




**THE UNIVERSITY
OF ILLINOIS
LIBRARY**

Q. 540.5
CC
v.96¹



CHEMISCHES ZENTRALBLATT

VOLLSTÄNDIGES REPERTORIUM
FÜR ALLE ZWEIGE DER REINEN UND ANGEWANDTEN CHEMIE

HERAUSGEGEBEN VOM
VORSTANDE DER
DEUTSCHEN CHEMISCHEN GESELLSCHAFT

VERTRETEN DURCH
PROF. DR. W. MARCKWALD

REDIGIERT VON
DR. MAXIMILIAN PFLÜCKE UND DR. ERNST BEHRLE

96. JAHRGANG (7. FOLGE. 7. JAHRGANG) 1925. I.

UNIVERSITY OF ILLINOIS
LIBRARY-CHEMISTRY

ERSTES QUARTAL. JANUAR BIS MÄRZ
SEITE 1—1672

VERLAG CHEMIE, G. M. B. H.
LEIPZIG — BERLIN

1925

PRINTED IN GERMANY^a.

UNIVERSITY OF ILLINOIS
LIBRARY

Q.5405-

CC

v 96

p 1

2

LESTER QUANTAL JACOB AND KATE
BETTE - 1912

VERLAG OHNE G.M.B.H.
LEIPZIG - BERLIN

1893

PRINTED IN GERMANY

1000

Die Bearbeitung des Sachregisters wird wieder wie früher von der Schriftleitung des Chemischen Zentralblatts ausgeführt werden. Es ist beabsichtigt, in Zukunft nicht nach Abschluß eines Halbjahrsbandes ein Sachregister herauszugeben, sondern den Umfang der Berichterstattung eines ganzen Jahres in einem Sachregister zu vereinigen, das nach Abschluß des zweiten Halbjahres erscheint. Mit diesem

Jahres-Sachregister

wird in innigem Zusammenhange ein *Formel-Register* der organischen Verbindungen stehen. Das vor einigen Jahren in Fortfall gekommene systematische Register wird in ausgedehntem Maße als Grundlage für das Jahres-Sachregister dienen. Die *Autorenregister* werden wie bisher nach Abschluß jedes Halbjahrsbandes herausgegeben.

Die Schriftleitung des Chemischen Zentralblatts macht weiter darauf aufmerksam, daß auch in diesem Jahre die laufend referierten Zeitschriften eine Erweiterung erfahren haben, und daß auch der Umfang der Berichterstattung hinsichtlich der Patentliteratur erweitert worden ist. Um trotz des vergrößerten Umfanges das Patentreferatenmaterial in denselben Textumfang des Zentralblatts zu bringen, war es nötig, in dem Abdruck der *Patentrücksichtreferate* eine Vereinfachung zu schaffen. Aus diesem Grunde wird in Zukunft nicht jedes ausländische Patent, das die Berichterstattung berücksichtigt, im Textteil sich befinden, es wird vielmehr wie folgt verfahren: das erste veröffentlichte Patent des Erfinders wird referiert, während die identischen ausländischen Parallelpatente in einer gesonderten Tabelle am Schlusse eines jeden Halbjahres aufgeführt sind, wie das bereits 1924. II. Seite 3392 geschehen ist.

Die Schriftleitung des Chemischen Zentralblatts

M. Pflücke.

E. Behrle.

A. Allgemeine und physikalische Chemie.

T. M. Lowry, *Leute und Gewohnheiten*. I. Der Pegasus von van't Hoff. Geschichtliche Notiz über die seinerzeitige Ablehnung der Kekulé'schen Benzoltheorie u. der van't Hoff'schen Auffassung über Stereochemie durch KOLBE. (Chemistry and Ind. 43. 1048—50. 1924.)

BEHRLE.

E. Rutherford, *Anfänge der Radioaktivität*. Persönliche Erinnerungen des Vfs., anknüpfend an seine erste Unters. über Radioaktivität. (Journ. Franklin Inst. 198. 281—89. 1924. Cambridge.)

K. WOLF.

VII. 1.


612046

Eugène Derrien, *Eugène Lambling* (1857—1924). Nekrolog auf den als Professor der biol. Chemie an der Universität Lille verstorbenen Forscher. (Bull. Soc. Chim. Biol. 6. 812—15. 1924.) SPIEGEL.

K. Schaum, *Heinrich Bernhard Rathke* (1840—1923). Nachruf auf den auf physikal., anorg.- u. organ.-chem. Gebiet namhaften Forscher. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 57. A. 83—92. 1924.) LINDENBAUM.




Pierre Lecomte du Noüy, *Eine neue Bestimmung der Avogadroschen Konstanten N auf Grund ihrer Definition*. In früheren Arbeiten (vgl. Philos. Magazine [6] 48. 264; C. 1924. II. 2129 u. C. r. d. l'Acad. des sciences 178. 1904; C. 1924. II. 999) entwickelte Vf. die Technik zur Erzeugung monomolekularer Adsorptionsschichten von Kolloiden an Wasseroberflächen u. Kriterien zu ihrer Erkennung, derer hauptsächlichstes das Auftreten von Minimis bei bestimmten Konz. ist. Es wird dann angenommen, daß bei diesen Konz. die gesamte Wassermasse, die sich in einem Uhrglase befindet, in einer eine Molekülschicht dicken Adsorptionsschicht, wie in einem Sacke stecke. Verschiedenen Minimis bei verschiedenen Konz. entsprechen dann verschiedene Orientierungen der Moleküle. Für *Na-Oleat* fand Vf. außer dem früher gefundenen noch zwei bei den Verdünnungen 1:1390000 u. 1:1220000; die drei Minima werden als monomolekulare Schichten, in jeweils nach den drei Dimensionen verschiedenen Packungen interpretiert. Aus dieser Annahme läßt sich das Vol. eines Mol. berechnen u. mittels des bekannten spezif. Gew. seine M. Durch Division des Mol.-Gew. durch die M. eines Mol. errechnet sich die Avogadrosche Konstante $n = 6,003 \times 10^{23}$. Die Diskussion der Fehlermöglichkeiten führt zu einem wahrscheinlichen Fehler von $\pm 0,15\%$ u. es wird wahrscheinlich gemacht, daß der Fehler, der in die Rechnung eingeht, durch die sicherlich nicht streng richtige Annahme, daß sämtliche Moleküle in die Adsorptionsschicht treten, innerhalb der Meßfehler fällt. (Philos. Magazine [6] 48. 664—72. 1924. ROCKEFELLER Inst. f. med. res., New York.) KYROPOULOS.

Edward C. Franklin, *Systeme von Säuren, Basen und Salzen*. Der Zweck der folgenden Unters. war, zu zeigen, daß nicht nur O, sondern auch S, N, Halogene u. in bemerkenswertem Umfange auch C Säuren, Basen u. Salze bildende Elemente im Lavoisierschen Sinne sind. Die gewöhnlichen Sauerstoffsäuren, -basen u. -salze werden als Derivv. des W. angesehen. Wird darin Sauerstoff durch Schwefel ersetzt, so gelangt man von dem sog. Aquosystem zu dem Schwefelwasserstoffsystem der Säuren, Basen u. Salze. So wird z. B. KSH als Thiobase gedeutet, welche z. B. mit der Säure H_2CS_3 das Salz $(\text{KS})_2\text{CS}$, u. mit der dem Oxyd entsprechenden Verb. CS_2 $(\text{KS})_2\text{CS}$ u. H_2S bildet. S spielt in den Komponenten dieses Systems genau dieselbe Rolle wie O in denen des W.-Systems, u. man könnte erwarten, daß zu allen Säuren, Basen u. Salzen des W.-Systems Analoge im H_2S -System auftreten; daß die Anzahl dieser Verbb. jedoch so viel kleiner ist, liegt daran, daß viele 1. Verbb. des H_2S -Systems in Ggw. von W. der Hydrolyse unterworfen werden, u. daß also W. ein zu ihrer Darst. ungeeignetes Lösungsm. ist; hierfür wäre fl. H_2S geeignet, wenn es ein Elektrolyt wäre. — In allen Eigenschaften, welche dem W. die einzigartige Stellung unter den Lösungsmm. verleihen, kommt fl. NH_3 dem W. am nächsten. Fl. NH_3 erweist sich als ausgezeichnetes Lösungsm. für die Verbb. des NH_3 -Systems, die sog. Ammonobasen (z. B. KNH_2 , PbNH), Ammonosäuren (z. B. $\text{C}(\text{NH}_2)_4$, $\text{HNC}(\text{NH}_2)_2$, NCNH_2 , $(\text{NC})_2\text{NH}$, dem Oxyd entspricht C_3N_4) u. den Ammonosalzen. Diese müssen in fl. NH_3 durch Rk. der Ammonosäuren mit den Ammonobasen gebildet werden, was durch die 3 experimentell bestätigten Gleichungen:







wiedergegeben wird. Ferner bewirken die Ammonoverbb. in fl. NH_3 auch analoge


Farbumschläge bei Indicatoren wie die Verbb. des W.-Systems; so ist z. B. eine Lsg. von Phenolphthalein in fl. NH_3 farblos, durch KNH_2 erhält sie die charakterist. rote Färbung, die durch Dicyanamid wieder zum Verschwinden gebracht werden kann. Die Lsgg. der Salze, Basen u. Säuren des NH_3 -Systems sind elektr. leitend. Die B. der Ammonobasen wird durch die typ. Rkk.:




dargestellt. — Von der 3. Kolumne des period. Systems sind die Ammonosäuren $\text{B}(\text{NH}_2)_3$, $\text{B}_2(\text{NH}_3)$ u. $\text{HN}=\text{Al}=\text{NH}_2$ bekannt, von der 4. Kolumne die Säuren



von der 5. die Curtiusche Stickstoffwasserstoffsäure, $\text{H}-\text{N}=\text{N}=\text{N}$, sie steht in demselben Verhältnis zu NH_3 wie HNO_3 zu W. u. stellt eine Ammonosalpetersäure dar, dafür sprechen folgende interessante Beobachtungen: Ein Gemisch von HCl u. HNO_3 löst Au u. Pt u. oxydiert Fe^{II} zu Fe^{III} . Eine w. Mischung von HJ u. NaNO_3 macht J_2 frei u. löst Au . Ebenso wie KNO_3 als Oxydationsmittel wirkt, so ist KN_3 geneigt, N an andere Verbb. abzugeben. Und schließlich wurde gefunden, daß KNO_3 in fl. NH_3 der „Ammonolyse“ ausgesetzt, KN_3 , K-Ammononitrat, bildet: $\text{KONO}_2 + 2\text{NH}_3 = \text{K}-\text{N}=\text{N}=\text{N} + 3\text{H}_2\text{O}$. Eine andere Klasse von Ammonosäuren, deren Analoge im W.-System theoret. unmöglich sind, sind Pyrrol, $(\text{C}_4\text{H}_4)\text{NH}$, Indol, $(\text{C}_8\text{H}_6)\text{NH}$, Carbazol, $(\text{C}_{12}\text{H}_8)\text{NH}$, Imidazol, $(\text{C}_4\text{H}_3\text{N})\text{NH}$, u. Purin, $(\text{C}_5\text{H}_3\text{N}_3)\text{NH}$. Ihre Lsgg. in fl. NH_3 wirken auf Na, K, Mg u. Ca unter H_2 -Entw. u. bilden krystallin. Salze. HCN stellt rein formal eine Ammonocarbonsäure dar, in der 2 H durch 1 C ersetzt sind. Folgende Rkk. bestätigen die Auffassung von KCN als K-Ammonocarbonit:



Auch die den Zinkaten, Plumbiten u. Aluminaten entsprechenden amphoteren Ammonosalze existieren u. werden sehr leicht gut krystallisiert erhalten, u. zwar ist auch die Anzahl der Metallamide, die mit KNH_2 in dieser Weise reagieren, sehr groß, neben den genannten wurden noch Ammonocadmiat, -cuprit, -argentat, -manganit, -thallit, -nickelit, -magnesi, -bariat, -strontiat, -calciat u. sogar -natriat u. -lithiat gefunden. Zu den sog. ammonobas. Salzen gehört der Nesslernd. HgNH_2Cl u. HgNJ . — Daß auch HF ein ähnliches System von Säuren, Basen u. Salzen bildet, erläutern die folgenden Gleichungen:



Als Methano- oder Carbonosäuren könnten z. B. Nitromethan u. Tricyanomethan, als Methano- oder Carbonobasen, Na-Methyl, Zn-Dimethyl angesehen werden. Das Na-Salz des Nitromethans, $\text{CH}_2=\text{NOONa}$, kann jedoch nicht als Methanosalz angesehen werden, sondern es ist ein Aquosalz, das Na-Salz des Triazomethans, $(\text{NC})_2=\text{C}=\text{C}=\text{NNa}$, ein Ammonosalz. Diejenigen Gruppen, die stark polare Elemente, wie O, S, N oder Halogene, enthalten, müssen als negative Radikale bei der B. von Methanosäuren ausgeschlossen werden. Methanosäuren sind z. B. C_3H_2 , Cyclopentadien, $(\text{C}_4\text{H}_4)\text{CH}_2$, Inden, $(\text{C}_8\text{H}_6)\text{CH}_2$, u. Fluoren, $(\text{C}_{12}\text{H}_8)\text{CH}_2$. — Die Betrachtungen werden auf Mischverbb., Verbb., die sich gleichzeitig von 2 der genannten Systeme herleiten, ausgedehnt, zu diesen gehört z. B. Acetanilid, $\text{CH}_3\text{CO} \cdot$

NH_3 , eine Aquoammonoessigsäure. (Journ. Americ. Chem. Soc. **46**. 2137—51. 1924. Stanford Univ. [Cal.])




JOSEPHY.

Richard M. Badger, *Das Gleichgewicht zwischen Ammoniak, Kohlenstoff, Cyanwasserstoff, Wasserstoff und die freie Energie von Cyanwasserstoff*. Das Gleichgewicht $\text{NH}_3 + \text{C}_{\text{fest}} \rightleftharpoons \text{HCN} + \text{H}_2$ wird bei 800° absol. untersucht. Vgl. Beschreibung u. Abb. des App. im Original. Das mit N_2 verd. Gasgemisch wurde über erhitzte Holzkohle geleitet. Das Maß, mit dem $\text{HCN} + \text{H}_2$ reagieren, wächst nicht mit der 1. Potenz des Partialdrucks von HCN , sondern es war sogar, wenn HCN enthaltender N_2 über den Katalysator geleitet wurde, hoch im Vergleich zu dem Maß, in dem es durch Zers. von NH_3 entsteht. Indessen wird die Gleichgewichtskonstante von der Richtung, in welcher man sich dem Gleichgewicht nähert, wenig beeinflusst. Aus den Daten von HABER (Ztschr. f. Elektrochem. **20**. 597; C. 1915. II. 33) über das NH_3 -Gleichgewicht ergibt sich für die freie Energie F von HCN bei 800° absol. $F = 28400 \text{ cal. } F = 30600 + 0,60 T \ln T - 0,00068 T^2 + 0,00000011 T^3 - 6,3 T$ führt für $T = 298^\circ$ zu $F = 29700 \text{ cal.}$ (Journ. Americ. Chem. Soc. **46**. 2166—72. 1924. Pasadena [Cal.], Inst. f. Technol.)

JOSEPHY.

L. J. Olmer, *Zersetzungsgeschwindigkeit der ammoniakalischen Silberoxydlösung in Gegenwart eines Ammoniaküberschusses*. (Vgl. Bull. Soc. Chim. de France [4] **35**. 847; C. 1924. II. 1676.) Vf. hat l. c. gezeigt, daß Ag_2O in überschüssigem NH_3 nach l. reagiert. Es wurde nunmehr aus dem entwickelten N_2 die Zersetzungsgeschwindigkeit des Ag_2O unter verschiedenen Bedingungen ermittelt. Die Verss. wurden, meistens mehrere Monate hindurch, in einem Thermostaten bei 20—30° angestellt. Einfluß der Temp.: Bei einer Erhöhung um 10° (von 20° auf 30°) steigt die Zersetzungsgeschwindigkeit um das 3,8-fache. — Einfluß des Lichts: Dieser scheint nicht zu bestehen; bei den Verss., bei denen dem Sonnenlicht ausgesetzte Rk.-Gefäße gegenüber den vor Sonnenstrahlen geschützten Gefäßen erhöhte Zersetzungsgeschwindigkeit zeigten, ist der Unterschied wohl eher auf die unvermeidliche Temperatursteigerung zurückzuführen. — Einfluß des Schüttelns: Dieser besteht wohl nur darin, daß am Ag haftender N_2 rascher losgelöst u. in die Meßbürette getrieben wird; eine Erhöhung der Zersetzungsgeschwindigkeit wird nicht hervorgerufen. — Einfluß fester Katalysatoren: a) Glaspulver beschleunigt die Zers. stark. Mit Paraffin überzogene Reaktionsgefäße, die auf 20 cm Lsg. (0,934 At. Ag + 14,64 Mol. NH_3 enthaltend) 10 g Glassplitter zugesetzt erhielten, zeigten nach 20 Tagen eine Zers. von 26,91% gegenüber 7,89% einer Lsg., die frei von Glassplittern waren. Bei Glaspulver wurden mit einer ähnlichen Lsg. bei 30° 35,7% ohne Glaspulver 18,9% zers. Es ergibt sich aus diesen Verss., daß die Oberfläche des Katalysators auch von Wichtigkeit ist. b) Katalyt. wirken ebenfalls: SiO_2 , MnO_2 u. Ag. Platinmohr scheint nicht katalyt. zu wirken. Da sich in allen Fällen Ag abscheidet, das auch katalyt. wirkt, wurden, um nur den Einfluß eines einzelnen Katalysators zu untersuchen, die weiteren Verss. nur mit Ag angestellt. Deutlich macht sich der Einfluß verschiedener Mengen des Katalysators bemerkbar (Kurven für alle Verss. im Original) vor allem in den ersten Stadien des Verss.; im weiteren Verlauf der Rk. tritt die Wrkg. des Katalysators weniger hervor, da sich ohnehin Ag abscheidet. Unabhängig von der Menge des Katalysators entspricht der Endzustand der Zers. fast demselben Wert; es wurden gefunden bei 20° (0,99 Atome Ag + 7,43 Mol. NH_3) mit 0,2 g Ag 65,7%; 0,3 g Ag 65,4%; 0,4 g Ag 66,7%; 0,5 g Ag 65,8% Zers. nach 139 Tagen. Mit derselben Lsg. u. der gleichen Katalysatormenge bei 30° ergab sich, daß dieselben Werte erreicht werden, jedoch in früherer Zeit (ca. 35 Tage). — Einfluß verschieden großer Oberfläche des Katalysators bei gleichem Gewicht: die Geschwindigkeit wird nur wenig vergrößert, wenn Draht mit verschieden großer Oberfläche benutzt wird; ein Draht mit 20-fach vergrößerter Oberfläche verdoppelt im Laufe von 15 Tagen die Zers.;

die mit dem gleichen Gewicht Silberpulver erzielte Zers. ist erheblich größer. Ag-Pulver wirkt besser als die gleiche Menge Au-Pulver: Zers. nach 12 Tagen 61,1 u. 3,6%. Da in diesem Falle die Katalysatoren fast gleiche Oberflächen hatten, ist anzunehmen, daß Ag chem. katalyt. wirkt. Bzgl. der Oberfläche des Katalysators, die mit der Fl. in Berührung kommt (gleiches Gewicht des Ag in Zylindern verschiedenen Durchmessers) hat sich ergeben, daß die Zers. bei größerer Oberfläche rascher eintritt; proportionale Beziehungen konnten jedoch nicht festgestellt werden. — Einfluß löslicher Katalysatoren: Es wurden KOH u. NH_4OH zugegeben mit dem Ergebnis, daß beide katalyt. wirken; 1 Mol. KOH entspricht in seiner Wrkg. 10 Mol. NH_4OH . — Einfluß von NH_3 in verschiedener Konz.: Erhöhung der Konz. beschleunigt die Zers. Wird die Konz. z. B. auf das 1,33-fache erhöht, so nimmt die Zers. um das Doppelte zu. Ist kein Überschuß NH_3 vorhanden (0,554 At. Ag u. 1,77 bzw. 3,53 Mol. NH_3), so zeigen die Zersetzungskurven einen eigentümlich abweichenden Verlauf; die Rk. ist anfangs sehr langsam, die Geschwindigkeit steigt danach an, u. die Zers. geht weiter (72%) als in den bisherigen Fällen. Zurückzuführen ist dies darauf, daß, wenn kein NH_3 -Überschuß vorhanden ist, AgNH_2 entsteht, das bei der Zers. ein größeres Vol. N_2 gibt als Ag_3N (aus dem gleichen Gewicht Ag). Lsgg., in denen die Konz. $\text{Ag}_2\text{O} : \text{NH}_3 = 2 : 7$, zeigen trotz Anwesenheit des Katalysators nach 28 Tagen keine Zers., es existiert demnach eine „Zersetzungsgrenze“; ihre Lage hängt von der Temp. ab: bei 7 Mol. NH_3 im l bleiben bei 15° gel. 0,330, bei 20° 0,320, bei 30° 0,196, bei 45° 0,127 At. Ag. Es muß sich beim Verlauf der Rkk. demnach um endotherme Prozesse handeln.



Theoret. lassen sich aus den Versuchsergebnissen folgende Schlüsse ziehen: die gemessene Zersetzungsgeschwindigkeit ist nicht zurückzuführen auf Diffusionsgeschwindigkeit, denn die Zers. erfolgt sehr langsam, obwohl durch den entwickelten N_2 die Diffusion begünstigt werden müßte; dieses würde beim Schütteln des Gefäßes sich ebenfalls bemerkbar machen müssen, es ist jedoch gezeigt worden, daß die Geschwindigkeit der Zers. beim Schütteln nicht gesteigert wird. Ferner ist der Temperaturkoeffizient (3,8) im Vergleich zu dem sonst bei heterogenen Systemen gefundenen (2—3) verhältnismäßig hoch; diese Erscheinung ist erklärlich, wenn man annimmt, daß das stark endotherm. Ag_3N gebildet wird. Es muß sich demnach bei der Zersetzungsgeschwindigkeit von Ag_2O durch NH_3 um eine chem. Rk. handeln. Vf. hat dann unter der Voraussetzung, daß die B. von Ag_3N schneller erfolgt als seine Zers., u. daß bei der Rk. diese Zersetzungsgeschwindigkeit gemessen wird, rechner. u. auf Grund der Verss. festgestellt (bzgl. der mathemat. Ableitungen muß auf das Original verwiesen werden), daß, wenn kein Katalysator anwesend ist, die Zers. des Ag_3N die langsamere Rk. ist, die Rk. ist autokatalyt. Ist nur sehr wenig Katalysator vorhanden, so werden noch ziemlich konstante K -Werte erhalten, die Rk. bleibt autokatalyt., jedoch zeigt sich schon, daß der Katalysator die Zers. von Ag_3N beschleunigt. In den Fällen, in denen der Katalysator reichlich vorhanden ist, lassen sich die erhaltenen Zers.-Kurven durch eine Gleichung nicht mehr wiedergeben. Ist die Katalysatormenge hinreichend groß, so kann die Rk.-Geschwindigkeit durch Vermehrung des Katalysators nicht mehr verändert werden; in diesem Falle wird die Geschwindigkeit nicht durch die Zers., sondern durch die B. von Ag_3N bestimmt. Vf. hat festgestellt, daß die Rk., die zur B. von Ag_3N führt, eine trimolekulare ist. Man könnte nun annehmen, daß die Verb. $\text{Ag}, 2\text{NH}_3, \text{OH}$ in Lsg. zerfällt nach 2). Frühere Verss. des Vfs.

haben gezeigt, daß, wenn kein NH_3 -Überschuß vorhanden ist, AgNH_2 entsteht. Nimmt man nun an, daß diese Verb. sich stets bildet (Gleichung 3.) u. nach 4. zerfällt, so ist die Rk. ebenfalls trimolekular. Schließlich, wenn man annimmt, daß die B. von AgNH_2 die Rk.-Geschwindigkeit regelt, ergibt sich auch die Rk. 5. als denkbar; diese Rk. würde den Einfluß von NH_3 auf die Geschwindigkeit der Zers. erklären. Mit Rücksicht auf das Auftreten einer Zersetzungsgrenze ist Vf. jedoch geneigt, Gleichung 4. vorzuziehen.

Das Auftreten der Zersetzungsgrenze erklärt Vf. folgendermaßen: Aus Ag_2O u. NH_4OH entsteht das 1. „*Silberammoniumhydrat*“ $\text{Ag}_2\text{NH}_3\cdot\text{OH}$ (I), das stark ionisiert ist. Vf. nimmt nun an, daß die Ionen Ag_2NH_3^+ u. OH^- in Lsg. stabil sind, u. nur die Moll. untereinander unter B. von AgNH_2 reagieren. Dieses Amid zerfällt nach 4., schließlich zerfällt auch Ag_3N . Ist kein Katalysator anwesend, so findet 4. schneller statt als die Zers. von Ag_3N ; bei einem Katalysatorüberschuß wird dagegen Ag_3N schneller zers., als es sich bilden kann. Ist die Lsg. so verd., daß I vollkommen ionisiert ist, so kann kein AgNH_2 entstehen u. folglich auch keine Zers. stattfinden. Ist die Lsg. konz., die Ionisation also nicht vollständig, so reagieren die Moll. so lange, bis nur noch Ionen in der Lsg. sind. Zugabe von NH_4OH vermindert die Dissoziation von I, die Zahl der Moll. steigt u. damit auch die Zers. Alle OH' müssen dieselbe Wrkg. haben, was durch das Experiment bestätigt wurde (KOH); da KOH stärker ionisiert ist als NH_4OH erklärt sich hieraus die größere Wirksamkeit, die oben erwähnt worden ist. Mit der eben gegebenen Erklärung der Zers. steht allerdings das Verh. der Lsgg. bei Temperaturerhöhung nicht im Einklang. Die Dissoziation von I müßte hierbei zunehmen, die Moll. von I demnach — wie auch die Zers. — geringer werden, was den tatsächlichen Befunden widerspricht. (Journ. de Chim. physique 21. 113—42. 1924. Paris, Inst. Catholique.)

HABERLAND.

A. Berthoud und R. Brum, *Untersuchungen über die physikalischen Eigenschaften einiger organischer Verbindungen*. Von Methyl- u. Äthylmercaptan, Methyl u. Äthylsulfid, sowie Methyl- u. Propyläthyläther wurden folgende Konstanten bestimmt: Dampfdruckkurve, DD. der fl. u. dampfförmigen Verbb., Oberflächenspannung, krit. Druck u. Temp., sowie molekulare Verdampfungswärme. Ergebnisse tabellar. im Original. Aus ihnen lassen sich folgende Schlüsse ziehen: Die Koeffizienten f der van der Waalsschen Gleichung variieren wenig mit der Temp., die erhaltenen Zahlen liegen nahe beim Mittelwert 2,95, mit Ausnahme von Äthylpropyläther, wo der Koeffizient höher gefunden wurde. — Die Regel von RAMSAY, wonach man beim Auftragen von T_{aq} auf die Abszisse, von T_{aq}/T auf die Ordinate (T u. $T_{\text{aq}} =$ Temp., bei denen eine gegebene Substanz u. W. denselben Dampfdruck haben) eine Gerade erhält, gilt auch für die untersuchten Verbb. Die Troutonsche Regel wird annähernd erfüllt, einige Verbb. zeigen etwas höhere Werte. — Alle Verbb. folgen dem Matthiasschen Gesetz der geraden Mittellinie. — Der Quotient wirkliche krit. D.: theoret. krit. D. liegt nahe bei dem von YOUNG für n. Fl. gefundenen Wert 3,6. — Die Konstante K der Eötvösschen Formel liegt, wie bei n. Fl., nahe bei 2,12. — Der Wert b der van der Waalschen Gleichung hat additiven Charakter; der Wert $\sqrt{a}$ zeigt annähernd additiven Charakter. (Journ. de Chim. physique 21. 143—60. 1924. Neufchâtel, Univ.)

HABERLAND.

F. C. Thompson und W. H. Dearden, *Bemerkung über einen Versuch über Diffusion im festen Zustande und ihr möglicher Einfluß auf die Struktur fester Lösungen*. Vf. haben ein kleines Stück einer Ag-Au-Legierung, reines Ag u. reines Au in Elektrolyt-Cu eingehämmert u. bei 650° 70 Stdn. lang im Vakuum geglüht. Durch Anschleifen u. Ätzen wurde dann festgestellt, daß das Cu in die Ag-Au-Legierung 0,075 mm, in das Ag 0,15 mm u. in das Au 0,23 mm tief hineindiffundiert

war. Die genannten Metalle wurden für diesen Vers. ausgewählt, da ihre Atomvolumina etwa gleich groß sind. (Trans. Faraday Soc. **20**. 84—86. 1924. London.) LÜ.

G. Masing und **M. Polanyi**, *Zur Reißverfestigung von Zink durch Kaltrecken*. Die Vff. stellten Zerreißverss. an mit Zink „Kahlbaum“ u. Zink I gleicher Herkunft. Das Material wurde in 0,07—0,1 mm dicken, 30—50 mm langen u. 2—5 mm breiten ausgewalzten Streifen verwendet, deren Breite nach den Enden zu auf etwa das Doppelte zunahm. Die Verss. wurden bei der Temp. der fl. Luft angestellt, da sich bei dieser Temp. das Material vor dem Reißen nicht einschnürt. Einige Bleche wurden bis zum Vers. in fl. Luft aufbewahrt, andere etwa $\frac{1}{2}$ Std. auf 100 bis 400° zur Rekristallisation erhitzt. Die niederen Temp. erzeugten feines, die höheren grobes Gefüge. In den drei Zuständen: frisch gewalzt, fein u. grob rekristallisiert wurden die Verss. angestellt. In allen Fällen ergab sich eine höhere Reißfestigkeit als beim Einkrystall. Sie betrug bei $T = 85^\circ K$, für frischgewalztes Zn bis zu 45 kg/qmm, für feinkörnig rekristallisiertes mit einer Korngröße von etwa $80 \mu\mu$ ca. 15 kg/qmm u. für grobkörniges der ungefähren Korngröße von $50000 \mu^2$ ca. 5 kg/qmm. Der Riß erfolgte stets intrakrystallin. (Ztschr. f. Physik **28**. 169 bis 176. 1924. Kaiser WILHELM-Inst. f. phys. Chem. u. Elektrochem. u. Forschungslab. des Siemenskonzerns.) KYROPOULOS.

Otto Feußner, *Die Metalle im Lichte der Forschung an Metalleinkrystallen*. Kurze Zusammenfassung der derzeitigen Ergebnisse nach der Forschung von POLANYI u. Mitarbeitern sowie von CZOCHRAJSKI. (Metallbörse **14**. 1977—78. 2001—2. 2025—26. 2049. 1924.) BEHRLE.

E. Grüneisen und **E. Goens**, *Untersuchungen an Metallkrystallen*. III. *Thermische Ausdehnung von Zink und Cadmium*. (II. vgl. Ztschr. f. Physik **26**. 250; C. **1924**. II. 1659.) Mit Hilfe des Henningschen Ausdehnungsapparates werden an Zn u. Cd Einkrystallstäbchen die mittleren Ausdehnungskoeffizienten parallel u. senkrecht zur hexagonalen Achse zwischen $+100^\circ$ u. -253° bestimmt. Es werden die Einkrystallstäbe so ausgewählt, daß die hexagonale Achse fast mit der Stabrichtung zusammenfällt oder senkrecht dazu steht, und aus einer Anzahl von Beobachtungen werden die Messungen auf die hexagonale Achse selbst umgerechnet. Es ergab sich, daß sich besonders bei tiefen Temp. die Anisotropie in den therm. Eigenschaften stärker ausprägt als in den elast. Eigenschaften. Bei $T = 333,2^\circ$ absol. beträgt der Ausdehnungskoeffizient parallel zur hexagonalen Achse bei Zn $64 \cdot 10^{-6}$, bei Cd $53 \cdot 10^{-6}$, senkrecht dazu bei Zn $14 \cdot 10^{-6}$, bei Cd $21 \cdot 10^{-6}$. Bei $T = 53,2^\circ$ sind die entsprechenden Werte parallel zur Hauptachse bei Zn $52,5 \cdot 10^{-6}$, bei Cd $54,5 \cdot 10^{-6}$, senkrecht dazu bei Zn $-2,1 \cdot 10^{-6}$, bei Cd $3,6 \cdot 10^{-6}$. Während also der Ausdehnungskoeffizient parallel zur hexagonalen Achse seinen hohen Wert im ganzen Temperaturintervall beibehält, u. in der Gegend von $T = 150^\circ$ sogar zu einem sehr flachen Maximum ansteigt u. erst unterhalb von 100° etwas abfällt, sinkt der sehr viel kleinere Ausdehnungskoeffizient senkrecht dazu rasch gegen Null ab u. nimmt schließlich negative Werte an. Auch bei Cd scheint er bei noch tieferen Temp. negativ zu werden. Mittels der Theorie des festen Körpers lassen sich die gemessenen Ausdehnungskurven in befriedigender Weise wiedergeben. Infolge der niederen atomaren Eigenfrequenz des Cd kann der Übergang zum negativen Ausdehnungskoeffizienten erst bei tieferen Temp. stattfinden als bei Zn. Da die atomare Eigenfrequenz bei Graphit bedeutend höher liegt, tritt in diesem Fall der negative Ausdehnungskoeffizient senkrecht zur hexagonalen Achse schon bei weit höheren Temp. auf (vgl. BACKHURST, Proc. Royal Soc. London Serie A **102**. 340; C. **1923**. I. 497). Dieses Verh. müssen sämtliche hexagonalen Krystalle mit starker elast. Anisotropie zeigen. (Ztschr. f. Physik **29**. 141—56. 1924. Charlottenburg, Physikal. Techn. Reichsanstalt.) BECKER.

W. Geiss, *Das Fließen von Einkrystallen*. Vf. untersucht die plast. Deformation

von *W*-Einkristallen bei verschiedenen, aber jeweils unveränderlichen Belastungen als Funktion von der Zeit. Die Drähte wurden vertikal aufgehängt u. die Verlängerung mit Hilfe eines Kathetometers gemessen. Die Versuchsdauer erstreckte sich für jeden Draht auf mehrere Stunden. Es zeigte sich, daß die Fließgeschwindigkeit eine Exponentialfunktion der Zeit war. Bei etwa 70 kg/qmm trat die erste bleibende Deformation ein. Bei kleineren Belastungen nahm infolge der Formverfestigung, welche eine Erhöhung der Elastizitätsgrenze bewirkt, die Fließgeschwindigkeit zeitlich ab. Bei der Elastizitätsgrenze war sie Null, bei der Streckgrenze konstant. Wurde die Streckgrenze überschritten, dann trat eine Beschleunigung der Fließgeschwindigkeit ein. Die Fließgeschwindigkeit ist durch folgende Formel dargestellt: $v = A e^{B(P - P_s)t} \cdot [e^{C(P - P_e)} - 1]$, wenn *P* die Belastung, *P_s* die Streckgrenze, *P_e* die Elastizitätsgrenze u. *A*, *B*, *C* die Konstanten sind. (Ztschr. f. Physik 29. 78—80. 1924. Eindhoven, PHILLIPS Glühlampenfabriken.) BECKER.

K. P. Chatterjee und **N. R. Dhar**, *Studien über schwerlösliche Salze, die aus heißen Lösungen der reagierenden Substanzen schnell erhalten werden*. I. Im Gegensatz zu vielen Salzen, deren Löslichkeit mit steigender Temp. ansteigt, wird bei anderen Substanzen die B. von Ndd. durch Erhitzen gefördert. Zu letzteren gehören die Oxalate von Cu, Zn, Mn, Fe (2), Mg, Th u. Co, während bei den Oxalaten von Ca, Sr, Ba, Cd, Tl, Ag u. Pb die Löslichkeit mit der Temp. ansteigt. Dieselben Erscheinungen beobachten Vff. an einer Reihe von anderen Salzen, *Tartraten*, *Citraten*, *Benzoaten*, *Fluoriden* u. führen sie auf die B. von verschiedenen Hydraten zurück. Die Löslichkeit steigt mit dem Grad der *Hydratisierung*. Bei einer Reihe von Salzen, die in der Hitze u. bei gewöhnlicher Temp. dasselbe Hydrat bilden ($MgC_2O_4 \cdot 2H_2O$) u. deren Löslichkeit mit der Temp. steigt, wird auch die B. von Ndd. (aus $MgSO_4 + K_2C_2O_3$) durch Erhitzen gefördert. Aus den Unterss. über den Einfluß der Temp. auf die Geschwindigkeit der Niederschlagsbildung schließen Vff., daß die Erhöhung der Temp., wie bei allen anderen chem. Rkk., auch hier beschleunigend wirkt. Erfolgt keine Bewegung der reagierenden Substanzen, so folgt die *Rk.-Geschwindigkeit* der Gleichung: $(Kt + 10)/Kt = 1,5$.

Calciumcitrat bildet 4 Hydrate, 1. $Ca_3(C_6H_5O_7)_2 \cdot 16H_2O$, ll., hygroscop., labil, 2. mit $6H_2O$, das gewöhnliche Hydrat (bei Zimmertemp. gefällt), 1. bei 30° 2,01 g/l, bei 95° 2,27 g/l (wasserfreies Salz), geht beim Erhitzen (Umwandlungspunkt 52°) über in 3. mit $4H_2O$, 1. bei 30° 2,2 g/l, bei 95° 1,83 g/l (wasserfreies Salz). 4. mit $\frac{1}{2}H_2O$, entsteht bei 110°, bildet in Lsg. das Tetrahydrat zurück. — *Strontiumcitrat*, 1. wasserreiches labiles Hydrat wie Ca, 2. $Sr_3(C_6H_5O_7)_2 \cdot 5H_2O$, 1. bei 30° 1,26 g/l, bei 95° 1,57 g/l (wasserfrei), in sd. Lsg. beständig, geht bei Bestrahlung mit trop. Sonnenlicht in 3. das Monohydrat über, 1. bei 30° 2,97 g/l, bei 95° 1,54 g/l, bildet in W. nicht das Pentahydrat zurück. — *Nickeloxalat* bildet, bei gewöhnlicher Temp. gefällt, das Hydrat $3NiC_2O_4 \cdot 8H_2O$, in der Hitze $3NiC_2O_4 \cdot 7H_2O$. — *Kobalt-oxalat*, bei 30° $4CoC_2O_4 \cdot 9H_2O$, bei 100° $CoC_2O_4 \cdot 2H_2O$. — *Cuprioxalat*, krystallisiert sowohl in der Hitze wie in der Kälte wasserfrei. — *Manganoxalat* bildet nur ein Hydrat, $MnC_2O_4 \cdot 2H_2O$, 1. bei 36° 0,375 g/l, bei 93° 0,78 g/l. — *Magnesiumoxalat*, nur ein Hydrat $MgC_2O_4 \cdot 2H_2O$, 1. bei 36° 0,338 g/l, bei 92° 0,406 g/l (bei 30° gefällt), 1. bei 36° 0,302 g/l, bei 92° 0,393 g/l (bei 100° gefällt). — *Ferrooxalat*, nur ein Hydrat $FeC_2O_4 \cdot 2H_2O$. — *Zinkoxalat*, nur $ZnC_2O_4 \cdot 2H_2O$. — *Thoriumoxalat*, nur ein Hydrat $Th(C_2O_4)_2 \cdot 6H_2O$. — *Magnesiumtartrat*, ein Hydrat $MgC_4H_4O_6 \cdot 2\frac{1}{2}H_2O$, 1. bei 30° 7,6 g/l (wasserfrei), bei 90° 14,4 g/l (bei 30° gefällt), bei 30° 7,5 g/l, bei 90° 14,5 g/l (bei 100° gefällt). — *Mangantartrat*, ein Hydrat $MnC_4H_4O_6 \cdot 2H_2O$. — *Kobalttartrat*, ein Hydrat $CoC_4H_4O_6 \cdot 2\frac{1}{2}H_2O$, 1. bei 29° 1,85 g/l, bei 84° 2,45 g/l, geht bei 60° in das wasserfreie Salz über. — *Nickeltartrat*, bei 30° gefällt, $NiC_4H_4O_6 \cdot 3H_2O$, bei 100° mit $2\frac{1}{2}H_2O$, beide gehen bei 170° in wasserfreies Salz über, dieses bildet mit W. ein Gemisch von beiden Hydraten zurück. — *Calciumtartrat*, bei

gewöhnlicher Temp. u. im Sieden gefällt: $\text{CaC}_4\text{H}_4\text{O}_6 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$, geht bei 170° über in $\text{CaC}_4\text{H}_4\text{O}_6 \cdot \frac{1}{4}\text{H}_2\text{O}$, dieses bildet mit W. $\text{CaC}_4\text{H}_4\text{O}_6 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$. — *Strontiumtartrat*, bei 30° gefällt, $\text{SrC}_4\text{H}_4\text{O}_6 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$, bei 100° mit $1\text{H}_2\text{O}$, hat bei 170° noch nicht alles W. verloren, anscheinend Hemihydrat. — *Ferrotartrat* bildet keine Hydrate. (Journ. Physical Chem. 28. 1009—28. 1924. Allahabad, Indien.) ZANDER.

V. Cuttica und A. Tocchi, *Über den Isomorphismus von Gemischen des Thoriums mit denen des vierwertigen Cers.* Zur Frage der Aufklärung der Frage des Isomorphismus von Gemischen des Th mit denen des vierwertigen Ce stellen Vf. mehrere Mischsalze her. Die einzelnen Salze werden fraktioniert, kristallisiert u. die einzelnen Krystallisationen analysiert. Die Analysen ergeben, daß Ce u. Th nicht in stöchiometr. Verhältnissen in den verschiedenen Salzen enthalten u. daß die Verb. des Th in denen des entsprechenden Ce in fester Lsg. enthalten sind. Hergestellt wurden $(\text{Th}, \text{Ce})(\text{SO}_4)_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$, $(\text{NH}_4)_2(\text{Ce}, \text{Th})(\text{NO}_3)_6 \cdot 8\text{H}_2\text{O}$ u. $\text{Ni}(\text{Ce}, \text{Th})(\text{NO}_3)_6 \cdot 8\text{H}_2\text{O}$. (Gazz. chim. ital. 54. 628—33. 1924. Florenz.) GOTTFRIED.

W. Kopaczewski, *Die Katalyse und ihre Anwendung.* Zusammenfassende Darst. mit Literaturübersicht. (Moniteur scient. 14. 97—110. 177—89. 203—16. 1924.) JUNG.

Wilder D. Bancroft, *Kontaktkatalyse und Photochemie.* Wenn man mit LANGMUIR gerichtete Adsorption annimmt, kann man sich die Kontaktkatalyse auf zwei Arten erklären. Entweder nimmt man mit KRUYT u. VAN DUIN (Rec. trav. chim. Pays-Bas 40. 249; C. 1921. III. 699) an, daß das reagierende Mol. vom Katalysator so festgehalten wird, daß der reagierende Teil des Mol. nach außen zeigt, oder man muß annehmen, daß durch die Adsorption durch Störung des Gleichgewichts freie Radikale entstehen, u. daß diese reaktionsfähig sind. Vf. entscheidet sich für die zweite Betrachtungsweise, da nach Verss. von BERTHELOT u. GAUDECHON (C. r. d. l'Acad. des sciences 153. 383; C. 1911. II. 1016) durch definierte ultraviolette Bestrahlung z. B. bei der Zers. von A. derselbe Effekt erzielt wird wie durch Katalysatoren. Dann ist auch anzunehmen, daß die Adsorptionsverb., die man bisher für bestimmte Kontaktkatalysen verantwortlich machte, nur Zwischenstufen sind zu freien Radikalen. Da jeder Bindung bestimmte Absorptionsbanden zu entsprechen scheinen, sieht Vf. eine Zukunftsmöglichkeit der organ. Technik darin, eine bestimmte Bindung durch definierte Bestrahlung zu sprengen. (Ind. and Engin. Chem. 16. 270—71. 1924. Ithaka [N. Y.]) LESZYNSKI.

James B. Conant und Harold B. Cutter, *Irreversible Reduktion und katalytische Hydrierung.* (Vgl. Journ. Americ. Chem. Soc. 46. 1254; C. 1924. II. 1454.) Im Gegensatz zu den reversiblen Redd. (Chinon $\rightleftharpoons$ Hydrochinon, Nitrosobenzol $\rightleftharpoons$ Phenylhydroxylamin) tritt bei den irreversiblen (Azofarbstoffen, Nitroverb., verschiedenen ungesätt. Ketonen) kein Gleichgewicht ein, entweder hat das Red.-Mittel gar keinen Einfluß oder es verursacht vollständige Red. Das wirkliche Oxydations-Red.-Potential ist bei solchen irreversiblen Systemen nicht meßbar, man kann sie jedoch genau charakterisieren, indem man das Potential der schwächsten reduzierenden Substanz bestimmt, die Red. verursacht, das „scheinbare“ Red.-Potential. Die Messungen lassen sich um so genauer ausführen, je mehr Red.-Mittel von bekannten Potentialen verfügbar sind u. je geringer die Differenzen zwischen je zweien sind. Für Verb., die von Red.-Mitteln vom Potential + 0,150 nicht reduziert werden, sind verhältnismäßig wenig Reagenzien verfügbar, so daß die scheinbaren Red.-Potentiale ungenau sind.

Bei irreversiblen Redd. ist im Gegensatz zu katalyt. Hydrierungen das Red.-Potential der reduzierenden Substanz entscheidend dafür, ob die Red. stattfindet oder nicht. Der Einfluß der $[\text{H}^+]$ ist derselbe wie bei den reversiblen Redd. Das scheinbare Red.-Potential in A (75% Aceton + 25% wss. HCl, Gesamtsäurekonz. 0,2-n.) u. B (wss. 0,2-n. HCl) wird bestimmt bei: *Dibenzoyläthylen* (cis u. trans) in

A: $+0,27 (\pm 0,03)$, *Benzoylacrylsäure* in A u. B: $+0,08 (\pm 0,06)$, *Benzoylacrylsäureäthylester* in A: $+0,08 (\pm 0,06)$, *Maleinsäurediäthylester* in A: $-0,25 (\pm 0,10)$, *Maleinsäure* in A u. B: $-0,25 (\pm 0,10)$ (n. H-Elektrode = 0). — Der scharfe Unterschied zwischen der Einw. von H u. Pt-Katalysatoren einerseits u. V- u. Cr-Salzen andererseits auf Maleinsäure besteht in der Art der irreversiblen Anlagerung der H-Atome an die ungesätt. Bindung. Während bei dem l. Red.-Mittel die Anlagerung an die O-Atome erfolgt: $\text{HO} \cdot (\text{O} : \text{C} \cdot \text{CH} : \text{CH} \cdot \text{C}(\text{O}) \cdot \text{OH} \rightarrow (\text{HO})_2 : \text{C} : \text{CH} : \text{CH} : \text{C} : (\text{OH})_2 \rightarrow \text{HO} \cdot (\text{O} : \text{C} \cdot \text{CH}_2 \cdot \text{CH}_2 \cdot \text{C}(\text{O}) \cdot \text{OH}$ durch B. der Dienolform, die sich dann in die n. Form der *Bernsteinsäure* umlagert, erfolgt die Addition bei der katalyt. Hydrierung direkt an die doppelte Bindung. Damit stimmt überein, daß Äthylen-KW-stoffe durch l. Red.-Mittel nicht reduziert werden. Die Red. von C_2H_2 zu C_2H_4 durch CrCl_2 dürfte durch das besondere Verh. der dreifachen Bindung verursacht sein. (Journ. Physical Chem. **28**. 1096—1107. 1924.) ZANDER.

A₁. Atomstruktur. Radiochemie. Photochemie.

Leigh Page, *Beschleunigte Potentiale und ihre Anwendung für Atommodelle*. Eine allgemeine mathemat. Ableitung einer Emissionstheorie unter Annahme von beschleunigten u. verzögerten Potentialen im elektromagnet. Feld. (Physical Review [2] **24**. 296—305. 1924. Yale Univ.) BECKER.

Edmund C. Stoner, *Die Verteilung der Elektronen über die Atomniveaus*. Vf. bringt die Annahme einer Elektronenverteilung auf die Subniveaus des Atoms in Vorschlag, die sich auf die Landésche Klassifikation der Röntgenstrahlenniveaus mittels der drei Quantenzahlen gründet u. dadurch charakterisiert ist, daß die Anzahl der Elektronen auf jeder kompletten Schale gleich dem Doppelten der Summe der inneren Quantenzahlen ist. Für jedes Subniveau gilt bezüglich des Verhältnisses seiner Elektronenzahl zu seiner inneren Quantenzahl dasselbe. So hat z. B. Kr 2 K, 8 L, 18 M u. 8 N Elektronen. Die Verteilung wird mit der von BOHR angegebenen verglichen u. an Hand der Röntgenspektren, der magnet. Eigenschaften, der chem. Eigenschaften u. der opt. Spektren ausführlich diskutiert u. damit nicht in Widerspruch gefunden. (Philos. Magazine [6] **48**. 719—36. 1924. Cambridge.) KYR.

H. Sirk, *Der Durchmesser der Argonmolekel*, Gegenüber der Berechnung des Atom- gleich Mol.-Durchmessers von Ar zu $3,8 \times 10^{-8}$ durch SIMON u. v. SIMSON (Naturwissenschaften **11**. 1015; C. 1924. I. 870) ermittelt diesen Vf. aus Daten, die sich auf den fl. Zustand beziehen, zu $3,6 \times 10^{-8}$ cm. (Naturwissenschaften **12**. 920—21. 1924. Wien, Univ.) BEHRLE.

W. L. Bragg, *Der Einfluß der Atomanordnung auf den Brechungsindex*. Vf. berechnet die Brechungsindices einer Anzahl von Krystallen aus ihrer Struktur unter der Annahme, daß die Atome sphär. symmetr. Ionen bilden. Das elast. Verh. eines Ions zu der polarisierenden Kraft ist dann durch einen Koeffizienten definiert, welcher für jedes der betreffenden Ionen eine Konstante ist. Nach einer früher vom Vf. (Proc. Royal Soc. London Serie A **105**. 370; C. 1924. I. 2858) entwickelten Methode, welche bei der Berechnung der Brechungsindices von Kalkspat u. Aragonit aus den Krystallstrukturdaten angewendet wurde, berechnet der Vf. jetzt die Doppelbrechung des Al_2O_3 (*Korund*). Die berechneten u. gemessenen Werte zeigen eine gute Übereinstimmung. Auch die Brechung der Alkalihalogenide wird diskutiert. Weiter wird der Vers. gemacht, den umgekehrten Weg einzuschlagen u. aus der Brechung Aufklärung über den Krystallbau zu erhalten. Ein Vergleich der dem Kalkspat analog gebauten Nitrate (NaNO_3 , KNO_3) mit den Carbonaten zeigt, daß die NO_3 -Gruppe gegenüber der CO_3 -Gruppe eine gewisse Kontraktion aufweisen muß. Während beim Kalkspat die Entfernung C zu O $1,24 \text{ \AA}$. beträgt, ist die Entfernung beim NaNO_3 von N zu O nur $1,09 \text{ \AA}$. Die Möglichkeit, ähn-

liche Überlegungen auch auf Gase anzuwenden, wird kurz erörtert. (Proc. Royal Soc. London Serie A **106**. 346—68. 1924.) BECKER.

W. L. Bragg und **S. Chapman**, *Eine theoretische Berechnung der Rhomboederwinkel der Krystalle vom Calcittypus*. (Vgl. Proc. Royal Soc. London Serie A **105**. 370; C. **1924**. I. 2858.) Vf. machen die Annahme, daß ein Krystall vom Bautypus des Kalkspats durch die zwischen den einzelnen Atomen wirkenden elektrostatischen Kräfte zusammengehalten wird. Würden sich die Atome zu stark nähern, dann würde eine Abstoßungskraft in Tätigkeit treten. Im Zentrum eines Ca-Atoms trägt die Ladung $+2e$, eines C-Atoms $+4e$ u. eines O-Atoms $-2e$. Die elektrostatische Abstoßungskraft ist von den Zentren der Atome aus gerichtet. Bei der Annahme der Vf. werden die Abstände benachbarter Atome durch geringfügige Deformationen des Gitters nicht verändert. Es wird die elektrostatische Energie für jede Atomordnung berechnet u. der Rhomboederwinkel bestimmt, bei welchem die Energie ein Minimum ist. Denn dann ist die Gleichgewichtsbedingung erfüllt. Die Rechnung wurde an CaCO_3 , MgCO_3 , ZnCO_3 , CdCO_3 , MnCO_3 , FeCO_3 , $\text{CaMg}(\text{CO}_3)_2$ durchgeführt u. die berechneten Winkel durchweg um 3 bis 4° zu hoch befunden. (Proc. Royal Soc. London Serie A **106**. 369—77. 1924. Manchester, Univ.) BECKER.

A. J. Bradley, *Die Krystallstruktur der rhomboedrischen Formen von Selen und Tellur*. Vf. untersucht wie früher bei As (Philos. Magazine [6] **47**. 657; C. **1924**. II. 164) die Krystallstruktur von Se u. Te nach der Pulvermethode. Die Kantenlängen der Elementarrhomboeder, der Polkantenwinkel, D. u. Anzahl der Atome im Elementarparallelepiped berechnen sich bei Se zu $r = 4,35 \text{ \AA}$, $\alpha = 87^\circ 36'$, D. 4,82, $n = 3$. Für Te ergeben sich die analogen Zahlen zu $r = 4,445 \text{ \AA}$, $\alpha = 86^\circ 46'$, D. 6,25, $n = 3$. Auf das hexagonale Achsensystem bezogen ergibt sich bei Se $c:a = 1,14$, bei Te ist $c:a = 1,33$. Das Elementarparallelepiped besteht aus drei ineinander gestellten einfachen Rhomboedern, welche längs der dreizähligen Achse gegeneinander verschoben sind, während sie gegeneinander eine schraubenförmige Bewegung ausführen. So entsteht längs der dreizähligen Achse eine spiralige Atomordnung, welche, je nachdem ob diese Schraube links- oder rechtsgängig ist, zwei enantiomorphe Formen bedingen würde. Die zugrunde gelegte Raumgruppe ist D_3^3 , D_3^4 , D_3^5 oder D_3^6 . Mit Hilfe des Strukturfaktors wurden die Strukturparameter, welche die Verschiebung der einzelnen Gitter gegeneinander definieren, bestimmt. Die Elemente der IV., V. u. VI. Gruppe des period. Systems unterscheiden sich mit zunehmender elektronegativer Valenz durch zunehmende Abweichung der Krystallstruktur von kub. Symmetrie voneinander. (Philos. Magazine [6] **48**. 477—96. 1924. Manchester, Univ.) BECKER.

J. M. Byvoet und **A. Karssen**, *Röntgenstrahlenuntersuchung über die Krystallstruktur des Lithiumoxyds*. Li_2O wurde nach dem Debye-Scherrer-Verf. untersucht. Es kristallisiert kub. im CaF_2 -Typus mit einer Kantenlänge des Elementarwürfels von $a = 4,61 \text{ \AA}$. $D_{\text{ber.}} = 2,02$. Die Strukturfaktorbildung ergab eine hinreichend gute Übereinstimmung zwischen gemessenen u. berechneten Intensitäten, um die Struktur sicherzustellen. Jedoch konnten keinerlei Schlüsse auf die Abhängigkeit der Streuwirkung des O-Ions vom Gleitwinkel gezogen u. damit auch keine Einzelheiten über die Elektronenordnung ausgesagt werden. (Rec. trav. chim. Pays-Bas. **43**. 680—84. 1924. Amsterdam.) BECKER.

G. R. Levi, *Struktur der basischen Magnesiumcarbonate*. (Vgl. LEVI u. FERRARI Atti R. Accad. dei Lincei, Roma [5] **33**. I. 397; C. **1924**. II. 2118.) Vf. untersucht eine Anzahl natürlich vorkommender u. künstlich durch Neutralisation des Bicarbonats hergestellter basischer Magnesiumcarbonate sowie die Mineralien Hydro-magnetit, $4\text{MgO} \cdot 3\text{CO}_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$, u. Artinit, $2\text{MgO} \cdot \text{CO}_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$, nach dem Debye-Scherrer-Verf., ohne die Röntgenfilme jedoch weiter auszuwerten, um festzustellen, wie weit diese Verbb. die gleiche Krystallstruktur besitzen. Die bas. Carbonate mit einem

molekularen Verhältnis von $\text{MgO} : \text{CO}_2 = 1,135-1,335$ zeigen sämtliche die gleichen Interferenzlinien wie Hydromagnesit. Nur scheinen sie sich in der Teilchengröße voneinander zu unterscheiden. Dagegen zeigt Artinit eine andere Krystallstruktur. (Annali Chim. Appl. 14. 265—74. 1924. Mailand, Polytechn.) BECKER.

N. H. Kolkmeier, J. M. Byvoet und A. Karssen, *Die Krystallstruktur des Mercurisulfids*. I. Angabe der nach dem Debye-Scherrer-Verf. gefundenen Krystallstrukturdaten des schwarzen „amorphen“ HgS . (Vgl. Koninkl. Akad. van Wetensch. Amsterdam, Wisk. en Natk. Afd. 33. 327; C. 1924. II. 1154.) Die kub. schwarze Modifikation unterscheidet sich von der hexagonalen roten Modifikation dadurch, daß die tetraedr. Atomanordnung des schwarzen HgS beim Übergang in die rote Modifikation nicht gewahrt bleibt, obgleich der Atomabstand in der Oktaederfläche im ersten Fall u. die Basiskantenlänge im zweiten Fall gleich sind. Im Gegensatz dazu bleibt bei den dichtest gepackten hexagonalen Metallen Co u. Ce sowie bei ZnS beim Symmetriewechsel die tetraedr. Atomanordnung erhalten. (Rec. trav. chim. Pays-Bas. 43. 677—79. 1924. Utrecht, Amsterdam.) BECKER.

H. Mark, *Über die Anwendung der Röntgen-Krystallanalyse auf organische Strukturfragen*. Es werden die nach dem Drehkrystallverf. gewonnenen Abmessungen u. die möglichen, mit den Röntgenogrammen in Einklang stehenden Raumgruppen der folgenden Verbb. angegeben: *Tetrajodmethan, Tetraabrommethan* (stabile u. instabile Modifikation), *Pentaerythrit, Harnstoff, Monomethylharnstoff, symm. Dimethylharnstoff, symm. Diphenylharnstoff, symm. Diphenylthioharnstoff, Tetraphenylharnstoff, Metaldehyd, Acetaldehydammoniak, Hexamethylentetramin, Bzl., Hexachlorbenzol, Hexabrombenzol*, wozu noch einige röntgenograph. Angaben über *Benzoessäure* kommen. Bei allen Verbb. treten die Moll. als in sich geschlossene Gruppen im Krystallgitter auf. Bei der unter 45° beständigen monoklinen Modifikation des *Tetraabrommethans* ergeben sich Anhaltspunkte für die Existenz von C_2Br_2 -Moll. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 57. 1820—27. 1924.) BECKER.

G. C. Grindley und A. M. Tyndall, *Die Beweglichkeit in Luft von Ionen, die in einem anderen Gas erzeugt wurden*. Die Vf. untersuchten die Beweglichkeit positiver u. negativer Ionen, die in H_2 , NH_3 , CO_2 , Ä. u. Chlf. erzeugt wurden u. von dort in einen Luftstrom eintraten, indem sie die Ionen durch passende angelegte elektr. Felder in geeigneter Weise beschleunigten u. durch einen Schlitz auf die eine Platte eines Elektrometers auftreffen ließen u. bei variierender Spannung die Stromspannungskurve aufnahmen. Es ergab sich kein merklicher Unterschied zwischen der Beweglichkeit in Luft von Ionen, die direkt in Luft oder in einem der Versuchsgase erzeugt wurden. (Philos. Magazine [6] 48. 711—19. 1924.) KYR.

Rudolf Samuel, *Über Ionisation von Kaliumdampf durch Licht*. Es wird ein Molekülstrahl von K mit Wellenlängen von 2893 bis 2853 Å bzw. 2804 Å belichtet u. eine Ionisation des K -Dampfes festgestellt. Infolge der niedrigen elektr. Felder konnte Stoßionisation nicht in Betracht kommen. Unterhalb von 2804 Å wird der Effekt nicht weiter verstärkt. (Ztschr. f. Physik 29. 209—13. 1924. Göttingen, Univ.) BECKER.

A. Wigand, *Die durchdringende Höhenstrahlung*. Umfassende Zusammenstellung. (Physikal. Ztschr. 25. 445—63. 1924. Halle a. S.) BEHRLE.

W. Mund, *Die Radiochemie*. Eine Literaturstudie. (Bull. Soc. Chim. Belgique 33. 389—99. 1924.) K. WOLF.

Hermann Krefft, *Der Dopplereffekt an Kanalstrahlen des Wasserstoffs*. Nachtrag. Vf. trägt zu seiner früheren Arbeit (Ann. der Physik [4] 75. 75; C. 1924. II. 1769) einige Verss. über den Dopplereffekt bei der H_β -Linie nach. Die Intensitätsverteilung des Dopplereffektes ist unmittelbar vor der Kathode nicht dieselbe wie in weiteren Entfernungen von ihr. Wahrscheinlich befindet sich der Kanalstrahl an der Kathode noch nicht im Gleichgewicht. Die Komponenten der elektr.

Aufspaltung sind bei Betrieb mit Influenzmaschine ebenso scharf wie bei Betrieb mit Induktorium. Ein Zusatz von O_2 zum H_2 bewirkt, daß der Geschwindigkeitsbereich, auf welchen sich der Dopplereffekt beschränkt, kleiner wird. Es hat den Anschein, als ob H_2 u. O_2 als gemeinsamer Komplex im Kathodenfall beschleunigt werden, um dann hinter der Kathode wieder zu zerfallen. Die aus dem Maximal-effekt berechneten Spannungen lassen dabei auf ein zweifach geladenes H_2O -Mol. schließen. Ein Zusatz von N_2 zum H_2 ist auf den Geschwindigkeitsbereich des Dopplereffektes u. auf das Minimum zwischen ruhender u. bewegter Intensität ohne Einfluß. Auch bei dem O_2 -Zusatz bleibt das Minimum zwischen beiden Intensitäten erhalten. Mit zunehmender Stromstärke nimmt die Maximalgeschwindigkeit ab. (Ann. der Physik [4] **75**. 513—20. 1924. München, Univ.) BECKER.

A. Becker, *Über die Erzeugung und Untersuchung mittelschneller Kathodenstrahlen*. Nach einer Erörterung der Erzeugungsmethoden langsamer Kathodenstrahlen berichtet Vf. über die Messungen von **O. Eisenhut** (Diss. Heidelberg, 1921), die einen Vergleich zwischen diesen Methoden bezweckten. Die Homogenität der Strahlung ist am weitgehendsten mit Glühkathodenröhren erreicht, die bei ruhiger u. erst recht die bei disruptiver Gasentladung erzeugten Kathodenstrahlen besitzen verschiedenste Geschwindigkeiten. Durch passende Al-Folien können sie, wenn nicht zu groß, in einem gewissen Maße ausgeglichen werden. Der Geschwindigkeitsverlust der glüh-elekt. erzeugten Elektronen in Al hängt von ihrer Anfangsgeschwindigkeit in der von LENARD (Quantitatives über Kathodenstrahlen, 1918) angegebenen Weise ab. Desgleichen konnten mit glüh-elekt. Elektronen die Absorptionsmessungen (in Luft u. Al) LENARDS wiederholt u. bestätigt werden. Schließlich ist auch die von LENARD indirekt abgeleitete Abhängigkeit der Grenzdicken in Al von der Elektronen-geschwindigkeit mit neuer Strahlenquelle bestätigt worden. (Ann. der Physik [4] **75**. 435—47. 1924. Heidelberg, Radiol. Inst.) BIKERMAN.

D. Skobelzyn, *Über den Rückstoßeffect der zerstreuten γ -Strahlen*. (Vgl. Ztschr. f. Physik **24**. 393; C. 1924. II. 913.) Es werden die in Gasen sekundär erzeugten β -Strahlen nach der Bestrahlung mit γ -Strahlen nach der Wilsonschen Nebel-methode untersucht, wobei die störende Nebenwrkg. der Gefäßwände durch An-wendung von elektr. Feldern beseitigt wurde. Es ergab sich eine Bestätigung der Comptonschen Theorie, nach welcher die sekundären β -Strahlen, die von γ -Strahlen bei leichten Atomen erzeugt werden, Rückstoßstrahlen sind. Die Energie, welche von den harten γ -Strahlen an das Elektron abgegeben wird, ist meistens gleich $h\nu$, kann aber auch manchmal diesen Wert beträchtlich unterschreiten. Die Anfangs-geschwindigkeit der Elektronen hat stets eine „Vorwärtskomponente“. Die Energie des β -Strahles hängt von dem Winkel ab, welchen die Richtung der Anfangs-geschwindigkeit mit dem primären Strahl bildet. Die Energie nimmt ab, je größer dieser Winkel wird. Unter der Annahme, daß ein Rückstoßeffect der Zerstreuung auftritt, kann die Hypothese von einer sphär. Wellenform der Streuung u. Abgabe des ganzen elementaren Impulses der Strahlung an das Elektron nicht aufrecht erhalten werden. (Ztschr. f. Physik **28**. 278—86. 1924. Petersburg, Polytechn. Inst.) BECKER.

Karl Lang, *Messung von Röntgennormalen*. Vf. schlägt vor, bei Präzessions-wellenlängenmessungen von Röntgenstrahlen als Normalien die Gitterkonstante des NaCl mit $d = 2,81400 \text{ \AA}$ u. die $Cu K\alpha_1$ -Linie mit $\lambda = 1537,30 \text{ XE}$ zu wählen. Es werden Umrechnungstabellen für relative Messungen mit anderen Gittern u. Wellenlängen angegeben, welche es ermöglichen, die Messungen auf die beiden angegebenen Normalien zu beziehen. Ferner wird eine Anordnung beschrieben, um mit dem Seemannschen Schneidenspektrographen u. einer eigens zu diesem Zweck konstruierten Metallröntgenröhre die Präzessionsmessungen durchführen zu können. Neubestst. der Wellenlängen relativ zu $Cu K\alpha_1$ sind angegeben bei Cu,

Fe, Co, Ni, Zn, Pd, Ag, Cd, Sn (K-Serie); Os, Ir, Pt, Au, Pb, Bi (L-Serie). Vergleiche mit anderen Präzessionsmessungen von SIEGBAHN u. WEBER ergeben Abweichungen in den Wellenlängen bis 0,7 XE. (Ann. der Physik [4] 75. 489—512. 1924. Bonn, Univ.) BECKER.

B. B. Ray, *Über die Unregelmäßigkeit des L_{α} -Dubletts in den Röntgenspektren*. Die n. Elektronenanordnung um den Kern sollte nach BOHR aus der sukzessiven Anlagerung von einzelnen Elektronen hervorgehen, deren systemat. Einordnung in das System u. die verschiedenen Bahnen durch Stabilitätsbeziehungen zum Kern u. vorhergebundenen Elektronen gegeben wäre. Nach diesem Schema ergäben sich 2 Elektronen in der K-Schale, 8 in der L-Schale, 18 in der M-Schale usw. in den Elementen höherer Ordnungszahl. Der Einfluß des Hinzutretens neuer Elektronen ist naturgemäß gering u. wird praktisch Null in den inneren Schalen mit immer weiter steigender Ordnungszahl. Diese Erscheinung sollte sich auch praktisch in den K- u. L-Schalen geltend machen. So müßte sich z. B. für das K_{α} -Dublett, welches durch den Sprung von der L- auf die K-Schale emittiert wird, zeigen, daß von niederen zu höheren Elementen fortschreitend, die allmähliche Zunahme von $\Delta\lambda$ immer geringer wird u. so $\Delta\lambda$ schließlich einem konstanten Werte zustrebt. Da das hinzutretende Elektron indessen nicht stets auf die äußerste Schale kommt, wie bei Ti (22) bis Cu (29), so sind in diesem Gebiete Unregelmäßigkeiten bezüglich $\Delta\lambda$ im K_{α} -Dublett zu erwarten. Dasselbe gilt für die Elemente Al (13) bis Ar (18). Diese wurden auch bereits früher vom Vf. gefunden, der im vorliegenden seine Verss. auf das Studium des L_{α} -Dubletts der höheren Elemente erstreckte, u. zwar von Nb (41) bis U (92). Die Unregelmäßigkeiten geben sich in der $\Delta\lambda$ -Ordnungszahlkurve, die im Original wiedergegeben wird, deutlich zu erkennen. (Philos. Magazine [6] 48. 707—11. 1924. Upsala, Univ.) KYR.

I. S. Bowen und **R. A. Millikan**, *Die Erweiterung der Röntgenstrahlendublett-gesetze auf das optische Gebiet*. Frühere Verss. (Proc. National Acad. Sc. Washington 10. 199; Philos. Magazine [6] 48. 259; C. 1924. II. 430. 1772) hatten ergeben, daß die stärksten Linien im Funkenspektrum von Atomen herrühren, welche sämtliche Valenzelektronen verloren haben, ausgenommen jenes, welches die Bindung zwischen den Energieniveaus herstellt u. die Strahlung emittiert. Das L-Dublett von Atomen mit nur einem L-Elektron wie Li (+), Be (2 +), B (3 +), C (4 +) zeigt eine Änderung der Frequenzdifferenzen mit der Ordnungszahl. Dies stimmt mit der relativist. Formel für die Röntgenstrahlendubletten überein. Dasselbe gilt für die Triplets u. auch für die M-Serie. Es zeigt sich in allen besprochenen Fällen eine gute Übereinstimmung mit der Bohr-Sommerfeldschen Theorie. — Für N (5 +), N (3 +), N (+), O (4 +) u. O (2 +) werden einige neue Serienbeziehungen aufgestellt u. an Hand dieser Resultate eine Methode entwickelt, die Spektren vorauszusagen u. den Ionisierungsstand des Atoms zu bestimmen. — Von B (3 +) u. C (4 +) sind im extremen Ultraviolett die $2p_2 - p_1$ Terme bis zu 10 Ordnungen vermessen. (Physical Review [2] 24. 209—22. 1924.) BECKER.

R. A. Millikan und **I. S. Bowen**, *Einige sichtbare Folgerungen aus dem Bohrschen Atom und einige wichtige Schwierigkeiten*. (Vgl. vorst. Ref.) Die Erweiterung der Gesetze für die Röntgendubletts bis zu den ultravioletten Spektren ergibt Werte für die Abschirmungskonstante, welche mit der Bohr-Moseleyschen Formel in Einklang stehen. Obgleich dies eine Vereinfachung bedeutet, setzt es andererseits eine Gleichsetzung der L_I , L_{II} , L_{III} -Röntgenstrahlenniveaus mit den s , p_2 , p_1 -Termen der opt. Serien voraus. Man muß daher entgegen der ursprünglichen Annahme einen größeren Einfluß von der Orientierung der Bahnen (innere Quantennummer) auf die Abschirmungskonstante erwarten als von der Gestalt der Bahnen (azimutale Quantennummer.) (Physical Review [2] 24. 223—28. 1924. Californien, Inst. of Techn.) BECKER.

Paul D. Foote, *Spektroskopie und Bohrs Theorie des Atombaues*. Vf. behandelt die schemat. Modelldarstellung auf Grund spektroskop. Daten. Mathemat. Einzelheiten sind im Original nachzulesen. (Journ. Franklin Inst. **198**. 344—63. 517—40. 1924.) K. WOLF.

Jacques Errera, *Spektroskopie. Kolloide Stromzuführungen zur Erzeugung der Emissionsspektren von Lösungen*. (Bull. Soc. Chim. Belgique **33**. 449—51. — C. 1924. I. 536.) K. WOLF.

H. C. Urey, *Über den störenden Einfluß eines elektrischen Feldes auf den Zeemaneffekt von Spektrallinien*. (Ztschr. f. Physik **29**. 86—90. 1924. Kopenhagen.) BEHR.

R. Mecke, *Zur Systematik der Bandenspektren*. (Vgl. MECKE u. LINDAU, Physikal. Ztschr. **25**. 277; C. 1924. II. 582.) Die zweite positive Gruppe ergibt für das neutrale N_2 -Mol. eine Quintetterm, während das Funkenspektrum des Mol. in Übereinstimmung mit dem Verschiebungsgesetz eine Dubletterm liefert. Zur Darst. der Serien wird vom Vf. eine neue Serienformel abgeleitet. Bei der Einordnung der Bandenspektren werden dieselben Gesichtspunkte angewendet wie bei der Systematik der Linienspektren. Ein Bandensystem stellt dann das gesamte Multiplettsystem dar, das nur durch die Angabe der Rumpfquantenzahlen charakterisiert ist. Die Auswahlregeln bedürfen bei den Bandenspektren einer Einschränkung, da hier Kombinationen ausfallen, welche bei den Linienspektren auftreten. Doch ist auch bei den Bandenspektren ein regelmäßiger Wechsel von geraden u. ungeraden Multipletts im period. System der Elemente nachweisbar. Beim Übergang vom Atom zum entsprechenden Molekülspektrum tritt ein Wechsel in der Multiplizität der Terme ein. (Ztschr. f. Physik **23**. 261—77. 1924. Bonn.) BECKER.

Snehmoy Datta, *Regelmäßigkeiten in den Bandenspektren*. Vf. entwickelt auf Grund der Theorie von HEURLINGER (Ztschr. f. Physik **1**. 82; C. 1920. III. 867) u. LENZ (Verhandl. Dtsch. Physik. Ges. **21**. 632; C. 1920. I. 104) drei Gleichungen, welche die Beziehung zwischen den charakterist. Frequenzen in Bandensystemen ausdrücken. Der komplizierteste Fall wird durchgeführt u. für die ersten positiven Banden des Stickstoffs wird die Serienformel entwickelt, welche vollkommene Analogie mit der theoret. abgeleiteten zeigt. Die Bedeutung der Nachleuchtbanden u. die Infrarotabsorptionsbanden werden diskutiert. — Die Frequenz der maximalen Strahlungsenergie beim Stickstoffmol., die dem Sprung des Elektrons von der äußersten auf die innerste Bahn entspricht, ist bisher aus experimentellen Gründen nicht zur Beobachtung gelangt. Vf. berechnet sie indirekt aus den Versuchsdaten als Konvergenzfrequenz eines Systems von Banden u. erhält für sie aus der Quantenbeziehung das entsprechende Potential zu 7,6 Volt. Ionisationspotentialverss. haben 7,9 V ergeben, weshalb Vf. auf die Möglichkeit eines Zusammenhangs hinweist, derart, daß die photoelektr. Ströme der Ionisation des Stickstoffs durch die Ultraviolettstrahlung der erweiterten Serie der ersten positiven Banden erzeugt werden, die den äußersten Bahnen entsprechen. (Philos. Magazine [6] **48**. 673—52. 1924.) KYROPOULOS.

A. Ll. Hughes und C. F. Hagenow, *Anregung des Spektrums von Cäsium mit niedriger Spannung*. Nach der Bohrschen Theorie müssen schon unterhalb der Ionisierungsgrenze eine Anzahl von Serien auftreten. Die Vf. prüfen diese Hypothese am Cs, indem sie dieses in einer Dreielektrodenröhre bei 0,1 mm Druck u. 135—140° unterhalb von 3,9 Volt (Ionisierungsspannung) anregen. Es zeigt sich, daß die Linien der Hauptserie deutlich u. die Linien der diffusen Nebenserie schwach auftreten. (Physical. Review [2] **24**. 229—33. 1924. St. Louis, Washington Univ.) BECKER.

Nalini Kanta Sur, *Regelmäßigkeiten im Spektrum des ionisierten Titans*. Die Linien des Ti^+ kommen in der Chromosphäre der Sonne u. einiger Sterne bis zu einer Höhe von 6000 km vor, während die Resonanzlinie des Ti nur eine Höhe

bis 500 km erreicht. Ti verhält sich in dieser Hinsicht analog dem Ca. Das Spektrum des Ti^+ ähnelt dem des Sc. Man kann es wie dieses in Quartetts u. Dubletts einteilen. Das Ionisationspotential des Ti^+ liegt annähernd bei 13 V, jenes des Ti bei 6,8 Volt. (Nature **114**. 611. 1924. Allahabad.) BECKER.

Gregor Wentzel, *Dispersion und Korrespondenzprinzip*. Mathematisch. (Ztschr. f. Physik **29**. 306—10. 1924. München, Inst. f. theoret. Physik.) BEHRLE.

John A. Eldridge, *Theoretische Besprechung der Polarisationsversuche von Wood und Ellett*. Vf. bespricht die früheren Verss. von WOOD u. ELLETT (Proc. Royal Soc. London Serie A **103**. 396; C. **1923**. III. 885) über den Einfluß eines schwachen Magnetfeldes auf die Polarisation des Fluoreszenzlichtes von Hg u. K-Dampf vom Standpunkt der klass. elektromagnet. Theorie, welche diese Erscheinung zu erklären vermag. Mit der Annahme einer Quantentheorie der Atomstrahlung ist die Polarisation des Fluoreszenzlichtes schwer in Einklang zu bringen. (Physical Review [2] **24**. 234—42. 1924. Univ. of Wisconsin.) BECKER.

R. W. Wood und A. Ellett, *Polarisierte Resonanzstrahlung in weichen magnetischen Feldern*. (Vgl. vorst. Ref.) Vff. bestimmen die Polarisation der Resonanzstrahlung der 2536 Linie des Hg bei tiefen Drucken (0°) auf photograph. Weg. Wenn der erregende Strahl nach Osten gerichtet ist u. der elektr. Vektor senkrecht dazu steht, u. wenn das Erdfeld sorgfältig neutralisiert ist, dann tritt in horizontaler Richtung eine Polarisation von 90% u. in vertikaler Richtung überhaupt keine Polarisationswirkung ein. Ein nach Norden gerichtetes Feld von 2 Gauß drückt die Polarisation in dieser Richtung auf Null herab. Die Abnahme der Polarisation verläuft mit zunehmender Stärke des Magnetfeldes nach einer Exponentialfunktion. Auch die Polarisation in östlicher Richtung wird von dem nordwärts gerichteten Feld auf 60% herabgedrückt. Verss. mit anders gerichteten Magnetfeldern zeigten denselben Einfluß auf die Polarisation. Ein Feld von 10000 Gauß verstärkte die Intensität der Strahlung um 10%. Doch war der neu hinzu gekommene Anteil an Licht unpolarisiert. Analoge Resultate ergaben sich bei Verss. mit der D-Linie des K bei 185° . Spuren von H_2 scheinen einen gewissen Einfluß zu besitzen. Die Polarisation des Fluoreszenzlichtes von J_2 -Dampf, weißem zerstreuten Licht von Hg u. Ätherdampf wurde durch Magnetfelder nicht beeinflusst. (Physical Review [2] **24**. 243—54. 1924. Johns Hopkins Univ.) BECKER.

W. Rump, *Über den Dopplereffekt beim Übergang von der Resonanzfluoreszenz zur Spiegelung*. Vf. zeigt an der 2536,7 Linie des Hg, daß bei der Resonanzfluoreszenz die reemittierte Linie eine größere Dopplerbreite hat als die einfallende Linie, wenn die sekundäre Resonanzlampe eine höhere Temp. besitzt als die primäre Resonanzlampe. Es wird die Halbwertsbreite der Spektrallinie bei der diffusen Zerstreuung dieser Linie an einem Gas durch die zerstreuenen Moll. geändert. Dagegen ist bei der Reflexion eine solche Änderung der Wellenlänge nicht festzustellen, wobei es gleich ist, ob die Reflexion an einem festen oder einem gasförmigen Spiegel erfolgt. Daraus schließt Vf., daß bei der diffusen Zerstreuung an einem Gas die zerstreuenen Moll. unabhängig voneinander sind. Dagegen läßt sich bei der Reflexion die Wrkg. der einzelnen Moll. nicht durch voneinander unabhängige Elementarereignisse darstellen. Man hat hier ein Mittel in der Hand, um den Übergang von der Resonanzfluoreszenz zur Reflexion mit zunehmender Anzahl der Moll. zu verfolgen. Es findet dabei eine Abnahme des Dopplereffektes trotz zunehmender Temp. in der sekundären Resonanzlampe statt. (Ztschr. f. Physik **29**. 196—208. 1924. Göttingen, Univ.) BECKER.

Frances G. Wick, *Eine spektroskopische Untersuchung der Kathodenlumineszenz von Fluorit*. Das Spektrum der unter dem Einfluß von Kathodenstrahlen angeregten Lumineszenz des natürlichen Fluorits besteht aus einer Anzahl breiter diffuser Bänder, über welche einzelne schärfere Bänder überlagert sind. Eine vorangehende

Wärmebehandlung auf 600° schwächt die diffusen u. verstärkt die scharfen Banden. Ein Schmelzen in einer oxydierenden Flamme bewirkt eine Farbänderung u. ein Auftreten neuer Banden. Die beobachteten Banden scheinen von Verunreinigungen des Fluorits durch seltene Erdoxyde, vor allem *Sa*, *Dy*, *Eu*, *Gd*, *Te* herzurühren. Vf. nimmt an, daß die seltenen Erdoxyde in das Krystallgitter mit eintreten u. daß die Lichtemission unter Anregung der Nachbaratome erfolgt. Die Beobachtungen sind tabellar. angeführt. (Physical Review **24**. [2] 272—82. 1924. Pough Keepsie [N. Y.])

BECKER.

C. Doelter, *Über Thermoluminescenz bei Flußspat*. Vf. teilt verschiedene Beispiele für die von HIRSCHI gemachte Beobachtung mit, daß die Phosphorescenz nach einer Ra-Bestrahlung bei Flußspat zunächst ausbleibt u. erst bei höherer Temp. auftritt. Ultraviolette Strahlen haben auch bei hoher Temp. keine Wrkg. An Apatiten wurde ebenfalls nach Bestrahlung mit RaCl_2 Thermoluminescenz, die mit steigender Temp. zunimmt, beobachtet. (Zentralblatt f. Min. u. Geol. **1924**. 419—21.)

ENSZLIN.

A₂. Elektrochemie. Thermochemie.

Alfred Coehn und **Alfred Curs**, *Studien zur Berührungselektrizität. Die Ladung von Metallen gegen Dielektrika*. (Vgl. COEHN u. DUHME, Ztschr. f. Physik **27**. 358; C. **1924**. II. 2229.) Vff. untersuchen nach der von COEHN u. LOTZ (Ztschr. f. Physik **5**. 242 [1920]) angegebenen Methode im Hochvakuum die Ladung, welche *Zn*, *Cd*, *Sn*, *Pb*, *Cu*, *Hg*, *Ag*, *Pt* beim Durchgleiten durch Röhren aus Quarz, Felsenglas u. Natronglas aufnehmen. Es zeigt sich dabei, daß sich mit der Natur des Dielektrikums der Einschnitt in die Spannungsreihe ändert, zu dessen beiden Seiten die Aufladung des Metalls in entgegengesetztem Sinn erfolgt. Weiter wurden dieselben Verss. mit Amalgamen von *Na*, *K*, *Zn*, *Cd*, *Sn*, *Pb*, *Ag* in verschiedenen Konzentrationsintervallen durchgeführt, um den Punkt zu bestimmen, oberhalb welcher Konz. der Ladungswechsel stattfindet. *Hg* u. die Amalgame edler Metalle laden sich gegen alle Dielektrika positiv auf, die Amalgame der unedlen Metalle dagegen von einer bestimmten, bei jedem Dielektrikum anderer Konz. ab negativ. Gegen Diamant laden sich sämtliche Metalle, auch die unedelsten Amalgame positiv auf. Krystalline oder amorphe Struktur ist ohne Einfluß. So verhielten sich krystalliner Quarz u. Quarzglas in allen Fällen gleich. Es wird eine Methode beschrieben, mit deren Hilfe man die Aufladung eines kleinen Splitterchens des Dielektrikums gegen das Amalgam bestimmen kann. (Ztschr. f. Physik **29**. 186 bis 195. 1924. Göttingen, Univ.)

BECKER.

J. A. V. Butler, *Über die Beziehung zwischen Metallkontaktpotentialen und dem Peltiereffekt*. Vf. erörtert die früher viel umstrittene Frage der Existenz einer Kontaktpotentialdifferenz zwischen zwei Metallen theoret., indem er zunächst die Grenzen der thermodynam. Betrachtungsmöglichkeit aufweist, um sodann mit Hilfe statist. Betrachtungen die Beziehung zwischen Kontaktpotential u. Peltiereffekt zu behandeln. Die ganze Betrachtung fußt auf der Theorie der therm. Elektronenemission u. teilt demgemäß ihre Unvollkommenheiten. Eine Folgerung daraus ist, daß der Thomsonscheffekt im geschlossenen Kreise zweier Metalle mit zwei verschieden temperierten Stoßstellen nichts zur EK. beiträgt, u. daß die Potentialdifferenz längs eines homogenen Leiters, in dem ein Temp.-Gefälle auftritt, für alle Leiter die gleiche ist. (Philos. Magazine [6] **48**. 746—52. 1924. Swansea, Univ.) KY.

Joseph Simons und **J. H. Hildebrand**, *Ein Versuch, das Potential einer Fluorelektrode zu messen*. Vff. versuchen die EK. eines Elementes zu messen, das aus einer H-Elektrode, einer F-Elektrode u. einem Elektrolyten besteht, der sowohl H als auch F-Ionen enthält, u. in dem die Aktivität von HF bekannt ist oder bestimmt werden kann. Solche Fll. sind geschmolzenes $\text{KF} \cdot \text{HF}$ u. wasserfreie fl. HF, die

etwas KF enthält. Wegen der Reaktionsfähigkeit von F₂ mit W. oder organ. Substanzen sind wss. oder organ. Lösungsm. nicht zu verwenden. Mit HF mißlang der Vers. deshalb, weil kein Elektrodenmaterial der gemeinsamen Wrkg. von F u. HF widerstehen konnte, weder Pt, Ir, Au, Ni noch Graphit, u. weitere Schwierigkeit bot die Wahl des Isoliermaterials. In geschmolzenem KF·HF ließ sich zwar Graphit als Anode verwenden (vgl. S. 25), doch führte der Vers. auch hier nicht zum Ziel. (Journ. Americ. Chem. Soc. **46**. 2223—25. 1924. Berkeley [Cal.], Univ.) Jo.

Sydney Raymond Carter und **Francis Herbert Clews**, *Oxydationspotential* von Ferro- und Ferrisalzen in konzentrierter Chlorwasserstoffsäure und Phosphorsäure. Das Oxydationspotential der Fe^{II}-Fe^{III}-Kette wurde in CO₂-Atmosphäre bei verschiedenen Konz.-Verhältnissen von Fe^{II}:Fe^{III} u. bei HCl-Konz. von 0,1-n. bis 9,5-n. bzw. H₃PO₄-Konz. von 4,318-n. bis 15,79-n. gemessen. Die Formel:

$$E_{oc} = E_c - 0,058 \log [\text{Fe}^{\text{III}}]/[\text{Fe}^{\text{II}}],$$

in der E_c das abgelesene Potential u. E_{oc} das Potential für $[\text{Fe}^{\text{III}}] = [\text{Fe}^{\text{II}}]$ ist, gilt genau. Mit steigender $[\text{H}^+]$ sank das Potential in den beiden Systemen. Wie besondere Verss. ergaben, ist dafür nicht das Diffusionspotential verantwortlich zu machen; es wird mit der Säurekonz. steigende B. von Komplexen angenommen, wobei, um die obige Gleichung zu erfüllen, Fe^{III} allein oder doch in erheblich stärkerem Maße als Fe^{II} sich mit der Säure verbinden kann. Die Potential- $[\text{H}^+]$ -Kurve wird im Lichte des Verh. von SO₂ gegen mäßig u. stark saure Fe-Lsgg. in HCl oder H₃PO₄ (vgl. WARDLAW u. CLEWS, Journ. Chem. Soc. London **117**. 1093; C. **1921**. I. 204; WARDLAW, CARTER u. CLEWS, Journ. Chem. Soc. London **117**. 1241; C. **1921**. I. 204; CARTER u. BUTLER, Journ. Chem. Soc. London **123**. 2370. 2380; C. **1924**. I. 408. 409) besprochen u. eine Kurve für den Umschlag von reduzierender zu oxydierender Wrkg. des SO₂ in Abhängigkeit von der Säurekonz. gezeichnet, der allerdings nur qualitative Bedeutung zukommt, da die zugrunde liegenden Verss. bei 100°, die Potentialmessungen bei 17° ausgeführt wurden. (Journ. Chem. Soc. London **125**. 1880—88. 1924. Univ. of Birmingham.) HERTER.

Erich Kretschmann, *Berichtigung zu der Abhandlung: „Grundlagen einer Theorie der Supraleitfähigkeit.“* (Vgl. Ann. der Physik [4] **74**. 405; C. **1924**. II. 1445.) Der Satz über die Einw. des Magnetfeldes wird eingeschränkt u. berichtigt. (Ann. der Physik [4] **75**. 448. 1924. Königsberg.) BIKERMAN.

Alfred Riede, *Galvanische Leitfähigkeit und Halleffekt dünner Nickelschichten*. Die zu den Verss. dienenden dünnen Nickelschichten wurden durch Kathodenzerstäubung in strömendem H₂ erzeugt. Die Schichten waren bereits zusammenhängend bei einer Dicke von 3 mμ. Die Leitfähigkeit wurde mittels einer Kompensationschaltung gemessen, u. zwar als Leitwert eines Quadrates der betr. Schicht („Flächenleitfähigkeit“), wobei kleine Dickenschwankungen ohne Einfluß bleiben. Die Dicken wurden durch Wägen auf der Mikrowage bestimmt; ganz dünne Schichten wurden mittels der Bestäubungszeit ausgewertet. Die Dicken der Schichten betrugen im allgemeinen zwischen 15 u. 190 mμ. Es wurde Proportionalität zwischen elektr. Leitfähigkeit u. Querschnitt gefunden. Abweichungen von der Proportionalität bei den dünnsten Schichten werden eingehend diskutiert u. Nebenerscheinungen beschrieben. Eine der hauptsächlichsten ist, daß sich die durch kathod. Zerstäubung auf Glas erhaltene Ni-Schicht so verhält, als bestehe sie aus zwei Schichten: einer von 20 mμ Dicke u. einer, die den Rest der Dicke ausmacht. Bei Schichten, die dünner als 20 mμ sind, fehlt dieser zweite Teil. Vf. hält das Metall der dünnen Schicht für unrein, insbesondere wasserstoffhaltig. — Der Halleffekt ist in schwachen Magnetfeldern (unter 200 Gauss) der Feldstärke proportional, nähert sich in starken einem Grenzwert u. ist dem Primärstrom bis zu Stromdichten von 10⁵ Amp./cm² proportional. Das Vorzeichen des Effektes ist negativ. Sehr

ausführliche Beschreibung der Verss. u. ihrer Auswertung. (Ztschr. f. Physik **28**. 177—215. 1924. Karlsruhe, Techn. Hochschule.) KYROPOULOS.

George Jaffé, *Über den Einfluß der Diffusion auf nahezu gesättigte Ströme*. Die Rolle der Ionendiffusion bei der Gasleitfähigkeit wurde vom Vf. für den Fall des ebenen Kondensators berechnet (vgl. Ann. der Physik [4] **43**. 249. [1914]), jetzt ist die frühere Ableitung ergänzt u. die Fälle des Zylinder- u. des Kugelkondensators durchgerechnet. Die Formeln gelten bei hinreichend großen EKK. (in der Nähe der Sättigungsströme) für beliebige Elektrodenabstände, bei kleinem Elektrodenabstand für beliebige Potentialdifferenzen. (Ann. der Physik [4] **75**. 391—402. 1924. Leipzig.) BIKERMAN.

James Robert Pound, *Die elektrische Leitfähigkeit von Gemischen von Anilin, Essigsäure und Wasser*. Ein Gemisch von der Zus. von 92% W., 5% Essigsäure u. 3% Anilin zeigt ein Maximum der elektr. Leitfähigkeit. Vergleicht man die Werte der Leitfähigkeit mit den früher (POUND u. RUSSEL, Journ. Chem. Soc. London **125**. 769; C. 1924. II. 182) bestimmten Dichten u. Zähigkeiten derselben Gemische, dann ergibt sich, daß die Leitfähigkeit der D. u. Viscosität annähernd proportional ist, wenn man nur das Verhältnis von Essigsäure zu Anilin berücksichtigt. Während aber D. u. Viscosität bei Abwesenheit von W. ein Maximum erreichen, liegt das Maximum der Leitfähigkeit bei 95% W. Eine Verbindungsbildung macht sich auch hier durch Maxima der Leitfähigkeit bei denselben Konz. wie die Maxima der D. u. Zähigkeit bemerkbar. Mit zunehmender Konz. von Anilin sinkt die Leitfähigkeit stark herab. (Journ. Chem. Soc. London **125**. 1560—64. 1924. Ballarat [Victoria], School of Mines.) BECKER.

Martin Grützmacher, *Über die Dielektrizitätskonstante von Flüssigkeitsgemischen*. Vf. untersuchte die DEE. von Chlf., Tetrachlorkohlenstoff, Schwefelkohlenstoff, Toluol, Bzl. u. der Gemische CCl₄-CS₂, CCl₄-CHCl₃, CS₂-Bzl., Toluol-Bzl., zwecks Überprüfung der Pulfrichschen u. Silbersteinschen Formel für das opt. Refraktionsvermögen bezw. für die DEE. von Gemischen. Die tatsächlichen Verhältnisse werden von keiner dieser Formeln wiedergegeben. Zur Best. des Temperaturganges der DE. wurde eine Versuchsanordnung benutzt, die sich der Methode von HERWEG anlehnt. (Ztschr. f. Physik **28**. 342—54. 1924. Münster i. W.) K. WOLF.

J. Errera, *Untersuchung über die Dielektrizitätskonstanten kolloider Lösungen*. Vf. beschreibt einen App. zur Messung der DEE. kolloider Lsgg. Die mit V₂O₅ durchgeführten Messungen ergaben für das 14%ig. V₂O₅-Sol eine DE. = 400, bezogen auf W. Kontrollverss. bestätigten diesen hohen Wert, der erst einige Zeit nach der Solherstellung auftritt. Die Änderung der DE. des Soles als Funktion der Verdünnung wird graph. dargestellt u. diskutiert. Der Einfluß der Temp. u. der Stromstärke wurde gemessen. (Bull. Soc. Chim. Belgique **33**. 422—31. 1924.) K. W.

J. Errera, *Untersuchung über die Dielektrizitätskonstanten kolloider Lösungen*. (Vgl. vorst. Ref.) Vf. gelangt in Fortsetzung seiner Unterss. zu dem Ergebnis, daß die meisten kolloiden Lsgg., die man als wenig solvatisiert bezeichnet, dieselbe DE. besitzen wie das Dispersionsmittel. Eine Ausnahme bilden die V-Sole, da deren DEE. weder konstant noch unabhängig sind von der Stromstärke u. der Periodenzahl. (Bull. Soc. Chim. Belgique **33**. 432—49. 1924.) K. WOLF.

Charles P. Smyth, *Die elektrischen Momente typisch organischer Moleküle*. (Vgl. Philos. Magazine [6] **45**. 849. **47**. 530; C. 1924. I. 401. 2562.) Die elektr. Momente der Moll. werden nach der früher wiedergegebenen Methode (l. c.) berechnet. Die Abweichungen von den aus hypothet. Molekularstrukturbetrachtungen erhaltenen Werten werden durch eine den Anziehungskräften folgende Verschiebung der Ladung u. dem Rückstoß innerhalb des Mol. bedingt. Die Momente der gesätt. KW-stoffe sind sehr klein, die der KW-stoffe mit doppelter Bindung sind klein, doch immerhin groß genug, Neigung zur Elektronenänderung in der Nähe der Doppelbindung er-

kennen zu lassen. Die elektr. Momente der Alkohole, Äther, Aldehyde u. Ketone sind von derselben Größenordnung wie das von W., während die von NH₃ u. Aminen kleiner als das des W. sind, u. zwar ist die Differenz etwas größer als sich auf Grund der Molekularstruktur allein voraussagen läßt, weil die Elektronen um den Stickstoffkern leichter verschoben werden können als um den Sauerstoffkern. Unter den Wasserstoff- u. organ. Halogeniden sind die Momente der Jodverb. am kleinsten, die der Br-Verb. größer u. die der Cl-Verb. am größten. Das Moment ist also um so kleiner, je leichter die Elektronen verschiebbar sind. (Journ. Americ. Chem. Soc. 46. 2151—66. 1924. Princeton Univ., New Jersey.) JOSEPHY.

Ernst Sedström, *Zur Kenntnis der Gold-Kupfer-Legierungen*. (Vgl. HOLGERSSON u. SEDSTRÖM, Ann. der Physik [4] 75. 143; C. 1924. II. 1885.) Vf. mißt die *Thermokraft* der einzelnen Glieder der Cu-Au Reihe gegen Cu, sowie die Wärmeleitfähigkeit u. den elektr. Widerstand der im Vakuum zusammengeschmolzenen Legierungen. Bei allen drei Meßreihen ergeben sich scharfe Maxima, bezw. Minima im Zustandsdiagramm bei einer Zus. der Legierungen von 50 Atom-% Cu u. 50 Atom-% Au, was die B. einer Verb. CuAu möglich erscheinen läßt. Frühere Messungen der elektr. Leitfähigkeit dieser Reihe von KURNAKOW, ZEMCZUZYNY u. ZASEDATELEV (Journ. Inst. Metals 15. 305 [1916]) hatten Maxima bei einer Zus. CuAu u. Cu₃Au ergeben. Die letztere Verb. wurde vom Vf. jedoch nicht nachgewiesen. Entgegen der bisherigen Annahme scheint also die Cu-Au-Reihe keine kontinuierliche Mischkristallreihe zu bilden. (Ann. der Physik [4] 75. 549—55. 1924. Stockholm, Techn. Hochschule.) BECKER.

Leigh Page, *Notiz über eine Elektronentheorie des Halleffektes*. (Physical Review [2] 24. 283—85. 1924. YALE-Univ.) BECKER.

John A. Eldridge, *Notiz über eine Elektronentheorie des Halleffektes*. (Vgl. vorst. Ref.) (Physical Review [2] 24. 286. 1924. Gen. Electric Co.) BECKER.

P. Dejean, *Einige Betrachtungen über die Magnetochemie von ferromagnetischen Legierungen*. (Vgl. C. r. d. l'Acad. des sciences 178. 1370; C. 1924. II. 1059.) Die Gesetzmäßigkeiten der Magnetochemie werden an der Hand des Schrifttums besprochen u. an mkr. Bildern erläutert. Vf. hält die Unterss. zur Begutachtung für wichtig u. empfiehlt ihre Nachprüfung u. allgemeine Einführung. (Chimie et Industrie 1924. Mai-Sondernummer. 306—11. 1924.) GRIMME.

L. C. Jackson, *Untersuchungen über den Paramagnetismus bei tiefen Temperaturen*. Ausführliche Wiedergabe der Versuchsergebnisse der Arbeit von JACKSON u. KAMERLINGH ONNES (Proc. Royal Soc. London [Serie A] 104. 671; C. 1924. I. 1007). — Aus theoret. Erwägungen schlossen KAMERLINGH ONNES u. OOSTERHUIS (Leiden, Comm. 139. D.), daß längs der Hauptachse eines paramagnet. Krystalls die Δ -Werte eine Funktion der Abstände der paramagnet. Atome sind. Je kleiner der Gitterabstand ist, desto größer ist Δ . Unter Zuhilfenahme der magnet. Konstanten stellt dann der Vf. Leitlinien für die Kristallstruktur des NiSO₄·7H₂O auf, in dem die Ni-Atome ein allseitig flächenzentriertes rhomb. Prisma bilden sollen. Mittels einer von KEESOM durchgeführten röntgenograph. Kristallstrukturbest. nach dem Debye-Scherrer-Verf. wurde diese Annahme bestätigt. (Philos. Transact. Roy. Soc. London Serie A 224. 1—48. 1923.) BECKER.

Richard Vernon Wheeler, *Die Entzündung von Gasen*. Teil III. *Entzündung durch die impulsive elektrische Entladung. Gemische der Paraffine mit Luft*. (II. vgl. MASON u. WHEELER, Journ. Chem. Soc. London 121. 2079; C. 1923. III. 812.) Die Entzündbarkeit von Gemischen von Äthan, Propan, Butan, Pentan, Isopentan u. Hexan mit Luft durch einen Funken von 1 mm Länge wurde durch Messung der Primärstromstärke untersucht, bei deren Unterbrechung der Sekundärfunke des Induktoriums gerade zur Zündung ausreichte („Zündungsstrom“) u. mit den von MASON (Journ. Chem. Soc. London 123. 210; C. 1923. III. 733) er-

mittelten Werten für die schnellste Fortpflanzung der Flamme verglichen. Die günstigste Konz. des KW-stoffs lag bei Methan für Zündung niedriger als für größte Fortpflanzungsgeschwindigkeit, bei allen anderen höher. Der „Zündungsstrom“ stieg in der Reihenfolge 1. Propan, 2. Äthan u. Butan, 3. Pentan, 4. Methan. Parallelverss. mit H_2 gaben bei weniger als 0,25 mm Funkenstrecke einen Zündungsstrom von 0,36 Amp. bei 26% H_2 , während C_2H_6 (6,7%) 3,4 Amp. verlangte; die entsprechenden Fortpflanzungsgeschwindigkeiten sind 400 u. 80 cm/sec. Die Isolationskraft der KW-stoffe wurde bestimmt, sie stieg mit dem Mol.-Gew. u. war für Isopentan größer als für n-Pentan. Diese beiden Verbb. forderten jedoch bei gleicher Konz. gleiche Zündungsströme, so daß die Isolationskraft nicht zur Erklärung der auffallenden Reihenfolge herangezogen werden kann. — Das im I. Teil (Journ. Chem. Soc. London **119**. 239; C. **1921**. III. 449) erwähnte Auftreten von Stichflammen vor Eintritt der eigentlichen Verbrennung wurde wieder beobachtet, am deutlichsten bei Äthan. Es wird geschlossen, daß Verbrennung einer bestimmten Gasmenge Vorbedingung für die weitere Fortpflanzung der Verbrennung ist. Das Studium der Zündung durch kurze Erhitzung, wie der elektr. Funken sie darstellt, würde damit mehr ein Studium der Fortpflanzung als der Erzeugung der Flamme werden, doch sind quantitative Verss. in dieser Richtung schwer ausführbar, da die Funkenintensität, die zur B. von Flämmchen an der Funkenstrecke ausreicht, nicht wohldefiniert ist. Die Stichflammen treten mitunter auch bei sonst außerhalb der Brennbarkeitsgrenze liegenden Gemischen auf u. können bei kleinen Gefäßen so zur vollständigen Verbrennung führen.

Nachschrift von **Samuel Colville Lind**. (Washington, Un. States Bureau of Mines.) Das verschiedene Verh. von Methan u. den höheren KW-stoffen legt die Annahme eines Einflusses der D. auf die Fortpflanzung der Entflammung nahe. Es bestehen Parallelen zwischen den geschilderten Verss. u. der Rk. von H_2 u. O_2 unter der Einw. von α -Strahlen (Journ. Americ. Chem. Soc. **41**. 542; C. **1919**. III. 851). Da die „Bremskraft“ für α -Strahlen für Methan 0,86, für O_2 1,064 beträgt, gibt eine Anwendung der Bremskraftgesetze der α -Strahlen auf den vorliegenden Fall möglicherweise den Schlüssel zur Erklärung der Erscheinungen. Auch die Verss. von **DIXON** u. **CROFTS** (Journ. Chem. Soc. London **105**. 2036; C. **1914**. II. 1339) über die Verbrennungstemp. von H_2 - O_2 -Gemischen deuten auf das Bestehen derartiger Beziehungen hin. (Journ. Chem. Soc. London **125**. 1858—69. 1924. Sheffield, Safety in Mines Research Board.) HERTER.

Walter Mason und **Richard Vernon Wheeler**, *Die Entzündung von Gasen*. Teil IV. *Entzündung an geheizter Oberfläche. Gemische der Paraffine mit Luft*. (III. vgl. vorst. Ref.). Die in der II. Mitt. beschriebenen Verss. an Methan wurden in einem neuen Gefäß wiederholt, neue Bestst. an Äthan, Propan, Butan u. Pentan ausgeführt. Gemische dieser Gase mit Luft wurden in ein geheiztes Quarzgefäß eingeführt u. für verschiedene Konz. die niedrigste Temp. festgestellt, bei der Entflammung eintrat. Die Verss. haben keinen absol. Wert, da die Entflammungstemp. von dem Gefäßmaterial, dem Verhältnis seiner Oberfläche zum Gasvol. usw. abhängt, sind aber untereinander vergleichbar. Bei Methan stieg mit wachsender Konz. die Zündungstemp., bei den übrigen KW-stoffen fiel sie. Auch hier sind also die Bremskraftgesetze anwendbar, die Bremskraft für Ra-C beträgt nach **BRAGG** (Studies in Radioactivity, London 1912, S. 49) bei C_2H_6 1,519, bei C_5H_{12} 3,544. Die Zündungstemp. liegt stets unterhalb 600°, außer für CH_4 , wo sie minimal ca. 680° beträgt. Bei 600° ausgeführte Verss. über die Vorflammpériode ergaben einen starken Abfall der Zeit vor der Entflammung mit steigendem Gehalt der Gemische an KW-stoff. CH_4 nimmt auch hier eine Ausnahmestelle ein; seine Vorflammpériode (bestimmt bei 700°) steigt mit dem CH_4 -Gehalt des Gemischs. Eine Parallelbest. mit C_2H_6 bei 700° ergab ein ähnliches Resultat wie bei 600°. Die Vorflammpériode

perioden der einzelnen Gase sind untereinander sehr verschieden u. diese Unterschiede machen sich auch bei 1000° noch deutlich bemerkbar. Auf sie muß teilweise die verschiedene Empfindlichkeit bei der Zündung durch eine intensive Erhitzung von kurzer Dauer, z. B. den elektr. Funken (vgl. vorst. Ref.) zurückgeführt werden. (Journ. Chem. Soc. London 125. 1869—75. 1924. Eksmeals [Cumberland], Vers.-Station.)

HERTER.

Carl Barus, *Empfindliche Flammen und der scheinbare Flammendruck*. Der Vf. erzeugt eine empfindliche Flamme, indem er einen Gasstrom aus einer dünnen Düse ausströmen läßt. In der der Ausströmungsöffnung entgegengesetzten Seite sind zwei als Manometer dienende Interferometer angebracht, welche durch ein U-Rohr verbunden sind. In den Zuleitungsröhren zu den Interferometern befinden sich ebenfalls zwei enge Düsen, deren Spitze in einem Fall vom Gasstrom weg, im andern Fall zum Gasstrom gerichtet ist. Das Gas tritt in die Interferometer durch das diese beiden miteinander verbindende U-Rohr ein. Die Verss. des Vfs. ergeben, daß bei brennender Flamme ein höherer Druck in der Gaszuleitung u. in dem Manometer meßbar ist, als wenn bei gleicher Ausströmungsgeschwindigkeit des Gases die Flamme ausgelöscht ist. (Z. B. 0,25 mm Hg bei brennender, 0,075 mm bei nicht brennender Flamme.) Diesen Druckzuwachs, sobald die Flamme entzündet wird, deutet der Vf. durch die Annahme, daß durch Berührung mit der heißen Ausströmungsöffnung die Viscosität des Gases sich ändert. (Science 60. 137—38. 1924. Brown, Univ.)

BECKER.

Arthur Taber Jones, *Der Druck, welcher durch eine Flamme hervorgerufen wird*. (Vgl. vorst. Ref.) Vf. beobachtet, daß ein Gasometer, welches eine kleine Flamme speist, rascher fiel, wenn die Flamme brannte als wenn das Gas durch die Flammendüse bei nicht brennender Flamme frei ausströmte. Es betrug z. B. der Abfall im Gasometer bei brennender Flamme 0,084 mm/sec, bei nicht brennender Flamme 0,126 mm/sec. Doch läßt sich die Frage, ob diese Erscheinung durch Änderung der Viscosität des h. Gases u. damit der Ausströmungsgeschwindigkeit bedingt ist oder von einem Flammendruck herrührt, nicht ohne weiteres beantworten. (Science 60. 315—16. 1924. SMITH Coll.)

BECKER.

Colin Campbell und Oliver Coligny de Champfleür Ellis, *Der Einfluß von Verdünnung mit Stickstoff auf die Geschwindigkeit der Flamme*. Teil I. Bei konstantem Verhältnis Brennstoff: O₂ fand WHEELER (Journ. Chem. Soc. London 105. 2606; C. 1915. I. 245), daß mit fortschreitender Verd. mit N₂ die Geschwindigkeit der Flamme abnimmt; die Geschwindigkeit: Verd.-Kurve war eine Hyperbel. Dividiert man aber die Verbrennungswärme durch die Gesamtzahl der reagierenden u. verdünnenden Moll., so ist die Geschwindigkeit: Wärmewert-Kurve eine gerade Linie. Nur bei den äußersten Verd. liegen bei den von DIXON (Philos. Transact. Roy. Soc. London 184 A. 165 [1893]) ermittelten Fortpflanzungsgeschwindigkeiten von Explosionswellen diese etwas unterhalb der sich aus der calorimetr. Berechnung ergebenden. Eigene Verss. über die Fortpflanzungsgeschwindigkeiten der Verbrennung von *Pentan*, *Hexan*, *Bzl.*, *A.*, *Ä.*, *CS₂*, *CH₄*, *C₂H₄*, von denen die drei letzten diagrammat. wiedergegeben sind, bestätigten vollkommen die obige Beziehung. (Journ. Chem. Soc. London 125. 1957—60. 1924.)

HERTER.

Oliver Coligny de Champfleür Ellis und Sydney Robert Stubbs, *Der Einfluß von Verdünnung mit Stickstoff auf die Geschwindigkeit der Flamme*. Teil II. (I. vgl. vorst. Ref.). Das verschiedene Steigmaß der im I. Teil erhaltenen Kurven ist auf die verschiedene Wärmeleitfähigkeit der Gemische zurückzuführen. Verss. an Gemischen der Zus. $x(\text{CS}_2 + 3\text{O}_2) + y(2\text{H}_2 + \text{O}_2)$ bestätigten die früheren Resultate u. zeigten, daß in Reihen von Gemischen mit gleichem Wärmewert die Verbrennungsgeschwindigkeiten direkt proportional den Wärmeleitfähigkeiten sind. Diese Beziehung gestattet eine einfache Best. der Wärmeleitfähigkeit brennbarer

u. inerten Gase. (Journ. Chem. Soc. London **125**. 1960—63. 1924. Sheffield, Mines Department and Manchester, Univ.)

HERTER.

William Edward Garner und **Sidney Walter Saunders**, *Die Explosion von Acetylen und Stickstoff*. III. *Der Einfluß der Addition von Sauerstoff auf die Bildung von Cyanwasserstoffsäure*. (II. vgl. GARNER und MATSUNO, Journ. Chem. Soc. London **121**. 1729; C. **1923**. I. 1266.) Vff. bestimmen die HCN-Ausbeute bei der Explosion von C_2H_2 , O_2 - u. N_2 -Gemischen, wenn N_2 konstant auf 22% gehalten u. der C_2H_2 - u. O_2 -Gehalt des Gases von 0 bis 37,01% O_2 variiert wird. Es zeigte sich, daß mit zunehmendem O_2 -Gehalt auch die Ausbeute an HCN zunahm. Bei einem Anstieg des O_2 von 6 auf 37% stieg infolgedessen auch die Gleichgewichtskonstante $K = [HCN]^2/[H_2][N_2]$ von 0,009 auf 0,05 u. die Konstante $K_1'' = [HCN]/[C][N_2]^{0,37}$ von 0,11 auf 5,16, während die Explosionstemp. von 2959° auf 4287° zunahm. Auch Spuren von NH_3 wurden gebildet. Beträgt das Verhältnis von C_2H_2 zu O_2 1:1, dann wird keine HCN gebildet. Das gleiche ist der Fall, wenn mehr O_2 als C_2H_2 vorhanden ist, da dann keine Kohle mehr entsteht, welche zur B. von HCN notwendig ist. Verss. über die Adsorptionsfähigkeit der abgeschiedenen Kohle ergaben, daß diese wenig aktiv ist u. daher keinerlei katalyt. Einfluß bei der Rk. ausübt. (Journ. Chem. Soc. London **125**. 1634—41. 1924. London, Univ.)

BECKER.

Witold Jazyna, *Die thermodynamische Invariante und die spezifische Wärme beim absoluten Nullpunkt*. (Vgl. Ztschr. f. Physik **25**. 133; C. **1924**. II. 1059.) Vf. verallgemeinert mit Hilfe der sogen. thermodynam. Invariante auf Grund des 2. Hauptsatzes eine Folgerung aus dem Nernstschen Theorem u. zeigt, daß die spezif. Wärme der Körper bei irgend einem Prozesse in unmittelbarer Nähe des absol. Nullpunktes dem Werte Null zustrebt. (Ztschr. f. Physik **28**. 371—72. 1924. Leningrad.)

K. WOLF.

W. J. Walker, *Das kritische Druckverhältnis für Gase in seiner Beeinflussung durch die Veränderlichkeit der spezifischen Wärme*. (Vgl. Philos. Magazine [6] **43**. 589; C. **1922**. I. 1266.) Bezugnehmend auf seine frühere Studie, betreffend die Ausströmung von Gasen aus Düsen u. den Einfluß veränderlicher spezif. Wärme auf die Strömungsgeschwindigkeit, leitet Vf. im vorliegenden eine Formel ab für das Verhältnis zwischen dem höheren Druck vor der Ausströmung u. dem niedrigeren nach dieser, unter Berücksichtigung der Veränderlichkeit der spezif. Wärme. Dieses Verhältnis wächst mit der Temp. u. ist größer als bei konstanter spezif. Wärme. Die Ableitungen werden durch Wiedergabe früherer Verss. gestützt. (Philos. Magazine [6] **48**. 703—7. 1924. Dundee, Univ.)

KYROPOULOS.

K. K. Smith und **L. I. Bockstahler**, *Eine verbesserte Methode zur Messung der spezifischen Wärme von Metallen bei hoher Temperatur*. Mittels eines Hochfrequenzoszillographen werden an einem von Wechselstrom durchflossenen Glühdraht die Temperaturschwankungen gemessen. Da die Maximal- u. Minimaltemp. dem jeweils emittierten Elektronenstrom proportional ist, kann durch gleichzeitige Aufzeichnung des Thermoionenstroms mit dem Wechselstrom, mit welchem der Draht geheizt wird, die Amplitude der Temperaturschwankungen bestimmt werden. Bei bekannter Frequenz kann dann nach einer von CORBINO (Physikal. Zeitschr. **13**. 375; C. **1912**. I. 1964) entwickelten Formel die Wärmekapazität des h. Drahtes bestimmt werden. Verss. der Vff. ergeben bei W-Drähten zwischen 2375° u. 2475° absol. eine mittlere spezif. Wärme von 0,045 cal. pro g. Daraus berechnet sich die Atomwärme zu 8,3 cal. pro Grammatom. (Proc. National Acad. Sc. Washington **10**. 386—88. 1924. Northwestern Univ.)

BECKER.

Ernst Cohen und **W. D. Helderman**, *Die Metastabilität der Elemente und Verbindungen als Folge von Enantiotropie oder Monotropie*. VIII. (VII. vgl. COHEN, Ztschr. f. physik. Ch. **109**. 109; C. **1924**. II. 793.) Im Anschluß an die Verss. von

COHEN u. KOOY (Ztschr. f. physik. Ch. **109**. 81; C. **1924**. II. 793) über die Best. der Vol.-Änderung des *Ammoniumnitrats* bei dessen Umwandlungstemp. von $32,3^{\circ}$ ermitteln Vff. die intermediären *Lösungswärmen* der reinen Modifikationen III u. IV bei $32,3^{\circ}$ u. leiten hieraus die Wärmetönung der Umwandlung des NH_4NO_3 ab. Besondere Sorgfalt wurde der Reindarst. von III (Stabilitätsgebiet $32,3^{\circ}$ bis $84,2^{\circ}$) u. IV (Stabilitätsgebiet — 16 bis $32,3^{\circ}$) gewidmet. Die Umwandlungswärme III $\rightarrow$ IV bei $32,3^{\circ}$ ergab sich zu 4,99 gcal/g, während BRIDGMAN infolge Arbeitens mit Gemischen der beiden Modifikationen 4,66 gcal/g erhalten hatte. (Ztschr. f. physik. Ch. **113**. 145—56. 1924. Utrecht.) BEHRLE.

Franz Zeilinger, *Gastheoretische Berechnung der Brownschen Bewegung*. Der Einfluß der Moll. auf ein zwischen ihnen schwimmendes Teilchen wird berechnet, wenn die Moll. 1. elast. reflektiert, 2. diffus reflektiert werden, 3. adsorbiert werden u. nachher verdampfen. In allen Fällen ergeben sich die Einsteinschen Gesetze der Brownschen Bewegung. (Ann. der Physik [4] **75**. 403—25. 1924. Zürich.) BIK.

Walter Mund und Pierre Herrent, *Die Verflüssigung des binären Gasgemisches Schwefeldioxyd-Äthan*. (Bull. Soc. Chim. Belgique **33**. 401—22. 1924. — C. **1924**. II. 285.) BEHRLE.

Richard Becker, *Eine einfache kinetische Ableitung der Ionisierungs- und Dampfdruckgleichung*. (Vgl. Ztschr. f. Physik **18**. 325; C. **1924**. I. 122.) Wahrscheinlichkeitsbetrachtungen, an die frühere Arbeit anknüpfend, die für hinreichend tiefe Tempp., für die Ionisierung eines Atoms angestellt u. auf das Ionisationsgleichgewicht in einer elektr. neutralen Gasmasse angewandt zur Gleichung von SAHA u. in ihrer Übertragung auf Kondensations- u. Verdampfungsvorgang von Atomen zur Dampfdruckformel von SACKUR-STERN-TETRODE führen. An Stelle der Neutralitätsbedingung beim Ionisationsgleichgewicht tritt beim Dampfdruckgleichgewicht die Zusatzhypothese, daß die Zahl der Kondensationspunkte, welche der feste Körper seinem Dampf bietet, gleich der Zahl der Oberflächenatome des Körpers ist, welche Hypothese sich aus der Betrachtung der Oberflächenvorgänge ergibt. (Ztschr. f. Physik **28**. 256—60. 1924. Berlin-Grunewald.) KYROPOULOS.

H. H. Lowry und S. O. Morgan, *Die Dampfdrucke von Rochellesalz, den Hydraten der Natrium- und Kaliumtartrate und ihrer gesättigten Lösungen*. Die Dampfdrucke von Rochellesalz, $\text{NaKC}_4\text{H}_4\text{O}_6 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$, das nach VAN LEEUWEN (Ztschr. f. physik. Ch. **23**. 33 [1897]) in gesätt. Lsg. allein nur unterhalb 40° existieren kann, da sich bei dieser Temp. Na-Tartrat ausscheidet, u. die Lsg. dann sowohl an diesem als auch an Rochellesalz gesätt. wird, von $\text{Na}_2\text{C}_4\text{H}_4\text{O}_6 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ u. von $\text{K}_2\text{C}_4\text{H}_4\text{O}_6 \cdot \frac{1}{2}\text{H}_2\text{O}$ wurden nach der stat. Methode zwischen 15 u. 40° bestimmt mit Hg als der einschließenden Fl. Die Temp. t_w , bei der das W. denselben Dampfdruck p hat wie die untersuchte Substanz, ist als Funktion der Temp. graph. dargestellt. Diese Funktion muß nach JOHNSTON (Ztschr. f. physik. Ch. **62**. 330 [1908]) eine Gerade darstellen, die Abweichungen der gefundenen Werte sind unbedeutend. Bei 15° sind die Dampfdrucke von Rochellesalz 4,1, $\text{Na}_2\text{C}_4\text{H}_4\text{O}_6 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 11,0, $\text{K}_2\text{C}_4\text{H}_4\text{O}_6 \cdot \frac{1}{2}\text{H}_2\text{O}$ 10,5 u. von den gesätt. Lsgg. (in derselben Reihenfolge) 11,2; 11,7; 9,6; bei 40° sind die Dampfdrucke der Hydrate u. der Lsgg. (in derselben Reihenfolge) 27,1; 48,9; 39,2; 47,6; 50,2; 39,9 mm Hg. (Journ. Americ. Chem. Soc. **46**. 2192—96. 1924. New York [N. Y.], Am. Teleph. and Telegraph. Co. u. Western Electr. Co.) JOSEPHY.

B. Anorganische Chemie.

G. Malquori, *Elektrolytische Darstellung von Ozon mittels Wechselstrom, der von Gleichstrom überlagert ist*. Vff. arbeitet teils mit einer Pt-Anode mit Innenkühlung, teils mit einer Pb-Anode, die mit PbO_2 überzogen ist. Die Verss. wurden ausgeführt mit H_2SO_4 von den DD. 1,04, 1,35 u. 1,40, mit H_2SO_4 von der D. 1,35

mit 10% Phosphorsäurezusatz, mit 25%ig. Phosphorsäure, mit einer Lsg. von $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$, die 2 Mol. pro 1 enthielt, mit 2-n. NaOH-Lsg. u. mit einer gesätt. $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ -Lsg. Am besten eignet sich zur Darst. von Ozon als Elektrolytlf. eine H_2SO_4 von der D. 1,1—1,4, Gleichstromdichte 90 Amp. pro qcm, Wechselstromdichte 3 Amp. Bei Gebrauch der mit PbO_2 überzogenen Pb-Anode muß mit mäßiger Gleichstrom- u. kleiner Wechselstromdichte gearbeitet werden, um günstige Ausbeuten zu erzielen. (Atti R. Accad. dei Lincei, Roma [5] **33**. II. 102—6. 1924.) Go.

W. Manchot und **A. Wirzmüller**, *Über die Darstellung von Selenensäure*. JULIUS MEYER u. H. MOLDENHAUER (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. **116**. 193; C. **1921**. III. 927) empfehlen bei der Darst. von H_2SeO_4 aus H_2SeO_3 die Verwendung von Chlorsäure als Oxydants. Nach den Ermittlungen der Vf. ist es jedoch nicht möglich, auf diese Weise das Präparat frei von seleniger Säure zu erhalten. Dagegen gelingt es Vf., auf dem Wege der anod. Oxydation (GLAUSER, Chem.-Ztg. **1907**. 630) bei Verwendung eines Diaphragmas u. Einhaltung passender Stromdichten (0,15 Amp./qcm), den gewünschten Zweck zu erreichen. Der Anodenraum befindet sich außen u. wird durch Einstellen in eine Kältemischung auf 17—22° gehalten. Er enthält die selenige Säure in ca. 70%ig. wss. Lsg. Das Anodenmaterial ist mit PbO_2 umkleidetes Pt-Blech. Die Kathodenfl. besteht aus 5-n. HNO_3 , die Kathode selbst aus Pt Blech. Diese Anordnung ermöglicht bei einem Stromaufwand von ca. 350% der Theorie die vollständige Oxydation der eingebrachten selenigen Säure. Das Prod. wird von Spuren von PbSeO_4 abfiltriert, durch Erhitzen auf 205° von der beigemischten HNO_3 befreit u. auf einen Gehalt von 90% eingengt. Bei Verwendung von Pb-Elektroden gelangt man zu einem Präparat gleicher Güte unter Verbesserung der Stromausbeute um ca. 7%, jedoch unter gleichzeitiger Schmälerung der Selenausbeute um 10—12% zugunsten einer reichlichen B. von Anodenschlamm. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. **140**. 47—51. 1924. München, Techn. Hochsch.) GOLTERMANN.


Joseph Simons, *Die Darstellung von Fluor*. Das geeignetste Verf. zur Darst. von Fluor in größeren Mengen ist die Elektrolyse von geschmolzenem $\text{KF} \cdot \text{HF}$, wie es von ARGO, MATHERS, HUMISTON u. ANDERSON (Trans. Amer. Electr. Soc. **35**. 348; C. **1921**. III. 89) beschrieben ist. Vf. verbessert das Verf. durch einige Änderungen an dem App., vgl. Zeichnung im Original. Da der Cu-Stab, der die Anode hielt, zers. wurde, Cu sich wahrscheinlich auf dem Siegelack verteilte u. dadurch diesen leitend machte, so daß Anode u. Diaphragma kurz geschlossen waren, wurde die Graphitanode in Portlandzement eingesiegelt. Die Technik des Regenerierens des Elektrolyten ist eingehend beschrieben. (Journ. Americ. Chem. Soc. **46**. 2175—79. 1924.) JOSEPHY.

Joseph Simons, *Darstellung, Gefrierpunkt und Dampfdruck von Fluorwasserstoff*. (Vgl. vorst. Ref.) HF wurde aus wasserfreiem Kaliumfluorid dargestellt. Die Säure wird aus einem Kupfergefäß, dessen Deckel mit Klemmschrauben festgemacht ist, durch ein 1 m langes Cu-Rohr, das kurz vor seinem oberen Ende dicht mit Cu-Draht ausgefüllt ist, destilliert. Der Gefrierpunkt von HF wurde zu 190° absol. bestimmt. Die Dampfdrucke wurden vom F. 192° absol. bis zu 320° absol. u. einem Druck von 1827 mm Hg gemessen. (Die Angabe von 25 at ist ein Druckfehler.) (Journ. Americ. Chem. Soc. **46**. 2179—83. 1924.) JOSEPHY.

Joseph Simons und **J. H. Hildebrand**, *Dichte und Molekularkomplexität von gasförmigem Fluorwasserstoff*. Die Dampfdichte von Fluorwasserstoff wurde nach der dynam. Methode bestimmt. O_2 -freier, trockner N_2 wurde durch wasserfreie fl. HF, dann durch Cu-Röhren, die trocknes NaF enthielten, welches HF absorbiert, geleitet. Aus dem Gewicht der durch ein bestimmtes Vol. N_2 zur Absorption gebrachten Säuremenge u. dem aus vorst. Ref. bekannten Dampfdrucken der Fl. kann nach den Gasgesetzen die D. u. das scheinbare Mol.-Gew. des Gases berechnet werden.

Wie bei THORPE u. HAMBLY (Journ. Chem. Soc. London 55. 163 [1889]) ergibt sich, daß HF weiter als bis zu H_2F_2 polymerisiert ist. Die Änderung des Mol.-Gew. mit der Temp. ist in Tabellen angegeben. Nimmt man an, daß der Dampf aus einem im Gleichgewicht befindlichen Gemisch von HF u. $(\text{HF})_6$ besteht, so erhält man als Assoziationswärme von 1 Mol. HF 6670 cal, dieser Wert ist von derselben Größenordnung wie die Verdampfungswärmen ähnlicher Substanzen. (Journ. Americ. Chem. Soc. 46. 2183—91. 1924. Berkeley [Cal.], Univ.) JOSEPHY.

Lauder W. Jones und Alfred W. Scott, *Hyponitrite*. Die Formel $\text{O}=\text{N}-\text{NH}(\text{OH})$ stellt die untersalpetrige Säure als Hydroxamsäure, die Formel $\text{HO}-\text{N}=\text{N}-\text{OH}$ als Hydroximsäure der salpetrigen Säure dar. Diese Beziehungen führten Vf. zur Darst. von $(\text{NaNO})_2$ nach



mit befriedigender Ausbeute. Ein Überschuß von Na-Äthylat wirkt günstig. Das Äthylnitrit muß langsam in das Rk.-Gemisch hineindestilliert werden. Mit AgNO_3 setzt sich $(\text{NaNO})_2$ um, u. man stellt auf diese Weise am besten $(\text{AgNO})_2$ dar. (Journ. Americ. Chem. Soc. 46. 2172—75. 1924. New Jersey u. Athens [Georgia], Princeton Univ.) JOSEPHY.

Lord Rayleigh, *Das Leuchten des Phosphors*. Zusammenfassender Vortrag über die Verss. des Vf. (Vgl. Proc. Royal Soc. London Serie A 106. 1; C. 1924. II. 1168). (Nature 114. 612—14. 1924.) BECKER.

Arthur Rosenheim, *Über innerkomplexe Borate*. (Berichtigung.) Zu seiner letzten Veröffentlichung (vgl. ROSENHEIM u. VERMEHREN, Ber. Dtsch. Chem. Ges. 57. 1337; C. 1924. II. 2015) teilt Vf. berichtend mit, daß ihm die zur Erklärung der opt. Isomerie der *Salicylsäureborate* ausreichende Spiranasymmetrie entgangen ist. Doch spricht diese neue Isomerie nicht gegen die Annahme eines dreiwertigen Bors in den innerkomplexen Boraten. Die Molekularasymmetrie wird hier im Tetraederschema durch drei Hauptvalenzen u. eine Nebenvaleanz hervorgerufen. Der Einwand gegen die Auffassung BOESEKENS von fünfwertigem Bor wird durch die festgestellte Spiranasymmetrie nicht entkräftigt. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 57. 1828. 1924.) HORST.

J. Frenkel, *Beitrag zur Theorie der Metalle*. (Vgl. Ztschr. f. Physik 25. 1; C. 1924. II. 912.) Vf. leitet aus Grundgesetzen der Wechselbeziehungen elektr. geladener Teilchen die Folgerung ab, daß bei der Vereinigung von Metallatomen zu fl. oder festem Metall ihre Valenzelektronen erheblich stärker gebunden werden u. rascher schwingen als in den vorher als Gasteilchen voneinander isolierten Einzelatomen. Die Bahnbewegung der Valenzelektronen wird aber bei der Kondensation aus rein geometr. Gründen (Aphelabstand der Bahnen $\gg$ Gitterkonstante des Metalls) derart zerstört, daß sie trotz ihrer festeren Bindung sehr rasch von Atom zu Atom bzw. Ion übergehen anstatt individuelle Atome dauernd zu umkreisen. Vf. betrachtet diese „Wanderung“ der Valenzelektronen als eine Art von Selbstdiffusion und berechnet approximativ die Diffusionskonstante. Hieraus ergibt sich — analog der Einsteinsche Theorie der Brownschen Bewegung — die Beweglichkeit der Valenzelektronen und die Leitfähigkeit der Metalle. Die so abschätzbaren Werte stimmen der Größenordnung nach sowohl bzgl. der Temperatur-Abhängigkeit als auch dem Eigenwert nach mit den bei hohen Temp. beobachteten Werten überein; auch läßt sich die Wärmeleitfähigkeit formal berechnen u. sich mit dem Wiedemann-Franz'schen Gesetz in Einklang bringen. Ferner bestimmt Vf. näherungsweise die Kohäsionskräfte und Kompressibilität der Metalle auf Grund der vereinfachenden Annahme, daß die sich rasch bewegenden Valenzelektronen wie ein kontinuierliches Fluidum wirken, innerhalb dessen die positiven Ionen (Atomrümpfe) schwimmen. Hieraus läßt sich eine Deutung der Krystallstruktur der

meisten Metalle und eine Berechnung ihrer Gitterenergien und Kompressibilitäten ableiten, ohne in erster Näherung andere als die Coulombschen Kräfte einzuführen. (Ztschr. f. Physik **29**. 214—40. 1924. Leningrad.) FRANKENBURGER.

Paul Pascal, *Untersuchungen über die Metaphosphate*. II. (I. vgl. Bull. Soc. Chim. de France [4] **33**. 1611; C. 1924. I. 1339.) Kurz. Ref. nach C. r. d. l'Acad. des sciences vgl. C. 1924. II. 604. Nachzutragen ist: 1. Die Umwandlung des NaH_2PO_4 ins *Madrell-Salz* dauert bei 252° ca. 300 Stdn., bei 355° ca. 2 Stdn. 2. Die *Kurrol-Salze* des Na sind zweckmäßig aus Natriummonoäthylphosphat herzustellen; die minimale Erhitzungstemp. ist 500° . Die Übergänge aus einem Kurrolschen Salz in ein anderes sind in der Na-Reihe u. in der K-Reihe umkehrbar, namentlich nach einem Zusatz von 1% Bleimetaphosphat. (Bull. Soc. Chim. de France [4] **35**. 1119—30. 1924. Lille, Univ.) BIKERMAN.

Paul Pascal, *Untersuchungen über die Metaphosphate*. III. (II. vgl. vorst. Ref.) Kurz. Ref. nach C. r. d. l'Acad. des sciences vgl. 1924. II. 1070. Nachzutragen ist: Da das *Na-Tetrametaphosphat* nur in engem Bereich von 607 — 640° stabil ist, muß das Abschrecken der auf diese Temp. gebrachten Substanz rasch durchgeführt werden, um die sehr rasch erfolgende Umwandlung ins Trimetaphosphat bei 607° zu vermeiden. Die Kryoskopie liefert für das *Na-Trimetaphosphat* das Mol.-Gew. von 95, für das Tetrametaphosphat ca. 90, für das Hexametaphosphat 255. Das reine Na-Hexametaphosphat wird beim Abschrecken des geschmolzenen Trimetaphosphates dargestellt, es schm. bei 640° , ist hygroskop. u. bildet l. Komplexe der Form $\text{M}_2\text{Fe}(\text{PO}_3)_6$ bzw. $\text{M}_4(\text{UO}_3)(\text{PO}_3)_6$. Das K-Hexametaphosphat stellt man aus dem Na-Hexametaphosphat her durch Füllen mit $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$ u. Zersetzen des Bleihexametaphosphates mit theoret. Menge K_2SO_4 ; das Filtrat von PbSO_4 wird mit A. gefällt. Die Lsgg. des K-Hexametaphosphates sind kaum viscoser, als W. Kryoskop. Messungen ergeben für das K-Hexametaphosphat das Mol.-Gew. 82—92. — Die im l. c. angegebenen Schema angeführten Salze erfüllen mit ihren Stabilitätsbereichen das gesamte Temperaturgebiet bis ca. 900° , so daß die Existenz noch anderer Polymetaphosphate sehr zweifelhaft erscheint. (Bull. Soc. Chim. de France [4] **35** 1131—41. 1924. Lille, Univ.) BIKERMAN.

R. Fricke, *Zähigkeit von Rubidiumhydroxydlösungen*. (Kurze Mitteilung.) Die Zähigkeit reiner Rb(OH)-Lsgg. werden bestimmt u. mit denen von H_2O verglichen. Die Viscosität der Lsgg. ist sehr gering — bei 1-n. Rb(OH)-Lsg. 1,102 auf H_2O bezogen —, was in guter Übereinstimmung mit der relativ geringen Hydratation des Rb-Ions steht. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. **139**. 419—20. 1924. Münster, Univ.) GOTTFRIED.

Hubert Thomas Stanley Britton, *Untersuchungen über die Chromate des Thoriums und der seltenen Erden*. Teil II. *Die Chromate von Lanthan, Praseodym, Neodym und Samarium*. (I. vgl. Journ. Chem. Soc. London **123**. 1429; C. 1924. I. 1017.) Die Chromate von La, Pr, Nd u. Sa wurden dargestellt durch Lösen der Oxyde in möglichst wenig konz. H_2CrO_4 , Verdünnen mit W. u. Füllen mit $\frac{1}{10}$ -n. K_2CrO_4 . Die Salze entsprechen der Formel $\text{M}'''_2(\text{CrO}_4)_3 \cdot 8\text{H}_2\text{O}$. Das Sa-Salz ist etwas bas. (gef. Sa_2O_3 45,42 u. 44,70%, ber. 44,00%). Alle bilden hell- bis dunkelgelbe mkr. Nadeln u. scheinen isomorph zu sein. Die Löslichkeit in W. fällt in der Reihenfolge Sa, Nd, Pr, La; sie beträgt bei 25° 0,043, 0,027, 0,021, 0,020 g in 100 g W., bezogen auf wasserfreies Salz; sie fällt bei steigender Temp. La, Pr u. Sa zeigen Neigung zur B. von Doppelchromaten mit K. Die Doppelsalze des Pr u. Sa waren nicht frei von bas. Salz zu erhalten, bei Zugabe von $\text{La}(\text{NO}_3)_3$ zu überschüssigem K-Chromat fiel mikrokristallin., wahrscheinlich rhomb. $\text{K}_2\text{CrO}_4 \cdot \text{La}_2(\text{CrO}_4)_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ aus. Bei umgekehrtem Verf. bestand der Nd. aus einfachem u. Doppelsalz, entsprechend fiel aus Pr-Lsgg. n. Chromat, aus Nd-Lsgg. ein Gemisch

von n. u. bas. Salz, aus SnCl_2 nur bas. Chromat. (Journ. Chem. Soc. London **125**. 1875—80. 1924. South Kensington, Imp. Coll. of Sci. and Techn.) **HERTER.**

O. Hönigschmid, E. Zintl und F. González, *Über das Atomgewicht des Zirkoniums.* Vff. bestimmen neu das At.-Gew. des Zr aus den Verhältnissen $\text{ZrBr}_4/4 \text{ Ag}$ u. $\text{ZrBr}_4/4 \text{ AgBr}$ u. finden es zu **91,22**. Das zur Darst. des ZrBr_4 verwendete ZrO_2 wurde röntgenspektrograph. auf einen Gehalt an Hf geprüft u. bei dem zur endgültigen Best. benutzten zu maximal 0,08% HfO_2 gefunden. Dieser Hf-Gehalt wurde bei dem Analysenergebnis berücksichtigt. Die Darst. des ZrBr_4 geschah durch Glühen eines Gemisches von ZrO_2 u. Zuckerkohle im brombeladenen N_2 -Strom (App. s. Original). Das ZrBr_4 , bei gewöhnlicher Temp. ein weißes Pulver, das an der Luft raucht, wurde im Vakuum in Glaskugeln hineinsublimiert, zugeschmolzen u. so gewogen. Die Herst. des ZrO_2 geschah über das K-Zr-Fluorid, Überführung in Zr-Oxychlorid mittels NH_3 u. Glühen des Oxychlorids, wodurch ZrO_2 entsteht. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. **139**. 293—309. 1924. München, Akademie d. Wissenschaften.) **GOTTFRIED.**

W. Manchot, *Über das Dissoziationsgleichgewicht der Ferrostickoxydsalze.* Unter Zugrundelegung des früher (LIEBIGS Ann. **350**. 368; C. **1907**. I. 608) ermittelten Grenzwertes für die Stickoxydbindung wss. Ferrosalzlsgg. von 1 Mol NO pro Mol Ferrosalz läßt sich nach der Formel $K = P \cdot (22,4 - v)/v$ (P = Partialdruck des NO, v = Vol. des pro Mol Ferrosalz gebundenen NO) das Gleichgewicht der Rk.: Ferrosalz + NO $\rightleftharpoons$ Ferrostickoxydsalz berechnen. Vf. mißt (über die App. vgl. LIEBIGS Ann. **372**. 153; C. **1910**. I. 1685) bei 0°, 13°, 25°, bei Drucken von 1 at abwärts u. erhält K-Werte von guter Konstanz u. ohne Gang. Die NO-Bindung verläuft exotherm. Aus dem Gleichgewicht ergibt sich eine Wärmetönung von 11,9 cal im Mittel, ein Wert, der übereinstimmt mit dem von GAY (Thèse, Paris, Fac. des sciences, 1895) auf direktem Wege ermittelten. Es ist somit der Beweis für die Richtigkeit der vorausgesetzten Formulierung des Gleichgewichts erbracht. Die Konz. des Ferrosalzes ist insofern von Einfluß, als dieses von einer unteren Grenze an aufwärts aussalzend auf das nur gel. NO wirkt. Ein Zusammenhang zwischen der elektrolyt. Dissoziation des Ferrosalzes u. dem Betrage der Stickoxydbindung besteht jedoch nicht. Die Wrkg. fortschreitender Verd. auf die NO-Bindung ist bereits zu Ende, (33,3 Liter/Mol) wenn das Eisensalz erst etwa zur Hälfte dissoziiert ist. (Vollständige Dissoziation bei 2500 Liter/Mol.) Es ist ferner anzunehmen, daß, wenngleich in der Lsg. die Existenz des Ions FeNO^{++} nachzuweisen ist, die Addition des NO primär am undissoziierten Ferrosalzmol. erfolgt, denn Zusätze von Elektrolyten mit gleichem Anion u. Anwendung schwach dissoziierender Lösungsm. verschieben das Gleichgewicht im Sinne vermehrter NO-Bindung. Mit steigender Temp. wird die Wrkg. des NO eine mehr oxydierende; z. B. findet bei 90° kaum mehr Addition, sondern nur noch Red. des NO statt. Vf. sieht, da sich die beiden Stadien eines solchen Oxydationsvorganges: 1. Bindung des Oxydants, 2. Red. desselben beliebig voneinander trennen lassen, in dieser Rk. ein Modell eines Oxydationsprozesses überhaupt im Sinne der von ihm früher (LIEBIGS Ann. **325**. 102; C. **1903**. I. 376) entwickelten Anschauungen. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. **140**. 22—36. 1924.) **GOTTERMANN.**

W. Manchot und E. Linckh, *Darstellung kristallisierter Ferrostickoxydsalze.* III. *Kristallisiertes Ferroselenatstickoxyd.* (II. vgl. LIEBIGS Ann. **372**, 165; C. **1910**. I. 1685, vgl. auch vorst. Ref.) Zur Darst. größerer Mengen empfehlen Vff. das folgende Verf. 5 g Ferroselenat, $\text{FeSeO}_4 \cdot 5 \text{ H}_2\text{O}$ (aus in 20% ig. Selensäure gel. Eisenfeile mit k. A. ausgefällt) werden unter Erwärmen in 5—10 ccm w. + einige Tropfen 60% ig. Selensäure gelöst. Die filtrierte u. noch w. Lsg. wird in einem besonderen Absorptionsapp. mit NO gesätt. u. nach sorgfältiger Kühlung mit Kochsalzkältemischung mit 100 ccm ebenso gekühltem u. mit NO gesätt. absol. A. unter


weiterem Sättigen mit NO (ca. 50 cm Überdruck) gemischt. Nach 24 Stdn. Stehen unter Kühlung pumpt man das über der Lsg. stehende NO möglichst rasch heraus, leitet H_2 ein, ersetzt die über dem Nd. stehende Lsg. durch gekühlten 96% ig. A. u. preßt auf Tonteller ab. Man erhält so etwa 3 g des braunschwarzen, krystallisierten *Ferroselenatstickoxyds* von der Formel $FeSeO_4 \cdot NO \cdot 4H_2O$. Die Verb. löst sich in W. unter Verlust von NO. Aus der wss. Lsg. scheidet Aceton ein braunschwarzes Öl ab, das bald erstarrt. NaOH-Lsg. fällt flockigen braunschwarzen Nd., der in seinem Aussehen von Ferro- u. Ferrihydroxyd deutlich verschieden ist. Konz. H_2SO_4 u. konz. H_2SeO_4 geben rote, konz. HCl grüne, konz. H_3PO_4 tief braunrote Lsgg. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 140. 37—46. 1924. München, Techn. Hochsch.) Go.

Julius Meyer, Gerhard Dirska und Fritz Clemens, Zur Kenntnis komplexer Kobaltiselenate. Vff. stellen eine größere Menge von ein- u. mehrkernigen Kobaltkomplexsalzen her, in denen der Sulfatrest durch den Selsäurerest ersetzt ist, um die Ähnlichkeit oder Verschiedenheit zwischen H_2SO_4 u. H_2SeO_4 zu prüfen. In den von den Vff. hergestellten Salzen tritt der Selsäurerest einerseits als dissoziierbares Anion, andererseits innerhalb des Komplexes nichtionogen gebunden auf. Die Möglichkeit u. die Neigung der beiden Säuren zur Brückenbildung zwischen zwei oder mehr Metallatomen wird untersucht; Vff. stellen zwei zweikernige Salze her, in denen der Selenatrest als Brücke zwei Kobaltatome zusammenhält. Alle Selsalze zeigen mit den entsprechenden Sulfaten die beste Übereinstimmung. Der H_2SO_4 -Rest kann in den komplexen Kobaltisulfaten ohne merkliche Änderung des Charakters der Salze durch H_2SeO_4 ersetzt werden. Hergestellt wurden folgende Salze.

I.



II.




III.




IV.




V.







VI.



VII.



XI.



Hexamminkobaltiselenatpersulfat, $[(NH_3)_6Co]_2(SeO_4)_2 \cdot (S_2O_8)$, gelbe Blättchen; *saures Diaquodipyridindiamminkobaltiselenat*, $[(H_2O)_2Py_2(NH_3)_2Co](SeO_4)SeO_4H$, braunrote Krystalle; *Nitratopentamminkobaltiselenat*, $[(NO_3)Co(NH_3)_5]SeO_4$, rosafarbene Nadeln; *Isorhodanatopentamminkobaltiselenat*, $[(NCS)(NH_3)_5Co]SeO_4 \cdot 2H_2O$, glimmerartige, gelbbraune, glänzende Blättchen; *Carbonatopentamminkobaltiselenat*, $[(CO_3) \cdot (NH_3)_5]SeO_4$, dunkelviolettrote, perlmutterglänzende Schüppchen; *saures Oxalatopentamminkobaltiselenat*, $[(NH_3)_5CoC_2O_4]SeO_4H \cdot H_2O$, ziegelrotes Krystallpulver; *normales Oxalatopentamminkobaltiselenat*, $[(NH_3)_5CoC_2O_4]_2(SeO_4) \cdot 3H_2O$, rosenrot; *Hydroxoquatetramminkobaltiselenat*, $[(OH)(H_2O)Co(NH_3)_4]SeO_4$, violette Schuppen; *Chloroquatetramminkobaltiselenat*, $[Cl(H_2O)Co(NH_3)_4]SeO_4$, violett; *Aquobromotetrammin-*

kobaltiselenat, $[\text{Br}(\text{H}_2\text{O})\text{Co}(\text{NH}_3)_4]\text{SeO}_4$, violettes Pulver; *Chlorodiaquotriamminkobaltiselenat*, $[\text{Cl}(\text{H}_2\text{O})_2\text{Co}(\text{NH}_3)_3]\text{SeO}_4$, violette Blättchen; *Dichlorodiaquodiamminkobaltihydroselenat*, $[\text{Cl}_2(\text{H}_2\text{O}, \text{Co}(\text{NH}_3)_2)]\cdot\text{SeO}_4\text{H}$, glänzende, blaugüne Krystalle; *Oxalatotetramminkobaltiselenat*, $[(\text{NH}_3)_4\text{CoC}_2\text{O}_4]_2\text{SeO}_4\cdot 2\text{H}_2\text{O}$, carmoisinrot; *Oxalatodiäthylendiamminkobaltiselenat*, $[\text{en}_2\text{CoC}_2\text{O}_4]_2\text{SeO}_4\cdot 3\text{H}_2\text{O}$, dunkelrot; *Diäthylendiamminkobaltiselenat*, $[\text{en}_2\text{Co}(\text{CNS})_2]\text{SeO}_4\text{H}$, rubinrot; *Diamminobisdimethylglyoximin-kobaltiselenat*, $[(\text{NH}_3)_2\text{Co}(\text{OH})_2]_2\cdot\text{SeO}_4$, glänzende, gelbe Nadeln; *Hexammintetranitro-μ-selenatodikobalt*, $[(\text{NH}_3)_3(\text{NO}_2)_2\text{Co}\cdot\text{OSeO}_2\cdot\text{Co}(\text{NO}_2)_2(\text{NH}_3)_3]_2\cdot 2\text{H}_2\text{O}$, bräunlichgelb; *Dekamminperoxodikobaltiselenat*, $(\text{SeO}_4)\cdot[(\text{NH}_3)_5\text{Co}\cdot\text{O}_2\cdot\text{Co}(\text{NH}_3)_5]\cdot(\text{SeO}_4)\cdot 3\text{H}_2\text{O}$, braunschwarze, säulenförmige Krystalle; *saures Dekamminperoxodikobaltiselenat*, $(\text{HO}_4\text{Se})_2\cdot[(\text{NH}_3)_5\text{CO}\cdot\text{O}_2\cdot\text{Co}(\text{NH}_3)_5](\text{SeO}_4\text{H})_2$, rot; *Dekamminperoxokobaltikobaltiselenat*, $(\text{SeO}_4)_2\cdot[(\text{NH}_3)_5\text{Co}\cdot\text{O}_2\cdot\text{Co}(\text{NH}_3)_5](\text{SeO}_4)_3\cdot 8\text{H}_2\text{O}$, grün; *Dekammin-μ-aminodikobaltiselenat*, $(\text{SeO}_4)[(\text{NH}_3)_5\text{Co}\cdot\text{NH}_2\cdot\text{Co}(\text{NH}_3)_5](\text{SeO}_4)_3$, rote Nadeln; *Chloroaoctoammin-μ-aminodikobaltiselenat*, $(\text{SeO}_4)[\text{Ce}(\text{NH}_3)_4\text{Co}\cdot\text{NH}_2\cdot\text{Co}(\text{NH}_3)_4(\text{H}_2\text{O})](\text{SeO}_4)$, violett; *saures Octammin-μ-aminoselenatodikobaltiselenat* (I.), violette Blättchen; *Octammin-μ-aminoselenatodikobaltinitrat* (II.), violettrote Blättchen; *saures Octammin-μ-aminoselenatodikobaltsulfat* (III.), violett; *saures Octammin-μ-aminosulfatodikobaltiselenat* (IV.); *Octammin-μ-aminoperoxodikobaltiselenat* (V.), grün; *Octammin-μ-amino-ol-dikobaltiselenat* (VI.), rot; *Octammin-μ-aminonitrodikobaltiselenat* (VII.), orangegelb; *Octammin-diol-dikobaltiselenat* (VIII.), violett; *Hexammintrioldikobaltiselenat* (IX.), rot; *Hexammin-μ-nitrodioldikobaltiselenat* (X.), orangefarbig; *Dodekamminhexoltetrakobaltiselenat* (XI.), dunkelbraunviolette Blättchen. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. **139**. 333—86. 1924. Breslau, Univ.)

GOTTFRIED.

Arnoldo Piutti und Duilio Migliacci, *Über das Atomgewicht des Bleies aus Cotunnit vom Vesuv*. Das At.-Gew. des Pb aus dem radioaktiven Cotunnit (PbCl_2) wird bestimmt. Zuerst entziehen Vff. dem feinstgepulverten Cotunnit mit kochendem W. das PbCl_2 u. krystallisieren es mehrfach aus W. um u. finden die Radioaktivität des so gewonnenen Salzes zu $\frac{1}{10}$ des als Vergleichspräparat angewandten Gemisches von UO_2 u. MnO_2 . Das PbCl_2 wird zur Reinigung mit H_2S gefällt, das PbS in Nitrat u. dann in Sulfat überführt. Nach Behandlung mit NH_4NO_3 wurde das Sulfat wiederum mit H_2S gefällt, in Nitrat u. schließlich durch HCl wieder in PbCl_2 überführt. Das PbCl_2 wurde nun in $\text{Pb}(\text{C}_6\text{H}_5)_4$ überführt, mehrmals aus Bzl. u. CHCl_3 umkrystallisiert, im Soxhlet mit abs. A. behandelt u. zum Schluß nochmals mittels Bzl. gereinigt. F. 223,6°. Die Prüfung der Radioaktivität des so gewonnenen *Pb-Tetraphenils* u. des Pb, das mit dem Phenyl nicht reagiert hatte, ergab, daß das $\text{Pb}(\text{C}_6\text{H}_5)_4$ fast inaktiv, die Rückstände dagegen aktiv waren, ein Zeichen dafür, daß sich in den Rückständen RaD angereichert hatte. Auf gleiche Weise wurde $\text{Pb}(\text{C}_6\text{H}_5)_4$ aus gewöhnlichem Pb hergestellt u. der F. ebenfalls zu 223,6° gefunden. Die At.-Geww. wurden bestimmt aus dem Verhältnis $\text{Pb}(\text{C}_6\text{H}_5)_4$: PbBr_2 . Zur Überführung des $\text{Pb}(\text{C}_6\text{H}_5)_4$ in PbBr_2 wurde das Tetraphenyl in einem Schiffchen mehrere Tage Br-Dämpfen ausgesetzt. In dem Schiffchen befand sich nun außer dem PbBr_2 noch $\text{C}_6\text{H}_5\text{Br}$ u. überschüssiges Br. Das Schiffchen wurde in einen Exsiccator über NaOH u. konz. H_2SO_4 gebracht u. dort etwa eine Woche, zuletzt im Vakuum, gelassen, dann im Trockenschrank langsam bis 260° einige Stdn. erhitzt. Nach nochmaligem Trocknen über P_2O_5 wurde das PbBr_2 zur Analyse gewogen. Vff. fanden für das At.-Gew. des gewöhnlichen Pb 207,192 u. für Pb aus Cotunnit 207,050. (Gazz. chim. ital. **54**. 605—10. 1924. Neapel, Univ.)

GOTTFRIED.

A. Thiel und L. Stoll, *Über Bleinitrit*. Vff. untersuchen die Einw. von Pb auf Bleinitrat u. die dabei auftretenden Gleichgewichte. Die Versuchsanordnung war so, daß grobes Pb-Pulver bei 25° mit Bleinitratlsgg. verschiedener Konz. in zugeschmolzenen Gefäßen geschüttelt wurde. Die Lsg. färbt sich bald gelb u. es

schied sich ein weißlichgelber Bodenkörper ab, in dem sich Bleinitrat, Bleinitrit u. Bleihydroxyd nachweisen ließen, d. h. vermutlich ein Gemisch von bas. Bleinitrat u. bas. Bleinitrit. Da sich ein Einfluß der Zus. der nichtmetall. Bodenkörper auf das schließlich sich einstellende Gleichgewicht von Nitrat zu Nitrit in der Lsg. nicht feststellen ließ, nehmen Vff. an, daß es sich um Salzmischungen handelt, deren Bruttozus. durch das Mischungsverhältnis NO_3' u. NO_2' in der Lsg. bedingt wird, selbst aber ohne Einfluß auf die Zus. der Lsg. ist. Die Zus. der Lsg. scheint allein auf einer Gleichgewichtseinstellung zwischen Pb, NO_3' u. NO_2' zu beruhen. Vff. untersuchen daher nur die Konz. in der Lsg. In allen Versuchsreihen zeigt sich, daß sowohl das metall. zugesetzte Pb als auch der Pb-Gehalt der Ausgangslsg. zu einen großen Teil in den nichtmetall. Bodenkörper übergeht. Mit sinkender Konz. der Ausgangslsg. wird der Nd. immer nitritreicher. Das Konz.-Verhältnis von NO_2/NO_3 in der Gleichgewichtslsg. ist annähernd 2 : 3. Verss., die entsprechenden Gleichgewichte bei höherer Temp. zu erhalten, scheiterten an dem Druck des sich entwickelnden NO , doch läßt sich soviel sagen, daß die Red. des Bleinitrats bei höherer Temp. weiter geht. Zusatz einer schwachen Säure scheint (bei 25°) im wesentlichen ähnlich zu wirken wie höhere Temp.

Vff. haben ferner festgestellt, daß sich feine Bleinitritlsgg. schon für sich allein, rascher beim Schütteln mit Pb, unter B. von Nitrat teilweise umwandeln. Ob sich dieselben Gleichgewichte bilden wie bei der ersten Rk. ist nicht ermittelt worden. — Nitratfreie Lsgg. von Bleinitrit erhielten Vff., wenn man sich auf Konz. unterhalb 0,3 m beschränkt, als sie äquivalente Mengen von festem Bleibromid u. festem AgNO_3 mit relativ geringen Mengen W. bis zur völligen Umsetzung bei Zimmertemp. schüttelten. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. **139**. 317—23. 1924. Marburg, Univ.)

GOTTFRIED.

G. R. Levi und A. Quilico, *Über die Nichtexistenz des Silbersuboxyds*. Vff. haben die Photogramme von Ag_2O u. seinen Reduktionsprodd nach der Methode von DEBYE u. SCHERRER-HULL untersucht u. dadurch festgestellt, daß sowohl das von GLASER (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. **36**. 9 [1903]), als auch das von GUNZ (C. r. d. l'Acad. des sciences **112**. 861) dargestellte Reduktionsprod. kein Ag_4O , sondern ein Gemisch aus Ag_2O u. Ag ist. Ag_2O_2 ist dagegen eine chem. wohl definierte Verb. von geringem krystallin. Symmetriegrade. (Gazz. chim. ital. **54**. 598—604. 1924. Mailand.)

DEHN.

Fritz Paneth und Eugen Rabinowitsch, *Über die Gewinnung des Zinnwasserstoffs durch kathodische Reduktion*. Zinnwasserstoff durch kathod. Red. darzustellen, gelang nicht nur an Pb-Kathoden (vgl. Ztschr. f. Elektrochem. **29**. 97; C. **1923**. III. 605), sondern nach den neueren Unters. der Vff. auch an Sn-Kathoden. Die Ausbeute ist hierbei ebenfalls recht gering u. abhängig von einer kleinen Sn-Konz. der Lsg. Durch Zusatz von Gelatine zum Elektrolyten konnte die Ausbeute erhöht werden, während die Variierung anderer Einflüsse ohne Zusatz des Kolloids keine Verbesserung der Ausbeute zeigte. Bei Anwendung von Dextrin wurde die Ausbeute um das 10—30-fache gesteigert u. nach einiger Zeit („Einlaufzeit“) trat Konstanz ein, was für die systemat. Unters. der anderen Bedingungen der Elektrolyse von großer Bedeutung war. In Anwesenheit von Dextrin wächst die Ausbeute mit der Stromstärke etwa um das doppelte. Im Bereich von 0,5—7,5 Amp. pro qcm ist sie von der Stromdichte unabhängig. Erhöhung des Zinngehalts in der Lsg. ist für die Ausbeute vernichtend. Die Temp. hat nur einen geringen Einfluß. Die B. von SnH_4 geht an allen unangreifbaren oder schwer angreifbaren Kathoden vor sich (Sn, Pb, Cd, Pt), aber nicht an solchen, die sich während des Stromdurchgangs rasch auflösen (Zn) oder deren Oberfläche ständig erneuert wird (Hg). Der Mechanismus der kathod. Red. wird von den Vff. als durch die „Wasserstoffüberspannung“ bestimmt angesehen. Der Zusatz der Kolloide wirkt

in starkem Maße erhöhend u. stabilisierend auf die Überspannung. Die Unabhängigkeit der Elektrolyse von der Stromdichte ist nach Ansicht der Vff. darin begründet, daß die angewendeten Stromdichten im Vergleich zu den bei Überspannungsmessungen gebrauchten sehr hoch sind, u. bei der SnH_4 -Elektrolyse immer ein Stromdichtegebiet vorliegt, in welchem die Überspannung von der Stromdichte nicht mehr abhängig ist. Überspannungserscheinungen treten nicht nur bei der H_2 -Entw. sondern auch bei der elektrol. Metallabscheidung auf. Durch den Zusatz von Kolloiden werden diese sonst geringen Metallüberspannungen stark erhöht, so daß für die B. des SnH_4 u. die Höhe der Ausbeute sowohl die Konz. des „Überspannungswasserstoffs“, wie die des „Überspannungsmetalls“ maßgebend sein werden. Die Konz. des gebildeten SnH_4 im kathod. mitentwickelten H_2 beträgt etwa 1 : 10000, was dem Verhältnis der Sn-Ionenkonz. zu der $[\text{H}^+]$ in der Lsg. entspricht. — Vff. beschreiben eine im Bild wiedergegebene Versuchsanordnung (Glockenanordnung), welche die Darst. des SnH_4 für Zwecke der Vorlesung ermöglicht. Nach einer Einlaufzeit von $\frac{1}{2}$ Stde. beträgt die Ausbeute 2—3 mg pro Stde., auf welcher Höhe sie 6—8 Stdn. konstant gehalten werden kann. Nach Ansicht der Vff. kann das als SnH_4 beschriebene Gas, das VAUBEL (vgl. Ber. Dtsch. Chem. Ges. 57. 515; C. 1924. I. 1905) in großen Mengen durch Lösen von Sn in HCl erhalten haben will, unmöglich reiner SnH_4 sein. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 57. 1877—90. 1924.)

HORST.

Fritz Paneth, Wilhelm Haken und Eugen Rabinowitsch, Über die Reindarstellung und Eigenschaften des Zinnwasserstoffs. (Vgl. vorst. Ref.) Zur Reindarst. von SnH_4 wird von den Vff. eine 8-Zellenapparatur beschrieben, deren Einzelheiten aus der übersichtlichen Skizze im Original ohne weiteres zu entnehmen sind. Anoden u. Kathoden bestehen aus Pb. Ein Glockensystem dient zur Ableitung des SnH_4 -haltigen H_2 . Die Gase werden durch alkal. Bleiacetatlg. geleitet, durch Ausfrieren getrocknet u. durch fl. Luft kondensiert, wobei auf peinlichen Ausschluß von Luft geachtet werden muß. Innerhalb einer Stde. werden mit dem App. bei 15 Amp. Stromstärke 50 l H_2 , die 12 cem kondensierbare Gase enthalten, gewonnen. Nach dem Waschen u. Kondensieren konnte der Prozentgehalt an SnH_4 auf 88—92% gesteigert werden. In 8 Stdn. werden etwa 13 cem 90%ig. Gas erhalten. Die vollständige Reinigung des SnH_4 geschah durch sorgfältige fraktionierte Dest. u. Kondensation. Die Reinheit ist dann gewährleistet, wenn nach Zers. des Gases reiner H_2 u. keine durch fl. Luft kondensierbare Gase entstehen.

Die stöchiometr. Zus. wurde auf Grund zahlreicher Analysen zu SnH_4 bewiesen. Höhere Hydride, die wegen ihrer schwereren Flüchtigkeit in den untersuchten Fraktionen nicht vorhanden sein konnten, dürften möglicherweise nebenher entstanden sein. In einer Tabelle sind die Sättigungsdrucke des SnH_4 bei Temp. von -148 bis -49° angegeben. Der Kp. wurde zu -52° ermittelt (221° absol.). Der F. liegt bei -150° (123° absol.). Beimengungen von 2% (98%ig. Fraktion) verursachen bereits eine Erniedrigung des F. um 10° . Die Färbung, die SnH_4 der Wasserstoffflamme erteilt, ist charakterist. Bei einer Konz. von 0,002% erscheint ein rötlicher Kegel in der Mitte, der bei höherer Konz. leuchtend gelb wird, während der obere Flammenteil blau gefärbt wird. Sehr hohe Konz. lassen die Flamme himmelblau erscheinen, mit einem rotumsäumten Kegel in der Mitte. Die Zinnspiegel sind bei gewöhnlicher Zers. hellgrau, bei langsamer, gleichmäßiger Zers. u. tiefer Temp. metall.-silberglänzend. In der Marshschen Röhre scheidet sich Sn meist vor oder in der Flamme ab als schwarzgrauer nichtflüchtiger Spiegel. Die Spiegel hinter der Flamme stammen von einer Schwefelverb. — SnH_4 ist sehr beständig u. zers. sich in reinen Glasgefäßen erst nach einigen Tagen, beim Erhitzen auf 145 — 150° jedoch sofort. Rauhe Oberflächen bewirken

katalyt. eine rasch verlaufende u. vollständige Zers. Gegen chem. Agenzien ist SnH_4 sehr beständig, wie z. B. gegen mäßig starke (15%ig.) Laugen, verd. H_2SO_4 , verd. u. konz. HNO_3 , sowie die meisten Metallsalze wie Na_2CO_3 , CuSO_4 , Pb-Acetate , FeCl_3 . Dagegen wird SnH_4 fast vollständig absorbiert von sehr starken Laugen, konz. H_2SO_4 , von Lsgg. des AgNO_3 u. HgCl_2 . Feste Alkalien halten SnH_4 gänzlich zurück analog dem SbH_3 . Die geolog. Frage, ob SnH_4 als flüchtigste Sn-Verb. zur Erklärung der pneumatolyt. B. von Zinnsteingängen herangezogen werden kann, wird von den Vf. vorläufig verneint. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 57. 1891—1903. 1924. Berlin, Univ.)

HORST.

F. de Carli, *Über die Reduzierbarkeit einiger Metallhalogenide mittels Wasserstoff*. Untersucht wurden SnCl_4 , SnBr_4 , SnJ_4 , SnCl_2 , CuCl_2 , CuBr_2 , Cu_2Cl_2 , Cu_2Br_2 , Cu_2J_2 , PbCl_2 , PbBr_2 , PbJ_2 , CoCl_2 u. CoBr_2 . Die Verss. wurden in einem Porzellanrohr ausgeführt, das in einem elektr. Ofen geheizt wurde. Der entstehende Halogenwasserstoff wurde in 1%ig. NaOH-Lsg. aufgefangen u. nach Neutralisierung mit $\frac{1}{10}$ -n. $\text{AgNO}_3\text{-Lsg.}$ titriert. Aus der so gefundenen Menge Halogenwasserstoff wurde die prozentuale Zers. des Ausgangsmaterials berechnet. — Auf diese Weise ließen sich die Red. der Bromide u. Chloride auch bei höheren Temp. bestimmen, während bei den Jodiden die Resultate zu niedrig ausfallen, da der entstehende HJ sich bei höheren Temp. zersetzt. Vf. kommt auf Grund seiner Verss. zu folgendem Ergebnis: Von den drei Halogenen ist das Jod am wenigsten, das Chlor am stärksten gebunden; demgemäß werden Chloride am wenigsten, Jodide am stärksten reduziert. Die Reduzierbarkeit der Bromide liegt zwischen der der beiden anderen Halogene. Außerdem beobachtet Vf., daß die Tendenz Halogen abzutrennen, bei Elementen mit verschiedener Valenz wächst mit dem Wachsen der Valenz. (Atti R. Accad. dei Lincei, Roma [5] 33. II. 94—97. 1924.)

GOTTFRIED.

Lothar Wöhler, Ph. Balz und L. Metz, *Die Oxyde des Rutheniums*. (Vgl. KRAUSS u. KÜCKENTHAL, Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 136. 62; C. 1924. II. 1073.) Vf. wollen zur Aufklärung der zahlreichen in der Literatur beschriebenen u. zum Teil als solche nicht beständigen Oxydationsstufen des Ru beitragen. Daß trotz vieler sich widersprechender Veröffentlichungen immer wieder gewisse zweifelhafte Oxyde bestätigt werden, wird auf die irrige Analysenmethode der indirekten Sauerstoffbest. durch Differenz u. auf die Art ihrer Berechnung zurückgeführt. Edeloxyde, die als hydratisierte Gele meist Verunreinigungen adsorbiert enthalten, kleine Wasserreste beim Erhitzen festhalten u. zum Teil beim Glühen O_2 verlieren, aber auch aufnehmen können, dürfen nicht so bestimmt werden, daß der Wassergehalt der Oxyde u. das reduzierte Metall direkt ermittelt werden. Man darf den Sauerstoff nur auf reines wasserfreies Oxyd beziehen, das W. jedoch zur Beurteilung des Hydratationsgrades auf die angewandte Substanz. In Berichtigung der bisherigen Angaben über die B. von sogenanntem „Pentoxyd“, $\text{Ru}_2\text{O}_5 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$, haben Vf. festgestellt, daß die freiwillige Zers. von *Ruthenium-8-oxyd* in wss. Lsg. besonders im Hg-Licht nur zu *4-Oxydhydrat* führt. Ebenso führt die Red. von gel. *Ruthenium-8-oxyd* u. Kaliumruthenat durch A. zu *4-Oxydhydrat*, das durch eine explosible organ. Ru-Verb. verunreinigt ist. Zu dieser Oxydationsstufe führt auch die Autoxydation niederer Oxydhydrate. Kaliumruthenat wird durch HNO_3 u. auch CO_2 zu *4-Oxydhydrat* zers. Durch 6%ig. H_2O_2 erhält man aus RuO_4 u. aus dem *3-Oxydhydrat* das *4-Oxydhydrat*, das durch Glühen in RuO_2 übergeführt wird. Zur Darst. von wasserfreiem RuO_2 erhitzt man wasserfreies RuCl_3 im Sauerstoffstrom auf 600—700°. Aus komplexem RuCl_3 u. Alkali in wss. Lsg. entsteht das *3-Oxydhydrat*, wenn man die Oxydation vermeidet. Beim Glühen zerfällt es in RuO_2 u. Metall. Wasserfreies Ru_2O_3 ist daher nicht beständig. Das *2-Oxydhydrat* ist trotz peinlicher Fernhaltung der Luft noch nicht rein aus dem *3-Chlorid* durch Red.

gewonnen worden; doch deuten die Ergebnisse der Unterss. in Übereinstimmung mit den früheren Angaben von REMY (vgl. Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. **126**. 185; C. **1923**. I. 1265) auf die Existenz dieses Hydrats. Wasserfreies RuO ist nicht beständig, da wasserfreies RuO₂ durch H ohne Zwischenstufe direkt zum Metall reduziert wird. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. **139**. 205—19. 1924. Darmstadt, Techn. Hochsch.) HORST.

Norman Frederick Budgen, *Das ternäre System Aluminium-Cadmium-Zink*. Vf. bestimmt die Liquidusfläche des ternären Systems, das Gebiet des fl. Feldes, welches 2 nicht mischbare Phasen enthält, die krit. Tempp. u. krit. Konz. desselben, die Bedingungen, unter welchen sich die Komponenten der ternären Legierungen unterhalb der Liquidusfläche abscheiden bis zu Tempp., wo keinerlei meßbare Umwandlungen mehr stattfinden, sowie den Einfluß den eines der Metalle auf die Mischbarkeit der beiden anderen ausübt, u. die Mikrostruktur der Legierungen. Die Ergebnisse sind ausführlich in Zustandsdiagrammen (Figur im Original) u. Kurven sowie in Mikrophographien wiedergegeben. (Journ. Chem. Soc. London **125**. 1642—60. 1924. Birmingham, Univ.) BECKER.

C. Mineralogische und geologische Chemie.

G. Canneri und V. Pestelli, *Die Synthese des Carnotits*. Zur Aufklärung der Struktur, der Entstehungsbedingungen u. der Krystallform stellen Vf. den Carnotit synthet. her. Zu diesem Zweck schmelzen sie in einem elektr. Ofen K-Metavanadat u. geben zu der Schmelze in kleinen Portionen Ammoniumpyrouranat. Das Uranat zersetzt sich langsam u. geht in Lsg. — K-Vanadat war immer im Überschuß vorhanden. Nach dem Erkalten wurde die Masse mit heißem W. behandelt, um das überschüssige Vanadat zu entfernen. Der Rückstand, cederngelbe glänzende Schüppchen, wurde zur Entfernung der letzten Spuren Vanadat mit verd. k. HNO₃ behandelt, abgesaugt, gewaschen u. getrocknet. Mkr. sind schöne, fluorescierende, quadrat. Tafeln mit Auslöschung des polarisierten Lichtes nach der Diagonale zu erkennen. Ebenso wurde das Na-Salz hergestellt. Die Analysen ergaben Werte, die auf die Formel K(UO₂)(VO₄) bzw. Na(UO₂)(VO₄) stimmen. — Die Trennung des V vom U geschah mittels Cupferron. Auf Grund der Analogie mit den Uranylphosphaten u. auf Grund der Tatsache, daß Carnotit mit konz. HNO₃ keine Farbänderung zeigt, was Vanadate sonst tun, nehmen Vf. an, daß im Carnotit das V als Zentralatom auftritt. Sie nehmen daher folgende Strukturformel für den Carnotit an $\left[\text{V}^{\text{UO}_3}_{\text{O}_3} \right] \text{H}$. Vf. geben also der zugrunde liegenden Säure den Charakter einer Heteropolysäure, analog den Heteropolysäuren ROSENHAINS, die den Phosphor-Uran-Verbb. zu Grunde liegen u. in denen er den P als Zentralatom annimmt. (Gazz. chim. ital. **54**. 641—46. 1924. Florenz.) GOTTFRIED.

O. Mügge, *Chemische Zusammensetzung und Dichte der Columbite und Tantalite*. Es werden bei den Analysen der Columbite u. Tantalite sowohl der Gehalt an FeO + MnO, wie auch der an Nb₂O₅ + Ta₂O₅ auf 100 umgerechnet u. in einem Diagramm aufgezeichnet. Die übrigen Komponenten sind nicht berücksichtigt. Es verteilen sich dann die Analysenpunkte ziemlich gleichmäßig über das ganze Feld. Da die Entstehung der Mineralien überall eine ähnliche ist, kann auf eine unbeschränkte Mischbarkeit der vier möglichen Komponenten (FeNb₂O₆, MnNb₂O₆, FeTa₂O₆, MnTa₂O₆) geschlossen werden. In der D. läßt sich keine Einheitlichkeit feststellen, da selbst kleinere Stücke nach dem Zerschlagen in ihren einzelnen Teilen ganz verschiedene DD. besitzen. (Zentralblatt f. Min. u. Geol. **1924**. 417 bis 419. Göttingen.) ENSZLIN.

Mario Ferrari, *Noch einmal über den Datolith vom Monte Campotrera (Reggio*

Emilia). Vf. berichtet über neue Messungen an Datolith u. erweitert damit seine früheren (Atti R. Accad. dei Lincei, Roma [5] **33**. I. 439; C. **1924**. II. 1678) Untersuchungsergebnisse. (Atti R. Accad. dei Lincei, Roma [5] **33**. II. 120—23. 1924.)

GOTTFRIED.

L. Tokody, *Neue Beiträge zur Kenntnis des Eisenglanzes von Dognácska*. Es wird der Bau der Krystalle, sowie die an denselben auftretenden Krystallflächen beschrieben. (Zentralblatt f. Min. u. Geol. **1924**. 321—31. Budapest.) ENSZLIN.

F. Heritsch und **F. Lieb**, *Ein mineralreicher Marmor im Stubaiengebiet*. Es sind mehrere Analysen angegeben, aus denen auf die Mineralzus. der Marmore geschlossen wird. (Zentralblatt f. Min. u. Geol. **1924**. 334—39.) ENSZLIN

F. Henrich, **H. Laubmann** und **Prell**, *Über eine indiumhaltige Zinkblende aus dem Oberpfälzer Walde (Bayern)*. Vff. berichten über die Analyse einer pneumatolytisch-pegmatitischen Zinkblende mit schätzungsweise weniger als 1% In. (Ztschr. f. angew. Ch. **37**. 877—78. 1924.)

JUNG.

P. Sève, *Beitrag zur Kenntnis der optischen Eigenschaften des Kieselzinkerzes*. Das Kieselzinkerz (*Calamin*) ist für die Wellenlänge $3270 \pm 10 \text{ \AA}$ einachsigt. Die Doppelbrechung des längs der ersten Mittellinie fortpflanzenden Lichtes besitzt ein Maximum bei $5200 \pm 50 \text{ \AA}$. Es wird der Zusammenhang zwischen diesen Erscheinungen dargelegt u. auf die Anwendungsmöglichkeiten des Calamins in der prakt. Optik hingewiesen. (Journ. de Physique et le Radium [6] **5**. 249—56. 1924. Marseille, Fac. d. sciences.)

BIKERMAN.

C. W. Carstens, *Über thermische Metamorphose im Topfstein*. Elektr. Kochplatten aus Topfstein zeigen an den therm. stark beanspruchten Stellen Risse u. Sprünge. Es hat sich der im ursprünglichen Material vorhandene Dolomit weitgehend im Calcit u. MgO vermischt mit Fe_2O_3 umgewandelt. Im Ausgangsmaterial treten als Mineralien Talk, Chlorit, Dolomit u. in geringem Maße Biotit auf, während die umgewandelte Schicht zur Hälfte aus Biotit, entstanden aus Chlorit, dann aus unverändertem Talk u. zerstörtem Dolomit zusammengesetzt ist. (Zentralblatt f. Min. u. Geol. **1924**. 331—34. Trondhjem.)

ENSZLIN.

A. Geller, *Salztektonik und Salzmetamorphose*. Es wurde die Veränderung der Fließkurven von Steinsalz, Sylvin, Karnallit u. Bischofit bei verschiedenen Drucken u. Temp. bestimmt. Das Fließen beruht nicht auf einem teilweisen Schmelzen, weil sich sonst die Doppelsalze wenigstens teilweise zersetzen müßten, was nie eingetreten ist, sondern auf einem Gleiten nach bevorzugten Flächen. Die Fließdruckkurve des blauen Steinsalzes liegt bei geringeren Drucken als die des klaren. Beim Fließen entfärbt sich dasselbe allmählich u. besitzt nachher den Fließdruck des klaren. Es wird die Abhängigkeit des F. vom Druck für Glaubersalz, Kainit, Bischofit u. Carnallit graph. aufgezeichnet. Im Anschluß daran finden sich Überlegungen über die Umwandlung der Salzlagerstätten. (Kali **18**. 297—301. 1924. Braunschweig.)

ENSZLIN.

Maria Trost, *Die Eruptivgesteine der Insel Patmos*. Es handelt sich um wahrscheinlich tertiäre Eruptivgesteine, bei denen Liparite, Trachyte, deren Tuffe u. Breccien vorherrschen. Es treten jedoch auch Anamesite, Andesite u. Phonolithen auf. (Zentralblatt f. Min. u. Geol. **1924**. 622—29. Münster, Univ.)

ENSZLIN.

E. Deger und **W. Meigen**, *Chemische Untersuchungen phonolithischer und tinguaitischer Gesteine aus dem Kaiserstuhl*. (Zentralblatt f. Min. u. Geol. **1924**. 609 bis 614.)

ENSZLIN.

Wilhelm Anderson, *Über die Existenzmöglichkeit von kosmischem Staube in der Sonnenkorona*. Vf. zeigt, daß in größerer Nähe als ein Sonnenradius von der Photosphäre keine Partikelchen aus festen Stoffen (Kohlenstoff, feuerfeste Oxyde) bestehen können, da sie zu rasch verdampfen würden, u. die verdampften Partikelchen nicht schnell genug durch neue ersetzt werden können. Dies bezieht sich jedoch

nur auf Teilchen von der Größenordnung von $1\ \mu$. Dagegen könnten größere Meteorsteine in der Korona eine Zeitlang um die Sonne rotieren, bis sie verdampft wären, vorausgesetzt, daß sie immer nur nachgeliefert würden. Doch müßte in diesem Fall die Dampfentwicklung in der Korona spektroskop. nachweisbar sein. Daher zieht der Vf. den Schluß, daß das kontinuierliche Spektrum der inneren Korona keinen festen u. fl. Körpern zugeschrieben werden kann. (Ztschr. f. Physik 28. 299—324. 1924. Dorpat.) BECKER.

D: Organische Chemie.

Wallace H. Carothers, *Die Doppelbindung*. Vf. geht aus von der Lewisschen Theorie über die Struktur des Atoms. Er nimmt an, daß in Verb., die eine Doppelbindung enthalten, dynam. Gleichgewicht zwischen einer inaktiven u. einer aktiven Form vorliegt. Bei der ersteren besteht die Doppelbindung aus 2 typ. nichtpolaren Bindungen, während bei letzterer Dissoziation der einen Bindung eingetreten ist, so daß eines der beiden Atome nur 6 Elektronen in der Außenschale aufweist. Die aktive Form ist immer nur in kleiner mit den äußeren Bedingungen wechselnder Menge vorhanden. Bei der Dissoziation behält das Atom mit der größten wirksamen Kernladung das überschießende Elektron. Diese Vorstellungen werden mit einigen anderen Annahmen (es sind 6 Postulate aufgeführt) der Oktetttheorie zur Erklärung der Eigenschaften der Doppelbindung verwendet. Im einzelnen geht Vf. ein auf einfache, selektive u. 1,4-Addition, Veresterung, beleuchtet krit. die Polarität der Doppelbindungen, der er nur sekundäre Wichtigkeit beilegt, u. behandelt MARKOWNIKOFFs Regel wie auch die *Theorien der Red., katalyt. Hydrierung* u. Befördererwrkgg. bei Katalysatoren. (Journ. Americ. Chem. Soc. 46. 2226—36. 1924. Urbana, Univ. of Illinois.) BEHRLE.

Joel H. Hildebrand, H. B. Merrill und Joseph Simons, *Versuche zur Darstellung eines Fluorcarbonats und ihre Beziehungen zur Koordinationszahl von Kohlenstoff*. Vf. versuchen Cäsiumfluorcarbonat darzustellen durch Einw. von CF_4 auf CsF bei -80° , doch blieb der Vers. erfolglos. Vf. waren von den theoret. Vorstellungen geleitet, daß auch C eine höhere Koordinationszahl als 4 haben könnte u. mit Fluor eine der H_2SiF_6 entsprechende Verb. bilden würde, deren Cs-Salz am beständigsten sein müßte, weil ein Komplexsalz um so beständiger ist, je elektropositiver das Metall ist. Die Unterss. ergaben nicht nur, daß zwischen HF u. CF_4 keine Rk. stattfindet, sondern auch, daß ihre gegenseitige Löslichkeit klein ist. (Journ. Americ. Chem. Soc. 46. 2225—26. 1924. Berkeley [Cal.], Univ.) JOSEPHY.

Ossian Aschan, *Über zwei Homologe des Diprens*. Vf. vermutete, daß Dipren (vgl. LIEBIGs Ann. 439. 221; C. 1924. II. 2251) bei der techn. Darst. des Isoprenkautschuks entstehen könnte. In der Tat erwies sich ein in den Farbenfabriken vorm. FRIEDR. BAYER & Co. vor Jahren hierbei gewonnenes Prod. mit jenem ident., nur die D. war etwas niedriger als früher gefunden (an Luft leicht veränderlich). Zwei weitere dimere Präparate, in der genannten Fabrik bei Kondensation von Butadien bzw. β,γ -Dimethylbutadien erhalten, danach vom Vf. als Dibutadien u. Dimethyldipren bezeichnet, erwiesen sich nach Analyse u. Mol.-Refr. als niedrigeres bzw. höheres Homolog des Diprens. Sie haben ähnlichen Geruch wie dieses, bei Dibutadien schärfer, bei Dimethyldipren weniger ausgesprochen. Wahrscheinlich sind sie monocycl. mit 2 Doppelbindungen.





Versuche (mit Ilmari F. M. Krohn). Die KW-stoffe wurden, da sie teilweise verharzt waren, mit Dampf unter Zusatz von wenig mit etwas Na_2CO_3 alkaliisiertem W. übergetrieben, die abgehobenen Schichten mit CaCl_2 getrocknet, dann über Na zur Hälfte unter gewöhnlichem, zum Rest unter vermindertem Druck dest. — Dibutadien, C_8H_{12} , Kp.₇₄₅ $126-127^\circ$, Kp.₇₄ $60-60,5^\circ$, D.₂₀ $0,8318$ bzw. $0,8319$,

$n_D^{20,4} = 1,46228$ bzw. $n_D^{20} = 1,46238$. — *Dipren*, $C_{10}H_{16}$, Kp_{752} Hauptfraktion 171,5–173°, $D_4^{20} 0,8481$, $n_D^{23,4} = 1,49660$, Kp_{16} Hauptfraktion 68,5–69°, $D_4^{20} 0,8476$, $n_D^{23,2} = 1,46946$. — *Dimethyldipren*, $C_{12}H_{20}$, Kp_{758} Hauptfraktion 200,5–201,3°, $D_4^{20} 0,8535$, $n_D^{20} = 1,47915$, Kp_{12} Hauptfraktion 87,8–88,3°, $n_D^{20} = 1,47915$. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 57. 1959–62. 1924. Helsingfors, Univ.) SPIEGEL.

A. B. Brown und E. Emmet Reid, *Die katalytische Alkylierung des Ammoniaaks*. (Vgl. Journ. Americ. Chem. Soc. 46. 1836; C. 1924. II. 1681.) Vff. untersuchen quantitativ die Alkylierung des NH_3 durch *Methyl-, Äthyl-, n-Propyl- u. n-Butylalkohol* in Ggw. verschiedener Katalysatoren bei Temp. bis zu 500°. *Blaues Wolframoxyd* gab geringe Ausbeuten an *Aminen*, *Thoriumoxyd* gab mit *n-Butylalkohol* gute Ausbeuten, aber auch viel Aldehyd, zum größten Teil in Form der Nitrile. Die wirksame Temp. war bei einem frischen Katalysator 380–390°, nach längerem Gebrauch 420°. Insgesamt wurden 48,3% alkyliert, *prim. : sek. : tert. Butylamin* = 15 : 7 : 7. Die hierbei gleichzeitig stattfindende Entw. von H_2 , C_4H_8 u. Nitrilen stieg mit der Temp. Von anderen Katalysatoren wurden noch *Al-* u. *Zr-Oxyd* u. eine Reihe von *Silicagel*präparaten untersucht, von welch letzteren sich ein besonders hergestelltes als der wirksamste u. ausdauerndste Katalysator erwies. Na_2SiO_3 -Lsg., 4,5% Na_2O , wird mit dem gleichen Vol. reiner 10%ig. HCl versetzt, 6–9 Stdn. Absetzungsdauer, mehrere Tage in fließendem W. ausgewaschen u. durch langsames Erhitzen auf 180° getrocknet. Die wirksame Temp., der Prozentsatz der in *Amine* übergeführten *Alkohole* u. das Verhältnis der *prim. : sek. : tert. Amine* war bei: *Methylalkohol* 480°, 56%, 5 : 12 : 3; A. 465°, 39,5%, 2 : 5 : 3, *n-Propylalkohol* 415°, 49%, 10 : 11 : 8, *n-Butylalkohol* 430°, 25%, 11 : 11 : 3. (Journ. Physical Chem. 28. 1067–76. 1924.) ZANDER.

A. B. Brown und E. Emmet Reid, *Die katalytische Dehydratation von Alkoholen*. (Vgl. vorst. Ref.) Vff. untersuchen die Einw. verschiedener dehydratisierend wirkender Katalysatoren, ThO_2 , Al_2O_3 , W_2O_5 u. *Silicagel* auf *Äthyl- u. Butylalkohol*. In allen Fällen wurde CO_2 gefunden, besonders bei ThO_2 bei hohen Temp. (10% des Rk.-Prod.). Aus A. wurde daneben CH_4 u. C_2H_6 , aus *Butylalkohol* C_3H_8 u. C_4H_{10} gebildet, CH_4 u. C_3H_8 durch Zers. der Aldehyde (CO-Abspaltung), C_2H_6 u. C_4H_{10} durch Red. von C_2H_4 u. C_4H_8 durch den anwesenden H. Als die besten Katalysatoren für die Herst. von C_2H_4 u. C_4H_8 wurden W_2O_5 u. Al_2O_3 befunden bezgl. Ausbeute u. Reinheit der Prodd. *Butylalkohol* wird schon bei niedrigeren Temp. zers. als A. 60% A. wurden zers. durch: W_2O_5 bei 313°, Al_2O_3 bei 312°, ThO_2 bei 405°, *Silicagel* bei 438°; 60% *Butylalkohol* wurden zers. durch: W_2O_5 bei 235°, Al_2O_3 bei 208°, ThO_2 bei 351°, *Silicagel* 360–441° (je nach Herst.). (Journ. Physical Chem. 28. 1077–81. 1924. Baltimore, Md.) ZANDER.

Herbert Lambourne, *Derivate der Methylstannonsäure*. Teil II. (I vgl. Journ. Chem. Soc. London 121. 2533; C. 1923. I. 501.) Durch Einw. von $CHCl_2 \cdot COOH$, C_2H_5COOH , C_4H_9COOH (*n-* u. *i-*) auf *Methylstannonsäure* wurden *Pentaacylderivv.* (I) erhalten. Bei der partiellen Hydrolyse zerfielen Ib, c u. d nicht zu Tri-, sondern zu *Hexaacylderivv.*, ihre B. ist wahrscheinlich nach II erfolgt. Diese *Hexaacylverb.* entstehen auch, wenn *Methylstannonsäure* oder I in der betreffenden organ. Säure mit A. behandelt werden. Diese Rk. ist so zu erklären, daß die wahrscheinlich cycl. gebaute *Methylstannonsäure*, $(Sn \cdot CH_3O \cdot OH)_3$, in der Lsg. der organ. Säure in das nicht isolierbare *Orthoderiv.*, $CH_3 \cdot Sn(O \cdot COR)_3$, übergeht. Bei einem Über-



schuß der organ. Säure entsteht durch Kondensation von 3 Mol. der Orthoverb. I; bei Überschuß von A. findet jedoch Hydrolyse u. Kondensation von 6 Mol. der Orthoverb. statt (III), es entsteht die beständige Hexaacylverb.


Versuche. Die Pentaacylderivv. wurden hergestellt durch portionsweise Zugabe von Methylstannonsäure zu den sd. Säuren. *Pentadichloracetylmethylstannonsäure*, $C_{13}H_{14}O_{12}Cl_{10}Sn_3$ (Ia), aus Bzl. rhomb. Tafeln, F. 235–240°, l. in h. A. — *Pentapropionylverb.*, $C_{15}H_{34}O_{12}Sn_3$ (Ib), hexagonale Tafeln, F. 156–157°, bei 160° wieder fest werdend, danach F. 240°; l. in k. Bzl. u. h. A. — *Pentabutyrylverb.*, $C_{23}H_{44}O_{12}Sn_3$ (Ic), F. 105°, ll. in Bzl., Ä., Chlf. u. h. A. — *Pentaisobutyrylverb.*, $C_{23}H_{44}O_{12}Sn_3$ (Id), Prismen, F. 194°, l. wie vorige. Die Hydrolyse dieser Verbh. erfolgte größtenteils durch A., da mit W. leicht Methylstannonsäure entstand. *Hexapropionylverb.*, $C_{24}H_{48}O_{12}Sn_6$, aus Ib in Propionsäure + überschüssigem A. durch Kochen; rhomb. Krystalle, teilweise unter Zers. bei 246° schm., ll. in Bzl., wl. in sd. Aceton u. A. Durch längeres Kochen mit A. in Methylstannonsäure zerfallend. — *Hexabutyrylverb.*, $C_{30}H_{60}O_{18}Sn_6$, Rhomben, F. 180°, ll. in Bzl. — *Hexaisobutyrylverb.*, $C_{30}H_{60}O_{18}Sn_6$, aus Id mittels sd. A., kub. Tafeln, F. ca. 260°, l. in Bzl., Ä., Chlf., wl. in h. A. (Journ. Chem. Soc. London 125. 2013–15. 1924. Nottingham, Univ. Coll.)

HABERLAND.

Christopher Kelk Ingold, James Herbert Oliver und Jocelyn Field Thorpe, *Die Chemie der Glutaconsäuren*. XVII. *Die Tendenz zur Rückbildung des Typs*. (XVI. vgl. GOSS, INGOLD u. THORPE, Journ. Chem. Soc. London 125. 1927; C. 1924. II. 2458.) Stabile Glutaconsäurederivv. zeigen die Tendenz, sich leicht in die bewegliche freie Säure zurückzuverwandeln. So gibt das *Dibromadditionsprod.* (I) bei Behandlung mit Alkalien, wie FARMER u. INGOLD (Journ. Chem. Soc. London 119. 2001; C. 1922. III. 765) gezeigt haben, *Glutaconsäure* (IV); die Hydrolyse wird, obwohl kein Reduktionsmittel vorhanden ist, von einer Red. begleitet. Die Rk. erfolgt wahrscheinlich über III nach a; jedoch ist bei Anwesenheit von Alkali auch die B. von HOBr u. der Verlauf der Rk. über II nach b denkbar. IV kann sowohl als α,β -, wie auch als β,γ -ungesätt. Säure angesehen werden. Um zu untersuchen, ob die Rk. für IV charakterist. ist, oder ob α,β - oder β,γ -ungesätt. Säuren ähnliches Verh. zeigen, wurden die Dibromide von Crotonsäure, Vinylessigsäure, Cyclohexyldienessigsäure u. Cyclohexennessigsäure mit Alkalien behandelt, eine Regenerierung dieser Säuren trat jedoch nicht ein. Die Fähigkeit von Glutaconsäurederivv., aus den Dibromiden die Säuren zurückzubilden, hängt anscheinend von der Zahl der Substituenten ab. Aus den Dibromiden werden regeneriert: IV, α - u. β -Methylglutaconsäure u. Aconitsäureäthylester; nicht regeneriert aus ihren Dibromiden werden α,β - u. α,γ -Dimethylglutaconsäure. Die Angabe von RUHEMANN u. ALLHUSEN (Journ. Chem. Soc. London 65. 10 [1894]), daß das *Dibromid des Aconitsäureesters* bei der Hydrolyse mit $Ba(OH)_2$ ein Gemisch von Oxal- u. Bernsteinsäure gibt, konnten Vff. nicht bestätigen, sie erhielten bei der Rk. fast quantitativ *Aconitsäure*. — Zur Prüfung der Frage, ob der Ersatz des Halogens durch H bedingt wird durch die Anwesenheit des Hypobromits, wurde *Bromaconitsäureester* (V) statt mit wss. Alkali, mit alkoh. C_2H_5ONa behandelt. Würde NaOBr für den Verlauf der Rk. wesentlich sein, so müßte in diesem Falle die Rk. nach c verlaufen, anderenfalls nach d. Die Verss. sprechen für den letzteren Verlauf; es wurde *Aconitsäureester* isoliert, C_2H_5OBr konnte jedoch nicht nachgewiesen werden. Wird V in Ggw. von Malonester zers., so wurde neben Aconitsäureäthylester *Äthantetracarbonsäureester* isoliert, ein Zeichen dafür, daß der Red. von V eine Oxydation entspricht.

Versuche. Äthylester der α,β -Dibromtricarballysäure wurde erhalten durch Stehenlassen von Aconitsäureester in Br-Dämpfen. — *Lactonester der Bromoxytricarballysäure*, $C_{10}H_{13}O_6Br$ (VI bezw. VII), aus vorigem durch Dest. im Vakuum,

Kp.₁₀ 205°. — *Aconitsäure* aus dem Dibromester mittels h. Ba(OH)₂, Na₂CO₃ oder methylalkoh. KOH, F. 183°. — *Äthylester der α-Bromaconitsäure*, C₁₂H₁₇O₆Br (V), aus dem Dibromester + alkoh. C₂H₅ONa, Kp.₂₀ 194°, geht durch Einw. von Alkalien in Aconitsäure über. — *α,β-Dibrom-α(γ)-methylglutarsäure*, C₈H₈O₄Br₂, aus Chlf.-Bzl. Prismen, F. 178° (Zers.); hieraus mittels sd. Alkali *α-Methylglutaconsäure* aus Ä., F. 145°. — *α,β-Dibrom-β-methylglutarsäure*, C₈H₈O₄Br₂, aus Chlf.-PAe., F. 142°; hieraus labile Form der *β-Methylglutaconsäure* aus Essigester-PAe., F. 115°.




α-Brom-α,β(β,γ)-dimethylglutaconsäure, C₇H₈O₄Br, aus Bzl.-Chlf. Prismen, F. 115° (Zers.). — *α,β-Dibrom-α,γ-dimethylglutarsäure*, C₇H₁₀O₄Br₂, aus Bzl., F. 134°; Einw. von Alkali auf diese beiden letzten Br-Säuren führt zu Hydroxylverb. — *β,γ-Dioxybuttersäure* wurde bei Einw. von Ba(OH)₂ auf *β,γ-Dibrombuttersäureester* (dargestellt aus Allylcyanid nach LESPIEAU, C. r. d. l'Acad. des sciences **133**. 63 [1905]) erhalten; Ba-Salz, C₈H₁₄O₈Ba. — Durch Addition von Br an Crotonsäureester wurde Dibrombuttersäureester dargestellt, der beim Verseifen mit Alkalien *Bromcrotonsäure*, F. 106°, liefert. — Die Dibromide der *Δ¹-Cyclohexenessigsäure*, F. 121°, u. *Cyclohexylidenessigsäure*, F. 141°, gaben mit verd. Alkalien noch nicht identifizierte Zersetzungsprod. — Werden 2 g Na in 25 ccm absol. A. mit 40 g A. + 29,5 g Bromaconitsäureäthylester + 14 g Malonsäureäthylester 1/2 Stde. auf dem Wasserbad erhitzt, dann in W. gegossen u. mit Ä. extrahiert, so erhält man bei Kp.₂₀ 140 bis 200° ein Gemisch von Aconitsäureäthylester u. Äthantetracarbonsäureäthylester, trennbar durch fraktionierte Dest. u. Ausfrieren; ersterer hat Kp.₂₀ 178—185°. (Journ. Chem. Soc. London **125**. 2128—36. 1924. South Kensington, Imp. Coll. of Sc. and Techn.)

HABERLAND.

E. Darmais, *Untersuchungsmethoden der optisch-aktiven Körper. Anwendung auf Komplexe der Äpfelsäure, des Kupfers und der Basen.* (Vgl. C. r. d. l'Acad. des sciences **178**. 1981; C. **1924**. II. 1680.) Es wurde das Drehungsvermögen der Lsgg. bestimmt, die in 25 ccm wechselnde Mengen NaOH u. 0,002 Mol. sauren Kupfermalats bzw. 0,002 Mol. neutralen Kupfermalats bzw. 0,0025 Mol. Äpfelsäure + 0,0035 Mol. Cu(OH)₂ enthielten. Im ersten Gemisch nimmt die Drehung mit der NaOH-Konz. für das Indigolicht zu, für das grüne Licht zuerst zu (bis ca. 0,0023 Mol. NaOH) dann ab; nach dem Zusatz von 0,006 Mol. NaOH schlägt die Linksdrehung für das grüne Licht in eine Rechtsdrehung um, auch die Drehung des Indigolichtes erleidet einen Sprung; gleichzeitig findet eine Cu-Fällung statt. Im zweiten Gemisch wird schon durch 0,002 Mol. NaOH ein Nd. erzeugt; er entspricht einer Verb. (I) Cu₄H₄O₅ + NaOH, deren Konst. nicht bekannt ist, die aber die Niederschlagsbildung im ersten Gemisch u. die große Rotationsdispersion desselben in der Nähe der Fällungskonz. von NaOH erklären dürfte. Das Drehungsvermögen u. die Dispersion des dritten Gemisches ändert sich nur wenig mit der NaOH-Konz.; ein Nd. erscheint bei ca. 0,56 Mol. NaOH. — KOH verhält sich dem NaOH analog. — Die Drehung der Lsgg., die in 20 ccm 0,002 Mol. Cu₄H₄O₅ u. x millimols NH₃

enthalten, nimmt von $x = 0$ bis $x = 1,25$ zu ($\alpha_{436} = -2,58$, auf 10 cm bezogen), was die B. des bas. Cu-Malats offenbart. Bei höherem x entsteht der (I) entsprechende $\text{CuC}_4\text{H}_4\text{O}_5 + \text{NH}_3$, die Drehung nimmt ab. Oberhalb $x = 4$ fällt α noch steiler; man muß die B. einer Verb. $\text{CuC}_4\text{H}_4\text{O}_5 + 2\text{NH}_3$ vermuten. Bei $x = \text{ca. } 5,5$ wird die Drehung positiv u. erhält bei $x = 9$ einen konstanten Wert von $+1,70^\circ$. — Die B. der Alkalikupfermalate erklärt auch das Verh. der Lsg. der Äpfelsäure u. des CuSO_4 nach einem Alkalizusatz. Die Endlsgg. waren an Äpfelsäure 0,2-mol., an CuSO_4 0,1- bzw. 0,2- bzw. 0,3- bzw. 0,4-molar, an NaOH x -molar. Das erste Gemisch wird bei $x = 0,6$ gefällt, die Drehung vor der Fällung ist gering, die Dispersion ist groß, die Ggw. der Verb. I unerkennbar. Das zweite Gemisch wird bei $x > 0,6$ gefällt, die α ist von $x = 0,45$ an konstant u. gleich $-5,0^\circ$. Im dritten Gemisch ist die Entstehung des bas. Cu-Malats bemerkbar; Fällung bei $x > 0,6$. Aus dem vierten Gemisch scheidet sich die Verb. $2\text{C}_4\text{H}_6\text{O}_5 \cdot 3\text{CuO} \cdot \text{CuSO}_4 \cdot 14\text{H}_2\text{O}$ aus, die ihr Krystallwasser bei 100° verliert. (Journ. de Physique et le Radium [6] 5. 225—37. 1924. Nancy, Fac. de sciences.) BIKERMAN.

Ian William Wark, *Metallische Oxysäurekomplexe*. Teil III. *Die Konstitution von Cuprimalaten und analogen Verbindungen*. (II. vgl. Journ. Chem. Soc. London 123. 1926; C. 1924. I. 162.) Mol.-Gew.-Bestst. von NH_4^- u. Na-Cuprimalat deuten auf Assoziation der Verbb. Die Cupriäpfelsäure aus diesem Grunde für zweibas. zu halten, ist nicht angängig, denn das Mol.-Gew. nimmt bei Verd. zu schnell ab. Vf. hält die Säure für einbas. u. die beobachtete Assoziation für eine ähnliche Erscheinung, wie sie auch Essigsäure in Bzl.-Lsg. zeigt. Die Alkalisalze der Cupriäpfelsäure sind neutral, infolgedessen ist anzunehmen, daß das Alkalimetall in eine COOH-Gruppe eingetreten ist. GROSSMANN u. LOEB (Ztschr. Ver. Dtsch. Zuckerind. 1908. 994) haben ein Natriumcuprimalat dargestellt, das die Zus. $\text{NaCuC}_4\text{H}_5\text{O}_6$ hatte. Vollständig dehydratisiertes Na-Cuprimalat enthält jedoch $1\text{H}_2\text{O}$ weniger ($\text{NaCuC}_4\text{H}_5\text{O}_5$); Vf. erteilt daher dieser Verb. Konst. I oder II, die letztere hält er für wahrscheinlicher. Der Cupriäpfelsäure würde hiernach Formel IV zukommen, ihre B. aus äpfelsaurem Cu (III) beruht auf der Wanderung eines H-Atoms. Die in der II. Mitteilung beschriebenen Komplexverbb. der Äpfelsäure haben analoge Struktur. Die B. des Cu-haltigen Fünfringes in III würde gleichzeitig eine Erklärung geben für die Stabilität der Komplexe. Eine solche Ringbildung ist bei den früher beschriebenen Na-Salzen der Cu-Komplexe einbas. Oxysäuren nicht möglich, sie sind daher weniger beständig. — Verbb., in denen Alkali u. Cu ähnlich gebunden sind wie in II, sind folgende: das von LUFF (Ztschr. f. ges. Brauwesen 21. 319) beschriebene Kaliumcupricitrat, $(\text{C}_6\text{H}_4\text{O}_7)_2\text{K}_6\text{Cu} \cdot 6\text{H}_2\text{O}$, das beim Erhitzen $6\text{H}_2\text{O}$ abgibt u. alkal. reagiert. Vf. erteilt dieser Verb. Konst. V; das fettgedruckte K erteilt diesem Deriv. die alkal. Eigenschaften. Das von PICKERING (Journ. Chem. Soc. London 99. 1347 [1911]) dargestellte Kaliumcupriglykolat, $\text{C}_4\text{H}_6\text{O}_6\text{CuK}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$, das auch leicht $2\text{H}_2\text{O}$ abgibt, muß Konst. VI haben. Die von BULLNHEIMER u.



SEITZ (Ber. Dtsch. Chem. Ges. **33**. 817 [1900]) beschriebenen *Alkalikupferderiv.* der *Weinsäure* müssen der Struktur VII entsprechen. Eine den genannten Derivv. entsprechende Konst. findet man in der Schiffschen Formulierung des *Brechweinsteins* (VIII). Die *neutralen Cupritartrate*, für die PACKER u. WARK (Journ. Chem. Soc. London **119**. 1348; C. **1922**. I. 1103) die empir. Formel $(M' \cdot CuC_4H_3O_6)_n, CuO$ ($n = 2$ oder 3) aufgestellt haben, lassen sich analog nicht formulieren, da die Stellung der CuO -Gruppe noch nicht feststeht. Vf. ist geneigt, diesen Verbb. eine ähnliche Konst. zuzuteilen, wie den Derivv., die „kondensierte Anionen“ enthalten. (Journ. Chem. Soc. London **125**. 2004—9. 1924. London, Univ. Coll.) HABERLAND.

H. Krause, *Bemerkungen zu der Abhandlung von Bergmann, Jacobsohn und Schotte: Über Formaldehydverbindungen einfacher Aminosäurederivate*. Die vom Vf. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. **52**. 1211; C. **1919**. III. 320) für das Reaktionsprod. aus Formaldehyd u. $H_2NCH_2CO_2R$ aufgestellte Formel eines *Oxytrimethylenglycinesters* $CHOH(CH_2 \cdot NH \cdot CH_2 \cdot CO_2R)_2$ wird gegenüber der von BERGMANN (Ztschr. f. physiol. Ch. **131**. 18; C. **1924**. I. 669) angegebenen aufrecht erhalten. Ebenso seine Auffassung von der Konst. des Reaktionsprod. aus CH_2O u. Glykokoll-Ba als Ba-Salz des *N-Oxymethylglycins*. (Ztschr. f. physiol. Ch. **139**. 216—18. 1924. Dresden.) GU.

Marc Bridel, *Über die fermentative Hydrolyse des Gentianaualins. Darstellung einer Xyloglucose, der Primverose*. (Vgl. Journ. Pharm. et Chim. [7] **10**. 329; C. **1915**. I. 613.) *Gentianaualin* wird sowohl durch das von CHARAUX (Bull. Soc. Chim. Biol. **6**. 631; C. **1924**. II. 2665) aus den Samen von *Rhamnus utilis*, als auch durch ein aus *Monotropa hypopitys* gewonnenes Ferment gespalten in *Gentianaualin* u. eine *Xyloglucose*. Es werden hierzu 7 g *Gentianaualin* in 1000 ccm W. mit 2 g des Ferments versetzt. Nach Entfernung des *Gentianaualins* wird der neue Zucker aus A. als längliche Blättchen erhalten; er schmeckt schwach süß, F. 210° (Block MAQUENNE); die reduzierende Wrkg. von 1 g en spricht der von 0,631 g Glucose; der Zucker zeigt Mutarotation; Anfangswert $[\alpha]_D = +24,14^\circ$, Endwert $[\alpha]_D = -3,30^\circ$ ($p = 0,2520$, $v = 10$, $l = 2$); mit Orcin-HCl tritt in der Wärme Violett-blaufärbung ein; durch w. verd. H_2SO_4 wird die Verb. in äquimolekulare Mengen *Glucose* u. *Xylose* gespalten. Obgleich das Verb. der neuen Verb. bei der Red. etwas abweicht von dem von GORIS, MASCRÉ u. VISCHNIAC (Bull. Sciences Pharmacol. **19**. 577; C. **1913**. I. 310) dargestellten *Primverose* kann man annehmen, daß dieses u. der neue Zucker sich als ident. erweisen werden. (C. r. d. l'Acad. des sciences **179**. 780—82. 1924.)

HABERLAND.


W. Vieweg, *Einwirkung von wässerigen und wässrig-alkoholischen Natronlauge auf Cellulose*. (Vgl. Ber. Dtsch. Chem. Ges. **40**. 3877 [1907].) Vf. hat, gemeinschaftlich mit P. Schubert, Lsgg. von NaOH in 10, 35 u. 50%ig. A. dargestellt u. bei $18-20^\circ$ auf Cellulose (Watte) einwirken lassen. Aus den Tabellen u. Kurven des Originals ergibt sich, daß in Ggw. von wss. A. zwischen NaOH u. Cellulose keine zu einer definierten Verb. führende Rk. eintritt; NaOH verteilt sich zwischen Cellulose u. wss. A. Bei schwach alkal. Lauge ist die Beeinflussung der NaOH-Aufnahme seitens der Cellulose durch A. wesentlich geringer als bei starker Lauge. Die Aufnahme der Cellulose an NaOH wird umso größer, je mehr A. vorhanden ist. — Diese Verhältnisse erklären, weshalb RASSOW u. WADEWITZ (Journ. f. prakt. Ch. **106**. 266; C. **1924**. I. 976) die aus konz. wss. Lauge hergestellte Verb. $(C_6H_{10}O_5)_2NaOH$ durch Waschen mit A. nicht isolieren konnten. Die Wiederholung der vom Vf. früher veröffentlichten Unterss. ergaben den Beweis dafür, daß die Verb. $(C_6H_{10}O_5)_2NaOH$ in Lauge mittlerer Stärke beständig ist; bei verschiedenem Cellulosematerial tritt diese Verb. bei Lauge verschiedener Konz. auf: bei *Makobaumwolle* u. *Watte* in 16%ig. NaOH, bei *Ramie* u. aus Viscose regenerierter Cellulose (*Crinol*) in 12%ig. NaOH. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. **57**. 1917—21. 1924. HA.)

Leonard James Goldsworthy, *Spaltung von trans-Cyclobutan-1,2-dicarbonensäure*.

Sie gelingt mit Hilfe von Chinin: 9 g der Säure in 300 cem W. werden mit 21 g Chinin in wenig A. versetzt; nach Verdampfen des A. wird das Chininsalz durch Zugabe von sd. W. in Lsg. gebracht; beim Abkühlen krystallisiert das *Chininsalz der l-Säure*, $(C_{20}H_{24}O_2N_2)_2$, $C_6H_8O_4$, $8H_2O$, aus. Nadeln in A., $[\alpha]_D = -193,6^\circ$ nach einmaligem, $-192,9^\circ$ nach fünffaligem Umkrystallisieren aus W. u. Trocknen bei 120° . Aus der h. wss. Lsg. des Chininsalzes durch Zugabe von NH_4OH , Entfernen des Chinins u. Ansäuern wird die *l-Säure* erhalten; aus HCl Nadeln, F. 105° . — Die *d-Säure*, $C_4H_8(COOH)_2$, wurde analog isoliert aus der Mutterlauge der ersten Krystallisation des l-Salzes; aus HCl Krystalle, F. 105° ; $[\alpha]_D^{30} = +123,3^\circ$ in W. (c = 1,2208, l = 2); *Äthylester*, Kp.₇₆₁ 236° , $[\alpha]_D^{30}$ in Aceton = $+77,9^\circ$ (c = 1,732, l = 2). Die Spaltung mittels Brucin gelingt nur unvollkommen. (Journ. Chem. Soc. London **125**. 2012—13. 1924. Rangoon, Univ. Coll.) HABERLAND.

N. Zelinsky und E. Rjachina, *Über 1,3-Dimethylcyclopentan-3-carbonsäure*. Die durch Oxydation des Pulegons hergestellte β -Methyladipinsäure wurde katalyt. (Thoriumoxyd) in das entsprechende Keton übergeführt (vgl. SENDERENS, Ann. Chim. et Phys. [8] **28**; C. **1913**. I. 1498), durch KOH abgeschieden, die von 146 bis 149° sd. Fraktion mit $CH_3 \cdot MgJ$ in das *1,3-Dimethylcyclopentanol-3* übergeführt, Kp.₂₀ 70° . — *Chlorid*, durch Einw. von HCl-Gas in der Kälte auf den Alkohol, Kp. $134-136^\circ$. — *1,3-Dimethylcyclopentan-3-carbonsäure*, $C_8H_{14}O_2$, aus vorigem $+Mg + CO_2$, Kp.₇₄₆ $226-227^\circ$, D.₂₀ 0,9915, D.₂₀ 0,9899, $n_D^{20} = 1,4479$, Mol.-Refr. $38,40$, $\alpha_D = -7,7^\circ$, Geruch nach gereinigten Naphthensäuren. — *Amid*, F. 95° , l. in verd. A. — Cu-Salz, grün, mit grünblauer Farbe ll. in Ä. u. Bzn. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. **57**. 1931. 1924. Moskau, Univ.) ZANDER.

Oswald Silberrad, *Die photochemische Wirkung von Jod auf feuchtes p-Chlortoluol*. 100 g *p-Chlortoluol* + 75 g W. + 0,1 g J wurden 2 Jahre lang besonnt; nach dieser Zeit wurden außer 85,5 g nicht angegriffenem *p-Chlortoluol* isoliert: 1,86 g *Toluol*, 1,35 g *p-Chlorbenzoesäure*, F. 236° , 0,2 g *4,4'-Dichlordiphenyläthan*, F. 111° u. 0,82 g HCl. Diese Verb. sind wahrscheinlich nach folgenden Gleichungen entstanden:






(Journ. Chem. Soc. London **125**. 2196—97. 1924. Buckhurst Hill [Essex], Silberrad Res. Lab.) HABERLAND.

Herbert Henry Hodgson und Peter Anderson, *Mononitrierung von p-Chlortoluol*. Die Nitrierung wurde ausgeführt: a) nach dem Verf. von HOLLEMAN (Rec. trav. chim. Pays-Bas **28**. 408 [1909]), HNO_3 wurde im Laufe von 15, 45 u. 60 Min. zugegeben, es wurden erhalten 52,8%, 58 u. 58,8% *4-Chlor-2-nitrotoluol* (I), b) mit 5 Teilen konz. H_2SO_4 (D. 1,84) u. 10%ig. Überschuß HNO_3 (D. 1,48), Dauer der Zugabe 1 Stde. Es wurden erhalten 64—65% I u. 36—35% *4-Chlor-3-nitrotoluol* (II), der F. dieses Gemischs war 14° ; c) mit je 1 Teil HNO_3 (D. 1,5) u. P_2O_5 + 5 Teilen Acetanhydrid, Zeit wie bei b); es wurden erhalten 50% I u. 50% II, d) Darst. von I u. II aus den entsprechenden Nitrotoluidinen nach SANDMEYER. I : II = 93,9 : 6,2 oder 93,8 : 6,4 (aus dem I entsprechenden Nitrotoluidin), I : II = 6,7 : 94—93 oder 11—12 : 89—88 aus dem II entsprechenden Nitrotoluidin. (Journ. Chem. Soc. London **125**. 2195—96. 1924. Huddersfield, Techn. Coll.) HABERLAND.

David Henry Peacock, *Die Benzylierungsgeschwindigkeit einiger Amine*. Wenn bei einer bimolekularen Rk. jedes Mol. für sich aktiviert wird, so muß die Aktivierungsenergie gleich der Summe der beiden einzelnen Energien sein. Sind bei den Rkk. 1. *Benzylchlorid* (a) + *Anilin* (b), 2. b + *p-Nitrobenzylchlorid* (d), 3. a + *p-Toluidin* (c), 4. c + d: $E_1 = E_a + E_b$, $E_2 = E_b + E_d$, $E_3 = E_a + E_c$, $E_4 = E_c + E_d$, so müßte sein $E_1 - E_2 = E_3 - E_4$. Die E-Werte wurden aus den Temperatur-


koeffizienten der Rk.-Geschwindigkeit für die Rkk. 1—4 ermittelt u. folgende Zahlen erhalten: 1. 13454 cal., 2. 14678 cal., 3. 16050 cal., 4. 11860 cal. Die Differenz zwischen der Aktivierungsenergie von p-Nitrobenzylchlorid u. Benzylchlorid beträgt im ersten Falle ($E_1 - E_2$) 1224 cal., im zweiten ($E_3 - E_4$) 4190 cal. Hieraus folgt, daß nicht jedes Mol. unabhängig aktiviert wird, sondern daß ein Mol. auf das andere aktivierend wirkt. Bei den untersuchten Rkk. hat sich gezeigt, daß der Geschwindigkeitskoeffizient dann besonders wächst, wenn die Konz. des Amins erhöht wird; es wäre dies z. B. bei Rk. 1. so zu erklären, daß sich nach 1.' Amin u. Halogenverb. zu einer losen Komplexverb. vereinigen, die nach 1.'' unter dem Einfluß eines weiteren Mols Anilin sich umlagert unter Abspaltung von HCl. Die k -Werte würden nach 1.' aus der Gleichung $dx/dt = k(a-x)(b-x)$ sich ergeben; zieht man aber noch 1.'' in Betracht, so wäre k nach $dx/dt = k(a-2a)(b-x)$ zu errechnen. Beide Gleichungen ergaben am Anfange der Rk. ähnliche Werte, im weiteren Verlauf wurden nur nach der erstgenannten Gleichung konstante Zahlen erhalten; mit Rücksicht darauf, daß nach 1.iii sich auch *Dibenzylanilin* bildet, wäre



dies erklärlich. Folgende k Werte wurden bei 35° (bezw. 45°) für eine Konz. von 1,6 Mol. Amin u. 0,4 Mol. Benzyl- bzw. p-Nitrobenzylchlorid pro l A. erhalten: bei Rk. 1. 0,00157 (0,00315); Rk. 2. 0,000588 (0,00125); Rk. 3. 0,00217 (0,00495); Rk. 4. 0,00137 (0,00252); p-Nitrobenzylchlorid reagiert demnach (wohl infolge des Einflusses der NO₂-Gruppe) langsamer als Benzylchlorid. k -Werte der Rk. 1. bei 35° u. wechselnden Konz. vgl. Tabelle im Original. — Folgende $k \times 10^5$ -Werte wurden bei 40° in A. zwischen *Benzylchlorid* (Konz. = c') u. nachgenannten Aminen (Konz. = c) ermittelt: *Anilin* ($c = 4$, $c' = 2$) 354; ($c = 2$, $c' = 1$) 300; ($c = 4$, $c' = 1$) 383; *o-Toluidin* ($c = 4$, $c' = 1$) 70; *p-Toluidin* ($c = 4$, $c' = 1$) 660; *o-Chloranilin* ($c = 4$, $c' = 1$) 44; *p-Chloranilin* ($c = 2$, $c' = 0,5$) 232; *2,5-Dichloranilin* ($c = 4$, $c' = 1$) 17; *Monomethylanilin* ($c = 4$, $c' = 1$) 562; *Monoäthylanilin* ($c = 4$, $c' = 1$) 202; *Monobenzylanilin* ($c = 2$, $c' = 1$) 120. (Journ. Chem. Soc. London **125**. 1975—80. 1924. Rangoon [Birma], Univ.)

HABERLAND.



Gilbert T. Morgan und Wilfried John Hickinbottom, *Nitrierung stereoisomerer aromatischer Diamine*. Die von den Vff. (Journ. Chem. Soc. London **123**. 97; C. **1923**. I. 943) dargestellten *d,l*- u. *meso-β,γ-Di-p-tolylaminobutane* (II) zeigen bei der Nitrierung gleichartiges Verh. Einw. von HNO₃ auf die Eg.- oder Acetanhydridlg. von II führt in Abwesenheit anderer Mineralsäuren zu *d,l*- bzw. *meso-β,γ-3,3'-Dinitrodi-p-tolylaminobutan* (III), mit konzentrierter Säure entstehen *d,l*- bzw. *meso-β,γ-3,3',5,5'-Tetranitrodi-p-tolylaminobutan* (IV). Orientierend wirkt in diesen Fällen die Alkylendiaminogruppe; es bildet sich wahrscheinlich zuerst das Nitrat, das zum Nitramin dehydriert wird; durch Wanderung von NO₂ in dieser letzteren Verb. entsteht das o-Nitroderiv. Sind beide o-Stellungen besetzt, so tritt die Umlagerung nicht ein, das Nitramin kann isoliert werden; wird das *d,l*-Diamin in Acetanhydrid mit überschüssiger HNO₃ behandelt, so entsteht *d,l-β,γ-Butylen-*



3,3',5,5'-tetranitro-*p*-tolylldinitramin (V). Wird die Nitrierung mit dem Sulfat der Basen ausgeführt, so ist bei der Orientierung die CH_3 -Gruppe ausschlaggebend; es entsteht *d,l*- bzw. *meso*- β,γ -2,2'-Dinitrodi-*p*-tolylaminobutan (I). Die Konst. der Nitroverb. wurde dadurch bestimmt, daß Hydrolyse von I mit H_2SO_4 2-Nitro-*p*-toluidin gab. IV lieferte bei analoger Behandlung 3,5-Dinitro-*p*-toluidin. Alkal. Hydrolyse von IV führt zu 3,5-Dinitro-*p*-kresol u. *d,l*- bzw. *meso*-Diaminobutan.

Versuche. *d,l*- β,γ -3,3',5,5'-Tetranitrodi-*p*-tolylaminobutan, $\text{C}_{18}\text{H}_{20}\text{O}_8\text{N}_6$ (IV), aus 4 g der *d,l*-Base in 25 ccm Eg. + 60 ccm HNO_3 (D. 1,5) + 60 ccm Eg. bei -10° nach beendeter Zugabe auf Zimmertemp. steigen lassen; aus Eg. orangegelbe Nadeln, F. 230° , wl. in Aceton u. Ä. Zugabe von 50% KOH zu Acetonsuspension gibt purpurrote Färbung, die Acetonschicht geht über hellrot in orange über, die ursprüngliche farblose untere Schicht wird dunkelrot. — *d,l*- β,γ -Butylentetranitrodi-*p*-tolyl-dinitramin, $\text{C}_{18}\text{H}_{18}\text{O}_{12}\text{N}_8$ (V), aus 3 g II in 7 g Eg. + 50 ccm HNO_3 (D. 1,5) + Acetanhydrid; aus Eg. hellgelbe Täfelchen, aus rauchender HNO_3 fast weißes Krystallpulver, Zers. bei 178 – 180° unter Entw. von Stickoxyden; wl. in A. u. Ä., l. in Aceton. — *d,l*- β,γ -3,3'-Dinitrodi-*p*-tolylaminobutan, $\text{C}_{18}\text{H}_{22}\text{O}_4\text{N}_4$ (III), aus 1 g II in 10 ccm Eg. + 10 ccm HNO_3 (D. 1,42) + 25 ccm Eg. bei 0° ; aus Eg. bräunlichrote Nadeln. F. 200° , wl. in Aceton u. A., l. in Chlf. — *d,l*- β,γ -2,2'-Dinitrodi-*p*-tolylaminobutan, $\text{C}_{18}\text{H}_{22}\text{O}_4\text{N}_4$ (I), aus 2,55 g II in 110 g H_2SO_4 (D. 1,84) bei 0° + 1 Mol. HNO_3 (D. 1,42) in 1 Vol. H_2SO_4 ; aus Eg. orange Nadeln, F. 132° , wl. in A. u. CCl_4 , l. in Chlf. u. Aceton. Salze mit HCl, HBr u. H_2SO_4 farblos, sehr leicht hydrolysierbar; mit CH_2O entsteht ein citronengelbes Kondensationsprod. — *meso*- β,γ -3,3',5,5'-Tetranitrodi-*p*-tolylaminobutan, $\text{C}_{18}\text{H}_{20}\text{O}_8\text{N}_6$ (IV), aus 1 g *meso*-Amin II in 5 ccm Eg. + 15 ccm HNO_3 (D. 1,5) in 5 ccm Eg. bei -15° ; nach beendeter Zugabe 15 Min. bei -10° belassen u. auf Eis gegossen; Nd. nach Extrahieren mit w. Aceton aus Bzl. orangefarbene Tafeln, F. 212° ; gibt mit NaOH dieselbe Farbrk. wie die *d,l*-Verb. Wird die Nitrierung bei 0° durchgeführt, so entsteht wahrscheinlich das Tetranitrodinitrosamin des Ditolylaminobutans, ll. in Aceton, aus Eg. hellgelbe Nadeln, F. 163 – 164° (Zers.). — *meso*- β,γ -3,3'-Dinitrodi-*p*-tolylaminobutan, $\text{C}_{18}\text{H}_{22}\text{O}_4\text{N}_4$ (III), aus Aceton scharlachrote Tafeln, F. 195° , wl. in A. u. Eg. — *meso*- β,γ -2,2'-Dinitrodi-*p*-tolylaminobutan, $\text{C}_{18}\text{H}_{22}\text{O}_4\text{N}_4$ (I), B. analog der *d,l*-Verb.; aus Essigester höckerige M., aus CH_3COOH orangegelbe Nadeln, F. 186° , wl. in Bzl., l. in Xylol. — 2-Nitro-*p*-toluidin, aus PAe. gelbe Nadeln, F. 76 – $77,5^\circ$. — 3,5-Dinitro-*p*-toluidin, aus A. danach aus CS_2 , F. 167 – 168° . — Dibenzoilyldiaminobutan durch alkal. Hydrolyse von IV u. Versetzen des mit Wasserdampf übergetriebenen Prod. mit $\text{C}_6\text{H}_5\text{COCl}$, F. 220 – 224° ; geht durch Erhitzen im HCl-Strom in ein Imidazolderiv. (vgl. unten) über. — Wird β,γ -Dibrombutan 1 Woche lang bei gewöhnlicher Temp., danach 10 Stdn. im Autoklaven bei 110 – 125° mit alkoh. NH_3 behandelt, das Reaktionsprod. nach Neutralisieren mit HCl dest., so enthält das Destillat β -Brombutylen, Kp. $87,5$ – 92° . Der nicht übergehende Rückstand wird nach Eindampfen mit A. extrahiert, Rückstand hieraus bei 0° mit konz. NaOH behandelt gab β,γ -Diaminobutan, $\text{C}_4\text{H}_{12}\text{N}_2\cdot\text{H}_2\text{O}$, die Fraktion Kp. 130 – 135° war anscheinend ein Gemisch von Stereoisomeren; Dibenzoilylderiv., $\text{C}_{18}\text{H}_{20}\text{O}_2\text{N}_2$, F. 236 – 238° , aus A. prismat. Nadeln. — β,γ -Di-*p*-toluolsulfonylaminobutan, $\text{C}_{18}\text{H}_{24}\text{O}_4\text{N}_2\text{S}_2$, aus A. Nadeln oder Tafeln, F. 178 – 179° , einzelne Fraktionen hatten F. 140 – 170° . — Pikrat des β,γ -Diaminobutans, $\text{C}_4\text{H}_{12}\text{N}_2\cdot 2\text{C}_6\text{H}_3\text{O}_7\text{N}_3$, hellgelbes Krystallpulver, F. 250 – 252° , ab 220° Schwärzung. — 2-Phenyl-4,5-dimethylimidazoldihydrid-4,5, aus Bzl. + PAe. Nadeln, F. 101 – 103° ; Pikrat, $\text{C}_{11}\text{H}_{14}\text{N}_2\cdot\text{C}_6\text{H}_3\text{O}_7\text{N}_3$, aus A. gelbe Krystalle, F. 190° (Journ. Soc. Chem. Ind. 43. T. 307–10. 1924. Edgbaston, Univ. of Birmingham.) HA.

Frederick George Soper, Die Hydrolyse der *p*-Toluolsulfonchloramide in Wasser. (Vgl. Journ. Chem. Sec. London 125. 768; C. 1924. II. 318.) Die Hydrolyse von *p*-Toluolsulfondichloramid (I) erfolgt im Sinne der Gleichungen:



p-Toluolsulfonmonochloramid (II) konnte nicht isoliert werden, da sich beim Ansäuern seines Na-Salzes, Chloramin-T, sofort I ausschied. Seine Existenz in Lsg. konnte aber wie folgt bewiesen werden. Die jodometr. meßbare Löslichkeit von I setzt sich zusammen aus den Konz. von undissoziiertem I, HClO u. II. Erfolgte der Zerfall von I nach $\text{C}_7\text{H}_7 \cdot \text{SO}_2 \cdot \text{NCO}_2 + 2\text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{C}_7\text{H}_7 \cdot \text{SO}_2 \cdot \text{NH}_2 + 2\text{HClO}$, so müßte die Löslichkeit in W. bei Ggw. von Toluolsulfonamid (III) abnehmen; sie stieg aber von $0,6720 \times 10^{-3}$ -n. auf $2,93 \times 10^{-3}$ -n. bei 25°, was nur durch B. von II zu erklären ist. Da I zu wl. in W. ist, um eine Phasentrennung zu ermöglichen, HClO sich elektrometr. nicht bestimmen läßt, wurden die Hydrolysenkonstanten durch Verb. zweier unabhängiger Versuchsreihen ermittelt, nämlich a) Bestst. der Löslichkeit von I in wss. Lsgg. von III u. b) Bestst. des freien Cl₂ in salzsauren Lsgg. von Chloramin-T; a) wurde direkt jodometr., b) durch Durchsaugen einer gemessenen Luftmenge durch die Lsg. u. Auffangen der Gase in KJ ausgeführt. Die 1. u. 2. Hydrolysenkonstante von I ergaben sich so zu $4,9 \times 10^{-8}$ bzw. $8,0 \times 10^{-7}$. Bestst. der Löslichkeit von I in verd. HCl bestätigten die erhaltenen Resultate. — II dürfte ein Gemisch von $\text{C}_7\text{H}_7 \cdot \text{SO}_2 \cdot \text{NHCl}$ u. $\text{C}_7\text{H}_7 \cdot \text{SO}_2\text{H} : \text{NCl}$ sein, *Chloramin-T* das Salz der zweiten Form. Die Konz. von II wurde stets als die Summe beider Formen gerechnet, da das Gleichgewicht sich schnell einstellt: aus Chloramin-T u. HCl u. aus III u. HClO bereitete Lsgg. ergaben ident. Hydrolysenwerte. Die Zus. angesäuerter Lsgg. von Chloramin-T wurde berechnet; seine Konz. beeinflußt die der HClO nicht. — Das verwandte W. wurde durch Dest. des gewöhnlichen dest. W. über alkal. KMnO₄ gewonnen; es zeigte einen hohen Reinheitsgrad, HClO veränderte darin seinen Titer in 14 Tagen nicht. Chloramin-T, Krystalle mit 3H₂O aus verd. wss. NaOH. Die salzsaure wss. Lsg. ist 14 Tage vollkommen titerbeständig. I aus III in Eg. u. überschüssigem Chlorkalk. Spuren von III wurden durch Schütteln mit W. bis zur Titerkonstanz entfernt. III, Krystalle aus Eg., F. 137°. (Journ. Chem. Soc. London **125**. 1899—1910. 1924. Bangor [Wales], Univ.)


HERTER.

Mario Passerini, *Über die Isonitrile*. XI. Reaktion des Phenylisonitrils mit den Anilinderivaten der aromatischen o-Oxyaldehyde. (X. vgl. Gazz. chim. ital. **54**. 633; C. **1924**. II. 2651.) Über den Verlauf der Rk. des Phenylisonitrils (I) mit dem β -Naphthol (vgl. Gazz. chim. ital. **54**. 184; C. **1924**. II. 467) stellt Vf. fest, daß das Phenylisonitril nicht in der Form (R·N:C)₂ reagiert, sondern daß die Rk. in zwei Stufen verläuft. In der ersten Phase addiert das β -Naphthol ein Mol. Isonitril unter B. des Anilideriv. des 2-Oxy-1-naphthylaldehyds (II), das alsdann mit einem zweiten Mol. Isonitril das Dianilideriv. des 2-Oxy-1-naphthylglyoxals bildet. — Dianilideriv. des 2-Oxy-1-naphthylglyoxals, C₂₄H₁₈ON₂, aus I u. II, F. 169—170°. — Dianilideriv. des o-Oxyphenylglyoxals, C₂₀H₁₆N₂O, aus I u. Salicylidenanilin (C₆H₅N:CHC₆H₄OH), gelbe Nadeln aus A., F. 150—152°, ll. in Ä., Chlf. u. Aceton. — Diphenylhydrazon des o-Oxyphenylglyoxals, C₂₀H₁₈ON₄, orangefarbige Krystalle aus A., F. 198°. (Gazz. chim. ital. **54**. 667—71. 1924. Florenz, Ist. di Studi sup.) ZANDER.

A. Gutmann, *Über die Einwirkung von tertiären Natriumarsenit auf Azidverbindungen*. Auf Salze der N₃H wirkt Na₃AsO₃ nicht ein; auf Chlor- bzw. Jodazid schon in der Kälte nach



Die Oxydation zu Arsenat erfolgt unter intermediärer B. von Hypohalogeniten. Die Beständigkeit der Azidogruppe steht mit der Konstitutionsformel nach CURTIUS im Einklang. — Bei den organ. Azidoverbb. dagegen bleibt die Azidogruppe nicht erhalten. Die Rk. verläuft etwa nach




u. spricht für die Thielesche Konstitutionsformel. Benzoylazid zerfällt so in N_2 , NH_3 u. Benzoessäure; *p*-azidobenzolsulfonsaures Phenylhydrazin in N_2 , sulfanilsaures Na u. Phenylhydrazin; Phenylazid — als Ausnahme schon in der Kälte — unter starker Wärmeentwicklung in N_2 u. Anilin. — Die Verss. werden ausgeführt, indem die Reaktionssubstanz in alkoh. Lsg. in eine wss. von Natriumarsenit eingetragen wird. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 57. 1956—58. 1924.) TRÉNEL.

Harold Gordon Rule und Thomas Ramsay Paterson, *Einfluß von Substituenten auf chemische und physikalische Eigenschaften: die Reaktionsgeschwindigkeit zwischen substituierten Benzoessäureanhydriden und einem aliphatischen Alkohol*. (Vgl. RULE, Journ. Chem. Soc. London 125. 1121; C. 1924. II. 641.) Es wurde die Esterifizierungsgeschwindigkeit festgestellt bei Einw. von A. auf Benzoessäureanhydrid, sowie auf die *m*- NO_2 -, *o*-Cl-, *o*,*m*,*p*- OCH_3 u. *o*,*m*,*p*- CH_3 substituierten Anhydride, ferner bei der Einw. von Cetylalkohol in Bzl. auf die *o*-, *m*-, *p*-substituierten NO_2 - u. Cl-Deriv. des Anhydrids. Aus den Tabellen des Originals ergibt sich, daß der Einfluß von Substituenten auf die Geschwindigkeit der Veresterung ausgedrückt werden kann durch die Reihenfolge $NO_2 > Cl > (H, OCH_3) > CH_3$. Diese Reihenfolge entspricht der von MICHAEL u. OECHSLIN (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 42. 317 [1909]) bei Veresterung der freien Benzoessäure mittels CH_3OH erhaltenen. Aus den Unterss. anderer Autoren ergibt sich, daß der Einfluß von Substituenten auf die Reaktionsfähigkeit von Benzolderiv. annähernd durch die Reihenfolge NO_2 , $COOH$, Halogene, (H, OCH_3) , CH_3 wiedergegeben werden kann; mit Ausnahme der relativen Stellung von H u. OCH_3 ist diese Reihe in Übereinstimmung mit den DE.DE. monosubstituierter Benzol- u. Paraffinderiv. sowie der Stärke aliph. u. *o*-substituierter Benzoessäuren. Tabelle über den Einfluß von Substituenten auf chem. u. physikal. Eigenschaften im Original. Die Stellung eines Substituenten beeinflusst die Eigenschaften des Verb.; so ist $k_m > k_p$ u. k_o für die Substituenten CH_3 , OCH_3 , Cl, dagegen ist bei Anwesenheit der NO_2 -Gruppe $k_m < k_p$.

Versuche. Neu dargestellt wurden folgende Anhydride: *p*-Chlorbenzoessäureanhydrid, $C_{14}H_9O_3Cl_2$, durch Erhitzen des Säurechlorids mit dem Na-Salz der Säure; aus Bzl. Tafeln. F. 194,8°, wl. in k., l. in h. organ. Mitteln. — *m*-Chlorbenzoessäureanhydrid, aus dem Säurechlorid in Toluol + P_2O_5 ; aus Bzl. oder Toluol. Tafeln. F. 95,5°, aus A. oder PAe. Nadeln; wl. in Lg. — *o*-Chlorbenzoessäureanhydrid, Darst. analog vorigem; aus PAe. Nadeln, F. 79,6°. — *o*-Methoxybenzoessäureanhydrid, $C_{16}H_{14}O_5$, aus *o*-Methoxybenzoylchlorid durch Schütteln mit Na_2CO_3 u. Pyridin; aus PAe. Nadeln, F. 72,4°, ll. in Bzl. u. Chlf. — *m*-Methoxybenzoessäureanhydrid, aus dem Chlorid mittels P_2O_5 ; aus PAe. Tafeln, F. 66,6°; l. wie voriges. (Journ. Chem. Soc. London 125. 2155—63. 1924. Edinburgh, Univ.) HAB.

S. C. J. Olivier, *Bemerkung zur elektrochemischen Reduktion der 2,6-Dibrombenzoessäure*. Von den halogensubstituierten Benzoessäuren hat sich nach den Verss. von METTLER (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 39. 2933; C. 1906. II. 1413) nur bei den J-substituierten Säuren die n. Red. zu den entsprechenden Halogenbenzylalkoholen durch elektrochem. Red. an Pb-Elektroden durchführen lassen. Zwecks Darst. des 2,6-Dibrombenzylchlorids über den entsprechenden Benzylalkohol versuchte Vf. die elektrochem. Red. der 2,6-Dibrombenzoessäure. Während der Red. wurde eine starke Entw. von HBr beobachtet u. im Ä.-Auszug konnte nach vollendeter Red. nur *o*-Brombenzylalkohol, C_7H_7OBr , F. 79°, als Rk.-Prod. isoliert werden. Reduziert man *o*-Brombenzoessäure unter den gleichen Bedingungen, so wird derselbe *o*-Brombenzylalkohol erhalten. Ein in 6-Stellung zum Carboxyl eingeführtes Br wirkt somit auf das in 2-Stellung sitzende Br auflockernd, so daß es leichter eliminiert wird. Durch Na-Amalgam wird die 2,6-Dibrombenzoessäure nicht reduziert, wenn man in saurer Lsg. arbeitet; in alkal. Lsg. wird der Bzl.-Kern hydriert. (Rec. trav. chim. Pays-Bas 43. 872—73. 1924. Wageningen.) HORST.

J. Böeseken und H. Gelissen, *Die Einwirkung von Benzoylperoxyd auf Chloroform und Tetrachlorkohlenstoff. (Neue Synthesen der ω -Trichlortoluylsäuren.)* Kocht man Benzoylperoxyd mit einem Überschuß von CCl_4 auf dem Wasserbad während 8 Stdn., so ist nach Entweichen von CO_2 u. Phosgen schließlich alles Peroxyd verschwunden. Beim Abkühlen erhält man ω -Trichlor-*p*-toluylsäure, $\text{C}_6\text{H}_5\text{O}_2\text{Cl}_3$ (I), Blättchen, F. 194–195°, aus Chlf., l. in A., Ä. u. Bzl. Daraus mit alkoh. KOH (5 Stdn.), *Terephthalsäure*. In der Mutterlauge von I wurde Hexachloräthan nachgewiesen, außerdem Chlorbenzol u. o-Phthalsäure. — Wirkt Chlf. auf Benzoylperoxyd, so ist der Verlauf der Rk. analog. Es bildet sich in der Hauptsache I u. Bzl. nach der Gleichung:



Durch Einw. von Benzoylperoxyd auf trockenes Bzl. erhielten Vff. Benzoesäure, CO_2 u. *Diphenyl*. Nimmt man anstatt Benzoylperoxyd *p*-Chlorbenzoylperoxyd oder *m*-Nitrobenzoylperoxyd, so erhält man *p*-Monochlordiphenyl oder andere monosubstituierte Prodd., die sich auf diesem Wege sehr gut darstellen lassen. (Rec. trav. chim. Pays Bas 43. 869–71. 1924. Delft, Univ.)

HORST.


George Senter und Allan Miles Ward, *Untersuchungen über die Waldensche Umkehrung. VIII. Der Einfluß des Lösungsmittels auf das Vorzeichen des Umwandlungsprodukts von β -Oxy- β -phenylpropionsäuren in β -Brom- β -phenylpropionsäuren.* (VII. vgl. SENTER, DREW u. MARTIN, Journ. Chem. Soc. London 113. 151; C. 1919. I. 513.) Die Überführung der β -Oxy- in die β -Brom- β -phenylpropionsäuren wurde mittels HBr bewirkt. Als Lösungsm. wurden angewandt: Ameisensäure, Essigsäure, Propionsäure, Buttersäure, Essigester, Chlorameisenester, Ä., Chlf., Nitromethan, Nitrobenzol u. Dichloressigsäure. Alle Bromsäuren zeigten entgegengesetzte Drehung wie die Oxy Säuren, aus denen sie hergestellt wurden; die Größe der Drehung variierte je nach Art des Lösungsm. u. der sonstigen Versuchsbedingungen. Die vorliegenden u. früheren Unterss. zeigen, daß Waldensche Umkehrung durch Wechsel des Lösungsm. eintritt bei den Verbb., bei denen die C_6H_5 - u. COOH -Gruppe gleichzeitig an das a. C-Atom gebunden sind; ist nur eine dieser Gruppen an das a. C-Atom gebunden, so tritt keine Umkehrung ein. Bei den vorliegenden Verss. hat sich ergeben, daß HBr bei der B. der Bromsäure (eventuell auch noch nach ihrer Entstehung) katalyt. racemisierend wirkt.


Versuche. Die Spaltung der *d,l*- β -Oxy- β -phenylpropionsäure in die beiden akt. Formen wurde mittels Morphin durchgeführt. *l*-Säure, F. 115–116°, $[\alpha]^{18}_{\text{Hg}} = -19,8^\circ$ in A. ($c = 4,726$, $l = 2$); *d*-Säure, F. 116°, $[\alpha]^{18}_{\text{Hg}} = +19,8^\circ$. — Darst. der β -Brom- β -phenylpropionsäuren. War HBr in dem angewandten Lösungsm. ll., so wurde dieses mit HBr gesätt. u. zu der akt. Oxy Säure so viel hiervon zugegeben, daß eine ca. 10%ig. Lsg. entstand. In den anderen Fällen wurde eine 5%ig. Lsg. der Oxy Säure dargestellt, die dann mit HBr gesätt. wurde. Die Drehungswerte wurden in A., im 2 dm-Rohr mit gelbem Hg-Licht festgestellt. — I. Lösungsm. Ameisensäure: Die aus der l-Oxy Säure nach $\frac{1}{2}$ -std. Stehen der Mischung erhaltene Bromsäure hatte $[\alpha]^{15} = +24,4^\circ$ ($c = 2,130$); Br-Säure nach 4-tägigem Stehen isoliert $[\alpha]^{18,5} = +13,3^\circ$ ($c = 2,069$); durch Lösen der Oxy Säure in HCOOH , darauf Sättigung mit HBr u. sofortige Isolierung der Br-Säure: $[\alpha]^{15} = +9,7^\circ$ ($c = 2,118$). — II. Lösungsm. Essigsäure: Aus l-Oxy Säure nach 4-tägigem Stehen erhaltene Br-Säure: $[\alpha]^{17} = +1,9$ ($c = 2,162$); aus d-Oxy Säure nach $\frac{1}{2}$ -std. Stehen $[\alpha]^{18} = -59,3^\circ$ ($c = 2,303$); aus der d-Oxy Säure nach 65 Min. langem Stehen bei 5°: $[\alpha]^{20} = -65,2^\circ$ ($c = 1,849$); aus der l-Oxy Säure in Essigsäure durch Sättigen mit HBr (20 Min.) u. sofortige Isolierung der Br-Säure: $[\alpha]^{15} = +28,1^\circ$ ($c = 0,998$). Je 0,5 g der l-Oxy Säure wurden gel. in 5 cem mit HBr gesätt. Eg., die Br-Säuren hatten nach $\frac{1}{2}$ -std. Aufbewahren bei 45, 35, 25 u. 15° folgende $[\alpha]$ -Werte: $+13,3^\circ$,

+27,6°, +40,0° u. +42,5°. — III. Lösungsm. Propionsäure: Br-Säure aus l-Oxysäure nach $\frac{1}{2}$ -std. Stehen bei 25°: $[\alpha]^{14} = +47,2^\circ$, aus d-Oxysäure nach 4-tägigem Stehen $[\alpha]^{19,5} = -8,4^\circ$ ($c = 2,141$). — IV. Buttersäure (n + i). Br-Säure aus d-Oxysäure nach 2-tägigem Stehen: $[\alpha]^{17} = -12,4^\circ$. Es hatten sich bei der Rk. 2 Schichten gebildet; die obere lieferte beim Eingießen in W. die Br-Säure, die untere roch esterartig, wahrscheinlich war der Buttersäureester der β -Oxysäure entstanden. — V. Dichloressigsäure: Aus l-Oxysäure nach 16std. Stehen erhaltene Br-Säure: $[\alpha]^{20} = +1,1^\circ$ ($c = 1,888$). — VI. Essigester. Aus d-Oxysäure nach 24 Stdn.: $[\alpha] = -10,1^\circ$ ($c = 2,226$). — VII. Chlorkohlensäureester. Aus l-Oxysäure nach 2 Stdn.: $[\alpha]^{20} = +13,5^\circ$ ($c = 2,037$). — VIII. Äther. Aus d-Oxysäure nach 10-std. Stehen: $[\alpha] = -0,49^\circ$. — IX. Chlf. Aus d-Oxysäure nach 20 Stdn.: $[\alpha]^{22} = -13,9^\circ$ ($c = 1,760$). — X. Nitromethan. Aus l-Oxysäure nach 3 Stdn.: $[\alpha]^{19} = +0,59^\circ$ ($c = 1,692$). — XI. Nitrobenzol. Aus l-Oxysäure nach 5 Stdn. erhaltene Br-Säure: $[\alpha]^{16} = +11,4^\circ$ ($c = 1,716$). (Journ. Chem. Soc. London **125**. 2137—44. 1924. London, Univ., BIRKBECK Coll.) HA.

L. Vanino und F. Herzer, *Zur Darstellung des Acetylsalicylsäureperoxyds*. (Vgl. VANINO u. UHLFELDER, Pharm.-Ztg. **47**. 847 [1902].) Genanntes Peroxyd wird in 39%ig. Ausbeute erhalten, wenn 60 cem Perhydrol (+ wenig Pyridin), die in einer Kältemischung sich befinden, allmählich unter gutem Rühren mit 10 g Acetylsalicylsäurechlorid in wenig Aceton versetzt werden. Aus Bzl. oder k. Chlf. mit Gasolin gefällt F. 109—110°; das Umkrystallisieren mit A. führt bisweilen zur Abspaltung von O₂. Verpufft beim Erhitzen; mit FeCl₃ keine Violettfärbung. (Arch. der Pharm. **262**. 441—42. 1924.) HABERLAND.

Gilbert T. Morgan und J. D. Main Smith, *Untersuchungen über Restaffinität und Koordination*. Teil 22. *Optisch aktive Salicylatokobaltdiäthylendiammine*. (21. vgl. MORGAN u. TUNSTALL, Journ. Chem. Soc. London **125**. 1963; C. **1924**. II. 2477.) Die rac. Verb. [Salicy. Co. 2en]X wurden auf folgende Arten dargestellt: 1. durch Ersatz von NH₃ durch Äthylendiamin in den Verb. [Salicy. Co. 4NH₃]X; 2. durch Oxidation von Kobaltsalzen mit H₂O₂ in Ggw. von Äthylendiaminhydrat u. Salicylsäure; 3. aus den Verb. [en₂ CoCl₂]X, [en₂ CoH₂O, OH]X₂ oder [en₂ Co(OH)₂]X durch Kernsubstitution. Die Spaltung der rac. Verb. gelang mittels d- u. l-Campher-sulfonsäure. Die Isolierung der opt.-akt. Verb. geschieht am besten durch Zugabe von HgCl₂ oder HgBr₂, das Hg-Salz der rac. Form fällt sofort aus, u. aus dem Filtrat können die opt.-akt. Formen durch fraktionierte Krystallisation isoliert werden. Die opt.-akt. Mercurihaloidsalze sind, im Gegensatz zu den entsprechenden Salzen der Oxalato- u. Malonatoreihe sehr beständig. Die Salicylatodiäthylendiamminsalze zeigen große Ähnlichkeit mit den früher (vgl. MORGAN u. SMITH, Journ. Chem. Soc. London **123**. 1096; C. **1923**. III. 1267) dargestellten Salicylatotetramminsalzen, sie sind jedoch in W. u. wss. A. leichter l. als letztere; auch bzgl. der Hydratation der n. u. sauren Salze ergeben sich zwischen beiden Ähnlichkeiten. Der Umstand, daß nur 1 H₂O oder 1 HX in das komplexe Kation eintritt, bestätigt die früher (MORGAN u. SMITH, l. c.) ausgesprochene Vermutung, daß diesen Salzen Konst. I u. nicht II zukommt. In Analogie hierzu muß geschlossen werden, daß die ähnlich konstituierten Oxoniumsalze der α - u. γ -Pyrone HX koordinativ an den Carbonyl-O gebunden enthalten.





Versuche. Rac. n. Salicylatoäthylendi-
amminkobaltisalze: *Chlorididhydrat*, $C_{11}H_{20}O_3N_4$.
 $ClCo, 2H_2O$ ($YCl(H_2O)_2$; $Y = III$), aus 41 g trans-
Dichlorodiäthylendiamminkobaltichlorid + Ag_2O (aus
48 g $AgNO_3$) in 100 ccm W.; das Filtrat, das eis-

Dihydroxochlorid enthält, wird mit 19,7 g Salicylsäure versetzt; beim Eindampfen
krystallisiert die am Ende genannte *Disalicylatoverb.* zunächst aus, aus dem Filtrat
erhält man das Chlorididhydrat; aus h. W. purpurrote Tafeln, die bei 100° $1H_2O$
abgeben; ll. in W. mit dunkelroter Farbe, Lsg. reagiert neutral; mit $AgNO_3$ fällt
 $AgCl$ aus; mit $FeCl_3$ keine Färbung; mit w. 5-n. HNO_3 entsteht die für die
Salicylatokobaltamine charakterist. grüne Färbung; der Salicylsäurerest ist aus
der Verb. nur durch h. konz. Säuren oder Alkalien zu entfernen. — *Carbonato-*
dihydrat, $C_{23}H_{40}O_9N_4Co_2, 2H_2O$ ($Y_2CO_3[H_2O]_2$), aus wss. Lsg. des vorigen + Ag_2CO_3 ;
aus verd. A. violett-rote rhomb. Tafeln, wl. in k. W., die dunkelrote Lsg. reagiert
gegen Methylorange und Bromphenolblau alkal. u. gibt mit Ca-, Hg- u. Ag-Salzen
Ndd. — *Nitratttrihydrat*, $C_{11}H_{20}O_6N_5Co, 3H_2O$, ($YNO_3[H_2O]_3$), aus voriger Verb. +
2-n. HNO_3 , aus Gemisch von A.-Aceton-Ä. dunkelrote Nadeln, an Luft rasch zer-
fließend. — *Mercurichloridhydrat*, $C_{11}H_{20}O_3N_4Cl_3CoHg, H_2O$ (I, R = HOH, X = $HgCl_3$),
aus dem Chlorid + $HgCl_2$ oder durch Mischen gesätt. Lsgg. der l- u. d-Verb. als
purpurrote Tafeln oder Nadeln, wl. in W., l. in äquivalenter Menge 5-n. HCl. —
Mercuribromidhydrat, $C_{11}H_{20}O_3N_4Br_3CoHg, H_2O$ (I, R = HOH, X = $HgBr_3$), aus
h. W. purpurrote Nadeln, wl. in w. 10-n. HCl, durch 33-n. HCl Zers. zu Salicyl-
säure u. trans-Dibromdiäthylendiamminkobaltidibromid. — *Mercurijodidhydrat*,
 $C_{11}H_{20}O_3N_4J_3CoHg, H_2O$, dunkel purpurrote Nadeln, swl. in W.

Opt.-akt. Salicylatodiäthylendiamminkobalticamphersulfonate,
 $YC_{10}H_{15}O_4S(H_2O)_2$; [$Y = III$]. *d-Camphersulfonat der l-Base*, $C_{21}H_{35}O_7N_4SCO, 2H_2O$,
durch Zugabe eines Gemischs von 15 ccm A. + 15 ccm Ä. + 30 ccm Aceton zu
einer Lsg. von 10,9 g des rac. Carbonats + 7 g d-Camphersulfonsäure in 15 ccm
W.; hellrote Tafeln; $[\alpha]_{D708} = -41,3^\circ$. — *l-Camphersulfonat der d-Base*, B. analog
vorigem aus l-Camphersulfonsäure, $[\alpha]_{D708} = +33^\circ$. — *l-Salicylatodiäthylendiammin-*
kobaltimercurichloridhydrat, $C_{11}H_{20}O_3N_4Cl_3CoHg, H_2O$ (I, R = HOH, X = $HgCl_3$),
aus vorigem + $HgCl_2$; aus h. W. purpurrote Prismen, leichter l. in W. als die
rac. Verb., $[\alpha]_{D708} = -46^\circ$. — *d-Salicylatodiäthylendiamminkobaltimercurichloridhydrat*,
 $[\alpha]_{D708} = +45^\circ$. — *l-Mercuribromidhydrat*, $C_{11}H_{20}O_3N_4Br_3CoHg, H_2O$ (I, X = $HgBr_3$,
R = HOH), dunkel purpurrote bis schwarze Tafeln, $[\alpha]_{D708} = -38^\circ$. — *d-Mercuri-*
bromidhydrat, $[\alpha]_{D708} = +38^\circ$. — Rac. saure Salicylatodiäthylendiammin-
kobaltisalze: *Saures Dichlorid*, $C_{11}H_{20}O_3N_4CoCl_2H, 3H_2O$, ($YHCl[H_2O]_3$), aus 8 g
des n. Chlorids in 4 ccm W. + 1 ccm 10-n. HCl durch Zugabe von gleichen Voll.
A. + Aceton + Ä.; scharlachrote Tafeln, luftbeständig, ll. in W., Lsg. reagiert
sauer; in wenig W. oder wss. Pyridin gel. geht die Farbe der Lsg. von scharlach
nach carminrot über, das n. Chlorid scheidet sich allmählich ab. — *Saures Dinitrat*,
 $C_{11}H_{20}O_3N_4Co(NO_3)_2H$, dunkelrote, luftbeständige Tafeln, ll. in W. — *Saures*
Carbonat, $C_{11}H_{20}O_3N_4CoHCO_3$, durch Zugabe von Aceton zu einer mit CO_2 gesätt.
Lsg. des n. Carbonats in W., hellrote Tafeln, l. in W. Die dunkelrote Lsg. ist
neutral gegen Lackmus u. Phenolphthalein, alkal. gegen Methylorange oder Brom-
phenolblau; Ndd. mit Ca- oder Hg-Salzen entstehen nur nach dem Kochen. —
Disalicylatodiäthylendiamminkobaltisalicylat, $C_{25}H_{31}O_9N_4Co = [en_2Co(C_7H_5O_3)] \cdot$
 $C_7H_5O_3$, hellviolettrote Nadeln, unl. in W., mit $FeCl_3$ purpurrote Färbung, mit w.
 HNO_3 keine Grünfärbung; durch sd. konz. HCl Spaltung in Salicylsäure u. trans-
Dichlorodiäthylendiamminkobaltichlorid. (Journ. Chem. Soc. London 125. 1996 bis
2004. 1924. Edgbaston, Univ. of Birmingham.)


HABERLAND.

Karl Thomas und Fritz Bettzieche, Über die Einwirkung von Grignard-
VII. 1.

reagens auf Aminosäuren. I. Aus Aminosäureestern u. RMgX entstehen tert. Aminoalkohole. Vorteilhafter geht man von den Esterchlorhydraten aus, der Mehrverbrauch an RMgX — man nimmt zwischen 5 u. 9 Mol. — spielt keine Rolle. Die leichter l. Aminoalkohole werden zweckmäßig als N-Benzoylverb. isoliert. — 2-Amino-1,1-diphenyläthanol-(I), $\text{C}_{14}\text{H}_{15}\text{ON} = \text{CH}_2(\text{NH}_2) \cdot \text{C}(\text{OH})(\text{C}_6\text{H}_5)_2$. 1. Aus Glykokolläthylester u. $\text{C}_6\text{H}_5\text{MgBr}$. Ausbeute 60%. 2. Aus Glykokoll esterchlorhydrat (I). Ausbeute 68%. Nach Zers. mit verd. HCl Ausfällung mit NH_3 . Rhomb. Nadeln aus W., F. 110–111°, ll. in A., Bzl. — N-Benzoylverb., $\text{C}_{21}\text{H}_{19}\text{O}_2\text{N}$. Nadeln aus A., F. 182°, wl. in Ä. — 2-Amino-1,1-diäthyläthanol-(I). 1. Aus I u. $\text{C}_2\text{H}_5\text{MgBr}$. Die alkal. gemachte Fl. wird mit Dampft dest., das Destillat mit HCl eingedampft. Isolierung des freien Aminoalkohols daraus liefert mit großen Verlusten ein wenig reines Prod. Besser wird das rohe Chlorhydrat übergeführt in die N-Benzoylverb., $\text{C}_{13}\text{H}_{19}\text{O}_2\text{N}$. Ausbeute 58%. Nadeln, F. 104°, ll. in A., zl. in Ä., wl. in Bzl. 2. Aus Glykokollester. Ausbeute an Benzoylverb. 62%. — 2-Amino-1,1-dibenzyläthanol-(I), $\text{C}_{16}\text{H}_{19}\text{ON}$. Aus I u. $\text{C}_6\text{H}_5\text{MgBr}$. Ausbeute 49,2%. Krystalle aus A., F. 115 bis 116°. — 2-Amino-1,1-diphenylpropanol-(I), $\text{C}_{15}\text{H}_{17}\text{ON} = \text{CH}_3 \cdot \text{CH}(\text{NH}_2) \cdot \text{C}(\text{OH})(\text{C}_6\text{H}_5)_2$. 1. Aus Alaninester u. $\text{C}_6\text{H}_5\text{MgBr}$. Ausbeute 59%. 2. Aus Alaninesterchlorhydrat (II). Ausbeute 67%. Blättchen aus A., F. 104–105°, ll. außer in PAe. Chlorhydrat, $\text{C}_{15}\text{H}_{18}\text{ONCl}$, Nadeln aus A., F. 210–215° (Zers.). — 2-Amino-1,1-diäthylpropanol-(I). 1. Aus Alaninester u. $\text{C}_2\text{H}_5\text{MgBr}$. Die alkal. gemachte u. vom $\text{Mg}(\text{OH})_2$ abgesaugte Fl. wird ohne weiteres benzoiliert. N-Benzoylverb., $\text{C}_{14}\text{H}_{21}\text{O}_2\text{N}$. Ausbeute 52%. Rhomb. Nadeln aus A., F. 104–105°, ll. in A., zl. in Ä., Bzl., wl. in W. 2. Aus II. Ausbeute 55%. — 2-Phenyl-2-amino-1,1-diphenyläthanol-(I), $\text{C}_{20}\text{H}_{19}\text{ON}$. Aus Phenylglykokollesterchlorhydrat u. $\text{C}_6\text{H}_5\text{MgBr}$. Isolierung über das Chlorhydrat (F. 234–236°). Ausbeute 72%. Blättchen, F. 154° (korr.), wl. in A., zl. in Ä., ll. in Bzl. — 2-Phenyl-2-amino-1,1-diäthyläthanol-(I), $\text{C}_{12}\text{H}_{19}\text{ON}$. Mit $\text{C}_6\text{H}_5\text{MgBr}$. Ausbeute 65%. Monokline Nadeln, F. 93–95°, ll. außer in W. Chlorhydrat, $\text{C}_{12}\text{H}_{20}\text{ONCl}$, aus A., F. 214–215°. — N-Benzoylverb., $\text{C}_{19}\text{H}_{23}\text{O}_2\text{N}$. Rhomb. Nadeln aus A. + W., F. 173° (korr.), wl. in Ä., Bzl. — 2-Phenyl-2-amino-1,1-dibenzyläthanol-(I), $\text{C}_{22}\text{H}_{23}\text{ON}$. Mit $\text{C}_6\text{H}_5\text{MgBr}$. Ausbeute 61%. Blättchen aus A., F. 125–126° (korr.). — 2-Benzyl-2-amino-1,1-diphenyläthanol-(I), $\text{C}_{21}\text{H}_{21}\text{ON}$. Aus Phenylalaninesterchlorhydrat u. $\text{C}_6\text{H}_5\text{MgBr}$. Ausbeute 69%, F. 144–145° (korr.). Chlorhydrat, $\text{C}_{21}\text{H}_{22}\text{ONCl}$, aus A., F. 227–228° (korr.). — 2-Benzyl-2-amino-1,1-dibenzyläthanol-(I), $\text{C}_{23}\text{H}_{25}\text{ON}$. Mit $\text{C}_6\text{H}_5\text{MgBr}$. Ausbeute 58%. F. 129–130°. — 2-Benzyl-2-amino-1,1-diäthyläthanol-(I). Mit $\text{C}_2\text{H}_5\text{MgBr}$. Gelbliches viscoses Öl, Kp._{16} 145–148°. — N-Benzoylverb., $\text{C}_{20}\text{H}_{25}\text{O}_2\text{N}$. Nadelbüschel, F. 135°, ll. in A., Bzl., wl. in PAe. (Ztschr. f. physiol. Ch. 140. 244–60. 1924.)

LINDENBAUM.

Karl Thomas und Fritz Bettzieche, Über die Einwirkung von Grignardreagens auf Aminosäuren. II. Überführung der 2-Amino-1,1-diphenyläthanol-(I) in 1,1-Diphenyläthanone-(2). (I. vgl. vorst. Ref.). Die vorst. beschriebenen tert. Diphenyl- u. Dibenzylaminole sind gegen Alkali weitgehend beständig, letztere auch gegen Säuren, während erstere von diesen wie die Glykole von STOERMER (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 39. 2288 [1906]) leicht in CO-Verb. umgewandelt werden:




Vielleicht kann die Rk. auch nach Art der Pinakolinumlagerung von MEERWEIN (LIEBIGS Ann. 419. 121; C. 1920. I. 153) erklärt werden, obwohl Radikalwanderung bisher nicht beobachtet wurde. — Diphenylacetaldehyd. Aus 2-Amino-1,1-diphenyläthanol-(I) mit sd. 15%ig. HCl (3 Stdn.). Ausbeute 90%. Azin, $\text{C}_{23}\text{H}_{24}\text{N}_2$, F. 165°. Oxim, $\text{C}_{14}\text{H}_{13}\text{ON}$, F. 118–119°. Beim Arbeiten mit konz. HCl entstehen außer einem zähen Öl sehr wenig N-freie Nadeln unbekannter Natur. — a. Diphenylaceton, $\text{C}_{15}\text{H}_{14}\text{O}$. Aus 2-Amino-1,1-diphenylpropanol-(I) mit 15%ig. HCl

(Dampfbad, 1 Stde.). Anfangs wurde wie bei STOERMER (l. c.) die labile Form, F. 45–46° aus A. + W., mit 81% Ausbeute gewonnen, später nur die stabile Form, F. 60–61°, in welche erstere beim Umkrystallisieren allmählich übergeht. Das Gemisch der beiden Formen sintert bei 45°, ist bei 58–59° klar geschm. u. schm., wieder erstarrt, bei 56–57°. Aus beiden Formen entsteht dasselbe *Oxim*, $C_{15}H_{15}ON$, F. 164°. — *Triphenyläthanon*, $C_{20}H_{16}O = C_6H_5 \cdot CO \cdot CH(C_6H_5)_2$. Aus 2-Phenyl-2-amino-1,1-diphenyläthanol-(1) durch 8-std. Kochen mit gleichen Teilen A. u. 35%ig. HCl. Aus Eg., F. 136°. Ausbeute 75%.

Eine Lsg. von 2-Amino-1,1-diphenyläthanol in konz. H_2SO_4 scheidet allmählich Nadeln des *neutralen Sulfats* ab. Aus A. + Ä., F. 220–222°, ll. in W., A. — Werden dagegen die Lsgg. von 2-Amino-1,1-diphenylpropanol-(1), 2-Phenyl-2-amino-1,1-diphenyläthanol-(1) u. 2-Benzyl-2-amino-1,1-diphenyläthanol-(1) in konz. H_2SO_4 nach längerem Stehen in W. gegossen, so erhält man die betreffenden Ketone: a. Diphenylacetone, Triphenyläthanon u. *Diphenylmethylbenzylketone*, $C_6H_5 \cdot CH_2 \cdot CO \cdot CH(C_6H_5)_2$, Nadeln aus A., F. 71°. — In konz. HNO_3 lösen sich die Diphenylaminole mit schwach brauner Farbe. Mit W. werden ölige Prodd. ausgefällt, die teils aus den entsprechenden Ketonen, teils aus Zersetzungsprodd. (z. B. Benzophenon) bestehen. — Gegen sd. NaOH (bis zu 20%ig.) sind 2-Amino-1,1-diphenyläthanol-(1), -propanol-(1) u. 2-Phenyl-2-amino-1,1-diphenyläthanol-(1) auch in Ggw. von A. sehr beständig. Die letztere Verb. wird zu einem geringen Teil gespalten, es wurden Benzophenon u. Benzoesäure festgestellt. (Ztschr. f. physiol. Ch. **140**. 261–72. 1924.)

LINDENBAUM.

Fritz Bettzieche, Über die Einwirkung von Grignardreagens auf Aminosäuren. III. Desamidierung tertiärer Aminoalkohole durch Eisessig und Natriumnitrit: Überführung in Carbonylverbindungen unter Gruppenwanderung. (II. vgl. vorst. Ref.). Die Literaturangaben über die aus Aminoalkoholen vom Typus $CHR(NH_2) \cdot CR_2(OH)$ u. HNO_2 entstehenden Prodd. sind vielfach unrichtig. Vf. haben verschiedene Diphenylaminole in Eg. mit konz. $NaNO_2$ -Lsg. behandelt u. festgestellt, daß dabei *Desoxybenzoin* u. seine Derivv. gebildet werden. — Das Prod. aus 2-Amino-1,1-diphenyläthanol-(1) ist nicht, wie PAAL u. WEIDENKAFF (Ber. Dtsch. Chem. Ges. **39**. 2062 [1906]) annehmen, ident. mit dem a. Diphenyläthylenoxyd, sondern mit *Desoxybenzoin*. — 2-Phenyl-2-amino-1,1-diphenyläthanol-(1) gibt *Triphenyläthanon*, früher als Triphenylvinylalkohol aufgefaßt (vgl. MC KENZIE u. RICHARDSON, Journ. Chem. Soc. London **123**. 79; C. **1923**. I. 925). — Aus 2-Amino-1,1-diphenylpropanol-(1) entsteht *Methyldesoxybenzoin*, $C_6H_5 \cdot CH(CH_3) \cdot CO \cdot C_6H_5$, aus A. + W., F. 51–52°. Daß dieses nicht das Einw.-Prod. von HNO_2 auf β -Oxy- α,β -diphenylpropylamin ist, sondern das isomere a. Diphenylacetone, wurde inzwischen von MC KENZIE u. ROGER (Journ. Chem. Soc. London **125**. 844; C. **1924**. II. 37) berichtigt. — Das Prod. aus 2-Benzyl-2-amino-1,1-diphenyläthanol-(1) ist nicht, wie MC KENZIE u. RICHARDSON vermuten, Diphenylmethylbenzylketone (vorst. Ref.), sondern ident. mit *Benzyl-desoxybenzoin*, $C_6H_5 \cdot CH(C_6H_5) \cdot CO \cdot C_6H_5$, aus Eg., F. 120–121°. — Die Rkk. verlaufen analog den Pinakolinumlagerungen (MEERWEIN) wie folgt:



Diese Erklärung entspricht der Auffassung von MC KENZIE u. ROGER. (Ztschr. f. physiol. Ch. **140**. 273–78. 1924.)


LINDENBAUM.

Karl Thomas und Fritz Bettzieche, *Über die Einwirkung von Grignard-reagens auf Aminosäuren. IV. Acylaminosäuren.* (III. vgl. vorst. Ref.) Läßt man RMgX auf Chloride oder Ester von *Benzoylaminosäuren* einwirken, so entstehen *Benzoylaminoalkohole*, ident. mit den in der I. Mitt. beschriebenen *N-Benzoylverb.* Die NH -Gruppe ist indifferent gegen RMgX . Ester geben bessere Ausbeuten als Chloride u. sind auch in rohem Zustand verwendbar, die rohen Chloride dagegen nicht oder schlecht. Es wird mit einem großen Überschuß (meist 7–8 Mol.) RMgX gearbeitet. Eine geeignete Apparatur wird beschrieben (Abbildung). Die Methode scheint auch auf Polypeptide u. Peptone übertragbar zu sein. — *2-Benzoylamino-1,2-diäthyläthanol*-(1). 1. Aus reinem Hippurylchlorid (dargestellt aus Hippursäure, PCl_5 u. CH_3COCl , umkrystallisiert aus CH_3COCl) u. $\text{C}_2\text{H}_5\text{MgBr}$. Ausbeute 46%. Nicht umkrystallisiertes Chlorid liefert kein krystallisierbares Prod. 2. Aus reinem oder rohem Hippursäureäthylester. Ausbeute 76 bzw. 57%. 3. Aus Hippursäureester in Anisol statt Ä. (vgl. MAJIMA u. KOTAKE, Ber. Dtsch. Chem. Ges. 55. 3865; C. 1923. I. 323). Ausbeute 81%. — *2-Phenyl-2-benzoylamino-1,1-diäthyläthanol*-(1). 1. Aus rohem Benzoylphenylglykokollchlorid u. $\text{C}_2\text{H}_5\text{MgBr}$. Ausbeute 37%. 2. Aus reinem oder rohem Benzoylphenylglykokollester. Ausbeute 82 bzw. 61%. — *2-Benzoylamino-1,1-diäthylpropanol*-(1). Aus Benzoylalaninester u. $\text{C}_2\text{H}_5\text{MgBr}$. Ausbeute 78%. — *2-Benzoylamino-1,1-diphenyläthanol*-(1). Aus Hippursäureester u. $\text{C}_6\text{H}_5\text{MgBr}$. Ausbeute 63%. — *2-Glycylamino-1,1-diphenyläthanol*-(1)-chlorhydrat, $\text{C}_{16}\text{H}_{19}\text{O}_2\text{N}_2\text{Cl} = \text{HCl}$, $\text{H}_2\text{N} \cdot \text{CH}_2 \cdot \text{CO} \cdot \text{NH} \cdot \text{CH}_2 \cdot \text{C}(\text{OH})(\text{C}_6\text{H}_5)_2$. Aus Glycylglycinesterchlorhydrat u. $\text{C}_6\text{H}_5\text{MgBr}$. Ausbeute 66%. Aus A., F. oberhalb 200° (Zers.).

Unterwirft man die Acylaminoalkohole der Spaltung durch alkoh. NaOH oder alkoh. HCl , so erhält man neben Benzoessäure im 1. Fall Aminoalkohole, im 2. Fall NH_3 u. die betreffende CO -Verb., entsprechend den Ergebnissen der II. Mitt. In beiden Fällen haftet die Benzoylgruppe an den phenylierten Verb. merklich fester als an den äthylierten, erstere eignen sich besser zur Säurespaltung, letztere besser zur Alkalispaltung. Bei der Säurespaltung des 2-Benzoylamino-1,1-diäthyläthanol-(1) wurde ein in Alkali unl. Zwischenprod. erhalten, das sich freiwillig wieder in das Ausgangsprod. zurückverwandelt. Es scheint, als ob Wanderung des Benzoyls vom N an den O vorläge. — Die Grignardierung der Acylaminosäureester u. Spaltung (sauer oder alkal.) der gebildeten Acylaminoalkohole kann auch ohne Isolierung letzterer in einem Arbeitsgang ausgeführt werden. (Ztschr. f. physiol. Ch. 140. 279–98. 1924. Leipzig, Univ.)

LINDENBAUM.

Fritz Eisenlohr und Leo Schulz, *Über den molekularen Brechungskoeffizienten.* Um den durch v. AUWERS u. KOLLIGS (vgl. Ber. Dtsch. Chem. Ges. 55. 21; C. 1922. I. 450) erhobenen Bedenken gegen die von EISENLOHR (vgl. Ber. Dtsch. Chem. Ges. 54. 299; C. 1921. I. 566) gefundenen Gesetzmäßigkeiten des „molekularen Brechungskoeffizienten“ ($M \times n_D^{20}$) mit neuem Vers.-Material entgegenzutreten, haben Vff. die Reihe der Bzl.-KW-stoffe untersucht. Da v. AUWERS für verschiedene Bzl.-KW-stoffe je nach der Art der Darst. recht auseinandergehende E -Werte (Überschuwerte der gefundenen Zahlengrößen für den Ausdruck $M \times n_D^{20}$ gegenüber den durch Summation errechneten Werten) gefunden hat, glauben Vff. annehmen zu müssen, daß ein Teil der Präparate nicht einheitlich war. Die Darst. einwandfreier Präparate war daher erste Vorbedingung, die Ergebnisse vergleichen zu können. Aromat. KW-stoffe werden in sehr reiner Form nach der Methode von WOLFF durch Zers. von Semicarbazonen der Aldehyde u. Ketone mit Na -Äthylat gewonnen:




Mit diesen Standardpräparaten konnten die anderen zu den Verss. benötigten Präpp., die durch Hydrierung nach PAAL oder mittels Einw. von Na u. Alkohol

erhalten wurden, verglichen werden. Die neu gefundenen *E*-Mittelwerte für *o*, *m*- u. *p*-Methyläthylbenzol sind: +1,01, +0,92, +0,66; für *o*-, *m*- u. *p*-Methylpropylbenzol: +1,72, +0,99, +0,72; für *o*-, *m*- u. *p*-Methylisopropylbenzol: +1,67, +0,93, +0,69. Sie werden mit den älteren von v. AUWERS gefundenen Angaben verglichen. Verzweigung der Seitenkette übt nach Ansicht der Vff. keinen Einfluß auf die Erniedrigung des *E*-Wertes aus. Die Länge der Seitenketten (von der Sonderstellung des Methyls abgesehen) gibt sich im *E*-Wert zu erkennen, wie für die Substituenten $R = n\text{-C}_6\text{H}_{15}$, $n\text{-C}_8\text{H}_{17}$, $n\text{-C}_{16}\text{H}_{33}$, sek.-Amyl u. tert.-Amyl erwiesen ist. Die Beziehung zwischen Länge der Kette (Mol. Gew. des Substituenten) u. dem *E*-Wert gibt für den Quotienten $E/\text{Mol.-Gew.}_R$ eine stetig fallende Reihe (sek.- $\text{C}_5\text{H}_{11} = 1,01$, tert.- $\text{C}_6\text{H}_{13} = 0,85$, $n\text{-C}_7\text{H}_{15} = 0,8$, $n\text{-C}_8\text{H}_{17} = 0,77$, $n\text{-C}_{16}\text{H}_{33} = 0,68$); für den Quotienten aus *E* u. dem Mol.-Gew. der ganzen Verb. erhält man jedoch für diese Reihe nahezu konstante Größen von $R = \text{sek.-C}_5\text{H}_{11}$ ab, was auf ein stetes Anwachsen von *E* von einer bestimmten Größe des Substituenten ab deutet. Für die niederen Glieder bleiben die früher ausgesprochenen Gesetzmäßigkeiten in Geltung. Der Brechungsexponent läßt sich im Zusammenhang mit den früher gefundenen Substitutionseinflüssen für die hier besprochenen KW-stoffe voraus berechnen. Für das Isodurool (1,3,4,5-Tetramethylbenzol) wurde *E* zu +3,31 Einheiten gefunden. Die Nachprüfung dieses Wertes mit den früheren Substitutionsregeln ergab je nach dem gewählten Weg zwei verschiedene rechnerische Größen. Für den Spezialfall, daß eine Methylgruppe in Di-ortho, bzw. Di-meta-Stellung eintritt, ist jeweils ein um 0,3 Einheiten verminderter Wert einzusetzen. Bei fehlender *p*-ständiger Gruppe tritt diese Sonderregel nicht in Kraft.

Versuche: Äthylbenzol, C_8H_{10} , Darst. aus dem Semicarbazol des Acetophenons mit Na-Äthylat im Autoklaven während $7\frac{1}{2}$ Stdn. bei 195–205°. Kp. 135–136°. *E* = +0,32. Ausbeute 40%. — *n*-Heptylbenzol, $\text{C}_{13}\text{H}_{20}$. Aus dem Semicarbazol des Hexylphenylketons (F. 119°), Kp. 145–145,2°; *E* = +0,80, die Zers. des Semicarbazons erfolgte in diesem Falle wie bei den folgenden KW-stoffen durch 8–10-std. Erhitzen auf 200–210° unter Verwendung von über Ca dest. A. Das Äthylat wurde im Glasrohreinsatz des Autoklaven unter Abschluß von Luftfeuchtigkeit hergestellt u. hierzu das Semicarbazol gegeben. — *n*-Octylbenzol, $\text{C}_{14}\text{H}_{22}$, Benzylchlorid u. Önanthaldehyd wurden zu Heptylphenylcarbinol (Kp.₁₅ 162–166°) kondensiert, dieser zu Heptylphenylketon (Kp.₁₅ 164–166°) oxydiert. Das Semicarbazol (F. 202°) liefert nach der Zers. das *n*-Octylbenzol, Kp. 264–265°, *E* = +0,87. — Cetylbenzol, $\text{C}_{22}\text{H}_{38}$, Kp. 235–237°, *E* = +1,54. — *o*-Äthyltoluol, C_9H_{12} ; die als Ausgangsmaterial für die disubstituierten Bzl-KW-stoffe dienenden drei Bromtoluole wurden nach FITTIG u. GLINZER (LIEBIGS Ann. 169. 5 [1874]) dargestellt. Durch 5-maliges Ausfrieren der *o*-*p*-Mischung wurde das reine *p*-Bromtoluol erhalten. Der Rückstand wurde mit trockenem Bzl. versetzt u. 10 Tage über Na stehen gelassen. Nach endgültiger Rektifikation dest. das reine *o*-Bromtoluol bei 181–182°. Mit Acetaldehyd lieferte das *o*-Bromid zunächst Methyl-*o*-tolylcarbinol (I) (Kp.₂₀ 107,8–108°), das zum Keton (Kp.₁₀ 89–92°) oxydiert wurde. Aus dem Semicarbazol (F. 177 bis 178°) wurde das *o*-Äthyltoluol vom Kp. 163,7–163,9° gewonnen, *E* = +1,6. — Styrol, durch Dest. von I über Kaliumpyrosulfat, Kp. 162,5°, *E* = +1,62. — *m*-Äthyltoluol, C_9H_{12} , Äthyl-*m*-tolylcarbinol (Kp.₂₅ 115°) wurde zum Keton oxydiert (Kp.₃₀ 127,5–128,0°). Aus dem Semicarbazol (F. 190°) wurde der KW-stoff gewonnen, Kp. 159,2–159,8°; *E* = +0,92. — *p*-Äthyltoluol, C_9H_{12} , aus Methyl-*p*-tolylketonsemicarbazol (F. 202°) u. Na-Äthylat; Kp. 159,5–160,0°; *E* = +0,71. Über das bei 172–175° sd. Styrol dargestellt, zeigt der KW-stoff Kp. 159–160°; *E* = +0,61°. — *o*-Propyltoluol, $\text{C}_{10}\text{H}_{14}$, aus Äthyl-*o*-tolylcarbinol (Kp.₂₅ 128–129°) über Äthyl-*o*-tolylketon (Kp.₁₅ 107°) u. dessen Semicarbazol (F. 107°); Kp. 180,5–181,5°; *E* = +1,67. Über das dem Alkohol entsprechende Styrol dargestellt: Kp. 180,5 bis

181,5°; $E = +1,77$. — *m*-Propyltoluol, $C_{10}H_{14}$, aus dem Semicarbazon des Äthyl-*m*-tolylketons (F. 162—163°); Kp. 176,5—177,5°; $E = +0,99$. — *p*-Propyltoluol, $C_{10}H_{14}$, aus dem Semicarbazon des Äthyl-*p*-tolylketons (F. 185°); Kp. 179,5—180,0°; $E = +0,72$. — *o*-Cymol, $C_{10}H_{14}$, Dimethyl-*o*-tolylcarbinol (Kp.₁₀ 102—103°) wurde in das entsprechende Styrol (Kp. 183—185°) übergeführt. Der hieraus durch Anlagerung von H_2 mittels Na u. absol. A. oder kolloidem Pd u. H erhaltene KW-stoff zeigt nach dem ersten Weg der Darst.: Kp. 174,5—175,5°; $E = +1,60$; nach dem zweiten Weg: Kp. 175°; $E = +1,74$. — *m*-Cymol, $C_{10}H_{14}$, aus Dimethyl-*m*-tolylcarbinol (Kp.₁₅ 107—108°) u. dem entsprechenden Styrol (Kp. 182—184°). Hydrierung nach PAAL liefert den KW-stoff mit Kp. 174,5—175,5°; $E = +0,95$; mit absol. A. u. Na red.: Kp. 174,5—175,5°; $E = +0,91$. — *p*-Cymol, $C_{10}H_{14}$, aus dem Semicarbazon des *p*-Cuminaldehyds (F. 237—238°), Kp. 176,0—176,5, $E = +0,64$ u. 174,5—175,0°; $E = +0,63$. Aus Dimethyl-*p*-tolylcarbinol (Kp.₁₀ 102—103°) über das entsprechende Styrol (Kp. 183—184°) nach Hydrierung mit Pd- H_2 : Kp. 175,5—176,5°; $E = +0,76$; nach Hydrierung mit Na u. abs. A.: Kp. 174,4—174,8°; $E = +0,72$. — *o*-Heptyltoluol, $C_{14}H_{22}$, aus Hexyl-*o*-tolylcarbinol (Kp.₁₇ 169—170°) über das Hexyl-*o*-tolylketon (Kp.₁₇ 154—156°) u. dessen Semicarbazon (F. 98°): Kp. 263,0—263,2°; $E = +2,75$. — *m*-Heptyltoluol, $C_{14}H_{22}$, aus Hexyl-*m*-tolylcarbinol (Kp.₁₂ 165—170°) über das Hexyl-*m*-tolylketon (Kp.₁₆ 153—157°) u. dessen Semicarbazon (F. 118°): Kp. 260,0—260,8°; $E = +2,01$. — *p*-Heptyltoluol, $C_{14}H_{22}$, aus Hexyl-*p*-tolylcarbinol (Kp.₁₇ 172°, F. 121°) über Hexyl-*p*-tolylketon (F. 43,8—44,0) u. dessen Semicarbazon (F. 135°): Kp. 265,0 bis 265,2°; $E = +1,71$. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 57. 1808—20. 1924.) HORST.

Alexander McGookin und Isidor Morris Heilbron, *Die Isomerie der Styrylalkylketone*. I. Die Isomerie von 2-Oxystyrylmethylketon. Das Keton existiert in einer gelben u. farblosen Form; der letzteren hat man auf Grund ihres Verh. Konst. I zugeteilt u. die Isomerie auf Ringkettentautomerie zurückgeführt. I müßte beim Methylieren einen Äther geben; durch sd. CH_3OH konnte der Äther nicht erhalten werden, er entstand aus der farblosen Form nur mit $(CH_3)_2SO_4$ u. erwies sich als ident. mit dem aus der gelben Form zu erhaltenden Ä.; daß die farblose Form auch die CO-Gruppe enthält, ergibt sich aus der B. eines Oxims, Semicarbazons u. Phenylhydrazons; diese Derivv. sind gleichfalls ident. mit den aus der gelben Form dargestellten. Das von HEILBRON u. WHITWORTH (Journ. Chem. Soc. London 123. 238; C. 1923. I. 1220) dargestellte β -Oxy- β -3-methoxy-2-oxypheyläthylmethylketon kann keine cis-trans-Isomerie zeigen, kann aber ein Pyranolderiv. bilden; es gelang unter keinen Umständen, aus dieser Verb. eine farblose Form zu erhalten. Die Isomerie beider 2-Oxystyrylmethylketone muß daher eine cis-trans-Isomerie sein. Farblose Modifikationen konnten auch erhalten werden von 5-Brom-2-oxystyrylmethylketon u. 3-Methoxy-4-oxystyrylmethylketon. — Wird eine Lsg. der gelben Form des 2-Oxyketons in A. mit alkoh. C_2H_5ONa behandelt, so tritt die bekannte Rotfärbung auf; durch fraktionierte Fällung mit Chlf. wurde hieraus zunächst das Na Salz des 2,2'-Dioxydistyrylketons als dunkelrote Krystalle erhalten. Das Filtrat gibt bei erneuter Zugabe von Chlf. orangefarbene Krystalle, die nach Ansäuern das farblose Isomere des 2-Oxymethylketons gaben; das Filtrat von den orangefarbenen Krystallen wurde nochmals mit Chlf. versetzt u. gab ein goldgelbes u. hellgelbes Na-Salz; das erstere lieferte das farblose Isomere, letzteres Salicylaldehyd beim Ansäuern. Das V. dieses Aldehyds ist nur darauf zurückzuführen, daß die gelbe Form teilweise unter dem Einfluß des Alkalis in Salicylaldehyd u. Aceton gespalten wird; beide kondensieren sich dann zu dem Distyrylketon. Ob das orangefarbene Salz dem gelben Isomeren entspricht ist ungewiß. Sicher ist jedoch auf Grund der vorliegenden Unterss., daß 2-Oxystyrylmethylketon ein Gemisch der beiden Isomeren ist; die gelbe labile cis-Form zerfällt bei Einw. von Alkali, die farblose trans-Form bildet in w. alkal. Lsg. 2,2'-Dioxydistyrylketon.



Versuche. Farbloses (*trans*)-2-Oxystyrylmethylketon


Darst. aus der gelben Form nach dem Verf. von BUCK u. HEILBRON (Journ. Chem. Soc. London **121**. 1095; C. **1922**. III. 1340); außer Gentisinaldehyd wurden Protocatechualdehyd u. Vanillin benutzt, letzteres gab die beste Aus-

beute u. das reinste Prod. Die Darst. gelingt auch durch Kochen von Lsgg. der gelben Form in Bzl., Toluol, Amylalkohol, Acetessigester in Ggw. von wenig HCl; wss. Lsgg. der gelben Form scheiden nach dem Kochen ein Öl ab, von dem die Lsg. dekantiert wird; aus dieser prismat. schwach grün gefärbte Krystalle, die aus Bzl. farblos krystallisieren; wird eine alkoh. Lsg. der gelben Form mittels einer Quarz-Hg-Lampe belichtet, so entsteht ebenfalls die farblose Form. Wird diese in überschüssigem Alkali gel., so entsteht keine Färbung; beim Erhitzen tritt die rote Farbe des Na-Salzes des Dioxydistyrylketons auf; das Salz krystallisiert beim Abkühlen in grünen Krystallen aus. — 2,2'-Dioxydistyrylketon aus 4 g der farblosen Form + 3 g Salicylaldehyd + 30 ccm 10%ig. NaOH; nach 3-tägigem Stehen mit verd. HCl neutralisieren; Nd. aus Bzl. F. 159°; aus dem neutralen Filtrat scheidet sich nach längerem Stehen *Diphenospiropyran* als dunkelgrüne Krystalle ab, F. 100°. — *Oxim* der beiden Formen des 2-Oxystyrylmethylketons aus Bzl. Nadeln, F. 84°. — *Phenylhydrazon*, aus Bzl. hellgelbe Krystalle, F. 159°. Wird aus sd. A. umkrystallisiert, so entsteht 1-Phenyl-5-o-oxypheyl-3-methylpyrazolin, grünlich gelbe Krystalle, F. 147–148°. — 2-Methoxystyrylmethylketon (farblos) aus dem farblosen Isomeren mittels $\text{CH}_3\text{J} + \text{Ag}_2\text{O}$, besser durch Kochen des Na-Salzes in CH_3OH mit CH_3J ; aus A. F. 50°. — Na-Salz des gelben 2-Oxystyrylmethylketons; 14 g des gelben Isomeren in absol. A. + $\text{C}_2\text{H}_5\text{ONa}$ wurden mit Chlf. versetzt (vgl. oben). Sowohl die gelben als die orangefarbenen Krystalle, die sich nach Entfernung des Na-Salzes des Dioxydistyrylketons abscheiden, geben gelbe Lsgg. in W. Wird die Lsg. des orangefarbenen Salzes angesäuert, so entsteht ein gelber Nd. (cis-Form des Ketons), der sofort farblos wird; das orange Salz entspricht der cis-Form. — Na-Salz der farblosen Form aus 7 g des farblosen Isomeren in A. + $\text{C}_2\text{H}_5\text{ONa}$ (= 1 g Na) u. Zugabe von Chlf.; goldgelbe Krystalle. — 5-Brom-2-oxystyrylmethylketon, $\text{C}_{10}\text{H}_9\text{O}_2\text{Br}$, aus der gelben Form mittels der oben genannten Aldehyde; farblose Nadeln, F. 154°. — 3-Methoxy-4-oxystyrylmethylketon, farblose Nadeln, aus der gelben Modifikation wie vorige dargestellt; F. 129°. — 4,5-Methylendioxydistyrylmethylketon, Darst. nach HABER (Ber. Dtsch. Chem. Ges. **24**. 617 [1891]); sowohl die gelbe Form (aus A.) als auch die farblose Form (aus W.) haben F. 110–111°. (Journ. Chem. Soc. London **125**. 2099–2105. 1924. Liverpool, Univ.)

HABERLAND.

Isidor Morris Heilbron und Thomas Alfred Forster, Die Einwirkung von Acetessigester auf o-Oxydistyrylketone. (Vgl. FORSTER u. HEILBRON, Journ. Chem. Soc. London **125**. 340; C. **1924**. I. 2366.) Es wurden die aus dem Ester u. 2,2'-Dioxydistyrylketonen bzw. deren Mono- u. Dimethyläthern entstehenden Reaktionsprodd. untersucht. 2,2'-Dimethoxydistyrylketon reagiert in Ggw. von 10%ig. NaOH mit Acetessigester unter B. des Äthylesters der 3-o-Methoxyphenyl-5-o-methoxystyryl-Δ⁵-cyclohexen-1-on-2-carbonsäure (I). — 2,2'-Dioxydistyrylketon gab bei analoger Behandlung das Dihydrocumarinderiv. II u. das Cyclohexenonderiv. III. Die Konst. dieser Verb. ergab sich daraus, daß mit konz. H_2SO_4 Rotfärbung eintrat, eine, wie BORSCHÉ (LIEBIGS Ann. **375**. 145; C. **1910**. II. 1055) gezeigt hat, für Cyclohexenone charakterist. Rk., u. daß durch Methylieren ein Dimethyläther erhalten wurde, der ident. war mit dem aus IV durch Abspalten von CH_3CO erhaltenen Prod. — Aus 2'-Methoxy-2-oxydistyrylketon + Acetessigester entstehen Verbb. V u. VI, die durch Methylieren mit I u. III ident. Prodd. geben. Bemerkenswert ist, daß bei der Rk. mit 2,2'-Dioxydistyrylketon die $\text{CO}_2\text{C}_2\text{H}_5$ -Gruppe abgespalten wird, während sie bei der Rk. mit dem Dimethoxyderiv. intakt bleibt. Vff. nehmen an, daß in den

Fällen, in denen die Addition an einen o-OH-haltigen Styrylrest stattfindet, durch Abspaltung von C_2H_5OH sich zunächst ein Cumarinderiv. bildet; im Falle der 2,2'-Dioxyverb. müßte demnach VII als Zwischenprod. entstehen; die Isolierung von II bei dieser Rk. spricht für diese Annahme. Durch überschüssiges Alkali würde der Ring in VII geöffnet werden u. durch Abspaltung von CO_2 aus der so gebildeten β -Ketosäure würde das Diketon VIII entstehen, das durch Abgabe von H_2O in III umgewandelt wird. Verb. VII zu isolieren ist bisher noch nicht gelungen, da die β -Acetylgruppe sehr unbeständig ist. Als Stütze für diese Annahme kann jedoch die l. c. erwähnte B. des analog konstituierten 3-Acetyl-4-phenacyldihydrocumarins bei Einw. von Acetessigester auf 2-Oxystyrylphenylketon angesehen werden. Das Diketon VIII könnte auch in der tautomeren Enolform reagieren u. so zur B. von Benzo- γ -pyranen Veranlassung geben (vgl. l. c.); daß aus o-Oxydistyrylketonen u. ihrem Monomethyläther vorzugsweise Cyclohexenonderivv. entstehen, erklärt sich aus der großen Reaktionsfähigkeit der mit einer α,β -Äthylenbindung verbundenen CO-Gruppe.




Versuche. 3-o-Oxyphenyl-5-o-oxystyryl- Δ^5 -cyclohexen-1-on, $C_{20}H_{18}O_3$ (III), aus 1 Mol 2,2'-Dioxydistyrylketon + 1,5 Mol Acetessigester + 3 Mol NaOH in W.; das sich eventuell abscheidende Na-Salz wird bei 0° durch verd. Essigsäure zers.; nach dem Ansäuern scheidet sich zunächst II ab, aus dem Filtrat bei Zugabe von W. III; aus CH_3OH hellgelbe Prismen mit 1 Mol CH_3OH , das im Dampftrockenschrank abgegeben wird; F. 240°; mit konz. H_2SO_4 Rotfärbung. — 4-o-Oxystyryacyldihydrocumarin, $C_{16}H_{16}O_4$ (II), aus Aceton Krystalle mit F. 235°; mit konz. H_2SO_4 nur schwache Gelbfärbung; Methyläther, $C_{20}H_{18}O_4$, aus PAe. Prismen, F. 130°. — 3-o-Methoxyphenyl-5-o-methoxystyryl- Δ^5 -cyclohexen-1-on, $C_{22}H_{22}O_3$, durch Methylieren von III; aus PAe. federartige Nadeln, F. 128°. — 2,2'-Dimethoxydistyrylketon, $C_{19}H_{18}O_3$, aus dem Dioxyketon durch Methylieren; aus A. (worin wl.) gelbe Tafeln, F. 127°. — Äthylester der 3-o-Methoxyphenyl-5-o-methoxystyryl- Δ^5 -cyclohexen-1-on-2-carbonsäure, $C_{25}H_{26}O_5$ (I), aus Lg. hellgelbe Nadeln, F. 159°, unl. in A., ll. in Bzl.; Lsg. in konz. H_2SO_4 karminrot. Die $CO_2C_2H_5$ -Gruppe war weder durch Säuren noch Alkalien abspaltbar. — 3-o-Oxyphenyl-5-o-methoxystyryl- Δ^5 -cyclohexen-1-on (VI), aus A., danach öfter aus Bzl. + PAe. umkrystallisiert hellgelbe Nadeln, F. 172°; Lsg. in NaOH gelb, in konz. H_2SO_4 karminrot. — Äthylester der 3-o-Methoxyphenyl-5-o-oxystyryl- Δ^5 -cyclohexen-1-on-2-carbonsäure, $C_{24}H_{24}O_5$ (V), aus dem bei Darst. von VI erhaltenen alkal. Filtrat durch W. u. Ansäuern; aus CS_2 gelbe Prismen, F. 159–161°; Lsg. in Alkali gelb, in konz. H_2SO_4 tief rot. — 2-Acetyl-3-o-methoxyphenyl-5-o-methoxystyryl- Δ^5 -cyclohexen-1-on, $C_{14}H_{24}O_4$ (IV), aus 2,2'-Di-

methyldistyrylketon + Acetylaceton + NaOH in A.; aus A., danach aus Bzl.-Lsg. hellgelbe Prismen, F. 174°. (Journ. Chem. Soc. London 125. 2064—68. 1924. Liverpool, Univ.)

HABERLAND.

Heinrich Rheinboldt und **Hans Roleff**, *Über den Mechanismus der Grignard-schen Reaktion*. Auf Grund der unter gewissen Bedingungen eintretenden Red. von Benzaldehyd zu Benzylalkohol durch C_2H_5MgI unter Abspaltung von C_2H_4 waren HESZ u. RHEINBOLDT (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 54. 2043; C. 1921. III. 1347) zu einer Formulierung der Grignard-Rk.-Prodd. als Mol.-Verbb. gemäß I. gelangt. Die Richtigkeit dieser Auffassung läßt sich mittels derselben Rk. auf zweierlei Weise beweisen. — 1. Da C_6H_5MgX erfahrungsgemäß keine Red.-Wrkg. ausübt, so führt man die Rkk. III. u. IV. nebeneinander aus, wobei R' ein zur Olefinabspaltung be-



fähigtes Radikal bedeutet. Nach der alten Auffassung gemäß II. wären dieselben Additionsprodd. u. also auch derselbe Rk.-Verlauf zu erwarten. Es wurden nach III. Benzaldehyd mit *i*-Butyl-MgBr, Benzophenon mit Cyclohexyl-MgCl bzw. *i*-Butyl-MgBr, nach IV. *i*-Valeraldehyd, Phenylcyclohexylketon u. *i*-Butylphenylketon mit C_6H_5MgBr zur Einw. gebracht. In den Fällen III. trat starke, teilweise quantitative Red. ein, während in den Fällen IV. außer den n. Rk.-Prodd. (sek. bzw. tert. Carbinol) kein Red.-Prod. (Benzylalkohol bzw. Benzhydrol) nachgewiesen werden konnte, ganz gleich ob in sd. Ä. oder Bzl. gearbeitet wurde. Da sogar bei der Einw. von Cyclohexyl-MgCl auf Phenylcyclohexylketon kein Benzylalkohol gebildet wird, so ist zu schließen, daß eine Sprengung der C-Kette nur eintritt, wenn R' an Mg gebunden ist, d. h. nach I. — 2. Die Halogenmagnesiumalkoholate der Formel II. lassen sich bekanntlich durch Einw. von Grignardreagens auf Carbinole darstellen. So wurden die aus *i* Butylphenylcarbinol, Phenylcyclohexylcarbinol u. Diphenylcyclohexylcarbinol mit C_6H_5MgBr erhaltenen Rk.-Prodd. in Ä. bzw. Bzl. gekocht. In keinem Fall wurde Gasentw. beobachtet oder Red.-Prod. (Benzaldehyd bzw. Benzhydrol) nachgewiesen, vielmehr wurde das Carbinol fast quantitativ zurückgewonnen. Die Verbb. II. sind also von den isomeren (nach Rk. III. dargestellten) Grignard-Rk.-Prodd. I. durchaus verschieden (vgl. auch HESZ u. WUSTROW, LIEBIGS Ann. 437. 256; C. 1924. II. 324). — Die Verss. stützen die Annahme von $HMgX$, gebildet durch Abspaltung von Olefin aus $R'MgX$, als Ursache der Redd. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 57. 1921—25. 1924. Bonn, Univ.)

LINDENBAUM.

N. Zelinsky und **E. Rjachina**, *Ketonisierung der Naphthensäuren mit Hilfe der Katalyse*. (Vgl. ZELINSKY u. POKROWSKAJA, Ber. Dtsch. Chem. Ges. 57. 42; C. 1924. I. 654.) Da die Umwandlung von Naphthensäuren $C_nH_{2n-1} \cdot COOH$ in Ketone $C_nH_{2n-1} \cdot CO \cdot CH_3$ durch trockene Dest. von Gemischen von Ca- oder Ba-Salzen der Naphthensäuren u. Essigsäure sich nicht durchführen ließ, benutzten Vff. die Methode von SENDERENS (vgl. Ann. Chim. et Phys. [8] 28. 243; C. 1913. I. 1498) zur Darst. von Ketonen mittels Th- bzw. Zr-Oxyd-Katalysatoren; auch das von SABATIER u. MAILHE (vgl. C. r. d. l'Acad. des sciences 158. 830; C. 1914. I. 1640) verwandte Manganoxydul erwies sich als vorzüglicher Katalysator für diese Zwecke. Als Ausgangsmaterial benutzten Vff. die von KW-stoffen gereinigten Kerosinsäuren des Erdöls aus Balachany (Kaukasus), das 0,0048% davon enthält.

Naphthensäuren vom Kp. 235—250° wurden mit einem großen Überschuß von Essigsäure der Katalyse über Manganoxydul unterworfen. Durch Umkrystallisieren u. Zers. der Bisulfitverbb. erhielten Vff. eine Reihe von Ketonfraktionen. Verb. $C_7H_{12}O$, Kp. 177—184°. — Semicarbazon, aus wss. Methylalkohol, F. 105—107°. —

Verb. $C_9H_{16}O$, Kp. 184—190°, D_{15}^{14} 0,8836, $n_D^{15} = 1,4385$, Mol.-Refr. 41,62, theoret. 41,61. — *Semicarbazon*, aus wss. Methylalkohol, F. 135°. — Verb. $C_9H_{16}O$, Kp. 204 bis 207°, D_{15}^{14} 0,8921, $n_D^{15} = 1,4429$, Mol.-Refr. 41,65. — *Semicarbazon*, aus wss. Methylalkohol, F. 142°. — Verb. $C_{10}H_{18}O$, Kp. 210—212°, D_{14}^{21} 0,8861, $n_D^{21} = 1,4441$, Mol.-Refr. 46,20, theoret. 46,21. — *Semicarbazon*, aus wss. A., F. 140°. — Fraktion 212—215°, D_{20}^{20} 0,8892, $n_D^{20} = 1,4454$, Mol.-Refr. 46,15. — *Semicarbazon*, aus wss. A., F. 129°. — Diese Ketone lassen sich von den Naphthensäuren $C_{10}H_7\cdot COOH$, $C_7H_{13}\cdot COOH$ u. $C_8H_{15}\cdot COOH$ ableiten, die allgemeine Formel der Ketone wäre dann: $C_nH_{2n-1}\cdot CO\cdot CH_3$. Das Keton $C_5H_9\cdot CO\cdot CH_3$ ist ein Deriv. eines einfacheren Ringsystems als Cyclohexan, das der Hexahydrobenzoesäure entsprechende Keton ist nicht gefunden worden. Die Ketone $C_7H_{13}\cdot CO\cdot CH_3$ u. $C_8H_{15}\cdot CO\cdot CH_3$ stellen ein Gemisch von Isomeren anderer Ringsysteme als des Cyclohexans dar.

Durch Red. der Ketone der Fraktionen 210—212° u. 212—215° mit Na in W.-haltigem Ä. wurde ein Alkohol $C_{10}H_{20}O$ erhalten, Kp.₂₀ 111—113°, D_{21}^{21} 0,8849, $n_D^{21} = 1,4526$, Mol.-Refr. 47,69. — Jodid daraus, Kp.₂₂ 128—130°. — *Dekanaphthen-KW-stoffe* $C_{10}H_{20}$, aus dem Jodid durch Einw. von Zn u. wss. A., Kp. 162—171°; 1. Fraktion 162—165°: D_{20}^{20} 0,7872, $n_D^{20} = 1,4315$, Mol.-Refr. 46,08; 2. Fraktion 168—171°: D_{24}^{21} 0,7891, $n_D^{21} = 1,4330$, Mol.-Refr. 46,07. Mol.-Gew.-Best. ergab 142 (berechnet für $C_{10}H_{20}$: 140). — Die Ketone, die mit $NaHSO_3$ keine Verbb. gaben, wurden ebenfalls fraktioniert. Verb. $C_9H_{16}O$, Kp. 190—193°, D_{20}^{20} 0,8855, $n_D^{20} = 1,4416$, Mol.-Refr. 41,79. — *Semicarbazon*, aus wss. Methylalkohol, F. 125°. — Fraktion 200—202°, *Semicarbazon*, F. 133°. — Fraktion 202—205°, D_{20}^{20} 0,8863, $n_D^{20} = 1,4438$, Mol.-Refr. 41,95. — *Semicarbazon*, F. 130°. — Verb. $C_9H_{16}O$, Kp. 205 bis 207°, $D_{13,5}^{13,5}$ 0,8880, $n_D^{13,5} = 1,4429$, Mol.-Refr. 41,84. — *Semicarbazon*, F. 127°. — Verb. $C_{10}H_{18}O$, Kp. 207—210°, D_{23}^{23} 0,8876, $n_D^{23} = 1,4433$, Mol.-Refr. 46,09. — *Semicarbazon*, F. 121°. — Verb. $C_{11}H_{20}O$, Kp. 212—215°, D_{20}^{20} 0,8869, $n_D^{20} = 1,4454$, Mol.-Refr. 50,49. — *Semicarbazon*, F. 125°. — Fraktion 220—222°. — Verb. $C_{12}H_{22}O$, Kp. 222—225°, D_{20}^{20} 0,8911, $n_D^{20} = 1,4511$, Mol.-Refr. 55,08. — *Semicarbazon*, F. 114°. — Fraktion 230—235°, D_{15}^{15} 0,9003. — *Semicarbazon*, F. 116°. — Die Fraktion 190—207° ist auf Naphthensäuren $C_7H_{13}\cdot COOH$ zurückzuführen, Fraktion 207—210° auf $C_8H_{15}\cdot COOH$, Fraktion 212—215° auf $C_9H_{17}\cdot COOH$, Fraktion 220 bis 235° auf $C_{10}H_{19}\cdot COOH$. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 57. 1932—37. 1924. Moskau, Univ.)

ZANDER.

George Gerald Henderson und Alexander Robertson, *Die Chemie des Cadinens*. I. Es wurde versucht, *Hydroxylderiv.* des Cadinens zu erhalten, durch Lösen von Cadinendichlorhydrat in Eg., Behandeln mit Ag-Acetat u. Hydrolyse. Neben Cadinen wurde hierbei erhalten eine gesätt. Verb. $C_{15}H_{26}O_2$ (I) u. die ungesätt. Verb. $C_{15}H_{26}O$ (II). Verb. I ist vielleicht ein *Glykol*, von dem jedoch Derivv. mit $p\text{-NO}_2\cdot C_6H_4\cdot COCl$, Phthalanhydrid oder $C_6H_5\cdot NCO$ nicht erhalten werden konnten. II geht in Eg.-Lsg. beim Behandeln mit HCl-Gas in Cadinendichlorhydrat über u. wird durch Br in Chlf. in eine unbeständige Verb. $C_{15}H_{25}OBr_3$, anscheinend ein *Bromdibromid*, übergeführt. II ist vermutlich ident. mit *Cadinol*. — Einw. von Hydratationsmitteln auf Cadinen gab keinen Alkohol, sondern einen ungesätt. KW-stoff, den Vff. als *i-Cadinen* bezeichnen; diese Verb. entsteht auch beim Erhitzen von Cadinen mit Eg. u. unterscheidet sich von ihm dadurch, daß sie kein stabiles Dichlorhydrat, sowie kein Nitroschlorid oder Nitrosit bildet. — Aus *Kadeöl* konnten Vff. neben Cadinen ein *Sesquiterpen* isolieren, das mit HCl keine feste Verb. einging; dieses Deriv. hat große Ähnlichkeit mit einem von LEPESCHKIN (Journ. Russ. Phys.-Chem. Ges. 40. 126 [1908]) aus demselben Öl isolierten Sesquiterpen, sowie mit dem aus Cadinen durch Erhitzen mit Eg. erhaltenen Prod.


Versuche. Darst. von Cadinendichlorchlorid: das aus der Fraktion Kp.₁₂ 125 bis 140° des Cubebenöls erhaltene Destillat wird mit $\frac{1}{3}$ Vol. Eg. versetzt u. bei 0° mit

HCl-Gas gesätt. Nach 2-tägigem Stehen bei 0° wird die M. abgesaugt u. aus A. umkrystallisiert; F. 118,5°. — Darst. von *Cadinen*: 60 g des vorigen in 200 g w. Eg. (90°) werden allmählich mit 60 g wasserfreiem Na-Acetat versetzt; nach 4std. Erwärmen wird abgekühlt, mit W. versetzt u. *Cadinen* mit PAe. extrahiert. Kp.₁₁ 134–136°, D.₄²⁰ 0,9189, n_D²⁰ = 1,5079, [α]_{Hg} = –125,2°. — Analog lassen sich das Dichlorhydrat u. *Cadinen* aus der Fraktion Kp.₁₂ 125–140° des Kadeöls darstellen; hieraus erhaltenes *Cadinen* hatte Kp.₁₁ 134–136°, D.₄²⁰ 0,9185, n_D²⁰ = 1,5074, [α]_D = –130,0°. — Verb. C₁₅H₂₈O₂ (*Cadinenglykol*?) aus 25 g *Cadinendichlorhydrat* in 150 g Eg. von 70° durch Zugabe von 35 g Ag-Acetat; nach 1-std. Erwärmen wird AgCl entfernt, das Filtrat mit Na₂CO₃ neutralisiert, das abgeschiedene Öl mit Ä. extrahiert u. mittels methyllalkoh. KOH hydrolysiert. Bei der Wasserdampfdest. gehen *Cadinen* u. Verb. C₁₅H₂₆O über; der Kolbenrückstand wird nach Einleiten von CO₂ mit Ä. extrahiert, hieraus weiße Nadeln oder Prismen, F. 194–195°, Ausbeute 2%; beim Erhitzen über F. Sublimation; die Verb. ist ll. in CH₃OH u. A., wl. in Ä. u. W., unl. in PAe. — Verb. C₁₅H₂₆OH (*Cadinol*?) wird bei Kp.₁₁ 155–160° aus dem Wasserdampfdestillat erhalten; D.₄²⁰ 0,9741, n_D²⁰ = 1,5084; entfärbt verd. KMnO₄- u. Br.-Lsg. — Verb. C₁₅H₂₅OBr₃, hellgelbes Öl, das sich bei mehrstd. Stehen am Licht zu schwarzer teigerer M. zersetzt. — Wird *Cadinendichlorhydrat* in äth. oder alkoh. Lsg. mit Ag-Acetat oder in Ä. mit feuchtem Ag₂O behandelt, so entsteht nur *Cadinen*. — Werden 5 g *Cadinen* in 250 ccm Eg. mit 10 ccm 30%ig. H₂SO₄ 8 Stdn. auf dem Wasserbad erhitzt, so entsteht ein mit Wasserdampf flüchtiger, ungesätt. KW-stoff, Kp.₁₂ 125–128°, D.₄²⁰ 0,9160, n_D²⁰ = 1,5141, der mit Br in Chlf. ein unbeständiges öliges Bromid liefert. Durch 24-std. Erhitzen von 5 g *Cadinen* mit 15 g Eg. auf 230–235° wurde nach Neutralisieren *i-Cadinen*, C₁₅H₂₄, erhalten. Kp.₁₁ 124–126°, D.₄²⁰ 0,9154, n_D²⁰ = 1,5158, [α]_D = –1,0°; an Luft verharzend; KMnO₄-Lsg. wird entfärbt, Br unter Entw. von HBr absorbiert; hierdurch wird ein unbeständiges, öliges Bromid (Verb. C₁₅H₂₃Br₃?) erhalten. — Ein *Sesquiterpen* aus *Kadeöl* wurde erhalten, nachdem das *Cadinenhydrochlorid* entfernt u. der Rückstand in Eg. mit Na-Acetat erhitzt wurde; Kp.₁₂ 124–128°, D.₄¹⁵ 0,9182, n_D²⁰ = 1,5166, [α]_{Hg} = –21,9°, entfärbt KMnO₄-Lsg. (Journ. Chem. Soc. London 125. 1992–96. 1924. Glasgow, Univ.)

HABERLAND.

Henry Burgess und Thomas Martin Lowry, *Untersuchungen über dynamische Isomerie*. Teil XVI. *Die Mutarotation von Berylliumbenzoylcampher*. Bildung einer Additionsverbindung mit Chloroform. Die optische Aktivität des Berylliums. (Vgl. Journ. Chem. Soc. London 123. 1867; C. 1924. II. 1026. *Berylliumbenzoylcampher* (I) zeigt sowohl in Bzl. als auch in Chlf., Aceton, A., Heptan u. Cyclohexan Mutarotation. Daß die Änderung der Drehung nicht auf einer Zers. der Verb. in Lsg. zurückzuführen ist, ergibt sich daraus, daß eine benzol. Lsg., deren Rotation den Endwert besaß, verdampft wurde u. der in demselben Vol. Bzl. gel. Rückstand dieselbe hohe Anfangsdrehung zeigte. Daß die Erscheinung auch nicht auf eine Veränderung des Mol.-Gew. der gel. Substanz beruht, beweisen kryoskop. Mol.-Gew.-Bestst. in Bzl. Katalysatoren wie Piperidin oder Benzoesäure wirken beschleunigend auf die Änderung der Drehung. Je weiter die Mutarotation fortgeschritten ist, um so größer wird die Löslichkeit. Wird I aus einem Gemisch von Chlf. u. Aceton umkrystallisiert, so erhält man statt der üblichen Tafeln Prismen, die 2 Mol. Chlf. enthalten. Werden diese Prismen in Aceton oder Bzl. gel., so zeigen diese Lsgg. schon nach 15 Min. denselben Endwert der Rotation, den Lsgg. der Tafeln erst nach einer Woche zeigen; Lsgg. der Prismen in Chlf. lassen die letzten Stadien einer schnellen Mutarotation noch deutlich erkennen. Chlf. muß demnach die Änderung der Verb., die als Ursache der Rotation anzusehen ist, katalysieren. Diese Eigenschaft ist wohl darauf zurückzuführen, daß Chlf. mit I eine instabile Additionsverb. (II) bildet. Bzgl. des Ursprungs der

Mutarotation geben Vff. folgende Erklärung. MORGAN u. BRAGG (Proc. Royal Soc. London, Serie A. 104. 437; C. 1924. I. 415) haben durch Röntgenunters. des bas. Be-Acetats festgestellt, daß jedes Be-Atom in der Koordinationsverb. im Mittelpunkt eines Tetraeders liegt u. von 4 an den Ecken dieses Tetraeders gelegenen O-Atomen umgeben ist. Nimmt man für Berylliumbenzoylcampher einen ähnlichen Bau an (I), so ergibt sich, daß, da das Benzoylcampherradikal a. ist, zwei stereoisomere Formen der Komplexverb. möglich sind. In den beiden Formen muß das Be-Atom a. u. der Drehung nach entweder d oder l sein. Die Isomerie ist dieselbe wie bei α - u. β -Methylglucosiden. Wie bei diesen die isomere Umlagerung durch eine Öffnung des Lactonringes u. intermediäre B. eines s. C-Atoms erklärt wird, so muß bei I ebenfalls der Ring der Komplexverb. geöffnet werden. Die Tatsache, daß Chlf. die Mutarotation katalysiert, ist dadurch zu erklären, daß, wenn I mit 2 Mol. Chlf. II bildet, die Identität von zwei der vier koordinierten Radikale genügt, um die Asymmetrie des Be-Atoms zu zerstören.



Versuche. *Berylliumbenzoylcampher*, $C_{34}H_{38}O_2Be$ (I), 20 ccm Piperidin + 50 g Benzoylcampher in 150 ccm h. A. werden versetzt mit 18 g $BeSO_4$, 4 aq in möglichst wenig W.; nach 1-std. Erhitzen auf dem Wasserbad wird der Nd. abfiltriert; aus Aceton + wenig Bzl. oder Chlf. F. 208° , unl. in W., wl. in A. u. CH_3OH ; aus Aceton Tafeln, deren Schmelze grün ist; $[\alpha]_{5461} = 485^\circ$, $[\alpha]_{5780} = 402^\circ$ in Bzl., 0,28 g I in 100 ccm. Tabelle über Anfangs- u. Endwerte der Drehung von I in Bzl., Chlf., Aceton, A., Heptan u. Cyclohexan vgl. Original. — *Chloroformverb. von I*, $(C_{17}H_{19}O_2)_2Be, 2CHCl_3$ (II), aus gleichen Voll. Chlf. + Aceton als vierseitige Prismen, die beim Stehen Chlf. allmählich abgeben u. undurchsichtig werden. Werden die Prismen langsam erhitzt, so haben sie F. 204° , werden sie in ein auf 80° vorgewärmtes Bad gebracht, so entsteht sofort eine trübe Fl., die wieder erstarrt u. danach F. 204° hat. Krystallograph. Messungen von R. Jeffery vgl. Original. (Journ. Chem. Soc. London 125. 2081—96. 1924. Cambridge, Univ.)

HABERLAND.


W. Pastanogow, Über die Kinetik der katalytischen Zersetzung der Bromcamphocarbonsäure. Im Gegensatz zur Camphocarbonsäure zeigten sich bei der katalyt. Zers. der Bromcamphocarbonsäure, $C_{10}H_{14}BrCOOH = CO_2 + C_{10}H_{15}BrO$, einige der Aufklärung verlangenden Eigentümlichkeiten im Mechanismus der Rk. u. besonders in der opt. Aktivität der erhaltenen Prodd., die kleiner war, als die kinet. Theorie errechnen ließ. Zur Unters. des Einflusses der freien Säure auf den Verlauf der Rk. wurde einmal die Zers. der Säure bei sehr großer Konz. der Katalysatorbase, also in Abwesenheit freier Säure geprüft, ferner die Geschwindigkeiten gemessen, wenn die Versuchsbedingungen u. die Konz. der Base konstant blieb, aber die Anfangskonz. der Säure variierten. — Verss. mit Anilin als schwacher Base zeigten, daß der Reaktionsmechanismus in Abwesenheit freier Säure dem Gesetze erster Ordnung gut entspricht. Bei stärkerer Base oder größeren Mengen der katalysierenden Basen stieg die Geschwindigkeitskonstante erster Ordnung stark an. Nur bei im Überschuß vorhandener Säure tritt während der

Rk. eine Zunahme der Reaktionsgeschwindigkeit auf. Je kleiner die Anfangskonz. der angewandten Säure, desto größer die nach gleichen Zeiten abgespaltene Menge CO_2 . Wachsender Konz. der überschüssigen Säure entspricht abnehmende Geschwindigkeit der Rk. der absol. Größe nach. Zur Erklärung dieser Erscheinung könnte die Anschauung verhelfen, daß die Basen mit einem Säureüberschuß saure Salzkomplexe bilden.

Weiterhin wurde die opt. Aktivierung der *d,l*-Säure mit Chinidin als Katalysator untersucht, der zeitliche Verlauf der Zers. der *d*-, *l*- u. *d,l*-Säure u. die nach einer bestimmten Zeit gebildeten Mengen von opt.-akt. Prodd. bestimmt. Bei den Verss. in Acetophenon als Lösungsm. wurde die Menge der gebildeten *l*-Säure zu 0,221 g bestimmt. Die kinet. Daten fordern 0,2842 g. *d*-Bromcampher wurde zu 0,139 g gefunden, während die Theorie 0,224 g verlangt. Die Verss. in *o*-Nitrotoluol als Lösungsm. zeigten, daß die Zers.-Kurve der opt.-inakt. Säure zwischen denjenigen der akt. liegt u. zwar tiefer als die Mitte. Die Zers. erfolgt demnach — mit steigenden Abweichungen bei fortschreitender Rk. — langsamer als es den Zers.-Kurven der *d*- u. *l*-Säure entspricht. Die theoret. opt. Aktivität kann nur dann erreicht werden, wenn die Zers.-Kurve des *d,l*-Säuregemischs in der Mitte zwischen denen der antipod. akt. Säuren liegt. Unter der Voraussetzung, daß die Zers. jedes opt. Antipoden im Gemisch denselben zeitlichen Verlauf nimmt, als wenn es allein zers. würde, konnte man die theoret.-opt. Aktivität errechnen. Der berechnete Wert liegt in Übereinstimmung mit dem experimentell ermittelten. Als Ursachen der geringeren opt. Aktivität werden von dem Vf. einmal die Razematbildung, andererseits die nicht gleichmäßige Verteilung des Katalysators zwischen den Antipoden vermutet. (Ztschr. f. physik. Ch. 112. 448—60. 1924. Iwanow-Wosnessensk.)

HORST.

Marston Taylor Bogert und Philip Samuel Nisson, *Die Synthese von Terephthalgrün und Terephthalbrillantgrün aus Cymol*. (Vgl. BOGERT u. HARRIS, Journ. Americ. Chem. Soc. 41. 1676; C. 1920. I. 329.) *Terephthalylchlorid* u. *Dimethylanilin* kondensieren sich bei 198—215° unter Entw. von CH_3Cl zu *Terephthalmethylanilid* (I); in Ggw. von ZnCl_2 tritt die Rk. schon bei 100° ein, es entsteht das tiefgrün gefärbte *Terephthalgrün* (II). Wird statt Dimethylanilin das Diäthyl-deriv. angewandt, so bildet sich *Terephthalbrillantgrün*. Da der Farbstoff auch gebildet wird, wenn statt ZnCl_2 als Kondensationsmittel P_2O_5 , POCl_3 oder PCl_5 angewandt werden, u. diese Mittel vorzugsweise dehydratisierend u. nicht HCl-abspaltend wirken, da ferner bei Abspaltung von HCl ein farbloses Keton vom Typ des Michlerschen Ketons entstehen müßte, ist anzunehmen, daß die Rk. nach Schema a) erfolgt. Die Nuance der neuen Farbstoffe (Wolle) ist etwas mehr gelb als Malachit- u. Brillantgrün; sie sind weniger lichtbeständig als letztere, scheinen jedoch wasch-, koch-, walk- u. schweißbeständiger zu sein. *Terephthalbrillantgrün* gibt hellere Ausfärbungen als II.



Versuche. *Terephthalsäure* wurde dargestellt durch Oxydation von Cymol, das aus dem „Terpentin-Kondensat“ der Papiermühlen isoliert wurde. — *Terephthalylchlorid*, Kp. 263—266°; F. 82° (korrr.). — *Terephthalmethylanilid*, $\text{C}_{22}\text{H}_{20}\text{O}_2\text{N}_2$ (I), aus Toluol hellgelbe Prismen, F. 212—213°; wird durch 7-std. Kochen mit Acetanhydrid oder in alkoh. Lsg. durch HCl u. NaNO_2 nicht verändert; durch sd. konz. HCl Hydrolyse. Darstellbar auch aus Monomethylanilin + *Terephthalylchlorid* in Toluol. — *Zinkdoppelsalz des Terephthalgrüns*, $\text{C}_{40}\text{H}_{44}\text{N}_4\text{Cl}_2$, 3ZnCl_2 (II), dunkelgrün mit kupferartigem Glanz. — *Terephthalbrillantgrün* (*Zinkdoppelsalz*),

$C_{48}H_{60}N_4Cl_2$, 3 $ZnCl_2$; dunkelgrün, bronzeglänzend. (Proc. National Acad. Sc. Washington 10. 421—26. 1924.) HABERLAND.

Marston Taylor Bogert und **Philip Samuel Nisson**, *Weitere Versuche im Gebiete der Terephthalsäurederivate*. (Vgl. vorst. Ref.). Das von BOGERT u. HARRIS (vgl. vorst. Ref.) dargestellte *p*-Di-(oxyisopropyl)-benzol hat sich pharmakolog. wenig wirksam erwiesen. Es wurde daher die Synthese höherer Homologen dieser Verb. angestrebt; die erhaltenen Glykole erwiesen sich jedoch als sehr unbeständig, sie gingen unter Abspaltung von H_2O leicht in *Diolefine* über. Die Darst. der Verbb. durch Einw. von Grignardverbb. auf *p*-Diketone $C_6H_4(COR)_2$ führte auch zu keinem befriedigenden Ergebnis. Die aminierten Pinakone, die synthetisiert wurden, waren ebenfalls sehr unbeständig.

Versuche. *Tetramethyl-p-xylylenglykol*, [*p*-Di-(oxyisopropyl)-benzol], $C_6H_4 \cdot [C(CH_3)_2OH]_2$, Darst. nach BOGERT u. HARRIS. Der C. 1920. I. 330 abgebildete App. wird durch folgenden einfacheren ersetzt: ein Rundkolben, in dem die Grignardlsg. bereitet wird, hat am oberen Ende des Halses ein seitlich nach oben gehendes Glasrohr; in den Hals des Rundkolbens wird der Scheidetrichter eingesetzt, der am Boden eine Schicht Glaswolle trägt und während der Darst. der Grignardlsg. bis zur Hälfte mit Ä. gefüllt wird. Durch den Hals des Scheidetrichters geht eine Röhre, die durch einen seitlichen Ansatz mit der schrägen Röhre des Rundkolbens verbunden ist. Pharmakolog. Prüfung des Glykols: 3 mg in 1 ccm W. wurden von OLIVER KRAMM intraperitoneal einer 20 g schweren Maus injiziert, es trat keine Wrkg. ein. 6—7 mg in Olivenöl zeigten nur ganz schwachen hypnot. Effekt, nach 3 Stdn. war die Maus wieder n. Eine 1 g Dosis, einem 11 kg schweren Hund per os eingegeben, hatte keine Wrkg. Ähnlich negative Ergebnisse wurden von KOLU u. WICKHAM bei Verss. mit Fröschchen u. Kaninchen erhalten. — 3-*p*-Phenylbis-(2-penten), $C_{16}H_{22} = C_6H_4[C(C_2H_5):CHCH_3]_2$, aus C_2H_5MgJ u. Methylterephthalat; hellgelbe Fl. von angenehm pinenartigem Geruch, Kp_{20} 149—151°, Br in CCl_4 -Lsg. wird sofort entfärbt. — Verss. zur Darst. von Tetra-*n*-butyl-*p*-xylylenglykol aus *n*- C_4H_9MgBr führten nach Hydrolyse des Reaktionsprod. zu einem nicht erstarrenden Öl, das bei Kp_{19} 230—232° unter Abspaltung von H_2O anscheinend in 5-*p*-Phenylbis-(4 nonen), $C_6H_4[C(C_4H_9):CHC_3H_7]_2$, überging; Br in CCl_4 wird sofort entfärbt. — *Terephthalylbis*-(acetessigester), $C_6H_4(COCH[COCH_3]COOC_2H_5)_2$, Darst. nach BEREND u. HERMS (Journ. f. prakt. Ch. 74. 123 [1906]) aus Terephthalylchlorid + Na-Acetessigester; F. 102,5° (korr.); wird mittels NH_4OH u. NH_4Cl hydrolysiert zu *Terephthalylbisäthylacetat*, $C_6H_4(COCH_2COOC_2H_5)_2$, F. 70° (korr.). — *p*-Diacetylbenzol aus vorigem mittels 10%ig. H_2SO_4 , F. 113° (korr.). Verss. zu Darst. dieses oder ähnlicher Ketone aus Terephthalylchlorid + aliphat. Grignardverbb. mißlangen. — *p*-Dibenzoylbenzol, durch Zugabe von C_6H_5MgBr in Ä. zu benzol. Lsg. von Terephthalylchlorid; aus Bzl. Tafeln, F. 160—161° (korr.). — Verss. zur Darst. der Mg-Verb. des *p*-Dibrombenzols gaben nur die Monobromverb. — *Nitroterephthalsäuredimethylester*, Darst. nach KAUFFMANN u. WEISSEL (LIEBIGS Ann. 393. 10 [1910]), F. 96° (korr.); durch gutes Kühlen während der Nitrierung wird eine Ausbeute von 90% erhalten. *Aminoverb.* hellgelbe Krystalle, F. 133° (korr.). — a) *Dimethylaminoterephthalsäuredimethylester*, F. 70,5° (korr.). Äthylaminoterephthalsäuredimethylester, $C_{12}H_{15}O_4N = C_2H_5NHC_6H_3(COOCH_3)_2$, aus dem Aminoester + 33%ig. Überschuß von C_2H_5J durch 2-std. Erhitzen im Rohr auf 100°; aus A. grünlich-gelbe Nadeln, F. 83,5° (korr.). — b) *Diäthylaminoterephthalsäuredimethylester*, $C_{14}H_{19}O_4N$, aus dem Aminoester + 50%ig. Überschuß $(C_2H_5)_2SO_4$ bei 150° (4 Stdn.); zur Entfernung von $(C_2H_5)_2SO_4$ wird danach einige Stdn. mit überschüssiger Na_2CO_3 -Lsg. bei 100° digeriert; hellgelbes, stark lichtbrechendes Öl, Kp_{20} 191—192°. — 2-(Dimethylamino-*p*-phenyl)-bis-(1-propylen), $C_{14}H_{19}N = (CH_3)_2N \cdot C_6H_3(C[CH_3]:CH_2)_2$, aus CH_3MgJ in

Ä. + a) in Bzl. Aus A. gelbliche Krystalle, F. 62—63° (korr.), Kp_{25} 190—192°; Br in CCl_4 wird sofort entfärbt. — 2-(Diäthylamino-*p*-phenylen)-bis-(1-propen), $C_{16}H_{23}N$, Kp_{18} 195—197°. — Aminotetraphenyl-*p*-xylylenglykol, $C_{32}H_{27}O_2N = H_2N \cdot C_6H_3 \cdot [C \cdot [C_6H_5]_2OH]_2$, aus Aminoterephthalester + C_6H_5MgBr ; nach 13-maligem Umkrystallisieren aus Toluol hellgelbe, prismat. Krystalle, die bei 110° ihre Krystallform verlieren, F. 202° (korr.). — Dimethylaminotetraphenyl-*p*-xylylenglykol, $C_{34}H_{31}O_2N = (CH_3)_2N \cdot C_6H_3 \cdot [C \cdot [C_6H_5]_2OH]_2$, aus a + C_6H_5MgBr ; aus Bzl. mkr. Nadeln, F. 185° (korr.). — Diäthylaminotetraphenyl-*p*-xylylenglykol, $C_{36}H_{35}O_2N$, aus Bzl. farbloses Pulver, F. 179° (korr.). (Proc. National Acad. Sc. Washington 10. 426—33. 1924. Columbia Univ.)

HABERLAND.

Margaret Millen Jeffs Sutherland und Forsyth James Wilson, Die Einwirkung von Hydrazinen auf Semicarbazone. Teil I. Einw. von Phenylhydrazin auf Acetophenon- oder Benzophenonsemicarbazone in Toluollsg. in der Hitze erfolgte nach Schema A. Hydrolyse des entstehenden δ -Anilinosemicarbazons (I) führte zur B. des Ketons u. δ -Anilinosemicarbazidchlorhydrat (II). Die Konst. dieses letzteren wurde durch die Synthese aus β -Carbäthoxyphenylhydrazin + Hydrazinhydrat (Schema B) sichergestellt. — Acetonsemicarbazone u. Phenylhydrazin reagieren in der Wärme nach Schema C, es tritt hauptsächlich Verdrängung des Semicarbazidrests durch Phenylhydrazin ein; nebenbei entsteht in geringer Menge Aceton- δ -anilinosemicarbazon.

A) $R \cdot R' \cdot C : N \cdot NHCONH_2 + C_6H_5NHNH_2 = I \cdot R \cdot R' \cdot C : N \cdot NHCONH \cdot NH \cdot C_6H_5 + NH_3$
 B) $NH_2 \cdot NH_2 + C_6H_5NHNHCOOC_2H_5 = II \cdot NH_2 \cdot NH \cdot CONH \cdot NHC_6H_5 + C_2H_5OH$
 C) $(CH_3)_2C : N \cdot NHCONH_2 + C_6H_5NHNH_2 = (CH_3)_2C : N \cdot NHC_6H_5 + NH_2 \cdot NHCONH_2$.

Versuche. Acetophenon- δ -anilinosemicarbazon, $C_{15}H_{16}ON_4$ (I $R = CH_3$, $R' = C_6H_5$), Darst. bei 120° bis NH_3 -Entw. beendet; aus A. Nadeln, F. 210°; in sonstigen organ. Mitteln wl. oder unl. — δ -Anilinosemicarbazidchlorhydrat, $C_7H_{10}ON_4 \cdot HCl$ (II), aus I mittels 10%ig. HCl; aus A. Blättchen, F. 193° (Zers.), die sich beim Stehen an feuchter Luft verfärben, wl. in organ. Mitteln; Benzylidenderiv., $C_{14}H_{14}ON_4$, aus Aceton Nadeln, F. 206°, wl. außer in Aceton. — δ -Anilinosemicarbazid, $C_7H_{10}ON_4$ (II), Darst. nach Schema B) in A. bei 150—200° im Rohr; aus A. Nadeln, F. 151°, l. in W. u. h. A. Benzophenon- δ -anilinosemicarbazon, $C_{20}H_{18}ON_4$ (I. $R = R' = C_6H_5$), aus A. Nadeln, F. 161°, unl. in W. Hydrolyse führt zu II. Mit 12%ig. HCl findet vollständige Zers. statt zu Benzophenon, salzsaurem Hydrazin u. Phenylhydrazin sowie CO_2 . — Aceton- δ -anilinosemicarbazon, $C_{10}H_{14}ON_4$ (I, $R = R' = CH_3$), aus A. Nadeln, F. 169°, l. in h. A., wl. oder unl. in anderen organ. Mitteln; Hydrolyse führt zu II u. Aceton. (Journ. Chem. Soc. London 125. 2145—48. 1924. Glasgow, Royal Techn. Coll.)


HABERLAND.

L. Elion, Über den Ersatz der Benzoylgruppe durch die Nitrogruppe. Analog dem Ersatz der Acetylgruppe im 4-Amino-3,5-dibromacetophenon durch die Nitrogruppe (vgl. Rec. trav. chim. Pays-Bas. 42. 145; C. 1923. I. 1021) konnte Vf. aus 4-Amino-3,5-dibrombenzophenon durch Einw. von konz. HNO_3 (1,5) 4-Nitro-2,6-dibromphenylnitramin, $C_6H_3O_4N_3Br_2 = C_6H_2Br_2NO_2(NHNO_2)$, darstellen. Die konz. HNO_3 wird zu diesem Zweck auf die Benzoylverb., die sich in Eismischung befindet, gegossen. Alsald setzt lebhaft Rk. ein u. Abscheidung von Krystallen der neugebildeten Verb., welche mit HNO_3 u. W. gewaschen u. durch Lösen in verd. NaOH u. Wiederausfällen mit HCl gereinigt wird. Braune Krystalle, Zers. bei 122° (Rec. trav. chim. Pays-Bas. 43. 867—68. 1924. Utrecht, Univ.)

HORST.

John Alfred Aeschlimann und Nial Patrick McClelland, Organische Arsenverbindungen. I. Derivate der o-Benzarsinsäure. Es sollte versucht werden, durch Abspaltung von HCl aus Benzophenonarsindichlorid (II) oder aus dem Säurechlorid des o-Carboxydiphenylchlorarsins (III) die Verb. I herzustellen. III gab jedoch bei Behandlung mit $AlCl_3$ (wahrscheinlich unter intermediärer B. von I)

nur **II**. Wurde **II** alleine oder mit AlCl_3 im Vakuum erhitzt, so trat Abspaltung von HCl ein, es entstand eine zähe M., aus der krystallisierende Prodd. nicht isoliert werden konnten; durch Behandeln mit HCl wurde aus ihr **II** zurückgewonnen, durch Oxydation in alkal. Lsg. entstand *Benzophenon-o-arsinsäure*; mit Alkali allein u. nachfolgendem Ansäuern wurde eine anscheinend mit *Benzophenon-o-arsinoxyd* ident. Verb. erhalten. — Verss., analog der B. von Anthrachinon aus *o*-Benzoylbenzoesäure, durch Abspaltung von H_2O Verb. **IV** aus *Benzophenon-o-arsinsäure* zu erhalten, mißlingen ebenfalls. Bei Behandlung der *Arsinsäure* mit k. konz. H_2SO_4 trat keine Rk. ein, beim Erwärmen fand, ebenso wie mit P_2O_5 oder durch Erhitzen im Vakuum auf 100° , Zers. der *Arsinsäure* statt. Auch *Benzophenon-methylchlorarsin*, $\text{C}_6\text{H}_5\text{CO}\cdot\text{C}_6\text{H}_4\text{-o-As}\cdot\text{Cl}\cdot\text{CH}_3$, ließ sich nicht zum Ringschluß bringen. — Die der Verb. **III** entsprechende freie Säure spaltete bei Behandlung mit H_2SO_4 kein W. ab. Wurde **III** in Bzl.-Lsg. mit AlCl_3 behandelt u. das Prod. mit W. zersetzt, so entstand nicht **I**, sondern eine Verb., die sich wie ein Gemisch von *Benzophenon-o-arsinoxyd* u. -Chlorid verhielt. Bei der Zers. des Reaktionsprod. mit HCl entstand **II**. — *Benzarsinoxyd* hält beim Umkrystallisieren aus W. 1 Mol. H_2O fest, die Verb. entspricht wahrscheinlich der Konst. **V**. Bei 70° im Vakuum werden $1\frac{1}{2}$ H_2O abgegeben, das entstandene Prod. hat demnach wohl Konst. **VI**. Durch Dest. von *o*-Benzarsindichlorid unter vermindertem Druck wird HCl abgespalten, es entsteht Verb. **VII**. Aus **III** entsteht durch Abspaltung von HCl das Deriv. **VIII**, das auch durch Red. der nur als Anhydrid (**IX**) isolierbaren *o*-Carboxydiphenylarsinsäure erhalten wird. Diese Rk. beweist, daß dem Anhydrid dieser letztgenannten Säure Konst. **IX** u. nicht **IV** zukommt; würde **IV** dem Anhydrid entsprechen, so müßte durch Red. hieraus **I** entstehen. Abspaltung von HCl aus *o*-Carboxyphenylmethylchlorarsin führt zum Anhydrid **X**, das auch durch Red. von *o*-Carboxyphenylmethylarsinsäure erhalten wird. *o,o'*-Dicarboxydiphenylarsinanhydrid (**XI**) entsteht durch Abspaltung von HCl aus *Dicarboxydiphenylchlorarsin*, es gibt beim Behandeln mit CH_3OH u. HCl den *Methylester* (**XII**), der bei der Hydrolyse wieder in **XI** zurückverwandelt wird. Das Anhydrid der *o,o'*-Dicarboxydiphenylarsinsäure entspricht der Formel **XIII**, es läßt sich als einbas. Säure titrieren, der Ring wird nur bei Überschuß von Alkali geöffnet.



Versuche. *o*-Benzarsinoxyd, $\text{C}_6\text{H}_5\text{O}_3\text{As}\cdot\text{H}_2\text{O}$ (**V**), aus *o*-Benzarsinsäure in W. durch Red. mittels SO_2 u. wenig HJ bei 60° ; aus W. F. 89° , bei 140° wieder er-


starrend, F. danach 225—231°; bei Umkrystallisieren aus Bzl. oder Ä. wird die Verb. ohne H_2O erhalten; *Anhydrid*, $C_{14}H_9O_5As_2$ (VI) aus V nach Trocknen im Vakuum erhalten. — *o*-Carboxyphenylchlorarsinanhydrid, $C_7H_4O_2ClAs$ (VII), F. 145°, Kp.₁₅ 220°, wl. in w. Bzl., Chlf., Ä., ll. in A. u. w. Na_2CO_3 ; als zweibas. Säure titrierbar. — *Benzophenon-o*-arsindichlorid, $C_{13}H_9OCl_2As$ (II), aus Dichlorarsinobenzoylchlorid (vgl. LEWIS u. CHEETHAM, Journ. Americ. Chem. Soc. 45. 510: C. 1923. I. 1572) + C_6H_5 in CS_2 -Lsg. mittels $AlCl_3$, Zers. mittels HCl , extrahieren mit Bzl.; diese Lsg. wird, um Oxyd in Dichlorid zu verwandeln, mit HCl gut durchgeschüttelt; F. 107—108°; schwach gelblich gefärbt. — *Benzophenon-o*-arsinsäure, $C_{13}H_{11}O_4As$, aus vorigem in $NaOH$ + w. H_2O_2 ; aus h. W. oder verd. A. F. 215—219°. — *Benzophenon-o*-arsinoxyd aus II in $NaOH$ durch Ansäuern, oder aus h. wss. Lsg. der vorigen mittels SO_2 ; beginnt bei 105° zu schmelzen, ist aber bei 200° noch nicht vollkommen fl., ll. in organ. Mitteln außer PAe. u. Ä., worin unl. — *Benzophenon-o*-methylchlorarsin, durch Schütteln von 25 g II in 50 cem W. + 14 g $NaOH$ mit CH_3J , Ansäuern u. Red. mittels SO_2 erhält man nach Extrahieren mit Chlf. das entsprechende *Jodarsin*, aus A. F. 110—114°; durch Einw. von alkoh. KOH entsteht das Oxyd, das in Bzl. durch Einleiten von HCl das Methylchlorarsin gibt; aus h. A. F. 88°. — *Benzophenon-o*-methylarsinsäure, $C_{14}H_{13}O_5As$, aus oben genanntem Oxyd in $NaOH$ + sd. H_2O_2 ; aus W. weiße Nadeln, F. 186°. — *Anhydrid der o*-Carboxydiphenylarsinsäure, $C_{13}H_9O_3As$ (IX), aus benzarsinsaurem Na + diazotiertem Anilin in alkal. Lsg.; der nach Ansäuern erhaltene Nd. wird mit h. W. extrahiert, Extrakt eingedampft u. aus h. A. umkrystallisiert; weißes Pulver, kein F. bis 300°. — *o*-Carboxydiphenylarsinanhydrid, $C_{13}H_9O_3As$ (VIII), weißes krystallin. Pulver, F. 133°, wl. in h. W. (hieraus Krystalle), ll. in A., l. in h. Bzl. — *o*-Carboxydiphenylchlorarsin, $C_{13}H_{10}O_2ClAs$, aus Phenylarsindichlorid in $NaOH$ + diazotierter Anthranilsäure; ansäuern, Nd. mit h. HCl extrahieren, Extrakt bei 80° mit SO_2 red. Reduktionsprod. in Bzl. mit HCl behandeln; weißes krystallin. Pulver, F. 163°, ll. in A.; beim Umkrystallisieren aus h. Bzl. wurde ein Prod. mit F. 125° erhalten; *Chlorid der Säure* (III), das Einwirkungsprod. aus voriger in $Chf.$ + PCl_5 wird bei niedrigem Druck dest., das Destillat erstarrt zu Krystallen. — *o*-Carboxyphenylmethylarsinanhydrid, $C_8H_7O_2As$ (X), F. 106°, Kp.₁₅ 220°, ll. in A. u. h. Bzl., wl. in h. W. — *o*-Carboxyphenylmethylarsinsäure, $C_8H_9O_4As$, aus vorigem + H_2O_2 ; aus h. W. F. 310°. — *o*-Carboxyphenylmethylchlorarsin, $C_8H_8O_2ClAs$, aus voriger in HCl durch HJ , danach Einleiten von HCl ; aus Bzl. F. 141°, ll. in organ. Mitteln u. Alkali. — *o,o'*-Dicarboxydiphenylarsinsäureanhydrid, $C_{14}H_9O_5As$ (XIII), durch Kondensation von diazotierter Anthranilsäure mit alkoh. Lsg. von Benzarsinoxyd; aus alkal. Lsg. durch Ansäuern F. 255°. — *o,o'*-Dicarboxydiphenylarsinanhydrid, $C_{14}H_9O_4As$ (XI), F. 251—255°, unl. in Ä., Bzl., Chlf., CCl_4 , l. in CH_3OH , hieraus mit 1 Mol. CH_3OH krystallisierend. — *o,o'*-Dicarbo-methoxydiphenylchlorarsin, $C_{16}H_{11}O_4ClAs$ (XII), aus Bzl. F. 184°, unl. in CH_3OH . (Journ. Chem. Soc. London 125. 2025—35. 1924. Cambridge, Univ.) HABERLAND.

Alex. McKenzie und Robert Roger, *Die Dehydratation der optisch-aktiven Methyl- und Äthylhydrobenzoin*. (Vgl. MCKENZIE u. ROGER, Journ. Chem. Soc. London 125. 844; C. 1924. II. 37.) *Rac. α,β -Dioxy- α,β -diphenylpropan* (*rac. Methylhydrobenzoin*, III) gibt bei Einw. von h. verd. H_2SO_4 ein Gemisch von *Diphenylmethylacetaldehyd* u. *rac. Didiphenylmethyläthlenoxyd* (I). *Rac. Äthylhydrobenzoin* bildet unter analogen Bedingungen ein Gemisch von *Diphenylbutanon* u. *rac. Äthlenoxyd* II. Dieses letztere zerfällt mit konz. H_2SO_4 in *Diphenylbutanon* u. *rac. Äthyldeoxybenzoin*. Dehydratation von *l*-Methylhydrobenzoin mittels konz. H_2SO_4 führt zu *rac. Methyldeoxybenzoin* (V), wird die Dehydratation mittels verd. H_2SO_4 durchgeführt, so bleibt die opt. Aktivität bestehen, es bildet sich das linksdrehende Oxyd I, Anzeichen der B. einer Racemverb. wurden nicht gefunden. *l*-Äthylhydro-

beuten; letztere sind schwieriger vom Mangandioxydhydrat zu befreien. Bei Einw. von KMnO_4 in alkal. Lsg. direkt auf *Phenanthren* wird ebenfalls Diphensäure erhalten, in reinem Zustande, F. 227—228°, aber geringerer Ausbeute, bei 60-std. Einw. 40%. *Hydrophenanthrene* gehen ebenfalls bei Einw. von KMnO_4 in alkal. Lsg. teilweise in Diphensäure über. (Gazz. chim. ital. 54. 765—69. 1924. Pavia, Univ.)

ZANDER.



Georg Scheuing, *Einige Bemerkungen über die Benzilsäureumlagerung*. Zu der Veröffentlichung von SCHÖNBERG (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 57. 1396; C. 1924. II. 2147) über dasselbe Thema bemerkt Vf. folgendes: Der begünstigende Einfluß, den Ä. auf die Umlagerung von *Benzil* in der Kälte zu *Benzilsäure* ausübt, besteht darin, daß das Additionsprod. von KOH an *Benzil* (vgl. SCHEUING, Ber. Dtsch. Chem. Ges. 56. 252; C. 1923. III. 762) durch Ä. teilweise wieder zerlegt wird; das sich einstellende Gleichgewicht ist bedingt durch die Konz. des Ä. Wird diese durch indifferenten Ä. verändert, so verschiebt sich das Gleichgewicht zugunsten des Additionsprod. u. damit auch der Umlagerung. — Der Beweis dafür, daß zur Umlagerung des *Benzils* nur 1 Mol. KOH erforderlich ist, wird nur durch das vom Vf. isolierte Additionsprod. erbracht. Der Befund SCHÖNBERGS, daß die Umlagerung mit Alkoholat besser geht als mit KOH, ist darauf zurückzuführen, daß der von SCHÖNBERG verwandte Ä. wasserhaltig war. — Experimentell hat sich bisher der Nachweis, wie sich das Additionsprod. $\text{C}_6\text{H}_5 \cdot \text{CO} \cdot \text{C}(\text{OK})(\text{OH}) \cdot \text{C}_6\text{H}_5$ umlagert, noch nicht erbringen lassen. Auf Grund der analogen Umlagerung von *Benzilanil* zu *Diphenylanilinoessigsäure* (vgl. REDDELIEN u. DANILOF, Ber. Dtsch. Chem. Ges. 54. 3132; C. 1922. I. 454) kann man jedoch annehmen, daß in dem Additionsprod. (I) H von OH u. C_6H_5 an der hydratisierten CO-Gruppe verdrängt werden, wodurch eine COOK-Gruppe gebildet wird; H u. C_6H_5 , die verdrängt wurden, lagern sich unter B. von II an die andere CO-Gruppe an:



Da die Ablösung des Alkyls von einer Alkoxygruppe schwerer eintreten wird als die Ablösung des H von OH, ist erklärlich, daß sich Alkoholatadditionsprodd. nicht zu *Benzilsäure* umlagern können. — Die Anschauungen des Vfs. decken sich mit denen von MICHAEL (Journ. Americ. Chem. Soc. 42. 787; C. 1920. III. 181). (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 57. 1963—65. 1924. Freiburg i. Br., Univ.) HABERLAND.

Hans Stobbe und **Eduard Färber**, *Polymere des Indens*. Das von WEISZGERBER (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 44. 1438; C. 1911. II. 206) aus Inden durch Eg. oder 50%ig. H_3PO_4 erhaltene *Diinden* entsteht auch durch verd. HCl u. H_2SO_4 verschiedener Konz., durch stärkere Säuren schneller, ferner langsam durch ZnCl_2 in konz. wss. Lsg., während 60%ig. H_2SO_4 u. 33%ig. AlCl_3 -Lsg. daneben ein höher sd., also wohl auch höher polymeres Prod. geben. HCl von etwas höherer Konz., als infolge hydrolyt. Dissoziation in der AlCl_3 -Lsg. anzunehmen ist, wirkt nicht so. Das *Diinden* zeigte nach Dest. im Vakuum u. Krystallisation aus Eg. auch, wenn es mehrfach mit 90%ig. Ä. extrahiert u. wiederholt dest. wurde, nur den von WEISZGERBER angegebenen F. 51°, nach Krystallisation aus Ä. oder Eg. mit Zusatz von wenig W. aber höheren, schließlich bei 57—58° konstanten, zeigte dann denselben Kp. wie das niedriger schm., behielt auch nach der Dest. den höheren F. Beide Präparate entfärbten annähernd gleich schnell Br- u. KMnO_4 -Lsgg., sind also im Gegensatz zu der Annahme WEISZGERBERS ungesätt.; das tiefer schmelzende wird aber bei Autoxydation weit schneller angegriffen, u. die Grenze des Absorptionsbandes in äth. Lsg. ist bei ihm etwas weiter nach dem sichtbaren Spektrum vorgeschoben. Für die weiteren Verss. wurde nur das höher schm. Prod. benutzt. Es addiert Br zum *Dibromid* $\text{C}_{18}\text{H}_{16}\text{Br}_2$, das bei Einw. von Alkalien oder bei

Vakuumdest. das Br wieder vollständig abgibt. Bei Oxydation mit CrO_3 entsteht α -Hydrindon, es muß also in der ungesätt. Verb. ein in α -Stellung substituierter Hydrindenkern wie im Distyrol vorliegen. Von den möglichen Formeln werden auf Grund des spektroskop. Verh. (kontinuierliches Spektrum mit ganz flachem, schmalen Band bei niedriger Konz., dem des Distyrols analog) den Formeln I. u. II., die nach der THIELESchen Hypothese der oszillierenden Doppelbindung zusammenfallen würden, oder III. der Vorzug gegeben. Die Entscheidung zwischen



ihnen durch Oxydation des durch Red. mit Na u. A. erhaltenen Dihydrodiindens zu erbringen, wobei aus I. u. II. nur α -Hydrindon, aus III. daneben auch β -Hydrindon entstehen sollte, mißlang, denn die Oxydation dieses Prod. mit CrO_3 verlief so weitgehend, daß Ketone überhaupt nur in Spuren nachgewiesen werden konnten. Mit der Annahme eines durch α -Hydrindenyl substituierten Indens in Einklang steht die B. eines sehr unbeständigen, daher schwer isolierbaren roten Pikrats, sowie die Möglichkeit weiterer Polymerisierung durch konz. H_2SO_4 (bräunliche, amorphe gesätt. Prodd.), anscheinend auch durch gasförmigen HBr (rotes, Br-freies Öl). — Ein gesätt. Diinden suchten Vff. aus *Truxon* (IV.) durch Red. nach CLEMMENSEN zu gewinnen. Es entstand in geringer Ausbeute ein Öl, dessen Analyse nur annähernd, dessen Mol.-Gew. befriedigend auf $\text{C}_{18}\text{H}_{16}$ stimmte, das bei der geringen Menge nicht weiter gereinigt werden konnte. Später hat Fritz Zschoch (vgl. Diss. Leipzig 1921) das erwartete *Truxan* in tafelförmigen Krystallen vom F. 116° erhalten. — Polyindene. Das aus unverd. oder hoch-%ig. gel. Inden mit 95%ig. H_2SO_4 erhaltene Harz wurde durch häufiges Umfällen aus Bzl.-Lsg. mit A. als weißes, amorphes, geruchloses Pulver erhalten, *Metainden*, F. unscharf, bei verschiedenen Präparaten zwischen 220 u. 280° , Mol.-Gew. wesentlich zwischen $(\text{C}_9\text{H}_8)_{10}$ u. $(\text{C}_9\text{H}_8)_{22}$ schwankend, bei längerem Erhitzen auf 200° unter geringer Erhöhung des Mol.-Gew. nur wenig verändert, von ca. 350° an unter gewöhnlichem Druck oder im Vakuum langsam depolymerisiert, wobei zuerst monomeres Inden überdest., dann ein gelbliches Öl, das das ungesätt. Diinden enthält. Im Rohr tritt schon bei wenig über 200° weitgehende Zers. ein. Ähnlich, aber langsamer als konz. H_2SO_4 wirkte AlCl_3 , noch langsamer ZnCl_2 u. CaCl_2 . — Bei Beleuchtung von Inden, unter N_2 in Glasröhren eingeschm., durch Bogenlampenlicht wuchs der Brechungsexponent nur wenig, aber schneller als im Dunklen; unter Annahme, daß der Brechungsexponent proportional dem Polymerengehalte steigt, zeigt die Kurve, daß nach einer anfänglichen Induktionszeit, in der die Rk. anomal verläuft, eine n., dem Massenwirkungsgesetz folgende, nicht autokatalyt. B. der Polymeren vor sich geht. Nach ca. 1-jähriger Belichtung an Sonne unter N_2 hatten sich verhältnismäßig geringe Mengen eines 8-fach u. eines 16-fach polymeren Indens gebildet, von denen das letzte ident. mit *Metainden* sein kann. Bei Ggw. von Spuren Luft ist die Menge der gebildeten Polymeren größer, bei Verwendung von 50%ig. Lsg. des Indens in Bzl. sehr viel geringer. Unter Luft belichtet, schied Inden nach baldiger Gelbfärbung krystallin. Flocken aus unter rascher Zunahme des Brechungsexponenten. — Unter N_2 erhitztes reines Inden verändert sich bei 115 – 118° in Brechungsexponenten u. chem. Verh. nur wenig, erst bei 190 – 200° im Rohr rascher. Nach 90 Stdn. enthält dann die kolophonumartige M. nur noch wenig monomeres Inden, etwas *Truxen*, hauptsächlich ein Gemisch von Isomeren,


darunter ein 8faches u. ein 12faches, kein 4faches. — Wss. J-KJ-Lsg. (vgl. R. MEYER, Ber. Dtsch. Chem. Ges. **45**. 1629; C. **1912**. II. 181) liefert ein Gemisch hochmolekularer Polymeren, die gleichzeitig zum Teil jodiert werden. Eins der isolierten Prodd., *Joddodekainden*, entsprach der Zus. $C_{108}H_{95}J$, ein zweites enthielt so wenig J, daß es wahrscheinlich nur ein durch jenes verunreinigtes Polyinden ist. Im Sonnenlichte mit J in Bzl. bildet Inden meist J-haltige Harze, bei Luft-ausschluß wurde hierbei noch nicht $\frac{1}{100}$ der für Indendijodid berechneten Menge J gebunden. Ein unter gewissen Bedingungen ausgeschiedenes krystallin. Jodid ist wahrscheinlich *Indendijodid*.

Versuche. *Inden*, C_9H_8 , F. -2° , Kp. 179° (in der Fl. $183-184^\circ$), in Bzl. monomolekular gel., $n_D^{20} = 1,56940$, $D_4^{20} 1,0060$, $D_4^{20} 0,9915$. *Pikrat*, $C_9H_8 \cdot C_6H_5O_3N_3$, nur rein bei Verwendung der doppelten Menge Inden, F. 96° (vorher gelindes Erweichen), durch feuchte Luft bald zerlegt, ebenso durch Fll., in denen die Löslichkeit der Komponenten verschieden ist. — *Diinden*, $C_{18}H_{16}$, F. $57-58^\circ$ (vgl. oben). — *Diindendibromid*, $C_{18}H_{16}Br_2$, Krystalle (aus Ä.), F. $120-121^\circ$, l. in den meisten Fll. — *Dihydrodiinden*, $C_{18}H_{18}$, stark blau fluoreszierende Fl., bei -25° nicht erstarrt, Kp.₂₀ $225-226^\circ$, Kp.₅₀ $239-241^\circ$, mit konz. H_2SO_4 hellrot ohne Lsg., bei Erwärmen Dunkelfärbung u. Geruch von SO_2 . — *Joddodekainden*, $C_{108}H_{95}J$, schwammige Flocken (aus Lsg. in Bzl. durch Ä.), F. $200-210^\circ$ (Gasentw.), l. in Bzl., Chlf. usw. schwachgelb mit violetter Fluorescenz, enthält das J sehr fest gebunden. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. **57**. 1838—51. 1924.) SPIEGEL.

Eric Alfred Speight, Arnold Stevenson und Jocelyn Field Thorpe, *Der Einfluß von Substituenten auf die Bildung von 1-Hydrindonderivaten aus β -Phenylpropionsäuren*. (Vgl. ATTWOOD, STEVENSON u. THORPE, Journ. Chem. Soc. London **123**. 1755; C. **1923**. III. 1318.) β -Phenylglutarsäure (I), die als CH_2COOH -substituierte β -Phenylpropionsäure anzusehen ist, geht bei 100° mit konz. H_2SO_4 in das Hydrindonderiv. II über; bei gewöhnlicher Temp. tritt kein Ringschluß ein. Der Äthylester von I bildete unter dem Einfluß von konz. H_2SO_4 kein Hydrindonderiv. bei gewöhnlicher Temp.; bei 100° wurde der Ester jedoch hydrolysiert u. lieferte II. Benzylmalonsäure (α -Carboxy- β -phenylpropionsäure) wird selbst in der Kälte durch konz. H_2SO_4 zers. Phenylbernsteinsäure (β -Carboxy- β -phenylpropionsäure) wird bei gewöhnlicher Temp. durch konz. H_2SO_4 nicht angegriffen, bei 100° entsteht III. — Benzoylmalonsäurediäthylester wurde bei 100° durch konz. H_2SO_4 zers. zu Benzoesäure, bei gewöhnlicher Temp. zu Benzoylessigsäure. Diese letztere ist das β -Ketoderiv. der β -Phenylpropionsäure; Ringbildung tritt demnach mit dieser Verb. bei gewöhnlicher Temp. nicht ein, bei 100° findet vollständige Zers. statt. Das α -Ketoisomere (Phenylbrenztraubensäure) wird durch H_2SO_4 schon bei gewöhnlicher Temp. zers. — Benzylmethylmalonsäure (α - CH_3 u. $COOH$ -substituierte β -Phenylpropionsäure) geht bei 100° durch konz. H_2SO_4 über in IV, eine Verb., die mittels H_2SO_4 bei gewöhnlicher Temp. oder bei 100° auch aus Benzylpropionsäure erhalten werden kann. α - C_3H_5 -substituierte β -Phenylpropionsäuren zeigen ähnliches Verh. wie die eben beschriebenen CH_3 -substituierten. Phenylmethylisobernsteinsäure wird bei 100° vollkommen zers., bei gewöhnlicher Temp. bildet sich Malonsäure. β -Phenylbuttersäure gibt sowohl bei gewöhnlicher Temp., als auch bei 100° V. — β -Phenylpropionsäure geht, mit konz. H_2SO_4 bei 130° behandelt, in 1-Hydrindon über. — Die aufgeführten Rkk. zeigen, daß zum Ringschluß bei β -Phenylpropionsäuren weder eine zweite $COOH$ -Gruppe, noch ein β -Substituent erforderlich ist. Eine α -ständige $COOH$ -Gruppe scheint Ringschluß zu verhindern. Eine β -ständige $COOH$ -Gruppe begünstigt die B. des Ringes; Alkylgruppen in α - oder β -Stellung wirken sehr günstig.


Versuche. Der Ringschluß wurde so bewirkt, daß die betreffende Säure mit der 5–10-fachen Menge konz. H_2SO_4 16–20 Stdn. entweder bei Zimmertemp. oder

bei 100° stehen gelassen wurde; darauf wurde auf Eis gegossen u. eventuell mit Ä. extrahiert. — 1-Ketohydrinden-3-essigsäure, $C_{11}H_{10}O_3$ (II), aus W. Tafeln, aus Bzl. oder PAe. Prismen, F. 154,5°; Lsg. in Alkali wird beim Kochen oder Stehen rot, durch Ansäuern wird II unverändert ausgefällt; Semicarbazon, $C_{12}H_{13}O_3N_3$,



wird bei 240° dunkel, F. u. Zers. bei 249°; durch alkal. $KMnO_4$ -Lsg. wird II zu Phthalsäure oxydiert. — β -Phenylglutarsäureäthylester, $C_{15}H_{20}O_4$, farb- u. geruchloses Öl, Kp.₉ 174—175°. — 1-Ketohydrinden-3-carbonsäure, $C_{10}H_8O_3$ (III), aus W. oder Bzl.-PAe. Tafeln, F. 84°, die im Vakuumexsiccator in eine wasserfreie Form übergehen, F. 120°; Ag-, Pb-, Cu-, Ba-, Fe- u. Ca-Salze werden aus wss. Lsg. des NH_4 -Salzes gefällt; Semicarbazon, $C_{11}H_{11}O_3N_3$, aus A. bei 220° dunkel werdend, F. u. Zers. bei 231°. Die Säure wird mittels $CrO_3 + H_2SO_4$ zu Phthalsäure oxydiert. — 1-Keto-2-methylhydrinden (IV), Semicarbazon F. 198°. — 1-Keto-2-äthylhydrinden, $C_{11}H_{12}O$ (analog IV), Öl mit schwachem angenehmem Geruch, Kp.₂₂ 143—144°; Semicarbazon, $C_{12}H_{15}ON_3$, aus A. Prismen, F. 202° unter geringer Zers. — 1-Keto-3-methylhydrinden (V), Semicarbazon F. 208°. (Journ. Chem. Soc. London 125. 2185—92. 1924. South Kensington, Imp. Coll. of Sc. and Techn.) HABERLAND.

H. Gault und A. Funke, Die Alkylidendibenzoylbrenztraubensäureester. 1 Mol $CH_2O + 2$ Mol Benzoylbrenztraubensäureester kondensieren sich (in der Schmelze oder in alkoh. Lsg.) in Ggw. von $NH(C_2H_5)_2$ zum Methylendibenzoylbrenztraubensäureäthylester (I); die entstehende Verb. scheint ein Monohydrat von I zu sein. Die wasserfreie Form wird auch durch Erhitzen auf 110° nicht erhalten, da beim Vers. sie darzustellen, CO u. CO_2 gleichzeitig abgespalten werden. Die alkoh. Lsg. des Monohydrats färbt sich mit $FeCl_3$ schwach rot, das durch teilweise Dehydratation erhaltene Prod. gibt in alkoh. Lsg. mit $FeCl_3$ intensive Rotfärbung, woraus Vf. schließen, daß dem Monohydrat Konst. II zukommt; diese Verb. II krystallisiert in Nadeln, F. 95°, u. ist l. in organ. Mitteln außer PAe.; Diphenylhydrazon, F. 100°. Durch sd. verd. Mineralsäuren findet Aufspaltung zu $C_2O_4H_2$ u. Diphenylpentandion statt; da diese Spaltung auch durch Alkalien bewirkt wird, ist die Darst.








der freien Säure noch nicht möglich gewesen. Durch 24-std. Einw. von konz. H_2SO_4 auf den Ester bei gewöhnlicher Temp. entsteht durch intramolekulare Abspaltung von $2H_2O$ der Methylendisindoncarbonsäureester u. die entsprechende Säure (IV). — Durch Kondensation von CH_3CHO bezw. Önanthol mit Benzoylbrenz-

traubensäure entstehen Äthyliden- bzw. Önanthylidendibenzoylbrenztraubensäureester. (C. r. d. l'Acad. des sciences **179**. 535—37. 1924.)

HABERLAND.


Pauline Ramart, *Einwirkung von Bromwasserstoffsäure auf einige tertiäre Alkohole*. (Vgl. C. r. d. l'Acad. des sciences **179**. 400; C. **1924**. II. 1788.) Nachstehend genannte tertiäre Alkohole geben in Eg.-Lsg. bei $\frac{1}{2}$ std. Behandeln mit HBr bei 40—50° unter Abspaltung von H₂O Äthylen-KW-stoffe, indem gleichzeitig eine CH₃-Gruppe sich umlagert: 1,1-Diphenyl-2,2-dimethylpropanol-1 (I), 1-Phenyl-1-anisyl-2,2-dimethylpropanol-1 (II), 1-Phenyl-1-naphthyl-2,2-dimethylpropanol-1 (III) u. 1,1,3-Triphenyl-2,2-dimethylpropanol-1 (IV). Unter denselben Bedingungen bildet



sich aus 1,3,3-Triphenyl-2-methylbutanol-2 (V) der KW-stoff Va. Br-Derivv. werden in keinem Falle gebildet. Die B. der Äthylen-KW-stoffe kann man nach oben stehenden Schema VI erklären. (C. r. d. l'Acad. des sciences **179**. 634—36. 1924.)

HABERLAND.

Frederick Alfred Mason, *Derivate der 1,8-Naphthalsäure*. Teil I. *Darstellung und Eigenschaften des 1,8-Naphthalylchlorids*. Die Darst. der Verb. (I oder II) gelingt durch Einw. von PCl₅ auf Naphthalanhydrid in POCl₃. Mit Phenol reagiert die Verb. unter B. von *Phenolphthalein*, mit Resorcin entsteht *Naphthofluorescein*, mit alkylierten m-Aminophenolen werden *Naphtharhodamine* gebildet. Mit Alkoholen entsteht ein Gemisch der Diester u. *Naphthalanhydrid*; mit Bzl. in Ggw. von AlCl₃ entsteht die *1,8-Benzoylnaphthoesäure*; durch Einw. von Anilin entsteht eine hellgelbe Verb. Diese letzten beiden Rkk. sprechen dafür, daß dem Chlorid Konst. I zukommt.




Versuche. *Naphthalylchlorid*, C₁₂H₆O₂Cl₂, Darst.: 100 g aus h. 70%ig. HNO₃ umkrystallisiertes, gut getrocknetes Naphthalanhydrid + 150 g PCl₅ + 150 cem POCl₃ werden 40—60 Stdn. unter Rückfluß gekocht (Ausschluß von Feuchtigkeit); nach Filtrieren werden unter vermindertem Druck 200 cem POCl₃ abdest. u. zum erkalteten Rückstand 150 cem trockener CS₂ zugegeben; farblose bis hellgelbe Prismen, F. 84—86°; Ausbeute 68%, ll. in POCl₃, Chlf., C₂H₂Cl₄, wl. in PAe.; wird durch W. sofort in das Anhydrid zers.; die Krystalle sind selbst in zugeschmolzenen Gefäßen nicht lange beständig; sie rauchen stark an der Luft, bis sich eine schützende Anhydridschicht gebildet hat; bei der Dest. im Vakuum tritt Zers. ein. — *Naphthalsäurediäthylester* aus CH₃OH, F. 58—60°. — *Dimethylester* aus CH₃OH, F. 101 bis

mit h. verd. H_2SO_4 wurden als Reaktionsprodd. isoliert: *Diphenylnaphthylacetaldehyd* (V), α -Naphthyldeoxybenzoin (VI) u. *Diphenylnaphthyläthylenoxyd*.

Versuche. Dehydratation von α -Naphthylhydrobenzoin: 20 g des Glykols + 160 g W. + 200 g konz. H_2SO_4 werden 90 Min. gekocht u. das Öl mit Bzl. extrahiert; bei Zugabe von A. fällt *Diphenylnaphthyläthylenoxyd*, F. 180—181°, aus. Das aus der Mutterlauge auskristallisierende Gemisch von großen rhomb. Prismen u. amorpher Substanz wurde mechan. getrennt. Die Prismen waren α -Naphthyldeoxybenzoin, $\text{C}_{24}\text{H}_{18}\text{O}$ (VI), F. 109—110°; mit konz. H_2SO_4 rötlichbraun, dann hellgelb u. grün werdend. Die amorphe Substanz, die außer VI isoliert wurde, F. 104—106°, war ein Gemisch von V u. VI u. gab bei der Hydrolyse mit alkoh. KOH folgende Prodd.: *Diphenylnaphthylmethan*, $\text{C}_{22}\text{H}_{18}$, aus A. F. 152° u. HCOOH (aus V entstanden), sowie *Phenylnaphthylmethan*, $\text{C}_{17}\text{H}_{14}$, aus A. Tafeln, F. 58°, *Pikrat*, F. 98—101° u. *Benzoessäure* (aus VI entstanden). — *Diphenylacetonaphthon*, $\text{C}_{24}\text{H}_{18}\text{O}$ (IV), dargestellt durch Einw. von konz. H_2SO_4 auf Naphthylhydrobenzoin (wobei auch geringe Menge VI erhalten wurde), zerfällt bei der Hydrolyse mit alkoh. KOH in Diphenylmethan u. α -Naphthoesäure, aus W. F. 159,5 bis 160,5°; bei der Oxydation mit CrO_3 + Eg. entsteht Benzophenon. Synthese von IV: aus Naphthalin + Diphenylacetylchlorid mittels AlCl_3 ; aus A. rhomb. Tafeln, F. 107—108° oder aus α -Naphthyl-MgBr + Diphenylacetylchlorid; F. 108 bis 109°. (Journ. Chem. Soc. London 125. 2105—10. 1924. Dundee, Univ. Coll., St. Andrews Univ.)

HABERLAND.

A. Windaus und W. Eickel, *Synthese einiger Dihydrophenanthrenderivate*. Über den Verlauf dieser Synthese vgl. KIRCHNER (Nachr. K. Ges. Wiss. Göttingen 1921. 154; C. 1923. I. 944). Nach ihr lassen sich — im Gegensatz zu der von PSCHORR — auch 9-alkylierte Phenanthrenderiv. gewinnen, da sich Oxindol auch mit Ketonen kondensiert. Um den Colchicinderiv. nahestehende Verbb. zu erhalten, wurde in den 9,10-Dihydrophenanthren-9-carbonsäuren das CO_2H nach CURTIUS durch $\text{NH}\cdot\text{CO}_2\text{C}_2\text{H}_5$ ersetzt. Bei energ. Behandlung dieser Urethane mit starker HCl entstehen nicht etwa die 9-Aminodihydroverbb., sondern auffallenderweise unter Abspaltung von NH_3 die betreffenden Phenanthrene selbst. Dieser glatte Abbau kann für die Synthese von Phenanthrenderiv. von Bedeutung sein. — 3-p-Methoxybenzylloxindol, $\text{C}_{16}\text{H}_{15}\text{O}_3\text{N}$. Durch Hydrieren von 3-p-Methoxybenzaloxindol in A. + wenig Eg. (+ Pd-Mohr). Nadeln aus verd. A., F. 114°. — Überführung in die 3-Methoxy-9,10-dihydrophenanthren-9-carbonsäure, $\text{C}_{16}\text{H}_{14}\text{O}_3$, analog KIRCHNER (l. c.). Sie wird der sauren Fl. mit Ä. entzogen u. bildet Krystalle aus verd. A., F. 155°, unl. in W., sonst ll. außer in PAe. Ausbeute 15%. — Methylester, $\text{C}_{17}\text{H}_{16}\text{O}_3$. Mit CH_2N_2 . Nadeln aus verd. CH_3OH , F. 98°. — Hydrazid, $\text{C}_{16}\text{H}_{16}\text{O}_3\text{N}_2$. Nadelchen aus verd. A., F. 152—153°. — Azid, Zers. gegen 72°. — Urethan $\text{C}_{16}\text{H}_{16}\text{O}_3\text{N}$ (Formel nebenst.) Aus dem Azid mit absol. A. Blättchen aus verd. A., F. 124 bis 125°. Gibt bei der Spaltung mit HCl 3-Methoxyphenanthren, F. 60°. — 3-[3,4'-Methylenedioxybenzyl]-oxindol, $\text{C}_{16}\text{H}_{13}\text{O}_3\text{N}$. Durch Hydrieren des Kondensationsprod. von Piperonal u. Oxindol.




Nadelchen aus verd. A., F. 138—139°. — 2,3(3,4?)-Methylenedioxy-9,10-dihydrophenanthren-9-carbonsäure, $\text{C}_{16}\text{H}_{12}\text{O}_4$. Nadeln, F. 192—193°, unl. in W., sonst ll. Ausbeute 20%. — Methylester, $\text{C}_{17}\text{H}_{14}\text{O}_4$. Nadelchen, F. 107—108°. — Hydrazid, $\text{C}_{16}\text{H}_{14}\text{O}_3\text{N}_2$, Nadelchen, F. 187—189°. — Azid, Zers. gegen 95°. — Urethan $\text{C}_{16}\text{H}_{17}\text{O}_4\text{N}$. Blättchen, F. 150—152°. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 57. 1871—75. 1924.) LINDENBAUM.

A. Windaus, H. Jensen und A. Schramme, *Synthese des 9-Methylphenanthrens*. Die Auffassung des durch Abbau des Colchicins erhaltenen KW-stoffs $\text{C}_{15}\text{H}_{12}$ als 9-Methylphenanthren (vgl. LIEBIGS Ann. 439. 59; C. 1924. II. 2164) wird durch

artig riechende Fl., $D_{18.5}^{18.5} = 1,4418$, $n_D^{18.5} = 1,4418$, *Methylester*, $C_{10}H_{18}O_3$, ebenso, $D_{18.7}^{18.7} = 0,9938$, $n_D^{18.7} = 1,4426$. — *Dimethylacetal des Nonylaldehyds*, $C_{11}H_{24}O_2$, $Kp_{15} = 96-98^\circ$, $D_{18.4}^{18.4} = 0,8733$, $n_D^{18.5} = 1,4246$. — *Dimethylacetal des Nonanal-9-säure-1-methylesters*, $C_{12}H_{24}O_4$ (II.), $Kp_{14} = 148-150^\circ$, $D_{19.4}^{19.4} = 0,9379$, $n_D^{18.8} = 1,4312$. — *Dimethylacetal des ω -Benzoyloxy-nonylaldehyds*, $C_{18}H_{28}O_4$ (III.), $Kp_{15} = 234-235^\circ$, $D_{19.4}^{19.4} = 1,0096$, $n_D^{19} = 1,4862$. — *Methylhalbacetal des ω -Oxynonylaldehyds*, $C_{10}H_{20}O_2$ (IV.), obstartig riechende Fl., $Kp_{15} = 125-130^\circ$, $D_{18.5}^{18.5} = 0,8892$, $n_D^{18.5} = 1,4306$. — *Dimethylacetal des ω -Oxynonylaldehyds*, $C_{11}H_{24}O_3$ (V.), $Kp_{14} = 158-160^\circ$, $D_{19.4}^{19.4} = 0,9329$, $n_D^{19.2} = 1,4441$. — *Kondensationsprodd. des ω -Oxynonylaldehyds*, $C_{18}H_{34}O_3$ (?), $Kp_{15} = 210-220^\circ$ bezw. $Kp_{14} = 200-220^\circ$, reduzieren Fehlingsche Lsg. erst nach Hydrolyse. — *n-Undecandiol-1,9*, $C_{11}H_{24}O_2$ (VI.), geruchloses Öl, $Kp_{14} = 175^\circ$, $D_{18.4}^{18.4} = 0,9273$. — *Penten-4-ol-1*, $HO \cdot CH_2 \cdot CH_2 \cdot CH_2 \cdot CH : CH_2$, aus Allylmalonester durch Na, $Kp. = 142^\circ$. — *γ -Oxy-n-butyraldehyd*, *1-Oxytetrahydrofuran*, $C_4H_8O_2$ (VII.), $D_{18.4}^{18.4} = 1,0447$, $n_D^{18} = 1,4291$. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 57. 1911-17. 1924. Frankfurt a. M., Univ.) SPIEGEL.

Reinhard Seka, *Zur Kenntnis substituerter Indolderivate* (II.). (I. vgl. Ber. Dtsch. Chem. Ges. 56. 2058; C. 1923. III. 1412.) *Methylketol- β -aldehyd* (*2-Methyl-3-formylindol*, I.) kondensiert sich mit Nitromethan in alkal. Medium zu *2-Methyl-3-[ω -nitrovinyl]-indol*, mit Cyanessigester zu *2-Methyl-3-[ω -cyan- ω -carbäthoxyvinyl]-indol*, mit Benzyleyanid erst im Bombenrohr bei 100° mit C_2H_5ONa als Kondensationsmittel zu *2-Methyl-3-[ω -phenyl- ω -cyanvinyl]-indol*. Zu analogen Kondensationsverss. sollte das aus jenem Methylformylindol über das Oxim durch $(C_2H_5O)_2O$ u. $NaC_2H_3O_2$ erhaltliche *1-Acetyl-2-methyl-3-cyanindol* (II.) dienen. Mit oder ohne Cyanessigester in Ggw. von C_2H_5ONa im Rohr erhitzt, lieferte es als Hauptprod. unter Abspaltung des C_2H_5O nur *2-Methyl-3-cyanindol*, mit Benzylecyanid u. C_2H_5ONa eine Verb. $(C_7H_6N)_4$, deren Konst. noch nicht geklärt ist.






Versuche. *2-Methyl-3-[ω -nitrovinyl]-indol*, $C_{11}H_{10}O_2N_2$, orangefarbenes Krystallpulver (aus alkoh. Lsg. durch vorsichtigen Zusatz von W.), $F. = 191,5^\circ$ (Zers.), ll. in w. A., Eg., Pyridin, Aceton u. Essigester, wl. in w. Ä., Chlf., Bzl., unl. in h. Lg., in Säuren u. in Alkalien



gelbrot l. — *2-Methyl-3-[ω -cyan- ω -carbäthoxyvinyl]-indol*, $C_{15}H_{14}O_2N_2$, citronengelb (aus A.), $F. = 246-247^\circ$, unl. in W., wl. in h. Lg., l. in h. Ä., Chlf., Bzl., ll. in h. A., Eg., Aceton, Essigester u. Pyridin. — *2-Methyl-3-[ω -phenyl- ω -cyanvinyl]-indol*, $C_{18}H_{14}N_2$, Krystalle (aus A.), $F. = 179,5^\circ$, unl. in W. u. Lg., ll. in h. A., Chlf., Eg., Bzl. u. Pyridin, in k. Aceton u. Essigester. Gibt Chloroplatinat u. Pikrat. — *1-Acetyl-2-methyl-3-cyanindol*, $C_{12}H_{10}ON_2$ (II.), Nadeln (aus A.), $F. = 116^\circ$. — *2-Methyl-3-cyanindol*, $C_{10}H_8N_2$, Nadeln (aus h. W.), $F. = 209-210^\circ$, wl. in Lg., ll. in A., Ä., Chlf., Eg., etwas l. in h. W. — Verb. $C_{28}H_{24}N_4$, aus Acetylmethyleyanindol u. $C_6H_5 \cdot CH_2 \cdot CN$ (vgl. oben), Nadeln (aus starkem A.), $F. = 102-103^\circ$, unl. in W. u. Lg., ll. in h. A., Chlf., Essigester, Eg., Pyridin, sl. in Aceton u. Ä. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 57. 1868-71. 1924. Wien, Univ.) SPIEGEL.

Reinhard Seka, *Zur Kenntnis heterocyclischer Ringsysteme* (I.). Es wurden bicycl. kondensierte heterocycl. Ringsysteme dargestellt, bei denen die Kondensation der beiden heterocycl. Systeme durch zwei gemeinschaftliche Ringglieder, die in β -Stellung zu den Heteroatomen sich befinden, erzeugt wurde. *Carbopyrrotritar-säurediäthylester* (I) gab bei Einw. von C_6H_5MgBr [*2,5-Dimethylfuro*]-*2',2',5',5'-tetraphenyl-[tetrahydrofuran]* (II), mit CH_3MgJ die II entsprechende *2',2',5',5'-Tetramethylverb.* — Ein Imidringschluß des dem Ester I entsprechenden Säureamids konnte nicht erzielt werden, da das Diamid zu leicht sublimiert. — Einw. von C_6H_5MgBr auf *2,5-Dimethylpyrrol-3,4-dicarbonensäureester* führte nur zur B. von *2,5-Dimethyl-4-[diphenyloxyethyl]-pyrrol-3-carbonsäurediäthylester* (III). In der An-

nahme, daß die freie Imidgruppe im Dimethylpyrroldicarbonsäureester für den Verlauf dieser Rk. verantwortlich gemacht werden muß, wurde *2,5-Dimethyl-N-phenylpyrrol-3,4-dicarbonsäurediäthylester* mit $\text{C}_6\text{H}_5\text{MgBr}$ umgesetzt, wobei eine Verb. isoliert wurde, der vielleicht die Konst. eines *2,5-Dimethyl-N-phenyl-3,4-dibenzoylpyrrols* (IV) zukommt. Einw. von CH_3MgJ auf den N-Phenylpyrroldicarbonsäureester führte zu einer Verb., deren Analyse auf das Vorliegen von [*2,5-Dimethyl-N-phenylpyrrolo*]-2',2',5',5'-tetramethyl-[tetrahydrofuran] (V) deutete.







Versuche. *Carbopyrotritisäurediamid*, $\text{C}_8\text{H}_{10}\text{O}_3\text{N}_2$, Darst. durch einwöchiges Erhitzen des Diäthylesters (I) mit fl. NH_3 im Autoklaven auf 50° ; nach Verreiben des Reaktionsprod. mit Ä. Reinigung der Verb. durch Sublimation, Nadeln; im geschlossenen Röhrchen F. $243-244^\circ$ (Zers.), ab 240° weich werdend; ll. in k. A. u. h. W., unl. in Lg. Wird in schwefelsaurer Lsg. durch Zugabe von NaNO_2 zur *Carbopyrotritisäure*, F. 228° , verseift. — [*2,5-Dimethylfuro*]-2',2',5',5'-tetraphenyl-[tetrahydrofuran], $\text{C}_{22}\text{H}_{26}\text{O}_2$ (II), aus 1 Mol. I in Ä. + 5 Mol. $\text{C}_6\text{H}_5\text{MgBr}$ in Ä., anfangs unter Kühlung, danach 2 Stdn. auf sd. Wasserbad erhitzt; Zers. des Reaktionsgemisches durch Eis u. HCl . Nach Extrahieren mit Ä. äth. Lsg. mit $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ -Lsg. u. W. gewaschen, Rückstand aus äth. Lsg. mit Wasserdampf dest., wobei II zurückbleibt. Durch Zugabe von W. zur sd. Eg.-Lsg., bis Trübung eintritt, nach Erkalten schiefwinkelige Tafeln, F. 199° (vorher Sintern); ll. in Ä., $\text{CH}_3\text{CO}_2\text{C}_2\text{H}_5$, Eg., Bzl. u. h. A., swl. in Lg.; Lsg. in konz. H_2SO_4 scharlachrot. — [*2,5-Dimethylfuro*]-2',2',5',5'-tetramethyl-[tetrahydrofuran], $\text{C}_{12}\text{H}_{18}\text{O}_2$, leicht bewegliche Fl., Kp._{10} 107 bis 109° , bei längerem Stehen gelbbraun werdend, unl. in W. u. Alkali; Lsg. in konz. H_2SO_4 dunkel purpurrot. — *2,5-Dimethylpyrrol-3,4-dicarbonsäurediäthylester*, $\text{C}_{12}\text{H}_{17}\text{O}_4\text{N}$, durch 8 tages Erwärmen von Diacethernsteinsäurediäthylester mit fl. NH_3 im Autoklaven auf 50° ; aus Ä. eisblumenartige Krystalle, F. $98-99^\circ$. — *2,5-Dimethyl-4-[diphenyloxymethyl]-pyrrol-3-carbonsäureäthylester*, $\text{C}_{22}\text{H}_{23}\text{O}_3\text{N}$ (III), aus 1 Mol. des vorigen + 8 Mol. $\text{C}_6\text{H}_5\text{MgBr}$; aus A. Nadeln (Drusen), bei 185° gelb werdend, F. 189° (dunkelrote Fl.), bei 192° Zers. unter Gasentw., ll. in $\text{CH}_3\text{CO}_2\text{C}_2\text{H}_5$, Aceton, h. A., Bzl., Ä., wl. in h. Lg.; Lsg. in Eg. u. konz. H_2SO_4 dunkelrot. — *2,5-Dimethyl-N-phenyl-3,4-dibenzoylpyrrol* (?), $\text{C}_{26}\text{H}_{21}\text{O}_2\text{N}$ (IV), aus verd. Eg. stark lichtbrechende Krystallnadeln, F. $206-207^\circ$. — [*2,5-Dimethyl-N-phenylpyrrolo*]-2',2',5',5'-tetramethyl-[tetrahydrofuran], $\text{C}_{18}\text{H}_{23}\text{ON}$ (V), ölig, Kp._{10} 145° , farblos, bei längerem Stehen dunkel werdend. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 57. 1861—67. 1924. Wien, Univ.)

HABERLAND.




R. F. Hunter, *Die Bromierung thiazolringhaltiger Substanzen*. III. Die Struktur der Brombenzothiazole, 1-Phenylbenzothiazoltetrabromid und das Dibromsubstitutionsprodukt des 1-Anilidobenzothiazols. (II. vgl. Chem. News 129. 125; C. 1924. II. 1795.) BOGERT u. ABRAHAMSON (Journ. Americ. Chem. Soc. 46. 826; C. 1922. III. 150) haben festgestellt, daß 1-Phenylbenzothiazol im Gegensatz zu den substituierten Benzothiazolen ein Tetrabromid bildet. Dieser Verb. ist Konst. I zu-

zuschreiben, worin S^{II} in S^{IV} übergegangen ist. Dieses Tetrabromid gibt beim Erhitzen mit W. ein Monobromsubstitutionsprod.; das ebenfalls ein Tetrabromid bildende 1-Phenylaminobenzothiazol gibt beim Erwärmen des Tetrabromids mit Alkali dagegen ein Dibromsubstitutionsprod. — HUGERSHOFF (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 37. 3120 [1903]) hat durch Behandeln von 1-Anilidobenzothiazoltetrabromid mit verd. Alkali ein seiner Konst. nach bisher nicht aufgeklärtes Dibromsubstitutionsprod. des 1-Anilidobenzothiazols erhalten. Dem Anilid kommt auf Grund seiner verschiedenen Darstellungsmöglichkeiten (aus 1-Chlorbenzothiazol + $C_6H_5NH_2$ oder durch Bromieren von Diphenylthioharnstoff u. Abspaltung von HBr) sowohl Konst. II als III (tautomere Verb.) zu. Aus III würde das Tetrabromid IV bzw. Dibromid V entstehen. Denkbar ist aber auch, daß das Dibromid Konst. VI haben kann. Die Aufklärung hierüber gibt die Alkalischmelze, wobei aus VI $C_6H_5NH_2$ entstehen müßte; da sich $C_6H_5NH_2$ nicht bei der Spaltung nachweisen ließ, muß das Hegershoffsche Dibromid als 1-p-Bromphenylamino-5-brombenzothiazol (V) angesehen werden.



Darst. von 1-Phenylbenzothiazol durch Verschmelzen von Benzalanilin mit S bei 260°, Extrahieren der Schmelze mit konz. HCl, Filtrieren in k. W.; aus A. F. 115°. — 1-Phenylbenzothiazoltetrabromid aus vorigem in Eg. + Br, orangerote Nadeln, die an Luft allmählich Br abgeben; wird die Lsg. der Krystalle mit W. verd. u. kurze Zeit gekocht, so entsteht 5-Brom-1-phenylbenzothiazol, weiße Krystalle. (Chem. News 129. 235—40. 1924. Highbury New Park, Chem. Lab.) HABERLAND.

Marston Taylor Bogert und Moses Chertcoff, Eine neue Gruppe von Farbstoffen aus giftigen Gasen mit 2-Aminothiazolen als Zwischenprodukten. Darstellung von Thiazolfarbstoffen vom Typhus des Doebnerschen Violetts. Auf Grund der Ansicht, daß in den aus halogenierten Aldehyden u. Ketonen (die im Kriege als tränenreizende Gase benutzt wurden) u. Thioharnstoff zu erhaltenden 2-Aminothiazolen (I) das im Fünfring befindliche S-Atom einer $CH:CH$ -Gruppe gleichwertig ist, daß somit die NH_2 -Gruppe p-ständig zum C_6 steht, haben Vff. diese Aminothiazole in Ggw. von HCl mit arom. Aldehyden kondensiert u. auf diese Weise Monoaryldithiazylmethane (II), die entsprechenden Carbinole u. Farbstoffe (III, Oxalat) erhalten. Die Kondensation gelang auch mit I bei dem statt Aryl in




4 Alkyl substituiert war. Der Angriff des Aldehyds muß demnach an C_6 erfolgen. Die Leukobasen der neuen Farbstoffe waren farblos bis hellgelb, die Carbinole dunkelrot u. die Farbstoffe selbst (Oxalat) dunkelgrün. Mit analog gebauten Triphenylmethanfarbstoffen besteht große Ähnlichkeit. Die neuen Farbstoffe färben Seide, Wolle u. tanningebeizte Baumwolle grün, jedoch sind sie färberisch weniger gut als Malachitgrün; in direktem Sonnenlicht werden sie gebleicht, mit überschüssiger konz. HCl entstehen rote Lsgg. Die Farbnuance wird durch Verwendung von p-Dimethylaminobenzaldehyd statt C_6H_5CHO bei den neuen Farbstoffen nicht sehr geändert. Als Ausgangsverbb. wurden benutzt: Dichloräther, Chloraceton u. Chloracetophenon; von Thiazolen wurden dargestellt: 4-Methyl- u. 4-Phenyl-2-amino-

thiazol. Zur Kondensation wurden folgende Aldehyde angewandt: C_6H_5CHO u. seine *p*-Chlor-, *o*-, *m*-, *p*-Nitro-, *p*-Dimethylamino-, *o*- u. *p*-Oxyderiv., sowie Piperonal. Es wurde ferner festgestellt, daß die Amino-thiazole mit diazotierten Aminen zu roten Farbstoffen (IV) kuppeln. (Proc. National Acad. Sc. Washington 10. 418—20. 1924. Columbia Univ.)

HABERLAND.

Frederick Daniel Chataway, Frank Leslie Garton und George David Parkes, *Diazoniumtetrachlorjodide und Plumbichloride*. Werden k. Lsgg. von Diazoniumchloriden in solche von JCl_3 in konz. HCl gegossen, so scheiden sich *Diazoniumtetrachlorjodide* ab. Die Konst. dieser Verbindungen gleicht der von CHATTAWAY u. GARTON (Journ. Chem. Soc. London 125. 183; C. 1924. I. 2710) beschriebenen Tetrachlorjodide von organ. Basen u. entspricht Formel I. Die neuen Verbb. lassen sich aus verd. Lsg. von JCl_3 in konz. HCl umkrystallisieren, sie sind, besonders in zugeschmolzenen Gefäßen oder in Cl_2 -Atmosphäre, sehr beständig; mit HJ bzw. angesäuerter KJ-Lsg. reagieren sie nach II; mit CuCl, CuBr oder Kaliumkupfercyanür wird die Diazogruppe in I zum größten Teil durch Cl, Br oder CN ersetzt, eine kleine Menge der entsprechenden Jodverb. bildet sich ebenfalls; mit h. W. entstehen *Phenole*, teilweise auch *halogensubstituierte Phenole*; mit konz. NH_4OH entstehen *Azide* u. *Stickstoffjodid*; mit w. A. wird die Diazogruppe hauptsächlich durch Cl ersetzt, H-Substitution tritt nur in untergeordnetem Maße ein. — Mit $PbCl_4$ bilden die Diazoniumchloride die *Diazoniumplumbichloride* (III), die in trockenem Zustande ebenfalls recht beständig sind u. beim Erhitzen sich explosionsartig zersetzen; sie sind nicht umkrystallisierbar; mit KJ in saurer Lsg. reagieren sie nach II; ebenso wie bei I kann die Diazogruppe durch CN oder Cl ersetzt werden. Durch W. findet sofortige Zers. unter B. von PbO_2 u. *Phenol* oder *Chlorphenol* statt; die B. von Chlorphenol tritt besonders mit verd. H_2SO_4 ein; mit sd. A. wird die Diazogruppe in III durch Cl ersetzt, durch überschüssiges Cl wird hier C_2H_5OH zum Aldehyd oxydiert, gleichzeitig scheidet sich $PbCl_2$ ab.



Versuche. 1. *Benzoldiazoniumtetrachlorjodid*, $C_6H_5N_2Cl_4J$ (I, $Ar = C_6H_5$), hellgelbes krystallin. Pulver, F. 88° (Zers.). Die nachgenannten Verbb. haben dieselbe Farbe: 2. *o*-Toluol-Deriv., $C_7H_7N_2Cl_4J$, F. $81,5^\circ$. — 3. *p*-Toluolverb., F. 95° . — 4. *o*-Chlorbenzolderiv., $C_6H_4N_2Cl_5J$, F. 148° . — 5. *p*-Chlorbenzolderiv., F. 111° . — 6. 2,4-Dichlorbenzolderiv., $C_6H_3N_2Cl_6J$, Zers. bei ca. 150° unter B. von JCl_3 . — 7. 2,5-Dichlorbenzolderiv., F. 141° . — 8. 2,4-Dibrombenzolderiv., $C_6H_3N_2Cl_4Br_2J$, Zers. bei ca. 120° unter Entw. von JCl_3 . — 9. 2,4,6-Tribrombenzolderiv., $C_6H_2N_2Cl_4Br_3J$, F. 135° . — 10. *o*-Nitrobenzolderiv., $C_6H_4O_2N_3Cl_4J$, F. $125,5^\circ$. — 11. *m*-Nitrobenzolderiv., F. 92° . — 12. *p*-Nitrobenzolderiv., F. 103° . — 5 g der Verbb. 1., 2. u. 5. in 15 g KJ + 30 cem W. gaben beim Ansäuern mit Essigsäure unter Abscheidung

von Jod u. N_2 -Entw. *Jodbenzol*, Kp. 189° , *o-Jodtoluol*, Kp. 204° u. *p-Chlorjodbenzol*, F. 56° in nahezu quantitativer Ausbeute. — 10 g der Verb. 9. allmählich zugegeben zu überschüssiger h. Kaliumkupfercyanürlsg. lieferte neben wenig *CuJ 2,4,6-Tribrombenzonitril*, F. 127° u. *2,4,6-Tribrom-1-jodbenzol*, F. $105,5^\circ$. — Verb. 10. wurde mit W. gekocht, bis die N_2 -Entw. beendet war; als Reaktionsprodd. wurden isoliert: *o-Nitrophenol*, F. 45° u. *4-Chlor-2-nitrophenol*, F. 87° . — Wird eine w. Lsg. von *CuCl* in konz. *HCl* mit 10 g der Verb. 12. versetzt, so entsteht wenig J_2 , *CuJ* u. *p-Chlornitrobenzol*, F. 83° in 70%ig. Ausbeute. — *Diphenyl-4,4'-bisdiazoniumoctachloridijodid*, $C_{12}H_8N_4Cl_8J_2$, aus diazotiertem Benzidin; gelbbraune krystallin. M., zwischen $135-140^\circ$ explosionsartige Zers. — *Diphenyl-4,4'-bisazoimid*, aus vorigem durch Zers. mit NH_4OH (D. 0,880) u. Eis; aus Bzl. hellbraune Blättchen, F. 131° , Zers. bei $165-170^\circ$; bei plötzlichem Erhitzen oder bei Betupfen mit konz. H_2SO_4 Explosion; wird ein Krystall in konz. H_2SO_4 geworfen, so entsteht ohne Explosion eine rote Lsg.

Darst. der Diazoniumplumbichloride (III): die Diazoniumchloridlsg. wird bei einer 0° nicht übersteigenden Temp. zu einer durch Einleiten von Cl_2 in frisch gefälltes $PbCl_2$ (in konz. *HCl* suspendiert) bereiteten $PbCl_4$ -Lsg. gegeben. III scheidet sich sofort als gelbes mikrokrySTALL. Pulver ab, das mit Cl_2 -haltiger *HCl* u. Cl_2 -haltigem Chlf. gewaschen u. über $CaCl_2$ in einem mit Cl_2 gefüllten Exsiccator getrocknet wird. Dargestellt wurden folgende Diazoniumplumbichloride: 13. *o-Toluolderiv.*, $C_{14}H_{14}N_4Cl_6Pb$, Zers. bei 78° . — 14. *2,4-Dichlorbenzolderiv.*, $C_{12}H_6N_4Cl_{10}Pb$, Zers. bei 183° . — 15. *p-Brombenzolverb.*, $C_{12}H_8N_4Cl_6Br_2Pb$, Zers. bei 139° . — 16. *2,4-Dibrombenzolderiv.*, $C_{12}H_6N_4Cl_6Br_4Pb$, Zers. bei 117° . — 17. *2,4,6-Tribrombenzolderiv.*, $C_{12}H_4N_4Cl_6Br_6Pb$, Zers. bei 114° . — 18. *o-Nitrobenzolderiv.*, $C_{12}H_5O_4N_6Cl_6Pb$, Zers. bei 120° . Werden die Verbb. in ein auf die Zersetzungstemp. vorgewärmtes Bad gebracht, so tritt die Zers. $1-2^\circ$ höher ein. Einw. von *CuCl* auf 14. gab *1,2,4-Trichlorbenzol*, Kp. 213° , F. 16° in 70%ig. Ausbeute. — 15. + *KJ*-Lsg. + CH_3COOH gab quantitativ *J* u. *p-Bromjodbenzol* in 90%ig. Ausbeute. — 16. + h. Kaliumkupfercyanürlsg. gab *2,4-Dibrombenzonitril*, F. 81° . — Mit sd. A. lieferte 17. *1-Chlor-2,4,6-tribrombenzol*, F. 87° (70%) u. sehr wenig *1,3,5-Tribrombenzol*. — Aus 18. + h. verd. H_2SO_4 wurde eine gelbbraune, nicht krystallisierende M. erhalten, ll. in *NaOH* mit rötlich-gelber Farbe, allem Anscheine nach aus chlorierten *o-Nitrophenolen* bestehend. — *Diphenyl-4,4'-bisdiazoniumplumbichlorid*, $C_{12}H_8N_4Cl_6Pb$, orangefarbenes Pulver, bei 131° heftig explodierend; mit sd. W. entsteht hieraus *4,4'-Dioxydiphenyl*, F. 272° u. nur wenig *Cl*-haltige Verbb. — Von folgenden auch schon von SAKELLARIOS (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 56. 2536; C. 1924. I. 301) dargestellten Verbb. hat Vf. die Explosionstemp. festgestellt: *Benzolderiv.* $80-81^\circ$. — *p-Chlorbenzolderiv.* $145-150^\circ$. — *p-Toluolderiv.* $72-75^\circ$. — *m-Nitrobenzolderiv.* $161-163^\circ$. — *p-Nitrobenzolderiv.* $132-133^\circ$.


Die Einw. von NH_4OH auf I oder III muß nach Schema (IV) verlaufen. — *2,4-Dichlorphenylazoimid*, $C_6H_3N_3Cl_2$, aus 6. mit Eis gemischt + überschüssigem NH_4OH (D. 0,880); ausfallender Nd. wird von Jodstickstoff durch Schütteln mit Na_2SO_3 -Lsg. befreit u. das Azoimid aus schwacher Na_2SO_3 -Lsg. mit Wasserdampf übergetrieben; aus Aceton oder Bzl. hellgelbe Prismen, F. 54° ; bei langsamem Erhitzen über F. Zers. bei 160° , bei schnellem Erhitzen explosionsartige Zers. unter B. von schwarzem Rauch. — *2,5-Dichlorphenylazoimid*, hellgelbe Krystalle, F. 30° , ll. in organ. Mitteln. — *2,4-Dibrombenzolaazoimid*, aus Aceton oder Bzl. hellgelbe Nadeln, F. 62° . — *o-Tolylazoimid*, hellgelbes Öl, Kp.₂₀ 70° , explodiert beim Erhitzen unter gewöhnlichem Druck. Folgende Triazole wurden nach V dargestellt: *1-(2,4-Dichlorphenyl)-1,2,3-triazol*, $C_6H_3N_3Cl_2$, aus *2,4-Dichlorphenylazoimid* mit bei 0° mit C_2H_2 gesätt. Aceton durch Erhitzen auf 100° im Rohr; aus sd. W. Nadeln, F. 80° ; Geruch champignonartig; ll. in Ä.u. konz. Mineralsäuren. — *1-(2,5'-Di-*

chlorphenyl)-1,2,3-triazol, Nadeln, F. 78°. — 1-(2,4'-Dibromphenyl)-1,2,3-triazol, $C_8H_3N_3Br_2$, Nadeln. — 1-o-Tolyl-1,2,3-triazol, gelbes Öl; alle letztgenannten Verbb. besitzen ähnlichen Geruch u. sind wl. in W. — 1,1'-(4,4'-Diphenyl)-bis-1,2,3-triazol, $C_{16}H_{12}N_6 = C_2H_2N_3 \cdot C_6H_4 \cdot C_6H_4 \cdot C_2H_2N_3$, aus sd. Anilin hellgelbe Nadeln, F. 326° (Zers.); ll. in konz. Mineralsäuren mit violetter Farbe, die auf VI zurückzuführen sein dürfte. — 1-o-Tolyl-5-methyl-1,2,3-triazol-4-carbonsäure, $C_{11}H_{11}O_2N_3$, durch Kochen von C_2H_5ONa (2 g Na in 35 ccm A.) + 8 g Acetessigester + 7 g o-Tolyl azoimid; aus sd. W. Nadeln, F. 138° (Zers. u. Entw. von CO_2); es bildet sich hierbei (vgl. DIMROTH, Ber. Dtsch. Chem. Ges. **35**, 1029 [1902]) der Ester, der aber sofort hydrolysiert wird. Die Hydrolyse tritt mit halogensubstituierten Phenylazoimiden nicht ein: aus 2,4-Dichlorphenylazoimid entsteht so der Äthylester der 1-(2,4'-Dichlorphenyl)-5-methyl-1,2,3-triazol-4-carbonsäure, $C_{12}H_{11}O_2N_3Cl_2$, aus sd. A. rhomb. Tafeln, F. 270° (Zers.); hieraus die freie Säure, $C_{10}H_7O_2N_3Cl_2$, aus W. rhomb. Tafeln, F. 169,5° (unter Entw. von CO_2). — 1-(2,5'-Dichlorphenyl)-5-methyl-1,2,3-triazol-4-carbonsäure, aus sd. W. Nadeln, F. 158° (Zers.); der Ester, der sich bei dieser analogen Rk. zuerst gebildet hatte, war zu schwer isolierbar. — Äthylester der 1-(2,4'-Dibromphenyl)-5-methyl-1,2,3-triazol-4-carbonsäure, $C_{12}H_{11}O_2N_3Br_2$, aus sd. A. Prismen, F. 302° (Zers.); freie Säure, $C_{10}H_7O_2N_3Br_2$, aus h. W. Nadeln, F. 173° (Zers.). — 1,1'-(4,4'-Diphenyl)-bis-5-methyl-1,2,3-triazol-4-carbonsäure, $C_{20}H_{16}O_4N_6$, weißes Pulver, F. 245° (Zers. u. Entw. von CO_2); der Ester war auch in diesem Falle schwierig isolierbar. Alle genannten Triazolcarbonsäuren gehen beim Erhitzen unter Abspaltung von CO_2 in die entsprechenden 5-Methyltriazole über: 1-(2,4'-Dichlorphenyl)-5-methyl-1,2,3-triazol, $C_9H_7N_3Cl_2$, Isolierung aus der in Ä. gel. mit NaOH gewaschenen Schmelze über das Sulfat (farbloses Krystallpulver) aus h. W. Rhomben, F. 69°. — 1-(2,5'-Dichlorphenyl)-5-methyl-1,2,3-triazol, aus sd. W. Rhomben, F. 51°. — 1-(2,4'-Dibromphenyl)-5-methyl-1,2,3-triazol, aus sd. W. Tafeln, F. 87°. — 1,1'-(4,4'-Diphenyl)-bis-5-methyl-1,2,3-triazol aus sd. Anilin rhomb. Tafeln, F. 227°. — Alle Phenyl-1,2,3-triazole mit nicht substituiertem Triazolring besitzen einen champignonartigen Geruch, der durch Substitution im Benzolring nicht verändert wird. Die 1-Phenyl-5-methyl-1,2,3-triazole sind ohne besonderer Geruch. (Journ. Chem. Soc. London **125**, 1980—91. 1924. Oxford, The Queens Coll.)

HABERLAND.

J. van Alphen, Die Einwirkung der Ketene auf Hydrazinderivate. Aldoketen u. Ketoketene in äth. Lsg. verbinden sich mit Phenylhydrazin u. kernsubstituierter Derivv. zu β -acylierten Phenylhydrazinen. Die Anlagerung der Ketene erfolgt zu nächst nur am β -N-Atom. Die bei tiefen Temp. bei Senfölen u. Isocyanaten beobachtete Anlagerung an das α -N-Atom konnte für Ketene auf direktem Weg nicht erreicht werden. Ein zweites Ketenmol. wird dann in α -Stellung aufgenommen aber mit weniger großer Geschwindigkeit. So addiert β -Acetylphenylhydrazin das Diphenylketen zu α -Diphenylacetyl- β -acetylphenylhydrazin, das durch Hydrolyse in α -Diphenylacetylphenylhydrazin übergeführt wird. Weder durch Kochen in alkoh. Lsg., noch durch Erhitzen auf 180° kann die α -acylierte in die β -acylierte Verb. umgesetzt werden. Methylhydrazin reagiert mit 2 Molekülen Keten, indem sowohl im α - wie im β -N-Atom Acetylierung eintritt. Im Methylhydrazin fehlt der den Phenylrest eigene negative Einfluß auf die Basizität der N-Atome, die gleich stark bas. sind u. demnach mit gleicher Stärke die Anlagerung der Acetylgruppe voll ziehen. Im Phenylhydrazin hingegen ist die Basizität des α -N derart abgeschwächt daß das Keten am β -N angreift. Mit in Aceton gel. Hydrazinsalzen (Phenylhydrazinhydrochlorid) tritt keine Umsetzung der Ketene ein. — 1 Mol. Kohlensuboxyd bildet mit 1 Mol. Phenylhydrazin eine unbeständige Verb., die mit 1-Phenyl-3,5-diketopyrazolidin (I) tautomer ist, in dieses übergeht u. als 1-Phenyl-5-keto-3-oxypyrazolin (II) erkannt wurde. Letztere bildet mit 1 Mol. Phenylhydrazin eine Additions

verb., die auch direkt aus 1 Mol. Kohlensuboxyd mit 2 Mol. Phenylhydrazin entsteht. — Die Neigung der Ketene, mit Anilinderivv. zu reagieren, wird durch die Einführung solcher Gruppen beeinträchtigt, die den bas. Charakter der Aminogruppe herabsetzen. Die Acetylierungswrkg. der Ketene ist relativ schwach, denn eine Nitrogruppe im *o*-Nitroanilin hebt diese Wrkg. schon auf. Durch HCl wird sie katalyt. beschleunigt. — Mit *o*-, *m*- u. *p*-Phenylendiamin gibt Kohlensuboxyd Verbb., die vermutlich heterocycl. Sieben-, Acht- u. Neunringe enthalten.



Versuche. β -Diphenylacetylphenylhydrazin, $\text{C}_{20}\text{H}_{18}\text{ON}_2$, aus Phenylhydrazin u. Diphenylketen in trockenem Ä., Nadeln vom F. 168° , ll. in k. Chlf., Aceton u. Pyridin, h. Ä., Bzl. u. CCl_4 , wl. in CS_2 , k. Ä., Bzl., unl. in W., Ä. u. Lg. — α -Acetyl- β -diphenylacetylphenylhydrazin, $\text{C}_{22}\text{H}_{20}\text{O}_2\text{N}_2$, F. $134\text{--}135^\circ$, l. in Ä., Chlf., Aceton, Bzl. u. Pyridin, unl. in W., Ä., CS_2 , Lg. u. CCl_4 . — Daraus durch Erhitzen mit Phosgen in Bzl. (im Rohr, Wasserbad) *N*-Phenyl-5-diphenylmethyl-2-ketofurodiazoldihydrid, $\text{C}_{21}\text{H}_{16}\text{O}_2\text{N}_2$ (III), farblose Krystalle, F. 113° , l. in organ. Lösungsm., unl. in W. — α -Diphenylacetyl- β -benzalphenylhydrazon, $\text{C}_{27}\text{H}_{22}\text{ON}_2$, aus Diphenylketen u. Benzalphenylhydrazon in Bzl., F. $182\text{--}183^\circ$ aus Ä. — β -Acetyl- α -diphenylacetylphenylhydrazin, $\text{C}_{22}\text{H}_{20}\text{O}_2\text{N}_2$, aus β -Acetylphenylhydrazin u. Diphenylketen in trockenem Ä. (Schütteln 2 Tage, 2 Monate stehen). Weiße Nadeln aus verd. Ä., F. $158\text{--}159^\circ$. — α -Diphenylacetylphenylhydrazin, $\text{C}_{20}\text{H}_{18}\text{ON}_2$ (Druckfehler im Original), aus voriger Verb. in Ä. mit 20%ig. H_2SO_4 am Rückflußkühler schwachgelb, F. $80\text{--}82^\circ$. — β -Diphenylacetyl-*o*-tolylhydrazin, $\text{C}_{21}\text{H}_{20}\text{ON}_2$, aus *o*-Tolylhydrazin u. Diphenylketen in trockenem Ä., Nadeln, F. 175° , aus verd. Ä. — β -Diphenylacetyl-*m*-tolylhydrazin, F. $143\text{--}144^\circ$. — β -Diphenylacetyl-*p*-tolylhydrazin, F. 177° . — β -Diphenylacetyl-*o*-nitrophenylhydrazin, $\text{C}_{20}\text{H}_{17}\text{O}_3\text{N}_3$, aus *o*-Nitrophenylhydrazin u. Diphenylketen; schwach gelbe Nadeln aus verd. Ä., F. $174\text{--}175^\circ$; l. mit dunkelroter Farbe in Ä., Chlf., Bzl., unl. in W., Ä. u. Lg. — β -Diphenylacetyl-*p*-nitrophenylhydrazin, rotbraune Nadeln, F. $218\text{--}219^\circ$. — β -Diphenylacetyl-*p*-bromphenylhydrazin, $\text{C}_{20}\text{H}_{17}\text{ON}_2\text{Br}$, aus Diphenylketen u. *p*-Bromphenylhydrazin, Nadeln aus verd. Ä., F. $182,5^\circ$.

α,β -Didiphenylacetylmethylhydrazin, $\text{C}_{20}\text{H}_{26}\text{O}_2\text{N}_2$, aus Methylhydrazin u. Diphenylketen, aus Ä. u. verd. Ä., F. 183° , l. in Ä., Chlf., CS_2 , Aceton, Bzl. u. Pyridin, unl. in W. u. Lg. — α,β -Di-*i*-butyrylphenylhydrazin, $\text{C}_{14}\text{H}_{20}\text{O}_2\text{N}_2$, aus Phenylhydrazin u. der doppelten Menge *i*-Butyrylbromid in trockenem Ä. Aus verd. Ä. u. Ä., F. 160° . — β -*i*-Butyrylphenylhydrazin, $\text{C}_{10}\text{H}_{14}\text{ON}_2$, bei Vermeidung eines Überschusses von *i*-Butyrylbromid in Pyridinlsg. Nadeln aus h. W., F. 123° (Sintern 121°). — β -*i*-Butyryl-*o*-tolylhydrazin, $\text{C}_{11}\text{H}_{16}\text{ON}_2$, aus *o*-Tolylhydrazin in Pyridin durch tropfenweisen Zusatz von *i*-Butyrylbromid, F. $99\text{--}100^\circ$. — β -*i*-Butyryl-*m*-tolylhydrazin, aus verd. Alkohol, F. 143° . — β -*i*-Butyryl-*p*-tolylhydrazin, F. 153° . — β -*i*-Butyryl-*o*-nitrophenylhydrazin, $\text{C}_{10}\text{H}_{13}\text{O}_3\text{N}_3$, aus *o*-Nitrophenylhydrazin u. *i*-Butyrylbromid; schwach braune Nadeln vom F. 153° . — β -*i*-Butyryl-*p*-nitrophenylhydrazin, schwach braune Nadeln vom F. 155° aus verd. Ä., l. in Ä. mit roter Farbe. — β -*i*-Butyryl-*p*-bromphenylhydrazin, $\text{C}_{10}\text{H}_{13}\text{ON}_2\text{Br}$, aus gleichen Anteilen *i*-Buttersäure u. *p*-Bromphenylhydrazin (120°), aus W. Nadeln, F. 164° . — β -Acetyl-*o*-nitrophenylhydrazin, $\text{C}_8\text{H}_9\text{O}_3\text{N}_3$, aus *o*-Nitrophenylhydrazin u. Ketten in äth. Lsg., goldbraune Nadeln, F. 140° . — β -Acetyl-*p*-nitrophenylhydrazin,

braune Nadeln, F. 205°, aus A. — β -Acetyl-*p*-bromphenylhydrazin, $C_8H_9ON_2Br$, aus äth. Lsg. von *p*-Bromphenylhydrazin u. Keten, F. 161°.

Verb. $C_{15}H_{16}O_2N_4$ (1-Phenyl-5-keto-3-oxypyrazolin + 1 Mol. Phenylhydrazin (aus 2 Mol. Phenylhydrazin u. 1 Mol. Kohlensuboxyd, F. 164°, l. in A., Aceton u. konz. HCl, unl. in Ä., Lg., Chlf. u. Bzl. — 1-Phenyl-5-keto-3-oxypyrazolin, $C_9H_9O_2N_2$ (II), F. 191°, aus Phenylhydrazin u. Kohlensuboxyd direkt u. über das tautomere 1-Phenyl-3,5 diketopyrazolidin, als unbeständigem Zwischenprod. — II bildet beim Erhitzen mit Benzaldehyd 1-Phenyl-4-benzyliden-5-keto-3-oxypyrazolin, $C_{16}H_{12}O_2N_2$, F. 266°. — *o*-Tolylhydrazinderiv. des 1-*o*-Tolyl-3,5-diketopyrazolidins, $C_{17}H_{20}O_2N_4$, aus *o*-Tolylhydrazin u. der äth. Lsg. von C_3O_2 , F. 168°, l. in konz. HCl, A., unl. in W., Ä., Lg. — *m*-Tolylhydrazinderiv. des 1-*m*-Tolyl-3,5-diketopyrazolidins, F. 192°, aus A. — *p*-Tolylhydrazinderiv. des 1-*p*-Tolyl-3,5-diketopyrazolidins, F. 198—200°, aus A. — 1-*p*-Tolyl-4-benzyliden-3,5-diketopyrazolidin, $C_{17}H_{14}O_2N_2$ (IV), F. 253°. — *o*-Nitrophenylhydrazinderiv. des 1-*o*-Nitrophenyl-3,5-diketopyrazolidins, $C_{15}H_{14}O_6N_6$, F. 241°, aus verd. A. gelbe Nadeln. — *p*-Nitrophenylhydrazinderiv. des 1-*p*-Nitrophenyl-3,5-diketopyrazolidins, F. 271°, gelbe Nadeln aus A. — *N*-Methylidiphenylacetamid, $C_{15}H_{15}ON$, aus Diphenylketen in PAe. u. Methylamin, farblose Nadeln aus verd. A. vom F. 166,5°, l. in A., Chlf., Aceton, unl. in Ä. u. Lg., wl. in W. — Diphenylacetyl-*o*-nitroanilin, $C_{20}H_{16}O_3N_3$, aus Diphenylketen u. *o*-Nitroanilin in trockenem Ä., F. 188°, aus verd. A. — Diphenylacetyl-2,4,6-tribromanilin, $C_{20}H_{14}ONBr_3$, aus Tribromanilin u. Diphenylketen, weiße Nadeln vom F. 226—227°. — Verb. $C_9H_8O_2N_2$, aus *p*-Phenylendiamin u. C_3O_2 , aus A. farblose Substanz (bei 320° ungeschmolzen), unl. in den meisten organ. Lösungsm. — Verb. $C_9H_8O_2N_2$, aus *m*-Phenylendiamin u. C_3O_2 , Eigenschaften ähnlich der Verb. aus *p*-Phenylendiamin. (Rec. trav. chim. Pays-Bas 43. 823—66. 1924. Leiden, Univ.) HORST.

E. Oliveri-Mandalà, Über die Einwirkung des Hydrazins auf das Cyantetrazol. (Vgl. OLIVERI u. PASSALACQUA, Gazz. chim. ital. 41. II. 430. 43. II. 465; C. 1912. I. 820. 1914. I. 393.) Durch Einw. von HNO_2 auf das Rohprod. aus der Rk. des Cyantetrazols mit Hydrazin erhält Vf. das Bistetrazol. Ein Mol. Cyantetrazol mit zwei Moll. Hydrazinhydrat gibt das von CURTIUS beschriebene Ditetrazolyldihydro-tetrazin, wl. in W. Nach dem Ansäuern mit verd. HCl u. Versetzen mit $NaNO_2$ fällt das Ditetrazolyltetrazin, aus dem Filtrat durch Verdampfen u. Extraktion mit Aceton das Bistetrazol, $C_2H_2N_8$, F. 254°.



(Gazz. chim. ital. 54. 774—77. 1924. Palermo, Univ.)

ZANDER.

R. F. Hunter, Die Synthese von triheteroatomaren fünfgliedrigen Schwefel-Stickstoffringssystemen. Teil I. Die Bromierung von Thioharnstoffen in alkoholischen Lösungen und die Darstellung von Brom-3,5-diimino-2,4-diphenyltetrahydro-1,2,4-thiodiazol und 3,5-Diphenylimino-2,4-diphenyltetrahydro-1,2,4-thiodiazol. Vf. hat die Verss. von HUGERSHOFF (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 36. 3121 (1903)) über die Einw. von Br auf Phenyl- u. Diphenylthioharnstoff in absol. A. wiederholt u. dessen Er-




gebnisse bestätigen können. Es entstand in ersterem Falle das HBr-Salz des Brom-3,5-diimino-2,4-diphenyltetrahydro-1,2,4-thiodiazols (I oder II), aus h. W. weiße Krystalle, F. 242—244°; die freie Base ist unl. in k. W., ll. in A. + Bzl. Das HBr-Salz bildet beim Behandeln mit rauchender HNO_3 u. Eingießen in W. ein orangefarbenes Nitroderiv. — Einw. von Br auf Diphenylthioharnstoff in A. führt zu 3,5-Diphenylimino-2,4-diphenyltetrahydro-1,2,4-thiodiazol; die Ausbeute an dieser

Verb. war sehr gering, da viel harzige Prodd. entstanden. (Chem. News 129. 269 bis 271. 1924. Highbury New Park, Chem. Lab.)

HABERLAND.

F. Arndt, E. Scholz und P. Nachtwey, *Über Dipyrlylene und über die Bindungsverhältnisse in Pyronringsystemen*. (Vgl. Ber. Dtsch. Chem. Ges. 56. 2406; C. 1924. I. 421.) Während 4-Thiochelidonsäureester sehr leicht, 4-Thiopyron u. 4-Thiodimethylpyron gar nicht in Dipyrlylene übergehen, gibt 4-Thiodiphenylpyron (III., R = C₆H₅) diese Rk. wieder, aber schwerer als Thiochelidonsäureester; es spaltet sich in S u. Tetraphenyldipyrlylen (I.); dessen Farbe ist noch intensiver als die des Tetracarbonesters, was auf der von Vff. auch sonst beobachteten, farbverstärkenden Wrkg. der α -Phenyle beruht. Chromophor der Dipyrlylene ist die doppelte gekreuzte Konjugation; der Vergleich mit dem fast farblosen *Dixanthylen* zeigt, daß in letzterem die Pyronringdoppelbindungen in den Benzolringen „aufgelöst“ sind (vgl. THIELE); aber auch die Ring-O müssen an der Farbvernichtung Anteil haben, denn Dibiphenylenäthylen ist wieder rot gefärbt. — Aus Xanthion bildet sich in der Hitze kein *Dixanthylen*, umgekehrt ist durch Red. von Diphenylpyron kein Dipyrlylen zu erhalten. — Wie eingangs ersichtlich; hängt die Fähigkeit der 4-Thiopyrone zum Übergang in Dipyrlylene von dem Grade des acidifizierenden Charakters der α -ständigen R (Formel III.) ab; dieser muß also einen Unterschied in der Konst. der Thiopyrone bewirken, welcher seinerseits die Fähigkeit zur S-Abspaltung bedingt. Die acidifizierende Wrkg. der R kann sich äußern an den „basischen Eigenschaften“ des Ringsauerstoffs. Danach ist die Abstufung im Verh. der 4-Thiopyrone in ihren Extremen durch Formeln II. u. III. darstellbar. II. bedeutet, daß der Ring-O „basisch“, der γ -S „sauer“, d. h. als Mercaptanion, fungiert; II. verhält sich zu der u. a. von COLLIE vorgeschlagenen Pyronformel wie die Pfeifferschen Betainformeln zu den früheren Ringformeln der Betaine. 4-Thiodimethylpyron nähert sich am meisten der Konst. II., Thiochelidonsäureester, wo die bas. Eigenschaften des Ring-O am meisten geschwächt sind, der Konst. III., während Thiodiphenylpyron eine Zwischenstellung einnimmt. III. bedeutet wahres Thioketon, daher Fähigkeit zur B. von Dipyrlylen entsprechend der B. von Tetraphenyldipyrlylen aus Thiobenzophenon.

Für solche Abstufung spricht ferner, daß Thiochelidonsäureester blaugrün gefärbt ist, ähnlich der blauen Farbe der wahren Thioketone, Thiodimethylpyron dagegen gelb, sowie daß Thiochelidonsäureester sehr leicht, Thiodiphenylpyron schwerer mit Ketonreagenzien reagiert unter B. von Semicarbazon bzw. Oxim, dagegen Thiodimethylpyron solche Prodd. nicht gibt. — Auch zwischen schwefelfreiem Dimethyl- u. Diphenylpyron scheint eine gewisse Abstufung im Sinne der Formeln IV. u. V. zu bestehen, nur daß Dimethylpyron sich IV. nicht so weit nähert wie sein Thioderiv. der Konst. II. Für solche Abstufung spricht, daß Diphenylpyron, im Gegensatz zu Dimethylpyron, in Abwesenheit von HBr Brom




addiert, also deutlichere Doppelbindungen enthält (V.) als Dimethylpyron (IV.). Das Bromadditionsprod. geht aber, sobald sich HBr bilden kann (Luft, Ä. u. a.) in Bisdiphenylpyronhydrotribromid über, das dem aus Dimethylpyron mit HBr u. Br zu erhaltenen Prod. entspricht. — Tetraphenyldipyrülen addiert in Lsgg. 6 Atome Br zu Tetraphenyldipyrroxoniumperbromid (VI.), ebenso Dixanthylen nicht, wie HANTZSCH u. DENSTORFF (LIEBIGS Ann. **349**. 31) angeben, 4Br, sondern 6Br zu Dixanthoxoniumperbromid. Beim Dipyrylentetracarbonester dagegen wird das Br an die Doppelbindungen addiert, weil hier wegen der stark acidifizierenden Carboxäthyl keine B. von Pyroxoniumsalzen möglich ist. — Die Farblosigkeit auch solche Pyrone, bei denen bas. Funktion des Ring-O ausgeschlossen (V.), zeigt, daß der Ring-O noch eine andere Wrkg. auf den Ring ausüben kann, die u. a. hypsochron ist; vgl. Dixanthylen und Dibiphenylenäthylen.

Versuche. 4-Thiopyron, C_8H_4OS , aus γ -Pyron in Bzl. mit P_2S_5 ; ockergelbe Nadeln aus PAc., F. 49°. — 4-Thio-2,6-diphenylpyron, $C_{17}H_{12}OS$, rote Nadeln aus A., F. 173°, Lsgg. etwas dichroitisch. — $\alpha, \alpha', \alpha'', \alpha'''$ -Tetraphenyl- γ, γ' -dipyrülen $C_{34}H_{24}O_2$ (I.), aus dem Vorigen bei 200–240°, dunkelbraunrote Nadeln aus Xylol F. 313°. — Tetraphenyldipyrroxoniumperbromid, $C_{34}H_{24}O_2Br_6$, dunkelbraunroter Nd. F. 275–280°. — Dixanthoxoniumperbromid, $C_{26}H_{16}O_2Br_6$, F. 215–220° (Zers.) (vgl. HANTZSCH, DENSTORFF l. c.). — Bromadditionsprod. des Diphenylpyrons, gelbe Nadeln, gibt sehr leicht Br ab. — Bisdiphenylpyronhydrotribromid, $(C_{17}H_{12}O_2)_2HBr$, Br_3 orangefarbene Nadeln aus $CHCl_3$, F. 174–175°. — Semicarbazon des Chelidonsäureesters, $C_{13}H_{15}O_6N_3$, gelbliche Nadelchen aus A., F. 201°. — Oxim des Diphenylpyrons, $C_{17}H_{13}O_2N$, hellgelbe Nadeln aus A., F. 196–197°. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. **57**. 1903–11. 1924. Breslau, Univ.)


ARNDT.

James Allan und Robert Robinson, Ein leicht zugängliches Chromonolderivat. Das von SLATER u. STEPHEN (Journ. Chem. Soc. London **117**. 309; C. **1920**. III 140) dargestellte ω -Methoxyresacetophenon wird durch Acetanhydrid in Ggw. von Na-Acetat übergeführt in 3-Methoxy-7-acetoxy-2-methylchromon (I), das durch Koche mit HJ in 3,7-Dioxy-2-methylchromon verwandelt wird; der Dimethyläther diese Deriv. wird erhalten durch Hydrolyse von I mittels Alkali u. nachfolgende Methylierung. Mit C_6H_5MgBr u. Anisyl-MgBr reagiert der Dimethyläther unter B. de als Ferrichloride isolierbaren Carbinolbasen (II). — Wird ω -Methoxyresacetophenon mit Benzoesäureanhydrid + Na-Benzozat erhitzt u. das Reaktionsprod. hydrolysiert so entsteht 7-Oxy-3-methoxyflavon (III). In analoger Rk. bildet sich aus Resacetophenon 7-Oxyflavon (F. 240°), jedoch in schlechter Ausbeute. Bei der Hydrolyse bildet sich in diesem Falle als Zwischenprod. anscheinend 7-Oxy-3-benzoylflavon.



Versuche. 7-Acetoxy-3-methoxy-2-methylchromon, $C_{13}H_{12}O_5$ (I), aus 6,5 ω -Methoxyresacetophenon + 9,8 g geschmolzenem Na-Acetat + 13 g Acetanhydrid bei 170°; aus CH_3OH Nadeln, F. 113°; gibt, wie die drei unten genannten Chromon deriv., mit konz. H_2SO_4 eine farblose, violett fluoreszierende Lsg. — 3,7-Dioxy-2-methylchromon, $C_{10}H_8O_4$, aus CH_3OH Nadeln, F. 249° (Zers.). — 7-Oxy-3-methoxy-2-methylchromon, $C_{11}H_{10}O_4$, aus CH_3OH prismat. Nadeln, F. 214°; Lsg. in wss. alk. NaOH farblos, hellblau fluoreszierend. — 3,7-Dimethoxy-2-methylchromon, $C_{12}H_{12}O$ aus CH_3OH Nadeln, F. 120°, ll. in organ. Mitteln. — 3,7-Dimethoxy-4-phenylmethylbenzopyryliumferrichlorid, $C_{18}H_{17}O_3Cl_4Fe$ (II; Ar = C_6H_5), aus CH_3COO gelbe Tafelchen, F. 120°; Lsg. in konz. H_2SO_4 gelb, grün fluoreszierend. — 3,7-Dimethoxy-4-p-methoxyphenyl-2-methylbenzopyryliumferrichlorid, $C_{19}H_{19}O_4Cl_4Fe$ (II; Ar =



Oskar Seide, *Über die Einwirkung von Natriumamid auf das β -Picolin.* (Vgl. Ber. Dtsch. Chem. Ges. **57**. 791; C. 1924. II. 44.) Aus β -Picolin u. NaNH_2 in Xylol (135—140°, 6 Stdn.) bildet sich nur α -Amino- β -picolin, $\text{C}_6\text{H}_8\text{N}_2$ (nebenst.)



während die α' -Aminoverb. nicht nachgewiesen werden konnte. Bei der Dest. unter 12 mm geht die Hauptfraktion bei 101—102° über. Über das Pikrat gereinigt, Kp.₇₄₈ 222° Kp.₈ 95°, starke einsäurige Base, ll. außer in Lg. u. starkem Alkali, hygroskop. Erstarrt in Kältemischung, F. 24° Chlorhydrat, Nadeln aus A., sll. in W. u. A. Pikrat, dunkelgelbe Prismen aus Aceton, F. 229°, wl. Chlorplatinat, orangefarbige Prismen aus W. (+ 1 H₂O) F. 209° (Zers.), wl. in W. u. A. — Acetylverb., $\text{C}_6\text{H}_{10}\text{ON}_2$. Kp.₁₄ 156—158°. Krystalle aus Bzl., F. 64°, ll. in W., A., zl. in Ä., Bzl., wl. in Lg. — Dibenzoylverb. $\text{C}_{20}\text{H}_{16}\text{O}_2\text{N}_2$. Nadeln aus A., F. 220°, wl. — Die Base, ihre in W. l. Salze u. die Acetylverb. besitzen eine cocainähnliche Wrkg. — α -Nirramino- β -picolin, $\text{C}_6\text{H}_7\text{O}_2\text{N}_3$. Mit HNO_3 (D. 1,4) in konz. H_2SO_4 unter Kühlung. Hellgelbe Nadeln aus W. F. 159° (Zers.), wl. in W., A., ll. in Alkali u. Alkalicarbonat. — α -Amino- β' -nitro- β -picolin, $\text{C}_6\text{H}_7\text{O}_2\text{N}_3$. Die Lsg. des vorigen in konz. H_2SO_4 wird über Nacht an kühlem Ort stehen gelassen. Gelbe Prismen aus A., F. 255°, swl. in W. u. k. A. ll. in Säuren. — α -Oxy- β -picolin, $\text{C}_6\text{H}_7\text{ON}$. Aus dem Amin mit NaNO_2 in 5%ig H_2SO_4 (1 Stde. Zimmertemp., dann 50—60°). Kp.₇₅₂ 288—290°. Nadeln aus Lg. Chlf., F. 140°, l. außer in Lg. Mit FeCl_3 rotbraun. — α -Chlor- β -picolin, $\text{C}_6\text{H}_6\text{NCl}$. Aus dem vorigen mit PCl_5 (150°, 1 Stde.), alkal. machen u. mit Dampf dest. Öl Kp.₇₅₁ 192—193°, von eigenartigem Geruch, meist ll., schwach bas. Die Lsgg. in Säuren werden von W. gefällt. Chlorplatinat, orangefarbige Prismen (+ 1 H₂O) F. 208°, ll. in W., A. — α -Chlornicotinsäure, $\text{C}_6\text{H}_4\text{O}_2\text{NCl}$. Durch Oxydation des vorigen mit KMnO_4 . Nadeln aus W., F. 193°. Ident. mit der aus α -Oxynicotinsäure, PCl_5 u. POCl_3 bei 140° dargestellten Vergleichssubstanz. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. **57**. 1802—6. 1924.)

LINDENBAUM.

Oskar Seide, *Ein Versuch zur Darstellung von 1,8-Naphthyridinderivaten.* Die Darst. von Derivv. des 1,8-Naphthyridins auf dem Wege der Anlagerung eines Pyridinringes an einen fertigen Pyridinring durch Ringschluß zur β -Stellung ist bisher nicht gelungen. Vf. hat auf folgendem Wege das Ziel zu erreichen versucht. Aus α -Aminonicotinsäuremethylester u. sd. Acetanhydrid (15 Min.) entsteht der α -Acetaminonicotinsäuremethylester, $\text{C}_9\text{H}_{10}\text{O}_3\text{N}_2$ (I.). Dest. im Vakuum unzersetzt. Gelbliche Täfelchen aus Lg., F. 88°, von aromat. Geruch, ll. Durch intramol. Abspaltung von CH_3OH müßte I. in ein Naphthyridinderiv. übergehen. Wenn man jedoch eine alkoh. Lsg. mit $\text{C}_2\text{H}_5\text{ONa}$ -Lsg. $\frac{1}{2}$ Stde. kocht, den A. abdest. u.




schwach ansäuert, so erhält man unter Abspaltung von Essigester mit vorzüglicher Ausbeute α -Aminonicotinsäureanhydrid, $\text{C}_{12}\text{H}_8\text{O}_2\text{N}_4$ (II.). Rhomb. Krystalle aus W., F. 390° (korr.), meist wl., ll. in h. Eg., l. in NaOH , wir


durch CO_2 wieder gefällt. Mit FeCl_3 rotbraun. Unverändert l. in konz. H_2SO_4 . Wird von sd. Lauge glatt zu α -Aminonicotinsäure verseift. — II. bildet sich auch ausschließlich, wenn I. mit trockenem $\text{C}_2\text{H}_5\text{ONa}$ bis auf 300° erhitzt wird. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. **57**. 1806—8. 1924. Moskau, Techn. Hochsch.) LINDENBAUM.

H. Finger und F. Kraft, *Über indigoide Farbstoffe in der Pyridinreihe.* Der von REINDEL (Ber. Dtsch. Chem. Ges. **57**. 1381; C. 1924. II. 2158) beschriebene neue Farbstoff besitzt sehr wahrscheinlich die Konst. I. u. wäre demnach der Glyoxalinrot von RUHEMANN verwandt, mit dem er auch spektr. weitgehende Ähnlichkeit zeigt. Das Zwischenprod. wäre dann kein Pyrindoxyl, sondern ein *Pyrimin*

azolone (II). Wird I. nämlich mit 35%ig. HCl 3—4 Stdn. auf 125° erhitzt, so bilden sich außer CO u. CO₂ α -Aminopyridin u. II. Zweifellos wird I. zunächst zu II. u. III. hydrolysiert, u. III. wird zu α -Aminopyridin u. Oxalsäure verseift, letztere




in CO, CO₂ u. H₂O gespalten. Bei der Oxydation mit H₂O₂ liefert I. α -Aminopyridin u. CO₂. Diese Spaltungen sind mit der Formel von REINDEL nicht gut zu erklären. Andererseits bedürfen die Reindelschen Benzoylderivv. von II. noch der Erklärung. — Das α -Pyridylglycin erhielten Vff. aus W. stets mit 1 H₂O. — II. wurde auch auf einem anderen Wege dargestellt. Aus α -Aminopyridin in Bzl. u. Chloracetylchlorid in mit HCl-Gas gesätt. Bzl. (starke Kühlung, dann Zimmertemp.) entsteht das Chlorhydrat von IV., C₇H₇ON₂Cl, HCl, Tafeln



aus A., F. 157°. Die Base C₇H₇ON₂Cl, mit NaHCO₃ abgeschieden, bildet Nadeln aus verd. Aceton, F. 123°, reizt zum Niesen u. verursacht Hautjucken. Pikrat, C₇H₇ON₂Cl, C₈H₃O₇N₃, grüngelbe Nadeln aus Aceton, F. 155—157° (Zers.). IV. geht unter „intramol. Alkylierung“ sehr langsam bei Zimmertemp., schneller beim Erhitzen, am besten durch Erwärmen von 1 g (nicht mehr!) mit ca. 5 ccm Nitrobenzol u. Verd. mit Ä. in das von REINDEL beschriebene Chlorhydrat von II. über. Nadeln aus A. oder Eg.-Chlf., F. 245° (Zers.), fluoresciert in Lsg., besonders nach Zusatz von Alkali, stark blau. — Ein isomeres Chlorhydrat bildet sich, wenn Pyridylglycin acetyliert u. das Prod. mit verd. HCl gekocht wird. Schm. ca. 50° höher u. ist etwas weniger l. in W., hat aber sonst dieselben Eigenschaften wie das Isomere, in das es sich über das Na-Salz umwandeln läßt. — Die entsprechenden Pikrate schm. bei 207° (REINDEL) u. 211° (Mischprobe bei 204°). (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 57. 1950—53. 1924. Darmstadt, Techn. Hochsch.) LINDENB.

P. Bruylants, Beitrag zum Studium der Einwirkung der Organomagnesiumverbindungen auf die Nitrile. Die α -Aminonitrile. (Bull. Soc. Chim. Belgique 33. 467—78. 1924. — C. 1924. II. 336.) BEHRLE.

Robert Robinson und Sidney Thornley, 5-Carbolin und einige Derivate. (Vgl. LAWSON, PERKIN JUN. u. ROBINSON, Journ. Chem. Soc. London 125. 626; C. 1924. I. 2517.) Die Darst. von 5-Carbolin (II) gelang durch Erhitzen von 1- γ -Pyridylbenzotriazol (I) mit sirupöser H₃PO₄. I wurde dargestellt, indem das aus 4-Chlorpyridin u. Phenylendiamin gebildete Chlorhydrat des N- γ -Pyridyl-o-phenylendiamins mit HNO₂ behandelt wurde. Das Methylsulfat von II geht mit Alkalihydroxyden über in 5-Methyl-5-isocarbolin (III). Mit Na u. n-Butylalkohol wird II zum Tetrahydroderiv. IV red. Das Methylphenylhydrazon des Triacetaminins gibt beim Erhitzen mit verd. H₂SO₄ Pentamethyltetrahydro-5-carbolin (V).



Versuche. N- γ -Pyridyl-o-phenylendiamin, C₁₁H₁₁N₃, aus 20,4 g Chlorpyridin + 21 g o-Phenylendiamin 2 1/2 Stdn. auf 98° (40 mm), dann 1 1/4 Stdn. unter demselben Druck bei 140° erhitzt; aus CH₃OH Prismen, F. 173,5°, aus h. Bzl. Nadeln; wl. in

k. W., Chlf., Aceton, ll. in A.; Chlorhydrat Nadeln; wird die Base in absol. HCOOH 6 Stdn. gekocht, so entsteht wahrscheinlich γ *Pyridylbenzimidazol*, aus PAe. hexagonale Tafeln, F. 123°, die durch HNO_3 nicht angegriffen werden. — 1- γ -*Pyridylbenzotriazol*, $\text{C}_{11}\text{H}_8\text{N}_4$ (I), aus h. W. Nadeln mit $3\text{H}_2\text{O}$, schm. bei 82° zu dunkler Fl., die bei 105° unter Entw. von Dampf klar wird; das Krystallwasser wird im Vakuumexsiccator über H_2SO_4 vollständig abgegeben; die wasserfreie Base krystallisiert aus Bzl.-PAe. in Tafeln, F. 113,5°, ll. in Bzl. u. CH_3OH , wl. in PAe., kann ohne Zers. zu Nadeln sublimiert werden. Chlorhydrat aus CH_3OH Nadeln, F. 262° (Zers.), unl. in Bzl., wss. Lsg. reagiert sauer gegen Lackmus. — 5-*Carbolin*, $\text{C}_{11}\text{H}_8\text{N}_2$ (II), aus 3 g I + 30 cem H_3PO_4 (D. 1,75) durch Erhitzen über freier Flamme, bis N_2 -Entw. beendet; aus wss. CH_3OH prismat. Nadeln, aus CH_3OH Prismen, F. 225°; ll. in A., wl. in W., aus letzterem Nadeln; bei gewöhnlichem Druck ohne Zers. destillierbar. Lsgg. in alkoh. HCl fluorescieren blauviolett in Mg-Licht, sonst keine Fluorescenz. Krystallograph. Messungen von G. Greenwood vgl. Original. Saures Oxalat, $\text{C}_{13}\text{H}_{10}\text{O}_4\text{N}_2$, aus h. W. Prismen, F. 226° (Zers.); Pikrat aus Aceton gelbe Nadeln, F. 250°; Methylsulfat, $\text{C}_{13}\text{H}_{14}\text{O}_4\text{N}_2\text{S}$, aus A. Nadeln, aus CH_3OH Prismen, F. 161°; alkoh. Lsg. fluoresciert schwach blauviolett bei gewöhnlichem Licht, kräftig in Mg-Licht. — 5-*Methyl-5-isocarbolin*, $\text{C}_{12}\text{H}_{10}\text{N}_2$ (III), aus Bzl. gelbe Nadeln, F. 203—204° nach Sublimation im Hochvakuum bei 138°; sehr hygroskop.; Lsg. in W. reagiert alkal.; Methylsulfat, $\text{C}_{14}\text{H}_{16}\text{O}_4\text{N}_2\text{S}$, aus CH_3OH Nadeln, F. 210—211°; wss. u. alkoh. Lsgg. fluorescieren blauviolett im Mg-Licht; wird eine wss. Lsg. des Salzes mit KOH versetzt, so entsteht ein Nd., unl. in Ä. u. Bzl., l. in W., durch sd. KOH nicht zers. werdend. — 3,4,5,6-*Tetrahydro-5-carbolin*, $\text{C}_{11}\text{H}_{12}\text{N}_2$ (IV), aus CH_3OH Prismen, F. 215,5° unter vorherigem Sintern. — 5-*Acetyl-3,4,5,6-tetrahydro-5-carbolin*, $\text{C}_{13}\text{H}_{14}\text{ON}_2$, aus A. Nadeln, F. 254,5° (vorher Erweichen), wl. in organ. Mitteln. — *Acetyltriacetonaminphenylhydrazon*, $\text{C}_{17}\text{H}_{25}\text{ON}_3$, aus Bzl. sternartig gruppierte Nadeln, F. 107°, wl. in PAe., ll. in CH_3OH , A., Bzl., Aceton, Chlf.; schwache Base; Ringschluß zu einem Indolderiv. war nicht zu erzielen. — 1,4,4,6,6-Pentamethyl-3,4,5,6-tetrahydro-5-carbolin, $\text{C}_{16}\text{H}_{22}\text{N}_2$ (V). Darst. 10 g Triacetonamin + 8 g a. Phenylmethylhydrazin + 10 cem CH_3COOH werden 10 Min. auf dem Wasserbad erhitzt, danach 15 cem H_2SO_4 + 100 cem W. zugegeben u. 40 Min. auf dem Wasserbad erhitzt; aus CH_3OH Prismen, die mit 1 Mol. Krystall- CH_3OH krystallisieren; bei 78° erweichend, F. 80—86°; nach Erhitzen auf 111° F. 92—93°; ll. in Bzl., A. u. PAe.; aus letzterem Nadeln, die bei ca. 160° sintern, bei 170° anscheinend teilweise schmelzen u. wieder fest werden, bei 180° klare Fl. (Journ. Chem. Soc. London 125. 2169—76. 1924. Manchester, Univ.) HABERLAND.


Rudolf Stern, *Physikalisch-chemische Untersuchungen über die Harnsäure*. (Vgl. Klin. Wehschr. 3. 1583; C. 1924. II. 1925.) Es gelang Vf. die Herst. einer Harnsäurelsg. die völlig einwandfrei als Sol festgestellt werden konnte, allerdings gelang dies nur einmal. Bei allen anderen, nach Angaben von SCHADE u. KOHLER hergestellten Lsgg. war das nicht der Fall. (Biochem. Ztschr. 150. 535—41. 1924. Breslau, Univ.) FRANK.

E. Abderhalden und E. Komm, *Über die Entstehung von Diketopiperazinen aus Polypeptiden unter verschiedenen Bedingungen*. (Vgl. ABDERHALDEN u. KLARMANN, Ztschr. f. physiol. Ch. 134. 121; C. 1924. II. 190.) Beim Erhitzen von Dipeptiden: *Glycylglycin*, *Glycyl-d,l-leucin*, *Glycyl-l-leucin*, *d,l-Leucylglycin*, *Glycyl-d,l-phenylalanin*, *d,l-Leucyl-d,l-leucin*, *d,l-Alanylglycin*, *d,l-Valyl-d,l-leucin*, *Glycyl-d,l-aminocaprylsäure*, *Diglycylglycin* mit W. auf 80, 150 bis 230°, mit verd. HCl u. verd. H_2SO_4 auf 150—260° entstehen, je nach den Bedingungen (Menge H_2O bezw. Konz. der HCl u. H_2SO_4) wechselnde, bis über 90% des Ausgangsmaterials betragende Mengen an Diketopiperazinen. Die Resultate sind im Original tabellar. zusammengestellt. Die Anhydride entstehen aus den angewandten Dipeptiden,

mit Ausnahme des d,l-Valyl-d,l-leucins, schon beim Erwärmen mit W., sogar beim Kochen bei gewöhnlichem Druck. Die Anhydridbildung bleibt aus mit 70%ig. H_2SO_4 u. konz. HCl bei Zimmertemp. Diglycylglycin liefert in geringer Ausbeute *Glycinanhydrid*. In keinem Fall wurde aus einem Tripeptid ein Anhydrid mit mehr als 2 Bausteinen erhalten. Diketopiperazine geben beim Erwärmen mit Pikrinsäure bei Ggw. von Soda eine rotbraune Färbung, welche bei Aminosäuren und Polypeptiden nicht auftritt. Die Ringbildung der Dipeptide deutet auf die Möglichkeit, daß auch im Eiweiß offene Dipeptidketten unter gewissen Bedingungen in stabilere Ringsysteme übergehen können. (Ztschr. f. physiol. Ch. **139**. 147 bis 168. 1924.)

GUGGENHEIM.

E. Abderhalden und **E. Schwab**, *Über die Anhydridstruktur des Seidenfibroins*. In Bestätigung der Verss. von **ABDERHALDEN** u. **STIX** (Ztschr. f. physiol. Ch. **132**. 238; C. **1924**. I. 2149), gelang es, nach der Red. von Seidenpepton *Methylpiperazin*, $C_5H_{12}N_2$, u. *3-Methyl-6-oxymethylpiperazin* zu isolieren, letzteres wahrscheinlich aus Alanylserinanhydrid entstehend, ferner das Red.-Prod. eines Anhydrides des früher von **FISCHER** u. **ABDERHALDEN** (Ber. Dtsch. Chem. Ges. **40**. 3545 [1907]) isolierten Tetrapeptids aus 2 Mol. Glykokoll, 1 Mol. Alanin u. 1 Mol. Tyrosin, dem möglicherweise Struktur **I** zukommt:



Es gibt keine Millourk. — Auch *Di-p-oxphenylmethylpiperazin*, hergestellt aus *Tyrosinanhydrid*, gibt negative Millourk. Es wird für möglich erachtet, daß dem Eiweißmol. Komplexe anhydridartiger Struktur zugrunde liegen, die unter sich u. mit Polypeptiden mittels Nebenvalenzen assoziiert sind, eine Annahme, auf Grund welcher verschiedene biochem. Umwandlungen des Eiweißmol. erklärt werden. — *3-Methyl-6-oxymethylpiperazindichlorhydrat*, $C_6H_{10}ON_2Cl_2$. B. durch Red. von Seidenpepton mit $Na + A$. nach der früher (l. c.) beschriebenen Methode. Das Gemisch der isolierten Piperazinchlorhydrate wird durch $A. + \ddot{A}$. fraktioniert gefällt. Zuerst scheidet sich das Methylpiperazin ab. Das sich vom Glycylalanylglycyltyrosin anhydrid ableitende *Chlorhydrat*, $C_{16}H_{32}ON_4Cl_4$, des *Piperazins* $C_{15}H_{28}ON_4$ (wahrscheinliche Konst.: in **I** die 3O-Atome durch 6H-Atome ersetzt), färbt sich beim Stehen gelb bis braun u. ist ziemlich hygroskop. — *Di-p-oxphenylmethylpiperazin*. Das durch Red. des Tyrosinanhydrids dargestellte Chlorhydrat $C_{18}H_{24}O_2N_2Cl_2$ schm. bei 265° unter Schwarzfärbung, ll. in W. u. A., unl. in $\ddot{A}$, Millourk. negativ. — *Alanylserinanhydrid*, $C_8H_{10}N_2O_3$. Das mit Seesand zur Trockne gebrachte partielle Hydrolysat (70% H_2SO_4 , 37%) von Seidenfibroin wird zunächst mit Essigäther extrahiert, wodurch Glycylalanyl- u. Glycyltyrosinanhydrid abgetrennt werden, dann mit A . Aus A . Sintern bei 208° , F. 230° , wl. in k. W. u. Essigäther *Anhydrid* aus 2 Mol. Glykokoll + 1 Mol. Alanin + 1 Mol. Tyrosin, $C_{16}H_{20}N_2O_5$ (**I**). Das mit A . erschöpfte Seidenpepton wird mit CH_3OH u. dann mit $Chlf.$ extrahiert, worauf sich mit $\ddot{A}$. aus den Auszügen ein amorphes Prod. abscheiden ließ, das sich an der Luft gelb bis braun färbte. Pulver aus $CH_3OH + A$, Zers.-Punkt unscharf 235° , Millonsche Rk. positiv. Mit Ninhydrin Blaufärbung beim Kochen. Pikrinsäurerk. schwach positiv. (Ztschr. f. physiol. Ch. **139**. 169—80. 1924.) GUGGENH.


E. Abderhalden und **E. Komm**, *Über die Anhydridstruktur der Proteine*. (Vgl. vorst. Ref.) Entgegen **SASAKI** (Biochem. Ztschr. **114**. 63; C. **1921**. II. 979) wurde festgestellt, daß die Braunrotfärbung, welche Diketopiperazine mit alkal. Pikrinsäurelsg. zeigen, charakterist. ist u. mit Aminosäuren u. Polypeptiden nicht

eintritt; nur mit Glukosamin ist die Rk. positiv. Der positive Ausfall der Rk. bei verschiedenen Eiweißkörpern u. Peptonen deutet daher auf die Anwesenheit vorgebildeter Diketopiperazine im Eiweißmol. *m*-Dinitrobenzol verhielt sich gegenüber Carboxylgruppen wie alkal. Pikrinsäurelsg. *m*-Phenylendiamin u. Nitroprussidnatrium zeigen kein charakterist. Verh. — Im weiteren behandeln Vff. die nach ihrer Ansicht in den Arbeiten von SSADIKON u. ZELINSKI (vgl. Biochem. Ztschr. 147. 30; C. 1924. II. 686) vorhandenen vielen Unklarheiten u. Unrichtigkeiten. *N,N'*-Diacetyl- u. *N,N'*-Dibenzyl-2,5-diketopiperazin gaben eine positive Pikrinsäure u. Dinitrobenzolrk., während bei *O,O'*-Dibenzyl-2,5-dioxy-dihydropyrazin u. *Dibenzoyl*-2,5-diketopiperazin die Rk. negativ ausfiel. Bei der Diskussion der nach den gegenwärtigen Kenntnissen im Eiweiß möglich erscheinenden Anhydridbindungen wird der Diketopiperazinstruktur der Vorzug gegeben, da weder die äther- noch die esterartige Verknüpfung von Dipeptidanhydriden mit ihrer C(OH)-Gruppe eine durchwegs befriedigende Erklärung geben. — Farbrk. mit *Pikrinsäure*. 10—15 mg der zu untersuchenden Substanz werden in W. aufgeschwemmt u. mit 0,25 ccm gesätt. Sodalsg. $\frac{1}{2}$ bis 1 Min. gekocht. Bei in W. unl. Prodd. wird die Rk. in alkoh. Lsg. ausgeführt, wobei man statt Soda zweckmäßig Na-Alkoholat verwendet. Die Rk. ist positiv mit: Glycin-, Glycylalanin-, d,l-Glycylleucin-, d,l-Glycylphenylalanin-, d-Alanin-, d,l-Alanin-, d,l-Serin-, d,l-Phenylalanin-, d,l-Tyrosin- u. d,l-Glycyl-dioxyprolinanhydrid, d,l-Leucinimid, Pepton aus: Seide, Gliadin, Placenta, Eiereiweiß, Casein, Keratin (Federn, Haare, Geweih) u. Gelatine, Antipepton, pflanzliches u. tierisches Casein, verschiedene Seidearten, Seidenleim, Seidenfibroin, Elastin, Keratin, Avenin, Antiarin, Vitellin aus Eigelb, Ricin, Blutglobulin, Eiereiweiß, Sturin, Clupein, Mucin u. Glucosamin, negativ mit: Glykokoll, Alanin, Leucin, Tyrosin, Tryptophan, Histidin, Cystin, Prolin, Pyrrolidincarbonsäure, Glycylglycin, d,l-Glycylleucin, d,l-Leucylglycin, d,l-Glycylaminocaprylsäure, d,l-Glycyltyrosin, l-Leucyl-d-leucinanhydrid, Triglycin, Leucyldiglycylglycin, Pentaglycin, Palmitylalanin, Formylleucin, Glukosaminsäure, Asparagin, Glutamin, Harnstoff, Chitin, Edestin, Legumin, Eiweiß aus Kürbissamen, Hippursäure. Der negative Ausfall der Rk. bei den pflanzlichen Proteinen wird auf ihre Unlöslichkeit zurückgeführt. Die Rk. mit *m*-Dinitrobenzol wird analog ausgeführt, wie die Pikrinsäurerk. u. zeigt auch ein ähnliches Verh., doch ist hier die Rk. mit *l*-Leucyl-d-leucinanhydrid positiv. — *N,N'*-Diacetylglycinanhydrid. B. aus Glycinanhydrid u. Essigsäureanhydrid. F. 100°. — *N,N'*-Dibenzoylglycinanhydrid. B. aus Glycinanhydrid-Ag u. C_6H_5COCl . F. 238°. — *N,N'*-Dibenzylglycinanhydrid. Nadelchen, F. 173°. (Vgl. SASAKI l. c.). — *O,O'*-Dibenzyläther des 2,5-Dioxydihydropyrazins, (Vgl. KARRER, GRÄNACHER u. SCHLOSSER, Helv. chim. Acta 6. 1108; C. 1924. I. 485.) Glänzende Blättchen. F. 163°. (Ztschr. f. physiol. Ch. 139. 181—204. 141. 62. Halle, Univ.)

GUGGENHEIM.

M. Busch, G. Friedenberger und W. Tischbein, Zur Kenntnis der Hydrazon-isomerie: Isomere Hydrazone von Phenacylaminen und deren Konfigurationsbestimmung. (Vgl. BUSCH u. HEFELE, Journ. f. prakt. Ch. 83. 425.) Es ist Vff. gelungen, eine Reihe von Phenacylaminhydrazonen in 2 isomeren Formen zu gewinnen, deren Konfiguration zu bestimmen u. damit die Hydrazonisomerie endgültig als Raumisomerie festzustellen. Die schwerer l. u. höher schm. α -Formen entstehen meist in überwiegender Menge, vielfach ausschließlich, die leichter l. u. 50—60° niedriger schm. β -Formen treten besonders bei o-substituierten Arylhydrazonen auf (vgl. BUSCH, ACHTERFELDT u. SEUFERT, Journ. f. prakt. Ch. 92. 1). Beide Formen sind selbst in sd. Lsgg. auffallend beständig; auch im Schmelzfluß scheint sich ein Gleichgewicht nicht einzustellen; selbst Säuren von ziemlich hoher Konz. bewirken keine Umlagerung. Dagegen gelingt die Überführung der β - in die α -Form glatt, wenn man in die w. alkoh. Lsg. H_2S einleitet. Wahrscheinlich lagert sich das

Agens an u. spaltet sich nach Umstellung des Mol. wieder ab. — Beide Formen oxydieren sich leicht schon durch den Luft-O, glatter mit HgO zu den entsprechenden Azoverbb. Da diese bei der Red. mit Zn-Staub u. Eg. nur die α -Form der Hydrazone zurückliefern, so ist damit ein 2. Weg von der β - zur α -Form gegeben. Die Umstellung des Mol. vollzieht sich hierbei in der Azoform. — Die Autoxydation beider Formen in Bzl. liefert mehrere Verbb., darunter *Oso triazole* (V.). — Die frühere Annahme der anti-Konfiguration (II.) für die β -Formen (I. c.) hat sich jetzt als richtig erwiesen. Denn die α -Formen reagieren glatt mit 1 Mol. eines Aldehyds unter Austritt von H₂O u. B. von *Triazin*en (III.), besitzen also die syn-Konfiguration I., während die β -Formen unter denselben Bedingungen die aldolartigen Additionsprodd. IV. liefern, in gewissen Fällen auch den ganzen Hydrazinrest an den Aldehyd abgeben.



Die Hydrazone werden aus mol. Mengen der Phenacylaniline u. Arylhydrazine in alkoh. Suspension unter Zusatz von wenig Eg. bei Zimmertemp. oder durch Erwärmen auf höchstens 50° erhalten, die beiden Formen durch A. getrennt. Beim Umkrystallisieren wird zur Verhinderung der Autoxydation ein Tropfen N₂H₄, H₂O zugesetzt. Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht über die dargestellten Verbb.:

R	R'	α -Form %	F. °	β -Form %	F. °
Phenyl	Phenyl		106,5	—	—
p-Tolyl	"	80	140	20	95
"	o-Tolyl	90	160—162	10	96—97
Phenyl	"	90	148,5	10	95—96
o-Tolyl	"		147—148	—	—
o-Anisyl	"	60	127—128	40	115—117
p-Anisyl	"	50	146	50	95—96
p-Chlorphenyl	"		102—104	—	—
a. m-Xylyl	"	50	137—138	50	75—77
p-Tolyl	a. m-Xylyl		149—150	—	—
o-Tolyl	"		118—120	—	—
p-Tolyl	o-Anisyl		136—137	—	—
"	o-Chlorphenyl	50	142	50	96
"	m-Chlorphenyl		92	—	—
"	p-Chlorphenyl		138	—	—
"	α -Naphthyl	60	147—158	40	84

Zu sämtlichen folgenden Verss. wurde das *N*-Phenacyl-*p*-anisidin-*o*-tolylhydrazon, C₂₂H₂₃ON₃, benutzt. α -Form: hellgelbe Nadelchen aus A., F. 145—146°, II. in Bzl., Chlf., zl. in Ä., wl. in A., kaum l. in PAe. β -Form: gelbliche Nadelchen aus A., F. 95—96°, viel leichter l. Beide Formen werden von Zn-Staub in h. Essigsäure unter B. von p-Anisidin gespalten, von Na-Amalgam nicht angegriffen. — *Azoverb.* C₂₂H₂₁ON₃ = C₆H₅ · C(N : N · C₇H₇) : CH · NH · C₆H₄ · OCH₃. Mit HgO in sd. A. oder mit Azodicarbonsäureester ohne Lösungsm., mit letzterem Reagens besonders leicht aus der β -Form. Orangerote, seidenglänzende Nadeln aus Chlf.-A., F. 138—139°, wl. in A., PAe., l. in Ä., II. in Bzl., Aceton, Chlf. — Die Kondensation der Hydrazone mit Aldehyden erfolgt in konz. sd. alkoh. Lsg., bei den aromat. Aldehyden unter Zusatz von 1—2 Tropfen HCl. — Formaldehyd: 6-Phenyl-4-*p*-anisyl-2-*o*-tolyl-1,2,4-triazintetrahydrid-2,3,4,5, C₂₃H₂₅ON₃ (nach III.). Nadeln aus Chlf.-A., F. 143—144°, II. in Bzl., Chlf., l. in Ä., wl. in A., PAe. Mit w. verd. H₂SO₄ wird CH₂O abgespalten. — Die β -Form gibt neben einem öligen Hauptprod. etwa 10%

III. infolge partieller Umlagerung. — Acetaldehyd: *Triazin* $C_{24}H_{25}ON_3$. Nadeln, F. 127—128°. — Benzaldehyd: *Triazin* $C_{29}H_{27}ON_3$. Nadeln aus Bzl.-PAe., F. 170°. — Die β -Form gibt ein rotbraunes Öl. — p-Chlorbenzaldehyd: *Triazin* $C_{29}H_{26}ON_3Cl$. Prismen aus Chlf.-A., F. 139—140°. — Verb. $C_{29}H_{25}O_2N_3Cl$ (nach IV.). (Nebenprod. III.). Gelbliche Prismen aus Chlf.-A., F. 123—124°, in A. leichter l. als III., neigt zur B. übersätt. Lsgg. — Anisaldehyd: *Triazin* $C_{30}H_{25}O_2N_3$. Nadeln oder Säulen aus Bzl.-A., F. 166°. — Verb. $C_{30}H_{24}O_3N_3$ (nach IV.). (Nebenprod. ca. 40% III.). Gelbliche Prismen aus A., F. 152°. — p-Dimethylaminobenzaldehyd: *Triazin* $C_{31}H_{32}ON_4$. Gelbliche Nadeln aus A., citronengelbe Prismen aus Chlf.-A., F. 158°, swl. in A. — Verb. $C_{31}H_{34}O_2N_4$ (nach IV.). Gelbe Prismen aus Chlf.-A., F. 118°. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 57. 1783—92. 1924. Erlangen, Univ.)

LINDENBAUM.

K. Heß, Bemerkung zu der Mitteilung von M. Stechow: „Über die Einwirkung von Alkali auf Äthylalkohol und die Stickoxydreaktion von W. Traube.“ Vf. weist die Behauptung von STECHOW (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 57. 1611; C. 1924. II. 2135), daß der von HESZ u. FINK durchgeführte Abbau des *Cusckhygrins* in Frage gestellt sei, weil das erhaltene $CH_2(NO)_4Na_2$ aus dem benutzten A. stamme, zurück. Während die B. dieses Salzes aus A. ungemein langsam verläuft, setzt sich Cusckhygrin mit NO rapide um (30 g in 30—45 Min. fast quantitativ), sodaß über die Herkunft des Salzes aus dem Cusckhygrin kein Zweifel bestehen kann. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 57. 1930. 1924.)

LINDENBAUM.

Richard Willstätter, László Zechmeister und Wilhelm Kindler †, *Synthese des Pelargonidins und Cyanidins*. Die Rk. eines Cumarins mit Mg-Arylhalogeniden führt durch Abänderung des Aryls der Grignardschen Verb. zu einer Reihe von *Anthocyanidinen*. *Trimethoxycumarin* verbindet sich mit Phenol u. Brenzcatechin (in Form der Mg-Verbb. des 4-Bromanisols u. 4-Jodveratrols) zu den Methyläthern der Tetra- u. Pentaoxyppyryliumverbb., aus diesen resultieren durch Entmethylierung mit HJ die freien Anthocyanidine. Die Oxyphenylverb. wurde als *Pelargonidin* (aus den Anthocyanen der Pelargonie, Dahlie, Aster usw.), die o-Dioxyphenylverb. als *Cyanidin* (aus Kornblume, Rose, Mohn usw.) identifiziert.

Versuche. Darst. des 3,5,7-*Trimethoxycumarins* u. des *Pelargonidins* vgl. WILLSTÄTTER u. ZECHMEISTER, Sitzungsber. Preuß. Akad. Wiss. Berlin 1914. 886; C. 1914. II. 1359. — Die Rk. des *Trimethoxycumarins* mit dem 4-Jodveratrol-Mg ergab eine gelbe Carbinol-Mg-Verb., aus der durch Zers. mit HCl das Salz des *Pentamethyläthers des Cyanidins* erhalten wurde, ll. in 0,5%ig. HCl, unterscheidet sich vom Cyanidin durch die violette Färbung (Cyanidin blau), die die alkoh. Lsg. mit Soda gibt. — *Cyanidin*, $C_{15}H_{11}O_6Cl$, aus vorigem u. HJ, nach Überführung des Jodids in das Chlorid (vgl. WILLSTÄTTER, BOLTON u. BURDICK, LIEBIGS Ann. 412. 113; C. 1916. II. 1153). (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 57. 1938—44. 1924.) ZANDER.

Richard Willstätter und Otto Th. Schmidt, *Synthese neuer Anthocyanidine*. (Vgl. vorst. Ref.) Durch Veränderung des Aryls bei der Addition von Arylmagnesiumhalogeniden an Trimethoxycumarin stellen Vff. neue *Flavylumverbb.* her. Die schöne Farbe der Anthocyane wird durch den Eintritt von mindestens einer OH-Gruppe in den Phenylrest bedingt, bei Eintritt von zwei OH-Gruppen wirkt die Substitution in o-Stellung bathochrom gegen die in m-Stellung. Anthocyane des so dargestellten *Galanginidins* u. *Morinidins* sind in der Natur noch nicht gefunden worden.

Versuche. *Pentamethyläther des Morinidinchlorids*, $C_{20}H_{21}O_6Cl$, aus *Trimethoxycumarin* u. der Mg-Verb. des 4-Jodresorcin dimethyläthers, rote Nadeln, l. in A. u. 1/2%ig. HCl mit tieferer Farbe, wird durch W. zers. — *Morinidinchlorid* (2-Resorcy-3,5,7-trioxybenzopyryliumchlorid), $C_{15}H_{11}O_6Cl$, aus vorigem durch Entmethylierung mit Phenol u. HJ, krystallisiert in verschiedenen Hydraten, swl. in h. 0,1%ig. u.

k. 1%ig. HCl, zl. in h. 1%ig. HCl, ll. in h. 7%ig. HCl, gibt mit FeCl_3 keine Farbrk. (Unterschied von Cyanidin). — *Galangindichlorid* (2-Phenyl-3,5,7-trioxybenzopyryliumchlorid), $\text{C}_{15}\text{H}_{11}\text{O}_4\text{Cl}$, aus *Trimethoxycumarin* u. der Mg-Verb. des Brombenzols durch Hydrolyse des Rk.-Prod. mit HJ, umkrystallisiert aus HCl-haltigem A., lange, leuchtend rote Prismen, ll. in A. (orangerot) u. Chlf. (himbeerrot), bildet auch verschiedene Hydrate. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 57. 1945–50. 1924. München, Akad. d. Wissensch.)

ZANDER.

T. Brailsford Robertson, *Der Einfluß der Hydrolyse auf das Säure- und Basenbindungsvermögen der Proteine*. Die Verb. der schwach sauren freien NH_2 - bzw. COOH -Gruppen mit Säuren bzw. Basen müßte stark hydrolyt. dissoziiert sein, während die Bindungsfähigkeit der Eiweißstoffe für Säuren u. Basen von der Verdünnung unabhängig ist. Vf. vermutet daher, daß für diese Bindungen vorzugsweise die Säureamidgruppen ($\text{CO}\cdot\text{NH}$) in Betracht kommen, worauf die Veränderung des Verhältnisses gebundene Säuren- oder Basenäquivalente freie NH_2 -Äquivalente hinweist. In Verss.

bei Hydrolyse von *Casein* u. *Gelatine* mittels Trypsins gab er zu den Hydrolysefl. Säuren bzw. Alkalien bis zu $\text{pH} = 2-8,2-10,5$, bestimmte dann die davon gebundenen Mengen u. verglich sie mit den formoltitrierbaren NH_2 -Gruppen. In allen Fällen außer *Gelatinehydrolysat* bei $\text{pH} = 10,5$ fand sich starke Abnahme der Säurebindungsfähigkeit durch die Hydrolyse sowohl im Vergleich zu freiem NH_2 als auch absol., nur in dem erwähnten Ausnahmefall eine Zunahme der Säuren- u. Basenbindungsfähigkeit. (Australian Journ. of exp. biol. and med. science 1. 31–37. Adelaide, Univ.; Ber. ges. Physiol. 27. 31–32. 1924. Ref. FELIX.)

SPIEGEL.

Edwin J. Cohn und Ruth E. L. Berggren, *Studien über die physikalische Chemie der Proteine*. III. Die Beziehung zwischen der Aminosäurezusammensetzung des Caseins und seinem Basenbindungsvermögen. (II. vgl. Journ. Gen. Physiol. 5. 521; C. 1923. III. 1491.) Unter Zugrundelegung des Mol.-Gew. 12800 für das *Casein* (nach dem Tryptophangehalt) muß ein Mol. an Aminodicarbonsäuren mindestens 19 Moll. *Glutaminsäure*, 4 Moll. *Asparaginsäure* u. 8 Moll. β -*Oxyglutaminsäure* enthalten. Durch Bindung der im Caseinmol. enthaltenen 12 Moll. NH_2 würden 19 Säuregruppen für die Basenbindung verfügbar sein, deren Zahl sich unter Berücksichtigung der 3 im Mol. vorhandenen P-Atome (falls in Form freier H_3PO_4 vorliegend), auf höchstens 28 erhöhen könnte. Das Basenbindungsvermögen von 1 g *Casein* würde hiernach zwischen 148,7 u. $217,4 \cdot 10^{-5}$ Moll. Base schwanken. Es wird gemessen durch die Abnahme der $[\text{OH}^-]$ der einwirkenden alkal. Lsg., die direkt durch die EK. der H-Elektrode gegen einen bekannten Standard bestimmt wird. Die erhaltenen Werte zeigen gute Übereinstimmung mit den von ROBERTSON erhaltenen (vgl. Journ. Physical Chem. 1910. 521; C. 1911. II. 766); sie steigen bei längerer Einw. der Base, da durch Hydrolyse mehr Säuregruppen frei werden. Untersucht wurden 10 verschiedene Präparate bei Konz. von 0,025–0,05-n. NaOH. Die erhaltenen Werte variieren zum Teil stark, was Vf. auf die Art der Darst. der Präparate zurückführen; mit starken Alkalien behandelte haben ein großes Basenbindungsvermögen, 0,0018 Mol. NaOH, mit schwachen Lsgg. behandelte 0,0014 Mol. NaOH auf 1 g *Casein*. Das Äquivalentgewicht zu 1 Mol. NaOH wäre demnach 535–735 g *Casein*. Bei einem Mol.-Gew. von 12800 würde das natürliche *Casein* also annähernd 18, nach alkal. Behandlung 24 freie Säuregruppen enthalten. (Journ. Gen. Physiol. 7. 45–79. 1924.) ZANDER.

Edwin J. Cohn, Ruth E. L. Berggren und Jessie L. Hendry, *Studien über die physikalische Chemie der Proteine*. IV. Die Beziehung zwischen der Zusammensetzung des Zeins und seinen basischen und sauren Eigenschaften. (III. vgl. vorst.

Ref.) Vff. berechnen aus der Zus. des Zeins nach der beim Casein beschriebenen Methode (vgl. COHN u. HENDRY, Journ. Gen. Physiol. 5. 521; C. 1923. III. 1491) sein Minimal-Mol.-Gew. nach dem Cystin- u. Histidingehalt zu etwa 19400. Bei diesem Mol.-Gew. würde ein Mol. Zein an Aminodicarbonsäuren enthalten: 3 Moll. *Asparaginsäure*, 3 Moll. β -*Oxyglutaminsäure* u. 41 Moll. *Glutaminsäure*, insgesamt 47 Moll. Unter der Annahme, daß die im Zeinmol. enthaltenen 41 NH_2 -Moll. als Amide an die Säuren gebunden sind, würden 6 freie Carboxylgruppen für das Basenbindungsvermögen verfügbar sein. 1 g Zein würde danach annähernd $3 \cdot 10^{-4}$ Moll. Base binden.

Zu den Unterss. wurden zwei Präparate verwendet, die vollständig chlorid- u. sulfatfrei waren. Die Löslichkeit in W. betrug bei 25° 8,8 mg N = 0,054 g Zein in 1 l. Das wie beim Casein bestimmte Basenbindungsvermögen betrug 0,0028 bis 0,0031 Mol. NaOH für 1 g Zein; das Äquivalentgewicht zu 1 Mol. NaOH ist demnach 3226 g bzw. 3571 g, das Minimal-Mol.-Gew. (äquivalent 6 Moll. NaOH) wäre annähernd 20400 (berechnet 19400).

Mit Säuren bildet das Zein keine Verb., im Mol. sind also keine freien bas. Gruppen vorhanden; die Löslichkeit in 0,01–0,04-n. HCl ist die gleiche wie in W. (nur in einzelnen Fällen unwesentlich höher); sie steigt auch nicht nach der Behandlung mit Alkali, so daß Vff. annehmen, daß die NH_2 -Gruppen sehr fest im Mol. gebunden sein müssen. Auch das Basenbindungsvermögen wird durch alkal. Behandlung kaum verändert; es kann nach den erhaltenen Werten höchstens eine neue Säuregruppe frei werden; Vff. halten dieses jedoch nicht für wahrscheinlich. (Journ. Gen. Physiol. 7. 81–98. 1924. Boston, HARVARD Medic. School.) ZANDER.

H. Steudel und E. Peiser, *Über die Kohlenhydratgruppe der Thymonucleinsäure*. II. (I. vgl. Ztschr. f. physiol. Ch. 132. 297; C. 1924. I. 2149.) ω -Oxymethylfurfural, das sich beim Erhitzen von Kohlenhydrat mit Säuren leicht bildet, gibt die grüne Fichtenspanrk. u. eine stark positive Rk. mit fuchsinschwefliger Säure. Es ist sehr wahrscheinlich die Ursache der von FEULGEN (Ztschr. f. physiol. Ch. 137. 272; C. 1924. II. 1207) Nuclealfärbung genannten Rk. der Thymonucleinsäure u. der sog. Pentosenrk. derselben. Die leichte Zersetzlichkeit des ω -Oxymethylfurfurals in Ameisen- u. Lävulinsäure bedingt, daß bei Einw. von Säuren auf Thymonucleinsäure nur geringe Mengen des Furfurols nachweisbar sind. Außer Thymonucleinsäure geben auch verschiedene andere Kohlenhydratderiv. einen positiven Ausfall der Fichtenspanrk., wenn sie nach der von FEULGEN l. c.) angegebenen Methode gespalten werden. Die Rk. ist schwach mit: Rohrzucker, Lävulose u. Inulin, positiv mit: Malzzucker, Inosin u. glucosephosphorsaurem Ca, stark mit Theophyllinglucosid, negativ mit: α -Methylglucosid, Adeninhexosid, Vernin, Vicin u. saccharasephosphorsaurem Ca. Der mehr oder weniger positive Ausfall der Rk. hängt von der Spaltbarkeit des Kohlenhydratderiv. ab. Die Rk. mit fuchsinschwefliger Säure ist, unabhängig von der Fichtenspanrk., an die Anwesenheit der CHO-Gruppe gebunden u. schwach positiv mit Malz- u. Rohrzucker, stark positiv mit Theophyllinglucosid. Es liegt deshalb kein Grund vor, in der Thymonucleinsäure ein besonderes Kohlenhydrat anzunehmen; auch kann die Nuclealfärbung nicht als absol. spezif. für sie angesehen werden. (Ztschr. f. physiol. Ch. 139. 205–11. 1924. Berlin, Univ.) GUGGENHEIM.

E. Biochemie.

P. Reiss, *Bemerkungen über den inneren p_{H} des Zellkerns und seine experimentellen Veränderungen*. Die untersuchten Kerne der Eizellen von *Psammecinus miliaris*, *Echinocardium cordatum* u. *Sabellaria alveolata* haben p_{H} -Werte, die fast Neutralität anzeigen. Im Gegensatz zu p_{H} des Protoplasmas sind diese Werte

durch $[H^+]$ des Außenmediums stark veränderlich innerhalb der Grenzen $p_H = 5$ u. $p_H = 9$. Werden die Zellen in urethanhaltiges Meerwasser ($p_H = 8,8$) gebracht, so zeigt p_H des Kerns anfangs einen Anstieg, sinkt dann nach 15–30 Min. langer Einw. aber wieder. Durch mehrmaliges Waschen kann die Depression wieder rückgängig gemacht werden. Wird die Einw. der Narkotika (untersucht wurde außer Urethan, $CHCl_3$, Chloral, Cocain) weiter verlängert, so steigt p_H des Kerns wie auch des Protoplasmas, gleichzeitig tritt hiermit Plasmolyse ein. (C. r. d. l'Acad. des sciences 179. 641–43. 1924.)

HABERLAND.

G. W. Scarth, *Kolloidale Zustandsänderungen, verbunden mit Protoplasmakontraktion*. (Vgl. Proc. Trans. Roy. Soc. Canada [V] 17. Sekt. V. 137; C. 1924. II. 1104.) Vf. unterscheidet bei Spirogyra 2 Typen von Kontraktion des Chloroplasten u. des Plasmakörpers, „vitale“ u. „disintegrierende“. Die erste Verkürzung in einer Achse, rasch reversibel ohne Hinterlassung einer Deformation, ist Kontraktion im physiol. Sinne, die zweite, „unechte“, besteht in tiefergreifenden Formveränderungen von Plasmakörpern durch Wirksamwerden der Oberflächenkräfte u. geht gar nicht oder erst nach Tagen zurück. — Der Chloroplast, n. ein Gel, elast., ohne Molekularbewegung seiner Körnchen, wird bei beiden Typen der Kontraktion verflüssigt. Faktoren, die ihn verflüssigen (Wärme, elektr. Reizung, A., Ä., Aceton, Chlf., Saponin) rufen auch Kontraktion hervor. Bei Erzeugung von Kontraktion durch anorgan. Stoffe besteht Parallelismus zwischen dieser Wrkg. u. der fallenden auf Kolloide. Ausschlaggebend sind vornehmlich die Kationen, dreiwertige wirken schon bei großer Verdünnung sehr stark, Ba auch noch stark, Sr weniger, Ca nicht. HCl wirkt am stärksten bei 10^{-3} -n. Lsg., über $10^{-4,5}$ -n. rasch tox. — Der Chloroplast ist im Dunkelfeld opt. leer, bei Kontraktion gelegentlich schwach leuchtend. Im polarisierten Lichte erscheint er als Gel doppelbrechend; diese Eigenschaft verschwindet bei Verflüssigung, um dann noch deutlicher aufzutreten. (Quart. Journ. of exp. physiol. 14. 99–113; Ber. ges. Physiol. 27. 13. 1924. Ref. SPEK.)

G. W. Scarth, *Die Wirkung der Kationen auf die Kontraktion und Viscosität des Plasmas bei Spirogyra*. (Vgl. vorst. Ref.) Die molare Grenzkonz. reiner Salzlsgg., durch die Kontraktion des Chloroplasten herbeigeführt wurde, fand Vf. ca. 10^{-7} für Ce, La, Nd, Pr, Ag, Hg⁺, Cu, 10^{-3} – 10^{-7} für Sa, Gd, Er, $Co(NH_3)_6$, 10^{-6} für Fe⁺⁺⁺, Al, Y, Ru, Cd, 10^{-5} – 10^{-6} für Th, Zr, Sn, Be, Ba u. H, 10^{-5} für Au, Hg⁺, Pb, Mn, Fe⁺⁺, Co⁺⁺, 10^{-3} für Cr⁺, Mg, Sr, 10^{-2} für Cs, Rb, K, 10^{-1} – 10^{-2} für Na, Li; Ca, UO_2 , Zn hatten keine Wrkg. — Um den Einfluß der verschiedenen Permeabilität möglichst auszuschalten, wurden die Zellen zuvor mit dest. W. behandelt. Manche Salze bewirken Adhäsion des Chloroplasten an die Zellwand, manche lassen ihn nach der Kontraktion leicht wieder in Gelzustand übergehen. (Quart. Journ. of exp. physiol. 14. 115–22. Montreal, Mc GILL Univ.; Ber. ges. Physiol. 27. 13. 1924. Ref. SPEK.)

SPIEGEL.

C. Fromageot, *Über die Beziehungen zwischen dem physiko-chemischen Zustand und der Funktion des Protoplasmas: Photosynthese und Respiration*. Bei Ulva lactuca wird die Respiration durch Glycerin herabgesetzt. Das initiale Maximum der Respiration ist durch die Verbrennung von Glycerin bedingt, das in einer Menge in die Zelle dringt, die den physikalisch-chem. Zustand des Protoplasmas nicht beeinflusst. Im Licht ist die Oxydation stärker ausgesprochen als im Dunklen. Photosynthese u. Respiration verhalten sich nicht gleichsinnig. (Bull. Soc. Chim. Biol. 6. 169–80. 1924.)

LEWIN.

E₁. Enzymchemie.

Mark Serejski, *Gibt es spezifische Abwehrfermente?* Der Vf. gibt für die „Mikro-Abd.-Rk.“ nach PREGL-CRINIS eine genaue Vorschrift, welche im Original nachgelesen werden muß. Unbedingt müssen folgende Kontrollproben angestellt werden: aktives Serum + Organ, inaktives Serum + Organ, sowie aktives u. in-

aktives Serum allein. — Sowohl aktives als auch inaktives Serum erleiden beim Aufbewahren Änderung des Brechungsindex bis 0,4—0,6 der Refraktometerskala, welche von autolyt. Prozessen oder auch von unkontrollierbaren Verschiedenheiten der Versuchsbedingungen verursacht sind. Beim Vers. „Serum + Organ“ können diese Abweichungen auch durch Adsorption von einem Teil des Serums durch das Organ bewirkt werden. — Man kann nicht einwandfrei angeben, welche Änderung der Refraktometerzahl als positive Rk. anzusehen ist. Es läßt sich keine untere Grenze angeben, oberhalb deren die positive Rk. beginnt, da auch bei Männern u. bei Nichtschwangeren sehr hohe, manchmal sogar höhere Zahlen als bei Schwangeren beobachtet wurden. Je tiefer man die Grenze zieht, desto häufiger erhält man eine positive Rk. In keinem Fall ist die Rk. spezif. im Sinne von ABDERHALDEN, es ist keine Differenz zwischen dem Ausfall der Abd.-R. bei Schwangeren u. Nichtschwangeren zu beobachten. — Da die hohe Zahl der positiven Rkk. bei Nichtschwangeren bei der Verfolgung der Rk. mittels des Refraktometers die fermentative Natur der Abd.-Rk. zweifelhaft erschienen ließ, wurde für die Best. der Proteinabbauprodd. die chem. Methode von BACH (C. r. d. l'Acad. des sciences 164. 248; C. 1917. II. 167) benutzt, welche auf der Eigenschaft der *Perhydridase* von SCHARDINGER beruht, Nitrate in Ggw. von Aldehyden oder Eiweißabbauprodd. in Nitrite umzuwandeln. Auch mit dieser Methode konnten keine Anhaltspunkte für die Annahme des fermentativen Charakters der bei der Abd.-Rk. sich abspielenden Prozesse erhalten werden; die gefundenen Zunahmen der Eiweißabbauprodd. lagen innerhalb der Fehlergrenzen der Methode. (Biochem. Ztschr. 152. 79—91. 1924. Moskau, Biochem. Inst.)

A. R. F. HESSE.

P. W. Danckwortt und E. Pfau, Über ein proteolytisches Enzym in den Hülsen von *Vicia faba* L. Wss. Auszüge der Hülsen u. des weißen Gewebes, in dem die Bohnen von *Vicia faba* kurz vor ihrer Reife eingebettet sind, enthalten ein *proteolyt. Enzym* (I). In den Blättern, Stengeln u. Bohnen selbst kommt es nicht vor. Das Gewebe enthält auch *Peroxydase* (II). Beide lassen sich aus der wss. Lsg. dadurch trennen, daß I durch gewachsenes Al_2O_3 , II durch Tierkohle adsorbiert wird. Durch Aufschwämmen mit viel W. lassen sich die Enzyme wieder von den Adsorbentien abtrennen. — Der Milchsafte von *Euphorbia lathyris* enthält nur *Peroxydase*, ebenso der von *Papaver rhoeas*. I u. II fanden sich im Milchsafte von *Euphorbia palustris* u. *Chelidonium majus*; in letzterem konnte auch *Oxydase* nachgewiesen werden. (Arch. der Pharm. 262. 449—51. 1924. Hannover, Tierärztl. Hochsch.)

HABERLAND.

C. Neuberg, Einige Beobachtungen über Hefenfermente. Es wird ein Vorlesungsvers. zur Vorführung der Carboxylasewrkg. beschrieben, dessen genau angegebene Einzelheiten im Original nachgelesen werden müssen. — An einem nach den Krauseverf. getrocknetem Hefemacerationssaft wurde beobachtet, daß das Trockenpräparat sogleich nach der Trocknung noch seine volle Gärwrkg. hatte, daß aber nach 49 Tagen die *Zymase* verschwunden war u. auch durch Zugabe von Coferment nicht wieder belebt werden konnte. Während zu dieser Zeit die *Carboxylase* noch wirksam war, verlor das getrocknete Präparat in 190 Tagen auch diese Wrkg. Die Carboxylase ist also widerstandsfähiger als die Zymase (vgl. NEUBERG, Biochem. Ztschr. 56. 495; C. 1914. I. 52). — Ein nach den neueren Vorschriften bereiteter Hefemacerationssaft, welcher keine Selbstgärung hat, verursacht im Gegensatz zu früherer Beobachtungen (NEUBERG u. ROSENTHAL, Biochem. Ztschr. 61. 171; C. 1914. I. 1893) bei der Vergärung von *Brenztraubensäure* keine Wärmeentw. — Eine durch Autolyse unter Zugabe von CHCl_3 + Toluol aus Preßhefe bereitete *Saccharaselsg* hatte nach 4400 Tagen bei Zimmertemp. ihre volle Wirksamkeit behalten. (Biochem. Ztschr. 152. 203—6. 1924. Berlin-Dahlem, Kaiser WILHELM-Inst. f. exper. Ther. u. Biochemie.)

A. R. F. HESSE.

S. Watanabe, *Über die Katalase in der Cerebrospinalflüssigkeit*. Nach Klärung durch Zentrifugieren hat der Liquor keine Katalasewrkg. Diese ist proportional dem Gehalte an polynucleären Leukocyten, die Lymphocyten sind ohne Bedeutung. Polynucleäre Leukocytose bei Krankheiten läßt auf Katalasewrkg. der Lumbalf. schließen. (Japan med. world 4. 8—11. Osaka, Osaka med. coll.; Ber. ges. Physiol. 27. 194. 1924. Ref. JACOBY.)

SPIEGEL.

Kuhei Okubo, *Beiträge zur Kenntnis der Serumprotease*. I. Verhalten des antityptischen Faktors des Serums gegenüber der Behandlung mit Aceton bezw. Carbol. II. Heterolytische Wirkung der Serumproteasen auf zugeführte Eiweißlösungen. I. Aceton u. Phenol beseitigen je nach Menge u. Temp. die antienzymat. Eigenschaft von gemeinem Serum gegen Pankreas-, Hefe- u. Serumprotease. Kleine Mengen Toluol verstärken diese Wrkg. Aceton schädigt die Enzyme. — II. Hundeserum hat eine schwächer wirkende Protease als Meerschweinchenserum. Es kommt mit Chlf., besser mit Aceton zur Autolyse. Sowohl gemeines, als durch Aceton aktiviertes Serum von Hund u. Schwein verdaut in Ggw. von Chlf. Eiweißlsgg., am leichtesten Nutrose u. gekochte Kuhmilch, viel weniger gekochte Sera, am wenigsten gekochtes Eiereiweiß. Gleiches gilt für Pankreasprotease u. künstliches Gemisch von Serum u. Pankreassaft. Mit Aceton behandelte Sera sind weit wirksamer als genuine. (Tôhoku Journ. of exp. med. 4. 427—63. Sendai, Univ.; Ber. ges. Physiol. 27. 195—96. 1924. Ref. JACOBY.)

SPIEGEL.

Toshiharu Nomura, *Zur Frage der Cholesterase im Blutserum und den Organextrakten*. Cholesterase wurde in Leber, Niere, Magen- u. Darmschleimhaut, Muskel, Milz, Pankreas gefunden, nicht aber im Blute. (Tohoku Journ. of exp. med. 4. 677—84. Sendai, Tôhoku Univ.; Ber. ges. Physiol. 27. 198. 1924. Ref. JACOBY.)

E₂. Pflanzenchemie.

C. F. Langworthy, *Radioaktivität von reifen Tomaten*. Unterss. an zerriebenen Tomatenpflanzen ergaben, daß ihre Radioaktivität zunächst über dreimal so groß war als die des Wassers der Stadt u. daß sie mit dem Lagern stark abnahm. (Science 60. 405—6. 1924. Washington [D. C.])

BEHRLE.

Erich Schmidt und Günther Malyoth, *Zur Kenntnis pflanzlicher Inkrusten*. V. (IV. vgl. Ber. Dtsch. Chem. Ges. 56. 1438; C. 1923. III. 393.) Pflanzliche Zellmembranen werden durch Behandlung mit wss. ClO_2 - u. Na_2SO_3 -Lsgg. in Inkrusten u. Skelettsubstanzen zerlegt. Um die Frage nach der Verteilung der Polysaccharide (vgl. SCHMIDT, GEISLER, ARNDT u. IHLOW, Ber. Dtsch. Chem. Ges. 56. 23; C. 1923. I. 960) auf Skelettsubstanz u. Inkruste zu entscheiden, untersuchen Vff. zunächst die Möglichkeit, nach dem ClO_2 -Verf. völlig unangegriffene Skelettsubstanzen zu erhalten. Die beim Aufschluß mit $\frac{1}{50}$ -n. ClO_2 erhaltene Skelettsubstanz (= Skelettsubstanz $\frac{1}{50}$ -n.) ist noch gegen $\frac{1}{5}$ -n. ClO_2 beständig; Vff. halten es daher für zweckmäßig, bei Aufschluß größerer Mengen mit $\frac{1}{5}$ -n. ClO_2 u. 2%ig. Na_2SO_3 zu arbeiten. Die sich während des Aufschlusses bildende HCl hat keinen störenden Einfluß auf die Rk., da sie bei den in Frage kommenden Konz., auch in Wechselwirkung mit Na_2SO_3 , keine hydrolysierende Einw. auf die Skelettsubstanz $\frac{1}{50}$ -n. zeigt, erst 2-n. HCl wirkt schädigend.

Versuche. Verh. von ClO_2 - u. Na_2SO_3 -Lsgg. gegen Skelettsubstanzen. *Galaktose* u. *Lävulose* werden von $\frac{1}{50}$ -n. ClO_2 nicht angegriffen. Skelettsubstanz $\frac{1}{50}$ -n. von Buchenholz (*Fagus silvatica*) wird 96 Stdn. der ClO_2 -Einw. u. danach 2 Stdn. der Na_2SO_3 -Einw. (bei 100°) ausgesetzt; Differenz: —1,73%. — Verh. von HCl gegen Skelettsubstanz. Bei der Einw. von $\frac{1}{2}$ - u. $\frac{1}{10}$ -n. HCl beträgt die Differenz nach 96-std. Einw. auf Skelettsubstanz $\frac{1}{50}$ -n. aus Buchenholz 1—1,7%, bei der Einw. von 2-n. Säure 4,83%, ähnliche Werte bei Fichtenholz (*Picea excelsa*): 1,12%, 1,79% u. 3,48%. — Nachfolgende Behandlung mit 2%ig. Na_2SO_3 -Lsg. (bei 100°) zeigt auch

im Durchschnitt eine Differenz von nur 1,5%. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. **57**. 1834 bis 1837. 1924. München, Akad. d. Wissensch.) ZANDER.


Charles E. Sando und **H. H. Bartlett**, *Über die organischen Säuren von Pyrus coronaria, Rhus glabra und Acer saccharum*. Anstatt der normalerweise in sauren Früchten von *Pyrus coronaria* vorkommenden Äpfelsäure (I) wurde beim Extrahieren mit k. W. nur *Bernsteinsäure* (II) isoliert. Da die Extraktion unter anaeroben Bedingungen (Anwesenheit von CHCl_3 u. Toluol) geschah, nehmen Vff. eine Autolyse an. Durch die hohe anfängliche Acidität der Lsg. wird eine bakterielle Einw. wahrscheinlich verhindert, obwohl die Möglichkeit einer Fermentierung durch Mikroorganismen nicht gänzlich ausgeschlossen erscheint. Gegen Anwesenheit von Hefe spricht die schließlich beim Extrahieren erhaltene klare Lsg. Beim Erhitzen mit W. im Autoklaven wurde dagegen nur *Äpfelsäure*, isoliert als Ag-Salz, nicht aber II gefunden, ein Beweis dafür, daß II in lebenden Früchten nicht vorhanden ist.

Die Unterss. über die rote, herbe Samenhülle (Perikarp) von *Rhus glabra* bestätigen die Befunde von ROGERS u. FRANKFORTER u. MARTIN (Amer. Journ. Pharm. **76**. 151; C. **1904**. I. 1574), daß die darin enthaltene Fruchtsäure aus Äpfelsäure, fast immer als saures Ca-Salz besteht. Außerdem wurde freie *Gallussäure* $\text{C}_7\text{H}_5\text{O}_5 \cdot \text{H}_2\text{O}$, nachgewiesen.

Obwohl die Anwesenheit von I im Saft des Zuckerahorns (*Acer saccharum*) bekannt ist (vgl. COWLES, Journ. Americ. Chem. Soc. **30**. 1285; C. **1908**. II. 1471) ist die Zus. des während Konz. des Saftes in den Pfannen ausgeschiedenen körnigen Sandes (maple sand) bisher ungenügend experimentell begründet werden. — Während im Zuckerahornsafte ein Gemisch von saurem u. neutralem Ca-Salz der Äpfelsäure enthalten ist, besteht der „Ahornsand“ aus rohem apfelsaurem Ca. (Journ. Agricult. Research **22**. 221—29. 1924. Univ. von Michigan.) TENNENBAUM

Frederick B. Power und **Victor K. Chesnut**, *Alkalische Reaktion der Baumwollpflanze*. Gegenüber C. M. SMITH (Journ. Franklin Inst. **197**. 699; C. **1924**. II. 877) stellen Vff. fest, daß die Alkalinität des von Baumwollpflanzen gesammelten Taus mindestens teilweise auf der Ggw. von *Ammoniak* u. *Trimethylamin* beruht. Beide sind sicherlich Ausscheidungen der Pflanze u. werden in erheblich größerer Menge bei ihrer Dampfdest. erhalten. Das Trimethylamin hat eine besondere Anziehungskraft für den Baumwollwurm. (Science **60**. 405. 1924. Washington. Dep. of Agric.) BEHRLE.

Gustave Rivière und **Georges Pichard**, *Beitrag zur Untersuchung der in den Blättern und Fruchtschalen des Apfelbaums vorkommenden Bestandteile*. Auf Grund der Unters. von SANDO (Journ. Biol. Chem. **56**. 457; C. **1923**. III. 1283) haben Vff. *Äpfelschalen*, die bei 50° (150 mm) im CO_2 -Strom getrocknet, darauf zur Entfernung von Wachs mit w. CCl_4 behandelt worden waren, untersucht. Phlorizin wurde in Rückstand nicht gefunden. In Übereinstimmung mit den Befunden von SANDO wurden im CCl_4 -Extrakt festgestellt: *Triacontan*, F. 64°, *Heptacosanol*, $\text{C}_{27}\text{H}_{55}\text{OH}$ F. 81°, u. die von SANDO als *Malol*, $\text{C}_{20}\text{H}_{48}\text{O}_3$, bezeichnete Verb., F. 285°, wl. in CCl_4 . Außerdem wurde ein nicht näher untersuchtes Gemisch *gesätt. KW-stoffe* F. ca. 30°, Kp.₁₂ 220—280°, sowie in dem zum Trocknen benutzten CO_2 -Strom *Geraniol* gefunden. Die von SANDO für Monomethyl-, Monoacetyl-, Acetylmethyl- u. Diacetylmalol gewählten Bezeichnungen der Malolderivv. sind inkorrekt. Malol ist in Wirklichkeit eine Alkoholsäure u. dem *Diacetylmalol* kommt die Konst. (I) eines gemischten Anhydrids aus dem Essigsäureester der Säure u. CH_3COOH zu. Diese Verb. hat F. 200° (Zers.) wird danach wieder fest u. schm. hierauf bei 300° es erfolgt Spaltung in *Acetanhydrid* u. in das *Anhydrid des Malolessigesters* (II Schema A); letzteres gibt durch Hydrolyse dasselbe Essigesterderiv. (III), das aus durch sd. verd. A. erhalten wird. An Stelle der Sandoschen Bezeichnung Malol



schlagen Vff. für die Verb. $\text{C}_{30}\text{H}_{48}\text{O}_3$ den Namen *Malolsäure* vor. Diese Säure läßt sich in sd. alkoh. Lsg. gut titrieren (Phenolphthalein), sie bildet beim Kochen ihrer alkoh. Lsg. mit Alkali- u. Erdalkalicarbonaten die entsprechenden Salze. Das Pb-, Cu- u. Ag-Salz (unl.) konnten bisher nicht in reinem Zustande isoliert werden. Die ll. Alkali- u. Erdalkalisalze werden durch CO_2 leicht gespalten. Die Ablagerung der Säure in den Fruchtschalen ist hierauf zurückzuführen, denn die als l. Salz in die Schalen gelangte Säure wird durch CO_2 oder Apfelsäure zerlegt u. abgelagert. Vff. mutmaßen, daß die Säure zu den Sterinen in Beziehung steht. — Im Extrakt frischer *Apfelblätter* fanden Vff.: ca. 1% *Phlorizin*, etwas *Phloretin*, ca. 2,5% *Fette*, eine sehr leicht oxydable noch nicht identifizierte Verb. u. ca. 1% *Malolsäure*. (C. r. d. l'Acad. des sciences 179. 775—77. 1924.)

HABERLAND.

Paul Menaul, *Chemische Analyse von Jatropha stimulos*a. Die untersuchten Samen der *Jatropha stimulos*a bestehen zum größten Teil aus Fett u. Eiweiß. Im Fett befindet sich ein hoher Prozentsatz an ungesätt. Verbh. Das Eiweiß weist einen hohen Gehalt an Histidin auf. (Journ. Agricult. Research 26. 259—60. 1924. Oklahoma.)

TENNINGBAUM.

J. Arthur Harris, R. A. Gortner, W. F. Hoffman, J. V. Lawrence und **A. T. Valentine**, *Osmotischer Druck, spezifische elektrische Leitfähigkeit und Chloridgehalt der Gewebssäfte der Indicatorpflanzen des Toveletals, Utah*. KEARNEY, BRIGGS, SHANTZ, MC LANE u. PIEMEISEL (Journ. Agricult. Research 1. 365 [1914]) hatten durch Bodenanalyse desselben Tales u. Feststellung der in seinen verschiedenen Gebieten wachsenden Pflanzen festgestellt, daß gewisse Beziehungen bestehen zwischen dem Salzgehalt des Bodens u. der Vegetation. Die vorliegenden Unters. bilden eine Ergänzung der eben erwähnten, indem in Anlehnung an die von KEARNEY etc. geschaffene Boden- bzw. Vegetationseinteilung an Pflanzensäften osmot. Druck, Leitfähigkeit u. Chloridgehalt bestimmt wurden. Ergebnisse tabellar. im Original. Es wurde gefunden, das die physikal.-chem. Eigenschaften des Pflanzensaftes in hohem Grade von der Zus. des Bodens abhängig sind. Das wegen seiner Weiden landwirtschaftlich am meisten in Betracht kommende hochgelegene Gebiet A) (Leitpflanze *Artemisia tridentata*), das sich durch niedrigen Salzgehalt u. gut durchlässigen Boden auszeichnet, trägt Pflanzen, bei denen der durchschnittliche osmot. Druck des Saftes der Blätter (P) 22 at betrug; spezif. Leitfähigkeit (K) = 0,024 mhy, 2,65 g Cl pro l Saft. Das hier angrenzende durch *Kochia vestita* gekennzeichnete Gebiet B) ist salzreicher, für W. weniger gut durchdringbar u. hat nur eine dünne für Pflanzenwuchs geeignete Bodenschicht; während des Sommers fehlt genügend Feuchtigkeit zum Wachstum; Kulturpflanzen gedeihen hier am besten, wenn durch Berieselung der zu hohe Salzgehalt herausgewaschen wird. Es wurde bei diesen Pflanzen gefunden: P = 27,08, K = 0,0390, Cl = 7,53 g pro l. Dringen Pflanzen von A) nach B) ein, so verkriecheln sie, ihr Saft zeigt hohen osmot. Druck. C) Schattenassoziation, charakterisiert durch *Atriplex confertifolia*: der Boden ist hier ähnlich wie bei B, er enthält viel Kies und trocknet im Sommer stärker aus; durch Berieselung kann Getreide gezogen werden. Die unter n. Bedingungen gedeihenden Pflanzen haben P bis zu 150 at, K = 0,129 u. enthalten mehr als 100 g Salz pro l Saft. D) Bei der nächsten Formation (*Sarcobatus vermiculatus* u. *Atriplex confertifolia*) sind Bodenfeuchtigkeit u. Salzgehalt höher als bei den vorher genannten; Berieselung u. in einigen Fällen Drainage sind für das Gedeihen von Kulturpflanzen erforderlich; es wurden gefunden: P = 30 at, K mehr als 0,045 mhy u. 18 g Cl

pro 1 Saft. E) Die hieran stoßenden Grasflächen haben Feuchtigkeitsgehalt u. hohen, wachselnden Salzgehalt des Bodens. Die physikochem. Konstanten liegen zwischen der vorhergehenden u. der folgenden Formation. F) Die Salzgebiete mit *Alleurofea occidentalis* u. *Salicornia utahensis*, typ. Succulenten, haben den höchsten Salzgehalt u. während des größten Teiles des Jahres viel Feuchtigkeit; im Spätsommer krySTALLIERT NaCl oft aus dem Boden aus; Pflanzen gedeihen hier nur auf kleinen Hügeln oder an Abflußkanälen von Quellen; der Saft hatte *P* über 40 at, *K* über 0,060 mHv u. einen Chloridgehalt von 17–30 g pro l. (Journ. Agricult. Research 27. 893–924. 1924. U. S. A. Dep. of Agricult.)

HABERLAND.

F. M. Wood, *Beiträge zur Untersuchung der chemischen Natur der Cellulosemembran*. Bei mikrochem. Unterss. auf Cellulosebestandteile u. Pektin sollen die Fixierungsmittel Oxydationswrkg. vermeiden, Hydratation aber begünstigen. Das Fixierungsmittel soll eher sauer als alkal. sein, da Alkalien Pektin lösen. Einführung von Metallen ist zu vermeiden, ebenso Behandlung mit A. oder Glycerin. Die Cellulosefarbstoffe sind meist Alkalisalze von Radikalen (?) mit einer oder mehreren Azogruppen, die Pektinfarbstoffe Chloride von Aminofarbstoffen. Nach den tabellar. wiedergegebenen Ergebnissen der Unters. an Wurzel- u. Sproßspitzen von *Helianthus annuus*, *Vicia Faba*, *Hyacinthus* u. *Galtonia* besteht die Cellulosemembran aus *Cellulose*, *Oxycellulose* u. *Hydrocellulose* in je nach Alter u. Art verschiedenen Verhältnissen. (Ann. of botany 38. 273–98; Ber. ges. Physiol. 27. 82. 1924. Ref. WALTER.)

SPIEGEL.

E₃. Pflanzenphysiologie. Bakteriologie.

Edith Philip Smith, *Die Wirkung der allgemeinen Anästhetica auf die Atmung der Getreidearten*. I. *Bildung von Kohlendioxyd*. Vf. bestimmt bei Einw. verschiedener Konzz. von Ä., Chlf. u. A. auf Weizen, Reis u. Hafer die ausgeschiedenen Mengen CO₂. Die Atmungskurve fiel stets zunächst ab, um nach einiger Zeit plötzlich anzusteigen, dann wieder steil abzufallen. Erholung trat bei Chlf. nur nach kurzer Einw. (15 Min.) ein, bei Ä. noch nach 6 Stdn. Chlf. scheint in festere Bindung mit den Zellelementen zu treten. Die Permeabilität der Zellen wird durch die Anästhetica anfangs herabgesetzt, dann rasch gesteigert. Vielleicht ist die Form der Atmungskurve dadurch zu deuten. (Ann. of botany 38. 261–72; Ber. ges. Physiol. 27. 79–80. 1924. Ref. WALTER.)

SPIEGEL.

F. W. Mc Ginnis und **G. S. Taylor**, *Die Wirkung der Atmung auf dem Proteinprozentgehalt von Weizen, Hafer und Gerste*. Die Ansicht, daß bei Getreidekörnern die Änderung des %-Gehalts an Protein bestimmt wird durch den Verlust an Kohlenhydraten, der im Laufe der Reifungsperiode durch Atmung eintritt, läßt sich nach den Verss. der Vff., bei denen genannte Getreidearten in verschiedenen Gebieten kultiviert wurden, nicht aufrecht erhalten. Es wurde in allen Fällen eine größere N-Abnahme festgestellt, als Vff. aus der Menge veratmeter Kohlenhydrate berechnet hatten, woraus zu schließen ist, daß auch andere Faktoren noch für die Änderung maßgebend sein müssen. (Journ. Agricult. Research 24. 1041–48. 1923 Univ. of Minnesota.)

HABERLAND.

F. Picard, *Beitrag zur Untersuchung der physiologischen Rolle der Tannine Ihre Bedeutung bei der Reifung der Weinreben*. (Vgl. C. r. d. l'Acad. des sciences 179. 480; C. 1924. II. 2171.) Die Unters. des Holzes, des Bastes, des Marks, sowie die Best. der Trockensubstanz, der Stärke u. Tannine, u. des Quotienten Stärke Tannin in Weinreben, die sich in verschiedenem Reifestadium befanden, führt Vf zu folgenden Schlüssen: die Rebe ist um so reifer, je größer ihr Durchmesser ist je größer das Mark, desto weniger reif die Rebe; Holz, Bast u. Rinde sind bei gut gereiften Reben besser als bei schlecht gereiften ausgebildet; mit zunehmende Reife steigt der Gehalt an Trockensubstanz, ihre Best. ist jedoch prakt. ohne großen

Wert; bei gut gereiften Reben ist der Stärkegehalt höher als bei schlecht gereiften; die Menge der Tannine scheint in keiner Beziehung zum Reifungsgrad zu stehen. Aus der im Original veröffentlichten Tabelle ist ersichtlich, daß der Quotient Stärke: Tannin für die mittelreifen Reben am größten ist; es müßten hiernach falls die Tannine Exkretionsprodd. der Rebe sind, die nicht weiter verarbeitet werden, diese Reben als die reifsten angesehen werden, was mit den tatsächlichen Verhältnissen jedoch nicht vereinbar ist; dieser Wert ist daher auch ohne Bedeutung. (C. r. d. l'Acad. des sciences 179. 778—80. 1924.)

HABERLAND.

H. Lagatu und **L. Maume**, *Bemerkenswert regelmäßige Entwicklung gewisser physiologischer Beziehungen (Kalk, Magnesia, Kali) in den Blättern der gut ernährten Weinrebe*. Vff. bestimmen in den Blättern gut ernährter Weinreben den Ca-, Mg- u. K-Gehalt in der Zeit von Mai bis September in Abständen von je einem Monat. Berechnet auf Trockensubstanz steigt CaO von 1,90 auf 7,00%, MgO von 0,19 auf 0,69%, K₂O sinkt von 2,32 auf 1,43%. Durch rechner. Methoden, bzgl. deren Einzelheiten auf das Original verwiesen werden muß, leiten Vff. Beziehungen zwischen der Zeit u. dem Mineralstoffgehalt der Blätter ab. (C. r. d. l'Acad. des sciences 179. 782—85. 1924.)

ZANDER.

Karl Boresch, *Zur Frage der Ersetzbarkeit des Eisens bei der Chlorose*. (Vgl. Ber. Dtsch. Botan. Ges. 38. 286; C. 1921. I. 458.) Chlorot. Rasen der Spaltalge *Phormidium Retzii* (Ag.) Gom. var. *nigro-violacea* Wille, die statt der sepiabraunen n. Farbe rotbraune Färbung zeigten, wurden mit a) Cr₂(SO₄)₃, b) MnSO₄, c) CoCl₂, d) Co(NO₃)₃ u. e) NiSO₄-Lsg. versetzt, so daß die Fl. 0,001 Mol. enthielt. Die a- u. b-haltigen Kulturen hatten schon nach wenigen Tagen dieselbe Farbe angenommen, die auch durch Zugabe von Fe-Salzen erhalten wurde, während die mit c—e versetzten Lsgg. zum größten Teile abgestorbene Kulturen zeigten. Weitere Verss., bei denen chlorot. Kulturen mit a) oder b) u. KNO₃ versetzt worden waren, zeigten ebenfalls Neubildung des Farbstoffs. In Rasen, die mit Zusatz von a), b) u. ohne diese 5 Monate lang kultiviert wurden, verhielten sich die Phykochromoproteide im wss. Extrakt wie 14,6 : 3,1 u. der Gehalt an Chlorophyll wie 18,9 : 12,0 : 6,3; es hat also eine Neubildung des Farbstoffs stattgefunden. Außer Cr- u. Mn-Salz zeigte nur *Uranylacetat* noch eine (jedoch unvollständige) Farbstoffregeneration. CuSO₄, auch in höchster Verd., erwies sich als stark giftig. Die Funktionen, die Fe beim Wachstum der Alge zu erfüllen hat, werden von Mn- u. Cr-Salzen nicht übernommen. (Ber. Dtsch. Botan. Ges. 42. 284—90. 1924. Tetschen-Liebwerd. [Prag].)

HABERLAND.

Marcel Mirande, *Über die Zustände des Liliosterins im Verlaufe des Lebens der Zwiebschalen der weißen Lilien*. (Vgl. C. r. d. l'Acad. des sciences 176. 769; C. 1923. III. 1091.) Zwiebschalen, die von der Knolle abgelöst werden, bilden an der Wundfläche auf Kosten der Reservestoffe neue Knospen; mit Ausnahme der Epidermiszellen werden die Schalen allmählich entleert. Die Epidermiszellen sind vollständig mit *Liliosterin* erfüllt. Am Anfange findet man noch Zellen mit Sterinoplasten, der Zentralkörper hierin ist teilweise amorph, teilweise zeigt er mikrokristalline Struktur; bisweilen nimmt der Sterinoplast auch fadenartige Form an u. in der Mitte liegt eine amorphe M. Alle Konkretionen des Liliosterins zeigen capillare Struktur. Zwiebschalen, die sich im Laufe der Entw. n. von den Knollen ablösen, zeigen dieselben Erscheinungen. Durch Einw. von Kälte werden die Sterinoplasten häufig in strahlige Krystallaggregate umgewandelt (Abb. im Original). Die stearinhaltige Epidermis gibt mit H₂SO₄ + Acetanhydrid karminrote Färbung (Liebemannsche Rk.); die Konkretionen behalten unter dem Einfluß des Reagens ihre Form einige Zeit bei, bevor sie gel. werden. (C. r. d. l'Acad. des sciences 179. 638—41. 1924.)

HABERLAND.

J. F. Breazeale, *Die Absorption von Kohlenstoff durch Pflanzenwurzeln*. Vf. untersucht die Absorbierbarkeit von verschiedenen Salzen durch Weizensämlinge aus Nährlsgg. Bei Anwesenheit von NaNO_3 , NH_4NO_3 , CaCO_3 , Na_2CO_3 oder K_2CO_3 wurden in der Asche der Sämlinge Carbonate nachgewiesen. Daß die selektive Absorption in Pflanzen stark entwickelt ist, konnte an verschiedenen Beispielen gezeigt werden. Eine rapide Absorption von K^+ aus einer neutralen Lsg. (KCl) würde die Nährlsg. sauer u. das Pflanzengewebe bas. machen infolge eines Überschusses der Ionenladung. Der Ausgleich wird hier erzielt durch Aufnahme von CO_3^{--} aus der Lsg. Ist dagegen ein saures Radikal absorbiert worden, (NO_3^- aus einer NaNO_3 -Lsg.) so wird durch Ausscheidung von CO_2 das Ionengleichgewicht wieder hergestellt unter B. von Na_2CO_3 resp. NaHCO_3 in der Lsg. Durch gleichzeitige Anwesenheit verschiedener Salze in der Nährlsg. wird ihre Absorbierbarkeit stark beeinflußt. So wird die Aufnahme von K^+ aus KCl -Lsg. bei Zugabe von NaNO_3 verdoppelt. Die Absorption von bas. Radikalen, wie K^+ scheint von der Aufnahme des sauren Radikals stark abzuhängen. — Im Anschluß daran wird auf die sauren bezw. bas. Eigenschaften verschiedener Nährböden eingegangen u. die wichtige Rolle der darin enthaltenen CO_2 diskutiert. Die Absorption von CO_3^{--} sowie die Ausscheidung von CO_2 vollzieht sich mittels der Pflanzenwurzel, wobei das absorbierte CO_3^{--} nicht zum Aufbau organ. Bestandteile in der Pflanze verwendet wird, sondern, ebenso wie das ausgeschiedene CO_2 als Regulator, im Sinne der Erhaltung von Gleichgewicht im Pflanzengewebe dient. Die Absorption eines jeden Bestandteils aus den Nährsalzen hängt wahrscheinlich ab von dem Gleichgewicht zwischen dem Pflanzensaft u. der Nährlsg., wobei dasselbe für jede Pflanze ein anderes sein kann. Es besteht eine weitgehende Analogie zwischen dem Phänomen der Absorption von CO_3^{--} , bezw. Ausscheidung von CO_2 in der Tier- u. Pflanzenphysiologie. (Journ. Agricult. Research **26**. 303—11. 1924.) TENNENBAUM.

C. B. Lipman und J. K. Taylor, *Haben grüne Pflanzen die Kraft, elementaren Stickstoff aus der Atmosphäre zu fixieren?* Es wurden in Nährlsgg., die KH_2PO_4 , MgSO_4 u. keine oder wechselnde Mengen von $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2$ als N-Quelle enthielten, im Gewächshause oder in freier Luft, zur Kontrolle ferner unter Glasglocken, denen Luft frei von N-Verbb. zugeführt wurde, Weizen-, Gerste-, Erbsen-, Bromus- u. Kiefernpflanzen gezogen u. nach bestimmten Zeiten die gebildete Trockensubstanz analysiert u. N-Zunahme bestimmt. Es ergab sich, daß alle genannten Pflanzen, mit Ausnahme der Erbsenkulturen, selbst bei Nichtzugabe von $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2$ einen Stickstoffgewinn aufwiesen. Diese Zunahme ist nur darauf zurückzuführen, daß die untersuchten Pflanzen die Fähigkeit besitzen, atmosphär. N zu assimilieren. In ausführlichen Darlegungen begegnen Vf. dem Einwande, daß die N-Zunahme auf Mitwirkung von an den Wurzeln sitzenden Bakterien in den nicht sterilisierten Kulturen zurückgeführt werden könnte. Hauptsächlich ist hieraus zu erwähnen, daß die Kulturfl. für eine Entw. von Bakterien, wie besondere Verss. gezeigt haben, durchaus ungeeignet sind. Die wenigen Bakterienarten, die tatsächlich an den Wurzeln gefunden worden sind, haben keine Ähnlichkeit mit Stickstoffsammlern. Würden Bakterien für die N-Assimilation verantwortlich zu machen sein, so müßten gerade die Erbsenkulturen bedeutenden N-Zuwachs zeigen, was nicht der Fall war. Pflanzen, denen übermäßig $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2$ zugeführt wurde, müßten dann gleichfalls reichlich N_2 assimilieren, es zeigte sich jedoch, daß solche Kulturen nicht gediehen. (Journ. Franklin Inst. **198**. 475—506. 1924. Univ. of Cal.) HABERLAND.

E. Sidney Semmens, *Polarisiertes Licht und Stärkegehalt von Pflanzen*. Es ist Vf. gelungen festzustellen, daß auch bei lebenden Pflanzen der Stärkegehalt bei Bestrahlung mit künstlichem polarisiertem Licht abnimmt. Im Sonnenlicht nimmt er zu, im Dunkeln bleibt er unverändert. (Nature **114**. 719. 1924. London, Bedford Coll.) BEHRLE.

Ralph R. Mellon, W. S. Hastings und C. Anastasia, *Über die Natur des „Kohäsionsfaktors“ bei spontaner Bakterienagglutination unter besonderer Berücksichtigung der interfacialen Oberflächenspannung.* Es ist wahrscheinlich, daß die hohe Kohäsionskraft gewisser Bakterien, die größtenteils ihre spontane Agglutinierbarkeit verursacht, durch Substanzen vermindert werden kann, die offenbar die Oberflächenspannung an der Scheidewand zwischen Organismus u. Medium herabsetzen. Der in diesem Sinne wirkende, zugleich emulgierende Einfluß des Na-Oleats, erklärlich durch die offenbar lipoide Natur der Zellwand bei den untersuchten Bakterienstämmen wird in diesem Zusammenhange erörtert. Auch andere Salze, besonders anorgan. Elektrolyte, wirken emulgierend, aber erst bei höherer Konz., anscheinend unter selektiver Adsorption. Der Mechanismus ihrer Wrkg. auf Stabilisierung der Suspensionen dürfte mit Umkehrungen der Oberflächenspannungen in dem Eiweiß-Lipoid-Salzsystem innerhalb der Zellwand selbst verknüpft sein; dafür spricht der Antagonismus zwischen Na⁺, Ca⁺⁺ u. Mg⁺⁺. Mutationerscheinungen, die bei den reinen Ausgangsstämmen auftreten, erzeugen physikal.-chem. Veränderungen in der Zellwand, die mit der Erscheinung des Ionenantagonismus in einfachen Emulsionen von Öl u. W. in Beziehung gebracht werden können. Wenn Suspensionen, die bei hoher Salzkonz. hergestellt waren, verd. werden, bleiben sie stabil, auch wenn die Endkonz. an Salz so ist, daß der Organismus bei Verwendung direkten Abstrichs agglutiniert werden würde. (Journ. Immunology **9**. 365—81. 1924. Rochester [N. Y.], HIGHLAND Hosp.) SPIEGEL.

George E. Holm und J. M. Sherman, *Salzwirkungen im bakteriellen Wachstum.*
 IV. *Die physikalische Natur des Bakterienwachstums in verschiedenen Konzentrationen von Neutralsalzen.* (III. vgl. SHERMAN, HOLM u. ALBUS, Journ. of bacteriol. **7**. 583; C. 1923. III. 942.) Wachstumsformen, wie Hautbildung, diffuse Trübung, Bodensatz, hängen von den physikal. Eigenschaften des Mediums ab. Salze, die in geringen Gaben das Wachstum fördern, erhöhen die Permeabilität der Bakterienzellen, so daß sie größer u. reicher an W. werden, dadurch auch in Suspensionen stabiler erscheinen. Die Salzwirkg. ist daher keine rein physikal., sondern eine biol. (Proc. of the soc. f. exp. biol. and med. **21**. 311—15. Washington, U.S. Dep. of agric. Ber. ges. Physiol. **27**. 204—5. 1924. Ref. SELIGMANN.) SPIEGEL.

James Walter McLeod und John Gordon, *Die Erzeugung organischer Schwefelverbindungen in Bakterienkulturen mit besonderer Berücksichtigung des Glutathions.* Die Nitroprussidrk. auf Glutathion (vgl. HOPKINS, Journ. Biol. Chem. **15**. 286; C. 1921. III. 485) wurde deutlich erhalten in 24—48 Stdn. alten Bouillonkulturen von allen untersuchten Anaerobiern, ferner von B. paratyphosus B u. seinen meisten Verwandten, Cholera vibrio, Typhusbacillus, B. pyocyaneus, sowie einigen Stämmen von Coli- u. Proteus bacillen, nicht aber in solchen von verschiedenen pathogenen Kokken, B. influenzae, B. Morax-Axenfeld, B. paratyphosus A u. Dysenterie bacillen. Soweit die Rk. bei fakultativ anaeroben Bakterien auftritt, ist sie weit stärker, wenn die Züchtung anaerob erfolgte, als bei aerober. Verschiedene Beobachtungen führten zu der Ansicht, daß das Auftreten der Rk. mit der Red. eines im Nährboden vorhandenen Prod. zusammenhänge. Sie trat nicht ein, wenn das angenommene Oxydationsprod. des Glutathions im Nährboden zuvor durch Erhitzen mit H₂O₂-Lsg. zerstört wurde, trat dagegen in der Nährbrühe selbst nach längerer Red. mit dem Hg-Al-Paar auf. Die Bakterien erzeugen daher das Glutathion oder ähnliche, mit Nitroprussidnatrium reagierende Substanzen nicht, sondern reduzieren nur sein Oxydationsprod. Soweit sie dazu imstande sind, nutzen sie den Vorgang wahrscheinlich bei anaerobem Wachstum zur Beschleunigung der für ihren Stoffwechsel erforderlichen Oxydationen aus. (Biochemical Journ. **18**. 937—40. 1924. Leeds, Univ.) SPIEGEL.

A. Passow, *Untersuchungen über die Lichtwirkung und die photodynamische Wirkung auf Bakterien als Grundlage zur Lichttherapie bacillärer Augenerkrankungen*. II. Über die photodynamische Wirkung auf Bakterien. Vf. führte eigene Verss. an Staphylokokken mit verschiedenen Farbstoffen aus. Eine Anzahl dieser (Farbstoffe der Fluoresceingruppe außer Fluorescein u. Uranin, ferner Alizarinblau, Säurefuchsin, Toluylenrot, Indigokarmin) färbten gut ohne Giftwrkg. Bakterien können also Farbstoffe ohne Schädigung absorbieren, die Absorption ist aber Vorbedingung für Zustandekommen einer Giftwrkg. Zu gut färbenden, dabei giftigen Farbstoffen gehören hauptsächlich cycl. Indaminfarbstoffe, Triphenylmethanfarbstoffe usw. Für photodynam. Wrkg. ist gleichfalls Eindringen des Farbstoffes in die Zelle erforderlich. Solche Wrkg. hatten die untersuchten Fluoresceinfarbstoffe, Alizarinblau u. Säurefuchsin. Am besten sensibilisierend auf die Staphylokokken wirkte Rose bengale, dann Phloxin, Dijodfluorescein, Eosin u. Erythrosin. Die Wrkg. des Rose bengale findet sich im Spektrum vom Gelb bis ins Ultraviolett. Gesetzmäßige Beziehungen zwischen Fluoreszenz u. photodynam. Wirksamkeit konnten nicht festgestellt werden. Diese scheint keine reine Absorptionserscheinung zu sein. Sie tritt bei den verschiedenen Farbstoffen teils ebenso schnell, teils schneller ein als reine Lichtwrkg. im Ultraviolett. Kohlenbogenlicht ist geeigneter als Quarzlicht, um in kurzer Zeit baktericide Wrkg. zu erreichen. (Arch. f. Augenheilk. **94**. 1—26. München, Univ; Ber. ges. Physiol. **27**. 210—11. 1924. Ref. MEESMANN.) SPIEGEL.

Evelyn Ashley Cooper und **George Eric Forstner**, *Untersuchungen über selektive baktericide Wirkung*. Chem. Keimtötungsmittel, die auf die Bestandteile des Protoplasmas einwirken (Nitroverbind., Chinon, Aldehyde, Schwermetallsalze, $\text{NH}_2\text{OH}\cdot\text{HCl}$) wirken stärker auf *B. coli* als auf *B. pyocyaneus*, nur CH_2O auf beide gleich stark. Dagegen wirken Mittel des physikal.-chem. Typus (aliphat. Alkohole, Benzylalkohol, Phenol, Chlorphenole, Chinol, Toluchinol) umgekehrt stärker auf *Pyocyaneus* (besonders Chinol etwa 4 mal so stark) als auf *Coli*. Entsprechend dem Verh. gegen die 2. Gruppe ist dasjenige beim Erhitzen. (Biochemical Journ. **18**. 941—47. 1924. Birmingham, Univ.) SPIEGEL.

R. Pons, *Wirkung von 914 in vitro auf Spirochätenkulturen*. Die bisherigen Unterss., die nur auf ca. 10 Stdn. ausgedehnt werden konnten, haben eine direkte Einw. des Mittels 914 wie auch mancher anderen vermissen lassen. Durch den Besitz einer in Blut züchtbaren Spirochäte (*Sp. sinensis*) war Vf. in der Lage, die Unterss. auf längere Zeit auszudehnen u. stellte nun eine spirocide Wrkg. jenes Präparates fest, die erst nach einer „negativen Phase“ eintritt, dann aber noch in Verdünnungen von ca. 1:200000 zu erkennen ist. (C. r. soc. de biologie **91**. 938—39. 1924. Saigon, Inst. PASTEUR.) SPIEGEL.

R. Pons, *Wirkung des Blutes, des Harnes und der Organe eines mit Neosalvarsan behandelten Kaninchens auf Spirochätenkulturen in vitro*. Bei der verlängerten Einw. (vgl. vorst. Ref.) ließ sich spirocide Wrkg. auch an Gesamtblut, Serum, Niere u. Harn des Neosalvarsantieres nachweisen. (C. r. soc. de biologie **91**. 941—42. 1924. Saigon, Inst. PASTEUR.) SPIEGEL.

Oswald H. Robertson und **Richard H. P. Sia**, *Studien über Wachstumshemmung von Pneumokokken*. III. Der Einfluß spezifischen Antipneumokokkenserums auf die wachstumshindernde und baktericide Wirkung normaler Serum-Leukocytenmischungen. (I. vgl. Journ. Exp. Med. **39**. 199; C. 1924. I. 2161; II. vgl. Journ. Exp. Med. **39**. 219 [1923]). Das Gemisch von Serum u. Leukocyten des Kaninchens, das für sich das Wachstum von Pneumokokken nicht zu hemmen vermag, erwirbt die Fähigkeit hierzu u. diejenige zur Abtötung der Kokken durch verhältnismäßig geringe Zusätze von Immunserum. Die Intensität dieser Wrkg. steht im Verhältnis zur Konz. des Immunserums, die Zahl der getöteten Keime hängt ferner unter gleichen Umständen innerhalb gewisser Grenzen von der Zahl der anwesenden

Leukocyten ab. Die Wirksamkeit verschiedener Immunseren bei dieser Probe steht im gleichen Verhältnis wie ihre Schutzwirkg. für Mäuse. (Journ. Exp. Med. **40**. 467—85. 1924. Peking [China], Peking Union Med. Coll.) SPIEGEL.

Oswald H. Robertson, Shutai T. Woo und Sheo Nan Cheer, *Studien über Wachstumshemmung von Pneumokokken*. IV. Ein vereinfachter Rührer für Prüfungen von Wachstumshemmung mit Serumleucocytenmischungen und gewisse Abänderungen in der Prüfungstechnik. (III. vgl. vorst. Ref.) (Journ. Exp. Med. **40**. 487—91. 1924. Peking [China], Peking Union Med. Coll.) SPIEGEL.

David Ellis, *Eine Untersuchung über die Struktur und die Lebensgeschichte der Schwefelbakterien*. (I.) Eingehende Unters. des Baues von *Beggiatoa alba*. Neu ist die Feststellung einer äußeren, von der Zellmembran verschiedenen Deckschicht, die durch Verschmelzen des äußeren Teiles der Zellmembran entsteht, anfangs schleimig, dann erhärtend u. sich vom Organismus abhebend, u. die Feststellung, daß außer der n. Vermehrung durch Spaltung auch eine solche durch Endosporen stattfinden kann. Die Erscheinung der Autolyse, wobei von der oben erwähnten Deckschicht Abgrenzungen zwischen den einzelnen Segmenten gebildet werden, dürfte nicht durch Wirkg. eines Enzyms, sondern durch osmot. Vorgänge bedingt sein. (Proc. Roy. Soc. Edinburgh **44**. 153—67. 1924. Glasgow, Royal Techn. Coll.) Sp.

E₅. Tierphysiologie.

Mentz von Krogh, *Über Sexualhormone*. Vf. erhielt nach nicht angegebenem Verf. aus Hodenextrakten ein konz. Sexualhormon in Form einer wasserklaren, 10% Glycerin u. 0,5% Phenol enthaltenden Fl. (1 ccm = 0,1 g frischer Hodensubstanz), die ganz schwache Eiweißrk. gibt. Einspritzungen derselben erzeugten beim Gesunden gesteigerte Euphorie mit behaglichem Gefühl der Haut, bei fieberhafter Erkältung zunächst nur Verstärkung des Krankheitsgefühls, bei Greisen einen unbehaglichen nervösen Reizzustand, manchmal auch hartnäckigen trockenen Husten, zuweilen Fieber. In Wirkg. auf Männer u. Frauen bestand im allgemeinen kein Unterschied, bei letzteren zuweilen frühere u. stärkere Menstruation. Sehr günstige Wirkg. bei Dysmenorrhöe u. in einem Falle von Hyperemesis. Der Blutdruck wurde, außer bei ganz jungen Menschen, um 15—25 mm Hg erniedrigt. Starke Vermehrung des Appetits, besserer Schlaf, Regelung der Verdauung werden ferner dem Präparat zugeschrieben. Auch soll es bei leichten fieberlosen Fällen von Tuberkulose günstig wirken. (Norsk magaz. f. laegeridenskaben **85**. 1—28; Ber. ges. Physiol. **27**. 176—77. 1924. Ref. SAENGER.) SPIEGEL.

Vincent Coates und Percy Charles Raiment, *Der Calciumgehalt des Blutes bei Füllen von Gicht*. Best. des Ca im Blutserum nach dem Verf. von KRAMER u. TISDALL (Journ. Biol. Chem. **47**. 475; C. **1921**. IV. 895) ergab in Gichtfällen recht beträchtliche Erhöhung, zwischen 16 u. 24 mg in 100 ccm. (Biochemical. Journ. **18**. 921—24. 1924. Oxford, Biochem. Lab.) SPIEGEL.

W. W. Herrick, *Die gegenseitige Beziehung der Chloride und der Glucose im Blute*. Nach Einnahme von 100 g Glucose per os fiel nahezu konstant die Kurve der NaCl-Konz. mit dem Anstieg des Blutzuckers, mit dessen Rückkehr zur Norm auch wieder zu n. Werten ansteigend. Verdünnung des Blutes findet nach Ausweis der Blutkörperchenzahlen nicht statt. Es dürfte sich um einen osmot. Ausgleich handeln. (Journ. of laborat. and clin. med. **9**. 458—62; Ber. ges. Physiol. **27**. 143. 1924. Ref. E. OPPENHEIMER.) SPIEGEL.

Shigemi Nakahayashi und J. Abelin, *Über die Veränderungen des Blutzuckers*. I. Früher wurde bei Stoffwechselverss. beobachtet, daß ein Glykogenschwund aus der Leber u. eine Hyperglykämie nicht immer von erhöhter Kohlenhydratverbrennung begleitet sind (vgl. ABELIN, Biochem. Ztschr. **129**. 1; C. **1922**. III. 74.) Es wurde jetzt geprüft, ob die nicht vermehrte Zuckerverbrennung auf

einer Änderung der Natur des Blutzuckers beruhen könnte. Die Angabe von WINTER u. SMITH (Journ. of Physiol. 57. 100; C. 1923. I. 709) über die Zunahme des Polarisationswertes des Blutzuckers mit der Zeit wurde bestätigt; die Ursache dieser Erscheinung ist aber noch nicht geklärt. Zufuhr von Schilddrüsenstoffen ändert nicht das Verh. des Blutzuckers; auch hier nimmt der Polarisationswert mit der Zeit zu, nach Adrenalininjektion aber beim Stehen ab. (Biochem. Ztschr. 147. 544—56. 1924. Bern, Univ.) WOLFF.

Enrico Sereni, *Die Fermente des Blutes bei der Ermüdung*. Nach akuter Ermüdung waren bei Mensch u. Meerschweinchen das amylolyt., glykolyt., katalyt. u. proteolyt. Vermögen des Blutes vermehrt, das lipolyt. vermindert. Über einige Tage fortgesetzte Ermüdung führte zu stärkerer Abnahme des lipolyt. u. katalyt., verstärkter Zunahme des amylolyt. u. glykolyt. Vermögens. Aderlässe waren ohne Einfluß oder verminderten die Fermentwrkg. (Arch. di fisiol. 21. 501—19. 1923. Milano, Ist. clin. di perfezion.; Ber. ges. Physiol. 27. 137. 1924. Ref. SCHIFF.) SP.

Junichi Murakami und **Takashi Yamaguchi**, *Der Gehalt des Blutes an Fibrinogen und Fibrinferment bei inneren Krankheiten. Seine Beziehung zur Senkungsgeschwindigkeit der roten Blutkörperchen, zum Gehalt des Blutes an Calcium und der Gerinnungszeit des Blutes*. Bei 20 gesunden Menschen wurde Fibrinogen (I) zu 62,5—125 Einheiten, im allgemeinen bei Frauen mehr als bei Männern, Fibrinferment (II) zu 8—125 Einheiten, im allgemeinen bei Frauen weniger, gefunden. Bei *Dysenterie* u. *Enteritis* keine Abweichungen, bei *Typhus* I bis 250, II von 4 Einheiten an, bei *Iktus* für beide kleine Werte, bei *Pleuritis* u. *Lungentuberkulose* in schweren Fällen hohe für I, niedrige für II. Bei schneller Senkung der Blutkörperchen findet sich wenig Ca u. umgekehrt, im ersten Falle viel I u. wenig II, doch sind zwischen Ca, I u. II im Serum keine quantitativen Beziehungen festzustellen. Die Gerinnungszeit geht parallel mit II, nicht mit I, ohne Beziehung zum Ca-Gehalt. Sie ist bei *Pleuritis* u. *Lungentuberkulose* im allgemeinen verlängert; bei ihrer Verlängerung ist die Senkungsgeschwindigkeit der Blutkörperchen stets stark beschleunigt. (Ann. de méd. 15. 297—314; Ber. ges. Physiol. 27. 135—36. 1924. Ref. JACOBY.) SPIEGEL.

A. C. Marie, *Untersuchungen über die Cholesterinämie*. II. (I. vgl. Ann. Inst. Pasteur 37. 921; C. 1924. I. 1051.) Bei Pferden, die vor der Immunisierung keinen erhöhten Cholesteringehalt des Blutes zeigten, kann ein solcher mehr oder weniger deutlich im Verlaufe der Immunisierung gegen Diphtherie auftreten. Damit ist im allgemeinen eine schwache Ausbeute an antitox. Einheiten verknüpft. Verss. an Kaninchen zeigten, daß man den Cholesteringehalt ihres Blutes durch intravenöse Einspritzungen von Cholesterin, besonders in ölgiger Lsg erhöhen kann u. daß dann im Serum besondere Eigenschaften, namentlich schwaches Agglutinationsvermögen auftreten. (Ann. Inst. Pasteur 38. 945—51. 1924.) SPIEGEL.

N. A. Ssokolow, *Über Cholesterinämie beim Skorbut*. Bei Skorbutkranken ist der Cholesteringehalt des Blutes vermindert, anscheinend im Verhältnis zur Schwere der Erkrankung, während der Genesung kehrt er zur Norm zurück. (Dtsch. Arch. f. klin. med. 145. 236—39. 1924. Leningrad, Militärmed. Akad.) SPIEGEL.

Eléonore Reicher, *Untersuchungen über die Wirkung des Adrenalins auf Blutkonzentration und Leukocytenformel*. Die Trockensubstanz des Blutes war meist vermehrt, häufiger bei jungen als bei alten Personen; auch die Leukocyten zeigten meist Vermehrung, unabhängig von Alter u. Geschlecht, Lymphocyten regelmäßiger u. stärker als neutrophile. Der Puls zeigte bei Alten häufiger als bei Jungen Beschleunigung, bei jenen aber stärkere. Diese verschiedenen Änderungen können unabhängig voneinander auftreten. Die erhöhte Blutkonz. dürfte durch erhöhten Stoffwechsel bedingt sein. (C. r. soc. de biologie 91. 977—78. 1924. Warschau, Univ.) SP.

G. Di Macco, *Untersuchungen über einige physikalisch-chemische Eigenschaften des Blutserums in der experimentellen Acidose. (Elektrische Leitfähigkeit, Oberflächenspannung, Wasserstoffionenkonzentration.* Die Acidose wurde durch intravenöse Injektionen subletaler Mengen von Na-Butyrat u. Na-Isobutytrat in wss. Lsg. bewirkt. Die elektr. Leitfähigkeit des Plasmas war erhöht, am stärksten gleich nach der Injektion, aber weniger als bei Zusatz der Salze zum Blute in vitro. Die Oberflächenspannung zeigte sich vorübergehend erniedrigt, die $[H^+]$ unverändert. (Ann. di clin. med. e di med. sperim. **13**. 260—70. 1923. Palermo, Univ.; Ber. ges. Physiol. **27**. 138—39. Ref. SCHMITZ.) SPIEGEL.

Harry Plotz und **M. Schoen**, *Einige Beobachtungen über die Veränderungen der Reaktion der Sera.* (Ann. Inst. Pasteur **38**. 923—36. 1924. — C. 1924. II. 691.) SP.

R. Ottenberg und **F. Stenbuck**, *Untersuchungen über die Reinigung von Antikörpern.* II. (I. vgl. OTTENBERG, Proc. of the soc. f. exp. biol. and med. **21**. 14; C. 1924. II. 518.) Ausführung des schon beschriebenen Verf. unter Verwendung von Cu lieferte schließlich nach wiederholter Umfällung ein Präparat, das alle Agglutinine quantitativ enthält, frei von Cu, ohne Eiweißrk., nur noch Spuren N enthaltend, wahrscheinlich als ein Kohlenhydrat zu betrachten. (Proc. of the soc. f. exp. biol. and med. **21**. 303—7. New York, Mount Sinai Hosp.; Ber. ges. Physiol. **27**. 215. 1924. Ref. SELIGMANN.) SPIEGEL.

Andrea Scarpellini, „*Natürlich*“ *cholesterinisierte Antigene.* Um von vornherein cholesterinfreie Extrakte für die Luesdiagnose zu gewinnen, erzeugt Vf. bei den Tieren, deren Organe verwendet werden sollen, künstlichen Ikterus u. zugleich (durch P oder As) fettige Degeneration. (Biochim. e terap. sperim. **11**. 115—23. Padova, Univ.; Ber. ges. Physiol. **27**. 215. 1924. Ref. SELIGMANN.) SPIEGEL.

Clyde Brooks, **George T. Pack** und **Henry Goode**, *Weitere Untersuchungen über die physiologische Wirkung nichtspezifischer Antigene aus aufgespaltenen Hämoproteinen.* Aus dem Gemisch der Verdauung von Rinderblutfibrin mit Pepsin-HCl wurde durch Fraktionierung mit $(NH_4)_2SO_4$ eine Substanz gewonnen, die nicht mehr anaphylaktisierend wirkt, nach Injektion keine Leukopenie, sondern sofort Leukocytose u. klin. keinerlei Reizerscheinungen auslöst. Sie soll therapeut. namentlich bei Arthritiden wirksam sein. Sie wirkt als unspezif. immunisierender Antikörper. (Proc. of the soc. f. exp. biol. and med. **21**. 321—26. Alabama, Univ. Ber. ges. Physiol. **27**. 214. 1924. Ref. SELIGMANN.) SPIEGEL.

I. L. Kritchewsky und **O. G. Birger**, *Ein Beitrag zu den Cellular- und Humoraltheorien der Anaphylaxie und ähnlicher Prozesse.* An „Salzfröschen“ wird gezeigt, daß Shocksymptome mit tödlichem Ausgange auch bei vollständigem Fehlen des Blutes durch Stoffe, welche den Dispersionsgrad ändern (Warmblüterserum, Pflanzensaft, Salvarsan), ausgelöst werden. In diesem Falle muß sich der Shock durch „Metaballoidispersion“ im Zellgebiet entwickeln, die Änderung des Dispersionsgrades an den Kolloiden des Zellprotoplasmas vor sich gehen. Die Erscheinungen sind dieselben, wenn die Gefäße des Frosches mit Blut gefüllt sind, aber die Lebensdauer ist in diesem Falle länger, meist erheblich länger. Das Blut schützt also durch seine Kolloide das Zellplasma vor zu schneller Einw. der Gifte. Obwohl also die Cellulartheorie durch diese Verss. eine feste Stütze gewinnt, ist doch auch der Humoraltheorie unter gewöhnlichen Verhältnissen eine Berechtigung zuzuerkennen. Die eklekt. Auffassung ist allein befriedigend. (Journ. Immunology **9**. 339—63. 1924. Moskau, Staatl. Medizinschule.) SPIEGEL.

S. J. Thannhauser und **G. Tischhauser**, *Zur Theorie und Therapie des Diabetes mellitus und der Azidosis.* (Münch. med. Wchschr. **71**. 1419—22. 1924. München, Univ.) FRANK.

Helmuth Reinwein, *Über basische Bestandteile im Harn bei fortgeschrittener Lungentuberkulose.* Als geeignetes Verf. erwies sich das von KUTSCHER. Bei Ver-

arbeitung von 100 l Harn von Lungentuberkulösen mit stark positiver Diazork. wurde im Filtrat der Histidinsilberfraktion *Methylguanidin* mit Sicherheit identifiziert. Bei Anfarbung der Lysinfraktion durch Fällung mit Phosphorwolframsäure, Zerlegung des Nd. mit Na_2CO_3 , Beseitigung des im Sirup durch alkoh. Pikrinsäure-lsg. entstandenen Nd., Entfernung von A., Pikrinsäure u. H_2SO_4 aus dem Rückstande wurde nach Neutralisieren der stark eingengten Carbonatlsg. mit HCl u. Zusatz von 30%ig. alkoh. PtCl_4 -Lsg. ein Nd. erhalten, von dem ein Teil sich in W. leicht löste. Dieser Teil wurde mit H_2S zerlegt, dann mit CdCl_2 gefällt. Nach weiterer Reinigung über Chlorid u. Pt-Salz wurde schließlich das krystallisierte Au-Salz einer Base $\text{C}_{15}\text{H}_{33}\text{O}_4\text{N}_3$ erhalten, die *Julin* genannt wird. (Dtsch. Arch. f. klin. Med. **144**. 37—44. Würzburg, Univ.; Ber. ges. Physiol. **27**. 165. 1924. Ref. STRAUSS.) SPIEGEL.

Henry Cohen, *Der Gehalt der Cerebrospinalflüssigkeit an anorganischem Phosphor*. Anorgan. P fand sich in 100 ccm Liquor von Normalen zu 1,5—1,9, im Mittel 1,64 mg, bei Encephalitis lethargica 1,62, Encephalitis chronica 1,97, Meningitis tuberculosa 2,54, Meningitis meningococc. 2,0—3,3, Meningitis syphilit. 2,47, Influenza 1,83, allgemeiner Paralyse 1,9, Tabes 1,86, multipler Sklerose 1,79, Epilepsie 1,74, Hemiplegie 1,74, Hirntumor 1,81, Apoplexie 1,61, spast. Paraplegie 2,07 mg. Nach dem Tode nehmen die Werte sehr schnell zu. Konstante Beziehung zwischen P-Gehalt des Plasmas u. dem des Liquors besteht bei Normalen nicht, auch Alter des Kranken, Wiederholung der Lumbalpunktionen, Zahl der in Liquor vorhandenen Zellen u. Bakterien u. Nähe des Todes bedingen keine ausgesprochenen Änderungen. Die in ra vitam beobachteten Erhöhungen dürften hauptsächlich auf Änderungen der Permeabilität im erkrankten Plexus chorioideus beruhen. (Quart. Journ. of med. **17**. 289—301. Liverpool, Univ.; Roy. Infirmary Ber. ges. Physiol. **27**. 142—43. 1924. Ref. SCHMITZ.) SPIEGEL.

Shozo Tsuchiya, *Über Cholesterin in der Cerebroflüssigkeit*. Nach dem Autenrieth-Funkschen Verf. konnte Vf. in Fällen von man.-depressivem Irresein u. Idiotie bei Verwendung von 10 u. auch 30 ccm Cerebrospinalfl. kein Cholesterin nachweisen (Ztschr. f. d. ges. Neurol. u. Psychiatrie **90**. 255—59. Tokyo, Univ.; Ber. ges. Physiol. **27**. 150. 1924. Ref. SCHMITZ.) SPIEGEL.

B. Konopacka, *Über die Fette und Lipide bei der Entwicklung der Froschembryonen*. Nach den histochem. Unterss. werden bei der Entw. zuerst die Fettsäuren verbraucht, insofern, als die Tropfen, welche Osmiumsäure reduzieren, anfangs größer u. zahlreicher sind als die mit Sudan III färbbaren, während in den späteren Stadien beide Arten gleiche Größe haben. Die Lipide bleiben während der Segmentation unberührt, häufen sich während der morphogenet. Vorgänge an u. werden erst bei der Histogenese tätig, so daß sie nach vollendetem Aufbau eines Organs ganz verschwinden. (C. r. soc. de biologie **91**. 971—73. 1924. Warschau, Univ.) SPIEGEL.

M. Konopacki, *Über das Glykogen bei der Entwicklung der Froschembryonen* (Vgl. KONOPACKA, vorst. Ref.) In den ersten Stadien der Entw. lassen sich für das Auftreten des Glykogens 3 Phasen unterscheiden: 1. Ansammlung in der Oocyten auf Kosten von Stoffen, die mit dem Blute dem Ovarium zugeführt werden. — 2. B. aus dem Vitellus, dessen Kerne in dieser Zeit aus Basophilie in Acidophilie übergehen. — 3. Ansammlung auf Kosten der aufgenommenen Nahrung (C. r. soc. de biologie **91**. 973—75. 1924. Warschau, Univ.) SPIEGEL.

M. L. Mitchell, *Der Ersatz des Cystins durch Taurin im Futter der Maus* Nach dem Ausfall der Verss. kann Mangel an Cystin in der Nahrung durch Zulag nicht nur von jenem, sondern auch von Taurin ausgeglichen werden. Deutliche Erfolge dieser Zusätze wurden nur festgestellt, wenn noch Hefe zugelegt wurde

(Australian Journ. of exp. biol. and med. science 1. 5—9. Adelaide, Univ.; Ber. ges. Physiol. 27. 89. 1924. Ref. KAPFHAMMER.) SPIEGEL.

H. Sehestedt, *Über den Sättigungswert gerösteten Brotes*. Geröstetes Brot verweilt im Magen nahezu doppelt so lang, wie Krume u. bedingt dadurch einen höheren Sättigungswert (vgl. KESTNER, Münch. med. Wchschr. 60. (1922), 1429; C. 1923. II. 49.) Im Einklang damit konnte an Fistelhunden festgestellt werden, daß Extrakte aus geröstetem Brot stärker säuretreibend wirken, doch ließ sich ein Unterschied zwischen mit Hefe u. Backpulver gebackenem Brot nicht ermitteln. Gebackener Hefeteig bewirkte hingegen eine deutlich längere Verweildauer u. stärkere Sekretion als ungebackener. Die gesteigerte Sekretionswrkg. erklärt sich nicht durch die während des Backprozesses gebildeten Maltose u. Dextrine, da diese Substanzen für sich ohne Einfluß waren, doch spielen wahrscheinlich während des Röstens gebildete Geschmacksstoffe eine Rolle. Der günstige Einfluß des Backprozesses bestätigte sich in Verss. mit Extrakten von rohen u. gebratenen Kartoffeln. (Ztschr. f. physiol. Ch. 139. 212—15. 1924. Hamburg, Univ.) GÜGG.

E. L. Schield, *Der antiskorbutische Wert von Büchsenmüsen und seine Erhaltung durch Auspumpen der Luft vor dem Prozeß*. Nach Vf. finden sich in Büchsenkonserven (Mais, Bohnen, Erbsen) beträchtliche Mengen antiskorbut. Vitamine, aber 2—4 mal so viel, wenn vor Herst. der Konserven die Luft aus den Büchsen entfernt wurde. (Proc. of the soc. f. exp. biol. and med. 21. 341. Minneapolis, Univ. of Minnesota; Ber. ges. Physiol. 27. 93. 1924. Ref. WIELAND.) SP.

N. van der Walle, *Über Beri-Beri und das antineuritische Vitamin*. Histor. Überblick über die Forschungen von C. EIJKMAN, SCHAUMAN, LICHTENSTEIN über Entstehung u. Heilung von Beri-Beri. (Nederl. Tijdschr. Geneeskunde 68. 1487 bis 1498. 1924. Utrecht.) MÜLLER.

A. Clementi, *Der Nährwert und die Verdaulichkeit von Fleisch, das bei hoher Temperatur und alkalischer Reaktion denaturiert ist. Experimentelle Untersuchungen*. Gehacktes Pferdefleisch wurde mit $\frac{1}{10}$ seiner Menge 20%ig. Sodalsg. gemischt, dann 10 Stdn. bei 120° im Autoklaven gehalten, mit HCl neutralisiert u. getrocknet. Es zeigte dann in Nahrungsgemischen für Ratten geringeren Nährwert als nicht erhitztes, zum Teil infolge geringerer Schmackhaftigkeit, aber auch infolge verminderter Verdaulichkeit durch Magen- u. besonders Pankreassaft. Die Proteine u. Albumosen müssen tiefgreifende Veränderungen ihrer chem. oder stereochem. Natur erlitten haben oder es müssen bestimmte Aminosäuren zerstört oder racemisiert sein. Der formeltitrierbare N des autoklavierten Fleisches ist gesteigert. — Hefe wirkte in den Verss. appetitanregend, nach Extraktion mit A. in geringerem Maße. (Arch. di fisiol. 21. 453—69. 1923. Roma, Univ.; Ber. ges. Physiol. 27. 87. 1924. Ref. ROSENTHAL.) SPIEGEL.

M. Breskin und K. Bykoff, *Die Rolle des Magenschleims in der Verdauung*. Es wird auf eine aktive Rolle des Magenschleimes bei der Verdauung hingewiesen. Der beim Hungertier auf mechan. u. chem. Reize erhaltene Schleim von alkal. Rk. enthält stets Ferment von großer Verdauungsfähigkeit. Der gleichzeitig mit dem Magensaft abgesonderte Schleim verdaut bei gleicher Verdünnung mehr als jener u. erfährt auch durch starkes Verd. kaum eine Verminderung dieser Fähigkeit. Bei der Verdauung u. auch bei Durchspülen mit HCl dringt das Ferment des Schleimes in die fl. Umgebung ein. (Russ. Physiol. Journ. 1923. 13/6. Petrograd, Inst. f. exp. Med.; Ber. ges. Physiol. 27. 119. 1924. Ref. SEREJSKI.) SPIEGEL.

F. Arloing, L. Langeron und B. Spassitch, *Experimentelle Verdauungsanaphylaxie des Meerschweinchens auf Nichteiweißsubstanzen (Zucker, Fette und Arzneimittel)*. Nach Zufuhr von Galle zeigten Meerschweinchen ähnlich wie gegenüber Eiweißstoffen auch gegenüber einigen anderen Stoffen. Rk. durch Shockerscheinungen bei erster oder bei wiederholter Eingabe. Bei Glucose fehlen beide

Wrkng., bei *Chinin* ist die erste stärker als bei den anderen, fehlt aber die zweite fast vollständig, während *Olivenöl* u. *Antipyrin* beide besitzen. (C. r. soc. de biologie 91. 943—46. 1924. Lyon, Fac. de méd.) SPIEGEL.

Adolf Bickel, *Die dynamische Wirkung der Ionen auf Stoffwechsel und Wachstum der organischen Substanz*. 1. Teil eines Vortrages. (Dtsch. med. Wehschr. 50. 1359—61. 1924. Berlin, Univ.) FRANK.

Poul Iversen, *Untersuchungen über den intermediären Chlorstoffwechsel*. Auf einmalige Zufuhr von 10 g NaCl mit ca. 1 Liter W. zeigt der n. Mensch in den ersten 2—3 Stdn. mäßige Hyperchlorämie u. beträchtliche Hydrämie. Unter der Annahme, daß das Plus an W. im Blute durch einen bestimmten Teil des zugeführten Salzes festgehalten ist, errechnet sich, daß nach $2\frac{1}{2}$ Stdn. sich noch ca. 40% des zugeführten NaCl im Blute befindet. Bei Kranken mit Ödemneigung findet sich relativ geringer Anstieg an Cl u. nur geringe Hydrämie; da hierbei auch die NaCl-Ausscheidung gering ist, ist auf vermehrte Aufnahme- u. Retentionsfähigkeit der Gewebe für NaCl zu schließen. Bei Nierensklerose findet sich starker Anstieg des NaCl im Blute ohne Hydrämie. (Acta med. scandinav. 60. 359—71. Kopenhagen, Univ.; Ber. ges. Physiol. 27. 97. 1924. Ref. E. OPPENHEIMER.) SPIEGEL.

W. H. Jansen, *Kalkstudien am Menschen*. IV. *Das Verhalten des Blutkalks nach peroralen, subcutanen und intravenösen Kalkextragaben*. (III. vgl. Dtsch. Arch. f. klin. Med. 144. 14; C. 1924. II. 486.) Peroral bewirken Ca-Gaben in kleinen Dosen keine Erhöhung des Ca im Blute, wohl aber Gaben von 1,0—1,5 g Ca in Form von l. Salzen. Diese Erhöhung, am stärksten nach 2—3 Stdn., ist vorübergehend. Ihr Grad schwankt je nach dem benutzten Salze, Diphosphat < Sulfat < Chlorid < Dicarbonat; Lactat wirkt hierbei nicht oder nur unbedeutend, Acetat besser. Bei Ca-reichen Getränken wird die Wrkng. durch Ggw. anderer Ionen u. die Art ihrer Bindung beeinflusst. Nach subcutanen Injektionen von Ca-Salzen ist das Ca im Blute innerhalb der ersten 2 Stdn. vermehrt, je nach der angewandten Menge um bis 50%, nach 24 Stdn. auf die ursprüngliche Höhe u. darunter gesenkt. Nach intravenösen Injektionen, wozu sich Ca- α -Isobutytrat (*Optochal*) am besten eignet, in den ersten 10 Min. maximaler Anstieg, dann allmählich wieder Abfall, so daß nach 1—2 Stdn. der Ausgangswert wieder erreicht ist. Höhe u. Dauer des Anstiegs gehen der verabreichten Menge parallel. — Auf keinem Wege gelang bei erwachsenen Menschen die Steigerung eines vorher n. Blutkalkgehaltes für längere Zeit. Subnormale Werte konnten aber durch subcutane oder intravenöse Injektionen für längere Zeit auf n. Höhe gebracht werden. (Dtsch. Arch. f. klin. Med. 145. 209—21. 1924. München, Univ.) SPIEGEL.

S. V. Telfer, *Untersuchungen über Kalk- und Phosphorstoffwechsel*. III. *Die Absorption von Calcium und Phosphor und ihre Ablagerung im Skelett*. (I. u. II vgl. Quart. Journ. of med. 16. 45; C. 1923. III. 466.) Gewisse Hemmungen der Inkrustation u. des Knochenwachstums an wachsenden Hunden bei P-reicher, aber Ca-armer Kost konnten durch Gaben von Ca-Lactat schon in 3—4 Tagen erheblich gebessert werden. Ratten verhielten sich wie Hunde. Bei beiden stieg unter der Ca-Zulage Ausscheidung von Ca in Harn u. Kot, von Phosphat nur in Kot unter Sinken im Harn. — Wurde Kuhmilch mit HCl bis zu 0,03-n. Konz. oder mit Pepsin oder mit beiden mehrere Stdn. bei 37° gehalten, so wurde schon durch HCl allein die Hauptmenge von Ca u. Phosphat II. Vf. schreibt der HCl der Magens u. der sauren Rk. des Duodenum maßgebenden Einfluß auf die Resorption von Ca u. Phosphat zu, für die auch die B. niederer Fettsäuren bei der Darmverdauung günstig sein kann. Ungenügende Resorption kann demnach durch Achlorhydrie, Darmstörungen usw. bedingt sein. (Quart. Journ. of med. 17. 24)

bis 259. Glasgow, Univ.; Roy. Hosp. f. sick children; Ber. ges. Physiol. **27**. 94—95. 1924. Ref. HEUBNER.) SPIEGEL.

O. Meyerhof und **H. E. Himwich**, *Beiträge zum Kohlenhydratstoffwechsel des Warmblütermuskels, insbesondere nach einseitiger Fetternährung*. Bei gleichzeitiger Fetternährung u. Arbeit sinkt der Kohlenhydratgehalt des Rattenmuskels, vor allem das Glykogen; aber auch die niederen Kohlenhydrate nehmen durchschnittlich um $\frac{1}{3}$ ab. Dabei ist der respirator. Quotient während der Laufarbeit = 0,7, entsprechend ausschließlicher Fettverbrennung. Die chem. Starre durch *Coffein* u. *Chlf.*, sowie die Wärmestarre bei 46° u. 52° ist in ihren mechan. Äußerungen (Spannung, Verkürzung, Härtezunahme) stark herabgesetzt, wenn das mobilisierte Kohlenhydrat nur noch für 0,3% oder weniger Milchsäure ausreicht an Stelle des gewöhnlichen Starremaximums von 0,45—0,6%. Dabei bleibt die *Chlf.*- u. *Coffein*-starre in allen Fällen u. meist auch bei Wärmestarre in Luft die Äquivalenz von Milchsäure u. Kohlenhydratschwund vollkommen. Dagegen erhält man bei fett-ernährten Ratten an in Ringerlsg.wärmestarr gewordenen Muskeln, besonders bei längerer Versuchsdauer, zu hohe „Milchsäurezahlen“, wahrscheinlich aber nur infolge method. Komplikation. Bei der Wärmestarre nehmen die niederen Kohlenhydrate nicht gleich mit der Milchsäurebildung ab, sondern erst gegen Ende derselben. Die Atmung der Rattenmuskeln (Zwerchfell) bei Fett- u. Kohlenhydraternährung ist gleich groß, jedoch vom Milieu abhängig, am größten in Ringer-Phosphatlsg. Der respirator. Quotient zeigt bei verschiedener Ernährung keine sicheren Unterschiede (im Durchschnitt 0,95); der Oxydationsquotient der Milchsäure (Milchsäure verschwunden : Milchsäure oxydiert) in der Ruheatmung ist > 1 (zwischen 1 u. 2), wenn er auch wahrscheinlich aus Gründen der Versuchsanordnung, hinter dem bei Froshmuskeln gefundenen (2—4) zurückbleibt. (PFLÜGERS Arch. d. Physiol. **205**. 415—37. 1924. Kiel, Univ.) WOLFF.

Rudolf Rittmann, *Zur Frage der Rückresorption von Zucker durch die Nieren-epithelzellen beim Warmblüter*. Aus bluthaltigen, nicht oder nicht genügend durchspülten Nieren hergestellte Zellbreie zerstörten zugesetzten Traubenzucker rasch mehr oder weniger vollständig bzw. veränderten ihn so, daß er, offenbar durch Glykolyse durch das im Zellbrei enthaltene Blut, durch die Folin-Wu-Rk. nicht mehr nachweisbar war. Nierenzellen selbst, bzw. Brei aus vollständig blutfrei gewaschenen Nieren, entfalteten keine glykolyt. Wrkg. Bei diesem trat sehr rasch Autolyse ein, die eine Zunahme der Red. verursachten. Der Zuwachs an reduzierenden Substanzen ist anscheinend um so größer, je konzentrierter innerhalb der Versuchsgrenzen die zugesetzte Zuckerlsg. ist. (Wien. klin. Wchschr. **37**. 1112—14. 1924. Innsbruck, Univ.) FRANK.

Tomitaro Inaoka und **Karl Retzlaff**, *Über den Einfluß des Alkohols auf den Harnsäurestoffwechsel*. Nach intravenöser A.-Infusion bei nicht purinfrei ernährten Personen findet eine erhebliche Vermehrung der Blutharnsäure statt, schon nach 10—20 Min. erscheinen die höchsten Werte von 39 u. 22% Harnsäurezunahme. Bei Personen, die längere Zeit möglichst purinfrei ernährt worden waren, trat nach intravenöser A.-Infusion (20 A. absol. auf 280 physiol. NaCl-Lsg.) dagegen eine Verminderung des Blutharnsäurespiegels von 8—15% auf. (Klin. Wchschr. **3**. 1947—49. 1924. Berlin, Univ.) FRANK.

James Murray Luck, *Ammoniakbildung durch tierische Gewebe in vitro*. I. Anwendung von gemischten Gewebsextrakten. (Vgl. Biochemical Journ. **18**. 679; C. **1924**. II. 1352.) Als Substrate für Prüfung der NH_3 -Bildung dienten völlig hydrolysierte Gelatine (I), trypsinverdautes Caseinogen (II) u. der trypsinbeständige Amidrückstand aus demselben (III), von denen I keinen Amid-N, II sowohl Amid- als auch Amino-N, III verhältnismäßig viel trypsinbeständigen Amid-N, Amino-N nur in Form von Glutaminsäure u. Lysin enthält. Geprüft wurden die folgenden

Gewebe u. Fl. von Hunden: Muskel (A), Leber (B), Dünndarmschleimhaut (C), Nebennieren (D), Schilddrüse (E), Milz (G), Pituitariakörper (H), Parotisdrüsen (J), Submaxillardrüsen (K), Magenschleimhaut (M), Pankreas (N), Mesenterium (O), Galle (P), Niere (Q), Ovarien (R), Gehirn (S), Herz (T), Lymphe (U), Lymphdrüsen (V), Gesamtblut (W), defibriniertes Blut (X), geformte Elemente (Y), rotes Knochenmark (Z). Aus I bildete nur Z NH_3 , außer in Ggw. von C, vielleicht aber nur infolge bakterieller Verunreinigung. Aus II erfolgte die B. durch B, C u. in geringem Maße durch C. Diese bewirken sie auch aus III, nicht aber nach Säurehydrolyse desselben, es dürfte demnach Deamidierung, nicht Deaminierung vorliegen. Harnstoff wurde gebildet durch B, C u. Q, wahrscheinlich aus Arginin durch Wrkg. einer Arginase. In weiteren Verss., bei denen nicht, wie beim ersten, die Tiere längere Zeit in Anästhesie gehalten waren, aber 12 Stdn. vor der Tötung gehungert hatten, ergaben sich deutliche B. von NH_3 durch Gemische von B u. C, keine merkliche Deaminierung durch irgend ein Einzelpräparat, durch B u. Gemische dieser Synthese eines amidartigen Körpers, der im Gemisch mit M dann vollständig deamidiert wurde. (Biochemical Journ. 18. 814—24. 1924. Cambridge, Biochem. Lab.) SPIEGEL.

James Murray Luck, *Ammoniakbildung durch tierische Gewebe in vitro.* II. *Der Nachweis von Urease im Tierkörper.* (I. vgl. vorst. Ref.) Der fördernde Einfluß von M auf die B. von NH_3 durch B aus Substrat I wurde näher untersucht. Es ergab sich B. von NH_3 aus I in den Gemischen von B u. M, in schwächerem Maße durch solche von M u. C u. von M u. Q; mit B allein wurde ferner Harnstoff gefunden, mit B + M nicht. Hieraus u. aus weiteren Verss. mit Harnstoff, Arginin usw. als Substrat wird geschlossen, daß die Magenschleimhaut des Hundes eine Urease enthält. Verss. an anderen Tierarten führten zu negativen Ergebnissen bei Ratte, Kaninchen, Meerschweinchen, positiven bei Schaf, Ochs, Katze u. Ziege. Am stärksten tritt die Urease bei den Fleischfressern auf, bei Wiederkäuern fehlt sie in dem Teile des Magens, in der pept. Verdauung stattfindet. (Biochemical Journ. 18. 825—28. 1924. Cambridge, Biochem. Lab.) SPIEGEL.

Tamotsu Watanabe, *Studien zur Physiologie und experimentellen Therapie der Gallenabsonderung.* I. *Einfluß von Mineralwassersalzen auf die Gallensekretion nach Versuchen mit dem Homburger und Mondorfer Quellsalz.* Die genannten Quellsalze wurden an Hunde mit permanenter Gallenfistel in 5%ig. Lsg. gegeben (die Quellsalze enthalten 1,12 bzw. 1,54%). Danach waren die ausgeschiedenen Gallenmengen vermindert, die gallenfähigen Bestandteile aber nicht nur relativ, sondern auch absol. vermehrt. (II. vgl. Ztschr. f. d. ges. exp. Medizin 40. 201; C. 1924. II. 205.) (Ztschr. f. d. ges. physikal. Therapie 28. 66—79. Berlin, Univ.; Ber. ges. Physiol. 27. 123. 1924. Ref. VAN REY.) SPIEGEL.

Robert McCarrison, *Pathogenese von Avitaminosen.* XII. *Die Funktion der Nebennieren und ihre Beziehung zur Wasserstoffionenkonzentration.* (XI. vgl. Indian Journ. of med. res. 11. 1; C. 1924. II. 1360.) Adrenalin erhöht die Lichtempfindlichkeit der Iris am enucleierten Auge der ind. Kröte. Erhöhung der Temp. verringert, Abkühlung erhöht die Rk., Annäherung der $[\text{H}^+]$ an den Neutralpunkt von alkal. Seite erhöht den Effekt, der durch Säure nach Überschreitung eines Optimums wieder gehemmt wird. Die letzterwähnte Hemmung kann durch Erhöhung der AdrenalinKonz. überwunden werden. Emulsion von Nebennierenrinde regelt die Neutralität der AdrenalinSalzLsg.; diese Eigenschaft der Rinde verschwindet bei durch Nahrungsdefekt polyneurit. Vögeln. Das Serum dieser Tiere steigert die Empfindlichkeit der Kröteniris für Adrenalin, ihre Perikardialfl. erniedrigt sie. — Adrenalin wird in Ringerlsg. am schnellsten, etwas weniger in physiol. NaCl-Lsg. noch langsamer in frischem Schafserum zerstört. (Indian Journ. of med. res. 10. 861—99. 1923; Ber. ges. Physiol. 27. 93—94. 1924. Ref. OEHME.) SPIEGEL.

A. Clementi, *Die Wirkung des Sekretes des kleinen Magens auf Tributyrin und die Natur des lipolytischen Vermögens des Magensaftes.* (Vgl. Arch. internat. de physiol. 22. 121; C. 1924. II. 1806.) Die Spaltung von Tributyrin durch das Sekret aus dem Pawlowschen kleinen Magen erfolgt auch noch nach Kochen des Saftes, aber nicht nach sorgsamer Neutralisation mit Na_2CO_3 ; andererseits wird das Tributyrin auch durch n. HCl gespalten. Vf. schließt daraus, daß im Magensaft keine Lipase vorhanden u. die bisher beobachtete Fettspaltung durch Magensaft nur Wrkg. der freien HCl ist. (Arch. di fisiol. 21. 471—84. 1923. Roma, Univ.; Ber. ges. Physiol. 27. 120. 1924. Ref. LAQUER.)

SPIEGEL.

M. Frhr. v. Falkenhausen, *Über den Aminosäuregehalt des Blutes und seine Bedeutung für die Beurteilung der Leberfunktion.* Nach Einnahme von Rectamin konnte aus dem NH_2 -N-Gehalt des Blutes bei Lebergesunden u. verschiedenen Lebererkrankungen keine aminosäureretinierende Funktion der Leber nachgewiesen werden. Demnach dürfte die Möglichkeit einer akt. Tätigkeit dieses Organes im intermediären Eiweißstoffwechsel stark einzuengen sein. Auch eine Methode der Leberfunktionsprüfung kann so nicht aufgebaut werden. (Arch. f. exp. Pathol. u. Pharmak. 103. 322—28. 1924. Breslau, Univ.)

WOLFF.

H. Bechhold, *Ein neuer Nachweis der Aufnahme von Substanzen durch die lebende Schleimhaut.* Vf. führte den Nachweis einer Konz.-Verminderung durch die Abnahme der Desinfektionswrkg. von Lsgg. von Karbolsäure, Tribromnaphthol, Inspirol (einem Gemisch verschiedener äth. Öle) u. Oxychinolin auf Staphylokokken u. Bacterium coli. Die Versuchspersonen spülten mit den verd. Lsgg. den Mund, in der Spülfl. zeigte sich die Minderung des desinfektor. Effekts. Es konnte nachgewiesen werden, daß die Schleimhaut aus einigen obiger Lsgg. annähernd die Hälfte bis Dreiviertel der gel. Substanz zu entziehen vermag. (Münch. med. Wchschr. 71. 1391—92. 1924. Frankfurt a. M., Inst. f. Kolloidforschung.)

FRANK.

Joseph Needham, *Untersuchungen über Inosit.* II. *Die Synthese des Inosits im Tierkörper.* (I. vgl. Biochemical Journ. 17. 422; C. 1923. IV. 386.) Der im Körpergewebe der Ratte vorhandene freie Inosit erfuhr keine Veränderung bei 3 Monate langer Ernährung mit inositfreier Kost, auch nicht, wenn durch starken Salzgehalt eine dauernde u. starke Ausfuhr von Inosit durch den Harn herbeigeführt wurde. Der Tierkörper scheint somit zur Synthese von Inosit befähigt. (Biochemical Journ. 18. 891—904. 1924. Univ. of Cambridge.)

SPIEGEL.

Edmund Maliwa, *Über die chemisch-biologischen Grundlagen der Schwefelbäderwirkung.* (Wien. klin. Wchschr. 37. Beilage. 1—3. 1924.)

FRANK.

Hans Handovsky, *Die allgemeine Pharmakologie im Rahmen der Naturwissenschaften.* Zusammenfassende Darst. neuerer Ergebnisse der Pharmakologie. (Dtsch. ned. Wchschr. 50. 1315—18. 1924. Göttingen.)

FRANK.

Fritz Paneth und Georg Joachimoglu, *Über die pharmakologischen Eigenschaften des Zinnwasserstoffs und Germaniumwasserstoffs.* Vom Standpunkt des Period. Systems war die Feststellung u. der Vergleich der Giftwrkgg. von Zinnwasserstoff, Arsenwasserstoff u. Germaniumwasserstoff von Interesse. Die große Giftigkeit des Zinnwasserstoffs erhellt aus der Tatsache, daß schon eine Konz. von ,65 mg pro Liter genügt, um Mäuse sofort zu töten. Meerschweinchen sind etwas widerstandsfähiger, während Frösche vollkommen unempfindlich sind. Während die Giftwrkg. des AsH_3 bei Mäusen eine schleichende ist, treten bei SnH_4 plötzliche heftige Krämpfe auf, die sofort zum Tode führen. Die SnH_4 -Vergiftung geht ausschließlich auf das Zentralnervensystem, während AsH_3 außerdem noch hämolyt. wirkt. Bei SnH_4 wurden keine Veränderungen des Blutfarbstoffes festgestellt. — GeH_4 ist wesentlich weniger giftig als SnH_4 . Eine Maus wird durch 2,0 ccm im Liter bei einer Inhalationsdauer von 60 Minuten erst am folgenden Tag getötet. Bei Meerschweinchen wurde unter diesen Bedingungen Hämoglobinurie festgestellt,

was auf eine Ähnlichkeit im pharmakolog. Verh. mit AsH_3 deutet, die im Period. System auch benachbart stehen. AsH_3 erreicht nicht die Giftigkeit von SnH_4 , sondern steht zwischen diesem u. GeH_4 . Der eigenartige Geruch von SnH_4 kann als „dumpf“ bezeichnet werden u. erinnert an organ. Substanzen. SnH_4 ist in der betreffenden Gruppe die giftigste Wasserstoffverb., die wahrscheinlich nur von dem noch zu untersuchenden Bleiwasserstoff übertroffen wird. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 57. 1925—30. 1924. Berlin, Univ.) HORST.

W. Blair Bell, *Ein Vortrag über den Einfluß von Blei auf normales und abnormes Zellwachstum und auf gewisse Organe*. An Einzelbeobachtungen sehr reiche Abhandlung, die besonders auch die Einw. des Pb auf Tumoren berücksichtigt. (Lancet 206. 267—76; Ber. ges. Physiol. 27. 223—24. 1924. Ref. SCHÜBEL.) SP.

P. W. Danckwortt und **E. Pfau**, *Über das Schicksal der Blausäure im tierischen Organismus, zugleich eine neue Methode zum Nachweis von Rhodanverbindungen in organischem Material*. (Nach Verss. mit **V. Onderka**.) In den Wintermonaten konnten Vff. in mit KCN vergifteten nach 48 Tagen exhumierten Hunden noch HCN deutlich nachweisen. Die Behauptung früherer Autoren (vgl. CHELLE C. r. d. l'Acad. 169. 426; C. 1920. II. 683), daß HCN im tier. Organismus in HCNS übergeht, läßt sich nicht aufrecht erhalten. Aus Organteilen läßt sich HCN am besten durch Dest. mit Wasserdampf entfernen; das Destillat wird nach den Vorschläge von KOLTHOFF (Ztschr. f. anal. Ch. 57. 1; C. 1918. I. 662) in 2—5 ccm einer Mischung von je 8 g NaHCO_3 u. Na_2CO_3 in 84 g W. aufgefangen u. mittel der Berlinerblauk. HCN nachgewiesen. Bei geringen HCN -Mengen hängt man vorteilhaft einen Streifen Filtrierpapier in die Lsg., auf dem sich im Laufe von 24 Stdn. dicht über dem Spiegel der Fl. ein blauer Streifen absetzt. Empfindlichkeit: 0,8 mg HCN im l. — Der Nachweis von HCNS in Organen wird, wo die Rk. mit FeCl_3 nicht durchführbar ist, am besten so geführt, daß nach der Gleichung $\text{HCNS} + 3\text{H}_2\text{O}_2 = \text{HCN} + \text{H}_2\text{SO}_4 + 3\text{H}_2\text{O}$ Rhodanwasserstoffsäure zu HCN oxydiert u. diese nachgewiesen wird. Auf diese Weise lassen sich noch 0,73 mg $\text{NH}_4\text{CNS} = 0,59$ mg HCNS als HCN nachweisen. Quantitativ läßt sich HCN (bezw. nach Oxydation mit H_2O_2 auch HCNS) im Destillat durch Titrieren mit $\frac{1}{50}$ -n. AgNO_3 nach $\text{AgNO}_3 + 2\text{KCN} = \text{KAg}(\text{CN})_2 + \text{KNO}_3$ bestimmen. — Rhodanzalze, die zu Organteilen zugesetzt werden, ließen sich nach 3 Wochen quantitativ wieder gewinnen, ein Übergang in HCN hatte nicht stattgefunden. (Arch. de Pharm. 262. 442—49. 1924. Hannover, Tierärztl. Hochsch.) HABERLAND.

Erwin Becher, *Die renalen Wirkungen des Harnstoffs*. (Vgl. Zentralblatt inn. Med. 45. 273; C. 1924. II. 489.) Ein gewisser Parallelismus zwischen Ausscheidung von W. u. von Harnstoff spricht für eine renale Wrkg. des letzten, a der wahrscheinlich sowohl die Glomeruli (vorwiegend für Ausscheidung des V. nebst NaCl) als auch die Tubuli (für Sekretion des Harnstoffs) beteiligt sind. Möglicherweise wird in den Tubuli auch W. osmot. abgeschieden. Beweise für eine Rückresorption, die besonders für NaCl möglich scheint, wurden nicht gefunden. — Bei Harnstoffdiurese lassen sich 2 Stadien unterscheiden, von denen I nur bei rasch eintretender Diurese, vorwiegend nach intravenöser Zufuhr von Harnstoff eintritt hier nähern sich während Ausscheidung des Harnstoffes in starker Konz. die Konz. der anderen harnfähigen Stoffe den Serumwerten, während sich bei II die Konz. voneinander entfernen u. NaCl in der Niere durch Harnstoff verdrängt wird. Na^+ wird bei Harnstoffdiurese vermehrt ausgeschieden, ohne daß die Konz. über den Serumwert steigt. Die absol. Ausscheidung von PO_4 , Milchzucker, Kreatinin, Harnsäure wird nicht oder verhältnismäßig wenig gesteigert. Die bei mehrfach hintereinander erzeugter Harnstoffdiurese eintretende Abnahme der diuret. Wrk. beruht nicht auf Ermüdung der Nierenzellen gegenüber Harnstoff, sondern a

Wassermangel der Gewebe. (Dtsch. Arch. f. klin. Med. **145**. 222—35. 1924. München, II. med. Klin.) SPIEGEL.

Hans Spatz und Ernst Wiechmann, *Beobachtungen über den Einfluß des Cholins auf den Magendarmkanal beim Menschen*. Durch Beobachtungen an 21 Personen konnte gezeigt werden, daß die Wrkg. des Cholins auf den menschlichen Darm nicht wie beim tier. in konstanter Förderung, sondern ganz unregelmäßig, bald in motilitätssteigerndem, bald hemmendem Sinne erfolgt. Schon niedrige Dosen können schwere tox. Nebenwrkgg. zeitigen. Vor der Anwendung des Cholins bei gewöhnlichen Darmmotilitätsstörungen wird gewarnt. (Münch. med. Wchschr. **71**. 1425—27. 1924. Köln, Univ.) FRANK.

K. K. Chen und Carl F. Schmidt, *Die Wirkung des Ephedrins, eines Alkaloids aus Ma Huang*. Ma Huang, in China als Arzneipflanze lange bekannt, ist ident. mit *Ephedra vulgaris* var. *helvetica*. Das daraus gewonnene Ephedrin bewirkt bei Katzen u. Hunden zu 0,25—10 mg intravenös Blutdrucksteigerung, Gefäßkontraktion, Lähmung der Darmbewegungen, Steigerung des Uterustonius, Pupillenerweiterung, Erschlaffung der Bronchialmuskeln, gleich Adrenalin durch peripheren Sympathicusreiz. Die Herztätigkeit wird auch bei Aufpinselung auf das Ganglion stellatum gesteigert, aber weniger als bei intravenöser Injektion. Hierbei tritt eine sekundäre Lähmung ein, wohl aber bei Anwendung am Herzmuskel selbst. Die periphere Gefäßwrkg. ist verhältnismäßig schwächer als die fördernde auf das Herz, verhältnismäßig stark an den Nieren-, gering an den Lungengefäßen. Wiederholte Injektionen führen zu starker Gefäßkontraktion u. später zu Herzerschlaffung. In der Wrkgg. auf Pupille u. glatte Muskulatur besteht Antagonismus gegen *Pilocarpin* u. *Physostigmin*. (Proc. of the soc. f. exp. biol. and med. **21**. 351—54. 1924. New York, Union med. coll.; Ber. ges. Physiol. **27**. 239. 1924. Ref. FROMHERZ.) SP.

Harry E. Dubin und H. B. Corbitt, *Über die Natur der Wirkung von Pflanzenextrakten auf den Blutzucker normaler Kaninchen*. (Vgl. FUNK u. CORBITT, Proc. of the soc. f. exp. biol. and med. **20**. 422; C. **1924**. I. 2376.) In den Extrakten aus Hefen u. grünen Pflanzen sind neben den blutzuckersenkenden Substanzen auch blutzuckersteigernde vorhanden, so daß die Verwendung roher Extrakte wechselnde oder veränderte Ergebnisse, z. B. die Verspätung u. Verlängerung der Wrkg. bei dem „Glucokin“ von COLLIP, liefert. Die steigernde Substanz ließ sich aus den Extrakten durch Behandlung mit A., dann mit Dinitrosalicylsäure (Pikrinsäure) abtrennen. Die übrig bleibende blutzuckersenkende wird von Tierkohle adsorbiert u. kann daraus in der Regel mit Eg. eluiert werden. Sie wirkt im Tiervers. bzgl. des Blutzuckers wie Insulin. (Proc. of the soc. f. exp. biol. and med. **21**. 16—18. 1923. New York, Lab. von H. A. METZ; Ber. ges. Physiol. **27**. 108. 1924. Ref. LESSER.) SPIEGEL.

H. Chr. Geelmuyden, *Die physiologischen Wirkungen des Insulins*. (Vgl. Ergebn. d. Physiol. **22**. 1; C. **1924**. II. 1822.) Injektion von Insulin beim nicht-diabet. Menschen führt zu Hypoglykämie u. Steigerung des respirator. Quotienten durch vermehrte Ausscheidung von CO₂ ohne Acidose (es wird deshalb B. von nicht-diabet. Menschen aus Kohlenhydraten angenommen), ferner zu hypoglykäm. Erscheinungen. Beim pankreasdiabet. Hund verschwindet nach Insulin das vorher vorhandene Syndrom Fettleber, Lipämie, Ketonurie. Insulin hindert also hier die B. von Zucker aus Fett; ob es die B. von Fett aus Zucker zu befördern vermag, ist zweifelhaft. Beim diabet. Menschen scheint es auch die Umsetzung von Eiweiß abzusetzen. Zu beachten ist die Mitwrkg. anderer endokriner Organe, besonders der Nebennieren u. Schilddrüse. *Hypophysin* u. Insulin, die beide für sich Hypoglykämie erzeugen, wirken zusammen auf den Blutzuckergehalt nicht oder erhöhend. Die weiteren Erörterungen decken sich im wesentlichen mit früheren.

(l. c.). (Norsk magaz. f. laegevidenskaben **85**. 285—92.; Ber. ges. Physiol. **27**. 105—6. 1924. Ref. SCHOLZ.) SPIEGEL.

B. R. Dickson, G. S. Eadie, J. J. R. Macleod und F. R. Pember, Die Wirkung des Insulins auf den Gaswechsel normaler Tiere. Bei Hunden steigt der respirator. Quotient (R. Q.) innerhalb der 1. Stde. nach Insulin, häufig, besonders bei vorher mit Kohlenhydrat gefütterten Tieren, über die Einheit hinaus, später steigen Lungenventilation u. O₂-Verbrauch unter leichtem Sinken des R. Q. Bei Kaninchen fehlen die letzten Erscheinungen, findet sich aber auch meist deutliches Steigen des R. Q., zeitlich mit dem ersten starken Absinken des Blutzucker zusammenfallend, 15—45 Min. nach der Injektion. Dieses Steigen ist (auch beim Hunde) nicht durch Hyperpnöe verursacht. CO₂-Kapazität u. Gesamt-CO₂ des Blutes ändern sich nur unbedeutend (anfänglich geringe Verminderung). Der aus dem Blute schwindende Zucker wird vielleicht in Zwischenprodd. verwandelt, die nicht mit Glykogen oder Glucose ident. sind. (Quart. Journ. of exp. physiol. **14**. 123—49. Toronto, Univ.; Ber. ges. Physiol. **27**. 106. 1924. Ref. LESSER.) SPIEGEL.

Ernst Laqueur, Zur Kritik der Kanincheneinheit. Widerlegung von LOEW (C. 1924. II. 367). (Dtsch. med. Wehschr. **50**. 537—38. Amsterdam.) MÜLLER.

St. Kroszczynski, Die Wirkung des Insulins auf Kaulquappen. Quappen von *Rana temporaria* werden in Lsg. von 8 Insulineinheiten, solche von *Pelobates fuscus* erst in Lsg. von 25—32 Einheiten in 40 cem W. langsam comatös; subcutane Einspritzung wirkt viel schneller. Behandlung mit Glucose läßt die comatösen Tier für einige Zeit ihre Beweglichkeit wiedergewinnen, *Adrenalin* in Konz. 1:60—4000 ist ohne Schutzwrg., *Hypophysenextrakt* (0,75 cem Pituglandol ROCHE in 20 cem W.) hindert die Insulinwrg. vollständig, ebenso Zusatz von 0,00075% Atropinsulfid zur Lsg., während die gleichen Zusätze von *Pilocarpin* oder *Physostigmin* den Eintritt des Comas beschleunigen. (C. r. soc. de biologie **91**. 964—66. 1924. Warschau Univ.) SPIEGEL.

A. R. Colwell, Insulin und Phlorhizinglycosurie. Gibt man Phlorhizinhunde bei einer reinen Milch-Sahnekost (30—120 cal pro kg) mit konstanter Zuckerausscheidung *Insulin*, so sinkt der Zucker entsprechend 0,08—0,20 g pro Insulin-einheit. Zugleich sinkt die an sich schon niedrige N-Ausscheidung. — Wenn Phlorhizinhunde glykogenfrei gemacht sind, erhöht *Adrenalin* die Glykosurie nicht (Journ. Biol. Chem. **61**. 289—301. 1924. Chicago.) MÜLLER.

O. Klein, Zur hormonalen Beeinflussung des Wasserhaushaltes beim Diabetes mellitus durch Insulin und Pituitrin. Durch *Insulin* steigt bei den meisten Diabetikern das Körpergewicht infolge starker Retention von W. — Diese ist extrarenal bedingt. W. tritt mit Salz zusammen aus der Blutbahn in die Gewebe, wird dort retiniert. — Erst bei länger dauernder Insulinbehandlung wird auch das Blut reicher an W., ebenso wie anfangs die Gewebe. — Die W.-Retention bedeutet die Rückkehr zur Norm zugleich mit der wiederkehrenden Fähigkeit zur Glykogenspeicherung. — *Pituitrin* wirkt bei Diabetikern wie bei bestimmten Nierenkranken: Die renale W.-Diurese wird gehemmt, das Blut stärker verd. *Insulin* verändert diese Wrg. des Pituitrin nicht. — In selteneren Diabetesfällen bewirkt schon die erste Insulininjektion Hydrämie mit Zeichen der renalen Hemmung der W.-Diurese, wie es Pituitrin macht. Beide summieren sich. Es sind die Diabetesfälle auf der Basis einer Erkrankung der endokrinen Drüsen. (Ztschr. klin. Med. **100**. 458—77. 1924. Prag.) MÜLLER.

N. R. Blatherwick, Marion Bell und Elsie Hill, Einige Wirkungen von Insulin auf den Kohlenhydrat- und Phosphorstoffwechsel normaler Individuen. Gibt man *Insulin* vor Zufuhr von Traubenzucker, so nimmt die Menge des anorgan. N. im Blut u. die P-Ausscheidung im Harn stark ab. — Gibt man bei einer bestimmten Standardkost *Insulin*, so erfolgt zunächst Vermehrung der N- u. P-Ausscheidung,

bei wiederholten Injektionen sinkt sie aber unter die Norm. — Insulin beeinflußt den n. Harnzucker kaum nennenswert. Er scheint von der Höhe des Blutzuckerspiegels ganz unabhängig zu sein, sofern er unter der renalen Ausscheidungsschwelle liegt. — Körperliche Arbeit erhöht die P-Ausscheidung im Harn. — Die Befunde deuten alle auf die Bedeutung einer Verb. von Traubenzucker m. Phosphorsäure für den Kohlenhydratstoffwechsel hin. (Journ. Biol. Chem. **61**. 241—59. 1924. St. Barbara.)

MÜLLER.

I. I. Nitzescu und J. Manguica, *Wirkung von Insulin auf das „hämoglobuläre Gleichgewicht“*. (Vgl. NITZESCU u. POPESCU, INOTESTI, C. r. soc. de biologie **90**. 534; C. 1924. I. 2445.) Vagusreizung bewirkt Leukopenie, *Insulin* bei n. Kaninchen, Hunden u. pankreasdiabet. Hunden, wie beim Diabetiker in der ersten Stde., nur bisweilen Leukopenie, dann aber regelmäßig, etwa parallel der Blutzuckersenkung, Leukocytose. (C. r. soc. de biologie **90**. 1347—49. 1924. Bukarest.)

MÜLLER.

W. D. Halliburton und D. H. de Souza, *Über die Wirkung von Pankreassaft auf Milch*. Auch durch Sekretinjektion gewonnener Pankreassaft wirkt auf Milch so, daß sie in Wärme fl. bleibt, bei Abkühlen fest wird. (Quart. Journ. of exp. physiol. **14**. 83—84. London, KINGS Coll.; Ber. ges. Physiol. **27**. 197. 1924. Ref. JACOBY.)

SPIEGEL.

Henri Arthus, *Experimentelle Untersuchungen über die Chloroformnarkose*. Unterss. am Kaninchen, welche die Ursache des bei Chlf.-Narkose beobachteten plötzlichen Herzstillstandes feststellen sollten, haben diese Frage nicht gelöst, lassen über die von DASTRE als möglich angenommene Herbeiführung der Vagusreizung reflektor. von der Nase aus, wenn diese auch eine Herzverlangsamung herbeiführen kann, als ausgeschlossen erscheinen. Eine Lähmung des Herzhemmungszentrums scheint bei tiefer Narkose aufzutreten. (Arch. internat. de physiol. **22**. 259—72; Ber. ges. Physiol. **27**. 229—30. 1924. Ref. WACHHOLDER.)

SPIEGEL.

Sakuji Kodama, *Die Wirkung der Äthernarkose auf das Maß der Adrenalinausscheidung der Nebennieren*. I. Äthernarkose setzt die Adrenalinausfuhr herab, ohne sie ganz zu unterdrücken, während die Durchblutung der Nebennieren zu nimmt; bei Erwachen aus der Narkose stellt sich das umgekehrte Verhältnis ein. Auch bei langer Dauer der Ä.-Narkose ist die Adrenalinausfuhr herabgesetzt, obwohl gleichzeitig Hyperglykämie entsteht u. obwohl Asphyxie, die mit Narkose verbunden sein soll, die Ausfuhr steigert. Sensible Reize lassen diese auch in der Narkose ansteigen. Bestst. des Adrenaliningehaltes in den Nebennieren nach Schluß der Verss. lassen erkennen, daß auch die B. von Adrenalin in der Narkose vermindert ist. (Tôhoku Journ. of exp. med. **4**. 601—42. Sendai, Tôhoku Univ.; Ber. ges. Physiol. **27**. 231—32. 1924. Ref. FROMHERZ.)

SPIEGEL.

Josef Wilder, *Über das Schlafmittel „Somnifen“*. *Somnifen* (vgl. C. 1923. II. 883) bewährte sich als sicheres Schlafmittel in oraler u. intravenöser Applikation. (Wien. klin. Wchschr. **37**. 1091—93. 1924. Wien, Nervenheilanstalt MARIA-THERESIA-Schlössel.)

FRANK.

Otto Graf, *Über die Wirkung von Psikain in einem Fall von Überempfindlichkeit gegen Kokain*. Bei einer Versuchsperson mit ausgesprochener Überempfindlichkeit gegen Cocain traten nach Psikain nicht die geringsten Störungen ein. (Münch. ned. Wchschr. **71**. 1433—34. 1924. Dtsch. Erforschungsanstalt f. Psychiatrie.)

FR.

O. Wiese, *Quinisol (Chinin. bisalicylosalicylicum)*. Quinisol (Herst. BOEHRINGER) ist eine Verb. aus 1 Mol. Chinin u. 2 Mol. Diplosal. Aus 100 Teilen Quinisol entstehen bei der Spaltung rund 45 Teile Chinin u. 55 Teile Diplosal. Das Präparat wird zur Behandlung von akuten, fieberhaften Erkältungskrankheiten u. Grippe bei Kindern empfohlen. (Therapie d. Gegenwart **65**. 478—79. 1924. Landeshut i. Schles., Kinderheilstätte.)

FRANK.

Erich Langer und Bruno Peiser, *Über neuere kolloidale Silberpräparate zur Behandlung der Gonorrhoe*. Klin. Bericht über die Wrkgg. von *Targesin* u. *Reargon*. In der Früh- u. Abortivbehandlung leisten beide Präparate gute Dienste, in den anderen Stadien stehen sie mit den übrigen Antigonorrhoea auf gleicher Wirkungsstufe. Das *Targesin* hat vor dem *Reargon* den Vorzug absol. Reizlosigkeit. (Dtsch. med. Wchschr. **50**. 1439—40, 1924. Berlin, RUDOLF VIRCHOW-Krankenh.) FRANK.

Karl B. Hanson und H. L. van Volkenberg, *Wirksamkeit des Tetrachlorkohlenstoffs als Wurmvertreibungsmittel bei der Behandlung von Füchsen*. Gaben von 0,2 cem CCl_4 pro kg u. mehr erwiesen sich bei der Vertreibung von Hakenwürmern u. Askariden als sehr wirksam. Durch 0,25 cem u. darüber wurde Eingeweidegel vollkommen beseitigt. Wurde W. u. Futter erst 3 Stdn. nach der Behandlung verabreicht, so wurde durch Verabreichung des Mittels in elast. Kapseln oder harten Gelatinekapseln die gleiche Wrkg. erzielt. (Journ. Agricult. Research **28**. 331—37. 1924. U. St. A. Dep. of Agric.) BERJU.

G. Scherber, *Übersicht über die therapeutische Wirksamkeit der gebräuchlichen Wismutpräparate unter Berücksichtigung eines neuen deutschen Präparates, des Mesurol-Bayer*. Zusammenfassender klin. Bericht. Das *Mesurol* zeichnete sich durch auffallende Schmerzlosigkeit beim Gebrauch, durch gleichmäßige Umsetzung u. sehr günstige klin. Wrkg. aus. (Wien. med. Wchschr. **74**. 2093—98. 1924. Wien RUDOLF-Spital.) FRANK.

E. Orbach, *Die Behandlung mit intravenösen Injektionen von Natrium kakodylicum in hohen Dosen; ein toxikologischer Beitrag*. Vf. warnt vor den von französ. Autoren wie RODRIGUEZ, MARÉCHAL u. a., empfohlenen intravenösen Injektionen von *Natrium kakodylicum* in hohen Dosen bei der Behandlung des amyostat. Symptomen komplexes u. tab. Symptome. Es wurden schwere Störungen im autonomen Nervensystem u. in der Blutzus. beobachtet. (Dtsch. med. Wchschr. **50**. 1371—73. 1924. Berlin, FRIEDRICH WILHELM-Hospital.) FRANK.

K. A. Schmelew, *Über die Wirkung von Capsella bursae pastoris auf die Gefäße*. Verss. mit Lsgg. des aus der Tinktur nach Verdunsten des A. bei Zimmer temp. verbliebenen Rückstandes in physiol. NaCl-Lsg. oder Ringerscher oder Lockescher Lsg. Bei Konzz. 1:5000 u. 1:1000 beim Kaltblüter Gefäßverengung, nach Auswaschung verhältnismäßig schnell verschwindend, beim Warmblüter Gefäß erweiterung, die nach Auswaschung langsam zurückging. Der Blutdruck (Hund) wurde nur wenig u. rasch vorübergehend gesenkt. (Ssaratowski Westnik Sdra wooderancija **3**. 4—7. 1923. Ssaratow, Univ.; Ber. ges. Physiol. **27**. 239. 1924. Ref. SSOKOLOW.) SPIEGEL.

Georg Saxinger, *Zur Frage der Chemotherapie der Aphtenseuche mit Wismutverbindungen*. Verss. an Meerschweinchen mit Heydenschen Bi-Salzen, komplexe. Verbb. des Bi mit Körpern der aromat. Reihe. Diese Bi-Salze eignen sich für die Einführung in die Praxis als Schutz- oder Heilmittel bei der Bekämpfung der Aphtenseuche nicht. Auch von einer chem. Umformung des Bi-Salzmoleküls verspricht sich Vf. geringen Erfolg, da hier Bi unabhängig vom einkleidenden Körper u. von der Konst. des Gesamtmoleküls den Schutzzustand lediglich durch sein Toxizität erzeugt. (Dtsch. tierärztl. Wchschr. **32**. 591—94. 1924. Schleißheim Veterinärpolizeiliche Anstalt.) FRANK.

S. Loewe und W. Faure, *Zur experimentellen Prüfung von Haarwuchsmitteln (Humagsolan)*. Verss. an Kaninchen. Es konnte keine haarwuchsfördernde Wrkg des *Humagsolan* festgestellt werden. (Klin. Wchschr. **3**. 1532—33. 1924. Dorpat Univ.) FRANK.

E. Gorter und J. C. Streng, *Klinische Untersuchungen über Tonophosphan*. Vergleich mit Rachitisfällen, die auf gewöhnliche Weise behandelt worden waren.

fällt sehr zu ungunsten des Präparats aus. (Mededeelingen Rijks-Inst. Pharmacotherapeut. Onderzoek 1924. 45—51. Leiden. Sep.)

LEWIN.

Hugo Weiss, Über eine neue Behandlungsmethode des Diabetes mellitus und verwandter Stoffwechselstörungen. Bericht über klin. Verss. mit einem von J. SZIRMA hergestellten Präparat, Lithizit, einem komplexen alkal. Doppelsalz des Li u. des Na, die an Citrat gebunden sind ($\text{Li}_2\text{C}_6\text{H}_5\text{NaO}_7 + 2\text{H}_2\text{O}$). Das Pulver wird steigend in Dosen von 2—4 g gegeben. Es soll den Albuminat- u. Kohlenhydratstoffwechsel in günstiger Weise beeinflussen. Die Menge des ausgeschiedenen Zuckers nimmt rasch ab u. schwindet manchmal gänzlich, die Patienten können Kohlenhydrate in oft großen Mengen zu sich nehmen u. assimilieren, ohne Steigerung des Zuckergehaltes. Vf. will damit bessere Resultate erzielt haben als mit den bisher üblichen Mitteln. (Wien. klin. Wehschr. 37. 1142. 1924.)

FRANK.

E. Toeniessen, Die spezifische Erkennung und Behandlung der Tuberkulose mit einem aus Tuberkelbazillen gewonnenen Eiweißkörper (Tebeptotin). II. Darstellung, chemische Eigenschaften und biologische Wirkungen des Tebeptotins. Seine Unterschiede gegenüber den bisherigen Tuberkulinpräparaten. (Vgl. Münch. med. Wehschr. 69. 957; C. 1922. IV. 741.) Das Prinzip der Darst. des Tebeptotins besteht darin, daß die auf Glycerinbouillon gewachsenen u. durch Waschen mit W. gereinigten Tuberkelbacillen vom Typus humanus kurze Zeit in verd. Mineralsäure erhitzt, dann in KOH extrahiert u. abzentrifugiert werden. Der alkal. Extrakt wird durch Berkefeldkerzen filtriert u. im völlig klaren Filtrat das Tebeptotin durch CH_3COOH gefällt. Die Reinigung erfolgt durch mehrmaliges Lösen u. Füllen. Das Tebeptotin ist in neutralem u. saurem W. unl., klar l. in Alkalien. Zum Gebrauch wird die Substanz abgewogen u. in $\frac{1}{5}$ -n. Na_2CO_3 -Lsg. gel., $\frac{1}{10}$ -n. HCl bis zur Bicarbonatalkalescenz u. zur Konservierung 0,5% Carbolsäure zugegeben. Präparate aus verschiedenen Stämmen des Typus humanus zeigten die gleiche biol. Wrkg., auch gleichen N-Gehalt. Tebeptotin besitzt geringe Giftigkeit neben starker spezif. Wrkg. beim tuberkulösen Menschen. (Dtsch. med. Wehschr. 50. 629—32. 1924. Erlangen, Univ.)

FRANK.

David I. Macht, S. S. Blackmann jr. und E. B. Kelly, Ein experimenteller Beitrag zur Behandlung von Kohlenoxydvergiftungen. Die Abdissoziation des CO vom Hämoglobin wird durch Bestrahlung mit ultravioletten Strahlen in vitro u. in vivo stark beschleunigt, durch erhöhte Temp. nur in geringem Grade. (Proc. of the soc. f. exp. biol. and med. 21. 289—90; Ber. ges. Physiol. 27. 221. 1924. Ref. BIEHLER.)

SPIEGEL.

Gotthold Herxheimer, Versuche zur Frage der Analogisierung der Guanidinvergiftung mit der parathyreopriven Tetanie. Tiere, die keine Epithelkörperchen u. somit keine Epithelkörperchenabwehrtätigkeit gegen Guanidine haben, sind gegen diese Gifte, verglichen mit n. Tieren mit funktionierenden Epithelkörpern, abnorm empfindlich. Eine physiol. Tätigkeit der Epithelkörperchen besteht wahrscheinlich in der Unschädlichmachung der Guanidine u. der Verhinderung übermäßiger B. derselben. (Dtsch. med. Wehschr. 50. 1463—65. 1924. Wiesbaden.)

FRANK.

O. Moor, Kaliumpermanganat gegen Morphinvergiftung. Gegenüber den Einwendungen mehrerer Pharmakologen, daß nur innerliche Verabreichung von KMnO_4 bei Morphinvergiftungen wirksam sei, weißt Vf. darauf hin, daß Einspritzungen von KMnO_4 -Lsgg. niemals Abszesse verursachen, da sich KMnO_4 sofort mit Eiweiß zu oxyprotsaurem Mn verbindet, das keine Reizwrkg. mehr ausübt. Am besten sind 1—2% ig. Lsgg., öfters wiederholt. Intravenös Lsgg. $\frac{1}{1000}$ in physiol. NaCl-Lsg. (Dtsch. med. Wehschr. 50. 1482. Leningrad.)

FRANK.

Alfons Mahnert, Untersuchungen über das glykolytische Vermögen der Carcinomzellen. Feine Schnitte steril gewonnener Tumoren wurden in 0,25% Traubenzucker enthaltene Ringerlsg. gebracht u. im Brutschrank bei 38° gehalten. Nach

einigen Stdn. zeigten die Lsgg., in welchen Carcinomgewebe gelegen hatte, bei der Prüfung mit Neutralrot eine Säuerung u. eine positive Hopkin-Fletschersche Milchsäurerk., die Kontrollen, die in isoton. Ringerlsg. gelegen hatten, waren negativ. Ebenso gaben Kontrollen mit gesunden Organen unter den gleichen Versuchsbedingungen negativen Ausfall. Überlebende menschliche Carcinomzellen besitzen demnach, ebenso wie Zellen von Impftumoren, ein glykol. Ferment. In vitro-Röntgenstrahlen ausgesetzte Carcinomzellen verhielten sich gegenüber Zuckerlsg. wie unbestrahlte. Wurde noch im Körper befindliches, carcinomergriffenes Gewebe intensiv bestrahlt, 12 Stdn. nach der Bestrahlung excidiert u. auf Säureb. in Zuckerlsg. geprüft, so zeigten sich nur Spuren von Säuerung, keineswegs aber Steigerung der Milchsäureb. Ähnlich verhielt sich einer Bestrahlung mit Radium ausgesetztes Gewebe. (Wien. klin. Wchschr. 37. 1114—15. 1924. Graz, Univ.) FRANK.

F. Pharmazie. Desinfektion.

E. C. Dodds und F. Dickens, *Einige Beobachtungen über die Eigenschaften und Darstellung des Insulins mit besonderer Berücksichtigung der Pikrat-Aceton-Darstellungsmethode*. Löslichkeit. Insulin ist ll. in Eg., Phenol, Formamid, Paraldehyd, darin den Eiweißstoffen sehr nahestehend, so daß wenig Hoffnung besteht, eine Darstellungsmethode für Insulin auf Grund der von Eiweißstoffen verschiedenen Löslichkeit außer in A. zu finden. — Salze des Insulins. Das *Pikrat*, nach DUDLEY dargestellt, ist unl. in W., absol. A., Aceton, Ä., ll. in feuchtem A. oder Aceton, in Formamid u. Paraldehyd. In wss. Aceton ist die Löslichkeit am größten bei 70% Aceton; aus der bräunlichen Lsg. wird es durch W. unter Zusatz von gesätt. Pikrinsäurelsg. gefällt, aber nur zu 60%, quantitativ nur durch Dest. des Acetons unter gewöhnlichem oder vermindertem Druck. Die Löslichkeit der Pikrate aus Eialbumin, Blut u. Pankreasproteinen ist sehr verschieden von der des Insulinpikrats, aber, obwohl jene in A. oder Aceton unl. sind, fallen sie aus der Lsg. der Proteine in den feuchten Lösungsmm. durch Pikrinsäure nicht aus. — Wrkg. von organ. Reagentien auf Insulin. Behandlung selbst mit 20%ig. Formalin beeinflusste die Aktivität nicht, solche mit 5%ig. bei 37° setzte sie nur sehr wenig herab. Extraktion von Pankreas mit 1%ig. Ameisensäure unter Zusatz von 0,1%ig. Formalin gab aber keine Ausbeute an akt. Substanz. — Darst. des Insulins. Die Pikrat-Acetonmethode wird in folgender verbesserter Weise ausgeführt: Zerkleinertes, auf Büchnerfilter abgepreßtes Pankreas wird gut mit fein gepulverter Pikrinsäure (45 g auf 1 kg) vermischt, nochmals zerkleinert u. durch Tuch abgepreßt, dann 3-mal mit Aceton in solchen Mengen, daß die Konz. jeweilig ca. 70% beträgt, extrahiert, die vereinigten, nötigenfalls filtrierten Extrakte im Vakuum dest. Bei Abkühlen scheiden sich aus dem wss. Rückstände das amorphe Pikrat u. etwas Fett sowie Krystalle von Pikrinsäure aus (fehlt die letzte, so soll ein gleiches Vol. gesätt. Pikrinsäurelsg. zugegeben werden). Die Ausscheidung wird abgesaugt u. mit Ä. (Verrühren) gewaschen, dann in Mischung von 25 cem 3-n. HCl u. 75 cem A. (10—20 cem pro g Pikrat) gel., die trübe Lsg. zentrifugiert, Fl. abgegossen, die Behandlung noch 1—2 mal wiederholt. Aus der klaren Fl. wird das *Chlorhydrat* durch 10—20 Voll. Aceton gefällt, nach Absetzen u. Dekantieren abgesaugt u. mit Aceton pikrinsäurefrei gewaschen, schließlich im Vakuumexsiccator getrocknet. Das erhaltene rohe Chlorhydrat, weißes, nicht hygroskop., amorphes Pulver, hat eine Kanincheneinheit in 0,25—1 mg. (Brit. Journ. of exp. pathol. 5. 115—22. London, Middlesex Hosp.; Ber. ges. Physiol. 27. 102—3. 1924. Ref. KLEINMANN.) SPIEGEL.

B. Sjollesma und L. Seekles, *Ein einfaches Darstellungsverfahren für Insulin*. Auf Grund der Angabe, daß Insulin nicht bei der *Metaphosphorsäure*-Fällung mit

ausfällt, versuchten Vff., Insulin durch Extraktion mit Metaphosphorsäure darzustellen, was jedoch nicht gelang. Das Verf. der Vff. ist dadurch gekennzeichnet, daß durch Hinzufügen von festem $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ die Dest. mit sehr wenig A. in zwei Phasen zerfällt, in deren einer fast die ganze Menge des Insulins überdestilliert. Bei der Reinigung des Insulins unter stufenweiser Erhöhung des A.-Gehalts wird sehr wenig absol. A. benötigt. Aus 100 kg Rinderpankreas gewinnen Vff. 37,34 g Insulin, entsprechend 140 000 Einheiten. (Mededeelingen, Rijks-Inst. Pharmacotherapie. Onderzoek 1924. 23—26. Utrecht. Sep.) LEWIN.

—, *Untersuchungen über das Insulinpräparat von Sjöllema.* (Vgl. vorst. Ref.) Das Präparat zeigte bei klin. Prüfung stärkere Wrkg. als Insulinum Neerlandicum. Die Auswertung ergab 9 Einheiten pro ccm im Mittel. (Mededeelingen Rijks-Inst. Pharmacotherapie. Onderzoek 1924. 27. Leiden. Sep.) LEWIN.

Pan-Secretin Co. (Harrower). (Vgl. vorst. Ref.) *Pansecretin* soll ein dem Insulin gleichwertiges per os zu verabfolgendes Präparat aus dem Schwanztail des Pankreas sein. Prüfung des Präparates an drei Patienten ergab nicht die geringste Beeinflussung des Diabetes. (Mededeelingen Rijks-Inst. Pharmacotherapie. Onderzoek 1924. 27—31. Leiden. Sep.) LEWIN.

Ernst Schwab, *Über eine neue Darreichung des Camphers in Form der Camphergelatinetten.* Camphergelatinetten (Herst. KNOLL & Co.) enthalten je 0,1 g Campher u. sind mit einer campherfreien Gelatineschicht überzogen, die durch HCHO derart gehärtet ist, daß sie den Magen unverdaut passieren u. erst im Darm aufgel. werden. Sie konnten bei schweren Infektionskrankheiten, besonders bei Pneumonien, längere Zeit mit guter Wrkg., ohne daß die Patienten Widerwillen zeigten, gegeben werden. (Wien. klin. Wchschr. 37. 1093. Frankfurt a. M., Hospit. z. heil. Geist.) FRANK.

C. Bachem, *Über Geschmacksverbesserung und Geschmacksaufhebung von Arzneimitteln.* Als Geschmackskorrigentien für zahlreiche Substanzen eignen sich besonders NaH_2PO_4 , Na_2HPO_4 , ferner Herba santa-Tinktur (Tinct. Eriodictyonis) u. Himbeeräther. Die Bestandteile des letzteren sind größtenteils lipoid-l. u. vermögen daher schnell die oberflächlich gelegenen Geschmacksnerven zu lähmen. (Münch. med. Wchschr. 71. 1348—50. 1924. Bonn, Univ.) FRANK.

N. Schoorl, *Phosphas natricus exsiccatus.* Die Beständigkeitsgrenzen (Verwitterung bezw. Wasseranziehung) der verschiedenen Salze liegen zwischen folgenden Luftfeuchtigkeitsgehalten S 12 (= Salz mit 12 W.) : 0,75—0,95, S 7 : 0,55—0,75, S 2 : 0,28—0,55, S 0 : 0—0,28. Prüfung der Salze auf Reinheit nach KOLTHOFF (der Gebrauch von Farbenindikatoren 1921, 104.) (Pharm. Weekblad 61. 971—78. 1924. Utrecht, Univ.) GROSZFELD.

C. E. Corfield und G. R. A. Short, *Acetannin.* Acetannin, bisher als Tannigen bekannt, soll durch Erhitzen von 10 g Tannin u. 15 g Eg.-Anhydrid 1 Stde. im Wasserbade, Zusatz von 25 ccm A. u. Eingießen der Lsg. in 500 ccm W. hergestellt werden; Nd. soll gewaschen u. bei 60° getrocknet werden. Gehalt an Gallussäure st. ohne Einfluß. Die Prodd. des Handels enthalten mehr oder weniger freies Tannin. Zur Best. desselben schüttelt man 5 g 10 Min. mit 95 ccm W., filtriert, gibt das Filtrat in ein Neßlerglas, setzt 2 ccm MITCHELLS Reagens (0,1 g FeSO_4 , 0,5 g Rochellesalz, W. bis zu 100 ccm) zu u. füllt auf 100 ccm mit W. auf. Die entstehende Färbung vergleicht man mit der einer Standardlg. von Gallotannin : 100 000, gleich ca. 0,2% freiem Tannin. — Best. des F. ist wertlos. (Pharmaceutical Journ. 113. 115—17. 1924.) DIETZE.

J. H. Lorenzen, *Tannineiweißpräparate.* Es werden Ersatzpräparate für Cannalbin im Handel getroffen, die in der Zus. wesentlich abweichen. Bei der Prüfung auf genügende Härtung wurden die von LINKE (Apoth.-Ztg. 25. 604) gefundenen Werte bestätigt. Bei der weiteren Prüfung wurde eine leicht ausführbare,

den Unterschied zwischen Albumen tannic. u. Tannalbin scharf bezeichnende Vorschrift gefunden. Man läßt 1 g Tannalbin mit 100 ccm W. u. 3 Tropfen NH_3 unter wiederholtem Umschütteln 15 Min. stehen, filtriert, versetzt 10 ccm Filtrat mit 7 Tropfen Jodtinktur u. schüttelt kräftig. Es bildet sich ein starker Schaum, der bei Tannalbin bei ruhigem Stehen nach 2 Min. vollständig verschwand, bei Albumen tannic. lange Zeit stehen blieb. Wendet man anstatt Jodtinktur Spiritus an, so ist kein Unterschied in der Haltbarkeit des Schaumes festzustellen. (Pharm. Ztg. **69** 902. 1924.) DIETZE.

Cristoforo Rizzo, *Eine schnelle und sichere Methode zur Gewinnung des hämolytischen Serums*. Kaninchen von > 2 kg erhalten jeden 2. Tag, im ganzen 5mal intravenöse Injektion von 2 ccm 50%ig. Brei von wenigstens 4mal gründlich gewaschenen Hammelblutkörperchen. 2 Tage nach der letzten Injektion 8 Stdn. hungern lassen, dann Entbluten aus der Carotis. (Sperimentale **78**. 65—67 Firenze, Ist. di studi sup.; Ber. ges. Physiol. **27**. 215—16. 1924. Ref. SELIGMANN.) SPIEGEL.

Karl Schreiner, *Über Dermolentsalben und ihre Anwendung*. Dermolent (Herst. Chem.-Pharm. Werke, Graz), eine Salbengrundlage als Ersatz für Vaseline wird zur Herst. der verschiedensten Heilsalben empfohlen. Die Zus. wird nicht angegeben. (Wien. klin. Wchschr. **37**. 1064—66. Graz, Univ.) FRANK.

Wilhelm Prausnitz, *Beitrag zur desinfektorischen Wirkung der Formalinseifenpräparate*. Verss., bei denen die Wrkg. verschiedener Formalinseifenpräparate in 3%ig. Lsg. mit 1%ig. Lysol verglichen wurde, ergaben die desinfektorische Minderwertigkeit des Lysoforms u. ähnlicher Erzeugnisse. (Der prakt. Desinfektor **16** 21. 1924. Graz.) BORINSKI.

W. Wedemann, *Desinfektionsversuche mit Rohcaporit*. Caporit ist nahezu reines $\text{Ca}(\text{OCl})_2$, das bis 80% wirksames Cl enthalten soll (Herst. Farbwerke vorm F. BAYER u. Co.) Lsgg. von Caporit haben sich bis zu 1% herab gegenüber Milzbrandsporen wirksamer gezeigt als 3%ige Kresolschwefelsäure. Beim Versprühen waren 2%ig. Caporitlsgg. weniger wirksam als 2,5%ig. verd. Kresolw. durch Zusatz von gelöschtem CaO wird die Wirksamkeit höher. (Desinfektion **9**. 129—32. 1924.) BO

H. E. Kersten, *Neuere Desinfektionsmittel, ihr Wirkungswert und ihre Verwendbarkeit*. Sammelreferat. (Gesundheitsingenieur **47**. 335—38. 1924. Münster i. W.) BO

G. Analyse. Laboratorium.

Hellthaler, *Ein Siedestab gegen Siedeverzug. Bemerkungen zu der Veröffentlichung von J. Obermiller*. (Vgl. OBERMILLER, Ztschr. f. angew. Ch. **37**. 510 C. 1924. II. 1115.) Die von OBERMILLER angegebene Vorr. geht ebenso wie zwei andere Konstruktionen auf das von SIWOLOBOFF (Ber. Dtsch. Chem. Ges. **1888** 795) vorgeschlagene Röhrchen zurück. Das Siederohr eignet sich schlecht für quantitative Bestst., da in dem Hohlraum Fl. oder Nd. hängen bleibt. (Ztschr. f. angew. Ch. **37**. 887—88. 1924. Gerstewitz, Kr. Weißenfels.) JUNG.

E. Berl und F. Rau, *Über eine Molekulargewichts-Bestimmungsmethode mit dem Gasinterferometer von Haber-Löwe*. Die Methode beruht auf der Ermittlung der Tensionsdifferenz zwischen reinem Lösungsm. u. einer Lsg. von 0,300 g der zu untersuchenden Substanz in 10 ccm des gleichen Lösungsm., in gleichem Vers., bei dem sich beide Fl. in einem Thermostaten von 2—3° unter Zimmertemp. befinden u. von trockenem Luftstrom durchstrichen werden; die beiden Fl. befinden sich in kleinen dreiteiligen Gefäßen ähnlich den Geisslerschen Absorptionsapp.; vor geschaltet ist bei beiden, im Thermostaten, ein Greiner-Friedrichs-Fläschchen mit reinem Lösungsm. Die Differenz der Partialdrucke des Lösungsmitteldampfes in beiden Strömen wird gemessen mit dem Interferometer von HABER u. LÖW.

(Ztschr. f. angew. Ch. **23**. 1393; C. **1910**. II. 833); die eine der beiden Trommeln dient für den durch reines Lösungsm. gegangenen Strom, die andere für den durch die Lsg. gegangenen. Gleichheit der Strömungsgeschwindigkeit wird eingestellt mittels nachgeschalteten Strömungsmessern, die den Druckverlust beim Durchströmen einer Zickzackcapillare an einem schräg gestellten, mit konz. H_2SO_4 gefüllten Manometerrohr anzeigen; man eicht diese vorher mit Luftstrom von gleicher Stärke (Waschflasche, Stoppuhr) u. stellt während des Vers. auf dieselben Manometerstände ein. Zur Best. des Mol.-Gew. stellt man sich für jedes Lösungsm. eine empirische „Azobenzolskala“ her, welche die zusammengehörigen Werte von Dampfdruckdifferenz (ausgedrückt in Interferometertrommelteilen) u. Azobenzolmolarität tabellar. oder graph. zusammenstellt; nach dem bekannten Mol.-Gew. des Azobenzols u. der oben genannten Konz. der zu untersuchenden Lsg. gibt diese Skala zusammengehörige Werte von Trommelteilen u. Mol. Geww. der zu untersuchenden Substanz, zwischen denen interpoliert wird. — Belegbest. in Bzl., Aceton u. CCl_4 ; Bzl. gibt die höchsten Trommelablesungen. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. **57**. 1829—34. 1924. Darmstadt, Techn. Hochsch.)

ARNDT.

A. Michels, *Genauigkeit und Empfindlichkeit einer Druckwaage mit einem sogenannten Amagatzylinder*. (Koninkl. Akad. van Wetensch. Amsterdam, Wisk. en Natk. Afd. **33**. 496—99. — C. **1924**. I. 2893.)

JOSEPHY.

D. R. Sperry, *Welches ist das passendste Filter?* Vf. unterscheidet folgende Arten von Filtern: Offene Filter, Blattfilter, Quetschfilter, Centrifugalfilter u. Plattenfilter. Die verschiedenen Arten werden ausführlich beschrieben. Zum Schluß bringt Vf. die Gesichtspunkte, nach denen für die jeweils zu filtrierende Fl. das geeignetste Filter auszuwählen ist. Aus einer beigegebenen kleinen schemat. Übersicht kann man mit Leichtigkeit das für den jeweiligen Zweck beste Filter ersehen. (Chem. Metallurg. Engineering. **31**. 422—28. 1924.)

GOTTFRIED.

L. Zakarias, *Die glühbaren Polydynfilter für Kolloidfiltration (Ultrafiltration) und quantitative Analysen*. (Kolloid-Ztschr. **35**. 179—80. 1924. — C. **1924**. II. 865.)

BIKEMAN.

Löwenstein, *Elektrische Hochtemperaturöfen*. Vf. beschreibt einen elektr. Widerstandsofen für 3000° , dessen Heizrohr aus Kohle besteht; er wird in 4 verschiedenen Größen vom Göttinger Elektro-Schaltwerk A.-G. für einen Einsatz von 40 bis 385 ccm gebaut. (Chem. Apparatur **11**. 146—47. 1924. Göttingen.)

NEIDH.

Robert C. Frederick, *Neue Flasche zum Gebrauche am Soxhlet'schen Apparat*. Vf. verwendet Fläschchen aus dünnem Glase mit ebenem Boden (Durchmesser 6,8 cm), von da senkrecht aufsteigenden Wänden, mit starker Einschnürung zum Halse; Halsdurchmesser 2,7 cm, Höhe vom Boden bis zum oberen Ende des Halses, 5,5 cm. (Analyst **49**. 474. 1924. Greenwich, Royal Naval College.)

RÜHLE.

W. J. Gooderham, *Mit einem Kondensator kombinierte Fraktionierkolonne*. Der Dampf der erhitzten Fl. steigt durch eine Röhre, die die Fraktioniereinsätze enthält, in eine hierzu konzentr. gelagerte Röhre, die durch einen gewöhnlichen Kühler gekühlt wird; am unteren Ende der mittleren Röhre ist eine Ausflußöffnung angebracht. (Journ. Chem. Soc. London **125**. 2197. 1924. South Kensington, Roy. Coll. of Sc.)

HABERLAND.

A. Gutbier und Theo Payer, *Ein neuer Sublimationsapparat*. Der im Original abgebildete App. zur Sublimation von schwer flüchtigen, bei höheren Temp. leicht zersetzlichen oder reduzierbaren Stoffen oder Substanzen, die auch in der Nähe des Sublimationspunktes Fl. wie W., Säuren usw. hartnäckig zurückhalten, besteht aus einer in einem Schamotteofen untergebrachten Hartglasretorte u. zwei durch Kühler verbundenen Vorlagen. Das Ableitungsrohr ist mit Schamotte umkleidet; in das Rohr ist eine sich fest an die Wandungen anschmiegende Platinfolie gelegt, so daß das Rohr frei von Ansatz bleibt. Das Material der Stopfen ist Asbest mit Wasser-

glas. Das Rohr des die Vorlagen verbindenden Kühlers ist in der ersten Vorlage etwas nach oben gebogen. Durch den App. wird Gas gesaugt, das durch ein Sicherheitsventil eintritt. Das Zuleitungsrohr ist am Ende des Retortenhalses nach dem Platineylinder zu umgebogen; der Gasstrom drückt alle Dämpfe u. Sublimation prodd. fort. Die Arbeitsweise wird an der Sublimation von Se(4)-oxyd erklärt (Chem.-Ztg. **48**. 807—8. 1924. Jena, Univ.)

JUNG.

Harper F. Zoller, *Organische Kältelösungen*. Vf. empfiehlt den Ersatz d. üblichen Kältemischungen durch organ. Verbb. oder deren Lsgg., welche für sich in einer Eismischung abgekühlt werden. Als solche kommen Alkohole u. Glucose in Frage. Gegenüber den anorgan. Mischungen haben sie den Vorteil, daß sie in wss. Lsg. fast nicht ionisieren u. deshalb stark negativ geladen sind. Sie greife Metalle nicht an, sind handlich, haben niederen Dampfdruck, so daß ihre Flüchtigkeit zu vernachlässigen ist. (Ind. and Engin. Chem. **16**. 1073—75. 1924. Detroit [Mich.])

GRIMME.

Paul E. Klopsteg, *Eine Notiz über die Ringmethode zur Messung der Oberflächenspannung*. Vf. stellt fest, daß bei der üblichen Methode, die Oberflächenspannung durch Herausziehen eines auf der Fl. liegenden Ringes zu messen, zu große Werte erzielt werden, daß jedoch mit anderen Methoden übereinstimmende Resultate erhalten werden, wenn man das Flüssigkeitsgefäß senkt u. den Ring fest hält. (Science **60**. 319—20. 1924. Central Scientific Co.)

BECKER.

F. Henning und W. Heuse, *Über ein Mikropyrometer mit spektraler Zerlegung und die optisch beobachteten Schmelzpunkte einiger Platinmetalle*. Nach allgemeinen theoret. Erörterungen über die Strahlungseigenschaften von Metallen wird ein Mikrospektralpyrometer u. seine Eichung beschrieben. Mit diesem Instrument werden die schwarzen Tempp. der FF. von Pt, Pd, Rh, Ir gemessen. Schmelzendes Ir strahlt im sichtbaren Gebiet wie ein schwarzer Körper von 1810° , dessen Helligkeit für alle Wellenlängen um den Faktor 4,179 geschwächt ist. Sein F. kann als Fixpunkt für opt. Messungen dienen u. bei der Eichung von Pyrometerlampen als Ersatz für einen schwarzen Körper von bekannter Temp. verwendet werden. (Ztsch. f. Physik **29**. 157—74. 1924. Charlottenburg, Physikal. Techn. Reichsanstalt.)

L. Bertiaux, *Apparat mit rotierender Anode zur elektrolytischen Schnellanalyse* (Ann. Chim. analyt. appl. [2] **6**. 257—64. 1924. — C. 1924. II. 2065.)

BEHRLE.

G. C. Heringa, *Die Benutzung der Gelatine zum Aufkleben der Gefrierschnitte* (Ergänzung der früher (C. r. soc. de biologie **91**. 671; C. 1924. II. 2188) beschriebenen Einbettungsmethode. (C. r. soc. de biologie **91**. 951. 1924. Utrecht Univ.)

SPIEGEL.

Einar Westblad, *Eine Methode zur Fixierung und zum Einschuß mit Alizarin vitalgefärbter Objekte*. Als gutes Fixierungsmittel für mit Alizarin gefärbte Präparate ergab sich Kalkwasser. Als Einschlußmittel dient Cedernöl. (Zool. Anz. **59**. 21 bis 223. Göteborg, Naturhist. Museum; Ber. ges. Physiol. **27**. 39—40. 1924. ROTHIG.)

SPIEGEL.

W. A. Collier, *Ausschaltung des Wasserfehlers bei der Giemsa-Färbung durch Phosphatpufferung*. Bei Verwendung einer auf eine $[\text{H}^+]$ von $\text{pH} = 7,1$ in molarer Konz. von etwa $\text{m}/50$ eingestellten Phosphatpufferung ist man völlig unabhängig von der Beschaffenheit des W. — Während sonst zur Erzielung einer wirklichen guten Azur-Eosin-Methylenblaufärbung absol. neutrales dest. W. erforderlich ist, gibt nach obiger Methode jedes beliebige käufliche dest. W. gute Färbungen. Die genaue Herst. der Lösung wird angegeben. (Dtsch. med. Wchschr. **50**. 1325. 1924. Frankfurt a. M., GEORG SPEYER-Haus.)

FRANK.

B. D. H. Watters, *Über den Austritt der Strahlung aus dem Quarzquecksilberbogen während der Periode nach dem ersten Zünden*, Vf. bestimmt die Spannung, Stromstärke u. Farbtiefe bei einer Quecksilberlampe im Verlauf der ersten 8 Min.

nach der Zündung. Die Farbtiefe, welche durch die Schwärzung eines AgCl-Papieres während einer Belichtungszeit von 30 Sek. gemessen wurde zeigte bei kleinen Spannungen (119 V.) sofort nach dem Zünden einen Höchstwert, welcher nach einer Min. Brenndauer auf ein Minimum herabging, dann wieder anstieg ohne das Maximum am Anfang wieder zu erreichen u. nach 8 Min. konstant blieb. Bei höheren Spannungen (160 V.) dagegen überschritt der Endwert den Anfangswert, nachdem auch hier ein Minimum durchlaufen worden war. Die Spannung zeigt nach der Zündung den tiefsten Wert, um dann langsam anzusteigen, wobei nach 8 Min. eine Konstanz erreicht wurde. Dagegen zeigte die Stromstärke das umgekehrte Verh. Aufnahme des Spektrums zeigte ebenfalls erst nach 8 Min. Brenndauer eine vollständige Entwicklung der Linien. (Philos. Magazine [6] **48**. 527—34. 1924. Middlesex Hospital.)

BECKER.

William C. Bray und Harry East Miller, *Die Einstellung von Thiosulfatlösung nach der Permanganat-Jodid- und der Dichromat-Jodidmethode*. Bei Best. der Konz. von $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ -Lsg. nach der Permanganatmethode (KMnO_4 war gegen $\text{Na}_2\text{C}_2\text{O}_4$ eingestellt) u. nach der Dichromatmethode (vgl. VOSBURGH, Journ. Americ. Chem. Soc. **44**. 2120; C. 1923. II. 219) zeigte sich, daß beide Methoden innerhalb 0,1% übereinstimmen. Die Menge des bei der Rk. zwischen KMnO_4 , KJ u. Säure ausgeschiedenen J_2 bleibt konstant, wenn das Vol. der Lsg. u. die KJ- u. Säuremengen innerhalb weiter Grenzen variiert werden, das beweist, daß dabei keine Nebenrk. stattfinden. Bei der entsprechenden Dichromatr. müssen hingegen die von VOSBURGH angegebenen Bedingungen, insbesondere bei Ggw. von O_2 streng eingehalten werden. Nur wenn die KJ-Lsg. zuletzt zugegeben wird, dürfen die Säure- u. KJ-Konz. innerhalb enger Grenzen variiert werden. Wird zuletzt $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ zugesetzt, so wächst der durch O_2 verursachte Fehler sehr schnell mit der Konz. von KJ u. Säure, u. zwar kann der Fehler 0,4% betragen unter Bedingungen, unter denen die Permanganatmethode fehlerfrei verläuft. Wahrscheinlich ist die eingangs erwähnte Abweichung von 0,1% zwischen den beiden Methoden schon einem O_2 -Einfluß auf die Dichromat-Jodidrk. zuzuschreiben. Zur Erklärung der großen Wrkg. des O_2 wird angenommen, daß eine Zwischenverb. durch Rk. von O_2 , J' u. $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ gebildet wird, die mit Jodid in saurer Lsg. J_2 u. mit Dichromat O_2 bildet. Solche Eigenschaften besitzen Peroxyde oder Peroxysäuren. (Journ. Americ. Chem. Soc. **46**. 2204—11. 1924. Berkeley [Cal.], Univ.)

JOSEPHY.

L. Herboth, *Erfahrungen über den Gebrauch der Amidosulfonsäure als Ursubstanz in der Maßanalyse*. Die nach der Vorschrift von K. A. HOFMANN (Lehrb. d. anorgan. Ch. 4. Aufl. S. 174 [1922]) durch Sättigen einer konz. Lsg. von NH_4OH , HCl mit SO_2 zu erhaltende Amidosulfonsäure läßt sich, mit Dimethylaminoazobenzol als Indikator, an Stelle von Na_2CO_3 als Urtitersubstanz zur Einstellung von $1/10$ -n. Lsgg. verwenden. Die Abweichungen, die bei Verwendung anderer Indikatoren (Methylrot, Phenolphthalein, Rosolsäure) erhalten werden, sind so klein, daß sie für die Praxis nicht in Betracht kommen. Zur Einstellung einer $1/100$ -n. Lauge empfiehlt es sich, bei Verwendung von Jodeosin, etwas überzutitrieren u. dann auf schwache Rosafärbung zurückzutitrieren. Zum Nachweis der Amidosulfonsäure können folgende Rkk. dienen: beim Erwärmen der wss. Lsg. mit NaOH B. von NH_3 ; wss. Lsg. + BaCl_2 gibt das in verd. HCl unl. Ba-Salz; wss. Lsg. + HgNO_3 gibt Nd. von Hg -Verbb. (Arch. der Pharm. **262**. 517—19. 1924. Göttingen, Univ.)

HABERLAND.

W. Manchot und F. Oberhauser, *Bromometrische Bestimmungen*. (Vgl. Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. **138**. 357; C. 1924. II. 2576.) Vff. teilen neben einigen neuen Bestst. Nachträge u. Ergänzungen früherer Veröffentlichungen mit. Als bromometr. Maßf. in salzsaurer Lsg. wird anstelle der mit Bicarbonat hergestellten Arseniklsg. eine salzsaure Lsg. von As_2O_3 empfohlen, die an Haltbarkeit jener ebenbürtig ist. Die Lsg. von Br in 20%ig. HCl kann meist zweckmäßiger durch

eine 0,1-n. Br.-Lsg. in etwa 1-n. KBr ersetzt werden, besonders dann, wenn saure Lsgg. stören (vgl. MANCHOT u. STEINHÄUSER, Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. **138**. 304; C. **1924**. II. 2189). Zur Best. der Jodzahl ist jedoch die salzsaure Br.-Lsg. brauchbarer. Auch die mit gereinigten Eg. hergestellte Br.-Lsg. in Eg. ist für letzteren Zweck gut geeignet. Gemeinsam mit H. Wettstein wurden Bromspannungsmessungen von Bromlsgg. ausgeführt, als deren prakt. Ergebnis die Bestätigung der Erfahrungstatsache gefunden wurde, daß die Lsg. von Br in n.-KBr für den prakt. Gebrauch am meisten in Betracht kommt. Alkal. Br.-Lsgg. kann man je nach Bedarf durch Vermischen der Lsg. von Br in KBr mit der doppelt-theoret. Menge $\frac{1}{2}$ -n. NaOH herstellen. Gegen die Anwendung von Bromatlsg. haben Vff. aus Gründen der Schnelligkeit u. Sicherheit Bedenken. Als Indicatoren haben sich *Indigokarmin* u. die Mischung mit *Styphninsäure* bewährt.

Als einfachste u. schnellste aller Fe-Bestst. empfehlen Vff. die rein bromometr. in folgender Ausführung: Eine 0,1-n. Br.-Lsg. wird mit etwa $\frac{1}{2}$ -n. NaOH versetzt. Dann läßt man die reduzierte Ferrosalzlsg. unter die Oberfläche der Mischung einfließen, säuert an, gibt überschüssige arsenige Säure hinzu u. titriert deren Überschuß nach Zusatz von Phosphorsäure mit Br zurück. Man verwendet als Red.-Mittel SO_2 oder besser gefälltes Cd. — *Nitrite* lassen sich durch Br in Ggw. von NaHCO_3 in 5 Min. quantitativ oxydieren: $\text{NaNO}_2 + \text{H}_2\text{O} + \text{Br}_2 = \text{NaNO} + 2\text{HBr}$. Um ein Austreiben von Br durch die CO_2 zu verhindern, kann man alkal. arsenige Säure im Überschuß zufügen, ansäuern u. bis zum Äquivalenzpunkt titrieren. — Bei der Titration von Sb, die wie bei arseniger Säure vor sich geht, hat man der Lsg. Seignettesalz zuzusetzen. Außerdem empfiehlt sich die Anwendung von überschüssigem Br u. dann Rücktitration, weil die letzten Reste der Antimonigen Säure nur langsam durch Br oxydiert werden. — Bei der Best. des Sn durch Oxydation des SnCl_2 mit Bromkaliumbromid verschwindet der Indicator Indigokarmin zunächst u. erscheint kurz vor dem Endpunkt plötzlich wieder. — Zur direkten Best. alkal. H_2O_2 -Lsgg. gibt man das H_2O_2 zu der Hypobromitmischung. Nach der O_2 -Entw. säuert man an u. titriert das auftretende Br zurück. — Nach der früher mitgeteilten bromometr. Pb-Best. läßt sich analog auch Ba bestimmen. Es bedarf keiner eingestellten Chromatlsg., wenn man die im Nd. gebundene Chromsäure bestimmt. — MnO_2 , PbO_2 , *Chromsäure* u. unl. *Chromate* lassen sich unter Vermeidung des lästigen Destillierens mit HCl bestimmen. Man gibt MnO_2 zur abgemessenen Menge überschüssiger arseniger Säure, setzt 0,5–1 g KBr sowie 30–40 ccm konz. HCl zu u. erwärmt auf 50–70°, bis das Superoxyd völlig gel. ist. Nach dem Abkühlen wird die Arsenige Säure mit Br titriert. Bei Ggw. von Fe setzt man etwas Natriumphosphat oder H_3PO_4 zu. — Reiner *Harnstoff* läßt sich nach der für NH_3 mitgeteilten Methode bestimmen, doch läßt man Hypobromit etwas länger (10–15 Min.) einwirken. — *Hypochlorite* fügt man zur alkal. gemachten arsenigen Säure u. titriert nach dem Ansäuern den Überschuß der arsenigen Säure mit Br zurück, was der Endpunktbest. durch Tüpfeln nach PENOT vorzuziehen ist. Diese rein bromometr. Methode, die für die Wertbest. des Chlorkalk von Wichtigkeit ist, vermeidet teure Reagentien u. wird durch Chlorate u. Ferrisalze nicht beeinflußt. — *Thiosulfat* kann mit Br quantitativ oxydiert werden; bei stärkeren Konz. arbeitet man jedoch besser in alkal. Lsg. u. verfährt wie bei der Best. von *schwefliger Säure* in alkal. Lsg., indem man unter die Oberfläche einer Hypobromitlsg. die schweflige Säure oder Sulfidlsg. einfließen läßt. Ebenso lassen sich H_2S u. alkal. *Sulfidlsgg.* nach diesem Prinzip bestimmen. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. **139**. 40–50. 1924. München, Techn. Hochsch.) HORST.

S. P. L. Sørensen und K. Linderstrøm-Lang, Über die Bestimmung und den Wert von π_0 bei elektrometrischen Messungen von Wasserstoffionenkonzentrationen. Vff. beabsichtigten eine Klärung folgender Fragen: 1. Ist bei Bestst. von $[\text{H}^+]$ durch

Messung des Potentials gegen die Pt-H₂-Elektrode der 0,1-n., der n., der 3,5-n., der gesätt. KCl-HgCl-Hg-Elektrode oder einer noch anderen der Vorzug zu geben? 2. Wie wird am besten das Diffusionspotential eliminiert? 3. Welcher Wert von π_0 soll als Norm angenommen werden, wenn man π_0 definiert als die EK. einer Zelle, deren einer Pol die 0,1-n. HgCl-Elektrode u. deren anderer Pol die Pt-H₂-Elektrode in einer an H⁺ n. Lsg. bei einem H₂-Druck von 1 at bei 18° ist, unter Ausschaltung des Diffusionspotentials? Zu dem Zweck wurden die EKK. der verschiedenen HgCl-Elektroden, die sich bei einigermaßen sorgfältiger Herst. u. Behandlung monatelang konstant halten, gemessen u. ihre Temperaturkoeffizienten bestimmt; auch mit der Chinhydronelektrode wurden Verss. angestellt. Die verschiedenen Methoden zur Elimination des Diffusionspotentials wurden experimentell geprüft. Ferner enthält die Arbeit ausführliche Betrachtungen über die Unterschiede von Ionenkonz. u. Aktivitäten. Die Ergebnisse führen zu nachstehenden Normierungsvorschlägen, die sich teilweise mit denen von CLARK (The Determination of Hydrogen Ions, 2. Aufl.) decken: Es ist scharf zu unterscheiden zwischen Konz. u. Aktivitäten von H⁺, zweckmäßig auch in den Beziehungen c_{H^+} , p_{H^+} u. π_0 einerseits u. a_{H^+} , p_{aH^+} u. $a\pi_0$ andererseits. Als Standardwert für π_0 wird 0,3380 V, für $a\pi_0$ 0,3357 V. vorgeschlagen; bei der Definition von $a\pi_0$ tritt an Stelle der konz. 1,0-n. die Aktivität 1,0-n. für H⁺. Die Abhängigkeit von π_0 von der Temp. wird entsprechend den Angaben von CLARK (l. c.) angenommen. Bei Verwendung anderer als der 0,1-n. KCl-Calomelektrode empfiehlt sich Umrechnung auf diese; die Größe des Korrektionsterms α für die n. u. 3,5-n. Calomelektrode bei verschiedenen Temp. ist in einer Tabelle zusammengestellt. Die gesätt. KCl-HgCl-Elektrode ist nur als Arbeitselektrode zu verwenden u. unmittelbar vor oder nach den Messungen mit einer Elektrode von bekanntem Potential zu vergleichen. Auch für die Chinhydronelektrode werden Umrechnungszahlen angegeben. Das Diffusionspotential wird am besten nach der Extrapolationsmethode von BJERRUM (Ztschr. f. physik. Ch. 53. 428 [1905]) eliminiert. Bei Präzisionsmessungen verwendet man mehrere HgCl-Elektroden u. prüft deren Potential u. Konstanz mit einer frisch hergestellten gleichartigen Elektrode oder vorteilhafter mit einer H₂-Elektrode in 0,01-n. HCl + 0,09-n. KCl als Elektrolyt. Schließlich wird bzgl. des Vorzeichens für Potential u. Korrekturen die von der Deutschen Bunsengesellschaft angegebene Regelung zur allgemeinen Annahme empfohlen. (C. r. du Lab. Carlsberg 15. Nr. 6. 1924. 40 S.)

HERTER.

Erich Müller und Harald Aarflot, *Potentiometrische Bestimmungen mit Mercuroperchlorat*. Mit einer Mercuroperchloratlsg., die leicht frei von Mercurisalzen hergestellt werden kann, lassen sich Chloride u. Bromide an einer elektrolyt. verquecksilberten Pt-Elektrode genau potentiometr. bestimmen. Die Umschlagspotentiale sind für Cl +0,32, für Br +0,29 V gegen die Normal-Calomelektrode. Auch mit Jodiden, Cyaniden u. Rhodaniden lassen sich Titrationen ausführen, die dann genau sind, wenn man die Lsgg. zum Mercuroperchlorat zulaufen läßt. Umgekehrt treten Fehler bis zu 0,8% u. beim Cyanid noch größere Abweichungen auf. Der Zerfall von Hg₂J₂ in HgJ₂ u. Hg ist für den Endeffekt nicht ausschlaggebend, welcher stets so ist, als ob die Rk. $Hg_2^{2+} + 2J^- = Hg_2J_2$ stattgefunden hätte. Dasselbe gilt für Cyanide u. Rhodanide. Chloride lassen sich auch mit Mercuriperchlorat potentiometr. titrieren. Das Umschlagspotential liegt für Mercuriperchlorat bei +0,41 (für Mercuroperchlorat bei +0,32). Mercurio u. Mercuri mit Chlorid nebeneinander zu bestimmen, ließ sich nicht verwirklichen. (Rec. trav. chim. Pays-Bas 43. 874—78. 1924. Dresden.)

HORST.

Stephan G. Simpson, *Ein Mischindicator für Carbonat-Dicarbonattitrationen*. Vf. empfiehlt als Indicator eine Lsg. aus 1 Teil Kresobrot u. 6 Teilen Thymolblau, welche bei Ggw. von Na₂CO₃ von Blau in Rot ausschlägt u. bei weiterem Säure-

zusatz in Orangegelb übergeht, so daß man weiter gegen Methylorange etwa vor handenes NaHCO_3 titrieren kann. Für letzteren Zweck eignet sich jedoch noch besser als Indicator *Bromphenolblau*, welches von Blau in Rot umschlägt. Man titriert zunächst das Na_2CO_3 bis zum Umschlagen in Rot mit Thymolblau-Kresolrot (0,03 g Thymolblau + 1,42 ccm 0,05-n. NaOH verd. auf 25 ccm gemischt mit 0,01 g Kresolrot + 0,58 ccm 0,05-n. NaOH verd. auf 25 ccm), gibt dann einige Tropfen Bromphenolblau (0,02 g + 0,66 ccm, 0,05-n. NaOH verd. auf 25 ccm) hinzu u. titriert NaHCO_3 bis zum Umschlag Blau in Rot. (Ind. and Engin. Chem. 16 709. 1924. Cambridge [Mass.]) GRIMME.

K. Josephson und K. Sjöberg, *Zur Mikrobestimmung des Phosphors organischer Substanzen*. Die Zerstörung der organ. Substanz unter gleichzeitiger Überführung des P in Phosphorsäure erfolgt durch die Zusammenwrkg. von konz. H_2SO_4 u. H_2O_2 , alle übrigen Einzelheiten werden nach den Vorschriften LIEBS unter Anwendung der Preglschen Mikroapparatur ausgeführt. Analyse: Die abgewogene Substanz wird in einem Kolben, in dem nachher auch P als Ammoniumphosphormolybdat gefällt wird, mit 1 ccm reiner konz. H_2SO_4 übergossen, nach dem Erhitzen zum beginnenden Sieden mit 2 oder 3 Tropfen reinem Perhydrol zers., nochmals zum Sieden erhitzt u. H_2O_2 zugegeben bis zur vollständigen Entfärbung. Die Fällung des P erfolgt nach bekannter Methode. Die gegen die Vorschriften von LIEB veränderte Säurekonz. hat, wie Vf. an einer Reihe von Analysenwerten zeigen, keinen Einfluß auf die Zus. des Ammoniumphosphormolybdats, so daß die von LIEB gegebene Phosphorfaktor 0,014524 ($\log F = 0,16209 - 2$) auch bei diesen Analysen angewandt werden kann. (Svensk. Kem. Tidskr. 36. 267—72 1924. Stockholm, Hochsch.) ZANDER.

Lewis Reeve, *Eine neue Methode zur Mikrogasanalyse*. Es wird eine Apparatur angegeben zur Best. von O_2 , CO_2 , CO, H_2 , KW-stoffen u. Formaldehyd bei einem Gesamtgasvol. von 0,005—0,05 ccm. Anwendung von Hähnen ist völlig vermieden, die Pipette ist oben durch ein mit Hg gefülltes U-Rohr verschlossen. Die Best. von CO_2 geschieht durch Überführung der gemessenen Gasmenge in ein Zylinderchen über Hg, Absorption durch Einführen eines kleinen Stückchens von festem KOH u. neue Messung des Vol. Die im Eudiometer maximal zur Explosion bringende Gasmenge beträgt ca. 0,0075 ccm, entsprechend 0,001 ccm CO oder H_2 . Bzgl. der konstruktiven Einzelheiten der Apparatur u. ihrer Handhabung muß auf das Original verwiesen werden. (Journ. Chem. Soc. London 125. 1946—54 1924. London, King's Coll.) HERTER.

Elemente und anorganische Verbindungen.

H. Bahr und W. v. d. Heide, *Schnellbestimmung von Schwefel, besonders in Kohlen*. Das Verf. beruht darauf, daß die Kohle mit Al-Grieß u. BaO_2 briquettiert u. entzündet wird. Die Schmelze enthält den gesamten S als Sulfid; der mit HCl entwickelte H_2S wird in Cd-Acetatlg. aufgefangen u. CdS mit J u. Thioisulfat titriert. Die Schmelze enthält Al_2O_3 , BaO, BaS, BaC, AlC, Al-Ba-Legierung, C bzw. verkotte organ. Substanz. Ob sie auch Nitrid enthält, ist noch nicht festgestellt. Das Verf. ist auch geeignet zur Best. von S in *Pyrit u. Gips*. Für Koks arbeitet das Verf. nicht zuverlässig. Die Ggw. von Feuchtigkeit ist notwendig. Bei Steinkohlen ergab Zumischung von Eschkamischung richtige Werte bis auf eine Ausnahme. (Ztschr. f. angew. Ch. 37. 848—51. 1924. Clausthal.) JUNG.

Nobuji Sasaki, *Neue maßanalytische Bestimmung von Jodiden*. Das Prinzip der Methode besteht darin, daß das Jodid in genügend saurer Lsg. durch überschüssiges $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ in freies Jod u. das Bichromat seinerseits durch überschüssiges Ferrosalz in Chromsalz schnell u. vollständig umgesetzt wird, während die Rk zwischen dem Jod u. dem Ferrisalz bei Ggw. von Ferrosalz, sowie auch die

zwischen dem freien Jod u. dem Ferrosalz nur äußerst langsam vor sich geht. Der Zusatz von Ferrosalz erfolgt 10–60 Sek. nach Zugabe der Bichromatlg. Hierauf erfolgt sofort die Titration mit Thiosulfat. Auf diese Weise kann man 1 mg-Äquivalent Jodid bei Ggw. gleicher Mengen Bromid u. 80fach so großer Mengen Chlorid genau bestimmen. Die Wirkungsdauer des Bichromats muß in diesen Fällen möglichst kurz bemessen sein. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. **139**. 394–96. 1924. Kyoto, Univ.)

GOTTFRIED.

P. Fleury und H. Levaltier, *Untersuchungen über die Kjeldahlsche Stickstoffbestimmung und ihre Modifikationen*. II. (I. vgl. Journ. Pharm. et Chim. [7] **29**. 37; C. **1924**. I. 1835.) Mit der beim Casein erprobten Aufschlußmischung, 5 ccm eine H_2SO_4 , 15 ccm H_3PO_4 von 60° Bé., 5 g K_2SO_4 , wurde die Anwendbarkeit des Verf. auf eine Reihe anderer Stoffe erprobt. Es zeigten sich leicht (in $< \frac{1}{2}$ Stde.) aufschließbar *Dimethylamin (HCl-Salz)*, *Anilin*, *Saccharin*, *Phenacetin*, *Harnstoff*, *Harnsäure*, *Kaffein*, *Amygdalin*, *Bakankosin*; schwer, aber selten ($> \frac{1}{2}$ Stdn.) aufschließbar *Kreatin*, *Skatol*, *Isatin*, *Chinin* (bas. Sulfat), *Piperazinhydrat*, *Morphin (HCl-Salz)*, *Brucin* (neutrales Sulfat), *Strychnin* (desgl.), *Betain (HCl-Salz)*, *Cholin (HCl-Salz)*, *Atropin* (neutrales Sulfat), *Tyrosin*, *Pyridin*; aufschließbar bei Ggw. von Benzoesäure (ca. 2 Stdn.) *NaNO₃*, *Benzonitril*, *Oxime* von Benzophenon u. Aceton, *Benzolazobenzol*, *Piperidin*, nach Red. mit Zn *Pikrinäure*, *m-Dinitrobenzol*, *Phenylhydrazin*, *Mannosehydraton*, *Glucosazon*, durch Kombination beider Reduktionsmethoden *Semicarbazid* u. *Semicarbazone*. Keinen vollständigen Aufschluß erhielt Vf. bei *Antipyrin* u. *Pyramidon*; am besten wirkte das Verf. hier noch bei Ggw. von Benzoesäure. Es werden noch Ausführungsvorschriften für die verschiedenen Modifikationen gegeben. (Journ. Pharm. et Chim. [7] **30**. 265–72. 1924. Paris, Fac. de Pharm.)

SPIEGEL.

Friedrich L. Hahn und Hans Wolf, *Die Trennung von Arsen und Antimon durch Destillation*. Die Ursache des Mitübergehens von Sb bei der Trennung von As u. Sb ist nach den Unterss. der Vff. nicht in der Methode zu suchen, sondern in der mangelnden Vollkommenheit der bisher verwandten Apparatur begründet. Wenn der Dest.-Kolben auf einem Drahtnetz stehend mit großer tiefstehender Flamme erhitzt wurde, konnten aufspritzende Teile der Lsg., die an der oberen überhitzten Kolbenwand eintrockneten, leicht Veranlassung geben, daß Antimonchlorid im Dampfstrom mitgerissen wird. Verwendet man den von den Vff. vorgeschlagenen u. von der Firma O. E. KOBE, Marburg, lieferbaren Kolben mit destilliereinsatz (Figur im Original), so kann in kurzer Zeit das gesamte As ohne große Vorsicht überdest. werden u. ohne daß Sb mit in das Destillat gerissen wird. Als Red.-Mittel wurde Hydrazinsulfat verwandt. Zur Erleichterung der Dest. können verschiedene Stoffe, auch MgCl_2 u. CaCl_2 , dienen. Trotz des starken Gehalts an HCl oxydiert sich die As-Lsg. allmählich, wie quantitative Verss. darlegten. Zur Trennung dest. man in etwa $\frac{1}{2}$ Stde. 80–90 ccm Fl. über, die dann das gesamte As enthält. Sb drang in den meisten Fällen kaum bis ins Innere des destilliereinsatzes ein. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. **57**. 1858–60. 1924. Frankfurt a. M. Univ.)

HORST.

Edward Mortimer Crowther und Wallace Stanley Martin, *Die volumetrische Bestimmung der Gesamtkohlensäure in verdünnten Lösungen von Calciumdicarbonat in harten Leitungswässern*. Der Gehalt von Wässern an Dicarbonat läßt sich leicht durch Titration mit Säure unter Verwendung von Methylrot als Indicator bestimmen, das freie CO_2 nur als Differenz von Gesamt- CO_2 u. Dicarbonat. Die Best. des Gesamt- CO_2 geschieht nach TREADWELL (Quantitative Analyse, 9. Aufl. 1921, S. 509) durch Versetzen mit einem Überschuß von $\text{Ba(OH)}_2 + \text{BaCl}_2$ u. Titration des überschüssigen Ba(OH)_2 mit HCl gegen Phenolphthalein. Nach JOHNSTON (Journ. Amer. Chem. Soc. **33**. 947; C. **1916**. II. 690) erhält man genaue Werte

nur, wenn nur Alkalimetalle zugegen sind. Vff. fanden, daß in hartem Leitungswasser u. in Lsgg. von $\text{CaH}_2(\text{CO}_3)_2$ mit $\text{Ba}(\text{OH})_2$ oder $\text{Ca}(\text{OH})_2$ ohne Salzzusatz gänzlich ungenügende Werte erzielt werden, mit Salzzusatz genaue auch erst nach ca. 3-std. Stehen der Fll. nach Zusatz des Reagens. Sie führen als wahrscheinlichen Grund an, daß die frisch gefällten Erdalkalicarbonate leichter l. sind als nach längerem Stehen. Sie konnten 10 Min. nach Zusatz des Reagens genaue Resultate erzielen, wenn sie der $\text{Ca}(\text{OH})_2$ - CaCl_2 -Lsg. etwas festes CaCO_3 zusetzten wodurch ein schnelles „Altern“ des entstehenden Nd. erreicht wird. (Journ. Chem. Soc. London **125**, 1937—39. 1924. Harpenden.)

HERTER.

Th. Döring, *Fortschritte auf dem Gebiete der Metallanalyse im Jahre 1923*. (Chem.-Ztg. **48**, 525—26. 557—58. 589—90. 609—10. 634—36. 677—78. 747—48. 777—80. 786—87. 1924.)

JUNG.

I. M. Kolthoff und O. Tomiček, *Die Anwendung von Titanochlorid bei potentiometrischen Titrationen. II. Reinheit, Darstellung und Einstellung der Titrationsflüssigkeit*. (I. vgl. Rec. trav. chim. Pays-Bas **43**, 768; C. **1924**, II. 2776.) Die Handelsprodd. von TiCl_3 sind stets Fe-haltig. Zur Darst. Fe-freier Lsgg. wurde die Lsg. von techn. TiCl_3 in Eiskochsalzkühlung mit HCl -Gas gesätt., u. bei tiefer Temp. gehalten, bis sich möglichst viel $\text{TiCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ in violetten Krystallen aus geschieden hat, was 1—2 Tage dauert. Die Krystalle werden so schnell wie möglich abgesaugt u. mit eiskalter HCl gewaschen. Das so dargestellte $\text{TiCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ enthält so wenig Fe, daß dieses bei den Titrationen ganz vernachlässigt werden konnte. In Lsgg. techn. Prodd. läßt sich der Nachweis von Fe sehr leicht führen, die Lsg. wird gekocht, mit HNO_3 oxydiert, in den abgekühlten Lsgg. entsteht mit $\text{K}_4\text{Fe}(\text{CN})_6$ in Fe-freien Lsgg. braunes $\text{TiFe}(\text{CN})_6$, bei Ggw. von Fe färben sich Fl. u. Nd. grün oder grünblau, mit KSCN wird die bekannte Rotfärbung erhalten. Der Fe-Gehalt kann quantitativ durch potentiometr. Titration mit $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ bestimmt werden, indem man die mit HCl verd. TiCl_3 -Lsg. aus einer Bürette zur $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ Lsg. zufließen läßt. Bichromat wird durch Titanosalz zu Chromisalz reduziert während gleichzeitig der Überschuß des Bichromats Ferro- zu Ferrisalz oxydiert, dieses wird aber nach vollständiger Red. des Bichromats von Titanosalz wieder zu Ferro reduziert. Es werden also bei Fe-haltigen Lsgg. 2 Potentialsprünge, eine nach der Red. von $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ u. einer nach der Red. von Fe^{III} , auftreten. Aus den Verbrauch an TiCl_3 zwischen den beiden Sprüngen ergibt sich der Fe-Gehalt. Die meisten Handelsprodd. sind auch noch mit H_2S verunreinigt. — Die sauren Lsgg. des reinen TiCl_3 sind, wenn sie vor Oxydation geschützt werden, ziemlich beständig. Ein App. zur Ausführung potentiometr. Titrationen mit stark sauren TiCl_3 -Lsgg. unter Vermeidung von Luftoxydation u. Gummischläuchen, die von den sauren Lsgg. angegriffen werden, ist beschrieben u. gezeichnet. Zur Einstellung der Titrationsfl. eignen sich am besten $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$, $\text{K}_4\text{Fe}(\text{CN})_6$ u. $\text{Fe}(\text{NH}_4)(\text{SO}_4)_2 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$. Bei Ggw. von Fe in der TiCl_3 -Lsg. erhält man mit $\text{K}_4\text{Fe}(\text{CN})_6$ nur einen Potentialsprung, dieser entspricht dem ersten mit Bichromat, mit Ferriammoniumsulfat wird ebenfalls nur ein Sprung erhalten, dieser entspricht aber genau dem zweiten mit Bichromat. (Rec. trav. chim. Pays-Bas **43**, 775—83. 1924.)

JOSEPHY.

O. Tomiček, *Die Anwendung von Titanochlorid bei potentiometrischen Titrationen III. Die Bestimmung oxydierender Anionen*. (II. vgl. vorst. Ref.) Vorausgeschickt wird, daß alle Titrationen zur Vermeidung der Oxydation durch die Luft in CO_2 Atm. ausgeführt wurden. *Permanganat* kann nicht mit TiCl_3 titriert werden, weil der Gehalt der Lsg. an HCl zu groß ist, auch nicht bei Zusatz großer Mengen NaAcetat . *Bichromat* läßt sich gut mit TiCl_3 titrieren (vgl. vorst. Ref.). Am Äquivalenzpunkt beträgt der Potentialsprung bei 0,025 cem 0,1-n. TiCl_3 -Lsg. bei gewöhnlicher Temp. 600 mV. Bei 50—60° wird das Potential schnell wieder konstant bei gewöhnlicher Temp. dauert es einige Min. Die Bichromatlg. braucht vor der

Titration nicht mehr angesäuert zu werden. Der Wert des Potentials, bei dem der Sprung erfolgt, hängt von der Acidität der Lsg. ab. — $K_3Fe(CN)_6$ eignet sich ebenfalls zur Normierung der $TiCl_3$ -Lsg., die Titration ist bei gewöhnlicher Temp. auszuführen. Innerhalb weiter Grenzen ist die Acidität ohne Einfluß auf die Ergebnisse. Der Sprung beträgt bei 0,025 ccm 0,1-n. $TiCl_3$ -Lsg. 50–60 mV, doch ändert sich das Potential, wahrscheinlich infolge B. wl. Komplexsalze, nur langsam. In tartrathaltiger Lsg. beträgt das Potentialgefälle 0,272 V. Bei Unters. von *Ammoniumvanadat* fand Vf., daß sich dieses wie mit Ferrosalz auch mit Titanosalz titrieren läßt. Beim ersten Sprung ist vierwertiges Vanadylsalz gebildet. Dann setzt man Tartrat zu u. red. jetzt bei 50–60° weiter bis zu dreiwertigem Vanadium. Der erste Sprung tritt etwa bei 280 mV, mit Fe-haltiger Lsg. bei 540 mV ein, der zweite bei –120 mV bei 50–60°. Bei Fe-haltiger $TiCl_3$ -Lsg. treten 3 Potentialsprünge auf. — Im Gegensatz zu WILLARD u. FENWICK (Journ. Americ. Chem. Soc. **45**. 1923; C. 1924. I. 503) findet Vf., daß sich *Molybdat* sehr genau mit $TiCl_3$ titrieren läßt, wenn die Best. in saurer Lsg. bei 75–85° vorgenommen wird. Phosphat stört dabei. — Bei Titration der Halogenate mit $TiCl_3$ konnte Vf. die Resultate von HENDRIXSON (Journ. Americ. Chem. Soc. **45**. 2013; C. 1924. I. 2388) bestätigen. Diese Bestst. wurden ohne CO_2 ausgeführt. Bei Titration von JO_3^- in mit HCl angesäuerter Lsg. treten 3 Potentialsprünge auf, erst wird HJO_3 zu HJO red., dann diese zu J_2 , das weiter zu HJ red. wird. — Die Titration von *Selenit* wird am besten bei 50–60° ausgeführt, dabei ist eine HCl-Konz. von wenigstens 10% (vgl. WILLARD u. FENWICK, l. c.) erforderlich u. Ggw. von NaCl wirkt günstig. Mit seleniger Säure werden Ferri- u. Cuprisalze gleichzeitig reduziert. Nitrite, Nitrate u. Persalze mit Titanosalzen zu titrieren, gelang nicht. (Rec. trav. chim. Pays-Bas **43**. 784–97. 1924.)

JOSEPHY.

O. Tomiček, Die Anwendung von Titanochlorid bei potentiometrischen Titrationen. IV. Die Bestimmung oxydierender Kationen. (III. vgl. vorst. Ref.) Fe^{III} läßt sich bei 55–60° sehr gut u. schnell potentiometr. mit $TiCl_3$ titrieren, sowohl in saurer Lsg. als auch bei Ggw. von Rochellesalz. H_3PO_4 stört dabei nicht. Fluorid erniedrigt das Oxydationspotential. In Ggw. von viel Fluorid werden keine guten Resultate mehr erhalten. In reiner, saurer Lsg. wird zur Titration von $CuSO_4$ zu viel $TiCl_3$ gebraucht. Die Resultate sind gut, wenn bei Zimmertemp. in Ggw. von KCNS titriert wird. KCNS kann auch durch KJ ersetzt werden. Bei Ggw. von Rochellesalz allein wird zu viel $TiCl_3$ verbraucht, hier verbessert KJ die Ergebnisse, während KCNS störend wirkt. — Bei 90–95° läßt sich 5-wertiges Sb in saurer Lsg. genau mit $TiCl_3$ titrieren, sogar bei Ggw. von H_3AsO_4 . — Uranylsalze werden durch Titanochlorid quantitativ zu Uranosalzen red. Sowohl in saurer Lsg. wie bei Ggw. von Rochellesalz ist die Best. bei 55–65° genau. Die HCl-Konz. soll 2% nicht überschreiten. Der Potentialsprung ist am größten in Ggw. von Rochellesalz. Sämtliche Titrationskurven sind im Original einzusehen. Besondere Sorgfalt muß darauf verwandt werden, die Lsg. vor Luft zu schützen. (Rec. trav. chim. Pays-Bas **43**. 798–807. 1924.)

JOSEPHY.

O. Tomiček, Die Anwendung von Titanochlorid bei potentiometrischen Titrationen. V. Die Bestimmung verschiedener Oxydationsmittel nebeneinander. (IV. vgl. vorst. Ref.) Wenn ein Gemisch zweier Oxydationsmittel mit verschiedenen Oxydationspotentialen mit einem Reduktionsmittel titriert wird, so wird zuerst das stärkere u. dann das schwächere Oxydationsmittel reduziert, u. zwar ist die Red. des ersten vollständig, bevor die des zweiten beginnt, wenn der Unterschied zwischen den Oxydationspotentialen groß genug ist (400–500 mV). Mit $TiCl_3$ ließen sich folgende Oxydationsmittel nebeneinander titrieren: $Cr_2O_7^{2-}$ u. Fe^{+++} , VO_3^- u. Fe^{+++} , $Cr_2O_7^{2-}$ u. Fe^{+++} , $Cr_2O_7^{2-}$ u. $Fe(CN)_6^{3-}$, Fe^{+++} u. Cu (auch in Ggw. von $Cr_2O_7^{2-}$),

Fe⁺⁺⁺ u. Uranylsalze, Fe⁺⁺⁺ u. Sb^v, Cu⁺⁺ u. Sb^v in Ggw. von Tartrat u. KJ. (Rec. trav. chim. Pays-Bas **43**. 808—15. 1924.) JOSEPHY.

Oldřich Tomiček, *Anwendung von TiCl₃ in der potentiometrischen Titration*. Vff. gibt eine Zusammenfassung seiner Arbeiten (vgl. vorst. Ref.) (Chemické Listy **18**. 210—20. 233—42. 1924.) STOJANOVÁ.

I. M. Kolthoff, *Die Titration von Ferri- und Cuprisalzen gesondert und nebeneinander und in Gegenwart von Antimon mit Titanochlorid*. (Vgl. vorvorst. Reff.) Wird Ferrisalz bei Zimmertemp. in Ggw. von Rhodanid als Indicator mit TiCl₃ titriert, so werden auch in CO₂-Atm. 1—2% TiCl₃ zu viel gebraucht. Gute Resultate werden erhalten, wenn man kurz vor dem Endpunkt 1—2 Min. nach der Zugabe jedes Tropfens auf den Farbumschlag wartet. Bei 50—60° kommt man schneller zum Ziel, direkt vor dem Endpunkt muß die Titrationsfl. tropfenweise zugesetzt werden. Cuprisalze lassen sich gut nach der Methode von RHEAD (Journ. Soc. Chem. Ind. **89**. 1491 [1906]) mit Titanosalzen titrieren. In Ggw. von Cuprisalzen erwies sich zur Titration von Ferrisalzen als geeigneter Indicator *Mekonsäure*; Cu⁺⁺ kann dann jodometr. bestimmt werden. Die Ggw. von Sb^v stört weder die Titration von Fe⁺⁺⁺, noch die von Cu⁺⁺, noch ihre Best. nebeneinander, da bei Zimmertemp. Sb^v nur langsam durch TiCl₃ red. wird. (Rec. trav. chim. Pays-Bas **43**. 816—22. 1924. Utrecht, Univ.) JOSEPHY.

Friedrich L. Hahn, *Widersprüche und Irrtümer in der analytischen Chemie*. **V. G. Scheiderer**, *Die Fällung von Magnesiumammoniumphosphat aus aluminiumhaltiger Lösung*. (IV. vgl. Ber. Dtsch. Chem. Ges. **55**. 3434; C. **1923**. II. 294.) Auf Grund zahlreicher u. variierender Verss. konnten Vff. feststellen, daß die Best. kleinster Mengen Mg als Magnesiumammoniumphosphat aus Al-haltiger Lsg. bei gleichzeitiger Anwesenheit von Weinsäure nicht möglich ist, da die Fällungen zum Teil verzögert oder überhaupt verhindert werden. In Al-freien Lsgg. ist die Fällung allerdings vollständig; doch treten bei Ggw. von Al erhebliche Fehler auf; zum Teil war Mg überhaupt nicht mehr nachzuweisen. Im Gegensatz zur Ansicht von WILKE-DÖRFURT (vgl. Siemenskonzern **3**. Nr. 2. 9; C. **1924**. II. 1118) können Vff. für Legierungen mit sehr wenig Mg (unter 1%) das Tartratverf. nicht empfehlen. Man trennt vorteilhafter Zn u. Al durch überschüssiges KOH von Mg (vgl. FETKENHEUER u. KONARSKY, Siemenskonzern **3**. Nr. 2. 19; C. **1924**. II. 1118), was sicherer, weniger teuer u. rascher zum Ziel führt. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. **57**. 1854—58. 1924. Frankfurt a. M., Univ.) HORST.

L. Rolla, V. Cuttica und L. Fernandes, *Über die Trennung des Yttriums von den anderen Elementen des Gadolinitis*. Nach kurzer Übersicht über die bisherigen Trennungsmethoden des Y von den anderen seltenen Erden, beschreiben Vff. ihr Verf., das darin besteht, daß sie feingepulverten Gadolinit in Königswasser lösten, zur Trockene dampften u. mehrere Stdn. auf 120° zur vollständigen Unlöslichmachung der SiO₂ erhitzen. Der Rückstand wurde mit HCl aufgenommen, gekocht, mit W. verd. u. abfiltriert. Die nun mit Oxalsäure gefüllten seltenen Erden wurden in Sulfate übergeführt u. zur Abscheidung eines Teiles der Elemente der Cerggruppe mehrmals mit K₂SO₄ behandelt. Die nicht gefüllten Erden wurden wieder gefällt u. in Sulfate überführt, u. zu der konz. w. Lsg. eine gesätt. Lsg. von Tl-Sulfat hinzugefügt. Die Lsg. wurde nun langsam verdampft u. so sechs Krystallisationen erhalten. Durch fortgesetzte fraktionierte Krystallisation unter teilweisem Zusatz von weiterem Tl-Sulfat reicherte sich das Y in den wenig löslichen Fraktionen immer weiter an. Nach insgesamt 40 Krystallisationen zeigte das so gewonnene Y spektr. nur noch ganz geringe Verunreinigungen. Das mit diesen Präparaten bestimmte At.-Gew. des Y ergab 88,7. (Gazz. chim. ital. **54**. 617—22. 1924. Florenz.) GOTTFRIED.

L. Fernandes, *Über die Fraktionierung der Cererden und die Trennung der verschiedenen Gruppen der seltenen Erden*. Das Verf. beruht darauf, daß die Sulfatsgg. der seltenen Erden mit TiSO_4 versetzt wurden. Die Lsg. wurde langsam eingedampft u. so fünf Krystallisationen erhalten. Die einzelnen Fraktionen wurden analysiert, u. zwar wurde auf Cer mit H_2O_2 in NH_3 -Lsg., auf Didym mit Hilfe des Adsorptionsspektrums u. auf La mittels des Bogenspektrums geprüft. Außer dem wurden von den einzelnen Fraktionen At.-Gew.-Bestst. gemacht. Es ergab sich, daß die erste Fraktion fast reines Cer, — das jedenfalls frei von La u. nur spurenweise Nd enthielt — u. die letzte Fraktion fast reines La enthielt. Die zweite Fraktion enthielt Cer u. Elemente der Didymgruppe im Überschuß, die dritte u. vierte Didym u. Lanthan. (Gazz. chim. ital. **54**. 623—28. 1924. Florenz.)

GOTTFRIED.

J. H. de Boer, *Eine Farbenreaktion auf Zirkon und Fluor*. Sofort nach Vermischung einer Lsg. eines Zr-Salzes mit einer wss. Lsg. von alizarinsulfosaurem Na entsteht violettrote Farbe, beim Stehenlassen nachdunkelnd. Erst durch sehr großen Überschuß von HCl (Gegensatz zu Al, Yt, Ce, Er, Tl, Nb, W, weniger schnell: Ti, Th, Mo, U). Übergang über orange nach gelb. 1 cem Zr-Lsg. mit 0,03 g Zr u. 5 cem Alizarinsulfosäurelsg. = 0,015 g des Salzes wurden mit 120 cem konz. HCl orange. Empfindlichkeit des Nachweises im Reagensglas noch 0,00002 g Zr/1 cem W. Bei Ggw. von $(\text{COOH})_2$, HClO , $\text{H}_2\text{S}_2\text{O}_3$ verläuft die Gelbfärbung mit HCl rascher; sehr stark beschleunigt F; Anwendung zum Nachweis von F: 2 cem 1%ig. Zr-Lsg. + 5 cem 0,3%ig. Alizarinsulfosäure + 60 cem konz. HCl färbt sich noch mit 0,000001 g F/1 cem gelb; bei 120 cem HCl statt 60 wird Empfindlichkeit verzehnfacht. Volumetr. Zr-Best. gelingt durch Titration mit NaF. (Chem. Weekblad **21**. 404—5. 1924. Eindhoven, PHILIPS Gloeilampenfabrieken.)

GROSZFELD.

Edgar Beyne, *Bestimmung des Zinks in eisenhaltigen Produkten*. (Rev. chimie ind. **33**. 164. — C. 1924. II. 1832.)

SÜVERN.

G. Canneri und L. Fernandes, *Die analytische Trennung der seltenen Erden vom Uran*. Alkalische Uranylsalicylate. Salicylsäure gibt mit U Komplexe, die durch Oxalate nicht gefällt werden, im Gegensatz zu den Salzen der seltenen Erden. Analyse. Die schwach saure Lsg. wird mit einem Überschuß von Salicylsäure, dann allmählich mit NH_3 versetzt (Rotfärbung). Die Lsg. darf nicht alkal. werden, sonst ist mit Salicylsäure anzusäuern. Darauf versetzt man mit einem kleinen Überschuß von konz. Ammoniumoxalatlg., erhitzt zum Sieden, läßt einige Min. absetzen, filtriert u. wäscht sorgfältig mit sd. Ammoniumoxalatlg. Das Filtrat, das das U enthält, wird mit konz. HCl angesäuert, abgekühlt, von der ausgeschiedenen Salicylsäure abfiltriert, mit k. W. gewaschen, mit HNO_3 zur Trockne eingedampft u. zur Zerstörung der organ. Substanz auf dem Sandbad erhitzt. Der Rückstand wird mit HCl aufgenommen, aufgeköcht, filtriert u. U durch langsames Einsetzen von NH_3 als Ammoniumpyrouranat gefällt. — Die B. der Uranylsalicylate wird durch Rotfärbung angezeigt, sie sind gegen Alkalien stabil, durch Mineral-säuren erfolgt Zers. $\text{C}_6\text{H}_4 < \begin{matrix} (1) \text{O} \cdot \text{UO}_3 \cdot \text{O} (1) \\ (2) \text{CO}_2\text{R} \text{ RO}_2\text{C} (2) \end{matrix} > \text{C}_6\text{H}_4$, R = Alkali. — Na-Salz, $\text{C}_6\text{H}_4[\text{COONa}]_2\text{O}_3\text{UO}_3 \cdot 9\text{H}_2\text{O}$, orangerote Nadeln, sl. in W. (blutrot) u. A. — K-Salz, mit $10\text{H}_2\text{O}$, orangerote Nadeln, noch besser l. — Ammoniumsalz, mit $13\text{H}_2\text{O}$. (Gazz. chim. ital. **54**. 770—73. 1924.)

ZANDER.

Eduard Zintl und August Rauch, *Potentiometrische Titration des Wismuts allein und neben Blei*. Nach krit. Würdigung der bis jetzt bekannten Methoden zur Best. des Bi geben Vf. ihr Verf. an, das auf potentiometr. Titration mit Hilfe von TiCl_3 beruht. Es kommen zwei Möglichkeiten in Frage, 1. die Oxydation des dreiwertigen Bi zum fünfwertigen oder umgekehrt. Dieser Weg erscheint aus-sichtslos, da eine quantitative Oxydation nicht gelingt. 2. Die Red. des dreiwertigen

Bi zum Metall oder umgekehrt. Vff. finden, daß die Red. in schwach saurer Lsg. dreiwertiges Bi schnell u. quantitativ als Metall abschneidet. Da in stärker saurer Lsg. TiCl_3 kein Bi fällt, da das Reduktionspotential $\text{Ti}^{\text{IV}}/\text{Ti}^{\text{III}}$ stark von der Acidität abhängig ist, bestimmen Vff. zunächst das Potential einer Bi-Elektrode gegen eine Lsg., die in 200 cem 3%ig. HCl-Lsg. einen Tropfen einer 0,1 n. BiCl_3 -Lsg. enthielt u. finden es zu -120 Millivolt, bezogen auf eine Kalomelektrode mit gesätt. KCl-Lsg. In essigsaurer Lsg. finden Vff. das Potential, da das Bi dort stärker komplex gebunden ist, unter gleichen Bedingungen zu -280 Millivolt. Zur vollständigen Ausfällung des Bi durch die äquivalente Menge TiCl_3 ist es nötig, daß ein sehr geringer Überschuß des Fällungsmittels ein Potential erzeugt, das wesentlich negativer ist als die oben angegebenen Werte. Als obere Grenze finden Vff. 0,4%ige HCl-Konz. Wegen der verwendeten Apparatur u. der prakt. Ausführung muß auf das Original verwiesen werden. Titriert wird bei etwa 80° . Nach den Verss. der Vff. eignet sich am besten eine Lsg., die 0,3% freie HCl enthält. Bei dieser Konz. bewirkte der letzte Tropfen TiCl_3 -Lsg. eine Potentialänderung von 94 Millivolt. Der Fehler betrug maximal 1 Tropfen 0,1-n. TiCl_3 -Lsg. gleich 0,2 mg Bi, unabhängig von der titrierten Bi-Menge. Sulfate stören die Best. nicht, dagegen muß die Lsg. frei von Nitrat sein, da dieses von TiCl_3 u. B. langsam reduziert wird. — In essigsaurer Lsg. ist der Potentialsprung infolge der geringen $[\text{H}^+]$ noch bedeutend schärfer. Der letzte Tropfen TiCl_3 -Lsg. bewirkt hier eine Potentialänderung von durchschnittlich 220 Millivolt. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. **139**. 397—410. 1924. München, Akad. d. Wissensch.) GOTTFRIED.

A. Jilek und Jan Lukas, *Zinnbestimmung und Trennung von Sn und W mit Hilfe der Schnellelektrolyse*. Die besten Bedingungen sind in schwach alkal. Lsg. gegeben bei höchstens 0,5 g Sn u. 0,15 g WO_3 . Man verfährt wie folgt: Die schwefelalkalische Sn- u. W-Lsg. (Na- oder K-alkalisch!) versetzt man mit 2—4 Seignette-Salz gel. in wenig W. u. 5 cem 20%ig. KOH u. oxydiert mit 5 cem (oder mehr) 30%ig. H_2O_2 . Überschüssiges H_2O_2 wird weggekocht; bei mehr als 0,1 g Sn u. größeren K_2SO_4 -Mengen kann dabei eine Trübung auftreten, die durch etwas Seignette-Salz beseitigt wird. Man setzt 1 g K_2HPO_4 zu u. elektrolysiert die Lsg. (sie soll nicht mehr als 150 cem betragen) in einer Pt-Schale mit rotierende Pt-Anode bei $60\text{--}70^\circ$, 3 A, 8—10 V u. 800 Umdrehungen in der Min., 3 Std. lang. Sn scheidet sich dabei in schöner silberglänzender Form aus. — Die gleiche Methode zur Trennung von Sn u. Mo benutzt, gibt weniger befriedigende Resultat da Mo in den Sn-Nd. übergeht; Sn u. V lassen sich auf diese Weise nicht trennen. (Chemické Listy **18**. 205—10. 1924. Prag, Tschech. Techn. Hochschule.) STOJANOV.

G. E. F. Lundell und H. B. Knowles, *Die Verwendung von kalten Lösungen bei der Reduktion nach Jones*. Die Verss. ergaben, daß Fe, Ti, Mo, V u. Cr b. der Red. nach JONES schon in der Kälte quantitativ reduziert werden. (Ind. an Engin. Chem. **16**. 723—24. 1924. Washington [D. C.]) GRIMME.

I. Koppel, *Die Trennung von Molybdän- und Wolframsäure*. Nach Versuche von Hedwig Tolde u. Hildegard Mölle. Das Verf. von STERBA-BÖHM u. VOSTREBAL (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. **110**. 81; C. **1920**. IV. 382) zur Best. von Mo als Sulfid in ameisensaurer Lsg. wurde vom Vf. zur Trennung von MoO_3 u. WO_3 verwendet. Im Filtrat vertreibt man die HCOOH durch Eindampfen u. etwas H_2SO_4 u. bestimmt W in bekannter Weise. (Chem.-Ztg. **48**. 801—2. 1924. Berlin.) JUNG.

Kinichi Someya, *Selective Bestimmung von Vanadium in Gegenwart von Eisen und Chrom*. I. Bestimmung von Vanadium in Gegenwart von Eisen. Vf. fand, daß sich die Methode von I. KNOP (vgl. Journ. Americ. Chem. Soc. **46**. 263; C. **1924**. 2188) unter Anwendung von Diphenylaminsulfat als Indicator, Eisen mit Bichromat lsg. zu titrieren, auch auf die Titration von Vanadumpentaoxyd oder Ammonium

vanadat mit Ferrosalzen übertragen läßt. Auf diesem Wege war eine selektive Best. von V in Ggw. von Fe ohne Elektrometrie möglich. Die zu den Verss. verwendete Lsg. von FeSO_4 u. schwefelsaurer Vanadinsäure wurde nach dem Mischen mit KMnO_4 oxydiert u. hierzu 15 ccm eines Gemisches von Phosphor- u. Schwefelsäure u. 3 Tropfen Indicatorlsg. gegeben. Man verd. mit W. auf 120–200 ccm u. titriert mit 0,1-n. Ferrosulfat bei 100°. In der Nähe des Endpunktes verblaßt die starkblaue Farbe zu Dunkelblaugrün, bei viel Eisen zu Graugrün. Als Ende der Rk. wird der Punkt angenommen, wo die völlige Entfernung der violettbraunen Farbe eintritt. Da die Schärfe des Endpunktes sehr von der Temp. abhängt, ist dieser nur genau, wenn die Lsg. sd. heiß gehalten wird. Vom Säuregrad ist die Rk. weniger abhängig. Salzsäure jedoch zers. die violettblaue Verb. rasch beim Kochen u. ist daher ungeeignet. Nach Zusatz des Indicators soll die Lsg. wegen der Zers. der gefärbten Verb. nicht zu lange heiß gehalten werden. Die Farbe am Endpunkt ist von der Konz. an Fe abhängig. Bei relativ kleinen Mengen ist die Färbung eine lichtblaue entsprechend den vierwertigen V-Salzen. Mit wachsender Eisenmenge nimmt die Schwierigkeit der Erkennung des Endpunktes zu. Die Ergebnisse werden nur wenig durch die Ggw. von Al, Mn, Cr, Mo, Zn, Ni u. Cu beeinflusst. Bei Ggw. von Wolfram war der Endpunkt sehr undeutlich. — Besser als die unmittelbare Titration ist die Rücktitration von überschüssigem Ferrosulfat mit Kaliumdichromat in der Kälte, wodurch die Gefahren der Zers. beim Kochen vermieden werden u. auch HCl zugesetzt werden kann, ja sogar vorteilhafter ist. Das bei der Rk. gebildete Vanadylsalz wird von dem Chromat nicht angegriffen. Mit H_2SO_4 ist die Erkennung des Endpunktes nur mäßig (bei 15–30 ccm H_2SO_4 u. 15 ccm H_3PO_4 -Gemisch am besten). Bei Verwendung von HCl erhält man den schärfsten Endpunkt mit 15–30 ccm HCl (1 : 1) u. 15 ccm H_3PO_4 -Gemisch. Bei der Rücktitration ist ein Überschuß an Ferrosulfat nicht schädlich. Die oben erwähnten Fremdsalze haben auch hier keinen Einfluß auf die Titration, allerdings verdunkeln große Mengen von Mn-Salzen die Blaufärbung. Mo u. W lassen die blaue Endfarbe sehr schwer erkennen, was durch Komplexsalzbildung erklärt werden kann. Kaliumdichromat läßt sich auch durch Kaliumchromat ersetzen. — Das Titrationsverf. mit *Diphenylamin* als Indicator ist dem mit Ferricyanid als Indicator entschieden vorzuziehen, da zahlreiche Fehler ausgeschaltet sind u. die Genauigkeit in Ggw. von Fe erhöht wird. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 139. 237 bis 245. 1924. Sendai [Japan], Univ.)

HORST.

G. Berg, *Metallmikroskopische Untersuchung mit Tageslichtbeleuchtung*. Zur Beobachtung im Anschliff eignet sich das Tageslicht bis zu stärksten Vergrößerungen, da das Objektiv in Verb. mit dem Vertikalilluminator als Kondensor wirkt, meist sehr gut. Diese Methode bietet die Vorteile, daß die Mineralien in ihrer natürlichen Farbe hervortreten. Weiter wird die Apparatur durch das Wegfallen der Lampe bedeutend vereinfacht. Nach Ansicht des Vf. sind nur etwa 10% der Tage zu trübe zur Beobachtung im natürlichen Licht. (Zentralblatt f. Min. u. Geol. 1924. 339–40. Berlin.)

ENSZLIN.

Organische Substanzen.

Henry Leffmann, *Bemerkungen über einige Proben auf Methanol*. SUMNER ratte die Orcinrk. auf CH_3OH empfohlen (Reagensgläser mit Kratzern geben irreführende Resultate): in ein weites Reagensglas gibt man 1 ccm der zu prüfenden Fl., 2 ccm $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ -Lsg. (6,7%) u. 2 ccm H_2SO_4 (62%) u. läßt 10 Min. stehen. Red. zu blauem $\text{Cr}_3(\text{SO}_4)_3$ erfolgt in 40 Sek.; dauert es länger, so ist der A. zu dünn. Nach 10 Min. mischt man mit 15 ccm W. u. erhitzt 10 Min. im sd. Wasserbad, um Acetaldehyd abdestillieren. Dann setzt man 1 ccm Orcinlsg. (0,5%) zu u. bringt wieder in sd. W. Wenn das Muster mehr als 5% CH_3OH enthält, wird Fl. trübe,

bei 1% nach 15 Min., u. mit noch weniger ist das Erhitzen zu verlängern. Glycerin hindert die Rk.; Dest. ist nötig. Das Verf. ist nicht so bequem wie das mit KMnO_4 , aber in forens. Fällen gut als Bestätigung. — Bei Ggw. von Aceton in beträchtlichen Mengen ist Verwendung der Salicylaldehyd- u. Vanillinrk. zu empfehlen. Weniger als 0,1% CH_3OH des Handels kann man durch Zusatz von einigen cem 5%ig. Lsg. von Salicylaldehyd oder Vanillin in verd. A. zu 10 cem Muster u. Einträufeln in wenig NaOH nachweisen. Über der alkal. Lsg. erscheint ein roter Ring. Die Rk. mit Vanillin ist deutlich, aber langsamer u. weniger scharf. (Amer. Journ. Pharm. 96. 583—85. 1924.) DIETZE.

P. Thomas und A. Micsa, *Ein Reagens auf mehrwertige Alkohole: die R-Säure* (β -Naphthol-3,6-disulfonsäure). Die mehrwertigen Alkohole werden durch Bromwasser oxydiert, 1 Teil 5%ig. Polyalkohollsg. wird mit 10 Teilen Br-W. (3 cem Br/l. 20 Min. auf dem W.-Bade erhitzt, das überschüssige Br durch einen Luftstrom entfernt. Mit einer Lsg. der R-Säure (1 Teil in 300 Teilen konz. H_2SO_4) gibt: Äthylenglykol einen blauen, von einem gelben überlagerten Ring, Glycerin einen grünlich-blauen, von einem gelben überlagerten Ring, Propylenglykol einen rotbraunen u. Butylenglykol einen intensiv braunroten Ring. Da die Lsg. der R-Säure blaßviolett gefärbt ist, sind diese Farbringe gut zu erkennen. Eine Verwechslung mit Form. u. Acetaldehyd (wie beim β -Naphthol) ist bei dieser Rk. ausgeschlossen, da Form. aldehyd einen orangefarbenen Ring u. grüne Fluorescenz u. Acetaldehyd einen ros. Ring ohne Fluorescenz liefert. Bei allen Rkk. ist auf die Abwesenheit von reduzierenden Zuckern zu achten, da diese auch mit der R-Säure intensive Farbrk. geben. (Bulet. Societ. de Stiinta din Cluj 2. 222—24. 1924.) ZANDER.

Harold Benson Bennett, *Eine modifizierte Dichromatmethode zur Bestimmung von Glycerin*. Die Hydratation erstarrter Fasern von palmitinsäurem Natrium. Erstarrte Fasern von palmitinsäuren Na adsorbieren, selbst bei Abwesenheit eines anderen Salzes, Glycerin negativ. Die sich aus 1-molarer Lsg. abscheidende Fasern haben auf Grund der vorliegenden Unters. die annähernde Zus. Na-Palmitat $4,3 \text{ H}_2\text{O}$, die aus 0,25 molarer Lsg. entstehenden entsprechen der Zus. Na-Palmitat $10 \text{ H}_2\text{O}$; erstere scheinen um ein Vielfaches mehr l. zu sein, als letztere. Daß nicht nur Hydrate mit $10 \text{ H}_2\text{O}$ gebildet werden, ergibt sich daraus, daß aus 0,5-mol. Lsgg. + 0,6-mol. Glycerin ein Prod. der Zus. Na-Palmitat, $15 \text{ H}_2\text{O}$ erhalten wurde. Mit zunehmendem Alter der Faser scheint die Hydratation größer zu werden. — Bei der analyt. Unters. der durch Erhitzen u. Schütteln von Na-Palmitat u. Glycerin lsgg. nach Entfernung der erstarrten M. erhaltenen Lauge wurde die Best. von Glycerin hierin nach folgender Abänderung der von HEHNER gegebenen Vorschrift (Journ. Soc. Chem. Ind. 17. 330 [1898]) durchgeführt: 10 g der Lauge werden mit 28 cem CO_2 -freiem W. + 50 cem ca. 50%ig. H_2SO_4 versetzt; nach Abkühlen u. vollständiger Abscheidung der Palmitinsäure wird $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ (ca. 0,1 g mehr als zur Oxydation des Glycerins erforderlich ist) zugegeben. Die Mischung wird 2 Stdn. auf sd. Wasserbad erhitzt (Luftkühler) u. nach raschem Abkühlen mit dest. W. auf 1 l aufgefüllt. 60 cem dieser Lsg. werden mit KJ + 2 cem 50%ig. H_2SO_4 versetzt, nach 5 Min. auf 600 cem verd. u. mit 0,01-n. $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ (Stärke als Indikator) titriert. (Journ. Chem. Soc. London 125. 1971—75. 1924.) BRISTOL, Univ.) HABERLAND.

Fosse und A. Hieulle, *Über eine angeblich für Formaldehyd spezifische Farb-reaktion, die durch Glyoxylsäure hervorgerufen wird*. Der von SCHRYVER angegebene Nachweis von CH_2O (Fuchsinrotfärbung mit $\text{C}_6\text{H}_5\text{NHNH}_2$, HCl + $\text{K}_3\text{Fe}(\text{CN})_6$ + konz. HCl) ist nicht für CH_2O allein charakteristisch. Die Färbung tritt auch mit vollständig CH_2O -freier Glyoxylsäure auf. Ausschütteln mit Ä. entzieht der gefärbten Lsg. die Farbbase, auf Zusatz von HCl zur äth. Lsg. tritt die Rotfärbung wieder ein. (C. r. d. l'Acad. des sciences 179. 636—38. 1924.) HABERLAND.

Maurice François und Charles Lormand, *Bestimmung der Weinsäure durch Wägen des Calciumtartrats in den im Codex eingeschriebenen Tartraten*. Die früher Journ. Pharm. et Chim. [7] 28. 433; C. 1924. I. 1068) beschriebene Methode ist ohne weiteres anwendbar bei den Alkalitartraten mit Einschluß des Seignettesalzes, Mischungen von Weinsäure mit NaHCO_3 u. LiCO_3 , auch bei Kaliumborotartrat. Beim gewöhnlichen Brechweinstein u. Kaliumferrotartrat ist dagegen vorherige Entfernung des Sb bzw. Fe erforderlich. (Journ. Pharm. et Chim. [7] 30. 276 bis 283. 1924. Lab. centr. d'étude et d'analyse des prod. médicam.) SPIEGEL.

H. R. Lee und D. O. Jones, *Analyse von Dehydrothio-p-toluidinsulfosäure*. 3 g des Ammoniumsalzes werden in einem 600 ccm-Becherglase mit 200 ccm W. u. 5 ccm 10%ig. NaOH gel. Abkühlen mit Eis u. unter Eiszusatz mit ca. 50 ccm $\frac{1}{10}$ -n. NaNO_2 -Lsg. (nach der Diazotierung sollen noch ca. 10 ccm ungebunden sein) versetzen, stark rühren u. mit 25 ccm konz. HCl u. 10 ccm konz. N_2O_5 -freier HNO_3 ansäuern. 10 Min. stehen lassen u. titrieren mit $\frac{1}{10}$ -n. p-Nitroanilinslg. gegen Fäufelung mit Stärkejodidlsg. 1 ccm $\frac{1}{10}$ -n. $\text{NaNO}_2 = 0,033733$ g dehydrothio-p-toluidinsulfosaures Ammonium. (Ind. and Engin. Chem. 16. 930—31. 1924. Milwaukee [Wisc.]) GRIMME.

L. W. Winkler, *Theobromin, Theophyllin und Coffein*. Theobromin l. in 3282 Teilen W. (18°) u. in 6680 Chlf. (16°), Theophyllin in 227 W. (17°) u. in 186 Chlf., Coffein in 80 W. (15°) u. in 7,6 Chlf. (16°). — Zur Unterscheidung eignet sich folgende Probe: Man mischt 5 ccm W., 1—2 Tropfen alkoh. Phenolphthaleinslg. (1:100) u. 1 Tropfen $\frac{1}{10}$ -n. NaOH; schüttelt man die rote Fl. mit 0,1 g Theophyllin zusammen, so wird sie sofort entfärbt, während Coffein ohne Wrkg. ist; mit 0,1 g Theobromin wird die Fl. erst beim Kochen farblos, beim Erkalten aber wieder rot. — 0,1 g Theophyllin wird von 1 ccm NH_3 (10%) fast sofort gel., Theobromin u. Coffein bleiben größtenteils ungel. Man kann mit dieser Probe noch 5% Theobromin oder Coffein finden, wenn man 0,25 g Theophyllin auf 1 ccm NH_3 nimmt. — Durch 1 ccm NaOH (20%) wird 0,1 g Theobromin sofort gel., auf Coffein wirkt NaOH nicht ein, aus Theophyllin entsteht swl. Na-Verb. Nimmt man auf 1 ccm NaOH (20%) 0,25 g Theobromin, so kann man noch ca. 5% Coffein oder Theophyllin nachweisen. (Pharm. Zentralhalle 65. 557. 1924.) DIETZE.

Filippo Calzolari, *Eine neue Methode zur Erkennung kleinster Mengen von Urotropin, Formaldehyd und Methylalkohol*. Urotropin gibt noch in 1%ig. Lsg. auf Zusatz gleicher Mengen von gesätt. MgSO_4 -Lsg. u. gesätt. frisch bereiteter $\text{K}_3\text{Fe}(\text{CN})_6$ -Lsg. einen krystallin. Nd. $\text{MgKFe}(\text{CN})_6 \cdot 2\text{C}_6\text{H}_{12}\text{N}_4 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$, gelbe, glitzernde Schüppchen. Mikrochem. können so noch 0,02 mg Urotropin nachgewiesen werden, u. die auch in ammoniakal. Lsg. vor sich gehende Rk. kann auch zum Nachweis seiner zahlreichen Additionsverbb. dienen. — Zum Nachweis von Formaldehyd verdampft man 1 ccm der zu prüfenden Lsg. mit 20%ig. NH_3 -Lsg. auf dem Wasserbade zur Trockne u. benutzt den Rückstand für obige Rk. — Für Nachweis von Methylalkohol werden 2 ccm der 2%ig. Lsg. mit 2 ccm 2,5%ig. KMnO_4 -Lsg. u. 0,4 ccm 50%ig. H_2SO_4 3 Min. bei gewöhnlicher Temp. belassen, der Überschuß von KMnO_4 mit 8%ig. Oxalsäure beseitigt, dann dest., das Dest. in 20%ig. NH_3 -Lsg. aufzufangen u. weiter wie oben behandelt. (Scritti di scienze med. e natur. a celebrazione del primo centenario dell'acad. di Ferrara 1923. 305—7. Ferrara, Univ.; Ber. ges. Physiol. 27. 226—27. 1924. Ref. LAQUER.) SP.

Bestandteile von Pflanzen und Tieren.

Margaret Mary Murray, *Eine Methode zur Bestimmung des Eisens in kleinen Mengen in biologischen Substanzen*. Die Best. erfolgt durch Titration mit $\frac{1}{80}$ -n. KMnO_4 -Lsg. im mit HCl erwärmten, dann mit H_2SO_4 abgerauchten Veraschungs-rückstand. Neu ist wesentlich die Art der Red. des Fe u. der Titration. Eine

Saugflasche wird mit doppelt durchbohrtem Stopfen versehen, durch den der „Reaktor“ u. die KMnO_4 -Bürette hindurchgeht. Jener ist ein Rohr von 75:2,5 cm beschickt mit cadmiumisiertem Zn, unten mit einem Filter aus Schmelzpunktröhren u. Glaswolle versehen, mit unterem Hahn. Durch ihn wird die 10% H_2SC enthaltende Fl. durchgesaugt, mit ca. 20 ccm 5%ig. H_2SO_4 nachgewaschen, dann wird unter weiterem Saugen u. Schütteln die KMnO_4 -Lsg. bis zur Rosafärbung zugelassen. (Biochemical Journ. 18. 852—54. 1924. Univ. of London.) SPIEGEL.

René Clogne, Welti und Pichon, *Bestimmung von Glykogen in der Placenta*. Das Verf. von BERRY u. GRUZIEWSKA hat den Übelstand, daß sehr große Menge des Pateinschen Reagenses erforderlich sind, die Filtration dann langwierig ist u. die schließlich erhaltenen Zuckerlsgg. sehr verd. sind, wenn man glykogenarm Organe zu untersuchen hat. Vf. fällt deshalb aus der durch Erhitzen mit konz. Alkali auf 120° erhaltenen Fl. zunächst das Glykogen durch Zusatz der doppelte Menge mit NaCl gesätt. 95%ig. A., löst den Nd. in 5%ig. HCl u. verzuckert dann bei 120°. (Bull. Soc. Chim. Biol. 6. 788—90. 1924.) SPIEGEL.

F. M. Schertz, *Die quantitative Bestimmung von Carotin mittels des Spektrophotometers und des Colorimeters*. Die Unterss. wurden mittels eines König-Martens Spektrophotometers ausgeführt. Von den verschiedenen, zur Unters. angewandten Lichtarten (monochromat. Licht, Wellenlängen $\text{Hg}_{435,8}$, $\text{He}_{447,2}$ u. $501,6$, Hg_{516} , $\text{Hg}_{575,9}$ + $579,1$ u. $\text{He}_{587,3}$) erwies sich $\text{Hg}_{35,8}$ als geeignetste. Die Ergebnisse sind tabellar. u. graph. im Original veröffentlicht. Geprüft wurden Lsgg., die 0,0 bis 42,0 mg Carotin pro l Lösungsm. enthielten. Die Best. des Extinktionskoeffizienten u. die Kurven im Original ermöglichen die quantitative Best. des Carotins in Lsgg. Für A. u. PAe. als Lösungsm. wurden dieselben Werte gefunden, mit Ä. waren sie niedriger. Der Extinktionskoeffizient für Carotin in A. u. PAe. wurde für $\text{Hg}_{35,8}$ zu 1,91, in Ä. zu 1,986 gefunden. Vergleichende Bestst. mittels des Spektrophotometers u. einer colorimetr. Methode zeigen, daß erstere zuverlässiger sind (Journ. Agricult. Research. 26. 383—400. 1923. U. S. A. Dep. of Agric.) HABERER.

Paul Menaul, *Eine Methode zur quantitativen Bestimmung von Tannin im pflanzlichen Gewebe*. In der angegebenen colorimetr. Bestimmungsmethode wird das Farbreagens durch Erhitzen von 100 g reinen Na-Wolframats, 30 g As_2O_5 mit 300 ccm W u. 50 ccm konz. HCl während 2—3 Stdn., am Rückflußkühler bereitet. Nach Abkühlung Auffüllen auf 1 Liter. Das Reagens wird weder von Phenolen u. Eiweißstoffen, noch von Dextrose angegriffen. Die durch Tannin erzeugte Färbung, welche eine Stde. beständig ist, ist gegenüber reduzierenden Reagenzien empfindlich. — Zur Ausführung der Best. wurden 10 ccm des filtrierten Extrakts von fein zerriebener mit PAe. u. A. behandelten Sorghumkörnern in einem Zentrifugenröhrchen mit Pb-Acetat gefällt, auf 75° erwärmt, 3 Min. zentrifugiert u. der Nd. getrocknet. Daran mit 5%ig. H_2SO_4 versetzt. Das gel. Pb-Tannat in einer 50—100 ccm Meßflasche mit 2 ccm des Farbreagens u. mit Sodalsg. versetzt u. bis zur Marke aufgefüllt. Die Färbung verglichen mit einer Standardlsg. von Tanningallussäure nach vorheriger Entfernung von Gallussäure mit Ä. — Die %-Gehalte von Tannin in verschiedenen Sorghumsorten werden angegeben. (Journ. Agricult. Research 26. 25 bis 258. 1924. Oklahoma.) TENNENBAUM.

Z. Gorecki und P. Slonimski, *Über die Blutfärbung mit Sudan III*. Vf. färben mit alkoh. Lsg. in der Wärme. Dann sind die Erythrocyten gelbrot, Lymphocyten, Monocyten u. basophile Leukocyten ungefärbt, neutrophile Leukocyten mit kleinen roten Körnchen, eosinophile mit roten Granulationen in gelblichem Plasma. Nach Extraktion des Blutes mit Fettlösungsm. ist das Bild ungefähr das gleiche (C. r. soc. de biologie 91. 957—59. 1924. Warnhau, Univ.) SPIEGEL.

David I. Macht, S. S. Blackman jr. und Margaret Swigart, *Eine neue und empfindliche biologische Methode des Kohlenoxydnachweises im Blute*. CO-Blut

reine Lsgg. von CO-Hämoglobin hemmen noch bei 1—0,1% deutlich das Wachstum der Wurzeln bei Keimlingen von *Lupinus albus*. Die Hemmung ist der Konzentration proportional. Leuchtgasblut wirkt wegen gleichzeitiger Ggw. von C_2H_4 noch giftiger. Proc. of the soc. f. exp. biol. and med. **21**. 287—88. Baltimore, JOHNS HOPKINS Univ.; Ber. ges. Physiol **27**. 221. 1924. Ref. BIEHLER.) SPIEGEL.

R. Sulzer, *Der Einfluß des Alkohols auf das isolierte Säugetierherz*. (Mit einem Anhang über *Die Bestimmung von Alkohol im Blut* von **R. K. Cannan** und **R. Sulzer**.) Beim Starlingschen Herzlungenpräparat von Hunden ergaben A.-Konz. von 0,06% nur Vergrößerung des diastol. u. systol. Vol., höhere (0,3—0,4%) Veränderung des Schlagvol. u. beträchtliche Steigerung des venösen Druckes u. des Druckes im Lungenkreislauf. Von 0,1—0,2% an verursacht A. Verschlechterung des Coronarkreislaufes durch Kontraktion der Coronargefäße. — Die Pringsheimsche Methode zur Best. von A. (Dest. im Vakuum in eine Mischung von $K_2Cr_2O_7$ u. konz. H_2SO_4 u. Rücktitration) wird dadurch modifiziert, daß das Blut zunächst mit der 2- bis 3-fachen Menge Na_2SO_4 zu halbf. M. gemischt wird. (Heart **11**. 141—50. London, Univ. Coll.; Ber. ges. Physiol **27**. 155—56. 1924. Ref. WACHHOLDER.) SP.

Erwin Becher und **Elfriede Herrmann**, *Eine einfach und rasch ausführbare Mikromethode zur Schätzung der Höhe des Blutzuckers*. Die Methode beruht auf der Red. alkal. Pikrinsäurelsg. durch Dextrose. 0,1 ccm Blut werden mit 1,5 ccm gesätt. Pikrinsäurelsg. versetzt u. von dem gefällten Eiweiß, eventuell nach ganz leichtem Erwärmen, abfiltriert. Von dem klaren gelben Filtrat werden 2,1 ccm mit 0,3 ccm 4%ig. NaOH-Lsg. gekocht, bis keine weitere Braunfärbung der Lsg. mehr eintritt u. diese in einem Meßzylinder mit W. bis auf 2,4 ccm aufgefüllt. Bei n. Blutzucker bleibt die Fl., in auffallendem Licht betrachtet, gelb, etwa einer 0,25%ig. Lsg. von $K_2Cr_2O_7$ entsprechend, bei deutlich braunem Ton ist der Blutzucker erhöht. Zu Vergleichslsgg. kann man Lsgg. von $K_2Cr_2O_7$ benutzen, die der bei bestimmten Blutzuckermengen entstehenden Braunfärbung entsprechen. (Münch. med. Wchschr. **71**. 1464—65. 1924. Halle, Univ.) FRANK.

Ferdinand Lebermann, *Eine einfache klinische Methode zur Bestimmung kleiner Kaliummengen im Blutserum und anderen Flüssigkeiten*. Kleine K-mengen in Fl. lassen sich colorimetr. bestimmen durch Füllen des K als K-Co-nitrit u. Auflösen des ausgewaschenen u. trockenen Nd. in starker HCl. Die Best. kann sowohl mit einer eigens dazu hergest. Röhrenskala als auch im Colorimeter nach DUBOSQ vorgenommen werden, sie ist nicht nur für Blutserum, sondern auch für andere Körperfl. brauchbar u. wesentlich einfacher als die Kramer-Tisdallsche Methode. Mit dieser stimmen die nach obiger Methode erhaltenen Resultate befriedigend überein. Durch Verwendung besonders kleiner Zentrifugengläser, in denen der Nd. gut zentrifugiert wird u. durch Benutzung sehr kleiner Colorimeterröhrchen hat Vf. das Verf. verfeinert. (Biochem. Ztschr. **150**. 548—59. 1924. Würzburg, Univ.) FRANK.

Ferdinand Lebermann, *Über eine neue klinische Methode der Mikrocalciumbestimmung im Blutserum*. Kleine Mengen Ca lassen sich leicht bestimmen, indem man den Calciumoxalat-Nd. bei Mengen unter 0,05 mg Ca durch bloßes Erhitzen auf 200—250°, bei größeren Mengen durch Erhitzen u. Kochen mit Na_2CO_3 -Lsg. in $CaCO_3$ überführt u. dieses acidimetr. bestimmt. Bei kleinen Mengen, unter 0,1 mg Ca, arbeitet das Verf. weit genauer als die oxydimetr. Methode. Für die Ca-Best. in kleinen Mengen Blutserum ist die Methode durchaus brauchbar, da sie bei Verwendung von nur 0,1 ccm Fl. leidlich genaue Werte liefert. (Münch. med. Wchschr. **71**. 1392—93. 1924. Würzburg, Univ.) FRANK.

N. Betchov, *Bestimmung des Cholesterins in Körperflüssigkeiten [Serum, Exsudaten, Transsudaten, Cerebrospinalflüssigkeit] nach dem Saponinverfahren*. Es werden Ausführungsmaßnahmen angegeben, um mit für klin. Zwecke genügender

Genauigkeit den Cholesteringehalt derartiger Fl. auf Grund der Entgiftung von Saponinen zu ermitteln, obwohl die Bindung zwischen Cholesterin u. Saponin sich in verd. Lsgg. nicht nach stöchiometr. Verhältnis, sondern durch Adsorption vollzieht. In Exsudaten wurde mehr Cholesterin gefunden als in Transsudaten, in d. Cerebrospinalfl. im Mittel 0,004‰. Der Gehalt steht hier in patholog. Fällen nicht in Zusammenhang mit der lymphocytären Rk., wohl aber mit dem Eiweißgehalt. (Journ. de physiol. et de pathol. gén. 21. 334—43. 1923. Genf, Univ. Ber. ges. Physiol 27. 149. 1924. Ref. SCHMITZ.) SPIEGEL.

G. Inghilleri, *Nachweis anormaler Bestandteile des Harns. Nachweis der Glucose.* (Vgl. das folg. Ref.) Die übliche Fehlingsche Lsg. wird auch durch Kreatin, Asparagin, Theobromin, Kaffein u. Salvarsan reduziert. Vf. empfiehlt deshalb eine neue Methode zur Herst.: Lsg. von 185 g kryst. Na_2CO_3 , 160 g Natriumcitrat, 16 g CuSO_4 zu 1 Liter. (Boll. Chim. Farm. 62. 225—27. 1923 Rom.) GRIMME.

Ugo Santi, *Zur Würdigung der Mitteilung von Dr. Inghilleri über den Nachweis von Glucose im Harn.* (Vgl. vorst. Ref.) Vf. weist darauf hin, daß die von INGHILLER angegebene neue Vorschrift für Fehlingsche Lsg. fast genau so, bereits 1911 von BENEDIKT vorgeschlagen wurde. Die Empfindlichkeitsgrenze beträgt 0,015‰ Glucose gegenüber 0,1‰ bei der alten Fehlingschen Lsg. (Bull. Chim. Farm. 62. 325—26 1923.) GRIMME.

B. Pohorecka-Lelesz, *Über die Mikrobestimmung des Harnstoffs und der Ammoniaksalze durch Titration von Hypobromit.* Die durch Harnstoff oder NH_4 Salze in alkal. Lsg. zers. Mengen NaBrO lassen sich sowohl jodometr. wie alkalimetr. bei Mikrobestst. genau ermitteln. Für die jodometr. Best. kann man die Rk. in der Kälte vor sich gehen lassen, für die alkalimetr. muß sie, wie schon MARGOSCHEN u. ROSE fanden, in der Wärme erfolgen, um die Menge Alkali, die noch durch B eines Br-freien Körpers (nach LESCOEUR NaCNO) neben N_2 der Best. entzogen wird, zu verringern. Jene ist leichter als die zweite. Sie kann auch zur Mikrobest. des beim Kjeldahlverf. gebildeten NH_3 mit Vorteil benutzt werden, wobei man die Dest. vermeidet. (Bull. Soc. Chim. Biol. 6. 773—87. 1924. Posen, Univ.) SPIEGEL.

Robert Campbell Garry, *Mitteilung über die Bestimmung der Harnsäure nach dem Verfahren von Hopkins-Folin.* Bei dem genannten Verf. (vgl. FOLIN u. SHAFFER Ztschr. f. physiol. Ch. 32. 552; C. 1901. II. 507) sind Blindverss. unerlässlich, bei denen die Titration von 100 ccm W. mit 15 ccm konz. H_2SO_4 nach Filtration durch ein Filter gleich dem für Filtration des Ammoniumuratsniederschlags benutzten titriert werden. Dieser Blindvers. soll täglich wiederholt werden. Verd. der Harnsäure übt keinen Einfluß. Die Temp. bei der Titration muß immer gleichmäßig am besten 60° sein, für Feststellung des Endpunktes ist eine bestimmte Zeit, etwa 10 Sekunden, festzulegen. Spuren von Chlorid stören nicht. Zum Waschen des Uratnd. soll stets die gleiche Menge 10‰ig. $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ -Lsg., nicht > 100 ccm, benutzt werden. Da starkes NH_3 selbst in Ggw. von $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ die Harnsäure angreift, muß die Menge von jenem u. die Zeit, während deren es in Berührung mit der Harnsäure bleibt, auch stets gleichmäßig sein. (Biochemical Journ. 18. 913—18. 1924 Glasgow, Univ.) SPIEGEL.

Georg Schuftan, *Eine schnelle und sichere Eiweißbestimmung.* Der Harn wird in besondere, in $\frac{1}{10}$ ccm eingeteilte Zentrifugiergläschen (Herst. I. H. BÜCHLER Breslau) bis zur 5 ccm Marke gebracht, kurze Zeit mit dem Röhrchen in einen passenden Gefäße erhitzt, mit Eg. angesäuert u. etwa $\frac{1}{4}$ Stde. zentrifugiert. Der Gehalt an Eiweiß kann dann direkt abgelesen werden. (Klin. Wchschr. 3. 1982 bis 1983. 1924. Breslau.) FRANK.

Paolo Pietra und Giovanni Bozzolo, *Über die quantitative Bestimmung des Stercobilins durch eine neue Methode mit Heißextraktion und physio-pathologische*

etrachtungen über die erhaltenen Ergebnisse. Von der genau gewogenen Tagesmenge des Kotes wird 1 g mit 50 ccm A. gleichmäßig verrieben, dann $\frac{1}{2}$ Stde. unter Rückfluß zum Sieden erhitzt, nach Erkalten von der überstehenden klaren . 1 ccm auf eine Reihe Reagensgläser in absteigenden Mengen verteilt u. nach Zusatz von je 1 ccm Nenckischem Reagens auf Fluorescenz geprüft. Zeigt sich diese noch bei 0,1 ccm Extrakt, so wird mit Verdünnung 1:25. Zweckmäßig wird bei der Extraktion ein oxydierendes Agens (OBERMAYERS Reagens, trithaltige HNO_3) zugegeben, um Stereobilinogen in Stercobilin überzuführen. Bei gesunden wurde so die Fluorescenzgrenze für 1 g Stuhl zwischen 1:120 u. 1:750 gefunden, zum Teil abhängig von der Verweildauer der Galle im Darm, besonders bei Schwankungen der Gallensekretion, ferner von der Art der zugeführten Nahrungsmittel. Die Konz. in den Faeces ist durchaus nicht immer größer, wenn deren Menge klein ist. Bei perniziösen Anämien liegen die Zahlen wesentlich tiefer, bis 1:5400. Doch kann die Entw. der Hyperbilinie durch gleichzeitige Darmstörungen aufgehalten sein. Bei hämolyt. Ikterus schwankt ihr Grad mit der Schwere der hämolysierenden Prozesse. Abnahme der Bilinogenie bei mechan. oder durch Leberinsuffizienz bedingten Ikterus oder durch Verlangsamung des Hämoglobinstoffwechsels, am deutlichsten bei Hinderung des Gallenabflusses durch Konkrementen oder Tumoren. (Polidinico, sez. med. 31. 145—65. Torino, Univ.; r. ges. Physiol. 27. 34—35. 1924. Ref. SCHMITZ.) SPIEGEL.

W. Barikine und P. Zdrodovsky, *Experimentelle Untersuchungen über die Abderhaldensche Reaktion*. Die Fehlerquellen der Dialysiermethode werden hervorgehoben. Eigene Unterss. nach derselben unter genauer Einhaltung der Vorschriften von ABDERHALDEN ergaben zuweilen bessere Verdauung von Placentagewebe durch Präparate von Männern oder jungen Mädchen als durch solche von Schwangeren. Vff. geben 2 Modifikationen des Verf. an, die durch Arbeiten unter vergleichbaren Umständen die Unsicherheit ausschalten sollen: **I.** Es werden 3 Röhrchen bebrütet, von denen *a* 2 ccm des zu prüfenden Serums enthält, *b* 1 g Organ u. 2 ccm 0,85%ig. NaCl-Lsg., *c* 2 ccm des Serums u. 1 g Organ. Nach 16 Stdn. wird der Inhalt jedes Röhrchens mit 0,85%ig. NaCl-Lsg. auf 20 ccm verd. u. mit Ninhydrin bis zur Grenzrk. versetzt; *b* darf, wenn das Organ sorgfältig zubereitet war, keine Rk. zeigen, das Verhältnis der Verdünnung von *c* u. *a* bei der Grenzrk. liefert dann den Koeffizienten, der für den Ausfall der Prüfung maßgebend ist. — **II.** *a* erhält 1 ccm Serum + 2 ccm 0,85%ig. NaCl-Lsg., *b* 2 ccm Lsg. des Fremdeiweißes + 2 ccm NaCl-Lsg., *c* 2 ccm Serum + 2 ccm Eiweißlg. Hier wird der ausschlaggebende Koeffizient gefunden, indem man den Titer von *c* durch die Summe der Titer von *a* u. *b* dividiert. — **I** gab bei Schwangerschaftsdiagnose durchaus befriedigende Resultate, keine positive Rk. bei Männern oder n. Frauen, nur zuweilen in der Konstruktionsmethode eine unbedeutende Steigerung des Spaltungsvermögens gegen menschliche Placenta. **II** kommt hauptsächlich für Fälle der Immunisierung mit Eiweißkörpern in Betracht u. gibt hier gleichfalls befriedigende Ergebnisse. — Es schließen, daß die Abwehrfermente wohl existieren, aber nicht streng spezif. sind u. für die Diagnose nur in Betracht kommen, wenn die Methode sich auf quantitative Messung gründet. (Ann. Inst. Pasteur 38. 909—14. 1924.) SPIEGEL.

Ryo Tsukasaki, *Ein Lösungsmittel für Blutflecken*. Besser als andere Lösungsmittel wirkt bei getrockneten Blutflecken verd. NaOH-Lsg., die in den empfohlenen Konz. keine Zerstörung herbeiführt. Für Serumpräzipitink. wird 6-std. Digestion mit $\frac{1}{50}$ -n. Lsg., die 0,792% NaCl enthält, oder 24-std. mit $\frac{1}{300}$ -n. Lsg. bei Zimmer-temp., dann Neutralisieren mit verd. HCl u. Filtrieren empfohlen, für Hämoglobinpräzipitink. 20-std. Digestion mit $\frac{1}{300}$ -n. NaOH, dann Verd. mit dem gleichen Vol.

1,7%ig. NaCl-Lsg. (Tôhoku Journ. of exp. med. 4. 663—69. Sendai, Tôhoku Univ. Ber. ges. Physiol. 27. 130. 1924. Ref. GROLL.) SPIEGEL.

R. Boiteux, Beschreibung eines nicht zugeschmolzenen Konservierungsgefäßes für sterile Bouillon. Um häufiger kleine Mengen der Fl. entnehmen zu können, dient eine Art Spritzflasche mit einem Verteilungsapp., der gegen Eindringen von Staub u. Mikroben geschützt ist. (Ann. Inst. Pasteur 38. 873—78. 1924. Niort, Lycée.) SP

C. E. Corfield und **G. R. A. Short**, Die Prüfung und Zusammensetzung von Wismutoxynitrat. Bei der Einw. von W. auf n. $\text{Bi}(\text{NO}_3)_3$ oder HNO_3 -Lsgg. des selben kann man eine Anzahl von Oxysalzen bestimmter Zus. darstellen. Die Formel $\text{BiONO}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ entspricht einem Subnitrat mit 76,3% Bi_2O_3 ; das Subnitrat des Handels ist bas. u. entspricht der Zus. $6\text{Bi}_2\text{O}_3 \cdot 5\text{N}_2\text{O}_5 \cdot 9\text{H}_2\text{O}$ mit 79,8% Bi_2O_3 . Theoret. Ausbeuten erhält man durch Eingießen der Nitratlsg. in W. mit bestimmten Mengen Alkali; das Prod. ist leicht u. amorph. Wenn das Subnitrat mit 79—82% Bi_2O_3 für pharmazeut. Zwecke brauchbar ist, müssen die Angaben des P. B. u. das P. B. Codex revidiert werden. — Es wird folgende Prüfung empfohlen. Ca. 0,5 g behandelt man in einem $\frac{1}{2}$ Liter-Erlenmeyer-Kolben mit 50 ccm W. 20 ccm H_2SO_4 (D. 1,35) u. 10 g reduziertem Fe, verschließt mit Kautschukstopfen u. Rohr, das oben mit Glasperlen zur Hälfte gefüllt ist. Die Fl. wird 5 Min. gekocht; die Glasperlen werden von den kondensierten Dämpfen abgespült; man kocht das Ganze nochmals 3 Min., spült wieder ab, bringt die Fl. in einen NH_3 Dest.-App., behandelt mit 50 ccm NaOH (50%) u. sammelt das Destillat in 50 ccm $\frac{1}{10}$ -n. H_2SO_4 . Den Säureüberschuß titriert man mit $\frac{1}{5}$ -n. Alkali. (Pharmaceutica Journ. 113. 80—83. 1924.) DIETZE.

R. Wasicky und **J. Becker**, Weitere Beiträge zur biologischen Wertbestimmung von *Filix mas*. (Vgl. WASICKY, Arch. f. exp. Pathol. u. Pharmak. 97. 454; C. 1923 IV. 276.) Als Testsubstanz zur Unters. der Reaktionsfähigkeit der zur biol. Wertbest. von Filixpräparaten verwendeten Versuchstiere eignet sich *Phlorbutyrophenon* (KARRER, Helv. chim. acta 2. 466; C. 1920. I. 420.) Die chem. Wertbest. allein nämlich die Darst. des Gesamtfilicins u. des Filixsäuregehaltes sind zur Charakterisierung von Filixpräparaten unbrauchbar. Die biol. Wertbest. erteilt nur innerhalb weiter Grenzen Aufschluß über die Wirksamkeit nicht näher bekannte Extrakte. Um die aus einer ungenauen Dosierung von Filix sich ergebenden Gefahren zu vermeiden, scheint es notwendig, immer Filixpräparate derselben Herstellungsweise zu verwenden, diese Präparate durch chem. Konstanten, etwa den Gehalt an Gesamtfilicin u. Filixsäure zu charakterisieren u. daran die biol. Wertbest. anzuschließen. (Arch. f. exp. Pathol. u. Pharmakol. 103. 313—21. 1924 Wien, Univ.) WOLFF.

Hugo Platz, Die capillaranalytische Prüfung des Perubalsams. Zur capillaranalyt. Prüfung des Perubalsams sind nur 2 Tropfen erforderlich. Der eine Tropfen wird in 5 ccm A. (90%) gel.; aus der Lsg. stellt man das erste Capillarbild her. Das frische Bild besteht aus einer obersten, ca. 0,5 cm breiten, blaßbräunlichen Zone, der sich eine hellbraune Zone von ca. 1,5—2 cm anschließt u. die mit einer dunkelbraunen Basisstreifen abschließt. Die Zonen sind durchscheinend, der Basisstreifen nicht. Bei einem synthet. Balsam fehlt der lichtundurchlässige dunkle Basisstreifen, die hell- bis dunkelbraune durchscheinende Zone breitet sich häufig bis zum unteren Ende des Streifens ohne Abschlußstreifen aus. Die Capillarbildder echten Balsame fetten durch. Bei längerem Liegen verschwindet meist die oberste Zone; es bleibt eine gleichmäßig gefärbte mit dem dunklen Basisstreifen — Aus dem 2. Tropfen erhält man erst mit CS_2 , dann mit A. (90%) 2 weitere Bilder. Diese 3 Bilder geben über die Art des Prod. genügende Aufklärung. — Man schüttelt 1 Tropfen Balsam mit 5 ccm CS_2 5 Min. lang kräftig, läßt 10 Min. verschlossen stehen u. gießt klar ab. Das erhaltene Capillarbild besteht bei echter

alsamen aus 2 durchscheinenden Zonen, einer oberen, etwa 1 cm breiten, farbigen u. einer unteren, 4 cm breiten, von leicht gelblichem Schimmer u. mit gelbem Basisstreifen. Alle Präparate, die mit künstlichem Balsam verschnitten sind, zeigen eine mehr oder weniger breite rosafarbige Zone in der unteren Hälfte des Ides. Liegen andere Verfälschungen vor, so erhält man auch verschiedenfarbige Zonen, oftmals nur eine gleichmäßig gefärbte Fläche. — Den zurückbleibenden CS₂ läßt man durch Offenstehen des Schüttelgefäßes verdunsten u. nimmt den Balsamrückstand mit 5 ccm A. (90%) auf. Die Lsg. liefert ein Capillarbild, das bei echtem Balsam aus einem ca. 2 mm breiten, rötlichbraunen harzigen Streifen besteht, der meist hellbraun durchscheinend ist, u. einer ca. 1,5 cm breiten hellbräunlichen, lichtdurchlässigen Zone, deren Basis in 0,5 cm Breite fettglänzend ist. Bei Verfälschungen u. künstlichem Balsam erhält man auch hier die abweichendsten Bilder. Pharm.-Ztg. 69. 1037—38. 1924. Leipzig.)

DIETZE.

L. Y. Dyrenforth, *Mitteilung über die Untersuchung von Kreosotöl*. Bei der Unters. von Kreosotölen spielt die Best. der D. der fl. Fraktion 235—315° u. 315—355° eine große Rolle. Vf. berechnet diese nach der Formel $S = \left(\frac{w + wc}{G} \right) k$, wobei $S = D_{15,5}^{38}$, w das Gewicht im Pyknometer, c die Korrektur für 1° über der unter 38° = 0,0008, G der Wasserwert des Pyknometers bei 38° u. k eine Konstante = Verhältnis $D_{38} : D_{15,5}$ für Wasser. (Journ. Ind. and Engin. Chem. 16. 18. 1924. Jacksonville [Fla.] GRIMME.

H. Angewandte Chemie.

I. Allgemeine chemische Technologie.

R. Schöttler, *Der Verbrennungsvorgang in Gas- und Ölmaschinen*. Vf. erörtert die prakt. Erfahrungen beim Verbrennungsvorgang in Gasmaschinen, Vergasermaschinen, Glühkopfmotoren u. Gleichdruckmaschinen, sowie die angewandten Mittel, um eine gleichmäßige u. vollkommene Verbrennung zu erreichen. Er setzt weiter auseinander, welche Auffassungen verschiedene Forscher über den Verbrennungsvorgang haben u. gibt zum Schluß selbst eine theoret. Unters. u. Berechnung dieses Vorgangs. (Die Wärme 47. 403—5. 416—20. 430—34. 442—45. 1925—86. 1924. Braunschweig.)

NEIDHARDT.

Fritz Jaeger, *Pumpen in der chemischen Industrie*. Zusammenfassende Beschreibung. (Ztschr. f. angew. Ch. 37. 882—85. 1924. Halle a. S.)

JUNG.

F. Ahrens, *Säurebeständige Gummiauskleidungen*. Beschreibung der Herstellung. Prüfung erfolgt mit einem Induktionsstrom. (Chem.-Ztg. 48. 748. 1924.)

JUNG.

—, *Von der Filtration chemischer Flüssigkeiten*. Bei den Filtern der Enzinger-Union-Werke A.-G., Mannheim, wird eine zu Kuchen gepreßte Filtermasse aus Baumwollstoffen verwendet, die gewaschen u. von neuem verwendet werden kann. (Chem.-Ztg. 48. 796—97. 1924.)

JUNG.

M. Löwentberg, *Die elektrischen Gasreinigungsverfahren*. Beschreibung der von den Siemens-Schuckert-Werken hergestellten Elektrofilter zur Abscheidung von Staub aus Gasen. (Zentralbl. d. Hütten u. Walzw. 23. 93—94. 105—8. 1924. Berlin.)

BÖRNSTEIN.

Walter A. Schmidt, *Rückblick über elektrische Füllungen*. Sammelbericht mit besonderer Berücksichtigung des Cottrellverf. u. seiner Modifikationen. (Ind. and Engin. Chem. 16. 1038—41. 1924. Los Angeles [Cal.] GRIMME.

Deutsche Maschinenfabrik A.-G., Duisburg, *Verfahren und Vorrichtung zur Erwärmung von Gasen, Dämpfen, Wasser o. dgl. mittels Heizgase*. Verf. dad. gek.,

daß je nach Bedarf die Erzeugung des Heizgases selbsttätig unterbrochen bzw. wiedereingeschaltet wird. — Vorr. gek. durch Relais, auf welche die Temperaturschwankungen des zu beheizenden Gases übertragen werden u. welche ihrerseits die Heizvorr. an- bzw. abstellen. — 2 weitere Ansprüche kennzeichnen Ausführungsformen der Vorr. (D. R. P. 405632 Kl. 12e vom 24/2. 1922, ausg. 4/11. 1924.) KA.

Carl A. Agthe, Zürich, *Kontinuierliche Herstellung disperser Systeme.* (D. R. P. 405237 Kl. 12g vom 14/3. 1922, ausg. 29/10. 1924. — C. 1924. I. 1248.) KAUSCH.

Pierre Creuzé, Gabriel Moinet und Société Les Petits Fils de François de Wendel & Cie., Frankreich, *Kolloidale Metalloidlösungen.* Das Metalloid wird in ein mit vier Armen verbundenes Kugelgefäß, von denen zwei als Elektroden wirken u. mit dest. W. gefüllt sind, während zwei zur Zu- u. Abführung des in der Kugel überhitzten Dampfes dienen, eingebracht. Letzterer wird mit dem Dampf des auf elektr. Wege ionisierten Metalloids gemischt. Das Gemisch wird dann abgekühlt u. ergibt die kolloidale Lsg. (F. P. 26239 vom 10/4. 1922, ausg. 5/9. 1923. Zu . zu F. P. 546165; C. 1923. II. 620.) KAUSCH.

Adolf Ott, Recklinghausen, *Einrichtung zur Zerstäubung von Flüssigkeiten zwecks Berieselung von Wasch- und Absorptionstürmen,* bei welcher die Zerstäubung der gesamten zugeleiteten Flüssigkeitsmenge durch mehrere in senkrechter Reihe untereinanderliegende ringförmige Verteilkörper in Teilmengen stufenweise erzielt wird, dad. gek., daß die Verteilkörper, mit Ausnahme des untersten der Reihe aus einem als Leitfläche für die auftreffende Fl. ausgebildeten, in der Mitte kreisförmig durchbrochenen Teller u. einem diesen umschließenden, zur Zerstäubung der vom Teller abströmenden Fl. dienenden Ring mit wulstartig erhöhtem Rand bestehen. — 3 weitere Ansprüche kennzeichnen Ausführungsformen der Einrichtung. (D. R. P. 404767 Kl. 12e vom 24/9. 1922, ausg. 21/10. 1924.) KAUSCH.

Carl Holthaus, Dortmund, *Absorptions- und Mischgefäß,* gek., durch einen m. feinen Durchtrittskanälen (Rillen, Nuten o. dgl.) versehenen beweglichen Ventilkörper der bei der Zuführung von Gas oder Luft oder Fl. in das Gefäß den Durchtritt so sperrt, daß das Gas oder die Fl. nur durch die feinen Kanäle in das Gefäß eintreten kann. (D. R. P. 404766 Kl. 12e vom 27/2. 1923, ausg. 25/10. 1924.) KA.

Bruno Waeser, Strausberg b. Berlin, *Verfahren und Vorrichtung zum Mischen von Flüssigkeiten oder Gasen,* bei deren Mischung Reaktions-, Misch- oder Lösungswärme auftreten, 1. dad. gek., daß die Mischung in einem Mischraum vorgenommen wird, welcher unter einem der entstehenden Mischtemp. entsprechenden Druck gehalten wird. — 2. dad. gek., daß die Mischstoffe über Rückschlagventile einen Mischraum zugeführt werden, dessen Inhalt durch einen beweglichen Belastungskolben unter Druck gesetzt werden kann. — 4 weitere Ansprüche kennzeichnen Ausführungsformen der Vorr. (D. R. P. 404907 Kl. 12e vom 9/9. 1923, ausg. 25/10. 1924.) KAUSCH.

Harold S. Booth und George G. Marshall, Cleveland, Ohio, *Überführung von Stoffen in fein verteilte Form.* Man treibt den Stoff (z. B. Hg) in dispergierte (Dampf) Form in eine Fl. (fl. Fett), die ersteren in dispergierter Form zurückhält (A. P. 1509824 vom 28/6. 1922, ausg. 30/9. 1924.) KAUSCH.

Max Buchner, Hannover-Kleefeld und Alfred Wakenhut, Hannover, *Vorrichtung zum Filtrieren,* bei welcher gemäß D. R. P. 402252 Filter beliebiger Art zwischen einem mit Bohrung u. Erweiterung zum Sammeln u. zur Ableitung des Filtrats versehenen elast. Zwischenkörper u. einem als Filterkammer dienenden Aufsatz elast. gehalten werden, dad. gek., daß das die Filterkammer aufnehmend Vakuumgefäß mit seinem verbreiterten Stopfenrand dem elast. Zwischenkörper zur Auflage dient. (D. R. P. 403858 Kl. 12d vom 16/5. 1922, ausg. 9/10. 1924. Zus. zu D. R. P. 402252; C. 1924. II. 2287.) KAUSCH.

Otto Begerow und Paul Siede, Kreuznach, Herstellung einer Filterschicht, dad. gek., daß trockne, ganz dünne, poröse u. schleierartige, auf einer Papiermaschine hergestellte zusammenhängende Faserschichten von gleicher oder verschiedener Faserbeschaffenheit angefeuchtet zwischen ebenen parallelen Flächen aufeinandergepreßt u. nach der Pressung getrocknet werden. — 2. dad. gek., daß sie auf eine naß angeschwemmte Schicht aufgelegt wird u. deren Wirkungsgrad vergrößert. — 3. dad. gek., daß sie trocken in einem Anschwemmfilter eingelegt, durch Aufgießen von in Fl. aufgelösten feinen Fasern am Rande abgedichtet wird. (D. R. P. 405055 Kl. 12d vom 16/4. 1921, ausg. 25/10. 1924.) KAUSCH.

Moriz Weinrich, New York, Kohlenstoffhaltiges Filtermaterial. Man mischt eine Saccharose- u. eine Glucoselsg. mit Kalk, zerbricht die entstandene harte glasartige M. in kleine Stücke, calciniert u. kühlt sie ab. (Holl. P. 6780 vom 10/4. 1919, ausg. 15/5. 1922. A. Prior. 21/6. 1918.) KAUSCH.

C. A. Brackelsberg, Hemer i. W., Gasentwicklungsapparat, dad. gek., daß der Behälter für die Gasentbindungsmasse in eine unbewegliche Gasglocke hineingeschoben ist u. der Säurebehälter aus zwei offenen Kammern besteht, die durch einen Kanal miteinander verbunden sind, von denen eine Kammer durch eine unbewegliche Gasglocke verschlossen u. die andere Kammer durch eine Fl. abgeschlossen ist. (D. R. P. 404637 Kl. 12g vom 14/4. 1923, ausg. 21/10. 1924.) KAUSCH.

Wilhelm Kochmann, Charlottenburg, Vorrichtung zum Behandeln von Gasen mit Fl., sowie zum Absorbieren u. Waschen von Gasen durch Hindurchtreten einer Gas-Fl.-Säule durch eine auf- u. absteigende Rohrleitung, 1. dad. gek., daß an den nächst aufsteigenden Teil des Rohrsystems der absteigende Teil derart angeschlossen ist, daß er als Heber wirkt. — 5 weitere Ansprüche betreffen Ausführungsformen der Vorr. (D. R. P. 404618 Kl. 12e vom 5/9. 1913, ausg. 20/10. 1924.) KAUSCH.

Carbide and Carbon Chemicals Corporation, New York, übert. von: Gail Ersereau, New York, Behandlung von Gasen. Man läßt eine komplexe Mischung von gesätt. u. ungesätt. KW-stoffgasen unter die Oberfläche einer Temp. kontrollierenden Fl. gleichzeitig mit einem Halogen, das mit den ungesätt. KW-stoffen reagiert, eintreten, u. behandelt die flüchtigen Anteile mit einem Regen dieser Fl., prüft man die erhaltenen Prodd. von den nicht zur Umsetzung gekommenen gesammelt. (A. P. 1509603 vom 16/9. 1913, ausg. 23/9. 1923.) KAUSCH.

Elektrische Gasreinigung-G. m. b. H., Charlottenburg, und Dr. H. Rohmann, Saarbrücken, Elektrische Gasreinigung, dad. gek., daß zur Erzielung günstiger Staubreinigung mit gleicher Klemmenspannung in allen Behandlungsabschnitten der Abstand zwischen den einzelnen in einer Apparatur hintereinanderliegenden Sprüh-Abscheidungs Elektroden im Sinne des Gasstroms stufenweise so vergrößert wird, daß der Einfluß der geladenen Staubeilchen auf die Sprühentladung überall kompensiert wird. (D. R. P. 404619 Kl. 12e vom 17/5. 1922, ausg. 20/10. 1924.) KA.

Alfred O. F. Schroeder, Fürstenwalde a. Spree, Gebrauchsfertige Patrone für Gasreinigung bzw. -trocknung mittels Oberflächen- u. gegebenenfalls Filterwrkg., gek. durch einen einseitig verschlossenen Hohlzylinder, in dem mit Reinigungs- bzw. Trockenmasse gleichmäßig beschickte Einsatzkörper derart befestigt sind, daß das reinigende Gas in bekannter Weise einen langen Weg über die Reinigungs- masse hinweg zu nehmen gezwungen ist. — Die Patrone ist besonders zur Reinigung u. Trocknung von Acetylen gas geeignet. (D. R. P. 404104 Kl. 26d vom 1/7. 1922, ausg. 15/10. 1924.) OELKER.

U. S. Industrial Alcohol Co., West Virginia, übert. von: Arthur A. Backus, Baltimore, Maryland, Reinigung von Kohlensäure. Von der alkoh. Gärung

stammende Gase werden durch aktive Kohle hindurchgeleitet. (A. P. 1510373 vom 5/5. 1924, ausg. 30/9. 1924.) KAUSCH.

Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Leverkusen b. Köln a. Rh. (Erfinder: **Heinz Thienemann**, Leverkusen), *Trocknen von Gasen und Dämpfen sowie zum Entwässern von Flüssigkeiten und festen Körpern mittels Aluminiumhydroxyd*, das eine hohe Erhitzung erfahren hat, dad. gek., daß man als Trockenmittel $\text{Al}(\text{OH})_3$ verwendet, das zu festen Stücken gepreßt u. in dieser Form auf Rotgl. (400—600°) erhitzt worden ist. (D. R. P. 405238 Kl. 12e vom 25/2. 1921, ausg. 28/10. 1924.) KAUSCH.

Charles Rinkenbach, Mülhausen, Frankr., *Einrichtung zum Abkühlen und Auskrystallisieren von Salzlösungen* in treppenförmig aneinandergereihten flachen Rieseltrögen, die zu auf Fahrgestellen übereinander angeordneten Gruppen vereinigt sind dad. gek., daß die einzelnen Rieseltröge jeder Gruppe in der Abflußrichtung de Fl. gegen den darunter folgenden Rieseltrög so weit verschoben sind, daß beim treppenförmigen Aneinanderreihen je zweier durch ein Fahrgestell vereinigte Gruppen von Trögen auf geneigten Fahrschienen der Ausflußrand jedes einzelnen Troges der höher stehenden Gruppe über den Einlauftrand eines entsprechenden Troges der tiefer folgenden Gruppe übergreift, so daß die jedem Troge abfließende Fl. unmittelbar in einen bestimmten der folgenden Rieseltröge geleitet wird. (D. R. P. 404620 Kl. 12l vom 5/11. 1921, ausg. 21/10. 1924.) KAUSCH.

Charles Rinkenbach, Mülhausen, Frankr., *Vorrichtung zum Verteilen von aus Auskrystallisieren zu bringenden Salzlösungen in Rieseltröge*, gek. durch eine m Zulauftrichter versehene Verteilungsrinne u. eine an diesen Überlauftrand sich anschließende, flach geneigte Verteilungsplatte, die nahe ihrem unteren Rand in gleich breite Vertiefungen übergeführt ist, an die sich unten Fallröhren anschließen, deren jede in eine der verschiedenen Höhenlagen der zu beschickenden Rieseltröge entsprechend angeordneten Speiserinnen ausmündet. — 2 weitere Ansprüche kennzeichnen Ausführungsformen der Vorr. (D. R. P. 404621 Kl. 12l vom 5/11. 1921, ausg. 21/10. 1924.) KAUSCH.

Rotopulsor Akt.-Ges., Schaffhausen, Schweiz, *Überführung krystallisierbarer amorpher, fester Stoffe in den krystallinischen Zustand*, dad. gek., daß die amorphen Stoffe mit Impfkristallen versetzt u. sodann einem starken Druck ausgesetzt werden, wobei zweckmäßig die Pressung gleichzeitig zur Formgebung benutzt wird. (D. R. P. 404906 Kl. 12c vom 2/11. 1923, ausg. 23/10. 1924.) KAUSCH.

Joh. Mac Lang, Hannover, *Destillierapparat*, bei dem der Kühler den Verdampfungsraum ganz oder teilweise umgibt, dad. gek., daß der Kühler als ein besonderer, in sich abgeschlossener Ringkörper den Kessel mit einem der freien Luft zugänglichen Zwischenraum umgibt, u. zwar in dessen unterem Teil, so daß die Verbindungsrohre zwischen Kochkessel u. Kühler nach unten gerichtet sind. (D. R. P. 404696 Kl. 12a vom 21/1. 1923, ausg. 25/10. 1924.) KAUSCH.

Badische Anilin- & Soda-Fabrik (Erfinder: **Martin Müller-Cunradi**), Ludwigshafen a. Rh., *Verfahren zur fraktionierten Destillation von verflüssigten Gasgemischen*, besonders zur Zerlegung verflüssigter Kohledestillationsgase, 1. dad. gek. daß die von den abziehenden Dämpfen erzeugten Bewegungen eines Strömungsmessers in zwangsläufige Abhängigkeit von der Gasentwicklung gebracht wird. — 2. dad. gek., daß die Wärme dem nur zum Teil mit verflüssigten Gasen gefüllten Behälter, der zweckmäßig mit Füllkörpern versehen ist, von unten zugeführt wird u. daß der obere Teil dieses Behälters vor Erwärmung geschützt bleibt. (D. R. P. 405308 Kl. 12a vom 27/6. 1922, ausg. 31/10. 1924.) KAUSCH.

Albert Klein, Stuttgart, *Kältemittel für Kältesysteme*, 1. dad. gek., daß es im wesentlichen aus nur einer der beiden Isomeren des *Dichloräthylens* besteht. — 2. gek. durch seine Verwendung in einem Kreislauf, bei dem es ständig unter

einem geringeren als Atmosphärendruck steht. (D. R. P. 404960 Kl. 17a vom 14/7. 1923, ausg. 24/10. 1924.) KAUSCH.

Norsk Hydro-Elektrisk Kvaestofaktieselskab, Kristiania, *Katalysator*. Man erhitzt eine reduzierbare Metallverb. mit einem mehrwertigen A. mit oder ohne Zusatzmittel. (N. P. 38200 vom 12/4. 1920, ausg. 5/11. 1923.) KAUSCH.

V. Anorganische Industrie.

Alfred T. Larson, *Verstärkte Ammoniakgewinnung mit praktischen Katalysatoren*. Bericht über die Verwendung von Fe-Katalysatoren u. deren Verstärkung durch gewisse Zusätze, sowie über die Wichtigkeit möglichst reiner Gasgemische. Ind. and Engin. Chem. 16. 1002—4. 1924. Washington [D. C.] GRIMME.

H. A. Doerner, *Gewinnung von Vanadium aus vanadinhaltigem Sandstein*. Der in Frage kommende Stein enthielt etwa 3% V_2O_5 . Es werden folgende Methoden zur Gewinnung des V erörtert: 1. Einfaches Rösten mit nachfolgendem Auslaugen von heißem H_2O u. anderen Reagentien; 2. Schmelzen mit $NaHSO_4$ u. anschließendem Auslaugem mit heißem H_2O ; 3. Schmelzen mit Salz u. Soda u. nachfolgendem Auslaugen mit heißem H_2O u. 4. Aufschluß des gerösteten Gesteins unter Druck mit H_2SO_4 u. Salz mit nachfolgendem Auslaugen mit heißem H_2O . Die Ausbeuten schwanken zwischen 35,3% bei 1 bis 93,3% bei 4. Bei 3 ist die Ausbeute 75—77%. Für die Praxis eignet sich am besten 3, da bei dem Aufschluß mit H_2SO_4 die Kosten für Reagentien u. App. verhältnismäßig hoch sind. (Chem. Metallurg. Engineering 31. 429. 1924.) GOTTFRIED.

J. H. Frydlander, *Kieselsäuregel, Herstellung, Eigenschaften und Verwendung*. F. behandelt die Eigenschaften des *Kieselsäuregels*, die Verwendung als *Absorptionsmittel* u. als Katalysatorträger u. die Herst. nach den Verff. von PATRICK, HERRMANN, BAYER u. a. (Rev. des produits chim. 27. 613—16. 1924.) JUNG.

Werner Mecklenburg, *Über aktive Kohle*. Vortrag über Herst. u. Eigenschaften. (Ztschr. f. angew. Ch. 37. 873—77. 1924. Aussig a. E.) JUNG.

Berthold Block, *Die deutsche Entfärbungskohle Polycarbon*. Sie wird hergestellt von der MICHAEL-A.-G.-Berlin; die Korngröße kann beliebig, den jeweiligen Verhältnissen entsprechend gewählt werden. Die Kohle ist völlig neutral, beeinflusst so die Alkalität des Zuckersaftes nicht. Man muß danach streben, auf dem Filter eine Schicht des *Polycarbons* von 10—20 mm zu erzeugen. Dabei ist darauf zu achten, daß die Entfärbungskohle nicht als Filter dienen soll, sondern nur zum Entfärben, anderenfalls würde die entfärbende Wrkg. der Kohle beträchtigt werden. Man soll deshalb den Zuckersaft, bevor er zum Entfärbungsfilter kommt, völlig blank u. klar filtrieren. Anfangs beträgt die Entfärbung 90—95%; sie geht allmählich zurück, kann aber leicht wieder hergestellt werden. (Zentralblatt f. Zuckerind. 32. 1080—82. 1924. Charlottenburg.) RÜHLE.

Carl Elschner, *Die Verarbeitung von Seewasser zu hochwertigen Produkten in Kalifornien*. Beschreibung der Gewinnung von $NaCl$, $MgSO_4$, KCl , Carnallit. Chem.-Ztg. 48. 759—61. 1924. Cosamalodpan [Mexico.] JUNG.

—, *Elektrolytische Alkali- und Chlorherstellung*. Die Anlage der Canadian Salt Company wird ausführlich beschrieben. Die entstehende Lauge enthält pro 1 l 10 g $NaOH$, 17,5 g $NaCl$, 0,6 g Na_2SO_4 u. 0,17 g Fe. Das entweichende Cl enthält 95% Cl_2 , 1,2% CO_2 , 1% H_2 u. Spuren von CO . Diese Beimengungen bleiben in der Verflüssigung des Cl_2 zurück. Das bei der Verflüssigung entweichende H_2 wird zur Herst. von Ca-Hypochlorit verwandt. Die Eigenschaften des hierzu verwendenden Kalkes u. die ganze Anlage werden beschrieben. (Chem. Trade Journal. 75. 360—61. 391. 1924.) GOTTFRIED.

D. A. Pritchard und G. E. Gollop, *Die Verfahren der Canadian Salt Company zur Herstellung von Alkali-Chlorprodukten*. Ausführliche Beschreibung der

Fabrikation an der Hand zahlreicher Bilder. (Ind. and Engin. Chem. **16**. 1056—62. 1924. Windsor [Ont.]) GRIMME.

E. J. Fox und **C. W. Whittaker**, *Kali aus Zementstaub. Konzentration durch Schlümmung mit Luft*. Vff. beschreiben ein Verf., welches durch Gebläseluft den Zementstaub in verschiedene Fraktionen zerlegt. Alle enthalten gewisse Mengen K_2O , doch nimmt der Gehalt zu mit dem Feinheitsgrade, da das K_2O hauptsächlich im feinsten Staube enthalten ist. (Ind. and Engin. Chem. **16**. 1044—1046. 1924. Washington [D. C.]) GRIMME.

L. A. Pratt, *Die Herstellung von Natriumhyposulfit*. Beschreibung einer prakt. Einrichtung für den Großbetrieb an der Hand eines instruktiven Bildes. (Ind. and Engin. Chem. **16**. 676—77. 1924. Boston [Mass.]) GRIMME.

Oswald von Faber, 'st. Gravenhage, Holland, *Gewinnung von Jod aus jodhaltigen Flüssigkeiten* mit Hilfe von Adsorptionsmitteln, insbesondere aktive Kohle, 1. dad. gek., daß man die Fl. mit einer solchen Menge des Adsorptionsmittels behandelt, die gerade zur vollständigen Adsorption des J notwendig ist, u. daß man das Adsorptionsmittel ohne vorherige Wiederbelebung für weitere Chargen J-haltiger Fl. anwendet. — 2. dad. gek., daß man bei jeder neuen Charge eine kleine Menge frischen Adsorptionsmittels zugefügt. (D. R. P. 398317 Kl. 12i vom 14/4. 1922, ausg. 18/10. 1924.) KAUSCH.

Johannes Boedler, Potsdam, *Herstellung von trockenem und chemisch reinem Halogenwasserstoff*, dad. gek., daß man Halogen in einer Siedeatmosphäre auf *Tetrahydronaphthalin* in der Wärme zur Einw. bringt. (D. R. P. 405376 Kl. 12i vom 28/4. 1922, ausg. 31/10. 1924.) KAUSCH.

L'Air Liquide, Soc. anon. pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés G. Claude, Paris, *Ammoniaksynthese*. Die Rk. wird unter Drucken von 400—200 at. in Ggw. eines katalyt. Stoffes derart durchgeführt, daß nach Einleiten der Rk. durch äußere Wärmezufuhr die Reaktionstemp. mittels der bei der Vereinigung der Elemente entwickelten Wärme unter gleichzeitigem Ableiten jeglichen Wärmeüberschusses nach außen, auf etwa 500—700° gehalten wird. (Oe. P. 96786 vom 16/4. 1920, ausg. 25/4. 1924. F. Prior. 31/3. 1917.) KAUSCH.

Badische Anilin- & Soda-Fabrik, Ludwigshafen a. Rh., *Vorrichtung zur elektrischen Heizung von Druckgasen*, z. B. des N_2-H_2 -Gemischs für die NH_3 -Synthese. Diese besteht aus einem die Hin- u. Rückleitung des Stromes enthaltenden, einseitig in den zu heizenden App. einführbaren Heizkörper, der einen großen Leitungsquerschnitt aufweist u. nur auf einer Seite in dem Hochdruckapp. befestigt wird. (D. R. P. 405309 Kl. 12g vom 14/7. 1921, ausg. 28/10. 1924.) KAUSCH.

Woodall, Duckham & Jones (1920) Ltd., Oldbury S. C. Syndicate Ltd und **Arthur Mc Dougall Duckham**, London, *Bindung von Stickstoff mittels Kohlenstoffs und Bariumoxyds*. (D. R. P. 402266 Kl. 12k vom 29/9. 1922, ausg. 18/9. 1924 u. Aust. P. 9819 vom 8/11. 1922, ausg. 10/4. 1923. E. Prior. 20/12. 1921. — C. 1923. IV. 111.) KÜHLING.

Wallace & Tiernau Co., Inc., Belleville, N. J., übert. von: **John C. Baker** Nutley, N. J., *Stickstofftrichlorid*. Man mischt Cl_2 -W. u. ein NH_4 -Salz oder NH_3 Lsg. miteinander in Berührung, läßt die Lsg. stehen u. entfernt alsdann das gebildete NCl_3 durch einen hindurchgeleiteten Luftstrom. (A. P. 1510132 vom 21/4. 1924, ausg. 30/9. 1924.) KAUSCH.

Frans Georg Liljenroth, Stocksund, *Phosphorsäure und Ammoniak*. Phosphornitrid wird mit Wasserdampf in NH_3 u. H_3PO_4 übergeführt. (N. P. 38466 vom 19/8. 1922, ausg. 3/12. 1923. Schwed. P. 55557 vom 6/9. 1921, ausg. 13/11. 1923.) KAUSCH.

Chemical Construction Company, Charlotte, *Phosphorsäure*. Luft oder ei

anderes Oxydationsmittel wird in den Teil der Phosphat-Kieselsäure-Kohle-Beschickung eines elektr. Ofens geblasen, woselbst P-Dämpfe gebildet werden. (N. P. 38530 vom 10/6. 1922, ausg. 10/12. 1923.) KAUSCH.

Charles L. Parsons, Hawkinsville, Georgien, übert. von: Harry P. Bassett, Philadelphia, *Arsenik*. Der W. l. As-Verbb. enthaltende Metallstaub oder Rauch wird mit h. W. ausgelaugt u. der Rückstand mit einer h. Alkali enthaltenden Lsg. extrahiert, um Dialkaliarsenikverbb. zu erhalten. (A. P. 1509688 vom 13/8. 1923, ausg. 23/9. 1924.) KAUSCH.

Badische Anilin- & Soda-Fabrik, (Erfinder: Alwin Mittasch und Josef Jannek), Ludwigshafen a. Rh., *Herstellung einer aktiven Kohle* aus C-haltigem Material, dad. gek., daß man dieses mit beschränkten Mengen Nitraten der Alkalien, einschließlich des NH_4 , oder der Erdalkalien, einschließlich des Mg, behandelt. (D. R. P. 405312 Kl. 12i vom 26/5. 1920, ausg. 30/10. 1924.) KAUSCH.

Mineralchemische Gesellschaft m. b. H., Leipzig, *Erzeugung von Entfärbungskohle* durch Verkohlung von mit Salz imprägnierten organ. Stoffen über Luftzutritt, dad. gek., daß als Imprägnierungsmittel *K-Acetat* verwendet wird, welches nach der Verkohlung zweckmäßig durch verd. HCl entfernt wird. (D. R. P. 405377 Kl. 12i vom 18/11. 1922, ausg. 31/10. 1924.) KAUSCH.

U. S. Industrial Alcohol Co., West Virginia, übert. von: Arthur A. Backhaus, Baltimore, Maryland, *Entfärbungskohlen*. Melassedestillationsrückstände werden auf 25—30° Bé eingedampft, mit Absorptionsmaterial vermischt u. in der Retorte auf 750° erhitzt, wobei man vor oder kurz vor Beendigung des Glühens Dampf einführt. (A. P. 1510131 vom 7/5. 1919, ausg. 30/9. 1924.) KAUSCH.

E. Urbain, Paris, *Adsorptionskohle*. Man pulverisiert ein vorgekohltes Material (Torf, Braunkohle) u. behandelt das Pulver alsdann mit einer Säure oder einer Lsg. eines flüchtigen Salzes u. hierauf mit einem Bindemittel wie Gluten, das in der Fl. unl. die Poren der Kohle nicht durchdringt. Die pastöse M. wird in gleichförmige Stücke auf mechan. Wege übergeführt, getrocknet u. im Vakuum oder einer inerten Atm. auf über 800° erhitzt. (E. P. 218242 vom 19/3. 1924, Auszug veröff. 20/8. 1924. Prior. 25/6. 1923.) KAUSCH.

John Wood Leadbeater, Doncaster, England, *Entfärbungskohle aus Torf*. Getrockneter, fein zerteilter Torf wird mit fein verteiltem Ätzkalk gemischt, das Gemisch gegläht u. der Rückstand mit einer anorgan. Säure ausgewaschen. Die gereinigte Kohle mischt man mit Kieselgur, erhitzt u. trocknet das Gemisch. (A. P. 1510284 vom 12/5. 1919, ausg. 30/9. 1924.) KAUSCH.

Industrial Research Co., San Francisco, übert. von: Clinton E. Dolbear, San Francisco, *Trennung von Alkalisalzen*. Man gibt zu der Lsg. der Salzgemische NH_3 zwecks selektiver Fällung. (A. P. 1510046 vom 18/8. 1923, ausg. 30/9. 1924.) KAUSCH.

R. Roos & Co., Berlin, *Herstellung von Schwefelnatrium* durch Schmelzen von Na_2SO_4 u. Einwirkenlassen von Reduktionsmitteln auf die Schmelze, dad. gek., daß man das Sulfat im Na_2S -Handofen zuerst zum Schmelzen bringt u. dann in diesem Ofen auf die geschmolzene M. Kohle oder reduzierende Gase einwirken läßt. (D. R. P. 404410 Kl. 12i vom 17/1. 1924, ausg. 17/10. 1924.) KAUSCH.

André Edouard Paul Bourdet, Paris, *Reduzieren von Calciumsulfat zu Schwefelcalcium*. (D. R. P. 404531 Kl. 12i vom 5/3. 1922, ausg. 21/10. 1924. — C. 1923. V. 94.) KAUSCH.

Nils Backman, Stockholm, *Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung von Thlorkalk* in Etagenapp., wobei das Cl_2 -Gas im Gegenstrom zu der von oben nach unten bewegten festen Reaktionsmasse strömt. Verf., 1. dad. gek., daß durch eine geregelte Kühlung der einzelnen Etagen des App. die Temp. der festen Reaktionsmasse zum allmählichen Sinken in dem Maße, wie die Chlorkalkbildung ansteigt,

gebracht wird. — 2. dad. gek., daß die Kühlung im oberen Teil des App. zwischen 30 u. 50° u. im unteren Teil zwischen 15 u. 25° gehalten wird. — Vorr. mit übereinanderliegenden Zwischenböden, welche je mit einem Kühlrohr oder Kühlkasten mit besonderer Zu- u. Abflußleitung für Kühlwasser versehen sind, die derart eingerichtet ist, daß die Kühlwassermenge einerseits an einem freien, in einem Trichter oder eine Rinne mündenden Abflußstutzen beobachtet werden kann, während die Temp. des abfließenden W. an Thermometern abgelesen werden kann, die an den einzelnen Abflußleitungen angebracht sind. Weitere 3 Ansprüche betreffen Ausführungsformen der Vorr. (D. R. P. 404768 Kl. 12i vom 16/12. 1922, ausg. 31/10. 1924.) KAUSCH.

Rhenania Verein Chemischer Fabriken A.-G. (Erfinder: **B. C. Stuer**), Aachen, Gewinnung von *Strontiumhydroxyd* aus SrS , 1. dad. gek., daß dieses mit kaust. Alkalien in Ggw. von W. behandelt wird. — 2. gek. durch die Verwendung von NH_3 in Ggw. der Hydroxyde der fixen Alkalien. — 3. gek. durch wiederholte Benutzung des aus der Mutterlauge des Sr(OH)_2 ausgetriebenen NH_3 zur Abscheidung neuer Mengen von Sr(OH)_2 . (D. R. P. 404769 Kl. 12m vom 28/9. 1923, ausg. 21/10. 1924.) KAUSCH.

Electric Smelting & Aluminium Company, Sewarten, N. J., übert. von: **Alfred H. Cowles**, Sewarten, *Alkalien und Tonerde*. Leucit, Feldspat u. ähnliche Aluminiumsilicate werden mit soviel Na_2CO_3 gesintert, daß ein 1 Mol. SiO_2 auf 2 Mol. Erdalkalioxyd u. weniger als $\frac{71}{100}$ Mol. Alkalioxyd enthaltendes Prod. entsteht, das ausgelaugt wird. (A. P. 1508777 vom 20/11. 1915, ausg. 16/9. 1924.) KAUSCH.

Texas Company, New York, übert. von: **George W. Gray**, New York, und **Frank W. Hall**, Port Arthur, Texas, *Aluminiumchlorid*. Man erhitzt ein Gemisch von Al_2O_3 u. Kohle u. chloriert das verkokte Prod. (A. P. 1508451 vom 1/12. 1921, ausg. 16/9. 1924.) KAUSCH.

Ralph H. McKee, New York, *Aluminiumchlorid*. Al-enthaltendes Material wird in Ggw. aktiver Kohle mit Cl_2 behandelt. (A. P. 1509605 vom 5/10. 1923, ausg. 23/9. 1924.) KAUSCH.

Turc Robert Haglund, Stockholm, *Aluminiumsulfid*. Man läßt auf ein Al_2O_3 -haltiges Material, wie Bauxit, Alaunschiefer, Feldspat, Kohle in Ggw. einer S-Metallverb. in der Hitze einwirken: $\text{Al}_2\text{O}_3 + 2\text{SiO}_2 + 3\text{FeS} + 7\text{C} = \text{Al}_2\text{S}_3 + \text{Fe}_3\text{Si}_2 + 7\text{CO}$. (N. P. 38590 vom 1/12. 1921, ausg. 17/12. 1923. Schwed. P. 54107 vom 12/3. 1920, ausg. 28/3. 1923.) KAUSCH.

Hugo Bunzel, München, *Herstellung von Alkali- (Erdalkali-) Schwefeleisenverbindungen und den Hydraten der Alkalien oder der alkalischen Erden mittels hydratischer Eisensauerstoffverbindungen* in bas. Form, dad. gek., daß diese Eisenhydrate mit den Sulfiden der Alkalien oder Erdalkalien behandelt werden. — 2. gek. durch gleichzeitige Anwendung von Alkali- u. Erdalkalisulfid, so daß neben einer Erdalkali-Schwefeleisenverb. gleichzeitig das Hydrat des Alkali entsteht. — Nutzbarmachung des in den Schwefeleisendoppelverb. enthaltenen Alkalies oder Erdalkalis durch Behandlung der durch 1. u. 2. erhaltenen Doppelverb. mit CO_2 -freier Luft, O_2 , SO_2 , CO_2 oder Metallsalzen, namentlich FeCl_2 , zur Erzielung von Thiosulfaten bzw. Carbonaten u. anderen Salzen der Alkalien oder alkal. Erden. (D. R. P. 404245 Kl. 12l vom 3/1. 1920, ausg. 16/10. 1924.) KAUSCH.

Metalltwerke A.-G. für Metallveredelung, München, *Umwandlung solcher Metalle und Legierungen, die von Schwefelsäure nicht oder nur langsam gelöst werden, in die entsprechenden Sulfate unter Verwendung von Salpetersäure*. Man läßt zunächst konz. HNO_3 für sich solange allein auf das Metall (Cu, Ni, Messing) einwirken, bis der größte Teil der Säure gebunden ist, hierauf trennt man die noch stark saure Nitratlauge vom Metall u. läßt nach Zugabe der erforderlichen Menge

konz. H₂SO₄ auskristallisieren, worauf die Krystalle von Mutterlauge getrennt u. gewaschen werden, während die Mutterlauge u. die Waschlauge zum Zersetzungsprozeß zurückgeführt werden. (Oe. P. 95700 vom 3/9. 1921, ausg. 10/1. 1924.) KAUSCH.

Metals Extraction Corporation Limited, London, *Reinigung von Zink*, besonders *Zinksulfatlösungen*. Die Lsgg. werden in üblicher Weise von Fe, As, Sb, Cu u. Cd befreit, dann bei 80° mit einem Metallsuperoxyd, vorzugsweise PbO₂, behandelt, um Co zu fällen u. schließlich bei 80—100° der Einw. von fein gepulvertem Zn ausgesetzt, wodurch Ni entfernt wird. (N. P. 37709 vom 21/8. 1919, ausg. 10/8. 1923.) KÜHLING.

Ferdinand Krauss und **Hans Kükenthal**, Braunschweig, *Darstellung reiner, insbesondere alkali- und chlorfreier Rutheniumverbindungen*. (D. R. P. 405313 Kl. 12n vom 6/12. 1923, ausg. 31/10. 1924. — C. 1924. I. 1347.) KAUSCH.

VI. Glas; Keramik; Zement; Baustoffe.

Léonce Fabre, *Die Spezialmaterialien für die chemische Industrie*. Besprechung der Eigenschaften u. Verwendbarkeit von chem. Tonwaren, Pyrexglas, geschmolzener SiO₂ u. geschmolzener SiO₂ „Silis.“ (Rev. chimie ind. 33. 160—64. 1924.) St.

Arnaldo Mauri, *Die Gläser für die analytischen Arbeiten und ihre chemischen und physikalischen Eigenschaften*. Vf. untersucht Gläser der Glasfabrik Murano auf ihr chem. u. physikal. Verh. u. vergleicht sie mit den Eigenschaften der Jenaer Gläser. Er unterscheidet saure u. neutrale Gläser. Die ersteren kann man, wenn sie sorgfältig gearbeitet sind, großen Temp.-Unterschieden aussetzen. Beim Arbeiten mit W., Säuren u. Salzen kann man mit sauren Gläsern arbeiten, da die Angreifbarkeit dieser Reagentien auf das saure Glas während der kurzen Dauer der Einw. vernachlässigt werden kann. Arbeitet man dagegen mit Alkalien, so muß man auf die therm. Widerstandsfähigkeit des sauren Glases verzichten u. mit neutralem Glas arbeiten, da das saure Glas schon in kurzer Zeit von den Alkalien stark angegriffen wird. (Giorn. di Chim. ind. ed appl. 6. 429—31. 1924.) GOTTFRIED.

Oscar Knapp, *Das Bleiglas und die Glasformel*. Die Glasformeln haben bei den Bleigläsern wenig Gültigkeit; die Aufstellung einer Normalformel hat weder theoret. noch prakt. Zweck. Die Grenzwerte der Bleigläser umfassen einen viel größeren Bereich als die der Kalkgläser; denn die Leichtschmelzbarkeit des Bleisulfoxids ermöglicht eine sehr hohe Silicierung bis über die Grenze $z = 5 (x^2 + 1)$; andererseits erlaubt seine Schwerlöslichkeit u. seine chem. Widerstandsfähigkeit auch die Herst. haltbarer Gläser mit weniger als $z = 2 (x^2 + 1)$ SiO₂. (Sprechsal 57. 512—14. 1924.) WECKE.

E. Zschimmer, *Bemerkungen zu den Natron-Kalk-Kieselsäurediagrammen von J. Gelstharp und J. C. Parkinson*. Krit. Vergleichung der Haltbarkeitsgrenzen der Natron-Kalk-Silicatgläser nach GELSTHARP u. PARKINSON mit den Grenzlinien, die f. unter Benutzung der Beobachtungen von WEBER, BENRATH, MYLIUS, FÖRSTER a. in einem Vierdimensionaldiagramm der Spiegelgruppe gezogen hat. (Sprechsal 57. 466—68. 1924. Karlsruhe.) WECKE.

E. Spindler, *Die Brennfelder des Hartporzellans*. I. Ihre Grundlagen und Ursachen. II. Ihre Beziehungen zum Ofensystem. I. 1. Die Grundlagen: a) Die Vorgänge im Scherben beim Brand, b) der Aufbau der Hartporzellanmasse. 2. Die Ursachen: a) Temperaturfehler, b) Atmosphärenfehler. — II. 1. Die brenntechn. Bedingungen für ein zweites Ofensystem: a) Möglichkeit guter Temp.-Regulierung, b) Möglichkeit, wirtschaftlich eine genügend hohe Gasbrandtemp. zu erreichen, c) gleichmäßige Wärmeverteilung über den Ofeninhalt, d) Möglichkeit guter Atmosphärenregulierung. 2. Die brenntechn. Bedingungen u. das Ofensystem: a) der Rundofen, b) der Gaskammerofen, c) der Tunnelofen, d) Vergleich der 3 Ofensysteme

in bezug auf die brenntechn. Bedingungen. 3. Die Brennfehler u. das Ofensystem: a) Temp.-Fehler, b) Atmosphärenfehler, c) Vergleich der 3 Ofensysteme in Bezug auf Brennfehlermöglichkeiten. — Die Vorgänge im Scherben beim Brande der Hartporzellanmasse bestimmen nicht nur deren Zus. u. Aufbereitung, sondern auch die Feuerführung in Bezug auf den zeitlichen Temp.- u. Atmosphärenverlauf, sowie auch die Ofenkonstruktion. (Keram. Rdsch. 32. 542—47. 589—92. 602—5. 1924.)

WECKE.

Alfred Francis Joseph und John Stanley Hancock, *Die Zusammensetzung und Eigenschaften von Tonerde*. Die chem. u. physikal. Eigenschaften von ca 15 Tonerden verschiedener Herkunft wurden bestimmt. Die chem. Zus. wechselt stark, besonders das Verhältnis $\text{SiO}_2 : \text{Al}_2\text{O}_3$ (A), das Werte von 2,11 bis 7,67 zeigte. Um eine Gewähr für die Homogenität der Materialien zu haben, wurden nur die Anteile von weniger als 0,002 mm Durchmesser, bestimmt durch die Schwebzeit in W., benutzt. Es zeigte sich, daß eine Beziehung zwischen A u. den typ. Toneigenschaften besteht, die am ausgeprägtesten bei den plast. Tonen sind. Als ein gutes Maß für die Plastizität betrachten Vff. solche Eigenschaften, die sich durch Glühen der Materialien oder Behandlung mit Elektrolyten stark ändern. Sie führten als solches das „Feuchtigkeitsäquivalent“ ein, d. h. den %-Gehalt W., die die gut durchfeuchtete M. nach dem Zentrifugieren unter bestimmten Bedingungen zurückhält. Es scheint auch mit A verknüpft zu sein, z. B. zeigte Kaolin (A = 2) ein Feuchtigkeitsäquivalent von 44, nach dem Glühen 58, ohne Glühen, aber nach Behandlung mit 3%ig. Na_2CO_3 -Lsg. 49. Die entsprechenden Zahlen sind für Löß (A = 3,9) 37,8, 11,1 u. 51,3 u. für Bentonit (A = 6,9) 118, 47,1 u. 180. Auch das Verh. gegen NaOH u. Neutralsalze, insbesondere Basenaustausch u. Erzeugung von Acidität in neutralen Lsgg. dürfte mit A verknüpft sein. (Journ. Chem. Soc. London 125. 1888—95. 1924. Khartoum, Wellcome Trop. Res. Lab.)

HERTER.

A. Simon, *Erzeugung von glasierten Steingutplatten*. Überblick über die rationelle Einrichtung u. Arbeitsweise einer neuzeitlichen Wandplattenfabrik. (Ind. u. Technik 5. 220—25. 1924.)

WECKE.

A. Berge, *Magnesia als keramisches Rohmaterial*. Bericht über Verss. zur Herst. von Zementen aus Magnesia unter Zusatz von Chloriden. (Sprechsaal 57. 454—56. 1924. Bunzlau.)

WECKE.

V. Rodt, *Über das Verhalten der Alkalien des Zementes bei Lagerung von Zement- und Zementmörtelkörpern in Wasser*. Bei Lagerung eines Druckwürfels (1:3) in dest. W. ging innerhalb 28 Tagen die Hälfte des Gesamtalkaligehaltes des Würfels in die Lagerungsf. über. Bei Lagerung von reinem Zement in Leitungswasser verschwand dessen Kalk u. Magnesia; dagegen ging in der Lagerungsf. Soda in Lsg.; bei Zusatz von Zucker zeigte sich auch Ätznatron. (Zement 13. 47 bis 472. 1924. Berlin.)

WECKE.

Hans Hirsch, *Zement-Kalke*. Zementkalk ist ein hochwertiger hydraul. Kalk der zwischen den löschfähigen Wasserkalken u. dem Romankalk bzw. -zement steht. Zur Nachprüfung dieser Abgrenzung führte Vf. synthet. Arbeiten aus, deren Prodd. chem., mech.-techn. u. mkr. geprüft wurden. (Tonind.-Ztg. 48. 929—32. 1924. Berlin.)

WECKE.

Walter Dyckerhoff, *Was ist Alit? Neue Untersuchungen über die Konstitution der Portland-Zement-Klinker*. Auf Grund seiner Verss. u. der großen Neigung des α -Bicalciumsilicats, aus basischen Schmelzen der verschiedensten Zus. im System Kalk-Kieselsäure-Tonerde als primäre Phase auszukristallisieren, u. dessen Eigenschaften hydraul. Erhärtung ist Vf. der Ansicht, daß das α -Bicalciumsilicat den Träger des Alit im Portlandzementklinker bildet. (Zement 13. 455—57. 467—72. 1924.)

WECKE.

H. K. Benson, J. S. Herrick und T. Matsumoto, *Die Löslichkeit von Portlandzement in Mitteln, welche die Verwitterung befördern*. Die Zers. von Zement, durch W. erfolgt vor allem durch Hydrolyse des vorhandenen *Tricalciumsilicats* gemäß der Gleichung: $3\text{CaO} \cdot \text{SiO}_2 + 3,5\text{H}_2\text{O} = \text{CaO} \cdot \text{SiO}_2 \cdot 2,5\text{H}_2\text{O} + 2\text{Ca}(\text{OH})_2$. Die vorhandenen Al- u. Fe-Verbb. werden kaum angegriffen, da der wss. Auszug fast ausschließlich aus $\text{Ca}(\text{OH})_2$ besteht. In dest. W. ist die Löslichkeit sehr gering, Ggw. von CO_2 u. gel. organ. Substanz erhöht sie. Sie geht konform mit der Anhydrierung. Je geringer der Gehalt an gebundenem W., desto höher die Löslichkeit. (Ind. and Engin. Chem. 16. 1063—66. 1924. Seattle [Wash.]) GRIMME.

Karl Biehl, *Hochwertige deutsche und ausländische Portlandzemente*. Vf. prüfte 8 deutsche hochwertige Portlandzemente u. den Schweizer Zement Holderbank nach den deutschen Normen. Die gefundenen Zahlen ergeben, auch auf die Schweizer Normen umgerechnet (nach diesen wird mit der Fallramme statt mit dem Hammerapp. u. mit anderem Normensand gearbeitet), daß in Deutschland hochwertige Zemente von gleicher Güte u. Vollkommenheit hergestellt werden wie im Ausland. (Tonind.-Ztg. 48. 819—20. 1924. Lengerich i. W.) WECKE.

Dahlke, *Hochwertiger Zement und Betonfestigkeiten*. Vergleichende Druck-Verss. mit Schachtofenzement in den Mischungen 1 : 3, $1\frac{1}{4}$: 3, $1\frac{1}{2}$: 3 u. 2 : 3, einmal mit Normensand, zum andern mit Mauersand + Betonkies. (Zement 13. 481—82. 1924. Ennigerloh.) WECKE.

E. Probst, *Zerstörungen an Beton- und Eisenbetonbauten bei Gas- und Wasserwerken. Ursachen und Schutzmaßnahmen*. Die Zerstörungen entstehen meist durch Angriffe auf den Ca-Gehalt des Zements von Seiten kohlensaurer oder l. Sulfate etc. enthaltender Wässer oder durch das Rosten der Fe-Einlagen. Die Schutzmaßnahmen haben sich nach den örtlichen Umständen zu richten; besonders empfohlen wird die Anwendung SiO_2 -reichen u. Al_2O_3 -haltigen Zements. (Gas- u. Wasserfach 67. 513—15. 1924. Karlsruhe.) BÖRNSTEIN.

Graham L. Montgomery, *Mechanische Behandlung des Materials für die Fabrikation von Verblendziegeln*. Der nach neuzeitlichen Grundsätzen eingerichtete Betrieb der Bradford Brick and Tile Co. wird ausführlich beschrieben. (Chem. Metallurg. Engineering 31. 413—16. 1924.) GOTTFRIED.

H. Schilling, *Beitrag zur Bewertung des Kalkes bei der Fabrikation von Silikateinen*. Bei dem verwendeten Kalk muß der CaO-Gehalt bestimmt werden, da % CaO berechnet auf den fertiggebrannten Stein erforderlich sind. Langes Lagern des Kalkes oder der Kalkmilch ist zu vermeiden. (Chem.-Ztg. 48. 787. 1924. Virges, Westerwald.) JUNG.

André Lamure, *Über die Wahl der motorischen Kraft für keramische Betriebe, insbesondere für Ziegeleien*. Gegenüberstellung des Gesteigungspreises der motor. Kraft der verschiedenen Erzeugungsarten, auf Brennstoff umgerechnet. Für Ziegeleien verdient die Dampfkraft den Vorzug. (Céramique 27. 305—6. 1924.) WECKE.

Karl Biehl, *Deutscher und Schweizer Normalsand*. Der Schweizer Normalsand ist kein reiner Quarzsand; er gibt niedrigere Druckfestigkeits- u. höhere Zugfestigkeitswerte als der deutsche Normalsand. Die Unterschiede sind umso geringer, je größer der Wirkungsgrad des Zements ist. Die Festigkeitsunterschiede, die beide Sande ergeben, gleichen sich nach längerer Zeit aus. Das Wertverhältnis der mit dem deutschen Hammerapp. hergestellten Proben zu den mit der schweizer Fallramme erzeugten ist rund $73\frac{1}{2}\%$. (Zement 13. 442—44. 453—55. 1924. Lengerich i. W.) WECKE.

H. Bach, *Die Bewertung und Verwendung des Trasses*. Schluß. (Vgl. Tonind.-Ztg. 8. 812; C. 1924. II. 2361.) Traß für sich ist kein Bindemittel, sondern nur ein Ergänzungsstoff für andere Bindemittel, jedoch nicht für alle. Alle Bindemittel, die „kalkig“ abbinden u. fast alle Portlandzemente können durch Traßzusatz ver-

bessert werden. Wichtig ist dabei sorgfältige Mischung. (Tonind.-Ztg. 48. 820—21. 1924. Essen.)

WECKE.

Otto Ruff, *Die Verarbeitung unplastischer Oxyde zu keramischen Gegenständen und einiges von der Verwendbarkeit dieser*. Vorschriften zur Herst. plastischer Massen aus SiO_2 , Al_2O_3 , ZrO_2 u. CeO_2 durch Behandlung mit Säure u. ihre Behandlung beim Brennen. (Keram. Rdsch. 32. 605—9. 1924. Breslau.)

WECKE.

Felix Linke, *Temperaturmessungen in der Keramik*. Beschreibung der Anwendung des Ardometers u. des Glühfadenpyrometers von HOLBORN u. KURLBAUM in keram. Ofenbetrieben. (Tonind.-Ztg. 48. 941—44. 1924. Berlin.)

WECKE.

VII. Agrikulturchemie; Düngemittel; Boden.

Adolf Mayer, *Die Grenzen der Liebig'schen Agrikulturchemie*. Geschichtlicher Rückblick des Vfs. über seine Stellung gegenüber LIEBIG. (Naturwissenschaften 12. 905—11. 1924. Heidelberg.)

BEHRLE.

E. John Russell, *Die gegenwärtigen Probleme der landwirtschaftlichen Produktion*. (Chemistry and Ind. 43. 888—95. 1924.)

BERJU.

Harald R. Christensen, *Untersuchungen über die Löslichkeit verschiedener Phosphate*. Die Löslichkeit der P_2O_5 in den Phosphaten nach $\frac{1}{2}$ std. Behandlung mit 2%ig. Citronensäure schwankte von 8,7% (Kragerö-Apati) bis 44,8% (Obolen-phosphat). Die Apatite besitzen die geringste Löslichkeit. In CO_2 -haltigem W. lösten sich 0—43,2 mg P_2O_5 im l. u. 22 bis 535 mg CaO, wobei niedriger P_2O_5 -Gehalt mit hohem CaO-Gehalt zusammenfällt. Bernard- u. Tetraphosphat verhalten sich in ihrer Löslichkeit wie Rohphosphate, während Rhenania-Vesta- u. Supraphosphat II. sind. „Offen-Herd-Schlackenphosphate“ zeigten bei einem Gehalt von 12,4—17,9% Gesamt- P_2O_5 eine Löslichkeit in Citronensäure von 10—93% u. eine Citraliöslichkeit von je 47%. Biol. Verss mit Azobakter zeigten, daß nur die Nauraphosphate instande sind, den Bakterien die nötige P_2O_5 zu liefern. Im Gegensatz hierzu wuchs Azobakter gut bei geringen Thomasmehlgaben, während größere Mengen die Vegetation hinderten. Knochenmehl versagte in dieser Beziehung vollständig. Durch Azobakter konnte der Unterschied zwischen Tri- u. Bicalciumphosphat festgestellt werden, wobei ersteres das Wachstum nicht ermöglichte. Bei künftigen Unterss. über den Wert von Phosphaten wird die Azotobakterprobe stets mit herangezogen werden müssen. (Tidskrift for Planteavl 24. 513. 1923; BIED. Zentralblatt f. Agrik.-Ch. 53. 314—15. 1924.)

BERJU.

Fr. Lang und **L. F. Kuchler**, *Beiträge zur Stickstoffdüngung der Wiesen auf Grund dreijähriger Düngungsversuche der Bayer. Landesanstalt für Pflanzenbau und Pflanzenschutz München in den Jahren 1921—1923*. Durch die auf 7 Gütern durchgeführten N-Düngungsverss. wurde nachgewiesen, daß es möglich ist, durch starke N-Gaben (40 bis 200 kg/ha) Mehrerträge an Heu bis zu 70% zu erzielen. Die günstigsten Wrkgg. wurden durch 100 kg N (ausnahmsweise 150 kg) meist in Form von $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ erzielt. Dann folgte Kalk-N besonders auf kalkarmen Böden im Winter gegeben. Die Anwendung des N war restlos erfolgt. Durch die starke N-Düngung wurden die Leguminosen teilweise zurückgedrängt, doch ist die N-sparende Wirkung dieser nicht von ausschlaggebender Bedeutung. Eine nachteilige Versäuerung des Bodens durch $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ wurde nicht beobachtet, u. auch keine Anreicherung des %-Gehaltes an Eiweiß in den Wiesenpflanzen. (Ztschr. f. Pflanzenernähr. u. Düngung Abt. B 3. 393—433. 1924.)

BERJU.

O. Nolte und **M. Gerlach**, *Beiträge zur Kenntnis der Ernährung der Schmetterlingsblütler*. Nach den Ergebnissen von Felddüngungsverss. verspricht starke Düngung mit $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ zu Leguminosen am ehesten Erfolge bei Luzerne u. Erbsen. Seltener bei Rotklee u. kaum bei Serradella u. Lupinen. Dem Harnstoff kommt anscheinend eine besondere Wirkung zu. Die kalkliebenden Erbsen, Bohnen, Klee u.

zuerne können nur bei reichlichem Kalkvorrat des Bodens sichere Erträge bringen. Mitt. der Deutsch. Landw.-Gesellsch. **38**. 78—80. 1923; BIED. Zentralblatt f. Agrik.-h. **53**. 329—31. 1924.)

BERJU.

W. Windisch, *Über den Einfluß der Schwefeldüngung auf die Gerste*. Vf. zeigt, daß die Schwefelbest. in Pflanzen bei Ggw. von viel Alkali ausgeführt werden muß, da sonst ein großer Teil des S unter Verflüchtigung als H_2S und auch als SO_2 — letzteres infolge der frei werdenden H_3PO_4 — verloren geht. Die mit Schwefelblüte gedüngte Gerste zeichnet sich durch einen sehr hohen Gehalt an Eiweiß u. durch ihre Widerstandsfähigkeit gegen den Kornkäfer aus. (Wchschr. Brauerei **41**. 71—72. 1924.)

LINHARDT.

Jacob, *Wirkung der Kalidüngung auf die Stammfäule der chinesischen Jute*. Durch Düngungsverss. wurde festgestellt, daß die Krankheit am stärksten auf den ungedüngten, sowie auf den K-freien Parzellen auftritt, während sie auf den Vollüngungspartzellen um so mehr zurücktrat, je stärker die K-Gaben in der Vollüngung bemessen waren. (Ernährung d. Pflanze **20**. 146—47. 1924.)

BERJU.

J. J. Skinner und F. E. Allison, *Einfluß Borax enthaltender Dünger auf Wachstum und Ertrag der Baumwolle*. Schon die geringe Boraxgabe von 5 lbs pro acre ($Na_2B_4O_7$) zeigte in einigen Fällen nachteilige Wrkg. die mit steigenden Gaben sichtlich zunahm. Bei einem Versuch auf einem Colbert-Lehm Boden, bei dem 100 lbs Borax pro acre breitwürfig verteilt worden waren u. nach dem Einpflanzen ein 10tägiger heftiger Regenfall eintrat, wurde die Keimung der Samen sehr beeinträchtigt u. durch 200 lbs ganz verhindert. Bei Reihendüngung brachte die Hälfte der angegebenen Menge die gleiche Wrkg. hervor. (Journ. Agricult. Research **23**. 433—43. 1923. U. St. A. Dep. of Agric.)

BERJU.

K. D. Jacob, F. E. Allison und J. M. Braham, *Chemische und biologische Studien mit Cyanamid und einigen seiner Umwandlungsprodukte*. Zu 100 bzw. 250 g Boden wurde Cyanamid oder die in Folge genannten Umsetzungsprodd. desselben gegeben u. die Geschwindigkeit ermittelt, mit welcher der N dieser Erbb. in NH_3 - u. HNO_3 -N umgewandelt wurde. Der N im Boden wurde nach ATTHEWS (Journ. Agricult. Science **10**. I. 72; C. 1920. IV. 285) bestimmt. Nach 6 Stdn. Durchleiten von Luft durch die Bodensuspension wurden von dem zusetzten $(NH_4)_2SO_4$ 93,3% u. nach 6 Stdn. 98,5% seines NH_3 -N wiedergefunden. Die Best. des Harnstoffes erfolgte nach FOX u. GELDARD (Ind. and Engin. Chem. **17**. 743; C. 1923. IV. 915) u. die der HNO_3 nach JACOB (Ind. and Engin. Chem. **17**. 1175; C. 1924. I. 943). Cyanamid u. Dicyanamid wurden zusammen nach RABOUX durch Dest. nach KJELDAHL des aus 50 ccm Bodenextrakt ausgefällten ausgewaschenen Ag-Salzes bestimmt. Cyanamid wurde schon nach 5—10 Tagen hauptsächlich in Harnstoff u. NH_3 umgewandelt. Die Nitrifikation des Cyanamids verlief viel langsamer als die des Harnstoffes oder $(NH_4)_2SO_4$. Einige von den Umwandlungsprodd. sowohl des unbehandelten wie des mit 8% W. u. 3,5% Öl versetzten Cyanamids zeigten den nitrifizierenden Bakterien gegenüber tox. Eigenschaften. Die größte Nitrifikationsgeschwindigkeit wurde bei dem Cyanamid nach Einstellung der Wasserkapazität des Bodens bis zu $\frac{1}{4}$ (10%) u. bei 38,5° beobachtet. Durch partielle Sterilisation des Bodens mittels C_6H_5OH wurde jegliche Nitrifikation verhindert. Zusatz von Dicyandiamid verzögerte die Nitratbildung aus der organ. Substanz u. aus $(NH_4)_2SO_4$. Schon ein Zusatz von 0,1 mg auf 100 g Boden hatte eine deutliche Wrkg. Der N des Guanylharnstoffes wurde sehr langsam in NH_3 -N übergeführt, welcher sich nicht anhäufte, sondern nitrifiziert wurde. Durch die Ggw. von Harnstoff wurde die Nitrifikation einige Wochen lang verzögert, doch wurden dessen schädliche Wrkg. nicht angenähert so groß als die des Dicyanamids. Die Salze des Guanidins namentlich das Nitrat u. das Carbonat hemmte je nach der angewendeten Menge die Nitrifikation mehrere Wochen hindurch, doch setzte

hiernach eine schnelle Nitratbildung ein. Nach 75 Tagen war Guanidinnitrat je nach den angewandten Mengen bis zu 83, 9 u. 49% nitrifiziert. *Nitroguanidin* zeigte ein Maximum von 17% nach 50 Tagen. Von *Guanylguanidinnitrat* wurden nur ganz geringe Mengen nitrifiziert. (Journ. Agricult. Research 28. 37—70. 1924. U. S. A. Department of Agric.) BERJU.

J. L. Baldwin, *Veränderungen der Bodenflora hervorgerufen durch Anwendung von Rohpetroleum*. Durch Anwendung von Rohpetroleum wurde das Wachstum der Schimmelpilze nicht gehindert, die B. von NH_3 im Boden leicht herabgesetzt u. die Nitratbildung anfangs vollständig verhindert. Hierauf folgte langsame allmählich zunehmende Nitrifikation. Das Pflanzenwachstum wurde durch geringe Petroleummengen nicht gehindert. Größere Mengen verschlechterten die physikal. Zus. des Bodens. (Soil Sci. 14. 465—77. 1922; BIED. Zentralblatt f. Agric.-Ch. 58. 311—12. 1924. ROSENBERG.) BERJU.

A. Némec und K. Kvapil, *Über die Zusammensetzung der Waldböden*. (Vg. Bull. Soc. Chim. Biol. 6. 515; C. 1924. II. 1623.) Waldböden von St. Markyt (Tschechoslowakei) wurden in verschiedenen Tiefen bzgl. der Acidität, des %-Gehalts an organ. Material u. N-Gehalt untersucht. Ergebnisse tabellar. im Original. Unter 70 Jahre altem Weißtannenhochwald (kein Unterholz) zeigten alle bis 40 cm Tiefe untersuchten Schichten saure Rk. Die Humusschicht eines dicht daneben gelegenen 40 Jahre alten Stieleichenbestandes mit Rotbuchenanflug war weniger sauer als beim vorigen Bestand; die Acidität nimmt nach der Tiefe zu allmählich ab, bei 15—40 cm Tiefe werden fast neutrale pH -Werte gefunden, unterhalb dieser Schicht steigt die Acidität wieder an. Der Boden unter einem 60-jährigen Kiefernbestand, der mit Heidelbeeren u. Moos bedeckt war, war sauer; die Acidität fällt allmählich, bei 60—80 cm reagieren die Schichten alkal. Boden unter einem 70-jährigen Kiefernwald mit Tannenunterholz hatte eine stärker saure Humusschicht als alle vorher genannten Bestände; in 40 cm Tiefe trat Raseneisentein auf, die diesen überlagernde Schicht (20—40 cm) war neutral, darauf folgt Aciditätsanstiege (40—42 cm) u. erneuter Abfall (42—75 cm). (C. r. d. l'Acad. des sciences 174. 537—39. 1924.) HABERLAND.

C. O. Rost und E. A. Fieger, *Der Einfluß des Trocknens auf die Acidität von Bodenproben*. Sowohl saure als alkal. Böden können Änderungen der $[\text{H}^+]$ beim Trocknen erfahren, bald Steigerung, bald Abnahme. Glacialböden zeigten beim Trocknen an Luft stets Zunahme, alkal. deutlicher als saure. Bei von Natur saureren Lößböden war die Veränderung geringer. Ofentrocknung steigerte mehr als Lufttrocknung. Befeuchten luftgetrockneter Proben steigerte ihre Acidität meist noch weiter. Auch bei Aufbewahren feuchter Proben in luftdichten Behältern trat mehr Säuerung ein. Bestst. der Acidität müssen demnach an frisch entnommenen Bodenproben ausgeführt werden. (Science 60. 297. 1924. St. Paul, Minnesota Agric. Exp. Stat.) SPIEGEL.

George John Bouyoucos, *Bewegung der Bodenfeuchtigkeit aus den engen Capillaren in die größeren Capillaren des Bodens beim Gefrieren*. Vf. fand, daß beim wiederholten Gefrieren u. Wiederauftauen nahezu mit W. gesätt. Böden der Δ abnimmt, beim leichten Durchrühren des Bodens aber wieder ihren ursprünglichen Wert annimmt. Die Erscheinung läßt sich dadurch erklären, daß beim Gefrieren des Bodens infolge B. von Eiskristallen W. aus den engeren Capillaren in die weiteren wandert, u. hiermit Änderungen der Konz. verbunden sind. (Journ. Agricult. Research 24. 427—32. 1923. Michigan, Agric. Exp. Stat.) BERJU.

James G. Dickson, *Einfluß der Bodentemperatur und Feuchtigkeit auf die Entwicklung des durch Gibberella Saubinetii verursachten Sämlingsrostes des Weizens und des Maises*. Schon wiedergegeben nach DICKSON, ECKERSON u. LINK (Pro

ational Acad. Sc. Washington 9. 434; C. 1924. I. 1440). (Journ. Agricult. Research 3. 837—70. 1923.)

BERJU.

J. Hissink, *Die physikalischen und chemischen Veränderungen von Marschböden nach der Eindeichung*. Nach dem Eindeichen wird NaCl durch Regenwasser aus-
gelaugt u. durch die eindringende Luft die Eisenoxydulverbb. in Fe₂O₃ umgesetzt.
ie bei der Zers. der organ. Substanz gebildete CO₂ führt einen Teil des CaCO₃
Bicarbonat über, welches sich mit dem Natronion in Kalkton umsetzt u. hier-
durch die peptisierende Wrkg. des ersteren hindert. Das Porenvol. nimmt nach
dem Eindeichen um so mehr ab, je größer es anfänglich war. (Verslagen von
landbouwkund. Onderzoek. der Rijkslandbouwproefstat. Nr. 29. 1923; BIED. Zen-
taalblatt f. Agrik.-Ch. 53. 306—11. 1924.)

BERJU.

John W. Crist und J. E. Weaver, *Die Absorption von Nährstoffen aus dem Untergrund in Beziehung zum Ernteertrag*. Die Nährstoffe werden von den Wurzeln
is allen Tiefen aufgenommen, am meisten aber aus der Oberschicht. Nitrate
fordern die Verzweigung der Wurzeln unter Verminderung ihrer Länge, Phosphate
haben geringeren Einfluß. Die Ernteerträge werden durch Art der Düngemittel u.
re Tiefenlage im Boden in bestimmter Weise beeinflusst, wobei auch der Zeitpunkt
er Aufnahme von Bedeutung ist. (Botan. Gaz. 77. 121—48; Ber. ges. Physiol. 27.
1924. Ref. WALTER.)

SPIEGEL.

C. O. Swanson, *Beziehung der Bodenreaktion zur Adsorption des Calciums*.
im Studium der Adsorption des Ca nach Zusatz von Ca(OH)₂ u. Ca(OH)₂ + CaCO₃
Bodensuspensionen oder deren Extrakte bei Ggw. oder Abwesenheit von KCl
wurde der von HILDEBRAND (Journ. Americ. Chem. Soc. 35. 1538; C. 1913. II.
63) konstruierte App. dahin verbessert, daß er die gleichzeitige Inbetriebsetzung
n 6 H-Elektroden gestattete. Die Anordnung der Elektroden u. deren Verb. mit
nem Westonlaboratoriumsvoltmeter für direkte Ablesungen werden durch Text u.
bbildungen veranschaulicht. Durch Zusatz von KCl wurde nur die [H⁺] der Ca-
meren Böden vergrößert. Nur bei einem Überschuß von OH⁻ war die [H⁺] in den
Bodensuspensionen größer als in den Extrakten. Durch Auslaugen der Böden
ur weder die [H⁺] noch das Adsorptionsvermögen verringert; letzteres dagegen
urch Glühen. Nach Zusatz von CaCO₃ zu den mit Ca(OH)₂ behandelten Böden
werden die p_H-Werte nicht wesentlich nach kurz andauernder Berührung mit den
CaCO₃ geändert, auch die Menge des aus dem Ca(OH)₂ adsorbierten Ca wird hier-
urch nicht beeinflusst. Der Tongehalt der Böden hatte einen viel größeren Einfluß
uf die Adsorption als deren [H⁺]. Die [H⁺] u. das Adsorptionsvermögen von mit
Cl behandelten u. nachfolgend ausgewaschenen Böden ist von dem ursprünglichen
a-Gehalt dieser Böden unabhängig. Zusatz von 0,04-n. HCl steigerte die [H⁺]
proportional der zugesetzten Menge. Durch Oxalsäure von gleicher Konz. wurde
ch geringem Zusatz die [H⁺] zunächst verringert u. erst nach größerem Zusatz
steigert, doch nicht in dem Maße wie bei äquivalenten HCl-Gaben. Das ver-
chiedene Verh. beider Säuren wird durch B. schwach dissociierter Salze einer
chwachen Säure (Oxalsäure) u. einer starken Base erklärt. Die saure Beschaffen-
eit der Mineralböden ist hauptsächlich eine Folge der durch Verwitterungs- u.
auslaugungsprozesse verursachten chem. Umänderungen, bei welchen die Basen
entfernt werden u. die Al-Silicate sich anhäufen. Die schädliche Wrkg. dieser ist
cht ausschließlich der stärkeren [H⁺] zuzuschreiben, sondern mehr der Adsorption
es Ca bis zu einem solchen Grade, daß nicht genügend aufnehmbares Ca für die
flanzen zurückbleibt. (Journ. Agricult. Research 26. 83—123. 1924. Kansas State
gricult. Coll.)

BERJU.

P. L. Gainey, *Die Verwendung von Calciumcarbonat bei Stickstoffbindungs-
versuchen*. Je 50 ccm des Nährmediums wurden mit 10 ccm Bodenextrakt einer
hr großen Anzahl von Böden geimpft u. die Entw. des Azotobakter u. die

N-Bindung geprüft. Hierbei wurde gefunden, daß die im Durchschnitt gebundene Menge N bei Ggw. von Azotobakter größer ist als bei Abwesenheit desselben, und daß Zusatz von CaCO_3 dessen Entw. begünstigt. Durch die Ggw. von CaCO_3 wird ferner die Entw. solcher Mikroorganismen, welche außer dem Azotobakter die N-Bindung bewirken, noch mehr gefördert, als die Entw. des Azotobakters selbst (Journ. Agricult. Research **24**. 185—90. 1923. Kansas, Agric. Exp. Stat.) BERJU.

Selman A. Waksman, Clara H. Wark, Jacob Joffe und Robert L. Starke *Oxydation des Schwefels durch Mikroorganismen in schwarzen Alkaliböden.* Durch S wird bei Ggw. geeigneter S oxydierender Mikroorganismen „schwarzer Alkaliboden“ infolge Umsetzung des in ihm enthaltenen Na_2CO_3 in Na_2SO_4 in „weißen Alkaliboden“ umgewandelt. Die Endrk. des Bodens hängt von der S-Menge und der Zeit der Einw. ab. Die Oxydation des S in schwarzen Alkaliböden wird wahrscheinlich durch mehrere S oxydierende Bakterien bewirkt (vgl. WAKSMAN, Journ. of bacteriol. **7**. 609; C. 1923. III. 579). (Journ. Agricult. Research **24**. 297 bis 305. 1923. New Jersey, Agric. Exper. Stat.) BERJU.

G. Guittoneau, *Über die Verwertung mineralischen Stickstoffs durch die Mikrosiphoneen des Bodens.* (Vgl. C. r. d. l'Acad. des sciences **179**. 512; C. 1924. II. 2607.) Es wurden Mikrosiphoneen in der früher vom Vf. angegebenen Mineralsg. unter Zugabe von $(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3$, NaNO_2 u. KNO_3 als N-Quelle, von Glycerin, Mannit u. Rohrzucker als C-Quelle kultiviert. Es ergab sich, daß alle N-Verbb. assimiliert wurden, und daß besonders die Anwesenheit von Glycerin diese Assimilation fördert. Bei Kulturen, die Glycerin, Stärke u. Glucose, sowie $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$, KNO_2 u. KNO_3 enthielten, wurde der höchste N-Gehalt im Mycel bei denen gefunden, die NH_3 -N enthielten, die Unterschiede gegenüber den KNO_2 - u. KNO_3 -haltigen Kulturen waren jedoch geringfügig, die C-Verb. war auch hier wieder für das gute Gedeihen wichtiger. Tabellen im Original. (C. r. d. l'Acad. des sciences **179**. 788—90. 1924.) HABERLAND.

F. C. Cook, *Absorption von Kupfer aus dem Boden durch die Kartoffelpflanze.* Mit Kartoffeln bestandene Böden wurden mit Bordeauxmischung bzw. Kalkwasserbordeauxbrühe u. mit CuSO_4 -Lsg. wiederholt bespritzt. Sämtliche Brühen enthielten 0,75% CuSO_4 ; die ersteren beiden in unl. Form. Die auf den mit den unl. Cu-Verbb. behandelten Böden gewachsenen Pflanzen enthielten in den Blättern mehr Cu als in den Stengeln; wenig Cu in den Wurzeln u. nur Spuren in den Knollen. Durch die unvermischte CuSO_4 -Lsg. wurde die Entw. der Pflanzen stark geschädigt. Die verkümmerten Wurzeln dieser Pflanzen enthielten mehr Cu als die Stengel. Überschüssiger Zusatz von CuO zu den Brühen beeinflusste die Cu-Absorption durch die Pflanzen nicht. (Journ. Agricult. Research **22**. 281—87. 1921. U. S. A. Dep. of Agric.) BERJU.

J. K. Dickerson, *Chemische Probleme auf dem Gebiete der Insektenbekämpfungsmittel.* Ausschlaggebend bei der Auswahl des Mittels müssen sein die chem. Zus. der Preis u. die Wirksamkeit. Die Wichtigkeit wird an Beispielen erläutert. (Journ. Ind. and Engin. Chem. **16**. 1013—15. 1924. Middleport [N. Y.]) GRIMME.

D. E. Haley, F. D. Gardner und R. T. Whitney, *Nicotiana rustica als Quelle von Nicotin zur Insektenbekämpfung.* Die genannte Art, deren lederartige Blätter für die Tabakindustrie nicht verwendbar sind, hat sehr hohen Nicotiningehalt, der durch geeignete Kultur noch erhöht werden konnte. Die Gewinnung des Nicotins daraus erfolgt am leichtesten so, daß der Tabak mit k. W. behandelt, dann zum Kochen gebracht, sofort durch Käsetuch filtriert u. einigemal mit h. W. nachgewaschen wird. (Science **60**. 365—66. 1924. Pennsylvania State Coll.) SPIEGEL.

A. O. Larson, *Räucherung der Bohnensaatwürmer Bruchus obtectus Say und B. quadrimaculatus Fab.* Geringe Bohnenmengen können mit vollem Erfolge mit 3 lbs CS_2 pro 1000 Kubikfuß bei 58° F. oder höher bei 24 std. Einw. oder mit

$\frac{1}{2}$ lbs bei 48 std. Einw. behandelt werden. Mit 2 lbs *verfl.* HCN wird die gleiche Wrkg. nach 48 Stdn. bei 70° F. oder höher erzielt oder mit 1,3 lbs nach 10 Stdn. Bei Herst. des HCN aus NaCN werden 3,4 lbs des letzteren für eine 8 Stdn.-Einw. u. 1,8 lbs für 90 std. Einw. gebraucht. (Journ. Agricult. Research 8. 347—56. 1924. U. S. A. Dep. of Agric.)

BERJU.

Webster S. Krout, *Bekämpfung der Lattichfäule durch Formaldehyd*. In den meisten Fällen tötete eine 1%ig. CH₂O-Lsg. (1 Gallon je 1 Quadratfuß) Sclerotia u. Myzelium des die Erkrankung des Lattichs hervorrufenden Pilzes Sclerotinia libera bis zu einer Tiefe von 20 Zoll. Der Boden wird hierbei nicht immer vollständig steril. Bei 2 Verss. mit Gewächshausböden waren in den behandelten Böden 2—4% u. in den unbehandelten Böden 50% der Salatpflanzen erkrankt. Da die CH₂O-Lsgg. besser wirken, wenn die Sclerotia nicht ausgetrocknet ist, müssen die Böden 5—10 Tage vor der Behandlung feucht gehalten werden. (Journ. agricult. Res. 23. 645—54. 1923. Massachusetts, Agric. Exp. Stat.)

BERJU.

F. J. Brinley, *Darstellung und Eigenschaften von kolloidalem Bleiarseniat*. Eine kolloidale wss. Lsg. von PbHAsO₄ wird erhalten, wenn 311,96 g Na₂HAsO₄ · 7 H₂O + 7,35 g Gelatine in wenig h. W. gel., danach auf 10 l verd. (Lsg. A) u. 331,4 g Pb(NO₃)₂ in 10 l W. (Lsg. B) gemischt werden. Lsg. B wird unter beständigem Rühren zu A gegeben. Während des Mischens wird geprüft, ob das Pb-Salz in Licht zu großem Überschuß vorhanden ist (Gelbfärbung von KJ-Papier). Die erhaltene Lsg. ist kolloidal, das Pb-Salz bleibt mehrere Tage suspendiert; sie eignet sich gut zum Bespritzen von Blättern, da sie einen dünnen Film bildet, der durch Regen schwer abwaschbar ist. Anwendung konzentrierter Lsgg. führt zu einem dicken Nd. von PbHAsO₄, mit verdünnteren Lsgg. entstehen oft nadelartige Kristalle. (Journ. Agricult. Research 26. 373—74. 1923. U. S. A. Dep. of Agric.)

HABERLAND.

R. M. Pinckney, *Wirkung der Seife auf Bleiarseniate*. Zusatz von Seifenlsgg. zu den Auflösungen der Bleiarseniate bewirkt eine andauerndere Suspension der Arseniate u. eine ausgiebigere Verstäubbarkeit dieser. Da aber die Seifen sich mit den Bleiarseniaten in unl. Pb-Seifen u. l. Na₂AsO₄ umsetzen, kann beim Bespritzen der Pflanzen durch die ätzende Wrkg. des letzteren großer Schaden angerichtet werden. Die bisher den As-Präparaten zugesetzten Seifenlsgg. enthielten fast ausschließlich nur stearinreiche Natriumfettseifen. Da über die Wrkg. der Natriumseife noch keine prakt. Erfahrungen vorliegen, stellte Vf. reine Ölseifen her u. verglich diese mit diesen an 2 As-Präparaten vergleichende Lösungsverss. aus. Die Bestst. nach 5 tägiger Digestion gel. As-Mengen ergaben, daß unter gleichen Versuchsbedingungen durch Stearinseifenlsgg. 2 bis 7 mal so viel As gel. wird als durch Seifenlsgg. Durch Vermehrung der Konz. der Stearinseifenlsgg. wurde sowohl die Löslichkeit des PbHAsO₄ wie die des Pb₃(AsO₄)₂ gesteigert, während die gleiche Konz. der Ölseife nur die Löslichkeit des mehr sauren PbHAsO₄ vermehrte. Nach diesen Befunden können durch Verwendung reiner Ölseifen an Stelle der Stearinseifen, die schädlichen Nebenwrkgg. der Seifenarsenemulsionen ganz wesentlich eingeschränkt werden. (Journ. Agricult. Research 24. 87—95. 1923. Montana, Agric. Exp. Stat.)

BERJU.

William H. Fry, *Die mikroskopische Bestimmung von abgetrennten Bodenkolloiden*. Die Kolloide wurden von den Bodenteilchen durch Verrühren mit W., aus eine Spur NH₃ enthielt, u. Zentrifugieren getrennt. Im Ultramikroskop wurde nachgewiesen, daß die Mineralbestandteile so fast vollständig von den Kolloiden getrennt waren. An Gemischen der so erhaltenen Kolloide mit Quarz konnte gezeigt werden, daß man u. Mk. den Gehalt einer Probe an Kolloiden ziemlich quantitativ bestimmen kann. — Bei Unters. einer Anzahl von Böden wurde gefunden, daß 34,5

bis 60,2% der Gesamtkolloide auf die beschriebene Weise extrahiert werden kann. (Journ. Agricult. Research 24. 879—83. 1924. Bureau of Soils, U. S.) A. R. F. HESSE

Engels und W. Hirschberger, *Beiträge zur Feststellung des Nährstoffgehaltes resp. des Nährstoffbedürfnisses der Böden nach dem Neubauerschen Verfahren*. Schon wiedergegeben nach ENGELS (C. 1924. II. 2084). (Landw. Jahrb. 60. 379 bis 392. 1924. Weihenstephan.)

BERJU.

George John Bouyoucos, *Die Wärme beim Feuchtwerden als ein neues Mittel, das kolloidale Material in Böden zu bestimmen*. Vf. stellt fest, daß die Wärme, welche beim Befeuchten von Böden auftritt, ausschließlich von den darin enthaltenen Kolloiden u. fein verteilten mineral. Bestandteilen herrührt. Darauf begründet sich eine Methode zur Best. des kolloidalen Anteils, indem einmal die Wärmeentwicklung bei Befeuchten des Bodens, das zweitemal die Wärmeentwicklung beim Befeuchten eines Teils der extrahierten Kolloide bestimmt wird. Im Boden können 0 bis 80% kolloidale Substanzen enthalten sein. (Science 60. 320. 1924. East Lansing [Mich.])

BECKER.

VIII. Metallurgie; Metallographie; Metallverarbeitung.

Illies, *Versuche an einem Winderhitzer*. Es wird der Wärmewirkungsgrad eines mit Hochofengas geheizten Winderhitzers bestimmt durch Analyse der Gase u. Abgase, Best. der Verbrennungsluft in den erzeugten Heißwindmengen, Messung der Temp. u. Berechnung der Strahlungsverluste. Es wurde ein Wirkungsgrad von 50,5% erreicht. Bei modernen Winderhitzern sollen 72—75% erreichbar sein. (Feuerungstechnik 13. 2—5. 1924. Amberg.)

NEIDHARDT.

A. Jung, *Die Aufnahme des Schwefels aus dem Heizgas im Siemens-Martin-Ofen*. Vf. bespricht die S-Gehalte in Briketts, Kohle, Generatorgas u. Gaserzeugerschlacke, den Einfluß des Dampfzusatzes im Gaserzeuger u. die Beziehungen zwischen S-Gehalt im Gas u. Block. Steigt der S-Gehalt im Gas, nimmt er auch im Block zu, kann aber durch Zusatz von CaF_2 herabgesetzt werden. Will man 0,06% S im Block nicht überschreiten, darf das Gas — ohne besonderen CaF_2 -Zusatz — nicht mehr als 3 g/cbm S enthalten. (Stahl u. Eisen 44. 911—14. 1924. Peine.)

LÜDER.

Cecil H. Desch, *Die physikalische Chemie von Schlacken und Flußmitteln in den Nichteisen-Metallindustrien*. Vf. gibt eine Übersicht der physikal.-chem. Eigenschaften von Metallsalzen u. -schlacken, so im besonderen eine Aufstellung der FF. der bei der Gewinnung von Al, Mg u. von Leichtmetalllegierungen benötigten Salze u. eutekt. Salzgemische. Ferner werden die bisherigen Arbeiten über Gleichgewichte von Metallen mit ihren Salzen behandelt. (Trans. Faraday Soc. 20. 115 bis 121. 1924. London.)

LÜDER.

Gilbert Rigg, *Bemerkung über Schlacken aus Blei-, Kupfer- und anderen Verblasöfen*. Es werden die Forderungen, die an eine gute Schlacke im allgemeinen gestellt werden müssen, kurz zusammengefaßt u. einige Beispiele nebst Analysen angegeben. (Trans. Faraday Soc. 20. 129—34. 1924. London.)

LÜDER.

B. P. Haigh, *Schlackeneinschlüsse in Beziehung zu Ermüdungserscheinungen*. Vf. unterscheidet 3 Arten des Einflusses von Schlackeneinschlüssen auf die Festigkeitseigenschaften von Metallen, nämlich chem., elast., u. einw. auf die therm. Ausdehnung der betreffenden Stücke. Schlackeneinschlüsse können mit dem Metall reagieren u. spröde Stellen bilden; infolge der verschiedenen Ausdehnungskoeffizienten entstehen Spannungen. Vf. wertet diese Einflüsse mathem. aus. (Trans. Faraday Soc. 20. 153—58. 1924. London.)

LÜDER.

Frank T. Sisco, *Fluor in der reduzierenden Schlacke und sein Einfluß auf das Futter der basischen elektrischen Öfen*. Die reduzierende Schlacke in bas. elektr. Öfen besteht aus Kalk; Koks u. Flußspat im Verhältnis 6:1:1. Das in den

Reduktionszone bei der hohen Temp. in Freiheit gesetzte F bildet mit dem SiO_2 Si-Tetrafluorid. Ein Teil des SiF_4 entweicht, der andere bildet mit dem Kalk der Schlacke Ca-Si-Fluorid. Die Tätigkeit des F bewirkt ein Anwachsen des Si-Gehaltes der Schlacke auf Kosten des Futters. Bei Benutzung von CaF_2 wird guter Fluß erreicht durch die B. von Ca-Silicat, Ca-Si-Fluorid u. durch die Ggw. von CaF_2 . Bei Zusatz von SiO_2 wird die Flüssigkeit durch die B. von Ca-Silicat erreicht. Bei Ggw. von CaF_2 wird für den gleichen Flüssigkeitsgrad ein höherer Grad von Asidität erreicht, als dies bei Zugabe von SiO_2 der Fall ist; außerdem wirkt CaF_2 entschwefelnd, was SiO_2 ebenfalls nicht tut. Der Hauptvorteil des CaF_2 besteht aber darin, daß es durch Zusatz von CaC_2 viel leichter ist, kräftige reduzierende Bedingungen beizubehalten. Zuviel CaF_2 oder zu hohe Temp. macht die Schlacke dünn u. wäbrig. In diesem Zustand ist sie für die Hitze des Flammenbogens durchlässiger, die so stärker auf das Futter wirken kann u. es schmilzt. Abgesehen davon, daß dadurch die Lebensdauer des Futters bedeutend herabgesetzt wird, bewirkt dies eine starke Veränderung in der Zus. der Schlacke, indem die reduzierenden Bestandteile, besonders CaC_2 , schnell zerstört werden. Zum Schluß bringt f. den ausführlichen Gang einer Schlackenanalyse. (Trans. Amer. Electr. Soc. 6. 16 Seiten. 1924. Sep.)

GOTTFRIED.

Theodore Swann, Die Gewinnung von Ferrophosphor im elektrischen Ofen. f. beschreibt die Gewinnung von Ferrophosphor mit 18–24% P im elektr. Ofen. (Trans. Amer. Inst. Mining and Metallurg. Eng. 1924. Nr. 1383. 3 Seiten. Birmingham [Ala.])

LÜDER.

J. R. Cain, Einfluß von Schwefel, Sauerstoff, Kupfer und Mangan auf die Rotbrüchigkeit von Eisen. Vf. gibt eine Übersicht über die Literatur der Rotbrüchigkeit des Fe u. eigene Versuchsergebnisse. Das Ausgangsmaterial war Elektrolytisen mit 0,004% C, 0,004% S, 0,001% Si, 0,014% Cu, Ni u. Co zusammen. Barren von ca. 900 g dieses Materials oder manchmal von Armcoußbeisen, welche mit verschiedenen, kleinen Mengen von S_2 , O_2 , Cu u. Mn versetzt worden waren, wurden unter Vakuum im Kohlewiderstandsofen oder in Luft im Hochfrequenzinduktionsofen geschmolzen. Zur Prüfung auf Rotbrüchigkeit wurden die Barren zu 1,27 cm (= 0,5 inch) Umfang zusammengeschmiedet. Nach dem Erhitzen auf 1100° wurden sie schnell aus dem Feuer gezogen u. vor- u. rückwärts über die scharfe Kante eines Amboßes gebogen. Dabei kühlte sich die Probe schnell auf dunkle Rotglut ab. Aus den Verss. geht hervor: 1. S darf nicht über 0,01% vorhanden sein. 2. O_2 bis zu 0,20% bewirkt keine Rotbrüchigkeit, wenn der Schwefelgehalt unter 0,01% liegt. 3. Mn verhindert die Rotbrüchigkeit, wenn der Mn-Gehalt des Fe so groß wie der S-Gehalt ist, u. der O_2 -Gehalt nicht über 0,04% liegt. — 4. Die Anwesenheit beträchtlicher Mengen von O_2 hindert die Wirksamkeit des Mn gegen Rotbrüchigkeit. — 5. Cu (0,05–0,5%) ist von geringer Bedeutung. Bei geringem S-Gehalt (0,015–0,021% S) wird die Rotbrüchigkeit vermindert. (Trans. Amer. Electr. Soc. 46. 13 Seiten. Technolog. papers bureau of standards 1924. Nr. 261. 327–35. Washington. Sep. v. Vf.)

BECKER-ROSE.

T. P. Campbell und Henry Fay, Die Kastenhärtung von Stahl durch Bor und Stickstoff. B kann C bei der Stahlhärtung ersetzen, seine Aufnahme verläuft genau wie des C, doch ist der Borstahl nicht so hart als ein Prod. mit einer äquivalenten Menge C. N wird von Borstahl stärker absorbiert als von C-Stahl infolge von Nitriden. (Ind. and. Engin. Chem. 16. 719–23. 1923. Cambridge [Mass.]) Gr. **A. Clément**, Verwendung des biegsamen Stahls bei Auszimmerung von Grubenwänden. (Montan. Rundsch. 16. 525–28. 581–84. 1924.)

BEHRLE.

Washington Del Regno, Beziehung zwischen der elastischen Spannung und dem magnetischen Verhalten von Nickelstählen in der Nähe des Umwandlungspunktes. (Atti R. Accad. dei Lincei, Roma [5] 33. II. 87–91. 1924.)

GOTTFRIED.

L. J. Barton, *Das elektrische Raffinieren von Metallen*. III. (II. vgl. Foundry 52. 542; C. 1924. II. 1850.) Es wird die Herst. von C-Stahl besprochen, im besonderen der Einkauf des Schrotttes, die Beschickung des Ofens, die Rkk. während der Schmelzperiode u. das Abschlacken. Dem Aufsatz sind einige Tabellen über Schrottpreise u. -analysen, über Beschickungen u. über Schlackenanalysen beigefügt. (Foundry 52. 726—29. 813—16. 1924.) LÜDER

W. Heike, *Die Anwendung der Gleichgewichtslehre auf metallurgische Fragen*. Vf. bespricht das Verh. des Bi beim Pattinsonverf. Bi bildet mit Pb bei den Frage kommenden Konz. Mischkrystalle, läßt sich jedoch trotzdem vom Pb trennen, indem es beim unvollständigen Erstarren der Schmelze sich in dem noch fl. Teil anreichert u. erst beim Soliduspunkt vollständig mit den vorher ausgeschiedenen Bi-ärmeren Pb-Krystallen unter B. einer festen Lsg. reagiert. — Weitere Untersuch. des Vfs. erstrecken sich auf das Parkesverf. (Entsilberung des Pb mit Hilfe von Zn). Die Verss. wurden in einem eigens hergerichteten elektr. Ofen ausgeführt, der das Schmelzgut in einem dicht abgeschlossenen Gefäß enthält u. drehbar angeordnet ist, daß eine gute Durchmischung der Probe während des Schmelzens möglich ist, ohne den Tiegel öffnen zu müssen. In dieser Weise wurden mehrere Pb-Zn-Ag-Schmelzen ausgeführt u. die sich bei verschiedenen Temp. zwischen Pb u. Zn einstellenden Gleichgewichte fest gestellt. Die Gleichgewichte im System Ag-Pb-Zn im fl. wie im festen Zustande werden eingehend erörtert, im besonderen die Frage, ob bei der Entsilberung des Werkbleis durch Zn eine zweite fl. Phase allein oder in Gemeinschaft mit einer festen oder diese allein genommen wird. Es wird gezeigt, daß bei den in der Praxis vorkommenden Ag-Konz. des Werkbleis 1—1,5%, bei der im Parkesverf. angewendeten Temperaturerniedrigung das Ag mit dem Zn in fester Lsg. als feste Phase vom Pb sich scheidet. Dabei ist das Verhältnis Ag:Zn in den Krystallen stets größer als in dem Werkblei. Bei Gegenwart von Cu ändern sich die Verhältnisse, u. es bedarf weiterer Verss. (Metall u. Eisen 21. 469—82. 1924. Freiberg i. Sa.) LÜDER

E. H. Schulz, *Stellit und stellitähnliche Legierungen. Neuere Nutzlegierung von Metallen der Eisengruppe*. Vf. untersuchte eine Legierung von 51% Fe, 39,3% Co, 6,36% W, 2,44% Cr, 0,54% C, 0,34% Mn, 0,12% Si, 0,02% P u. 0,02% N. Der Block ließ sich bei 1000—1100° gut schmieden, war nach dem Erkalten sehr spröde, was jedoch durch Abschrecken bei 850° gemildert wurde. Die bei 950° abgeschreckte Legierung zeigte die Remanenz = 10600 u. die Koerzitivkraft 200, ist also für permanente Magnete ein sehr geeignetes Material. — Es werden ferner die chem. widerstandsfähigen Legierungen des Systems Fe-Cr-Ni an Hand des Diagramms u. ebensolche Co-W-Cr-Legierungen, die Stellite, besprochen. z. B. hat sich eine Legierung mit 31% Co, 35% W, 15% Cr, 10% Mo, 3% Ni, 2% Fe, 0,7% C gut bewährt. — Stellite etwas anderer Zus., 40—55% Co, 15% W, 33% Cr, 10—17% W, bis 2% C eignen sich sehr gut als Schneidmaterial, z. B. als Drehstahl. Weitere Verss. zeigten, daß der Fe-Gehalt des Stellites 5% nicht überschreiten, der C-Gehalt nicht weniger als 2% sein darf. Ein Zusatz von Ni u. Ni verbesserte weiterhin die Eigenschaften, so daß die neue Legierung mit einem Mittel 38% Co, 30% Cr, 16% W, 10% Ni, 4% Mo u. 2—5% C, der Akrit, ein vorzügliches Material für Drehstähle darstellt. Bei einem zu bearbeitenden Werkstoff z. B., das eine Bruchgrenze von 90 kg/qmm hatte, wies der Akritdrehstahl bei 25% höherer Schnittgeschwindigkeit eine 50% höhere Schnittdauer auf als bester Schneidstahl. Es konnten sogar Kugellagerringe mit Akrit bearbeitet werden. (Ztschr. f. Metallkunde 16. 337—43. 1924. Dortmund.) LÜDER

C. W. Drescher, *Stellit und stellitähnliche Legierungen. Erfahrungen mit Akrit*. Vf. hat Verss. mit Stellit (vgl. vorst. Ref.) als Schneidmaterial für Drehbänke mit Akrit angestellt. Es wurden Siemens-Martinstahl u. Grauguß bearbeitet u. z.

Überlegenheit des Akrites über die bisher verwendeten Schnelldrehstähle festgestellt. Eine Reihe von Figuren u. Tabellen erläutern den Aufsatz. (Ztschr. f. Metallkunde 16. 382—90. 1924. Berlin.)

LÜDER.

M. Moeller, *Über die Temperaturbestimmung in Metallschmelzen*. Vf. bespricht die Schwierigkeiten der Temperaturbest. von Metallschmelzen mit Hilfe von Thermoelementen, wie Verschleiß von Schutzröhren aus keram. Stoffen u. Metallen, ferner die Verzögerung der Einstellung mit u. ohne Anwendung eines Schutzrohres. Es wird dann ein Eintauchpyrometer für Zn-, Sn-, Pb- u. Al-Bäder beschrieben, das auswechselbare Fe-, bzw. Konstantandrahtschenkel von 30 cm Länge besitzt. Diese Röhren brauchen nicht verschweißt zu werden, da das Metallbad den elektr. Kurzschluß bewirkt. (Gießereiztg. 21. 442—43. 1924. Berlin.)

LÜDER.

H. H. Lester, E. C. Herthel, William Mendius und William V. Ischie, *Die Verwendung von Röntgenstrahlen zum Auffinden versteckter Fehler in Betriebsmaterial*. Vff. führen an einer Anzahl von Maschinen- u. Kesselteilen vor, wie bei der Durchleuchtung dieser Stücke mit Röntgenstrahlen infolge der vom Stahl verschiedenen Absorption der Sand-, Oxyd- u. Gaseinschlüsse Fehlstellen rechtzeitig entdeckt werden können, welche im Betrieb durch Bruch großen Schaden anrichten könnten. (Chem. Metallurg. Engineering 31. 619—22. 1924. Watertown, Chicago.)

BECKER-ROSE.

M. Moeller und H. Miething, *Über die Strahlungsemission des geschmolzenen Aluminiums*. Vff. haben die Emissionsvermögen einer der freien Luft ausgesetzten Oberfläche von geschmolzenem Al zwischen 700° u. 1000° bei der Wellenlänge des Holborn-Kurlbaumschen Pyrometers $\lambda = 0,65 \mu$ gemessen. Die Werte liegen sich von 0,12 bei 700° bis 0,17 bei 1000°. Hieraus ergibt sich eine erhebliche Abweichung der mit Hilfe des Pyrometers gemessenen schwarzen Temp. von der wahren Temp. des Al. Vff. haben die erforderlichen Korrekturen berechnet zu einer Kurve zusammengefaßt. Trotz Berücksichtigung dieser Korrektur ist die Messung der Temp. mit Hilfe des opt. Pyrometers mit großen Fehlern behaftet, da das Al sich bei 800—1000° mit einer Oxydschicht bedeckt, die die Beobachtung erschwert. (Gießereiztg. 21. 444—46. 1924. Berlin.)

LÜDER.

Achenbach, *Lichtbogenschweißung von Gußstücken*. Vf. bespricht den Einfluß von Si, Mn, C, P, S u. O auf die Schweißung von Gußstücken. Si u. Mn sind mehr oder weniger erwünschte, P, S u. O dagegen schädliche Beimengungen. In einem Diagramm werden die Wärmeverhältnisse bei den verschiedenen Schweißmethoden dargestellt. Ferner weist Vf. auf die Gefügeänderungen hin, der die Schweißstelle unterworfen ist, u. bringt einige Mikrophotographien. Die verschiedenen vorkommenden Beschädigungen der Gußstücke sowie die einzelnen Methoden der Schweißung werden beschrieben. (Gießereiztg. 21. 417—23. 1924. Berlin.)

LÜDER.

H. Frank, *Die Verwertung der Abwärme von Topfglühöfen in einem Kaltwalzwerk*. Vf. beschreibt eine Anlage, in der die Abwärme von Topfglühöfen für Heizzwecke verwertet wird. (Die Wärme 47. 479—83. 1924. Hagen i. Westf.)

NEIDH.

T. B. Crow, *Flußmittel zum Weichlöten*. Es wurde die Brauchbarkeit von Terp., Olivenöl, Harz, Vaseline, einer alkoh. Lsg. von Harz, NH_4Cl , $\text{Zn}(\text{NH}_4)_2\text{Cl}_2$, FeCl_2 in A., HCl u. KCN als Flußmittel zum Weichlöten geprüft, indem Vf. diese Stoffe bei 250° u. niedrigeren Tempp. auf Cu-Bleche wirken ließ, welche in verschieden hohem Grade oberflächlich oxydiert worden waren. Ferner wurde auf Metallen Cu, Fe, Zn, Messing u. Neusilber die Ausbreitfähigkeit eines Weichlötes unter Verwendung verschiedener Flußmittel dadurch festgestellt, daß ein Ringelchen des Lotes von bestimmtem Durchmesser auf einem Blech der betreffenden Metalle mit oder ohne Flußmittel geschmolzen u. seine Höhe nach erfolgtem Erkalten abermals festgestellt wurde. (Trans. Faraday Soc. 20. 199—208. 1924. London.)

LÜDER.

T. Lewis Bailey, *Flußmittel in der Verzinnungsindustrie*. Vf. bespricht die Vorbereitungen, denen ein Metallgegenstand vor dem trockenen Verzinnen unterworfen werden muß. (Trans. Faraday Soc. 20. 195—98. 1924. London.) LÜDER.

J. P. Mc Lare, *Die Reparatur verschlissener Maschinenteile durch Galvanostegie*. Während des Krieges wurden ausgelaufene oder sonstwie verschlissene Maschinenteile durch galvan. Metallniederschläge wieder brauchbar gemacht. Vf. beschreibt das angewendete Reinigungsverfahren, das in nichts von dem üblichen abweicht, unter Angabe von Badvorschriften. Nach eingehender Behandlung der Vereisung u. Vernickelung werden einige Beispiele ausgeführter Reparaturen beschrieben, zum Schluß noch die Versilberung u. Verbleiung von Gummiringen besprochen. (Trans. Faraday Soc. 20. 87—96. 1924. London.) LÜDER.

F. N. Speller und **F. G. Harmon**, *Die elektrolytische Theorie der Korrosion*. Vf. bespricht die Theorie von WILDER D. BANCROFT über Korrosion u. weist darauf hin, daß Verss. mit beschleunigter Korrosion sehr vorsichtig ausgeführt werden müssen, wenn sie auf die Art der in der Praxis einzig vorkommenden sehr langsamen Korrosion brauchbare Rückschlüsse gestatten sollen. (Trans. Amer. Elect. Soc. 46. 4 Seiten. 1924. Sep.) LÜDER.

G. W. Whitman, **R. P. Russell** und **V. J. Altieri**, *Einfluß der Wasserstoffionenkonzentration auf das Rosten von untergetauchtem Stahl*. p_H der den Stahl umgebenden Lsg. ist von größter Bedeutung auf den Verlauf des Rostens. Nach der sauren Seite hin wird die Fe-Löslichkeit gesteigert, nach der alkal. Seite hin führt sie zur B. schützender Überzüge von $Fe(OH)_2$. Jedoch führt Erhöhung an dieser Seite wiederum zur Auflsg. der Schutzschicht. Auf der sauren Seite kommt es zur B. von H_2 . (Journ. Ind. and Engin. Chem. 16. 665—70. 1924. Can. bridge [Mass.]) GRIMME.

Menahem Merlub-Sobel, *Korrosion durch Phosphorhaloide*. PCl_5 greift sowohl bei Zimmertemp. als auch bei 200° Ni nicht an u. nur in sehr geringen Maße Monelmetall; jedes andere Metall wird mehr oder minder davon angegriffen. Ni u. Monelmetall sind auch widerstandsfähig gegen organ. Acylchloride u. gegen die anderen Phosphorchloride, worin sie allerdings nicht allein stehen wie bei PCl_5 . (Chem. Metallurg. Engineering 31. 472. 1924. Cartaret [N. J.]) RÜHLE.

C. M. Kurtz und **R. J. Zaunmeyer**, *Die Korrosion von Eisenlegierungen durch Kupfersulfatlösungen*. Vf. prüfen die Widerstandsfähigkeit von etwa 40 Fe-Legierungen gegen eine Lsg. von 0,07-n. H_2SO_4 + 1-n. $CuSO_4$ mit folgende Resultat: Nicht angegriffen werden Elektrolyteisenlegierungen, welche als Mindestgrenze enthalten: 10% Cr. — 6% Cr, 18% W. — 6% Cr, 14% Ni. — 7% Cr, 10% Ni. — 7% Cr, 3% Si, 9% W. — 7% Cr, 3% W, 2% Mo. — 8% Cr, 1% Si. Die letzten beiden Legierungen nachdem sie bis zur Rotglut 20 Min. lang erhitzt dann abgeschreckt wurden. Legierungen mit 10% Cr u. weniger als 0,31% C werden nicht angegriffen, dagegen bei 0,4—0,64% C erst nach dem Tempern u. Abschrecken. Bei Legierungen mit mehr als 1% C muß der Cr-Gehalt auf 15% erhöht werden um widerstandsfähig zu bleiben. Bei Cr-Si-Legierungen vermag V nach dem A lassen die Korrosion zu befördern. Mn scheint ohne Einfluß zu sein. Desgleichen ist die Temp., bei welcher die Probe vorgenommen wird, ohne Einfluß auf die angeführten Resultate. (Trans. Amer. Electr. Soc. 46. 10 Seiten. 1924. Wisconsin Univ., Sep.) BECKER-ROSE.

Wm. E. Erickson und **L. A. Kirst**, *Versuche zur Einteilung der gegen Korrosion beständigen Legierungen*. Die Verss. von KURTZ u. ZAUNMEYER (Vf. vorst. Ref.) hatten ergeben, daß manche Fe-Legierungen von $CuSO_4$ -Lsg. verschieden stark angegriffen wurden. Die Vf. schlagen deshalb vor, zur Unterscheidung des Grades der Korrosion eine Anzahl von Korrosionsfl. zu verwenden, welche gegen die Legierungsbestandteile eine verschiedene Stärke besitzen.

korrodiert CuSO_4 von den in Betracht kommenden Nichteisenmetallen Si, Cr, W, Mo, Mn nur das Mn , AgNO_3 nur Mo u. Mn, PtCl_4 u. AuCl_4 nur Ni, Mo, Mn, dCl_4 nur W, Ni, Mo, Mn, während Si u. Cr von diesen Lsgg. nicht angegriffen werden. Es werden eine Anzahl von Legierungen geprüft, wobei sich CuSO_4 u. gNO_3 einerseits u. PtCl_4 , AuCl_4 u. PdCl_4 andererseits als gleich stark verhalten. Die letzteren sind stärkere Ätzmittel. (Trans. Amer. Electr. Soc. 46. 8 Seiten. 1924. Wisconsin, Univ., Sep.)

BECKER-ROSE.

E. Poppe, Antwerpen, *Aufarbeitung von Erzen*. Gepulverte Erze werden getrocknet u. teilweise reduziert, indem sie ohne Zusatz von Binde- oder anderen Mitteln an der einen Seite eines sich langsam drehenden Drehrohrofens her nach der anderen Seite geleitet werden, an der Kohlenstaub oder ein anderer Heizstoff unter gleichen Bedingungen eingeblasen wird, daß eine reduzierende Flamme entsteht. (N. P. 220195 vom 15/10. 1923, ausg. 4/9. 1924.) KÜHLING.

Minerals Separation Ltd., London, *Konzentration von Erzen*. Die Konzentration erfolgt durch einen Schaumswimmprozeß, wobei der M. viscose Körper zugesetzt werden, welche bei der destruktiven Dest. von Kohle, Holz usw. erhalten werden u. die vor ihrer Verwendung mit einem emulgierend wirkenden Mittel, z. B. NaOH, behandelt worden sind. (N. P. 37726 vom 23/3. 1921, ausg. 27/8. 1923. E. Prior. 30/7. 1920.) OELKER.

H. G. Flodin, Roslags-Näsby, Schweden, *Kohlenstoffarme Metalle und Legierungen*. Bei der Ausführung des Verf. gemäß E. P. 214655 (C. 1924. II. 1509) werden die fl. kohlenstoffhaltigen Reduktionsmittel durch bei gewöhnlicher Temp. feste, bei der Brikettierungstemp. aber halbf. Stoffe, wie Pech, Asphalt, Zellpech u. dgl. ersetzt, oder es werden fl. Reduktionsmittel verwendet u. die Mischungen vor der Brikettierung getrocknet, gegebenenfalls auch noch gemahlen. (E. P. 219706 vom 26/7. 1924, Auszug veröff. 17/9. 1924. Prior. 27/7. 1923.) KÜHLING.

David Werner Berlin, Råfunda, Schweden, *Reduzieren von Eisenerz*. Das gepulverte Erz wird mit gleichfalls gepulvertem Graphit u. gegebenenfalls CaO gesiebt u. die M. unter Luftabschluß auf Reduktionstemp. erhitzt. (N. P. 37703 vom 20/10. 1920, ausg. 20/8. 1923.) KÜHLING.

Aktiebolaget Svenska Kullagerfabriken, Gothenburg, *Erhöhung des Härtegrades von gehärteten Wälzlager teilen*. (D. P. P. 402706 Kl. 18c vom 4/6. 1921, ausg. 18/9. 1924. A. Prior. 15/6. 1920. — C. 1923. IV. 107.) KÜHLING.

Robert Abbott Hadfield, Westminster, *Eisenlegierungen*. Die Legierungen enthalten neben Fe bis zu 3,5% C, 1,3—8% Si, 8—40% Cr, 1—10% W u. können außerdem 20—50% Ni u. 0,5—10% Mn enthalten. Das W kann ganz oder teilweise durch Mo, in besonderen Fällen auch bis zu 6% durch Co, V, Ti, Cu, Al oder mehrere dieser Metalle ersetzt werden. Die Legierungen zeichnen sich durch sehr große Festigkeit gegen oxydierende Einflüsse u. hohe Hitzegrade aus u. sind deshalb für Herst. von Verbrennungskraftmaschinen besonders geeignet. (E. P. 220006 vom 9/2. 1923, ausg. 4/9. 1924.) KÜHLING.

American Smelting and Refining Company, New York, *Gewinnung metallischen Zinns*. Sb, Pb, Bi, Cu u. gegebenenfalls Fe enthaltende Zinnerze werden, wenn erforderlich, zunächst geröstet oder, mit oder ohne Zusatz kieselsäurehaltiger Zuschläge gesintert, u. in Mischung mit Kohle oder Koks in einem Hoch- oder Flammofen geglüht, wobei der Kohlezusatz so bemessen wird, daß Sn u. Fe zu Oxydul, die übrigen Metalle völlig reduziert werden. Hierbei bilden die Verbb. des Sn u. Fe mit der vorhandenen SiO_2 eine Schlacke, welche abgeschöpft, mit CaO u. Kohle mischt u. im Hoch- oder Flammofen niedergeschmolzen wird, wobei das Sn als Metall gewonnen wird, während das Fe in der Schlacke bleibt. (E. P. 219719 vom 12. 1923, ausg. 28/8. 1924.) KÜHLING.

American Smelting and Refining Company, New York, *Elektrolytische Reinigung von Zinn*. (Kurzes Ref. nach A. P. 1487136 vgl. C. 1924. II. 401.) Als Elektrolyt dient eine wss. Lsg., welche ein Zinnoxidulsalz, H_2SO_4 , H_2SiF_6 u. eine organ. Sulfosäure, vorzugsweise *Kresolsulfosäure* enthält. H_2SiF_6 kann auch entbehrt werden, wenn die Menge der H_2SO_4 u. der organ. Sulfosäure vermehrt wird; in diesem Fall wird Leim o. dgl. zugefügt. Die Elektrolyse wird mit Spannungen von 0,2–0,4 Volt, Stromstärken von etwa 8 Amp. je Quadratfuß u. Tempp. von 35–55° ausgeführt. (E. P. 220012 vom 28/2. 1923, ausg. 4/9. 1924.) KÜHLING.

George D. Van Arsdale, Rush T. Sill und Harley A. Sill, Los Angeles, Calif., *Molybdän und Molybdänverbindungen*. Mo-Erz oder Konzentrat wird geröstet, dann das Mo_2O_3 enthaltende Prod. mit verd. H_2SO_4 behandelt, um die Verunreinigungen zu entfernen, die saure Lsg. des Natriummolybdats wird elektrolysiert u. dabei Mo an der Kathode abgeschieden. (A. P. 1508629 vom 6/11. 1922, ausg. 16/9. 1924.) KAUSCH.

Chemische Fabrik Griesheim-Elektron, Frankfurt a. M., und **A. Beielstein**, Bitterfeld, *Wiedergewinnung von Leichtmetallen aus Abfällen*. Bei dem Verf. gemäß der Hauptanmeldung werden dem $MgCl_2$ vor oder nach dem Schmelzen Oxyde oder Fluoride des Mg, Ca, Al oder anderer Metalle zugegeben. (E. P. 219287 vom 6/6. 1924, Auszug veröff. 10/9. 1924. Prior. 20/7. 1923. Zus. zu E. P. 182948; C. 1922. IV. 939.) KÜHLING.

Deutsch-Luxemburgische Bergwerks- und Hütten-Akt.-Ges., übertr. von **F. Bauerfeld**, Dortmund, *Legierungen*, enthaltend Co, Cr, W, C, 10–50% Ni u. 1–5% Mo. W u. Mo können durch V ersetzt werden; außerdem können die Legierungen bis zu 10% Fe sowie Si u. B enthalten. Eine Legierung dieser Art besteht z. B. aus 20% Ni, 25% Co, 33% Cr, 9,5% W, 5% Mo, 5% Fe, 2% C u. 0,5% Si. (E. P. 219293 vom 1/7. 1924, Auszug veröff. 10/9. 1924. Prior. 16/7. 1923.) KÜHLING.

British Aluminium Company, Limited, Alfred George Cooper Gwyer und Henry Wilfred Lewi Phillips, London, *Änderung des Baues von Aluminiumlegierungen*. Zu nur wenig über ihren F. erhitzten Legierungen, welche neben Al 3–15% Si enthalten, werden kleine Mengen von Erdalkalimetallen, besonders Ca, $NaNH_2$ oder Peroxyden der Alkali- oder Erdalkalimetalle gegeben. Hierbei verschwinden die großen eckigen Siliciumkrystalle der ursprünglichen M., u. es entsteht eine gleichförmigere M. von verbesserten Eigenschaften. Die verwendete Menge von Ca soll 0,1% nicht überschreiten, bei Zusatz von 0,2% geht der Umwandlungsvorgang zu weit u. die Erzeugnisse besitzen weniger vorteilhafte Eigenschaften. Statt reinen metall. Ca kann auch eine Legierung von 98% Al u. 2% Ca verwendet werden. (E. P. 219346 vom 22/1. 1923, ausg. 21.8. 1924.) KÜHLING.

Erik J. Norberg, Everett, Washington, *Rostlösende Flüssigkeit*, bestehend aus einem Überschuß einer alkoh. Fl., Carbonsäure u. CH_3COOH . (A. P. 1510067 vom 26/2. 1923, ausg. 30/9. 1924.) KAUSCH.

X. Farben; Färberei; Druckerei.

—, *Geschichte der Farbe*. Angaben über Karmin u. seine Gewinnung im Laufe der Zeiten. (Farbe u. Lack 1924. 411–12.) SÜVERN.

Wilhelm Frommel, *Einige alte Vorschriften zur Darstellung von Cassiusschen Purpur- und von Schmelzfarben*. Vorschriften aus einem aus dem Jahr 1835 stammenden Brief des Glasmalers HOLLMANN. (Chem.-Ztg. 48. 777. 1924.) JUNG.

Egon Elöd, *Physikalisch-chemische Beiträge zur Theorie der mineralischen Beizung tierischer Faserstoffe*. Auf Grund von Verss. zur Entscheidung der Frage, ob die Wrkg. der Säuren u. somit schließlich der Beizen einen Adsorptionsvorgang oder eine chem. Rk. darstellt, ergab sich, daß die Mineralsäuren bei gewöhnlicher

Temp. u. nicht zu geringen Konz. in der Hauptsache chem. unter Abbau der Fasersubstanz einwirken. Diese chem. Rk. wird zweifellos von einer Adsorption eingeleitet. Schwache Säuren, z. B. Ameisensäure, werden hauptsächlich nur adsorbiert. Bei erhöhter Temp. wirken auch die stark verd. Mineralsäuren vorzuziehend chem. auf die Faser ein. Die abbauende chem. Einw. der Säuren zeigt sich in einer exakt nachweisbaren Abnahme der Reißfestigkeit der Faser. Bei der n-Beschwerung der Seide wird das Beschwerungsmittel nur in krystallin. gestemtem Zustande von der Faser aufgenommen. Die Aufnahme der $\text{Sn}(\text{OH})_4$ durch die Faser kann nicht durch Ladungsaustausch zwischen diesen beiden erfolgen. Die Seidensubstanz unterliegt bereits bei gewöhnlicher Temp. bei Einwirkung wss. HCl hydrolyt. Abbau. Die entstehenden bas. Abbauprodukte begünstigen die Hydrolyse der in die Faser diffundierten SnCl_4 -Lsgg. u. bewirken dadurch, daß ein Teil der $\text{Sn}(\text{OH})_4$ bereits vor dem Waschen innerhalb der Faser ausfällt. Der größte Teil der $\text{Sn}(\text{OH})_4$ wird erst im Verlauf der beim Waschen erfolgenden weiteren Hydrolyse der SnCl_4 -Lsgg. in der Faser kolloid ausfallen. Die von FICHTER u. JÜLLER (Chem.-Ztg. 1914. 693, Färber-Ztg. 1915. 254. 276) aufgestellte Theorie, daß das Fibroin mit dem SnCl_4 eine Molekülverb. bildet, konnte nicht bestätigt werden. Aus den Anschauungen über den Verlauf der Seidenerschwerung, die experimentell gestützt sind, gehen auch die Ursachen des Morschwerdens beschwerter Seiden hervor. Andererseits ergab sich der Weg zur Verhinderung des Morschwerdens. Es wurden Sn-Salze organ. Säuren hergestellt, von denen sich nur die komplexen Sn-Formiate für die Seidenerschwerung eignen, sie werden innerhalb der Faser selbst durch doppelte Umsetzung gebildet. Die Al-Beizung der Wolle wurde ebenfalls als chem. Vorgang erkannt u. ist dadurch bedingt, daß die Säure auf die Wollsubstanz abbauend wirkt u. von den Abbauprodukten gebunden wird. Die hierdurch eintretende Beeinflussung des hydrolyt. Gleichgewichts hat die Abscheidung einer entsprechenden Menge $\text{Al}_2(\text{OH})_6$ in der Faser zur Folge. Die $\text{Al}_2(\text{OH})_6$ -Abscheidung erfolgt beim Beizen mit $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ oder Alaun mit oder ohne Zusätze auf Kosten des gleichzeitigen Wollsubstanzabbaus. Diesen kann man vermeiden, wenn man leicht hydrolysierende Al-Salze schwacher Säuren anwendet, die nur durch das Fortschreiten der Hydrolyse beim Waschen ihr $\text{Al}_2(\text{OH})_6$ in der Faser freigeben. In diesem Sinne wirkt ein Zusatz von Na-Biformiat auf die Faser, während der von Weinstein, infolge B. eines sehr stabilen komplexen Sn-Tartrats ungünstig u. nur bei Wollsorten, die das $\text{Al}_2(\text{OH})_6$ gleichmäßig aufnehmen, einigermaßen berechtigt ist. Die durch seinen Zusatz erzielte Verzögerung der Hydrolyse kann auch ohne weitere Beeinträchtigung der Faser durch entsprechenden Neutralisalz-zusatz erfolgen. (Kolloidchem. Beihefte 19. 298—362. 1924. Karlsruhe i. B.) SÜ.

Johannes Pfleger, *Superoxydbleiche der Baumwolle*. Vorläufige Mitt. Der akt. O_2 in den Perverbb. ist ein hervorragendes Bleichmittel, es ist nicht anzunehmen, daß in absehbarer Zeit wesentlich anders geartete Bleichmittel von der-

elben Aktivität auftauchen werden. Der Heermannsche Quotient $\frac{\text{Koprotropie}}{\text{Organotropie}}$ Mellands Textilber. 5. 181; C. 1924. I. 2316) ist keine für alle Verwendungsarten desselben Bleichmittels konstante Größe, sondern abhängig von den Arbeitsbedingungen. Es sind für die bekannten u. guten Bleichmittel solche Anwendungsformen zu finden, die einen guten Wirkungsgrad gewährleisten. (Ztschr. f. angew. Ch. 37. 826—27. 1924. Frankfurt a. M.) SÜVERN.

Foulon, *Über die Affinität der sauren Farbstoffe zur tierischen Faser*. Die in der Literatur niedergelegten Ansichten über das Verh. der Wolle beim Färben mit sauren Farbstoffen werden besprochen. (Ztschr. f. ges. Textilind. 27. 434—35. 1924.) SÜVERN.

Kehren, *Basische Farbstoffe und Katanol*. Beizen mit Katanol wird in einem

Bade vorgenommen, auf die gebeizte Ware ziehen bas. Farbstoffe gut auf u. werden waschecht fixiert. Der im Vergleich zur Tannin-Brech Weinsteinbeize etwas gelbere Ton fällt zumeist nicht ins Gewicht. Im Druck wird Katanol für Buntätzen substantiver Färbungen mit Rongalit C oder Zn-staubdisulfit u. im Dampf anilinschwarz-Reserveartikel verwendet. Vorschriften für Anwendung des Katanols. (Ztschr. f. ges. Textilind. **27**. 446—47. 1924.) SÜVERN.

J. Groot, Über die Bildung von Farbstoffen für tierische Fasern durch Reaktionen des Materials selbst. Nach Besprechung der sogenannten Eisfarben u. Ingrain colours wird die Diazotierung der Woll- oder Seidenfaser durch Behandeln mit $\text{HNO}_2 + \text{HCl}$ erörtert. Durch Koppelung dieser diazotierten Wolle oder Seide mit Phenol, Kresolen, Brenzcatechin, Resorcin, Hydrochinon, Phloroglucin, Salicylsäure, α -Naphthol, β -Naphthol, 2-oxynaphthalin-6-sulfosäurem Na, 2-oxynaphthalin-6,8-disulfosäurem Na, 2-oxynaphthalin-3,6-disulfosäurem Na, 1,8-oxynaphthalin-3,6-disulfosäurem Na, α -Naphthylamin, β -Naphthylamin, Naphthionsäure, 2-Aminonaphthalin-4-sulfosäure, 2-Aminonaphthalin-5-sulfosäure, 1-Amino-8-oxynaphthalin-3,6-disulfosäurem Na (mono), 2-Amino-8-oxynaphthalin-6-sulfosäure erhaltenen Farben werden beschrieben. Hinweis auf die Lichtempfindlichkeit der diazotierten Fasern u. deren Verwendung zur Herst. von Lichtbildern darauf sowie auf die Möglichkeit an die Farbstoffe Metallsalze anzulagern. (Chem. Weekblad **21**. 450—55. 1924. Delft, Techn. Hoogenhool.) GROSZFELD.

H. Bing, Amerikanische und deutsche Polier-Lackierung. Die verschiedenen Arten der amerikanischen Lackierung unter Verwendung von Porenfüllern u. das von PAUL JAEGER angegebene deutsche Verf. ohne Öl werden geschildet. (Farbe u. Lack **1924**. 421—22.) SÜVERN.

H. Graßmé, Säure- und feuerfeste Farbe. Besprechung erfolgreicher Brand- u. Säureproben mit der „Gronid“-farbe der Monopol-Waren-Handelsgesellschaft m. b. H., Berlin, Friedrichstr. 100. (Dtsch. Essigind. **28**. 288—89. 1924.) RÜHLE.

K. Deck, Über „Benzole“ und „Amylacetat“. Ob Bzl. den vom Benzolverband geschaffenen Definitionen entspricht, ist durch einfach auszuführende Unterss. festzustellen. Beim techn. Amylacetat ist auf engere Siedegrenzen u. möglichst hohen Veresterungsgrad hinarbeiten. (Farbe u. Lack **1924**. 419.) SÜVERN.

A. Chaplet, Die Opacimeter. Verschiedene App. zur Messung der Deckkraft von Pigmenten werden besprochen. Verss. mit weißen Pigmentfarben werden mitgeteilt. (Rev. chimie ind. **33**. 231—35. 1924.) SÜVERN.

Hermann Weisz, Tageslichtbrille. Eine lichttechnische Neuerung für Farben-erkennung und -Vergleich bei künstlichem Licht. Richtiges, weißes künstliches Tageslicht läßt sich mit Lampenfiltern aus gepreßtem u. gegossenem Farbglas nicht erzielen. Eine Tageslichtbrille u. eine 200-Wattlampe der Voltzahl des eigenen Netzes wird empfohlen. (Zellstoff u. Papier **4**. 259—60. 1924.) SÜVERN.

Henry Green, Die Mikrochemie von weißen Farben und Füllstoffen, welche in Farben gemischt vorkommen. Zur Entfernung des einhüllenden Öles gibt man einen Tropfen der gemischten Farbe auf einen Objektträger u. verreibt mit 2 Tropfen frisch dest. Terpentinöl. Letzteres bei 150° verdampfen u. Öl durch Behandeln mit Bzl. quantitativ entfernen, d. h. nach dem Trocknen muß der Farbstoff ein trockenes Pulver darstellen. Man verreibt dieses wieder mit Terpentinöl, dampft ab u. gibt ein Stückchen mit Chlf. gereinigtes Dammarharz darauf u. fixiert den Farbstoff durch Erwärmen. Vorprüfung u. Mkr. Zur genauen Analyse benutzt man folgende Methode: Man behandelt die Verreibung mit Terpentinöl mit h. konz. H_2SO_4 . Bleibt ein Rückstand, so prüft man auf die Füllstoffe Titanox, Asbestin u. Silix. Titanox bildet kleine runde Körper, Durchmesser ca. 4 μ , mit sehr hoher Refraktion. Asbestin besteht aus länglichen Partikeln mit stärkerer oder schwächerer Refraktion als CHBr_3 . Silix kann nur bei Abwesenheit von Asbestin charakterisiert werden.

Es ist inert u. hat schwächere Refraktion als CHBr_3 . Bleibt bei der H_2SO_4 -Behandlung kein Rückstand, so taucht man ein neues Terpentinölpräparat in 0%ig. Essigsäure, um vorhandenes ZnO zu entfernen. 1 Minute in Bunsenflamme rhitzen. Hinzugeben von 1 Tropfen „Paravar“ (ein Spezialkautschukfirnis der I. S. Kautschukkompanie), $\frac{1}{2}$ Minute auf h. Platte erwärmen. Durch die vorhergehende Erhitzung ist vorhandenes *Lithopon* oberflächlich in ZnO übergegangen, welches mit Paravar sich hellbraun färbt. Zur Prüfung auf *Zinkoxyd* behandelt man direkt mit Paravar, welches ZnO tiefschwarz anfärbt.

Ein weiteres Terpentinölpräparat wird 2 Minuten lang in $\text{H}_2\text{S-W.}$, welches Tropfen NH_3 enthält, getaucht. Hierbei wird *basisches* PbSO_4 schwarz. Durch-esser ca. 0,6 u. *Basisches* PbCO_3 wird hellbraun, ist hexagonal u. kleiner als das orige. Zur Prüfung auf *Timonox* behandelt man ein Präparat 5 Minuten mit k. 0%ig. Essigsäure, trocknet, verreibt mit Glycerin u. prüft u. Mkr. Spitzwinklige, vor allem trianguläre Krystalle deuten auf Timonox. Ein extra konz. Präparat wird mit HCl (1:1) behandelt. Die eine Hälfte behandelt man mit h. konz. H_2SO_4 . Mit dem bloßen Auge erkennbares Mehrwerden deutet auf *Baryt* oder *Blanc fixe*. Bestimmen der Refraktion in CHBr_3 des ganzen Präparates. Zeigt die mit H_2SO_4 behandelte Hälfte eine größere Brechung als die unbehandelte, so ist Baryt nachgewiesen. *Blanc fixe* ist sehr fein u. nur schwer sichtbar. Schließlich prüft man ein Präparat u. Mk. auf Foraminiferenschalen, deren Anwesenheit Schlammkreide anzeigt. (Ind. and Engin. Chem. 16. 677—80. 1924. Palmerton [Pa.]) GRIMME.

XII. Kautschuk; Guttapercha; Balata.

A. J. Ultée und L. R. van Dillen, Über die Faktoren, die auf die Entstehung in Lump Einfluß ausüben. Der Einfluß der Zeit ist in den ersten Stdn. nach dem apfen gering. Schütteln des Latex beim Transport befördert den Säuregrad u. mit die Lumpb. nicht, es geht sogar ein Teil der Säure (CO_2) fort. Das Gleiche lt von erhöhter Temp. Schmutzige Gefäße wirken beschleunigend auf Säuregrad B. von Lump. Von Antikoagulanten wirkte KCN dem Säuregrad stark entgegen, achteile Giftigkeit u. Unkenntnis über Wrkg. auf innere Eigenschaften des Kaut- h. Der Soda ist Sulfid vorzuziehen. (Archief Rubberecultuur Nederland-Indie 6. —31. 32. 1922. Djember.)

GROSZFELD.

O. de Vries, Kerbosch Gummi. An Hand einer sehr großen Anzahl von Verss. ommt Vf. zu dem Schluß, daß Kerbosch Gummi keinerlei bemerkenswerte Eigen- schaften zeigt. Er dürfte kaum als Ersatz für „fine Para“ in Frage kommen, da r Prozeß für die Pflanzungen auch viel zu umständlich u. langsam ist. In Frage me höchstens seine Verwendung in der Kaltvulkanisation, die aber noch nicht pprobiert worden ist. (India Rubber Journ. 68. 29—35. 1924.)

PIECK.

L. B. Sebrell und W. W. Vogt, Die Beschleunigung der Vulkanisation. Einfluß der acetonlöslichen Bestandteile des Gummis auf die physikalischen und emischen Eigenschaften von Beschleunigermischungen. Es wird gezeigt, daß alle gan. Beschleuniger die Ggw. von 1. Zn erfordern, um optimale Wirksamkeit zu ttfalten. Dabei bilden sich Verbb. zwischen Zn u. dem Beschleuniger, die außer i den Mercaptobeschleunigern, die Zn-Salze bilden, bisher noch nicht isoliert rden konnten. *Diphenylguanidin* u. *Dimethylaminodimethyldithiocarbamat* z. B. ugieren direkt mit ZnO , andere erfordern ein gummilösliches Zn-Salz, das ent- der direkt zugesetzt wird, oder sich aus ZnO u. den Harzsäuren bildet.

Zu den Verss. wurden gleichzeitig Mischungen aus gewöhnlichem u. aus aceton- rtrahiertem Crepe geheizt. Letzteren wurde in manchen Fällen, um Fehler aus- schalten, der Acetonextrakt nachträglich wieder zugesetzt. — Daß die Harze en Einfluß auf die Wirksamkeit der Beschleuniger haben, wird auch dadurch wiesen, daß ein Zusatz von *Zn-Stearat* zu Mischungen aus acetoneextrahiertem

Gummi außerordentlich verbessernd wirkt. (Ind. and Engin. Chem. 16. 792—1924.)

W. E. Glancy, *Der Einfluß gewisser Füllmittel im Hartgummi*. Bei Vulkanisation von Hartgummi besteht eine krit. Temp., unterhalb welcher nur schmiegsames, lederartiges Prod. entsteht. Bei Erhitzen über diese Temp. erhöht sich die Bruchfestigkeit beträchtlich bei gleichzeitiger Abnahme der Dehnung. Bei wachsendem Zusatz von S nimmt die Bruchfestigkeit nur bis zu einem bestimmten Gehalt zu, dann nimmt sie infolge der Verd. wieder ab. — Bitum. können bis zu 7,5 Vol.-% zugesetzt werden. — Kalk u. Magnesia bewirken Hartgummimischungen ebenso wie bei Weichgummi eine Vulkanisationsbeschleunigung u. Erhöhung der Bruchfestigkeit. — Harz kann bis zu 5 Vol.-% zugesetzt werden. — Reifenregenerat bis zu 6 Vol.-% erhöht die Bruchfestigkeit u. vermindert Dehnung beträchtlich, bei größerem Zusatz wirkt es entgegengesetzt. (Ind. Engin. Chem. 16. 359—61. 1924.)

Walter Hole, *Versuche und Erfahrungen in Verbindung mit Gummi als Bindungsmittel für Gaskabel*. Um die Widerstandsfähigkeit des betreffenden Gummifestzustellen, wurden Streifen eingehängt einmal in das Lösungsm. selbst, einmal in die Dämpfe von Bzl., Toluol, Solventnaphtha usw. Es zeigte sich, daß Aufnahme von Lösungsm. rein physikal. Natur war u. daß keinerlei chem. eintrat. Nach dem Trocknen nahmen die Streifen wieder ursprüngliche Form u. Gewicht an, u. das Lösungsm. war nur schwach gefärbt. Da im Gebrauch das Kabel die Gummiverb. unter Druck steht, kommt eine Formveränderung dort überhaupt nicht in Frage. Ein nach 40-jährigem Gebrauch ausgegrabener Gummi zeigte noch durchaus gute physikal. Eigenschaften, er wies nur kreuz u. quer Risse auf, die aber nicht vollständig durchgegangen waren. Es handelte sich um eine Bleiglätte- u. ZnO-haltige Mischung mit 31% Asche. (Gas Journ. 166. 899—1924.)

O. de Vries, *Einige Angaben über die Viscosität von Latex ohne und mit Ammoniak*. Die Best. der Viscosität (V.) im Latex ist selbst mit einfachsten Mitteln wegen Gerinnung u. Säureh. unsicher u. ungenau. Die Kurven V./Kautschukgehalt für Latex von verschiedenem Gehalte durch starkes oder schwächeres Anzapfen verlaufen steiler als die Exponentialkurve. Die V. fällt bei Verdünnung mit Wasser ebenfalls steiler als die genannte Kurve. Die Logarithmen der relativen V. liegen auf schwach gebogenen in einigen Fällen fast geraden Linien, die die Abszissen rechts vom Anfang, bei Kautschukgehalten von 6—10 g/100 ccm schneiden. Die V. von n Latex beträgt bei einem Kautschukgehalte von 35%: 12—15, bei 30% ca. 8, bei 25%: 5—6, bei 20%: ca. 4 Einheiten bei großen Schwankungen. Latex von Bäumen nach langer Ruhezeit hatte stets $V. < n$, starkes Zapfen lief $V. > n$, Zapfen auf isoliertem Rindenstück $V. < n$, bei jungen Bäumen hohen V. für V., Latex von abnormer Zus. (niedriger Kautschukgehalt, kleiner Trockenrückstand, wenig Asche) hohe V. Die V. ist wegen der geringen Unterschiede wenig geeignet um Unterschiede in der Zus. des Latex anzuzeigen. Der Einfluß von 3 Faktoren, die die V. beeinflussen (Größe der Kautschukteilchen, Solvation, Gehalt an Elektrolyten) konnte noch nicht genau ermittelt werden. — Bei Konservierung mit NH_3 werden die Bestst., der V. besonders bei möglichst frischem u. durchgeseibtem Latex genauer. Zusatz von NH_3 (2—6%, bisweilen mehr) erniedrigt die V. mehr als der Verdünnung entspricht. V. von NH_3 -Latex bei 30%: 4—5½, bei 25%: 3—4, bei 20%: ca. 2½, bei 15%: ca. 2, nimmt bei Aufbewahren ab, bei frischen Proben in einer Woche um 1, in einem Monat um 1½. — Für frisch bereiteten NH_3 -Latex gilt folgendes: NH_3 beeinflusst stark die Faktoren der V., zweifellos durch Änderung der Solvation. Die V. von NH_3 -Latex nach fortgesetztem starkem Zapfen war gleich der V. von n Latex, trotzdem die Kautschukkügelchen im er-

alle kleiner sind. Bei jungen Bäumen wurden teils niedere V., auf isoliertem Indenstück anfangs n. dann niedere V. gefunden; Latex von abnormaler Zus. gab was höhere V. als n. Es ist wenig Hoffnung, daß die V. von NH₃-Latex, ebenso wie die von gewöhnlichem als Hilfsmittel zur Erforschung der Latexzus. größere Bedeutung haben wird, weil die Zahlenunterschiede so viel kleiner sind. (Archief rubbercultuur Nederland-Indie 7. 409—35. 436—43. 1923. Buitenzorg.) GROSZFELD.

Stanley Krall, *Einfluß von Beschleunigern auf die Plastizität von ungeheizten Gumminismischungen*. Die Neigung von Beschleunigermischungen, leicht auf der Flamme anzubrennen, bzw. beim Lagern anzuvulkanisieren, wurde durch Plastizitätsmessungen mittels des App. von WILLIAMS (C. 1924. II. 2089) näher bestimmt. Es ergab sich: bei 90° neigen nur Thiocarbanilid u. Aldehydammoniak zum Anvulkanisieren. Die Konz. des Beschleunigers ist bei Diphenylguanidin von großem Einfluß, weniger ausgeprägt bei Thiocarbanilid, Formaldehydanilin u. Äthylidenanilin. Die Konz. des Zinks spielt nur eine untergeordnete Rolle. ZnO setzt bei Aldehydammoniak die Neigung, anzuvulkanisieren, etwas herab, bei Diphenylguanidin wird sie etwas erhöht, bei Thiocarbanilid ganz enorm. Kalk u. Magnesia in Ggw. von ZnO erhöhen die Neigung zum Anvulkanisieren von Mischungen mit Aldehydammoniak u. Diphenylguanidin. — Diese Bestimmungsmethode läßt sich auf „Ultraschleuniger“ leicht anwenden. Wie sich aus dieser Methode entnehmen läßt, wirkt S selbst bis zu 12% nicht als Weichmachungsmittel. (Ind. and Engin. Chem. 16. 1922—24. 1924.)

PIECK.

Committee on methods of analysis of the Rubber division of the American chemical society, *Standardmethoden für die Analyse von Gummiwaren*. (Ind. and Engin. Chem. 16. 397—402. 1924. — C. 1922. IV. 1197.)

PIECK.

XIII. Ätherische Öle; Riechstoffe.

A. Ganswindt, *Über Riechstoffsysteme*. Kurzes Ref. über ein neues System von KELLER, welcher die Riechstoffe nach ihrem Duft in indoloide, aminoide, anizoloide, paraffinoide u. terpenoide Düfte einteilt. (Dtsch. Parfümerieztg. 10. 1924—16. 1924.)

A. R. F. HESSE.

Percy May, *Die Herstellung von Vanillin*. Vf. gibt eine Übersicht über die chem. Verff. zur Darst. von Vanillin, die seit TIEMANN u. HAARMANN (Ber. Dtsch. chem. Ges. 7. 613 [1874]) in den verflossenen 50 Jahren ausgearbeitet worden sind. (Perfumery Essent. Oil Record 15. 351—58. 1924.)

HABERLAND.

L. Francesconi und P. Scarafia, *Öl aus Santolina Chamae cyparissus L.* Das Öl, welches in der Hauptsache aus den Epidermis- u. Palisadenzellen der Blätter gewonnen wird, wird durch Wasserdest. gewonnen. Die Ausbeuten von 4 verschiedenen Sorten betragen 4, 2,60, 3,40, 13,2%₁₀₀. D.¹⁵ 0,8715, 0,8746, 0,8704, 0,8732, [α]_D = 16,43, —18,04, —11,66, —11,74°. Das zum größten Teil fl. ungefärbte Öl sd. bei gewöhnlichem Druck von 176—250° unter Zurücklassung eines pechschwarzen Rückstandes. Beim Fraktionieren ergab das Öl der D.¹⁵ 0,8704 (SZ. 0, VZ. 11,78, VZ. 16,43) zwei Fraktionen, Kp. 94—100° u. 100—108° mit den konstanten D.¹⁵ 0,8586 bzw. 0,8767, [α]_D = —12,23 bzw. —7,57°, VZ. 9,718 bzw. 16,65, VZ. des acetylierten Prod. 9,71 bzw. 13,91. — Die Fraktionierung von 300 g des D.¹⁵ 0,8732 u. [α]_D = —11,74° ergab folgende 6 Fraktionen:

D. ¹⁵ —20	94—97	97—98	98—107	107—108	108—109	109—111°
Farbe			farblos			hellgelb
n _D ²⁰	15	45	93	60	36	12
D. ¹⁵	0,8456	0,8496	0,8622	0,8736	0,8832	0,8951
[α] _D ²⁰	—10,76	—12,41	—9,76	—6,70	—7,22	—13,40°

Der Rückstand läßt sich durch Wasserdampfdest. in ein gelbes Harz (30 g,

D.¹⁵ 0,9538; $[\alpha]_D = -18,57^\circ$ u. ein Öl (D.¹⁵ 0,9344, $[\alpha]_D = 32,21^\circ$) zerlegen. (Riv. It. delle essenze e profumi 6. 76—79. 1924. Cagliari, Univ.) A. R. F. HESSE.

L. Bonaccorsi, *Kennzeichen der Bergamottöle in der ersten Periode der Agrumen ernte (Dezember 1923 bis Januar 1924)*. An einer größeren Anzahl von Ölen, deren Analysenzahlen in einer Tabelle zusammengestellt sind, wird gezeigt, daß die Öle einen verhältnismäßig geringen Gehalt an Estern haben, nämlich ca. 32—37%, nur in einem Falle 42%. — Die opt. Drehung liegt zwischen $+14$ u. $+24^\circ$. — Der Gehalt an freien Alkoholen gibt Werte zwischen 1,82—9,97%, Aldehyde 0,50—2% fester Rückstand 4,40—5,80%. (Riv. It. delle essenze e profumi 6. 39—41. 1924.) A. R. F. HESSE.

Giovanni Romeo, *Öl aus Rückständen der Bergamotte und seine Verwendung*. Das in den Rückständen verbliebene Öl wird durch erschöpfende Extraktion mit PAe. gewonnen, wobei der PAe. nach Abdest. immer wieder verwendet wird. Die Konstanten der vereinigten grüngelbten Extrakte sind: D.¹⁵ 0,8641, Kp. 170° $[\alpha]_D^{15} = +7^\circ 40'$, Säure (als CH₃COOH berechnet) 0,13, Ester 8,60, fester Rückstand 5,34%; l. in gleichen Vol. 80%ig. A. Der Geruch des Öles erinnert sehr an Bergamottöl. — Sogenanntes Bergamottdestillat, welches aus mehr oder weniger reifen Früchten erhalten wird, hat D.¹⁵ 0,861—0,865, $[\alpha]_D^{15} = +10$ bis $+30^\circ$; l. in gleichen Vol. 75 oder 80%ig. A., enthält 3—6% Ester. Destillat aus ausgewählten kleinen Früchten (Bergamotten) hat D.¹⁵ 0,870, $[\alpha]_D^{15} =$ nahezu 0°; l. in 2—3 Vol. 70%ig. A.; enthält 3—6% Ester. Der Geruch ist leicht brenzlich u. erinnert nicht an Bergamotten. (Riv. It. delle essenze e profumi 6. 1—2. 1924.) A. R. F. HESSE.

A. Doluis, *Die Wichtigkeit des Terpentins für die Riechstoffindustrie*. Die Eigenschaften des Terpentins, seine Zus. u. die Verfälschungsmittel, ferner das chem. Verh. von α - u. β -Pinen werden besprochen. (Rev. chimie ind. 33. 213—17. 1924.) SÜVERN.

Gérard-Vaudin, *Das Terpentingöl und seine Ersatzmittel*. Begriffsbestimmungen (Ann. des falsifications 17. 273—75. 1924.) RÜHLE.

Hans Katinsky, *Was ist Terpentingöl?* Vf. empfiehlt folgende Bezeichnungen 1. für Balsamöle: amerikan., deutsches, span. Kiefern-Balsam-Terpentingöl, 2. für andere terpenähnliche Öle: amerikan., deutsches, poln., russ. Kiefer-Stubben-Terpentingöl, nord. Cellulose-Terpentingöl usw. Jedes in den Handel kommende Öl muß so bezeichnet werden, daß der Verbraucher aus dem Namen Art u. Herkunft erkennen kann. (Farben-Ztg. 30. 239—40. 1924.) SÜVERN.

C. Edward Sage und W. Geoffrey Dalton, *Die Bestimmung von Thymol und Carvacrol in spanischen Thymianölen*. Es wurden Mischungen der beiden Phenole die von 5% Thymol bis 95% Carvacrol und von 5% Carvacrol bis 95% Thymol enthielten, bereitet u. die Erstarrungspunkte der verschiedenen Mischungen ermittelt u. graph. in Beziehung zur Temp. dargestellt. Die erhaltene Kurve ermöglicht die Ermittlung der prozentualen Zus. von Gemischen der beiden Phenole. Ein Vergleich der Kurven aus dem Gemisch der reinen Phenole u. der aus span. Thymianöl extrahierten Phenole zeigt geringe Abweichung der beiden Kurven, was wohl darauf zurückzuführen ist, daß im letzteren Falle bei der Isolierung noch geringe Mengen von Terpenen adsorbiert waren. (Perfumery Essent. Oil Record 15. 345—46. 1924.) HABERLAND.

XV. Gärungsgewerbe.

E. Lühder, *Bericht über die Prüfung eines Maische-Destillierapparates für hochprozentigen Spiritus*. Angabe der Ergebnisse der Prüfung eines App. dieser Art der Apparatebauanstalt R. DÄHNE in Frankfurt a. O. (Ztschr. f. Spiritusindustrie 47. 262—63.) RÜHLE.

E. Lühder, *Destillierapparate für die Gewinnung von hochprozentigem Spiritus direkt aus der Maische*. Zusammenfassende Besprechung älterer u. neuer App. an Hand von Skizzen. Mit den neuesten ein- u. zweiteiligen App. gelingt es, Spiritus von 95,4—96,1 Maß-% unmittelbar aus der Maische zu erhalten. (Ztschr. f. Spiritusindustrie 47. 257—59. 1924.) RÜHLE.

E. Lühder, *Über Bau und Konstruktion des periodisch arbeitenden Blasendestillierapparates*. Techn. Betrachtungen über die Eignung des App. für kleinere Brennereien u. über seine Einrichtung u. Handhabung. (Brennereiztg. 41. 151—52. 1924.) RÜHLE.

Kurt Hembd, *Das Verhalten von Kahlmhefen gegenüber verschiedenen Substraten*. Die Kahlmhefen, deren Entstehung nur in unmittelbarer Berührung mit Luftsauerstoff möglich ist, unterscheiden sich durch die Fähigkeit der Gärung u. der Sporenbildung voneinander. Während die zur Gattung Willia gehörenden Kahlmhefen wohlriechende Ester zu bilden vermögen, besteht die durch die zur Gattung Mycoerma gehörigen Kahlmhefen erzeugte Einw. lediglich in der Verringerung der Säure u. des A. Allen Kahlmhefen gemeinsam ist ihre Anspruchslosigkeit in der Ernährung u. ihre Widerstandsfähigkeit gegen Wärme u. Sauerstoffmangel. Die Kahlmhefen sind große Schädlinge von Most u. Wein, da sie auf Kosten der Nährfl. ppig wuchern, ihre wertvollen Bestandteile u. Bukettstoffe zerstören u. dafür unangenehme Stoffwechselprodd. wie Aldehyd, Buttersäure, Valeriansäure, Essigsäure, kkal. wirkende Ammoniumverbb., schwarzes Ferritannat u. H₂S hineinbefördern. (Brennereiztg. 41. 45. 1924. Inst. f. Gärungsgew. Berlin.) LINHARDT.

W. Windisch, *Die Gersten der 1923er Ernte*. Nach allgemeinen Betrachtungen über den Zusammenhang der Güte der Gerste mit der Witterung u. der Güte des Malzes u. dessen Bewährung beim Bierbrauen mit der Güte der Gerste, geht Vf. insbesondere auf die ungünstigen Witterungs- u. Marktverhältnisse für Gerste im Jahre 1923 ein u. bringt anschließend Berichte einiger Malzfabriken über die Erfahrungen, die sie bei der Verarbeitung der Gersten des Jahres 1923 gemacht haben, u. einiger Brauereien über die Erfahrungen mit den daraus gewonnenen Malzen. Die mitgeteilten Erfahrungen sind je nach Art u. Herkunft der Gerste sehr verschieden. (Wechschr. f. Brauerei 41. 55—56. 59—60. 65—67. 72—73. 1924.) RÜHLE.

H. Lloyd Hind, *Der Brauwert des Hopfens*. (Vgl. Brewers Journ. 60. 502; 1924. II. 2431.) Zusammenfassende Erörterung vom Standpunkte des Veranchers aus bei Gelegenheit eines Vortrages. (Brewers Journ. 60. 556—58. 1924.) RÜHLE.

Langwell und Lloyd Hind, *Die Abfallstoffe in der Brauerei. Die Verwertung des ausgebrauten Hopfens und der Treber durch die Cellulosegärung*. Sie erfolgt fast ebenso schnell wie die Vergärung der Glucose durch Hefe durch einen neuerlich entdeckten Bacillus, dessen Optimumtemp. bei 60—65° liegt. (Journ. Inst. Brewing; 1924. II. 2431.) Zitat Journal du Brasseur; Allg. Brauer- u. Hopfenztg. 64. 915—16. 1924.) RÜHLE.

Otto Pampe, *Zur Erzeugung von hochprozentigem Rohspiritus*. Vf. gibt einen Überblick über die Erwägungen hinsichtlich der Herst. von hochprozentigem A. auf Grund der Maßnahme der Reichsmonopolverwaltung, für Rohsprit von 93—94 Gew.-% (95,4—96,1 Maß-%) besondere Zuschläge zu gewähren. (Ztschr. f. Spiritusindustrie 47. 259. 1924. Halle a. S.) RÜHLE.

P. Grélot, *Lothringischer Mirabellenbranntwein*. Nach kurzer Besprechung der Abstammung u. des V. der Mirabelle, die eine Spielart der Pflaume, Prunus domestica L., ist, u. besonders in Lothringen geeignete Bedingungen für ihre Entw. findet, erörtert Vf. die Herst. des Mirabellenbranntweins durch Gärung u. Dest. u. die Zus. Bei 6 Proben solchen Branntweins schwankten, bezogen auf 100 l absol. u. in g: Säure (als Essigsäure) 1,1—59,6, Ester 51—187,5, Aldehyde 1,4—32,8,

Furfurol 0—5,5, höhere Alkohole 134—382,5. Von 8 Proben enthielten 3 HCN, zwar 5,4—5,4—75,6 mg in 1 l u. dieselben Proben entsprechend Benzaldehyd Spuren—Spuren—57,7 mg in 1 l. Die Zus. ist also sehr schwankend u. läßt keinen sicheren Schluß zu, es liegt dies wohl an dem Rohmaterial, den Mirabellen, selbst u. an der verschiedenen Art der Herst. (Ann. des Falsifications 17. 261—6 1924. Nancy.) RÜHLE.

P. Mumme, *Hopfenbiere, Hopfenkochen, Hopfenextraktion, Filtration der Würze vor der Hopfenzugabe*. Vf. erörtert die Einw. der Wassersalze auf die Beschaffenheit des Bieres u. Arbeitsverf. zum Ausgleich dieser Einw. Hierher gehört insbesondere das Kochen u. Filtrieren der Würze vor der Hopfenzugabe u. die Verwendung von *Hopfenextrakten*, die mittels destilliertem W. in einem App. hergestellt werden, der an Hand einer Skizze kurz nach Einrichtung u. Wirksamkeit beschrieben wird. (Allg. Brauer- u. Hopfenztg. 64. 959—60. 1924.) RÜHLE.

Oldrich Miskovsky, *Die Kolloide im Biere*. Durch die bei der Gärung entstehende Kohlensäure wird ein großer Teil der in der Bierwürze enthaltenen Kolloide ausgeschieden. Diese „Reinigung“ des Bieres geschieht bei Gefäßen nicht zu hoher Biersäule am raschesten. Es muß jedoch auch dafür Sorge getragen werden, daß dieselbe nicht zu weit getrieben wird, da sonst die Fähigkeit der Schaumbildung u. die Vollmundigkeit Schaden leiden. (Wehschr. f. Brauerei 4 17—18. 21—24. 27—28. 1924. Berlin.) LINHARDT.

Hermann Christoph, *Beiträge zur Physiologie der Sarzina flava de Bavy und der Bierpediokokken*. Während *Sarzina flava* ausschließlich von aerobem Charakter u. für den Betrieb harmloser Natur ist, verursacht die Biersarzina die typ. Sarzinkenkrankheitserscheinungen in Würze u. Bier. (Ztschr. f. ges. Brauwesen 47. 21—2 1924. München.) LINHARDT.

Fonzes-Diacon, *Die Sulphophosphate bei der Weinbereitung*. Nach dem französischen Erlass vom 19. 8. 1921 darf Weinmaische u. Wein nur mit den kristallisierten Disulfiten des K oder Na u. höchstens in einer Menge von 20 g im hl versetzt werden; ebenso werden dazu zugelassen NH_4 -Phosphate u. zwar $(\text{NH}_4)_2\text{H}_2\text{PO}_4$ u. $\text{H}_2\text{-NH}_4\text{-PO}_4$; nicht zugelassen ist das $(\text{NH}_4)_3\text{-PO}_4$. Vf. erörtert die sich an Hand dieses Erlasses ergebende Beurteilung der im Handel befindlichen u. zur Weinbereitung angebotenen Zubereitungen dieser Salze u. den Chemismus der bei ihrer Verwendung eintretenden Umsetzungen, insbesondere der Einw. gasförmiger SO_2 auf Mono-, Di- u. Tri- NH_4 -Phosphat in Lsg. (Ann. des Falsifications 17. 277—83 1924. Montpellier.) RÜHLE.

E. Manceau, *Herstellung des Weins in der Champagne. Untersuchungen über die Zusammensetzung der Trauben Pinot Noir*. (Französische Rebe und gefrorene Rebe). Die einheimische wurzelechte französische Champagnerrebe (Pinot noir) wird bereits seit vielen Jahren mehr u. mehr durch Pflöfen dieser Rebe auf amerikanische Unterlage ersetzt. Vf. hat die Trauben beiderlei Arten auf chem. Zus. hin untersucht u. gefunden, daß sie sich darin in keiner wesentlichen Beziehung unterscheiden. (Ann. des Falsifications 17. 275—77. 1924.) RÜHLE.

J. Fromme, *Über Hagebuttenwein*. Das früher (Pharm. Ztg. 68. 856; C. 1924. I. 2835) angegebene Verf. zur Darst. wurde verbessert. Bei Verwendung von frischen Hagebutten ist Weinhefe nicht nötig, bei trockenen ist sie aber erforderlich. (Pharm. Ztg. 69. 964. 1924. Egel.) DIETZE.

Rothentach, *Rationelle Betriebsweise in automatisch bedienten Schnellseignfabriken unter Verminderung der Verluste bei der Gärung*. Durch Anreicherung des Alkoholgehaltes der Maische kann man die Verarbeitungsfähigkeit von automatisch bedienten Schnellseignbildnern steigern. (Dtsch. Essigind. 28. 65—66. 1924. Berlin.) LINHARDT.

Frederick B. Power und Victor K. Chesnut, *Prüfung echter Traubenmoste auf Anthranilsäuremethylester*. Die früheren Unterss. der Vf. (vgl. Journ. Americ. chem. Soc. 43. 1741; C. 1922. II. 1145) werden auf eine große Anzahl von Mosten amerikan. Ursprungs ausgedehnt. Nach den mitgeteilten Ergebnissen wurde in der weitaus größeren Anzahl der unters. Moste das V. des Esters nachgewiesen. (Journ. agricult. Research 23. 47—53. 1923. U. S. A. Dep. of Agric.) BERJU.

Leop. Preyß, *Die Bestimmung des Essigsäuregehaltes im Weine*. Beschreibung eines App. zur Best. der Essigsäure im Wein durch Abdestillieren mit Wasserdampf. (Dtsch. Essigind. 28. 281. 1924.) RÜHLE.

Kroemer, *Über den Nachweis von Obstwein in Traubenweinen mit Hilfe der Stärkebestimmungen*. Da auch in naturreinen Traubenweinen Stärkekörner nicht ölig fehlen u. nicht selten nachgewiesen werden können u. ihre morpholog. Merkmale von den Körnern der Obststärke nicht völlig zu unterscheiden sind, ist nicht zu empfehlen, einen etwaigen Zusatz von Obstwein zu Traubenwein nach dem Stärkegehalt allein zu beurteilen. Bei verbesserten Weinen ist dieses Verf. ganz unzulässig, weil der zur Verbesserung dienende Zucker nach den Beobachtungen des Vf. fast immer geringe Mengen von Stärke enthält, die zum Teil ebenfalls aus Feinkörnern besteht. (Landw. Jahrb. 60. 490—92. 1924. Geisenheim, Höhere landw. Lehranst.) BERJU.

XVI. Nahrungsmittel; Genußmittel; Futtermittel.

P. Buttenberg und H. Weiss, *Über die Beeinflussung von Lebensmitteln bei der Blausäuredurchgasung von Schiffen und Speichern*. Nach den mitgeteilten Unterss. über die Wrkg. der Blausäuredurchgasung erfahren bei sachgemäßer Ausführung die durchgasteten Lebensmittel keine Veränderung, welche eine Minderung der Bösartigkeit oder gar Gesundheitsschädlichkeit zur Folge hat. Die Lebensmittel werden unmittelbar nach der Durchgasung einen HCN-Gehalt von 1—3 mg in 100 g, welcher bei der handelsmäßigen weiteren Bearbeitung der Waren in wenigen Tagen verschwindet. Ein erhöhter HCN-Gehalt über 2 mg wurde nur bei Rohkaffee, schwarzem Pfeffer, getrockneten Pflaumen u. Rosinen festgestellt. Eine gewisse Beeinträchtigung des Geschmacks u. Geruches kommt nur bei fertigen Tabakwaren, Rohkaffee u. insbesondere Tee in Frage. (Ztschr. f. Unters. Nahrungsmittel 48. 104—18. 1924. Hamburg.) MANZ.

C. Moewes, *Über Eatan*. Eatan ist ein Gemisch von Aminosäuren, hergestellt durch hydrolyt. Abbau von tier. Blut, Eiweiß u. dergleichen. (Herstellungsgesellschaft, München.) Es bewährte sich als Nähr- u. Kräftigungsmittel u. wurde als Zusatz zur n. Kost längere Zeit von den Patienten gern genommen. (Münch. med. Wchschr. 71. 1363. 1924. Berlin-Lichterfelde, STUBENRAUCH-Krankenhaus.) FRANK.

Braun, *Die Bestimmung der Backfähigkeit der Mehle*. Vf. hat 16 Mehle nach LEURENT (Best. von Gliadin u. Glutenin; Trennung beider durch 70%ig. A., der 3% KOH enthält u. Gliadin löst, während Glutenin in kolloidaler Suspension bleibt u. daraus durch Einleiten von CO₂ gefällt wird) untersucht u. bespricht die Ergebnisse. Das Verhältnis Gliadin zu Gluten mal 100 schwankt auch bei besten Mehlen ganz bedeutend, was wahrscheinlich auf die Ungleichmäßigkeit der Zus. des Glutens zurückzuführen ist. Vf. verfährt deshalb wie folgt: In 2 g des Mehles bestimmt man den Gesamt-N nach KJELDAHL; dann schüttelt man 2 g Mehl im 200 ccm-Kolben mit annähernd 200 ccm W. 3 Min., füllt auf, mischt, filtriert u. bestimmt den l. N aus 100 ccm des Filtrats nach KJELDAHL; der Unterschied ist der unl. N, der auch unmittelbar bestimmt werden kann durch Best. des N-Gehaltes von mit W. erschöpftem Mehle; beide Werte stimmen sehr gut miteinander überein. Bei 7 Mehlen hat Vf. hiernach erhalten:

Gesamt-N $\times$ 6,25	11,43	13,12	14,37	13,25	12,56	12,68	13,1
l. N $\times$ 6,25	2,81	2,68	3,06	2,87	2,68	2,74	2,8
unl. N $\times$ 6,25, bestimmt	8,62	10,44	11,31	10,38	9,88	9,94	10,6
unl. N $\times$ 6,25, berechnet	8,75	10,43	11,31	10,37	9,87	9,73	10,8

(Ann. des Falsifications 17. 269—72. 1924.)

RÜHLE.

Jacob Zinn, *Beziehungen zwischen den verschiedenen charakteristischen Eigenschaften des Weizens und der Mehle, nach den veröffentlichten Angaben über chemische Untersuchungen und Mahl- und Backversuche mit amerikanischen Weizensorten.* Die in dem amerikanischen Schrifttum veröffentlichten Angaben über den Gehalt der amerikanischen Weizensorten u. Mehle an Protein, Gluten u. Gliadin u. das Wasserverbindungsvermögen der in den verschiedenen Getreidedistrikten gewonnenen Mehle werden tabellar. geordnet u. aus den so gewonnenen übersichtlichen Zusammenstellungen die Korrelationskoeffizienten der Mengenverhältnisse der einzelnen Bestandteile unter sich u. deren Beziehungen zur Mehlausbeute u. zur Triebkraft der Mehle berechnet. (Journ. Agricult. Research 23. 529—48. 1923. Maine, Agric. Exp. Stat.)

BERJU.

F. C. Stewart, *Die Beziehung des Feuchtigkeitsgehaltes und gewisser anderer Faktoren zum Poppen des Popmais.* Die größte Ausbeute an „Popmais“, d. h. an Körnern, welche beim Rösten puffend zerplatzen, wird bei einem Feuchtigkeitsgehalt des Röstgutes von 13—15% W. erhalten. Da Popmais leicht W. abgibt oder absorbiert, kann er leicht auf den gewünschten Wassergehalt gebracht werden. Die Best. des W. wird mit genügender Genauigkeit durch 10tägiges Trocknen einer 50 g-Probe in einem elektr. Freastrocknenofen bei 85° ausgeführt. (New York State Agric. Exper. Stat. Bull. 505. 70 S. 1923. Geneva [N. Y.], Sep. v. Vf.)

BERJU.

Arthur W. Christie, *Roher Schwefel bei der Präservierung von Früchten.* Nach NEWHALL (Chem. Metallurg. Engineering 31. 144; C. 1924. II. 1841) ist es vorteilhafter, beim Behandeln von Früchten mit SO₂ durch Verbrennen von S sublimierte S und nicht rohen S zu nehmen. Nach Vf. trifft dies nicht zu, vielmehr ist roher S dazu ebensogut geeignet wie sublimierter S. — In einem Nachwort hält NEWHALL seine Meinung aufrecht. (Chem. Metallurg. Engineering 31. 472—73. 1924. Berkeley [Calif.] u. Seattle [Wash.])

RÜHLE.

W. H. Dore, *Neue Fortschritte in der Pektinchemie und ihre technische Anwendung.* Bericht über die Chemie des Pektins, seine techn. Gewinnung aus Obst u. Rübenabfällen, seine Verwendung als Nahrungsmittel u. zur Herst. von Klebstoffen. Vorschläge zur Verwendung bei der Faserstoffherst. u. Papierfabrikation. (Ind. and Engin. Chem. 16. 1042—44. 1924. Berkeley [Cal.])

GRIMME.

R. O. Neumann, *Versuche über die Süßung von Nahrungsmitteln mit Süßstoffen (Saccharin und Krystalllose).* (Vgl. Techn. Gemeindeblatt 26. 147; C. 1924. I. 2794.) Nach den mitgeteilten prakt. Verss. kann bei einer großen Zahl von Nahrungsmitteln der Zuckerzusatz zu einem erheblichen Anteil (50—80%) durch eine isodulce Menge Saccharin ohne Beeinträchtigung des Geschmacks ersetzt werden, wobei im übrigen Saccharin bei der üblichen küchenmäßigen Zubereitung der Speisen nicht verändert wird. (Ztschr. f. Unters. Nahrsg.- u. Genußmittel 47. 184—98. 1924. Bonn/Hamburg, Hyg. Inst.)

MANZ.

R. T. Thomson und James Sorley, *Die Zusammensetzung und Zersetzung von Eiern.* Bei der Best. des Dotterfettes werden mit PAe., Ä. oder Chl. gleiche Werte erhalten, wenn die Substanz sorgfältig getrocknet ist. Zur Best. des Unverseifbaren ist CH₃OH, nicht PAe. zu verwenden. Der Gehalt an freier Fettsäure stieg gegen 1,72% ber. als Ölsäure im frischen Hühnerei nach zweijähriger Aufbewahrung auf 5,24%. (Analyst 49. 327—31. 1924.)

MANZ.

Harrison Hale und William L. Bleecker, *Aktives Chlor als keimtötendes Mittel für Milch und Milchprodukte.* Milch u. Sahneproben wurden mit Lsgg. von

Chlorwasser, NaOCl u. $\text{Ca}(\text{OCl})_2$ mit verschieden starkem Gehalt an akt. Cl_2 versetzt u. die Keime vorher u. nach 1-std. Einw. der Cl -haltigen Lsgg. festgestellt. Es ergab sich in allen Fällen erhebliche Abnahme der vorhandenen Keime. Chlorwasser ist am wirksamsten, es hat bei gleicher Cl_2 -Konz. innerhalb 45 Min. dieselbe Wrkg. wie NaOCl in $1\frac{1}{2}$ oder Clorkalk in 19 Stdn. Zurückzuführen ist darauf, daß Cl_2 im Chlorwasser rascher verwertbar ist als in den Salzen. Chlorwasser in Verd. von 1:4000 beeinflusst den Geschmack der Milch nicht, bei 1:3000 ergibt sich schwacher Cl -Geschmack, der bald wieder verschwindet; NaOCl dagegen ergibt schon in Verd. 1:10000 deutlichen Nachgeschmack. (Journ. Agricult. Research 6. 375—81. 1923. Univ. of Arkansas Agricult. Exp. Station.) HABERLAND.

Dan. W. Steuart, Der Gehalt von Milchpulver an Citronensäure. Die Best. der Citronensäure geschah durch Überführen in Pentabromaceton nach STAHRÉ u. das Doppelsalz des Hg-Acetondicarboxylat mit bas. Hg-Sulfat nach BEAU (vgl. BARTHEL, Milk and Dairy Products). Darnach ist dieser Gehalt ganz bedeutend. Eine frische Milch (April) enthält 0,158% anhydr. Citronensäure. Milchpulver aus Sahm enthielt im Mittel 1,16%, aus entrahmter Milch 1,55%, entsprechend in beiden Fällen etwa 0,144% in der ursprünglichen Milch. (Analyst 49. 465—67. 1924.) RÜHLE.



Stuart L. Crawford, Rochester, V. St. A., Protein- und stärkefreies Pektin. Apfel werden ausgepreßt u. der Rückstand kurze Zeit mit s. M. behandelt, wobei Zucker, aber keine nennenswerten Mengen Pektin gel. werden sollen. Der ungel. Teil wird mit stark verd. organ. Säuren ausgekocht, die entstandene Lsg. mit roteolyt. u. amolyt. Enzymen behandelt, um Protein u. Stärke zu zerstören u. die gegebenenfalls filtrierte Fl. eingedampft. (A. P. 1507338 vom 20/10. 1920, ausg. 19. 1924.) KÜHLING.

Marie Louise Marsan, Frankreich, Ersatzstoff für Fleischextrakt und -pulver. Z. P. 554913 vom 6/12. 1921, ausg. 19/6. 1923. — C. 1924. II. 2209.) KAUSCH.

XVII. Fette; Wachse; Seifen; Waschmittel.

Wilmer C. Powick, Verbindungen, die in ranzigen Fetten entstehen, mit Beobachtungen über den Mechanismus ihrer Bildung. Ranzige Fette zeichnen sich aus durch ihren eigenartigen Geruch u. geben beim Schütteln mit konz. HCl u. einer 1%ig. Phloroglucinlsg. Rotfärbung der HCl -Schicht. Um die Verbb. festzustellen, die für diese Eigenschaften ranziger Fette verantwortlich zu machen sind, hat Vf. Oxydationsprodd. der Ölsäure, sowie Verbb., die andere Autoren aus ranzigen Fetten isoliert haben, einzeln oder nach Zugabe zu frischem nicht ranzigem Fett, geprüft. Folgende Verbb. sind weder die Ursache des Geruchs noch der Phloroglucinkrk.: Oxyctearinsäure, Dioxyctearinsäure, Diketostearinsäure, HCOOH , CH_3COOH , H_2COOH , Capronsäure, Heptylsäure, Caprylsäure, Nonylsäure, Azelainsäure, Acrylsäure, CH_2O , CH_3CHO , $\text{C}_4\text{H}_5\text{CHO}$, Acrolein, Crotonaldehyd, Methylglyoxal, Dioxyacetone. Für den Geruch ranziger Fette kommen nicht in Frage: Ke ostearinsäure u. der Halbaldehyd der Azelainsäure. Nonylaldehyd u. Heptylaldehyd geben keine Krk. mit Phloroglucin- HCl , erteilen jedoch, frischen Fetten nur in kleiner Menge eigemischt, diesen einen ähnlichen, aber weniger scharfen Geruch wie er für ranzige Fette charakt. ist. Wird Ölsäure ozonisiert u. das gebildete Ozonid durch W. hydrolysiert, so zeigte sich, daß außer den C_9 -Aldehyden u. Säuren auch peroxyartige Verbb. entstanden waren, die die Fuchsin- SO_2 u. die Phloroglucinkrk. haben. Ranzige Fette sowie ranzige Ölsäure geben außer der Phloroglucinkrk. stets auch Peroxydrkk. (B. von J aus KJ in Eg.-Lsg.). Eine endgültige Entscheidung darüber, ob diese Peroxyde von Wichtigkeit für den positiven Ausfall der Phloroglucinkrk. sind, hat sich nicht fällen lassen, die Möglichkeit ist jedoch nicht aus-


geschlossen. — Es ist bekannt, daß auch arom. Verb. sowie frisches Baumwollsaamenöl eine positive Phloroglucinrk. geben. Durch spekt. Unters. der rotgefärbten HCl-Schicht lassen sich diese Färbungen jedoch deutlich von den durch ranzige Fette, ranzige Ölsäure u. Acrolein + H₂O₂ hervorgerufenen unterscheiden. Diese letzteren zeigen eine schmale, fast symmetr., stets gleichliegende Bande im Gelbgrün nahe der D-Linie; die mit *Baumwollsaamenöl*, *Vanillin*, *gealtertem Terpentinöl*, *Eugenol* u. *Zimtaldehyd* + Phloroglucin-HCl erhaltenen Färbungen zeigen untereinander spekt. Abweichungen, die Absorption beginnt hier in der blau- oder gelbgrünen Region u. erstreckt sich bis zum violetten Ende des Spektrums. Die Beobachtung, daß Acrolein + H₂O₂ + Phloroglucin dasselbe Absorptionsspektrum gibt wie die ranzigen Fette, veranlaßte Vf. die Oxydationsprodd. des *Acrolein* (a) mit H₂O₂ (b) bezüglich ihres Verh. gegenüber Phloroglucin-HCl zu untersuchen. Es kann entstehen: aus 1 Mol a + 2 Mol b Acroleinperoxyd, aus 1a + 1b Glycerinaldehyd, Dioxyaceton, Methylglyoxal, Malondialdehyd, Oxacrolein u. Epihydrinaldehyd; aus 1 Mol a + 3 Mol b Mesoxalaldehyd. Mit Ausnahme des vorletzten Verb. sind alle eben genannten Oxydationsprodd. an der B. der roten Färbung unbeteiligt. *Epihydrinaldehyd* selbst ist bisher in freiem Zustande nicht erhalten worden, daher wurde in Anlehnung an die Verff. von WITZEMANN (Journ. Americ. Chem. Soc. **36**. 1908; C. **1915**. I. 654) u. WOHL u. MOMBER (Ber. Dtsch. Chem. Ges. **47**. 3346; C. **1915**. I. 249) *Epihydrinaldehyddiäthylacetal* nach folgender Rkk. dargestellt:





Das so erhaltene Prod. war prakt. unl. in W., wurde durch Säuren leicht zers. u. hatte Kp. 165—168°. Werden einige Tropfen einer äth. Lsg. mit konz. HCl u. Phloroglucin in Ä. versetzt, so färbt sich die HCl-Schicht sofort rot, schwache Rk. tritt auch mit verd. HCl (1:20) noch ein, bei Abwesenheit von Säure bleibt die Färbung aus. Das Absorptionsspektrum dieser roten Lsg. u. das aus Acrolein + H₂O₂ + Phloroglucin-HCl erhaltene erwiesen sich als ident. Um Klarheit über die Zus. des roten Farbstoffs zu erhalten, wurden 25 cem einer frischen 5%ig. wäss. Acroleinlsg. mit überschüssigem 30%ig. H₂O₂ + 300 cem konz. HCl + 300 cem einer 1%ig. äth. Phloroglucinlsg. gemischt (Rotfärbung) u. der nach Schütteln entstandene tief purpurrote Nd. untersucht; er war wl. in Eg. u. konz. HCl, l. (vielleicht unter Zers.) in Alkali, sonst unl. in organ. Mitteln; beim Erhitzen tritt vom dem Schmelzen Verkohlungen ein. Die Verbrennung der Verb. gab Werte, die zwischen den für Verb. C₁₅H₁₄O₆, entstanden nach Rk. I, u. für Verb. C₁₅H₁₂O (IIIa), entstanden nach Rk. II, berechneten lagen. Das untersuchte rote Prod. bestand der Farbe nach zu urteilen hauptsächlich aus IIIa. Die B. von IIIa aus III erfolgt unter dem dehydratisierenden Einfluß der konz. HCl. Die wasserlösliche rote Verb. entspricht wahrscheinlich Verb. III.

Nach diesen Befunden wurde versucht, durch fraktionierte Dest. von ranziger Fett u. ranziger Ölsäure das färbende Prinzip zu isolieren, um es mit Epihydrinaldehyddiäthylacetal zu vergleichen. Die Isolierung u. Reindarst. gelang jedoch nicht. Die angestellten Verss. haben aber ergeben, daß die fragliche Verb. wl. in W. ist, sie ist mit Wasserdampf nicht flüchtig; bei 0,2—0,5 mm u. 100° dest. nur sehr wenig über, bei höheren Temp. findet Zers. statt. Auf Grund dieses Verh. ist freies Acrolein nicht als die Verb. anzusehen, die in ranzigen Fetten die Phloroglucin-HCl-Rk. gibt; auch freier Epihydrinaldehyd, der sich mutmaßlich analog wie Acrolein verhalten würde, kommt nicht in Betracht. Das Verb. von *Epihydrinaldehyddiäthylacetal*

see errata
v. 9912
025493



see errata v. 991 p. 3493



drinäthylacetal dagegen deutet darauf hin, daß die Substanz das Epihydrinaldehydradikal intakt enthalten muß, vielleicht ist sie das Glycerylacetal des Epihydrinaldehyds.

Den Zerfall des Ölsäuremol. unter dem Einfluß von Luft-O₂ erklärt Vf. folgendermaßen: es bildet sich zunächst Oleinsäureperoxyd (IV). Durch Einw. von aktiviertem O₂ (aus dem Peroxyd eines anderen Mol.) auf H an gesätt. C-Atomen von IV entsteht das Oxyd der 7-8,9-10,11-12-Linolensäure (V), das mit O₂ unter B. des Doppelperoxyds (VI) reagiert. Durch Aufspaltung an den beiden Peroxydgruppen entstehen hieraus: Heptylaldehyd (VII), Butendialoxyd (VIII) u. der Halbaldehyd der Pimelinsäure (IX). Durch weitere Oxydation von VIII entsteht das Oxyd der Acrolein-β-carbonsäure (X) u. hieraus durch Abspaltung von CO₂ oder des VIII durch Abspaltung von CO (vgl. SALWAY, Journ. Soc. Chem. London 109. 188; C. 1916. II. 123) wird Epihydrinaldehyd (XI) gebildet. (Journ. Agricult. Research 26. 323—62. 1923. U. S. A. Dep. of Agricult.), HABERLAND.

J. Bohle, Die Sulfurölindustrie Spaniens. Vf. beschreibt die Extraktion der Oliventrester mit CS₂ u. die Herst. des CS₂ in Spanien u. weist darauf hin, daß die Modernisierung der Einrichtungen ein gutes Arbeitsfeld für die deutsche Industrie (Chem.-Ztg. 48. 745—46. 785—86. 1924.) JUNG.

H. K. Benson, Reinigung von Lachsöl. Lachsöl ist das Nebenprod. der Lachsindustrie an der Pacificküste. Es kann durch Erhitzen bis 340° in der Qualität wesentlich verbessert werden, wenn man gleichzeitig einen Gasstrom von H₂, N₂ oder CO₂ durchleitet. Alle drei Gase verhalten sich gleich, indem sie bewirken,

daß die Jodzahl des Rückstandes sinkt, u. zwar je stärker, desto höher die Temp. liegt. Daraus kann man schließen, daß keine Hydrierung des Öles stattfindet, sondern daß lediglich leicht flüchtige Bestandteile des Öles mit Hilfe des Gasstroms abdest. werden. Dabei läßt einerseits der faulige Geruch des Öles nach, andererseits klärt sich dessen Farbe, besonders bei Verwendung von H₂, auf. Oberhalb von 340° wird das Öl zersetzt. (Chem. Metallurg. Engineering **31**. 627. 1924. Washington, Univ.)

BECKER-ROSE

A. J. Ultée, *Über Gondang-Wachs* (Cera Fici). II. *Über die sogenannte Ficercylsäure*. (I. Pharm. Weekblad **52**. 1097; C. **1915**. II. 794.) Durch Umkrystallisieren aus A. wurde der F. des Wachses auf 69,5° gebracht. Die beim Verseifen (schwierig) erhaltene Säure war nur verunreinigte *Palmitinsäure*, F. 62°, SZ. 263; (Schmelzprobe mit reiner Palmitinsäure). Synthet. aus β -Amyrin u. Palmitinsäure hergestelltes Wachs hatte F. 77°, Mischprobe mit natürlichem Wachs zeigt mittlere F. (Pharm. Weekblad **61**. 1118—20. Malang, Proefstation.)

GROSZFELD.

G. de Belsunge, *Die trocknen Seifen*. Das Verf. von L. SCHMIDT zur Gewinnung wasserfreien Glycerins u. wasserfreier Alkaliseifen (D. R. P. 376643 C. **1923**. IV. 259) wurde nachgearbeitet. Die Extraktion des Glycerins aus der trocknen verseiften Masse ließ sich am besten mit Aceton erreichen. Vor- u. Nachteile des Verf. werden besprochen. (Bulletin des Matières grasses **1924**. Nr. 3. Rev. chimie ind. **33**. 237—40. 1924.)

SÜVERN.

D. Holde, M. Selim und W. Bleyberg, *Über die quantitative Trennung der in Fetten vorkommenden festen gesättigten von den flüssigen Fettsäuren*. (Ztschr. angew. Ch. **37**. 885—87. 1924. — C. **1924**. II. 903. 1643.)

BEHRE.

Herman J. Bankston jr. und Frank C. Vilbrandt, *Einfluß verschiedener Lösungsmittel auf die Hanus-Jodzahl von Baumwollsaatöl und Cocosöl*. Exakte Vers. ergaben, daß Chlf. u. CCl₄ bei der Best. der Jodzahl nach HANUS die höchsten u. dabei konstanten Werte geben. Dabei spielt die Menge des Lösungsm. kaum eine Rolle. Ä., A. u. Bzl. eignen sich nicht so gut. (Ind. and Engin. Chem. **16**. 707—Atlanta [Ga.] u. Chapel Hill [N. C.]

GRIMME.

K. A. Williams und E. R. Bolton, *Die Erkennung gehärteter Öle*. Sie kann durch den Nachweis des Ni erfolgen, erfordert aber, da Ni nur in sehr geringen Mengen in gehärteten Ölen vorkommt, größere Mengen Fett oder Öl. Vff. verwenden deshalb den Nachweis der *Isoölsäure* dazu, die nach LEWKOWITSCH (Oils, Fats and Waxes, I. 192. 5. Ausg.) u. MOORE (Journ. Soc. Chem. Ind. **38**. T. 320; C. **1919**. III. 987) beim Härten aus Ölsäure entsteht u. nicht in der Natur vorkommt, mit Ausnahme von etwa 1% in Rindertalg (TWITCHELL Journ. Ind. and Engin. Chem. **13**. 806; C. **1921**. IV. 1041). Die Isoölsäure enthält anscheinend hauptsächlich Elaidinsäure, daneben noch gewisse andere Isomere der Ölsäure; sie ist bei gewöhnlicher Temp. ein festes Gemisch, Jodzahl 90. Eigenartig ist, daß die Isoölsäure ein in den meisten organ. Lösungsm. (z. B. Ä., A., Bzn.) fast unl. Pb-Salz bildet, wie die gesätt. Fettsäuren, während die Pb-Salze der ungesätt. Säuren mit wenigen Ausnahmen (Erucasäure u. vielleicht Elaeostearinsäure) darin l. sind. Diese Eigenschaft dient zur Erkennung u. zur Best. der Menge der Isoölsäure. Man bildet aus einigen Gramm Fett quantitativ die Pb-Salze, trennt davon die Pb-Salze der ungesätt. Säuren u. bestimmt nach Zers. der unl. Salze die Jodzahl der Fettsäuren. Enthält das Fett kein gehärtetes Fett, so wird die Jodzahl nicht größer als 5 sein (das Auswaschen der l. Pb-Salze ist nicht restlos durchzuführen); in gehärtetes Fett zugegen, so muß die Jodzahl größer sein; es berechnet sich der Gehalt an Isoölsäure aus $95/100 \times s \times (J - 5)/90$, worin bedeutet $s = \%$ der festen Säuren, $J =$ Jodzahl. Weiterhin erörtern Vff. die Trennung der festen u. fl. Fettsäuren nach den verschiedenen dafür angegebenen Verf. u. zeigen die Möglichkeit, an Hand eines Schaubildes über das Verhältnis der Jodzahlen zu dem %-Gehalt

er Fettsäuren an gesätt. Säuren, an Isoölsäure, Ölsäure u. Linolsäure annähernd e Menge des jeweils vorhandenen gehärteten Öles zu bestimmen. Ein neuerdings ageführtes ohne Unterbrechung arbeitendes Härtungsverf. (E. R. BOLTON, **E. P. 2370**, C. 1921. IV. 370) kann derart geleitet werden, daß die n. vorkommende enge Isoölsäure unverändert bleibt; der Gehalt daran kann andererseits aber auch rmindert werden. Die Genauigkeit des eben angegeben Verf. leidet natürlich runter, wenn nicht das jeweils gebrauchte Härteverf. angegeben wird; in solchem lle kann der Gehalt an gehärtetem Öle stark überschätzt werden. Der Wert s Verf. zum Nachweise der Ggw. gehärteten Öles ist davon aber unberührt. (Analyst. **49**. 460—65. 1924.)

RÜHLE.

J. Großfeld, *Verfahren zur genauen Bestimmung des Fettsäuregehaltes von Cocosseifen*. Vf. bespricht die Literatur, welche die *Best. von Fettsäuren des Cocos-Palmkernfettes* betrifft. Im Anschluß daran beschreibt Vf. ein neues Verf. Nach r früher vom Vf. beschriebenen Methode (vgl. Seifensieder-Ztg. **50**. 237; C. 1923. **957**) wird die Seife (10 g) in Ggw. von Trichloräthylen (100 ccm) durch 25%ig. Cl-Lsg. (10 ccm) zersetzt, die wss. saure Schicht durch Schütteln mit Gips be- stigt u. in 25 ccm der Fettsäurelsg. die gesamten Fettsäuren durch 2-std. Trocknen i 105—110° ermittelt. Zu dem erhaltenen Wert sind die durch Verflüchtigung rloren gegangenen Fettsäuren (im wesentlichen Caprylsäure) zu addieren. Die enge der letzteren wird aus weiteren 25 ccm der Fettsäurelsg. ermittelt. 15 bis 5 ccm des Trichloräthylens werden abgedampft u. nach Zusatz von 10 ccm A. die ttsäuren mit $\frac{1}{5}$ -n. alkoh. KOH-Lsg. titriert. Die gleiche Titration wird bei dem 20 ccm A. gel. Trockenrückstand ausgeführt. Die Differenz der Laugenmenge nöglicht die Best. der flüchtigen Säuren berechnet als Caprylsäure (1 ccm $\frac{1}{5}$ -n. OH entspricht 0,0288 g Caprylsäure). Analysen von *Palmin* zeigen, daß 97—98% r Fettsäuren bereits bei der Trockenbest. gefunden werden. (Ztschr. Dtsch. Öl- Fettind. **44**. 485—87. 499—502. 1924. Recklinghausen.)

K. LINDNER.

Severin Morgenstern, Leipzig, *Herstellung von überfetteten Seifen*, dad. gek., B man Rohwollfett in bekannter Weise im Autoklaven mittels Alkalien verseift, Seife ohne Abtrennung der Wollfettalkohole aussalzt u. den so erhaltenen fenkern bei der üblichen Herst. von Seifen aus anderen Fetten mitverwendet. — wird eine überfettete feste Seife erhalten, die einerseits einen sehr hohen ozentsatz weicher Fettsäuren enthält, u. bei deren Herst. andererseits das zu- gesetzte Wollfettpräparat nicht durch die Trennung der Wollfettsäuren von den ollfettalkoholen verschlechtert u. verteuert ist. (D. R. P. **404189** Kl. 23e vom 6. 1922, ausg. 14/10. 1924.)

OELKER.

Severin Morgenstern, Leipzig, *Behandlung von Wollfett*, dad. gek., daß das- be mittels Anwendung von W. in einem absol. geschlossenen Druckgefäß bis ra 150° binnen mehreren Stdn. erhitzt u. hierauf offen oder mittels überhitzten mpfes mit oder ohne Zuhilfenahme von Vakuum dest. wird. — Es werden hoch- ertige Wollfettprodd. erhalten. (D. R. P. **404709** Kl. 23a vom 30/7. 1922, ausg. 10. 1924.)

OELKER.

XVIII. Faser- und Spinnstoffe; Papier; Cellulose; Kunststoffe.

André Dubosc, *Die Baumwolle und ihre Selbstentzündung*. Vf. behandelt die v. der Baumwolle u. ihre Selbstentzündung durch Fermente bzw. Bakterien. v. des produits chim. **27**. 617—18. 1924.)

JUNG.

Friedr. von Höble, *Württembergische Papiergeschichte*. Beschreibung des m Papiermacherhandwerks, sowie der alten Papiermühlen im Gebiet des König-

reichs Württemberg (vgl. Wehbl. f. Papierfabr. 55. 457; C. 1924. I. 2755). (Wehbl. f. Papierfabr. 55. 2132—38. 2602—3. 1924.) SÜVERN.

E. Belani, *Das Schoopsche Rostschutzverfahren in Zellstoff- und Papierfabrik*. Nach Schilderung der zur Ausführung des Verf. dienenden App. werden die für Zellstoff- u. Papierfabriken in Betracht kommenden Anwendungsarten, das Verbleien von Bottichen, das Chromatisieren von Roststäben (Überziehen mit einer Überzug aus Al), das Metallisieren von Holzrinnen u. -bottichen, von $\text{Ca}(\text{OCl})_2$ Behältern, in der Leimküche, bei Kollergängen u. Holländern u. a. m. beschrieben (Papierfabr. 22. 689—97. 1924. Villach.) SÜVERN.

Anton D. J. Kuhn, *Mittel und Wege zur Verbilligung der Herstellungskosten in Zellstoff- und Papierfabrikation*. Angaben über Entstaubung der SO_2 -Gas-Laugenbereitungsanlagen, Einrichtung des Holzplatzes, Schnellschäler, Vorsortierung Pressen der Späne, Kochereinrichtung, Schnitzelstampfer, Stoffbüten, Feinsortierung des Stoffes, automat. Stoffauflauf, Bleichen, Wasserförderung u. -verteilung. (Zellstoff u. Papier 4. 260—62. 1924.) SÜVERN.

—, *Die Youngchild-Holländerwalze*. Das Neue an ihr ist, daß zwischen 2 Holländermesser zickzackförmige Einsätze angebracht u. mit den Messern verschweißt sind. Die Walze soll viel Kraft u. Arbeit sparen. (Zellstoff u. Papier 4. 268. 1924.) SÜVERN.

Hans Lehmann, *Über Harz und Harzleim*. Nach Angaben über die Gewinnung des Harzes wird die Herst. des Harzleims in allen Einzelheiten geschildert (Papierfabr. 22. 506—9. 1924. Robschütz, Sa.) SÜVERN.

Hans Wrede, *Die Verwendung von Lenzin in der Papierfabrikation*. Die Anwendung des CaSO_4 als Füllstoff zum Aufweißen u. seine Beurteilung ist beschrieben. (Zellstoff u. Papier 4. 258. 1924.) SÜVERN.

Paul Ernst Altmann, *Oberflächenleimung von Papier mit Agar-Agar*. Vorschritt zur Verwendung von Agar-Agar zur Oberflächenleimung von Papier. (Chem.-Zt 48. 777. 1924. Dresden-A.) JUNG.

Rudolf Lorenz, *Capillarität und Quellung bei der Papierfabrikation*. Beispiele für capillarem Vorgänge bei der Papierherst. (Wehbl. f. Papierfabr. 55. 260 bis 2664. 1924. Tharandt.) SÜVERN.

Svante Arrhenius, *Die physikalische Chemie der Cellulosefabrikation*. (Zellstoff u. Papier 4. 182—84. — C. 1924. II. 1034.) SÜVERN.

James Strachan, *Der De-Vains-Prozeß*. Gegenüber SCHACHT (Papierfabr. 2. 121; C. 1924. II. 130) wird das de Vains-Verf. verteidigt u. auf Fabriken in verschiedenen Ländern hingewiesen, die nach diesem Verf. arbeiten. (Wehbl. f. Papierfabr. 55. 2595—96. 1924.) SÜVERN.

Willi Schacht, *Der De-Vains-Prozeß*. Zu den Ausführungen STRACHANS (vgl. vorsteh. Ref.) wird bemerkt, daß die Stoffe der altbewährten klass. Zellstoffverf. u. auch die dafür in Betracht kommenden Betriebe Vorzüge gegenüber der Chlorierung aufweisen, die anerkannt werden müssen. (Wehbl. f. Papierfabr. 55. 2596—2600. 1924. Weimar.) SÜVERN.

Pradel, *Die Verbrennung von Sulfitablauge*. Das Verbrennen der Ablauge durch Einspritzen in eine Feuerung, z. B. Kohlenstaubfeuerung, das Aufbereiten der Lauge durch Eindampfen, die zeitlich u. räumlich verteilte Aufbringung an das Brennstoffbett eines Wanderrosts u. das Verdampfen an Rieselflächen durch die Abgase der mit der eingedickten Lauge betriebenen Rostfeuerungen ist beschrieben. (Papierfabr. 22. 517—19. 1924. Verein der Zellstoff- u. Papier-Chemiker u. Ingenieure.) SÜVERN.

Abel Caille, *Studie über die Herstellung von Celluloseacetaten*. Nach einem geschichtlichen Überblick wird die Acetylierung, die Hydrolyse, der Einfluß von Temp. u. der Menge H_2SO_4 in dem Acetylierungsprozeß besprochen. Verss. über

tabilisierung der Acetate ergaben, daß unter sonst gleichen Bedingungen ein Acetat um so stabiler ist, je weniger gebundene H_2SO_4 es enthält, u. daß bei demselben Gehalt an H_2SO_4 ein Acetat um so stabiler ist, je weiter die Neutralisation der H_2SO_4 getrieben ist. (Chimie et Industrie 12. 441—448. 1924. Rouen.) SÜ.

Felix Fritz, Über Selbstentzündung von flüssigen Lösungsmitteln. CS_2 entamnte sich an der Luft von selbst an einem Cu-Gefäß, das nur mit zum Sieden erbrachtem W. gefüllt war. Die Selbstentzündung beim Pressen von Linoleumblöcken, eben einzelne Platten mit einem Klebmittel aus Linoleumzement, Kolophonium u. bz. bestrichen waren, wird durch Funkenbildung infolge Reibungselektrizität oder Kompression des Gemisches aus Bzl.-Dampf u. Luft zu erklären versucht. (Farbentg. 30. 128—29. 1924.) SÜVERN.

Johannes Teicher, Prüfung des Holzschliffes. Die Prüfung auf Splitter, die kr. Unters., Mahlungsgradbest., Beurteilung der Festigkeitseigenschaften des Holzschliffs, seiner Fähigkeit, gute Glätte zu erzeugen, u. die Prüfung auf Reinheit. Trockengehalt wird besprochen. (Zellstoff u. Papier 4. 253—58. 1924.) SÜ.

Charles A. Gammal, Worcester, Mass., Bleichpulver. Chorkalk wird mit W. behandelt u. dann getrocknet. (A. P. 1510216 vom 19/2. 1924, ausg. 30/9. 1924.) KAUSCH.

Technochemia Aktiengesellschaft, Glarus, Textilfasern. Animal. Fasern werden zunächst mit großen Überschüssen der bekannten Oxydationsmittel behandelt, dann nach dem Waschen nur noch mit Lsgg. von Seifen oder l. Ölen abgekocht. (D. R. P. 97109 vom 23/4. 1921, ausg. 10/6. 1924.) KAUSCH.

Albert Veitinger, Cannstadt, Überziehen von Karton oder Pappe beliebiger Größe und Art mit gelatiniertem Papier, dad. gek., daß der Karton bzw. die Pappe auf das zum Zwecke der Gelatinierung auf einer Glastafel liegende Papier aufgeklebt wird. — Die Kartons bzw. Pappen zeigen einen vorzüglichen Hochglanz. (D. R. P. 404740 Kl. 55f vom 26/3. 1924, ausg. 20/10. 1924.) OELKER.

Gustav Pollitz, Berlin, Aufarbeiten der alkalischen Ablagen der Halbcellulose bzw. Cellulosefabrikation zwecks Wiedergewinnung des Alkalis u. Abscheidung der el. Inkrusten des Holzes durch Säuren, dad. gek., daß als Fällsäure Oxalsäure verwendet wird. — Man erhält oxalsaures Natron u. vergärbare inkrustierende Substanz. Das oxalsäure Natron wird in bekannter Weise mit Kalk in oxalsäuren alk. u. NaOH übergeführt, der erstere durch H_2SO_4 in Gips u. Oxalsäure zerlegt, die letztere wieder in den Kreislauf des Verf. eingeführt. (D. R. P. 404737 Kl. 55b vom 31/1. 1922, ausg. 20/10. 1924.) OELKER.

Carl G. Schwalbe und **Hermann Wenzl**, Eberswalde, Herstellung sehr reiner, krusten- und aschenarmer Zellstofffasern, 1. dad. gek., daß man nach beendeter Bleiche das ausgebrauchte Bleichbad durch Abschleudern entfernt u. das Bleichgut der Schleuder auswäscht. — 2. dad. gek., daß man nach Beendigung der Bleiche das ausgebrauchte Bleichbad durch Abpressen u. darauffolgendes vorsichtiges Verhängen der letzten Bleichbadreste mit Frischwasser entfernt. (D. R. P. 405004 Kl. 55b vom 29/10. 1922, ausg. 24/10. 1924.) OELKER.

Dr. Treichel G. m. b. H., Berlin, Druckfähigmachen von glatten Flächen, B. Celluloid, Elfenbein usw., dad. gek., daß man eine trüb u. papierähnlich auflehnende, mehr oder minder undurchsichtig werdende Cellulosederivatlösung aufträgt, die nach dem Bedrucken durch einen Lack von gleichem Brechungsvermögen wieder durchsichtig gemacht werden kann. (D. R. P. 405069 Kl. 15k vom 31/10. 1922, ausg. 27/10. 1924.) OELKER.

Glanzfasen-Aktiengesellschaft, Berlin und Petersdorf, Rsgb., Herstellung eines wolleartigen Gespinnstes aus Viscoselösungen nach D. R. P. 389394, darin bestehend, daß bei der Herst. der Viscoselsgg. reduzierende Körper wie Kohlenhydrate oder

mehrwertige Alkohole verwendet werden. (D. R. P. 405002 Kl. 29b vom 16/8 1918, ausg. 27/10. 1924. Zus. zu D. R. P. 389394; C. 1924. I. 1464.) KAUSCH.

Fr. Küttner, Pirna, Elbe, *Verfahren und Vorrichtung zum Auswaschen von an Spulen aufgewickelter Viscosekunstseide*. Verf., dad. gek., daß man die Spulen bis zur Säurefreiheit zunächst mit kaltem W. u. dann bis zur CS₂-Freiheit mit 60—70 h. W. behandelt. — Vorr., dad. gek., daß Bottiche, in welche auf Rahmen aufgesteckte, mit Viscosekunstseide bewickelte Spulen eingelegt sind, kreisförmig geschaltet sind, in den am meisten ausgewaschenen Spulen enthaltenden Bottiche W. von 60—70° fließt u. dieses im Gegenstrom weiter getrocknet wird. (D. R. P. 404404 Kl. 29a vom 28/12. 1921, ausg. 17/10. 1924.) KAUSCH.

Emile Bronnert, Mülhausen, Frankr., *Kunstseide aus Viscose*. Das Spinnbad wird mit H₂SO₄ versetzt u. Celluloseprodd. durch Hydrolyse darin gelöst. (Can. P. 236819 vom 27/3. 1922, ausg. 8/1. 1924.) KAUSCH.

Glanzfasen A.-G., Berlin und Petersdorf i. Riesengebirge, *Erzeugung künstlicher sehr feiner Fäden aus Celluloselösungen*. (D. R. P. 405443 Kl. 29b vom 23/7. 1918, ausg. 31/10. 1924. — C. 1921. IV. 1113 [F. P. 5184 I.]) KAUSCH.

Michel de Roiboul, Paris, *Herstellung künstlicher mineralischer Fäden aus Kieselsäure, Tonerde oder anderen schwer schmelzbaren Stoffen*. (D. R. P. 40244 Kl. 32a vom 31/8. 1920, ausg. 22/9. 1924. F. Prior. 16/6. 1920. — C. 1921. IV. 209.) KÜHLING.

XIX. Brennstoffe; Teerdestillation; Beleuchtung; Heizung

O. P. Hood, *Lignit, ein Zukunftsbrennstoff?* Vf. hält die Ausnutzung der Lignitevorkommen als Brennstoff zur Zeit noch nicht für rentabel. (Journ. Ind. and Engin. Chem. 16. 1020. 1924. Washington [D. C.]) GRIMME.

K. Bunte und **W. Fitz**, *Über die Ursachen der verschiedenen Reaktionsfähigkeit der Kokse*. Vff. untersuchten den Einfluß des Ausgasungsgrades u. der Feinheit der Auflösung der Kokssubstanz auf die Reaktionsfähigkeit verschiedener Koksorten, unter Verwendung des Zündpunktes, bestimmt nach BUNTE u. KÖLME (Gas- u. Wasserfach 65. 592—94; C. 1922. IV. 966) als Maß der Reaktionsfähigkeit. Für einen bei 550.—650° aus Gasflammkohle der Ruhrzeche Baldur hergestelltem Halbkoks ergab sich vor u. nach der Erhitzung im N-Strome auf 1100 (60 Min.):

Korngröße des Kokes	0,5—1 mm	1—3 mm	3—5 mm
Zündpunkt des Halbkokes	328°	350°	397°
Zündpunkt des nacherhitzten Kokes	483°	502°	532°

Der Zündpunkt von Zechenkoks dagegen liegt bei ca. 600°. Die Veränderung der Koksstruktur wird durch das starke Ansteigen der D. von 1,493 auf 1,787 der Härte von knapp 3 auf über 4 der Moßschen Skala angezeigt.

Das Verhältnis Masse : Oberfläche d. h. Feinheit der Auflösung der Kokssubstanz maßen Vff. an der Adsorptionsfähigkeit gewisser Koksgewichte gegen CO resp. H₂. Die abgewogene Koksmenge wurde in einem Kolben von bekanntem Raumgehalt durch mehrstd. Abpumpen im absol. Vakuum bei der Temp. des sd. (444,5°) gasfrei gemacht, auf 0° gekühlt u. mit einem Recipienten von genau bekanntem Inhalt verbunden, der das zu prüfende Gas bei bekanntem Druck u. Temp. enthielt. Ein Barometer zeigte nach Eintritt des Gleichgewichts den Enddruck an, woraus die adsorbierte Gasmenge folgte. Die Kurven zeigen einen Zusammenhang des Zündpunktes mit der relativen Porenfläche; die weniger erhitzten Koksproben, die weniger verdichtet sind, adsorbieren auch mehr Gas.

Im Zusammenhange mit den Veränderungen von spez. Gew. u. Härte läßt sich schließen, daß die Koksstruktur schon bei der Entstehungstemp. des Halbkokes in wesentlichen festgelegt wird. u. daß weitere Erhitzung besonders eine Verdichtung

urch Schwinden des Kokes bewirkt. — Das Verhältnis der Adsorption von CO₂ H ist nicht für alle Kokssorten gleich, vielmehr nehmen die stark CO₂ adsorbierenden Koke bei weitem nicht so viel H auf. Vff. schließen, daß das leichter diffundierende Gas (H) auch in dichten Koks fast ebenso stark eindringen kann, als in weniger dichten, d. h. für das schwere CO₂ überwiegt bei Zechenkoks die Adsorption, für den leicht diffundierenden H die Diffusion. Auch ist die Kurve für das Verhältnis H-Adsorption : Zündpunkt geradlinig, weil wirklich die Koksstruktur maßgebend wird, bei der CO₂-Adsorption überwiegt die Sorption, d. h. die Verdichtung des Gases auf der äußeren Oberfläche u. in den aufgeschlossenen Zellen. (Gas- u. Wasserfach 67. 241—43. 1924.) BÖRNSTEIN.

Otto Pfeiffer, *Der Wassergehalt im Teer*. Der für den Verkauf unzulässige Wassergehalt des Gasteeres findet sich besonders in den oberen Schichten des Teerbehälterinhalts zugleich mit der Anhäufung niedriger sd. Öle u. „freien“ Kohlenstoffs. Vielleicht ist letzterer die Ursache für die emulsionsartige Bindung des W. (Gas- u. Wasserfach 67. 521—23. 1924. Magdeburg.) BÖRNSTEIN.

Fr. Messinger, *Neuer Temperaturregler für gasbeheizte Feuerstätten*. Beschreibung des „Meta“-Gasreglers der Fa. LORENZ Apparatebau Berlin. (Wasser u. Gas 15. 29—35. 1924. Charlottenburg.) PFLÜCKE.

L. Rodde, *Dickteer und Vorlagenpech*. Die Bildung von Dickteer u. Vorlagenpech, lästiger Nebenprod. des Gasbetriebes, wird verringert durch Einhaltung von 40° nicht überschreitenden Temp. in Retorten, Steigrohren u. Vorlagen; ihre Festsetzung in Steigrohr u. Vorlagen bekämpft man durch Erzeugung eines Nebels von H₂-W. in denselben. Verwendet werden sie einstweilen am vorteilhaftesten durch Verbrennung in den Retorten oder unter den Kesseln. (Wasser u. Gas 15. 53—57. 1924. Angsburg.) BÖRNSTEIN.

Karl Stumpf, *Das Paraffinöl als Waschmittel für die Benzolgewinnung aus dem Gase*. Bei Verwendung eines Paraffinöls vom Kp. 280—400°, D. 0,93 u. Sdpunkt —4° zur Benzolwäsche wurde 10,6% mehr Vorprod. gewonnen als mit Petroleumöl u. aus dem Vorprod. um 5% mehr Des illat; beide enthielten nur Spuren von sauren u. bas. Verbb. u. fast keine verharzenden Stoffe. Das Öl verdickt sich nicht, setzt aber mit NH₃, H₂S u. W. feste Körper unbekannter Natur ab. (Gas- u. Wasserfach 67. 515—17. 1924. Karlsruhe.) BÖRNSTEIN.

F. Frank, *Über Braunkohlenteer*. IV. F. Vollmer, *Beiträge zur Kenntnis der basischen Bestandteile des Braunkohlenteers*. (I.—III. vgl. Ztschr. f. angew. Chem. 1912. 141. 153. 163; C. 1923. II. 972. 1124. IV. 510.) Zur Gewinnung der Basen wurde der Teer mit Säuren behandelt u. die aus den sauren Lsgg. mittels Alkali in Freiheit gesetzten Basen fraktioniert dest. Die einzelnen Fraktionen wurden in HgCl₂-Doppelsalze übergeführt u. durch mehrfache, fraktionierte Krystallisation gereinigt. Die Fraktion 160—170° lieferte die bereits von IHLDER (Ztschr. f. angew. Chem. 17. 524, 1670) gefundenen Basen: β - u. γ -Picolin, α,γ - u. α,β' -Lutidin u. das Kollidin. Aus der Fraktion 250—255° wurden nach Entfernung der Anilinbasen Pikrate isoliert: Chinolin, Isochinolin, ein Monomethylchinolin, drei isomere Dimethylchinoline u. ein Trimethylchinolin. Die höheren Fraktionen lieferten wesentlich Chinolin, der Destillationsrückstand ein Monomethylchinolin, das ebenfalls als Pikrat erhalten wurde. Der verwendete Teer war ein Schwelteer der Riebeckischen Anthranwerke. (Braunkohle 23. 505—10. 1924. Berlin, Techn. Hochschule, Inst. f. Braunkohlen- u. Mineralölforschg.) BIELENBERG.

Wilh. Franckenstein, *Untersuchung und Aufarbeitung von Braunkohlenteeren*. I. berichtet über die Unters. von Braunkohlenteer, die sich erstreckt auf: 1. physikal. u. chem. Konstanten des Rohteers; 2. Zerstörung der Emulsionen, gegebenenfalls Filtration u. Entwässerung des Rohteers; 3. physikal. u. chem. Konstanten des gereinigten Teers; 4. Dest. in die einzelnen Bestandteile ent-

sprechend dem Großbetriebe einmal durch Vakuumdest., zweitens durch Dest. n. Wasserdampf. — Bei der Behebung der Emulsion mit NaHSO₄ nach dem Verf. d. BAS wurde festgestellt, daß ein Teil der labileren KW-stoffe abgebaut wird (Ztschr. f. angew. Ch. 37. 878—82. 1924. Bochum.)

JUNG.

Georg Stadnikoff und **Erwin Iwanowsky**, *Die Koagulierung von Hydrot mit Gips und ihr Einfluß auf die Entwässerungsgeschwindigkeit und den Zustand d. Trockenfelder.* (Vgl. Neftjanoe i slancevoe Chozjajstvo 5. 277; C. 1924. I. 255.) Die nach dem Abspritzverfahren aus dem Torfmoore gewonnene Hydromasse n. 95,5% W. wurde, mit Gipslg. koaguliert oder nicht, durch eine Schicht feste Torfes (aus 0,75 Meter Tiefe) filtriert. Auf 2125 g Hydromasse nahm man 375 cc Gipslg. Die Filtration der koagulierten Hydromasse erfolgt bedeutend schneller vor allem aber wird die Durchlässigkeit des Torfs nicht aufgehoben, was bei Filtration der nichtkoagulierten Hydromasse, die die Poren des Torffilters verstopft, der Fall ist. Die vorhin zur Filtration der koagulierten Hydromasse benutzte Torfschicht läßt auch das W. aus der nichtkoagulierten Hydromasse leichter durch; der zur Filtration der nichtkoagulierten Masse verwendete Torf wird auch für die koagulierte schwer durchlässig. — In der Praxis bedeutet die Anwendung der Gipskoagulation eine ca. 10tägige Verkürzung der Trocknungszeit der Hydromasse. (Kolloid-Ztschr. 3. 174—78. 1924. Moskau, KARPOW-Inst.)

BIKERMAN.

H. M. Mulany und **E. R. Watson**, *Aromatische Kohlenwasserstoffe im Birmenpetroleum.* Die Kerosinfraktion von Birmapetroleum wurde fraktioniert dest. u. an den Destillaten nach der Methode von ARMSTRONG (Journ. Chem. Soc. London 4. 148 [1884]) die aromat. KW-stoffe isoliert; analog wurde mit der Petroleumfraktion verfahren. Die einzelnen Fraktionen wurden nitriert, sulfoniert oder oxydiert; durch diese Rkk. ermittelten Verbb. waren folgende: Bzl. im Petroleum u. d. niedrigst sd. Kerosinfraktion. Toluol bildet mehr als 7% des Petroleums u. ist d. am reichlichsten vorkommende aromat. KW-stoff. In den höheren Petroleum- u. den niedrigeren Kerosinfraktionen findet man alle 3 isomeren Xylole; o- u. p-Xylol bilden ca. 2% des Petroleums, m-Xylol ca. 1,1% des Kerosins. Der aromat. Hauptbestandteil des Kerosins ist p-Cymol, es beträgt 20% aller aromat. Verbb. u. ca. 2% des Kerosins. Die höheren Kerosinfraktionen (220—260°) bestehen hauptsächlich aus β -Isocamyl-naphthalin; 10% der aromat. Verbb. bestehen aus diesem KW-stoff, der 1% des Kerosins beträgt. Mesitylen u. Cumol wurden in den höheren Petroleum- u. den niedrigeren Kerosinfraktionen in geringer Menge gleichfalls gefunden. (Journ. Soc. Chem. Ind. 43. T. 310—13. 1924. Cawnpore, Gov. Techn. Inst.) HABERLAND.

S. S. Nametkin, **N. D. Zelinski** und seine *die Erforschung des kaukasischen Erdöls betreffenden Arbeiten.* Anlässlich des 40jährigen Jubiläums der wissenschaftlichen Tätigkeit ZELINSKIS werden seine Arbeiten, namentlich die sich auf das Erdöl beziehenden (vgl. ZELINSKI, MAKSOROW u. BORISSOW, Neftjanoe i slancevoe Chozjajstvo 6. 274; C. 1924. II. 2566) gewürdigt. (Neftjanoe i slancevoe Chozjajstvo 95—104. 1924.)

BIKERMAN.

B. G. Tytschinin, *Erdöl als Grundstoff für die chemische Industrie.* Die komplizierte Zus. des Erdöls u. die Schwierigkeit, seine Bestandteile zu isolieren macht es wenig geeignet für feinere chem. Industrie, die einheitlicher Stoffe bedarf (Neftjanoe i slancevoe Chozjajstvo 7. 105—15. 1924. Moskau, KARPOW-Inst.) BIKERMAN.

T. A. Boyd, *Die Petroleumkrackverfahren und zukünftige Produktionsprobleme.* Sammelbericht über das Wesen u. die Ausführung des Krackverf. (Journ. Ind. and Engin. Chem. 16. 1004—6. 1924. Dayton [Ohio].)

GRIMME.

A. Demtschenko und **A. Woronow**, *Über die Herstellung des medizinischen Vaseline aus dem technischen Vaseline und paraffinhaltigen Masut.* Das techn. Vaseline oder der Masut wird in Bzn. gel., mit Kohle (am besten bewährte sich die nach ZELINSKI aktivierte Holzkohle) geschüttelt, abgegossen u. fraktioniert. Das Verf. ist

niger als die Filtration durch Kohle. Die Kohle kann auch durch *Tonerde* (aus Nord-Kaukasus) ersetzt werden, was das Prod. noch verbilligen wird. (Neftjanoe i sneevoe Chozjajstvo **7**. 116—19. 1924. Grosnyi, „Grosnephth.“) BIKERMAN.

N. E. Funk, *Turbinenschmierung*. Bei der Schmierung von Turbinen wirkt das verwendete Öl als Schmiermittel, als einhüllende Fl. mit als Wärmeverteiler. Es muß unempfindlich sein gegen Hitze u. darf sich nicht mit Luft u. W. mischen. Außerdem soll es einheitlich sein. Die sich hieraus ableitenden Wrkgg. sind an Beispielen erläutert. (Journ. Ind. and Engin. Chem. **16**. 1080—84. 1924. Philadelphia [Pa.]) GRIMME.

L. F. Hawley, L. C. Fleck und C. A. Richards, *Die Beziehung zwischen der Haltbarkeit und chemischen Zusammensetzung von Holz*. Die Haltbarkeit von Holz ruht auf dem Gehalte gewisser Verbb., wie Gerbstoffe, Harze etc., welche gegenüber Pilzen, welche die Holzzerst. begünstigen, tox. wirken. Je höher also die Toxizität, desto höher die Haltbarkeit. Vf. stellen ihren Prüfungen mit Auszügen aus k. u. h. W. gegenüber *Fomes annosus* an, welcher der widerstandsfähigste, holzzerstörende Pilz ist. Die Resultate der Verss. mit den verschiedensten Hölzern sind tabellarisch mitgeteilt. (Ind. and Engin. Chem. **16**. 699—700. 1924. Madison Wis.) GRIMME.

W. H. Kobbé, *Neue Verwendung von Schwefel in der Technik*. Schwefel kann ein Vorteil zur Verbesserung von *Beton* u. *Sandstein*, zur *Imprägnierung* von *Fasermaterial* u. zur *Konservierung* von *Holz* verwendet werden. (Ind. and Engin. Chem. **16**. 1026—28. New York [N. Y.]) GRIMME.

Felice Garelli, *Nationales Preisausschreiben für einen Betriebsstoff mittels Alkohol*. Die Ergebnisse eines Preisausschreibens, Bzn. durch ein anderes Betriebsmittel zu ersetzen werden gebracht. Es handelt sich um Gemische von A. (40 bis 90%) mit Bzn., Bzl, Öl, Tetralin oder Naphthalin unter Zusatz von etwas Ä. zum Zwecke der guten Mischbarkeit. Die Verss. mit solchen Betriebsmitteln haben für alle Arten von Motoren gute Ergebnisse gezeitigt. (Giorn. di Chim. ind. ed appl. **43**. 435—37. 1924.) GOTTFRIED.

G. Foth, *Das Verhältnis von Weingeist und Benzol im Motorspiritus*. Vf. betont, daß es zur Vermeidung von Mißverständnissen nötig ist, daß bei allen Beteiligten über eine Reihe naheverwandter Begriffe (wie Weingeist-Branntweinspiritus-Sprit) völlige Klarheit herrsche, daß bei den Angaben über das Mischungsverhältnis Einheitlichkeit obwalte, u. daß die Mischung der Bestandteile innig folgte. An einigen Beispielen werden die aufgestellten Anforderungen näher erläutert. (Ztschr. f. Spiritusindustrie **47**. 259—62. 1924.) RÜHLE.

Wulf, *Fuller-Kohlenstaubfeuerung und Staubtransport*. Die Erzeugung von Kohlenstaub mit der Fullermühle. Der Transport des Staubes durch die pneumat. Pumpe. Die Fuller-Staubfeuerung beim Kesselbetrieb u. den Brennapp. der Zementfabriken. (Zement **13**. 434—37. 447—50. 489—90. 502—5. 1924. Hamburg.) WECKE.

F. Schulte, *Der Verbrennungsvorgang bei der Kohlenstaubfeuerung*. Bespricht die für Zündung u. Verbrennung der verschiedenen, für Kohlenstaubfeuerung verwendeten, Brennstoffe in Betracht kommenden Verh. u. die sich daraus ergebenden Gesichtspunkte, die für eine gute Feuerführung maßgebend sind. (Glückauf **60**. 71—78. 1924. Essen.) BÖRNSTEIN.

Kurt Schaefer, *Ein automatischer Wasserbestimmungsapparat für die Untersuchung von Kohle, Teer und Öl*. Der App. (Abbildung im Original, Lieferant Dr. H. GÖCKEL, Berlin NW 6, Luisenstr. 21) ermöglicht die Verwendung verschiedener Auffanggefäße, so daß je nach Größe die Best. von Materialien mit kleinem oder größerem W.-Gehalt vorgenommen werden kann. (Chem.-Ztg. **48**. 761. 1924.) J.

Kausch, *Die Behandlung von Kohlendestillationsgasen u. dgl. mittels Kohle*. Patentliteratur. (Wasser u. Gas 15. 19—23. 1924. Berlin.) PFLÜCKE.

H. Jentzsch, *Über Selbstentzündung von Ölen und Brennstoffen*. Vf. prüfte die Temp. der Selbstentzündung verschiedener Schmier-, Heiz- u. Treiböle in einen elektr. geheizten Zündklotz, in dessen Bohrung O den Proben blasenweise zugeführt wurde. Zur Kennzeichnung der Selbstentzündlichkeit benutzt er den „Zündwert“, den er durch Division der Temperaturzahl der Zündung durch die Zahl der z. ihrer Herbeiführung erforderlichen O-Blasen pro Minute errechnet. Dieser Wert steht in keiner Beziehung zum Flammpunkt eines Öles, z. B. entzündet ein Bzl vom Flammpunkt -10° sich erst bei 490° u. 115 Blasen (Zündwert 4,26), ein Heißdampfzylinderöl vom Flammpunkt 243° bereits bei 244° u. 64 Blasen (Zündwert 3,81). Die Kraft der, in engen u. geschlossenen Räumen bei einigen Ölen sehr heftigen Explosion wird noch gesteigert, wenn das Öl die Gefäßwände in dünner Schicht bedeckt, also dem O eine bessere Einw. ermöglicht. Für bestimmte Temperaturgrenzen läßt sich ein oberer u. unterer Zündwert berechnen u. diese können als Grundlage von Vorschriften für die Beschaffung u. Verwendung von Brennstoffen u. Ölen dienen. (Ztschr. Ver. Dtsch. Ing. 68. 1150—52. 1924. Wilhelmshaven.) BÖRN

Metallbank und metallurgische Gesellschaft Akt.-Ges., Frankfurt a. M. *Teilweise Verbrennung von Gasen*. Beim Aufheizen von Gasen mittels einer in einen Gasstrom hineinbrennenden Heizflamme wird unterhalb des Gasstroms selbst ein Teil des Gases getrennt geführt u. dabei zur Verbrennung gebracht. Zur Durchführung dieses Verf. wird eine Einrichtung benutzt, bei der in eine Gasleitung ein rohrförmiger Hohlkörper eingesetzt ist, in den die Zuleitung für die Verbrennungsluft mündet. (D. R. P. 402415 Kl. 10a vom 24/5. 1923, ausg. 17/9. 1924.) OELKER.

Wilhelm Neu, Zweibrücken, *Wassergaserzeuger mit darüberliegendem, von den Warmblasegasen beheiztem Dampfessel*, 1. dad. gek., daß der Verbrennungsraum der Warmblasegase unmittelbar über der Gaserzeugerfüllung liegt u. daß die Abgaseschaltvorrichtung hinter den Kesselzügen angeordnet ist. — Die Eigenwärme der Generatorgase geht nicht verloren; Betriebsstörungen durch zu starkes Erhitzen der Abgaseschaltvorr. werden vermieden u. die Eigenwärme des h. Wassergases u. des unzersetzten Dampfes beim Gasen von unten werden zur Dampferzeugung ausgenutzt. (D. R. P. 403553 Kl. 24e vom 18/10. 1919, ausg. 1/10. 1924.) OELKER.

Raymond Vidal, Seine, Frankreich, *Lösen von schweren Kohlenwasserstoffen*. Man setzt den Gemischen von schweren u. leichten KW-stoffen OH-Verbb. der aliphat. oder hydroaromat. Reihe zu, wie Terpeneol, Cyclohexanole, Butylalkohole usw. Die Fl. dient als Motortreibmittel s. F. P. 26783 u. 26784, C. 1924. II. 2309. (F. P. 26785 vom 16/9. 1921, ausg. 15/3. 1924. Zus. zu F. P. 560909; C. 1924. I. 606.) FR

XXI. Leder; Gerbstoffe.

John Don und **L. G. Pringle**, *Die Adsorption von Hydroxylyon durch an der Sonne getrocknete Haut*. Die in den Tropen an der Sonne getrockneten Häute müssen vor der Verarbeitung zu Leder wieder aufgeweicht werden, ohne daß hierbei zu viel Hautsubstanz verloren geht. Das gelingt viel besser mit einer Lsg. von Na_2S als mit einer solchen von NaOH mit gleichem Gehalt an Hydroxyd. Anscheinend wird das Keratin durch H_2S etwas durchlässiger. — Eine Adsorption von S aus Na_2S findet durch Hautpulver nicht statt. (Kolloid-Ztschr. 35. 162—63. 1924. Glasgow.) LIESEGANG.

V. Casaburi, *Die Syntannine oder syntetischen Tannine bei der Sohlengerbung*. Vf. berichtet über die verschiedenen Gerbmethode u. über die Verwendung der Syntannine bei der Sohlengerbung. (Bollet. Industria delle Pelli 2. 161—67. 1924.) GOTTFRIED.

Fr. Kirchdorfer, Lederappreturen. Es werden 3 Arten von Appreturen unterschieden: die Schutzappretur, die verhindert, daß Glanz, Narbung u. Färbung beim Lägern verloren geht, die Fabrik- oder Werkstattappretur, sogenannte Dressing, die den Fertigwaren gegeben wird u. die für die Verbraucher bestimmte Lederpolitur oder -politur. Vorschriften für die einzelnen Appreturen, besonders solche für Leder ohne Schellack, mit Copal u. Casein. (Farben-Ztg. **29**. 1944—46. 1997—99. 124.)

SÜVERN.

Lloyd Balderston, Chromleder für Riemen. Die möglichen Ursachen, warum manche schwere Chromleder sich in bezug auf Haltbarkeit u. geringe Streckung im Gebrauch so gut wie Eichenriemen verhalten, andere Chromlederriemen völlig versagen, werden diskutiert. Eine Unters. von Chromleder, bei dem das Verhältnis von $\text{Cr}_2\text{O}_3:\text{SO}_3$ in der Gerbbrühe von 0,75—1,10 variiert, zeigt daß die Basizität auf die Reißfestigkeit keinen Einfluß hat. Allerdings wurde diese Unters. nicht auf längere Zeit gelagertes Leder ausgedehnt. Der hohe Reibungskoeffizient mancher Chromleder gegen Stahl (stählerne Riemenscheiben), der wohl seine Ursache in den entarteten Narben hat, wird als besonders wertvoll für die Erreichung großer Wirkungseffekte bei der Kraftübertragung hervorgehoben. (Journ. Amer. Leather Chem. Assoc. **19**. 521—27. 1924.)

GERNGROSS.

E. Depasse, Neue Ergebnisse mit Gerbextrakten. Bericht über prakt. Fabrikrichtungen. (Chimie et Industrie **1924**. Mai-Sondernummer. 584—94.) GRIMME.

Di Hill und Merryman, Mitteilung über synthetische Gerbstoffe. Bericht über synthet. Gerbstoffe im allgemeinen u. ihre Anwendung zur Gerbung von Oberleder, Riemenleder u. Sohlleder im besonderen. (Bollet. Industria delle Pelli **2**. 191—34. 1924.)

GRIMME.

St. Ljubowski, Lederfette und Lederöle. Bericht. (Seifensieder-Ztg. **51**. 453—454. 471—72. 487. 507—8. 525—26. 1924.)

PFLÜCKE.

L. E. Stacy, Bestimmung von freier Schwefelsäure in vegetabilisch gegerbtem Leder. 1923—1924 Kommissionsbericht. Kritik der üblichen Procter-Searlschen Methode, welche vorhandenen freien oder organ. gebundenen S als freie H_2SO_4 zeigt, u. deren Ergebnisse von der individuellen Art der Durchführung der Analyse weitgehend abhängig ist. Mitteilung u. Diskussion der Resultate der Kommissionsweisen Unters. über die von KOHN u. CREDE (Journ. Amer. Leather Chem. Assoc. **18**. 189; C. **1923**. IV. 269) vorgeschlagene elektrometr. Titration der saurengesättigten Flüssigkeit von 4,9 g gemahlenem Leder mit 100 ccm W. mit $\frac{1}{10}$ -n. NaOH. Die Vergleichsverss. ergeben, daß man mit diesem Verf. die freie, experimentell zugesetzte Säure wohl quantitativ bestimmen kann. Die Schwierigkeit ist aber die Standardisierung des pH , bis zu dem titriert werden soll u. die Festlegung der optimal- pH -Zahl, bis zu der die Säure als harmlos zu bezeichnen ist, da der „natürliche pH “ der verwandten reinen Gerbbrühen u. somit der mit ihnen erhaltenen Leder variiert. So haben Protokatechu-Gerbstoffbrühen pH 4 bis 5, Pyrogallol-Gerbstoffbrühen pH 3,25 bis 3,75. Der pH 3 als „Neutralpunkt“ des einwandfreien Leders, der erwogen wurde, wird als zu tief im sauren Gebiet liegend, die ganze vorgeschlagene Methode als wichtig, aber als noch nicht fertig ausgebildet bezeichnet. (Journ. Amer. Leather Chem. Assoc. **19**. 506—20. 1924.) GERNGROSS.

XXII. Leim; Gelatine; Klebmittel usw.

Hermann Stadlinger, Neue Wege in der Leim- und Gelatineindustrie. Beschreibung des von der A.-G. f. chem. Produkte vorm. H. SCHEIDEMANDEL, Berlin ausgearbeiteten „Gelatine und Leimperlen“-Verf., bei welchem die Brühen durch feine Lösungen in ein gekühltes, fl. oder gasförmiges Medium eintreten u. sich in Gestalt perlenförmiger Rotationskörper absetzen. Außer Abkürzung u. Ermöglichung der Fabrikation in heißen Gegenden hat das Verf. den Vorteil, daß die Verpackung

u. Dosierung der nach ihm erzeugten Leimperlen leichter ist als die der Leimtafel u. daß die Quelldauer vor dem Gebrauch außerordentlich abgekürzt werden kann (Farben-Ztg. **29**. 1427. 1924; Kunststoffe **14**. 97—98; Kolloid-Ztschr. **34**. 349 b 351. Berlin.)

GERNGROSS.

—, *Holzporenfüller und Holzkitte*. Verschiedene Vorschriften. (Farbe u. Lack **1924**. 434.)

SÜVERN.

Felix Fritz, *Kitte und Klebmittel aus Linosyn*. Die Herst. von Tücher-Trommellinosyn ist beschrieben. (Farben-Ztg. **29**. 1961—62. 2011—13. 1924. Berlin.)

SÜVERN.

W. R. Atkin und G. W. Douglas, *Die Titrationskurve von Gelatine*. I. Teil. Es wurde eine durch Waschen mit schwach saurem W. gereinigte, nur 0,02% Asche enthaltende Gelatine, die p_H 4,87 zeigte u. in 1%iger Lsg. beim Stehen sich trübte u. ausflockte, verwendet u. die Titrationskurve von p_H 1 bis p_H 13 aufgezeichnet. Bei p_H 1,7, woselbst totale Neutralisationen der NH_2 -Gruppen erfolgt, ist 1 g Gelatine 8,74 ccm. $\frac{1}{10}$ -n. HCl äquivalent, d. h. ihr Äquivalentgewicht beträgt 1180, was sehr gut mit dem Befund von HITCHCOCK (Journ. Gen. Physiol. **4**. 733; C. **1922**. I. 100) übereinstimmt, der mit Leitfähigkeitstiteration 1160 u. mit der H-Elektrode 1095 fand. Auf der bas. Seite der Titrationskurve, zwischen p_H 4,7 u. 7,7, welche die Neutralisation der freien Carboxylgruppen vorstellt, entspricht 1 g Gelatine 3,04 ccm. $\frac{1}{10}$ -n. NaOH, was ein Äquivalentgewicht für die freien COOH-Gruppen vom 329 bedeutet. In einem Anhang wird die Beobachtung WILSONS (Ind. and Engin. Chem. **15**. 71; C. **1923**. IV. 70; Journ. Americ. Chem. Soc. **44**. 2633; C. **1923**. I. 457) daß ein 2. Quellungsminimum bei p_H 7,7 u. damit ein 2. isoelekt. Punkt existiert kritisiert. Das Quellungsminimum ist nur vorgetäuscht durch die Wrkg. wachsende Mengen von Na-Phosphat, das bei steigendem Zusatz von NaOH zu dem von WILSON verwendeten Phosphatpuffer entsteht u. welches trotz wachsendem p_H einen Rückgang der Alkaliquellung hervorruft. (Journ. Amer. Leather Chem. Assoc. **19**. 528—41. 1924.)

GERNGROSS.

S. E. Sheppard und F. A. Elliott, *Ein Instrument zur Messung der Quellung von Gelatine auf fester Unterlage*. Die Vorr. besteht aus einem Wagebalken, dessen ein Ende mit einem Mikrometer verbunden ist, während auf dem anderen Ende ein Quarzfaden herabhängt, der mit einem Fuß auf die zu untersuchende Gelatineschicht die sich in einem doppelwandigen mit W. von bestimmter Temp. durchflossene Gefäß befindet, auftrifft. Durch Quellung der Gelatine wird das Gleichgewicht verschoben u. die Größe der Quellung kann mittels des Mikrometers bestimmt werden. (Journ. Franklin Inst. **198**. 559. 1924. Eastman Kodak Comp.)

HABERLAND.

F. L. de Beukelaer, J. R. Powell und E. F. Bahlmann, *Standardmethode für die Bestimmung von Viscosität und Gallertfestigkeit von Leim*. Eingehende Beschreibung der von der amerikan. „National Association of Glue Manufacturers“ angenommenen Standardmethoden, -Gefäße u. -App. für obige Zwecke. 120 g 12%ige Leimlsgg. werden durch Quellenlassen über Nacht des möglichst gut zerkleinerte Leimes mit der entsprechenden Menge dest. W. von 10—15° in einem Standardgefäß, das auch für die Gallertfestigkeitsbest. benutzt wird (dickwandige, weithalsige Flasche von 150 ccm Inhalt, 49 mm innerer, 66 mm äußerer Weite, 85 mm Höhe) allmähliches, höchstens 15' währendes Erwärmen auf 62° in einem Wasserbad von höchstens 70° bereitet. Während des Erhitzens wird die mit einem Gummistopfen verschlossene Flasche gedreht, um Mischung zu erreichen; starkes Schütteln vermindert die Viscosität. Die Lsg. wird in die Bloomschen Viscosimeterpipette (Figur im Original), einer einfachen Glaspipette mit Trichter, deren Auslaufcapillar mit dem Finger verschlossen wird, eingefüllt. Die Pipette befindet sich in einer mit Heizdraht erwärmten Glasheizmantel, der statt Boden einen dreifach durchbohrten Gummistopfen hat, durch den außer dem Ausflußrohr der Pipette, ein Aus-

Röhrchen für das Heizwasser u. ein Röhrchen für das Einblasen für Luft zwecks Bewegung des Wassers im Thermostaten gesteckt ist. Die Durchlaufzeit von ca. 100 ccm Lsg. zwischen 2 Marken wird bei 60,0° (0,1 geteiltes Thermometer) mit einer in $\frac{1}{5}$ geteilten Stoppuhr gemessen u. in $\frac{1}{1000}$ -Gewichten, die nach einer Formel berechnet werden, ausgedrückt. Die Leimhandelssorten schwanken zwischen ca. 165 $\frac{1}{1000}$ -Gewichten. Die ausgelaufene Lsg. wird zwecks Best. der Gallertfestigkeit mit dem Bloomschen Gelometer (Figur im Original) in dem oben beschriebenen Standardgefäß aufgefangen, auf ca. 45° an der Luft abkühlen gelassen u. 6—18 Stdn. im Thermostaten bei 10° aufbewahrt. Die Messung erfolgt durch Best. des nötigen Gewichtes, um einen zylindrischen Stempel von 12,7 mm Durchmesser 4 mm tief in die Gallerte zu drücken. Die Belastung beträgt innerhalb 200 g u. wird automat. geregelt. Große Bedeutung hat für die Best. die Gewandigkeit der Belastung, die Größe des Standardgefäßes, die Oberfläche der Gallerte, die schaumfrei, horizontal u. glatt sein muß. Rasches Abkühlen auf 10° bewirkt Erhöhung der Gallertfestigkeit. Die Vff. bestätigen die Verss. von DAVIS u. DAKS (Journ. Ind. and Engin. Chem. 14. 706; C. 1922. I. 1201), demzufolge die Gallertfestigkeit bei p_H 8 ein Maximum u. dann Abfall mit fallendem p_H zeigt. (Ind. and Engin. Chem. 16. 310—15. 1924. Atlantic City [N. J.]) GERNGROSS.

H. Wislicenus und Rudolf Lorenz, *Über kolloidchemische Wertbestimmung der Leimstoffe*. (Vgl. F. LORENZ, Papierfabr. 21. 105, C. 1923. II. 1000.) Ablehnung der Einwände KIRCHHOFFS (Papierfabr. 21. 529; C. 1924. I. 1473) gegen die Leimprüfung durch Adsorptionsanalyse mit *Fasertonerde*. Es wird an stufenweise durch Erhitzung mit W. abgebauter Gelatine gezeigt, daß mit wachsendem Abbau die Adsorption an die Fasertonerde regelmäßig abnimmt. Die Adsorptionszahlen gehen parallel mit den Viscositätswerten, doch sind sie zuverlässiger, was an einem Fall nachgewiesen wird, in dem durch Trübung des Sols ein irreführender Anstieg der Viscositätskurve auftritt, während die „Adsorptionskurve“ in regelmäßigem Abstiege verläuft. Die Klebkraft hängt von der Kohäsion der Leimteilchen untereinander u. von ihrer Adhäsion an den zu verbindenden Flächen, also auch von der Beschaffenheit der letzteren ab. (Kolloid-Ztschr. 34. 201—8. 1924. Tharandt, Forstl. Hochschule.) GERNGROSS.

Donald K. Tressler, *Prüfung von flüssigem Leim*. Es wird empfohlen, ein Temperatur-Viscositätsdiagramm von 5—50° aufzunehmen u. den Gelatinierungspunkt durch Extrapolieren zu bestimmen. Niedere Viscosität bei hohem Gelatinierungspunkt zeigt schlechte Qualität an. Zur Aschebest. ist die getrocknete Masse vorher mit Standard-Ca-Acetat zu versetzen, um Schmelzen zu verhindern. Hoher Cl-Gehalt wirkt auf das nicht erwünschte $CaCl_2$ u. $MgCl_2$ als hygroskop. Mittel hin, bester Leim sollte nicht mehr als 0,02% Cl enthalten. Trocknende Eigenschaften werden durch Aufblasen einer 0,2 cm dicken Schicht auf eine Glasplatte u. Verändern der Trocknungszeit bei 25° u. 70% Luftfeuchtigkeit mit einem Standardleimeter festgestellt. Der getrocknete Film muß fest, durchsichtig, glänzend sein. Die Best. der Fugenfestigkeit — an Eichenholzklötzen vorgenommen — ist auf Luftfeuchtigkeit u. Luftfeuchtigkeit genauestens Rücksicht zu nehmen, da z. B. ein sonst sehr gut aber hygroskop. Leim bei hoher Temp. u. Luftfeuchtigkeit viel schlechtere Festigkeitswerte als ein milderer nicht hygroskop. geben kann. Die Farbe ist nach Prüfung mit Eialbumin im Levibondschen Tintometer zu ermitteln. Große Wichtigkeit ist auf die Stabilität zu legen. Starke Säuren u. alkal. Rk. bewirken allmählichen Abbau. Der flüssige Leim soll daher neutral gegen Lackmus, leicht alkalisch gegen Phenolphthalein sein. Eine Prüfung auf Freiheit von Einflüssen durch Mikroorganismen ist durch einmonatliche Aufbewahrung im Brutschrank bei 37,5° vorzunehmen. (Ind. and Engin. Chem. 16. 943—45. 1924. Mellon Inst. of Ind. Pittsburgh [Pa.]) GERNGROSS.

W. J. Kelly, *Bestimmung der Verteilung von Leimteilen*. Die Methode stellt eine Modifikation der von v. HAHN mitgeteilten (Chem.-Ztg. 47. 402: C. 1923. II. 277) dar, beruhend auf Ersatz des geraden, engen Schenkels durch eine rechtwinklig gebogene Capillare. (Ind. and Engin. Chem. 16. 928—30. 1924. Akron [Ohio].) GRIMME.

XXIV. Photographie.

S. E. Sheppard, E. P. Wightman und A. P. H. Trivelli, *Studien über photographische Empfindlichkeit*. IV. *Wirksamkeit von Oxydationsmitteln auf die Empfindlichkeit und das latente Bild*. (III. vgl. Journ. Franklin Inst. 196. 653; C. 1924. II. 2726.) Durch CrO_3 wird das latente Bild mehr beeinflusst als die Empfindlichkeit. CrO_3 kann eine Platte nicht vollständig unempfindlich machen. Behandlung der Platte mit KJ erniedrigt die Empfindlichkeit beträchtlich. Wenn Behandlung mit CrO_3 vorhergegangen ist, ist der Effekt nicht größer, dagegen hat eine nachfolgende nochmalige Behandlung mit CrO_3 vollständiges Verschwinden der Empfindlichkeit zur Folge. Der 16000fache Betrag der Belichtungszeit, die bei der nicht behandelten Platte zur Erzeugung der ersten sichtbaren Schwärzung hinreichend ergibt, dann keine Spur eines Bildes. Vff. ziehen daraus den Schluß, daß in AgCl -Korn auf der Oberfläche und im Innern „Empfindlichkeitskeime“ existieren. Die oberflächlichen Keime sind durch CrO_3 angreifbar, die inneren werden durch KJ umgewandelt u. können durch nochmalige Behandlung mit CrO_3 zerstört werden. — Vff. beobachten mkr. die Entstehung von Flecken auf AgCl -Körnern bei Belichtung, welche wachsen u. schließlich verschmelzen. Bei Expositionen, die zur Erzeugung eines sichtbaren Bildes nicht hinreichen, läßt sich durch ganz kurz dauernde Entwicklung die Emulsion färben, herrührend von mikroskopischen Ag -Teilchen, die durch Hg -Verstärkung u. Mk. sichtbar gemacht werden können. Vff. stellen sich den primären Vorgang bei der Belichtung so vor, daß das Licht ein Elektron aus einem kolloidalen Ag -Keim in Freiheit setzt, dieses neutralisiert ein benachbartes Ag -Ion im AgBr -Gitter. Das freigewordene Br -Ion verliert dabei ein Elektron an ein benachbartes Ag -Ion usw. Es ist auch möglich, daß das Br -Ion im AgBr -Gitter gewisse Wellenlängen absorbiert u. ein Elektron abgibt, welches ein benachbartes Ag -Ion entlädt. Vielleicht finden auch beide Effekte statt. — 1%ige CuSO_4 -Lsg. vermindert bei einer gewöhnlichen Platte die Empfindlichkeit, hat aber auf den Gradationswinkel keinen Einfluß. An Einschießplatten finden Vff. nach Behandlung mit CuSO_4 einen nach längeren Expositionen verschobenen Schwellenwert, vergrößertes γ u. gleichbleibendes Schwärzungsmaximum im Vergleich zu nicht behandelten Platten. CrO_3 u. KMnO_4 zeigen ähnliche Wrkg. Die Wrkg. von CrO_3 auf das latente Bild studieren Vff. an belichteten Sensitometerstreifen. Der Gradationswinkel wird verkleinert, bei längerer Behandlung wird das latente Bild vollständig zerstört. (Journ. Franklin Inst. 198. 507—515. 1924. Eastman Kodak Co.) KELLERMANN.

J. I. Crabtree und G. E. Matthews, *Korrosion von „Monel“-Metall in photographischen Lösungen*. (Vgl. CRABTREE, HART u. MATTHEWS, Ind. and Engin. Chem. 16. 13; C. 1924. I. 2056.) Monelmetall wird durch saure Fixierlsgg. besonders bei höherer Temp. angegriffen. Die Auflsg. ist nicht selektiv für bestimmte Bestandteile der Legierung, sondern bewirkt ganz allgemein B. von Fraustellen. Die Wrkg. wird unterstützt durch oberflächliche Ndd. von Metallsulfid infolge B. von kolloidalem S aus der Lsg. oder durch elektrolyt. niedergeschlagenes Ag . Die Korrosion tritt am ersten an den Stellen an, welche der Luft zugänglich sind. (Ind. and Engin. Chem. 16. 671—75. 1924. Rochester [N. Y.]) GRIMME.

Existenz von Perjodiden ziehen lassen. Wechselnde Mengen von in Ggw. von K sublimiertem Jod u. über H_2SO_4 getrocknetem KJ wurden in wss. A. von 70 Vol.-% (aus absol. A. u. fraktioniert dest. W.) u. in *Methylalkohol*, Aceton- u. A.-freie Fraktion Kp. 65–65,5°, $D_{25,6}^{20}$ 0,7874, $\eta_{25,6}^{20}$ 0,005613, $\gamma_{25,6}^{20}$ 22,58 gel., so daß die Summe von Jod u. Jodid in wss. A. 0,1, in Methylalkohol 1,0 Mol pro l betrug. D., Viscosität u. Oberflächenspannung γ dieser Lsgg. wurden bei 25,6° gemessen, η mit 2 Ostwald-Viscosimetern, γ nach der von SUGDEN (Journ. Chem. Soc. London **121**, 858 C. **1922**. IV. 1025) angegebenen Methode mit Hilfe des Maximaldrucks in Gasblasen. Die Viscositätskurve der methylalkoh. Lsg. weist zwar bei 0,78 Mol J u. 0,22 Mol KJ einen schwachen Knick auf, ohne aber für die Existenz von KJ_3 beweisen zu sein. Darst. einer methylalkoh. n. KJ-Lsg. zum Vergleich war nicht möglich. Noch weniger ließ sich aus den Resultaten in wss. alkoh. Lsg. aussagen. (Journ. Chem. Soc. London **125**, 2036–37. 1924. London, Birkbeck Coll.) HERTER.

M. Lewalt-Jeserski, *Über den osmotischen Druck der Lösungen*. (Vgl. Journ. Russ. Phys.-Chem. Ges. **51**, 231; C. **1923**. III. 707.) Die Beziehung zwischen der Depression t u. dem osmot. Druck P (in at.) $P = 12,04 t$ wird am vorliegenden Material nochmals geprüft u. bestätigt. Gleichfalls wird eine Übersicht über die Gültigkeit des Gesetzes von BABO u. des von GAY-LUSSAC in Anwendung auf wss. Lsgg. gegeben. (Journ. Russ. Phys.-Chem. Ges. **55**, 160–70. 1923/4.) BIKERMAN.

Hans v. Euler und Karin Rudberg, *Über Löslichkeitsbeeinflussungen durch Salze*. Die früher (Ztschr. f. Elektrochem. **23**, 192; C. **1917**. II. 264) entwickelte

Größe $-AS = \frac{1}{n} \frac{l_w}{l_v} - \frac{l_v}{l_w} \cdot 100$, in welcher n die Konz. der Salzäquivalente, l_w die

Löslichkeit des Nichtelektrolyten in W., l_v die Löslichkeit des Nichtelektrolyten in der Salzlsg. u. $-AS$ die mit 100 multiplizierte „äquivalente Löslichkeitsbeeinflussung“ angibt, ist so von n abhängig, daß die aussalzende Wrkg. pro Gramm mol. Salz mit steigender Verdünnung zunimmt; dies rührt daher, daß die aussalzende Wrkg. eine Wrkg. der freien Ionen ist. Man gibt besser die auf die Konz. der Ionen bezogene Löslichkeitserniedrigung an, in dem in der Formel für $-AS$ also n mit dem Dissoziationsgrad γ multipliziert wird. Es werden Werte für *Äthylacetat* in NaCl- oder KNO_3 -Lsg. gegeben. — *Äther* hat ein Maximum der Löslichkeit bei etwa 0,02-n. NaCl. — Bei Lsgg. von Aminosäuren in Salzlsg. übelagern sich zwei Einflüsse, nämlich die Aussalzung (gemessen durch $-AS$) u. eine Löslichkeitserhöhung bewirkt durch eine Verb. Aminosäure-Neutralsalz. Berücksichtigt man die Hypothese von BJERRUM (Ztschr. f. physik. Ch. **104**, 147 C. **1923**. I. 1575), daß Aminosäuren zum Teil als Zwitterionen $^+\text{H}_3\text{N}\cdot\text{R}\cdot\text{COO}^-$ in Lsg. sind, so kann man aus der Löslichkeitskurve einer Aminosäure in Neutralsalzlsgg. Schlüsse auf die relative Konz. der Zwitterionen machen. Nach BJERRUM müßte die Löslichkeit der Aminosäuren in W. durch Salze erhöht werden. A Kurven für *Tyrosin* + NaCl wird gezeigt, daß die Löslichkeit der Aminosäure durch steigenden Salzzusatz herabgesetzt wird u. daß $-AS$ u. noch mehr $-AS$ stark mit zunehmender Salzkonz. steigen, während diese letzten Werte bei n. Nichtelektrolyten von der Salzkonz. annähernd unabhängig sind. Auch bei *Tyrosin* + LiNO_3 u. bei *Leucin* + NaCl konnte keine Löslichkeitserhöhung beobachtet werden. — An *Leucin* u. primärem oder sekundärem Phosphat wird gezeigt, daß bei derartigen Unterss. p_H u. isoelekt. Punkt definiert sein müssen. — In Gemischen von *Leucin* u. *Tyrosin* in NaCl-Lsg. wurde keine gegenseitige Beeinflussung der Aminosäuren gefunden. — In 0,01-n. HCl sind *Leucin* u. *Tyrosin* leichter löslich in W. (Ztschr. f. physiol. Ch. **140**, 113–27. 1924. Stockholm, Hochsch.) A. R. F. HESS.

W. Finkelstein, *Kryoskopische Untersuchungen von Lösungen in Brom*. (Journ. Russ. Phys.-Chem. Ges. **55**, 84–99. 1923/4. — C. **1923**. III. 811.) BIKERMAN.

J. N. Pearce und C. N. Ott, *Eine Untersuchung über den Mechanismus der katalytischen Zersetzung des Essigesters durch Nickel bei verschiedenen hohen Temperaturen*. Vff. untersuchen die Zers. des Essigesters durch Ni-Katalysatoren bei Temp. zwischen 300 u. 450° (unter 300° keine Zers.). Mit steigender Temp. steigen die Ausbeuten an CO₂, 9,5–18,8%, u. CH₄, 29,15–45,2%, während die Ausbeuten an H₂, 32,15–13,8%, u. CO, 21,95–17,6%, sinken. C₃H₈ wurde gar nicht gebildet, C₂H₆ nur wenig, 2,9–0,00%, ungesätt. Verbb. nur bei 300°, 0,6%, Säuren gar nicht. Die Zers. verläuft in Ggw. von H₂ nach dem gleichen Mechanismus, die Ausbeuten an den einzelnen Gasen entsprechen im allgemeinen der Zers. ohne H₂. Bei längerem Gebrauche des Ni-Katalysators bei gleichbleibender Temp. sinken die Ausbeuten an CO₂ u. CH₄, während die Ausbeuten an CO u. H₂ steigen. (Journ. Physical Chem. 28. 1201–10. 1924. State Univ. of Iowa.)

ZANDER.

L. Hugounenq und J. Loiseleur, *Experimentelle Untersuchungen über die katalytische Wirkung gewisser Kolloide und insbesondere des Glykogens im Vergleich mit den diastatischen Phänomenen*. Eingehendere Schilderung der Unterss., deren Ergebnisse an anderer Stelle (C. r. d. l'Acad. des sciences 179. 86; C. 1924. II. 2003) wesentlich mitgeteilt sind. Ultrastrahlung scheint unter den gewählten Bedingungen ohne Einfluß auf die Spaltung von Eiweißkörpern. Die Wrkkg. der natürlichen proteolyt. Fermente können durch Dissoziations- u. Kolloidwrkkg. nicht vollständig hervorgerufen werden. (Bull. Soc. Chim. Biol. 6. 791–811. 1924. Lyon, Soc. de méd.)

SPIEGEL.

A₁. Atomstruktur. Radiochemie. Photochemie.

Dan Rădulescu, *Atommodelle und die Dynamide von Lenard*. III. *Das Torulusmodell und die Quantentheorie*. (I. u. II. vgl. Bulet. Societ. de Ştiinţe din Cluj 1. 26; C. 1923. III. 1054.) Als stabile Dynamiden werden die Elementarmagnete der Ferromagnet. Substanzen angesehen, die aus den Oberflächen- oder Valenzelektronen gebildet werden. Die Elementarmagnete oder Dynamiden im Atominneren sollen viel stärker magnet. Eigenschaften besitzen u. sich deshalb so polymerisieren, daß sie einen Ring bilden, dessen Oberfläche aus den rotierenden Elektronen besteht. In diesem Ringe soll es für jedes Elektron zum mindesten eine strahlungslose Bahn geben, der diese Eigenschaft aus Gründen der klass. Elektrodynamik ohne Hinzuziehung der Bohrschen Hypothese zukommt. Dem Modell haftet eine gewisse Unbestimmtheit an, in der Vf. allerdings einen Vorteil sieht. Es ist ein Quantenmodell in dem allgemeineren Sinne der Planckschen Quantentheorie. Zur Hebung der genannten Unbestimmtheit muß auf das Valenzfeld näher eingegangen werden. Bei Erörterung seiner Eigenschaften geht Vf. im Gegensatz zu der Bohrschen Quantentheorie von dem Satz aus, daß die Elementargesetze der Mechanik, Elektrostatik u. Elektrodynamik der molaren Systeme ohne weiteres auf die Mikrosysteme, Atome, Ionen u. Elektronen, übertragbar sind. Bei B. des Ringes aus mehreren Einzeldynamiden soll eine Anzahl Elektronen als β -Strahlen abgegeben werden. Der dadurch positiv werdende Ring sättigt sich durch ein lose gebundenes Valenzelektron ab. Dieses Elektron ist aber im Gegensatz zu denjenigen der Dynamiden in einer stat. Gleichgewichtslage wie die Elektronen des Modells von J. J. THOMSON. Die Atommodelle setzen sich im allgemeinen alle aus drei senkrecht zueinander stehenden Ringen zusammen. Auf der Oberfläche der durch diese Ringe als größte Kugel gebildeten Kugel herrschen für die Elektronen die gleichen Kraftfelder, die die RCK, aber ohne Kenntnis des Atominneren, angenommen hat. Das Modell soll einer tetraedr. Anordnung der Valenzen für den C führen. Jedes Element verhält sein Oberflächenfeld durch Aufnahme oder Abgabe von Elektronen symmetrisch. Dabei kann die Zahl der abgegebenen Valenzelektronen nicht über den hinausgehen. Die Elemente, bei denen im neutralen Zustand die acht

Valenzfelder unbesetzt oder symmetr. besetzt sind, sind Edelgase. Vf. setzt die Vorteile seines Modells gegenüber dem Bohrschen auseinander. Es werden aus der Theorie einige Folgerungen für die Absorptionsspektren u. die Beziehungen zwischen Farbe u. Konst. gezogen. Die bathochromen Wrkgg. der Auxochrome der Halochromie u. der Chromoisomerie werden unter einem gemeinschaftlichen Gesichtspunkt betrachtet. (Bulet. Societät. de Stiinte din Cluj 2. 129—54. 1924.) BY

Hawksworth Collins, *Die Struktur des Antimons*. Auf Grund der relativen Voll. u. der Bildungswärmen seiner Verbb. wird dem Sb die Struktur Ag zugeschrieben. (Chem. News 129. 267—69. 1924.)

HERTER.

E. G. Dymond, *Über die Messung der kritischen Potentiale von Gasen*. Vf. führt aus, daß die aus den Strom-Spannungskurven ermittelten Werte für die krit. Potentiale von Gasen eine gewisse Unsicherheit bzgl. der exakten Fixierung bieten; diese Unsicherheit fällt bei Differenzierung der Kurven fort. Vf. beschreibt ein Verf., welches es ermöglicht, experimentell unmittelbar die differenzierten Strom-Spannungskurven zu erhalten; dies gelingt durch Überlagerung eines relativ geringen Wechselstrompotentials über das Röhrenpotential u. entsprechende Transformation des entstehenden Gesamtstromes in einem Kommutator. Die nach dieser Methode bei mit He gefüllten Röhren erzielten Kurven legen die krit. Potentiale in Form sehr scharf definierbarer Maxima fest. (Proc. Cambridge Philos. Soc. 2. 405—8. 1924. St. Johns Coll.)

FRANKENBURGER.

R. H. Fowler, *Die statistische Theorie der Dissoziation und Ionisierung durch Stoß, ihre Anwendung auf die Aufnahme und Abgabe von Elektronen durch α -Teilchen*. Vf. erweitert u. vervollständigt die früheren Betrachtungen (Philos. Magazine [6] 4. 416; C. 1924. II. 278) über die Lage u. Einstellungsgeschwindigkeit des Gleichgewichtes zwischen α -Teilchen u. Elektronen, um aus diesem typ. Fall Schlüsse allgemeiner Art auf den Verlauf von Dissoziationen u. Stoßionisierungen ziehen können. Er stellt Gleichungen für die Häufigkeit von Zweier- u. Dreierstößen an einem idealen Gas auf; diese nehmen für Ionisierungen bzw. den reversen Prozeß einfache Formen an. Diese Gleichungen werden auf den Fall der Elektronenaufnahme durch schnelle α Teilchen angewendet u. hierbei der Einfluß des atomaren Kraftfeldes berücksichtigt. Die gewonnenen Resultate decken sich mit RUTHERFORDS Beobachtungen bei Annahme einer Dichte der „freien“ Elektronen innerhalb ein Atoms zu etwa 10^{24} Elektronen/1 cem. RUTHERFORDS V^5 -Beziehung für den Gleichgewichtswert $[\text{He}^{++}]/[\text{He}^+]$ ist eine notwendige Folgerung aus der klass. Form für die von α - oder β -Teilchen gegebener Geschwindigkeiten ausgelösten δ -Teilchen ($= \text{He}^+$). Eine nähere Betrachtung über die Natur des Kraftfeldes innerhalb ein Atoms wird auf Grund seiner Auswirkungen bei der Abgabe u. der Aufnahme von Elektronen im einzelnen entwickelt. (Proc. Cambridge Philos. Soc. 22. 253—7. 1924. Cambridge, Trinity College.)

FRANKENBURGER.

Gerhard C. Schmidt, *Über Atomstrahlen*. (Vgl. Ztschr. f. Elektrochem. 3. 440; C. 1924. II. 2737.) Die Arbeit stellt eine Fortsetzung der Unterss. über die Elektrizitätsleitung von Salzdämpfen (vgl. SCHMIDT u. WALTER, Ann. der Phys. [4] 72. 565; C. 1924. I. 2498) dar; die Titeländerung rührt davon her, daß es bekannt wurde, daß es sich bei den Messungen nicht um die Leitfähigkeit des Dampfes handelte, vielmehr über den Elektrizitätstransport durch vom erhitzten Sa. emittierte Ionen. Mit der Zeit nimmt die Ionenemission zuerst zu, dann ab, was aber mit den Eigenschaften der Unterlage (Pt- oder Ni-Draht) im Zusammenhang steht. Die Emission am Pt ist intensiver als am Ni. Mit steigender EK. wächst die Stromstärke anfangs geradlinig an, darauf folgt Sättigung (bei ca. 4 V.) schließlich wieder Zunahme der Stromstärke infolge von Stoßionisation. Die Aussendung von positiven Ionen erfolgt bei 413—435° auch, wenn der Pt-Draht a.—1 V. aufgeladen wurde; höhere negative Potentiale hemmen die Emission von

ommen. — Positive Metallionen (vgl. VOLMER, Ztschr. f. Physik **26**. 285; C. **1924**. 1661) senden die Halogensalze des *Cd*, *Zn*, *Ag*, ferner *FeCl₃*, *AlF₃*, *AlCl₃*, *MgCl₂*, *CaF₂*, *NH₄J*, *NH₄Br*, *PbJ₂*, *PbBr₂*, *PbCrO₄*, *CuJ₂* (aus *CuSO₄* u. *KJ*; liefert *Cu⁺*- u. nicht *Cu²⁺*-Ionen), *NH₄NO₂*, *KNO₃*, *NaNO₃*, *Ba(NO₃)₂*, *Ca(NO₃)₂*, *Cd(NO₃)₂*; beim Übergang der Nitrate in entsprechende Oxyde verschwindet die positive Ionenemission u. tritt die Elektronenabgabe auf. *PbS* emittiert nicht. *BaCl₂*, *PbCl₂* geben gleichzeitig + u. — Ionen ab. Zusatz von *J* zu *CdJ₂* bzw. *ZnJ₂* u. von *Br* zu *CdBr₂* u. *ZnBr₂* steigert die Emissionsfähigkeit, *Zn* u. *Cd* setzen sich herab. Auch die Leitfähigkeit von festem *AgJ* nimmt nach einem *J*-Zusatz zu. Bezgl. der Analogie zwischen der unipolaren Leitung von festen Salzen u. der Aussendung von Ionen nur einer Art vgl. Ztschr. f. Elektrochem. **30**. 440 (C. **1924**. 2737). — Die großen unbeweglichen Komplexe werden durch Halogenzusatz gesprengt nach dem Muster $(\text{CdJ}_2)_n + \text{J}_2 = 2(\text{CdJ}_2)_{n/2}\text{J}_2$, wobei auch die Ionenzahl zunimmt; die zugesetzten Metalle fangen das *J* auf u. hemmen seine Wrkg. mit der Zeit, während die Metallionen entweichen, entsteht auch aus dem Salz ein Jod, das die zeitliche Zunahme der Emission bedingt. Das Ausscheiden des überschüssigen *J* auf dem *Pt*-Draht, die Abgabe der überschüssigen negativen Ladungen auf denselben verhindernd, bewirkt die Hemmung der Emission nach einem Maximum. (Ann. der Physik [4] **75**. 337—68. 1924. Münster, Univ.) BIKERMAN.

H. W. B. Skinner, Die relativen Absorptionsvermögen der L-Niveaus für Strahlungen verschiedener Wellenlängen. Vf. untersucht das relative Absorptionsvermögen der einzelnen L-Niveaus für Wellenlängen verschiedener Länge; es zeigte sich nämlich, daß bei magnet. Analyse des durch γ -Strahlung des RaB ausgelösten β -Strahlenspektrums des RaB die relativen Intensitäten der aus den *L_I*, *L_{II}* u. *L_{III}* Niveaus stammenden Elektronen mit der Reihenfolge nicht übereinstimmen, die aus Messungen der Absorption von Röntgenstrahlen in den L-Niveaus sich ergeben hatte; es ist somit eine Abhängigkeit des relativen Absorptionsvermögens der einzelnen L-Niveaus von der Wellenlänge der absorbierten Strahlung zu erwarten. Vf. studiert diese Beziehungen in der Weise, daß er die Fluoreszenzstrahlung der L-Niveaus des *Ce* der Intensität der einzelnen Linien nach bei Anregung mit Strahlen verschiedener λ analysiert; diese Intensitäten werden im gleichen Verhältnis wie das Absorptionsvermögen der betreffenden Niveaus zueinander stehen. Die erregende Strahlung wird in einer Gasröhre erzeugt; Antikathode ist auswechselbar nah am Al-Fenster angebracht, Röhre mit etwa $\frac{1}{10}$ Kilowatt belastet. Als Fluoreszenzstrahler wird *Ce*-Oxyd verwendet; die Fluoreszenzspektren werden mit einem kleinen Seemannspektrographen aufgenommen (NaCl-Krystall). Als Erregungsstrahlung werden die K-Strahlungen von *Cu*, *Mo* u. *Ag* (nebst etwas unvermeidlicher kontinuierlicher Strahlung) verwendet; Vf. beschreibt näher die angewendeten Filter usw. Es zeigt sich, daß das gegenseitige Verhältnis des Absorptionsvermögens der einzelnen L-Niveaus nicht für alle λ der erregenden Strahlung konstant ist, sondern daß mit Abnahme der Wellenlängen das Absorptionsvermögen des *L_I*-Niveaus gegenüber dem der *L_{II}*- u. *L_{III}*-Niveaus erheblich ansteigt u. somit das Gesetz $\mu/\lambda^3 = \text{const.}$ (μ = Absorptionskoeffizient der Röntgenstrahlung der Wellenlänge λ), welches für die Absorption des gesamten L-Niveaus gilt, seine Gültigkeit für das Absorptionsvermögen der einzelnen L-Niveaus verliert. Für Strahlungen von λ dicht unterhalb der L-Strahlung des *Ce* besitzt das *L_{III}*-Niveau weitaus das relativ stärkste Absorptionsvermögen; bereits bei Strahlung von $\alpha \sim \frac{1}{4} \lambda$ der Eigenstrahlung des L-Niveaus des *Ce* wächst das relative Absorptionsvermögen des *L_I*-Niveaus. Dieser Befund deckt sich mit den Vorstellungen von ROBINSON (Proc. Royal Soc. London Serie A. **104**. 455; C. **1924**. 2563) über das durch Röntgenstrahlung ausgelöste β -Strahlenspektrum verschiedener Substanzen. ROBINSON findet für die aus den *L_I*-, *L_{II}*- u. *L_{III}*-Niveaus

stammenden Photoelektronen verschiedener Elemente (bei gleichbleibenden λ der erregenden Strahlung), daß mit abnehmender Ordnungszahl der Elemente (Ba-J-Sr-Ag-Mo-Sr-Cu) die relativen Intensitäten der aus den L_I , L_{II} u. L_{III} -Niveaus ausgelösten Elektronenmengen sich stark zugunsten des L_I -Niveaus verschieben; auch hier beginnt diese Verschiebung bei einer erregenden Wellenlänge merklich zu werden, die etwa $= \frac{1}{4}$ der λ der Eigenstrahlung des L -Niveaus der bestrahlten Atomart beträgt. Vf. diskutiert ferner die Bedeutung dieser Ergebnisse für die Intensitätsverteilung in β -Strahlungsspektren. (Proc. Cambridge Philos. Soc. 22, 379—92. Trinity Coll.)

FRANKENBURGER.

Thomas Henry Nunan und **Joseph Kenneth Marsh**, *Studien über Fluoreszenzspektren*. Teil III. *Dämpfe aromatischer Amine*. (II. vgl. MARSH, Journ. Chem. Soc. London 125. 418; C. 1924. I. 2861.) Die Fluoreszenz der Dämpfe folgender Verbindungen wurde untersucht: *Anilin*, *Methylanilin*, *Äthylanilin*, *Dimethyl-* u. *Diäthylanilin*, *i-Amylanilin*, *Benzylamin*, *o*-, *m*- u. *p*-*Toluidin*, *o*- u. *p*-*Anisidin*, *1*- u. *2*-*Naphthylamin*, *ar-Tetrahydro-1-naphthylamin*, *ac-Tetrahydro-2-naphthylamin*, *Tetrahydrochinolin*, *Anthranilsäureäthylester*, *Diphenylamin* u. *p-Phenylendiamin*. Bei Benzylamin u. *ac-Tetrahydro-2-naphthylamin* u. *Diphenylamin* konnte keine Fluoreszenz beobachtet werden, die der übrigen Verbb. ist tabellar. zusammengestellt, die Intensität gelang aus einem Diagramm hervor. Bei *Anilin* u. *p-Toluidin* gelang eine Aufspaltung des Fluoreszenzspektrums in einzelne Banden. Vergleich mit den von LEY u. ENGELHARDT (Ztschr. f. physik. Ch. 74. 1; C. 1910. II. 855) u. von STARK u. STEUBING (Physikal. Ztschr. 9. 481 [1908]) in Lsg. erhaltenen Resultaten zeigt, daß das Fluoreszenzspektrum in Lsg. intensiver u. meist nach längeren Wellenlängen hin verschoben ist; bei *o*-*Anisidin* u. *Tetrahydrochinolin* ist es nach beiden Seiten ausgedehnter, dagegen umfaßt bei *Äthylanilin* u. *Dimethylanilin* das Dampfspektrum den größeren Bereich. Bei einigen Verbb. scheint die hohe zum Verdampfen nötige Temp. bezw. die dabei eintretende Zers. die Intensität der Spektren stark vermindert zu haben. (Journ. Chem. Soc. London 125. 2123—28. 1924. The Queens Univ. Belfast.)

HETER.

P. A. M. Dirac, *Notiz über das Dopplerprinzip und Bohrs Frequenzbeziehung*. Theoret. Betrachtung über die Veränderung der Bohrschen Frequenzbeziehung $\delta E = h\nu$ bei Anwendung auf ein relativ zum Beobachter bewegtes Atom. (Proc. Cambridge Philos. Soc. 22. 432—33. 1924. St. Johns Coll.)

FRANKENBURGER.

D. R. Hartree, *Die Spektren einiger lithiumähnlicher und natriumähnlicher Atome*. Vf. entwickelt auf Grund der Quantentheorie u. der Bohrschen Theorien des Atombaus u. der Spektren theoret. Näherungsgleichungen für die Spektren verschiedener ionisierter Atome, deren Elektronenkonfigurationen einander ähneln, also z. B. für Li , Be^+ , B^{++} , C^{+++} , N^{++++} u. O^{+++++} . Das in diesen einzelnen Fällen zu beobachtende Quantenspringen u. damit zur Linienemission angeregte Elektron steht — in obiger Reihenfolge — einem 1—6-fach positiv geladenen Atomrumpf gegenüber, was zu einer Klassifizierung der emittierenden Atome bezw. Ionen als $Li\ I$, $Be\ II$, $B\ III$, $C\ IV$, $N\ V$ u. $O\ VI$ führt. Die Serienkonstante der von den einzelnen Strahlern emittierten Linienserien ist dann gleich dem Quadrat dieser Zahlensymbole; die nähere Berechnung der Serien führt noch den „Termüberschuß“ u. den „Quanten defekt“ in die Gleichungen ein. Vf. berechnet die für die obigen, „Li-artigen“ sowie für die „Na-artigen“ Atome PV u. $S\ VI$ zu erwartenden Linienemissionen u. bringt sie in vielen Fällen mit den von MILLIKAN u. BOWEN (Physical Review [2] 23. 1; C. 1924. I. 1634) im heißen Funkenspektrum der betreffenden Elemente beobachteten Linien in Übereinstimmung. (Proc. Cambridge Philos. Soc. 22, 409—25. 1924. St. Johns Coll.)

FRANKENBURGER.

D. R. Hartree, *Einige Methoden zur Schätzung der aufeinanderfolgenden Ionisierungspotentiale eines Elementes*. Vf. schätzt auf Grund opt. Daten über d

nisierungsenergie einzelner Atome sowie auf Grund gewisser Annahmen über die Elektronenkonfiguration der nach sukzessiver Entfernung von Elektronen verbleibenden „Atomrümpfe“, über die Quantenzahlen der Hauptbahnen der einzelnen Serien, die mathemat. Beziehungen zwischen den Serienspektren analog aufgebauter Atome bzw. Ionen (vgl. vorst. Ref.) u. der numer. Konstanten die Energiebeträge, welche bei der Losreißung sämtlicher Außenelektronen von den Atomen des Ag u. O aufzuwenden sind. Diese Beträge sind nebst Kennzeichnung ihres Genauigkeitswertes tabellar. aufgeführt; sie schwanken der Größenordnung nach zwischen 7 (für die äußersten Valenzelektronen) bis 30000 Volt (für die Elektronen der K-Schale des Ag). Diese Beträge haben für die chem. Vorgänge auf Sternen Bedeutung. Vf. diskutiert ferner die Abweichung der so errechneten Abtrennungsgenergien von dem Anregungspotential bei der Losreißung von Elektronen aus den betreffenden Niveaus eines neutralen Atoms. (Proc. Cambridge Philos. Soc. **22**, 34–74. 1924. St. Johns Coll.)

FRANKENBURGER.

O. S. Duffendack, *Die Erregung des sekundären Wasserstoffspektrums durch Elektronenstöße*. Vf. regt das „Sekundärspektrum“ des H_2 nach 2 Methoden an: in einem Niederspannungsbogen innerhalb eines Gemisches von H_2 u. Hg -Dampf (gl. Physical Review [2] **23**, 583; C. 1924. II. 798), 2. durch Elektronenstoß in einer 3-Elektrodenröhre. Es wird die Anregung dieses Spektrums unterhalb des Ionisierungspotentials (= 16 V) studiert; es entwickelt sich fast vollständig bereits unterhalb dieser Spannung. Vf. verfolgt das Verh. bestimmter Linien u. Banden (Balmerlinien, Fulcherbanden); die Anwesenheit von H-Atomen bei der 1. Methode wird auf Stöße „zweiter Art“ des beigemischten Hg -Dampfes zurückgeführt. Die Messungen lassen darauf schließen, daß ein charakterist. Spektrum des H_2 -Mol. im Ultraviolett bestehen muß, dessen Grundterm mit dem Endzustand des Mol. nach Emission des Sekundärspektrums zusammenfällt. Spekt. Beobachtungen im äußersten Ultraviolett u. Unters. der krit. Potentiale des H_2 stützen diese Ansicht. Anscheinend wird das ganze Sekundärspektrum vom neutralen Mol. emittiert u. ist nicht durch eine Dissoziation des Mol. bedingt. Beim Minimum-Ionisierungspotential = 16 V. zerfällt das Mol. in ein neutrales H-Atom, ein H^+ Ion u. ein Elektron. (Astrophys. Journ. **60**, 122–32. 1924. Michigan Univ.)

FRANKENBURGER.
Theodore Lyman, *Serien in den Spektren des Aluminium und Magnesium im äußersten Ultraviolett*. Vf. identifiziert gewisse, im Spektrum des Al^{++} (= Al III) des Mg^+ (= Mg II) von PASCHEN (Ann. der Physik [4] **71**, 152; C. 1923. III. 14) bzw. FOWLER („Serien in Linienspektren, S. 120) aufgeführte Linien als Grundserienlinien von Serien, deren höhere Glieder Vf. bei der Unters. der Spektren des Al u. Mg im äußersten Ultraviolett beobachtet hat. Die beobachteten Werte stimmen gut mit den errechneten überein, so daß trotz allenfalsiger Einflüsse durch Verunreinigungen die Einordnung dieser Linien als berechtigt erscheint. (Nature **114**, 641–42. Science **60**, 388–89. Harvard Univ.)

FRANKENBURGER.
Louis A. Turner, *Die relativen Größen der Kerne von 10 Elektronen des Na, Mg, Al und Si, hergeleitet aus homologen Spektren und ihre Beziehung zu den Niveaus der Röntgenstrahlung der leichten Atome*. Vf. berechnet auf Grund der Serienspektren und der Serienformel, sowie gewisser Ansätze der Bohrschen Atomtheorie die relativen Größenverhältnisse der Atome bzw. „Atomrümpfe“ des Na, Mg^+ , Al^{++} u. Si^{+++} (= Na I, Mg II, Al III u. Si IV), welche insgesamt eine analoge Anordnung von 10 Elektronen um den Kern aufweisen. Die Radien gehen obiger Reihenfolge nach zueinander im Verhältnis 1 : 0,740 : 0,575 : 0,472. Hieraus geht hervor, daß die effektive Kernladung für die äußersten Elektronenbahnen gleich der wahren Kernladung, vermindert um eine Abschirmungskonstante, ist, welche letztere für alle 4 Atome denselben Wert besitzt u. dem Wert nach mit der aus den L-Niveaus der Röntgenstrahlung dieser leichten Elemente berechneten

Abschirmungskonstante zusammenfällt. (Astrophys. Journ. **60**. 81—86. 1924 Princeton, New Jersey.) FRANKENBURGER.

W. Grotian, *Die Entwirrung der komplizierten Spektren, insbesondere des Eisenspektrums*. Allgemeine Übersicht über die theoret. Deutung eines Spektrums unter besonderer Berücksichtigung des Fe-Spektrums. (Naturwissenschaften **12** 945—55. 1924. Potsdam.) BECKER.

Henry Crew, *Einige Wellenlängen aus dem Vakuumbogenspektrum des Titans*. Vf. führt tabellar. Wellenlängenmessungen am Bogenspektrum des Ti im Bereich von 3653—6366 Å. auf, darunter 700 bereits bekannte, 78 neue Linien, die augenscheinlich dem Ti zugehören. Zur Aufrechterhaltung konstanter Temp. wird ein Toluol-Thermostat mit einigen Verbesserungen benutzt, der die Temp. des Gitters auf $\pm 0,01^\circ$ konstant hält. Vf. vergleicht die Eignung ebener und konkaver Gitter für Wellenlängenbestimmungen. Die Banden des Ti verschwinden bei niedrigeren Drucken. (Astrophys. Journ. **60**. 108—21. 1924. Evanston, Illinois.) FRANKENBURGER.

E. Rupp, *Über Phosphoreszenzerregung durch Hochfrequenzstrahlen*. Lichtemission, Lichtsumme u. Leitfähigkeitsänderung verschiedener ZnS-Phosphore werden einer Unters. mit Röntgen- u. γ -Strahlen unterworfen u. aus den Beobachtungen geschlossen, daß Hochfrequenzstrahlen den Phosphor hauptsächlich durch die von ihnen lichtelektr. ausgelösten Elektronen hoher Geschwindigkeit, die ihrerseits beträchtliche Mengen Sekundärelektronen freimachen, erregen. Infolge der geringen Absorption der Hochfrequenzstrahlen, besonders der γ -Strahlen, im ZnS wird auch in sehr dünnen Schichten die volle Lichtsumme bei fortdauernder Erregung nahezu asymptot. erreicht; sie betrug bei ZnCu u. Strahlen von 80 000 V ca. $\frac{1}{15}$ der Lichtsumme bei Lichterregung. Verstärkung der Strahlenabsorption durch künstliche Vermehrung der den Phosphor treffenden lichtelektr. ausgelösten Elektronen, z. B. durch BiNO₃-Zusatz, steigert die Lichtsumme, besonders bei γ -Strahlerregung. Die Leitfähigkeitsänderung durch Röntgenstrahlen steigt mit Vergrößerung des Feldes asymptot. zum Sättigungswert. Messung der spektralen Verteilung der Leitfähigkeitsänderung von ZnAg, ZnCu, ZnPb u. ZnBi ergibt deutliche Zunahme, wenn die Hochfrequenzwellenlängen die Absorptionskante der K-Serie der phosphoreszenzfähigen Metallatome überschreitet u. aus ihrer K-Schale Elektronen von der Geschwindigkeit der charakterist. Hochfrequenzstrahlung ausgelöst werden können. Dementsprechend steigt die Lichtsumme bei Übergang zu kürzeren Wellenlängen zunächst proportional der Leitfähigkeitsänderung, bei Annäherung an die K-Absorptionskante stärker als diese. Großen Zentren kommt wegen ihres größeren Hochfrequenzstrahlen absorbierenden Querschnitts eine verhältnismäßig größere Leitfähigkeitsänderung zu. Bei γ -Strahlerregung ist die Leitfähigkeitsänderung zu Messung zu schwach. An ZnCu-Phosphoren wird Ausleuchtung durch Hochfrequenzstrahlen nachgewiesen, die besonders die Zentren langer Dauer erfäßt. Die Momentanerregung durch γ -Strahlen ist sehr gering. Im Nachleuchten traten bei ZnCu, ZnMn, CaBi, SrBi u. CaNi bei Zimmertemp. solche Banden am intensivsten hervor, die auch bei Kathodenstrahlerregung stark speichern, bei Lichterregung aber erst bei tiefen Temp. nachweisbar sind. Durch γ -Strahlen werden nur Zentren langer Dauer erregt. (Ann. der Physik [4] **75**. 369—90. 1924. Heidelberg Univ.) KRÜGER.

A. Grumbach, *Über die Rolle der Ionisation bei Ketten mit einer fluoreszierenden Flüssigkeit*. Mit Lsgg. des K-Salzes der Fluoren-2-sulfonsäure (vgl. COURTOT u. GEOFFROY, C. r. d. l'Acad. des sciences **178**. 2259; C. **1924**. II. 1094) konnten die früheren Beobachtungen (vgl. C. r. d. l'Acad. des sciences **177**. 395; C. **1924**. I. 400) wiederholt werden: Bei direkter Bestrahlung der Elektrode wird sie zuerst positiv, dann (wenn die Konz. des fluoreszierenden Stoffes nicht zu niedrig ist) negativ. Bei Belichtung der Fl. neben der Elektrode ist dieselbe negativ. Es

ellte sich nun heraus, daß der zeitliche Gang der EK. von der Anwesenheit von CO_2 abhängt. Die Elektrode wurde so belichtet, daß die Achse des Strahlenspektrums in der Ebene der Elektrode lag. Die EK. in reiner Lsg. des fluorensulfonsauren K (0,00384 g/Liter) ist negativ, ihr absol. Betrag nimmt mit einem Wendepunkt zu. Die EK. derselben Lsg. nach Zusatz von 29,2 g K_2CO_3 auf Liter ist auch negativ, aber kleiner nach dem absol. Betrag u. bleibt eine Zeit lang konstant. — Die bei Belichtung stattfindende Rk. ist der Übergang des Aluminiumfluorensulfonates in K-Salz des *Sulfofluorenon's*, welches nicht fluoresziert. (C. r. d. l'Acad. des sciences **179**. 623—25. 1924.)

BIKERMANN.

René Audubert, *Über die photovoltaischen Erscheinungen*. (Vgl. C. r. d. l'Acad. des sciences **177**. 1110; C. **1924**. I. 1156.) Eine Elektrode aus CuO wird bei Belichtung (Bogenlampe, 30 Amp. Betriebsstrom) positiv, die aus CuBr negativ. AgCl u. Ag_2S reagieren in sehr dünnen Schichten auf rotes u. blaues Licht verschieden, in dickeren Schichten wird AgCl positiv, Ag_2S negativ. Die Polarisation des entgegengesetzten Vorzeichens erhöht den Effekt der Belichtung, eine gleichnamige Polarisation setzt ihn herab, ohne eine Umkehrung des Vorzeichens zu bewirken (Gegensatz zu metall. Elektroden). — Sodann polemisiert Vf. gegen ATHANASIU (C. r. d. l'Acad. des sciences **178**. 561; C. **1924**. I. 131): die chem. Änderung von Cu-Elektroden im ultravioletten Licht wiederholt sich im sichtbaren Licht nicht, obwohl der photovoltaische Effekt nicht ausbleibt. Die von ATHANASIU gefundene Übereinstimmung zwischen thermoelektr. u. photovoltaischem Effekt wird hinfällig, wenn man andere Belichtungsdauer zugrunde legt. Die therm. EK. ändert ihren Sinn mit der Polarisation nicht, wohl aber die EK. bei Belichtung. (C. r. d. l'Acad. des sciences **179**. 682—84. 1924.) BIKERMANN.

A₂. Elektrochemie. Thermochemie.

L. W. Pissarszewski, *Das Elektron in der Chemie der Lösungen und in der Elektrochemie*. V. Die Ionenreaktionen, als Elektronenströme betrachtet, Dissoziation der Metallatome in Ionen und Elektronen und osmotische Theorie der Erzeugung galvanischer Ströme. (IV. vgl. Journ. Russ. Phys.-Chem. Ges. **54**. 734; C. **1924**. I. 863.) Die Metallatome sind zum Teil in Ionen u. Elektronen zerspalten; die Elektronen bilden ein freies, den ganzen zugänglichen Raum erfüllendes Gas. Bei Betrachtung des Gleichgewichtes zwischen einem Metall u. seiner Lsg. müssen außer den Metallionen auch die Metallelektronen, die Ionensolvate u. die Moll. des Lösungsm. berücksichtigt werden. (Journ. Russ. Phys.-Chem. Ges. **54**. 777—97. 1922/24.) B1.

L. W. Pissarszewski, *Das Elektron in der Chemie der Lösungen und in der Elektrochemie*. VI. Einige Gedanken zur Frage über das Elektronenwesen katalytischer Vorgänge. (V. vgl. vorst. Ref.). Die Reaktionsgeschwindigkeit ist größer, wenn entgegengesetzt geladene Ionen miteinander reagieren, als wenn die Rk. im Zusammentreffen gleich geladenen Ionen erfolgt. Deswegen beschleunigt die Rk. $6\text{H}^+ + \text{ClO}_3^- + 6\text{J}' = 3\text{H}_2\text{O} + \text{Cl}^- + 3\text{J}_2$, weil ClO_3^- u. J' sich gegenseitig abstoßen, während Fe^{++} mit J' leicht Fe^{++} u. J liefert. Gegenüber den Ionen (z. B. Sn^{++}) ist die oxydierende Wrkg. des Fe^{++} viel geringer. H^+ -Ionen beschleunigen diese, wie auch andere Rkk., infolge ihres geringen Vol., das eine engere Annäherung an andere Ionen gestattet. Katalyt. Wirksamkeit der Metalle rührt von der die Metalle umgebenden Elektronenhülle her, sie muß mit dem Oxydationsgrad des Metalls Hand in Hand gehen; Gasadsorption an Metallen kann übrigens die Gesetzmäßigkeit verdecken. (Journ. Russ. Phys.-Chem. Ges. **54**. 783—804. 1922/24. Ekaterinoslaw.)

BIKERMANN.

J. J. van Laar, *Einiges über die Theorie der starken Elektrolyte und ihre Gesetze*. Vf. weist auf seine frühere Arbeit (vgl. Archives néerland. sc. exact. et

nat. [2] 7. 1; C. 98. I. 653) hin, die die Hypothese prakt. vollständiger Dissoziation enthält, den Einfluß des elektr. Feldes der Ionen berücksichtigt u. die lineare Abhängigkeit des (jetzigen) Aktivitätskoeffizienten von $\sqrt{c}$ annimmt. Nur eine Konstante wurde unbestimmt gelassen; DEBYE leitete ihren Wert theoret. ab (vgl. DEBYE u. HÜKEL, Physikal. Ztschr. 24. 305; C. 1924. I. 623). Die Debyeschen Entwicklungen werden in einer neuen Form wiederholt; für die Konzentrationsabhängigkeit wahrer Dissoziationsgrade α wird die Formel aufgestellt:

$$\alpha^2 c / (1 - \alpha) = K \cdot e^2 \beta \sqrt{c},$$

worin K die thermodynam. Dissoziationskonstante, $e^2 \beta \sqrt{c}$ der elektrost. Faktor $\beta = N^2 \epsilon^3 \cdot \sqrt{\pi} / 3 (R I D)^{1/2}$, ϵ die Elementarladung, D die DE., c die Konz. in Molenbrüchen. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 139. 108–34. 1924. Tavel sur Claren [Schweiz].) BIKERMAN.

Worth H. Rodebush, *Die Ionisierung starker Elektrolyte*. Ausgehend von seiner früheren Arbeit (LATIMER u. RODEBUSH, Journ. Americ. Chem. Soc. 42. 1419; C. 1920. III. 903) diskutiert Vf. die neueren Arbeiten dieses Gebietes. (Journ. Physical Chem. 28. 1113–17. 1924. Urbana, Illinois.) BECKER.

James A. Beattie, *Die Anwendung der Phasenregel auf galvanische Elemente*. Vf. konstruiert zur Herleitung der Phasenregel in der Gibbsschen Art (vgl. „Scientific Papers of J. Willard Gibbs“, LONGMANS GREEN & Co., 1906. I. 338–429) einen idealen elektrochem. App. Wenn auch dieser in der Wirklichkeit nicht existiert, so wird doch der Einfluß der Abweichungen der existierenden galvan. Elemente auf die gedachten in verschiedenen typ. Fällen einer Prüfung unterzogen. Voraussetzung für die Gültigkeit der Phasenregel, welche algebraisch ausgedrückt $V = n + 2 - P + S - R$ lautet, ist stabiles Gleichgewicht des Elements; dabei ist V die Anzahl der unabhängigen Variablen des Systems, P ist die Anzahl der homogenen Phasen (2 Elektroden aus gleichem Material, zwischen denen eine Spannungsdifferenz herrscht, werden als 2 Phasen gezählt, wenn das Elektrodenmaterial am Stromtransport teilnimmt, als eine Phase, wenn es inert bleibt), S ist die Anzahl der Oberflächen, an welchen elektr. Potentiale auftreten u. R ist die Anzahl der willkürlichen Beschränkungen, die man dem System auferlegen kann. In Worten lautet die Phasenregel: Für jede Oberfläche, an der ein elektr. Potential auftritt, wächst die Anzahl der Phasen, in die das System geteilt werden kann um 1. Unter der Voraussetzung, daß alle Phasen unter demselben Druck stehen, wird die Phasenregel auf folgende Elemente angewandt:

1. Pt, H₂(p at) | HCl(c) | Cl₂(p at), Pt 2. Ag | AgCl, LiCl(c') | LiCl(c''), AgCl | Ag
3. Ag | AgCl, KCl(c) | NaCl(c), AgCl | Ag.

Auch auf galvan. Elemente, bei denen die Phasen unter verschiedenem Druck stehen, wird die Herleitung der Regel ausgedehnt. (Journ. Americ. Chem. Soc. 46. 2211–23. 1924. Cambridge, [Mass.], Inst. of Technol.) JOSEPHY.

A. Lottermoser und Martin Grützner, *Untersuchungen über die Vorgänge in Bleisammlern*. Vf. verfolgen die Vorgänge an den Elektroden eines Vartaakkumulators mit Großoberflächenanode u. zwei gepasteten Kathoden durch fortlaufende Messung der Einzelpotentiale gegen saure Mercurosulfatelektroden mit 2-n. H₂SO₄ als Füllung, deren ϵ_h bei 18° 0,676 V beträgt. Gleichzeitig werden die zugehörigen Klemmenspannungen u. jeweils die Säurekonz. vor u. nach jeder Ladung bzw. Entladung bestimmt. Zahlreiche Tabellen u. Kurven im Original geben die Resultate der Messungsreihen bei 0,5, 2,0, 3,0 Amp. u. Anfangsdichten der Akkumulatorsäure 1,15, 1,19, 1,26 u. 1,30 wieder. Es ergibt sich ein Bild, das mit dem von SCHOOP (Die Diffusionsvorgänge im Akkumulator) u. besonders DOLEZALEK (Die Theorie des Bleiakкумуляtors) bereits früher entwickelten aufs beste übereinstimmt.

Die Potentialkurve der Bleisuperoxydplatte wird charakterisiert durch die Formel (JERNST)

$$= RT/2F \cdot \ln k \cdot [\text{PbO}_2] \cdot [\text{H}^+]^4 / [\text{Pb}^{++}] [\text{H}_2\text{O}] = RT/2F \cdot \ln k_1 \cdot [\text{H}^+]^4 / [\text{Pb}^{++}].$$

Konz. von $[\text{PbO}_2]$ u. $[\text{H}_2\text{O}] = \text{konst.}$ Das Potential der Bleiplatte hängt dagegen nach der Formel $\varepsilon = -RT/nF \cdot \ln P_{\text{Pb}}/P_{\text{Pb}^{++}}$ nur von der Konz. der Plumbo-
men ab, die ihrerseits von der Konz. der H_2SO_4 wenig beeinflußt wird.

Die Proportionalität des Superoxydpotentials zum Logarithmus der 4. Potenz von $[\text{H}^+]$ erklärt dessen rapiden Anstieg beim Schließen des Ladestromes ebenso wie sein rasches Abfallen zu Beginn u. gegen Ende der Entladung: im ersten Falle wird an den Elektroden H_2SO_4 in Freiheit gesetzt, im zweiten Falle wird H_2SO_4 zur B. von Sulfat verbraucht u. gleichzeitig durch das entstehende W. verdünnt. Nun konkurrieren Bildungs- bzw. Verbrauchsgeschwindigkeit der H_2SO_4 mit ihrer Diffusion, dergestalt, daß nach einiger Zeit ein Ausgleich stattfindet. Im ersten Falle jedoch vermag das Nachdiffundieren der Säure mit der Elektrolyse nicht mehr Schritt zu halten. Die Kapazität der PbO_2 -Platte ist plötzlich erschöpft. Das Potential der Bleielektrode erfährt ausschließlich gegen Ende der Ladung, nach Eintritt des „Gasens“, eine Exaltation, die darauf zurückzuführen ist, daß es nach Entladung sämtlicher Pb^{++} -Ionen bis zum Potential der Abscheidung gasförmigen Wasserstoffs ansteigen muß. Bedenkt man, daß, da die Abscheidung des PbSO_4 während der Entladung hauptsächlich innerhalb der Elektrodenmasse erfolgt, allmählich eine Verengerung dieser Kanälchen u. demzufolge eine Verarmung an akt. M. statt Verminderung des Potentials stattfinden muß, so ist zu schließen, daß nach Unterbrechung der Entladung auf eine gewisse Zeit eine Erholung des Potentials eintreten wird, deren Kurve eine Diffusionskurve sein muß. Es muß also das Fick'sche Diffusionsgesetz in der Form $dc = K(c_q - c_i)/l \cdot q \cdot dt$ anwendbar sein. (dc/dt = zeitliche Änderung der Konz., $c_q - c_i$ = Unterschied der Konz. der SO_4 außen u. im Innern der akt. M., q , l = Querschnitt bzw. Länge des Diffusionskanals.) Dieser Schluß wird in einer weiteren Messungsreihe bestätigt. (Ztschr. anorg. u. allg. Ch. **140**. 93—115. 1924. Dresden, Techn. Hochsch.) GOLTERMANN.

C. Marie und G. Lejeune, *Einfluß der Kolloide auf die kathodische Überspannung des Wasserstoffs und der Metalle.* Die Lsgg. waren 1-n. an MeSO_4 u. 1-n. an H_2SO_4 bzw. 1-n. an H_2SO_4 ; aus den ersten wurde das Metall abgeschieden, aus den zweiten der H. Ein Zusatz von 0,1% Gelatine bewirkte eine Überspannung von 0,20 V. bei Zn, 0,16 V. bei Ni, 0,17 V. bei Pb [aus $\text{Pb}(\text{ClO}_4)_2$], 0,05 V. bei Cu, 0,02 V. bei Hg u. 0,00 bei Ag (aus AgClO_4). Die Überspannung bei H_2 -Abscheidung an denselben Metallen betrug 0,16; 0,04; 0,08; 0,08; 0,04 u. 0,05 V., war also für die drei edleren Metalle größer, als die Überspannung bei der Metallabscheidung. Es ließ erwarten, daß ein Zusatz von Gelatine die Ausbeute an diesen Metallen bei Elektrolyse ihrer sauren Lsgg. erhöhen soll. Die Vermutung wurde indessen nur in einem gewissen Konzentrationsbereich bestätigt. (C. r. d. l'Acad. des sciences **179**. 679—82. 1924.)

BIKERMANN.

George Scatchard, *Der Einfluß von Gelatine auf Überführungszahlen.* Vf. zeigt, daß die Ergebnisse der Unterss. über den Einfluß von Gelatine auf die Überführungszahlen von H_2SO_4 von FERGUSON u. FRANCE (Journ. Americ. Chem. Soc. **43**. 2161; C. 1922. I. 1095) u. auf die von HCl von FRANCE u. MORAN (Journ. Americ. Chem. Soc. **46**. 19; C. 1924. II. 1486) keine allgemeine Gültigkeit besitzen. Dadurch, daß z. B. Gelatine mit HCl eine Komplexverb. bildet, deren Ionen ebenfalls am Stromtransport beteiligt sind, wird der Vorgang so kompliziert, daß unsere bisherigen Formeln nicht anwendbar sind, vor allem müßte die Theorie der Verb. weiter Fll. erweitert werden. Der Beweis, daß die Änderung des Potentials an der Verb. zweier Fll. nicht durch Änderung der Säurekonz. bewirkt wird, wird

vom Vf. ganz unabhängig von experimentellen Verss. geführt. (Journ. Americ. Chem. Soc. **46**. 2353—57. 1924. Cambridge [Mass.], Inst. of Technol.) JOSEPHY.

Erik Larsson, *Zur elektrolytischen Dissoziation der zweibasischen Säuren. II. Die zweiten Dissoziationskonstanten einiger Säuren.* (I. vgl. Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. **125**. 281; C. **1922**. I. 996.) Vf. bestimmt mit der früher beschriebenen elektrometr. Methode die zweiten Dissoziationskonstanten der *Malon-, Oxal-, Malein-, Citracon-, Mesacon-, Itacon-, α -Thiolactylglykol-, rac.- u. meso- α -Thiodilactyl-, rac. u. meso- α -Thiodibutter-, rac.- u. meso- α -Thiodiisovalerian- u. o-Phthalsäure* u. berechnet daraus die *n-* u. *r*-Werte (vgl. BJERRUM, Ztschr. f. physik. Ch. **106**. 219 C. **1923**. III. 1589). Die Substitution einer CH_3 -Gruppe in der Maleinsäure bewirkt eine Verminderung von *n* um etwa 0,8; die doppelte Bindung scheint eine Neigung dazu zu haben, den Säuren hohe *n*-Werte zu geben. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. **140**. 292—300. 1924. Lund, Univ.) ZANDER.

Andrew Hunter und Henry Borsook, *Die Dissoziationskonstanten von Arginin* Argininmonohydrochlorid wurde mit $\text{Ba}(\text{OH})_2$ (unter Ausschluß von CO_2) u. HCl titriert. Aus den Titrationsergebnissen berechnen Vff. folgende Dissoziationskonstanten: $K'_{b1} = 1,07 \times 10^{-5}$ ($p_{K'_{b1}} = 4,97$), $K_{b2} = 1,3 \times 10^{-12}$ ($p_{K'_{b2}} = 11,90$), $K'_a = 12,84$ u. den isoelekt. Punkt ($I = 1,1 \times 10^{-11}$ ($p_I = 10,97$). (Biochemical Journ. **18**. 883—90. Toronto, Univ.) A. R. F. HESSE.

A. N. Schtschukarew, *Der magnetochemische Effekt. VI.* (V. vgl. Journ. Russ. Phys.-Chem. Ges. **52**. 285; C. **1923**. III. 338, vgl. auch C. **1923**. III. 1377.) Die frühere Anordnung wurde wieder auf die Zuverlässigkeit geprüft. — Eine Vergleichung der Geschwindigkeit der positiven Teilchen, die bei elektrolyt. Cl -Abscheidung im Magnetfeld ausgesandt werden, mit der auf die Teilchen wirkenden Kraft ergibt für die Zähigkeit des Mediums (des *W.*) die Größe 35 statt 0,01; es handelt sich hier also nicht um die gewöhnliche Reibung. — Der magnetochem. Effekt kann auch in Gasen beobachtet werden. Zwei Pt -Platten sind mit $+$ u. $-$ Pol einer Batterie (50 V.) verbunden; zwischen $+$ Pol u. seiner Platte ist ein empfindliches Galvanometer eingeschaltet. Die Platten liegen einander parallel u. parallel einem Magnetfelde. Zwischen den Platten ist eine Düse angebracht, woraus HCl u. NH_3 austreten. Während der Rk. der Gase zeigt das Galvanometer einen Strom, der durch Ausschalten des Magnetfeldes stark verändert wird. Einmal wurde die B. von NH_4Cl -Fäden von der Düsenöffnung zur $+$ -Platte beobachtet (Journ. Russ. Phys.-Chem. Ges. **55**. 219—25. 1923/24. Charkow, Techn. Inst.) BIKERMAN.

Henri Lafuma, *Über die korrespondierenden Temperaturen der festen Körper* Eine theoret. Begründung des Befundes MICHAUDS (C. r. d. l'Acad. des sciences **171**. 241; C. **1920**. III. 614) gab Vf. in Bull. scient. des Etudiants de Paris lange v. BRODSKY (C. r. d. l'Acad. des sciences **179**. 498; C. **1924**. II. 2389). Er findet aber, daß die Temp. der höchsten c/T (c die spezif. Wärme bei Temp. T) $T_m = 0,391 \beta \nu$ u. nicht $0,401 \beta \nu$ ist. Wenn man für ν die von der Reststrahlenmethode gelieferten Werte nimmt, so ist die Übereinstimmung nicht so gut, wie wenn man ν aus der Amplitude der Atomschwingungen beim F. nach LINDEMANN ermittelt. (C. r. d. l'Acad. des sciences **179**. 684—86. 1924.) BIKERMAN.

Schmolke, *Die Berechnung des absoluten Wertes der Entropie mit Hilfe des dritten Wärmesatzes.* Mathemat. Betrachtungen über die Best. der absol. Werte der Entropie mit Besprechung eines Aufsatzes von FISCHER (vgl. Ztschr. f. techn. Physik **1924**. Nr. 5) über Dampfspannungsgleichungen für tiefe Temp. (Die Wärme **47**. 465—68. 1924. Berlin.) NEIDHARDT.

W. Payman, „*Jet Flames*“, eine Untersuchung von Gasflammen, welche entstehen, wenn die Gase ohne vorherige Luftzumischung aus einem Brenner austreten Die Höhe solcher Flammen zunächst ist abhängig vom Druck unter dem das Gas

eht u. vom Durchmesser der Brenneröffnung. Werden beide bei Verss. mit verschiedenen Gasen konstant gehalten, so sind die Flammenhöhen abhängig von der enge der zur Verbrennung benötigten Luft u. damit vom Heizwert des Gases. öhe der Flamme u. Heizwert des Gases sind nach Befunden des Vf. direkt proportional. H_2 ruft gewisse Abweichungen hervor, wenn seine Menge wesentlich ehr als 30% beträgt. (Fuel 3. 403—6. 1924. Sheffield, Univ.) BIELENBERG.

James Riddick Partington und **Alfred John Prince**, *Die Explosion von mmoniak mit Knallgas und Sauerstoff*. Gemische von sorgfältig gereinigtem NH_3 it ebenfalls gut gereinigtem u. über P_2O_5 getrocknetem Knallgas wurden zur xplosion gebracht bei einer Temp. von 85° u. einem Druck von 380 mm. Die ndung geschah durch elektr. Funken. Das Gesamtgasvol. betrug 100 ccm. Das emisch wurde bei einem Verhältnis Knallgas: $NH_3 = 1$ explosiv, hier wurden % des NH_3 in die Elemente zers., bei Knallgas: $NH_3 = 3$ war die Zers. voll- ändig. Unter denselben Umständen wurden NH_3 - O_2 -Gemische untersucht. Bei $H_2:O_2 > 1,6$ entstanden nur $W.$, N_2 u. H_2 , bei $NH_3:O_2 < 1,6$ auch Stickoxyde; r maximale Oxydationsgrad des N_2 von 16% lag bei $NH_3:O_2 = 1,22$. Der egin der Oxydation von N_2 war an der Farbänderung der Flamme deutlich kennbar. NH_3 konnte unter den Prodd. der Rk. niemals nachgewiesen werden, rs. sich also quantitativ. Wurde ein stöchiometr. NH_3 entsprechendes Gemisch n N_2 u. H_2 mit O_2 zur Explosion gebracht, so war bei entsprechender O_2 -Konz. e Stickoxydmenge stets geringer als bei der Explosion von NH_3 . (Journ. Chem. e. London 125. 2018—25. 1924. London, Univ.) HERTER.

D. Ch. Sawrian, *Bestimmung der Dissoziationsbedingungen auf Grund der ildungswärme*. Die Troutonsche Regel gilt auch für chem. Rkk., insbesondere r therm. Dissoziationen. Erreicht die Dissoziationsspannung 1 at. bei der Temp. T_1 , ist $U/T_1 = 17 + 0,015 T_1$ (U die Bildungswärme). In Zusammenhang mit der ist Hoffschens Isochorengleichung erlaubt die Gleichung die Dissoziations- annungen bei beliebiger Temp. auszurechnen. Die theoret. Ergebnisse werden if BaO_2 , $Ca(OH)_2$, $CaCO_3$, $SrCO_3$, CaC_2 , NH_4Cl u. $Pb(NO_3)_2$ mit Erfolg angewandt. (Journ. Russ. Phys.-Chem. Ges. 54. 805—13. 1922/24. Eriwan, Univ.) BIKERMAN.

A₃. Kolloidchemie.

N. R. Dhar und **A. C. Chatterji**, *Studien über die Bildung von periodischen iederschlägen*. II. (I. Kolloid-Ztschr. 31. 15; C. 1923. I. 488.) Man erhält bei er B. von Silberchromatringen eine stärkere Peptisation, wenn der Gelatine von nfang an das Dichromat beigemischt ist, als wenn das Silbernitrat zur Gelatine tgesetzt wird, u. das Dichromat eindiffundiert. — Bei der B. von Bleichlorid- ngen in SiO_2 -Gelen bewirkt niedrige SiO_2 -Konz. oder höhere Bleinitratkonz. eine ehere Lagerung der Ringe; dasselbe gilt für Silberchloridringe. Im Gegensatz i $PbCl_2$ u. PbJ_2 werden $AgCl$ - u. AgJ -Ringe durch zerstreutes Tageslicht beein- äßt. — HgJ -Ringe lagern sich dichter im Licht als im Dunkeln. — Die Theorien n OSTWALD u. BRADFORD erwiesen sich als unbefriedigend. Bei PbJ_2 folgt auf ne Lage von roter koagulierter u. krystallisierter Substanz eine Lage von gelbem olloidem PbJ_2 ; in dieser Peptisationszone findet eine Adsorption des Reaktions- roduktes, etwa des $NaNO_3$, statt. Dadurch ist es möglich, daß zwei bestimmte lassen von Liesegangschen Ringen auftreten; in einem Fall folgt auf eine Nieder- hlagszone eine prakt. substanzfreie Zone, im anderen Falle wechseln krystalline eptisierte Lagen ab. — Die Vff. sind der Ansicht, daß alle wl. Substanzen ter geeigneten Bedingungen rythm. Ndd. zeigen können. (Journ. Physical Chem. 8. 41—50. 1924. Allahabad, Univ.) V. HAHN.

A. F. Gerassimow, *Über die Bestimmung der Beweglichkeit kolloidaler Teilchen ach der kataphoretischen Methode*. Wenn das Sol u. die darauf geschichtete Lsg.

dieselbe Leitfähigkeit u. ein gemeinsames Ion haben, so ist dennoch die Beweglichkeit des Kolloids nicht konstant: 1. Das im Augenblick des Stromöffnens überall gleichmäßige elektr. Feld wird sich bald ändern, weil die Feldstärke im Sol sich zur Feldstärke in der Lsg. so verhalten soll, wie die Beweglichkeit der nicht-gemeinsamen Ions zur Beweglichkeit des kolloidalen Ions. 2. Gleichzeitig ändern sich die Konz. des Sols u. der Lsg. 3. Das elektr. Feld bewirkt eine Trennung schneller beweglicher von langsamen Elektrizitätsträgern im Sol u. der Lsg., was wieder die Potentialverteilung beeinflusst. Endlich ist noch die Störung zu beachten, die die Elektrolyseprod. hervorrufen; um dieselbe auf ein Mindestmaß zu reduzieren, macht man denjenigen Schenkel des U-Rohres, worin das Sediment steigt, breiter, als der zweite Schenkel; dadurch wird eine Verringerung der Wanderungsgeschwindigkeit des Kolloids u. eine Verd. der Elektrolyseprod. erreicht. Um aus beobachteten Geschwindigkeiten die bei gleichmäßiger Potentialverteilung gültige zu ermitteln, werden sie auf Zeit = Null extrapoliert. — Versuche wurden mit *Kollargol* (vgl. Journ. Russ. Phys.-Chem. Ges. **48**. 251; C. **1924**. 12413) angestellt. Die Geschwindigkeit seiner vorwärtsschreitenden Grenze v_1 ist vom Anion (Kation) der überschichteten Lsg. unabhängig (abhängig), die seine hinteren Grenze v_2 abhängig (unabhängig), v_1 nimmt mit Verd. ab, v_2 eher zu. Frische u. 2 Jahre alte Sole weisen gleiche Geschwindigkeiten auf. (Journ. Russ. Phys.-Chem. Ges. **54**. 818—28. 1922/24. Kasan, Univ.) BIKERMAN.

W. Kopaczewski, *Die Einwirkung der Verdünnung auf die Kolloide*. Die Leitfähigkeit (κ) kolloidaler Lsgg. nimmt mit der Verd. langsamer ab als die Verd. Vom Vf. wurden gemessen:

Substanzen	Konz.	Elektr. Vorzeichen	10 ⁴ · κ bei der Verd.		
			1.	2.	4.
<i>Normales Pferdeserum</i>	rein	amphoter	110,7	59,9	33,7
<i>Ovalbumin</i>	5%	„	39,5	22,5	11,7
<i>Hämoglobin</i>	1%	+	33,5	17,6	9,0
<i>Arsenobenzol</i>	2%	?	118,0	72,4	42,7
<i>Kollargol</i>	1%	—	3,1	1,9	1,1
<i>Silbersol</i> ¹⁾	0,04%	—	2,0	1,2	0,7
<i>Goldsol</i> ²⁾	0,01%	—	1,3	0,75	0,4
<i>Kieselsäure</i> ³⁾	rein	amphoter	47,9	24,3	12,7
<i>Eisenhydroxyd</i> ⁴⁾	rein	+	10,9	6,2	3,3
<i>Parisviolett</i> ⁴⁾	0,1%	amphoter	2,0	1,2	0,7
<i>Vesuvin</i> ⁴⁾	0,1%	—	13,0	7,0	3,7

¹⁾ dialysiert, nicht geschützt. — ²⁾ dialysiert, geschützt. — ³⁾ nach GRIMAU dialysiert. — ⁴⁾ dialysiert.

(C. r. d. l'Acad. des sciences **179**. 628—29. 1924.)

BIKERMAN.

K. C. Sen, *Über die Stabilität von kolloidalen Lösungen*. I. *Aluminiumhydroxyd suspensionen*. Vf. bestimmt die Beständigkeit von kolloidalen Al_2O_3 -Suspensionen in Ggw. von *Benzoessäure*, *Essigsäure* u. *Propionsäure* von wechselnder Konz. Al. Maß der Stabilität der Lsg. dient die Anzahl von cem einer K_2SO_4 -Lsg., welche zur Ausflockung eines bestimmten Vol. des Kolloids notwendig ist. Es ergab sich, daß für die Beständigkeit des Kolloids gegen die schwachen Säuren sowohl die Konz. des kolloidalen Al_2O_3 , als auch die Konz. der Säuren maßgebend ist. Mit zunehmender Säurekonz. nimmt die Beständigkeit der Suspension zu u. erzielt schließlich ein Maximum. Bei *Benzoessäure* wird dieses schon in der Ggw. von 1,4 Millimol erzielt, während bei der *Propionsäure* die Beständigkeit noch oberhalb einer Konz. von 16 Millimol weiter zunimmt. Wird bei konstanter Säurekonz. die kolloidale Lsg. verd., dann nimmt die Stabilitätsgrenze ab. Je größer die Konz.

als Sols ist, desto größer ist auch die Beständigkeit desselben gegen Elektrolyte. Journ. Physical Chem. **28**. 1029—35. 1924. Allahabad, Univ.) BECKER.

Elmer O. Kraemer und The Svedberg, *Die Bildung kolloider Lösungen durch elektrische Zerstäubung im Hochfrequenz-Wechselstrom-Bogen*. Die Zerstäubung von Cd in A., Ä. u. W. mittels oszillierendem Hochfrequenz-Lichtbogen, der durch eine Teslaapparatur erzeugt wird, wird beschrieben. Angabe der Gründe für das unterschiedliche Verhalten der verschiedenen Stromarten. (Journ. Americ. Chem. Soc. **46**. 1980—91. 1924. Madison [Wisc.]) v. HAHN.

H. Remy und K. Ruhland, *Über die bei chemischen Reaktionen auftretenden Nebel*. II. *Über die Absorption chemischer Nebel*. (I. vgl. Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. **138**. 167; C. 1924. II. 1679.) An den Beispielen des SO_3 u. des NH_4Cl werden die Vorgänge bei der Absorption von Nebeln in trockenem Zustand („kolloidale Aube“) u. in feuchtem Zustand in ihren hochkonz. wss. Lsgg. in quantitativer Hinsicht untersucht. Bei trockenen Nebeln erwies sich der W.-Dampfdruck der Adsorption dienenden wss. Lsg. als maßgebender Faktor für den Grad der Adsorption. So hat sich im Falle des SO_3 die in qualitativer Hinsicht längst bekannte Tatsache bestätigt gefunden, daß trockene SO_3 -Nebel von einer hochkonz. H_2SO_4 mit wachsender Konz. in entsprechend erhöhtem Maße aufgenommen, während feuchte SO_3 -Nebel mit steigendem H_2SO_4 -Gehalt weniger absorbiert werden. Auch bei ganz geringen H_2SO_4 -Konz. unter 5% H_2SO_4 absorbiert die Lsg. besser als reines W., über 5% H_2SO_4 hingegen nimmt das Absorptionsvermögen für feuchte Nebel steigend ab. Die beobachteten Beziehungen sind nicht nur für SO_3 -Nebel gültig, sondern treffen allgemein bei allen trockenen Nebeln zu, wie Verss. mit H_4Cl -Nebeln wss. NH_4Cl -Lsgg. gegenüber bestätigen. Die Absorptionsfähigkeit wächst mit steigender Konz. der vorgelegten Absorptionslsg., das heißt mit ihrem steigenden W.-Dampfdruck. Auch bei Verwendung von Absorptionsfl., deren Bestandteile gar nicht in dem Nebel enthalten waren, wie bei CaCl_2 -Lsgg. zur Absorption von NH_4Cl -Nebeln, zeigte sich, daß für trockene Nebel im Gegensatz zu feuchten Nebeln der Dampfdruck der Lsg. allein bestimmend ist. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. **139**. 51—68. 1924.) HORST.

H. Remy und C. Koch, *Über die bei chemischen Reaktionen auftretenden Nebel*. I. *Prüfung chemischer Nebel auf elektrische Ladungen*. (II. vgl. vorst. Ref.) Zur Erklärung der Stabilität chem. Nebel mußte ihre Prüfung auf elektr. Ladungen vorgenommen werden. Zu den Verss. wurden hauptsächlich feuchte NH_4Cl -Nebel, aber auch SO_3 - u. H_2SO_4 -Nebel benutzt. Zu orientierenden Vorverss. wurde ein Statelktrometer verwandt. Weitere Verss. mit starkem elektr. Feld ließen weder die Gesamtaufladung des Nebels noch eine Ladung einzelner Teilchen erkennen. Die Unterss. mit Quadrantenelektrometer zeigten deutlich, daß weder NH_4Cl - noch SO_3 -Nebel als solche elektr. Ladungen tragen. Durch vergleichende Messungen konnte nachgewiesen werden, daß die elektr. Aufladungen der Nebel nach Durchströmen durch W. nicht den Nebeln selbst, sondern den die Nebel führenden Gasen auf Grund des Sprudeffekts zugeschrieben werden müssen. Die Aufladung der nebelfreien Gase ist allerdings größer als die der nebelführenden unter denselben Bedingungen. Dies wird erklärt durch den Umstand, daß das vorgelegte W. teilweise durch Absorption in eine verd. Elektrolytlsg. verwandelt wird, die den Grad der Aufladung des durchperlenden Gases stark beeinflusst. Gerade die sehr empfindliche Unters.-Methode mit dem Quadrantenelektrometer (Vers.-Anordnung siehe signal) hätte den Nachweis auch kleiner der Nebeln selbst oder ihren Teilchen kommenden Ladungsbeträge ermöglichen müssen. Solche sind entweder trotz der Beständigkeit der Nebel nicht anzunehmen oder aber sie werden durch entgegengesetzte Ladungen (Gashaut) nach außen prakt. kompensiert. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. **139**. 69—80. 1924. Hamburg, Chem. Staatslab.) HORST.

Walter Farmer und **James Brierley Firth**, *Die katalytische Aktivität verschiedener Arten Kohlenstoff aus aromatischen Kohlenwasserstoffen und einigen Derivaten*. Vff. untersuchen die katalyt. Aktivität von Kohle aus Bzl., Toluol, Xylo Naphthalin, Anthracen, Chlorbenzol, m-Dinitrobenzol, Anilin, p-Toluidin, α -Naphthylamin, m-Nitranilin, Diphenylamin, Thiocarbanilid, Phenol, α - u. β -Naphthol, Resorcin Benzoe-, Salicylsäure, Terpentin, Campher u. Pyridin. Die Kohle wurde a) 2 Std. im Vakuum auf 900° erhitzt u. dann im Vakuum abgekühlt, b) wie unter a) b) handelt, danach 24 Stdn. mit $\frac{1}{10}$ -n. Jodlsg. in Chlf. behandelt, sorgfältig gewaschen u. wieder wie unter a) behandelt. Die Aktivität wurde durch die Einw. auf H_2C (vgl. FIRTH u. WATSON, Journ. Soc. Chem. Ind. **42**. T 371; C. 1924. I. 531) bei 18° gemessen. Bei den meisten Kohlearten ist b) bedeutend höher als a). Besonders hohe Werte für a) haben: m-Nitranilin u. Diphenylamin, für b): Anthracen Anilin, p-Toluidin, α -Naphthylamin, m-Nitranilin, Diphenylamin, Thiocarbanilid u. Pyridin. Besonderes Verh. zeigen somit besonders die Kohlearten aus KW-stoffen mit bas. Stickstoff. (Journ. Physical Chem. **28**. 1136—46. 1924. Nottingham Univ. Coll.) ZANDER.

H. C. Howard und **G. A. Hulett**, *Eine Untersuchung über die Dichte der Kohle*. Vff. bestimmen die D. von Adsorptionskohle, indem sie diese in ein Gefäß einschließen, welches leer u. mit Kohle plus He gefüllt gewogen wird, u. aus der Differenz der Gewichte die D. der Kohle berechnen. Für die verschiedensten Kohlearten ergab sich im Mittel D. 2,1. Es werden damit die auf röntgenograph. Weg gefundenen Angaben bestätigt, daß die verschiedenen Kohlearten aus Graphit bestehen, welcher noch kleine Mengen von KW-stoffen enthält. Auf das letztere sind die teilweise niedrigen D.D. zurückzuführen. He wird von Kohle nur zu einem sehr geringen, fast unmeßbaren Betrag adsorbiert, so daß bei den Dichtebest. nach dieser Methode eine Korrektur nicht notwendig ist. Ein Erhitzen der Kohle auf 2000° bewirkt eine beträchtliche Dichteverringerng auf 1,35. Diese Erscheinung ist wahrscheinlich auf die Zers. der KW-stoffe zurückzuführen, durch welche sich im Innern Hohlräume bilden, deren capillare Zuführungen nach außen durch den dabei gebildeten Ruß verstopft werden. Auch die Adsorptionskraft nimmt mit der Höhe der Temp. u. Dauer der Wärmebehandlung stark ab. Die Dichteabnahme hat daher keine reelle Ursache, sondern ist darauf zurückzuführen, daß das He als Füllgas nicht mehr sämtliche Hohlräume ausfüllen kann. Während He nicht adsorbiert wird, kann die Adsorptionswrkg. für andere Gase sehr stark sein. Aktive Kokosnußkohle adsorbiert pro g bei 25° 51,0 ccm CO, 8,2 ccm N_2 , 0,81 ccm H_2 . Ausgeglühte Kokosnußkohle dagegen nur 25,6 ccm CO, 3,9 ccm N_2 , 0,55 ccm H_2 . (Journ. Physical Chem. **28**. 1082—95. 1924.) BECKER.

E. Berl und **W. Pfannmüller**, *Über das Verhalten von organischen Farbstoffen zu Kieselsäure*. Saure Farbstoffe werden vom Quarz nicht adsorbiert. Bas. Farbstoffe werden am ungeglühten Quarzpulver (10 μ Korngröße) aus wss. Lsg. reversibel am geglühten Quarzpulver irreversibel adsorbiert. Das ungeglühte Quarzpulver bestimmter Korngröße (ca. 70—200 μ) entfärbt sich allmählich von selbst in eine eigentümlichen Weise. Gefällte Kieselsäure, elektrolythaltig u. elektrolytfrei, frisch u. geglüht, adsorbiert bas. Farbstoffe irreversibel. (Kolloid-Ztschr. **35**. 166—68. 1924. Darmstadt, Techn. Hochschule.) BIKERMAN.

B. Anorganische Chemie.

D. H. Black, *Einige elektrische Eigenschaften des flüssigen Schwefels*. Vf. untersucht, ob dem bekannten Verlauf der Viscositätskurve des geschmolzenen S (Minimum bei 150—160°, Maximum bei etwa 200°) ein analoger Verlauf der Leitfähigkeitskurve entspricht. Nach sorgfältiger Reinigung des S wird die Leitfähigkeitskurve

er dünnen, zwischen kon. Al-Kegel gepreßten Haut der geschmolzenen Substanz in Abhängigkeit von der Temp. untersucht u. gefunden, daß die Leitfähigkeit bei 10° ein Maximum, bei 190° ein Minimum aufweist. Es zeigt sich ferner eine Abhängigkeit der gemessenen Leitfähigkeiten von der Zeit des Stromdurchgangs; Vf. führt dies auf einen durch elektrolyt. Leitung verursachten Polarisierungseffekt zurück; letzterer wird mittels eines Quadrantenelektrometers untersucht. Die EK. der nach Stromdurchgang erzeugten Polarisierungsspannungen betragen, je nach der Temp., — 0,03—0,08 Volt. Vf. diskutiert die Ergebnisse auf Grund der Tatsache, daß im fl. S ein Gleichgewicht $S_\mu \rightleftharpoons S_\lambda$ besteht; der dünnfl. gelbe S_λ herrscht bis 160° vor, die Konz. des dickfl. braunen S_μ wächst bis zu etwa 190—200°; es scheint also, daß die Leitfähigkeit von $S_\lambda >$ Leitfähigkeit von S_μ . Die elektrolyt. Leitfähigkeit beruht vermutlich auf einer Wanderung von S_λ bzw. S_μ -Ionen zu den Elektroden u. Abscheidung an denselben, was dann die Polarisierung verursacht. Vf. gibt eine theoret. Ableitung dafür, daß in diesem Fall die Leitfähigkeit umgekehrt proportional der Zeit des Stromdurchgangs sein muß; eine Beziehung, die sich gut mit dem Verlauf der experimentell ermittelten Kurven deckt. (Proc. Cambridge Philos. Soc. 22. 393—99. 1924. Emmanuel Coll.)

FRANKENBURGER

F. Foerster, Über Bildung und Zersetzung von Polythionaten. Bemerkung zu der Mitteilung von Edith Josephy. Daß JOSEPHY (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 135. 2; C. 1924. II. 287) im Gegensatz zu FÖRSTER u. HORNIG (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 125. 86; C. 1923. I. 571) beim Zerfall der Polythionate kein Thiosulfat bildet, erklärt sich durch ungenügende Bestimmungsmethode, deren Ergebnisse z. B. durch CO_2 -Gehalt der angewandten NaOH-Lsg. entstellt werden konnten. Vf. u. SMITT benutzen zur Thiosulfatbest. neben Sulfid die Methode von KURTENACKER (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 134. 265; C. 1924. II. 87) u. fanden, daß $[\text{S}_2\text{O}_3^{2-}]$ teilweise $\frac{1}{20}$ der ursprünglichen $[\text{S}_2\text{O}_6^{2-}]$ beträgt, wenn man eine 0,1-mol. $\text{K}_2\text{S}_2\text{O}_6$ -Lsg. bei 25° sich zersetzen läßt. In größeren Konz. findet man Thiosulfat bei $\text{S}_2\text{O}_6^{2-}$ -Zers. in schwach alkal. Lsgg., da der $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ -Abbau hier ausbleibt. — Eine von JOSEPHY angegebene B. von H_2S beim Zerfall von Tetra- u. Pentathionaten ist d. W. konnte vom Vf. u. HORNIG nicht bestätigt werden, wie auch die unrichtbare B. von $\text{H}_2\text{S}_5\text{O}_6$ aus SO_2 u. S in W. Die Entstehung von Polythionsäuren durch Einw. des SO_2 auf Schwefelmilch bei 100° wurde von LANGE (vgl. FÖRSTER, LANGE, DROSSBACH u. SEIDEL, Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 128. 260; C. 1923. I. 345) nachgewiesen; Vf. wies jetzt mit HORNIG speziell die Pentathionsäure nach. Sie entsteht aber nur aus dem Thiosulfat, das als Zwischenprod. dient, wie VOGEL (Diss., Dresden 1923) zeigte. Angesichts dieser Tatsachen hält Vf. seine Reaktions-schemen (vgl. auch FÖRSTER u. MOMMSEN, Ber. Dtsch. Chem. Ges. 57. 23; C. 1924. I. 1337) aufrecht. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 139. 246—60. 141. 1923—30. 1924. Dresden, Techn. Hochsch.)

BIKERMAN.

Raymond T. Birge, Aktiver Stickstoff. Vf. diskutiert die Ansichten von SAHA u. SUR (Philos. Magazine [6] 48. 421; C. 1924. II. 2389) über die Natur des akt. Stickstoffs unter Betonung der Tatsache, daß im Spektrum des Nachleuchtens des akt. N_2 die sogenannten α -Banden mit einzelnen Banden der 1. positiven Gruppe des N -Spektrums, allerdings mit anderer Intensitätsverteilung, ident. sind. Das stärkste Band der α -Gruppe entspricht einem N_2 -Mol., dessen Schwingungsenergie bis auf einen, der Quantenzahl 11 entsprechenden Betrag erhöht ist; der akt. N_2 scheint also aus metastabilen N_2 -Molekülen zu bestehen, welche unter Emission der α -Banden in den n. Zustand zurückkehren; der energiereichere Zustand erklärt auch die gesteigerte chem. Reaktionsfähigkeit der Moleküle. Vf. behandelt im einzelnen die Zusammenhänge zwischen Quantenenergie der Elektronenbahnen u. Schwingungsenergie des N_2 -Mol. mit den Linien u. Banden des Emissionsspektrums; wendet sich gegen die Ansicht von SAHA u. SUR, daß akt. N_2 aus n. N_2 durch

Aufnahme einer Anregungsenergie von 8,5 V. entsteht; nach seinen Berechnungen beträgt die Energie etwa 11,5 V. Die Notwendigkeit der Anwesenheit von Spurenelektronegativer Stoffe für die Beständigkeit des akt. N_2 deutet Vf. im Anschluß an LEWIS (Nature **111**. 599; C. **1923**. III. 181) damit, daß durch dieselben die Beständigkeit der metastabilen Moll. des akt. N_2 gefährdenden Elektronen entfernt werden; ein Überschuß derartiger, starke molekulare Kraftfelder aufweisende elektronegativer Substanzen wirkt naturgemäß infolge der Möglichkeit störender Zusammenstöße mit den metastabilen Moll. des akt. N_2 ebenfalls schädlich auf dessen Beständigkeit. Ist O_2 als elektronegative Substanz zugegen, so werden sie bei deren Zusammenstößen mit den akt. N_2 -Moll. angeregte, metastabile NO-Moleküle bilden, welche in den n. Zustand zurückkehren u. hierbei vielleicht die β - oder γ -Gruppe des Nachleuchtens verursachen. (Nature **114**. 642—43. 1924. Californian Univ.)

FRANKENBURGER.

J. A. M. van Liempt, *Das Zustandsdiagramm des Kohlenstoffs*. (Vgl. Naturwissenschaften **12**. 578; C. **1924**. II. 1324.) Zusammenfassende Darst. Vf. hält an der Formel von JEDRZEJEWSKI-WERTENSTEIN-VAN LAAR fest. Der F. > 760 d. Kohle liegt > 4500°. (Chem. Weekblad **21**. 517—24. 1924. Eindhoven, N. V. Philips Gloeilampenfabrieken.)

GROSZFELD.

Albert F. O. Germann, *Die Reaktionsfähigkeit von flüssigem Phosgen*. (Scientia **60**. 434. 1924. — C. **1924**. II. 1766. 2224.)

BEHRLE.

G. W. Morey und N. L. Bowen, *Das binäre System Natriummetasilicat-Kieselsäure*. Der F. von Na_2SiO_3 ist 1088°, das Eutektikum Na_2SiO_3 - $Na_2Si_2O_5$ (62,5 Mol.-% Na_2SiO_3 , 37,5 Mol.-% SiO_2) hat F. 840°. $Na_2Si_2O_5$ hat F. 874°, seine F.-Kurve ist durch ein ungewöhnlich flaches Maximum charakterisiert. Das Eutektikum $Na_2Si_2O_5$ -Quarz (35 Mol.-% Na_2SiO_3 , 65 Mol.-% SiO_2) hat F. 793°. Zum Schluß bespricht Vf. die Bedeutung dieses niedrigschm. Eutektikums für die Petrologie u. Glastechnik. (Journ. Physical Chem. **28**. 1167—79. 1924. Washington, CARNEGIE-Inst.) ZANDER.

A. J. Berry, *Die Thallo-Thalli-Halogenide*. Vf. berichtet über die bisherigen Arbeiten über Verbb. von Halogeniden des 3-wertigen Tl mit solchen des 1-wertigen in welchen gewöhnlich die Annahme gegenseitiger Lsgg. dieser Halogenide bezogen von Mischkristallreihen zwischen den wohldefinierten Typen $TlX_3 \cdot TlX$ u. $TlX \cdot 3TlX$ gemacht wird. Vf. findet, daß aus Gemischen von Lsgg. des Tl^{III} u. d. Tl^I trotz wechselnder Zus. konstant zusammengesetzte Bodenkörper sich abscheiden. Herst. der $TlCl_3$ -Lsg. erfolgt durch Lösen von Tl_2O_3 in HCl u. Bei des Cl-Gehaltes mit $AgNO_3$ -Lsg. in Ggw. von $CH_3COO(NH_4)$ u. K_2CrO_4 als Indikator. Zu gleichen Mengen dieser $TlCl_3$ -Lsg. werden verschiedene Mengen von $TlCl$ -Lsg. gegeben, die Mischungen erhitzt, eisgekühlt u. die ausgeschiedenen Krystalle nach Trocknen analysiert. Trotz Variierung der zugegebenen $TlCl$ -Mengen im Verhältnis 1 : 3 scheiden sich stets Krystalle vom Äquivalentgew. 509 u. einem $TlCl$ -Gehalt von 30,5% aus, was mit der Formel $TlCl_3 \cdot 3TlCl$ sich deckt (514,5 bzw. 30,2%). Dieses Sesquichlorid ist deshalb kein Endglied einer Mischkristallreihe, sondern eine wohldefinierte Verb. Vf. diskutiert die Möglichkeit einer Isomerie bei den Chlorobromiden zwischen $Tl_4Cl_3Br_3$ ($TlBr_3 \cdot 3TlCl$ bzw. $TlCl_3 \cdot 3TlBr$); die Frage nach der Zus. dieser Verbb. ist nur durch analyt. Trennung der Tl^{III} von der Tl^I -Komponente möglich. CH_3OH löst lediglich das Tl^{III} -Salz u. ergibt ein Verhältnis von $Tl : Cl = 1 : 3$ der gel. Substanz. Prüfungen, ob der Alkohol beim Lösen Tl^{III} zu Tl^I reduziert, ergaben negative Resultate. Vf. sucht, durch Einw. einer $TlCl$ auf eine $TlBr_3$ -Lsg. eine Verb. $TlBr_3 \cdot 3TlCl$ zu erhalten. Die in der Hitze gemischten Lsgg. lassen beim Erkalten orangefarbene Krystalle vom Mol.-Gew. 565, 579, 588 u. 590 (in verschiedenen Verss.) sich absetzen (berechnet 581,2). Bei Ausziehen mit CH_3OH erweist sich die 1. Komponente als reines $TlBr_3$ (Verhältnis $Tl : Br = 1 : 3,2$); der ungelöste Bestandteil besteht lediglich aus $TlCl$. Son

entsteht beim Vermischen von TiBr_3 - mit TiCl_3 -Lsgg. die Verb. $\text{TiBr}_3 \cdot 3\text{TiCl}_3$. Zweckts Herst. der Verb. $\text{TiCl}_3 \cdot 3\text{TiBr}$ werden TiBr -Lsgg. mit TiCl_3 -Lsg. gemischt. I fallen stets gelbe, dem Ti -Sesquichlorid ähnelnde, jedoch etwas dunklere Krystalle an, gleichgültig, in welcher Art die Lsgg. vermischt werden. Extraktionen mit $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ erweisen die Anwesenheit von kleinen Mengen Br sowohl in der Ti^+ - als auch in der Ti^{+++} -Komponente, der Hauptbestandteil war jedoch stets Chlorid. Mol.-Gew. der Krystalle ergab sich zu 524—534. Die berechneten Werte lassen vermuten, daß die Krystalle die Zus. $\text{TiCl}_3 \cdot 3\text{TiCl}$ haben u. daneben etwas Bromid aufnehmen; die Darst. der Verb. $\text{TiCl}_3 \cdot 3\text{TiBr}$ ist somit auf diesem Weg nicht möglich. Vf. stellt weiterhin das Dibromid $\text{TiBr}_3 \cdot \text{TiBr}$ dar (feine gelbe Nadeln vom Mol.-Gew. 370—364, ber. 364). Das dunkelrote Sesquibromid $\text{TiBr}_3 \cdot 3\text{TiBr}$ ist schwierig herstellbar, die Präparate haben gewöhnlich ein kleineres als das ber. Mol.-Gew. Das Dibromid wird durch Feuchtigkeit in das Sesquibromid + TiBr_3 unter Rotfärbung zersetzt. In wss. Lsg. zeigen die Ti^+ - Ti^{+++} -Halogenide nur die Fk. ihrer Ionen u. u. geben keine Anzeichen für das Vorhandensein von komplexen Ionen (vgl. dagegen MEYER, Ztschr. f. anorgan. Ch. 32. 72 [1902]). Bei Temp.-Veränderungen zeigen die Thallo-Thalli-Halogenide markante Farbänderungen: Abkühlung bewirkt Abnahme der Farbtintensität: das Sesquichlorid wird in fl. Luft gebleicht weiß; das rote Sesquibromid u. Chlorobromid werden gelb. (Proc. Cambridge Philos. Soc. 22. 363—68. 1924. Downing Coll.)

FRANKENBURGER.

A. Smits, *Das elektromotorische Verhalten des Aluminiums*. I. Bringt man eine Al-Elektrode aus einer Lsg. von reinem Al-Salz in eine mit Hg-Salz versetzte Al-Lsg., so wird das Potential zuerst edler, erreicht schnell ein Maximum, um dann schnell wieder abzufallen auf ein unterhalb des Anfangspunktes gelegenes Minimum ansteigt allmählich wieder zu einem in der Nähe des Hg-Potentials liegenden Wert u. der dann konstant bleibt. Mit Hilfe des Schmelzpunktdiagramms des Systems Al-Hg, das keine Anzeichen für die Existenz einer Verb., sondern nur beim Umwandlungspunkt des Al, 585°, einen Wendepunkt zeigt, war es möglich, den Typus des EK-Diagramms ($X = \text{Zus. der Elektrode}$) für das System Al-Hg-Elektrolyt zu bestimmen. Die Wrkg. des im Al gel. Hg muß eine katalyt. sein u. das Potential der amalgamierten Al infolge der durch den Angriff bewirkten Änderung des inneren Gleichgewichts (vom Vf. „Verstörung“ genannt) weniger negativ sein als das Potential des im inneren Gleichgewicht befindlichen Al. Eine polierte Al-Platte verhielt sich anfangs elektromotor. anders als eine gebeizte u. dann mit w. abgewaschene; die Ursache wurde in dem Abwaschen gefunden u. wird durch Verstörungen erklärt. Ausgedehnte Verss. beschäftigen sich mit dem elektromotor. Verh. von Al in AlCl_3 -Lsgg. verschiedener $[\text{H}^+]$. Oberhalb $[\text{H}^+] = 10^{-2}$ u. unterhalb 10^{-10} ist Al zwar gewissermaßen verstört, aber aktiv, zwischen $10^{-2.1}$ u. $10^{-3.5}$ stark verstört oder passiv. Die Al-Elektrode verhält sich nie wie eine H_2 -Elektrode u. fällt stets Hg-Ionen momentan, kann also nie mit einer Oxydschicht bedeckt sein. Es gefundene elektromotor. Verh. läßt sich mittels der aus der Theorie der Alloretrie hervorgehenden Betrachtungen über elektromotor. Gleichgewichte sehr gut erklären. Vf. betont zum Schluß seine Annahme, daß die metall. u. fl. Grenzschichten, die miteinander in heterogenem Gleichgewicht sind, dieselben Bestandteile enthalten, natürlich in sehr verschiedener Konz. Nimmt also, was Vf. für wahrscheinlich hält, die Orientierung in der Fl. bei Annäherung an die Metallethe stark, aber kontinuierlich zu, so ist der Übergang Metall-Elektrolyt kontinuierlich. (Ztschr. f. Elektrochem. 30. 423—35. 1924. Amsterdam, Univ.) HERTER.

F. Krauss und H. Gerlach, *Studien zur Chemie des Berylliums*. I. Zur Kenntnis des Berylliumsulfats und seiner Hydrate. Die strittige Existenz der verschiedenen Hydrate des Berylliumsulfats wird dadurch entschieden, daß es Vf. gelingt, durch Titrieren des $\text{BeSO}_4 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ auf passende Tempp. Salze mit jedem gewünschten

Wassergehalt von 0 bis $4\text{H}_2\text{O}$ herzustellen. Der systemat. Abbau der genannten Verb. im Hüttigschen Tensi-Eudiometer (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. **114**. 16; C. **1921**. I. 608) zeigt jedoch, daß mit Sicherheit neben dem wasserfreien Salz nur die Hydrate $\text{BeSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ u. $\text{BeSO}_4 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ als chem. Verbb. angesprochen werden dürfen, während über die Existenz des 1-Hydrates noch nicht eindeutige Feststellungen gemacht werden können. Es erscheint nämlich nicht ausgeschlossen, daß ein Monohydrat als chem. Individuum wohl existiert, aber daß sein Existenzgebiet wegen Neigung zur B. von Mischkrystallen sowohl mit dem 2-Hydrat als mit dem wasserfreien Salz weitgehend eingeschränkt wird. Im Gegensatz zu älteren Arbeiten gelingt es Vff. weder das Berylliumsulfat-6-Hydrat (WIRTH, Ztschr. anorg. u. allg. Ch. **79**. 357; C. **1913**. I. 779) noch das 7-Hydrat herzustellen. Für die Darst. der Hydrate 0, 2 u. 4 empfehlen Vff. u. a. die folgenden Verff. $\text{BeSO}_4 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ wird erhalten durch Erwärmen von $\text{Be}(\text{OH})_2$ in verd. H_2SO_4 (spezif. Gewicht 1,070) u. Einengen der filtrierten Lsg. Die Krystalle werden mit A. gewaschen. 1 std. Erhitzen des 4-Hydrats auf 120° bzw. auf 400° liefert die Verb. $\text{BeSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ bzw. das wasserfreie Salz. Abgabe von SO_3 wird erst oberhalb 580° beobachtet. Die Gesamtbildungswärme des 4-Hydrates berechnen Vff. aus der Abbaukurve nach der Nernstschen Näherungsformel. Für die Rk. BeSO_4 (fest) $+ 4\text{H}_2$ (Dampf) $= \text{BeSO}_4 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ wird ein Wert von 79140 cal. mitgeteilt. (Ztschr. anorg. u. allg. Ch. **140**. 61–80. 1924. Braunschweig, Techn. Hochsch.) GÖLTER.

M. de Kay Thompson, *Die Gewinnung von Chromaten aus Ferrochrom-Anoden* (Nach Verss. von Y. C. Hsu, R. R. Ridgway, C. A. Norton und G. G. Kearful). Die Darst. von Chromaten auf elektrochem. Wege wurde untersucht, besonders die Wrkg. von Stromdichte, Temp., Konz. des Elektrolyten u. Zus. der Anode auf die Strom- u. Energieausbeute. Anoden aus reinem Cr lösten sich mit einer Stromausbeute von 100% in NaOH oder Na_2CO_3 , mit wachsendem Fe-Gehalt — verwandelt wurden Elektroden mit 68,70 u. 78,75% Cr — sank die Stromausbeute. In allen Fällen war in NaOH die Energieausbeute, gemessen in Kilowattstdn. pro kg Na_2CrO_4 besser als in Na_2CO_3 . Ein Minimum der Stromausbeute gaben, unabhängig von der Stromdichte, alle Elektroden in 5%ig. NaOH, während in allen Elektrolyten bei einer Stromdichte von 5 Amp/qdm sich ein Minimum zeigte. Niedrige Stromdichten u. hohe Konzz. des Elektrolyten bewirkten Abscheidung nicht kolloidale leicht abfiltrierbaren Anodenschlamm, der nie Cr enthält. Die Temp. war ohne Einfluß auf die Stromausbeute, doch stieg mit der Temp. die Energieausbeute. Eine den Stromdurchgang hindernde Schicht bildete sich an der Anode nicht. Ein Kostenüberschlag zeigt, daß das Verf. techn. Wert nicht besitzt. (Trans. Am. Electr. Soc. **46**. 14 S. 1924. Mass. Inst. of Techn. Cambridge [Mass.] Sep.) HERTEL.

A. Popowitzki, *Über die chemische Zersetzung von Bichromaten unter Lichteinfluß bei Gegenwart von organischen Substanzen*. Bei Belichtung von mit einem $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ -Lsg. durchgetränkter Gelatine wird das Bichromat reduziert. Auf Analyse EDERS („Das Pigmentverf. u. die Heliogravüre“, Halle 1896) fußend, gibt Vff. die entstehenden Verb. die Formel $4\text{Cr}_2\text{O}_3 \cdot 3\text{CrO}_3$ u. zeigt, daß sie sich an die Reihe bekannter Chromoxyde gut anschließt. (Journ. Russ. Phys.-Chem. Ges. **55**. 1–1922/24.) BIKERMAN.

J. Arvid Hedvall und J. Heuberger, *Platzwechselreaktionen zwischen festen Phasen*. IV. (III. vgl. Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. **135**. 49; C. **1924**. II. 164.) Zur Entkräftung der Balarewschen Kritik (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. **134**. 117; **1924**. II. 296), daß es sich bei den früher von Vff. mitgeteilten Rkkn. zwischen Oxyden einerseits u. Carbonaten, Sulfaten u. Phosphaten von Ca, Fe u. Ag andererseits nicht um Rkkn. fester Phasen, sondern um Rkkn. geschmolzener Hydroxyde handle, werden Verss. mit sorgfältig getrockneten Substanzen vorgenommen. Zu wird ein Ag-Schiffchen mit getrennten Portionen von trockenem $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$ u. Ba

Quarzrohr durch 2std. Erhitzen wenig unterhalb der Zers.-Temp. des $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$ unter Durchleiten von reinem, trockenem N_2 extrem getrocknet. Nach Abkühlung auf 200° werden die Substanzen von außen mit Hilfe eines luftdicht eingeführten Trichters gemischt. Dann erst erfolgt Erhitzung auf Rk.-Temp. ($350\text{--}360^\circ$). Trotz vollständiger Durchmischung der Substanzen findet Rk. statt, deren Prod. Fe_2O_3 deutlich zu erkennen ist. Es ist weiter zu beachten, daß auch bei nicht besonders getrockneten Oxyden der Gehalt an Hydroxyd Werte von $0,72\%$ für BaO u. $0,45\%$ (berechnet als H_2O) für SrO nicht übersteigt, während die Reaktionsausbeute 90% mehr erreicht. Die Mitwirkung des W. kann also keine wesentliche, das Eintreten der Rk. bedingende, sondern nur eine die Vollständigkeit der Umsetzung fördernde bzw. ihre Richtung bestimmende sein. Gegen die Balarewsche Kritik spricht auch die Übereinstimmung der Reaktionstemp. der verschiedensten Systeme wie BaO , SrO , CaO einerseits mit AgNO_3 oder Ag_2SO_4 andererseits, weil es unwahrscheinlich wäre, daß die entsprechenden eutekt. Schmelztemp. in Balarewschen Sinne so weitgehende Übereinstimmung untereinander zeigen sollten. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. **140**. 243—52. 1924. Örebro, Techn. Schule.) GÖLTERM.

A. Colani, Über das saure Uranylacetat. Das Salz, $\text{UO}_2(\text{C}_2\text{H}_3\text{O}_2)_2 \cdot 2(\text{C}_2\text{H}_4\text{O}_2)$, wird erhalten, wenn 500 ccm sd. Eg. nach u. nach mit 12 g fein gepulvertem U_3O_8 , H_2O versetzt werden. Mit der Zugabe von UO_3 wird aufgehört, wenn die Eg. beginnt, sich milchig zu trüben; es wird danach einige Min. beim Kp. gehalten, die klare Lsg. dekantiert. Beim Abkühlen scheidet sich ein gelbes Pulver ab, das bald in Kristalle übergeht. Die Verb. dissoziiert an der Luft leicht in CH_3COOH u. Uranylacetat; im Laufe von 72 Stdn. ist der Zerfall vollständig; durch W. u. verd. Essigsäure ebenfalls vollständige Zers. Die Ausbeute an saurem Acetat wird verbessert, wenn zur Darst. ein mit $10\text{--}20\%$ W. verd. Eg. benutzt wird; statt U_3O_8 , H_2O kann auch Uranylacetat zur Darst. verwandt werden; das saure Salz entsteht durch längeres Digerieren des Uranylacetats mit Eg.; es bildet sich auch, wenn Uranylacetat in dünner Schicht mit Essigsäuredämpfen bei gewöhnlicher Temp. in Berührung ist. (Bull. Soc. Chim. de France [4] **35**. 1305—7. 1924.) HA.
W. Herz und Edith Martin, Die Löslichkeit von Bleichlorid in Essigsäure. Überschüssiges PbCl_2 wurde 18 Stdn. lang bei 25° mit Essigsäurelsgg. von verschiedenen Konz. geschüttelt. Gleiche Erhöhung des Essigsäurezusatzes erniedrigt die PbCl_2 -Löslichkeit in mit steigender Essigsäurekonz. sinkendem Grade. Eine Lsg. von der Acidität 1,02 enthält $0,03365$ Moll. Pb/l ; 3,04: $0,02266$; 5,87: $0,01163$; 9,4: $0,00505$; 11,24: $0,00258$; 13,28: $0,00136$; 14,90: $0,00120$. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. **140**. 339—40. 1924. Breslau, Univ.) ZANDER.

Albert F. O. Germann, Die Einwirkung von Chlor auf Quecksilber. Sorgfältig durch Phosgen getrocknetes reines Cl_2 reagiert augenblicklich mit ebenso vorbehandeltem reinen trockenen Hg . Die Möglichkeit, daß das Phosgen katalyt. wirken könnte, hält Vf. für ausgeschlossen. (Journ. Physical Chem. **28**. 1218—20. 1924. STANFORD-UNIV., Cal.) ZANDER.

A. Krüger, Über normales und basisches Kupfersulfat. Für das bei der Hydrolyse des Kupfervitriols in verd. Lsgg. in Ggw. von essigsauerm Na entstehende basische Sulfat, „CASSELMANNS Grün“, bestätigt Vf. die Zus. $8\text{CuO} \cdot 2\text{SO}_3 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$. Die Hydrolyse des Kupfervitriols für sich ergab basische Sulfate von wechselnder Zus., darunter $6\text{CuO} \cdot 2\text{SO}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$; mit steigender Verdünnung (= Abnahme der $[\text{H}^+]$ der gebildeten freien H_2SO_4) der Lsgg. nähern sich die Werte der gebildeten basischen Sulfate immer mehr denen von CASSELMANNS Grün; bei Neutralisation der freien Säure durch KHCO_3 entsteht dieses wieder in der oben angegebenen Zus., fast unl. in W., wird von Säuren zers., geht in k. 1% ig. NaOH in ein Gemisch von blauem basischen Salz u. blauem Hydroxyd über. — Langit, $4\text{CuO} \cdot \text{SO}_3 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$, wird vom Vf. durch Hydrolyse von Kupfervitriol in Ggw. von KHCO_3 , Na-Acetate oder MgO dar-

gestellt, fast unl. in W., wird durch Säuren zers., durch verd. Säuren in das gri. bas. Sulfat übergeführt. — $4\text{CuO} \cdot \text{SO}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ ist oft neben dem bas. Sulfat $4\text{H}_2\text{O}$ erhalten worden u. diesem im Verh. sehr ähnlich.

Schwarzes Kupferhydroxyd, $8\text{CuO} \cdot \text{H}_2\text{O}$ (?), eignet sich wegen seiner körnig Beschaffenheit zur analyt. Best. des *Cu*, ist leicht auswaschbar u. kann im Goochen Tiegel filtriert werden. Durch sehr langsames Eingießen von verd. Soda in die sd. Kupfersulfatlsg. wird zunächst das bas. Salz gefällt u. dann durch ein Überschuß des Fällungsmittels in das Hydroxyd übergeführt. Zum Schluß schreibt Vf. die Darst. von reinem n. Kupfersulfat u. Methoden, um einen Überschuß von Base oder Säure in Kupfersulfatlsgg. zu erkennen u. zu vermeiden (Journ. f. prakt. Ch. 108. 278—96. 1924.) ZANDER

John Hughes Müller und **Horace R. Blank**, *Die Allotropie von Germaniumdioxyd*. Wenn GeO_2 -Lsgg. eingedampft u. die Rückstände über einem Bunsenbrenner geglüht werden, ist ein geringer Teil des Rückstandes, der sich zu 99,4 als GeO_2 erwies, nicht in W. l., während sich die Hauptmenge in k. W. langsam in h. W. schnell löst. Der in W. unl. Teil ist auch unl. in HCl , NaOH u. NH_4Cl u. auch in HF , worin durch Hydrolyse von GeF_4 erhaltenes GeO_2 unter Wärmeentzug unl. ist. Alle Formen des GeO_2 schmelzen bei hohen Temp. u. bilden viscose Fl., die beim Abkühlen zu einer glasigen M. erstarren, die in k. W. wenig, in sd. W. unl. ist. Auch wenn sie fein gemahlen wird, bildet die M. vor der Auflsg. keine milchige Suspension, wie das durch Hydrolyse erhaltene Dioxyd es tut. Durch Schmelzen kann also die unl. Form des GeO_2 in eine l. übergeführt werden. Unterschiede in der Krystallform bei den drei verschiedenen Modifikationen wurden nicht beobachtet. Die Ergebnisse der zur Best. der günstigsten Temp. für die Ausbeute an unl. GeO_2 bei 4-stünd. Glühen ausgeführten Verss. sind graphisch dargestellt, als optimale Temp. ergab sich 380° , wo ca. 8,5% GeO_2 in die unl. Form übergeführt sind. Die Umwandlung beginnt bei 225° u. hört erst bei $F. (1090^\circ < F. < 1100^\circ)$ auf. Wenn bei konstanter Temp. (280°) die Dauer des Erhitzens zunimmt, so wächst die Ausbeute an unl. Form anfangs sehr schnell, beginnt aber nach 15 Stdn. sich asymptot. einem Grenzwert zu nähern (ca. 15%), so daß eine vollständige Umwandlung in die unl. Modifikation ausgeschlossen bleibt. Zur Erklärung dieser Tatsachen wird angenommen, daß das durch Eindampfen der Lsg. erhaltene GeO_2 keine homogene Substanz ist, u. daß nur ein Teil davon mit einer meßbaren Geschwindigkeit in die unl. Form umwandelbar ist. Im Ganzen müssen also 3 allotrope Modifikationen angenommen werden, von den beiden l. Formen aus denen das durch Eindampfen der Lsg. erhaltene GeO_2 besteht, ist die eine mit größerer Geschwindigkeit in die unl. Form überführbar als die andere. Die Reinigung von GeO_2 von Sulfaten u. Chloriden durch Erhitzen wird beschrieben (Journ. Americ. Chem. Soc. 46. 2358—67. 1924. Philadelphia [Penn.], Univ.)

Gregory Paul Baxter und **William Charles Cooper jr.**, *Eine Revision des Atomgewichtes von Germanium*. I. *Die Analyse von Germaniumtetrachlorid*. (V. Journ. Americ. Chem. Soc. 46. 357; C. 1924. II. 450.) GeCl_4 wird aus dem gereinigten Metall durch Überleiten eines Cl_2 -Stromes hergestellt u. durch fraktioniertes Dest. sorgfältig von Verunreinigungen, insbesondere von As, Sb u. Sn befreit. Dann wird unter Verwendung verschiedener Vorsichtsmaßregeln das At.-Gew. von *Ge* aus dem Verhältnis $\text{GeCl}_4 : 4\text{AgCl}$ als Mittelwert von 31 Analysen zu 72,60 bestimmt. ($\text{Ag} = 107,880$, $\text{Cl} = 35,458$.) Spuren von *Ge*, welche im AgCl -Nd. nachgewiesen wurden, konnten spektroskop. bestimmt werden. Sie betrugen 0,01% d. Nd. u. konnten vernachlässigt werden. Die Analyse des GeCl_4 wurde so vorgenommen, daß das abgewogene Röhrchen, welches das GeCl_4 enthielt, unter einem KOH -Lsg. geöffnet wurde, welche hierauf mit HNO_3 angesäuert wird. Die Gase werden gesammelt u. zurückgewogen. Aus der Lsg. wird das GeCl_4 mit

ergfältig gereinigtem AgNO_3 gefällt, getrocknet u. gewogen. (Journ. Physical Chem. 3. 1049—66. 1924. Cambridge, Mass.).

BECKER.

Louis Kahlenberg und **Herman H. Kahlenberg**, *Die Darstellung von metallischem Wolfram und einigen seiner Legierungen*. Es wurde gefunden, daß sich WO_3 in geschmolzenen Alkalihalogeniden unter Entw. von Cl_2 löst nach der Gleichung $\text{WO}_3 + 2\text{NaCl} = \text{Na}_2\text{O} \cdot \text{W}_2\text{O}_5 + \text{Cl}_2$. H_2WO_4 löst sich darin unter Entw. von HCl , der sich nur durch längeres Erhitzen auf 800° völlig entfernen läßt, zu $\text{Na}_2\text{O} \cdot 5\text{WO}_3$. Durch Elektrolyse an Kohleelektroden läßt sich reines W in schwarzer, pulveriger Form gewinnen; bei Verwendung einer Ni-Kathode erhält man, wenn die Schmelze durch Na_2CO_3 neutral gemacht u. bei sehr niedriger Stromdichte gearbeitet wird, einen glatten W -Überzug, der jedoch, da sich die genauen Bedingungen nur wenige Min. innehalten lassen, stets sehr dünn ist. Ist die Schmelze, teilweise ein Gemisch von NaCl u. KCl , reich an WO_3 , so scheiden sich bei der Elektrolyse Alkali- W -Bronzen ab, bei 55 g H_2WO_4 in 100 g Schmelzmittel noch reines W , bei 60 g bereits eine rote Bronze. Durch Variation von WO_3 -Konz. u. Stromdichte gelangt man zu violetten, roten, blauen u. gelben Bronzen. Elektrolyse mit Kathode aus geschmolzenem Pb führt zu einer W - Pb -Legierung. Zn u. Al verdrängen W aus der Schmelze unter B. der entsprechenden Bronzen, nicht jedoch Fe , so daß dem W in der Spannungsreihe der Platz zwischen Zn u. Fe zukommt. Stützt man der Schmelze die Oxyde oder Chloride von Ni oder Co zu, so erhält man bei der Elektrolyse die entsprechenden Legierungen. Glatte Überzüge auf Ni wurden auch durch Elektrolyse einer Schmelze von 1 g WO_3 in 50 g Na_2WO_4 erhalten. (Trans. Amer. Electr. Soc. 46. 11 S. 1924. Madison [Wisc.], Univ. of Wis.)

HERTER.

Edgar F. Smith, *Natriumwolframate*. (Vgl. Journ. Americ. Chem. Soc. 44. 1922; C. 1923. I. 26.) $4\text{Na}_2\text{O}$, 10WO_3 , $23\text{H}_2\text{O}$ 4:10-Salz wird von dem 5:12-Salz durch getrennt, daß jenes nach vollständiger Dehydratation in W . l. ist, dieses aber nicht. Das 5:12-Salz kann aus der sd. Lsg. des 1:1-Salzes mittels HCl (vgl. SCHEIBLER, Journ. f. prakt. Ch. 83. 278. [1861]) alleine erhalten werden, wenn $[\text{H}^+]$ der Lsg. zwischen 10^{-6} u. 10^{-7} liegt; bei $[\text{H}^+] = 10^{-8}$ entsprachen die zuerst erhaltenen Krystalle der Zus. 9:22, das Filtrat hiervon ergab das 5:12-Salz. Mit H_2COOH wurde ebenfalls das 5:12-Salz erhalten. — Leitfähigkeitsmessungen an mit fast auf 100° erwärmten Lsgg. des 1:1-Salzes, die allmählich mit HCl versetzt wurden, lassen auf B. des 3:7, 5:12 u. 4:10-Salzes schließen. Das 3:7-Salz besteht aus 32,36 g 1:1-Salz + 20,6 ccm HCl (1 ccm = 0,1987 g HCl), das 5:12-Salz braucht zu seiner B. 21,0 ccm, das 4:10-Salz 21,6 ccm Säure. Die Salze $\text{Na}_2\text{O} \cdot 2\text{WO}_3$ (2) u. $\text{Na}_2\text{O} \cdot 3\text{WO}_3$ (1:3) konnten durch wechselnde Zugabe von WO_3 zu $\text{Na}_2\text{O} \cdot \text{WO}_3$ experimentell nicht erhalten werden, sondern es entsteht nur das 5:12-Salz. Diese Verb. (*Natriumparawolframat*) ist nach Verss. des Vf. u. den Ergebnissen der Arbeiten von SCHEIBLER (Journ. f. prakt. Ch. 83. 283) u. v. KNORRE (Journ. prakt. Ch. 27. 49 [1883]) als Doppelsalz des 1:1- u. 1:3-Salzes aufzufassen. Quantitative Unterss. über Zers. u. B. des 5:12-Salzes beweisen, daß seine Zus. die Formel $8(\text{Na}_2\text{O} \cdot \text{WO}_3) + 7(\text{Na}_2\text{O} \cdot 4\text{WO}_3) + aq$ entspricht. Das 5:12-Salz kann synthet. erhalten werden, wenn eine wss. Lsg. von 8 Mol des 1:1-Salzes mit je einer solchen von 7 Mol des 1:4-Salzes über Nacht stehen bleibt. Bei Darst. des 5:12-Salzes hat Vf. oft im Filtrat bei schnellem Eindampfen das von MARIIGNAC (Ann. Chim. et Phys. [3] 69. 5. [1863]) beschriebene $3\text{Na}_2\text{O} \cdot 7\text{WO}_3 + 16$ (oder 21) H_2O erhalten. Die auf Grund von Hydrolyseergebnissen gewonnene Auffassung, daß dieses Salz entstanden sein könnte nach: $5(\text{Na}_2\text{O} \cdot \text{WO}_3 + 2\text{H}_2\text{O}) + 4(\text{Na}_2\text{O} \cdot 4\text{WO}_3 + 9\text{H}_2\text{O}) = 3(3\text{Na}_2\text{O} \cdot 7\text{WO}_3 + 16\text{H}_2\text{O})$ ließ sich durch die Synthese bestätigen; wurden das 1:1 u. das 1:4-Salz im Verhältnis 1:2,83 zusammengebracht, so kristallisierte das 3:7-Salz aus. Aus dieser Synthese ist weiterhin zu schließen,

daß die *para-Wolframate* die Formel des 5:12-Salzes besitzen. Synthesen nach den Gleichungen: $3\text{Na}_2\text{O} \cdot 2\text{WO}_3 = 2(\text{Na}_2\text{O} \cdot \text{WO}_3) + \text{Na}_2\text{O} \cdot 4\text{WO}_3$ u. $\text{Na}_2\text{O} \cdot \text{WO}_3 + 2(\text{Na}_2\text{O} \cdot 4\text{WO}_3) = 3(\text{Na}_2\text{O} \cdot 3\text{WO}_3)$ ließen sich nicht verwirklichen. — Da das 1:4 u. Salz durch überschüssiges Alkali in das 1:1-Salz übergeht, wurde versucht, erstens durch Zugabe berechneter Mengen Alkali in das 1:3-Salz zu verwandeln; es entstand jedoch das 4:10-Salz, wohl infolge von Hydrolyse des intermediär gebildeten 1:3-Salzes. — Wird eine wss. Na_3PO_4 -Lsg. zu einer äquivalenten Lsg. des n. Wolframats gegeben, so findet beim Stehen in der Kälte selbst nach Wochen keine B. eines Phosphorwolframats statt. Wird das Gemisch der Lsgg. aber angesäuert (HCl) so scheidet sich nach 10-std. Stehen *phosphorwolframsaures Na* ab. Es ist möglich, daß zur B. des komplexen Salzes das Wolframat als meta-Salz vorhanden sein muß, worüber weitere Verss. Aufschluß geben können. — Die Annahme v. KNORRES (Ber. Dtsch. Chem. Ges. **18**. 326 [1885]), daß das *para-Wolframat* in zwei Formen existiert, ist nicht richtig; werden k. Lsgg. des 5:12 Wolframats in k. BaCl_2 -Lsgg. versetzt, so ist in dem Nd. das Verhältnis $\text{BaO}:\text{WO}_3$ auch gleich 5:12, das Salz enthält 24–26 Mol W.; beim Kochen der Lsg. des 5:12-Ba-Salzes geht das Verhältnis $\text{BaO}:\text{WO}_3$ in 5:8 oder 7:13, je nach dem Grade der Hydrolyse, über. Die durch Zugabe von *Mn*-, *Co*-, *Sr*- u. *Cd*-Salzlsgg. zu einer k. Lsg. des 5:12-Na-Wolframats erhaltenen Ndd. entsprechen in ihrer Zus. ebenfalls dem Verhältnis 5:12. Die analyt. Unters. der Wolframate wurde so durchgeführt, daß das Salz erhitzt wurde; Gewichtsverlust = H_2O -Gehalt. Der Rückstand wurde in einer Porzellanschale heißen Dämpfen von CCl_4 ausgesetzt, wodurch WO_3 entfernt wurde u. NaCl als Rückstand blieb; dieses wurde auf Na_2O umgerechnet u. in der Differenz mit dem wasserfreien Salz WO_3 ermittelt. (Chem. News **129**. 198–9, 207–8. 224–25. 240–42. 257–58. 286–87. 1924. Univ. of Pennsylvania.) H.

C. Mineralogische und geologische Chemie.

Felix Edgar Wormser, *Abbau, Anreicherung und Handel von Granat*. Beschreibung der Vv. u. Eigenschaften des Granats. Außerdem beschreibt Vf. die Aufbereitung des Gesteins sehr ausführlich. (Engin. Mining Journ. **118**. 525–1. 1924.)

ENSZLIN

Fritz Heide, *Über den Vaterit*. Der Vaterit, kleine 3–10 μ große Sphäroide, wird entgegen den Befunden anderer Autoren als selbständige Modifikation von CaCO_3 behauptet u. seine Existenz durch eine Analyse, durch die mögliche Umwandlung in Aragonit u. durch ein Debye-Scherrer Diagramm sichergestellt. Er ist nach den angegebenen Darstellungsmethoden stets wasserhaltig. v. OHLSHAUSEN fand für den Vaterit ein hexagonales Gitter mit $a = 4,120 \text{ \AA}$ u. $c = 8,556 \text{ \AA}$. $\alpha \text{ Ca}_3$ konnte nicht festgestellt werden. (Zentralblatt f. Min. u. Geol. **1924**. 641–51. (t. tingen, Univ.)

ENSZLIN

Francis A. Thomson, *Goldadern von mehreren Orten des Batholithen von Idaho*. Das V. ist an die Pegmatite des Granitbatholithen gebunden u. ergab 67,9–633 g Gold pro Tonne. (Eng. Mining Journ. **118**. 533–40. 1924.)

ENSZLIN

G. A. F. Molengraaff und **A. L. Hall**, *Alkaligranit, Nephelinsyenit, Canadit und Foyait im Vrededorst-heuweland, Südafrika*. Beschreibung u. Analyse der Gesteine. (Koninkl. Akad. van Wetensch. Amsterdam, Wisk. en Natk. Afd. **33**. 509–30. 1924. Delft, Geol. Lab.)

ENSZLIN

Karl Preclik, *Über einen Almandin-Cordierithornfels unbekannter Herkunft*. Es handelt sich um ein doppelt umgewandeltes Gestein. Der darin enthaltene Granat besteht aus 78,3% Almandin u. 14,7% Pyrop. (Zentralblatt f. Min. u. Geol. **1924**. 652–64. 1924. Graz, Univ.)

ENSZLIN

H. Hirsch, *Bemerkungen zu den Ausführungen von J. Joly „Über die Radioaktivität der Gesteine“*. (Vgl. JOLY, *Naturwissenschaften* 12. 693; C. 1924. II. 572.) Hinweis auf die von JOLY nicht berücksichtigte deutsche Literatur, welche teilweise im Widerspruch zu dessen Ausführungen steht. (*Naturwissenschaften* 12. 39—40. 1924. Spiez.)

BECKER.

B. Gudden, *Bemerkungen zu den Ausführungen von J. Joly „Über die Radioaktivität der Gesteine“*. (Vgl. vorst. Ref.) Hinweis auf die von JOLY nicht zitierten Arbeiten MÜGGES, welcher die pleochroit. Höfe der Gesteine schon vor 17 Jahren durch radioaktive Erscheinungen deutete. (*Naturwissenschaften* 12. 940. 1924. Höttingen.)

BECKER.

D. Organische Chemie.

N. D. Zelinsky, *Über die Kontaktkondensation des Acetylen*. (*Journ. Russ. phys.-Chem. Ges.* 55. 140—59. 1923/24. — C. 1924. I. 1170.)

BIKERMANN.

S. S. Nametkin, *Zur Frage über den Mechanismus der Oxydation ungesättigter Verbindungen mittels Chamäleon*. (*Journ. Russ. Phys.-Chem. Ges.* 55. 70—74. 1923/24. C. 1924. II. 1574.)

BIKERMANN.

Charles Moureu und René Chaux, *Darstellung der β -Chlorpropionsäure*. (Vgl. MOUREU, MURAT u. TAPIER, *Ann. de Chimie* [9] 15. 221; C. 1921. III. 1228.) Die Darst. geschieht, wie l. c. angegeben, durch Oxydation von *Acroleinchlorhydrat* mit rauchender HNO_3 (D. 1,49); Abbildung des App. im Original. Die Rk. wird durchgeführt, indem man bei ca. 30—35° das *Acroleinchlorhydrat* zur HNO_3 tropfen läßt (nicht umgekehrt) u. ständig rührt. Nach beendeter Zugabe wird in einem offenen Kolben allmählich bis zum Kp. des Wasserbades erhitzt. Die Isolierung der *Chlorpropionsäure* wird bewirkt, indem das Reaktionsgemisch bei ca. 20—25 mm (40—70° Ölbad) dest. wird; sobald wenig HNO_3 übergeht, steigert man die Temp. auf 100°. Der bei dieser Temp. zurückbleibende Anteil wird bei 20 mm dest.; Vorlage eines Kühlers ist nicht erforderlich. Bis 105° übergehendes Prod. Vorlauf, die β -Chlorpropionsäure geht bei Kp.₂₀ 105—107° über; Ausbeute 65% auf *Acrolein* bezogen. Durch Anwendung von HNO_3 , die bei der Dest. keinen Rückstand hinterläßt, kann die Ausbeute auf 70% gesteigert werden. (*Bull. Soc. chim. de France* [4] 35. 1360—64. 1924.)

HABERLAND.


Alice Duchesne und Marcel Delépine, *Autoxydation des Crotonaldehyds. Darstellung von Crotonsäure*. Die Darst. von *Crotonsäure* gelingt, wenn durch einige hintereinander geschaltete Gefäße mit Crotonaldehyd ein Strom von O_2 geleitet wird. Schütteln u. gelindes Erwärmen (70°) beschleunigt die Oxydation. Nach 3—4tägigem Durchleiten waren etwa 80% des Aldehyds oxydiert; es ergab sich jedoch, daß nicht nur *Crotonsäure*, sondern auch *Essigsäure* u. eine harzige, bei der Dest. stattfindende Zers. statt; Veresterung mit $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH} + \text{HCl}$ gibt eine kleine Menge einer gelben Fl. von caramelatigem Geruch, Kp.₁₈ 125—170°. Die Isolierung der *Crotonsäure* aus dem Oxydationsgemisch erfolgt am besten durch Dest. mit Wasserdampf, wodurch unveränderter Aldehyd übergetrieben wird; durch Abkühlen auf 0° wird aus dem Rückstand *Crotonsäure* erhalten, die man weiter reinigen kann, indem man sie unter dem gleichen Gewicht W. schmelzt u. durch Abkühlen isoliert; blasser Blättchen, F. 71—72°; Ausbeute auf Aldehyd bezogen 40—50%. Zugabe von Katalysatoren (Fe_2O_3 [Colcothar] oder $\text{Mn}(\text{OH})_2$) beschleunigt die Oxydation, jedoch die Ausbeute zu verbessern. — Bemerkenswert ist das Verh. des Aldehyds in Lösungsmittel bei der Oxydation. Von 40 ccm Aldehyd in 10, 20, 30, 40 ccm A. hatten sich nach 120-stünd. Durchleiten von O_2 oxydiert 67, 59, 50, 46% der Aldehydmenge. A. zur Lsg. benutzt, so trat keine Oxydation ein.

mehr ein. Ähnliche Ergebnisse wurden mit W., Ä., PAe. u. Bzl. erhalten. Lsg. des Aldehyds (1 Teil) in 15 Teilen A., W., Ä., Bzl. u. Essigsäure wurden 2 Mona mit O₂ in einer durch Hg abgesperrten Glasglocke in Berührung gelassen; es ergab sich, daß die alkoh. u. wss. Lsg. nach dieser Zeit nicht oxydiert worden waren bei den anderen Lösungsmm. (besonders Essigsäure) hatte O₂ abgenommen; wurden gleiche Teile Aldehyd u. A. analog behandelt, so trat Oxydation ein. Der Befund, daß von einer gewissen Verd. ab keine Oxydation des Aldehyds stattfindet, wovon Vff. so erklärt, daß die Aldehydmoll. sich mit einer Hülle des Lösungsm. umgeben, die um so leichter zu bilden ist, je mehr Lösungsm. vorhanden ist, infolgedessen nicht reagieren können. — Verss. Crotonsäure durch Oxydation d. Aldehyds mit HNO₃, CrO₃, PbO oder HgO darzustellen, führten nicht zu befriedigenden Ergebnissen. Wird der Aldehyd mittels HCl in β -Chlorbutyraldehyd übergeführt, dieser durch HNO₃ oxydiert u. die β -Chlorbuttersäure durch NaOH in Crotonsäure übergeführt, so erhält man (auf β -Chlorbutyraldehyd berechnet) 40 bis 45% Ausbeute. Da die Oxydation des Chloraldehyds eine heftige Rk. ist, kann nur mit kleineren Mengen gearbeitet werden. (Bull. Soc. Chim. de France [4] 3 1311—17. 1924. Paris, Faculté de Pharmacie.) HABERLAND.

E. Darmais und **A. Honnelaitre**, *Über einige Eigenschaften des Ammoniumdimolybdomalats*. (Vgl. DARMAIS u. PÉRIN, C. r. d. l'Acad. des sciences 176. 39 C. 1923. III. 1554.) Beim Ansäuern der Lsgg. von Ammoniumdimolybdomalat nimmt die (rechte) Drehung ab u. strebt einem konstanten negativen Werte zu. Der Umschlag der rechten in die linke Drehung kann aber durch Neutralisation der Säure rückgängig gemacht werden, was beweist, daß der Komplex durch die Säure nicht gänzlich zerstört wurde. Die Wiederherst. der ursprünglichen Drehung u. der ursprünglichen Rotationsdispersion erfolgt bei der Neutralisation so schnell, daß man den Komplex als Indicator benutzen kann. Beispiel: zu 20 ccm Lsg. enthaltend 0,4 g Ammoniumdimolybdomalat, wurden 5 ccm HCl (1,187-n.) zugesetzt u. darauf x ccm NaOH (1,1-n.) zusetz. Die Drehung α (die Rohrlänge 20 cm, grüne Hg-Linie) war bei $x = 5,30$ 9,53°; $x = 5,35$ 9,545°; $x = 5,45$ 8,92°; das Maximum beobachtet: bei $x = 5,36$, berechnet: bei $x = 5,38$. — Im allgemeinen erniedrigen die Säuren die Drehung ihrer Stärke gemäß; nur die mit MoO₃ ein Verb. gebenden Säuren weisen eine stärkere Wrkg. auf. So wird α (gelbe Hg-Linie einer 2%ig. Lsg. des Komplexes durch 0,001 Mol. Oxalsäure in 100 ccm von +8, auf -0,20 herabgesetzt; bei $> 0,0014$ Mol. ist α konstant (-1,02 bis 1,10). Bei Verdunsten setzt sich ein Ammoniumoxalomolybdat, MoO₃·NH₄·HC₂O₄, ab. Ähnlich wirken Phenylglykolsäure (Änderung des Vorzeichens von α durch ca. 0,0017 Mol. in 100 ccm), Citronensäure, Milchsäure u. Weinsäure; die Wrkg. der β -Oxybuttersäure entspricht ihrer Stärke, so daß eine besondere Wirksamkeit nur den α -Oxysäuren zukommt. Mannit, dessen Verb. mit MoO₃ bekannt ist (TANRET), erweist sich als sehr wirksam (0,002 Mol. in 100 ccm setzen α auf 0,95 herab). Brenzcatechin verringert α bei derselben Konz. auf 1,80 ähnlich verhalten sich Pyrogallol, Gallussäure u. ihr Äthylester; Polyphenole mit OH in m- u. p-Stellung sind unwirksam, die Salicylsäure — entsprechend ihrer Affinitätskonstante. (C. r. d. l'Acad. des sciences 179. 629—32. 1924.) BIKERMAN.

Marston Taylor Bogert und **Edward Mark Slocum**, *Die Synthese einiger neuer höherer aliphatischer Glykole und ungesättigter primärer Alkohole*. Durch Kondensation von Na-Acetessigestern u. den entsprechenden Jodhydrinacetaten wurde nach untenstehendem Schema 3-Aceto-1-propanol u. 4-Aceto-1-butanol dargestellt, aus diesen die tert. Glykole, die bei der Vakuumdest. die ungesätt. primären Alkohole geben. Bei Anwendung verschiedener Halogenhydrinester beobachteten Vff., daß die Cl-Derivv. vorzugsweise mit der Enol-, die Br-Derivv. teils mit der Enol-, teils mit der Keto-, u. die J-Derivv. vorzugsweise mit der Ketoform reagieren. — Ko-

ensation von Isoamylacetessigsäureäthylester mit Jodäthylacetat u. Hydrolyse des Kondensationsprod. führte zu α -Isoamyl- γ -oxybuttersäure, die bei der Vakuumdest. das entsprechende Lacton gab. — Der Umsatz zwischen Halogenhydrinestern mit Aldehyden u. Ketonen in Ggw. von Mg gelingt nur, wenn das Kondensationsprod. in Ä. ist; anderenfalls entstehen harzartige Prodd. u. die Rk. kommt bald zum Stillstand. Aus Mesityloxyd, γ -Brompropylacetat u. Mg wurde erhalten 4,6-Dimethyl-3,5-heptadien-1-ol. — Äthylen- u. Trimethylenbromid reagieren bei niedriger Temp. n. mit Mg; aus ersterem + Mg + n. Butyraldehyd wurde 4,7-Decandiol erhalten.




Versuche. Die Umsetzung von $\text{C}_2\text{H}_5\text{MgJ}$ + Äthylenchlor- oder Jodhydrin + Acetophenon in Ä. führt beim Erhitzen nur zur B. von ungesätt. Gas, die Mg-Verb. wurde zum größten Teil nicht angegriffen. — 4,6-Dimethyl-3,5-heptadien-1-ol, $\text{C}_{10}\text{H}_{16}\text{O} = (\text{CH}_3)_2\text{C}:\text{CH}\cdot\text{C}(\text{CH}_3):\text{CH}\cdot\text{CH}_2\cdot\text{CH}_2\text{OH}$, das aus Mesityloxyd, γ -Brompropylacetat u. Mg in Ä. erhaltene Additionsprod. wird hydrolysiert u. im Vakuum dest., hellgelbes Öl, Kp.₁₈ 78–80°, Geruch cedernartig; unl. in W., l. in A., Ä. u. Aceton; Br in CCl_4 wird entfärbt; Acetat hat denselben Geruch. — Werden 2 Mol. γ -Jodpropylacetat + 1 Mol. Methyl-n-butylketon + 1 Mg in H_2 -Atmosphäre in Abwesenheit von Ä. auf 130–135° erhitzt, so entsteht eine feste Mg-Verb., $\frac{1}{3}$ des Mg blieb unverändert; Hydrolyse der Mg-Verb. u. nachfolgende Vakuumdest. gab bei Kp.₂₀ 60° einen ungesätt. KW-stoff u. vielleicht 30% eines Alkohols. Methylmethyl-, Methylisoamyl- u. Methylhexylketon verhielten sich ähnlich. Günstigere Ergebnisse wurden auch nicht erhalten, wenn statt Mg amalgamiertes Mg benutzt wurde. In diesem Falle trat teilweise Red. ein: aus γ -Brompropylacetat + n-Heptylaldehyd + Amalgam in Ä. wurden 5% n-Heptylalkohol, Kp.₂₅ 70–82°, erhalten. — Wird der Methylenäther des Trimethylenjodhydrins, $\text{CH}_3(\text{OCH}_2\cdot\text{CH}_2\cdot\text{CH}_2\text{J})_2$, in Ä. mit Mg u. Methylisoamylketon behandelt, so tritt auch nach längerer Zeit keine Rk. ein; nach Entfernen des Ä. u. Erhitzen des Rückstandes bildet sich eine in Ä. unl. Mg-Verb., die durch W. oder A. langsam zers. wird; Dest. des Zersetzungsprod. gab anscheinend (durch Red. des Ketons entstandenes) 5-Methyl-2-hexanol, Kp. 145–155°. — 4,7-Decandiol, $\text{C}_{10}\text{H}_{20}\text{O}_2$, zähes, gelbes Öl, Kp.₁₅ 143–147°; Geruch angenehm fruchtartig; leichter als W., das Acetat riecht ähnlich. — n-Heptylaldehyd reagiert mit Mg u. Trimethylenbromid energ.; es wurde das Heptadecanglykol(?), Kp.₁₂ ca. 200°, u. eine nicht identifizierte Verb. Kp.₁₂ ca. 125° erhalten. — Kondensation von Na-Acetessigester + Äthylenchlorhydrin in A. (8–10 Stdn. kochen), Hydrolyse des Kondensationsprod. mit 5% HCl gab 20% Aceton, Hydrolyse mit $\text{Ba}(\text{OH})_2$ ab 3% Butyrolacton. — γ -Brompropylacetat + Na-Acetessigester gaben analog im größten Teil Aceton. — δ -Acetobutanol; Darst. durch Hydrolyse des aus γ -Jodpropylacetat + Na-Acetessigester in A. erhaltenen Kondensationsprod.; die Reinigung geschieht am besten, indem das Ketol bei Kp._{20–30} 109° in Methyläthyldiisopropyläther u. f. gespalten, u. dieses danach hydratisiert wird; Kp.₁₅ des Ketols 111–118°. — δ -Acetopropanol, Kp.₁₅ 100–106°. — 5-Methyl-1,5-heptandiol, aus Acetobutanol + $\text{C}_2\text{H}_5\text{MgBr}$, Kp.₁₂ 140–150°; Diacetat hat denselben Kp., gibt bei 500 mm dest. Acetat des Methylheptenols. — 5-Methyl- Δ^4 oder δ -1-heptenol, $\text{C}_8\text{H}_{16}\text{O} = \text{CH}_3\cdot\text{CH}_2\cdot(\text{CH}_3):\text{CH}\cdot\text{CH}_2\cdot\text{CH}_2\cdot\text{CH}_2\text{OH}$, Darst. aus vorigem Diol durch Dest. bei 500 mm; Kp.₁₅ 92–94°; Geruch geraniumartig; unl. in W., l. in A., Ä. u. Aceton; durch konz. H_2SO_4 Verharzung. — Acetobutanol u. i- $\text{C}_2\text{H}_7\text{MgJ}$ gaben anscheinend das entsprechende hochsd. Glykol, das bei der Dest. eine ungesätt. Verb. lieferte, die dem erwarteten Nonenol jedoch nicht entsprach. — 5-Methyl-1,5-nonandiol, aus Acetobutanol + n. $\text{C}_4\text{H}_9\text{MgJ}$; Kp.₁₄ 145–155°, hierbei unter W.-Verlust übergehend

in 5-Methyl- Δ_4 oder 5-1-nonenol, $C_{10}H_{20}O = CH_3(CH_2)_3C(CH_3):CH(CH_2)_3OH$, öli Kp.₁₁ 109—111°, Geruch süß arom., unl. in W., l. in A., Ä., Aceton. — 5,7-Dimethyl-1,5-octandiol, aus Acetobutanol + i-C₄H₉MgJ; Kp.₁₂ ca. 150°, hierbei übergehend in 5,7-Dimethyl- $\Delta^{(5)}$ -1-octenol, $C_{10}H_{20}O$, ölig, Kp.₁₂ 103—108°, Geruch angenehm arom. — 4,7-Dimethyl-1,4-octandiol aus Acetopropanol + i-C₅H₁₁MgJ; Kp.₁₅ 150°; nebenbei entsteht Diisoamyl. — 4,7-Dimethyl- $\Delta^{(4)}$ -1-octenol, $C_{10}H_{20}O$, aus vorigem Glykol durch Dest. bei 250 mm; Kp.₁₂ 107—109°; hellgelbes Öl, Geruch süß-aromat. — Äthylester der α -Isoamyl- α -(β' -acetoxyäthyl)-acetessigsäure, $CH_3 \cdot CH(CH_3) \cdot CH_2 \cdot CH_2 \cdot C(COOC_2H_5)(COCH_3)CH_2CH_2OCOC_2H_5$, aus Na-Isoamylacetessigester Jodäthylacetat in A. — α -Isoamyl- γ -oxybuttersäure, $C_9H_{18}O_3$, aus vorigem mit konz. H₂SO₄; unl. in W.; Äthylester, ölig, Geruch fruchtartig. — α -Isoamylbutyrolacton, $C_9H_{16}O_2$, zähes farbloses Öl, Kp.₁₂ 131—134°; Geruch pfirsichartig; unl. k. verd. NaOH, l. beim Kochen; durch verd. H₂SO₄ Verharzung; mit Acetanhydrid keine Rk. — Äthylester der α -Isoamyl- α -(γ' -acetoxypropyl)-acetessigsäure aus γ -Jodpropylacetat + Na-Isoamylacetessigester; rötliches Öl von süßem Geruch. Durch Hydrolyse mittels Ba(OH)₂ erhaltenes Öl hatte nach mehrwöchigem Stehen keine wesentliche Veränderung erfahren. (Amer. Perfumer 18. 621—26. 1924. Columbia Univ.)

HABERLAND.

A. Blanchetière, Über die Konstitution der Glutaminsäureanhydride. (V. Bull. Soc. Chim. de France [4] 31. 1045; C. 1923. III. 1084.) Das Ag-Salz entsteht durch Erhitzen von Glutaminsäure + Glycerin über 150° erhaltenen tricycl. Peptids ist bei gewöhnlicher Temp. l. in der 3—4-fachen Gewichtsmenge W., hieraus sph. Konglomerate; die wss. Lsg. scheidet beim Kp. metall. Ag ab; wird die Lsg. im Vakuum über H₂SO₄ konz., so findet ebenfalls teilweise Zers. statt, man erhält selbst unter Ausschluß von Licht, mehr oder weniger gefärbte Krystalle. In Biuretreakt. fällt mit I, je nach den Versuchsbedingungen, positiv oder negativ aus.



Alkal. Hydrolyse von I führt zu einer krystallisierten u. einer amorphen Verb. Beide sind als Glutamylglutaminsäure aufzufassen, u. zwar entspricht die krystallisierte Verb. wahrscheinlich dem n. Peptid (II); Ba-Salz aus A. oder W. Nadelbüschel, nicht hygroskop., aus wss. Lsg. durch A. fällbar; Cu-Salz, $(C_{10}H_{18}O_7N_2)C$, aus W. mit 2H₂O krystallisierend, blau, aus wss. Lsg. durch A. fällbar; wss. Lsg. gibt mit Pb-Acetat keinen Nd. — Die amorphe Säure (III) bildet nicht krystallisierende Ba-, Pb-Cu-Salze. Aus wss. Lsg. des Na- oder Ba-Salzes wird mittels Pb-Acetat ein gelatinöser Nd. erhalten, l. im Überschuß des Acetats. (Bull. Soc. Chim. de France [4] 35. 1317—25. 1924.)

HABERLAND.

C. N. Riiber, Lösungsvolumen und Refraktionskonstante des α - und β -Methylglucosids. (IV. Mitteilung über Mutarotation.) (III. vgl. Ber. Dtsch. Chem. Ges. 1919; C. 1924. II. 2023.) Die zu den Messungen verwendeten Präparate von α - und β -Methylglucosid wurden durch Umkrystallisieren so lange gereinigt, bis das Verhältnis zwischen dem spez. Gew. u. dem Brechungsindex der 10%ig. wss. Lsg. konstant bleibt. Die so gereinigte α -Verb. zeigte F. 166° u. $[\alpha]_D^{20} = +158,9^\circ$, die β -Verb. F. 105° u. $[\alpha]_D^{20} = -34,2^\circ$. Es ergab sich für eine 10%ig. Lsg. von α -Methylglucosid D.₂₀⁴ 1,031022 u. $n_D^{20} = 1,34680$, für eine 10%ig. Lsg. von β -Methylglucosid D.₂₀⁴ 1,030670 u. $n_D^{20} = 1,34688$. Setzt man das Mol.-Gew. mit 194,2 an, so ergibt sich für die α -Verb. als Lösungsvol. $v_m = 132,61$ ml., für die β -Verb.

33,26 ml. als Mol.-Refr. $M = 70,17$ bzw. $70,55$. Vergleicht man diese Ergebnisse mit den früher für α - u. β -Glucose gefundenen Werte, so findet man folgende Differenzen:

α -Methylglucosid — α -Glucose	v_m 21,38 ml.	M 7,49
β -Methylglucosid — β -Glucose	v_m 21,61 ml.	M 7,48

Diese Ergebnisse beweisen aufs Neue, daß das α -Methylglucosid der α -Glucose, das β -Methylglucosid der β -Glucose in bezug auf Struktur u. Konfiguration entspricht. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. **57**. 1797—99. 1924. Drontheim, Techn. Hochsch.) OHL.


Thomas Weston Johns Taylor und **Raymond Francis Bomford**, *Die scheinbare Wasserstoffionenkonzentration Rohrzucker enthaltender Lösungen*. Die Messungen wurden mit Lsgg. von 10 g Rohrzucker in 100 ccm Fl. ausgeführt, die in bezug auf ihren HCl-Gehalt $\frac{1}{10}$ -n. waren. Es wurde mit $\frac{1}{10}$ -n. Calomel Elektrode u. gesätt. Cl-Brücke gearbeitet. Vers.-Temp. 25° . Die EK. des Systems: $Hg | Hg_2Cl_2 | 10 KCl |$ gesätt. $KCl | n/10 HCl | H_2$ (760 mm). Pt wurde zu 0,4000—0,4002 V gefunden. In Ggw. von Rohrzucker nimmt die EK. allmählich um ca. 1% ab, parallel mit der Inversion des Rohrzuckers. In Ggw. von NaCl verläuft dieser Prozeß beschleunigt. Dem entspricht also eine Zunahme der scheinbaren $[H^+]$ um ca. 7% . Da aber die Fehlergrenze ca. 8% beträgt, lassen sich aus diesem Effekt keine zuverlässigen theoret. Schlüsse ziehen. (Journ. Chem. Soc. London **125**. 2016—17. 1924. Oxford, Dyson Perkins Labor.) OHLE.

Angelo Angeli, *Analogien im Verhalten einiger Derivate des Benzols und der entsprechenden Derivate der aliphatischen Reihen*. Vf. bringt hier eine zusammenfassende Darst. der früher in verschiedenen Abschnitten veröffentlichten theoret. Betrachtungen über das chem. Verh. der Verb. vom Typus A-B einerseits, der entsprechenden o- u. p-substituierten Deriv. arom. KW-stoffe vom Typus A-R-B andererseits. (Letzte Arbeit vgl. Atti R. Accad. dei Lincei, Roma [5] **33**. I. 109; 1924. II. 303.) (Memorie delle R. Accademia naz. dei Lincei [5] **14**. 627—58. 1924. Florenz, Inst. di Studi sup. Sep.) OHLE.

A. Leulier, *Über einige chlorierte oder bromierte Derivate, dargestellt mittels der entsprechenden Halogenwasserstoffsäuren und Wasserstoffsuperoxyd*. Vf. hat in seiner Dissertation (Lyon, 1923) gezeigt, daß H_2O_2 u. HBr oder HCl reagieren nach $H \cdot Hal + H_2O_2 = (Hal)_2 + 2H_2O$. Das freigemachte Halogen kann zu Halogenierungen dienen. Dargestellt wurden: *p*-Chloracetanilid, $CH_3CONH \cdot C_6H_4Cl$, aus g Acetanilid + 50 ccm HCl ($= 46,72\%$ HCl) + 25 ccm H_2O_2 ($2,3\%$ ig.), F. 173° (Böck Maquenne, wie alle anderen F.-Angaben). Wird statt H_2O_2 Perhydrol angewandt, so entsteht ein Gemisch von Mono- u. Dichlorderiv., F. 161 — 162° . — *p*-Chlor-*m*-nitroanilin, $C_6H_2Cl_2NO_2NH_2$, aus 10 g *m*-Nitroanilin + 200 ccm HCl + 50 ccm H_2O_2 (je 50 ccm im Laufe von 24 Stdn. zugegeben); aus sd. W., F. 79 bis 80° . — *2,6*-Dichlor-*p*-nitroanilin, $C_6H_2Cl_2NO_2NH_2$, aus 5 g *p*-Nitroanilin + 50 ccm HCl + 4 ccm Perhydrol, F. 185° , Ausbeute ca. 74% . — *Chlordinitroanilin*, $C_6H_2(O_2)_2NH_2Cl$, aus 5 g *1,2,4*-Dinitroanilin + 50 ccm HCl + 25 ccm H_2O_2 , F. 131 bis 132° . — *Chlorisatin*, $Cl \cdot C_6H_3 \begin{smallmatrix} CO \\ \diagup \diagdown \\ N \end{smallmatrix} \rangle COH$, aus 2 g Isatin + 25 ccm HCl + 1 ccm Perhydrol, F. 225° , Lsg. in Ä. orange. — *Chloracetyl-o-toluidin*, $CH_3CONH \cdot C_6H_3 \cdot (H_2)Cl$, aus 4,5 g Acetyl-toluidin + 50 ccm HCl + 25 ccm H_2O_2 , F. 138° . — *Chlor-*o*-toluidin*, $C_6H_2NH_2CH_3NO_2Cl$, aus 5 g *1,2,5*-Nitrotoluidin + 50 ccm HCl + 50 ccm H_2O_2 , F. 161 — 162° ; es wurde eine unreine Verb. erhalten; nach Waschen mit HCl-haltigem W., F. 168° (3-Chlor-5-nitroderiv.?). — *Chlorphenacetin*, aus 10 g Phenacetin + 100 ccm HCl + 100 ccm H_2O_2 , F. 119 — 120° . — *5-Bromacetyl-toluidin*, $H_3CONHC_6H_3CH_3Br$, aus 5 g Acetyl-toluidin + 6 ccm HBr ($= 90\%$ HBr) + 50 ccm H_2O_2 , F. 156° , Ausbeute $71,9\%$. — *3-Brom-5-nitrotoluidin*, $BrC_6H_3NO_2NH_2 \cdot H_3$, aus 4,5 g *1,2,5*-Nitrotoluidin + 3 ccm HBr + 20 ccm H_2O_2 , F. 179° nach

zweimaligem Waschen mit 1% HBr-haltigem W. (Bull. Soc. Chim. de France) 35. 1925—30. 1924.) HABERLAND.

see errata v. 97-0.3/36
P. Ramart und Amagat, Molekulare Umlagerungen. Darstellung und Dehydratation einiger α, α -Diaryläthanol und Alkyl diaryläthanol. (Vgl. RAMART, C. r. l'Acad. des sciences 179. 400; C. 1924. II. 1788.) Nach dem Verf. von RAMART (C. r. d. l'Acad. des sciences 178. 396; C. 1924. I. 2779) dargestellte Benzylester der Diphenylelessigsäure, (*p*-Tolyldiphenylelessigsäure), α, α -Diphenylpropionsäure, α, α -Triphenylpropionsäure geben bei der Red. mittels Na u. A. die primären Alkohole. Bei der Dehydratation zerfallen α, α -Diphenyläthanol u. *p*-Tolyldiphenyläthanol nach Schema A; α, α -Diphenylpropanol geht nach Schema B in Methylstilben über.



Benzylester der *p*-Tolyldiphenylelessigsäure, Kp.₁₂ 252°. — Benzylester der *p*-Tolyldiphenylbenzylelessigsäure, F. 83—84°, Kp.₅ 265°. — *p*-Tolyldiphenylbenzylelessigsäure, F. 145—146°. — Benzylester der α, α -*p*-Tolyldiphenylpropionsäure, Kp.₁₂ 254°; freie Säure, F. 128°. — α, α -Diphenyläthanol, F. 61—62°, Kp.₁₂ 190—192°. — α -Tolyl- α -phenyläthanol, F. 45—46°, Kp.₁₂ 194°. — α, α, β -Triphenylpropanol, F. 79°, Kp.₁₄ 232—23. (C. r. d. l'Acad. des sciences 179. 899—901. 1924.) HABERLAND.

N. D. Zelinsky, Über das Verhalten des 1,1-Dimethylcyclohexans bei der Dehydratisationskatalyse. (Journ. Russ. Phys.-Chem. Ges. 55. 137—39. 1923/24. — C. 1924. III. 433.) BIKERMAN.

S. S. Nametkin, Über den Mechanismus der Anlagerung an die cyclische Doppelbindung. (Beiträge zur Stereochemie alicyclischer Verbindungen. II.) (I. vgl. Journ. Russ. Phys.-Chem. Ges. 54. 177; C. 1923. III. 1155.) Kurze Ref. nach NAMETKIN u. JARZEWA, Ber. Dtsch. Chem. Ges. 56. 1803, NAMETKIN u. IWANOWA, Ber. Dtsch. Chem. Ges. 56. 1805, u. NAMETKIN u. DELEKTORSKAJA, Ber. Dtsch. Chem. Ges. 56. 583 vgl. C. 1923. III. 1217. 1218. 1924. I. 2252. Außerdem wurden mit W. CHOCHRAJAKOWA untersucht: *cis*-Cyclohexandiol-1,2, C₆H₁₀(OH)₂, F. 102—103°, rhon. Platten (aus Chlf. + Bzl.), dargestellt aus Cyclohexenoxyd, C₆H₁₀O, Kp.₇₆₀ 130,3—130,5°, D.₂₀⁴ 0,9663, n_D²⁰ = 1,4519. Das zur Oxydbildung verwendete Cyclohexen, C₆H₁₀, hatte Kp.₇₆₃ 84°, D.₂₀⁴ 0,8112, n_D²⁰ = 1,4469. — *trans*-Cyclohexandiol-1,2, durch Oxydation des Cyclohexens mit KMnO₄ gewonnen, F. 98—99°. (Journ. Russ. Phys.-Chem. Ges. 55. 47—69. 1923/24. Moskau, II. Univ.) BIKERMAN.

S. S. Nametkin und L. Ja. Brüssowa, Über einige der einfachsten Homologen des Cyclohexens und über ihre Derivate. (Beiträge zur Stereochemie acyclischer Verbindungen. III.) (II. vgl. vorst. Ref.) Kurzes Ref. nach Ber. Dtsch. Chem. Ges. 56. 1807; vgl. C. 1923. III. 1219.) Nachzutragen ist: 1,4-Dimethylcyclohexen-4, (CH₃)₂C₆H₈, aus 1,4-Dimethylcyclohexanol-4 bei Erwärmung mit 1 Vol. 50%ig. H₂SO₄ auf dem Wasserbad (3 Stdn.) u. Dest. über Na; Kp.₇₅₆ 127,5—128°, D.₂₀⁴ 0,8024; n_D²⁰ = 1,44. — 1,4-Dimethylcyclohexen-4-oxyd, (CH₃)₂C₆H₈O; aus 6 g voriger Verb. u. 140 ccm äth. Lsg. von Benzoylperoxyd (= 0,9 g akt. O) wurden in 5 Tagen 6 g Oxyd gewonnen; Kp.₇₄₉ 152,5—153°, D.₂₀⁴ 0,9050, n_D²⁰ = 1,4406. — *cis*-1,4-Dimethylcyclohexandiol-4,5, (CH₃)₂C₆H₈(OH)₂, aus dem Oxyd mit 4 Teilen W. (Rohr, 107—111, 4 Stdn.), das Reaktionsprod. mit Wasserdampf destilliert, das Glykol aus dem Rückstande mit Chlf. ausgezogen. Kp.₂₀ 127—128°. F. 88—89° (aus Ä. + Bzn.); e. Konstanz des F. wird nach 3 Umkrystallisierungen erreicht. — Das *trans*-Glykol vgl. WALLACH (LIEBIGS Ann. 396. 265; C. 1913. I. 1600). — 1-Methyl-4-äthylcyclohexen-4, CH₃·C₆H₈·C₂H₅, Darst. wie 1,4-Dimethylcyclohexen-4, Kp.₇₆₀ 151—152°, D.₂₀⁴ 0,8133; n_D²⁰ = 1,4522. — 1-Methyl-4-äthylcyclohexen-4-oxyd, CH₃·C₆H₈O·C₂H₅, Darst. wie 1,4-Dimethylcyclohexen-4-oxyd, Kp.₇₅₆ 177—178°, D.₂₀⁴ 0,9044, n_D²⁰ = 1,44.

cis-1-Methyl-4-äthylcyclohexan-4,5-diol, $\text{CH}_3 \cdot \text{C}_6\text{H}_8(\text{OH})_2 \cdot \text{C}_2\text{H}_5$, flüchtig mit Wasserampf, wird aus dem Reaktionsprod. nach Sättigung mit Pottasche durch Ä.-Chlf.-gemisch extrahiert, F. 82° ; aus Bzl. + PAe. scheiden sich tetragonale Krystalle ab, die eine Kombination des Scalenoeders mit der Bipyramide darstellen. Das α -Glykol vgl. WALLACH, l. c. — An den Verss. nahmen **N. L. Temeschewa** und **N. S. Razsudowa** teil. (Journ. Russ. Phys.-Chem. Ges. 55. 75—83. 1923/24. Moskau, II. Univ.)

BIKERMANN.

N. D. Zelinsky, Über die chemische Natur der Naphthensäuren. I.—II. (Journ. Russ. Phys.-Chem. Ges. 55. 106—23. 124—36. 1924. — C. 1924. I. 654. 655.) BIK.

Kazimierz Sławiński, Über die Konstitution der bicyclischen Terpene. (Bull. Soc. chim. de France [4] 35. 1195—98. 1924. — C. 1924. II. 2251.) BEHRLE.

Marcel Delépine, Über eine neue Form des Fenchonoxims; Charakterisierung des Fenchons in Gegenwart von Campher. Kurzes Ref. nach C. r. d. l'Acad. des sciences vgl. C. 1924. II. 643. Nachzutragen ist folgendes: Darst. von β -Fenchonoxim: 70 g Fenchon (d- oder l-Form) in 300 g sd. A. + 140 g NaOH werden viermal nach 3 Stdn. mit je 25 g $\text{NH}_2\text{OH} \cdot \text{HCl}$ versetzt u. das Erhitzen nach der letzten Zugabe 6 Stdn. lang fortgesetzt; danach wird die Lsg. mit 1200 ccm W. versetzt; es ausfallende Fenchonoxim wird in 4 Teilen A. gel. u. durch 12 Teile W. wieder ausgefällt; farblose Nadeln, Geruch campheroximartig. Die d- bzw. l-Form hat $[\alpha]_D = +$ bzw. -129.3° (2—4 g in 100 ccm abs. A.), in Chlf. $[\alpha]_D = +$ bzw. -149° . — Benzoylderiv. der Fenchonoxime: aus α -Oxim F. 79° , $[\alpha]_D = \pm 29^\circ$; aus β -Oxim, F. 123° , $[\alpha]_D = \pm 120^\circ$, aus A. große Prismen; aus rac. α -Oxim, F. 77° ; aus rac. β -Oxim, F. 111.5° . — Carbanilfenchonoxime: α -Verb. F. 140° , $[\alpha]_D = \pm 55.5^\circ$; β -Verb. F. 127 — 128° , $[\alpha]_D = \pm 116^\circ$; rac. α -Verb. F. 128° ; rac. β -Verb. F. 107.5° . — Trennung von α -Fenchonoxim (I) u. Campheroxim (II): das Gemisch wird in 7-facher Menge sd. A. gel., durch Abkühlen fällt I aus; die Mutterlauge wird mit KOH u. dem doppelten Vol. W. versetzt, wodurch erneuter Nd. von I; alkal. Filtrat gibt beim Ansäuern II. Oder man stellt nach der oben gegebenen Vorschrift aus dem Campher-Fenchongemisch ein Gemisch von Campher- u. β -Fenchonoxim her; das Oximgemisch wird mit verd. HCl behandelt u. mit NH_4OH versetzt; Campheroxim bleibt gel. u. kann durch Essigsäure gefällt werden; es kann auch das Gemisch in A. gel. werden (1 g Gemisch = 6—7 ccm A.); nach Zugabe der gleichen Gewichtsmenge NaOH wird mit 8—10 Vol. W. verd., wodurch β -Fenchonoxim ausgefällt wird. (Bull. Soc. Chim. de France [4] 35. 1330—35. 1924. Paris, Faculté de Pharmacie.)

HABERLAND.

K. Elbs und **M. Gaumer**, Über die elektrochemische Reduktion von Nitrobenzylanilinen in schwach alkalischer Lösung. Die Red. der Nitrobenzylaniline wurde an Nickeldrahtnetzkathoden durchgeführt.


Versuche: Die Red. von *p*-Nitrobenzylanilin in alkal. Lsg kann zum Azoxybenzylanilin, $\text{C}_{26}\text{H}_{21}\text{ON}_4$, oder zum *p*-Dianilidoazoxystilben, $\text{C}_{28}\text{H}_{20}\text{ON}_4$ (I), führen. Die Analyse konnte nicht entscheiden, die Messung der Stromzufuhr (auf 2 Moll. Nitrobenzylanilin 2 Atome H verbraucht) spricht für die B. von I, gelbrote, glänzende Blättchen, F. 223° , unl. in W., swl. in Ä., PAe. u. Chlf., wl. in A., k. Bzl. Eg., ll. in sd. Bzl. u. Eg. — Die Red. des *o*-Nitrobenzylanilins führte zu den gelblichen Azoxy-, Azo- u. Hydrazoverbb. — *o*-Azoxybenzylanilin, $\text{C}_{26}\text{H}_{21}\text{ON}_4$, farblose Nadeln aus verd. A., derbe Krystalle aus PAe., F. 81° , u. *o*-Azobenzylanilin, $\text{C}_{26}\text{H}_{20}\text{N}_4$, gelbrote Nadeln aus A., F. 142° , bilden sich gemeinsam, sind aber durch rd. A. leicht zu trennen, da die Azoxyverb. ll., die Azoverb. wl. in verd. A. ist. *o*-Hydrazobenzylanilin oxydiert sich an der Oberfläche der Kathodenfl. trotz der H. von H. Die Benzidinumlagerung führt zu einer Base, F. 75° , unl. in Bzl. PAe., wl. in A., ll. in Ä., unbeständig. — Die Red. des *o*-Nitrobenzyl-*o*-toluidins führt zu Gemischen der Azoxy- u. Azoverbb., Trennung durch A. (Azoxyverb.

leichter 1.); bei der weiteren Red. zur Hydrazoverb. bilden sich stets größere Mengen *o*-Aminobenzyl-*o*-toluidin. — *o*-Azoxybenzyl-*o*-toluidin, $C_{28}H_{28}ON_4$, hellgelbe Blättchen, F. 128°, ll. in A., Ä. u. Bzl., wl. in PAe. — *o*-Azobenzyl-*o*-toluidin, $C_{28}H_{28}N_4$, ziegelrote Nadelchen, F. 160°. — *o*-Hydrazobenzyl-*o*-toluidin, weißes Pulv., F. 184°, an der Luft ziemlich beständig. Heiße HCl lagert um zum *Di- ω -tolylamin-*o*-toluidin*, unbeständig, HCl- u. H_2SO_4 -Salze ll. in W. — Die Red. von *o*-Nitrobenzyl-*p*-toluidin verlief wie bei II. — *o*-Azoxybenzyl-*p*-toluidin, $C_{28}H_{28}ON_4$, hellgelbe Nadeln aus A., F. 99°, ll. in A., Ä. u. Bzl. — *o*-Azobenzyl-*p*-toluidin, $C_{28}H_{28}N_4$, gelbrote Nadeln aus A., F. 127°. — *o*-Hydrazobenzyl-*p*-toluidin, F. 104°, wl. in A., PAe. — Bei der Umlagerung entsteht kein Benzidin, sondern Verb. $C_{28}H_{24}N_4$, weiße Nadeln, F. 100°, ll. in k. A., Ä. u. Eg., läßt sich nicht diazotieren noch acetylieren. Vff. vermuten Benzidinumlagerung u. gleichzeitige Ringschließung. (Journ. f. prakt. Chem. 108. 234—39. 1924.) ZANDER.

K. Elbs, H. Nacken und H. Hofmann, Über Dianilido-*p*-azoxystilben. (Vgl. vorst. Ref.) Salzsaurer Salz des Dianilido-*p*-azoxystilbens, $C_{26}H_{20}ON_4 \cdot 2H$, gelbe Krystalle aus alkoh. HCl, F. 193°, verliert an der Luft HCl, wird in W. hydrolyt. gespalten. — Diacetylverb., $C_{30}H_{24}ON_4$, zwei Formen, unbeständige weißliche u. beständige gelbe, F. 173°. — Dinitrosodianilidoazoxystilben, $C_{26}H_{18}O_3N_6$, gelbe Krystalle, F. 61°, wl. in Ä., Bzl. u. A., ll. in w. CH_3OH . — Dianilidodiaminostilben, aus vorigem durch Red. mit Zn u. HCl, entsteht auch direkt aus Dianilidoazoxystilben (I) durch lange andauernde Einw. von Zn in alkoh. HCl, schwer zu reinigen. Saurer Oxalat, gelbes Pulver aus oxalsäurehaltigem A., unl. in W. u. Ä., wl. in Bzl. u. Eg., ll. in h. A. u. CH_3OH . — Methylschwefelsaures Salz des Dimethyldianilidoazoxystilbens, $C_{30}H_{32}O_9N_4S_2$, aus I u. Dimethylsulfat, hellgelbe Nadeln aus A., wl. in CH_3OH , A., Aceton u. Eg. — Äthylschwefelsaures Salz des Diäthylidianilidoazoxystilbens, $C_{34}H_{40}O_9N_4S_2$. — *p*-Azoxybenzoesäure, aus Diacetyldianilidoazoxystilben u. CrO_3 , hellgelbes Pulver, Zers. bei 240°, unl. in allen üblichen Lösungsm. außer Pyridin. — Dianilidoazoxystilbenbromid, $C_{26}H_{20}ON_4Br_2$, aus dem Stilben u. gelblichgelbe Nadeln aus verd. A., F. 123°, wl. in Ä., ll. in h. A. u. h. Eg., bei Gg. von A. oder Eg. mit Wasserdämpfen flüchtig, wird durch Zn u. alkoh. Alkali I, durch Zn u. HCl zum Dianilidodiaminostilben reduziert. — Dinitrosodianilidoazoxystilbenbromid, aus vorigem u. $NaNO_2$ u. HCl, gelbe Krystallkörner aus F., F. 189°, fast unl. in Lg., wl. in CH_3OH , A. u. Ä., ll. in h. Eg. — Diacetyldianilidoazoxystilbenbromid, gelbe Krystalle aus A., F. 186°, wl. in Ä., Lg., zl. in A., ll. in h. Eg. — Dibenzoyldianilidoazoxystilbenbromid, gelbes Pulver, F. 176°. — Dimethyldianilidoazoxystilbenbromid, aus dem Bromid u. Dimethylsulfat, gelbe, glänzende Krystalle aus Eg. oder Toluol, F. 192°, wl. in A., Ä., PAe., ll. in Eg. — Dibenzoyldianilidoazoxystilbenbromid, goldglänzende Blättchen aus Eg., F. 196°. Die Dimethyldianilidoazoxystilben u. die Dibenzylverb. spalten beim Kochen mit verd. A. Methyl- bzw. Benzylalkohol ab. (Journ. f. prakt. Chem. 108. 240—46. 1924. Gießen, Univ.) ZANDER.

N. J. Putochin, Über die Synthese des Prolins. (Journ. Russ. Phys.-Chem. Ges. 55. 39—46. 1923/24. — C. 1923. III. 1570.) BIKERMAN.

K. Elbs, Zur Kenntnis der Phentriazole. Aus den Dissertationen von **O. Hirschfeld, F. Wagner, K. Himmler, W. Türk, A. Henrich und E. Lehmann.** Phentriazole, vom nebenst. Typus lassen sich durch Red. von *o*-Nitrobenzylazoverb. herstellen.



Versuche. *o*-Nitrobenzylazophenol, aus diazotiertem *o*-Nitranilin u. Phenol, dunkelrote Nadeln aus verd. A., F. 157°. — Phenolphentriazol, $C_{12}H_9ON_3$, aus vorigem durch Red. mit Zinkstaub in alkal. Lsg., grauweiße Nadeln aus verd. A. (+ wenig Essigsäure), F. 219—220°, fast unl. in W., ll. in w. organ. Lösungsm. — Dichlorphenolphentriazol, $C_{12}H_7ON_3Cl_2$, aus Phentriazol (soll wohl heißen: Phenolphentriazol, R.)

gasförmigem Cl in Eg. weiße Nadeln aus Eg., F. 230°, fast unl. in W., ll. in gewöhnlichen Lösungsmm. — *Dibromphenolphentriazol*, $C_{12}H_7ON_3Br_2$, weiße Nadeln aus Eg., F. 223°, unl. in W., wl. in gewöhnlichen Lösungsmm. — *Anisolphentriazol*, $C_{12}H_{11}ON_3$, aus Phenolphentriazol u. Dimethylsulfat in alkal. Lsg., weiße Nadeln oder Fäden aus Ä., F. 136°, l. in organ. Lösungsmm. mit blauer Fluorescenz. — *Nitroanisolphentriazol*, $C_{13}H_{10}O_3N_4$, aus vorigem u. HNO_3 in Eg., blaßgelbe Nadeln, F. 198°, wl. in A., ll. in h. Eg. — *m-Nitrobenzolazophenolphentriazol*, $C_{18}H_{12}O_3N_6$, aus diazotiertem m-Nitranilin u. Phenolphentriazol in schwach alkal. Lsg., dunkelgelbes Krystallpulver aus Xylol, F. 225°, wl. in A. u. verd. NaOH. — *p-Nitrobenzolazophenolphentriazol*, $C_{18}H_{12}O_3N_6$, braungelbes Krystallpulver aus Xylol, sintert bei 275°, darüber Zers., wl. in Bzl. u. Xylol, fast unl. in allen anderen Lösungsmm. — *a.-u. K-Salz*, swl. in W. mit violetter Farbe. — *Acetylverb.*, $C_{20}H_{14}O_4N_6$, hellrotes Krystallpulver aus Xylol, F. 253°. — $KMnO_4$ oxydiert das Phenolphentriazol in *Phentriazol*, $C_6H_7N_3$, weiße Nadeln aus Bzl., F. 98°. — *Phentriazolsilber*, H_4N_3Ag , weiße Nadeln aus h. verd. HNO_3 , unl. in NH_3 . — *o-Nitrobenzolazosalicylsäure*, $C_{13}H_9O_5N_3$, aus diazotiertem o-Nitranilin u. Salicylsäure in schwach alkal. Lsg., braunes Krystallpulver aus A., F. 273°, wl. in sd. W. u. h. A., fast unl. in Chlf., NH_4 -Salz zl. in k. W., Na- u. K-Salz wl., Ca-, Ba- u. Mg-Salz swl. — *o-Nitrobenzolazosalicylsäurephenentriazol*, $C_{13}H_9O_3N_3$, aus vorigem durch Red. mit Zinkstaub u. verd. NaOH, weiße Nadeln aus verd. A., F. 305°, zl. in A., swl. in W., Chlf., CCl_4 . K-, Na-, Ca-, Ba- u. Mg-Salz, wl. in k. W. — *Acetylsalicylsäurephenentriazol*, $C_{15}H_{11}O_4N_3$, weiße Blättchen aus A. (+ etwas Essigsäure), F. 315° (Zers.). — *o-Nitrobenzolazostylaminophenol*, $C_{14}H_{12}O_4N_4$, aus diazotiertem o-Nitranilin u. p-Acetylaminophenol, rote Krystalle aus A., F. 153–155°. — *p-Aminophenolphentriazol*, $C_{12}H_{10}ON_4$, aus vorigem durch Abspaltung der Acetylgruppe durch NaOH) durch Red. mit Al-Pulver, gelblichweiße Nadeln, F. 282°. — *Acetylverb.*, $C_{14}H_{12}O_2N_4$, gelblichweiße Nadeln aus verd. A., F. 266°. — *Acetylaminophenyläthylätherphenentriazol* (*Phenacetinphenentriazol*), $C_{16}H_{16}O_2N_4$, aus der Acetylverb. u. Na-Alkoholat u. C_2H_5J , gelblichweiße Nadeln oder Prismen aus verd. A., F. 184°, fast unl. in sd. W., zl. in k. A., ll. in sd. A. — *o-Nitrobenzoloresorcin*, $C_{12}H_9O_4N_3$, aus diazotiertem o-Nitranilin u. Resorcin, rote Nadeln aus verd. A., F. 180° (Zers.). — *Di-o-nitrobenzoldisazoresorcin*, $C_{18}H_{12}O_6N_6$, wie voriges, verdoppelte Menge o-Nitranilin, gelbes Pulver, fast unl. in den üblichen Lösungsmm., Zers. unter Zers. — *Resorcinphenentriazol*, $C_{12}H_9O_2N_3$, aus Nitrobenzoldisazoresorcin durch Red. mit Zinkstaub, weiße Nadeln aus A. oder Eg., F. 188°, wl. in W., ll. in gewöhnlichen Lösungsmm. — *Dinitroresorcinphenentriazol*, $C_{12}H_7O_6N_6$, aus vorigem durch HNO_3 in h. Eg., hellgelbe Nadeln aus Eg. oder Essigester, verpufft gegen H_2O , F. 230°, wl. in sd. W., ll. in den meisten Lösungsmm. Ba-Salz, rotgelb, fast unl.; K-Salz, goldgelbe Nadeln, zl. in W., wl. in NH_3 mit moosgrüner Farbe. — *Dinitroresorcinphenentriazolnaphthalin*, Doppelsalz, beim Verdunsten einer äquimol. Acetonlsg. der Bestandteile, hellgelbe Nadeln, F. 242–243°. — *Dibromresorcinphenentriazol*, $C_{12}H_7O_2N_3Br_2$, durch Bromierung des entsprechenden Triazols, lange, weiße Nadeln aus Eg., swl., F. 206°. Alkalisalze, ll. in W., andere Salze wl. oder unl. in W. — *Resorcindiphenentriazol*, $C_{18}H_{12}O_2N_6$, aus Nitrobenzoldisazoresorcin durch Red. mit Zinkstaub in alkal. Lsg., gelbweiße Nadeln aus A., F. 196–198° (Zers.). — *o-Nitrobenzolazoanilin*, $C_{12}H_{10}O_2N_4$, aus diazotiertem o-Nitroanilin u. *phenylaminothiansulfonsaurem Na* (aus Formaldehydbisulfit u. Anilin bei 55–75° auf dem Wasserbad) u. Abspaltung des Methansulfonsäurerestes, rote Nadeln aus A. oder Bzl., F. 192–194°, ll. in h. A., wl. in Bzl. — *Anilinphenentriazol*, $C_{12}H_{10}N_4$, aus vorigem durch Red. in NH_3 -Lsg., lange gelbweiße Nadeln aus verd. A., F. 155°. — *Anilinnitriazoloxyd*, $C_{12}H_{10}ON_4$, aus Nitrobenzolazoanilin durch Red. mit alkoh. Schwefelammoniumlsg., gelbweiße Nadeln aus verd. A., F. 241–243°. — *o-Nitrobenzolazodimethylanilin*, $C_{14}H_{14}O_2N_4$ (I), aus diazotiertem o-Nitranilin u. Dimethylanilin, rote, F. 241–243°.

schillernde Blättchen aus verd. A., F. 127°. — *Dimethylanilinphentriazol*, $C_{14}H_{14}$, aus vorigem durch Red. mit Zn u. NaOH, grüngelbe Prismen aus Acetyldichlorid oder Ä., gelbe Nadeln aus verd. A., F. 182—183°, fluoresciert in Lsg., in h. 20% HCl farblos l. — Hydrochlorid, farblose Nadeln, F. 208°. — Methyljod weißes Pulver, F. 209°, unbeständig in wss. Lsg. — *Dimethylanilinphentriazol*, $C_{14}H_{14}ON_4$, aus I durch Red. mit Schwefelammoniumlsg., gelbe Nadeln, F. 167° in h. Eg. mit gelber, in Formalin mit hellgrüner Farbe. — Hydrochlorid, weißes Pulver, F. 187—188°, wird durch W. hydrolyt. gespalten. — *Aminobenzolazodimethylanilin*, $C_{14}H_{16}N_4$, aus I durch Red. mit Na_2S , gelbrote Nadeln aus A., F. 133—134°, ll. in den üblichen Lösungsmm. — *Azoxycybenzobisazodimethylanilin*, $C_{28}H_{26}O_2$, aus dem Filtrat der vorigen Rk., F. 93—94°. — *o-Nitrobenzolazodiphenylamin*, $C_{18}H_{14}O_2N_4$ (II), aus diazotiertem o-Nitranilin u. Diphenylamin, rote Nadeln aus A., F. 121°, wl. in k. A., ll. in h. A. — Hydrochlorid, schwarzblaue Krystalle, F. 135° (Zers.), durch W. hydrolyt. gespalten. — Pikrat, dunkelolivgrüne Krystalle. — *o-Nitrobenzolazodiphenylnitrosamin*, $C_{18}H_{13}O_3N_5$, rotgelbe Nadeln aus A., F. 132°. — *Diphenylaminphentriazol*, $C_{18}H_{14}N_4$, aus II durch Red. mit Zn u. NaOH, grüne Blättchen aus A., F. 137°, ll. in A. u. Bzl. — Hydrochlorid, blaßgrüne Blättchen, F. 158—165° (Zers.). — Pikrat, violette Nadeln aus Eg. — *Acetyldiphenylaminphentriazol*, $C_{20}H_{16}ON_4$, farblose Nadeln aus Eg., F. 166°. — *Diphenylaminphentriazol*, $C_{18}H_{14}ON_4$, aus II durch Red. mit Schwefelammonium, rotgelbe Nadeln aus A., F. 185°, wl. in organ. Lösungsmm. — Hydrochlorid, blaßgrün, F. 180—181° (Zers.). — *Diphenylnitrosaminphentriazoloxyd*, $C_{18}H_{13}O_2N_5$, aus dem Oxyd u. Anilin nitrit u. Eg., gelbe Prismen aus A., F. 154—155° (Zers.). — *Diphenylnitrosaminphentriazol*, $C_{18}H_{13}ON_5$, aus Diphenylaminphentriazol u. $NaNO_2$ (+ HCl), farblose Nadeln aus A., F. 178°, wl. in organ. Lösungsmm., zl. in Aceton. — *p-Nitrodiphenylaminphentriazol*, $C_{18}H_{13}ON_5$, aus vorigem durch Umlagerung mit HCl in Benzol. Lsg., blaugrüne Nadeln aus A., F. 149°. — *p-Aminodiphenylaminphentriazol*, $C_{18}H_{15}N_5$, aus vorigem durch Red. mit Schwefelammonium, hellgelbe Blättchen, F. 132°. — *2,4-Dinitrodiphenylaminphentriazol*, $C_{18}H_{12}O_4N_6$, aus Anilinphentriazol u. 2,4-Dinitrochlorbenzol, dunkelgelbe Nadeln aus Eg., F. 211°. — *2,4,6-Trinitrodiphenylaminphentriazol*, $C_{18}H_{11}O_6N_7$, mit Pikrylchlorid, braungelbe Nadeln, F. 230° (Zers.). — Bei kräftiger Nitrierung erhält man aus beiden Nitroverbb. Gemische aus zwei Pentanitroverbb. — *Pentanitrodiphenylaminphentriazol*, $C_{18}H_8O_{10}N_9$, 1. F. 200°, gelbe Nadeln aus Eg., swl. in A., Ä., Chlf. u. Bzl., zl. in sd. Eg. u. Aceton. Na -Salz, rote Krystallkrusten, l. in W., A. u. Aceton. 2. F. 249°, gelbe Blättchen aus Eg., tiefer gelb als 1., weniger l. in Eg. NH_4 -Salz, rot, leichter l. als 1. — *Äthyldiphenylaminhydrochlorid*, $C_{14}H_{15}N \cdot HCl$, farblose Nadeln, ll. in A., wl. in Ä. — *o-Nitrobenzolazo- α -naphthol*, $C_{16}H_{11}O_2N_3$, aus diazotiertem o-Nitranilin u. α -Naphthol, rote, bronzeglänzende Nadeln aus Xylol, F. 244—245° (Zers.), wl. in den üblichen Lösungsmm., ll. in sd. Xylol u. Amylalkohol. — *α -Naphtholphentriazol*, $C_{16}H_{11}ON_3$, durch Red. mit Zn, blaßrötliche Nadeln aus A. oder Eg., F. 204°, ll. in W., zl. in den gewöhnlichen Lösungsmm. — *β -Nitroso- α -naphtholphentriazol*, $C_{16}H_{10}O_2N_4$, grünlichgelbes bis ockerfarbenes Pulver aus verd. A., F. 154—156°. — *o-Nitrobenzolazo- α -naphthylamin*, $C_{16}H_{12}O_2N_4$, mit Naphthylamin, schwarzbraune Nadeln aus Xylol, F. 170°, wl. in üblichen Lösungsmm. — *α -Naphthylaminphentriazol*, $C_{16}H_{12}N_4$, durch Red. mit Zn u. NH_3 , gelblichweiße Nadeln aus A., F. 110°, zl. in den gewöhnlichen Lösungsmm. mit grünblauer Fluoreszenz.

Die pharmakol. Wrkg. des *Phenacetinphentriazols* vom Magen aus ist ähnlich der des Phenacetins, nur andauernder; wird die Einnahme länger als 8—10 Tage fortgesetzt, stellen sich Vergiftungserscheinungen ein, die auf die Wrkg. des *Phentriazolrestes* zurückzuführen sind. Ähnliche Wrkgg. zeigen *Salicyl-* u. *Acetylsalicylsäurephentriazol*. (Journ. f. prakt. Ch. **108**. 209—33. 1924. Gießen, Univ.) ZANDEL.

W. N. Minajew, *Über einige Derivate des 4-Chloranthracumarins*. (Vgl. Journ. Russ. Phys.-Chem. Ges. **54**. 680; C. **1924**. I. 911.) Es wird über die Darst. des Anilidoanthracumarins u. des Dianthracumaryls berichtet (vgl. MINAEFF u. RIPPER Monatshefte f. Chemie **42**. 73; C. **1922**. I. 457.) (Journ. Russ. Phys.-Chem. Ges. **54**. 9—32. 1922/24. Tomsk.) **BIKERMANN**.


Alfred Kirpal, *Über α -Pyridon-essigsäure. 2-Pyridon-1-essigsäure*, $C_7H_7O_3N$, J. SPÄTH u. KOLLER, Ber. Dtsch. Chem. Ges. **56**. 880; C. **1923**. I. 1458) wird als dem Additionsprod. von Chloressigsäure an α -Oxypyridin mit sd. konz. Lauge erhalten; wasserfreie Prismen oder Täfelchen, F. 222°. Die Abspaltung von HCl aus der Oxypyridinchloressigsäure kann auch durch Erhitzen auf 200° erzielt werden. Die Säure wird durch sd. konz. HCl nicht verändert. Ag-Salz, weiße Nadeln. — *Methylester*, $C_8H_9O_3N$, F. 45°, ll. in organ. Lösungsmm. mit Ausnahme Ä. — *Amid der α -Pyridonessigsäure*, $C_7H_8O_2N_2$, F. 228°, Nadeln aus verd. Ä. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. **57**. 1954—55. 1924. Prag, Deutsche Univ.) A.R.F.HESSE.

A. E. Tschitschibabin und J. G. Bylinkin, *α -Pyridylpyrrole*. (Journ. Russ. Phys.-Chem. Ges. **55**. 100—105. 1923/24. — C. **1923**. III. 852.) **BIKERMANN**.



A. E. Tschitschibabin, *Ein neues Darstellungsverfahren von Oxyderivaten des Chinolins, Chinolins und ihrer Homologen*. (Journ. Russ. Phys.-Chem. Ges. **55**. 7—18. 1923/24. — C. **1923**. III. 1225.) **BIKERMANN**.

Johannes Sybrandt Buck, Robert Downs Haworth und William Henry Perkin, jun., *Oxydation substituierter 1-Benzyl-3,4-dihydroisochinoline und eine Synthese des Papaveraldins*. Gelegentlich der Synthese des ψ -epi-Berberins u. des Berberins (vgl. Journ. Chem. Soc. London **125**. 1675. 1686; C. **1924**. II. 2161. 1924. 3) wurde die Beobachtung gemacht, daß gewisse substituierte 1-Benzyl-3,4-dihydroisochinoline vom Typus **A** in organ. Lösungsmm. sehr leicht der Oxydation durch Luft- O_2 anheimfallen, während ihre Salze beständig sind. Glatt verläuft die Oxydation in alkoh. Lsg. mit Jod in Ggw. von K-Acetat. Die Oxydationsprodd. erhalten noch unverändert die ursprünglichen Substituenten u. liefern bei der Behandlung mit Sn u. HCl die entsprechenden *Tetrahydroisochinoline* vom Typus **B**. Sie lassen sich als Ketone vom Typus **C**, deren CO-Gruppe durch gewöhnliche Veresterung nicht nachweisbar ist. Durch Arbeiten in Pyridin gelangt man dagegen zu gut charakterisierten Oximen. Die Ketone vom Typus **C** werden durch sd. Äthylalkoh. KOH oder durch $KMnO_4$ leicht zu Derivv. des Isochinolins des Typus **D** oxydiert.

Die Ketone vom Typus **C** reagieren mit Benzoylchlorid u. NaOH zu Substanzen, gegenüber den Ausgangsmaterialien ein Mol. Benzoesäure mehr im Molekül enthalten. In Analogie zu den Befunden von REISSERT (Ber. Dtsch. Chem. Ges. **38**. 3426 [1905]) an Chinolin u. Pyridin nehmen Vff. Ringsprengung an, die zu Substanzen vom Typus **E** führt. Bei der Behandlung mit verd. Säuren spalten diese Verbb. leicht wieder Benzoesäure ab unter Regenerierung von Salzen des Ausgangsmaterials (Typus **C**). Da das Papaveraldin (**XI**) zum Typus **D** gehört, so



ist damit auch eine bequeme Synthese dieser Verb. gegeben. Das aus *Homoveratrylamin* (XII) mit POCl_3 in sd. Toluol dargestellte 6,7,3',4'-Tetramethoxy-1-benzyl-3,4-dihydroisochinolin (IX) geht durch Luftoxydation in das Keton X über; das isomer ist mit dem von STUCHLIK (Monatshefte f. Chemie 21. 814 [1900]) durch Red. des Papaveraldins mit Zn-Staub u. Eg. erhaltenen Papaverinol. Durch Oxydation mit methylalkoh. KOH oder KMnO_4 entsteht aus X Papaveraldin (XI).



I ist **A** mit $\text{R} = \text{OMe}$

$\text{R}'\text{R}' = \text{CH}_2\text{O}_2$;

II ist **A** mit $\text{RR} =$

CH_2O_2 ; $\text{R}' = \text{OMe}$

III ist **B** mit $\text{R} = \text{OMe}$

$\text{R}'\text{R}' = \text{CH}_2\text{O}_2$;

IV ist **B** mit $\text{RR} =$

CH_2O_2 ; $\text{R}' = \text{OMe}$

V ist **C** mit $\text{R} = \text{OMe}$; $\text{R}'\text{R}' = \text{CH}_2\text{O}_2$;

VI ist **C** mit $\text{RR} = \text{CH}_2\text{O}_2$; $\text{R}' = \text{OMe}$;

VII ist **D** mit $\text{R} = \text{OMe}$; $\text{R}'\text{R}' = \text{CH}_2\text{O}_2$;

VIII ist **D** mit $\text{RR} = \text{CH}_2\text{O}_2$; $\text{R}' = \text{OMe}$;

IX ist **A** mit $\text{R} = \text{R}' = \text{OMe}$;

X ist **C** mit $\text{R} = \text{R}' = \text{OMe}$;

XI ist **D** mit $\text{R} = \text{R}' = \text{OMe}$.

Versuche. 6,7-Methylendioxy-3',4'-dimethoxy-1-benzoyl-3,4-dihydroisochinolin, $\text{C}_{19}\text{H}_{17}\text{O}_5\text{N}$, (VI), aus **II** durch Luftoxydation, aus CH_3OH Nadeln vom F. 111° in A., Ä., Bzl. u. Chlf., wl. in PÄ. In Mineralsäuren zu leuchtend gelben Salzen l. Die sd. Lsg. in Acetanhydrid färbt sich smaragdgrün. Die tieforange-farbige Lsg. in konz. H_2SO_4 wird mit Gallussäure rötlichgrün, in der Wärme rotgrün, mit Phloroglucin tiefrot, bei 100° roten Nd. — Jodhydrat, aus W. leuchtend gelbe Prismen mit Krystallwasser vom F. 209—110°. — Oxim, $\text{C}_{19}\text{H}_{18}\text{O}_5\text{N}_2$, aus A. rhomb. Platten vom F. 222° (Zers.) durchweg wl., l. in verd. Mineralsäuren u. NaOH. Die dunkelorange-farbige Lsg. in konz. H_2SO_4 wird mit KNO_3 braun. Benzoylderiv., $\text{C}_{26}\text{H}_{23}\text{O}_7\text{N}$, (gemäß **E**), aus A. mattgelbe Nadeln vom F. 158°, l. in sd. Bzl., Chlf., sonst swl. — 6,7-Methylendioxy-3',4'-dimethoxy-1-benzoylisochinolin, $\text{C}_{19}\text{H}_{16}\text{O}_5\text{N}$ (VIII), aus A. Nadeln F. 208°, ll. in sd. A., Bzl., Aceton, Chlf., swl., mattgelb l. in verd. Mineralsäuren, braun in konz. H_2SO_4 u. in sd. Acetanhydrid. — Pikrat, aus CH_3OH Platte henvom F. 206—207° (Zers.). — Oxim, $\text{C}_{19}\text{H}_{16}\text{O}_5\text{N}_2$, aus A. Platten vom F. 260° (Zers.) durchweg swl., l. in verd. Säuren u. NaOH. 6,7-Dimethoxy-3',4'-methylendioxy-1-benzoyl-3,4-dihydroisochinolin, $\text{C}_{19}\text{H}_{17}\text{O}_5\text{N}$ (V), aus A. Prismen F. 151—52°. — Jodhydrat, krystallin. Pulver vom F. 192°. — Pikrat, aus Eg. gelbe Platten F. 227° (Zers.). — Oxim, $\text{C}_{19}\text{H}_{18}\text{O}_5\text{N}_2$, aus A. Rhomben F. 223—24°. — Benzoylderiv., $\text{C}_{26}\text{H}_{23}\text{O}_7\text{N}$, (gemäß **E**) aus A. mattgelbe Nadeln vom F. 151°. Sein Monoxim, $\text{C}_{26}\text{H}_{24}\text{O}_7\text{N}_2$, ist amorph. — o-Nitrobenzoylderiv., $\text{C}_{26}\text{H}_{22}\text{O}_7\text{N}$ (gemäß **E**). Aus A. Platten F. 175—176°. — 6,7-Dimethoxy-3',4'-methylendioxy-1-benzoylisochinolin, $\text{C}_{19}\text{H}_{15}\text{O}_5\text{N}$, (VII) aus Eg. Nadelchen vom F. 199—200°. Pikrat, aus CH_3OH leuchtendgelbe Platten vom F. 243°. Oxim, $\text{C}_{19}\text{H}_{16}\text{O}_5\text{N}_2$, aus A. rhomb. Platten vom F. 263—264°. — Homoveratroyl-homoveratrylamin (XII), aus A. Krystalle vom F. 124°. — 6,7,3',4'-Tetramethoxy-1-benzyl-3,4-dihydroisochinolin (IX), Öl, l. in A. Pikrat, aus CH_3OH + Eg. gelbe Nadeln, F. 168°. — 6,7,3',4'-Tetramethoxy-1-benzyl-3,4-dihydroisochinolin, $\text{C}_{20}\text{H}_{21}\text{O}_5\text{N}$ (X), aus CH_3OH cremefarbiges Pulver F. 190—191°. Chlorhydrat, aus 30%ig. HCl gelbe Krystalle, F. 183° (Zers.) mit 1 H_2O . Jodhydrat, orange-farbige Nadeln F. 186° (Zers.). — Oxim, $\text{C}_{20}\text{H}_{22}\text{O}_5\text{N}_2$, aus A. Platten vom F. 247—248°, durchweg wl., l. in verd. Säuren oder Alkalien. Die tief orange-farbige Lsg. in konz. H_2SO_4 wird mit KNO_3 grünlichbraun. — Benzoylderiv.




($\text{H}_{27}\text{O}_7\text{N}$, (gemäß **E**), aus A. mattgelbe Nadein vom F. 160°. (Journ. Chem. Soc. London **125**. 2176—85. 1924. Oxford, Dyson Perkins Lab.)

OHLE.

Léon Piaux, *Wirkung der Katalysatoren auf die Oxydation der Harnsäure: Kupfer und harnsaures Kupfer*. (Vgl. C. r. d. l'Acad. des sciences **178**. 782; **1924**. I. 1934.) Cu entweder in metall. Zustande oder als *harnsaures Cu* begünstigt die Oxydation der *Harnsäure*. Das Salz ist, wohl infolge seiner kolloidalen Beschaffenheit, selbst in geringer Menge, viel wirksamer als das Metall. In Ggw. Cu ist die Schnelligkeit der O_2 -Absorption in der ersten halben Stde. $1\frac{1}{2}$ —3-mal so groß wie ohne Katalysator. Als Reaktionsprodd. werden isoliert Oxonat u. Allantoin. Steigerung der Temp. begünstigt die B. von Allantoin, die Grenze der Absorption sinkt. — Harnsaures Cu (entsprechend $\frac{1}{22.5}$ At. Cu pro Mol. Säure) als Katalysator liefert Oxonat, beim Ansäuern der Lsg. scheidet sich allmählich Allantoin ab; bei $\frac{1}{145}$ At. Cu pro Mol. Säure entsteht mit dem Salz nur Oxonat. (C. r. d. l'Acad. des sciences **179**. 901—3. 1924.)

HABERLAND.


John H. Yoe, *Die Reduktion gewisser Küpenfarbstoffe mittels Natriumhydrosulfit* alkalischer Lösung. Vf. untersucht die Red. einiger von der Du Pont Com-



pany hergestellten Küpenfarbstoffe, *Ponsolblau R* (I.) u. *G* [wie I., nur an den zwei mit * bezeichneten Stellen je ein Cl(?) Atom], *Ponsoldunkelblau RR* (II.) u. *Ponsolviolett RR* (III.) durch $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_4$. Die Red. erfolgt schnell, die resultierenden Prodd. bilden keine Lsgg., sondern anscheinend kolloidale Suspensionen. Anorgan. Salze koagulieren die reduzierten Farbstoffe. Die Resultate stimmen mit denen von früheren

verss. (vgl. YOE u. EDGAR, Journ. Physical Chem. **27**. 65; C. **1923**. IV. 290) gut ein. (Journ. Physical Chem. **28**. 1211—17. 1924. Virginia, Univ.) ZANDER.


Robert Charles Menzies und **Robert Robinson**, *Eine Synthese des ψ -Pelletrins*. Ganz entsprechend der Synthese des *Tropinons* aus Succindialdehyd, γ -Aminolysin u. einem reaktionsfähigen Acetonderiv. bauen Vf. das ψ -Pelletrin aus Succindialdehyd, Methylamin u. acetondicarbonsaurem Ca auf, gemäß folgender



Der Glutardialdehyd wurde durch Einw. von O_3 auf Cyclopenten gewonnen. Das ergiebigste Verf. zur Darst. des Cyclopentens zu finden, wurde zunächst

der Weg Cyclohexanon $\rightarrow$ Cyclohexen untersucht. Der Weg über Cyclohexanoxim ist empfehlenswerter als der über Cyclohexylamin. Die Ausbeuten an Cyclohexanoxim betrugen 81,6% der Theorie, an Cyclohexylaminchlorhydrat 73,7%, an Cyclohexyltrimethylammonium nahezu 100%, bezogen auf Cyclohexylamin, wenn einem Überschuß von $(\text{CH}_3)_2\text{SO}_4$ u. wss. NaOH methyliert wird. Die Umwandlung des Ammoniumjodids in Cyclohexen ist jedoch mit großen Verlusten verknüpft. Ausbeute nur ca. 25% der Theorie. Das Hauptprod. war dabei im Gegensatz zu SKITA u. ROLFES (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 53. 1250; C. 1920. III. 281) Cyclohexyldimethylamin. — Die Spaltung der Cyclohexenozonids liefert in folgender Weise die besten Ausbeuten. 20 g desselben in 285 ccm Eg. wurden allmählich unter Rühren zu einer Mischung von 300 ccm 15%ig. TiCl_3 -Lsg. u. 1200 ccm 40%ig. Essigsäure-Acetatlg. gegeben. Ausbeute an Adipindialdehyd 5 g. — Cyclopenten wurde durch Wasserentziehung aus Cyclopentanol dargestellt. Es kann in Hexanlsg. leicht mit Br in CCl_4 titriert werden. — Mit TiCl_3 reagiert das Cyclopentenozonid langsamer als das des höheren Ringhomologen. 50 ccm einer wss. Lsg. von TiCl_3 (enthaltend 6,85 g) u. ca. ebensoviel 40%ig. Na-Acetatlg. wird mit 3 g Cyclopentenozonid in 25 ccm Eg. innerhalb 20 Min. versetzt. Nach 1 Stde. wird bei 40° nochmals die gleiche Menge TiCl_3 zugegeben. Ausbeute 0,6 g Glutardialdehyd. — 1 g gewonnene ψ -Pelletierin wurde über das Pikrat gereinigt u. aus PAe. in Krystallen vom F. 48,5° erhalten. Es zeigte alle Eigenschaften des natürlichen ψ -Pelletierins u. lieferte das gleiche Dipiperonylidenderiv. vom F. 226–227°. (Journ. Chem. Soc. London 125. 2163–68. 1924. St. Andrews, Bristol, Manchester; Univv.) OHLER.

Hermann Leuchs und **Seizo Kanao**, Versuche mit dem Hydraxon der Brucinonsäure. (Über Strychnosalkaloide, XXXIV.) (XXXXIII. vgl. Ber. Dtsch. Chem. Ges. 57. 1318; C. 1924. II. 2038.) Die Brucinonsäure wird im Gegensatz zur Brucinolsäure durch NaOH nicht glatt in Glykolsäure u. die Verb. $\text{C}_{21}\text{H}_{20}\text{O}_5\text{N}_2$ gespalten, die das dem Alkohol Brucinolon entsprechende Keton darstellten soll. Nachdem der Abbau des Oxims der Brucinonsäure nach CURTIUS nicht zu jeher Verb. geführt hatte, wurde nunmehr das Hydraxon der Brucinonsäure nach dieser Richtung hin untersucht. Sein Hydrazid liefert mit 2 Mol. HNO_2 das Azid der freien Brucinonsäure. Auch das Hydraxon der Brucinonsäure selbst liefert bei dieser Behandlung die Brucinonsäure zurück. Bei der Verkohlung des Azids erhält man neben regenerierter Ketonensäure in einer Ausbeute von 40% die Verb. $\text{C}_{21}\text{H}_{22}\text{O}_5$, das Hydrat des Ketons $\text{C}_{21}\text{H}_{20}\text{O}_5\text{N}_2$. Es wurden also auch hier 2 C-Atome, offenbar als CH_2O u. CO_2 , entfernt. Ob dieses Ketonhydrat ein Oxim liefert, das mit früher auf anderem Wege erhaltenen ident. ist, konnte nicht festgestellt werden. Dieser Nachweis ist aus dem Grunde von Wichtigkeit, weil die Veresterung des Brucinonsäurehydrazons zu 2 Prodd. führt. Unter milden Bedingungen entsteht ein Ester vom F. 182° als Hauptprod., der als Ausgangsmaterial zu den vorhergehenden Verss. diente, bei energ. Veresterung dagegen ausschließlich ein Ester vom F. 192°. Diese Isomerie kann räumlicher Art sein, bedingt durch die Gruppe $(\text{R}_1)(\text{R}_2)\text{C}=\text{N}\cdot\text{NH}_2$, oder wahrscheinlicher struktureller Natur im Sinne der Formeln I–III. Dies spricht, daß der hochschmelzende Ester, obgleich ll. in Chlf. , der Reaktionsfl. in diesen Lösungsm. nur schwer vollständig entzogen werden kann. Vff. nehmen daher an, daß in der Reaktionsfl. zum Teil die in Chlf. wl. Verb. II vorhanden



ist, die erst allmählich in III übergeht. — Hydraxon der Brucinonsäure, $\text{C}_{23}\text{H}_{20}\text{O}_7\text{N}_2\cdot 3\text{H}_2\text{O}$, aus der Säure mit Hydrazinhydrat in sd. absol. A.; aus 30–40 Tln W

be, körnige Krystalle vom F. 203° (schaumig), ll. in Chlf., n. HCl, n. KHCO_3 u. Acetatlg. Aus der Bicarbonatlg. wird es von Chlf. nicht ausgezogen. Bei Veresterung des Hydrazons in 4%ig. alkoh. HCl bei 0° erhält man den Äthyl-, $\text{C}_{25}\text{H}_{30}\text{O}_7\text{N}_4$ (gemäß I), aus absol. A. Prismen vom F. 178—182° (blasig), ll. in Chlf., swl. in h. W., daraus derbe Prismen vom F. 180°. L. in n. HCl, unl. in Bicarbonat oder wss. NH_3 . Der dabei als Nebenprod. entstandene isomere Ester (gemäß III) wird beim Umlösen in absol. A., worin er unl. ist, abgetrennt. Er steht als einziges Reaktionsprod., wenn die Veresterung mit 10%ig. alkoh. HCl auf Zimmertemp. erfolgt. Ausbeute 70% der Theorie. Aus 350 Tln. absol. A. zu-
 erst 6-seitige Blättchen oder Prismen, die sich in der Kälte in die beständigen, tief 4-seitigen Tafelchen umwandeln. Aus verd. A. (1:50) prismat. Nadeln. F. 248—250°, $[\alpha]_D^{25} = -171^\circ$ (Eg.). Ll. in Chlf., 3-n. HCl, weniger in n. HCl, unl. in W. oder Bicarbonatlg. — Hydrazon des Brucinonsäurehydrazids, $\text{C}_{23}\text{H}_{28}\text{O}_6\text{N}_6$, vom dem Ester vom F. 182° mit Hydrazinhydrat in sd. A. Aus 50 Tln. gew. A. feine Nadeln u. Prismen. Sintert von 188° an u. ist gegen 210° blasig geschmolzen. L. in Chlf., sl. in k. W. mit neutraler Rk. Die durch Abbau des vorstehenden Hydrazons nach CURTIUS erhaltene Verb. $\text{C}_{21}\text{H}_{22}\text{O}_6\text{N}_2$ krystallisiert aus 100 Tln. Eg. in feinen derben Prismen. Zers. von 270° an, $[\alpha]_D^{25} = +8,1^\circ$ (Eg.); wl. in Chlf. u. W.; verd. HCl oder Bicarbonatlg. lösen nicht, n. Lauge ziemlich leicht. (Ber. d. Chem. Ges. 57. 1799—1802. 1924. Berlin, Univ.)

OHLE.

Evelyn Ashley Cooper, *Die Wirkung des Paraldehyds auf Proteine und Lipine*. Paraldehyd fällt Proteine aus wasserfreien Lösungsm. (A., Phenol), hat aber keine Wirkung auf ihre wss. Lsgg., auch nicht auf die von Nucleinsäure. Lecithin wird wohl aus wss. wie aus äth. Lsg. gefällt, Cerebroside aus Lsgg. in Pyridin u. h. Dagegen ist der Paraldehyd ein Lösungsm. für Cholesterin, Wachs, Fette u. freie Fettsäuren. Er kann sonach bei der Fraktionierung u. Reinigung der Lipine in Nerven- u. anderem Gewebe Dienste leisten. Seine pharmakolog. Wrkg. stimmt mit der hier festgestellten physikal.-chem. Wrkg. auf kolloidale Lipine in Zusammenhang zu stehen. (Biochemical Journ. 18. 948—50. 1924. Birmingham, v.)

SPIEGEL.

I. S. Jaitschnikow, *Hydrolyse des Peptons, der Albumose und der Proteine als Salzsäure*. (Vgl. Journ. Russ. Phys.-Chem. Ges. 52. 147; Ber. Dtsch. Chem. Ges. 56. 2226; C. 1923. III. 1554. 1924. I. 163.) Es wurde die Kinetik der Säurehydrolyse von Pepton, Protalbumose, Albumin, Casein u. Edestin bei 10, 37, 70 u. 100° untersucht. Die Lsgg. enthielten 1% Protein u. waren 1-n. an HCl. Meßmethode — die Formoltitration nach SÖRENSEN. In den meisten Fällen findet sich die Formel von SCHÜTZ u. BORISSOW $x/\sqrt{t} = \text{konst.}$ bestätigt, in einigen (Edestin bei 37°, Pepton u. Casein bei 100°) gilt $x/t = \text{konst.}$ (x die zur Zeit t umgesetzte Menge). Was die Kinetik betrifft, ist die Säurehydrolyse der Fermenthydrolyse sehr ähnlich. (Journ. Russ. Phys.-Chem. Ges. 54. 814—17. 1922/24. Moskau, Univ.)

BIKERMAN.

Hilda Louise Kingston und Samuel Barnett Schryver, *Untersuchungen über Gelatine*. III. Die Trennung der Produkte der Gelatinehydrolyse durch die Car-
 tmethode. (II. vgl. KNAGGS, MANNING u. SCHRYVER, Biochemical Journ. 17. C. 1924. I. 487.) Das Verf. zur Trennung der Spaltprodd. mittels der Car-
 tmethode (vgl. BUSTON u. SCHRYVER, Biochemical Journ. 15. 636; C. 1922. II. 920) wurde weiter ausgearbeitet. Wird das mit verd. H_2SO_4 erhaltene Spaltungsgemisch mit $\text{Ba}(\text{OH})_2$ behandelt, bis es gegen Kongo eben noch sauer reagiert, dann das Filtrat mit mehr $\text{Ba}(\text{OH})_2$, so enthält der jetzt entstehende Nd. merkliche Mengen N, konnte daraus rac. Asparaginsäure isoliert werden. Das Filtrat hiervon gab mit $\text{Ba}(\text{OH})_2$ eine vollständige Fällung der Ba-Salze der Dicarbonsäuren (bei Gelatine nur

Glutaminsäure u. *Asparaginsäure*). Aus dem Filtrat wurden bei 0° durch wechselnde Behandlung mit $\text{Ba}(\text{OH})_2$ u. CO_2 die Carbamate gefällt u. nach Eingen des Filtrats diese Fällung wiederholt, bis keine weitere Beseitigung von mehr eintrat; das letzte Filtrat enthielt dann noch 6—7% des Gesamt-N, fast kein Amino-N, fast nur *Prolin* oder *Prolylprolin*. Die gesammelten Carbamate wurden nun mit W. von 0° ausgezogen, wobei das Deriv. des *Glycins* zurückbleibt, durch Kochen mit W. zersetzbar. Die k. wss. Lsg. wurde durch Kochen zers., die noch vorhandenen Diaminosäuren wie üblich mit Phosphorwolframsäure abgeschieden. Nach Eindampfen der Lsg. schied sich dann die Hauptmenge des *Leucins*. Das Filtrat hiervon wurde in A. gegossen, die Fällung, mit den späteren, in abs. A. unl. Fraktionen vereinigt, die Reste des *Leucins*, ferner *Valin*, *Serin* u. *Oxyprolin* enthaltend, wovon das letzte durch Best. des Nichtamino-N ermittelt werden kann, wird im übrigen nach der Estermethode verarbeitet. Die alkoh. Lsg. wurde wiederholt zur Trockne verdampft u. mit A. behandelt, bis ein in absol. A. unl. im Eisschrank l. Prod. resultierte, das lediglich *Prolin* enthielt. Bei einem Vergrößen Maßstabes (mit 900 g Gelatine) wurden vom Gesamt-N erhalten als *Glutaminsäure* 3,2, *Asparaginsäure* 5,6, *Prolin* 14,8, *Oxyprolin* 11,25, *Glycin* 18,2%, in ein Vers. mit 10 g Gelatine als *Asparaginsäure* + *Humin* 4,49, *Dicarbonsäuren* (außer der *Asparaginsäure* der 1. Fraktion) 6,50, *Glycin* 17,44, *Leucin* + *Serin* + *Oxyprolin* + *Alanin* 17,26, *Prolin* 12,06, *Diaminosäuren* 26,67, *Nichtcarbamatsfraktion* 6,93%. (Biochemical Journ. 18. 1070—78. 1924.) SPIEGEL

John Knaggs und **Samuel Barnett Schryver**, *Untersuchungen über Gelatine*. IV. Die Reinigung der Gelatine durch Ausflockung in einem elektrischen Feld. (III. vgl. vorst. Ref.) Für die Reinigung sind Verunreinigungen, die aus dem Ausgangsmaterial für Herst. der Gelatine stammen, von solchen zu unterscheiden, die durch Veränderung beim Erhitzen entstehen. Von den ersten zeigt die Ggw. *Chondroitinschwefelsäure* einen Einfluß auf die Hausmannschen Zahlen. Sie korrigiert, nebst ähnlichen Verbb. durch längere Behandlung (60 Tage) des zunächst mit Salzwasser u. 0,5%ig. HCl 24 Stdn. behandelten, dann mit fließendem W. gut gewaschenen Osseins mit 0,2%ig. NaOH -Lsg. vollständig entfernt werden. Wiederholte Ausflockung der 2%ig. Lsg. der dann hergestellten Gelatine im elektr. Felde beseitigt dann die Prodd. der therm. Zers., so daß die Lsg. bei weiteren Ausflockungsverfahren ihren N-Gehalt nicht mehr ändert. (Biochemical Journ. 18. 1079—84. 1924.)

Alexander Bernard Manning, *Untersuchungen über Gelatine*. V. Die Eigenschaften einer durch Ausflockung in einem elektrischen Feld gereinigten Gelatine. (IV. vgl. vorst. Ref.) Bei dem vorher geschilderten Verf. gibt der N-Gehalt der bei der Elektrodialyse verbleibenden Lsg. ein gutes Kennzeichen für die Reinheit der Gelatine von Prodd. der therm. Zers. Er wurde zwischen 1 u. 2 mg in 100 ccm gefunden, wenn der untere Pol im Dialyseapp. die Anode war, die Eigenbewegung der Gelatine im elektr. Felde in der gleichen Richtung wie die der schweren erfolgte. Die frühere Best. der Löslichkeit (vgl. KNAGGS, MANNING u. SCHRYVER, Biochemical Journ. 17. 473; C. 1924. I. 487) hat zu hohe Ergebnisse geliefert. Sie kann für reine Gelatine, wenn sie überhaupt eine wahre Löslichkeit ist, nicht über 10:100000 hinausgehen. Die Gelatine hat nicht Eigenschaften eines eigenartigen Eiweißes, sondern fast alle eines Globulins. Sie ist unl. in W., aber l. (oder dispergierbar) in sehr schwachen Lsgg. von Säuren oder Alkalien, erst in viel stärkeren Lsgg. von Neutralsalzen. Von den meisten anderen Globulinen unterscheidet sich Gelatine durch ihren höheren Wasserungszustand, dem die große Fähigkeit zur B. von Gelen zugeschrieben werden kann. Auch andere Globuline können hierzu gebracht werden, soweit sie sich in einem verhältnismäßig kleinen Vol. eines Mediums dispergieren lassen, z. B. *Edestin* in Lsg. von Na-Salicylat . Wenn Gelatinelsgg. selbst nur bei 35° längere Zeit gehalten werden, erfährt sie

ine irreversible Verminderung ihrer Viscosität. (Biochemical Journ. **18**. 1085—94. 1924.)

SPIEGEL.

John Knaggs und Samuel Barnett Schryver, *Untersuchungen über Gelatine*. VI. *Der Einfluß der Behandlung des Vorproduktes auf den Charakter der Gelatine*. (V. vgl. vorst. Ref.). Es zeigte sich, daß hochgereinigte Gelatine bei Ausflockung 2%ig. Lsg. im elektr. Felde sich in 3 Fraktionen trennt. Die überstehende Fl. um die Anode herum enthält eine Fraktion mit geringem Gehalte an Diamino-N; er durch die Membran zur Kathode diffundierende Anteil wird hier in einfache Prodd. zerlegt. Die Menge beider Fraktionen ist aber gering im Verhältnis zur ausgeflockten Menge. Wiederholte Ausflockung aus 1%ig. Lsg. im elektr. Felde ändert den %-Gehalt der Gelatine an Diamino-N nicht, läßt aber den Monoamino-N allmählich bis zu einem Maximum von ca. 20% ansteigen. Die Hausmannschen Zahlen wechseln je nach der Behandlung der Vorprodd. vor Ausziehen der Gelatine. Vorherige Säurebehandlung ergibt niedrigeren Wert für Diamino-N als Alkalibehandlung. Die Unterschiede betragen 1,5—3,5% u. sind vielleicht durch Ketonolumentwandlerungen im Vorprod. zu erklären. Aus Vorprod. nach Säurebehandlung wird die Gelatine schneller extrahiert als nach Alkalibehandlung. (Biochemical Journ. **18**. 1095—1101. 1924.)

SPIEGEL.

John Knaggs und Samuel Barnett Schryver, *Untersuchungen über Gelatine*. II. *Der Nicht-Aminostickstoff der Gelatine*. (VI. vgl. vorst. Ref.). Die Hydrolyse einer durch Ausflockung gereinigten Gelatine nach Erhitzen mit W. zeigt eine merkliche Zunahme des Nichtamino-N, wahrscheinlich infolge Umlagerung des Molek. unter B. beständiger Ringverbb. Ähnlich wirkt wiederholte Ausflockung im elektr. Felde u. auch Behandlung mit verd. Säuren oder Alkalien. So erklären sich auch die verschiedenen Befunde an Gelatinen aus dem gleichen Vorprod. Man kann doch allem auch die nach den jetzigen Reinigungsmethoden gewonnene Gelatine noch nicht als chem. einheitlich betrachten. (Biochemical Journ. **18**. 1102—6. 1924.)

SPIEGEL.

Eleanor Violet Horne, *Untersuchungen über Gelatine*. VIII. *Der osmotische Druck der Gelatine in Lösungen von Natriumsalicylat*. (VII. vgl. vorst. Ref.). Nalicylat hält Gelatine in Lsg., ohne chem. einzuwirken. Der osmot. Druck solcher Lsgg. hängt von ihrer Konz. ab. Er steigt mit dieser, aber dieses Steigen wird dadurch erhöht, daß bei niedrigen Konzz. das scheinbare Aggregatgewicht größer ist, z. B. ca. 40000 in 0,9%ig. Lsg. gegen ca. 16000 in 3%ig. Lsg. Geringe Mengen anorgan. Stoffe in der Gelatine scheinen ohne Einfluß. (Biochemical Journ. **8**. 1107—13. Imp. Coll. of Science and Technol.)

SPIEGEL.

E. Biochemie.

E₁. Enzymchemie.

Victor Estienne, *Neue Untersuchungen über Maltase*. (Vorläufige Mitteilung.) Beim Züchten auf maltosehaltiger Nährlsg. (erhalten durch Verzuckerung von Stärke mit Amylase) bildete *Aspergillus niger* etwas mehr Maltase als *Asp. clavatus*. Bedeutend mehr als *Mucor Boulard*. *Monilia candida*, *Schizosaccharomyces ellacei* oder *Bact. mesentericum*. Die B. von Maltase wurde an der Reduktionsnahme der Nährlsg. gemessen. — Fermentpräparate wurden erhalten, indem das Mycel vor Beginn der B. von Sporen gesammelt, mit W. gewaschen u. erst in der Luft u. dann im Exsiccator über P₂O₅ oder H₂SO₄ getrocknet wird. Die trockene M. wird gepulvert. — Die Drehung der angewandten reinen kryst. Maltose wurde zu $[\alpha]_D = +133,5^\circ$ bestimmt. — *Aspergillus niger* spaltet Maltose rascher als *Takadiastase*. — Bei *Asp. niger* u. *Mucor Boulard* wird 1—10%ig. Maltoselsg. in 100% gespalten. Dagegen wurden mit Maltasen aus höheren Pflanzen (Mais,

Runkelrübe, Kapuzinerkresse) nie eine vollständige Spaltung erhalten. — Die Maltase der getrockneten Pilze war nach mehreren Jahren noch gut wirksam. — Vf. empfiehlt, die Best. der Maltase mit 1,5%ig. Aufschwemmung des Pilzes in 2%ig. Maltoselsg. vorzunehmen. (Journ. Pharm. de Belgique 6. 797—802. 813—19. 1924 Löwen, Inst. CARNOY.) A. R. F. HESSE.

Malcolm Dixon und Sylva Thurlow, *Studien über die Xanthinoxydase*. I. biol. III. Mitt. I. *Herstellung und Eigenschaften des aktiven Materials*. Die Best. des Enzyms erfolgte nach der Methode von THUNBERG (Skand. Arch. f. Physiol. 40 1; C. 1920. III. 390.) mit Methylenblau 1 : 5000 u. Lsgg. der Purinbasen, die 2 mg in 1 ccm ganz verd. NaOH enthielten. — Die Enzympräparate wurden aus Milch gewonnen, aus der das Enzym zusammen mit dem Caseinogen durch Zugabe der gleichen Vol. gesätt. $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ -Lsg. gefällt wurde; der Nd. wird zwischen Filterpapier getrocknet, gemahlen, mit Ä. extrahiert u. im Exsiccator getrocknet. — Au. neutraler Lsg. wird das Enzym an Kohle schlecht, dagegen gut an $\text{Al}(\text{OH})_3$ u. Filterpapier adsorbiert. In den Adsorbaten behält das Enzym seine Wirksamkeit. — Die Wrkg. des Enzyms wird durch fein verteiltes Fett gefördert. Atmosphärisches O_2 zerstört das Enzym. — A. oder Aceton zerstören das Enzym; Ä. CHCl_3 , Toluol oder Glycerin schädigen nicht. — Hypoxanthin u. Xanthin können nach längerem Stehen ihrer neutralen Lsg. nicht mehr durch das Enzym oxydiert werden.

II. *Die Dynamik des Oxydasesystems*. Das Optimum der Wrkg. liegt zwischen pH 5,5 u. 9, die Aktivitäts- pH -Kurve verläuft hier parallel für Abszisse; auf beiden Seiten des Optimums findet man einen sehr steilen Abfall der Kurve. Jenseit $\text{pH} = 9$ bzw. $\text{pH} = 4$ wird das Enzym rasch zerstört. — Die Geschwindigkeit der Rk. ist der Konz. des Enzyms proportional u. unabhängig von der Konz. der Methylenblaus, ausgenommen wenn diese Konz. sehr gering ist. — Bei hoher Konz. an Purinbase wird die Geschw. der Rk. gehemmt. Bei mittleren Konz. ist die Geschw. der Rk. von der Purinbasenkonz. unabhängig. — Die Oxydation von Hypoxanthin wird durch Ggw. von Harnsäure, Guanin oder Adenin gehemmt. Je größere Mengen Enzym vorhanden sind, desto größer ist die zur Hemmung nötige Menge. — Bei hohen Substratkonz. wirken Hypoxanthin u. Xanthin gleich stark bei den Substratkonz., bei denen die Rk. nicht mehr durch das Substrat gehemmt wird, wird Methylenblau durch Hypoxanthin zweimal so schnell wie durch Xanthin reduziert. — Vf. erörtern die Frage, ob die Xanthinoxydase mit dem *Schardinger Enzym* identisch ist. Die Frage ist heute noch nicht lösbar, jedoch halten die Vf. die Identität für wahrscheinlich. Bei pH 4,1—4,3, wo die Xanthinoxydase völlig unwirksam ist, wird *Acetaldehyd* unter Entfärbung des Methylenblau oxydiert.

III. *Die Reduktion von Nitraten*. Vf. treten der Ansicht von HAAS und HILL (Biochemical Journ. 17. 671; C. 1924. I. 1224) entgegen, daß die von den genannten Autoren mit „atite“ benannte angeblich die Reduktion von Nitrat durch Milch bewirkende Substanz von dem Schardingerenzym verschieden ist. Nitrate werden durch Milch oder Präparate der Xanthinoxydase in der gleichen Weise reduziert wie in den oben beschriebenen Verss. das Methylenblau reduziert wird. Alle bei Methylenblau als Acceptor beschriebenen Erscheinungen werden bei der Red. von Nitrat wiedergefunden. (Biochemical Journ. 18. 971—75. 976—88. 989—92. Cambridge, Univ.) A. R. F. HESSE.

R. Lecoq, *Unähnlichkeiten der amylolytischen Fermente bei verschiedenen Präparaten aus gekeimter Gerste*. (Vgl. LECOQ u. WARG, Journ. Pharm. and Exp. Therapeutics [7] 30. 231; C. 1924. II. 2560.) Das früher beobachtete Optimum der Temp. für die Wrkg. von Gerstenamylase auf Stärke konnte nicht bestätigt werden; die beste Wrkg. auf rohe Stärke wurde jetzt bei 50°, die beste Wrkg.

uf gekochte Stärke bei 70° gefunden. (C. r. soc. de biologie 91. 924—26. 1924.) A. R. F. HESSE.

R. Weitz und R. Lecoq, *Ähnlichkeiten zwischen Ptyalin und Amylase aus gemelter Gerste*. Die Temperaturoptima für Speichelamylase liegen bei den gleichen Punkten wie sie für Gerstenamylase (vgl. vorst. Ref.) gefunden wurden. (C. r. soc. de biologie 91. 926—27. 1924.) A. R. F. HESSE.

A. W. Blagowjeschtschenski, *Über die spezifische Wirkung von pflanzlichen Präparaten*. An Extrakten mit 5%ig. NaCl aus Pflanzensamen, aus denen durch Verd. mit V. die Globuline ausgefällt waren, wird gezeigt, daß die erhaltenen Fermentlsgg. stets als arteigene Globulin bedeutend besser spalten (bestimmt durch Zunahme des $[H_2N]$ nach SÖRENSEN) als das Globulin der anderen Pflanzen. — Fermente aus nahe verwandten Pflanzen (z. B. Phaseolus u. Dolichos) spalten das fremde Globulin fast ebenso gut wie das eigene. (Biochemical Journ. 18. 795—99. 1924.) A. R. F. HESSE.

Richard Kuhn und Georg Ernst v. Grundherr, *Einfluß der Acidität bei Einwirkung von Hefe-Auszügen auf konzentrierte Traubenzuckerlösungen*. Bei der Verfolgung der synthet. Wrkg. der Fermente der Hefe (vgl. CROFT HILL, Journ. chem. Soc. London 83. 578 [1903]) in Abhängigkeit von p_H finden Vf. mit Sinner-Löwenbräuhefe zwei Maxima für die Geschwindigkeit der Reduktionsabnahmen, zwar zwischen p_H 4 u. p_H 6 u. dann bei p_H 7,3—7,5, während bei p_H 6,5—6,8 ein ausgeprägtes Minimum liegt. Vf. haben die Überzeugung, daß es sich um B. zweier Reaktionsprodd. unter Einw. von mindestens zwei Fermenten handelt (vgl. RINGSHEIM u. LEIBOWITZ, Ber. Dtsch. Chem. Ges. 57. 1576; C. 1924. II. 2487). — In der anderen unters. Hefe scheint die in spurenweise alkal. Lsg. wirkende Enzymkomponente zu fehlen; die Auszüge lassen nur ein Optimum bei $p_H = 5$ erkennen. Auch dies spricht für das Vorhandensein zweier Enzyme. — Die Ausbeuten an Disaccharid hängen von der Konz. der Glucoselsg. ab. Die Synthese verläuft am schnellsten in 40%ig. Lsg. bei $p_H = 5$. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 57. 1852—54. 1924. München, Akad. d. Wiss.) A. R. F. HESSE.

Richard Kuhn, *Über die Konstitution der Stärke und die verschiedenen Wirkungsweisen der Amylasen*. Kinet. Messungen über enzymat. Spaltung von I. Stärke, Amylose u. Amylopektin, für welche Beispiele in 2 Figuren gegeben werden, haben gezeigt, daß durch Malzamyase die Gesamtmenge der Maltose in β -Form $[\alpha]_D = +112^\circ$ in Freiheit gesetzt wird, während durch maltasefreie Pankreasnylase- oder durch Takadiastase α -Maltose $[\alpha]_D = +158 \pm 5^\circ$ gebildet wird. Einige Malzamyasen werden durch β -Glucose oder β -Maltose, nicht aber durch α -Glucose oder α -Maltose (extrapoliert aus dem Vergleich von β - u. α, β -Maltose) gehemmt. Nach diesen Befunden unterscheidet Vf. α - u. β -Amylasen. — Bei der Verfolgung der raschen Stärkeverzuckerung durch α -Amylasen erkennt man, daß neben der eigentlichen zur Freilegung der Aldehydgruppen führenden Hydrolyse neben der Mutarotation der Zucker noch eine von starkem Anstieg des Ordnungsvermögens begleitete Rk. läuft. Vf. schließt daraus, daß je zwei in der Stärke nachbarte Glucosereste ungleichartig sind, daß nämlich nur einer eine O-Brücke in 1,4-Stellung trägt. Werden nun „ β “-Bindungen, z. B. durch Malzamyase gelöst, erfolgt die Isomerisierung zum butylenoxydischen O-Ring (wie er in Maltose vorgef. im reduzierenden Glucoserest des primär entstehenden Disaccharides u. ist über ohne Einfluß auf die Bindungsart der beiden Glucosemoleküle. Bei Spaltung der α -glucosid. Bindungen durch Pankreasamylase erfolgt die Ringverweiterung oder Verengerung im nichtreduzierenden Zuckerrest, wobei dann neben dem Neuschluß des O-Ringes in 1,4-Stellung die „ β “-Bindung in die α -Bindung eines neuen Maltosemol. erfolgt, was im intermediären Anstieg des Drehungsvermögens zum Ausdruck kommt. — Vf. unterscheidet 3 Wege des Stärkeabbaues, die durch Um-

lagerung eines nur in den Grundkörpern von Amylose u. Amylopektin stabile Oxydoringes verstanden werden können: 1. Hydrolyse durch Malzamyrase unter Isomerisierung in der reduzierenden Hälfte des gebildeten Malzzuckers, 2. intraglycosid. Umlagerung in der nicht reduzierenden Hälfte eines Disaccharides durch Pankreasamyrase gleichfalls unter B. von Maltose, 3. interglycosid. Isomerisierung wie z. B. bei der Umlagerung von α - in β -Polyamylosen, die zu Anhydriden von Trisacchariden führen können. — Die Existenz besonderer O-Brücken in den Glykogen aufbauenden Glucoseresten scheint für den Befund von NEUBERG u. GOTTSCHALK (Biochem. Ztschr. **146**. 164; C. **1924**. II. 491), daß die durch *Insulin* stimulierte B. von Acetaldehyd in Gewebesbrei durch Glykogen mehr als durch Glucose erhöht wird, eine Deutung zu ermöglichen. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. **57**. 1965—68. 1924. München, Lab. d. Akad. d. Wiss.) A. R. F. HESSE.

Richard Willstätter, Felix Haurowitz und Friedrich Memmen, Zur Spezifität der Lipasen aus verschiedenen Organen. IX. Abhandlung über Pankreasenzym (VIII. vgl. Ztschr. f. physiol. Ch. **138**. 216; C. **1924**. II. 1805.) In der Arbeit wird gezeigt, daß bei den bisher angewandten Untersuchungsmethoden kein Anhaltspunkt geblieben ist, von dem auf die Verschiedenheit der Pankreas- u. der Magenlipase zu schließen wäre. Nur bei Prüfung der opt. Spezifität findet man eine Verschiedenheit, da die durch Magenlipase aus Mandelsäureäthylester u. aus Phenyl-essigsäuremethylester gebildeten Spaltprodd. im Drehungssinn von den durch Pankreas oder Leber gebildeten Prodd. abweichen: „Wenn die auswählende Wrk. auf die asymmetr. Substrate als eine Eigenschaft der Enzyme selbst, nicht der physiol. Enzymkomplexe zu betrachten ist, so erlaubt die Prüfung dieser Spezifität die Magenlipase als verschieden von der Pankreaslipase zu kennzeichnen.“ — Die Präparate der Magenlipase wurden durch Extraktion der von der Muskulatur der Tunica propria abgetrennten u. dann mit Aceton getrockneten Magenschleimhaut durch 2 std. Extraktion mit der 50fachen Menge $\frac{1}{40}$ -n. NH_3 erhalten. Zu Aufbewahren müssen die Lsgg. auf $\text{pH} = 4,7$ eingestellt werden. Die Magenlipase läßt sich durch Ausflocken mit CH_3COOH , Elektrodialyse gegen $\frac{1}{100}$ -n. CH_3COOH u. Adsorption an Kaolin oder Tonerde u. Elutin mit $2\frac{2}{3}$ -bas. Ammonphosphat reinigen. Das Optimum der Wrkg. des ungereinigten Enzyms liegt beim Magen des Schweines bei $\text{pH} = 7,1$ — $7,9$, für Pferd bei $8,6$, für Hund bei $5,5$ — $6,3$, für Katze u. Wildente bei $5,5$ für Kaninchen bei $6,3$. Nach den untersuchten Beispielen scheint die Magenlipase der Carnivoren (Hund, Katze außerdem auch Wildente) für saueres Medium, die der Herbivoren (u. zwar durch Arsofiatin mit gewissen Begleitstoffen, s. u.) für alkal. Medium eingestellt zu sein.

Die Form der Aktivitäts- pH -Kurven der rohen Magenlipasen ändert sich wenig bei Verwendung anderer Puffer, beträchtlicher beim Altern der Präparate u. sehr stark bei der Reinigung. Für Hundemagen verschob sich bei Reinigung des pH -Optimum nach der alkal. Seite; es lag bei einem reinen Präparat etwa bei $\text{pH} = 7,0$. Die Vf. erklären dieses Verh. durch Beimischungen, welche im alkal. Gebiet hemmen u. Aktivatoren, die im sauren Gebiet fördern. Diese werden bei der Reinigung zum Teil entfernt. Die Form der Aktivitäts- pH -Kurven ist für die Magenlipase einer Tierart im ungereinigtem Zustand konstant; sie ist aber keine Eigenschaft des Enzyms selbst. — Lipase aus frischem Hundemagen, auch nach Reinigung, ist nicht durch $\text{Ca-Oleat} + \text{Albumin}$ aktivierbar; dagegen wurden in einigen, aber nicht allen Fällen die Auszüge aus längere Zeit aufbewahrtem getrocknetem Hundemagen durch diese Zusätze aktiviert. — Die Magenlipase verhält sich wie Pankreaslipase im Gegensatz zu Leberlipase sowohl Olivenöl als auch einfach Ester gut zu spalten. Da das Enzym nicht ausgleichend aktivierbar ist u. also die Begleitstoffe bei wechselndem pH ungleich wirken, gibt die stalagmometr. Messung nur scheinbare Enzymmengen, die mit $B\text{.}[e]$ bezeichnet werden; dadurch wird

ausgedrückt, daß die gemessene Wrkg. (Abnahme der Tropfenzahl) derjenigen leicht, die von der Pankreaslipasmenge 1 B.-E. unter eindeutig bestimmten Bedingungen bewirkt würde. (Ztschr. f. physiol. Ch. **140**. 203—22. 1924. München, akad. d. Wiss.)

A. R. F. HESSE.

Marjorie Martland, Frank S. Hansman und Robert Robison, *Die Phosphatase des Blutes*. (Vgl. Biochemical Journ. **18**. 765; C. 1924. II. 1375.) Das Enzym wirkt bei 38° am besten bei $p_H = 7,0$. — Das Enzym findet sich sowohl in Plasma, als auch in den Blutkörperchen. — Von den Phosphatasen der Muskel der denen der Knochen ist es unterschieden (außer durch das Optimum der Wrkg.) durch seine Fähigkeit, die (noch unbekannten) Phosphorsäureester des Blutes zu spalten. Es wirkt nicht auf Caseinogen, Phytin oder Nucleinsäuren, ist aber imstande, Nucleotide zu spalten. — Auf Grund der Erscheinungen bei der Verfolgung der Reduktionsänderung während der Phosphatasewrkg. kommen Vff. zu der Annahme, daß der im Blut vorhandene Zucker einerseits an Phosphorsäure, andererseits — u. zwar mit der reduzierenden Gruppe — an einen anderen noch unbekannten Rest gebunden ist; möglicherweise erfolgt die Spaltung dieser beiden Bindungen durch zwei verschiedene Enzyme, da B. von Phosphorsäure u. Wachsen des Reduktionsvermögens nicht parallel laufen. (Biochemical Journ. **18**. 1152 bis 160.)

A. R. F. HESSE.

J. Spohr, *Beiträge zur Kenntnis der organischen Fermente*. Chymase kann an Alkalien gewöhnt u. in stark alkal. Lsg. gehalten werden. Hieraus nach einem neuen „biol.“ Verf. des Vfs. ausgeschieden, bildet sie eine braune M., die Casein viel energischer als anders hergestellte Labfermente koaguliert. Vf. hat sein neues ferment, „Novochimosin“, angeblich auch züchten können, sieht in ihm ein „organisiertes Wesen“. (Schweiz. Apoth.-Ztg. **62**. 693—94. 1924. Lugano.)

SPIEGEL.

E₃. Pflanzenchemie.

P. Sajous, *Zusammensetzung einiger korsischer Olivenarten*. 15 Analysenergebnisse: Gewicht von 100 Oliven 74,5—428 g, von 100 Kernen 13,3—75,7 g, Kerngehalt 17,9—22,2%, Trockensubstanz 23,94—33,03%, Ölgehalt 25,03—37,5%. (Ann. des Falsifications **17**. 404—7. 1924. Ajaccio, Lab. départemental.)

GROSZFELD.

M. A. Rakusin und Anna Starobina, *Über die fetten Öle der Früchte der wichtigsten Umbelliferen*. Bei der Fettbest. in den Samen der Umbelliferen u. deren Rückstände nach Gewinnung der äth. Öle fallen die %-Gehalte an Fett um so höher aus, je sorgfältiger die Samen zerkleinert werden. Diesem Umstande sind besonders die in dem Schrifttum mitgeteilten, sehr differierenden Angaben über die Fettgehalte dieser Samen zuzuschreiben. Auf Grund der in zahlreichen Tabellen niedergegebenen Versuchsergebnisse folgern Vff., daß die Extraktion der Samen mit Ä. oder Chlf. feinere Zerteilung u. die Behandlung mit Wasserdampf gröbere Zerteilung voraussetzt. Die mit Wasserdampf behandelten Früchte geben die höchste Ertragsbeute, wenn sie nach dem Trocknen gesiebt u. nochmals gemahlen werden. Entsprechend wird folgendes Vf. der Fettbest. empfohlen: Behandlung der luftgetrockneten grob zerkleinerten Samen mit Wasserdampf, trocknen im Wassertrockenschrank, nochmaliges Mahlen u. Sieben durch ein 0,5 mm Sieb vor dem Extrahieren. Nach dieser Methode wurden folgende durchschnittliche Fettgehalte in den untersuchten Samen erhalten: Anis 28,185%, Coriander 20,70%, Dill 19,08%, Fenchel 17,635%, Kümmel 18,215%. Anschließend werden die zur Feststellung der Öle geeigneten physikal.-chem. Konst. angegeben. Da bei der Best. des W. im Trockenschrank die äth. Öle zum größten Teil verflüchtigt werden, u. somit die Ergebnisse für Wasserbest. viel zu hoch ausfallen, trocknen Vff. die in einem gewogenen Glaskölbchen befindlichen u. in einer sd. konz. NaCl-Lsg. erwärmten Samen unter Durchleiten eines getrockneten Luftstromes u. fangen das entweichende W. in

2 gewogenen, mit getrocknetem Na_2SO_4 gefüllten Röhren auf, denen ein mit kon. H_2SO_4 gefüllter K_2O -App. angeschlossen ist, in welchem der größte Teil der mitgerissenen äth. Dämpfe zurückgehalten wird. (Landw. Vers.-Stat. **103**. 103—104. 1924. Petrograd.)

BERJU.

P. Langlais und **J. Goby**, *Beitrag zur Untersuchung des festen Irisöls*. Kurze Ref. nach C. r. d. l'Acad. des sciences vgl. C. **1924**. II. 1474. Nachzutragen ist, daß aus der nach Umkrystallisieren der Pelargonsäure erhaltenen Mutterlauge *Benzoessäure* gewonnen wurde. (Bull. Soc. Chim. de France [4] **35**. 1307—1308. 1924. Amer. Perfumer **19**. 429—30. 1924. Grasse, Tombarel Frères.)

HABERLAND.

G. Dupont, *Die sauren Bestandteile der Coniferenharze*. Zusammenfassender Vortrag über die geschichtliche Entw. u. den gegenwärtigen Stand unserer Kenntnisse unter besonderer Berücksichtigung der Ergebnisse eigener Arbeiten des Vf. (Bull. Soc. Chim. de France [4] **35**. 1209—70. 1924. Bordeaux, Inst. du Pin.)

James Matthew Petrie, *Die gelben Farbstoffe australischer Akazien*. Untersucht wurden die Blütenfarbstoffe von *Acacia disolor*, *A. linifolia*, *A. decurrens var. mollis* u. *A. longifolia*. Die in W. l. gelben Farbstoffe zeigten sich ident. u. nach den Ergebnissen der Spaltung als *Rhamnosid des Kaempferols*. Kaempferol bildet mit H_2SO_4 ein Oxoniumsalz, orangefarbene Krystalle. Red. durch naszierenden H_2 in alkoh. Lsg. führte zu einem roten anthocyanidinartigen Farbstoff. — In den Gerbstoffen wurden *Phloroglucin*, *Protocatechusäure* u. *Gallussäure* nachgewiesen. Außer den in W. l. Farbstoffen fanden sich Plastidfarbstoffe, *Caroten* u. *Xanthophyll* zu 0,14—0,3% u. *Flavonol* zu ca. 0,06% der frischen Blüten. (Biochem. Journ. **18**. 957—64. 1924. Sydney, Univ.)

SPIEGEL.

Silvestr Prát, *Die Farbstoffe der Potamogetonblätter*. Vf. bestätigt u. ergänzt die Angaben von MONTÉVERDÉ u. LUBIMENKO (Bull. Acad. St. Pétersbourg **191**. 1105; C. **1914**. I. 1093). Das *Rhodoxanthin*, von dem ähnlichen *Fucoxanthin* durch unterschieden, daß es mit verd. Säuren nicht reagiert, ist isoliert sehr leicht unecht, entfärbt sich auch im Dunkeln sehr schnell. Aus getrockneten, im Dunkeln aufbewahrten Blättern konnte nach längerer Zeit, aus in diffusum Licht aufbewahrten schon nach einigen Tagen, durch Aceton oder CH_3O kein roter Farbstoff mehr extrahiert werden. — Sowohl in grünen wie in braunen Blättern von *Potamogeton* wurden reduzierende Zucker gefunden. Wurden die Blätter von *P. natans* untergetaucht gehalten, so blieben sie länger braun u. ergrüneten bei Übertragung in feuchte Luft schneller als n. schwimmende. Bei *P. lucens* bildeten umgekehrt die in die Luft hinausragenden jungen Blätter braune Chromoplasten. — Der in den rot werdenden Chromatophoren von *Aloe* entstehende Farbstoff gehört wahrscheinlich gleichfalls in die Gruppe der Xanthine. Ein ähnlicher Farbstoff findet sich auch in den unteren Internodienpartien von *Equisetum limosum*, die von der Blattscheide umgeben sind, u. in den unteren untergetauchten fleischigen bis violettroten Teilen. Dagegen wird die braune Färbung der Chromoplasten von *Neottia* durch einen anderen Farbstoff bedingt; diese Chromoplasten werden durch verschiedene Reagenzien schnell grün. (Biochem. Ztschr. **152**. 495—97. Pr. Tschech. Univ.)

SPIEGEL.

R. J. Anderson, *Ein Beitrag zur Chemie der Traubenpigmente*. III. Über *Anthocyane in Seibeltrauben*. (II. vgl. ANDERSON u. NABENHAUER, Journ. Bi. Chem. **61**. 97; C. **1924**. II. 2170.) Das Anthocyan dieser Trauben, einer Kreuzung zwischen europäischen u. amerikanischen Varietäten, ist ein Monoglucosid, anscheinend ident. mit *Oenin*, dem Glucosid aus *Vitis vinifera*. Der Farbstoff wurde in Form des *Pikrats*, dunkelroter Nadeln, isoliert, das *Chlorid* bildet lange Prismen mit Zus. $\text{C}_{23}\text{H}_{25}\text{O}_{12}\text{Cl} \cdot 3\text{H}_2\text{O}$. Nach Kochen des Anthocyan mit 20%ig. HCl krystallisiert das *Anthocyanidinchlorid*, $\text{C}_{17}\text{H}_{15}\text{O}_7\text{Cl} \cdot 1\frac{1}{2}\text{H}_2\text{O}$, in Prismen, nach der OCl -Best. zu großem Teil aus *Dimethyläther des Delphinidins*, augenscheinlich aber nicht

was Monomethyläther bestehend, sehr ähnlich dem Oenidin von WILLSTÄTTER u. COLLINGER oder ident. damit. Die Absorptionsspektren des Anthocyanins u. des Anthocyanidins zeigen ein breites Band von Gelb bis Blau. (Journ. Biol. Chem. **61**. 685 u. 694. 1924. Geneva, New York Agr. Exp. Stat.)

SPIEGEL.

W. L. Mallmann und Carl Hemstreet, Isolierung einer das Wachstum der Bakterien hemmenden Substanz aus Pflanzen. Aus dem Filtrat der Säfte von faulem Kohl wurde eine „inhibitorische Substanz“ isoliert, welche gegen andere die Fäulnis verursachende Organismen aktiv war aber diese Aktivität nach weiterem Erhitzen bald verlor. 20 Min. langes Erhitzen bei 56° zerstörte diese Substanz nicht, dagegen Erhitzen bei 63° nach 1/2 Stde. Die Wirksamkeit dieser Substanz, selbst nach großer Verd., deutet ihr reichliches V. in dem faulenden Saft an. (Journ. Agricult. Research. **28**. 599—602. 1924.)

BERJU.

E₃. Pflanzenphysiologie. Bakteriologie.

W. Rudolfs, Wirkung der Samen auf die H-Ionenkonzentration der Lösungen. Lsgg. von $MgSO_4$, $NaNO_3$, $Ca(NO_3)_2$, $NaCl$, KCl u. K_2SO_4 , deren Konz. zwischen 0,001 u. 7 at. lagen, wurden die Samen verschiedener Pflanzen eingeweicht. Die Ergebnisse zeigten eine merkliche Zunahme der $[H^+]$ bei fortschreitender Abnahme der Salzkonz. der einzelnen Salzlsgg. Die pH -Werte der sehr stark verd. Lsgg. änderten sich nach 15stg. Berührung mit den Samen eine auffallende Ähnlichkeit. Das Maximum der Reaktionsänderung trat nach verhältnismäßig kurzer Zeit ein. Die schnelle Änderung der Rk. der Lsgg. schreibt Vf. der schnelleren Absorption der Ionen durch die Samen zu. (Bot. Gaz. **74**. 215—20. 1922; Exp. Stat. Rec. **50**. 13—24.)

BERJU.

G. W. Pigulewski, Zur Kenntnis des Bildungsvorganges ätherischer Öle bei Pinus cembra L. III.—VI. Mitt. (II. vgl. Journ. Russ. Phys.-Chem. Ges. **54**. 259; C. **1923**. 1028.) III. Chemische Zusammensetzung des ätherischen Öls aus den Nadeln von Pinus cembra L. Frisch aus Nadeln dest. Öl wurde einer Dest. unter vermindertem Druck unterworfen; die Hauptfraktion (Kp_{23} 61—63°) enthielt hauptsächlich rechtsdrehendes Pinen, Kp 152,5—152,8°, $[\alpha]_D = +35,64$, $[\alpha]_D = +45,05$, $[\alpha]_D = +57,80$, $[\alpha]_D = +69,23$ (vgl. FLAWITZKI, Journ. f. prakt. Ch. **45**. 115 [1892]). In einer schwerer sd. Fraktion (Kp_{14} 129—131°) wurde Cadinen, $C_{15}H_{24}$, durch sein Dichlorid nachgewiesen; die mit einem KW-stoff, $C_{15}H_{26}$, verunreinigte Fraktion hatte $[\alpha]_D = -76,58$, $[\alpha]_D = -142,97$.

IV. Bildung und Umwandlung des ätherischen Öls bei Pinus cembra (mit **W. Wladimirowa u. A. A. Markow**). Es wurden während zwei Vegetationsperioden die Nadeln von mehreren Bäumen auf ihr Gewicht, Trockengewicht, Ölgehalt u. Ölzusammensetzung (teilweise allwöchentlich) untersucht. Das Wachstum der Nadeln u. die Zunahme ihres Trockengewichts dauert bis zum Ende Juli, die Reife des äth. Öls bis zum Oktober. Im zweiten u. dritten Lebensjahre der Nadeln bleibt ihr Ölgehalt, auf das Gewicht frischer Nadeln bezogen, unverändert, auf das Trockengewicht bezogen, nimmt er ab. Im Laufe der Zeit ändert sich die Drehung des Öls zu, was auf eine Verschwindung des Cadinens bei der Erzeugung des Pinens hinweist; auch geben ältere Teile einer Nadel (Spitze) ein stärker rechtsdrehendes Öl als die jüngeren, proximal liegenden Teile, deren Öl oft linksdrehend ist. Vf. vermuten, daß Cadinen sich in Harzsäuren umwandelt. V. Bildungsvorgang des ätherischen Öls bei Abies sibirica (mit **W. F. Grigorjew**). Die Nadeln von Abies sibirica enthalten 1,3—2% äth. Öl. Der Hauptbestandteil des Öls ist essigsäures Borneol (44—51%). Die Ölausbeute u. die Zus. des Öls hängen von Baum zu Baum weniger als bei Pinus cembra.

VI. Bildung und Umwandlung des ätherischen Öls bei Abies sibirica (mit **W. F. Grigorjew**). Die Nadeln u. ihr Trockengewicht wachsen bis zur Mitte

Juli, die Ölausbeute auch den ganzen August. Der Ölgehalt ein- u. zweijähriger Nadeln nimmt mehr nicht zu, eher ab. Die Konz. des essigsäuren Borneols ändert sich während der Vegetationsperiode kaum; eine oft beobachtete geringe Konzentrationszunahme führen Vff. auf das Verharzen anderer Bestandteile zurück. Die jungen Zweige enthalten, nach Verss. von **A. A. Grünberg**, ca. 3mal weniger Öl als die Nadeln. (Journ. Russ. Phys.-Chem. Ges. **55**. 171—210. 1923/24. Peterhof, Naturwiss. Inst.)

BIKERMAL

C. Griebel, *Acetaldehyd, ein normaler Bestandteil der als „Inklusen“ bezeichneten gerbstoffreichen Zelleinschlüsse im Mesokarp bestimmter Früchte*. Mit dem Verf. d. Vff. (Ztschr. f. Unters. Nahrsgs.- u. Genußmittel **47**. 438; **C. 1924**. II. 1754) wurde Acetaldehyd nicht nur in den Inklusen der bei der Überreife teilig werdenden Früchte (*Speierling, Feldbirne, Elsebeere, Mispel*), sondern anscheinend bei allen Fruchtarten gefunden, die sich vor der Reife durch herben Geschmack auszeichnen, diesen aber während der Reife oder Nachreife verlieren (*Johannisbrot, Kornkirsche, Banane*). Der Acetaldehyd scheint die Substanz zu sein, die die Gerinnung u. damit das Geschmackloswerden der Gerbstoffsubstanzen in den Zellen der Früchte herbeiführt. (Ztschr. f. Unters. Nahrsgs.- u. Genußmittel **48**. 218—220. 1924.)

GROSZFELD

C. Griebel, *Einige Beobachtungen über den Reifungsprozeß der Bananen*. In mikr. Präparaten (Abb. in der Quelle) wurde nachgewiesen, daß der in den Sekretzellen der Bananen vorkommende Gerbstoff in unreifen Früchten in l. Form vorhanden ist, während er in reifenden unl. geworden ist. Es wurde nachgewiesen, daß diese Gerinnung des Gerbstoffes ähnlich wie in den Inklusen (vgl. vorst. Bericht) bei Ggw. von Acetaldehyd, der bei der Reifung in den Sekretzellen in leicht spaltbarer Form entsteht, erfolgt. Auch beim Trocknen unreifer Bananen gerinnt das Sekret unter Braunfärbung, woraus sich die Geschmacklosigkeit des daraus erhaltenen Bananemehles erklärt. — Merkwürdigerweise enthalten die Sekretschläuche der Bananenschale reichlich *Kautschukkügelchen*, die des Markes dagegen nicht. (Ztschr. f. Unters. Nahrsgs.- u. Genußmittel **48**. 221—27. 1924. Berlin, Staatl. Nahrungsm.-Unters.-Anst.)

GROSZFELD

S. Sierakowski und **R. Zajdel**, *Über die Rolle des Kohlensäureanhydrids in Bakterienkulturen*. (Vgl. **SIERAKOWSKI**, Biochem. Ztschr. **151**. 15; **C. 1924**. II. 227.) Zwischen CO₂-Dissoziation u. Bakterienkulturentw. besteht ein Zusammenhang. In Bakterienkulturen wird CO₂ als Atmungsprod. ausgeschieden. Die luftdicht abgeschlossenen Kulturen werden von der CO₂, welche keinen Abfluß hat, angesäuert. Daher verschiebt sich das Ionenverhältnis von HCO₃ u. CO₃ zugunsten der CO₂-Moll. Wenn die HCO₃-Ionenzahl der der CO₂-Moll. gleicht, bleibt die Kultur stehen. Möglicherweise schafft der steigende Säuregrad, bei dem die Zahl der CO₂-Moll. rasch wächst, ungünstige Bedingungen für die Bakterienentw.; das Verschieben bei p_H = 6,7. (Biochem. Ztschr. **152**. 111—15. 1924. Warschau, Staatl. Inst. f. Hyg.)

WOLFF

Wright A. Gardner, *Zersetzung gewisser organischer Toxine durch Vanillin zersetzende Organismen*. Reinkulturen verschiedener Vanillin zers. Organismen auf mehreren Böden wurden in Nährböden mit *Resorcin, Cumarin, Chinolin, Benzidin* u. *Kaffein* eingimpft. In keinem dieser Nährböden trat Wachstum der Bakterien oder Zers. des Giftes ein. (Science **60**. 390. 1924. Auburn [Alabama], Alabama Polytechn. Inst.)

SPIEGEL

H. C. Brown, J. T. Duncan und **T. A. Henry**, *Die Gärung von Salzen organischer Säuren als Hilfsmittel zur Differenzierung von Bakterientypen*. Die Anforderungen der Rk. u. die Gasentw. in Medien, die organ. Salze enthalten, sind wenig konstant, um einen verlässlichen Anhalt zur Differenzierung einzelner Bakterientypen zu geben. Meist ist Verstärkung oder Hemmung des Wachstums im

ichen Medien in direktem Verhältnis zur Ausnutzung des Salzes durch den Organismus. Bei Anwendung von Citraten liefert dieses Verh. ein nützliches Untercheidungsmerkmal, für andere Salze aber gilt dies nicht immer. Soweit die Säuren u. Pb-Salze liefern, läßt sich die Zers. der Salze durch Bakterien durch Zusatz geeigneter Mengen von Pb-Acetat zur Kultur leicht feststellen. So ließ sich unter Verwendung von 6 Salzen (der Citronensäure, d-, l- u. Mesoweinsäure, Fumarsäure (Schleimsäure) die Unterscheidung von 7 verschiedenen Gruppen unter den 11 gewöhnlichen *Salmonella*-Typen durchführen, während die Zuckerrkk. bisher nur 4 erkennen ließen. In anderen Bakteriengruppen können die organ. Salze zur Untercheidung zwischen pathogenen u. gewissen nichtpathogenen *Vibrionen*, zwischen gewissen Gliedern der *Coli-Aerogenesgruppe*, zwischen *B. diphtheriae* u. *Hofmannschem Bacillus* sowie zwischen *B. mallei* u. *B. whitmori* dienen. — Viele andere organ. Salze, die außer den oben genannten geprüft wurden, haben versagt. Es scheint, daß einfache aliphatische 1- u. 2-bas. Säuren außer Ameisensäure durch die Bakterien nicht leicht genug zerlegt werden. Dies gilt auch noch für Monoxycarbonsäuren. Die Natur der Zersetzungsprodd. wurde im Falle der *Citronensäure* des *Bac. suipestifer* eingehend untersucht. Es entstehen $\text{CH}_3 \cdot \text{CO}_2\text{H}$, CO_2 u. $(\text{H}_2 \cdot \text{CO}_2\text{H})_2$. *Fumarsäure* u. anscheinend auch *Maleinsäure* werden in $(\text{CH}_2 \cdot \text{CO}_2\text{H})_2$, vermutlich durch direkte Red., verwandelt. (Journ. of Hyg. **23**. 1—22. 2 Tafeln. 24. Sep. London School of Trop. Med. WELLCOME Bureau of Scientif. Res. and (em. Res. Labb.)

SPIEGEL.

J. C. Geiger und W. E. Gouwens, *Wirkung des Ansäuerns auf die Giftigkeit des Giftes des Bacillus botulinus*. Im Gegensatz zu dem Befunde von BRONFEN-
ENNER u. SCHLESINGER (vgl. Proc. of the soc. f. exp. biol. and med. **19**. 227; **1922**. III. 1211) beobachteten Vff., daß die Giftwrkg. von 4 *B. botulinus* Kulturen durch Ansäuerung weder mit HCl, Natriumacetat, noch saurem essigsaurem Natrium verstärkt wurde. Weitere Unterss. zeigten, daß Essigsäure eine selektive tox. wrkg. bei weißen Mäusen zu haben scheint. Injizierung von 1 ccm einer gefertigten Essigsäure von pH 4 verursachte den Tod weißer Mäuse bei Ggw. u. Abwesenheit des *B. botulinus* Toxins. Bei größerer $[\text{H}^+]$ trat der Tod schneller ein. (ib. Health Rep. [U. S.] **33**. 1923; Exp. Stat. Rec. **50**. 569.)

BERJU.

A. Maige, *Regeneration der amylogenen Erregbarkeit der Plastiden während der Hydrolyse*. (Vgl. C. r. d. l'Acad. des sciences **177**. 895. **178**. 1998; C. **1924**. II. 37. 679.) Stärkehaltige Plastiden, die ihre Erregbarkeit zur B. von Stärke im Laufe längerer B. von dieser verloren haben, gewinnen sie während der Amylose wieder, in der einzelnen Zelle um so mehr, je stärker hier die Spaltung vor sich geht. Innerhalb derselben Zelle geht die Lsg. von Stärke mit verschiedener Geschwindigkeit bei den einzelnen Plastiden vor sich; diejenigen, bei denen sie vollständig erfolgt, haben stärkere amylogene Erregbarkeit als diejenigen, bei denen sie noch nicht erfolgt, entsprechend einer ausgesprochenen Hemmung der Amylasewrkg.; diese Hemmwrg. ist als eine der Formen zu betrachten, in denen die amylogene Erregbarkeit auf Zuckergehalt der Zelle reagiert, u. regelt die Lsg. der Stärke in der Zelle während der Hydrolyse. (C. r. d. l'Acad. des sciences **179**. 838—40. 14.)

SPIEGEL.

Geoffrey Lewis Peskett, *Allelokatalyse und das Wachstum der Hefe*. Als „Allelokatalyse“ hat ROBERTSON (Biochemical Journ. **15**. 612 [1921]) die von ihm an gewissen Infusorien beobachtete Erscheinung bezeichnet, daß 2 Individuen in einem Tropfen Nährfl. in gegebener Zeit mehr als die doppelte Vermehrung gegenüber einem vereinzelter zeigen. Bei Hefe konnte dies nicht beobachtet werden, vielmehr die Vermehrung proportional der angewendeten Zahl von Zellen, ausgesetzt, daß alle am Leben waren. Ggw. toter Zellen beschleunigt das Wachstum nicht. (Biochemical Journ. **18**. 866—71. 1924. Oxford, Biochem. Dep.)

SP.

N. L. Söhngen und W. S. Smith, *Der Einfluß der Temperatur auf die Zersetzung des Wasserstoffsuperoxyds durch Preßhefe*. Im Gegensatz zu Angaben von EULER u. BLIX finden Vff. die Geschwindigkeit der Spaltung von H_2O_2 durch Hefe in der Menge dieser bis zu einem Gehalte unter 4,5% proportional. Bis 65°, wo die Katalase zers. wird, nimmt die Geschwindigkeit mit Ansteigen der Temp. zu; unterhalb 50° entsprechen die Temperaturkoeffizienten der Formel von ARRHENIUS, dann werden sie kleiner. Ein Teil der Katalase ist für 56° sehr empfindlich. Es scheinen in der Preßhefe 2 bzgl. des Einflusses der Temp. sich unterscheidende Katalasen vorhanden zu sein. (Tijdschr. v. vergelijkende Geneesk. 10. 151—154. 1924. Ber. ges. Physiol. 27. 445—46. 1924. Ref. ZEEHUISEN.) SPIEGEL

E₄. Tierchemie.

Helena Pelanda Ponce, *Das „Lecithiburin“ oder Lecithin des Haifischrogers (Beitrag zum Studium der Phosphatide)*. Das Lecithiburin wurde nach dem Verfahren von LAMI sowohl aus dem Rogen, wie aus der Leber des Haifisches gewonnen, zeigte aus beiden Quellen ident. Eigenschaften. Löslichkeitsverhältnisse u. R. d. Lecithine. T_F 70°. Gehalt an P 3,43, an N 2,11%, Gesamtfettsäuren 1,74, mit Jodzahl 55,88. Aus der Leber wurde außerdem ein Tran gewonnen, der organolept. Eigenschaften des gewöhnlichen (Stockfisch-)Lebertrans zeigt. (Anales de la Asociación Química Argentina 12. 5—12. 103—13. 1924. Sep.) SPIEGEL

H. Fischer, H. Kämmerer und A. Kühner, *Zur Kenntnis der natürlichen Porphyrine*. XI. (X. vgl. Ztschr. f. physiol. Ch. 138. 288; C. 1924. II. 2592.) Wiederholung der Verss. von HOAGLAND (Journ. of Agric. Research Dep. of Agric. 7. 41; C. 1917. I. 76) konnte spekt. festgestellt werden, daß bei steriler Autolyse von Muskelfleisch Porphyrine gebildet werden, hauptsächlich Kämmerers Porphyrin, daneben wenig Koproporphyrin. Bei 37° zeigt sich die B. nach etwa 14, bei 50° schon nach 10 Tagen. Fäulnisvorgänge spielten bei diesen Verss. keine Rolle, da gelegentlich in geringer Zahl nachgewiesenen Bakterien keine Porphyrinbildung sind. Auch war die Rk. nach der Autolyse stets sauer, während die Porphyrinbildung durch Fäulnis nur bei alkal. Rk. verläuft. Es wird vermutet, daß während der Autolyse das Fe des Hämoglobins zuerst in den zweiwertigen Zustand übergeführt wird, worauf sich die autolysierenden Fermente an die ungesätt. Seitenkette der Pyrrolringe anlagern, wodurch das Fe vollständig lostgelöst wird. (Ztschr. physiol. Ch. 139. 107—17. 1924. München, Techn. Hochsch. u. Med. Klin.) GU

Wilder D. Bancroft, *Vorläufige Versuche über Federpigmente*. Das i. J. R. Adams durch A. aus den Federn des Klippenhuhns extrahierte Pigment verhält sich wie ein saurer Farbstoff; es färbt in schwach saurer Lsg. Wolle u. Sch. gelb, nicht in alkal. Lsg.; Baumwolle wird nicht gefärbt. Der aus den Federn eines Kardinals durch Extraktion mit Na-Oleatlsg. gewonnene Farbstoff zeigte die gleichen Eigenschaften. Die roh bestimmten Absorptionsbanden beider Lsgg. schienen ident. zu sein. Vff. vermuten deshalb auch Identität der beiden Pigmente. (Journal Physical Chem. 28. 1147—50. 1924. CORNELL Univ.) ZANDE

Wilmer C. Powick und Ralph Hoagland, *Die chemische Zusammensetzung essbarer Eingeweide von fleischliefernden Tieren*. Eingehende Unterss. der Leber von Ochs, Kalb, Schwein, Herzen von Ochs, Schwein, Schaf, Nieren von Ochs u. Schwein, Zunge von Ochs u. Lamm, Pankreas von Kalb u. Schwein, Lungen von Ochs u. Lamm, Magen von Ochs u. Schwein. Bestimmt wurden W., Ä.-Extrakt, Gesamt-N, Purin-N, Gesamtkreatinin, Glykogen, Dextrose, Gesamtkohlenhydrate, Gesamt-P, anorgan. P, organ. P, Cu, Fe, Ca, Mg, K, Na. Auffallend ist, daß in Schweinelebern mehrfach Kohlenhydrate ganz fehlten. (Journ. Agricult. Research 28. 339—46. 1924. U. S. Dep. of Agric.) SPIEGEL

Camillo Artom und Rosario Marziani, Vergleich des Gehaltes der Leber normaler und ovariectomierter Kaninchen an Fett- und Lipoidstoffen. (Vgl. ARTOM, Bull. Soc. Chim. Biol. 5. 872; C. 1924. II. 702.) In den Lebern von n. Kaninchen gegen Gehalt an W., Phosphatidfettsäuren (I) Gesamtfettsäuren (II) u. Unverseifbarem (III) sowie die Koeffizienten I : II, III : II u. III : I bemerkenswerte Bedeutung, dagegen Gehalt an nichtphosphatid. Fettsäuren, unverseifbarem X (vgl. ...) u. die Verhältnisse des Cholesterins zu den anderen Lipoidanteilen größere individuelle Schwankungen. Nach Entfernung der Ovarien sind solche Schwankungen erheblich, im allgemeinen aber Trockenrückstand u. Nichtphosphatidfettsäuren erhöht, die anderen Lipoidanteile, besonders I vermindert, besonders erheblich u. regelmäßig der Koeffizient I : II. (Bull. Soc. Chim. Biol. 6. 713—27. 1924. Messina, Univ.) SPIEGEL.

G. Hinard, Der Seefisch. Betrachtungen über seine chemische Zusammensetzung und seinen Nährwert. Nach Verss. mit entfettetem Fleisch von Fischen u. Säugern, roh oder gekocht, besteht im Gehalte an W. kein wesentlicher Unterschied. Auch die Zus. der Eiweißstoffe scheint im wesentlichen gleich u. die des Fettes, gesehen von höherem J-Gehalte, nicht erheblich abzuweichen. Bzgl. der Extraktstoffe zeigen die vorliegenden Unterss. sehr stark voneinander abweichende Ergebnisse. Die Verdaulichkeit des Fischfleisches in vitro zeigt gegenüber Säugetierfleisch keine wesentlichen Unterschiede. (Bull. de la soc. scient. d'Hyg. aliment. 550—65. 1923; Ber. ges. Physiol. 27. 322. 1924. Ref. RICHTER.) SPIEGEL.

V. B. Wigglesworth, Harnsäure bei den Pieriden. Eine quantitative Untersuchung. Die Puppe von *Pieris brassicae* enthält ca. 2 mg Harnsäure, im Ruhezustande fast vollständig oder vollständig im Fettkörper. Während der Entw. tritt eine Änderung des Gehaltes ein, aber kurz vor dem Ausschlüpfen geht ein Teil in die Flügel (0,5 mg bei Männchen, 0,3 mg bei Weibchen), die Hauptmenge in den Darm. Bei *Vanessa urticae* ist der Gesamtgehalt der Puppe an Harnsäure ungefähr der gleiche, geht aber nichts in die Flügel über. (Proc. Royal Soc. London B 97. 149—55. 1924. Cambridge, Biochem. Lab.) SPIEGEL.

E₅. Tierphysiologie.

J. R. Petroff, Studien über Gallensekretion. I. u. II. Mitt. I. Über normale Gallensekretion und Ausscheidung beim Kaninchen. Die Gallensekretion beim Kaninchen erfolgt ununterbrochen; die aus dem Ductus choledochus nach Unterbindung des Ductus cysticus beim gleichen Tiere ausgeschiedenen Gallenmengen sind ziemlich konstant. Die Gallenabsonderung steht in Zusammenhang mit den Atembewegungen; nach tiefen Atemzügen wird mehr Galle entleert. Der augenblickliche Fütterungszustand ist ohne Einfluß. Die absol. ausgeschiedenen Mengen sind individuell sehr verschieden u. unabhängig vom Körper- bzw. Lebergewicht. Die Galle fließt leicht zum Darm ab u. nur relativ schwierig in die Harnblase. — II. Über die experimentell erzeugte Acholie bei Kaninchen und Hunden. Hungern u. Galleverlust nach außen stockt der Gallenfluß bei einer Gewichtsabnahme von 29—30%. Bei Hungern ohne Gallenableitung kommt es zu Konkreten. Galle, während bei der experimentellen Acholie spezif. Gewicht u. Gallenreizegehalt sinken. Der stockende Gallenfluß stellt sich sofort nach Gallezufuhr wieder ein, bisweilen sogar schon nach großer Wasserzufuhr; die funktionelle Integrität der Leberzellen wird also durch die Acholie nicht wesentlich geschädigt. Intravenöse Injektion von Sekretin, stomachale HCl-Zufuhr, elektr. Reizung des Mesenterparenchyms, des Nervus ischiadicus u. des Nervus vagus rufen die Sekretion wieder hervor. (Ztschr. f. d. ges. exp. Medizin. 43. 284—90. 291—97. 1924. Petersburg, Mil.-med. Akad.)

WOLFF.

Kl. Gollwitzer-Meier, *Über die Elektrolytverteilung in Blut und Gewebsflüssigkeiten.* (Klin. Wehschr. **3**. 2181—83. 1924. Greifswald, Univ.) SPIEGEL

Edwin F. Hirsch, *Veränderungen in der Wasserstoffionenkonzentration Blutes bei der Gerinnung.* (Vgl. Journ. of infect. dis. **32**. 439; C. 1924. II. 6) Wenn dem Entweichen von CO₂ möglichst vorgebeugt wird, ist die Gerinnung Blutplasmas von einer geringen Verminderung der Alkalinität begleitet. Kaninchenblut betrug die p_H-Differenz durchschnittlich 0,09. Es wird die Möglichkeit erörtert, daß plötzlicher Wechsel der CO₂-Tension die Gerinnung leitet. (Journ. Biol. Chem. **61**. 795—805. 1924. Chicago, St. Luke's Hosp.) SPIEGEL

J. K. Parnas und J. Heller, *Über den Ammoniakgehalt und über die Ammoniakbildung im Blute.* I. Zur früheren Veröffentlichung (C. r. soc. de biologie **91**. 7. C. 1924. II. 2176) ist nachzutragen: Der NH₃-Gehalt des isolierten Blutes ändert sich mit jeder Min. infolge einer schnell u. gesetzmäßig erfolgenden B. von NH₃. Das im Blute gebildete NH₃ scheint aus einer Substanz zu entstehen, die zu N-Verbb. des entweißten Blutes gehört, jedoch nicht aus Harnstoff. Seine Entstehung im genuinen Blut, dessen Entgasung verhindert wird, verläuft wie die Rk., die durch Verbrauch der zers. Substanz an Geschwindigkeit abnimmt u. zu Stillstand kommt; durch NH₃-Zusatz wird sie nicht merklich gehemmt, durch Harnstoffzusatz nicht beschleunigt. Bei optimalen Bedingungen kommt die Rk. bei einem NH₃-Gehalt des Blutes von 2,2 mg-% zum Stillstand. Außer der hauptsächlich in Betracht kommenden B. des NH₃ in den Erythrocyten entsteht es auch im Plasma. Hämolyse beeinflusst den Vorgang nicht, Verdünnung verlangsamt ihn. Bei Erniedrigung der [H⁺] durch höhere CO₂-Spannung verläuft die NH₃-B. langsamer, bei Erhöhung der [H⁺] durch niedrigere CO₂-Spannung wird sie beschleunigt; das Optimum liegt bei der Rk. des entgast. Blutes. Sinkt die [H⁺] noch tiefer, so erfolgt eine Hemmung der NH₃-Bildung. (Biochem. Ztschr. **152**. 1—28. 1924. Lwów, Univ.) WOLF

E. Kylin, *Blutkalkstudien.* V. *Über Blut- und Ödemkalkgehalt bei Herzinsuffizienz.* (IV. vgl. KYLIN u. SILFVERSVÄRD, Ztschr. f. d. ges. exp. Medizin **47**; C. 1924. II. 2408.) Der Ca-Gehalt ist stark vermindert. (Ztschr. f. d. ges. exp. Medizin **43**. 368—70. 1924. Eksjö (Schweden), Mil.-Krankenh.) WOLF

S. G. Zondek und A. Benatt, *Beeinflussung des Blutzuckerspiegels durch Elektrolyte.* Bei direkter Injektion von CaCl₂ bzw. KCl in die Pfortader eines Hundes ruft Ca eine deutliche Hypoglykämie hervor, während K meist eine Senkung des Blutzuckers zur Folge hat. (Ztschr. f. d. ges. exp. Medizin **43**. 281—83. 1924. Berlin, Charité.) WOLF

Sergios Serefis, *Über die Wirkung von Alkali und von Atropin auf die Adrenalglykämie.* Bei älteren Hunden hemmt Alkali (NaHCO₃ + Na-Acetat) die Adrenalglykämie nicht, wohl aber bei jungen Hunden. In Atropin- + Adrenalinversuchs steigt der Blutzucker schnell an, sinkt dann aber schneller als normal. (Ztschr. f. d. ges. exp. Medizin **43**. 438—41. 1924. Hamburg, Pharmakol. Inst.) WOLF

Henry Ward Goodwin und Robert Robison, *Die mögliche Bedeutung der Hexosephosphorsäureester für die Knochenbildung.* IV. *Die Phosphorsäureester des Blutes.* (Vorläufige Mitteilung.) (III. vgl. Biochemical Journ. **18**. 755; C. 1924. I. 1474; S. 237.) Zur Isolierung der Phosphorsäureester wurde Blut unmittelbar mit 1% Trichloressigsäurelsg. aufgefangen, mit weiteren Mengen Säure zur Fällung des Eiweißes versetzt, das Filtrat mit Bleiessig gefällt u. die Pb-Salze mit H₂S zerlegt. Aus den Lsgg. wurden die Ba-Salze zweier Phosphorsäureester erhalten, von denen das eine (A) unl. in W., swl. in verd. Säuren, l. in w. HCl war u. Fehling'sche Lsg. nicht reduzierte; dieses Salz, welches den größeren Teil des gesamten organ. Phosphats im Blut enthält, ist das Salz derjenigen Ester, die nicht durch die Phosphatase aus Knochen gespalten werden. — Das andere Salz (B) ist l. in W., unl. in

zert Fehlingsche Lsg., dreht links. Das Verhältnis (reduzierender Zucker als Glucose): P entspricht dem von ROBISON (Biochemical Journ. 16. 809; C. 1923. I. 865) für einen Hexosomonophosphorsäureester gefundenem Verhältnis; jedoch stellt das Salz B nicht das Ba-Salz dieses Esters dar. Der Ester wird durch 5%ig. Pflanzenextrakt bei 38° u. $p_H = 8,4$ in 6 Std. zu 90% gespalten. (Biochemical Journ. 18. 1161—62. Listerinst.)

A. R. F. HESSE.

Dora Rosenberg, *Oligodynamische Metallwirkung und Hämolyse*. Von Au, Ag, Al, Zn, Sn u. Fe, die mit der 10-fachen Menge physiolog. NaCl-Lsg. in Berührung gelassen wurden, erteilte nur Cu der Lsg. eine Wirksamkeit gegen Erythrocyten im Sinne der Hämolyse. Sie läßt sich hier nach 24-std. Berührung mit dem Metall nachweisen u. erreicht ihr Maximum nach 4 tägiger Berührung. Nach Einbringen der Erythrocyten in die NaCl-Lsg. vergehen gewöhnlich 24 Std. bis zum Beginn der Hämolyse, die sich dann allmählich steigert bis zum 3. Tage. Dem Nutzen der Glasgefäße teilt sich die oligodynam. Wrkg. auf Blutkörperchen nicht im Gegensatz zu derjenigen auf Bakterien. Erythrocyten von gesunden u. kranken Menschen zeigen gegenüber jener Wrkg. keine gesetzmäßigen Unterschiede. Ein Cu-Stück, das längere Zeit zur Aktivierung einer NaCl-Lsg. benutzt ist, verliert an Wirksamkeit. (Klin. Wehschr. 3. 2057. 1924. Freiburg i. B., Univ.) SPIEGEL.

Cesare Decio, *Über den Bilirubingehalt im Blute Gravidar und beim Ikterus Neugeborenen*. Der Bilirubingehalt im Blute Schwangerer war nicht größer als bei Nichtschwangeren, bei den Neugeborenen größer als bei der Mutter, bei später geborenen meist, aber nicht immer höher als bei von Ikterus freibleibenden. Im Harn konnte Bilirubin nicht nachgewiesen werden. Vf. meint, daß die zum Ikterus der Neugeborenen führende B. von Bilirubin tatsächlich ohne Mitwrkg. der Leber erfolgt, daß aber funktionelle Insuffizienz der Leber insofern eine Rolle spielt, als die Befreiung des Blutes von überschüssigem Bilirubin ausbleibt. (An. d. fac. di med. e chirurg. 27. 3—24. 1922. Perugia, Univ.; Ber. ges. Physiol. 27. I. 1924. Ref. ASCHENHEIM.)

SPIEGEL.

Kurt Scheer und Adolf Salomon, *Zur Pathogenese und Therapie der Tetanie*. Mitteilung. Die Beziehungen zwischen Calcium-, Phosphat- und Chlorgehalt des Serums bei Tetanie und ihre Veränderung durch Salzsäuremilch. (I. vgl. Jahrb. Kinderheilk. 103. 129; C. 1924. II. 1941.) Während P im Serum bei Tetanie erhöht ist, ist Ca stark erniedrigt. Bei Behandlung mit HCl-Milch steigt u. sinkt P, nach Bestrahlung nehmen beide (auch Lipoid-P) zu. (Jahrb. f. Kinderheilk. 104. 65—78. 1924. Frankfurt a. M., Univ.; Ber. ges. Physiol. 27. 341. I. 1924. Ref. GYÖRGY.)

SPIEGEL.

Henry J. John, *Die Beziehung des Blutzuckergehaltes zur Nierendurchlässigkeit zur Glykosurie*. (Vgl. Journ. Metabol. Res. 4. 121; C. 1924. II. 1480.) Es kommt vor, daß bei einem bestimmten Zuckergehalt des Blutes bei einem Individuum Zucker im Harn nachgewiesen wird, bei dem dies vorher trotz höheren Zuckergehaltes im Blute nicht der Fall war. Dies ist darin begründet, daß es eines gewissen Übergahaltes im Blute bedarf, um die Tendenz der Niere zur Zurückhaltung von Zuckern zu überwinden, daß aber, wenn dieser Widerstand einmal überwunden ist, der Blutzuckergehalt noch über die eigentliche Permeabilitätsgrenze der Niere wirkt. (Journ. of laborat. and clin. med. 9. 626—29; Ber. ges. Physiol. 27. I. 1924. Ref. HEYMANN.)

SPIEGEL.

Chi Che Wang und Augusta R. Felsner, *Die Wirkung von alkoholischem Extrakt künstlichen Stärkezuckers auf die reduzierende Substanz des Harnes*. Im Anschlusse an die Beobachtung von FOLIN u. BERGLUND (Journ. Biol. Chem. 51. I. C. 1922. III. 69), daß 200 g reine Glucose noch keine Glucosurie verursachen, wurden vergleichende Verss. mit reiner (C. P.-)Glucose (I), Handelsglucose (II) u. einem aus II bei Ausziehen mit A. erhaltenen Extrakt (III) angestellt. Die Gluco-

surie nach II war stets wesentlich größer als nach I, nach I + III aber ungefähr ebenso stark wie nach II u. von längerer Dauer, während III für sich so gut gar nicht wirkte. Im Blute ergaben sich nach I, II u. I + III sehr ähnliche Krven des Zuckergehaltes, nach III allein wieder nur sehr geringe Steigerung (Journ. Biol. Chem. 61. 659—65. 1924. Chicago, MICHAEL REESE Hosp.) SPIEGEL

P. A. Shaffer und T. E. Friedemann, *Antiketogenesis. V. Die ketolyt. Reaktion. Einwirkung von Glykolaldehyd und von Glyoxal.* (IV. vgl. SHATT Journ. Biol. Chem. 54. 399; C. 1923. I. 261.) Die Oxydation von Glykolaldehyd durch H_2O_2 in alkal. Lsg. führt eine starke Beschleunigung der Oxydation zugleich anwesendem acetessigsäurem Salz herbei. Die eingehende Verfolgung d. Rk. führt zu der Erkenntnis, daß hierbei nicht, wie früher für die „ketolyt.“ Wrk. der Hexosen angenommen wurde, es zu einer Kondensation zwischen Acetessigsäure u. einem Zwischenprod. der Oxydation des Aldehyds kommt, daß vielmehr Knövenagelsche Kondensation des Aldehyds selbst mit der Acetessigsäure eintritt, die in dem Maße beschleunigt wird, wie das Kondensationsprod. durch Oxydation entfernt wird. Das erste Oxydationsprod. des Glykolaldehyds, Glyoxal, kondensiert sich zwar auch mit Acetessigsäure in neutraler oder schwach alkal. Lsg., aber in geringem Maße nicht unter den für die ketolyt. Wrkg. des Glykolaldehyds optimalen Bedingungen von Alkali u. H_2O_2 . (Journ. Biol. Chem. 61. 585—623. 1924. St. Louis, WASHINGTON Univ. School of med.) SPIEGEL

Ferdinand Bertram, *Zur Caseosanthérapie des Diabetes.* (Vgl. BERTRAM BORNSTEIN, Ztschr. f. d. ges. exp. Medizin 37. 132; C. 1924. I. 794.) Bei pankreasdiabet. Hunden gelingt es durch große, parenteral zugeführte Caseingaben innerhalb von 24 Stdn. den Blutzucker bis auf n. Werte herabzudrücken u. den Harn zuckerfrei zu machen. Schon normalerweise sinkt im Hungerzustand der Blutzucker pankreasdiabet. Hunde, aber nicht annähernd auf n. Werte. Bei schwerem u. mittelschwerem menschlichem Diabetes kann durch Casein allein eine Erhöhung der Kohlenhydrattoleranz nicht erreicht werden, eher bei leichtem Diabetes. (Ztschr. f. d. ges. exp. Medizin 43. 442—48. 1924. Hamburg, Univ.) WOLFF

Koloman Keller, *Wirkung der intravenösen Zufuhr von hypertonen Traubenzuckerlösungen auf die Cerebrospinalflüssigkeit.* Es findet sich danach kein Übertritt von Glucose in den Liquor (der körpereigene Blutzucker tritt nach Injektion von Adrenalin rasch über) u. keine Eindickung desselben. (Dtsch. Ztschr. f. Nervenheilk. 80. 95—105. 1923. Budapest, St. Stephansspit.; Ber. ges. Physiol. 27. 3. 1924. Ref. BÜRGER.) SPIEGEL

Helen Updegraff und Howard B. Lewis, *Eine quantitative Untersuchung einiger organischer Bestandteile des Speichels.* Kurzes Ref. nach Proc. of the Soc. f. exp. biol. and med. vgl. C. 1924. I. 1949. Nachzutragen ist: Der Vergleich von Speichel u. Blut bei derselben Person zeigt in jenem an Nichteiweiß-N durchschnittlich 37%, an NH_3 - + Harnstoff-N 76,1%, an Harnsäure 40,1% u. an R-N 12,1% von den Werten im Blute. Das NH_3 entsteht zum größten Teile durch Zers. von Harnstoff, die durch Ggw. von Chlf. gehemmt werden kann (Journ. Biol. Chem. 61. 633—48. 1924. Ann Arbor, Univ. of Michigan.) SPIEGEL

Klothilde Gollwitzer-Meier, *Die chemische Atmungsregulation bei alkalischer Blutreaktion.* (Vgl. Biochem. Ztschr. 151. 54; C. 1924. II. 2346.) Na_2CO_3 u. NaOH beeinflussen bei langsamer Infusion die CO_2 -Spannung des arteriellen Blutes kaum, die Atmung bleibt trotz stark alkal. Blutrk. nahezu unverändert. Eine Infusion von $NaHCO_3$ erhöht zwar ebenfalls die Blutalkalescenz, aber auch die CO_2 -Spannung im Blute u. die Ventilationsgröße. Infundiert man bei einer Alkalescenz infolge vorausgeschickter Na_2CO_3 -Infusion HCl, so tritt eine Atemsteigerung auf, ähnlich der, die eine HCl-Infusion bei n. Rk. erzeugt. Scheinbar ist also in

alkalose selbst ohne Einfluß auf die Atmung, während jede Änderung der CO_2 -Spannung auch die Ventilationsgröße verändert. Der Reiz einer bestimmten $[\text{H}^+]$ auf das Zentrum ist von der Größe eines bestimmten Ionenquotienten abhängig, der somit die Empfindlichkeit des Atemzentrums für H-Ionen beeinflusst. Dieser Quotient wird bei einer durch Alkaliinfusion erzeugten Alkalose wahrscheinlich stark verändert, daß eine Zunahme der Erregbarkeit des Atemzentrums angenommen werden kann. Die Bedeutung der $[\text{H}^+]$ für die Atmungsregulation ist bei alkal. Blutkr. die gleiche wie bei n. Rk., nur kann infolge einer erhöhten Erregbarkeit des Atemzentrums der für eine n. Atemtätigkeit erforderliche H-Ionenspiegel anderer sein. (Biochem. Ztschr. 151. 424—34. 1924. Greifswald, Univ.) WOLFF.

G. Endres, *Die physikalisch-chemische Atmungsregulation bei winterschlafenden Armblütern*. Im Winterschlaf ist bei Hamstern der maximale O_2 -Gehalt u. die prozentuale O_2 -Sättigung des arteriellen Blutes im wesentlichen die gleiche wie vor dem Winterschlaf, im venösen ist die O_2 -Sättigung etwas geringer. Der CO_2 -Gehalt des arteriellen u. venösen Blutes nimmt im Winterschlaf bedeutend zu. Die physikal. Löslichkeit von O_2 u. CO_2 im Blute ist bei den Temp. des winterschlafenden Tieres beträchtlich größer als bei jenen des wachen entsprechend der Zunahme des Absorptionskoeffizienten dieser Gase im Blut bei Abnahme der Bluttemp.; ihre Zunahme ist für beide Gase nicht gleich, z. B. bei Körpertemp. von 10° beträgt $37,7^\circ$ für CO_2 115%, für O_2 63,6%. Die Zunahme des CO_2 -Gehaltes des Blutes im Winterschlaf beruht auf Erhöhung der physikal. gel. wie der chem. gebundenen CO_2 , u. zwar bis 3,5 Vol.-% bzw. bis 20 Vol.-%. Die Menge der physikal. gel. CO_2 steigt relativ stärker an. Die Erhöhung der CO_2 -Spannung des Blutes ist im Winterschlaf nur gering. Das Ansteigen des chem. CO_2 -Bindungsvermögens des Blutes wird durch die Abnahme der Dissoziationskonstante des Oxyhämoglobins im Fallen der Bluttemp. erklärt. Die Zunahme der Konz. der physikal. gel. CO_2 im Blut beim menschlichen Schlaf beruht ausschließlich auf dem Ansteigen der CO_2 -Spannung, im Blut des winterschlafenden Tieres dagegen vorzugsweise auf der niedrigeren Temp. größeren Löslichkeit der CO_2 im Blut u. nur wenig auf der Erhöhung der CO_2 -Spannung. Die CO_2 -Bindungskurve liegt beim winterschlafenden Tier tiefer als beim wachen, vielleicht infolge der langen Nahrungsentziehung. Der Alkaleszenzgrad des Blutes ist im Winterschlaf erniedrigt, der Schwellenwert des Atemreizes des Blutes für das Atemzentrum also erheblich, z. B. um 32%, gegenüber. Das Blut ist zwar im Winterschlaf maximal mit O_2 gesättigt, das Spannungsfälle des O_2 vom Blut ins Gewebe jedoch anscheinend bedeutend erniedrigt. Der respirat. Quotient betrug z. B. 0,59. (Ztschr. f. d. ges. exp. Medizin 43. 311—31. 1924. Greifswald, Med. Klin.) WOLFF.

William C. Rose und Gerald J. Cox, *Die Beziehung von Arginin und Histidin zum Wachstum*. Ratten wurden ernährt mit Kostsätze, deren N gedeckt wurde durch Casein (I), völlig hydrolysiertes Casein (II) u. hydrolysiertes Casein nach Entfernung von Arginin u. Histidin durch Fällung mit Ag_2SO_4 u. $\text{Ba}(\text{OH})_2$ (III). II gediehen die Tiere zur Reife, wenn auch langsamer als mit I. Mit III trat der Wachstum noch auch nur Gewichtskonstanz ein, sondern schneller u. dauernder Gewichtsverlust. Nach Zusatz von Histidin zu III wurde das Wachstum u. die Geschwindigkeit wieder aufgenommen, u. zwar ermöglichte Zusatz von 0,1 g Histidinchlorid auf 100 g Futter in der Regel Gewichtserhaltung, 0,2—0,3 g mäßiges u. 0,5 g ein so gut wie n. Wachstum. Zusatz von Arginin zu III blieb dagegen in jedem merklichen Einfluß, verbesserte auch die Wrkg. von 0,1 g Histidin nicht. Gegensatz zu den Beobachtungen von ACKROYD u. HOPKINS (Biochemical Journ. 10. 551; C. 1917. I. 888) kann daher eine gegenseitige Vertretbarkeit für diese beiden Eiweißbausteine nicht angenommen werden. (Journ. Biol. Chem. 61. 1—73. 1924. Urbana, Univ. of Illinois.) SPIEGEL.

Kenzuke Miyazaki und **J. Abelin**, *Über die spezifisch-dynamische Wirkung der Nahrungsstoffe. III. Über die Beteiligung der akzessorischen Nährstoffe an der spezifisch-dynamischen Fleischwirkung.* (II. vgl. Biochem. Ztschr. **149**. 109; C. 192 II. 1705.) Die spezif.-dynam. Fleischwrkg. steht mit dem Vitamingehalt des Fleisch in Zusammenhang. Mit W., A. u. Ä. sorgfältig extrahiertes Fleisch wirkt bei gleichem N-Gehalt schwächer spezif.-dynam. als rohes Fleisch. Mit W. allein extrahiertes Fleisch wirkt fast ebenso stark spezif.-dynam. wie rohes Fleisch. (Biochem. Ztschr. **152**. 29—50. 1924. Bern, Univ.) WOLFF.

L. Berczeller, *Analyse der Nahrungsmittelwirkungen.* Die Bestandteile der Nahrungsmittel verhalten sich in ihrer Auswrgk. auf die Ernährung im Nahrungsmittel selbst anders als einzeln für sich. Beim Hungertier (weiße Ratte) wirkt Hefe, Stärkegemische + Paraffinöl, Fleischextrakt u. chem. gereinigte Eiweißkörper sogar lebensverkürzend, Kohlenhydrate 4—5 $\frac{1}{2}$ -fach -verlängernd, weniger Fett. Merkwürdig ist, daß die Tiere mit Gartenbohnen (*Phaseolus vulgaris*) allein nur bis 5 Tage leben, während die anderen hiesigen Leguminosen, auch die Rangbohne u. Pferdebohne (*Vicia faba*) diese Erscheinung nicht zeigen. — Als Indikatoren für die Auffindung der biol. Unterschiede in den Nahrungsmitteln kann in vielen Fällen sehr zweckmäßig der Instinkt des Tieres in der Nahrungswahl benützt werden. (Ztschr. f. Unters. Nahrsg.- u. Genußmittel **48**. 232—40. 1924. Wien, Univ.) GROSZFELD.

Gino Frontali, *Erste Untersuchungen über den Ersatz des Kuhmilchfettes durch Olivenöl bei der künstlichen Ernährung der Säuglinge.* Auf Grund früherer Beobachtungen, nach denen Fette von niederem F. besser als solche mit hohem F. resorbiert werden, hat Vf. in der Czerny-Kleinschmidtschen Buttermehlschwitze das Butterfett durch Olivenöl ersetzt, wonach in der Tat die Fettresorption gebessert war. Die allgemeinen werden hierbei 10% Öl gut vertragen, wegen des geringen Gehalts an Vitaminen im Olivenöl scheint Zugabe von etwas Lebertran oder Orangensaft angebracht. (Riv. di clin. pediatr. **22**. 145—70. Firenze, Ist. di stud. sup.; Ber. ges. Physiol. **27**. 323. 1924. Ref. ASCHENHEIM.) SPIEGEL.

B. C. P. Jansen und **W. F. Donath**, *Stoffwechselversuche bei Ratten über die Ausnutzung des Eiweißes einiger Nährmittel.* Geschliffener Reis wurde von einer Ratte zu 77%, Silberhautreis nur zu 63% ausgenutzt, 100 Jahre alter ebenso gut wie frischer (auch beim Menschen wurde geschliffener Reis besser als ungeschliffener, im ganzen aber weniger vollständig als bei der Ratte ausgenutzt). Vom Kleberklein nutzte die Ratte 84% aus, Sojabohnen u. daraus hergestellte „Kideleh“ bzgl. der Eiweißausnutzung ungefähr ebenso wie geschliffenen Reis. (Mededeel. Burgerl. Geneesk. Dienst in Nederlandsch Ind. **1**. 26—47; Ber. ges. Physiol. **27**. 323—24. 1924. Ref. ZEEHUISEN.) SPIEGEL.

B. C. P. Jansen und **W. F. Donath**, *A-Vitamingehalt indischer Nährmittel und der Wert der Eiweißsubstanzen derselben als Zusatz zu den Reiseiweißsubstanzen.* (Vgl. vorst. Ref.) Nach Zusatz von Vitamin A zum Reis genügen geringe Mengen Milchpulver oder Sojapulver zur Erhaltung ordentlichen Wachstums. Auf Java gezüchteter Mais verhielt sich, auch bzgl. der Differenz zwischen gelbem u. weißem, wie der aus Amerika. Von verschiedenen darauf geprüften Nährmitteln zeigten sich als Quellen von Vitamin A geeignet verschiedene Früchte (Pisang, Papaya usw.), Gemüse (frisch oder gekocht), Katjang-Pandjang (Früchte u. Blätter), Cassaveblätt., Pompun usw., Enteneier, Butter. (Mededeel. Burgerl. Geneesk. Dienst in Nederlandsch Ind. **1**. 48—102; Ber. ges. Physiol. **27**. 326. 1924. Ref. ZEEHUISEN.) SPIEGEL.

Lawrence Weld Smith, *Die experimentelle Verfütterung getrockneter Brustmilch.* Vf. hat mit **P. W. Emerson** ein Verf. ausgearbeitet, das eine Modifikation des Just-Hatmakerschen Verf. ist u. die Herst. eines wertvollen Trockenpräparates aus Brustmilch gestattet. In Verss. an Meerschweinchen ergab sich, daß dies

äparat, frisch hergestellt, ca. 80% des ursprünglichen antiskorbut. Wertes besaß nach 2jähriger Aufbewahrung noch ca. 40%. (Journ. Biol. Chem. 61. 625—31. 1924. Boston, Floating Hosp.; HARVARD med. school.)

SPIEGEL.

H. A. Mattill, J. S. Carman und M. M. Clayton, *Die Nährigenschaften der Milch. III. Die Wirksamkeit der X-Substanz bei Verhinderung der Sterilität von Ratten auf Milchrationen von hohem Fettgehalt.* (II. vgl. MATTILL u. STONE, Journ. Biol. Chem. 55. 443; C. 1923. I. 1601; vgl. auch MATTILL u. CARMAN, Proc. of Soc. f. exp. biol. and med. 20. 420; C. 1924. I. 2169.) Die schädlichen Folgen einer ausschließlichen Ernährung mit fettreicher Milch, die sich auch bei weiblichen Ratten zeigen, werden vermieden durch Zulage von 5% Weizenkeimlingen oder auch grünen Lattichblättern; aus den Weizenkeimlingen wird die wirksame Substanz durch Ä. ausgezogen. Sie erscheint danach ident. mit dem X von EVANS (vgl. EVANS u. BISHOP, Journ. Metabol. Res. 3. 233; C. 1924. I. 1403), wofür auch die Übereinstimmung der Wirkungsart, wenigstens bei weiblichen Tieren, spricht. Die Ursache, daß mit fettarmer Milch kein deutlicher Ausfall der Zeugungsfähigkeit eintritt, dürfte so zu deuten sein, daß die Menge des für n. Zeugung erforderlichen X von der Natur der Nahrung abhängt. (Journ. Biol. Chem. 61. 729—40. 1924. Rochester [N. Y.], Univ. of Rochester.)

SPIEGEL.

A. L. Daniels, M. E. Armstrong und M. K. Hutton, *Durch fettlösliche Vitamin-A-freie Nahrung erzeugte nasale Krümmungen.* Von 16 jungen mit fettreicher vitaminarmer Nahrung ernährten Ratten zeigten nur 4 keine nasale Krümmungen u. keine eitrige Abszesse, während 29 n. oder nur mit Vitamin B oder an Ca mangelnder Nahrung gefütterte Ratten diese Erscheinungen nicht aufwiesen. Vff. folgern hieraus, daß fettlösliches Vitamin A eine bedeutende Rolle bei der Immunisierung gewisser Organe gegen eitrige Infektion spiele. (Journ. Amer. Med. Assoc. 81. 828. 829. 1923; Exp. Stat. Rec. 50. 263.)

BERJU.

Chi Che Wang, David B. Witt und Augusta R. Felsher, *Ein Vergleich des Stoffwechsels einiger Mineralbestandteile der Kuhmilch und der Brustmilch bei dem menschlichen Säugling.* Vff. schließen aus den Beobachtungen, daß bei Brustmilch-ernährung der Ca-Stoffwechsel vom Alter der Kinder unabhängig sei, bei Kuhmilch-ernährung aber Retention u. Ausnutzung sich mit dem Alter steigere. (Amer. Journ. dis. of children 27. 352—68. Chicago, MICHAEL REESE Hosp.; Ber. ges. Physiol. 27. 323. 1924. Ref. ARON.)

SPIEGEL.

Jerome S. Leopold, Adolph Bernhard und Harry G. Jacobi, *Studien über Harnsäurestoffwechsel bei Kindern.* Bei gemischter purinfreier Kost bleibt die Ausscheidung von Harnsäure innerhalb 24 Stdn. bei demselben Individuum konstant, während Fastens sinkt der Wert auf ungefähr $\frac{1}{3}$ des vorigen. Kost mit hohem Proteingehalt gibt größere Ausscheidung, solche mit hohem Kohlenhydratgehalt, solche mit hohem Fettgehalt merklich verminderte. Die Werte sind morgens höher, nehmen im Laufe des Tages bis zum Nachmittage ab, steigen dann wieder an. Besteht keine Beziehung des Harnsäurewertes zur gesamten Harnabscheidung, auch Calorienwert der Nahrung. Die Verfütterung von Harnsäure beeinflusst nicht die Harnsäurekonz. im Blute u. bedingt keine erhöhte Ausscheidung im Harn. (Amer. Journ. of dis. of children 27. 243—55; Ber. ges. Physiol. 27. 341. 1924. Berlin, BACHSTETZ.)

SPIEGEL.

Edward C. Mason, *Eine Bemerkung über die Beeinflussung der Wasserabscheidung durch die Reaktion des Blutdrucks auf Natriumnitrit.* Zur Aufklärung entsprechender Angaben über Wrkg. von NaNO_2 auf die Diurese angestellte Versuche zeigten, daß das Salz fast immer eine nicht sehr erhebliche, aber deutliche Senkung des systol. Blutdrucks hervorruft, ferner meist Minderung, zuweilen aber auch Steigerung der Diurese. Dies wird so erklärt, daß der die Diurese hemmenden Blutdrucksenkung eine andere Wrkg. des NaNO_2 , gesteigerte Blutzufuhr zur Niere

infolge Erweiterung der Nierengefäße, entgegenwirkt. Je nach Überwiegen eines oder des anderen Faktors gestaltet sich der Einfluß auf die Diurese verschieden. (Journ. of laborat. and clin. med. **9**. 529—39. Rochester, MAYO v. Ber. ges. Physiol. **27**. 379. 1924. Ref. HEYMANN.) SPIEGEL

Ferdinand Bertram, *Die Bedeutung der Acidose und Alkalose für den Kohlenhydratstoffwechsel*. I. *Die alimentäre und Sympathicusglykämie*. II. *Die parasympathische und die asphyktische Glykämie*. I. Große Mengen intravenös infundierter HCl vermögen bei n. u. bei kohlenhydratgemästeten Hunden keine Hyperglykämie hervorzurufen. Im Verlauf von 2 Stdn. kommt es zu einer starken Hypoglykämie. Bei ganz jungen Hunden kommt es zu einer Hyperglykämie ohne nachfolgende Hypoglykämie. Bei experimentell acidot. Hunden kommt es im Vergleich zu Tieren zu einer erheblich verstärkten u. verlängerten alimentären Hyperglykämie. Auch die Adrenalinglykämie kann durch vorherige Säurezufuhr verstärkt werden. — II. Die Parasympathicusglykämie nach BORNSTEIN tritt nach *Cholin* u. *Acetylcholin* bei n. Hunden auf. Die Cholinglykämie kommt ohne Beteiligung der Nebennieren zustande. Wird die bei Parasympathicusgiften auftretende Alkalose des Organismus durch intravenöse HCl-Zufuhr aufgehoben, so kommt es zu einer wesentlich stärkeren Hyperglykämie als bei n. Tieren. Die „dissimilator. Umkehr“ läßt sich nicht mit einem einfachen Antagonismus zwischen Adrenalin u. Pilocarpin zu erklären. Bei experimentell acidot. Hunden kommt es im Vergleich zu n. zu einer verstärkten asphykt. Glykämie mit stark verzögertem Abfall der Blutzuckerkur. Nach experimenteller Säuerung des Organismus ist die normalerweise auftretende Abgabe von exogen zugeführtem oder endogen mobilisiertem Zucker an die Gewebe oder dessen Verbrennung gehemmt. Zwischen Hunden u. Kaninchen bestehen prinzipielle Unterschiede in den Beziehungen von Acidose u. Alkalose zum Kohlenhydratstoffwechsel. Die Hypoglykämie nach Säureinfusion u. nach hyperglykämischen Zuständen dürfte durch eine kompensator. überschießende Einschwemmung von Alkali ins Blut nach Übersäuerung u. dadurch bedingter beschleunigter Kohlenhydratverbrennung oder beschleunigter Abgabe an die Gewebe zu erklären sein. (Ztschr. f. d. ges. exp. Medizin **43**. 407—20. 421—37. 1924. Hamburg, Pharmak. Inst.) WOLFF

J. Berberich, *Neue Untersuchungen über den Cholesterinstoffwechsel*. Aus eigenen u. anderen Unterss. folgert Vf., daß die Verhältnisse zwischen Blut- u. Gewebscholesterin keineswegs einfach sind. Hypercholesterinämie geht zwar meist mit Ablagerung von anisotropen Substanzen in Geweben oder Organen einher, in selteneren Fällen aber auch mit Verminderung des Organcholesterins. Wo Ablagerung stattfindet, ist sie nicht allein von der Höhe des Blutcholesterinspiegels abhängig, der auch trotz der Ablagerung erhöht bleibt, sondern auch von geeigneten lokalen Gewebsbedingungen. Unter solchen kann örtliche Cholesterinablagerung auch bei Hypocholesterinämie stattfinden, wobei wahrscheinlich in erster Linie konstitutionelle oder erbbedingte Faktoren im Gewebe eine Rolle spielen. Die Ursache der Cholesterinstoffwechselstörung ist wahrscheinlich im endokrinen System zu suchen. (Klin. Wchschr. **3**. 2003—6. 1924. Frankfurt a. M., Univ.) SPIEGEL

S. A. Komarow, *Zur Frage nach dem Mechanismus der Darmsekretion*. I. *Über die Einwirkung des Carnosins auf die Darmsekretion*. (II. vgl. Biochem. Ztschr. **147**. 221; C. 1924. II. 856.) Carnosin ist schon in minimalen Mengen ein sehr wirksamer Funktionserreger des Darmdrüsenapp. (Biochem. Ztschr. **151**. 467—) 1924. Riga, Univ.) WOLFF

Alois Memmesheimer, *Die H-Ionenkonzentration der Hautoberfläche*. Mit der Indicatorenmethode wurde in > 100 Fällen der pH-Wert von gesunder intakter Hautoberfläche zwischen 5,2 u. 5,8 gefunden. Bestrahlung mit Röntgenstrahlung führte meist zu deutlicher Verschiebung nach der alkal. Seite. Vf. glaubt es

stärkere Durchtränkung des Epithels mit der stärker alkal. Gewebsfl. infolge des Bestrahlungsreizes, vielleicht auch auf eine gewisse Schweißsekretion zurückzuführen zu sollen. (Klin. Wechschr. 3. 2102. 1924. Essen, Städt. Krankenanst.) SP. **Tosaku Fukushima**, *Zur Frage der Funktion der Schilddrüse in bezug auf den Stoffwechsel*. I. Teil. Über den Jodgehalt der Schilddrüsen erwachsener Japaner. Die Schilddrüsen der Japaner sind absol. u. pro kg Körpergewicht kleiner als die der Europäer, im Mittel 13,8 g (0,37 g pro kg), der J-Gehalt aber sowohl pro g Drüse (0,860 mg) als auch absol. (10,58 mg) höher. Im Alter ist er geringer, bei Frauen etwas höher, nach Gebrauch von J-Präparaten beträchtlich höher. (Mitt. d. med. Fak. d. Kais. Univ. Tokyo 30. 557—69. 1923. Tokyo, Univ.; Ber. ges. Physiol. 27. 387. 1924. Ref. FROMHERZ.) SPIEGEL.

Tosaku Fukushima, *Zur Frage der Funktion der Schilddrüse in bezug auf den Stoffwechsel*. II. Teil. Das Schicksal des zugeführten Jods in normalen und J-entzogenen Ratten. (I. vgl. vorst. Ref.) Bei mit Gerste, Gemüse u. W. gefütterten Tieren wurden, wenn für Beseitigung der J-haltigen Sekrete gesorgt wurde, die Organe außer der Schilddrüse J-frei gefunden. 3 Stdn. nach Injektion von 1 mg J pro 10 g Körpergewicht unter die Rückenhaut fanden sich in Blut 0,133, in Niere 0,085, Lunge 0,073, Halsdrüsen 0,062, Milz 0,047, oberem Magenkanal 0,04, Muskeln 0,022 mg J pro g Organ, in Hirn u. Haaren keine nachweisbaren Mengen. In 9—12 Stdn. verschwand es aus Lunge, Nieren, Milz u. Halsdrüsen, in 30 Stdn. auch aus Magendarmwand, Leber u. Muskeln, während im Blut noch nach 45 Stdn., in der Haut nach 96 Stdn. nachgewiesen wurde. — 20 Tage nach Entfernung der Schilddrüse in gleicher Weise behandelte Tiere lieferten parallele Ergebnisse, aber mit durchweg niedrigerem J-Gehalt in den Organen u. rascherem Verschwinden des J daraus. (Mitt. a. d. med. Fak. d. Kais. Univ. Tokyo 30. 571—601. 1923. Tokyo, Univ.; Ber. ges. Physiol. 27. 388. 1924. f. FROMHERZ.) SPIEGEL.

Benvenuto Capaldi, *Prüfung der chemisch-zerkleinernden Funktion des Magens einer pflanzlichen Probekost*. Die Menge der im Magen ausgeschiedenen HCl spielt zwar eine Rolle für die rasche u. zweckmäßige Zerkleinerung der vegetabil. Nahrungsmittel (Auflockerung der Pektinstoffe), aber die ausschlaggebende Bedeutung der Verweildauer im Darne für die weitere Verarbeitung bringt es mit sich, daß die Ausnutzung einer pflanzlichen Probekost kein einwandfreies Bild der Magenfunktion liefert. (Arch. f. Verdauungskrankh. 33. 181—86. Frankfurt a. M., 1924. iv.; Ber. ges. Physiol. 27. 348. 1924. Ref. STRAUSS.) SPIEGEL.

G. Bignami und L. Boracchia, *Untersuchungen über die Hippursäuresynthese im menschlichen Organismus*. Von n. Menschen wurden bis 50 g Na-Benzoesäure an 4—5 Tagen verteilt, anstandslos vertragen, einmalige Gabe von 50 g machte leichte Störungen (Kopfschmerzen, Schwindel). Je größer die Menge der zugeführten Benzoesäure, ein um so geringerer Anteil von ihr wurde zu Hippursäure synthetisiert, bei 50 g pro die im Mittel nur 45%. Die Gesamtausscheidung von N war erhöht; nur Harnsäure zeigte im Harn leichte Tendenz zur Verminderung, Aminosäuren eine solche zur Vermehrung. Von der nicht zu Hippursäure gepaarten Benzoesäure erscheint nur ein Teil als solche im Harn, der Rest muß in Form unbekannter Verbb. ausgeschieden werden. (Boll. d. soc. med.-chirurg. di Pavia 36. 121—38. Pavia, Univ.; Ber. ges. Physiol. 27. 336. 1924. Ref. LAQUER.) SP.

Paul Hári, *Tierische Calorimetrie*. I. Mitteilung. Vorbesprechung. In einer Reihe von Mitteilungen soll fortlaufend über Arbeiten berichtet werden, bei denen Versuchsergebnisse durch gegenseitige Kontrolle von direkter u. indirekter Calorimetrie sichergestellt sind. Vf. behandelt hier die Grundsätze, die für diese Versuche maßgebend sind bzgl. Fütterung u. Körpergewicht der Versuchstiere, die

möglichst gleichmäßig sein müssen, Versuchstemp. (bei oder nahe der krit. Temperaturgrenze), ferner die Apparatur u. Ausführung der Verss., schließlich die Berechnung des 24std. Energieumsatzes auf 1 qm Körperoberfläche. (Biochem. Ztschr. 152. 445—55. 1924. Budapest, Kgl. ungar. Univ.) SPIEGEL.

Zoltán Aszódi, *Tierische Calorimetrie*. II. Mitteilung. *Gaswechsel und Energieumsatz im Fieber*. (I. vgl. HÁRI, vorst. Ref.) Die Ergebnisse werden in folgenden Sätzen zusammengefaßt: 1. Der durch Milch bezw. durch Colitoxin erzeugte Anstieg der Temp. im Rattenkörper ist der Menge des angewendeten fiebererzeugenden Mittels annähernd proportional. — 2. Der respirator. Quotient wird durch den fieberhaften Zustand an sich nicht geändert. — 3. Im fieberhaften Zustande ist der Energieumsatz gegen die Norm deutlich erhöht, die Zunahme dem Anstieg der Körpertemp. annähernd proportional. — 4. Für eine Einschränkung der Wärmeabgabe zu Beginn des Fiebers ließ sich kein Anhaltspunkt gewinnen. — 5. Im fieberhaften Zustande ist selbstverständlich auch die Wärmeabgabe erhöht. Daran sind Strahlung u. Leitung einerseits, Verdampfung von W. andererseits in demselben Maße beteiligt wie bei n. Körpertemp. (Biochem. Ztschr. 152. 456—464. 1924.) SPIEGEL.

Zoltán Aszódi, *Tierische Calorimetrie*. III. Mitteilung. *Energieumsatz kleiner Tiere bei chronischer Unterernährung*. (II. vgl. vorst. Ref.) Schon vom 1. Tage der Unterernährung an zeigt bei der weißen Ratte der Energieumsatz, auf 1 qm Körperoberfläche bezogen, eine Abnahme gleichzeitig mit der Abnahme des Körpergewichtes, die wahrscheinlich rascher fortschreitet als bei größeren Tieren, jedoch falls viel früher beginnt. Ein konstanter Wert des Energieumsatzes konnte auch dann nicht erreicht werden, wenn man die Ratte von 24 Std. zu 24 Std. fütterte u. hungern ließ. (Biochem. Ztschr. 152. 472—78. 1924. Budapest, Kgl. ungar. Univ.) SPIEGEL.

Christian Kroetz, *Zur Biochemie der Strahlenwirkungen*. II. *Der Einfluß der ultravioletten und Röntgenstrahlung auf den Wasser-, Salz- und Eiweißbestand des Serums*. (I. vgl. Biochem. Ztschr. 151. 146; C. 1924. II. 2275.) Die ultravioletten u. Röntgenstrahlen führen zu gleichsinnigen Veränderungen des W., Salz- u. Eiweißbestandes des Serums. Der Wassergehalt steigt im Frühstadium der Strahlenwirkung in der Mehrzahl der Fälle an, um nach 24 Std. sich wieder dem Ausgangswert zu nähern. Es erfolgt regelmäßig eine wahre Hypochlorämie u. eine Zunahme im Serum, die beide vor allem ausschlaggebend sind für den auftretenden Anstieg des Anionendefizits, der unter Strahlenwirkung $\frac{1}{3}$ — $\frac{1}{2}$ des Ausgangswertes beträgt. Die Bewegungen der quantitativ in der Serumbilanz zurücktretenden Na-, Ca- u. P-Ionen sind bei verschiedenen Strahlenmengen teilweise verschieden. Nur bei den stärksten Dosen ist eine Regelmäßigkeit nachweisbar: K u. P nehmen etwas ab, Ca nimmt etwas ab, wobei die Verminderung des ionisierten, wirksamen Ca jedoch höher zu bewerten ist, als sie in den Zahlen des Gesamt-Ca zum Ausdruck kommt. Für den biol. Effekt der Strahlen wesentlich ist nicht die Verschiebung des ein- oder anderen Ions, sondern die Umstellung des Gleichgewichtes der gesamten Ionen, innerhalb dessen das Teilverhältnis der äquivalenten Konz.

$$Q = \frac{K \times (H_2PO_4' + HPO_4'')}{Ca^{++}}$$

von maßgebender Bedeutung ist. Die Erhöhung dieses Quotienten wird als eine regelmäßige u. wichtige Rk. des bestrahlten Körpers nachgewiesen. Sie zeigt sich unabhängig von der verwendeten Strahlenmenge. Am Eiweißbestand des Serums tritt bei beiden Strahlenarten eine qualitative, wahrscheinlich auch quantitative Umstellung ein, die sich im Serumrefraktionswert äußert. (Biochem. Ztschr. 152. 449—66. 1924. Greifswald, Univ.) WOLFF.

C. Pulcher, *Die Wirkung der Durchströmung mit Äthylalkohol auf die Kontraktion der Froschmuskeln*. 1,3—3% A. in der Durchströmungsfl. verlängerte die Kontraktionszeit der Kontraktion u. verstärkte ihren ton. Anteil. Bei stärkeren Konzz. mitunter unvollständiger u. kurzer Tetanus. Der klon. Anteil der Kontraktion zeigte Verminderung. Die Wrkgg. traten auch nach Nervendurchschneidung, nicht aber nach Curarisierung auf, der Angriffspunkt wird daher vom N. in die motor. Nervenplatten oder die neuromuskulären Synapsen verlegt. (Arch. science biol. 5. 425—42. Torino, Univ.; Ber. ges. Physiol. 27. 311. 1924. Ref. (QUER.) SPIEGEL.

Johannes Dittrich, *Über die Cyanamidwirkung*. IV. (III. vgl. RAID, Ztschr. f. d. ges. exp. Medizin 31. 215; C. 1923. I. 1337.) Von Fermenten wurden Pepsin, Trypsin, Invertin, Amygdalin, Serumlipase, Peroxydase u. Katalase untersucht; Cyanamidkonz., mit denen im Tierkörper zu rechnen ist, wie auch höhere üben einen Einfluß auf deren Rkk. aus; nur die Katalase wird schon durch minimale Mengen Cyanamid gehemmt. In Kombination mit verschiedenen Fermentgiften läßt sich der Ablauf der Hefegärung gesetzmäßig ändern. Von Oxydationsvorgängen im Organismus gab die Oxydation von Bzl. zu Phenol beim Kaninchen mit u. ohne Cyanamidzusatz keine deutlichen Unterschiede; dagegen wird die Reduktionskraft des Gewebes nach LIPSCHITZ deutlich durch Cyanamid gehemmt. Weiter wurde der Einfluß auf die Zellatmung nach WARBURG geprüft. Das Cyanamid erzeugt nach allen diesen Verss. unter gewissen Bedingungen Hemmungen oxydo-reduktiver Prozesse in vitro u. in vivo. Die Temp.-Erniedrigung bei Kaninchen durch Atophan wird durch Cyanamid potenziert. (Ztschr. f. d. ges. exp. Medizin 43. 270—80. 1924. Breslau, Pharmakol. Inst.) WOLFF.

K. Harpuder und H. Erbsen, *Untersuchungen über die Bedeutung der Ketone für den Organismus*. Unter strenger Festhaltung aller übrigen Bedingungen, besonders auch der [H⁺] hemmte β -Oxybuttersäure sämtliche untersuchten Fermentgänge außer der Wrkg. von Trypsin u. der Autolyse, in merklichem, teilweise in starkem Grade. (Klin. Wchschr. 3. 2010—11. 1924. Kiel, Med. Klin.) SPIEGEL.

Armand J. Quick, *Die Synthese von Mentholglucuronsäure beim Kaninchen*. An anderer Stelle (S. 266) beschriebene Verf. zur Best. der Säure wurde zur Erfolge ihrer B. benutzt. Etwas < 3 g scheinen das Maximum, das ein Kaninchen von 2 kg Gewicht ausscheiden kann, eine Menge, die nach Verfütterung mit 3,5 g Menthol gewonnen wird. Die tödliche Dosis war ca. 4—5 g, doch fanden sich schon Krankheitserscheinungen nach 3,5 g, besonders bei Darreichung in A. wöhnliches Symptom der Mentholvergiftung war zeitweilige Lähmung der Hinterextremitäten, oft trat auch Freßunlust ein. Mentholglucuronsäure erschien im Harn nach 1 Stde. von der Darreichung an, 90% waren nach 2 mg Menthol in 6 Stdn., nur als 90% auch nach größeren Gaben in 24 Stdn. ausgeschieden. Die Angabe HERFELDS (Biochem. Ztschr. 65. 479; C. 1914. II. 1245), daß bei längerer Veresterung von Menthol der Anteil des als Glucuronsäurekomplex ausgeschiedenen vermindere, konnte nicht bestätigt werden. (Journ. Biol. Chem. 61. 679—83. 1914. Philadelphia, Univ. of Pennsylvania.) SPIEGEL.

E. Starkenstein, *Zur Frage der Wirkung der Phenylchinolincarbonsäure (Atophan) auf das vegetative Nervensystem*. (Vgl. ULLMANN, Ztschr. f. d. ges. exp. Medizin 32. 319; C. 1923. III. 171.) Meerschweinchen- wie Kaninchendünndarm werden durch Atophan gelähmt. Die Darmwrkg. des Atophans kann demnach als periphere Vagusregung gedeutet werden. Allerdings folgt der Lähmung nach dem Auswaschen ein Zustand erhöhter Erregbarkeit, der nach TRENDLENBURG wohl auf eine Tonuszunahme zurückzuführen sein dürfte. (Ztschr. f. d. ges. exp. Medizin 43. 449—53. 1924. Prag, deutsche Univ.) WOLFF.

I. A. Smorodinzew und A. N. Adowa, *Der Einfluß verschiedener Präparate der Chiningruppe auf die fermentativen Funktionen des Organismus.* (Journ. Russ. Phys.-Chem. Ges. **55**. 19—38. 1922/24. — C. **1923**. III. 633.) BIKERMANN

Vittorio Susanna, *Der Einfluß einiger sympathicotroper Stoffe auf das Leberglykogen.* Vff. fand bei Hunden nach Adrenalin Verminderung, nach Apocod (MERCK) u. Linfoganilin (Lymphdrüsenextrakt nach MARFORI) Vermehrung Leberglykogens. (Arch. internat. de pharmacodyn. et de therap. **28**. 379. Napoli, Univ.; Ber. ges. Physiol. **27**. 333—34. 1924. Ref. LESSER.) SPIEGEL

S. J. Thannhauser und H. Mezger, *Über die Wirkung des Insulins auf Acidosis beim gesunden Menschen im Kohlenhydrathunger. Ein Beitrag zur Theorie der Insulinwirkung.* Beim kohlenhydratfrei ernährten gesunden Menschen fand Vff. gleichartigen Einfluß des Insulins auf Blutzucker u. Ketokörper wie bei Diabetikern. Es ergibt sich dafür kaum eine andere Deutung als die, daß Insulin die Verbrennung des Zuckers steigert. (Klin. Wchschr. **3**. 1989—91. 1924. München, Univ.) SPIEGEL

Carl F. Cori, *Der Einfluß des Insulins auf das Leberglykogen und den freien Leberzucker beim Hungertier.* (Vgl. Journ. Pharm. and Exp. Therapeutics **23**. C. **1924**. II. 859.) Bei Kaninchen u. Mäusen sank nach Insulin das Leberglykogen oder blieb unverändert. Der freie Leberzucker sank. Vff. unterscheidet 2 Arten Glykogenhydrolyse in der Leber, entweder unter Zunahme des freien Leberzuckers u. Erhöhung der Zuckerabgabe an das Lebervenenblut (Adrenalin) oder unter Abnahme beider (Insulin). Er nimmt an, daß die 2. Form mit Glykogensynthese verbunden ist, wenn entweder durch Injektion von Zucker oder durch B. von soleb. aus Eiweiß (Phlorrhizinhungertier) Überschuß davon vorhanden ist. (Proc. of Soc. f. exp. biol. and med. **21**. 419—20. Buffalo, State Inst. f. the study of malnutrition; Ber. ges. Physiol. **27**. 330. 1924. Ref. LESSER.) SPIEGEL

C. H. Best und D. A. Scott, *Insulin in anderen Geweben als dem Pankreasgewebe.* Vff. berichten, daß sie aktive Extrakte von Insulin aus den Submaxillär-, Thymus- u. Schilddrüsen u. aus der Leber, Milz u. dem Muskelgewebe herstellen konnten. Auch in dem Blut verschiedener Tiere u. im menschlichen Urin wurde eine Substanz gefunden, welche wahrscheinlich Insulin ist. (Journ. Amer. Med. Assoc. **81**. 382. 383. 1923; Exp. Stat. Rec. **50**. 260.) BERJ

Paul Freund, *Über die Beeinflussung der experimentellen Meerschweinchen-Tuberkulose durch Thyreoidin.* (Ein Beitrag zur Wirksamkeit des Thyreoidins.) Fütterung tuberkulöser Meerschweinchen mit 0,02 g Thyreoidin Sanabo täglich kürzte ihre Lebensdauer beträchtlich ab. Dieser rasche Verlauf wird nicht allein durch Steigerung des Stoffwechsels, sondern durch direkten Einfluß des Thyreoidins auf den Ablauf der Tuberkulose bewirkt. (Ztschr. f. d. ges. exp. Medizin **43**. 251—5. 1924. Wien, Univ.) WOLFF

Walter Baumecker, *Der Einfluß der Narkotica auf die Blutkörperchensenkungsgeschwindigkeit.* CH₃OH, A., n. Propylalkohol, n. Butylalkohol, n. Amylalkohol sowie Äthylurethan verursachen in Citratblut eine Hemmung, Chloralhydrat u. eine Beschleunigung der Blutkörperchensenkungsgeschwindigkeit. Im allgemeinen ist dabei der nächst höhere Alkohol wirksamer als das vorangehende Glied der homologen Reihe. Bei einem Vergleich der Konzz., die gerade Hemmung verursachen, mit den narkot. Grenzkonz. für den isolierten Muskel zeigt sich, daß eine Hemmung der Senkungsgeschwindigkeit bereits in viel niedrigeren Konzz. beginnt als der narkot. Grenzkonz. entspricht. Die Hemmung wird dann mit Zunahme der Alkoholkonz. immer größer mit Maximum etwa bei narkot. wirksamer Konz. Bei Chloralhydrateinw. ist auch in narkot. wirksamen Konzz. eine Beschleunigung der Senkungsgeschwindigkeit festzustellen. Nach Viskositätsmessungen u. Flockungsverss. ist eine Erklärung der Hemmung durch Alkohole u. Urethane

rin zu suchen, daß diese auf Plasma in bestimmter Konz. stabilisierend, die Ausflockung hemmend, wirken, während die Beschleunigung der Senkungsgeschwindigkeit durch Chloralhydrat u. Ä. auf einer leichteren Ausflockbarkeit des Plasmas beruht. (Biochem. Ztschr. 152. 64—78. 1924. Halle, Univ.)

WOLFF.

Saburo Hara, Über die Wirkung verschiedener Narkotica auf die Atmung des Goldbutt (*Pleuronectes platessa*). Zum Studium des Einflusses einiger Narkotica auf die Atmung des Goldbutt wurde zunächst die narkot. Grenzkonz. derselben festgestellt. Diese ist bei *Paraldehyd* u. *Äthylenhydrat* ebenso groß wie die Konz., die im Frosch leichte Narkose hervorruft. Bei *Urethan* ist sie kleiner, bei *Chloralhydrat*, *Trional* u. *Adalin* liegt sie zwischen den Konz., die leichte u. tiefe Narkose am Frosch bewirken. *Sulfonal* wirkt beim Goldbutt weit schwächer als beim Frosch. In der narkot. Grenzkonz. u. auch bei etwas höherer Konz. läßt *Urethan* die Atmung des Goldbutt unverändert. Alle anderen untersuchten Narcotica beeinflussen die Atmung bereits bei der narkot. Grenzkonz. u. schon nach kurzer Dauer der Narkose; namentlich wirken so *Sulfonal*, *Trional*, *Adalin*, in geringerem Maße *Chloralhydrat*, *Voluntal*, *Phenylurethan*. Auch hier tritt starke Schädigung der Atmung bei Überschreiten der narkot. Grenzkonz. ein. (Ztschr. f. d. ges. exp. Medizin 43. 256—69. 1924. Kiel, Pharmakol. Inst.)

WOLFF.

Hans Burghart und **Karl Schoenfeldt**, Über ein neues Schlafmittel (*Noctal*). Das neue, von der Firma J. D. RIEDEL A.-G. hergestellte Mittel, nach deren Angabe ein *Deriv. der Isopropylbarbitursäure*, ist in Gaben von 0,2 g, deren Steigerung ohne Gefahr erfolgen kann, ein sehr wirksames Schlafmittel, zu 0,05—0,1 g ein gutes Beruhigungsmittel, frei von jeder unangenehmen u. schädlichen Nebenwirkung. (Münch. med. Wochschr. 71. 1508. 1924. Berlin, Elisabethkrankenhaus.)

SPIEGEL.

H. Deicher, Klinische Erfahrungen mit dem neuen Schlafmittel *Noctal*. (Vgl. BURGHART u. SCHOENFELDT, vorst. Ref.) Wrkg. stärker als von *Veronal*, meist wirksam bei Frauen von n. Konst. 1, bei Männern 2 Tabletten zu 0,1 g, in keinem Falle wurden irgendwelche Schäden festgestellt. (Klin. Wochschr. 3. 2053. 1924. Berlin, RUDOLF VIRCHOW-Krankenhaus.)

SPIEGEL.

Fr. Boedecker und **H. Ludwig**, Pharmakologische Versuche mit neuen halogenhaltigen Schlafmitteln der Barbitursäurereihe unter besonderer Berücksichtigung des *Noctal*. (Vgl. vorst. Ref.) Während die *Di-(brompropyl)-barbitursäure* u. *Bromäthyläthylbarbitursäure* von STAUDINGER keinerlei narkot. Effekt zeigten, wurde die Wirksamkeit festgestellt bei Barbitursäuren, die neben einem Alkyl-, Acyl- oder Arylrest die β -Halogenpropenylgruppe enthalten. Besonders eingehend wurde *Brompropenylisopropylbarbitursäure* untersucht, die als *Noctal* in den Handel kommt. Krystalle von schwach bitterem Geschmack, F. 178°, ll. in A., Eg., Aceton, schwerl. in Ä., wl. in W., Chlf., Bzl., Hexahydrotholuol. Es erreicht die stärkste Wirkung bei bekannten Schlafmitteln u. wirkt in 6 facher narkot. Dosis noch nicht tödlich. Ungefähr ebenso wirkt β -Chlorpropenylisopropylbarbitursäure, F. 170°, Wirkung ähnlich wie bei der Br-Verb. (Klin. Wochschr. 3. 2053—55. 1924. Berlin, J. D. RIEDEL A.-G.)

SPIEGEL.

Paul György und **E. Wilkes**, Weitere Beiträge zur Tetanielehre. Eine tetanogene Wrkg. kommt bei peroralen Gaben nur dem Na_2HPO_4 zu; nur dieses verursacht die Erniedrigung der Adrenalinblutzuckerkurve. Eine Erniedrigung des Gesamtkalkgehaltes tritt nach sauren wie alkal. Phosphaten ein. Obwohl kein mathematischer Parallelismus zwischen erhöhtem Serumphosphat- u. erniedrigtem Serumkalkgehalt bei oraler Phosphatzufuhr besteht, muß die Senkung des Serumkalkspiegels als Folge der Phosphatwrkg. aufgefaßt werden. Subcutan verabreichtes Adrenalin wirkt in der ersten acidot. Phase zu einer starken Verminderung der tetan. Nervenregbarkeit. Eine tetanogene Wrkg. kann nur im zweiten, alkalot. Stadium zum

Vorschein kommen. (Ztschr. f. d. ges. exp. Medizin **43**. 454—64. 1924. Heidelberg Kinderklin.) WOLF

J. Steinfeld, *Ein Beitrag zur experimentellen Prüfung von Stovarsol und Spir* (Acetyloxyaminophenylarsinsäure). Prüfung beider, dabei keine Unterschiede gebender Präparate an mit einem afrikan. Recurrensstamm infizierten Ratten Gaben von 0,2—0,6 g (in 1—3 Tagen). Sowohl bei vorheriger als bei gleichzeitig oder folgender Behandlung der Tiere mit dem Arsenicale schnell fast vollständiges Verschwinden der Spirochäten aus dem Blute (Dunkelfeldunters.) aber nach 12—17 Tagen Rückfälle, oft über mehrere Tage, nach kürzeren Intervallen dann oft wieder neue, schwächer u. von kürzerer Dauer. Während eines solchen Rückfalles vorgenommene Nachfütterung mit dem Mittel hinderte nicht das Auftreten von Relapsen nicht. Auch nach Ablauf aller Relapse waren die Tiere noch nicht gesund; vielmehr konnten durch Überimpfungen ihrer inneren Organe, besonders des Gehirns, auf gesunde Tiere Neuerkrankungen hervorgerufen werden. Die Infektion wird also durch das Mittel nicht coupiert, sondern nur stark geschwächt, dadurch aber die völlige Ausbildung einer Immunität verhindert oder stark verzögert. Bzgl. der Toxizität des Mittels wurden die Angaben von EHRICH durchaus bestätigt. (Klin. Wchschr. **3**. 2197—98. 1924. Heidelberg, Univ.)

Felix Harry, *Erfahrungen mit Targesin*. Die als Targesin bezeichnete kolloidale Diacetyltanninsilbereiweißverb. wird zur Behandlung der Gonorrhoe empfohlen, besonders hervorgehoben die vollständige Reiz- u. Schmerzlosigkeit auch in hohen Konzentrationen, außerordentlich rasche Verminderung des Sekretes u. der Gonokokken. (Münch. med. Wchschr. **71**. 1508—9. 1924. Wiesbaden.) SPIEGEL

J. Birnbaum, *Wismuttherapie der Syphilis mit Bismogenol und Mesurol*. In beiden Präparaten werden die im allgemeinen über Bi-Behandlung der Lues gemachten Erfahrungen bestätigt. Mit Mesurol, das 54—55% Bi enthält, konnte eine höhere Gesamtdosis von Bi (1,0—1,5 g pro Kur) verabreicht werden, ohne unbedenklich einverleibt zu werden. (Klin. Wchschr. **3**. 2051—52. 1924. Breslau, Allerheiligen-Hosp.) SPIEGEL

K. Kallmann, *Über einen plötzlichen Todesfall nach intravenöser Wismuteinspritzung*. (Entgegnung zur Arbeit von Magnus.) Vf. hält die allgemeine Warnung von MAGNUS (Klin. Wchschr. **3**. 1275; C. 1924. II. 861) vor intravenösen Injektionen für nicht berechtigt. Die dabei auftretenden Nebenerscheinungen sowohl bei Anwendung von Salvarsan als von Wismuten hat er im großen ganzen vermeiden können, indem er immer viel Blut aspirierte u. sehr langsam injizierte. (Klin. Wchschr. **3**. 2055. 1924.) SPIEGEL

August Albert, *Neue Arsenpräparate zur Bekämpfung protozoischer Parasiten insbesondere der Spirochäten*. Vf. hat gefunden, daß Ggw. von amidierenden Gruppen am Kern sowie besonders des o-Aminophenolkomplexes für Arsenobenzole die Wirksamkeit nicht erforderlich sind. Ein von ihm vorläufig als „Albert 102“ bezeichnetes Präparat ist dem Salvarsan infolge Fehlens der bezeichneten Gruppen an Beständigkeit weit überlegen (wss. Lsgg. von alkal. Rk. gegen Oxydation unempfindlich, dabei auch therapeut. höherwertig [vgl. KALBERLAH, nachst. R.]). (Klin. Wchschr. **3**. 2184—85. 1924. München.) SPIEGEL

Fritz Kalberlah, *Zur Chemotherapie der Spirochätosen und Trypanosomien (Präparat „Albert 102“)*. Über das Präparat (vgl. ALBERT, vorst. Ref.) wird er noch mitgeteilt, daß es eine Ketoseitenkette enthält, „der ein stark entgiftend wirkender, neuartiger Hydrazinokomplex angegliedert ist.“ Es ist als Na-Verb. in amorphes, stroh- bis chromgelbes Pulver, ll. in W. in kolloidaler Form mit leichtem phenolphthaleinalkal. Rk. (bis ca. 8%), ferner l. in Glycerin (fast unbegrenzt), Glykol usw., besonders ll. in Traubenzuckerlsgg., während durch > 0,4% NaCl leicht Aussalzung erfolgt. Bei Ggw. von Ca⁺⁺ tritt Nd. auf. As-Gehalt ca. 2%. Die Abtötung von Trypanosomen erfolgt nach der Injektion sehr schnell u. bei

höheren Dosen vollständig. Für die Anwendung kommt in erster Linie intravenöse Injektion in Betracht, in zweiter auch percutane (Lsg. in Glycerin, eventuell mit Emulgengrundlage). An Nebenerscheinungen wurden von anderer Seite gelegentlich Symplicusneurot. Symptome gesehen, von Vf. nicht, sonst leichte Kongestionen, nie Symplicusstörungen oder sonstige neurotrope Wrkgg., kein Ikterus oder andere Lebererkrankungen, keine Nierenstörungen, hämolyt. Blutschädigungen oder Dermatitis, etc. Das Dinatriumsalz der „Albert 102“ entsprechenden *Arsinsäure* (mit 5-wertigem Arsen) parenteral weniger wirksam, aber reizloser, daher auch subcutan, intracutikulär u. peroral verwendbar, scheint bei der letzten Anwendungsform sogar noch wirksamer als die Verb. mit 3-wertigem As. (Klin. Wchschr. 3. 2185—89. 1924. Wien. anst. Hohe Mark.)

SPIEGEL.

L. Jendrassik und E. Moser, *Beiträge zu einer Pharmakologie der Konzentrationenänderungen. 2. Über den Mechanismus der Adrenalinwirkung.* (I. vgl. Biochem. Ztschr. 148. 116; C. 1924. II. 857.) Am überlebenden Kaninchendünndarm ist die durch Tyrodelsg. zugesetzte Adrenalin auch nach abgeklungener Hemmung in der Konzentrationsfähiger Konz. vorhanden. Bei Ersatz durch frische Tyrodelsg. tritt vorübergehende Erregung auf. Wahrscheinlich werden demnach auch die Wrkgg. des Adrenalins durch Veränderungen seiner Konz. ausgel. Die Sympathicusreizung des Darm ist daher eine Augmentationswrkg. Die Diminutionswrkg. des Adrenalins besteht am Kaninchendünndarm in einer Erregung, am Katzendünndarm Erregung oder Hemmung. (Biochem. Ztschr. 152. 94—100. 1924. Budapest, Univ.) **WOLFF.**

H. de Jong und G. Schaltenbrand, *Die Wirkung des Bulbocapnins auf Paralysis agitans- und andere Tremorkranke.* In 4, teilweise sehr schweren, Fällen von Paralysis agitans u. je einem Falle von Tremor essentialis u. cerebellärem Tremor wurden durch Injektionen von Bulbocapnin die Zitteramplituden verringert, in 3 Fällen bis auf $\frac{1}{4}$. (Klin. Wchschr. 3. 2045—49. 1924. Amsterdam, Binnengasthuis. Eindhoven-Eppendorf, Univ.-Klin.)

SPIEGEL.

L. Rickmann, *Beitrag zur Goldbehandlung der Tuberkulose.* Das von den ersten Farbwerken hergestellte *Triphal* fand Vf. in der Praxis dem Krysolgan vorzuziehen. Irgendwelche Schädigungen nach den Injektionen wurden nicht beobachtet. (Münch. med. Wchschr. 71. 1609—10. 1924. St. Blasien, Sanat. f. Tuberkulosekranke.)

SPIEGEL.

S. Latteri, *Histologische Veränderungen der Thymusdrüse bei der experimentellen Typhusformvergiftung.* Bei Tötung durch Chlf., auch wenn die Narkose bis zu 24 St. ausgedehnt war, fanden sich bei Kaninchen, Meerschweinchen u. Katzen in der Thymusdrüse zwar wie in anderen Organen Hyperämie u. leichte Schwellung der retikulären Elemente, aber nicht die von BARBAROSSA beschriebenen auffallenden histolog. Veränderungen. Nach öfter wiederholter oder tagelang mit immer höheren Dosen fortgesetzter Chlf.-Narkose ließ sich dagegen hochgradige Atrophie der Thymus mit viel ausgeprägteren u. charakteristischeren Veränderungen als bei anderen Organen feststellen. (Ann. di clin. med. e di med. sperim. 13. 133—73. 1924. Palermo, Univ.; Ber. ges. Physiol. 27. 387. 1924. Ref. LAQUER.) **SPIEGEL.**

F. Pentimalli, *Über die chronische Proteinvergiftung.* Zusammenfassender Bericht über die Unterss. des Vfs. (vgl. Rif. med. 37. 532. Gazz. internaz. di med., 1924. I. 835. Folia med. 7. 321. Arch. di scienze biol. 2. 44; C. 1922. I. 510). Bisher veröffentlichten Befunde werden ergänzt durch solche im Blute u. den verschiedenen Organen der mit den verschiedenen fremden Eiweißarten, zu denen noch Typhusbacilleneiweiß gesellte, behandelten Kaninchen. Als Endergebnis festgestellt: „Die chron. Proteinvergiftung führt den Organismus zu einem Zustand von Hämopathie mit Anämie u. in gewissen Fällen zu einer Form von Leukämie, teils leukäm. Lymphadenie u. Myelodenie.“ Auf die Bedeutung

VII. 1.

dieser Folgen von chron. Proteinvergiftung für die Pathogenese gewisser krankhafter Zustände wird mit besonderem Nachdruck hingewiesen. (Klin. Wchschr. 2090—93. 1924. Neapel, Kgl. Univ.) SPIEGEL

M. R. Bonsmann, *Lobelin intravenös bei Vergiftungen*. Bei dieser Anwendungart zeigt Lobelin im Gegensatz zu subcutanen sehr prompte Wirkungswalrige Beschleunigung u. Vertiefung der Atmung in wenig Sekunden). Es wird vom Vf. besonders bei CO-Vergiftungen empfohlen. (Klin. Wchschr. 3. 2127—1924. Mainz.) SPIEGEL

Otto A. Schwarz, *Über einen Todesfall nach Anästhesie der Harnröhre mit Tutocain*. Der unter den Erscheinungen der Cocainvergiftung eingetretene Tod muß nach Lage der Dinge dem Tutocain (8 cem 2%ig. Lsg.) zugeschrieben werden, das infolge der bei der Autopsie nachgewiesenen Organminderwertigkeit im Kranken tox. Wrkg. entfaltete. (Münch. med. Wchschr. 71. 1507—8. 1924. Berlin Univ.) SPIEGEL

F. Pharmazie. Desinfektion.

I. M. Kolthoff, *Über den Zustand des Silbers im Protargol und Kollargol*. Protargol ist fast alles Ag an Eiweiß gebunden u. wird durch Halogenide in Ag-Halogenide umgesetzt. Protargol-Bayer enthielt 0,8% Ag als AgCl. Durch potentiomet. Titration mit Jodid kann man in Protargol das gesamte Ag u. AgCl bestimmen. Eine Protargollsg. hat eine gute Pufferwrkg. für Ag-Ionen zwischen $[Ag] = 10^{-2}$ u. 10^{-3} . — Kollargoll besteht hauptsächlich aus metall. Ag; sehr wenig Ag ist in ionogener Form vorhanden u. kann ebenso wie AgCl potentiomet. mit KJ titriert werden. (Pharm. Weekblad 61. 1280—85. 1924. Utrecht Univ.) GROSZFELD

Jaqueline Hillen, *Einige Bemerkungen über die Sterilisation von Heilmitteln*. Fraktionierte Sterilisation ist nicht allgemein anwendbar u. wird für das Arzneibuch nicht empfohlen, statt deren: 10 Minuten Erhitzen in vorher sterilisierten Gefäß auf 100° oder 1 Stde. auf 90° oder 2 Stdn auf 80°. Wenn so keine vollständige Sterilität erreicht wird, empfiehlt sich Zusatz eines Stoffes, der die Sterilisation ermöglicht (Antisepticum oder Stoff, der den p_H beeinflusst). Auch bei fraktionierter Sterilisation sollen vorher sterilisierte Gefäße verwendet werden. *Sulfas atropini* änderte sich in Lsg., $\frac{1}{2}$ Stde. auf 100°, nicht, wohl aber bei Ggw. von Alkali. Bei *Glycerin*, *Guajacol*, *Campheröl*, *Kreosot*, *Salicylsäure* empfiehlt sich statt der Vorschriften des Arzneibuches 1—2 Stdn. im Trockenschrank bei 100°. Die Vorschrift, *Skopolamin-Hydrobromid-Lsg.* stets frisch zu bereiten, ist unzuweckmäßig besser: Angabe des Herstellungsdatums u. der Dauer der Haltbarkeit in der Aufschrift. (Pharm. Weekblad 61. 1245—53. 1924. Amsterdam, O. L. VROEGE Gasthuis.) GROSZFELD

C. H. Boehringer Sohn, *Niederlingelheim a. Rh.*, und **Hermann Wiedemann**, *München*, *Herstellung von Narkotisierungsmitteln aus Acetylen*, gek. durch den Zusatz von flüchtigen Riechstoffen zum C_2H_2 oder seinen Lsgg. — Man leitet z. B. (H) vor dem Komprimieren über ein mit *Jonon* oder *Neroli*- oder *Latschenöl* beladene Material u. komprimiert dann das Gas — oder man löst in dem zur Aufsaugung des komprimierten C_2H_2 verwendeten Aceton den Riechstoff, z. B. auf 1 cbm (H) 3 g Neroliöl u. 2,5 g Latschenöl. Durch den Zusatz der Riechstoffe, auch auch Alkohole u. Aldehyde, wie Geraniol, Linalool u. deren Ester, Citral oder ein Gemisch dieser Stoffe, sind geeignet, zu dem C_2H_2 wird der reflektor. Widerstand der Patienten beim Einatmen des Gases ausgeschaltet u. das Narkoticum schon in den ersten Atemzügen ohne Störung aufgenommen. — Für die Verwendung des (H)

Narkoticum muß es von P u. S völlig befreit sein u. in einer geeigneten Konz. (mindestens 50%) mit Luft oder O_2 vermischt werden. Es verliert dann völlig seine Wirksamkeit u. kann ohne Nebenwrgg. eine rasche u. tiefe Narkose hervorrufen. — Vorteilhaft kann das C_2H_2 mit anderen Narkotisierungsmitteln, wie Ä.-Dampf, CCl_4 oder N_2O beladen werden, von denen nur ganz geringe Mengen zur Herbeiführung einer wirksamen Betäubung benötigt werden, so daß die nachteiligen Wrgg. der ausschließlich mit Ä., Chlf. oder N_2O ausgeführten Narkosen nicht eintreten. Für die Mischung C_2H_2 -Ä.- O_2 genügen z. B. 40–50% C_2H_2 , annehmend 60–50% O_2 u. 5–10 Tropfen Ä. = ungefähr 1,5% Ä.-Dampf. — Beim Zusatz von Riechstoffen kann man diese auch mit einem Verdünnungsmittel, wie Äther, vermischt in den Strom des C_2H_2 oder seines Gemisches mit Luft oder O_2 einschalten. (E. P. 205240 vom 24/7. 1922, ausg. 8/11. 1923. D. R. P. 403083 vom 30h vom 23/10. 1921, ausg. 22/9. 1924. Oe. P. 95916 vom 7/2. 1922, ausg. 2/2. 1924. D. Priorr. 23/9. 1921 u. 22/10. 1921.)

SCHOTTLÄNDER.

Deutsche Gold- und Silber-Scheide-Anstalt vorm. Roessler, Frankfurt a. M., Verfahren zur gleichzeitigen Abtötung von Bakterien und Ungeziefer, dad. gek., daß man Blausäure oder Derivv. desselben oder Mischung vorgenannter Stoffe in Gaseinschaltung mit Formaldehyd bei gewöhnlichem oder vermindertem Druck in Gasform auf die Schädlinge einwirken läßt. — Ein geeignetes CNH-Deriv. z. B. Acetonitril. Durch die vereinigte gleichzeitige Anwendung von CH_2O u. HCN wird ein schnellerer Erfolg erzielt als durch getrennte Anwendung beider Gase, selbst dann, wenn die getrennte Zufuhr ganz oder teilweise versagt. Vergleichlich übt der an sich schon baktericid wirkende CH_2O eine beträchtliche Reizwirkung auf die in Betracht kommenden Organismen aus, die so zu gesteigerter Atemaktivität u. damit zur schnelleren Aufnahme der HCN veranlaßt werden. — Um Gefahren bei der Begasung für die Arbeiter auszuschalten, führt man vorteilhaft geeignete Riechreizstoffe, wie Chlorkohlensäureester, oder gleichzeitig reizend abtötend wirkende CN-Derivv., wie Cyankohlensäureester (Cyklon), ein. (D. R. P. 4099 Kl. 451 vom 19/8. 1921, ausg. 22/9. 1924. Oe. P. 96330 vom 2/9. 1921, ausg. 10/3. 1924.)

SCHOTTLÄNDER.

Chemische Fabrik auf Actien (vorm. E. Schering), Berlin, Haltbare Impfung aus Bakterien. (D. R. P. 403737 Kl. 30h vom 10/4. 1923, ausg. 2/10. 1924. D. R. P. 397887; C. 1924. II. 1010. — C. 1924. II. 1010 [E. P. 208079.]) **SCHOTT. Fritz Steinitzer**, Osterwieck, Harz, Vorrichtung zur Gewinnung von Blutserum, durch einen beweglich gelagerten Behälter, in dem die Gerinnung des Blutes stattfindet, mit einem siebartig durchlöchernten Teil, in den bei Lageänderung des Behälters der Blutkuchen hineingleitet, so daß das Serum abtropfen kann. — Bei sprechender Form des Behälters geht das Gleiten des Blutkuchens erschütterungsvor sich, so daß keine Zerreißung des Fibrinnetzes u. infolgedessen auch kein Eintritt von Blutkörperchen in das Serum erfolgt. Das Innere des Behälters wird glatt emailliert oder lackiert, wodurch ein leichtes Gleiten des geronnenen Blutes u. ein vollständiges Herausfallen des vom Serum befreiten Blutkuchens erreicht wird. (D. R. P. 400568 Kl. 30h vom 3/7. 1923, ausg. 22/8. 1924.)

Economy Fuse & Manufacturing Company, übert. von: **William Hoskins**, Chicago, Formbare Massen. Fein gepulverte Füllmittel, wie Quarz, Glas, getrocknetes Al_2O_3 , MgO oder $CaSO_4$, Asbest, Holz, Kork u. dgl. werden zwecks Herstellung eines abbindender MM., wie Porzellanersatz, elektr. Widerstandsträger o. dgl. zu 2–10%, zwecks Erzeugung schnell abbindender MM., wie Zahnzemente, mit 75% Alkali- oder Erdalkali-, besonders Calciumaluminat gemischt, die bei Mischung mit einer konz. Lsg. von H_3PO_4 , welche Phosphate, wie Alkali- oder Ammoniumphosphat enthalten kann, versetzt, geformt, gegebenenfalls unter hohem Druck bei gewöhnlicher oder erhöhter, z. B. bis 150° gesteigerter Temp. sich selbst

überlassen. Wird unter erhöhtem Druck geformt, so empfiehlt sich ein Zusatz von Schmieröl, um Anhaften an der Form zu verhüten. (A. P. 1507379 vom 15/8. 1921, ausg. 2/9. 1924.) KÜHLING

Hermann Pauson, Berlin, *Material zur Herstellung gegossener Zahnfüllungen u. Brücken*, bestehend aus einer Legierung von Ag 65%, Sn 33%, Au 2% oder 64%, Sn 32%, Au 4%. — Die Legierung läßt sich infolge ihres niedrigen F. bei einer sehr niedrigen Temp. gießen, kann dem Zweck der Füllung entsprechend durch größeren oder geringeren Zusatz von Sn u. Au beeinflusst werden u. w. bei n. Speichelzus. nicht gel., wie die vielfach empfohlenen Goldersatzmetalle, zum Teil einen Pb-Zusatz enthalten. (D. R. P. 404607 Kl. 30h vom 15/8. 1924, ausg. 20/10. 1924.) SCHOTTLÄNDER

Centro Técnico de Fumigation, Valencia, *Verfahren und Vorrichtung zur Desinfizieren oder zur Entwesung*. (D. R. P. 403084 Kl. 30i vom 16/4. 1922, ausg. 22/9. 1924. — C. 1923. IV. 276.) KÜHLING

International Chemical Company und Ludv. A. Meyer, *Haltbare Formaldehydbereitungen*. Paraformaldehyd wird mit alkal. Stoffen gemischt, die Mischung in Tafelchen gepreßt u. gegebenenfalls mit einem Überzug von Paraffin o. dgl. versehen. (Dän. P. 32163 vom 16/12. 1922, ausg. 27/8. 1923. Zus. zu Dän. 29327.) KÜHLING

G. Analyse. Laboratorium.

A. R. Matthis, *Die Auslegung chemischer Analysen und dabei mögliche Irrtümer*. Vf. bespricht irrtümliche Auslegungen von Analysenergebnissen, wie sie entstehen durch unrichtige Probenahme, unsorgfältige Arbeit, unzulässigen Vergleich von verschiedenen nicht gleichwertiger Analysenverf., Berechnung von zu wenig oder zu viel Dezimalstellen ohne Rücksicht auf die Genauigkeit des Analysenverf. u. Fehler. (Bull. Fédération Industr. Chim. de Belgique 1924. 447—58. 1924.) NEUFELD

H. Hartridge und F. J. W. Roughton, *Verbesserungen am Apparat zur Messung der Geschwindigkeit sehr rasch verlaufender chemischer Reaktionen*. Vf. beschreiben Verbesserungen an ihrem App. (vgl. Proc. Royal Soc. London [Series A] 104. 376; C. 1924. I. 2057), die hauptsächlich in einer Verkürzung der Vermischungs- und Messdauer der Fl. besteht (von 0,0011 auf 0,00035 Sek.), so daß nun Halbwertszeiten von $\sim \frac{1}{1000}$ sec opt. beobachtbar sind. Eine Ausgestaltung ihrer Methode unternehmen Vf. nach einer anderen Seite hin insofern, als sie ein „Beobachtungsrohr“ den Fortgang der Rk. nicht mehr mittels opt. Methoden sondern mit sondentartig eingelassenen Thermoelementen verfolgen (Abgabe von Rk.-Wärme); hierbei wird durch vorherige Messungen mit dem „ausreagierten“ Gemisch der Einfluß der Flüssigkeitsreibung, Wirbelbildung u. elektr. Anomalien der Thermoelemente festgelegt. Es gelingt so, den Verlauf der gegenseitigen Neutralisierung von $\frac{1}{10}$ -n. HCl u. $\frac{1}{10}$ -n. NaOH zeitlich aufzulösen. (Proc. Cambridge Philos. Soc. 22. 426—31. 1924. Cambridge.) FRANKENBURGER

H. Hamdi, *Neue Konservierungsflüssigkeit*. Zur Konservierung von in Form fixierten Präparaten, die dabei auch ihre Originalfarbe wieder erhalten, hat Vf. Lsg. von 100 g NaCl, 5 g Glaubersalz, 50 Glycerin in 1000 Leitungswasser bewährt, der noch einige Tropfen gesätt. alkoh. Campherlsg. zugefügt werden. (Müh. med. Wehschr. 71. 1613. 1924. Konstantinopel, Med. Fak.) SPIEGEL

R. A. B. Tricker, *Eine „Schnecken“-Methode zur Fokussierung von β -Strahlen*. Vf. beschreibt eine neue Methode der magnet. Auflösung eines β -Strahlenspektrums mit schneckenförmigem Verlauf der Elektronenbahnen. Obgleich nicht so allgemein verwendbar wie die üblichen Verfahren bietet dieses den Vorteil großer Dispersion besonders großer Intensität u. guter Abschirmung (gegen γ -Strahlen). Aus

mit angestellten Verss. lassen sich gewisse Schlüsse auf die Natur des kontinuierlichen Untergrundes der β -Strahlspektren ziehen. (Proc. Cambridge Philos. Soc. 2. 454—63. 1924. Trinity Coll.)

FRANKENBURGER.

C. Blomberg, *Einige Bemerkungen über Titrationen*. Besprochen werden Maß- und Volumpipetten, Büretten, TiterEinstellung, Titerkontrolle, Stärke der Lsgg., Haltbarkeit derselben. (Pharm. Tijdschrift voor Nederlandsch Indië 1. 273—78. 1924. Serabaia, Lab. d. N. V. P. I. M. HELMIG & Co.)

GROSZFELD.

I. M. Kolthoff und O. Tomiček, *Die Ersetzung der jodometrischen Maßanalyse durch die Eisenchlorid-Maßanalyse*. Das von JELLINEK u. WINOGRADOFF (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 129. 15; C. 1923. IV. 277) vorgeschlagene Verf. kann die Jodometrie nicht ersetzen. Unter günstigsten Verhältnissen mit *Mekonsäure als Indikator* wurde die Genauigkeit nicht $< 0,5\%$ gefunden. (Pharm. Weekblad 61. 105—9. 1924. Utrecht, Univ.)

GROSZFELD.

W. Payman, „*Jet-Calorimeter*“ ein neues Gascalorimeter. Vf. hat auf Grund eigener Unterrs. (vgl. S. 204) ein einfaches Gascalorimeter konstruiert. Der App. besteht aus einem Zylinder mit eingesetztem Fenster, durch das man den im Innern des Zylinders befindlichen Brenner mit dahinterstehender Spiegelskala beobachten kann. Im unteren Ende des Zylinders befinden sich Luftlöcher, auf dem oberen steht ein kleiner Schornstein. Die Skala ist in mm geteilt. Statt der mm-Zahlen können WE eingetragen werden. In letzterem Falle ist die Eichung der App. sehr einfach. Ein Gas von bekanntem Heizwert wird im App. verbrannt; dabei wird der Gasdruck so geregelt, daß die Spitze der Flamme in Höhe des Skalenteiles steht, welcher dem Heizwert des Gases entspricht. Bei der Unters. von Gasen ist dann nur nötig, den so ermittelten Gasdruck genau einzuhalten, was mit Hilfe des einfachen H_2O -gefüllten Manometers möglich ist. Der der Höhe der Flammenhöhe entsprechende Skalenteil gibt dann direkt den gesuchten Heizwert an. (Z. 3. 406—7. 1924. Sheffield, Univ., Dep. of Fuel Technology.)

BIELENBERG.

Elemente und anorganische Verbindungen.

F. Feigl, *Koordinationschemische Studien über das analytische Verhalten von Schwermetallsulfiden*. Die Farbe der Schwermetallsulfide kann nicht auf der stark abweichenden Wrkg. des S als Chromophor beruhen, wie die Existenz der sogenannten Löslichkeitskomplexe des Hg, Pb u. Cd beweist, die in der Farbe von den n. Sulfiden stark abweichen. Für das Doppelsalz $2HgS \cdot HgCl_2$ dürfte folgende Koordinationsformel

in Erwägung zu ziehen sein: $HgS \rightarrow Hg \leftarrow \begin{smallmatrix} Cl \\ Cl \end{smallmatrix}$. Die Unlöslichkeit von CuS u. Cu_2S

in NH_3 u. die Beständigkeit von Cu_2S lassen es nicht zu, diese Verb. als $Cu(II)$ -Salze des H_2S aufzufassen. — Die Unstimmigkeiten zwischen prakt. beobachteten Löslichkeitseigenschaften u. den in der Literatur bekannten Angaben werden Vf. zu der Annahme, die er auch teilweise experimentell stützen konnte, daß die Ionentheorie zur Erklärung der W.- u. Säurelöslichkeit von Metallsulfiden in deren Umsetzung mit Metallsalzen nicht ausreicht. So beträgt beispielsweise die W.-Löslichkeit von Tl_2S $21500,0 \cdot 10^{-6}$ Mol/Liter, dagegen die des fleischfarbenen PbS $71,6 \cdot 10^{-8}$ Mole/Liter, demnach 3—400mal unlöslicher u. müßte nach der Ionentheorie auch weniger säurelöslich sein. Trotzdem kann Tl_2S in essigsaurer Lsg. dargestellt werden u. MnS nicht. ZnS ist nur sehr wenig mehr unl. als MnS in essigsaurer Lsg. gefällt werden. Nach der Ionentheorie dürfte die Umsetzung $MnS + 2TI^+ \rightarrow Mn^{2+} + 2I^- + H_2S$ nicht möglich sein, obwohl tatsächlich MnS durch $2TiNO_3$ in Tl_2S übergeführt wird. Ein ähnlich ungeklärter Fall ist die Umsetzung von PbS u. Cd -Acetat, während Pb -Acetat CdS nicht anzugreifen vermag. Ähnliche u. ähnliche Erscheinungen wurden ferner bei Bi_2S_3 , NiS u. CoS beobachtet.

Vf. glaubt die abweichenden Erscheinungen im Verh. der Metallsulfide gegenüber den bisherigen Anschauungen durch eine koordinationschem. Hypothese klären zu können, wenn er sagt, daß sämtliche gefällten Metallsulfide Polymerisationsprodd. der Einzelsulfidmoleküle darstellen. Die Polymerisation ist hervorgerufen durch Nebenvalenzbetätigung der S-Atome. Vf. ist der Ansicht, daß die Farbe der Sulfide durch einen Nebenvalenzausgleich an den S-Atomen der Einzelmoleküle zustande kommt. $(\text{NH}_4)_2\text{S}$ ist bekanntlich farblos, dagegen sind die Metallsulfide stark gefärbt. Die schwarzen Sulfide von Hg u. Pb enthalten Polymersulfide während die Sulfosalze Einzelmoleküle enthalten. Das Verh. von Schwermetallsulfiden bei der Umsetzung mit anderen Salzen abweichend vom Massenwirkungsgesetz wird durch den Einfluß der Festigkeit von Nebenvalenzbindungen erklärt. Bei 1. Metallsulfiden werden die Rkk. den Einzelmolekülen bzw. den Spaltprodukten zuzuschreiben sein. Da für die Metallsulfide keine Lösungsm. existieren, selbstige nicht zers., konnte ein direkter Beweis der koordinationschem. Annahme durch Best. des Polymerisationsgrades bzw. der Molekulargröße des Sulfidmoleküls nicht erbracht werden. Doch gelang es, die Hypothese durch einen Wahrscheinlichkeitsbeweis zu stützen, indem die ebenfalls auf Nebenvalenzausgleich vorwiegend zu S-Atom beruhende Polymerisation zu Mischsulfiden (Heteropolymeren) verwertet werden konnte. Diese enthalten aber im Gegensatz zu den Isopolymeren verschiedenartige, doch stets S-haltige Bestandteile gemäß den 3 Schemen: $\text{Me}_a\text{S} \dots \text{SMe}_b$, $\text{MeS} \dots \text{SH}_2$, $\text{MeS} \dots \text{S}$. Durch sulfid. Fällung in wss. Lsg. konnten so Mischsulfide wechselnder Zus. von Pb-Ni, von Zn-Mn, von Cd-Mn, von Zn-Hg, von Hg-Cd, von Hg-Mn, von Sn-Co u. Mo-Polysulfide dargestellt werden (Ztschr. f. anal. Ch. 65. 25—46. 1924. Wien, Univ.) HOES

I. M. Kolthoff und H. Hamer, *Der Nachweis von Metallen als Doppelhalogenide mit Pyridin oder Antipyrin oder Pyramidon*. Mit Pyridin u. Bromid als Reagens kann man makrochem. noch 5 mg Cd bzw. Zn/l. nachweisen. Mit Iodanid statt Bromid fallen alle Metalle der $(\text{NH}_4)_2\text{S}$ -Gruppe aus. Zn liefert nur eben bei 100 mg/l mit Rhodanid u. Antipyrin Nd., Cd nicht (*Nachweis von Zn neben Cd!*). Mit Pyramidon u. Rhodanid kann man noch eben 1 mg Cu/l. durch Violettärfärbung nachweisen. Zum mikrochem. Nachweis von Zn u. Cd ist das Pyridin-Bromid-Reagens am geeignetsten. (Pharm. Weekblad 61. 1222—27. 1924. Utrecht, Univ.) GROSZFE

Mich. Dimitroff, *Nachweis von Chlor in Gegenwart von Brom, Jod usw.* ausgehend von der Erwägung, daß HCl die beständigste der Halogenwasserstoffsäuren ist, welche durch Br u. J nicht oxydiert werden kann, während Cl Bromid u. Jodide leicht zers., hat Vf. eine Methode ausgearbeitet, um Chlor im Gemisch mit anderen Halogenen u. Salze eindeutig zu erkennen. Im Prinzip besteht die Methode im folgenden: Wenn die aus der Substanz freigemachten Cl-, Br- u. J-Dämpfe durch eine verd. Lsg. von Bromid perlen, werden Br u. J unverändert durchgeschwungen u. durch kurzes Erhitzen entfernt werden können. Cl hingegen wird je nach Menge das Bromid ganz oder zum Teil in Chlorid überführen. Noch vorhandenes HBr wird dann durch ein Oxydationsmittel entfernt, das zwar diesen quantitativ zu oxydieren imstande ist, aber die gebildete HCl nicht angreift. Als solches wurde NaBrO_3 gefunden. Der App. (Schliffdestillationskolben) mit vorgelegtem Reagens ist im Original wiedergegeben. Die vorzulegende Lsg. besteht aus 10 ml 2-n. H_2SO_4 mit 1—2 Tropfen $\frac{1}{10}$ -n. NH_4Br -Lsg. (Cl-frei). Das Verf. ist im folgenden: Die zu analysierende Substanz wird in dem Kölbchen mit W. u. 15 ml 20 ccm verd. H_2SO_4 gel. u. wenig KMnO_4 (Cl-frei) zugefügt. Die frei gewordenen Halogene werden durch hindurchperlende Luft nach der vorgelegten Lsg. hindurchgetrieben, nach der Entfärbung der Reagenslsg. die Fl. des Dest.-Kölbchens zum Sieden erhitzt u. weitere 2 Minuten Luft durchgeleitet. Aus der vorgelegten Lsg. entfällt

nun die freien Halogene durch hindurchperkende Luft u. kurzes Sieden. Nach Abkühlen fügt man jetzt hierzu 2 Tropfen $\frac{1}{10}$ -n. NaBrO_3 , läßt Luft durchgehen, bis alles Br entfernt ist. Eine nun im Reagensrohr mit AgNO_3 eventuell tretende Trübung kann dann nur von Cl herrühren. Es sei besonders darauf hingewiesen, daß die zur Benutzung kommenden Reagenzien chlorfrei sein müssen. Die Darst. von chlorfreiem NH_4Br ist eine Vorschrift gegeben. Es genügen diesem 2 Tropfen $\frac{1}{10}$ -n. Lsg., um alles Cl aufzunehmen. Überschüssiges Brom stört die Rk. nicht. Das neue Verf. empfiehlt sich besonders deswegen, andere Säuren, Alkalien, Salze, selbst Cyanide u. komplexe Cyanverb. nicht an. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. **140**. 253—60. 1924. Berlin, Tierärztl. Hochschule.)

HORST.

B. Schmitz, *Ein Beitrag zur Herstellung des Magnesium-Ammoniumphosphaterschlagf für die Bestimmung der Phosphorsäure, bezw. der Magnesia*. Vf. gibt abgeänderte Methode seiner früheren Vorschrift (vgl. Ztschr. f. anal. Ch. **45**. C. 1906. II. 911) zur Erzeugung des Nd. von *Magnesiumammoniumphosphat*, in *Ammonacetat* als Regulator der Fällung zugesetzt wird. Die Ausführung folgende: KH_2PO_4 wird in wenig W. gel., mit einigen Tropfen verd. HCl angesetzt u. mit 30 ccm Magnesiainxtur, 5 g Ammonacetat u. wenigen Tropfen Nalophthalein versetzt. Nach kräftigem Sieden der Fl. läßt man tropfenweise $\frac{1}{10}$ -g. NH_3 unter Umrühren zufließen bis zur schwachmilchigen Trübung. Nun setzt man, ohne weiter NH_3 zuzusetzen, solange, bis der Nd. krystallin geworden. Dann gibt man weiter NH_3 zu bis eben schwache Rotfärbung eintritt, spült Glasstab mit verd. HCl (1:10) ab u. setzt weiterhin NH_3 bis zur neuerlichen Färbung zu. Man läßt jetzt vollständig erkalten, setzt $\frac{1}{3}$ des Vol. konz. NH_3 kräftig u. filtriert nach wenigen Minuten. Im Neubauerplatintiegel mit $\frac{1}{10}$ -g. NH_3 , dann mit A. waschen, mit kleiner Flamme vortrocknen u. dann im Str. Ofen (oder Teclubrenner) $\frac{1}{2}$ Stde. glühen. Das Verf. schließt größere Ver. aus u. ist trotzdem rascher u. sicherer auszuführen als die früher (l. c.) betriebene Arbeitsweise. (Ztschr. f. anal. Ch. **65**. 46—53. 1924. Oerlikon, Landwirtsch. Vers.-Anstalt.)

HORST.

Ernest H. Swift, *Eine neue Methode zur Trennung von Gallium von anderen Elementen*. Wie Fe u. Ti so läßt sich auch Ga aus salzsaurer Lsg. mit Ä. extrahieren, was beim Ni nicht gelingt. Die Extraktion von Ga ist am vollständigsten, in der Anfangskonz. der HCl 6-n. ist. Die Konz. des Ga in der äth. Schicht war am größten, wenn die HCl 7-n. ist, doch ist sie im Verhältnis geringer, das Vol. der äth. Schicht durch größere Löslichkeit in HCl vermindert wird. Verteilungsverhältnis von Ga in der äth. u. der wss. Schicht für verschiedene Konzz. ist graph. dargestellt. Im Gegeusatz zu Angaben in der Literatur (Treadwell-Hall, 5. ed. 1., JOHN WILEY and Sons, 1921. 540) findet Vf. beim Aufnehmen salzsaurer Lsgg. von Ga auf dem Dampfbad keinen Verlust an Ga, nach Überführung in das Nitrat als Ga_2O_3 bestimmt wurde. Die Ä.-Extraktion zur Trennung des Ga von andern Elementen, deren Verh. Ä. gegenüber unter andern Bedingungen in einer Tabelle angegeben ist, benutzt. Von den mit Ga vorkommenden Elementen läßt sich nur Fe mit Ä. aus salzsaurer Lsg. trennen, von diesem wird Ga mit NaOH getrennt, dessen Konz. mindestens 0,3-n. soll. Nachdem alles Fe ausgefällt ist, wird das Gemisch 2 Min. zum Sieden erhitzt, abgekühlt u. filtriert. Zu dem Filtrat wird 6-n. HCl bis zur neutralen Rk. gesetzt u. noch 1 ccm mehr. Die Lsg. wird verd. mit 5 ccm 3-n. Ammoniumacetat 2 Min. lang gekocht. Die Menge des Ga-Nd. wird mit Standardmengen verglichen. Der $\text{Fe}(\text{OH})_3$ -Nd. wird in HCl gel., die Lsg. bis zur Trockne eingeapft, der Rückstand in 10—20 ccm 6-n. HCl gel., die Lsg. mit einem Überfluß von metall. Hg geschüttelt, bis alles Fe red. ist. Die Lsg. wird mit Ä. aus-

gezogen, u. dadurch Ga von zweiwertigem Fe getrennt. Der äth. Extrakt v. bis zur Trockne eingedampft u. Ga wie oben als Acetat (amorpher weißer) bestimmt. (Journ. Americ. Chem. Soc. 46. 2375—81. 1924. Pasadena [Cal.], Journ. of Technol.) JOSEPH

Arthur E. Stoppel, Charles F. Sidener und Paul H. M.-P. Brinton, *jodometrische Bestimmung von Vanadium.* Vff. stellen die Bedingungen fest, unter welchen 5-wertiges V auf jodometr. Wege genau bestimmt werden kann. Die Titration von V_2O_5 erfolgt durch Glühen bis 400° der durch mehrmaliges Umkrystallisieren von Ammoniummetavanadat aus NH_4OH -haltigem W. erhaltenen Krystalle, die mit verd. HNO₃ befeuchtet mit frisch dest. HNO₃ u. nochmaligem Erhitzen auf 400° . Ein Standardlsg. wurde hergestellt, indem das V_2O_5 , das frei von niederen Oxyden u. z. zu einer h. Lsg. von $NaHCO_3$ gegeben wurde. Die Lsg. war auch nach 6 Monaten noch nicht trübe. Der Grad der Red. des 5-wertigen V durch KJ hängt von Säure- u. der Jodidkonz. ab. Die günstigsten Bedingungen sind auf 10 ccm n. trale Vanadatlg. 5—10 ccm 6-n. Mineralsäure u. 2—4 g KJ, dann wird a. Vanadat in 4-wertiges Vanadyl übergeführt, u. in der verd. Lsg. ist bei Titration mit 0,05-n. $Na_2S_2O_3$ -Lsg. der Umschlag der dunkelblauen Farbe der J-Stärke-Rk. in die hellblaue Farbe der Vanadyl-Lsg. scharf. Bei Ggw. von mehr 0,2 g V_2O_5 verliert der Umschlagspunkt etwas an Schärfe, bleibt aber noch einen Tropfen 0,1-n. $Na_2S_2O_3$ empfindlich. Bei kleineren Säuremengen müssen entsprechend größere Mengen KJ angewandt werden, oder es muß bis zur Verdünnung einige Min. gewartet werden. Essigsäure ist nicht anwendbar. L. nicht alles V in der 5-wertigen Stufe vor, so muß zuvor mit H_2O_2 in alkal. L. oxydiert werden. Kleine Mengen von Mo stören die jodometr. Best. von V nicht, wenn HCl durch H_3PO_4 ersetzt ist. Bei Ggw. von W fallen die Ergebnisse etwas zu niedrig aus, u. U stört die Rk. (Journ. Americ. Chem. Soc. 46. 2448—54. 1924. Minneapolis [Minn.], Univ.) JOSEPH

A. Grammont, *Untersuchungen über natürliche Phosphate. Nachweis und Bestimmung der in diesen Mineralien in kleiner Menge befindlichen Metalle.* II. M. (I. vgl. Bull. Soc. Chim. de France [4] 35. 405; C. 1924. II. 219.) Es wurden die Zn u. Ni in natürlichen Phosphaten bestimmt. Die Auslaugung wurde nach der für Cr l. c. angegebenen Verf. bewirkt. Nachdem mittels SO_2 Eisenoxyd reduziert, überschüssiges SO_2 ausgekocht worden ist, wird H_2S eingeleitet, der Nd. nach 24 Std. Stehen bei gelinder Wärme abfiltriert, nach Waschen mit H_2S -haltigem W. mit wenig Na_2S u. $NaOH$ gewaschen, das zurückbleibende CuS mit Filter veraselt. Rückstand in HNO_3 gel. eingedampft, in $CuCl$ übergeführt u. Cu als $CuCNSe$ bestimmt. Das Filtrat des H_2S -Nd. wird mit HCl angesäuert, zur Entfernung von H_2S gekocht, u. mit $KClO_3$ oxydiert; nach Zugabe von viel NH_4OH u. 2 Stdn. bei gelinder Wärme digeriert. Der Nd., der Al- u. Fe-Phosphat enthält, wird in HCl gel. u. erneut mit überschüssigem NH_4OH gefällt, um Spuren von Cu u. Ni zu entfernen. Die vereinigten Filtrate u. Waschwässer werden mit $(NH_4)_2S$ versetzt; der Nd., der nach 12 Std. Stehen entfernt wird, enthält ZnS , NiS u. etwas FeS ; er wird nach Waschen mit $(NH_4)_2S$ -haltigem W. mit sd. HCl behandelt u. diese Lsg. mit $KClO_3$ oxydiert. Durch Zusatz von überschüssigem NH_4OH u. $Fe(OH)_3$ fällt; aus der ammoniakal. Lsg. werden mittels $(NH_4)_2S$ ZnS u. NiS gefällt, die nach 12 Std. Stehen u. Waschen mit W. ($(NH_4)_2S$ -haltig) mit H_2S -haltigem HCl behandelt werden, wodurch ZnS gel. wird. Das Filter mit NiS wird veraselt mit Königswasser behandelt, die Lsg. eingedampft, mit HCl aufgenommen u. als Dimethylglyoxim bestimmt. Es enthielten: 100 g *Gafsa-Phosphat* (63/68) 0,21 mg Cu, 0,014 g Zn, 0,052 mg Ni, *Gafsa* (58/63) 0,53 mg Cu, 0,027 g Zn, 0,76 mg Ni, *Pebble*: 1 mg Cu, 0,005 g Zn, 0,60 mg Ni; *Kef Rebiba*: 0,99 mg Cu, 0,012 g Zn, 0,19 mg Ni; *Kouif*: 0,69 mg Cu, 0,015 g Zn, 0,44 mg Ni; *Dyr*: 1,08 mg Cu, 0,01

n, 0,67 mg Ni; Marokko: 1,80 mg Cu, 0,016 g Zn, 0,50 mg Ni; Craie-Phosphat (aux) 0,90 mg Cu, 0,018 g Zn u. 0,76 mg Ni. (Bull. Soc. Chim. de France [4] 35. 351—54. 1924.)

HABERLAND.

Bestandteile von Pflanzen und Tieren.

O. M. Shedd, *Bestimmung von Nitrat und Ammoniak in stickstoffhaltigen Substanzen*. Von dem mit k. W. hergestellten Auszuge der Probe werden 2 gleiche große Anteile entnommen, in je einem 1 l-Kjeldahlkolben auf 250—350 ccm vermischt. Paraffin, Bimstein, 2,5—3 g gel. Na(OH) (1:1) zugesetzt u. nach Zusatz von 2—3 g Devardalegierung zu einer der beiden Fll. die Kolben mit Bunsenventilen enthaltenden Gummistopfen verschlossen, nach 24 Stdn. mit einer Dest.-Röhre nach Mc HARGUE (vgl. Journ. Ind. and Engin. Chem. 11. 670; C. 1920. IV. 106) verbunden; 2 Stdn. mit niedriger Flamme nahezu bis zum Sieden erhitzt u. schließlich indestens je 150 ccm abdestilliert. Abgemessene Teile der beiden Destillate werden mit 0,1-n. H_2SO_4 u. Natriumalazarinsulfonsäure als Indicator titriert. Die Differenz der beiden Titrationen ergibt den N in Form von HNO_3 u. HNO_2 . (Journ. Agric. Research 28. 527—39. 1924. Kentucky, Agric. Exp. Stat.)

BERJU.

S. I. Kanewskaja, *Über ein neues Trennungungsverfahren der wichtigsten Opiumalkaloide*. Morphin u. Narkotin werden aus dem Opiumextrakt mit NH_3 isoliert, nachdem dem wss. Auszug vorher die gleiche Menge A. zugesetzt wurde. Narkotin in Bzl. u. Chlf. ll., Morphin fast unl. Aus dem NH_3 -Filtrat werden Kodein, Papaverin u. Thebain durch Extraktion mit Bzl. gewonnen. Durch Ausschütteln der Lsg. mit Essigsäure gehen die starken Basen Kodein u. Thebain in die saure Schicht über, während die schwache Base Papaverin kein Salz bildet u. in der unlöslichen Lsg. bleibt. Kodein u. Thebain werden durch NH_3 oder Soda gewonnen, Thebain wird ausgefällt, Kodein bleibt in Lsg. (Journ. f. prakt. Ch. 108. 17—56. 1924. Moskau, 2. Univ.)

ZANDER.

Domenico Ganassini, *Nachweis des Chinins in Gegenwart von Antipyrin oder Pyramidon*. Gemische von Chinin mit Antipyrin bzw. Pyramidon geben mit frisch bereiteter Cl_2 -W. u. darauffolgender Behandlung mit NH_3 eine schöne Rosa- bis Rotfärbung unter allmählicher B. eines Nd. von gleicher Farbe. Antipyrin u. Pyramidon allein gegen diese Rk. nicht, letzteres nur eine sehr unbeständige Violettfärbung mit Cl_2 -W. Die Rk. gelingt bei einem großen Überschuß von Antipyrin u. Pyramidon immer; bei einem Überschuß von Chinin wie es meistens bei den therapeutischen Extrakten von tier. Geweben der Fall ist, wird dagegen der Ausfall der Rk. zweifelhaft. Am besten gelingt in diesem Falle der Nachweis des Chinins, indem man den Rückstand der äth. Lsg. wiederholt mit k. W. auswäscht, wobei Antipyrin u. Pyramidon in Lsg. gehen. In dem unl. Anteil läßt sich das Chinin sehr leicht durch den üblichen Verff. nachweisen. (Boll. Chim. Farm. 62. 321—22. 1924. Mailand, Univ.)

OHLE.

William P. Thompson und Frank L. Meleney, *Eine vergleichende Methode zur Untersuchung der Enzyme des lebenden hämolytischen Streptococcus*. I. Lipase. Die Wrkg. der Lipase wurde an der Farbänderung gemessen, die die mit Indicator versetzten Lsgg. infolge der B. von Säure aus Äthylbutyrat zeigten. — 7 Stdn. alte Kulturen waren besser wirksam als 21 Stdn. alte. — Die Geschwindigkeit der Rk. nahezu proportional der Konz. des Enzyms. — Das Temperaturoptimum liegt bei 37,5°, bei 50° ist die Wrkg. geringer, bei 60° fehlt sie völlig. — Erhitzen der Organismen auf 55° während 10 Min. schädigt den Organismus u. seine Enzyme; völlige Zerstörung tritt bei dieser Temp. in 30 Min. ein. — Die Erhöhung der Virulenz bei mehrfacher Passage durch Ratten hat keine Erhöhung der Lipase zur Folge. — Das pH -Optimum liegt bei $pH = 7,8$. — Die Vorliebe des Streptococcus für subcutanes Fett kann nicht mit Vermehrung der Lipase erklärt werden. (Journ. Exp. Med. 40. 233—52. Peking, Peking Union Med. Coll.) A. R. F. HESSE.

Georg Strassmann, *Die Bedeutung der Blutgruppenbestimmung für die gerichtliche Medizin*. Anführung von Fällen, in denen derartige Best. von Bedeutung sein kann. (Klin. Wehschr. 3. 2195. 1924. Berlin, Univ.) SPIEGEL.

Ferdinand Lebermann, *Über eine neue einfache Natriumbestimmung im Blutserum*. Die Best. beruht auf Vergleich der Trübungen beim Aufschütteln der mit Kaliumpyroantimonatreagens (nach KRAMER u. TISDALL bereitet) erhaltenen Na mit denen aus einer Reihe von NaCl-Lsgg. bekannten Gehaltes von 0,05—2,0 Na. Die Vergleichsskala muß mindestens jeden zweiten Tag frisch hergestellt werden. Vergleich kann vor einem schwarzen Schirm oder für kleinste Mengen in einem Beleuchtungsapp. nach WESSELY erfolgen. (Klin. Wehschr. 3. 2196—9. 1924. Würzburg, Univ.) SPIEGEL.

Armand J. Quick, *Eine Methode zur quantitativen Bestimmung von Menthylglucuronsäure im Harn*. Die komplexe Glucuronsäure wird aus dem eventuell zunächst alkal. ausgeätherten Harn nach Ansäuern mit Ä. ausgezogen, der Rückstand des Extraktes mit n. HCl verseift, dann die freie Glucuronsäure nach dem Verfahren zur Zuckerbest. von BENEDICT, das für sehr verd. Lsgg. etwas modifiziert wird oder nach dem von FOLIN u. WU bestimmt. (Journ. Biol. Chem. 61. 667—77. 1922. Philadelphia, Univ. of Pennsylvania.) SPIEGEL.

J.-Ch. Roux und R. Goiffon, *Die durch Vergärung entstandenen organischen Säuren in den Stuhlentleerungen, ihre Bestimmung und klinische Bedeutung*. Solche Säuren sind ein Maßstab für die Tätigkeit der Darmflora, ihre Vermehrung ein Zeichen übermäßiger Gärung, ihre Verminderung ein Zeichen einer Hemmung des Gärungsvorganges durch vorzeitige Fäulnis oder zu rasche Entleerung oder starker Verdünnung des Darminhaltes durch Hypersekretion im Magen oder Darm. Zur Best. verfährt Vf. wie folgt: 50 ccm 10%ig. Faecesaufschwemmung wird mit 10 Tropfen konz. AlCl₃-Lsg. kräftig geschüttelt, dann mit einigen Tropfen alkohol. Phenolphthaleinlsg. u. einigen g Ca(OH)₂ bis zur Rotfärbung versetzt; nach 5 Min. werden 25 ccm abfiltriert, nach Zusatz von noch etwas Phenolphthalein mit verd. HCl bis zum Umschlag blaßrosa neutralisiert, mit 5 ccm wss.-alkoh. 0,02%ig. Lsg. von Orangegelb IV versetzt u. mit $\frac{1}{10}$ -n. HCl auf gleichen Farbton wie Mischung von 5 ccm der Indicatorlsg. mit 1,2 ccm $\frac{1}{10}$ -n. HCl (beide in 60 ccm) titriert. Berechnung aus den verbrauchten ccm $\frac{1}{10}$ -n. HCl (V) für 100 ccm Faecesaufschwemmung nach Formel $(V - 1,2) \times 4$. (Arch. des maladies de l'appar. dig. et de nutrit. 14. 46—57; Ber. ges. Physiol. 27. 349—50. 1924. Ref. KATSCH.) SPIEGEL.

H. J. van Giffen, *Untersuchung von Salicylas hydrargyricus*. Als Ergebnis d. Unters. wird zur Beurteilung vorgeschlagen: Weißes bis hellrosa, geruch- u. geschmackloses Pulver, fast unl. in W, A. u. PAe.; 0,1 g + 5 ccm W. gibt nur 1 Tropfen FeCl₃ Violettfärbung; 0,2 g, trocken erhitzt, liefert Hg-Sublimat; 0,2 g muß sich in 1 ccm 4 n-NaOH bis auf leichte Opaleszenz lösen. (Vgl. Bruins Ned. Ind. 1. 86; C. 1924. I. 2461.) (Pharm. Tijdschrift voor Nederlandsch Indië 311—14. 1924.) GROSZFELD.

Staatliche Porzellan-Manufactur, Berlin, und Alfred König, Charlottenburg, *Herstellung von Porzellantiegeln mit durchlässigem Boden*, dad. gek., daß derartige poröser (feinporiger) M. bestehende Boden entweder in den rohen Porzellantiegeln eingesetzt u. mit diesem zusammen gebrannt werden, oder daß Tiegel u. poröse Boden für sich gebrannt werden u. der fertige Boden auf den Tiegel aufgeschmolzen wird. — Die Tiegel sollen unmittelbar, d. h. ohne Verwendung besonderer Filtermasse zum Abfiltrieren von Ndd. u. dgl. verwendet werden. (D. R. P. 403405 Kl. 4 vom 19/8. 1923, ausg. 25/9. 1924.) KÜHLING.

Carl Zeiss, Jena, *Vorrichtung zum Messen des Trübungsgrades schwach getrübt oder scheinbar ungetrübtter Flüssigkeiten*, bei welcher ein in einem Flüssigkeitstrom

zeugter Tyndallstreifen mit dem Lichte einer Vergleichslichtquelle verglichen wird, 1. dad. gek., daß die opt. Achse des zur Beobachtung des Tyndallstreifens dienenden Beobachtungsinstrumentes ungefähr unter 135° zur Achsenrichtung des Tyndallstreifens im Flüssigkeitstrog geneigt angeordnet ist. — 2. dad. gek., daß der Flüssigkeitstrog die Form eines Prismas mit einem brechenden Winkel von ungefähr 45° besitzt. — Es wird das für photo- u. colorimetr. Zwecke wünschenswerte Ergebnis erzielt, möglichst das Maximum der Intensität des Tyndalllichtes zu erhalten, ohne in den Wirkungsbereich des erregenden Büschels selbst oder seiner nächsten Umgebung einzutreten. (D. R. P. 402563 Kl. 421 vom 4/8. 1923, ausg. 9. 1924.)

KÜHLING.

Erich Hellige, Freiburg i. Br., *Colorimeter* mit in den Strahlengang einhaltetem Prismensystem, welches derart wirkt, daß die zu untersuchende u. die Vergleichsfarbe dem Beobachter nebeneinander liegend dargeboten werden, 1. dad. gek., daß die eine Hälfte des Prismensystems aus einem farbigen Körper, z. B. Farbglas besteht u. als Vergleichsfarbe dient. — 2. dad. gek., daß die eine Hälfte des Prismensystems durch Anlegen oder Ankitten einer Farbplatte, z. B. einer gefärbten Gelatinehaut, oder durch Bemalen gefärbt ist. — Die eine Hälfte des Prismensystems kann auch als Küvette ausgebildet sein u. mit fl. oder gasförmiger Vergleichsfarbe gefüllt werden. (D. R. P. 402889 Kl. 42h vom 19/1. 1924, ausg. 24/9. 1924.)

KÜHLING.

Thomas Walz, Jena, *Aufklappbarer elektrischer Heizofen*, insbesondere für analytische Elementaranalyse, dad. gek., daß die die Widerstandselemente enthaltenden Ofenteile aufklappbar derart miteinander verbunden sind, daß der Ofen den zu heizenden Gegenstand (das Verbrennungsrohr) leicht herumgelegt bzw. ihm entfernt werden kann, ohne daß hierbei die Lage des Gegenstandes (des Verbrennungsrohres) selbst geändert wird. — Der Ofen ist besonders für die Analyse nach PREGL geeignet. (D. R. P. 403270 Kl. 21h vom 17/2. 1924, ausg. 9. 1924.)

KÜHLING.

Julius Bertram, Rochsburg i. Sa., *Selbsttätige und ununterbrochene Analyse von Gasen durch Teilung der Gasprobe in zwei gleiche Teilströme*, von denen der eine unmittelbar, der andere nach Behandlung mit einem Absorptionsmittel einem Druckmesser zugeführt wird, 1. dad. gek., daß die Gasprobe vorher einen Druckregler durchstreicht. — 2. dad. gek., daß als Sperrfl. für den Druckregler eine Flüssigkeit gewählt wird, die denselben Dampfdruck besitzt wie das Absorptionsmittel. — Die nötigen Regulierungen u. Neueinstellungen, welche bei bekannten selbsttätigen Untersuchungen erforderlich sind, werden vermieden. (D. R. P. 402558 Kl. 421 vom 29/12. 1922, ausg. 23/9. 1924.)

KÜHLING.

Deutsche Maschinenfabrik A.-G., Duisburg, *Gasabsaugevorrichtung zur Prüfung des erzielten Reinheitsgrades für Trockengasreinigungsanlagen mit taschenförmigen Filtern*, dad. gek., daß zur Entnahme des zu untersuchenden Gases ein in bekannter Weise an den nebeneinanderliegenden Taschen vorbeibewegliches Mundstück angeordnet ist, durch welches Gas aus den Filtertaschen entnommen wird, um es an der Verbrennungsstelle zuzuführen. — Die Filtertaschen können, ohne freigelegt zu werden u. ohne die dadurch bedingten längeren Betriebsunterbrechungen auf den Zustand geprüft werden. (D. R. P. 402559 Kl. 421 vom 12/5. 1922, ausg. 9. 1924.)

KÜHLING.

Georg Forner, Berlin, *Vorrichtung zur Analyse von Gasen*, bei der das zu untersuchende Gas in ununterbrochenem Strome nacheinander durch eine Drosselstelle, eine Absorptionskammer und eine zweite Drosselstelle geführt wird, 1. dad. gek., daß zwischen den beiden, konstante Durchflußquerschnitte aufweisenden, als Meßdüsen gebildeten Drosselstellen Anschlußleitungen für die Druckmesser u. die Zirkulation der Absorptionsfl. vorgesehen sind. — 2. dad. gek., daß als Strahlfl. für den

zwischen die beiden Meßdüsen geschalteten, das zu untersuchende Gas ansaugend Strahlapp. die Absorptionsfl. selbst verwendet wird. — Die Vorr. besitzt alle Vzüge des Orsatapp., zeichnet sich vor diesem aber durch leichtere Bedienung die Möglichkeit stetiger Anzeige aus. (D. R. PP. 402560 Kl. 421 vom 30/6. 1923, ausg. 18/9. 1924 u. 403404 Kl. 421 [Zus.-Pat.] vom 28/9. 1922, ausg. 4/12. 1924.) KÜHLING

Fritz G. Hoffmann, Lugau-Neuölsnitz, Erzgeb., *Absorptionspipette zur Aufnahme von Gasanalysen, bestehend aus einem drehbeweglich angeordneten, mit Absorptionsflüssigkeit und mit Füllkörpern gefüllten Absorptionsgefäße*, dad. gek., daß die Drehachse des zur Aufnahme des zu untersuchenden Gases dienenden Absorptionsgefäßes derart schräg, u. zwar zweckmäßig um etwa 45° geneigt zu der nach Einführung des Gases innerhalb des Absorptionsgefäßes gebildeten Flüssigkeitsspiegel angeordnet ist, daß während einer hin u. her drehenden Bewegung des Absorptionsgefäßes um seine schräge Drehachse die hierbei jeweils aus der heraustauchenden Oberflächen der Füllkörper immer wieder frisch benetzt werden. Gegenüber den bekannten Absorptionspipetten ist die Absorption wesentlich beschleunigt u. dadurch sicherer. (D. R. P. 402561 Kl. 421 vom 21/6. 1923, ausg. 18/9. 1924.) KÜHLING

Paul Nettmann, Köln a. Rh., *Vorrichtung zur Analyse von Gasgemischen, z. B. von Rauchgasen, bei welcher die zur Messung, Absorption u. Gasförderung dienenden Räume ineinander angeordnet sind*, gemäß Patent 401021 mit in einem einzigen Steuerventil vereinigten Steuervorr. für die Gas- u. Flüssigkeitsbewegung; dad. gek., daß die ausströmende Menge der Triebfl. die Sperre für den die Zuleitung der Triebfl. die Ableitung derselben sowie den Gasausgleich mit der Außenluft steuernd Kolben ein- u. ausschaltet. (D. R. P. 402664 Kl. 421 vom 4/12. 1923, ausg. 18/9. 1924. Zus. zu D. R. P. 401021; C. 1924. II. 2286.) KÜHLING

II. Angewandte Chemie.

I. Allgemeine chemische Technologie.

Fritz Werner, Akt.-Ges., Berlin-Marienfelde, *Herstellung von säurefesten Gefäßen o. dgl. aus 2 Schichten, von denen die innere, der Säure widerstehende, aus einem Mantel aus zähem Material umgossen ist*, dad. gek., daß die innere Schicht aus höchstprozentigem (bis zu 20% ig.) SiFe durch Gießen hergestellt u. sofort nach oberflächlichem Erstarren mit einem Mantel aus Grauguß umgossen wird, der, daß die beiden Schichten miteinander verschmelzen. — Die Erzeugnisse zeigen nicht die Sprödigkeit der bekannten Gefäße aus hochprozentigem SiFe. (D. R. P. 402802 Kl. 31c vom 23/1. 1924, ausg. 18/9. 1924.) KÜHLING

Willy Stelkens, Köln-Rodenkirchen, *Verfahren und Vorrichtung zum Behandeln von Gasen mit Flüssigkeiten in Waschtürmen o. dgl. mit mehreren übereinander angeordneten Rieselskammern, in deren jeder ein gesonderter Kreislauf des Waschlüssigkeitsmittels aufrecht erhalten wird*. Verf., dad. gek., daß die in den einzelnen Rieselskammern zirkulierende Fl. in Emulsion mit einem Teil des zu behandelnden Gases am oberen Teil der Absorptionskammer eingeführt wird. — Einrichtung, dad. gek., daß die verwendeten Emulsionsapp. gleichzeitig als Gasstrahlpumpen ausgebildet sind, durch die in jeder Absorptionskammer ein gesonderter durch die Art der Gaszuführung regelbarer Kreislauf der Fl. über die Rieselemente aufrecht erhalten wird. — 4 weitere Ansprüche betreffen Ausführungsformen der Vorr. (D. R. P. 404580 Kl. 12e vom 20/9. 1921, ausg. 30/10. 1924.) KAUSCH

Paul Pape, Herischdorf b. Hirschberg i. Schl., *Drehbare Filtersaugtrommel längsseitig der Trommel angeordnetem Aufgabekasten*, dad. gek., daß der der Filter-

mel zugekehrte Teil des Aufgabekastens derartig ausgebildet ist, daß er die Trommel mittels Drosselschieber regelbar u. in tangentialer Richtung zwangsweise mit Entwässerungsgut beschickt. (D. R. P. 405064 Kl. 12d vom 25/11. 1923, ausg. 30/10. 1924.) KAUSCH.

United Filters Corporation, New York, *Vakuumfilter mit auf einer Welle angeordneten, sich gemeinsam drehenden und in einen gemeinsamen Behälter einwirkenden Filterscheiben*, die abwechselnd durch Saug- u. Druckwrgg. beeinflußt werden, u. mit an den Oberkanten des Behälters zu beiden Seiten der Filterscheiben festigten messerartigen Abstreifern, dad. gek., daß der halbzylindr. Behälter fast nur zur senkrechten Achsebene reichende Einbuchtungen aufweist, durch die die beschalteten Filterrückstände nach unten fallen. (D. R. P. 405065 Kl. 12d vom 25/11. 1923, ausg. 30/10. 1924. A. Prior. 9/4. 1918.) KAUSCH.

Eduard Theisen, Deutschland, *Verfahren und Vorrichtung zur Behandlung von Gasen, Dämpfen und Flüssigkeiten in mit Füllkörpern beschickten Schächten*. Die Füllkörperschicht ragt im Gegensatz zu der Anordnung gemäß dem Hauptanspruch bis nahe zum oberen Rande der in den Schacht eingebauten Querwände. Es wird dadurch vollständige Zurückhaltung von Flüssigkeitströpfchen bewirkt. (D. R. P. 26145 vom 25/3. 1922, ausg. 30/7. 1923. Zus. zu F. P. 543747; C. 1923. 1903.) KÜHLING.

Badische Anilin- & Soda-Fabrik, Ludwigshafen a. Rh., übert. von: **Josef Henckes**, Ludwigshafen, *Reinigen von Gasen*. Die von H₂S befreiten Gase werden durch Entfernung von COS mit einer akt. Kohle behandelt, welche eine alkal. Lösung zeigt, u. zwar zweckmäßig in Ggw. einer kleinen Menge O, die zur Oxydation von COS genügt. (A. P. 1504624 vom 19/8. 1921, ausg. 12/8. 1924.) OELKER.

Koppers Company, Pittsburgh, V. St. A., *Entfernen von Schwefelwasserstoff aus Gasen*. (D. R. PP. 402736, 402737 u. 402738 Kl. 26d vom 3/11. 1922, ausg. 19/9. 1924 u. Austr. P. 10236 vom 8/12. 1922, ausg. 4/3. 1924. A. Prior. 1921. — C. 1923. II. 1141. 1142 [E. PP. 190115, 190116, 190117, 190119 u. 190121].) OELKER.

Maschinenfabrik Baum Akt.-Ges., Herne, Westf., *Saugtrockner für Feinkohle, Feinmasse u. ähnliche Massengüter*, bei dem das Gut auf schrägen Siebböden ausgetrocknet wird, dad. gek., daß zwei mit schrägen Sieben versehene Luftkammern hintereinander angeordnet sind, deren Siebe gleichzeitig die Böden von Trocknern bilden, die von einer gemeinsamen Aufgabevorr. abwechselnd gespeist, u. abwechselnd entleert werden, während die Luftkammern mit einer gemeinsamen Saugleitung abwechselnd in Verb. gesetzt werden können. — Es wird ein unterbrochener Betrieb bei voller Ausnutzung der Saugpumpe erzielt. (D. R. P. 2633 Kl. 82a vom 26/3. 1922, ausg. 6/10. 1924.) OELKER.

John Thompson Ellis, Perth, Australien, *Körper von großer Oberflächenentwicklung*. Gips, gepulverte Holzkohle, geglühter Asbest u. gegebenenfalls H₃BO₃ werden innig gemischt, die Mischung mit reinem oder ammoniakhaltigem W. zum Anstrich angerührt u. in Formen gegossen, in denen sie erhärtet. Die Erzeugnisse werden aufgegossenes W. rasch verdunsten lassen u. zu Kühlzwecken Verwendung finden. (Aust. P. 5704 vom 18/2. 1922, ausg. 22/5. 1923.) KÜHLING.

II. Gewerbehygiene; Rettungswesen.

Elin Boening, *Untersuchungen der Arbeiter in den Jenaer Druckereibetrieben über Bleikrankheit*. Die Jenaer Druckereibetriebe arbeiteten durchaus nicht unter anders modernen u. hygien. einwandfreien Verhältnissen, die Gefährdung der Arbeiter in Druckereibetrieben ist demnach nicht so hoch, wie früher allgemein angenommen wurde; besonders dann nicht, wenn die hygien. Vorsichtsmaßregeln durchgeführt werden. (Gesundheitsingenieur 47. 477—80. Jena, Univ.) FRANK.

W. P. Yant, W. A. Jacobs und L. B. Berger, *Kohlenoxydvergiftung in Privataragen*. Bei Explosionsmotoren entstehen in den Auspuffgasen große Mengen v. CO, welche in geschlossenen Räumen Vergiftungen hervorrufen können. Win zu ihrer Verhinderung. (Ind. and Engin. Chem. 16. 1047—49. 1924. Pittsburgh [P. u. Washington [D. C.]]) GRIMME

Fr. Bürk, Tankanlagen. Zusammenfassende Betrachtungen u. Beschreibu der Schutzeinrichtungen der Dampfkessel- u. Gasometerfabrik vorm. A. WILKE u. Braunschweig, die in einer Verb. einer Tankbatterie mit einem Gasometer zur A nahme der Dämpfe besteht. (Chem.-Ztg. 48. 757—59. 795—96. 1924. Mannheim.)

H. B. Meller, *Rentabilität durch Rauchverminderung*. Starke Rauchentw. den in der Regel auf unsachliche Feuerführung. Starker Rauch enthält noch gro Mengen brennbarer Stoffe, welche ungenützt in die Luft gehen. Vf. bringt A lysen von Rauch aus verschiedenen Städten u. Jahreszeiten. (Ind. and Eng. Chem. 16. 1049—51. 1924. Pittsburgh [Pa.]) GRIMME

Bethke, *Tetrachlorkohlenstoff als Löschmittel bei Vergaserbränden*. CCl₄ b sich als vorzügliches Löschmittel bei Vergaserbränden erwiesen; da es ein Nie leiter ist, ist Kurzschluß am Magnet unmöglich. Vf. berichtet über die Unters. o Techn. Hochschule Hannover über die Gefährlichkeit der bei der Verwendung v. CCl₄ entstehenden Gase u. hält die Anwendung für unbedenklich. (Auto-Technik. Nr. 20. 17. 1924.) JUNG

Hermann Klug, Frohnau, Mark, *Staubfreihaltung von Brikettfabriken* u. tecl. Betrieben ähnlicher Art, dad. gek., daß die Fabrikationsräume wie Pressensaal, Trockenraum unter einem dauernden Überdruck atmosphär. Luft gesetzt werden. Mit der Staubfreihaltung wird gleichzeitig ein sanitär sehr wichtiger Vorteil du die ständige Zuführung von Frischluft erreicht. — Die teuren Rohrleitungen, bisher zum Absaugen der Luft notwendig waren, fallen fort. (D. R. P. 4040 Kl. 10b vom 10/8. 1922, ausg. 10/10. 1924.) OELKER

Matthijs Donkervoort, J. L. van der Voorden und Arie Donkervoo, Rotterdam, *Vorrichtung zum Geruchlosmachen von Luft und anderen Gasen be. Dämpfen unter Verwendung von zum Glühen gebrachten Metalldrähten*, dad. ge, daß in einem schornsteinartigen Raum, durch den die zu reinigenden Gase o Dämpfe geleitet werden, eine oder mehrere Netz- oder Flechtwerke von Met drähten angebracht sind, die mittels eines elektr. Stromes oder in anderer We zum Glühen erhitzt werden. — Die Vorr. sind besonders für Betriebe bestim, in denen tier. Abfälle verarbeitet werden. (D. R. P. 403324 Kl. 16 vom 14. 1923, ausg. 30/9. 1924.) KÜHLING

Vacuum Oil Company, New York, übert. von: **Lewis B. van Leuven** u. **Harry C. van Leuven**, Woodbury, *Feuerlöschmittel*, bestehend aus NaHC, Quebrachoauszug, Quillayarindenauszug, NaOH u. W. einerseits u. einer wss. L. von Al₂(SO₄)₃ andererseits. (A. P. 1507943 vom 9/11. 1922, ausg. 9/9. 1924.)

Friedrich Emil Krauss, Schwarzenberg i. Sa., und **Wilhelm Graaff**, Ber, *Gaserzeugungspatrone für Feuerlöcher*, die die zur Gaserzeugung dienenden Sto deren einer pulverförmig ist, in getrennter Anordnung enthält, dad. gek., daß r Füllung der Säureteile *Essigsäure* bezw. eine Lsg. von Essigsäure dient. — V krusten des pulverförmigen Stoffes (vorzugsweise NaHCO₃) wird vermieden. (D. R. 402824 Kl. 61b vom 10/5. 1922, ausg. 18/9. 1924.) KÜHLING

III. Elektrotechnik.

Wilh. Wunder, *Vorkommen, Gewinnung, Eigenschaften und Verwendung des Al miniums in der Elektrotechnik*. Vortrag über V., Gewinnung, Eigenschaften u. V.

andung des Al u. der Al-Legierungen in der Elektrotechnik. (Elektrotechn. Ztschr. 45, 1109—15. 1924. Berlin-Karlshorst.)

JUNG.

H. Danneel, *Ofen zur Schmelzelektrolyse von Natriumchlorid*. Vf. beschreibt einen Ofen, der die vielen apparativen Schwierigkeiten, die bei der elektrolyt. Gewinnung von NaCl entstehen, durch geschickte Ausbildung u. Anordnung von Anode u. Kathode, Chlorgasableitung u. Natriumabfluß glücklich überwindet. (Chem. Apparatur 11, 137—38, 147—48, 153. 1924. Rostock.)

NEIDHARDT.

W. Rohn, *Elektrische Blankglühöfen*. Vf. erörtert die Vorzüge elektr. Glühöfen, beschreibt den elektr. Blankglühofen der Firma Heraeus-Vacuumschmelze A.-G., Bau u. gibt eine Rentabilitätsberechnung. (Ztschr. Ver. Dtsch. Ing. 68, 1101—5. 1924.)

JUNG.

A. E. White, *Der Gebrauch von elektrischen Öfen zur Hitzebehandlung*. Die Öfen mit Öl-Gasfeuerung u. elektr. Heizung betriebenen Öfen zur Wärmebehandlung werden verglichen. Die Leistungsfähigkeit, die Betriebskosten u. die Vor- u. Nachteile der einzelnen Arten werden ausführlich besprochen. Auf Grund dieser Aussagen kommt Vf. zu dem Schluß, daß die elektr. geheizten Öfen am vorteilhaftesten zu verwenden sind. Als Anhang gibt Vf. eine große Zahl von Tabellen, die eine sehr vollständige Literaturübersicht. (Trans. Amer. Electr. Soc. 46, 56 Seiten. 1924. Sep.)

GOTTFRIED.

F. Grünewald, *Über die Durchschlagsfestigkeit verschiedener Glimmersorten bei periodischem Wechselstrom*. Bei der Unters. der dielektr. Festigkeit von Glimmer-Platenelektroden in Luft u. unter Transformatorenöl trat der Durchschlag an Elektrodenrändern auf. Durch die Verschiedenheit der Dielektrizitätskonstanten des Transformatorenöls ($\epsilon = 2,2$) u. der untersuchten Glimmersorten ($\epsilon = 5-7$) Brechung der Kraftlinien u. B. von Gleitfunken ein. Durch Verwendung von Mineralöl ($\epsilon = 7$) ließ sich die störende Einw. der Elektrodenränder ausschalten. App. ist im Original beschrieben u. abgebildet. Jeder Glimmer hat seine bestimmte Charakteristik. Bei den reineren Sorten ergibt sich eine lineare Abhängigkeit zwischen der Durchschlagsspannung u. der Isolationsstärke. An den runden roten Elektroden wurden keine Durchschläge beobachtet, schwarz nadelförmige Einschlüsse wurden als nachteilig. (Elektrotechn. Ztschr. 45, 1084—86. 1924. Porz/Rh.) JU.

John Pressly Scott, Toronto, Canada, *Elektrolytische Zelle*. (D. R. P. 404409 vom 26/7. 1922, ausg. 17/10. 1924. — C. 1924. I. 2728.)

KAUSCH.

Drahtlose Heiz- u. Widerstands-Körper für Elektrizität G. m. b. H., Berlin, *Herstellung von Heizkörpern aus Kohlenstoff enthaltender Silicatmasse*, bei denen der Grundkörper in glühendem Zustand einem Strom von O_2 ausgesetzt ist, der den an der Oberfläche befindlichen C zu CO_2 oxydiert, dad. gek., daß die Oberfläche nach der Sauerstoffbehandlung mit einer Schmelzglasur versehen ist, die den Körper luftdicht abschließt. — Der Luftabschluß macht die Körper für hohe Glühtemp. geeignet. (D. R. P. 402861 Kl. 21h vom 15/6. 1923, ausg. 1924.)

KÜHLING.

Koholyt Akt.-Ges., Berlin, *Adsorptions- und Isolationsmasse*, bestehend aus Flugstaub elektr. Öfen, in denen Ferrosilicium oder geschmolzene Al_2O_3 hergestellt werden. (D. R. P. 404297 Kl. 12g vom 21/5. 1922, ausg. 16/10. 1924.) KAU.

General Electric Company, New York, übert. von **Aladar Pacz**, Cleveland, *Verfahren zur Herstellung von Metallglühfäden*. Lsgg. von Alkaliwolframat u. Alkalinit, -tantalat oder -niobat werden gemischt, die Mischungen zum Sieden erhitzt, in sd. verd. HCl gegossen, die Ndd. sorgfältig ausgewaschen, im Strom von Wasser reduziert u. zum Sintern erhitzt. Als zweckmäßig wird empfohlen, die reduzierte M. mit der gleichen Menge nicht reduzierter Mischung zu verreiben u. diese

Mischung im Strom von H_2 zu sintern. (A. P. 1508241 vom 20/2. 1917, ausg. 9/9. 1924.) KÜHLING.

Naamlooze Vennootschap Philips' Gloeilampenfabrieken, Eindhoven, Holland, *Metalllegierungen für Glühfäden*. Hochschmelzende Metalle, wie W, Mo, Ta usw. werden mit 0,1—3% *Hafniumoxyd* oder einem Stoff vereinigt, der Hafniumoxyd bildet. Der Zusatz verhindert die Rekristallisation der Metalle. (E. P. 220301 vom 31/7. 1924. Auszug veröff. 1/10. 1924. Prior. 9/8. 1923.) KÜHLING.

Patent-Treuhand-Gesellschaft für elektrische Glühlampen m. b. H., Berlin, *Herstellung von aus einem einzigen oder wenigen Krystallen bestehenden Metalldrähten, -fäden und -bändern*. (D. R. P. 403450 Kl. 21f vom 8/8. 1922, ausg. 27/9. 1924. — C. 1924. I. 227.) KÜHLING.

William Prior, Tunbridge Wells, und **Clara Ellen Riley**, Ashton-on-Mersey, England, *Selenzelle mit zwei auf einen plattenförmigen Isolierkörper in doppelter Schraubenspur aufgewickelten Elektroden*, 1. dad. gek., daß zwischen den Elektroden eine Ausfüllung mit isolierendem Material angebracht ist, welche in dem für das Erhitzen des Se erforderlichen Maße hitzebeständig ist. — 2. dad. gek., daß die Elektroden aus Drähten bestehen, von denen der eine oder beide mit einem hitzebeständigen Isoliermaterial überzogen sind, welches auf der Außenseite der Windungen auf der einen Seite der Trägerplatte entfernt wird, bevor die Selenzelle aufgebracht wird. — Es kann zweckmäßig sein, Elektroden von verschiedener Leitfähigkeit zu benutzen. (D. R. P. 403547 Kl. 21g vom 4/1. 1924, ausg. 1/10. 1924.) KÜHLING.

Martin L. Martus, Woodbury, V. St. A., *Indikatoren für Primärelemente*. Den Elektrolyten alkal. Elemente, besonders Zn-CuO-Älzkalielelemente, wird ein Mittel zugesetzt, welches anzeigt, ob das Element Strom erzeugt oder nicht. Z. B. gibt man Tannin zu, welches den Elektrolyten im Ruhezustand des Elements dunkel färbt, beim Arbeiten des Elementes aber entfärbt wird. Auch Phenolphthalein, Natriumphosphat sind geeignet. Die durch ersteres in der starken Alkalilsg. bewirkte schwache Rotfärbung vertieft sich beim Arbeiten des Elements, das Phosphat bildet einen Nd. (A. P. 1505656 vom 19/2. 1924, ausg. 19/8. 1924.) KÜHLING.

Willard Storage Battery Company, übert. von: **Theodore A. Willard**, Cleveland, V. St. A., *Paste für Sammler*. Den für Sammlerpasten verwendeten Bleioxyden wird fein verteiltes Lignin beigemischt, z. B. eine M., welche durch mehrstd. Behandeln von Holzmehl mit 72%iger H_2SO_4 , Filtern u. Waschen mit Zellstoff befreit worden ist. Der Zusatz des Lignins zu den Bleioxyden soll die Kapazität des Sammlers erhöhen. (A. P. 1505990 vom 4/2. 1920, ausg. 23/8. 1924.) KÜHLING.

Orris J. Hollowell, übert. von: **Edgar A. Barkalow**, Kokomo, V. St. A., *Elektrolyt für Sammler*, bestehend aus 400 ccm H_2SO_4 von 1,4 D., 3,2 g Getreidestärke, 320 g geglähtem $CaSO_4$, 72 ccm Formalin u. 200 ccm W. Der Zusatz von Stärke soll das Auskrystallisieren von $CaSO_4$ u. das Gefrieren der Mischung verhindern. (A. P. 1505993 vom 21/4. 1923, ausg. 26/8. 1924.) KÜHLING.

Walter Scott Doe, Kent, V. St. A., *Galvanische Batterie*. Innerhalb des Gehäuses aus isolierendem Stoff sind mehrere Elemente angeordnet, welche auf einer Zinkplatte, einer an deren Unterseite befestigten Lage vor saugfähigem Stoff, z. B. ungeleimtem Papier, welches mit einer wss. Lsg. von NH_4Cl u. $HgSO_4$ getränkt u. dann getrocknet worden war, u. einem Napf aus Kohle besteht, der mit einer Mischung von zerkleinerter Kohle, Graphit, MnO_2 , PbO_2 , Glycerin u. Tragant gefüllt ist. Die obere u. die Seitenflächen der Zinkplatte u. des Kohlennapfes sind mit einem isolierenden Anstrich versehen, doch ragen von der Oberfläche der Zinkplatte Erhöhungen empor, deren Spitzen nicht isoliert sind. Sie bilden die leitenden Verb. mit dem Kohlennapf des benachbarten Elements. Die Batterie dient vorzugs-

se zum Betrieb von Taschenlampen. (E. P. 219769 vom 29/5. 1923, ausg. 23. 1924.)

KÜHLING.

Patent-Treuhand-Gesellschaft für elektrische Glühlampen m. b. H. (Erfinder: **F. Skaupy**) Berlin, *Elektrische Leuchtröhre*, die außer einer Edelgasfüllung Hg Leuchtkraft erhöhenden Zusatz enthält, 1. dad. gek., daß die Röhre aus braun-gefärbtem Glase besteht. — 2. dad. gek., daß die Röhrenfüllung aus Kr u. Hg besteht. — Das ausgestrahlte Licht besitzt eine auffallend schöne grüne Farbe. Die Röhren sind besonders für Signal- u. Reklamezwecke geeignet. (D. R. P. 667 Kl. 21f vom 7/12. 1922, ausg. 2/10. 1924.)

KÜHLING.

V. Anorganische Industrie.

Förster, *Die Technik des deutschen Phosphatbergbaues*. (Metall u. Erz 21. 493 499. 1924.)

BEHRLE.

—, *Entwicklung in der industriellen Verwertung elementaren Schwefels*. Es wird die starke Erhöhung der Druckfestigkeit von Beton u. Sandstein, die durch Tränken mit fl. S eintritt, hingewiesen. Ferner sind Verss. in Angriff genommen worden, die Erhaltung von Holz durch Tränken mit S zu erreichen. Im Gemische fein gemahlener Kohle bildet S eine widerstandsfähige M. („Lavasul“) zur Herst. von Tanks u. sonstigen Behältern von Chemikalien. *Lavasul* schm. bei 110°, widersteht der Einw. h. FeCl_3 -Lsgg., vieler verd. Säuren, einschließlich HF, von SnCl_4 -Lsg. wiegt etwa 125 lb. auf den Kubikfuß. (Mining and Metallurgy 5. 440. 1924.) RÜ. **Clifford D. Carpenter** und **Joseph A. Babor**, *Das Konzentrieren verdünnter Mineralsäure*. Vff. haben ihre früheren Unterss. (Chem. Metallurg. Engineering 27. C. 1922. III. 955) ausgedehnt auch auf höher konz. HNO_3 (dest. unter Zusatz des wasseranziehenden Mittels, konz. H_2SO_4) u. zu dem Zwecke das ternäre System HNO_3 — H_2SO_4 — H_2O eingehend untersucht. Die Ergebnisse sind in 1 Tabelle mit Schaubildern zusammengefaßt. Sie liefern eine sichere Grundlage zur Best. d. Dampfdruckgleichgewichte in HNO_3 -Konzentrationsstürmen. (Chem. Metallurg. Engineering 31. 260—62. 1924. Columbia, Univ.)

RÜHLE.

F. C. Welch, *Verhinderung der Ausblühungen auf Gips*. Sie können auf Gips bei seiner Verarbeitung entstehen aus l. Salzen, die sich entweder in dem Anmachwasser oder dem Gips selbst finden, oder es bildet sich ein l. Salz bei der Verarbeitung des Gipses aus einem unl. oder einem zerfließlichem Salze. Wie auch, wie Gips selbst u. CaCO_3 , können sich auf der Oberfläche bilden, wenn W. nicht genügend die Gipsmasse durchdringt oder sich auf der Oberfläche wiederholt konzentriert. Man kann solche Ausblühungen verhindern durch Zugabe von Leim oder Gips beim Vermahlen oder beim letzten Glätten nach der Verarbeitung sowie Dextrin ($\frac{1}{2}\%$) oder Gummiarabicum ($\frac{1}{2}\%$) zum Anmachwasser, ferner durch Abwischen der Oberfläche oder durch Abstellen des Wasserzulaufes. (Chem. Metallurg. Engineering 31. 263—64. 1924.)

RÜHLE.

General Chemical Company, New York, *Gasmischung für die Ammoniakherstellung*. Eine Gasmischung, welche 1 Teil N_2 , 3 Teile eines Gemisches von H_2 u. CO enthält, eine ausreichende Menge Wasserdampf enthält, wird über einen Katalysator für die Umsetzung zwischen CO u. H_2O geleitet. Der Katalysator befindet sich innerhalb eines geschlossenen Raumes, dessen Temp. durch Erhitzung der Gasmischung mittels eines Gasbrenners mit regelbarer Luftzufuhr auf der erforderlichen Höhe (etwa 400°) gehalten wird. Das den Katalysatorraum verlassende Gasgemisch wird durch einen Wärmeaustauschvorr. geleitet, in denen es frische Gasmischung vorwärmt. (Schwed. Pat. 5502 vom 2/11. 1918, ausg. 6/11. 1923. A. Prior. 3/11. 1917.)

KÜHLING.

General Chemical Company, New York, *Gasmischung für die Ammoniakherstellung*. Zur Befreiung der für die Ammoniaksynthese bestimmten Gasmischung

VII. 1.

von noch vorhandenen geringen Mengen CO wird die Mischung unter hohem D. erhitzt u. in diesem Zustande einem Injektor zugeführt, welchem gleichzeitig h. Lsg. von NaOH unter starkem Druck zugeleitet wird. Die aus dem Injektor geworfene Mischung gelangt in einen mit Gußeisenstückchen gefüllten Skrubber, den sie in der Richtung von oben nach unten durchläuft u. von diesem in einen Behälter, in welchem sich die h. NaOH sammelt. Diese wird unter Ergänzung verbrauchter Anteile in den Betrieb zurückgeführt. Das Gasgemisch wird in einem Kühler von mitgerissenen Wasserdämpfen befreit. (Schwed. P. 55503 vom 2. 1918, ausg. 6/11. 1923. A. Prior. 3/11. 1917.) KÜHLING

Synthetic Ammonia & Nitrates, Ltd., Stockton-on-Tees, übert. von: L. Greathouse, Washington, *Salpetersäure*. Man katalysiert ein Gemisch von NH_3 und O_2 oder Luft u. regelt die Kühlung der gel. Stickoxyde während das Gemisch unter Druck steht. (E. P. 221513 vom 6/9. 1924, Auszug veröff. 5/11. 1924. P. 6/9. 1923.) KAUSCH

Badische Anilin- & Soda-Fabrik (Erfinder: Fritz Winkler), Ludwigshafen a. Rh., *Herstellung beständiger, wässriger, kolloidaler Lösungen von Metalloiden*. dad. gek., daß man die Lsgg. der Metalloide in CS_2 mit W. oder wss. Lsgg. in Ggw. von Schutzkolloiden vermischt u. den CS_2 entfernt. — Die Entfernung des CS_2 kann durch mäßiges Erhitzen, einen indifferenten Gasstrom oder beide Methoden erfolgen. Das Schutzkolloid oder gleichzeitig mehrere Schutzkolloide können dem Ausgangslsg. oder dem W. zugefügt werden. Die kolloidalen Metalloidlsgg., besonders von S, Se, P u. As sind sowohl pharmazeut., als auch für die Schädlingsbekämpfung wertvoll. Beispiele sind angegeben für die Herst. von kolloidaler S. unter Zusatz von Seifenlsg. als Schutzkolloid, der auch andere Schutzkolloide, Saponin, lysalbinsaures Na, zugefügt werden können, — sowie einer kolloidalen P-Lsg., in Ggw. von Türkischrotöl erhalten, milchigweiße, beim Verd. mit W. ständige Emulsionen liefernde Fl., die nach dem Austreiben des CS_2 im Dunstphosphoreszierende Dämpfe entwickelt. (D. R. P. 401049 Kl. 30h vom 14/8. 1924, ausg. 25/8. 1924.) SCHOTTLÄNDER

Farbenfabriken vorm. F. Bayer & Co., Leverkusen b. Cöln, *Kieselsäure*. Man führt ein unl. Silicat (z. B. Schlackensand) mit Säure in Kieselsäuresol in einen Trenner, trennt es von dem Rückstand, läßt es gelatinieren, preßt es ab, wäscht u. trocknet es. (E. P. 221487 vom 15/8. 1924, Auszug veröff. 29/10. 1924. Prior. 3/9. 1923.) KAUSCH

Monroe-Louisiana Carbon Company, Monroe, übert. von: Chauncey Matlack, Brooklyn, *Rußherzeugung*. In einer geräumigen Kammer werden kohlenwasserstoffhaltige Gase, vorzugsweise Naturgas, mittels zur völligen Verbrennung unzureichender Luftmengen verbrannt, welche mittels Ventilators unterhalb der nahe dem Boden der Kammer angeordneten Brenner zugeführt werden. Die Verbrennungserzeugnisse werden vom oberen Teil der Kammer mittels Saugvorr. abgezogen, in engem W. besprühten Röhren gekühlt u. durch Kammern geleitet, in denen der entstandene Ruß entweder in Säcken gesammelt oder elektr. niedergeschlagen wird. (U. S. P. 1508367 vom 5/1. 1921, ausg. 9/9. 1924.) KÜHLING

Société Nationale d'Industrie Chimique en Belgique, Brüssel, *Gewinnung von Alkalisulfiden*. (D. R. P. 405311 Kl. 12i vom 23/1. 1924, ausg. 30/10. 1924. F. Prior. 23/1. 1923. — C. 1924. I. 2625.) KAUSCH

August Griebel, Gladbeck, *Klären von Kalkmilch*, besonders zur Verwertung zur Ammoniakdest., dad. gek., daß die zuvor in einem Rührwerk zubereitete Kalkmilch mindestens in zwei Behälter hintereinander übergeleitet u. in jedem dieser Behälter entsprechende Zeit unbewegt stehen gelassen wird, so daß sich in beiden Behältern unl. Bestandteile absetzen können, im zweiten Behälter ferner aber auch durch zweckmäßige Erhöhung der Temp. auf vorzugsweise 80–90° eine vollständige Schlämmlung noch ungel. Kalkteile stattfindet, woran sich in an sich bekannter Weise

weise ein weiterer Reinigungsprozeß im Durchflußfilter o. dgl. anschließen kann.
 2. Einrichtung zur Ausübung des Verf. gemäß Anspruch 1, dad. gek., daß zwei Behälter derart ineinander gesetzt, insbesondere konzentrisch angeordnet sind, die Kalkmilch sie hintereinander durchfließen muß u. einer von diesen mit Erwärmungsvorr., z. B. Heizschlangen, versehen ist u. zweckmäßig eine Dampfheißbrause o. dgl. in Nähe des Bodens mindestens eines der Behälter vorgesehen zur Reinigung desselben, gegebenenfalls auch zum Aufwirbeln abgesetzter Kalkes. (D. R. P. 402853 Kl. 12k vom 7/3. 1923, ausg. 22/9. 1924.) KÜHLING.

Bruno Waeser, Berlin, *Reduktion von Magnesiumsulfat unter Verwendung von Natriumsulfid als Reduktionsmittel*, 1. dad. gek., daß man das Sulfid-MgSO₄-Gemisch in der Luftabschluß glüht, die abziehenden Schwefeloxyde auffängt u. das zurückbleibende Gemisch von Kalk u. MgO für sich verwendet oder in an sich bekannter Weise mit MgCl₂-Lsg. in reine MgO u. CaCl₂ überführt. — 2. dad. gek., daß man an Stelle reiner Mg-Sulfate, wie Kieserit, Bittersalz u. dgl. Mg-haltige Kalirohsalze verwendet. (D. R. P. 405458 Kl. 12m vom 23/6. 1923, ausg. 1/11. 1924.) KAUSCH.
 R. Jacobsson, Kagerod, Schweden, *Tonerde*. Man löst Al₂O₃-haltigen Rohstoff in H₂SO₄ solcher Konz., deren W., wenn sie vom Unlöslichen getrennt ist, beim Erhitzen als Krystallisationswasser gebunden ist. Dieses W. wird im Vakuum abgedampft, ohne daß das gebildete Al₂(SO₄)₃ schm. Dieses wasserfreie poröse Prod. wird erhitzt, bis Al₂O₃ großer Porosität zurückbleibt. (E. P. 221209 vom 25/8. 1921, Auszug veröff. 29/10. 1924. Prior. 29/8. 1923.) KAUSCH.

VI. Glas; Keramik; Zement; Baustoffe.

W. E. Rice und R. A. Sherman, *Die Bestimmung der Wärmeverteilung in gemischten Öfen*. Methoden u. Formeln sind zusammengestellt, die Wärmeabfuhr u. Verluste an Wärme zu messen. Vf. hofft, mit diesen Formeln zu einer gewissen Norm zu kommen, nach der die alten Öfen beurteilt werden u. die zu erbauende die konstruktiven Grundlagen erhalten könnten. (Journ. Amer. Ceram. Soc. 7. 738—63. 1924. Pittsburg, U. S. Bureau of Mines.) BAUER.

Hobart M. Kraner, *Die Sillimanitbildung in einigen typischen Tonen*. Nach der Besprechung der bisherigen Ansichten über die Entstehung von Sillimanit beim Erhitzen von Tonen u. keram. Massen beschreibt Vf. seine Verss. an 5 amerikanischen Kaolinen u. Tonen, bei denen er den Brechungsindex der verschieden hoch gebrannten u. dann fein gepulverten Materialien bestimmte. Der Brechungsindex nimmt beim Zerfall des Kaolinites in Al₂O₃, SiO₂ u. H₂O ab; aus der dann bei etwa eintretenden Erhöhung des Brechungsindex schließt Vf., daß gleich nach dem Erweichen des Konstitutionsw. die Sillimanitb. beginnt, während mkr. nachweisbare Krystalle erst über 1100° auftreten. Es folgt eine kurze Beschreibung des Aussehens der verschieden hoch gebrannten Proben u. einige Hinweise auf den Zusammenhang zwischen der Sillimanitb. u. dem Erweichen der Tone bei hohen Temp. — In einem Nachtrag bespricht der Vf. seine Ergebnisse unter Gesichtspunkt, daß, wie neuerdings nachgewiesen wurde, die bisher für Sillimanit gehaltenen Krystalle nicht der Zus. Al₂O₃·SiO₂, sondern 3Al₂O₃·2SiO₂ enthalten. (Journ. Amer. Ceram. Soc. 7. 726—34. 1924. A. C. SPARK PLUG Co., Detroit, Mich.)

RIEKE.

J. L. Stuckey, *Die Entwässerungstemperatur von Pyrophyllit und Sericit*. Die Frage des Verlustes des Konstitutionswassers einiger wasserhaltiger Al-Silicate ist von Interesse beim Brennen von Tonen, in denen bei einem Gehalt an Beimengungen dieser wasserhaltiger Al-Silicate die Erhitzungskurven variieren. Es wurden zwei dieser Beimengungen, Sericit u. Pyrophyllit, auf verschiedene Temp. erhitzt u. ihr Glühverlust nach dem Vorbrennen auf die betreffende Temp. bestimmt. Es stellte sich heraus, daß Sericit das Maximum des Wasserverlustes

zwischen 500 u. 600°, Pyrophyllit zwischen 600 u. 700° zeigte, u. daß bei Sericit völlig wasserfrei war, Pyrophyllit aber erst bei 900°. (Journ. Amer. Cer. Soc. 7. 735—37. 1924. Cornell, Geological Laboratory.)

A. V. Henry, *Der elektrische Widerstand feuerfester Materialien*. Es wurden elektr. Widerstand feuerfester Materialien, wie Schieferton, Kaolin, Magnesit, Sillimanit, Quarzit, Diaspor u. Talk bei Temp. von 300—1500° bestimmt. Unterss. wurden in einer Stickstoffatmosphäre vorgenommen bei Messung der Ergebnisse mit einer Wheatstonschen Brücke unter Verwendung eines 1000-phas. Wechselstroms von 45 V. Bei steigender Temp. fällt mit Ausnahme des Magnesit der Widerstand. Bei größerem Gehalt an Verunreinigungen wird der Widerstand geringer, doch ist der Prozentgehalt an Verunreinigungen nicht ausschlaggebend. Die Verteilung u. Art der Verunreinigungen ist von Einfluß. (Journ. Amer. Cer. Soc. 7. 764—82. 1924. Pittsburg, U. S. Bureau of Mines.)

Gertrud Ködder, Schönebeck a. Elbe, *Betrieb von Schachtöfen*, bei welcher der Brennstoff eine sich durch die ganze Schachthöhe erstreckende, vom Brennumgebene Säule bildet, 1. dad. gek., daß der Brennstoff in verbrennbaren Behälter eingebracht wird, deren übereinanderstehende Seitenwände die Brennstoffsäule hüllen. — 2. dad. gek., daß die brennbaren Behälter Böden besitzen, welche die Brennstoffsäule oft unterbrechen. — Die Asche bleibt in der Mitte u. verunreinigt das Gut — Zement, Kalk, Gips u. dgl. — nicht. (D. R. P. 403310 Kl. 80c vom 21/9. 1923, ausg. 25/9. 1924.)

Philipp Rosenthal, Berlin, *Gutbrennen von Porzellan in der oberen Brennkammer eines Rundofens* unter Vorwärmung des Gutes durch die abziehenden Feuergase der darunter liegenden Kammer, dad. gek., daß die Kuhlluft der unteren abgebrannten Kammer mit Wasserdampf beladen u. unter den Rost der oberen Kammer in Wandungen der oberen Kammer eingebauten Feuerkästen geführt wird, so daß sich dort Wassergas bildet. — Das Verf. gestaltet sich infolge der zweckmäßigen Ausnutzung der Abhitze sehr wirtschaftlich. (D. R. P. 402981 Kl. 80c vom 12/10. 1922, ausg. 27/9. 1924.)

Charles A. Kraus, Worcester, V. St. A., *Gläser*. Die Gläser enthalten 70% SiO₂, 2,2—3,1% Na₂O, 12—40% PbO u. 4,8—16,9% B₂O₃. Ihr Ausdehnungskoeffizient beträgt $4,0 \cdot 10^{-6}$ — $4,95 \cdot 10^{-6}$. Sie sind leicht schmelzbar. (A. P. 1504 vom 13/10. 1920, ausg. 16/9. 1924.)

Schott & Gen., Jena, *Gläser*, enthaltend neben SiO₂ 4—18% B₂O₃, bis 1% Al₂O₃ u. 3—19% K₂O. PbO oder BaO können in Mengen bis zu 35% zugesetzt sein. — Das PbO kann ganz oder zum Teil durch Sb₂O₃, das BaO durch MgO oder ZnO vertreten werden. (E. P. 219972 vom 25/7. 1924, Auszug vom 24/9. 1924. Prior. 3/8. 1923.)

Kurt Becker, Berlin, *Herstellung porzellanartiger Massen auf kaltem Wege*. Magnesium-, Aluminiumsilicat, Feldspat o. dgl. wird zerkleinert, mittels fluorhaltiger Fll. gel. u. unter Zusatz von H₃PO₄ oder einer anderen Säure, gegebenenfalls mit Verwendung von Farbstoff zu einem steifen Brei verarbeitet. (Dän. P. 171 vom 7/7. 1922, ausg. 28/1. 1924.)

Wilhelm Vershofen, Bamberg, *Herstellung keramischer Erzeugnisse* nach Patent 371593, dad. gek., daß neben dem Zusatz des Fluoridanteils zu der Masse noch Calciumsalze beigelegt werden. — Es wird die völlige Erweichung vermieden. (D. R. P. 403175 Kl. 80b vom 28/7. 1923, ausg. 23/9. 1924. S. 10.)

Walter Richards, Perth, Australien, *Herstellung von Portlandzement* aus kieselsäurereichem Kalkstein o. dgl. Kalkstein, welcher die für die Herst. von Portlandzement erforderliche Menge SiO₂, aber kein oder nur wenig Al₂O₃ enthält.

wd Bauxit oder Fe_2O_3 beigemischt. Die feingepulverte Mischung wird in üblicher Weise gebrannt. (Aust. P. 5764 vom 23/2. 1922, ausg. 6/3. 1923.) KÜHLING.

Arnold Jacobs, Kopenhagen, Gießen von Formlingen aus Magnesiaement o. dgl. M. wird in Formen mit glatten Innenwänden, z. B. aus Elektrolytkupfer bestehenden Formen mit polierten u. gut versilberten Innenwänden vergossen u. nach Erhärten, um sie loszulösen, stark u. plötzlich erwärmt. (Dän. P. 33205 vom 1923, ausg. 12/5. 1924.) KÜHLING.

Jakob Mettler, Berlin, Verfahren zur Erzielung gesetzmäßiger Zusammenstellungen der Mischungen und zu ihrer Aufbereitung für die Herstellung von Bauteilen und fertigen Mörteln, 1. dad. gek., daß größere Körnungen (Zuschläge) bis $\frac{2}{3}$ Vol. gemischt werden mit bestimmten Körnungen von der Größe von Sieb 60 bis 6000 Durchgang oder von 0,1 mm bis 0,005 mm. — 2. dad. gek., daß die größere Körnung 1 mm nicht übersteigt u. nicht unter 0,15 mm sinkt. — 3. dad. gek., daß ein Teil der Feinkörnung vorgebrannt oder vorerhitzt wird. — Es können u. Hohlsteine mit mehr als 35% Hohlraum hergestellt werden. (D. R. P. 385213 vom 23/3. 1920, ausg. 8/10. 1924.) KÜHLING.

Tennessee Copper & Chemical Corporation, New York, übert. von: Andrew Fairlie, Atlanta, V. St. A., Straßenbelag. 70—90 Teile gepulverte mineralische Stoffe, wie Sand, Steinmehl, Schlacke beliebiger Art u. dgl., 5—15 Teile Asphalt oder Bitumen u. 5—15 Teile mehlfein gepulverte Kupferhochofen- oder -konverterschlacke werden gemischt u. die Mischung in üblicher Weise auf die zu belegenden Straßen aufgewalzt. Unter Kupferhochofen- oder -konverterschlacke wird eine Schlacke verstanden, die 1% CuO enthaltende, im wesentlichen aus Calciumeisen-silicat bestehende Schlacke verstanden. Der Gehalt an CuO soll die Festigkeit der Asphalt-schicht günstig beeinflussen. (A. P. 1505880 vom 19/4. 1923, ausg. 19/8. 1924.) KÜHLING.

Johannes Justinus Bergsma, Niederländisch-Indien, Nichtbrennbare Isoliermasse. Man vermischt pulverisierte Baumrinde mit Zement u. Infusorienerde u. setzt dann mit Melasse. (F. P. 555477 vom 28/8. 1922, ausg. 30/6. 1923. Holl. Pat. 12/9. 1921.) FRANZ.

VII. Agrikulturchemie; Düngemittel; Boden.

Ch. Brioux, Einfluß des als Düngemittel benutzten Harnstoffs auf die Reaktion des Bodens. Theoret. müßte Harnstoff zuerst alkalisierend, dann acidifizierend auf den Boden wirken. Die Versuchsergebnisse (Tabelle im Original), die durch Mischen von je 500 g Erde (18% Feuchtigkeit) mit einer 0,1 g N_2 entsprechenden Menge Harnstoff, $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ oder NaNO_3 erhalten wurden, bestätigen diese Annahme. (C. r. d. l'Acad. des sciences 179. 915—17. 1924.) HABERLAND.

Densch und Hunnius, Der Einfluß des Wassergehaltes des Bodens zu verschiedenen Zeiten der Wachstumsperiode auf Ertrag, Verhältnis von Korn zu Stroh u. Aufnahme der Nährstoffe, namentlich der Phosphorsäure bei Hafer. Nach Ergebnissen von Gefäßverss. kann sich die Zeit für die Aufnahme der P_2O_5 beim Hafer bis zum Heraustrreten der Rispen erstrecken. Die bis dahin aufgenommenen Nährstoffe werden unter günstigen Wasserverhältnissen noch für den Korn-ertrag voll ausgenutzt. Auch die K_2O -Aufnahme erfolgt ähnlich wie die der P_2O_5 . Wurde ein Hafer unter herrschender Wassermangel noch während des Schossens beendet, so verminderte der Hafer bis zur Rispenbildung noch nachträglich ebenso viel K_2O dem Boden zu entnehmen, als bei dauernd günstigen Wasserverhältnissen. Dagegen wurde eine volle N-Entnahme nicht mehr möglich, selbst wenn der Wassermangel frühzeitig während des Schossens beendet wurde. (Landw. Vers.-Stat. 103. 1-102. 1924. Landsberg a. W., Landw. Vers.- u. Forschungsanst.) BERJU.

S. Winogradsky, Über die Untersuchung der Anaerobie in der Ackereerde. (C. r. d. l'Acad. des sciences 179. 367; C. 1924. II. 1847.) Um die Entw. von

Aeroben (Azotobacter I) u. *Anaeroben* (Amylobacter II) im Ackerboden zu untersuchen, wurden Glasröhren von 5 cm Durchmesser u. verschiedener Länge verschieden feuchten Proben ein u. derselben Ackererde beschickt. Die untere Öffnung der Röhre war mittels paraffinierten Korkstopfens, die obere durch ein Wattebausch verschlossen; als C-Quelle wurden 0,5—1% Mannit oder Glucose gegeben; die Röhren wurden 3 Tage bei 28° aufbewahrt. Ergebnisse: Erde mit 15,5% Feuchtigkeit: reichliches V. von I bis zur Tiefe von 23 cm, von II nur wenig II; mit 18% Feuchtigkeit: I bis 18 cm Tiefe, dann II; mit 20,4% Feuchtigkeit: deutlicher Buttersäuregeruch in den unteren Schichten, II tritt schon 4–5 cm unter der Oberfläche auf; mit 23% Feuchtigkeit; nach 12 Stdn. ist die Erde durch Gasentw. gelockert, deutlicher Geruch nach Buttersäure an beiden Enden der Röhre, II findet sich auch an der Oberfläche, reichlich dicht darunter. Die Ergebnisse, sowie gleiche mit einer noch feuchteren Erde, zeigen deutlich, daß die Vorherrschen der einen oder anderen Bakterienart durch meteorolog. Verhältnisse bedingt wird. (C. r. d. l'Acad. des sciences 179. 861—63. 1924.) HABERLAND

E. Blanck und **F. Alten**, *Beiträge zur Kennzeichnung und Unterscheidung der Roterden*. In einer krit. Besprechung der bisher veröffentlichten Verss., die die Gruppe der Roterden zugehörenden BB. zu charakterisieren, legen Vff. die Tatsachen dar, welche eine sichere Unterscheidung dieser Böden hinsichtlich ihrer Beschaffenheit, ihres V., ihrer Entstehung usw. erschweren. Auf Grund von Unterss. anderer Forscher u. von BLANCK u. DOBRESCU (Landw. Vers.-Stat. 427; C. 1914. II. 800) ermittelten Vff., daß die Best. der in HCl l. Sesquioxyde Fe u. Al u. des Mengenverhältnisses beider, in Verb. mit der Best. der Hygroskopizität zu besseren Unterscheidungsmerkmalen führen kann. Eine systematische Zusammenstellung der gewonnenen Ergebnisse ermöglichte eine ungezwungene Gruppierung der trop. u. subtrop. Erden. (Landw. Vers.-Stat. 103. 41—42. 1924.) BERJ

E. Blanck und **F. Alten**, *Experimentelle Beiträge zur Entstehung der Mediterranen Roterde*. Zur Nachprüfung der in einer früheren Abhandlung (Landw. Vers.-Stat. 89. 455; C. 1918. I. 766) entwickelten Theorie der Entstehung der Mediterranen Roterde werden die Löslichkeitsverhältnisse der Hauptkomponenten der für die Erden in Frage kommenden „Muttergesteine“ CaCO_3 u. MgCO_3 im kalten Wasser, Dolomit u. Magnesit in CO_2 -haltigen W., in Fe-Lsgg. u. in Humuslsgg. untersucht u. stark verd. Fe-Lsgg. verschiedener Art mit oder ohne Schutzwirkg. auslösende Humus in Wechselwirkg. mit Kalk, Dolomit u. Magnesit gebracht. Ggw. kolloidaler Humussubstanzen kann selbst bei Anwesenheit von Kalk usw. die Ausfällung von Fe verhindern. Bei Sickerungsverss. mit Fe-Lsgg. wurde gefunden, daß der Humus das Fe sofort auf der Oberfläche der Carbonatgesteine ausfällt mit Humus, aber in die Gesteinspulver eindringt. Rohhumusbedeckung hatte dagegen keinen Einfluß auf die Ausscheidung des Fe aus den Lsgg., woraus hervorgeht, daß der Humus nur im kolloidal gel. Solzustande diese Schutzwirkg. ausübt. (Landw. Vers.-Stat. 103. 73—90. 1924.) BERJ

J. C. Geiger und **H. Benson**, *Starke örtliche Verteilung der Bacillus-Botulismussporen und die wahrscheinlichsten Beziehungen eingemachter Früchte zu den ausgesprochenen Typen*. Während in Bodenproben einer Form nur B. botulinus B. gefunden wurde, enthielten die von demselben Boden stammenden eingemachten grünen Bohnen u. Maiskörner B. botulinus A. Vff. glauben, daß beide Typen von Bacillus im Boden vorhanden waren, aber die ihnen gebotenen Nährstoffe u. Bedingungen der Entw. das Wachstum der A-Form begünstigte u. daher die B-Form unterdrückt wurde. Durch Impfverss. mit diesen Bodenproben u. Früchten wurde diese Ansicht bestätigt. (Pub. Health Rpts. [U. S.] 38. 1611—15. 1923; Exp. Rec. 50. 365.) BERJ

Howard E. Middleton, *Das Bodenbindungsvermögen der Kolloide beeinflussende Faktoren*. Zur Best. des Bodenbindungsvermögens der Kolloide wurde zunächst nach Vorverss. der „krit. Feuchtigkeitsgehalt“, d. h. die Wassermenge festgestellt, bei welcher eine konstante Bodenmenge, bezogen auf Trockensubstanzgewicht, unter einem genau 1 Min. andauernden Druck von 2000 lbs pro q. Zoll den kleinsten Raum einnimmt u. nach Zusatz der so bestimmten Wassermenge aus dem Bodenmaterial Briketts von 25 mm Durchmesser u. 25 mm Höhe in gleicher Weise hergestellt, welche vorsichtig vorgetrocknet, dann 18 Stdn. bei 110° getrocknet wurden. Nach dem Erkalten wurde die Bruchfestigkeit dieser Briketts mittels des OLSEN-Universalapp. bestimmt. Der Kolloidgehalt wurde nach dem Verf. von GILE (U. S. Dept. Agr. Bull. 1193 vgl. ROBINSON, Journ. Physical Chem. 26. 647; C. 1923. II. 564) festgestellt. Die Best. der Bruchfestigkeit der Briketts ergab zwischen der Belastungsgrenze, bei welcher die Briketts deformiert werden L u. den in % ausgedrückten Kolloidgehalt C die Beziehung $L = 0,42 C^{1,24}$. Die Konstanten dieser Gleichung ändern sich mit den Eigenschaften der Kolloide u. der Beschaffenheit der Mineralbestandteile des Bodens. Mischungen von Kolloiden u. Sand zeigten, daß mit abnehmender durchschnittlicher Korngröße des Bodens das Bindungsvermögen der Kolloide zunimmt, doch war die Zunahme nicht proportional der Korngröße proportional. (Journ. Agricult. Research 28. 499—513. 194. U. S. A., Dep. of Agric.)

BERJU.

H. R. Rosen, *Die Bekämpfung der Naßfäule von Baumwollsaaten durch die Anwendung von Uspulun*. In einem Felde, wo die Krankheit infolge starker Regenfälle sich häufte, blieb sie in den Reihen, die für je 1 Quadratfuß mit 1 Gallone 5%ig. Uspulunslsg. behandelt waren, aus, während sie in den anderen sich weiter ausbreitete. Erreger war nach mkr. Unters. in den meisten, wenn nicht allen Fällen *Ascochyta blight*. Nachteilige Folgen der Uspulunbehandlung waren nicht zu erkennen. (Plant Disease 60. 384. 1924. Univ. of Arkansas.)

SPIEGEL.

K. Sampson, *Samenbehandlung gegen Getreidebrand*. Vf. empfiehlt ein Gemisch von CuSO_4 -Anhydrid u. CaCO_3 . Loser Haferbrand wurde vollständig durch Benetzen des Hafers mit einer verd. Formalinlsg. 1 pint zu 40 gal W. vernichtet. Es muß, um Keimschaden zu verhüten, die Saat bald nach der Behandlung eingebracht werden. (Welsh Plant Breeding Sta. Aberystwyth [Bul.] Ser. C. 3. 46. 1924. 1921—22; Exp. Stat. Rec. 50. 347.)

BERJU.

A. Morgen, C. Windheuser und Elsa Ohlmer, *Weitere Versuche über den Einfluß von Eiweiß durch Harnstoff bei Milchtieren*. Die diesjährigen, im größeren Maßstabe ausgeführten Fütterungsverss. an Schafen u. Ziegen, bei denen der Harnstoff einmal als Zulage zu einem eiweißarmen u. das andere Mal zu einem eiweißreichen Grundfutter verfüttert wurde, führten im wesentlichen zu denselben Ergebnissen wie früher (vgl. Landw. Vers.-Stat. 99. 359; C. 1923. I. 484). Daneben wurden auch Verss. mit Ammonacetat u. einem eiweißreichen Futtermittel, Soja- oder Leinschrot, angestellt. Ähnlich wie oben wurde in der Mehrzahl der Fälle die Milchmenge durch Beifütterung von Ammonacetat verringert, dieser Ausfall aber durch Erhöhung des Milchgehaltes nicht nur an Fett, sondern auch an Eiweißsubstanz u. N mehr als ausgeglichen. In Übereinstimmung mit SCHEUNERT sind die Mitarbeiterinnen (vgl. Biochem. Ztschr. 133. 137; C. 1923. III. 464) folgern, daß die Beeinflussung der Milchzus. durch Harnstoff wahrscheinlich einer direkten wrkg. auf die Milchdrüsen zuzuschreiben ist. (Landw. Vers.-Stat. 103. 1—40. 1924. Hohenheim, Landw. Vers.-Stat.)

BERJU.

Theodor Schweizer, Dresden, *Haltbarmachung saftiger Massenfuttermittel durch den elektrischen Strom*. Das Futter wird nach Verletzung der Epidermis

(durch Zerkleinern, Zerquetschen, Zerreiben o. dgl.) der Stromwrg. ausgesetzt (Oe. P. 96803 vom 30/8. 1921, ausg. 10/5. 1924. D. Prior. 30/8. 1920.) KAUSCH
Eric Hannaford Richards und **Henry Brougham Hutchinson**, Harpenden und **Agricultural Developments Company (Pyrford) Ltd.**, London, *Düngemittel* (Stroh, Mais-, Reis-, Zuckerrohrabfälle, Laub u. dgl. werden mit Kalkstickstoff, trocknetem Blut u. dgl. u. gegebenenfalls Rohphosphaten oder Thomasmehl u. Calciumsulfat gemischt, angefeuchtet u. unter Luftzutritt der Vergärung überlassen. (E. P. 219748 vom 23/4. 1923, ausg. 21/8. 1924.) KÜHLING

Masao Igawa und **Asahi Garasu Kabushiki Kaisha**, Tokio, *Düngemittel* (Stickstoffhaltige Düngemittel werden mit kolloiden anorgan. Stoffen, mit Ausnahme von Magnesiasilicat gemischt, z. B. mit kolloidem Al_2O_3 , MgO , $\text{Al}_2(\text{SiO}_3)_3$ u. dgl. Die Menge des Zusatzes hängt mehr von der Beschaffenheit des Bodens als von der Art des Stickstoffdüngers ab, ist aber stets gering. (E. P. 219748 vom 23/4. 1923, ausg. 28/8. 1924.) KÜHLING

R. H. Hoover Laboratories, übert. von: **Roy H. Hoover**, Freeport, V. St., *Düngemittel*. Schlecht riechende Düngemittel, besonders Schlachthofabfälle, werden mit etwa 1% einer Mischung von Terpentinöl, synthet. Wintergrünöl u. Sternanisöl versetzt, wodurch ihr übler Geruch beseitigt werden soll. (A. P. 1509062 vom 29/12. 1919, ausg. 16/9. 1924.) KÜHLING

Th. Roemer, Halle a. S., *Saatgutbeize*, bestehend aus *Al-Formiatlsgg.* — *Al-Formiat* ist schon in einer Verd. von 0,2% imstande, Pilze abzutöten. Eine merkbare Schädigung der Keime stellt sich erst bei 0,5% ein. (D. R. P. 401294 Kl. 451 vom 17/12. 1922, ausg. 1/9. 1924.) SCHOTTLÄNDER

Saccharin-Fabrik, Akt.-Ges. vorm. Fahlberg, List & Co., Magdeburg-Stadt, *Herstellung von Schädlingsbekämpfungsmitteln aus Getreide*, dad. gek., daß man das Getreide nach Quellung u. Röstung mit l. Giften, z. B. Strychninnitrat, behandelt. — Durch die Quellung des Getreides in W. u. nachfolgende schwache Röstung erfolgt eine Sprengung der äußeren Schichten des Getreidekornes an verschiedenen Stellen u. eine solche Veränderung der Struktur, daß nunmehr Giftstoffe wie Strychnin u. As_2O_3 , das Getreidekorn durchdringen, das nach Trocknung in ca. 40–50° mit einem Farbstoff gefärbt wird, eine durchaus sichere Giftwrgk. bildet u. von Mäusen u. anderen Nagern gern angenommen wird. (D. R. P. 402000 Kl. 451 vom 28/12. 1921, ausg. 15/9. 1924.) SCHOTTLÄNDER

Paul Lehnert, Bliesdalheim, Saargebiet, *Mittel zur Abtötung von Blattläusen*, bestehend aus für diesen Zweck an sich bekannten Ätstoffen, wie Na_2CO_3 , Weiskalk u. Carbolium, dad. gek., daß diese Stoffe mit zusammengeschmolzenen tier. u. pflanzlichen Fetten vermischt sind u. in an sich bekannter Weise A. u. M. unter Umständen auch Ruß zugesetzt ist. — Es entsteht durch den Zusatz der Fettstoffe eine leicht auftragbare, u. weder vom Regen, noch durch Sonnenbrand von A. u. M. mit ihr behandelten Apfelbäumen entfernbare M. Der zugesetzte Ruß dient zur Färbung, der A. zur Konservierung der M. Man mischt z. B. Schweinefett, Pferdefett, Rinderfett, Heuschreckenfett, Pflanzenöl, $\text{Ca}(\text{OH})_2$, Na_2CO_3 , Carbolium, A. u. M. mit etwas Ruß miteinander. (D. R. P. 405152 Kl. 451 vom 24/5. 1921, ausg. 27/12. 1924.) SCHOTTLÄNDER

Walter Heerdt, Frankfurt a. M., *Insektenvertilgungsmittel*. Man läßt fl. HCN von 95–100% durch poröse Stoffe, wie Kieselgur, Diatomit oder Absorptionskohle, absorbieren u. füllt das pulverförmige Prod. in Weißblechbüchsen, die dicht verschlossen werden. Die Größe des Gefäßes wird so bemessen, daß der Inhalt eines oder mehrerer Gefäße zur Begasung des von den Insekten zu befreienden Raumes ausreicht. Ein mit Gasmaske versehener Arbeiter öffnet die Büchse in dem Raume u. streut das Pulver in dünner Schicht aus, wobei die HCN in kurzer Zeit verdunstet. Um Zeress. der HCN zu verhindern, kann man ihr stabilisierende Mittel, wie

Cu oder Oxalsäure, zusetzen, sowie Reizstoffe, wie Chlorameisensäuremethylester halogenierte KW-stoffe. (A. P. 1502190 vom 9/6. 1923, ausg. 22/7. 1924.) SCHÖ. E. Merck und Wilhelm Eichholz, Darmstadt, *Parasitenvertilgungs- und Desinfektionsmittel*, gek. durch eine Lsg. von fettsauren Salzen des Cu in Paraffin, A. anderen organ. Lösungsm., mit Ausnahme von Phenolen oder Kresolen. — wird Cu-Oleat in fl. Paraffin oder Vaselineöl unter Erwärmen gel. u. filtriert. abgekühlten Filtrat kann man gegebenenfalls Aceton u. Tetralin zusetzen. Mittel tötet nicht nur die Parasiten selbst, sondern auch deren Eier schnell. Kurze Zeit nach seiner Anwendung sind alle Nissen oder Eier im Innern grün angefärbt, woraus sich die Fähigkeit des Mittels ergibt, die Chitinhülle durchdringen. Besonders wirksam ist es gegen die Acarusräude des Hundes. außerordentlich tief in die Haut eindringende Acarusmilbe wird mit Sicherheit h eine alkoh. Lsg. von fettsaurem Cu abgetötet. Verss. haben ferner ergeben, auch Bakterien aller Art in kurzer Zeit abgetötet werden, so daß das Mittel auch zur Desinfektion verwenden läßt. (D. R. P. 401413 Kl. 451 vom 14/2. 1924, ausg. 3/9. 1924.)

SCHOTTLÄNDER.

Maschinenfabrik und Mühlenbau-Anstalt Hugo Greffenius, Frankfurt a. M., *Verfahren zur Bekämpfung der Mehlmotten*, dad. gek., daß die in bekannter Weise Bakteriennährböden gezüchteten *Erreger der Schlafsucht* mit Mehl angeteigt, entstehenden Kuchen nach Art der Mazzeherst. getrocknet werden, dieses hergestellte Trockenprod. fein vermahlen u. in einem bestimmten Verhältnis mit Mehl secht wird, welches in der von den Mehlmotten zu befreienden Mühle zerstäubt. — Durch das Anteigen der Bakteriennährböden mit Mehl werden die Erreger Schlafsucht dauernd virulent erhalten. Die Zerstäubung des [vermahlenden] Kuchenprod. in den verschiedenen Maschinen, Elevatoren u. Winkeln der Mühle geschieht durch eine besondere Vorr., die in der Patentschrift näher erläutert ist. (D. R. P. 401651 Kl. 451 vom 16/6. 1922, ausg. 6/9. 1924.)

SCHOTTLÄNDER.

Louis A. Eberhardt, New York, V. St. A., *Rattenvertilgungsmittel*. Meerbelemn werden mit Paraffinöl auf 85—95° erhitzt, das Gemisch in geeigneten zerkleinert u. zu Pasten, Pillen oder Kuchen geformt. Gegebenenfalls kann dem Paraffinöl Salicylsäure, Nelkenöl, Pimentöl oder Ba-Salze zusetzen. (A. P. 3575 vom 11/12. 1922, ausg. 26/8. 1924.)

SCHOTTLÄNDER.

Chemische Fabrik Griesheim-Elektron, Frankfurt a. M., *Verfahren zum Vertilgen von höhlenbewohnenden Schädlingen*, wie Ratten, Mäusen, Hamster, dad. gek., man am Aufenthaltsort der Schädlinge W. auf solche P-Verbb., die mit W. entwickeln, zur Einw. bringt. — Z. B. streut man die P-Verb., wie P_2Ca_3 , P_2Mg_3 in die von den Tieren bewohnten Löcher hinein u. verschließt auf die Löcher. Durch die Feuchtigkeit der Erde zers. sich das Phosphid u. entwickelte PH_3 tötet die Tiere oder veranlaßt sie, sich aus der Erde herauszuheben, so daß sie entweder getötet werden können oder doch alsbald den einströmenden Gasen erliegen. Hat der Boden nur geringe Feuchtigkeit, so kann man h Einführung von W. in die Löcher die PH_3 -Entw. beschleunigen. Der aus H_2 , $\text{Ba}(\text{OH})_2$ oder $\text{Mg}(\text{OH})_2$ bestehende Rückstand ist für die Pflanzen völlig schädlich. (D. R. P. 401778 Kl. 451 vom 3/6. 1919, ausg. 9/9. 1924.) SCHOTTL. **Georg Steindl**, München, *Sperlingsvertilgungsmittel*, dad. gek., daß als Ansmittel tier. Mist, am besten Pferdemist dient, dem ein Vertilgungsmittel zugeleibt ist, welches durch Behandeln von geschroteten Getreidekörnern (am besten Hafer) mit einem tödlich wirkenden Giftstoff, z. B. 0,5% Strychnin oder As_2O_3 , u. einem schwach gelb färbenden Farbstoff, z. B. Curcuma, Methylorange, gefärbt wird. — Der mit den vorbehandelten Körnern versetzte Pferdemist wird nicht zu großen Haufen an von den Sperlingen ständig aufgesuchten Örtlichkeiten unter den zur Vermeidung einer Gefährdung von Hausgeflügel nötigen Vor-

sichtsmaßregeln ausgelegt. Durch die Färbung der Haferkörner gewinnen die so große Ähnlichkeit mit den normalerweise im Pferdemist enthaltenen Körnerresten, daß der Sperling sie mit solchen verwechselt u. unbedenklich aufnimmt, während er anders gefärbte Körner verschmäht. (D. R. P. 403147 Kl. 451 vom 18/2. 1922, ausg. 23/9. 1924.) SCHOTTLÄNDER.

Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Leverkusen b. Köln a. R. *Verfahren zur Haftfähigmachung von Pflanzenschutzmitteln*, dad. gek., daß dies BaSO_4 oder Stoffe zugesetzt werden, die bei Ggw. von W. BaSO_4 zur Ausfällung bringen, mit oder ohne Beigabe inerter Stoffe. — Die beste Wrkg. wird erreicht, wenn man frisch gefälltes BaSO_4 verwendet oder dieses unmittelbar in der Sprüßflüssigkeit oder bei Pulvern nach der Verstäubung u. nach der Lsg. in Tau oder Regen zur Ausfällung bringt, z. B. durch Einw. von MgSO_4 auf BaCl_2 in Ggw. von W. Um die Schwebefähigkeit des ausfallenden BaSO_4 zu erhöhen, setzt man zweckmäßig die Ba-Verb. im Überschuß zu. Das BaSO_4 oder die zu seiner erforderlichen Salze können den verschiedensten Pflanzenschutzmitteln, wie As-Verb. Cu-Acetat, mit oder ohne Zusatz inerter Stoffe zugesetzt werden. Die Präparate lassen sich als Spritzbrühen oder Verstäubungspulver verwenden. (D. R. P. 4014 Kl. 451 vom 15/2. 1922, ausg. 3/9. 1924.) SCHOTTLÄNDER.

Citizens of the United States of America, übert. von: **Edwin C. E. Lor** Washington, *Bestimmung der Absorptionskraft von Böden*. Eine Probe des untersuchenden lufttrocknen Bodens wird mit einer Menge einer Farbstofflsg. v. bekanntem Farbstoffgehalt geschüttelt, welche von der Bodenprobe völlig entfärbt wird. Die Mischung wird dann in ein durch Glaswolle u. eine darüber angeordnete Filterscheibe verschlossenes Filterrohr gegossen, das mittels Glasschliff mit einem mit Kubikzentimeterteilung versehenen Standzylinder befestigt ist, u. das so lange Farbstofflsg. nachgegossen, bis diese beginnt, unentfärbt abzulaufl. (A. P. 1506351 vom 13/12. 1923, ausg. 26/8. 1924.) KÜHLING.

VIII. Metallurgie; Metallographie; Metallverarbeitung.

Committee for the application of oxygen or oxygenated air in metallurgical operations, *Zusammenfassender Bericht über die Verwendung von O_2 in der Eisenindustrie u. der Wirtschaftlichkeit der Betriebe*. (Trans. Amer. Inst. Mining and Metallurg. Eng. 1924. Nr. 1377. 7—15.) BECKER.

W. S. Landis, *Angereicherte Luft in der Metallurgie*. Besprechung der Verwendungsmöglichkeit von O_2 oder mit O_2 angereicherte Luft in der Metallurgie vom wirtschaftlichen u. prakt. Standpunkt. Vorschläge über neue Verwendungsgebiete in der Eisenindustrie u. bei der Metallurgie der Nichteisenmetalle. (Trans. Amer. Inst. Mining and Metallurg. Eng. 1924. Nr. 1377. 24—29. New York.) BECKER.

Arthur G. Mc Kee, *Die Verwendung von sauerstoffreicher Luft im Gebläseofen*. Vorteile dieses Verf. Das Verhältnis $\text{CO}_2 : \text{CO}$ in den Abgasen wird erhöht. (Trans. Amer. Inst. Mining and Metallurg. Eng. 1924. Nr. 1377. 32—34. Cleveland Ohio.) BECKER.

Charles Hart, *Die Verwendung von sauerstoffreicher Luft im Hochofen*. Größte Wirtschaftlichkeit des Betriebes als bei Verwendung von reiner Luft. (Trans. Amer. Inst. Mining and Metallurg. Eng. 1924. Nr. 1377. 35—38a. Chester, Pa.) BECKER.

Sidney Cornell, *Vorschlag zur Verwendung von Sauerstoff im Frischofen*. Er bespricht die O_2 -Bilanz u. gibt einen Kostenvoranschlag. (Trans. Amer. Inst. Mining and Metallurg. Eng. 1924. Nr. 1377. 39—46. New York.) BECKER.

Edmund B. Kirby, *Billiger Sauerstoff in der Metallurgie*. Besprechung der Wirtschaftlichkeit u. sonstigen Vorteile sowie der Wärmebilanz bei Verwendung von O_2 im Hochofen- u. im Frischherdprozeß sowie im Blei- u. Kupfergebläse.

(Trans. Amer. Inst. Mining and Metallurg. Eng. 1924. Nr. 1377. 58—78. York.)

BECKER.

C. S. Witherell, *Berechnung des thermischen Effektes bei Verwendung von stoffreicher Luft*. Vf. gibt die Wärmeausbeute bei der Verbrennung von pher Kohle in Luft-O₂-Gemischen von verschiedener Zus. an, wenn die Kohle al mit einem Überschuß von O₂ quantitativ zu CO₂ verbrennt, das andere wenn sämtlicher O₂ verbraucht ist u. noch CO im Gas enthalten ist. Die en sind in Kurven u. Tabellen angeführt. (Trans. Amer. Inst. Mining and llurg. Eng. 1924. Nr. 1377. 79—86. New York.)

BECKER.

B. M. O'Harra, William Kahlbaum, E. S. Wheeler und W. J. Darby, *Der luß von sauerstoffreicher Luft auf das Abrösten von Zinkerzen*. Vff. besprechen Wärmebilanz bei der Röste von Zn-Erzen mit reinem O₂ oder O₂-Luftgemischen verschiedener Zus. Der Vorteil gegenüber der Verwendung von gewöhnlicher bei der Röste besteht darin, daß der Prozeß schneller vor sich geht, eine re Temp. erreicht wird u. die Ausbeute an SO₂ steigt. Dadurch wird die schaftlichkeit des Betriebes gefördert. (Trans. Amer. Inst. Mining and Metal- Eng. 1924. Nr. 1377. 92—119. Rolla, Mo.)

BECKER.

Wilbur C. Riley, *Untersuchungen auf Erz mittels elektrischer Wellen*. Be- ibung eines von D. C. CHILSON ausgearbeiteten Verf., die Lage sulfid. Erze r Erde dadurch zu bestimmen, daß ein Sender von elektr. Wellen mit elektr. den sulfid. Erzen Kontakt hat u. bei einer bestimmten Schwingungszahl alle l. Erze der Umgebung gleichmäßig als Teil des Senders mitschwingen. Durch Empfänger bestimmter Form kann mittels Einstellung auf beste Hörbarkeit Zeichens die Lage errechnet werden. (Engin. Mining Journ. Press 118. 733 34. 1924. Caliente [Cal.])

BEHRLE.

Marcell Steffes, *Regulierungsversuche an den Hochfengasverbrauchern: Winderhitzer, aschinen u. Kessel*. Vf. hat eingehend Verss. angestellt zur Best. des günstigsten ltnisses zwischen Verbrennungsluft u. Frischgasmenge (Hochfengas) u. die misse in Kurventafeln zusammengestellt. (Die Wärme 47. 503—6. Esch a. zette, Luxemburg.)

NEIDHARDT.

V. Rohn, *Elektrischer Kleinschmelzofen für Weißmetall und Aluminium*. Vf. rt die Vorteile des elektr. Schmelzens im Hütten- u. Werkstättenbetrieb gegen- dem Schmelzen mit Kohle, Koks, Gas oder Öl u. beschreibt einen Klein- elzofen von 200 mm Durchmesser u. 550 mm Tiefe mit einer Fassung von 60 kg Lagerweißmetall oder 20 kg Al. Er kann bei einem Verbrauch von . bis 800° gebracht werden. Der Abbrand beim Schmelzen von Al-Abfällen ehr gering (0,6—1,2%). Die aus diesem Guß hergestellten Barren ließen sich besondere Vorsichtsmaßregeln zu fehlerfreien Blechen auswalzen. Der Strom- uch beträgt pro t Al 400 kW/Stdn. Möglich sind derartige Ofenkonstruk- für Fassungen bis 2000 kg Al. (Ztschr. f. Metallkunde 16. 396—98. Hanau Heraeus-Vakuumschmelze A.-G.)

BECKER.

Erich Scheil, *Studie über die sekundäre Krystallisation des Stahles*. Es wird ht, die bei der sekundären Krystallisation des Stahles auftretenden Er- rungen zu erklären, wobei die Keimzahl, die Krystallisationsgeschwindigkeit Einfluß der Gitterkräfte besonders beachtet werden. An den Grenzen von alkörnern, wo zwei Gitterstrukturen sich treffen u. ihre Orientierungskräfte seitig abschwächen, erfolgt die B. neuer fremder Keime u. ihr Wachstum mit rer Leichtigkeit; deshalb findet man den Perlit bei Abkühlung von dem zat umgeben (vgl. Howe, Proc. Am. Soc. Testing Materials 1911. 263). Für ogelsche Theorie (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 76. 429; C. 1912. II. 568) des allisationsverlaufes des Ferrits werden Belege angeführt. Dem Martensit wird abilität abgesprochen u. für ihn eine instabile Umwandlungskurve eingezeichnet.

Für die hohe „Reaktionsordnung“ des Anlaßvorganges (vgl. FRAENKEL u. HEIMANN, Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. **134**. 137; C. **1924**. II. 394) wird eine neue Erklärung gegeben. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. **139**. 81—107. 1924. Charlottenburg.)

BIKERMAN

H. Röhrig und **W. Borchert**, *Der Einfluß der Glühbehandlung auf die Reaktionsfähigkeit von Aluminium*. Vff. zeigen mittels der therm. Al-Probe MYLIUS (Ztschr. f. Metallkunde **16**. 81; C. **1924**. II. 2085), daß die Reaktionsfähigkeit des Al dadurch verringert wird, daß das Material nach dem Glühen rasch abgekühlt wird. Daß die Wrkg. des Abschreckens sich auch auf die inneren Schichten erstreckt, wurde dadurch nachgewiesen, daß Proben nach dem Glühen abgedreht u. vor der therm. Probe gebeizt wurden. Die Verminderung der Reaktionsfähigkeit der harten Al-Bleche durch geeignete Wärmebehandlung ist auf die Wrkg. oxyd. Deckschichten zurückzuführen. Doch scheint auch Mischkristallbildung mit den Verunreinigungen des Al, wie Si, eine für die Widerstandsfähigkeit des Al wichtige Rolle zu spielen. (Ztschr. f. Metallkunde **16**. 398. 1924. Grevenbroich, Erstwerk A.-G.)

BECKER

W. Heike und **Kath. Ledebur**, *Das ($\alpha + \gamma$)-Eutektoid des Messings*. Versuchen den Beweis für die Existenz des ($\alpha + \gamma$)-Eutektoids beim Zerfall des β -Messings unterhalb von 470° zu erbringen, indem sie dem Messing 15% Mn mischen. An Schliffen ist das Eutektoid dann deutlich sichtbar, da der Mn-Zusatz eine Kornvergrößerung der Eutektoidkristallite bewirkt. (Ztschr. f. Metallkunde **16**. 380—81. 1924. Freiberg i. Sa., Bergakademie.)

BECKER

R. Glocker und **E. Kaupp**, *Beobachtungen des Rekristallisationsvorganges mittels Röntgenstrahlen*. (Vgl. Ztschr. f. Physik **24**. 121; Ztschr. f. Metallkunde **180**; C. **1924**. II. 454. 1736.) Vff. zeigen an gewalzten Ag-Blechen, daß die Walzstruktur (parallel zur [112]-Richtung liegt die Walzrichtung, parallel zur [111]-Richtung die Querrichtung, senkrecht zur [110]-Richtung die Walzebene) erst nach einem kurzen Ausglühen bei 850° in eine regellose Anordnung der Kristallite übergeht. Bei niedriger Temp. (150°) hingegen tritt eine neue Kristallitlage auf, die bei dieser Temp. auch bei sehr lang anhaltendem Tempern nicht in den Zustand der regellosen Verteilung übergeht. Sie ist dadurch ausgezeichnet, daß die vorher in der Walzebene verlaufenden Würfelfanten sowohl nach vorn als auch nach hinten aus der Walzebene unter Beibehaltung ihres Winkels gegen die Walzrichtung heraustreten. Die Rekristallisationsstruktur geht aus der Walzstruktur durch eine Drehung um die in der Walzrichtung liegende kristallograph. [112]-Richtung hervor. Für den Rekristallisationsvorgang ist es von Einfluß, ob ein bestimmter Walzgrad in wenigen Walzstichen mit starker Dickenabnahme oder in vielen Walzstichen mit jeweiliger geringer Dickenabnahme erreicht wird. Im zweiten Fall stellen sich die Kristallite exakter zur charakterist. Walzstrukturlage ein. Dagegen zeigte dieser Fall bei einer Erhitzungsdauer von 10 Min. bei 150° keinerlei Andeutung einer Rekristallisation, während im ersten Fall diese auftritt. Die Ursache dürften die im ersten Fall auftretenden stärkeren Spannungen sein. (Ztschr. f. Metallkunde **16**. 377—380. 1924. Stuttgart, Techn. Hochschule.)

BECKER

W. Tafel, *Einiges über den Walzvorgang, insbesondere die Walzarbeit und den Fließdruck*. Definition u. theoret. Erörterung des Walzvorganges. Definition des Staukraft. Abhängigkeit der Breite vom Halbmesser. Voreilung. Deformationsart. Quetschgrenze. (Ztschr. f. Metallkunde **16**. 391—95. 430—32. 1924. Breslau.)

Carl Irresberger, *Der gegenwärtige Stand des Schleuder-(Zentrifugal-)Gusses*. Besprochen werden die Metallurgie des Schleudergusses, seine Anwendung u. Herst. von Kolbenringen, der Gebrauch von Schleuderformen mit wagerechter, schräger u. senkrechter Achse, die Herst. von Kesselnippeln u. Schwungrädern. Schutz vor übermäßiger Härtung durch Auskleiden der Formen mit Kernen. Verwe-

erde ein Eisen mit: 3,5% C, 1,9—2,0% Si, 0,1% S, 0,8% P, 0,5% Mn. Es ergab 250—2300 kg/qcm Festigkeit. Die Gießwärme soll möglichst genau 1430° betragen. Die British Piston Ring Co. gießt auch Gas- u. Wasserleitungsdruckröhren mittels nach Patenten von DE LAVAUD gebauten Schleudergußmaschinen mit wagenförmiger Achse, die beschrieben u. abgebildet sind. Ringe u. Röhren müssen nach dem Ausstoßen aus der Maschine in besonderen Glühöfen u. Glühkammern (Abb. Original) geglüht werden. Die wirtschaftlichen Ersparnisse werden durch Beobachtungsergebnisse belegt. 13 Abb. ergänzen die Beschreibung. (Gießerei-Ztg. 21. 1924—402. 1924.)

NEUFELD.

W. G. Whitman und R. P. Russell, *Die Korrosion von Eisen in Flüssigkeiten*. (Vgl. Chem. Metallurg. Engineering 30. 671; C. 1924. II. 540.) Die bei der Korrosion von Eisen u. Stahl in natürlichen Wässern, in alkal. Lsgg. u. nicht oxydierenden Säuren beobachteten Erscheinungen verlaufen entsprechend elektrochem. Vorgängen. — Gel. O nimmt an der unmittelbaren Kathodenrk. in höherem Maße teil als daß er als Depolarisator für atomaren H dient. — Der Grad der Korrosion in natürlichen Wässern ist bestimmt durch das Verhältnis der Sauerstoffdiffusion zur tatsächlichen Kathodenoberfläche u. durch den Schutz der auf dem Metall gedungenen Haut. Die Zus. u. Oberflächenbeschaffenheit des Metalls sind bei der Korrosion gewöhnlichen Stahles u. Eisens unwichtig. Wechsel in der [H] eines gegebenen W. innerhalb der annähernden Grenzen von pH 10 u. 4,5 ändern den Korrosionsgrad nicht; da die Fl. gegen das Metall infolge der Löslichkeit von $(OH)_2$ konstante Alkalinität behält. Die Unterschiede in der Korrosionswrkg. zwischen verschiedenen natürlichen Wässern beruhen auf ihren abweichenden Eigenschaften Schutzschichten zu bilden. — In Alkalien sinkt der Korrosionsgrad, weil der Rost schwerer l. ist u. daher eine besser schützende Schicht bildet. Die Ausscheidung von H-Ionen in alkal. Lsgg., die von manchen als Ursache für die Zunahme der Korrosion angesehen wird, spielt keine Rolle.

In nichtoxydierenden Säuren wird H_2 entwickelt u. das Verhältnis der Korrosion wird hierdurch von der Überspannung stark beeinflußt. Daher haben Zus. u. Oberflächenbeschaffenheit des Metalles starken Einfluß. Korrosion durch gel. O in Wässern ist durch das Verhältnis der O-Diffusion zur Oberfläche begrenzt, wie in natürlichen Wässern. Die O-Wrkg. wird deutlich bei schwachen nicht oxydierenden Säuren u. großen Geschwindigkeiten. — Die Anoden- u. Kathodengebiete können sich getrennt oder nahe beieinander liegen u. jedes reaktionslose Gebiet (Rost eingeschlossen), das in elektr. Berührung mit der korrodierenden Anode liegt, vermag als Kathode zu wirken. Der Kontakt mit einem zweiten Kathodengebiete steigert die Korrosion von Fe in natürlichen Wässern durch Anwachsen des Gebietes, in dem O diffundieren kann. Narbenwrkgg. entstehen durch örtliche Korrosion, wo nicht angegriffenen Stellen teilweise (in der Regel durch Schutzschichten) geschützt sind, u. haben daher als Kathoden in der Richtung der korrodierenden Säuren gewirkt. — Die Theorien der direkten Oxydation oder der kolloiden katalyt. Wirkung kann nur ein Teil der bei der Korrosion eingetauchten Stahles beobachteten Erscheinungen decken. Die Arbeit enthält 4 Schaulinienbilder der Versuchsergebnisse. (Journ. Soc. Chem. Ind. 43. T. 193—96. 197—99. Cambridge 1924. [ass.])

NEUFELD.

—, *Tabellarische Übersicht chemischer und physikalischer Eigenschaften korrosionsbeständiger Legierungen*. Ein Ausschluß der American Society for Testing Materials unter Vorsitz von Jerome Strauss alle erreichbaren Werte solcher Legierungen systemat. zusammengestellt, die Fe, Ni oder Cu als Hauptbestandteil haben u. verschiedenen zerstörenden Stoffen widerstehen. Tafel 1 behandelt die chem. Zus. u. physikal. Eigenschaften gegen Korrosion, gegen Hitze u. Elektrizität beständiger Legierungen u. enthält die Namen der Hersteller, der Werkstoffe, ihre Zus. in %,

ihre D., ihren F., ihre Gesamtkontraktion, Angaben über ihre Angreifbarkeit. Anmerkungen. Tafel 2 behandelt die therm., elektr. u. Beständigkeitswerte gleichen Legierungen u. enthält Angaben über ihre Löslichkeit in H_2SO_4 , HCl , Essigsäure, $NaOH$, NH_4OH , Seewasser, Seeluft, in feuchter Luft, feuchtschwefelhaltiger Luft, Grubenwässern, Chlor in wss. Lsg. u. in CO_2 enthaltenen Gasen. (Chem. Metallurg. Engineering 31. 79—83. 1924.) NEUFELD

—, *Wie Metalle der Korrosion widerstehen.* Auf Grund von Angaben, die reine Metalle **Harold F. Whittaker** vom National Research Council u. für Legierungen **Jerome Strauss** von der Naval Gun Factory zusammengestellt haben sei aus dem Sammelbericht über Korrosionseigenschaften hier auszugsweise folgend mitgeteilt, Einzelheiten müssen in der Arbeit nachgelesen werden: Eisen u. St. werden als Gußeisen, dem zur Erhöhung der Säurefestigkeit, Si legiert wird, als weicher Stahl (Flußeisen) trotz ihrer Zerstörbarkeit viel verwendet, weil billig u. bequem verwendbar sind. — Cu ist ein wichtiger Bestandteil widerstandsfähiger Legierungen, allein angewendet aber nur von begrenzter Brauchbarkeit. Im einzelnen wird besprochen das Verh. von Cu zu Essigsäure, Essigsäureanhydrid, KOH , $NaOH$, NH_4OH , Anilin, feuchter Luft, CO_2 , CO, Cl-Lsgg., Citronensäure, Farbstoffen u. ihren Lsgg., H , H_2O_2 , J, Milchsäure, Ölen, organ. Halogenen, photograph. Lsgg., Salz-Lsgg., Dampf, H_2SO_4 , H_2SO_3 , Seewasser. — Verh. von Cu zu Essigsäure, Essigsäureanhydrid, Alkoholen, Alkalien, NH_4OH , Anilin, Borsäure, Br, Buttersäure, $CaCl_2$, $CaSO_4$, Cl, Citronensäure, Cu-Salzen, Kresolen, Fettsäuren, Formaldehyd, Ameisensäure, Gelatine, Glycerin, HCl , HCN , H_2S , J, Milchsäure, Hg, Gemischen von H_2SO_4 u. HNO_3 , Naphtholen, Naphthylamin, HNO_3 , Nitrobenzol, N, Oxalsäure, O, Ozon, Palmitinsäure, Phenol, Phosphorsäure, K_2CO_3 , KNO_3 , Propionsäure, Pyrogallol, Hydrochinon, Salzlsgg., Seife, $NaHCO_3$, Na_2CO_3 , Na_2SO_4 , Stearinsäure, S, SO_2 , SO_3 , H_2SO_4 . — Verh. von Pb zu Essigsäure, Alkalien, NH_3 , NH_4OH , $CaCl_2$, CO_2 , Chloriden, HCl , HCN , HF, Gemischen von H_2SO_4 u. HNO_3 , HNO_3 , Nitrobenzol, Oleum, organ. Säuren, photograph. Lsgg., Na_2CO_3 , $NaOH$, H_2SO_4 , H_2SO_3 , Salzlsgg., Holz. — Verh. von Ni zu Essigsäure, Acetylhydrazid, Na_2HPO_4 , NH_4OH , Ammoniumazid, Ammoniumpersulfat, Benzaldehyd, Dämpfe der Benzoesäure, Benzophenon, $CaCl_2$, CO, Chloressigsäure, Citronensäure, Fettsäuren, $FeCl_3$, Ameisensäure, Halogenen, HCl , H_2O_2 , Milchsäure, $MgCl_2$, HNO_3 , Nitrobenzol, N, Oxalsäure, O, Phenole, photograph. Lsgg., Pikrinsäure, Na-Acetat, Na_2CO_3 , NaCl, Natriumhydrosulfid, $NaOH$, $NaNO_3$, Na_2SO_4 , Natriumtartrat, Wasserdampf, H_2SO_4 , Weinsäure, $SOCl_2$, H_2O . — Verh. von Sn zu Essigsäure, NH_4Cl , CO_2 , H_2CrO_4 , Citronensäure, HCl , J, Milch, HNO_3 , organ. Säuren, Oxalsäure, NaCl, NaOH, $SnCl_2$, Zucker, H_2SO_4 , Lebensmitteln in Konservendosen, Wein. — Verh. von Zn zu Essigsäure, NH_3 , NH_4OH , $CaCl_2$, Citronensäure, Äther, HCN , Ni-Salz-Lsgg., Nitrobenzol, Oxalsäure, NaCl, NaOH, H_2SO_4 , H_2O , $ZnCl_2$. (Chem. Metallurg. Engineering 31. 70—79. 1924.) NEUFELD

Edward Salomon Berglund, Djursholm, Schweden, *Aufarbeitung zinkbleihaltiger Schwefelerze u. dgl.* Die Erze werden gegebenenfalls nach dem Abreiben mit einem Gemisch von CaC_2 , CaO u., wenn erforderlich, Kohle gemengt u. erhitzt, wobei vorhandener Schwefel u. O_2 an Ca gebunden u. die Metalle in Freiheit gesetzt werden. Für manche Fälle empfiehlt es sich, die MM. zu brikettieren u. die Briketts in Kanalöfen auf Wagen zu erhitzen, wobei bei hohem Gehalt an Zink zweckmäßig auf Tempp. erhitzt wird, bei denen nur das Pb zu Metall reduziert wird, das abfließt u. in einer Rinne des Kanalofens gesammelt wird. Andernfalls verbindet man den Kanalofen mit einer Kondensationsanlage, in welcher das flüchtige Zn u. der nicht abgeflossene Teil des Pb niedergeschlagen wird. (ABH. 1507152 vom 20/3. 1922, ausg. 2/9. 1924.) KÜHLING

Thomas Willard Cavers, Nickelton, V. St. A., *Aufbereitung von Erzen*. Eisen-, Cu, Ni oder Pb bezw. mehrere dieser Metalle enthaltende Erze, Konzentrate u. dgl., werden in einem Hochofen mit Wassermantel geschmolzen, wobei zweckmäßig überhitzter Dampf etwas oberhalb der Windröhren eingeblasen wird, welcher vorhandene Metallsulfide unter B. von H_2S zerlegt, u. ein Luftüberschuß durch die Windröhren zugeführt wird, der ausreicht, um diesen H_2S zu verbrennen. Die Erzeugnisse, Matte u. Schlacke fließen in den Tiegelraum des Ofens u. sondern sich dort nach ihren verschiedenen DD. (A. P. 1507581 vom 25/1. 1921, ausg. 1924.)

KÜHLING.

Western Metallurgical Company, übert. von: **George M. Colvocoresses**, Emboldt, und **Walter A. Schmidt**, Los Angeles, V. St. A., *Aufarbeiten von Erzen*. Erze, welche Metalle, die flüchtige Chloride bilden, in Form von Oxyden, Carbonaten, Sulfiden o. dgl. enthalten, werden in gepulvertem Zustande in mit röhren übereinander angeordneten Herden u. Rührwerken, welche das Gut von dem Herd zum andern befördern, versehenen Öfen mittels entgegengeführter h. Gase auf etwa 1000° erhitzt u. dann in einen oder mehrere hintereinandergeschaltete, geneigte Drehrohröfen geleitet, an deren (oberen) Eintrittsende sie mit mittels h. Gase eingeblasenem $NaCl$ gemischt werden, unter gleichzeitigem Erhitzen durch ebenfalls am oberen Ende der Öfen eingeführte Verbrennungsgase. Die verflüchtigten Chloride werden in, z. B. elektr. Sammelgefäßen aufgefangen, die Rückstände in einer Wärmeaustauschvorr. zum Vorwärmen der Verbrennungsluft benutzt. (A. P. 1507858 vom 20/2. 1922, ausg. 9/9. 1924.) KÜHLING.

George Nelson Libby, Berkeley, V. St. A., *Aufarbeiten von Sulfiderzen*. Die gepulverten Erze werden mit wss. HNO_3 zum Brei verrührt u. dieser in den oberen gekühlten Teil eines geneigt angeordneten Drehrohrrofens eingeführt. Der untere Teil dieses Drehrohrrofens wird mittels Dampfmantels erhitzt. In diesem Teil zerfällt sich aus den HNO_3 u. Nitrate enthaltenden Mischungen NO , welches durch eingeführte Luft in NO_2 verwandelt wird. Dieses wird durch den Luftstrom dem oberen Teil des Ofens kommenden Erzbrei entgegengeführt u. von diesem der Rk. größtenteils absorbiert. Der nicht verbrauchte Teil wird in an den Ofen angeschlossen Türmen wiedergewonnen. Die sulfid. Anteile der Erze gehen bei der Behandlung in Sulfate über. (A. P. 1508561 vom 9/2. 1916, ausg. 16/9. 1924.)

KÜHLING.

Eureka Metallurgical Company, übert. von: **Reinhold V. Smith**, Salt Lake City, Utah, *Erzkonzentration*. Die oxydierten Erze werden in Form eines wss. Breies mit Öl u. einer S-Verb. behandelt, worauf man das W. entfernt, die M. mit Wasser w. verd. u. dann einem Schaumswimmprozeß unterwirft. (Can. P. 236881 vom 30/11. 1921, ausg. 8/1. 1924.)

OELKER.

Hans Adelmann, übert. von: **Richard Rodrian**, New York, *Metallgewinnung aus Erzen*. Die gegebenenfalls gerösteten oder ausgelaugten Erze werden fein gepulvert u. entweder für sich oder in Mischung mit Metallen oder anderen metallhaltigen Stoffen, wie Pb oder PbO oder diese enthaltenden MM. geschmolzen, erforderlichenfalls unter Zusatz von Flußmitteln, wie Ätz- oder kohlensauren Alkalien oder CaO . Die wieder erkaltete Schmelze wird gepulvert u. in einer Zelle mit Kathoden aus Fe, Pb oder Hg u. Anoden aus Pb oder Fe u. einer Mischung von Ätz- oder kohlensaurem Alkali oder Alkalisulfat als Elektrolyten bei etwa 10 Volt Spannung u. einer Stromstärke von 10–100 A. elektrolysiert. Das Erzeugnis wird ausgewaschen u. die abgeschiedenen Metalle in geeigneter Weise von Gangarten u. dgl. getrennt, z. B. durch Ausschmelzen für sich oder unter Zusatz von Pb, u. amalgamieren o. dgl. (A. P. 1505494 vom 29/4. 1922, ausg. 19/8. 1924.) KÜHLING.

Hans Hochleitner, Wien, *Rösten und Brennen nicht sulfidischer Erze*, dad. u. dgl., daß das Röstgut der Einw. erhitzter Luft oder h. Gase ohne Flammenentw.

ausgesetzt wird. — Es kann feinstückiges Gut geröstet, die Verunreinigung Guts durch Aschenteile vermieden u. es können ganz bestimmte Temp. eingehalten u. deshalb der Vorgang genau geregelt werden. (D. R. P. 403 671 Kl. 40a u. 4/3. 1923, ausg. 2/10. 1924.) KÜHLIN

G. Segerborg, Stockholm, *Eisenlegierungen*. Zwecks Verstärkung der Säure- u. Bruchfestigkeit wird mindestens 6% Si enthaltenden Eisenlegierungen bis zu 10% Cu oder Kupferlegierungen zugefügt. (Schwed. P. 53 896 vom 4/1. 1922, 2/5. 1923.) KÜHLIN

George F. Mc Mahon, Chicago, *Legierungen*. Fein gepulverte u. gesinterte Elektrolytmetalle, wie Elektrolyteisen-, -nickel oder -kobalt werden mit gleichfalls fein gepulverten Metallen, Metallegierungen oder diese Stoffe enthaltenden Metalloxyden bzw. Mischungen von Metalloxyden mit den ersterwähnten Stoffen gemengt, wobei die Menge des Metalloxyds diejenige nicht übersteigen darf, welche durch den im Elektrolytmetall enthaltenen H₂ reduziert werden kann. Die Gemenge werden unter Luftabschluß auf Temp. zwischen 900° u. dem Schmelzpunkt des Elektrolytmetalls erhitzt. Es entstehen gesinterte MM., welche ohne weitere Nachbehandlung zu Reduktionszwecken verwendet, aber auch gegossen oder in anderer Weise weiterverarbeitet werden können. (A. P. 1506 246 vom 2/11. 1922, ausg. 26/8. 1924.) KÜHLIN

Ludlum Steel Co., Watervliet, übert. von: **William H. Smith**, Cleveland, V. St. A., *Eisenlegierungen*, welche gegen zerstörende Einw. von Metallen, Gasen, Dämpfen, wiederholtes Erhitzen auf hohe Temp. beständig sein sollen, werden durch Zusammenschmelzen von 40 u. mehr % Fe, 15—40% Cr, 0,04—1% Ti, nicht mehr als 2% Mn, gegebenenfalls 0,5—3% Si u. 0,04—3% Al gewonnen. Zweckmäßig geht man von Ferrochrom aus, schmelzt dieses im elektr. Ofen u. fügt die übrigen Bestandteile kurz vor dem Gießen zu, zuletzt Si u. Al, welche als Reduktionsmittel wirken. (A. P. 1508 032 vom 27/2. 1919, ausg. 9/9. 1924.) KÜHLIN

Charles Tyndale Evans, Titusville, V. St. A., *Nichtrostende Stahllegierungen*. Fe, Ni, Cr, W, Mn, Si u. Zr, Ce oder Ti bzw. reduzierbare Verb. von ihnen werden, gegebenenfalls unter Zusatz von Reduktionsmitteln zusammengeschmolzen. Z. B. werden 707 Teile Fe, 104 Teile Ferrochrom, 64 Teile Wolframpulver, 6 Teile Zirkonsilicid u. 4 Teile Eisensilicid verschmolzen. Die gegossene M. wird bei Temp. von etwa 1100° gehärtet. (A. P. 1506 894 vom 3/4. 1922, 2/9. 1924.) KÜHLIN

Frank E. Clark, New York, *Stahl und Stahllegierungen*. Abfallstahl o. d. wird unter einer bas. oxydierenden Schlacke geschmolzen, z. B. einer 50—60% O₂ u. 15—20% Fe₂O₃ u. MgO, Al₂O₃ u. SiO₂ in wechselnden Mengen enthaltenden Schlacke, welche vorhandenen P bindet. Nach Entfernung dieser Schlacke wird das Erhitzen unter einer kieselensäurereichen Schlacke fortgesetzt, z. B. einer Schlacke, welche neben CaO u. geringen Mengen MgO u. Al₂O₃ 35—55% SiO₂ enthält, u. es wird Kohlenstaub zugegeben, der aus der Schlacke Si bildet, welches während des vorangehenden Teils des Verf. entstandene Oxyde reduziert. Nachdem auch diese Schlacke entfernt ist, wird eine höchstens 25%, zweckmäßig aber nur 10% O₂ neben CaO enthaltende Schlacke aufgebracht, welche Schwefel u. andere Verunreinigungen bindet. Sollen Legierungen hergestellt werden, so wird das betreffende Metall, besonders Cr, dieses in Form von Ferrochrom, vor dem Entschwefeln zugegeben. (A. P. 1508 083 vom 16/12. 1920, ausg. 9/9. 1924.) KÜHLIN

American Rolling Mill Company, übert. von: **John H. Nead**, Middletown, V. St. A., *Behandeln von Chromstahl*. Chromstahl von möglichst geringem, nicht mehr als 0,2% betragendem Gehalt an C wird gegläht, k. gewalzt u. dann gelöst. Das Verf. lockert die verbrannten Teile u. gestattet ihre leichte Entfernung. (A. P. 1508 567 vom 4/10. 1923, ausg. 16/9. 1924.) KÜHLIN

Oscar Klingenberg, Sarpsborg, Norwegen, *Elektrothermische Gewinnung von Zink und anderen flüchtigen Metallen* unter Benutzung einer Siliciumlegierung als Reduktionsmittel, 1. dad. gek., daß das metallhaltige Material in den Schmelzraum mit Kondensationseinrichtungen verbundenen, geschlossenen elektr. Ofens zusammen mit Si in Legierung mit einer verhältnismäßig geringen Menge, vorzugsweise zwischen 26 u. 40%, Ca eingeführt wird. — 2. dad. gek., daß das Oxyd des flüchtigen Metalls, z. B. Zn, erst durch Windbehandlung oder in anderer bekannter Weise aus dem Erz gewonnen u. danach in Mischung mit CaSi in den Schmelzraum des elektr. Ofens eingeführt wird. — Die Beschickung kann ohne Vorwärmung in den Schmelzraum eingebracht werden. (D. R. P. 403672 Kl. 40c vom 11/3. 1924, ausg. 2/10. 1924.)

KÜHLING.

Edward Salomon Berglund, Djursholm, Schweden, *Flüssiges Zink aus Zinkabfällen*. Die untere Öffnung des Kühlrohres einer elektrotherm. Zinkgewinnungsanlage ist mit einer Anzahl von Zähnen aus feuerfestem Stoff versehen, welche am Ende u. auf kreuzweise die Öffnung durchsetzenden Leisten angeordnet sind. Innerhalb des Kühlrohres befindet sich ein tiegelartiger Behälter mit mittlerer, an der unteren führender Öffnung u. einem außerhalb des Zahnkranzes befindlichem Abkanal. Dieser Behälter wird in schnelle Umdrehung versetzt, wobei das im Staub enthaltene fl. Metall zentrifugal abgeschleudert wird u. sich im Randkanal sammelt, während das vorhandene ZnO durch die mittlere Öffnung abgeführt wird. (A. P. 1506609 vom 2/2. 1922, ausg. 26/8. 1924.)

KÜHLING.

Hermann Mehner, Deutschland, *Gewinnung von Zink im Flammofen*. Die Sohle des Ofens ist aus gelochten oder porigen Ziegeln hergestellt oder als Rost ausgebildet. Die bei der Red. des Gutes entstehenden Gase werden durch die Sohle abgezogen u. in einer kleinen Anzahl von Zügen gesammelt. Beimischung von Heizgasen wird nach Möglichkeit vermieden u. der Vorgang so geleitet, daß bei der Beschickung keine Flamme u. kein Zinkrauch erscheint u. die abgezogenen Gase möglichst arm an N_2 sind. (F. P. 556261 vom 19/9. 1922, ausg. 16/7. 1923.)

KÜHLING.

Henry Harris, London, *Reinigung von Metallen*. Die Metalle, vorzugsweise Kupfer, werden mittels geschmolzener Salze gereinigt. Hierzu dient ein Behälter für geschmolzene Metall u. ein Behälter, in dem das geschmolzene Metall mit dem geschmolzenen Salz vermischt wird. Beide sind durch ein von der Unterseite des ersten Behälters für die Salzschnmelze ausgehendes Rohr, z. B. ein Überlaufrohr verbunden. In der Salzschnmelze wird mittels einer durch die Schnmelze selbst betriebene Turbinen auf der Oberfläche der Salzschnmelze verteilt, sinkt durch die letztere hindurch und kehrt durch den Überlauf in den Metallbehälter zurück. Zusätzliche Reagentien werden in fein verteilter Form dem Metall während des Zuflusses zur Turbine beigemischt. (Aust. P. 10531 vom 4/1. 1923, ausg. 29/5. 1923.)

KÜHLING.

Siemens & Halske Akt.-Ges., Siemenstadt b. Berlin (Erfinder: **Georg Eger** u. **Martin Hosenfeld**, Charlottenburg), *Elektrolytische Gewinnung des Kupfers aus Lösungen bei der Silberelektrolyse entstehenden Ablaugen*, 1. dad. gek., daß diese elektrolyt. Kupferung mit Hilfe von Anoden aus Magnetit erfolgt. — 2. dad. gek., daß die Kupferung unter Verwendung der gleichen Anoden auch bei Ablaugen von Silberelektrolysen stattfindet, die mit Hilfe der Salze der $HClO_4$ arbeiten. — Es wird ein hochwertiges, von Verunreinigungen freies Erzeugnis erhalten. (D. R. P. 41919 Kl. 40c vom 30/7. 1922, ausg. 22/9. 1924.)

KÜHLING.

Robert J. Cunningham und **George H. King**, Salt Lake City, V. St. A., *Reinigung von Kupfer*. Das zu reinigende Cu wird geschmolzen u. auf seine Oberfläche feuchtes NaCl gestreut, welches schm. u. in diesem Zustand die im Cu enthaltenen Verunreinigungen veranlassen soll, an die Oberfläche zu steigen, von wo sie abgeblasen werden. (D. R. P. 41919 Kl. 40c vom 30/7. 1922, ausg. 22/9. 1924.)

sie mit der fl. Salzsäure abgeschöpft oder abgegossen werden. (A. P. 1507 vom 15/5. 1919, ausg. 2/9. 1924.) KÜHLIN.

Metallhütte Baer & Co., Kommandit-Gesellschaft, Abt. der Metallindustrie Schiele & Bruchsalser, Hornberg, Erhöhung der Beständigkeit von Aluminium gegen saure und alkalische Flüssigkeiten. Man bestreut das Al mit einer Schicht von CaCO_3 , erhitzt auf etwa 550° u. vereinigt dann die Schicht mit dem Al durch Hämmern, Walzen u. dgl. (Holl. P. 8074 vom 18/2. 1920, ausg. 15/3. 1921.) D. Prior. 8/3. 1919.) OELKE.

Charles Edward Meyer, Crown Mines bei Johannesburg, Transvaal, Verfahren zur Gewinnung von Zink aus Zinkgoldschlämme. Innerhalb eines gelochten zylindrischen Rohrs mündet, das im Innern eines zweiten festen zylindrischen Rohres drehbar angeordnet ist. In dem drehbaren Rohr befinden sich zylindrische Mahlkörper u. das gelochte Rohr, durch welches überhitzter Dampf eingeführt wird. Die Schlämme gelangen zunächst in den ummantelten Kessel, werden hier vorzerkleinert u. gelangen dann in das drehbare Rohr, in dem unter Einwirkung des Dampfes vorhandene Zn oxydiert wird. Die M. wird dann mit einer wss. Lsg. von $(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3$ behandelt u. hierauf gefiltert, wobei das gel. Zn in das Filtrat übergeht, während ein Au, Ag, Pb, Fe u. SiO_2 enthaltender Rückstand auf dem Filter bleibt. Letzterer wird unmittelbar ausgeschmolzen oder zunächst mittels Natriumacetat vom Pb befreit. Die Zinklsg. wird durch Dampf zersetzt u. das ausfallende ZnO gemischt von ZnO u. ZnCO_3 zwecks Gewinnung von reinem ZnO gegläht. (A. P. 1507 vom 9/10. 1922, ausg. 30/1. 1923.) KÜHLIN.

Gesellschaft für Wolfram-Industrie m. b. H., Traunstein, Oberbay., Metalllegierung von sehr großer Härte gemäß Patent 310041 (C. 1919. IV. 540), 1. Legierung, daß der Gehalt an Fe erheblich verringert, der an Ti u. seltenen Erdenmetallen, wie auch an W erhöht ist. — 2. Legierung nach Anspruch 1, bestehend aus 10—15 Teilen Ti, 2—5 Teilen seltenen Erdmetallen, wie Zr, Th, Ce, 7 bis 84 Teilen W, 3—5 Teilen Fe u. 2—4 Teilen C. — Zur Herst. wird Titanpulver mit Wolframpulver u. den Carbiden oder Oxyden der übrigen Metalle gemischt u. die Mischung im elektr. Ofen geschmolzen. (D. R. P. 401600 Kl. 40b vom 14/5. 1922, ausg. 29/9. 1924.) KÜHLIN.

International General Electric Company Inc., New York, übert. von Gerald Robert Brophy, Schenectady, V. St. A., Hitzebeständige Legierungen bestehend aus Fe, 10—15% Al, 25—50% Ni u. gegebenenfalls bis 5% Cr. (A. P. 1507 vom 17/6. 1922, ausg. 16/1. 1923.) KÜHLIN.

British Ulco Company Limited, London, Antimon- und zinnfreies Halbleitend bestehend aus Pb, welchem in einer Menge bis zu 1,3% mehrere der Metalle Sr, Ca, Mg u. gegebenenfalls noch kleine Mengen Cu zugesetzt sind. (H. P. 1507 vom 14/2. 1920, ausg. 15/10. 1923. A. Prior. 31/7. 1915.) KÜHLIN.

A. R. Lindblad, Stockholm, Kohlenstoffarme Chromlegierungen. Die zinnhaltigen kohlenden Chromlegierungen werden mit Verb. von Metallen verschmolzen, welche in der chromhaltigen Schmelze unl. oder wl. Carbide bilden, z. B. mit Al_2O_3 oder Al_2O_3 enthaltenden MM., u. die Verb. durch ein zugesetztes Reduktionsmittel in Metall verwandelt. Der nicht in Carbid übergegangene Anteil des Metalls legiert sich mit der Chromlegierung u. muß, falls seine Menge unerwünscht geworden ist, in bekannter Weise abgeschieden werden. (Schwed. P. 55614 vom 17/2. 1922, ausg. 20/11. 1923.) KÜHLIN.

Hans Hansen, Kolding, Herstellung von Zinnsilberlegierungen. Sn wird mit einem oder mehreren Silbersalzen verschmolzen. Man verschmilzt z. B. 100 Teile Sn u. 25 Teile AgCl . (Dän. P. 32989 vom 30/8. 1922, ausg. 24/3. 1924.) KÜHLIN.

Hermann Stopsack, Tientsin, *Räuchermittel für Gießformen, besonders aus* Zinn, dad. gek., daß es aus einer Mischung von Öl (Steinöl) u. Heizkohlenruß (Steinkohlenruß) besteht. — Das Räuchern bezweckt, das Lösen des Gußstückes aus der Form zu erleichtern. Der untere Teil der Form wird mit dem Gemisch aus der Erfindung bestrichen u. die entstehenden Gase entzündet. (D. R. P. 401 Kl. 31 c vom 3/1. 1923, ausg. 19/9. 1924.)

KÜHLING.

Leonhard Treuheit, Breslau, *Herstellung von synthetischen Formsanden*, dad. gek., daß die in Formsand umzuwandelnden Sande, wie Quarz-, Fluß-, See-, Alt- usw., vor der an sich bekannten Aufbereitung mit Ton einer Vorbehandlung mit Metallverb. unterworfen werden. — Im Gegensatz zu den bekannten, durch die Behandlung von Sand mit Tonaufschwemmungen u. dgl. erhaltenen künstlichen Formsanden besitzen die Erzeugnisse völlig die Eigenschaften des natürlichen Sandes, die Sandkörner bleiben nicht rauh u. zackig u. die Gasdurchlässigkeit ist nicht erschwert. (D. R. P. 402 800 Kl. 31 c vom 8/4. 1924, ausg. 18/9. 1924.)

KÜHLING.

Lagskolen for Haandvaerkere og Mindre Industridrivende (Teknologisk Institut), Kopenhagen, *Schweißmittel für Aluminium*, bestehend aus Alkalichloriden, u. fluorhaltigen Bindemittel, wie CaF_2 , u. H_3BO_3 . (Dän. P. 32 696 vom 13/1. 1923, ausg. 31/12. 1923.)

KÜHLING.

Friedrich Schiemann, Berlin-Wilmersdorf, *Schärfen von Feilen, Raspeln* d. durch chemische Ätzung mittels eines Gemisches von W., H_2SO_4 u. HNO_3 , dad. gek., daß der mit den Gasblasen aufsteigende Schlamm an der Oberfläche abgeschöpft u. entfernt wird. — 2. dad. gek., daß die Feilen innerhalb des Ätzbades in drehende Bewegung versetzt werden. — Das Verf. gestattet auch solche Feilen zu schärfen, bei denen, wie bei den feinsten Nadelfeilen, das übliche Verfahren versagt. (D. R. P. 403 413 Kl. 48 d vom 27/6. 1923, ausg. 26/9. 1924.)

KÜHLING.

Walter Beige, Halle a. S., *Innen-Emaillieren von Röhren*, 1. dad. gek., daß aufgebrachten Röhren sich drehend den Glühofen durchwandern. — 2. dad. gek., daß die Dauer der Wanderung durch eine automat. betätigte Mitnehmermechanik bestimmt wird. — Es können auch lange dünne Röhren gleichmäßig emailliert werden. (D. R. P. 403 578 Kl. 48 c vom 29/2. 1924, ausg. 2/10. 1924.)

KÜHLING.

Carl Uebelhoer Bijouteriefabrik, Pforzheim, *Herstellen von ornamentalen Emailierungen auf beliebigen Metallgegenständen*, dad. gek., daß einzelne unter sich verschiedene Emailtöne nach einer beliebigen ornamentalen Zeichnung auf den Gegenstand aufgebracht u. zusammen so eingebrannt werden, daß die Emailen bzw. deren Ränder ineinanderfließen u. dadurch eine eigenartige, dem Batik- u. ähnlichen Wrkg. hervorrufen. — Es können sowohl durchsichtige wie undurchsichtige Emailen erzielt werden. (D. R. P. 403 755 Kl. 48 c vom 1/11. 1923, ausg. 10/10. 1924.)

KÜHLING.

Gemische Fabrik Griesheim-Elektron, Frankfurt a. M. (Erfinder: **Adolf Schwanheim** a. M.), *Rückgewinnung und Reinigung von Leichtmetallen* aus unedlen oder techn. reinen Metallen nach Patent 360 818, 1. dad. gek., daß statt MgCl_2 oder Carnallits (oder deren Mischungen) Mischungen aus diesen mit solchen Zuschlagstoffen verwendet werden, die als Verdickungsmittel wirken. — 2. dad. gek., daß als Verdickungsmittel Oxyde oder Fluoride verwendet werden. — Auch bei Überschuß von MgCl_2 gelangt dieses nicht in das Metall. (D. R. P. 403 802 Kl. 40 a vom 21/7. 1923, ausg. 2/10. 1924. Zus. zu D. R. P. 360 818; 2 II 140.)

KÜHLING.

Ertrand S. Summers, Port Huron, V. St. A., *Verbleien von Eisen*. Das zu bleibende Eisen wird als Kathode gegen eine Aluminiumanode geschaltet, als Anode dient eine Lsg. von Bleiacetat in einer wss. Lsg. von Aluminium- u.

Calciumacetat, die aus rohen, zweckmäßig organ. Stoffe (die als Schutzkol dienen sollen) enthaltendem Calciumacetat durch Lösen in W., Zusatz von we als der äquivalenten Menge Alaun u. Abtrennen des entstandenen CaSO_4 gewo wird. (A. P. 1505109 vom 23/2. 1923, ausg. 19/8. 1924.) KÜHLIN

General Electric Furnace Corporation, Reno, übert. von: **Roy A. Dris** Bay Point, V. St. A., *Metallgewinnung aus Eisenabfällen*. Die zerkleinerten gangsstoffe werden mit Überzügen von die Elektrizität nicht leitenden fl halbfl. Stoffen, wie Öl, Teer u. dgl. versehen, mit Kohle u. gegebenenfalls e weiteren Zusatzstoff wie SiO_2 vermischt u. im elektr. Widerstandsofen geschmo Sollen Eisenlegierungen hergestellt werden, so werden der Mischung die mit Eisen zu legierenden Metalle in fein verteilter Form zugesetzt. (A. P. 1507 vom 9/2. 1921, ausg. 2/9. 1924.) KÜHLIN

Earl Holley, übert. von: **Stanley M. Udale**, Detroit, V. St. A., *Schutzübe für Metallgußformen*. Feingepulverter Ton u. etwa die 4fache Menge W. we unter Zusatz von Wasserglas in schnelllaufenden Mühlen in eine kolloide Lsg. wandelt u. diese auf die über den Kp. des W. erhitzten Innenwände der (me Gußformen aufgebracht. (A. P. 1505176 vom 30/11. 1923, ausg. 19/8. 1924.)

Earl Holley, übert. von: **Daniel H. Meloche**, Detroit, V. St. A., *Schutz züge für Sandseelen*. Die bei der Herst. gußeiserner Gegenstände verwen Sandseelen werden mit einer Mischung von feinst verteiltem MgO u. einer 5 wss. Lsg. von Glutin getränkt u. dann im Ofen getrocknet. Der Überzug se die Seele vor der Einw. des fl. Fe. (A. P. 1505214 vom 26/12. 1922, ausg. 1924.) KÜHLIN

Earl Holley, übert. von: **Daniel H. Meloche**, Detroit, V. St. A., *Schutz züge für Dampfkessel und -röhren*. Die zu schützenden Gegenstände we zweckmäßig mittels Sandstrahlgebläses, gereinigt, unter Vermeidung von Oxyd auf etwa 150° erhitzt, dann mit einer Mischung von gepulvertem Ton u. 10 Wasserglaslsg bestrichen, so daß ein sehr dünner Überzug entsteht, wieder 150° erhitzt, die Mischung wieder aufgestrichen usw., bis die gewüns Stärke des Überzuges erreicht ist. (A. P. 1505215 vom 5/4. 1923, ausg. 1924.) KÜHLIN

G. Sköldberg, Lindesberg, *Rostschutzmittel*, bestehend aus Graphit, Karb oder Stärkemehl u. CaO . (Schwed. P. 53229 vom 15/11. 1919, ausg. 1922.) KÜHLIN

IX. Organische Präparate.

Oscar Loew, *Vom Werdegang der Formalinindustrie*. Vf. berichtet üb d Entdeckung des Verf. zur Herst. von Formaldehyd, über die Entdeckung de infizierenden Wrkg. über die Ergebnisse der Arbeiten des Vf. über Formo Formaldehyd. (Ztschr. f. angew. Ch. 37. 825—26. 1924.) JUL

K. D. Jacob, H. J. Krase und J. M. Braham, *Zersetzung von Calciumcyanamid bei der Lagerung*. Calciumcyanamid nimmt bei der Lagerung W. u. CO_2 au bei der Cyanamid-N bis zu NH_3 umgewandelt werden kann. Vff. haben dies gänge eingehend studiert u. dabei festgestellt, daß die Zers. stark verzögert wde kann durch Einölen oder durch Lagern in solchen Behältern, daß dem Luftiri nur eine kleine Oberfläche geboten wird. (Ind. and Engin. Chem. 16. 68—8 1924. Washington [D. C.]) GRIMM

Deutsche Gold- und Silber-Scheideanstalt vormals Roessler, Fra fu a. M., *Verfahren, um Blausäure aufzubewahren und zu transportieren*, dad. gel da akt. Kohle, zweckmäßig solche von saurer Rk., welche vorteilhaft mit eine Al sorptionsfl. für HCN getränkt ist, als Träger für die HCN verwendet wird. - I

geschlossenem Gefäße hält sich die „Blausäurekohle“ lange Zeit ohne Zersetzung. (D. R. P. 403378 Kl. 12k vom 2/8. 1923, ausg. 27/9. 1924.) KÜHLING.

Barrett Company, New York, V. St. A., Verfahren und Vorrichtung zur teilweisen Oxydation von organischen Verbindungen. (D. R. P. 404998 Kl. 12g vom 19/10. 1920, ausg. 25/10. 1924. A. Prior. 11/6. 1919. — C. 1922. II. 1055 [A. PP. 7720 u. 1374-721].) KAUSCH.

Ricard Allenet & Cie., Melle, Frankreich, Umwandlung von aliphatischen Kohlenwasserstoffen der Äthylenreihe in flüssige Kohlenwasserstoffe durch Polymerisation. (D. R. P. 402990 Kl. 12o vom 6/7. 1923, ausg. 19/9. 1924. Blg. Prior. 3/1922. — C. 1924. I. 444 [E. P. 202311].) SCHOTTLÄNDER.

Gustav Weinmann, Zürich, Schweiz, Leichtflüchtige Kohlenwasserstoffe der Äthylenreihe aus Äthylen. Kurzes Ref. nach Schwz. P. 91866; C. 1922. IV. 1085. Es ist zugetragen, daß das aus der Reaktionskammer austretende u. durch starke Abkühlung kondensierte Gas aus ca. gleichen Teilen einer schwerer flüchtigen, bei +80° übergehenden, u. einer leichtflüchtigen, bei -7° übergehenden Fraktion besteht. Die letztere ist ein Gemisch von KW-stoffen der Zus. zwischen C₄H₆ u. C₆H₁₀, entsprechend Gemischen aus Butadien u. Äthyläthylen. Die schwerflüchtige Fraktion ist ein durch Dest. schwer trennbares Gemisch von KW-stoffen, C₆H₁₀ u. C₈H₁₆. Die wertvollere, leichtflüchtige Fraktion dient zum Schweißen u. als Brennstoff für Flugzeuge. (D. R. P. 402993 Kl. 12o vom 4/8. 1921, ausg. 19/9. 1924.) SCHOTTLÄNDER.

Consortium für elektrochemische Industrie G. m. b. H. (Erfinder: Erich Schottländer, Hans Deutsch, Willy O. Herrmann und Martin Mugdan), München, Verfahren und Äther des Äthylidenglykols und Vinylalkohols. (D. R. P. 403784 Kl. 12o vom 24/7. 1921, ausg. 4/10. 1924. — C. 1923. IV. 659.) SCHOTTLÄNDER.

Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning (Erfinder: Georg Kränzlein, Martin Corell), Höchst a. M., Ester des Thiodiglykols. (D. R. P. 400311 Kl. 12o vom 13/6. 1920, ausg. 4/8. 1924. — C. 1921. II. 558. 1922. II. 638. 873.) SCHOTTLÄNDER.

F. F. Boehringer & Söhne G. m. b. H., (Erfinder: Lorenz Ach), Mannheim, Verfahren, Darstellung von Glycerinbenzyläther, darin bestehend, daß man in Glycerin einen leicht abspaltbaren Substituenten enthaltenden Glycerinderivat, einen Benzyläther, in Sauerstoffbindung einführt u. gegebenenfalls im Glycerinrest vorhandene substituierende Atome oder Atomgruppen abspaltet. — Man erhitzt z. B. die Natrium- oder Acetonglycerine in Bzl. gel. mit C₆H₅CH₂-Cl zum Sieden, zerlegt mit verd. H₂SO₄ u. hebt die Benzolschicht ab u. dest. diese im Vakuum. Der Benzyläther des Glycerins, Kp. 123—124°, geht beim Erhitzen mit verd. H₂SO₄ u. W. in den Glycerin- α -monobenzyläther, farblose Fl. von glycerinähnlicher Konsistenz, Kp. 157—159°, nicht süß schmeckend, mit W., A., Bzl., Ricinusöl u. Lanolin fast in jedem Verhältnis mischbar, über. Der juckreizstillende Äther ist geeignet, der Haut sowohl in W., als auch Fetten l. Arzneistoffe in leicht resorbierbarer Form zuzuführen. (D. R. P. 403050 Kl. 12o vom 6/8. 1921, ausg. 20/9. 1924.) SCHOTTLÄNDER.

Leon Lilienfeld, Wien, Diäthylsulfat. (D. R. P. 404173 Kl. 12o vom 15/11. 1920, ausg. 13/10. 1924. Oe. Prior. 15/12. 1913. — C. 1921. IV. 512 [F. P. 70].) SCHOTTLÄNDER.

3. Merck, Chemische Fabrik, Darmstadt, Darstellung von Nitrosaminen, bestehend, daß man tert. Amine aliphat. Charakters, allein oder in Mischung mit sek. Aminen, bei erhöhter Temp. mit überschüssiger HNO₂ in Rk. bringt. — Ebenfalls tert. Amine allein über 50% Ausbeute an Nitrosaminen. Das Verfahren ermöglicht, Gemische von sek. u. tert. Aminen, wie sie bei den meisten Nitrosaminen zunächst erhalten werden, auf Nitrosamine zu verarbeiten u. aus diesen in beliebiger Weise die reinen sekundären Amine wiederherzustellen. Beispiele sind

angegeben für die Herst. von *Dimethylnitrosamin* aus *Trimethylaminchlorhyd.* bzw. einem Gemisch aus Tri- u. Dimethylaminchlorhydrat, konz. HCl (D. 1,19 NaNO₂, sowie von *Diäthylnitrosamin* aus *Triäthylamin* in analoger Weise. (D. B. 400313 Kl. 12q vom 3/12. 1921, ausg. 6/8. 1924.) SCHOTTLÄNDER

Holzverkohlungs-Industrie Aktiengesellschaft, Konstanz i. B., Darstell. von *Formaldehyd* durch Oxydation von CH₃OH mit Hilfe von Kontaktstoffen, gek., daß als Kontaktkörper Metallpaare, wie solche durch Erzeugung dünner Schichten von Metallen, insbesondere solcher der Pt-Gruppe, auf anderen Metallen z. B. Ag, erhalten werden, verwendet werden. — Zur Herst. eines Metallpaares behandelt man z. B. das Grundmetall, wie Ag, in Form eines Drahtnetzgewebes mit einer Lsg. des niederzuschlagenden Metalls, wie Pt oder Rh, u. erhält so ein feinverteiltes gut haftendes Nd. auf dem metall. Träger. Die Darst. von CH₃OH unter Benutzung eines solchen Kontaktes erfolgt z. B. derart, daß man in einem Kontaktrohr vorgeschalteten, mit CH₃OH beschickten Gefäß den CH₃OH bei ca. 42° hält u. durch ein zweites auf den Boden des Gefäßes reichendes Rohr einen kräftigen Luftstrom durch den CH₃OH u. dann das CH₃OH-Luftgemisch durch das mit einem Metallpaar beschickte, z. B. aus Cu bestehende Kontaktrohr leitet, das bis nahe Rotglut erhitzt ist. Der h. Katalysator glüht auch ohne äußere Wärmezufuhr weiter. Die Abgase werden durch eine aus einigen mit W. beschickten Waschgefäßen bestehende Vorlage geleitet, in der sich der gebildete CH₂O ansammelt. Durch einfaches Einstellen mit W. auf den gewünschten %-Gehalt erhält man gebrauchsfertige Lsgg. Gegenüber bekannten Verff. gewährleistet die neue Arbeitsweise bei hoher, nahezu theoret. Ausbeute die Gewinnung eines nur solche Mengen nicht umgesetzten CH₃OH enthaltenden CH₃O die ohne CH₂O-Verluste im Fabrikationsgang entfernt werden können. (D. B. 402849 Kl. 12o vom 2/11. 1912, ausg. 19/9. 1924.) SCHOTTLÄNDER

Etablissements Barbet, Paris, Vorrichtung zur Herstellung von Formaldehyd aus Methylalkohol, dad. gek., daß das Katalysatorrohr aus zwei konachsialen Rohren besteht, von denen das eine von der für die Rk. erforderlichen Luft u. das andere von dem aus der katalysierenden M. austretenden Gasdampfgemisch durchströmt wird. — In dem vorderen Teil des Katalysatorrohres befindet sich ein eng zusammengepreßtes Cu-Drahtnetz als Katalysator. Weiter im Inneren ist ein zur Erhitzung der für die Rk. notwendigen Luft dienendes zweites Rohr konachsial zum ersten Rohr angeordnet. Durch einen Hahn wird der Eintritt dieser Luft geregelt. Das Austrittsrohr für die sehr h. Luft ist an ein Zuführungsrohr für den CH₃OH-Dampf angeschlossen, der durch eine Innendüse eintritt u. sich innig mit der h. Luft mischt. Das Gemisch von CH₃OH-Dampf u. Luft befindet sich so beim Eintritt in die katalysierende M. in überhitztem Zustande u. entzieht dieser daher viel weniger Wärme, so daß nicht soviel CH₃OH durch vollständige Verbrennung verschwendet wird. Die aus dem Katalysator austretenden, sehr h. Gas- u. Dämpfe werden in dem sehr engen Ringraum zwischen Innen- u. Außenrohr in einer dünnen Schicht verteilt, so daß gleichzeitig durch beide Rohre eine schnelle Abkühlung stattfindet, wodurch ebenfalls ein weiterer Abbau des CH₃OH vermieden wird. Durch eine Austrittsöffnung entweichen die halb abgekühlten Gase u. gelangen zur Waschvorrichtung u. zum Kondensator. (D. R. P. 403429 Kl. 12o vom 27/10. 1923, ausg. 2/10. 1924. Blg. Prior. 30/10. 1922. F. P. 571904 vom 13/10. 1923, ausg. 26/5. 1924. Blg. Prior. 30/10. 1922. E. P. 206158 vom 25/10. 1923, ausg. 19/12. 1923. Blg. Prior. 30/10. 1922.) SCHOTTLÄNDER

Elektrochemische Werke G. m. b. H. und Heinrich Boßhard, Hermann Röhler und David Strauss, Bitterfeld, Herstellung von Aldol aus Acetaldehyd, dad. gek., daß man auf fl. oder dampfförmigen CH₃CHO unter Druck neutralen oder amphoteren Metalloxyde oder Metallhydroxyde in der Wärme, aber unterhalb

setzungstemp. des Aldols, einwirken läßt. — Beispiele sind angegeben für die Verwendung von $\text{Al}(\text{OH})_3$, Fe_2O_3 , $\text{Sb}(\text{OH})_3$ u. ZnO als Katalysatoren. Das Erhitzen von CH_3CHO in Ggw. dieser Katalysatoren erfolgt unter Druck bei 80° . Eine Verharzung des Aldehyds wird fast ganz vermieden. Erhitzt man das Druckgas auf höhere Temp., z. B. 100° , so gelangt man unmittelbar zu *Crotonaldehyd*. (D. R. P. 400310 Kl. 12o vom 1/10. 1921, ausg. 7/8. 1924.) SCHOTTLÄNDER.

Ernst Zollinger-Jenny, Zürich, Schweiz, *Veresterung organischer Säuren*. (D. R. P. 403644 Kl. 12o vom 15/3 1921, ausg. 30/9. 1924. Schwz. Prior. 11/2. 1920, E. Prior. 8/1. 1918. — C. 1923. IV. 616.) SCHOTTLÄNDER.

Consortium für elektrochemische Industrie G. m. b. H. (Erfinder: Rudolf Ringast und Martin Mugdan), München, *Darstellung von Essigsäureanhydrid*, d. gek., daß *Keten* auf $\text{CH}_3\text{CO}_2\text{H}$ einwirken gelassen wird. — Z. B. wird aus Wasserdampf durch Überleiten über auf 580° erhitzte Tonscherben ein neben unbedeutendem Aceton ca. 12% Keten u. die entsprechende Menge CH_4 enthaltendes Gemisch erzeugt, durch Kühlung von der Hauptmenge des Acetons befreit u. darauf in $\text{CH}_3\text{CO}_2\text{H}$ geleitet. Unter Entw. von Wärme wird in dieser das Keten absorbiert, wobei quantitativ *Essigsäureanhydrid* gebildet wird. Die Absorption erfolgt erst nach Umwandlung sämtlicher $\text{CH}_3\text{CO}_2\text{H}$ in das Anhydrid auf. (D. R. P. 406863 Kl. 12o vom 16/4. 1922, ausg. 11/10. 1924.) SCHOTTLÄNDER.

Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Leverkusen b. Köln a. Rh. (Erfinder: Jürgen Callen, Elberfeld, Johann Huismann, Wiesdorf u. Wilhelm Ketteff, Elberfeld), *Arsinsäuren aliphatischer Carbonsäuren*. (D. R. P. 401993 Kl. 12o vom 19/10. 1920, ausg. 10/9. 1924. — C. 1923. IV. 721. 1924. I. 965 [A. P. 5685].) SCHOTTLÄNDER.

Joseph Schatzkes, Durlach, Baden, *Reinigung von Milchsäure*. (D. R. P. 402785 Kl. 12o vom 28/12. 1920, ausg. 19/9. 1924. — C. 1923. II. 251.) SCHOTTLÄNDER.

The California Cap Company, übert. von: Edward Arthur Barnes, Oakland, California, V. St. A., *Herstellung von Oxalsäure*. Die *Glykolsäure* enthaltende a. affl. von der *Knallquecksilberherst.* wird eingedampft u. mit Oxydationsmitteln behandelt, wobei die *Glykolsäure* in *Oxalsäure* übergeht. Man dampft unter anderem Zusatz von Oxydationsmitteln bis zur beginnenden Krystallisation der *Oxalsäure* ein, filtriert die Krystalle von der Mutterlauge ab u. wäscht sie von anhängenden Verunreinigungen aus. (Can. P. 235148 vom 3/1. 1923, ausg. 23/10. 1924.) SCHOTTLÄNDER.

Nitrogen Products Company, New York, V. St. A., *Herstellung von Oxamid*. Man leitet *Dicyan* unter Kühlung in wss. HCl oder HBr . — Zweckmäßig arbeitet man unter Druck u. in Ggw. eines Katalysators, wie Cu_2Cl_2 . Das Cyangas kann auch elektrol. Zers. von NaCN gewonnen werden, unter gleichzeitiger B. von H_2 u. H_2O . Die Ausbeute an *Oxamid* wird bei nicht genügender Kühlung der *Oxalsäure* beeinträchtigt, da die Verseifung alsdann bis zur B. von *Oxalsäure* weitergeht. (N. P. 38642 vom 30/6. 1921, ausg. 24/12. 1923. A. Prior. 23/2. 1920.) SCHOTTLÄNDER.

Forod von Bichowsky und John Harthan, Glendale, V. St. A., *Herstellung von Cyaniden und Cyanamiden*. Silicium- oder Aluminiumnitrid oder Gemische dieser mit Titanitrid werden mit Eisencarbid u. dem Alkali- oder Erdalkalisalz (organ. oder anorgan. Säure, vorzugsweise CO_2 , mit oder ohne Zusatz eines Katalysators) vermengt u. die M. unter Ausschluß oxydierender Gase auf hohe Temp. erhitzt. Bei Verwendung von Alkalisalzen entsteht ausschließlich, mit BaCO_3 vorzugsweise Cyanid, während mit CaCO_3 vorzugsweise Cyanamid erhalten wird. (U. S. P. 1506269 vom 23/2. 1921. ausg. 26/8. 1924.) KÜHLING.

Hans P. Kaufmann, Jena, *Herstellung von Sulfocyanverbindungen*, dad. gek., man freies *Rhodan* auf ungesätt. organ. Verbb. einwirken läßt. — (Hierzu vgl.

auch KAUFMANN u. LIEPE, Ber. Dtsch. Pharm. Ges. **33**. 139; C. **1923**. III. 614; KAUFMANN, LIEPE u. THOMAS, Ber. Dtsch. Chem. Ges. **56**. 2514; C. **1924**. I. 2 (D. R. P. **404175** Kl. 12o vom 10/12. 1922, ausg. 13/10. 1924.) SCHOTTLÄNDER

Chemische Fabriken vorm. Weiler-ter Meer, Uerdingen, Niederrh., *Herstellung von Polythionaten aromatischer Basen*, darin bestehend, daß man Polythionsäurelsgg. mit primären aromat. Aminen versetzt oder Polythionsäuren in G. primärer aromat. Amine entstehen läßt oder l. Polythionate mit Salzen der genannten Amine umsetzt. — Die meist gut krystallisierenden u. beständigen S finden außer auf engerem chem.-techn. Gebiete auch für therapeut. Zwecke u. Schädlingsbekämpfung Verwendung. *Anilintetrathionat*, zers. sich trocken erst o. halb 180° unter Entw. von SO₂, wird z. B. durch Erhitzen eines Gemisches wss. Na₂S₂O₃-Lsg. u. einer Lsg. von Anilin u. As₂O₃ in 20%ig. HCl auf 50° halten. — Durch Umsetzung von Na₂S₃O₆ mit Anilinchlorhydrat in Ggw. W. erhält man *Anilintrithionat* u. von o-Toluidinchlorhydrat mit Na₂S₄O₆ *o-Toluidintetrathionat*. (D. R. P. **400192** Kl. 12q vom 10/10. 1922, ausg. 1924.) SCHOTTLÄNDER

Chemische Fabriken vorm. Weiler-ter Meer, Uerdingen, Niederrh., *Herstellung von Thiosulfaten aromatischer Amine*, darin bestehend, daß man Alkylthiosulfate mit Salzen primärer aromat. Monamine in wss. Lsg. umsetzt. — *Anilinthiosulfat* aus w. W. Krystalle, trocken bis 80° beständig, bei höherer Temp. in Anilin, SO₂ u. S zers. — *α-Naphthylaminthiosulfat* zeigt analoges Verh. wie Anilinsalz, ist aber noch etwas beständiger. Infolge der Fähigkeit, in wss. Lsg. ganz allmählich unter Ausscheidung von S u. SO₂ zu zerfallen, können die Präparate zur Bekämpfung schädlicher Organismen verwendet werden. (D. R. P. **400192** Kl. 12q vom 25/10. 1922, ausg. 2/8. 1924.) SCHOTTLÄNDER

The Selden Company, Pittsburgh, Pennsylvania, V. St. A., *Aminocymol*. dem Ref. nach Schwz. P. 92687; C. **1922**. IV. 944 ist nachzutragen, daß das N-cymol durch Red. mit Fe u. HCl oder mit H₂ in Ggw. eines Katalysators *Aminocymol* übergeführt werden kann. Man behandelt das Reaktionsgemisch verd. H₂SO₄ u. trennt das *Sulfat* der Base von Terpenen u. anderen Verunreinigungen durch Dest. mit Wasserdampf, wobei die Nebenprodd. übergehen. Die wss. Lsg. des Sulfats wird mit Alkali oder Ca(OH)₂ zerlegt u. das ausgeschiedene Öl durch Dampfdest. übergetrieben. (Oe. P. **96518** vom 21/6. 1919, ausg. 1924. E. Prior. 20/2. 1919.) SCHOTTLÄNDER

Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning, Höchst a. M., übert. **Karl Streitwolf**, Frankfurt a. M., *Herstellung von in wässriger Lösung haltbaren Derivaten des Arsenobenzols*. Aminobstitutionsprodd. des Arsenobenzols werden l. Formaldehyddisulfitderiv. von Aminosubstitutionsprodd. des Arsenobenzols in wss. Lsgg. behandelt u. die Reaktionsprodd. durch A. oder Ä. ausgefällt. — Beispiele sind angegeben für die Umsetzung der Ag-Verb. des Na-Salzes des 4,4'-Diamino-3,3'-diaminoarsenobenzols mit der Monoformaldehyddisulfitverb. des 4,4'-Diamino-3,3'-diaminoarsenobenzols, — der Mono- u. Diformaldehyddisulfitverb. des 4'-Arsenobenzols, — sowie der Diformaldehyddisulfitverb. des 4,4'-Bismethylanilins, 3,3'-5,5'-tetraminoarsenobenzols mit der AgNa-Verb. des Dioxydiaminoarsenobenzols. Die braunen bis braunschwarzen, pulverförmigen Prodd., sind in W. mit alkalischen Lsgg. l., in Gemischen aus A. u. Ä. unl. Beim Einleiten von CO₂ in die wss. Lsg. werden diese klar. Die Prodd. finden therapeut. Verwendung. Die Vereinigung der einzelnen Komponenten kann auch in fester Form erfolgen. (A. P. **1506460** vom 1/12. 1923, ausg. 26/8. 1924. E. P. **204721** vom 29/9. 1923, ausg. 28/11. 1923. D. I. 29/9. 1922.) SCHOTTLÄNDER

Howards & Sons Limited, Uphall Works, Ilford, Essex, England, und **John William Blagden**, London, *Herstellung von Thymol (1-Methyl-4-i-propyl-3-oxybenzol)*, darin bestehend, daß man auf *m*-Kresol *i*-Propylalkohol in Ggw. von H_3PO_4 als Kondensationsm. unter Erwärmen einwirken läßt. — 2. darin bestehend, daß man wecks Gewinnung einer dem Thymol isomeren Verb. die Kondensation bei erhöhter Temp., etwa 150° , bewirkt. — Man erhitzt z. B. ein Gemisch aus *m*-Kresol H_3PO_4 , D. 1,85, unter langsamer Zugabe von *i*-Propylalkohol, der ebenfalls in H_3PO_4 gel. ist, 4–10 Stdn. auf etwa 70 – 80° u. dest. das in befriedigender Ausbeute erhaltene *Thymol* ab. Steigert man die Temp. bei der Kondensation auf 150° , so wird als Hauptprod. eine dem Thymol isomere Verb., $\text{C}_{10}\text{H}_{14}\text{O}$, F. 114° , S. 244 – 245° erhalten, vollkommen l. in den gewöhnlichen organ. Lösungsm. u. in Äther, in k. W. nahezu unl., in h. W. zl., mit FeCl_3 keine Färbung gebend. Das Prod. hat wertvolle antisept. Eigenschaften. (D. R. P. 400969 Kl. 12 q vom 9/3. 1923, ausg. 23/8. 1924. E. Prior. 10/3. 1922. E. P. 200151 vom 10/3. 1922, ausg. 2/8. 1923.)

SCHOTTLÄNDER.

Badische Anilin- & Soda-Fabrik (Erfinder: **Heinrich Ulrich**, Ludwigsburg a. Rh., *Darstellung reiner Phosphorsäureester von Phenolen*, darin bestehend, daß man in Abänderung des D. R. P. 396784 der Behandlung der fl. phenolhaltigen Prodd. mit verd. Alkalilauge eine solche mit poröser Kohle nachfolgen läßt, worauf die Behandlung mit verd. Alkalilauge ganz oder teilweise durch eine Behandlung mit poröser Kohle ersetzt. — Hierdurch wird eine noch vollkommenere Reinigung der Triarylphosphate von riechenden Beimischungen, insbesondere von *o*-Kresol u. *o*-Naphthol, erreicht als bei der Behandlung mit Alkalilauge allein. Man verrührt z. B. ein freies Kresol enthaltendes Arylphosphat mit akt. Kohle 1–2 Stdn., zweckmäßig bei höherer Temp. Nach dem Absaugen ist das Prod. farblos u. frei von Kresol, sowie von Naphthalin u. Pyridin. (D. R. P. 401872 Kl. 12 q vom 4/3. 1922, ausg. 10/9. 1924. Zus. zu D. R. P. 396784; C. 1924. II. 12 q.)

SCHOTTLÄNDER.

Hans P. Kaufmann, Jena, *Herstellung von Verbindungen aus Benzoldicarbonat und Salicylsäure oder deren Substitutionsprodukten*, dad. gek., daß man auf Alkalisalze der Salicylsäure, deren Ester oder Kernsubstitutionsprodd. Chloride der Benzoldicarbonsäuren oder deren Kernsubstitutionsprodd., mit oder ohne Zusatz eines Lösungsm., einwirken läßt. — Die Prodd. finden teils therapeut. Verwendung; geeignete Nitro- u. Aminoderivv. können auch als Farbstoffkomponenten benutzt werden (hierzu vgl. auch H. P. u. W. KAUFMANN, (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 55. 282; C. 1922. I. 543, sowie KAUFMANN, TEGTMEYER, SCHREIBER u. BARTENSTEIN, Ber. Dtsch. Pharm. Ges. 33. 120; C. 1923. III. 617.) (D. R. P. 400970 Kl. 12 q vom 13/1. 1922, ausg. 27/8. 1924.)

SCHOTTLÄNDER.

F. Hoffmann-La Roche & Co. Akt.-Ges., Basel, Schweiz, *Darstellung der Alkalisalze der Benzylphthalamidsäure*, dad. gek., daß man in weiterer Ausbeute des D. R. P. 381713 die Erdalkalisalze ohne vorheriges Eindampfen aus wässr. Lsgg. auskrystallisieren läßt, welche von dem entsprechenden Metallhydroxyd gel. enthalten. — Durch den Zusatz des entsprechenden Metallhydroxyds, der beim Abkühlen krystallisierenden Lsg. der Erdalkalisalze der Benzylphthalamidsäure wird eine Zers. der wässr. Lsgg. durch Anziehen von CO_2 aus der Luft vermieden u. das betreffende Salz in reiner Form gewonnen. Es ist nur eine geringe Konz. der Metallhydroxyds erforderlich. Beispiele sind angegeben für die Erst. des benzylphthalamidsäuren Ca, $(\text{C}_{15}\text{H}_{12}\text{O}_3\text{N})_2\text{Ca}$, aus Benzylphthalamid (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 20. 227 [1887]). (D. R. P. 401076 Kl. 12 o vom 25/12. 1921, ausg. 28/8. 1924. Schwz. Prior. 5/3. 1921. Zus. zu D. R. P. 381713; C. 1923. IV. 932.)

SCHOTTLÄNDER.

Knoll & Co. Chemische Fabrik (Erfinder: **Hermann Vieth**), Ludwigshafen a. Rh., *Herstellung von organischen Quecksilberverbindungen*, 1. dad. gek., da man auf Hg-Verbb. mit einem organ. Radikal *Mercaptane* einwirken läßt. 2. darin bestehend, daß man solche Mercaptane verwendet, die in ihrem organ. Radikal noch eine Säuregruppe enthalten. — Die Umsetzung der organ. Hg-Verb. R·Hg·OH mit den Mercaptanen R'·SH [R oder R' = C₂H₅—, C₆H₅—, —CH₂CO₂H—, —C₆H₄·CO₂H, —C₆H₄·NH₂, —C₆H₃(OH) (AsO·[OH]₂) usw.] führt zu Verbb. d. Zus. R·Hg·S·R' u. erfolgt bereits bei gewöhnlicher Temp. u. in verd. wss. Lsg. Das Hg in diesen Verbb. ist viel fester gebunden als in den S-freien Verbb., etwa in ähnlicher Weise wie in den Hg-Dialkylen; manche sind gegen Hydrosulfit n. in alkal. Lsg., andere dagegen auch in neutraler oder selbst saurer Lsg. beständig. Sie finden therapeut. Verwendung. *Mercuribenzoatthiosalicylat* C₆H₄(CO₂H)·Hg·C₆H₄·CO₂H, aus *Mercuribenzoësäureanhydrid* (I) u. dem Na-Salz der *Thiosalicysäure* (II) schwach gelblich gefärbtes Pulver, sl. in W. mit neutraler Rk., die Lsg. enthält ca. 10% Hg. Das Hg kann weder durch Alkali noch durch H₂S noch durch reduzierende Mittel in neutraler oder alkal. Lsg. ohne weiteres nachgewiesen werden; erst durch längere Einw. oder durch oxydierende bezw. saure Mittel, wie Cl₂ oder J, wird es allmählich abgespalten. — Etwas weniger beständig ist d. *Verb. aus Mercurisalicylsäure u. Thiosalicylsäure* C₆H₃(OH)·(CO₂H)·Hg·S·C₆H₄·CO₂H. — Na-Salz der *Mercuribenzoethioglykolsäure*, farblos in W. ll. Pulver, wird aus einer Lsg. von I in verd. NaOH u. *Thioglykolsäure* SH·CH₂·CO₂H erhalten. Die durch Erhitzen von p-Oxyphenylarsinsäure mit HgO oder Hg-Acetat erhaltene *Mercurioxybenzolarsinsäure* gibt mit einer alkal. Lsg. von II das Na-Salz der *Mercurioxybenzolarsinsäurethiosalicylsäure* C₆H₃(OH)·(AsO[OH]₂)·Hg·S·C₆H₄·CO₂H. Aus o-Mercuriphenolanhydrid in alkal. Lsg. u. II entsteht das Na-Salz d. *Verb. C₆H₄(OH)·Hg·S·C₆H₄CO₂H*, deren wss. Lsg. durch Na₂S₂O₄ nicht reduziert wird. — Na-Salz der *Thiophenolmercuribenzoësäure* wird durch Einw. einer alkal. Lsg. von *Thiophenol* auf ein Lsg. von I in verd. NaOH erhalten. — *Äthylquecksilberthiosalicylsäure*, C₂H₅·Hg·S·C₆H₄·CO₂H wird aus einer Lsg. von II in verd. NaOH u. einer wss.-alkoh. Lsg. von Äthylquecksilberchlorid C₂H₅·HgCl, mit Zusatz von 10%ig. NaOH gewonnen. (D. R. P. 399904 Kl. 12q vom 28/2. 1919; ausg. 2/8. 1924.)

SCHOTTLÄNDER.

Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Leverkusen b. Köln a. R. überf. von: **Werner Schulemann**, Vohwinkel, **Ludwig Schütz** und **Kurt Meisburg**, Elberfeld, *Herstellung von Alkaminestern aromatischer Aminosäuren*. Alkamine der allgemeinen Formel: (R)₂N·CH₂·CH(R)·CH(R)·OH [R = Alkyl] werden mit arom. Aminosäuren, wie *Aminobenzoësäuren* oder *Aminozimtsäure* verestert. Das Alkamin wird z. B. mit p-Nitrocinnamoylchlorid behandelt u. der Nitroester reduziert oder man erhitzt die Alkamine mit p-Aminobenzoësäurealkylestern. Folgendes Beispiel ist angegeben: *α,β-Dimethyl-γ-dimethylaminopropylalkohol* (CH₃)₂CH·CH₂·CH(CH₃)·CH(CH₃)OH wird in Bzl. gel., die k. Lsg. mit einer solchen von p-Nitrobenzoylchlorid in Bzl. vermischt, das Gemisch auf 100° erhitzt, mit W. versetzt, das Bzl. abgetrennt u. aus der wss. Lsg. der p-Nitrobenzoësäure-*α,β-dimethyl-γ-dimethylaminopropylester* durch Na₂CO₃ abgeschieden. Bei der Red. mit Sn·HCl bei ca. 60° geht er in den p-Aminobenzoësäure-*α,β-dimethyl-γ-dimethylaminopropylester*, krystallin. erstarrendes Öl, F. 81—82°, über, der 2 a. C-Atome enthält u. sich durch fraktionierte Krystallisation aus Lg. in die opt.-akt. Isomeren v. legen läßt. Das in W. l. rac. Chlorhydrat wird durch fraktionierte Krystallisation aus A. ebenfalls in die opt.-akt. Antipoden gespalten, von denen das eine laee Nadeln, F. 216—217°, das andere bei 178° schm. Krystalle bildet. — p-Aminobenzoësäure-*α-äthyl-β-methyl-γ-dimethylaminopropylester*, rac. Chlorhydrat F. 167°. — p-Aminobenzoësäure-*α,β-diäthyl-γ-diäthylaminopropylester*, rac. Chlorhydrat F. 146°, —

Aminobenzoessäure- α -äthyl- β -methyl- γ -diäthylaminopropylester, rac. Chlorhydrat F. 178°. ie wss. reizlosen Lsgg. der Salze wirken örtlich anästhesierend u. finden therapeut. Anwendung. Zur Sterilisation lassen sie sich unzers. kochen. (A. P. 1474567. vom 1/12. 1922, ausg. 20/11. 1923.)

SCHOTTLÄNDER.

Geza Austerweil und Louis Peuffailit, Paris, *Verfahren zum Trennen von Pinen und Camphen*, dad. gek., daß ein Gemisch dieser beiden Terpen-KW-stoffe mit W. gemischten Lösungsm., deren W.-Gehalt je nach der angewandten emp. u. Konz. wechselt, gewaschen u. die in die Waschlfl. übergegangenen Terpene entsprechend Weise durch Fällung oder Dest. oder sonst in angemessener Weise abgeschieden werden. — Während z. B. *Pinen* in ca. 55 Vol.-%ig. A. oder 2 Vol.-%ig. CH₃OH bei n. Temp. fast unl. ist, ist *Camphen* in diesen Lösungsm. niger Konz. bei n. Temp. ziemlich gut, u. bei leicht erhöhter Temp., vollständig l. n. Gegensatz zu A. u. CH₃OH, die auch verd. Camphen besser lösen als Pinen, erhält sich n-Propylalkohol u. Pyridin, die wieder Pinen besser lösen als Camphen. — Z. B. trübt sich ein Gemisch von 80% Camphen u. 20% 92,5%ig. A. bei 30° unter Krystallausscheidung, während ein Gemisch von 80% Pinen u. 20% 92,5%ig. A. sich erst bei 63° trübt. Dagegen trübt sich ein Gemisch aus 80% Camphen u. 20% n-Propylalkohol bei +18°, während ein Gemisch aus 80% Pinen u. 20% Propylalkohol sich erst bei -62°, etwa dem F. des Pinens, trübt. Die Patentschrift enthält ein Beispiel für die Trennung eines Gemisches von 35% Camphen u. 65% Pinen mit Hilfe von 55 Vol.-%ig. A. bei 15°. (D. R. P. 400253 Kl. 12 vom 6/9. 1922, ausg. 6/8. 1924.)



SCHOTTLÄNDER.

Geza Austerweil und Louis Peuffailit, Paris, *Verfahren zur Trennung von Pinen und Camphen*, dad. gek., daß das Gemisch unter Druck fast auf die Schmelztemp. des Pinen-Camphen-Eutektikums abgekühlt wird u. nach Ausscheidung des Pinens das zurückbleibende Pinen-Camphen-Gemisch behufs Ausscheidung eines Camphenanteiles vom Druck befreit, aber auf derselben Temp. gehalten wird. — Z. B. wird ein Gemisch von 10% Camphen u. 90% Pinen in einen mit einem Kompressor verbundenen dickwandigen Cu-Zylinder gebracht, in den ein sehr feines, als Tauchfilter wirkendes Tongefäß taucht. Das Ganze kann luftdicht verschlossen werden, so daß nur ein Rohrstutzen, der mit dem hohlen Tauchfilter verbunden ist, herausragt. Der Cu-Zylinder wird in fl. Luft eingetaucht u. der Kompressor in Bewegung gesetzt. Bei -85° u. ca. 50 at. Druck wird durch das Tongefäß das Camphen-Pinengemisch abgeblasen u. in einem anderen, mit fl. Luft abgekühlten Gefäß gesammelt, wo sich nun das Camphen abscheidet. Das Pinen-Camphen-Eutektikum kann aus diesem zweiten Gefäß einfach mittels porösen Tauchfilters abgesaugt werden; es bleibt Camphen zurück. Im ersten Cu-Zylinder bleibt das ausgefrorene Pinen zurück. Das abwechselnde Komprimieren u. Ausdehnen kann fast bis zur endgültigen Ausscheidung des gesamten Camphens wiederholt werden. Bei entsprechender Wärmeausschaltung ist das Verf. wirtschaftlich u. macht auch die Verff. der teilweisen katalyt. Umwandlung von Pinen in Camphen möglich u. wirtschaftlich. (D. R. P. 402995 Kl. 12 vom 31/8. 1922, ausg. 24/9. 1924.)

SCHOTTLÄNDER.

Ludwig Schmidt, Luzern, Schweiz, *Darstellung von Bornyl- und i-Bornyl-tern organ. Säuren aus Pinen oder pinenhaltigen Ölen*, 1. darin bestehend, daß die betreffenden organ. Säuren mit Pinen oder pinenhaltigen Ölen unter Zusatz von O₂ erhitzt werden. — 2. darin bestehend, daß Pinen oder pinenhaltige Öle mit Anhydriden organ. Säuren in Ggw. von Borsäuren erhitzt werden. — Das O₂ spaltet im Gegensatz zu B(OH)₃ kein Reaktionswasser ab u. ermöglicht in kurzer Zeit die nahezu quantitative Veresterung des Pinens. Besonders vorteilhaft ist man sowohl das Bortrioxyd als auch die betreffenden organ. Säuren allmählich in Entstehungszustände auf das Pinen oder die pinenhaltigen Öle zur Einw. ge-

langen, indem man die Anhydride der betreffenden organ. Säuren mit $B(OH)_3$, HBO_2 oder $H_2B_4O_7$ in dem Reaktionsgemisch im Sinne der nachstehenden Gleichung umsetzt:




Es entstehen in allen Fällen ausschließlich die Bornyl- u. i-Bornylester der angewandten organ. Säuren bzw. Säureanhydride, ohne B. anderer Prodd., d. sich nach erfolgter Verseifung ohne weiteres zur Herst. von *Campher* verwenden lassen. Das Arbeiten unter Druck im Autoklaven ist zu vermeiden. Beispiele sind angegeben für die Herst. von Gemischen aus: Bornyl- u. i-Bornylacetat aus Pinen oder Terpentinöl, Eg. u. B_2O_3 , bzw. Essigsäureanhydrid u. HBO_2 oder $H_2B_4O_7$, — Bornyl- u. i-Bornylbenzoat aus Pinen oder Terpentinöl, Benzoesäure u. B_2O_3 , bzw. Benzoesäureanhydrid u. $B(OH)_3$, — i-Bornyl- u. Bornylsalicylat aus Pinen oder Terpentinöl, Salicylsäure u. B_2O_3 , — sowie Bornyl- u. i-Bornylphthalat aus Pinen oder Terpentinöl, Phthalsäureanhydrid u. $B(OH)_3$. (D. R. P. 40187 Kl. 12o vom 3/1. 1917, ausg. 10/9. 1924.) SCHOTTLÄNDER.

Burckhardt Helferich, Frankfurt a. M., *Darstellung der Acetale von Aldehyden und Ketonen*, darin bestehend, daß man Orthokieselsäureester auf Aldehyde oder Ketone bei gewöhnlicher oder erhöhter Temp. in Ggw. geringer Mengen Säure oder sauer reagierender Stoffe als Katalysatoren einwirken läßt. — Nach dem Verlassen sich auch empfindliche Aldehyde in die entsprechenden Acetale überführen: *Benzophenondimethylacetal*, aus mit CH_3ONa alkal. gemachtem CH_3OH Krystall. wird durch Einw. von Orthokieselsäuremethylester auf eine absol. methylalkoh. Lsg. von Benzophenon in Ggw. von wenig methylalkoh. HCl erhalten. Entsprechend *Benzaldehyddiäthylacetal*, Kp.₁₃ 98—100° in 81% Ausbeute (hierzu vgl. auch HELFERICH u. HAUSEN, Ber. Dtsch. Chem. Ges. 57. 795; C. 1924. II. 31) (D. R. P. 404256 Kl. 12o vom 22/9. 1923, ausg. 13/10. 1924.) SCHOTTLÄNDER.

Durand & Huguenin S. A., Basel, Schweiz, *Darstellung von hochchlorierten stickstoffhaltigen hydroaromatischen Produkten*, dad. gek., daß man arom. Amine in einem indifferenten Lösungsm. löst, in diese Lsg. trockenes HCl -Gas bis zur Sättigung einleitet u. hernach mit Cl_2 -Gas chloriert. — Wesentlich für den Erfolg des Verfahrens ist der gänzliche Ausschluß von W. u. die Verwendung eines ganz indifferenten, keine Hydrolyse zulassenden Lösungsm., da andernfalls sofort eine Verseifung der entstehenden N-haltigen Chloradditionsprodd. zu den entsprechenden Ketonen erfolgt. Man leitet z. B. in die Lsg. des betreffenden arom. Amins in Bzl. bzw. Chlorbenzol, HCl -Gas bis zur Sättigung, hierauf Cl_2 , gegebenenfalls unter nachfolgendem Erhitzen auf ca. 100° ein. Aus *Anilin* in Chlorbenzol entsteht so das *Oktachlorchlorketimidohexahydrobenzol* (I.), aus Bzn. Krystalle, F. 151°, u. in Bzl. das *Hexachlorchlorketimidotetrahydrobenzol* (II. bzw. III.), Krystalle, F. 125°. Beim Erhitzen beider Stoffe auf ca. 170° tritt unter Cl_2 -Entw. Zers. ein. — Die beiden Naphthylamine gehen unter Aufnahme von 6 Cl-Atomen in chlorierte Tetrahydronaphthylamine über, u. zwar das 1-Naphthylamin in Chlorbenzol gel. in das *Pentachlor-1-chlorketimidotetrahydronaphthalin* (IV.), aus PAe. prismat. Krystalle, F. 122°, u. das 2-Naphthylamin in benzol. Lsg. in das *Pentachlor-2-chlorketimidotetrahydronaphthalin* (V.), Prismen, F. 118,5°. — Auch in die Aminoanthrachinone treten 6 Cl-Atome ein: 1-Aminoanthrachinon liefert in Bzl. gel. ein *Pentachlor-1-chlorketimidotetrahydroanthrachinon* (VI.), hellgelbe Prismen, F. 190° (Zers.) u. 2-Aminoanthrachinon das *Pentachlor-2-chlorketimidotetrahydroanthrachinon*, rhomb. Blättchen, F. 210°. Die Prodd. sind wertvolle Ausgangsstoffe für die Herst. von Farbstoffen. — Geht man an Stelle der unsubstituierten arom. Amine der Benzol- u. Naphthalinreihe von den entsprechenden, negative Substituenten enthaltenden Aminen, wie chlorierten

ler nitriertem Anilin aus, so kann die Chlorierung der Basen auch ohne vorhergehende Überführung in die Chlorhydrate erfolgen, wobei jedoch ebenfalls jegliche gw. von W. sorgfältig ausgeschlossen werden muß u. der Zusatz von indifferenten Lösungsm. erforderlich ist. Die beiden, die negativen CO-Gruppen substituiert haltenden *Aminoanthrachinone* lassen sich unmittelbar durch Einw. von Cl₂ in gw. des indifferenten Lösungsm. in die hochchlorierten hydroaromat., N-haltigen rodd. überführen. Leitet man z. B. in die eiskalte Lsg. von *2,5-Dichlor-1-aminoanzol*, bezw. *Chloranilin* in Chlorbenzol Cl₂ ein u. erhitzt schließlich bis zur völligen sg. unter weiterem Einleiten von Cl₂ auf 100°, so werden 8 Cl-Atome aufgenommen man erhält das *Heptachlorchlorketimidotetrahydrobenzol* (VII. bezw. VIII.), aus



Ae. farblose Blättchen, F. 125°, mit 76,2% Cl. — In analoger Weise gewinnt man is *1,3-Dichlor-2-naphthylamin* bezw. aus *1-Chlor-2-naphthylamin* das *Chlorderiv.* (V.), — aus *2,4-Dichlor-1-naphthylamin* das *Chlorderiv.* (IV.), — aus *2-Aminoanthrachinon* als *Pentachlor-2-chlorketimidotetrahydroanthrachinon* — u. aus *1-Aminoanthrachinon* als *Chlorderiv.* (VI.). (D. R. P. 400254 Kl. 12o vom 24/2. 1922, ausg. 13/8. 1924. . P. 562566 vom 22/2. 1923, ausg. 14/11. 1923. D. Priorr. 23/2. u. 31/5. 1922. . P. 193843 vom 20/2. 1923, ausg. 25/4. 1923. D. Prior. 23/2. 1922 u. E. P. 18676 [Zus-Pat.] vom 30/5. 1923, ausg. 1/8. 1923. D. Prior. 31/5. 1922. Schwz. P. 14791 vom 21/2. 1923, ausg. 16/5. 1924. D. Prior. 23/2. 1922 u. Schwz. PP. 15644, 105645, 105646, 105647, 105648 [Zus-Patt.] vom 21/2. 1923, ausg. 1/7. 1924. D. Prior. 23/2. 1922.)

SCHOTTLÄNDER.

Durand & Huguenin S. A., Basel, Schweiz, Herstellung von chloresubstituierten aromatischen Aminen. Die nach den Verff. des D. R. P. 400254 u. des E. P. 198676; erst. Ref. erhältlichen hochchlorierten, N-haltigen hydroaromat. Prodd. werden unter Vermeidung einer Hydrolyse mit geeigneten Reduktionsmitteln behandelt — die Red. verläuft unter teilweiser Abspaltung von Cl₂ u. Regenerierung der NH₂-gruppe. Man kann auch in stark saurer Lsg. arbeiten, wenn die Red. schnell durchgeführt wird. Starke Reduktionsmittel, wie Zn u. HCl, spalten mehr Cl-Atome als schwache, wie Na₂S in alkoh. oder methylalkoh. Lsg. oder A. allein. Das erf. führt in guten Ausbeuten zu teilweise noch nicht hergestellten Cl-Substitutionsrodd. primärer arom. Amine. Folgende Beispiele sind angegeben: *Hexachlorchlorketiminotetrahydrobenzol* geht beim Behandeln mit methylalkoh. Na₂S in das *3,4,6-Tetrachloranilin*, aus PAe. Krystalle, u. das *Oktachlorchlorketiminohexahydrobenzol* analog in das *2,3,4,5,6-Pentachloranilin* über. — Behandelt man das *Pentachlor-2-chlorketiminotetrahydronaphthalin* mit absol. alkoh. Na₂S erst bei 30 u. dann bei 100°, so gewinnt man das *1,3,4-Trichlor-2-naphthylamin*, aus Bzl. Krystalle, in einer Ausbeute von 90% — u. aus *Pentachlor-1-chlorketiminotetrahydronaphthalin*, analog das *2,3,4-Trichlor-1-naphthylamin*, F. 162°. — Durch vorsichtige Red. des *Pentachlor-3-chlorketiminotetrahydronaphthalin* mit Zn-Staub u. 30%ig. HCl unter Vermeidung eines Säureüberschusses, entsteht, neben wenig Naphthol, das *1,3-* bezw. *4-Dichlor-2-naphthylamin*, aus CH₃OH Krystalle, F. 93,5°. — *Pentachlor-1-chlorketiminotetrahydroanthrachinon* gibt beim Erhitzen mit A. unter Rückflußkühlung

das 2,3,4-Trichlor-1-aminoanthrachinon, F. 196°, u. bei der Red. mit einer Lsg. v. SnCl₂ in methylalkoh. HCl ein Dichlor-1-aminoanthrachinon, aus Bzl. Krystal F. 204°. (E. P. 217753 vom 4/6. 1923, ausg. 17/7. 1924. F. P. 566903 vom 31. 1923, ausg. 22/2. 1924. D. Prior. 3/6. 1922.) SCHOTTLÄNDER.

Eduard Kopetschni, Graz, Österreich, *Darstellung von 1-Oxy-2-aminoanthrachinon und dessen Derivaten*, dad. gek., daß man in 1-Stellung eine Halogensäure enthaltende Halogen-2-acylaminoanthrachinone mit Salzen aliph. Carbonsäuren zweckmäßig bei Ggw. von höher sd. Lösungsm., erhitzt. — Wird z. B. 1-Chlor-2-acetaminoanthrachinon mit entwässertem K-Acetat, Na-Acetat, Gemischen beider oder Salzen anderer organ. Säuren, wie Formiaten, verschmolzen oder in Ggw. v. Nitrobenzol zum Sieden erhitzt, so geht es in die O,N-Diacetylverb. des 1-Oxy-2-aminoanthrachinons über, aus Eg. bräunlichgelbe Prismen, F. nach vorherige Sintern (ab 200°) 211° unter Braunfärbung, sl. in Eg., A. Toluol in der Wärme in k. konz. H₂SO₄ mit gelber, beim Erwärmen in braunrot umschlagender Farbe. W. fällt aus der schwefelsauren Lsg. 1-Oxy-2-aminoanthrachinon. Dessen N. Salz, rotbraune Krystalle, entsteht auch durch Kochen des Diacetylderiv. mit alkoh. wss. NaOH, aus Toluol dunkelbraune Nadeln, F. 257—258°. — Kocht man 1,3-Dibrom-2-diacetaminoanthrachinon, F. 205°, mit gleichen Teilen entwässerten Na- u. K-Acetat u. Nitrobenzol, so entsteht aus ihm das 1-Acetoxy-2-diacetamino-3-bromanthrachinon u. aus diesem beim Verseifen mit alkoh.-wss. NaOH das 1-Oxy-2-amino-3-bromanthrachinon, dunkelbraunes Pulver. (D. R. P. 401727 Kl. 12 vom 6/2. 1921, ausg. 10/9. 1924.) SCHOTTLÄNDER.

Leopold Weil und Chemische Fabrik in Billwärdern vorm. Hell & Sthamer A.-G., Hamburg, *Darstellung von reinem Carbazol*, dad. gek., daß man Rohcarbazol zusammen mit hochsd. KW-stoffen oder anderen hochsd. Stoffen des — Z. B. wird Rohcarbazol von 48% Reinheitsgrad mit Gasöl D. 0,84, Kp. 240 bis 280°, gewonnen durch Dest. von gewöhnlichem Petroleum mit Wasserdampf u. Entfernung der niedrigsd. KW-stoffe, gemischt. Bei ca. 200° dest. das Gasöl mit Carbazol über. Aus dem Destillat krystallisiert beim Erkalten das reine Carbazol wird abgesaugt, mit Bzn. nachgewaschen u. getrocknet oder stark abgepreßt. Es hat einen Reinheitsgrad von ca. 90%, der durch wiederholte Dest. oder Krystallisation auf 95% erhöht werden kann. Die Dest. des Rohcarbazols kann auch unter gleichzeitigem Einleiten von überhitztem Wasserdampf oder im Vakuum ausgeführt werden. Außer Gasöl D. 0,84 eignen sich auch andere organ. Lösungsm. Kp. 200—360°, wie Braunkohlengasöl, Braunkohlenteeröle, Paraffinöle, Naphthalinöle, Chinolin, Chinaldin, Dimethylnaphthalin u. Tetrachlorbenzol. (D. R. P. 386744 Kl. 12p vom 8/9. 1922, ausg. 16/8. 1924.) SCHOTTLÄNDER.

Badische Anilin- & Soda-Fabrik, Ludwigshafen a. Rh., *Darstellung von wasserlöslichen Kondensationsprodukten*, darin bestehend, daß man in Abänderung des D. R. P. 349727 die hydroxylfreien Deriv. der Sulfosäuren arom. KW-stoffe zur Kondensation verwendet. — Man sulfoniert z. B. α -Chlornaphthalin mit konz. H₂SO₄ u. erhitzt die rohe Sulfosäure 20 Stdn. unter stark vermindertem Druck auf 150—155°. Die sirupartige, in W. klar l. M. fällt Alkaloid- u. Leimlsgg. — Erhitzt man in h. W. gel. carbazolsulfosaures Na, das mit Monohydrat im Vakuum eingedampft wurde, nach Zusatz weiterer Mengen Monohydrat so lange im Vakuum auf ca. 150°, bis die leimfällende Wrkg. nicht mehr zunimmt, so entsteht ein festes pulverisierbares Prod. — Man kann auch Gemische von Sulfosäuren der Deriv. der Bzl.- u. Naphthalinreihe oder des Carbazols gleichzeitig aufeinander zur Einw. bringen. Die Säuren bilden in W. ll. Alkalisalze. Weder diese, noch die freien Säuren geben in wss. Lsg. mit FeCl₃ Färbungen. Die Kondensation erfolgt unter Abspaltung von W. Auch die hier erhaltenen Prodd. sind der verschiedensten

techn. Anwendung fähig. (D. R. P. 402942 Kl. 12o vom 29/1. 1914, ausg. 19/9. 1924. Zus. zu D. R. P. 349 727; C. 1922. II. 970.) SCHOTTLÄNDER.

Gesellschaft für Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, *β*-Naphthofuran-1,2-dion (*β*-Thionaphthisatin). (D. R. P. 402994 Kl. 12o vom 29/11. 1921, ausg. 19/9. 1924. — C. 1923. II. 573 [Schwz. P. 92 688]. 998 [E. P. 186859].) SCHOTTL.

Chemische Fabrik auf Actien (vorm. E. Schering), Berlin (Erfinder: **Max Dohrn**, Charlottenburg, und **Hans Horsters**, Nowawes b. Berlin), *Darstellung von 2-Amino-5-chlorpyridin und 2-Amino-3,5-dichlorpyridin*, 1. dad. gek., daß man auf 2-Aminopyridin in einem geeigneten Lösungsm. Cl₂-Gas so lange einwirken läßt, bis die Gewichtszunahme etwa 2 Mol. Cl₂ entspricht u. gegebenenfalls das erhaltene 2-Amino-5-chlorpyridin durch Weiterbehandlung mit Cl₂ in das 2-Amino-3,5-dichlorpyridin überführt. — 2. dad. gek., daß man zur Darst. von 2-Amino-3,5-dichlorpyridin in eine Lsg. von 2-Aminopyridin Cl₂-Gas im Überschuß einleitet. — Als Lösungsm. für das 2-Aminopyridin eignet sich z. B. Chl₂. 2-Amino-5-chlorpyridin K₁₁ 127—128°, aus Bzl. oder Bzl.-PAe. Spieße bzw. Blättchen, F. 130—132°, in h. W. — 2-Amino-3,5-dichlorpyridin, aus Bzl. dicke Prismen, F. 84°, in h. W. Beim Ersatz der NH₂-Gruppe durch andere einwertige Radikale nach bekannten Methoden gelangt man zu wichtigen Derivv. des 3,5-Dichlor- bzw. 5-Chlorpyridins, z. B. einem zweifach als auch dreifach chlorierten Pyridin. Die Verbb. dienen als Zwischenprodd. für die Herst. von Arzneimitteln, sowie zur Bekämpfung von Schädlingen u. Parasiten dienen. (D. R. P. 400191 Kl. 12p vom 29/12. 1922, ausg. 4/8. 1924.) SCHOTTLÄNDER.

Chemische Fabrik auf Actien (vormals E. Schering), Berlin, **Max Dohrn**, Charlottenburg, und **Hans Horsters**, Nowawes b. Potsdam, *Darstellung von Diaminopyridin*, dad. gek., daß man in Abänderung des D. R. P. 399902, Zus. zu D. R. P. 398204; C. 1924. II. 1409, 2-Aminopyridin in Ggw. von leicht beweglichen, hochsd., indifferenten Verdünnungsmitteln mit NH₂-Na auf Temp. über 100° erhitzt. — Man läßt z. B. auf in Cumol gel. 2-Aminopyridin gepulvertes Na 10—20 Stdn. bei Temp. bis zu 200° einwirken. Nach Zers. mit W. wird die Base in der früher angegebenen Weise abgeschieden. (D. R. P. 400638 Kl. 12p vom 23/5. 1922, ausg. 16/8. 1924. Zus. zu D. R. P. 399902; C. 1924. II. 2788.) SCH. Gesellschaft für Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, *Derivate von Dihydroisochinolin*. (D. R. P. 399805 Kl. 12p vom 3/12. 1920, ausg. 5/8. 1924. — C. 1923. II. 574.) SCHOTTLÄNDER.

Actien-Gesellschaft für Anilin-Fabrikation, Berlin-Treptow, übert. von: **Ernst Grünbagen**, Berlin-Karlshorst, *2,7-Dialkyl-3-dialkylamino-6-amino-10-lacridiniumhalogenide*. Zn dem Ref. nach D. R. P. 366096; C. 1923. II. 528 folgendes nachzutragen: Die Alkylacridiniumhalogenide bilden trocken rötliche Pulver, ll. in W., l. in A., die verd. wss. Lsg. fluoresziert grün, in konz. Lsg. mit gelber Farbe l.; NaOH fällt aus konz. wss. Lsg. gelblichen in W. l., unl. mehrstd. Erhitzen in W. teilweise unl. werdenden Nd.; beim Erhitzen mit Oxidationsmitteln, wie Ca(OCl)₂ werden sie zers. Tannierte Baumwolle wird in gelben Tönen angefärbt, ebenso auch Leder. Ihre wss. Lsgg. sind starke Desinfektionsmittel. (A. P. 1473550 vom 10/3. 1922, ausg. 6/11. 1923.) SCHOTTL. **Arthur Stoll**, Basel, Schweiz, *Salze des Ergotamins*. (D. R. P. 401109 Kl. 12p vom 12/10. 1921, ausg. 27/8. 1924. Schwz. Prior. 14/10. 1920. — C. 1922. II. 66 [E. P. 170302].) SCHOTTLÄNDER.

Kalle & Co., Aktiengesellschaft (Erfinder: **Erich Bartholomäus** und **Otto Humann**), Biebrich a. Rh., *Darstellung von Aminoverbindungen des Lupinans*, dad. gek., daß man Halogenlupinane mit NH₃, primären oder sekundären Aminen oder deren Salzen behandelt. — Z. B. erhält man beim Erhitzen von Chlrolupinan (C₁₆H₁₆N)₂·CH₂·Cl mit wss. oder alkoh. NH₃ bzw. mit NH₄Cl auf 100° das Amino-

lupinan, Kp.₁₁ 126°, schwach bas. riechendes Öl; *Pikrat* F. 217—218°. — *Phenylaminolupinan*, dickes Öl, Kp.₁₅ 215—216°; *Pikrat* aus Aceton rhomb. Tafeln F. 159—160°, wird durch Erhitzen von Chlorlupinan mit Anilin auf 100° gewonnen. — Erhitzt man Bromlupinan mit methylalkoh. Methylaminlsg. auf 130—175°, so geht es in *Methylaminolupinan*, schwach bas. riechendes Öl, Kp.₁₁ 128—129° über; *Styphnat* F. 260° unter Zers., über. — *Dimethylaminolupinan* Öl, Kp.₁₁ 128—129°; *Styphnat* F. 181°, aus Chlorlupinan u. Dimethylaminlsg. durch Erhitzen auf 160—165° erhalten. — Chlorlupinan u. Piperidin auf 150—170° erhitzt, gehen in *Piperidinolupinan*, dickliches Öl von Sperrmageruch, Kp.₁₂ 170°; *Styphnat* F. 232°, über. Die Prodd. finden zu therapeut. Zwecken Verwendung. (D. R. P. 401167 Kl. 15 vom 17/9. 1922, ausg. 27/8. 1924.) SCHOTTLÄNDER

X. Farben; Färberei; Druckerei.

J. R. Hannay, *Ein historischer Überblick über Färben und Drucken*. Nachgibt über die in den ältesten Zeiten verwendeten färbenden Stoffe wird die Entwicklung der Färberei u. Druckerei in England besprochen. (Journ. Soc. Dyers Colourists 40. 317—23.) SÜVER

Arthur G. Green, *Moderne Färbemethoden*. Das Färben mit Anilinschwärzen, die Erzeugung unl. Azofarbstoffe auf der Faser, Naphthol AS, diazotierte u. wasserlösliche Farben, Küpenfarben, indigoide Farbstoffe, S-Farbstoffe, das Fixieren von Cr-Beizen u. das Färben von Acetatseide mittels Ionamine ist beschrieben. (Journ. Soc. Dyers Colourists 40. 323—29.) SÜVER

Société Fertein Père & Fils, Oise, Frankreich, *Bleichen von Baumwollenen Leinen und Buntgewebe*. Man behandelt die Faser zunächst 12 Stdn. mit einer Lsg. von NaOH, Chlorozon u. Harz, nach dem Behandeln mit Säuren wird gewaschen, gechlort, gewaschen u. neutralisiert. (F. P. 560075 vom 20/12. 1922, ausg. 28/9. 1923.) FRANZ

Chlorit Chemische Fabrik A.-G., Berlin-Lichterfelde, *Herstellung von bleichenden Mitteln*, 1. dad. gek., daß trockenes Cl₂, trockenes Chlorid u. wasserlösliches saures Salz, gegebenenfalls unter Zusatz von etwas Soda, gemischt wird. — 2. durch die Anwendung einer Mischung eines wasserfreien sauren Salzes mit durch Einw. von Cl₂ auf geglühte Na₂CO₃ in der Wärme entstehenden Gasen von NaClO₃ u. NaCl. — Die Erzeugnisse sollen zu Bleich-, Desinfektions- u. Chlorierungszwecken dienen. (D. R. P. 403085 Kl. 30i vom 18/2. 1922, ausg. 22/9. 1924.) KÜHLIG

Claudius Eugène Grasset, Oise, Frankreich, *Färben und Mustern von plastischen Massen*. Die aus der frisch bereiteten plast. M. hergestellten, etwa 1 mm dünnen Blättchen werden gefärbt oder mit Mustern versehen; die einzelnen Blättchen werden dann übereinander gelegt, durch Druck unter Erwärmen zu einem Block getrocknet u. getrocknet. (F. P. 25933 vom 14/1. 1922, ausg. 22/6. 1923. Zus. zu F. P. 5444 vom 14/1. 1922, C. 1923. II. 576.) FRANZ

Ludwig Wolf, Delmenhorst, *Druckfähigmachen von Flächen, die mit Leuchtstoffen bestrichen sind*, dad. gek., daß man diese Flächen mit Stoffen überzieht, die die körnige Struktur des Leuchtfarbenüberzuges ausgleichen u. letzteren gegen mechanische Einflüsse schützen, wobei die Stoffe eine genügende Lichtdurchlässigkeit, Elastizität u. Härte besitzen müssen. — Geeignete Stoffe sind Harz, Paraffin, Wachs, trocknende Öle, Lacke, Gelatine usw. (D. R. P. 403124 Kl. 15k vom 14/9. 1922, ausg. 23/9. 1924.) KÜHLIG

Hermann Hurwitz & Co., Deutschland, *Herstellung von Druckplatten*. Aus starren Platten beliebiger Art wird eine Schicht eines Metallsalzes erzeugt, welche beim Beschreiben o. dgl. der Schicht mit alkal. Tinten o. dgl. Ndd. von Osmium

hydraten o. dgl. liefert. Ist das geschehen, so wird mittels einer Walze oder durch Vorreiben eine zweckmäßig mit Glycerin vermischte Fettfarbe aufgetragen, welche in den Oxyden, Hydraten o. dgl. gebunden wird. Auf Metallplatten wird die Metallsalzsäure durch Vorreiben einer, zweckmäßig organ. Säure bzw. eines sauren Salzes, z. B. Seignettesalz erzeugt. (F. P. 555130 vom 16/8. 1922, ausg. 25/6. 1923. Prior. 20/8. 1921 u. 20/7. 1922.) KÜHLING.

New Jersey Zinc Company, New York, *Lithopon*. Die Fällung des Rohphosphors erfolgt aus Zinksulfatlsgg. von 20° Bé, welche je 1 etwa 1 g Cl_2 in Form des l. Chlorids enthalten. (Dän. P. 33140 vom 15/9. 1921, ausg. 28/4. 1924.) KÜ.

John Haufrey Ryan, Chicago, V. St. A., *Herstellung von Satinweiß*, dad. gek., daß 43 Tle. Alaun in ungefähr 160 Tln. W. aufgelöst werden u. 50 Gewichtsteile alk. mit genügend W. gelöscht werden, worauf die Alaunlsg. dem Kalk beigefügt u. genügend W. hinzugesetzt wird, um die M. zu einem dünnen Teig zu gestalten, worauf das Ganze in einer Kugelmühle so lange behandelt wird, bis eine glatte Mischung erzielt wird, welche mit W. aus der Kugelmühle herausgespült, von dem überschüssigen W. befreit, mit einer Leim- u. einer alkal. Verb. versetzt, nochmals in der Kugelmühle 20—30 Minuten lang gemahlen u. hierauf gegebenenfalls zur Trocknung gebracht wird. — Es wird ein von groben Bestandteilen freies u. bequem handhabendes Satinweiß erhalten. (D. R. P. 404739 Kl. 55f vom 25/5. 1923, ausg. 20/10. 1924.) OELKER.

Badische Anilin- & Soda-Fabrik, Ludwigshafen a. Rh., (Erfinder: **Erich Hartmann**, Wiesdorf), *Herstellung lichtechter Farblacke*, dad. gek., daß bas. oder saure Farbstoffe, welche neben Sulfogruppen Aminreste enthalten, mittels komplexer Säuren gefällt werden, in denen W u. Mo zugleich vorhanden sind. — Die Erzeugnisse sind wesentlich lichtechter als Lacke, welche nur W oder Mo enthalten. (D. R. P. 403002 Kl. 22f vom 23/5. 1923, ausg. 19/9. 1924.) KÜHLING.

August Kinkel und Fritz Zuckmayer, Hannover, *Herstellung von Fixier- und Aufhellmitteln*, dad. gek., daß man die l. Salze der Eiweißkörper, deren Abbau- u. Substitutionsprodd. zusammen mit Formaldehyd, zweckmäßig mit anorgan. Kolloiden anorgan. oder organ. Salzen der Erdalkalien oder Erden anwendet. — Die Lsg. der Eiweißverb. wirkt als Schutzkolloid auf die zugesetzten oder erzeugten anorgan. Kolloide. (D. R. P. 393270 Kl. 22g, vom 18/11. 1921; ausg. 31/3. 1924.) SCHALL.

Kramp & Comp. und Heinrich Boecken, Offenbach a. M., *Imitation echter Goldetiketten*, dad. gek., daß dünn gewalztes Metallblech zunächst mit einem glasartigen Schutzlack in einer Schicht von der Stärke eines feinen Papierblattes überzogen u. warm getrocknet, alsdann zwischen Prägeplatten gepreßt wird, deren Matrize mit einem farbigen Lack eingewalzt ist, worauf unmittelbar der für trockenen Staub aufnahmefähige matte Grund mittels eines in Bronzestaub getauchten Bausches oder Polsters derart trocken aufgefärbt wird, daß hierdurch die Schattenpartien entstehen, wonach das Etikett etwa 2 Stdn. einer Hitze von ungefähr 55° ausgesetzt wird, wodurch der Staub sich mit der eingepprägten Farbe u. dem Schutzlack innig verbindet, u. endlich das ganze Etikett mittels eines reinen Polsters nachpoliert wird. Die Erzeugnisse besitzen das Aussehen von mit echtem Gold hergestellten Etiketten u. sind sehr haltbar. (D. R. P. 403622 Kl. 75c vom 29/2. 1924, ausg. 20. 1924.) KÜHLING.

William Hans Theodor Jørgensen, Kopenhagen, und **Oscar Otto Nørregaard**, Frederiksberg, *Ölfarbe*. Lithopon wird zunächst mit einem flüchtigen u. dann mit einem fetten Öl verrieben. (Dän. P. 32878 vom 21/6. 1923, ausg. 18/2. 1924.) KÜHLING.

Milio Tsapalos, Seine, Frankreich, *Anstrichfarbe* bestehend aus Fe_3O_4 , Leinöl, Skatol u. ZnO . (F. P. 559044 vom 21/11. 1922, ausg. 8/9. 1923.) FRANZ.

E. de Haën Akt.-Ges., Seelze b. Hannover, *Herstellung von Phosphoren*, rein weißes Licht ausstrahlen, dad. gek., daß verschiedene sich in ihrer Licht ergänzende Borsäurephosphore gemischt oder deren Bestandteile auf Borsäurephosphore verarbeitet werden. — Z. B. wird Oxynaphthoesäureanhydrid mit Phthalsäure- oder Terephthalsäure-Borsäurephosphor gemischt. (D. R. P. 403130 Kl. 2 vom 11/11. 1922, ausg. 22/9. 1924.) KÜHLING

XI. Harze; Lacke; Firnis.

Hans Wolff, *Über Kopale*. Benennung u. Einteilung, chem. Zus., D., F. Härte wird besprochen. (Farbe u. Lack 1924. 395—96.) SÜVERN

Alan A. Drummond, *Die Viscosität sirupartiger Kondensationsprodukte aus Phenol und Formaldehyd*. Vf. verweist auf die Bedeutung der Viscositätsbest. für die Betriebskontrolle bei der techn. Herst. von Phenolaldehydkondensationsprodukten. Nach Besprechung schon bekannter Methoden erörtert Vf. die Möglichkeit, aus den relativen die absol. Werte zu erhalten. Deren Beziehung zur Temp. wird durch die Formel: $\eta = 453 \cdot 10^{11} / t^{5.2}$ ausgedrückt (η = absol. Viscosität, t = Temp. in Fahrenheit). Die graph. Darst. der Beziehungen zwischen den Logarithmen der Temp. u. der Viscosität führt zu einer geraden Linie. Im Anschluß hieran erörtert Vf. den kolloidalen Charakter der harzigen Prodd. (Journ. Soc. Chem. Ind. 4 T. 323—26. 328. 1924.) ZANDER

Hans Brendel, *Neuzeitliche Apparate zur Lackherstellung*. Für Arbeiten in großen mit einer einzigen Kopalschmelze wird die Heißwasseranlage der Sangehäuser Maschinenfabrik empfohlen. Die Schmelze erfolgt in einem Gefäß mit Dampfmantel u. Kondensationsanlage, sie läuft in ein darunter stehendes Kühlgefäß ab, in dem sie verd. wird, dann in ein Druckgefäß u. von einem höher angeordneten Sammelbehälter durch die Filterpresse in den Sammelbehälter. Bei dem Sommerchen Schmelzkessel werden die Dämpfe in den Kondensationsanlagen durch Einspritzen von W. niedergeschlagen. Standölkochanlagen, in denen das Öl einer indifferenten Atm., meistens CO₂, dickgekocht wird, werden an 2 verschiedenen Konstruktionen erläutert. Emaillierte Kessel werden als besser angesehen als solche aus Al, Al-Böden können zu Ausbuchtungen Veranlassung geben. Zum Filtrieren soll sich die Superzentrifuge der Sharples Specialty Co., New York, bewähren. (Farben-Ztg. 30. 236—38. 1924.) SÜVERN

—, *Bilderfirnisse, ihre Herstellung und Anwendung*. Bilderfirnis soll die Farbe eines Bildes sättigen u. die Oberfläche dichten, so daß das Bild ein gleichmäßiges Aussehen bekommt u. keine matten, aber auch keine hochglänzenden Stellen aufweist. Die für solche Lacke zu verwendenden Stoffe werden besprochen. (Farben u. Lack 1924. 406.) SÜVERN

Ch. Coffignier, *Die Firnisindustrie im Jahre 1923*. Zusammenfassende Besprechung über die Arbeiten auf dem Gebiete der Ausgangsstoffe, der Fabrikation, Analyse u. der Ölchemie. (Rev. chimie ind. 33. 149—53. 175—79. 1924.) SÜVERN

Jean-Augustin Arnaud und **Jules Henri Rouff**, Seine, Frankreich, *Reinigung von Harzen, insbesondere von Acaroidharz*. Das rohe Acaroidharz wird in Essigsäurealkalihydroxyden, Ca(OH)₂, Ba(OH)₂ gel., filtriert, aus dem Filtrat das Harz durch Säuren gefällt u. gewaschen. (F. P. 560981 vom 13/1. 1923, ausg. 13/10. 1923.)

Hercules Powder Company, Wilmington, Delaware, übert. von: **Clarence M. Sherwood** und **Raymond K. Cole**, Brunswick, Georgia, *Verfahren zur Gewinnung von Terpentinöl und Harz aus harzhaltigem Holz*. Man behandelt das zerkleinerte Holz mit Wasserdampf unter Druck, die abziehenden Terpentinöl- u. Wasserdämpfe wurden kondensiert. Das so behandelte Holz wird mit einem Lösungsmittel für Kolophonium, Gasolin extrahiert, nach dem Ablassen der Harzlsig. wird die

in Holz zurückgehaltene Harzlg. durch k. W., am besten durch überhitztes W. unter Druck verdrängt. Die Lsg. des Kolophoniums in Gasolin wird durch Filtern über Fullererde entfärbt. (A. P. 1505438 vom 18/5. 1921, ausg. 19/8. 1924.)

FRANZ.

Plauson's Forschungsinstitut G. m. b. H., Hamburg, *Herstellung von wässrigen, kolloiden Harz-, Pech-, Wachs- u. dgl. Dispersionen*, dad. gek., daß Harze, Pech- u. Wachse in k. oder in geschmolzenem Zustand unter Zusatz von W. als Dispersionsmittel an Stelle organ. Fl., in Ggw. von Alkalihydraten, -sulfiden oder Carbonaten, oder von Lösungsm. der Harze, Pech- u. Wachse oder von Mischungen ders., aber nur in solchen Mengen, daß sie nicht zur Lsg. der zu dispergierenden Stoffe oder zu ihrer Verseifung ausreichen, in Kolloidmühlen oder ähnlich wirkenden Dispersionsmaschinen behandelt u. dadurch so fein dispergiert werden, daß sie kolloidartig aufgelöst erscheinen u. sich nicht mehr abcheiden. — Die erhaltenen Dispersionen dienen zur Herst. von *Papier, Leim, Seifen, Schuhcreme, Bohnerseifen, Lacken, Farben* usw. u. zum Wasserdichtmachen von Zement. (D. R. P. 337 Kl. 22h vom 19/2. 1921, ausg. 18/3. 1924. Zus. zu D. R. P. 337955; C. 1921. 1361.)

FRANZ.

Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning (Erfinder: Arthur Voß), Höchst a. M., *Herstellung von Kunstharzen*, dad. gek., daß man die ölartigen Kondensationsprodd. von aromat. KW-stoffen bzw. ihren Deriv. v. Aralkylhalogeniden mit O₂ bzw. O₂-haltigen Gasen behandelt. — Man arbeitet vorteilhaft bei erhöhter Temp., bei Ggw. oder Abwesenheit von Katalysatoren, wie MnO₂ oder FeCl₃. Beispiele sind angegeben für die Oxydation der öligen Kondensationsprodd. aus: *Xylol u. Benzylchlorid* mit Luft bei 160–170°, — aus: *Naphthalin u. Benzylchlorid* mit Luft in Ggw. von MnO₂ bei 170–190°, braunes Harz, ll. in Leinöl, aromat. in Aceton, — sowie aus: *Xylolchlorid u. Trikresol* mit O₂ bei 120–130°, gelblichbraunes Harz, Klebe- bzw. Erweichungspunkt 80–85°. Xylolchlorid wird durch Chlorieren von techn. Xylol gewonnen. Die Harze eignen sich zur Herst. dauerbeständiger Lacke sowie von Isoliermitteln in der elektrotechn. Industrie u. als Zusatzmittel für Firnisse. (D. R. P. 400312 Kl. 12o vom 7/5. 1922, ausg. 4/8. 1924.)

SCHÖTTLÄNDER.

Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning, Höchst a. M., *Darstellung künstlicher Harze und Öle*, darin bestehend, daß man aromat. KW-stoffe u. deren Deriv. mit Ausnahme solcher, welche saure oder bas. Gruppen enthalten, mit Aldehyden oder Aldehyd abspaltenden Mitteln in Ggw. von so beschränkten Mengen H₂O oder Halogenwasserstoffsäuren, zweckmäßig in Ggw. von Lösungsm., ohne Anwendung von Druck erhitzt, daß leinösliche Prodd. erhalten werden. — Als Lösungsm., in dem sowohl der zu kondensierende KW-stoff als auch die katalyt. wirkenden Säuren l. sind, eignet sich besonders CH₃CO₂H. Die in KW-stoffen, Ölen, Firnis u. Terpentinöl gut l. Kondensationsprodd. finden in der Lackindustrie Anwendung. Folgende Beispiele sind angegeben: *Naphthalin u. Paraformaldehyd* mit konz. CH₃CO₂H u. 83%ig. H₃PO₄ längere Zeit erhitzt, gibt ein hellgelbes, durchsichtiges, k. springhartes, in aromat. KW-stoffen, wie Bzl., in CCl₄, Terpentinöl u. l. Harz, — *Xylol u. Paraformaldehyd* mit CH₃CO₂H u. konz. HCl erhitzt, gibt ein hellgelbes, durchsichtiges, sehr dickfl. Öl von ähnlichen Löslichkeitsverhältnissen. Erhitzt man *Phenetol* u. C₆H₅CHO in Ggw. von CH₃CO₂H u. konz. HCl längere Zeit, so entsteht ein rötlich gelb gefärbtes durchsichtiges Harz. — Das aus *Phenetol u. Paraformaldehyd* in Ggw. von konz. H₃PO₄ u. A. erhältliche Kondensationsprod. ist ein lares, zähfl. Öl. — *Kondensationsprod.* aus *Anisol* u. Paraformaldehyd ist, je nach der Menge des letzteren, entweder ein wasserhelles sehr zähfl. Öl oder ein springhartes Harz. — Aus *Diphenyläther* u. Paraformaldehyd erhält man durch Erhitzen mit konz. H₃PO₄ u. CH₃CO₂H ein hellgelb gefärbtes, nach einiger

Badische Anilin- & Soda-Fabrik (Erfinder: **Karl Seydel**), Ludwigshafen a. Rh., *Herstellung von Kunstharzen*, dad. gek., daß man Cyclohexanon oder seine Deriv. mit höheren Aldehyden unter so energ. Bedingungen kondensiert, daß die Kondensation über die anfangs entstehenden niedriger molekularen Reaktionsprodd. hinausgeht (hierzu vgl. auch D. R. P. 339107; C. 1921. IV. 714.) Die Kondensation mit den höheren Aldehyden kann mit sauren oder alkal. Kondensationsmm. u. mit der ohne Anwendung von Druck erfolgen. Die entstandenen Harze sind in den ebräuchlichen Lösungsmm. gut l. u. können in der Lack- u. Firnisindustrie Verwendung finden. Beispiele sind angegeben für die Kondensation von: Cyclohexanon mit Paraldehyd in Ggw. von KOH unter Druck bei 200°, — Cyclohexanon mit $\frac{1}{2}$ H₂CHO in Ggw. von konz. HCl bei 150°, — u. Methylcyclohexanon mit C₆H₅CHO in Ggw. von KOH unter Druck auf 200–220°. (D. R. P. 403646 Kl. 12o vom 15/2. 1922, ausg. 9/10. 1924.) SCHOTTLÄNDER.

Hans Bucherer, Charlottenburg, *Derivate der harzartigen, in Alkali löslichen Kondensationsprodukte aus Phenolen und Aldehyden*. Zu den Ref. nach F. P. 520319; C. 1921. IV. 873 u. E. P. 148366; C. 1922. II. 1222 ist folgendes nachzutragen: *Ämssäureester des Kresol-CH₂O-Harzes* amorphes, orangerotes, in W. unl., bei 100° auch nicht schm. Pulver. — *Gemischter Kohlensäureester aus Borneol u. Kresol-H₂O-Harz*, bräunlichgelbes, in W. unl., in h. Solventnaphtha u. Tetralin l. Harz. (D. R. P. 400639 Kl. 12q vom 23/3. 1919, ausg. 18/8. 1924. Zus. zu D. R. P. 391072; C. 1924. I. 2744 [vgl. auch D. R. P. 399677; C. 1924. II. 1520].) SCHOTTLÄNDER.

Badische Anilin- & Soda-Fabrik (Erfinder: **Heiner Ramstetter**), Ludwigshafen a. Rh., *Herstellung von Kondensationsprodukten aus Harnstoff u. CH₂O*, dad. gek., daß man im Herstellungsgang des Prod. organ. Lösungsmm. zufügt u. dest. — als in den nach den üblichen Verff. aus Harnstoff u. Formaldehyd in Ggw. von organ. oder organ. Säuren oder säureabspaltenden Salzen erhältlichen Kondensationsprodd. stets vorhandene W. wird auf diese Weise entfernt u. man erhält am nächst klare farblose Lsgg., die unmittelbar als Lacke verwendet werden können. dabei durchsichtige, farblose, wasserfeste Überzüge geben. Als Lösungsmm. eignen sich besonders Glykolchlorhydrin u. Glykolmonoacetat, ferner HCONH₂, CO₂H, Eg. oder Gemische dieser. Durch weitgehendes Abdestillieren des Lösungsm. gelangt man zu hochkonz., beim Erkalten sofort zu festen glasklaren u. völlig wasserfreien Prodd. erstarrenden Lsgg. Ein Beispiel für die Kondensation von Harnstoff mit CH₂O in Ggw. von NH₄Cl unter nachfolgender Verwendung von Glykolchlorhydrin als W. austreibendem Lösungsm. ist angegeben. (D. R. P. 03645 Kl. 12o vom 25/8. 1922, ausg. 11/10. 1924.) SCHOTTLÄNDER.

Compagnie Lincrusta-Walton Française & Loreïd Reunis, Seine, *Farbiger metallglänzender Lack*. Man vermischt die Lsg. eines Celluloseesters, Kollodium, mit Aluminiumbronze, einem organ. Farbstoff, Rhodamin u. Benzylalkohol. Der Lack dient zum Überziehen von Stoffen, Papier, Holz, Metallen. (F. P. 547533 vom 23/5. 1921, ausg. 18/12. 1922.) FRANZ.

Enrico Giovagnoli, Italien, *Isolierende und wasserdichte Überzugsmasse*, bestehend aus Fichtenharz, gekochtem Leinöl, Terpentinöl, Bleiweiß, Kolophonium, Ceresin, Wachs u. Kautschuk. (F. P. 555347 vom 24/8. 1922, ausg. 28/6. 1923; ital. Prior. 1/9. 1921.) FRANZ.

Marguerite Sabrou und Pierre Sabrou, Seine, Frankreich, *Durchsichtiger Schutzlack*. Man löst Kolophonium u. Bleioxyd in einem Gemisch von CCl₄ u. Petroleum. (F. P. 560014 vom 24/10. 1922, ausg. 26/9. 1923.) FRANZ.

XIV. Zucker; Kohlenhydrate; Stärke.

F. Hayduck, *Das Institut für Gärungsgewerbe in Vergangenheit und Zukunft*. Darst. der Entw. des Institutes bis zur Ggw. u. seiner Organisation bei Gelegenheit

der Festrede zur Feier des 50jährigen Jubiläums der Anstalt am 29. 9. 1924. (Dtsch. Essigind. 28. 273—79. 1924.) RÜHL

Richard F. Jackson und Clara Gillis Silsbee, *Sättigungsbeziehungen in Gemischen von Saccharose, Dextrose und Lävulose*. Vff. haben sich mit den Sirupsen beschäftigt, die diese Zucker enthalten, befaßt. Diese Sirupe enthalten sowohl als Zwischen- als Endprodd. die genannten Zucker in solch hoher Konz., daß sie gewöhnlich gesätt. oder übersättigt mit einem oder mehreren dieser Zucker sind. Es ist der Darst. dieser Sirupe wünschenswert, Übersättigung zu vermeiden, die die Abscheidung von Krystallen bewirkt, andererseits bedarf aber der Sirup eine genügenden Konz. um viscos zu sein. Vff. haben nun die Löslichkeit jedes Zuckers in Ggw. der andern bestimmt; es zeigte sich dabei, daß Invertzucker und Dextrose die Löslichkeit von Saccharose in W. verminderten, daß dabei aber der Gesamtzuckergehalt vermehrt war. Ähnlich vermindern Saccharose u. Lävulose die Löslichkeit von Dextrose. Die Zus. von Gemischen von Saccharose u. Invertzucker, die mit Saccharose u. Dextrose bei verschiedenen Tempp. gesätt. waren, ist bestimmt worden. Solche Lsgg. besitzen die größten Löslichkeiten, die mit teilweise invertierten Saccharoselsgg. erreicht werden können. Honig ist eine übersättigte Lsg. von Dextrose in Ggw. von Lävulose. Zur Lsg. der angeschnittenen Fragen ist es nötig, die Löslichkeit jedes der Bestandteile in Ggw. wechselnder Mengen jedes der beiden anderen zu bestimmen. Vff. haben deswegen die verschiedenen Systeme, die hier in Frage kommen, nach der Phasenregel eingehend untersucht, worüber berichtet wird. Hierzu muß auf das Original verwiesen werden (Dept. of commerce. Technologie papers of the bureau of standards 1924. Nr. 327—304. Ztschr. Ver. Dtsch. Zuckerind. 1924. 847—77. Washington.) RÜHL

William D. Horne, *Reinigung von Zuckerrohrsaft*. Vf. empfiehlt, die Saft zunächst mit Kalkmilch zu fällen u. zu neutralisieren bis zu einem Punkte, bei dem zwischen der Neutralität gegen Lackmus u. gegen Phenolphthalein liegt, dann den Zusatz von P_2O_5 , den überschüssigen CaO wieder zu entfernen. Es wird dadurch die Reinheit des Saftes erhöht u. sein Aussehen heller. Beiderlei Ndd. können zusammen abgepreßt werden. (Chem. Metallurg. Engineering 31. 264—65. 1924. Yonkers [N. Y.]) RÜHL

Berthold Block, *Die Druckverdampfung*. Zusammenfassende Erörterung der Verhältnisse bei Gelegenheit eines Vortrages zu dem Zwecke, es dem Einzelnen zu erleichtern, ob die Einführung der Druckverdampfung für ihn Vorteile bringt. (Zentralblatt f. Zuckerind. 32. 1130—35. 1924. Charlottenburg.) RÜHL

Dieckmann, *Zur Kalkfrage*. Es wird die Verwendung des Scheideschlammes als Kalkdünger in trockenem Zustande empfohlen, wodurch eine gleichmäßige Verteilung auf dem Lande u. eine wirtschaftlichere Ausnutzung des Schlammes erreicht wird. (Dtsch. Zuckerind. 49. 1184. 1924. Heimbürg a. Harz.) RÜHL

Alphons Heinze, *Eine neue Rohrzuckerdecke*. Vf. erörtert bei Gelegenheit eines Vortrages zunächst im allgemeinen das bei der Weißzuckerherzeugung übliche „Decken“ der Zuckerkrystalle u. anschließend empfehlend die PHILIPP patentierte Ablaufdecke im besonderen; diese besteht darin, daß der Rohrzucker, bevor er in Wasser- oder Dampfdecke erhält, mit seinem eigenen Ablaufe, also dem Grünsaft in ausreichend verd. Zustande vorgedeckt wird. (Zentralblatt f. Zuckerind. 32. 1106—8. 1924. Halle a. S.) RÜHL

—, *Arsen in der Melasse?* Zu den Bemerkungen von BRUHNS (Zentralblatt f. Zuckerind. 32. 948; C. 1924. II. 1860) wird ergänzend auf einige von anderen Seite beobachtete Vorkommnisse von As in Zucker u. Pottasche hingewiesen. (Zentralblatt f. Zuckerind. 32. 1082. 1924.) RÜHL

Edmund Knecht und Eva Hibbert, *Eine direkte Methode zur Bestimmung von Glucose und anderen Kohlenhydraten*. (Vgl. KNECHT, Journ. Chem. Soc. Lond. 1924.)

25. 1537; C. 1924. II. 1346.) Die Methode beruht auf der Red. der Osazone durch TiCl_3 -Lsg. Für 1 Mol. *Glucosazon* ist eine 6 H äquivalente Menge des Reduktionsmittels erforderlich. Die quantitative Überführung von Glucose in das Osazon gelingt, wenn 12 Mol. Phenylhydrazin pro Mol. Glucose angewandt werden. Das Erf. ist bei *Glucose* folgendes: 0,1–0,2 g Glucose werden in 100 ccm W. gel. 1 ccm dieser Lsg. + 1 ccm gesätt. Na-Tartratlsg. + 0,25 g Phenylhydrazin in Essigsäure werden 10 Min. in sd. Wasserbad erhitzt u. nach Zugabe überschüssiger eingestellter TiCl_3 -Lsg. 1–2 Min. über freier Flamme in CO_2 -Atmosphäre gekocht. Der Überschuß an TiCl_3 wird nach Zugabe von HCl bestimmt durch eine gegen TiCl_3 -Lsg. eingestellte Krustallscharlachlsg. Das Ende der Titration wird durch dauernde Rotfärbung angezeigt. Die Methode ist auch anwendbar für *Fructose*, *Bohrzucker* (nach der Inversion), *Maltose*, *Lactose* u. *Glucosamin*. (Journ. Chem. Soc. London 125. 2009–13. 1924. Manchester, Univ. u. Municip. Coll. of Techn.) HA.

Hans Riffart und **Constantin Pyriki**, *Nachweis und colorimetrische Bestimmung von Saccharose neben anderen Zuckerarten*. Mit 70%ig. H_2SO_4 werden *fructose* u. fructosehaltige Zucker (Saccharose) karamelisiert, andere Zucker, Stärke Dextrine nicht. Daraus wird ein Verf. zur raschen kolorimetr. Best. von Fructose in Nahrungsmitteln abgeleitet, Bedingungen dafür: Temp. 55°, Dauer der Einw. 1 Min., günstigste Zuckerkonz. der Lsg. 10–12%; Grenze für den Nachweis 2%, für die Best. 0,4–0,5%. Allgemeine Arbeitsvorschrift im Original. — Bei Milch beseitigt man die Eiweißstoffe vorher mit HgCl_2 + HCl, bei *Zwieback* Vorbehandlung des Auszuges mit Pb-Acetat u. Tierkohle, desgl. bei *Kuchen*, bei *Schokolade* mit HgCl_2 + HCl u. Tierkohle, bei *Bier* mit Bleiessig u. Tierkohle. Das Verf. ist auch für Malzextrakt brauchbar. (Ztschr. f. Unters. Nahrsg.- u. Genußmittel 48. 197–207. 1924. Frankfurt a. M., Univ.) GROSZFELD.

Cornelius Asselbergs, Breda, Holland, *Vorrichtung zum Verteilen von Gasen und Flüssigkeiten*, insbesondere des Sationsgases in Zuckersäften, mit an einem beweglichen Halter sitzenden, in die Gasaustrittsöffnungen der Gaskammer einziehbaren Reinigerstiften, dad. gek., daß die Stifte sich mit ihrem unteren Teil im Durchgangsquerschnitt der Öffnungen anpassen u. nach vorn zu kegelförmig spitz auslaufen, um bei entsprechender Verstellung des Halters den Durchgangsquerschnitt der Öffnungen zu verändern. (D. R. P. 402932 Kl. 89c vom 12/11. 1922, ausg. 25/9. 1924. Holl. Prior. 12/11. 1921.) OELKER.

Carl Neuberg und **Elsa Reinfurth**, Berlin-Dahlem, *Verzuckerung von Cellulose u. ihr verwandter Polysaccharide*, 1. dad. gek., daß das trockene Ausgangsmaterial mit Chlorsulfonsäure für sich oder unter Zugabe von CHCl_3 o. dgl. in der Hitze behandelt wird. Die unter Hydrolyse gebildeten Schwefelsäureester des Zuckers werden durch darauffolgende Erwärmung mit W. in freien Traubenzucker überführt. — 2. dad. gek., daß man die nach Einw. der Chlorsulfonsäure erhaltene Mischung von Zucker, dessen Estern, H_2SO_4 , HCl, zunächst in wss. Lsg. mit CaCO_3 oder Ca(OH)_2 neutralisiert, dann das Filtrat mit HCl ansäuert u. darauf mit so viel TiCl_3 versetzt, als zur B. der abzusplittenden in Esterform vorhandenen H_2SO_4 notwendig ist; nunmehr ist bis zur vollständigen Verseifung zu erwärmen. — An Stelle von fertiger Chlorsulfonsäure kann man auch Sulfurylchlorid verwenden u. so viel W. hinzugeben, daß sich nach der Gleichung $\text{SO}_2\text{Cl}_2 + \text{H}_2\text{O} = \text{SO}_3\text{HCl} + \text{HCl}$ Chlorsulfonsäure bilden kann. Die so erhaltene Zuckerlsg. kann glatt vergoren werden. (D. R. P. 403705 Kl. 89i vom 1/4. 1923, ausg. 2/10. 1924.) OELKER.

XVI. Nahrungsmittel; Genußmittel; Futtermittel.

Z. N. Wyant und **R. L. Tweed**, *Fade Säuren*. I. u. II. Mitt. **Z. N. Wyant**. Isolierte aus k. gepackten Blechdosen mit eingemachten Bohnen von fadem

sauren Geschmack thermophile, paarweise auftretende u. kurze Ketten mit Endsporen bildende Mikroben, deren Minimum- u. Optimumtemp. bezw. bei 20° bis 50° u. 55—65° lagen, u. die selbst bei 70° nicht abgetötet wurden. Die Bacillen sind akt. Gasbildner u. besonders durch die geringe Sichtbarkeit in den Kolonien in Agarmedien charakterisiert, welche auf der gleichen Lichtbrechung des Mediums u. der Kolonien beruht.

Z. N. Wyant und R. L. Tweed†. Aus faden sauren Erbsenkonserve wurden auf Erbsenagar 2 allgemeine Typen von Kolonien isoliert, von denen die eine konzentrisch ringförmig auftrat u. die andere glatt u. rund war. Von diesen Kolonien wurden 7 repräsentierende Reinkulturen auf ihre morpholog., kulturcharakterist. physikal. u. biochem. Merkmale hin untersucht. Alle entwickelten sich gut bei 20°, doch lag das Entw.-Optimum bei 37—55°. Die unter aeroben Bedingungen wachsenden Kulturen bewirkten bei 20° die gleiche oder sogar noch eine stärkere Säurezunahme als bei 55°. Büchsen, deren Inhalt pH-Werte unterhalb 5,8 zeigten, enthielten Säuren mit dem charakterist. faden Geschmack. Um die Entw. dieser Organismen zu hemmen, ist es erforderlich, die Konserven nach der Behandlung schnell abzukühlen u. k. aufzubewahren. (Michigan Sta. Tech. Bul. 59. 29. Sept. 1923; Exp. Stat. Rec. 50. 459—60.) BERJ

Eduard Skarnitzl, *Japanischer Safran. Ein Beitrag zur Kenntnis der Safranverfälschungen*. Eine Probe bestand aus künstlich gefärbten Blüten von *Onopordium Acanthium* L. (Eselsdistel), mit BaSO₄ beschwert. (Ztschr. f. Unters. Nahrungsmittel u. Genussmittel 48. 213—17. 1924. Prag.) GROSZFEI

—, *Die Backfähigkeit mesopotamischen Weizens*. Es wurden Verss. an 17 Proben Weizen, darunter 6 aus dem Irak selbst, die übrigen auswärtiger Herkunft, auf dem Versuchsgute bei Bagdad angestellt. Der geerntete Weizen wurde in England gemahlen u. das Mehl untersucht. Die Zus. der 17 Proben Mehle schwankte für W. von (%) 8,6—10,2, Protein (N × 5,7) 9,0—12,3, Gluten, fehmisch 17,8—29,8, trocken 6,3—10,5. Auch in den übrigen Eigenschaften sind die Mehle verschieden voneinander. Die Mehle würden in England nach Vermischung mit besserem amerikan. u. austral. Weizen verbraucht werden können. Da es möglich ist, daß sich bei fortgesetzter Kultivierung dieser verschiedenen Sorten Weizen in Irak aus allen oder einigen eine einheitlich Sorte Weizen herausbildet, sollen es Verss. eine Reihe von Jahren fortgesetzt werden. (Bull. Imperial Inst. London 22. 284—92. 1924.) RÜHM

C. Griebel, *Die Unterscheidung der einheimischen und amerikanischen Moosen in Zubereitungen*. Die mkr. Beschaffenheit der Kranbeere, die in Amerika in Großen gebaut wird, fälschlich als Preiselbeere auf den Markt kommt u. sich durch diesen auch durch milderen Geschmack auszeichnet, wird beschrieben. (Ztschr. f. Unters. Nahrungsmittel u. Genussmittel 48. 228—32. 1924. Berlin, Nahrungsmittel-Untersuchungs-Anst.) GROSZFEI

—, *Kaffee aus Sierra Leone*. Es wurden 2 Proben aus Coffea stenophylla untersucht. Die eine bestand aus den Kaffeebohnen, die andere noch aus unreifen Früchten. Jene ergaben (%): W. 8,2, Kaffein 1,3, Rohprotein 8,5, Fett 1,3, Kohlenhydrate (aus dem Unterschiede) 50,6, Rohfaser 17,8, Asche 3,5. Die Früchte bestanden zu 48% aus Schalen u. 52% aus Bohnen; das mittlere Gewicht der Früchte war 0,36 g, der Bohnen 0,11 g. Der Kaffee war von geringerer Güte als handelsfähig. (Bull. Imperial Inst. Lond. 22. 292—94. 1924.) RÜHM

—, *Von der Kakaobohne zum Kakao und zur Schokolade*. Kurze zusammenfassende Erörterung an Hand von Abbildungen der Aufbereitung der Kakaobohne u. ihrer Verarbeitung zu Kakao, zu gestüfter Schokolade u. zu Milchsokolade. Auf den bedeutenden Nährwert von Kakao u. Schokolade wird besonders hingewiesen. (Chem. Metallurg. Engineering 31. 257—59. 1924.) RÜHM

Spyros Galanos, *Über Kakaoschalenfett*. Kakaoschalen, mit W. 6,84, Protein 1,04, Fett 5,22, Rohfaser 12,50, Asche 9,15, Sand 1,02%, lieferten mit Ä. bezw. F. bezw. Bzl. bezw. CS₂: Fett 5,22—3,48—3,78—4,33%, Refraktion desselben 53—55,6—55,8—56,0, Säuregrade 69,0—50,2—58,4—56,1. Fett mit Ä. (12 Stdn.): 1,20 0,9206, Brechungszahl 56,3, Säuregrad 69,0, VZ. 180,3, Jodzahl (v. HÜBL) 3,0, RMZ. 8,25, PZ. 0,40. (Ztschr. f. Unters. Nahrgrs.- u. Genußmittel 48. 212. 1924. Athen, Univ.)

GROSZFELD.

André M. Leroy, *Die Durchsichtigkeit von Hühnereierschalen und die Änderungen, denen jene mit der Zeit unterliegt*. Sofort nach dem Legen ist jedes Ei gleichmäßig durchsichtig, während sich bei gewöhnlicher Aufbewahrung, gleichmäßig bei Eiern derselben Henne, bei Eiern verschiedener Herkunft aber in verschiedener Weise, beim Durchleuchten ein System weißer Punkte u. Flecken zeigt. Ob. im Original. Ursache: Wasserverdunstung. (Ann. des Falsifications 17. 47—8. 1924.)

GROSZFELD.

Fernand Bodroux, *Die üblichen Verfälschungen der Milch*. (Entrahmung und Fälschung.) Eingehende Darlegung der hiermit zusammenhängenden Fragen, betreffend die Zus., Verwertung u. Begriffsbest. der Milch, die üblichen Verfälschungen, die Regelung u. Überwachung des Handels mit Milch, die Probenahme, die Prüfung der Proben im Laboratorium, die strafrechtliche Verfolgung von Verfehlungen, die Molkereien u. die Bekämpfung der Verfälschungen durch die Verbraucher u. Vorschläge für einen wirksamen Schutz der Verbraucher. (Ann. des Falsifications 17. 1—112. 1924. Poitiers.)

RÜHLE.

M. P. Neumann, *Die Filtrierprobe zur Unterscheidung von Roggen- und Weizenmehl*. Zu den Ausführungen von STROHECKER (Ztschr. f. Unters. Nahrgrs.- u. Genußmittel 47. 90; C. 1924. I. 2840) wird auf die erheblichen Unterschiede in der Filtriergeschwindigkeit von Roggen- u. Weizenmehlaufschwemmungen hingewiesen. Die Methode versagt aber gerade da, wo sie Wert hätte, nämlich bei kleinen Zusätzen des einen oder anderen Mehles. Sie hat nur Wert als Demonstrationsvers. (Ztschr. f. Unters. Nahrgrs.- u. Genußmittel 48. 247. 1924. Berlin, Vers.- u. Forschungsanst. f. Getreideverarbeitung.)

GROSZFELD.

Wilhelm Plahl, *Zum Nachweis der bitteren in süßen Mandeln und ihre kritische Beurteilung*. Eine kleine Menge des Kotyledonargewebes der einzelnen Mandeln (Stichproben) wird abgeschabt u. mit 1—2 Tropfen W. versetzt, worauf nach 1—2 Minuten der Bittermandelölgeruch auftritt u. in 1—2 mm Entfernung mit Papierstreifen, die mit 3% ig. alkoh. Guajakharzlg. getränkt, dann getrocknet u. mit 0,1% ig. CuSO₄-Lsg. benetzt sind, nachgewiesen wird (Blaufärbung) (Schönbeinsche Rk.). Etwa 40 Mandeln enthalten die tödliche Menge HCN; 10 Stück können schon als bedenklich angesehen werden. (Ztschr. f. Unters. Nahrgrs.- u. Genußmittel 48. 241—43. 1924. Prag, Deutsche Univ.)

GROSZFELD.

Spyros Galanos, *Beiträge zur Kakaountersuchung*. Analysenergebnisse von Kakaobohnen, gerösteten Bohnen u. Kakaoschalen. An Fett wurden nach SOXHLET nach 12 Stdn. höhere Werte als nach LANGE (Arbb. Kais. Gesundh.-Amt 50. 149; C. 1915. II. 1089) erhalten. Auch stimmten die Refraktometerzahlen der Fette überein. Vergleichende Verss. mit Chlf., Ä. u. PÄ. lieferten Fette mit abnehmenden Refraktometerzahlen u. SZZ. Das Schalenfett zeigte immer höhere Refraktion u. höhere SZ als das zuhörige Kakaofett. Der Gehalt der Kakaoschalen an Asche ist bedeutend höher als bei reinen Bohnen, besonders auch an Sand (36—6,11% gegen 0,02—0,09%). Der Rohfasergehalt wurde bei Bohnen nur bis 2,505% gefunden. (Ztschr. f. Unters. Nahrgrs.- u. Genußmittel 48. 207—11. 1924. Athen, Univ.)

GROSZFELD.

Fr. Bolm, *Bemerkungen zur Gefrierpunktsbestimmung in der Milch*. Zur Vermeidung des verwendeten Thermometers wird vorgeschlagen, einheitlich den Ge-

frierpunkt einer Lsg. von 2,000 g reinstem Harnstoff in 100 ccm W. zu ermitteln u. die molekulare Gefrierpunktserniedrigung zu 1,86° anzunehmen. Als Gefrierpunkt wird der gefundene Wert $\times 100$ (ohne Minuszeichen) angegeben. Als Säuregrad (ccm $\frac{1}{4}$ -n. Säure für 100 ccm Milch) für Milch gilt 7. Bei > 7 für jeden Säuregrad 0,8 ab bei < 7 0,8 zugezählt. Für 1 ccm Formalin (40%) in 1 l Milch zieht man 3,0 ab. Anführung von 3 Fällen aus der Praxis, wonach den Gefrierpunkt 53 als n. (statt bisher 55) annehmen kann, wenn die Stallprobe nicht möglich ist. (Vgl. GRONOVER, Ztschr. f. Unters. Nahrsg.- u. Genußmittel 18; C. 1923. IV. 65.) (Ztschr. f. Unters. Nahrsg.- u. Genußmittel 48. 243-244. 1924. Altona.)

GROSZFEIL

Chemische Fabrik von Heyden, Aktiengesellschaft, Radebeul b. Dresden. *Verschuß für Einmachgläser.* Über die Öffnung des Glases wird zunächst ein feines, für W. undurchlässiges aus Celluloseestern bestehendes Häutchen gelegt, darüber eine wasserhaltige Kappe aus Hydratcellulose gezogen, die nach dem Trocknen zusammenschrumpft u. das Häutchen fest an den Hals des Glases presst. (Holl. P. 6237 vom 15/3. 1919, ausg. 15/4. 1922.)

OELKE

Ward Baking Company, Amerika, Nahrungsmittel, welches reich an waschl. Vitaminen (B) ist u. dadurch erhalten wird, daß man geeignete Rohstoffe, wie Reisschalen, Getreidekeime etc. bis zur Verkleisterung der in ihnen enthaltenen Stärke kocht, diese dann verzuckert, z. B. mittels Diastase u. zwar in Ggw. eines peptonisierend wirkenden Fermentes, wie Papain, u. die erhaltene Fl. alsdann kühlt. (F. P. 557387 vom 13/10. 1922, ausg. 8/8. 1923.)

OELKE

Coffee Products Corporation, New York, V. St. A., übert. von: **Karl Heinrich Wimmer, Bremen, Herstellung von coffeinfreiem Kaffee.** Rohkaffee wird in einer Extraktionsapp. mit Dampf, gegebenenfalls mit W., derart vorbehandelt, daß ein Gehalt an W. ca. 18—30% beträgt. Hierauf wird mit CH_2Cl_2 extrahiert, bis die Probe sich als frei von Coffein erweist. Der extrahierte Kaffee wird vom Lösungsmittel abgetrennt u. von den letzten Resten des letzteren durch Behandeln mit Dampf befreit. Das Verf. bietet den Vorteil, daß das niedrig sd. CH_2Cl_2 (Kp. 40°) leicht von den extrahierten Bohnen getrennt werden kann, keine wertvollen äther. Öle u. Aromastoffe aus den Bohnen auszieht, ein besonders reines Coffein liefert u. bei niedrigen Temp. zur Anwendung gelangen kann. (A. P. 1502222 vom 30. 10. 1923, ausg. 22/7. 1924.)

SCHOTTLÄNDE

Industrie-en Handel Maatschappij „Hag“, Amsterdam, übert. von: Herman Constant Everard Lombaers, Apeldoorn, Niederlande, Herstellung von coffeinfreiem Kaffee. Zu dem vorst. Ref. nach A. P. 1502222 ist nachzutragen, daß außer CH_2Cl_2 auch noch andere, zwischen 36 u. 45° sd. organ. Lösungsm. zur Extraktion des Coffeins aus dem mit Wasserdampf vorbehandelten Rohkaffee dienen können, wie *Isopropylchlorid*, Kp. 36,5°, — CH_3J , Kp. 43,8°, — $\text{C}_2\text{H}_5\text{Br}$, Kp. 38,4°, — *Amylchlorid*, Kp. 39°, — *n. Pentan*, Kp. 37°, — *n. Propylchlorid*, Kp. 44°. (E. P. 206145 vom 23/10. 1922, ausg. 19/12. 1923. Holl. Prior. 24/10. 1922. F. P. 572521 vom 25. 10. 1923, ausg. 7/6. 1924. Holl. Prior. 24/10. 1922.)

SCHOTTLÄNDE

Ward Baking Company, Amerika, Koagulieren von Milch. Man verwendet an Stelle von Lab ein Prod., welches durch Züchtung von *Mucor Rouxii* auf einem geeigneten Nährboden, z. B. Reis erhalten wird. (F. P. 558022 vom 13/10. 1922, ausg. 20/8. 1923.)

OELKE

XVII. Fette; Wachse; Seifen; Waschmittel.

B. Marcille, Die Haltbarmachung der Oliven zur Ölgewinnung. Zur Ölgewinnung ist eine gewisse Reifung der Oliven nützlich. Um aber den bei zu langer Aufbewahrung auf Ausbeute u. Güte des Öles schädlich wirkenden Schimmelbildungen

begegnen, fand Vf., daß besonders Vakuum u. CO₂-Atmosphäre Schimmel verhindern. Besonders bewährte sich für Ölmühlen im Großen Aufbewahrung in mit CO₂ gefüllten Silos. Für die Ölgüter kommen besonders dicht verschließbare Jammern in Frage, die unter Durchleiten von CO₂ zu füllen sind. In solchen Jammern vergären die Kohlenhydrate des Fruchtfleisches, wodurch die Früchte sich haltbarer werden. (Ann. des Falsifications 17. 395—404. 1924. Tunis, Lab. Services Administratifs.)

GROSZFELD.

E. A. Kolty, *Über die Bleichung von Kernseifen*. Oxydierend wirkende Bleichmittel eignen sich nur für harzfreie Seifen. Bei harzhaltigen Kernseifen empfiehlt Vf., den Harzleim mit hydroschwefliger Säure bzw. deren Salzen zu bleichen u. den gebleichten Leim der Seife zuzusetzen. (Ztschr. Dtsch. Öl- u. Fettind. 44. 53—57. 1924.)

HELLER.

J. Sinzig, *Beseitigung übelriechender Abdämpfe einer Kerzen- und Seifenfabrik*. Abdämpfe werden durch Wasserzerstäuber kondensiert; dabei blasen die Zerstäuber gegeneinander, um die Wrkg. der Luftbewegung aufzuheben. (Gesundheits-Ingenieur 47. 493—94. 1924. Graz.)

SPLITTGERBER.

—, *Silberschmierseifen aus Fettsäuren*. Die ohnehin dunkle Farbe der Fettsäuren wird durch die Auflösung von Eisen der Apparatur noch verstärkt. Vf. empfiehlt, Laugeüberschüssen u. Oxydationsbleichmitteln zu arbeiten. (Ztschr. Dtsch. Öl- u. Fettind. 44. 573—74. 1924.)

HELLER.

—, *Naturkornschmierseifen für Walkzwecke*. Seifensiederische Einzelheiten. (Ztschr. Dtsch. Öl- u. Fettind. 44. 583. 1924.)

HELLER.

H. Heller, *Über Trübungen in technischen Fettsäuren*. Solche können bedingt durch W., Seife u., wie Vf. fand, durch Silicate aus der zum Bleichen dienenden Bicherde. Bei der Zers. mit H₂SO₄ entsteht Kieselsäuregel, das alle anderen Verunreinigungen hartnäckig festhält. Es werden Hinweise zur Orientierung über die Qualität gegeben. (Allgemeine Öl- u. Fett-Zeitung 21. 519—20. 1924. Sep.)

HELLER.

G. Knigge, „*Verseifbarkeit*“. Vf. bestimmt nach vier verschiedenen Methoden den Gehalt einer handelsüblichen Cocosfettsäure an seifenbildender Fettsäure u. Glycerin. Die so ermittelten Werte der „Verseifbarkeit“ sind je nach der Methode verschieden. Vf. schlägt deshalb vor, den Begriff „Verseifbarkeit“ ganz fallen zu lassen u. den Gehalt an Glycerin u. Gesamtfettsäuren zugrunde zu legen. (Ztschr. Dtsch. Öl- u. Fettind. 44. 570—72. 1924. Berlin-Lichterfelde.)

HELLER.

H. Heller, *Zur Beurteilung von Bleicherden*. Zur Ermittlung des für die Beurteilung von Bleicherden wichtigen Saugvermögens gegenüber fetten Ölen verfährt Vf. wie folgt: 10 g Erde oder Kohle werden in einem Extraktionskolben tropfenweise mit einem klaren, schleimfreien Öl so lange getränkt, bis die zusammenziehende M. an den Wandungen schmiert, also Öl abgibt. Die Anzahl der verbrauchten cem Öl mit 10 u. dem spezif. Gew. des Öles multipliziert, gibt die prozentuale maximale Saugfähigkeit der Erde an. Die Sättigungswerte einer Anzahl von Bleicherden sind tabellar. aufgeführt. (Allgemeine Öl- und Fett-Zeitung 21. 471—72. 1924. Sep.)

HELLER.

Walter L. Brooke, *Auffindung von Spuren von Alkali oder Seife in raffiniertem Kokosöl*. Durch Veraschen von 25 g im Ni-Tiegel u. folgende Prüfung mit Natriumphosphat ließen sich noch <0,02% Na₂CO₃ u. bis 0,00065% NaOH im Kokosöl nachweisen. (Philippine Journ. of Science 25. 151—53. 1924. Manila, Bureau of Science.)

SPIEGEL.

J. Davidsohn, *Die Bestimmung des kohlensauren Alkalis in Seifen und Seifenpulvern*. Die vom Vf. früher (Seifensieder-Ztg. 34. 41; C. 1907. I. 1353 [1907]) gegebene Methode setzt die gleichzeitige Ermittlung des freien Alkalis voraus. Die Best. der CO₂ im Geißlerschen App. liefert andererseits nur angenäherte Werte. Vf. schlägt deshalb folgende Methode vor: 2—4 g Seifenpulver werden in

wss. Lsg. mit $n/2$ HCl titriert (Methylorange). Seife u. Wasserglas setzen hierbei mit um. Unter Zugrundelegung eines Mol.-Gew. der vorhandenen Säuren von 300 ist 1% derselben = 0,18% Na_2CO_3 u. 1% $\text{Na}_2\text{Si}_2\text{O}_5$ = 0,35% Na_2CO_3 . Nach Ermittlung des Fettsäure- u. Wasserglasgehaltes läßt sich der Carbonatgehalt berechnen. (Ztschr. Dtsch. Öl- u. Fettind. **44**. 569—70. 1924. Berlin-Schöneberg.)

G. Knigge, *Ein Beitrag zur Bestimmung von Cyclohexanol in Seifen*. 1. Verss. des Vfs. wird Cyclohexanol durch Erhitzen mit Dichromatschwefelsäure restlos oxydiert. Die Dest. der Kalkseife mit Wasserdampf u. nachheriges Äthern des Destillates ergaben annähernd brauchbare Resultate. (Ztschr. Dtsch. Öl- u. Fettind. **44**. 581—82. 1924. Berlin-Lichterfelde.) HELLI.

Wilhelm Adriani, Dordrecht, Holland, *Reinigung von Ölen und Fettm* pulverförmigen, den Ölen gegenüber neutralen Stoffen u. Wasserdampf, 1. a gek., daß man die Dampfbehandlung der mit den pulverförmigen Stoffen, 1 Bleicherde, Kohle o. dgl. versetzten Öle oder Fette so lange, gegebenenfalls im Vakuum, fortsetzt, bis die Carbonylkr. im Destillat ganz oder fast verschwunden ist. — 2. dad. gek., daß man als pulverförmige Zusatzstoffe Metalle, wie z. B. Fe, Ni, Mn, Co, deren Oxyde oder Silicate in fein verteilter Form, gegebenenfalls als Träger verwendet. — An Stelle von Wasserdampf können auch indifferenten Gase verwendet werden, wobei im Falle der Verwendung von H_2 unter Bedingungen zu arbeiten ist, bei denen eine Anlagerung des H_2 an das Öl oder die Fette nicht stattfindet. (D. R. P. **404708** Kl. 23a vom 19/8. 1919, ausg. 21/8. 1924.) OELK.

August Jacobi Akt.-Ges., Darmstadt, *Kühlplatte*. Die Seifenkühlplatte nach dem Hauptpatent, welche für nach Art der Filterpressen gebaute Seifenkühlmaschinen bestimmt ist u. deren wesentliches Kennzeichen in Ansätzen zu sehen ist, die eine Lageveränderung von Kühlplatten u. Formrahmen gegeneinander verhindern, ist dahin verbessert, daß die Ansätze die Plattenränder deckelartig umklammern. Es wird ein genaues Anpassen von Kühlplatte u. Rahmen gewährleistet. (D. R. P. **404017** Kl. 23f vom 2/12. 1922, ausg. 10/10. 1924. Zus. zu D. R. P. **211838**.) OELK.

Raoul Maxime Berline, Seine, Frankreich, *Oxydieren von Leinöl, trocken* die Ölen und dgl. Man leitet O_2 oder O_3 in fein verteilter Form, z. B. durch Porzellanröhrchen in die Öle u. trennt von den ausgeschiedenen festen Teilen durch Filter oder Schleudern. (F. P. **560194** vom 25/3. 1922, ausg. 29/9. 1923.) FRAZ.

P. Farup, Vettakollen b. Aker, Norwegen, *Herstellung eines Tranpräparates*. Tran wird mit ca. 10% 96%ig. A. vermischt. — Durch den Zusatz des A. wird der Tran leichter fl. u. erhält einen besseren Geschmack. In dem Prod. lassen sich auch leicht andere aromatisierende, geschmacksverbessernde oder therapeutisch wirksame Stoffe auflösen, wie Saccharin oder alkoh. Pflanzenextrakte. (N. P. **1887** vom 12/6. 1922, ausg. 17/9. 1923.) SCHOTTLÄNDE.

Willy Franke, Breslau, *Mischvorrichtung zur Gewinnung von Seifenmasse*, dad. gek., daß mehrere, gleichzeitig der Fortbewegung der Seifenmasse dienende, mit verschiedener Umdrehungszahl umlaufende Rührwerke derselben angeordnet sind, daß das Gemenge aus Seife u. Soda zuerst das die größte Umdrehungszahl aufweisende Rührwerk u. dann die langsamer laufenden Rührwerke der Reihe nach durchläuft. — Es wird eine vollkommen gleichmäßige Verteilung der Soda in der Seifenmasse erzielt. (D. R. P. **404015** Kl. 23f vom 18/12. 1922, ausg. 11/10. 1924.) OELK.

H. Schmitt & Co., Schweiz, *Mittel zum Reinigen von Baumwolle*. Man erwärmt eine Lsg. von NaOH, KOH, Wasserglas u. NH_3 auf 45°, gibt Kolophonium zu u. dann bei 65° Ricinusöl; Rohbaumwolle wird beim Erhitzen mit dieser Lsg.

a 1 Stde. von Fetten, Harzen usw. gereinigt. (F. P. 560456 vom 28/12. 1922, g. 5/10. 1923.) FRANZ.


XVIII. Faser- und Spinnstoffe; Papier; Cellulose; Kunststoffe.

L. Meunier und A. Breguet, Über die zwischen dem Alter der Cellulose und Eigenschaften der von ihr gelieferten Nitrocellulose bestehenden Beziehungen. Aus einem Stück Pappelholz wurden nach den Jahresringen 4 Teile Holz verschiedenen Alters (36—48; 24—36; 8—24; bis 8 Jahre) herausgeschnitten, in gleicher Weise NaOH in Cellulosebrei verwandelt u. in gleicher Weise nitriert. Die erhaltenen Nitrocellulosen zeigten ungefähr gleichen N-Gehalt, aber von innen nach außen, mit abnehmendem Alter des Holzes, regelmäßige steigende Viscosität. (Rev. g. des Colloides 2. 289—94. 1924. Lyon, Univ.) SPIEGEL.

Istituto Sieroterapico Milanese und Domenico Carbone, Mailand, Italien, Herstellung von Kulturen des *Bacillus felsineus*. Ein aus in Stücke zerlegtem, mit V befeuchtetem u. sterilisiertem Hanf bestehender Nährboden wird mit saccharomyces ellipsoideus geimpft, der besonders in einer Malzabkochung gezüchtet wurde. C zur Entw. gelangte Bakterienkultur dient, nach Zusatz frischer Mengen des charomyces ellipsoideus, zur Gewinnung weiterer Kulturen. Nach Durchschütteln l gut entwickelte Bakterienkulturen enthaltenden Fl. wird sie in die zum Rösten v Pflanzenfasern dienenden Bassins eingebracht. (F. P. 557832 vom 26/10. 1922, g. 16/8. 1923. It. Prior. 12/11. 1921.) SCHOTTLÄNDER.

Forschungsinstitut Sorau N. L. des Verbandes Deutscher Leinen-Industrieller E. V., Sorau, N.-L., Präparat zur Förderung des biologischen Röstfahrens. Zu den Ref. nach F. PP. 559419; C. 1924. I. 381 u. 557832; vorst. (hierzu vgl. auch CARBONE u. TOBLER, Faserforschung 2. 163; C. 1923. II.) ist folgendes nachzutragen: Bei 3-tägiger Züchtung von Kulturen des *Bacillus felsineus* auf fl. Kartoffelnährboden bei 37° steigt die eine typ. orange-gelbe Haut leitende Kartoffelmasse an die Oberfläche der Fl. Starker Geruch nach Frucht-rester zeigt die gute Entw. des *Bacillus felsineus* an. Es dürfen nur Kulturen n den genannten Erscheinungen zur Impfung des Röstwassers benutzt werden. Zn Abrösten von einem Doppelzentner *Flachs* sind etwa 3 l dieser Vorkultur awendig. Der *Bacillus felsineus*, ein anaerober Organismus, bildet dünne, selten Clostridienformen schwellende Formen. Die mit „Ziehl“ sich rosa färbenden, glichen Sporen liegen meist dem einen Ende des Bakteriums genähert. Auf tägiger Kultur von *Ramiefasern* sind die Vegetationsformen 0,3—0,4 zu 3—5 μ B, die freien Sporen 1,5 bis zu 3 μ . In *Kartoffelkulturen* tritt Sporenbildung spärlich ein. Die Sporen sind mit „Gram“ positiv, die vegetativen Stäbchen nt. Optimale Temp. des Röstorganismus bei 37°, unter 20° hört die Röst- gkeit auf. Sein V. beschränkt sich anscheinend auf die Rösten, auf die *Flachs-Tanfstengel* u. auf den Boden, wo diese gewachsen sind. Der *Bacillus felsineus* g, im Gegensatz zu den bekannten anaeroben Amylobakterien, mit J keine kogen- oder Iogenrk. (D. R. P. 399765 Kl. 29b vom 11/11. 1922, ausg. 29/7. 1924. It. Priorr. 12/11. 1921 u. 31/7. 1922.) SCHOTTLÄNDER.

Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Leverkusen b. Köln a. Rh. nder: Wilhelm Lommel, Wiesdorf a. Niederrh., und Heinrich Münzel, (Leverkusen), Verfahren zum Schützen von Wolle, Pelzen u. dgl. gegen Mottenfraß, l. gek., daß man sie mit chem. Stoffen behandelt, die die Gruppe —NH·X : Y ent- ten, wobei X N oder C, Y N, C oder ein Ring sein kann. — Solche Stoffe sind t. Äthylidenphenylhydrazon, $C_6H_5 \cdot NH : N : CH \cdot CH_3$, Diazoaminobenzol, $C_6H_5 \cdot NH \cdot$



$\text{N} : \text{N} \cdot \text{C}_6\text{H}_5$, *Triphenylguanidin*, $(\text{C}_6\text{H}_5 \cdot \text{NH})_2 : \text{C} : \text{N} \cdot \text{C}_6\text{H}_5$, *Phthalsäurephenylhydrazid*, $\text{C}_6\text{H}_5 \cdot \text{NH} \cdot \text{N}[\text{CO}_2\text{C}_6\text{H}_4]_2$, u. nebst. *Pyrazolon*. Es genügen äußerst geringe Mengen, um auf irgend eine Weise auf den zu schützenden Gegenstand

aus Wolle, Pelz usw. aufgebracht werden, um ihn vor dem Fraß durch Moten- und Raupen zu bewahren. (D. R. P. 402341 Kl. 451 vom 15/5. 1923, ausg. 1924.) SCHÖTTLÄNDER

Dürener Fabrik präparierter Papiere Renker & Cie., Niederau, Kr. Düren, Rhld., *Herstellung von Eisenblaupapier* mit nahezu unbegrenzter Haltbarkeit, dad. gek., daß gewöhnliche Negativroh-papiere durch Auftragen einer Lsg. von Salzen oder Doppelsalzen des dreiwertigen Fe oder einem Gemisch solcher Salze in üblicher Weise lichtempfindlich gemacht u. nach vorgenommener Trocknung mit $\text{Fe}(\text{CN})_3$ in fein gepulverter Form eingerieben werden. — Die beim Lagern eintretende Blaufärbung der bekannten Eisenblaupapiere wird vermieden. (D. R. P. 40316 Kl. 57b vom 8/2. 1924, ausg. 30/9. 1924.) KÜHLING

Nicolaus v. Hornyanszky, Budapest, *Verfahren zum Feuersichermachen von Stroh oder von Schilfrohr*, dad. gek., daß das Stroh oder Rohr zwecks Aufschließen der Pflanzenschale in einem silicatlösenden Mittel aufgekocht wird, worauf die Behandlung mit Feuerschutzmitteln in bekannter Weise nachfolgt. — Die Aufschließung des Strohes oder Rohres erfolgt mit verd. NaOH oder Na_2CO_3 -Lsg., zweckmäßig unter Druck, wodurch eine Aufnahme der Feuerschutzmittel, z. B. einer Mischung aus W., $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$, $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7$ u. Stärke bestehenden Mischung, von dem Stroh oder Rohr wesentlich leichter u. vollständiger erfolgt. Die feuersicher gemachten Pflanzenteile dienen zur Dachbedeckung. (D. R. P. 402447 Kl. 38h vom 2/9. 1923, ausg. 15/9. 1924.) SCHÖTTLÄNDER

Koholyt Akt.-Ges., Berlin, *Herstellung chlorreicher Produkte aus Sulfitzellstoffablaugen oder daraus hergestellten Celluloseextrakten*, dad. gek., daß man Sulfitstoffablauge oder die daraus hergestellten Celluloseextrakte mit freiem Cl_2 behandelt. Z. B. wird Sulfitzellstoffablauge, D. 1,313, mit W. verd. u. in die Lsg. Cl_2 so langsam eingeleitet, als es noch leicht aufgenommen wird. Unter Erwärmung der Fl. scheidet sich ein braunrotes Prod. ab, das abfiltriert u. mit NaCl-Lsg. gewaschen wird. Das mit Cl_2 weiter behandelte Filtrat liefert weitere Mengen des Prod. Man vereinigt die Rückstände, verrührt mit wenig W. u. kocht auf, wobei die M. vorübergehend schmutzig u. dunkler wird. Nach dem Erkalten wird filtriert u. mit NaCl-Lsg. nachgewaschen. Das in W., A., CH_3OH ll., in Aceton wl., in Bzl., Solventnaphthalin, Dichlorbenzol unl. Prod. hat in wss. Lsg. schwach saure Rk. u. läßt sich durch HCl u. NaCl aussalzen, fällt Leimslg. stark, mit FeCl_3 einen graugrünen Niederschlag gebend u. wird durch Al-, Cr- u. Erdalkalisalze ebenfalls gefällt. Es enthält ca. 36% Cl u. findet für sich allein zum Gerben tier. Häute Verwendung, wobei es ein braunes, vollgriffiges Leder nach Art des vegetabil. gegerbten liefert. (D. R. P. 401871 Kl. 12o vom 16/11. 1919, ausg. 10/9. 1924.) SCHÖTTLÄNDER

Koholyt Akt.-Ges., Berlin, *Herstellung von Chlorprodukten aus Pflanzenauszügen*, 1. dad. gek., daß die Chlorierung vorgenommen wird, nachdem die Pflanzenauszüge ganz oder größtenteils von W. befreit worden sind. — 2. dad. gek., daß die Oberfläche des Materials durch eine bewegliche Vorrichtung ständig verändert wird. — Z. B. wird zur Trockne eingedampfte, gepulverte Sulfitablauge in einer Kugelmühle unter Erwärmen von außen bei 50–60° mit Cl_2 behandelt, wobei sich ein schwarzes Pulver gelb färbt. Das in W. vollständig mit gelber Farbe l. Prod. enthält etwa 25% Cl u. besitzt dieselben Eigenschaften wie die durch Einw. in wss. Lsg. erhaltenen Cl-Derivv. der Sulfitablauge. Die Chlorierung erfolgt unter behäuflicher Entw. von reiner gasförmiger HCl, die gesondert aufgefangen u. verarbeitet wird. — Zerstäubt man W. enthaltende, durch Erwärmung verflüssigte Sulfitablauge

h eine Zerstäubungsdüse in einem Raum, in dem ein erwärmter Cl₂-Strom von nach oben geführt wird, so erfolgt die Chlorierung sehr schnell, so daß von Boden des Gefäßes die Cl-Derivv. der Sulfitablauge in fester Form gesammelt en. Das W. verdampft bei der Chlorierung größtenteils. Während beim riten in wss. Lsg. stets ein erheblicher Teil der Cl-Derivv. in der HCl gel. et u. nicht zur Abscheidung zu bringen ist, ermöglicht die neue Arbeitsweise erlustlose Verwertung der organ. Substanz, sowie der HCl. (D. R. P. 402997 Kl. 2o vom 14/4. 1922, ausg. 19/9. 1924.)

SCHÖTTLÄNDER.

Koholyt, Akt.-Ges., Berlin, *Herstellung von Sulfitzellstoff* durch Kochen von o mit vorgewärmter Sulfitlauge, 1. dad. gek., daß die den Kocher verlassende blauge zur Vorwärmung der Frischlauge benutzt wird. — 2. dad. gek., daß bebei der Sulfitprittfabrikation abfallende h. Schlempe zur Vorwärmung der hblauge benutzt wird. — Es wird eine Ersparnis an Zeit u. Heizmaterial er. (D. R. P. 404504 Kl. 55b vom 11/2. 1922, ausg. 20/10. 1924.)

OELKER.

Koholyt Akt.-Ges., Berlin, *Herstellung von Sulfitzellstoff* durch Kochen von o mit vorgewärmter Sulfitlauge gemäß Pat. 404504, dad. gek., daß die den oer verlassende h. Ablauge vor ihrer Entspannung zur Vorwärmung der hblauge benutzt wird. — 2. dad. gek., daß die h. Ablauge nach der Neutrali- si zur Vorwärmung der Sulfitlauge benutzt wird. — 3. dad. gek., daß die Vor- rung der Sulfitlauge in zwei Stufen erfolgt, u. zwar in erster Stufe durch die hblauge oder die neutralisierte Kochlauge u. in zweiter Stufe durch die den oer verlassende Ablauge. — Es wird noch eine bessere Ausnutzung der Wärme nach dem Verf. des Hauptpat. erreicht. (D. R. P. 404505 Kl. 55b vom 22/2. 1922, ausg. 20/10. 1924. Zus. zu D. R. P. 404504; vorst. Ref.)

OELKER.

Kiengesellschaft für Zellstoff- und Papierfabrikation, Aschaffenburg a. M., *Ubergewinnung der beim Abgasen von Zellstoffkochern übertretenden Flüssigkeits- mengen*, dad. gek., daß man das Gemisch ohne Zwischenbehälter un- ver in einen zweiten unter vollem Betriebsdruck stehenden Zellstoffkocher t. (D. R. P. 405058 Kl. 55b vom 9/11. 1923, ausg. 24/10. 1924.)

OELKER.

Kiengesellschaft für Zellstoff- und Papierfabrikation, Aschaffenburg a. M., *Ubergewinnung eines zur Verwendung in der chemischen Industrie sowie zur Herstellung spezialpapieren besonders geeigneten Zellstoffs*, dad. gek., daß man den bleich- in Zellstoff im Bleichholländer mit Alkali behandelt u. alsdann in demselben hader durch unmittelbare Zuführung von fl. oder gasförmigem Cl bleicht. — ved eine Ersparnis an Zeit, Material- u. Betriebskosten erzielt. (D. R. P. 405059 Kl. 55b vom 26/9. 1922, ausg. 24/10. 1924.)

OELKER.

Koholyt Akt.-Ges., Berlin, *Füllen von Zellstoffkochern mit Holz*, dad. gek., nach dem Zusammensacken des Holzes während des Kochvorganges weiteres nachgefüllt wird. — 2. dad. gek., daß außer Holz auch noch Kochlauge nach- gefüllt wird. — 3. dad. gek., daß zunächst mit überschüssiger Lauge angekocht di. dann der Überschuß an Lauge vor Nachfüllen des Holzes in einen zweiten r oder in einen Vorratsbehälter übergeführt wird. — Es wird eine bessere nutzung des Kochraums als bisher ermöglicht. (D. R. P. 405100 Kl. 55b vom 12/2. 1923, ausg. 27/10. 1924.)

OELKER.

Hugo Stinnes, Mülheim, Ruhr, *Chlorhaltige Produkte aus Zellstoffablaugen*. (D. R. P. 400255 Kl. 12o vom 4/10. 1921, ausg. 6/8. 1924. Zus. zu D. R. P. 397604;

D. R. P. 1547. — C. 1924. I. 2659 [F. P. 542027]. 2660 [F. P. 547359].)

SCHÖTTL.

Yoshi Kawashima, Japan, *Überzugsmasse für Flugzeugbespannungen*. Man telt Cellulosenitrat mit einer wss. Lsg. von Borsäure oder von Borsäure u. u. löst dann in Aceton, oder man versetzt eine Lsg. von Cellulosenitrat in t. mit einer wss. Lsg. von Borsäure u. MgCl₂. (F. P. 560341 vom 23/12. 1923, ausg. 2/10. 1923.)

FRANZ.

William Stocks, Fitzroy, Victoria, Australien, *Herstellung von lederähnlichen Stoffen*. Man vermischt fein zerkleinerten vulkanisierten Altkautschuk auf Mischwalzen mit Rohkautschuk u. Schwefel; die erhaltene plast. gewordene M. wird dann auf erhitzten Walzen mit Pontianac, Harz, Bleiweiß u. Ricinusöl vermischt u. vulkanisiert. Die M. dient zur Herst. von Fußbodenbelag, Wandbekleidung, Sohlen usw. (A. P. 1508899 vom 8/11. 1918, ausg. 16/9. 1924.) FRAZ.

William Stocks, Fitzroy, Victoria, Australien, *Herstellung von Kautschuk und lederähnlichen Massen*. Fein zerkleinerter vulkanisierter Altkautschuk wird auf erhitzten Walzen solange bearbeitet, bis er plast. geworden ist; die M. wird dann auf Mischwalzen mit Rohkautschuk, Bleiweiß, Ricinusöl, Pontianac u. Harzlag. vermischt u. vulkanisiert. Die M. dient zur Herst. von Fußbodenbelag, Sohlen usw. (A. P. 1508900 vom 8/11. 1918, ausg. 16/9. 1924.) FRAZ.

Urbain Pierre Marius Chandeysson, Alpes-Maritimes, Frankreich, *Herstellung von Kunstleder*. Man vermischt Stärke mit Schwefel u. ZnCl_2 zu einer Paste u. gibt hierzu die Lsg. von Leim in ZnCl_2 u. Kautschuklösung; mit diesem Gemisch wird das Gewebe mehrere Male in dünnen Schichten überzogen u. auf dem Trocknen vulkanisiert u. mit einer Lsg. von $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ behandelt. Als Füllstoffe kann man MgCO_3 , Korkpulver usw. zusetzen. (F. P. 558630 vom 14/11. 1923, ausg. 30/8. 1923.) FRAZ.

XIX. Brennstoffe; Teerdestillation; Beleuchtung; Heizung

Waldemar Dyrssen, *Die Verwendung von Sauerstoff bei der Vergasung von Kohle*. Die Aufstellung einer Bilanz ergibt, daß die Verwendung von O_2 in der Gasfabrikation unrationeller ist als die üblichen Vergasungsprozesse. (Trans. Inst. Mining and Metallurg. Eng. 1924. Nr. 1377. 47—57. New York.) BECFR.

R. Lessing und **M. A. L. Banks**, *Katalytische Beeinflussung der Verkokungsvorgänge*. Vff. haben den Einfluß von Zusätzen auf Koksausbeute u. -beschaffenheit untersucht. Da der Einfluß des natürlichen Aschegehaltes der Kohlen sehr störend wirkt, aber ohne chem. Eingriffe nicht auszuschalten ist, haben Vff. zunächst mit Zucker u. Cellulose gearbeitet. Die Verkokungsbedingungen waren konstant; jedoch wurde der Pt-Tiegel nur 3 Min. erhitzt. Eine größere Anzahl Zusätze wurden auf ihre Wrkg. geprüft (Metalloxyde, Salze, anorgan. Säuren etc.). Die Koksausbeuten schwankten bei Zucker zwischen 5,02 u. 18,74%, bei Cellulose zwischen 5,10 u. 20,36%. Sie erhöhten sich wesentlich durch Salze starker Säuren u. schwacher Basen. Im übrigen gehen die Resultate ziemlich regellos ineinander. Vff. meinen, daß ein Zusatz, sofern er überhaupt eine Wrkg. hat, in den meisten Fällen die Koksausbeute erhöht. Nach Ansicht der Vff. handelt es sich anscheinend um katalyt. Wrkg.; die geringen, benötigten Mengen deuten wenigstens darauf hin. Die meisten Zuschläge lieferten bei Verwendung feuchten Zinkoxyd geblähten Koks; Ausnahmen: die meisten Chloride u. Na-Silicat. Trockener Zinkoxyd lieferte geblähten Koks bei Zusatz von H_2SO_4 , Sulfaten, NaCl u. KNO_3 . Der Aschegehalt des Kokses wird erhöht durch Chloride u. Nitrate, herabgesetzt durch Alkalien. Weiterhin wurden noch Vorverss. mit einigen Kohlen ausgeführt u. zwar mit Vitrain u. Clarain einer Dalton-Main-Kohle. Die Koksausbeuten schwankten zwischen 65,7 u. 57,6% gegenüber 53,6% bei Verkokung ohne Zusatz. Die Unterschiede im Aussehen der Koksproben waren diesmal geringer; anscheinend bestanden Unterschiede hinsichtlich der Porosität u. der D. (Gas Journ. 16. 2. 1924, bis 225. 1924.) BIELEFELD.

A. E. Beet, *Analysen von Fusain*. Eine größere Zahl von Fusainproben wurden unters. u. ebenso die zugehörigen Kohlen. Fusain zeigte bei sämtl. Proben einen geringeren Wassergehalt als die entsprechenden Kohlen; der Gehalt an H_2 u. N_2 war ebenfalls geringer, der an C größer. Fusain lieferte bei der Verkokung

allgemeinen weniger Gase als die Kohlen; der KW-stoffgehalt der Gase aus Fusain war geringer als der aus Kohlen, Durchschnittliche Zus. von Fusain: 8% C, 3% H, 5% O, 0,5% N u. 2,5% S. Die Pyridinextraktmengen betrugen Durchschnitt 1,4% bei Fusain gegenüber 16% bei den Kohlen. (Fuel 3. 390 392. 1924. Sheffield, Univ., Dep. of Fuel Technology.)

BIELENBERG.

G. Coles und J. Iven Graham, *Der Einfluß der Vorerhitzung nicht oxydierter und partiell oxydierter Kohlen auf ihr Absorptionsvermögen für Sauerstoff*. Die Unters. sind vorgenommen ausgehend von der Tatsache, daß eine durch Introsiv-Basalt kataktmetamorph veränderte Barwoodkohle auffällige Neigung zur Selbstentzündung zeigte. Vf. haben zunächst, auf einer Beobachtung von TIDESWELL u. WHEELER fußend, wonach oxydierte Kohle beim Erhitzen auf 200° im Vakuum etwa 95% ihrer ursprünglichen Aufnahmefähigkeit für O₂ wieder erhält, eine Kohle im Vakuum Temp. von 200, 300, 400 u. 500° so lange ausgesetzt, bis sie keine gasförmigen Prodd. mehr abgab. Die so behandelten Kohlen wurden dann im CO₂-Strom, trockenen oder feuchten Luftstrom bei 100° oxydiert u. die aufgenommene Menge O₂ bestimmt. Dabei zeigte sich, daß die Vorerhitzung die O₂-Aufnahme vermindert u. zwar um so stärker, je mehr die Temp. der Vorerhitzung 300° übersteigt. Vf. haben dann weiterhin eine Kohle bei 100° oxydiert u. durch Erhitzen auf 200° im Vakuum reaktiviert. Bei dieser Reaktivierung wurde nur 50% der ursprünglichen Absorptionsfähigkeit erhalten. Eine stärkere Reaktivierung (ca. 60% der ursprünglichen Absorptionsfähigkeit) trat durch Erhitzen auf 300° im Vakuum ein. Vf. haben diese Behandlung der Kohle (Oxydation mit nachfolgender Reaktivierung) mit immer derselben Probe mehrfach wiederholen können. Die bei der Oxydation u. bei der Reaktivierung entstehende Menge von CO₂ u. CO u. ihr Verhältnis zueinander u. zur Menge des verbrauchten O₂ wurden bestimmt. (Fuel 3. 390—90. 1924. Birmingham, Univ.)

BIELENBERG.

Ludwig Buck, *Bericht über vergleichende Verdampfungsversuche mit Gaskoks und Zechenkoks in der Städtischen Badeanstalt Charlottenburg*. Vf. schildert den Versuch mit Wass.-Kessel u. die Vers.-Anordnung. Es ergab sich eine Verdampfungsziffer von 7,3 bei Gaskoks aus den Gasanstalten Tegel u. Mariendorf, 7,37 für westfäl. u. 7,6 für obereschles. Zechenkoks. Erhebliche Unterschiede sind somit nicht zutage getreten. (Gas- u. Wasserfach 67. 632—33. 1924.)

BIELENBERG.

H. Pinsl, *Zur registrierenden Messung der Zusammensetzung von Cowpergasen*. Zur richtigen Beurteilung der Cowperabgase ist die Kenntnis der Bestandteile unverbrannter Gase notwendig. Zur registrierenden Aufzeichnung dieser Bestandteile wird der Doppel-Keramik-Mono-App. der Mono-Gesellschaft, Hamburg, empfohlen; an einigen Beispielen aus der Praxis wird die Wirkungsweise des App. gezeigt. (Feuerungstechnik 13. 1—2. 14—16. 1924. LUITPOLD-Hütte, Amberg.)

Fritz G. Hoffmann, *Zur Benennung der brennbaren technischen Gase*. Vf. nimmt Stellung gegen eine Reihe von in vielen Büchern noch anzutreffenden Benennungen, die nach seiner Ansicht eine unnötige u. von der Praxis kaum verstandene Unterteilung des Begriffes Generatorgas darstellen. Vorschläge zur richtigen Benennung werden gemacht u. eine Reihe von sprachlichen Verbesserungsvorschlägen besprochen. (Gas- u. Wasserfach 67. 629—31. 1924. Leipzig i. Sa.)

BIELENBERG.

Willy Grosse, *Der heutige Stand der Torfteer- und Braunkohlenteerindustrie mit besonderer Berücksichtigung der Generatorteer-Nebenerzeuger*. Kurze Übersicht über Gewinnung u. Eigenschaften der Teere u. ihre Verwertung. (Gas- u. Wasserfach 67. 627—29. 1924. Berlin.)

BIELENBERG.

M. A. Rakusin, *Die moderne Adsorptionslehre in ihrer Bedeutung für die Chemie und Technologie des Erdöls*. Eingehende Würdigung der Theorie u. ihrer prakt. Auswertung auch auf die Geologie des Erdöls. Vf. weist darauf hin, daß MENDELEJEV

schon 1869 ähnliche Anschauungen wie FREUNDLICH entwickelte. (Petroleum 0 1695—99 u. 1761—66. 1924. Moskau.)

HERZENBERG

Gasolin Products Cy, Das Cross-Crackverfahren. Die Spaltung der KW-Saff erfolgt nur in der fl. Phase; zum Unterschied von ähnlichen Verff. wird bei hohem Druck (ca. 40 at.) gecrackt, daß das sich bildende Bzn. fl. bleibt. Ähnlich wie beim Dubbs-Verf. (A. P. 1488325; C. 1924. II. 2444) wird das Rohöl (nisi Gasöl) zunächst in Röhrenbündeln bis 450° erhitzt u. gelangt sodann in die in einem Stahlblock geschmiedete, nietlose Reaktionskammer, die nur gegen Wärmeausstrahlung geschützt wird, ohne erhitzt zu werden. Hier erfolgt die Krsabscheidung. Im Gegensatz zum Dubbs-Verf. erfolgen Cracking u. Dest. räumlich getrennt, letztere bei gewöhnlichen Druck. Vorteile des Verf.: Geringe Brand- u. Explosionsgefahr, großer Durchsatz, hohe Bzn.-ausbeute. Letztere beträgt im G.-Betrieb bei Gasöl 55—75%, bei Heizöl 40—50%. — Skizze u. Photographie der Gesamtanlage erläutern die Beschreibung. (Petroleum 20. 1766—69. 1924. Kansas City [Mo. O.])

HERZENBERG

F. D. Mahone, Die elektrische Entwässerung von „Cutoil“. (Vgl. Trans. Am. Inst. Mining and Metallurg. Eng. 1924. Nr. 1354; C. 1924. II. 1975.) „Cutoil“ ist ein Rohöl, das im Gemisch mit W. in einer durch die Schwerkraft allein unlöslichen Emulsion dem Bohrloch entspringt. Vf. bespricht das Brechen dieser Emulsion, indem man das Öl der Einw. eines geeigneten Kraftfeldes aussetzt, in der Ausführung, wie es sich in den westlichen Ölfeldern ausgebildet hat. (Mining and Metallurgy 5. 448—49. 1924. Los Angeles [Calif.])

RÜHL

Karl Kahn, Neue Mittel zur Vereinfachung und Verbilligung von Vakuum-Ölanlagen. Nach Ansicht des Vf. soll es möglich sein, durch Anwendung zweier von ihm angegebener Pumpen, bei Hochvakuumanlagen für die Schmieröldest. ohne die Zuhilfenahme natürlicher Niveaudifferenzen, wie die Hochstellung der Kondensation, zu arbeiten u. dadurch an Konstruktionsmaterial zu sparen. Mithin des „Hochvakuumförderapp.“ des Vf., einer mit 3 zwangsläufig gesteuerten Ventilen ausgestatteten Kolbenpumpe, soll die Differenz zwischen dem Vakuum der barometrischen Kondensation u. dem schlechteren Vakuum der Destillatleitungen zur schnellen Beförderung der Destillate ausgenutzt werden. Näheres ist aus beigegebener Skizze zu ersehen. Der zweite App. ist eine „Pumpe ohne schädlichen Raum“, bei welcher die dem Kolben gegenüberliegende Zylinderwand als durch Federn beweglicher Gegenkolben ausgebildet ist, um ein völliges Andrücken des Kolbens zu erreichen u. somit nach dem Vf. zu einem vollkommenen Vakuum zu gelangen. Indem eine Pumpe doppeltwirkend gebaut wird, d. h. auf der einen Seite als Destillatpumpe auf der anderen zur Abfuhr der permanenten Gase u. Wasserdämpfe, soll auch die barometr. Kondensation fortfallen können. Wie eine vollkommene Trennung von Wasser- u. Öldämpfen erfolgen soll, gibt Vf. nicht an. Auch werden Ergebnisse prakt. Verss. nicht mitgeteilt. Eine Tabelle gibt die mutmaßlichen Ersparnisse. Skizzen erläutern das Gesagte. (Petroleum 20. 1689—95. 1924. Bukarest.) HERZ

F. J. Nellensteyn, Bereitung aktiver Kohle aus Asphalt und Anthrazit durch die Einwirkung von Jod. (Vgl. Chem. Weekblad 21. 102; C. 1924. II. 781.) Asphalt u. Anthrazit werden durch Jod in stark adsorbierende Kohle umgewandelt. Entfernung des Jod am besten durch Umwandlung in NH_4J u. Auskochen mit W. Der Aktivierungsvorgang bei Kohle verläuft in 2 Phasen, von denen die erste durch die chem. Rk., die zweite durch die Oberflächenaktivität beherrscht wird. Letztere wird von anderen Autoren vielfach irrtümlich als Freilegung der C-Oberfläche angesehen. Durch die Auffassung des Vf. wird die geringe Wrkg. der O-Aktivierung u. die starke Wrkg. von J_2 erklärt. — Als Nebenrk. wurde beobachtet, daß bei entstehende HJ die S-Verbb. verschiedener Mineralöle in H_2S umwandelt. (Chem. Weekblad 21. 533—36. 1924. Delft, Lab. f. Chem. Technol.)

GROSZFEL

J. Hudler, *Hochdruckdampf und Kesselfeuerung unter besonderer Berücksichtigung der nassen Brennstoffe*. Die zur Erzeugung von Hochdruckdampf erforderlichen höheren Temp. der Rauchgase bedingen eine Vortrocknung der nassen Brennstoffe, wozu Vf. die Abgase zu benutzen empfiehlt. Er berechnet an verschiedenen Brennstoffen die wärmewirtschaftlichen Vorteile, die sich hierdurch ergeben lassen. (Feuerungstechnik 13. 9—14. 1924. Murnau a. St.) NEIDHARDT.

Ludwig Heinrich Diehl, Deutschland, *Schwimmaufbereitung von Kohle*. Der feine Kohlebrei wird mit einem Elektrolyten — einem Salz, Alkali oder einer Säure — vermischt u. einer die Form eines Doppelkegels besitzenden Kammer durch mehrere gebogene Röhren so zugeführt, daß er in kreisende Bewegung tritt. Gleichzeitig wird die Kammer entlüftet. Hierbei sinkt die Gangart durch weiteres an den unteren Kegel angeschlossenes Rohr zu Boden, die gereinigte Kohle steigt in die Höhe u. fließt durch die in den obersten Teilen des oberen Kegels befindliche Mündung eines engeren Rohres ab, dessen unterer Teil in der Gegenrichtung des erwähnten weiteren Rohrs verläuft. Die während der Entladung dicht geschlossenen Rohre werden zur Entleerung von Zeit zu Zeit geöffnet. (F. P. 557950 vom 30/10. 1922, ausg. 18/8. 1923. D. Priorr. 3/11. 1921 u. 11/1922.) KÜHLING.

Société Anonyme des Hauts-Fourneaux Forges et Aciéries du Saut-Du-Rhône, Frankreich (Tarn), *Künstlicher Brennstoff*, welcher durch einfaches Verarbeiten von Kohlenschlamm, z. B. dem Rückstand der Kohlenwäsche mit wertlosen Holzabfällen, Holzrinde, Tischlereiabfällen u. dgl. erhalten wird. (F. P. 551948 vom 13/5. 1922, ausg. 17/4. 1923.) OELKER.

Brikettharz-Gesellschaft m. b. H., Berlin-Schöneberg, *Herstellung eines Bindemittels* aus Säureharzen oder Rückständen, die hauptsächlich aus Säureharzen bestehen, insbesondere für die Herst. von Brennstoffbriketten nach Pat. 393546, dadurch, daß den Säureharzen oder säureharzhaltigen Rückständen vor, während oder nach der Behandlung mit Alkalien u. Luft wenige Hundertteile Steinkohlenteer, Kreosot, Rohnaphthalin, Anthracenöl, Rohanthracen-Preßkuchen u. dgl. zugesetzt werden. — Das Bindemittel ist leichter schmelzbar als das nach dem Hauptpatent erhaltene. (D. R. P. 405182 Kl. 10b vom 13/3. 1924, ausg. 27/10. 1924. Zus. zu Pat. 393546; C. 1924. II. 1299.) OELKER.

American Linseed Company, New York, *Herstellung eines künstlichen Brennstoffes*. Man löst Cellulosepentanitrat oder ein anderes geeignetes Cellulosenitrat in Acetaldehyd, versetzt die Lsg. mit einem Gerinnungsmittel, wie A. oder W., formt es zu erhaltenen plast. M. zu einem mit Kanälen versehenen Körper u. füllt diese Kanäle mit einer brennbaren Fl., wie A., welche die Koagulation des Cellulosenitrates noch weiter befördert. (Holl. P. 7443 vom 17/10. 1918, ausg. 15/8. 1922. Priorr. 17/7. 1917.) OELKER.

Établissements Poulenc Frères, Jean Gohin und Jean-Baptiste Senderens, Frankreich (Seine), *Brennstoff*, welcher aus einer Auflösung von hydriertem oder nicht hydriertem Naphthalin (über 25—30%) in hydriertem oder nicht hydriertem Petroleum besteht. (F. P. 549795 vom 28/7. 1921, ausg. 19/2. 1923.) OELKER.

Hritz Caspari, Gelsenkirchen, *Verschwelen von Steinkohle, Braunkohle u. anderen bituminösen Stoffen unter Gewinnung von hochwertigem Gas, Urteer u. Halbkoks*. Es besteht darin, daß das zu verschwelende Gut in staubförmigem Zustand in einen auf hoher Temp. erhitzten App. eingeführt, vermittelt eines elektr. Feldes gleichmäßig auf die h. Wände verteilt wird u. an ihnen herabgleitet. — Es wird ermöglicht, einen höheren Durchsatz als bisher zu erzielen u. das Verschwelen staubförmiger Kohle leichter zu machen. (D. R. P. 403505 Kl. 10a vom 25/10. 1923, ausg. 2/10. 1924.) OELKER.

Franz Fischer, Mülheim. Ruhr, *Kanalofen zur Tieftemperaturverkokung und Verschmelzung von Brennstoffen u. Schiefern*, dad. gek., daß sich im Innern des Kanalofens ein besonderer Heizkanal befindet, welchen die mit dem Destillationsgas gut beschickten Wagen in der Weise umschließen, daß die Destillationserzeugnisse mit dem Mauerwerk des Heizkanals nicht in Berührung kommen. — Eine unerwünschte Veränderung der Destillationsgase kann nicht eintreten. (D. R. P. 404695 Kl. 10a vom 2/9. 1923, ausg. 22/10. 1924.) OEKLE.

Th. Goldschmidt A.-G., Essen, Ruhr (Erfinder: **Josef Weber** und **Ernst Möllney**, Essen), *Beseitigung von höher siedenden Kohlenwasserstoffen, wie Naphthalin und anderen, aus Destillationsgasen*. Man leitet die Gase durch eine Pikrinsäure-Suspension, zerlegt die dadurch entstandene KW-stoff-Pikrinsäure-Säure mittels Alkali- oder Erdalkalioxyde u. macht nach der hierdurch bewirkten quantitativen Abscheidung des KW-stoffs (z. B. Naphthalin) die Pikrinsäure durch Ansäuern für die Wiederaufnahme von KW-stoffen wieder gebrauchsfähig. (D. R. P. 401794 Kl. 26d vom 7/10. 1922, ausg. 13/9. 1924.) OEKLE.

Hubert Hempel, Charlottenburg, *Cytingewinnung aus Steinkohlengas oder verwandten Gasarten* mittels metall. Fe o. dgl. in Ggw. von gegebenenfalls katalysatorgemachten W., dad. gek., daß das Fe in Form von Drehspänen oder sonstigen Körpern großer Oberfläche mit W. berieselt wird. — Die Verarbeitung des Eisencyanverbb. hoch angereicherten Rieselwassers, das prakt. frei von jeglichem Schlamm bleibt, gestaltet sich sehr einfach. (D. R. P. 404428 Kl. 26d vom 1/10. 1923, ausg. 18/10. 1924.) OEKLE.

Oskar Baumann, Amberg, Oberpf., *Brennen von bituminösen Schiefersteinen und anderen brennstoffhaltigen Gesteinen*, wobei das Gut unter Gewinnung von Nebenprodukten erzeugnissen zunächst entgast u. dann fertig gebrannt wird, dad. gek., daß in einem von 2 nebeneinander liegenden Ofenkanälen eines Doppeltunnel-, Ring- oder Schachtofens mit am fertigen Gut erhitzter Luft die Entgasung des vorgewärmten Gutes unter Ableitung des Überschusses an Destillationserzeugnissen bewirkt wird u. die entstandenen Verbrennungsgase durch eine Durchbrechung der Zwischenwand in das bereits entgaste Gut des anderen Ofenkanals geleitet werden u. nach Fertigbrennen der Vorgang unter Vertauschung der Ofenkanäle wiederholt wird. — 2. Doppeltunnelofen zur Ausführung des Verf. nach Anspruch 1, dad. gek., daß die Brennzonen der beiden Tunnel vor den den Abschluß gegen die Vorwärmzone bewirkenden Schiebern durch eine Öffnung der Zwischenwand verbunden sind, u. daß die Rauchabzugöffnungen zwischen Brenn- u. Kühlzone verbunden sind u. durch Kanäle mit dem Eingangsende der Vorwärmzone verbunden sind. (D. R. P. 403630 Kl. 80c vom 27/3. 1923, ausg. 2/10. 1924.) KÜHLIG.

Internationale Bergin-Compagnie voor Olie-en Kolen-Chemie, Haarlem, *Spalten von schweren Mineralölen, Kohlendestillationsprodukten und Suspensionen von Kohle in Teer*. Man setzt den Ölen usw. Adsorptionsmittel, wie alkal. gemahlten Raseneisenstein, Bauxit, natürlicher oder erschöpfter calcinierter, bituminöser Schiefer usw. u. Elektrolyten NaCl, MgSO₄, u. erhitzt unter Druck, der gelöstem Kohlenstoff scheidet sich nicht an den Gefäßwandungen, sondern an den gesetzten Adsorptionsmitteln ab. Man kann hiernach auch anorgan. Stoffe, die in Mineralölen enthalten sein können, gewinnen. Zur Gewinnung von Vanillin erhitzt man mexikan. Rohöl mit Diatomeenerde unter Druck, der Rückstand wird nach dem Brikettieren u. Glühen von neuem so oft verwendet, bis eine die Verarbeitbarkeit lohnende Anreicherung des V stattgefunden hat. (F. P. 56149 vom 27/1. 1923, ausg. 23/10. 1923.) FRIZ.

Chemisches Zentralblatt.

1925 Band I.

Nr. 3.

21. Januar.

A. Allgemeine und physikalische Chemie.

A. Pamflow, W. J. Pastanogow. Nachruf u. Bibliographie. Geb. 1885 im Gouvernement Perm, Doktorpromotion in Zürich 1915, gest. 25/4. 1924 in Iwanowo-Wosnessensk. (Ber. Polytechnikum Iwanowo-Wosnessensk 8. 3—5. 1924.) BIKER.

C. G. Bedreag, Physikalisches System der Elemente. (C. r. d. l'Acad. des sciences 179. 766—68. 1924. — C. 1924. II. 1877.) BIKERMAN.

Rudolf Wegscheider, Bemerkungen zu der Abhandlung von Friedrich Thiersch „Kinetik gekoppelter Reaktionen“. Die von THIERSCH (Ztschr. f. physik. Ch. 111. C. 1924. II. 2382) für Folgerkk., die er mit Unrecht „gekoppelte Rkk.“ nennt, aufgestellte Gleichungen finden sich schon in der älteren Literatur (vgl. z. B. WEGSCHEIDER, Monatshefte f. Chemie 33. 477; C. 1915. II. 454.) (Ztschr. f. physik. Ch. 113. 55—56. 1924. Wien, Univ.) BIKERMAN.

J. A. Christiansen, Über die Geschwindigkeit bimolekularer Reaktionen in Gasen. Bei Gasrkk. führt jeder (der Größenordnung nach) Zusammenstoß zur Wechselwrkg. (vgl. CHRISTIANSEN u. KRAMERS, Ztschr. f. physik. Ch. 104. 451; C. 1923. III. 879), in Lsgg., wie die vorliegenden Literaturangaben lehren, steht die Zahl der erfolgreichen Zusammenstöße um mehrere Zehnerpotenzen hinter der Zahl der Zusammenstöße zurück. Da die Rolle des ster. Faktors (Ω) in Gasen wohl kaum verschieden sein kann, sieht Vf. die Ursache der Erfolglosigkeit in der „induzierten Inaktivierung“ der krit. Komplexe seitens des Lösungsm.; ein auf der krit. Komplex treffendes Lösungsmittelmol. nimmt einen Teil der aufgespeicherten Energie des Komplexes u. beraubt ihn somit seiner Reaktionsfähigkeit. Ist ϱ die Geschwindigkeit der spontanen Umwandlung des krit. Komplexes, C die Konz. aller vorhandenen Moll. in der Nähe desselben, η ein Zahlenkoeffizient, so ist die Wahrscheinlichkeit, daß der Komplex wirklich reagiert, von der Form $\varrho/(\varrho + \sum \eta C)$. Die Konstante der bimolekularen Rkk. erhält dadurch die Form $k = Z_{12} \sqrt{T} e^{-Q/RT} \Omega / (\varrho + \sum \eta C)$, worin $Z_{12} \sqrt{T}$ die Zahl der Zusammenstöße bei Konz. = 1 bedeutet. Wenn die reagierenden Teilchen Ionen sind, so muß, um die Reaktionsgeschwindigkeit zu gewinnen, k nicht nur mit dem Prod. der Konz. multipliziert werden, sondern noch mit der Größe $e^{-v_2 e \varphi_1 / k T}$, die der Verdichtung der Ionen um ein entgegengesetzt geladene Ion Rechnung trägt, v_2 die Valenz der verdichteten Ionen, e die Elektronenladung, φ_1 das elektrost. Potential im Abstände η vom entgegengesetzt geladenen Ion, welches Vf. nach der Debye-Hückelschen Theorie (Physikal. Ztschr. 24. 186; C. 1923. III. 334) ermittelt. Auch die im Ausdruck für die induzierte Inaktivierung vorkommenden Konz. müssen auf die Verdichtung bezogen werden. Sieht man von dieser letzten Korrektur ab, entwickelt man φ_1 nach dem Abstand η und entfernt man am zweiten Gliede ab, so wird die Reaktionsgeschwindigkeit der Rkk. proportional $e^{1/10} \sqrt{\mu}$ (μ die „Ionenstärke“ von G. N. LEWIS, $\mu = \frac{1}{2} \sum C v^2$) proportional; die Größe läßt sich auf die Form $f_1 f_2 / f_{12}$ bringen, f_1 u. f_2 die Aktivitätskoeffizienten der reagierenden Ionen, f_{12} der der krit. Komplexe. In dieser Gestalt stimmt die Formel mit der von BRÖNSTED (Ztschr. f. physik. Ch. 102. 169; C. 1923. I. 10) überein. Da φ_1 von η abhängt, so könnte man aus der Konzentrationsabhängigkeit der Konstanten der Reaktionsgeschwindigkeit auf die gegenseitige

Entfernung von Ionen, bei welcher sie in Wechselwrg. treten, schließen; es geben sich aber unwahrscheinliche Werte. (Ztschr. f. physik. Ch. **113**. 35—1924. Kopenhagen, Univ.)

BIKERMAN

E. Wilke und **H. Kuhn**, *Über die Oxydation des Wasserstoffs durch Kaliumpermanganat*. Vf. bestimmen die Oxydation von H_2 durch $KMnO_4$, indem sie mal das Gas mit konstanter Strömungsgeschwindigkeit durch das mit der $KMnO_4$ -Lsg. gefüllte Reaktionsgefäß durchstreichen ließen, das andere Mal den H_2 einer größeren Flüssigkeitsoberfläche, welche langsam geschaukelt wurde, in rührung brachten. Die Messung selbst erfolgte auf gasvolumetr. Weg. Die benutzte Apparatur ist ausführlich beschrieben. Es zeigte sich, daß die Oxydation in saurer Lsg. langsamer verlief als in neutraler. Mit zunehmender Säurekonz. kann bei hohem $KMnO_4$ -Gehalt der Lsg. die Reaktionsgeschwindigkeit beliebig werden. In stark saurer Lsg. liegt das Maximum der Reaktionsgeschwindigkeit bei mittlerer $KMnO_4$ -Konz. Die Art des Anions scheint ohne Einfluß zu sein. Ähnlich verhalten sich alkal. Lsgg. In neutraler Lsg. wirkt H_2 im ersten Augenblick sehr schwach auf das $KMnO_4$ ein, woraus der Schluß gezogen werden kann, daß noch eine zum vollen Einsetzen der Rk. notwendige Reaktionskomponente fehlt. Diese kann entweder die erste Reduktionsstufe K_2MnO_4 oder ein kolloidales MnO_2 sein. Für beide Annahmen sprechen eine Anzahl experimenteller Erscheinungen. — Ein Einfluß von Tageslicht auf den Reaktionsverlauf wurde nicht beobachtet. Dagegen üben Röntgenstrahlen einen verzögernden Einfluß auf die Rk. aus. — Im Zusatz von frisch gefälltem oder fein gepulvertem MnO_2 zur Lsg. war ohne Einfluß. Dagegen vermag ein Zusatz von K_2MnO_4 trotz der Ggw. von freiem Al die Rk. zu beschleunigen. Die Arbeit von JUST u. KAUKO (Ztschr. f. physik. Ch. **76**. 601; C. **1911**. I. 1795) über das gleiche Thema wird eingehend erörtert. (Ztschr. f. physik. Ch. **113**. 313—25. 1924. Heidelberg, Univ.)

BECKE

Carl Wagner, *Der Mechanismus der Oxydation des Jodions durch Ferricyanid und Ferriion*. Vf. erörtert die Verzögerung einer Rk. durch eins der entstehenden Reaktionsprodd. Dies ist bei der von JUST (Ztschr. f. physik. Ch. **63**. 337. C. **1908**. II. 1423) untersuchten Rk. zwischen $Fe(CN)_6'''$ u. J' der Fall, wo $Fe(CN)_6'''$ u. J_2 als Endprod. auftreten. Die Reaktionsgeschwindigkeit ist proportional der $Fe(CN)_6'''$ -Konz. u. dem Quadrat der J' -Konz. Dagegen wird die Rk. durch die Anwesenheit von $Fe(CN)_6'''$ verzögert. Ähnliche Verhältnisse liegen bei der von SCHTSCHUKAREW (Ztschr. f. physik. Ch. **38**. 351 [1901]) untersuchten Rk. zwischen Fe''' u. J' zu Fe'' u. J_2 vor, wo Fe'' ebenfalls verzögernd wirkt. Als Zwischenprod. bildet sich in beiden Fällen ein Dijodion J_2' , welches als Anlagerung eines J -Atoms an ein J' -Ion aufgefaßt werden kann. Dieses Dijodion vermag die niedere Oxidationsstufe wieder teilweise zu oxydieren. Der Verlauf dieser beiden Rk. läßt sich unter der Annahme der Primärrk. I. $Fe(CN)_6''' + 2J' \rightarrow Fe(CN)_6''' + J_2'$ u. den Folgerkk.: $Fe(CN)_6''' + J_2' \rightarrow Fe(CN)_6''' + J_2$ u. $Fe(CN)_6''' + J_2' \rightarrow Fe(CN)_6''' + J'$ sowie II. $Fe''' + 2J' \rightarrow Fe'' + J_2'$ u. den hierbei verlaufenden Zwischenreaktionen $Fe''' + J_2' \rightarrow Fe'' + J_2$ u. $Fe'' + J_2' \rightarrow Fe''' + 2J'$ nach folgenden Gleichungen beschreiben:

$$\text{I. } -\frac{d[Fe(CN)_6''']}{dt} = \frac{2k_1[Fe(CN)_6'''][J']^2}{1 + \frac{k_3}{k_2} \frac{[Fe(CN)_6''']}{[Fe(CN)_6''']}}$$

$$\text{II. } -\frac{d[Fe''']}{dt} = \frac{2k_1[Fe'''][J']^2}{1 + \frac{k_3}{k_2} \frac{[Fe''']}{[Fe''']}}.$$

Weiter wird noch die Rk. zwischen Cu'' u. J' kurz besprochen. Es scheint

hier um eine heterogene autokatalyt. Rk. zu handeln, da festes CuJ die Rk. beschleunigt. (Ztschr. f. physik. Ch. **113**. 261—74. Leipzig, Univ.) BECKER.

J. J. van Laar, *Über die Flüssigkeitsdichte bei verschiedenen Temperaturen*. weist nach, daß die Grenzdichte D_0 weder mit der empir. Formel von GOLDMER, noch der von SASLAWSKI so leicht berechenbar ist wie mit der Gleichung der Mittellinie. Die Goldhammersche Formel gibt nur eine gewisse Strecke der Kurve wieder, was auch für die neue Formel von SASLAWSKI gilt, die trotz der Änderungen weder eine genaue Best. von D_0 , noch von D_k erlaubt. Demgegenüber verdient die Gleichung der geraden Mittellinie, wenn d_2 neben d_1 vernachlässigt werden kann, an Genauigkeit den Vorzug. Die Gleichung der geraden Mittellinie kann aus der van der Waalsschen Zustandsgleichung abgeleitet werden, welche in Verbindung mit $b = f(v)$ bei relativ niederen Temp. die Gleichung der geraden Mittellinie ergibt. Durch diese einzige Annahme $b = f(v)$ wird die Zustandsgleichung bei niedrigen Temp. $a/v^2 \cdot (v - b) = RT$ schließlich in der Form $b = b_0/\beta + (1 - \beta) \cdot \frac{b_0}{v}$ auch quantitativ bei allen Temp. auf Fll. anwendbar. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. **140**. 52—60. 1924. Tavel sur Clarens.) HO.

I. I. Saslawsky, *Abhängigkeit des Ausdehnungskoeffizienten der Flüssigkeit von Temperatur und chemischer Konstitution*. Deckt sich mit einer früheren Arbeit (Ztschr. f. physik. Ch. **109**. 111; C. **1924**. II. 422). (Ber. Polytechnikum Kiew-Wosniessensk **8**. 57—74. 1924.) BIKERMAN.

Georges Chaudron und Hubert Forestier, *Allotropie von Eisen-, Chrom- und Aluminiumsesquioxyd*. Das aus FeCl_3 - oder $\text{Fe}(\text{NO}_3)_3$ -Lsg. (10 g/l) gefällte $\text{Fe}(\text{OH})_3$ absorbiert bei 100° Wärme, die auf Verdampfung des W. verwendet wird, u. entleert bei 400° Wärme, die auf eine Umwandlung hinweist. Das durch Erhitzen von 1000° hergestellte Fe_2O_3 , das beim Glühen von $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$ oder Ferrioxalat entleert wird, verläuft in gleicher Weise: der natürliche Hämatit dehnt sich bei Temperaturerhöhung (bis 680°) in gleicher Weise: der Ausdehnungskoeffizient nimmt mit steigender Temp. ein Maximum bei 680°. Die von CHÉVENARD (C. r. d. l'Acad. des sciences **172**. 321; C. **1921**. III. 936) bestimmte Ausdehnungskurve des Magnetits verläuft in ähnlichen Verlauf. Abschrecken des Fe_2O_3 u. Fe_3O_4 ändert die Ausdehnungskurve bei mehrmaliger Erwärmung; man beobachtet eine Kontraktion bei 500°; von 600 bzw. 550° an fällt die neue Kurve mit der normalen Kurve zusammen. — *Aluminiumoxyd* absorbiert Wärme bei 300° (Zers. des Dihydrates $\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$), entwickelt Wärme bei 600°; die Ausdehnung des auf > 600° erhitzten Al_2O_3 verläuft ganz regelmäßig. Gleichfalls keine Anomalien bietet die Ausdehnung des auf > 500° erhitzten Cr_2O_3 ; bei 500° findet eine Wärmeentw. statt; die magnet. Suszeptibilität des geglühten Oxyds beträgt ca. $\frac{1}{3}$ der des ungeglühten. (C. r. d. l'Acad. des sciences **179**. 763—66. 1924.) BIKERMAN.

A. W. Warrington, *Die Atomgewichte*. Vf. stellt die At.-Geww. als eine Funktion der Ordnungszahl N des betreffenden Elementes in der Form: $A = 2N + 0,00678 N^2$ auf. weist auf eine Ähnlichkeit dieser Formel mit der Moseleyschen Beziehung für die Frequenz der Grundserie ν des Röntgenspektrums der Elemente: $\nu = A(N - 1)^2$ hin. (Chem. News **129**. 290—91. 1924.) FRANKENBURGER.

A. S. Russell, *Die Notwendigkeit für die Neubestimmung des Atomgewichtes von Thorium und Radium*. Vf. bespricht die Abweichungen zwischen den experimentell bestimmten u. theoret. berechneten At.-Geww. (Nature **114**. 717—18. 1922. Oxford.) BECKER.

F. W. Aston, *Die Massenspektren von Cadmium, Tellur und Wismut*. Mit einer Anode aus CdF_2 wurden mittels der Kanalstrahlenanalyse folgende Isotope festgestellt: 110 (c), 111 (e), 112 (b), 113 (d), 114 (a), 116 (f). Das letzte Iso-

tope ist isobar mit dem leichtesten Isotopen des Sn. Diesem ist auch das Verhältnis der Intensitäten aufeinanderfolgender Isotopen gleich, was auf eine merkwürdige Ähnlichkeit im Bau der Kerne des Cd u. Sn schließen läßt. Es besitzt die Isotopen 126, 128 u. 130. Die beiden letzten sind gleich intensiv, etwa doppelt so stark als das erste. Es scheint daher ein At.-Gew., welches gleich 128 ist, sehr wahrscheinlich, während bisher 127,5 angenommen wurde. Es zeigt nur eine einzige Linie bei 209. (Nature **114**. 717. 1924. Cambridge.) BR.

Sergius Mokroushin, *Die Bestimmung von Moleküldurchmessern aus Messungen der Oberflächenspannung*. Unter der Annahme, daß die Oberflächenschicht einer Flüssigkeit aus einer einzigen Molekülschicht besteht, die Oberflächenspannung gleich der gegenseitigen Molekülattraktion ist u. die latente Verdampfungswärme dem Energieaufwand zur Überwindung der Kohäsionskräfte entspricht, führt Vf. die Oberflächenspannung und Moleküloberfläche in die Beziehung für die Verdampfungswärme ein, indem er die Aufnahme der inneren Verdampfungswärme bei der Verdampfung der Vergrößerung der freien Oberfläche der Moleküle zuschreibt. Aus dieser ergibt sich unter Vernachlässigung der Oberfläche der Flüssigkeit der Wert für den Moleküldurchmesser. Dieser wird für W. gleich dem Werte gefunden, dessen man sich unter Benutzung von Oberflächenenergie u. kinet. Energie der Dampfmoles ergibt. (Philos. Magazine [6] **48**. 765—68. 1924. Ekaterinburg, Univ.) KYROPOL.

Leo Bleyer, *Über die Temperatursteigerung bei Ammoniak- und Chloroformaufnahme durch Wollstoffe*. Die bei Wasserdampfaufnahme durch Stoffe, als adsorptiver Verdichtung beruhende, Erscheinung der Übererwärmung zeigte sich wesentlich auch bei NH_3 - u. Chlf. -Aufnahme. Die experimentell ermittelte Gesamtwärme kann auch hier durch die Kondensationswärme allein nicht erklärt werden. Diese Adsorptionswärme betrug in % der Gesamtwärme ausgedrückt im Durchschnitt bei NH_3 = 40%, bei Chlf. = 50%. (Arch. f. Hyg. **94**. 34—40. 1924. Innsbruck, Univ.) FRANK.

Nicolai Antonowitsch Puschin und Elijah Vasiljewitsch Grebenschtschikow, *Die Abhängigkeit der adiabatischen Abkühlung einiger organischer Substanzen vom Druck*. (Vgl. Journ. Chem. Soc. London **123**. 2717; C. **1924**. I. 462.) In der W. (l. c.) angewandten Weise wurde die adiab. Kompression von A. u. die adiab. Expansion von Phenol, Bzl., Urethan, p-Toluidin, A., Glycerin, Ricinusöl, ein Gemisch von 75 Mol.-% Phenol u. 25 Mol.-% p-Toluidin u. eines Gemischs von 75 Mol.-% Bzl. u. 25 Mol.-% Urethan untersucht. Die Drucke wurden von 1 bis 3000 at variiert, die Anfangstemp. so gewählt, daß die Verbb. auch bei den größten Drucken fl. blieben. Der Koeffizient $(dt/dp)_p$ fiel stets mit wachsendem p; bei Phenol nahm er oberhalb 2250 at einen konstanten Wert an, was auf bei diesem Druck u. 64,4° eintretende B. einer Modifikation von größerer D., Phenol zurückzuführen ist. Das Phenol-Toluidingemisch zeigte ein abnormes Verh. w. infolge der durch therm. Analyse nachgewiesenen B. von p-Toluidinphenolat. Journ. Chem. Soc. London **125**. 2043—48. 1924. Petrograd, Elektrotechn. Inst.) HERR.

Stab des Versuchslaboratoriums der General Electric Co. (Arbeitsleiter F. S. Goucher), *Untersuchungen über die Deformation von Wolfram-Einkristallen unter Zugspannung*. Die vorliegende Arbeit bezieht sich nicht auf das Studium der eigentlichen Einkristalle, sondern auf das einzelner Krystallindividuen, wie sie aus gezogenen W-Drähten von 0,2 mm Durchmesser vorhanden sind u. zuweilen Teile des gesamten Querschnitts bilden. Die metallograph.-mikroskop. Unters. u. röntgenograph. nach DEBYE-SCHERRER wurden angewandt zum Studium der verschiedenen Erscheinungen: Gestalt der Zerreißstelle (verschiedene Keilwinkel), Bc. d. Art der Gleitebenen, Art der Verzerrung der Krystallebenen, Wrkg. der Orientierung auf die Art der Deformation u. den Mechanismus der B. des Zerreißens. Die Verss. sind durch zahlreiche gute Photogramme illustriert. Die gefundene

erhebungen, insbesondere die auftretenden Formen der Zerreißeile erklären durch Gleiten auf den (112)-Ebenen in der (111)-Richtung, mit einer einzigen Ausnahme, wo sich an einer Zerreißeile zwei nicht ungleichartige, zueinander einen Winkel von 90° stehende Keile bildeten, infolge einer Höhlung im Krystall, die einer Gleitung auf den (100)-Ebenen in der (100)-Richtung entsprach. Alle Krystalle zeigten Verwerfungen, welche die Neigung der Krystallebenen in der Gleitrichtung beeinflussen, nicht aber das Gitter selbst. Die günstigste Richtung der Dehnung u. Zerreißeung ist die, bei der zwei Scharen von (112)-Ebenen 35° zur Achse geneigt sind, während die günstigste Orientierung zur Gleitung in einer gegebenen Ebenenschar einem Winkel von ca. 40° zwischen Ebenenschar u. Zugrichtung entspricht. Die Gleitrichtung (111), längs der Würfel diagonale ist die der dichtesten Packung fürs raumzentrierte Gitter, ihre Bevorzugung beim W ist in Übereinstimmung mit den Befunden für andere Metalle mit verschiedenem Gitter, insbesondere Zn, Sn, Bi u. Al. Der Umfang der vorkommenden Verzerrungen ist so gering, daß die Vff. annehmen, daß die ihnen vorgelegenen Krystalle nicht als natürliche Einkrystalle anzusprechen, sondern ihrerseits aus vollkommenen Reinkrystallen aufgebaut sein müssen von einer den größeren ähnlichen, aber ganz gleichen Orientierung. — Die Ätzungen wurden in siedendem H_2O_2 u. auch in alkal. Ferricyankalium ausgeführt. Gleitungsmodelle wurden ausgeführt u. Original abgebildet, wo auch die Photogramme im einzelnen besprochen werden. (Philos. Magazine [6] 48. 800—19. Forschgs.-Lab. d. Gen. El. Co.) KYR.

Maurice Cook und Ulick R. Evans, *Rekrystallisation und Kornwachstum in reinen Metallen*. Vff. beschreiben nach eingehender Zusammenstellung der Literatur eine Anzahl von Rekrystallisationsverss. an Pb, Sn u. Cd. Das verwendete Material wurde in Barren gegossen u. dann auf 2,5 mm Dicke heruntergewalzt, in Barren geschnitten u. 30—60 Min. lang auf 180° angelassen. Die Oberfläche war so glatt, daß sie ohne Schleifen u. Polieren geätzt werden konnte. Nach dem Ätzen zeigten die so vorbehandelten Proben eine gute grobkörnige polygonale Struktur. Die mikroskop. Beobachtung erfolgte unter Verwendung von schief auf dem direkten Licht unter Vermeidung eines Vertikalluminators. Die beobachtete Fläche wurde markiert, so daß auch nach weiterer Wärmebehandlung stets die Stelle der Probe beobachtet werden konnte. Zugleich mit weiteren Temperat. wurden die Probestücke einer teilweisen Deformation unterworfen, indem sie weiter heruntergewalzt wurden, wobei die Längenzunahme u. Dickenabnahme der Probe als Maß für die Deformation diente. Die Art der Strukturänderung bei dieser Behandlung bestand in einer Rekrystallisation. Die Fälle, daß ein einziges auf Kosten der übrigen weiterwuchs, waren selten. Wenn aber schon rekrystallisierte Proben noch weiter eine Zeit lang bei 200° angelassen wurden, wuchs eine kleine Anzahl größerer Krystalle weiter, während eine bestimmte Anzahl kleinerer Körner unverändert blieben. Bei Pb zeigte sich, daß die Temp., bei welcher die Rekrystallisation einsetzt, desto tiefer liegt, je stärker die Probe verformt ist. Sn, welches um 28% gedehnt worden war, zeigte bei gewöhnlicher Temp. noch keinerlei Anzeichen einer Rekrystallisation. Nach dem Erhitzen auf 200° trat diese jedoch ein. Bei Cd nimmt bei tieferen Temp. die Korngröße beträchtlich mit zunehmendem Deformationsgrad ab. Bei höheren Temp. war das Kornwachstum jedoch in diesem Fall von der mechan. Behandlung unabhängig. (Amer. Inst. Mining and Metallurg. Eng. 1924. Nr. 1382. 24 Seiten. Cambridge.)

BECKER.

Friedel, *Ein Versuch zur Demonstration der Symmetrie zwischen Wachstum und Auflösung der Krystalle*. Vf. wendet sich gegen die Ansicht, daß die verschiedenen Größen der Wachstums- u. Auflösungsgeschwindigkeit von Krystallen auf einer Dissymmetrie des physikal. Geschehens bei diesen beiden Prozessen zurück-

zuführen ist; er schließt sich hierbei den Ausführungen von VALETON (Zts. f. Krystallogr. **60**. 1; C. **1924**. II. 1678) an. Die scheinbare Ungleichheit der Wachstums- u. Auflösungsgeschwindigkeit erklärt sich aus der Unmöglichkeit, an konvexen Krystallflächen gegenüber exakt für dieselbe Richtung gegenüber einem Oberflächenelement diese Geschwindigkeiten zu messen, da die auf Grund der verschiedenen Flächenbesetzungsdichte der Netzebenen verschiedenen u. Aufbaugeschwindigkeiten der einzelnen Flächen die Ausbildung verschiedenartiger Flächen bei Ab- u. Aufbau zur Folge haben. Dagegen bezieht sich der Vergleich zwischen der Aufbaugeschwindigkeit konkaver Flächen einerseits u. Abbaugeschwindigkeit konvexer Flächen andererseits u. umgekehrt auf das Entstehen u. Verschwinden gleichartiger Flächen. Vf. führt als Beweis das Verh. von Krystallen bei der Korrosion an, welches je nach konkaver oder konvexer Form derselben ein verschiedenes ist. Vf. läßt einen Alaunkrystall, der eine zylindrische Bohrung von 2 mm Durchmesser u. 5 mm Tiefe u. muldenförmigem Boden aufweist, bis auf diesen Boden mit Lack überziehen u. dann in die Bohrung eine wss., abgesätt. Alaunlg. einfließen. Sogleich entstehen bei der einsetzenden Auflösung des Krystalls in der Höhlung die ebenen, sonst nur als Wachstumsflächen beobachteten Würfel-, Dodekaeder- u. vor allem Oktaederflächen. An einem solchen Fall läßt sich im Vergleich zum Wachstum einer konvexen Krystallform, die Auflösungsgeschwindigkeit studiert werden. (C. r. d. l'Acad. des sciences **179**. 796—99. 1924.) F. M.

Robert Wright, *Selektive Lösungswirkung durch die Bestandteile von wässrigen Alkoholen*. Teil III. *Die Wirkung einiger wasserlöslicher Semisoluten*. (II. vgl. Journ. Chem. Soc. London **123**. 2493; C. **1924**. I. 1890.) Die Wrkg. von KCl, LiCl, NH₄Cl, KBr, NaBr, KNO₃, NaNO₃, K₂CO₃, Na₂CO₃, Na₂SO₄ u. (NH₄)₂SO₄ (0,5 Mol. Salz in 1000 g Lösungsm.) auf die Partialdrucke der Komponenten eines Gemischs von 10 Mol.-% A. u. 90 Mol.-% W. wurde bei 20° in der l. c. angegebenen Weise untersucht. Den offenbar irrigen Werten, die für p_{H₂O} erhalten wurden, ist nun analyt. Gründen kein Wert beizumessen — auch die l. c. für Benzylalkohol erhaltenen Resultate dürften auf Grund der gleichen Erwägung zweifelhaft erscheinen — doch ist in allen Fällen eine Steigerung von p_{C₆H₅O} festzustellen, die bei gleichem Anion bei K u. Na prakt. gleich groß war u. größer als bei H. Von den Anionen wirkte am stärksten SO₄, es folgen CO₃, Cl, Br, NO₃. Ob das Ion eine unabhängige Eigenwrkg. hat, konnte nicht entschieden werden. — Allgemein läßt sich aus den verschiedenen Versuchsreihen entnehmen, daß der Partialdruck der Semisolute den Partialdruck derjenigen Komponente von wss. A. erniedrigt, in der es l. ist, den der andern aber erhöht. Es scheint, daß in dem Gemisch ausschließlich diejenige Verb., die in reinem Zustand dazu in stande ist, die lösende Vkg. auf die betreffenden Solute ausübt. (Journ. Chem. Soc. London **125**. 2068—69. 1924.) Glasgow, Univ.)

HERT.

H. Remy und A. Kuhlmann, *Löslichkeitsbestimmungen an schwer löslichen Stoffen*. I. *Die Wasserlöslichkeit des Magnesiumoxyds*. Die Unters., die vorübergehend am MgO durchgeführt wurde, bezweckte, eine verlässige Methode zur Bestimmung der Löslichkeit noch schwerer l. Oxyde zu finden. Für MgO konnte die Bestimmung gewichtsanalyt. durchgeführt werden u. erwies sich dann brauchbar, wenn man fähig auf die Abwesenheit von CO₂ geachtet wird. Unter Verwendung von eitr. fähigkeitswasser als Lösungsm. wurde so die Löslichkeit des MgO bezw. des MgOxyds zu $3,97 \cdot 10^{-4}$ Mol. im Liter gefunden. Unmittelbar aus der Messung der spezif. Leitfähigkeit der gesätt. Lsg. unter Verwendung der Ionenbeweglichkeiten (konduktometr. Methode) wurde ein ähnlicher Wert im Mittel $3,48 \cdot 10^{-4}$ M im Liter gefunden. Weit besser gestaltet sich die Best. durch ein maßanalyt. Verfahren, bei dem die Leitfähigkeit nur als Indicator für den Neutralisationspunkt ent-

si sich auch die Fernhaltung der die Resultate wesentlich beeinflussenden CO_2 , besser kontrollieren läßt als bei der rein konduktometr. Methode. Diese Leitfähigkeitstiteration wird zum Unterschied von der konduktometr. konduktotitrimetr. genannt. Mit Hilfe der letzteren Methode wurde im Mittel ein Gehalt von $9 \cdot 10^{-4}$ Mol. MgO im Liter gefunden. Die Übereinstimmung mit den beiden anderen Verff. ist sehr gut. FRESSENIUS hatte auf gewichtsanalyt. Weg 0,45 Millimol/Liter, KOHLRAUSCH dagegen auf konduktometr. Weg nur 0,2 Millimol./Liter gefunden. Die bisher als gültig angenommenen Werte von KOHLRAUSCH müssen also etwa verdoppelt werden. Da die rein konduktometr. Gehaltsbest. der gesätt. Lsg. eines Oxyds wegen des Einflusses der Verunreinigungen (CO_2) nicht ohne weiteres auf genaue Werte der Wasserlöslichkeit schließen läßt, dürfte die Leitfähigkeitstiteration in Verbindung mit der konduktometr. Methode zweckmäßig zu sein. Die Resultaten führen u. eine Beurteilung u. Ausschaltung von Fehlern ermöglichen lassen. (Ztschr. f. anal. Ch. 65. 1—24. 1924. Göttingen, Univ., u. Hamburg, Univ.)

HORST.

Eugen Spitalsky und N. Petin, *Über die Katalyse des Wasserstoffsuperoxyds durch Eisensalze*. Vff. untersuchen die katalyt. Zers. von H_2O_2 durch FeSO_4 in saurer, alkal. u. neutralen Lsgg. Es zeigt sich, daß die Katalyse in saurer Lsg. einer Gleichung erster Ordnung verläuft u. eine echte Katalyse mit einem reproduzierbaren Verlauf auch bei wiederholter Anwendung des Katalysators stattfindet. Die Anfangskonz. des H_2O_2 u. sonstige Vorgeschichte ist ohne Einfluß auf den Reaktionsverlauf. Die Reaktionsgeschwindigkeit ist proportional der Fe^{+++} -Konz. u. umgekehrt proportional der $[\text{H}^+]$. Ndd. von gelben bas. Hydroxyden in saurer u. schwach saurer Lsg. sind katalyt. unwirksam. Die klare Lsg. selbst wirkt nur noch in dem Maß, in dem Fe^{+++} vorhanden sind. Die Ggw. des Nd. tritt in größeren Mengen, wahrscheinlich infolge von Adsorptionserscheinungen, in alkal. Lsg. hemmend. Dagegen wirken die frischen Ndd. von $\text{Fe}(\text{OH})_3$ in alkal. Lsg. stark katalyt. Doch spielen Alterungserscheinungen eine Rolle, welche schließlich zum Verschwinden der katalyt. Wrkg. führen können. In schwach alkal. Lsg. findet eine heterogene Katalyse durch das $\text{Fe}(\text{OH})_3$ statt, welche aber durch teilweise Auflösung des Nd. durch H_2O_2 u. Alkali als homogene Katalyse in Lösung gedeutet werden kann. Dagegen findet in stark alkal. Lsg. eine echte Katalyse statt. Erst am Ende der Rk., wenn die H_2O_2 -Konz. sehr klein geworden ist, fällt hier der braune Nd. aus. Es hat somit den Anschein, als ob die Fe^{+++} -Katalyse bei der H_2O_2 -Zers. in dem ganzen Intervall von stark sauer bis stark alkal. nach dem gleichen Schema durch B. von Zwischenprodd. unter der Wrkg. der Fe^{+++} u. $(\text{OH})^-$ in der Lsg. verläuft. Die B. dieser Zwischenprodd. stellt einen umkehrbaren Prozeß dar u. ihre jeweilige Konz. scheint die Reaktionsgeschwindigkeit eindeutig zu bestimmen. Ein Übergang von Fe^{++} zu Fe^{+++} als Träger der Katalyse erscheint unwahrscheinlich. Es ist gleichgültig, ob zu Beginn des Vers. der Katalysator als Fe^{++} oder Fe^{+++} -Salz zugesetzt wird. (Ztschr. physik. Ch. 113. 161—98. 1924. Moskau, Univ.)

BECKER.

Keizo Kimura, *Studien über katalytische und oxydative Wirksamkeit*. In den Metallechloriden hat Fe^{III} größte katalyt. Wirksamkeit, dann Cu , die anderen Metalle geringere. Die Wirksamkeit scheint an Ggw. des Metallions geknüpft (Abhängigkeit mit zunehmender Hydrolyse der FeCl_3 -Lsgg.). Der katalyt. Wirksamkeit unparallel geht die oxydative. Kaolin aktiviert beide bis zu einem gewissen Grade, hemmt sie im Überschuß; die aktivierende Wrkg. auf Fe-Salze wird durch vorherige Behandlung damit geschwächt. Zusatz einer bestimmten Menge von elektr. Albumin zum System $\text{H}_2\text{O}_2 + \text{FeCl}_3$ beschleunigt bei optimaler Konz. der Salze deren katalyt. Wirksamkeit, die Wrkg. ändert sich bei Änderung der $[\text{H}^+]$. In u. Kephalin wirken ähnlich. Fe-Salze hemmen die Wrkg. der Hämase,

während diese gleich Albumin u. nur durch ihren Eiweißgehalt die katalyt. W. samkeit jener bis zu einer bestimmten Konz. fördert. *Peroxydase* hemmt die W. der *Katalase*. Die Wrkg. jener wird durch Hämase bei Überschuß von H_2O_2 steigert, sonst gehemmt. (Journ. of biochem. 3. 211—60. Tokio, Univ.; Ber. Physiol. 27. 438. 1924. Ref. JACOBY.) SPIEGEL

A₁. Atomstruktur. Radiochemie. Photochemie.

A. Sommerfeld, *Grundlagen der Quantentheorie und des Bohrschen Atommodells*. (Vgl. Umschau 28. 501; C. 1924. II. 795.) Zusammenfassender Vortrag. (Naturwissenschaften 12. 1047—49. 1924. München.) BECKE

H. A. Kramers, *Die chemischen Eigenschaften der Atome nach der Bohrschen Theorie*. (Vgl. Nature 113. 673; C. 1924. II. 801.) Zusammenfassender Vortrag. (Naturwissenschaften 12. 1050—54. 1924. Kopenhagen.) BECKE

J. Franck, *Atome und Molekülstoffe und ihre chemische Bedeutung*. (Vgl. Ztschr. f. Physik 25. 312; C. 1924. II. 2118.) Zusammenfassender Vortrag. (Naturwissenschaften 12. 1063—68. 1924. Göttingen.) BECKE

D. N. Mallik, *Die Stabilität des Atoms*. In der üblichen Darst. der Bohrschen Theorie der Spektralserien wird betont, daß nach der klass. Elektrodynamik ein Atom auch in den stationären Zuständen strahlen müßte. LARMOR hat darauf hingewiesen, daß in Fällen permanenter dynam. Stabilität keine Energieausstrahlung erfolgt, u. daß hier eben ein solcher Fall vorliegt, woraus sich genau so eine Beschränkung der möglichen Bahnen ergibt wie aus der Einführung der Quantenhypothese. Der mathemat. Ausdruck dafür ist, daß in solchen Systemen die Vektorsumme $|e \cdot \dot{v}|$ konstant gleich Null ist, während die Strahlungsenergie in der Form $2e^2 \cdot \dot{v}^2 / 3c$ ist, wo $\dot{v}$ die Beschleunigung des Elektrons u. c die Lichtgeschwindigkeit, e die Ladung bedeutet. Vf. leitet diese Beziehungen direkt mittels der Integration der Feldgleichung der Elektronentheorie ab u. zeigt, daß sie allein in Übereinstimmung mit der Elektronentheorie der Dispersion sind. Umgekehrt ergibt sich, daß die Annahme der Quantentheorie die Geltung dieser Beziehungen fordert, so daß diese Theorie mithin eine andere Ausdrucksweise des auch auf klassischem Wege darstellbaren Sachverhalts bildet. (Philos. Magazine [6] 48. 884—98. 1924. Alirah, Indien.) KYROPOULOS

H. Stanley Allen, *Ein statisches Modell des Heliums*. Auf Grund der Annahme einer „Quantenkraft“ gemäß LANGMUIRS Theorie (Physical Review [2] 18. 1924. C. 1922. III. 94) entwickelt Vf. ein stat. Modell des einfach ionisierten He-Atoms des neutralen He-Atoms u. des He_2 -Mol. (dessen Existenz aus der Art der Baryonspektren erschlossen ist). Die Möglichkeit, 3 Quantenzahlen einzuführen (für die Quantenkräfte zwischen je 1 Elektron u. dem Kern sowie zwischen beiden Elektronen) gestattet weitgehende Variierung bei der Errechnung der Ionisierungsenergien. Letztere ergaben sich für das Atom gleich den aus dem Bohrschen Modell berechneten, also nicht genau gleich den experimentell gemessenen. Das Trägheitsmoment des He_2 -Mol ergibt sich zur gleichen Größenordnung als die von CURTIS aus dem Bandenspektrum geschätzte (Proc. Royal Soc. London Serie A 101. 62; C. 1922. I. 1355). (Proc. Roy. Soc. Edinburgh 44. 116—128. 1924.) FRANKENBURG

William Henry Bragg, *Das Kohlenstoffatom in der Kristallstruktur*. (Vgl. Proc. Physical Soc. London 34. 33. Science 60. 139; C. 1924. II. 1155. 1888. Vf. bespricht die Anordnung des C-Atoms im Diamant, Graphit, Anthracen, Naphtalin, Kalkspat u. in den Fettsäuren. (Journ. Franklin Inst. 193. 615—25. 1924. Nur 114. 862—65. London, Royal Inst.) BECKE

G. R. Levi, *Die Kristallstruktur des Manganooxydes*. Vf. bestimmt nach dem Debye-Scherrer-Verf. die Kristallstruktur des MnO . Es kristallisiert regulär in

NI-Typus. Die Kantenlänge des Elementarwürfels beträgt $a = 4,40 \text{ \AA}$, $D_{\text{ber}} =$
 12. (Gazz. chim. ital. **54**. 704—8. 1924.) BECKER.

G. B. Levi, *Die kristallographische Identität der beiden Formen des Quecksilber-*
 ds. Vf. untersucht rotes u. gelbes HgO nach dem Debye-Scherrer-Verf. Beide
 Formen ergaben dasselbe Interferenzbild. Quantitativ konnte die Struktur nicht
 ermittelt werden. (Gazz. chim. ital. **54**. 709—12. 1924. Mailand, Polytechn.) BECK.

K. H. Kingdon, *Elektronenemission von adsorbierten Filmen an Wolfram*. Vf.
 st für die Elektronenemission von W-Drähten, welche mit dünnen Schichten
 O_2 , Th, Cs u. O_2 , Cs, N_2 überzogen sind, eine Anzahl von Gleichungen auf,
 welche die Elektronenstromstärke als Funktion der Temp. u. einer Anzahl für jeden
 einzelnen Film charakterist. Konstanten darstellen. (Physical Review [2] **24**. 510—22.
 14. Schenectady [N. Y.], Gen. Elektr. Co.) BECKER.

Henry A. Erikson, *Über die Natur der Ionen in Luft und in Kohlendioxyd*.
 here Verss. des Vfs. (Physical Review [2] **20**. 117; C. 1923. III. 1251) über
 Verh. von positiven Ionen in Luft hatten ergeben, daß diese eine den negativen
 en gleiche Anfangsgeschwindigkeit besitzen, welche nach kurzer Zeit auf etwa
 dieses Wertes herabsinkt. Durch Vergrößerung der Strömungsgeschwindigkeit
 Luft u. Verstärkung des elektr. Feldes gelingt es, Ionen mit der Anfangs- u.
 Geschwindigkeit nebeneinander nachzuweisen. Die so erhaltenen Kurven ent-
 sprechen jenen, welche bei der Ionisation der Luft durch α - u. β -Strahlen auf-
 genommen werden können. Negative Ionen besitzen nur eine einzige Geschwindig-
 keit. CO_2 zeigte ein ähnliches Verh. wie Luft, nur ist in diesem Fall die Zeit des
 falls der Anfangsgeschwindigkeit kürzer. Diese Erscheinung kann dadurch erklärt
 werden, daß sich aus einem neutralen Mol. ein Elektron ablöst, u. daß das mono-
 molekulare positive Ion sich bald mit einem zweiten neutralen Mol. zu einem posi-
 tiven bimolekularen Ion verbindet. Das Elektron selbst bildet mit einem Mol. ein
 negatives monomolekulares Ion. Eine Dissoziation der Ionen findet nur zu einem
 kleinen Betrag statt. Einfach geladene Moll. haben, unabhängig von Masse u.
 Molekulargewicht, die gleiche Beweglichkeit. Bei einfach geladenen Komplexen von
 zwei oder mehr Moll. ist sie kleiner. (Physical Review [2] **24**. 502—9. 1924.
 Univ. of Minnesota.) BECKER.

G. B. Thomson, *Der Kathodenfall in einer Hochspannungsentladung*. Best. der
 Größe des kathod. Potentialabfalls in Entladungen von 15000—45000 V Gesamt-
 spannung. Der kathod. Abfall ist kleiner als die Gesamtspannung u. ändert
 sich linear mit dieser; er ist unabhängig vom Gasdruck u. dem Elektrodenmetall
 (außer für oberflächlich verunreinigtes Al). (Proc. Roy. Soc. Edinburgh **44**. 129—39.
 14. Aberdeen.) FRANKENBURGER.

G. Stead und B. Trevelyan, *Leuchterscheinungen bei niedriger Spannung in*
Wasserstoff. (Vgl. STEAD u. STONER, Proc. Cambridge Philos. Soc. **21**. 66;
 1923. I. 887.) Die früher benutzte Art von Entladungsröhren fand auch bei
 den vorliegenden Beobachtungen Anwendung. Ihre Hauptmerkmale sind: Sehr
 feines Gitter nahe dem Glühdraht, Fehlen der Anode, viel freier Raum hinter dem
 Gitter (Abb. i. Orig.). Vorverss. mit Cd, welches in einem derartigen Rohre auf
 verschiedene Temp. erhitzt wurde, ergaben den früher beschriebenen Hg-Verss.
 ähnliche Erscheinungen, insbesondere Sprung u. Hysteresisschleife der Strom-
 spannungskurven des Gitters, Auf- u. Abbewegung der Leuchterscheinung im Rohr
 bei variierter Spannung. — Zu den Verss. mit Wasserstoff wurde ein gleichartiges
 Rohr verwendet mit Ansätzen zum Auspumpen u. Einlassen des Gases, welches
 elektrolyt. erzeugt, über P_2O_5 getrocknet u. durch Passieren einer Gasfalle in fl.
 Wasserstoff gereinigt war. Der Typus der Stromspannungskurven ist von dem des Hg
 völlig verschieden. Die Kurven verliefen bis zu 30 V kontinuierlich, wo
 ein kleiner Sprung period. Stromschwankungen einsetzten bei entsprechen-

der Bewegung der Leuchterscheinung im Rohr. Die Frequenz dieser Schwingung stieg gleichmäßig mit wachsender Spannung. Reproduktionsbedingungen der cillationen noch ungeklärt; C-Verunreinigung als einer der Gründe ihres Auftretens angenommen. Verss. mit einem Entladungsrohr mit nahe dem Gitter angeblasener Gasfalle in fl. Luft gaben keine Schwingungen, sondern ein Maximum der Leuchterscheinung u. schließliches Verschwinden, wenn am Glühdraht angelangt. Bei stärkerem Heizen des Glühdrahtes trat das Glimmlicht nicht wieder auf; fast gesamte Wasserstoff wurde hierbei von der Gasfalle aufgenommen. Der bei geheiztem Glühdraht abnehmende Druck stieg wieder beim Abstellen des Heizstromes. Geringere Kondensation von Wasserstoff bei Anwendung einer erhitzten Entladungsrohre aus Quarz, bei der C-Verunreinigung vermindert. Bei starkem Heizstrom wird von den Glaswänden Wasserstoff absorbiert, unabhängig davon, ob am Gitter Spannung liegt oder nicht u. unabhängig vom Ladungszustand der Glaswand, der durch Versilberung u. Aufladung oder Erdung variiert wurde. Nur ein Teil dieses absorbierten Gases kann durch Erhitzen auf Rotglut wieder frei gemacht werden. Bei Isolierung der Glaswand erhebliche positive Aufladung. Die Deutung der Erscheinungen wird in einer eingehenden Diskussion versucht, von der hier nur kurz die Ergebnisse wiedergegeben werden können: Verschwinden u. Rückkehr des Druckes durch B. einer endothermen H-W-Verb.; B. von Verunreinigung negativer Ionen mit den anwesenden Metallen, die bei der Temp. der fl. Luft existieren ständig u. unbeständig bei gewöhnlicher Temp. sind; B. größerer Wassermolekeln, z. B. H₂O, welche erst bei Gitterpotentialen von 42–51 V ionisiert werden. (Philos. Magazine [6] 48. 978–1006. 1924. Cambridge.) KYROPOULOS

W. H. Mc Curdy, *Die geschichtete Entladung in Quecksilberdampf*. Gegenstand der Unters. sind negatives Glimmlicht, Faradayscher Dunkelraum u. positive Säule. Die von J. J. THOMSON (Philos. Magazine [6] 42. 986 [1921]) mathemat. behandelte Theorie der geschichteten positiven Säule wird ausführlich physikal. dargestellt. Das Auftreten der Schichten ist, wenigstens bei den einatomigen Gasen an der Anwesenheit von Verunreinigungen gebunden. Dasselbe hat Vf. bei Hg-Dampf gefunden. Die Verunreinigungen wirken verkürzend auf die Lebensdauer der gereizten Atome. Um trotzdem in allen Punkten der positiven Säule Ionen zu erhalten, muß die Nachlieferung der Elektronen, mithin die Stromdichte, sehr groß sein. Die geschichtete positive Säule, wie sie bei geringen Stromdichten beobachtet wird, läßt sich erklären, wenn man berücksichtigt, daß bei unelast. Stößen die Beweglichkeit der Elektronen vergrößert wird u. sie infolgedessen mit großer Geschwindigkeit nach der Anode gezogen werden, wobei eine positive Raumladung an der Stelle des Zusammenstoßes verbleibt. Dieser entspricht eine negative Raumladung auf der Kathodenseite des Ionisationsbereiches, da nur wenig positive Ionen vor der Rekombination längere Wege zurücklegen u. infolgedessen zu wenig positive Ionen nach dieser Seite zu vorhanden sind um die Elektronenraumladung von der Kathode oder der vorangehenden Schicht zu neutralisieren. Dieser Zustand begünstigt lokale Ionisation u. mithin eine geschichtete positive Säule. Die Insequenzen dieser Auffassung lassen sich z. T. prüfen. Einen Teil dieser Aufbehandelt die vorliegende Arbeit. — Betrachtungen über den Faradayschen Dunkelraum führen Vf. zu dem Schluß, daß dort der Strom durch die Diffusion der reichlich im negativen Glimmlicht erzeugten Elektronen u. positiven Ionen transportiert wird. Mangels einer negativen Raumladung in diesem Bereiche, die sich zufolge der größeren Beweglichkeit der Elektronen einstellen müßte, nimmt Vf. an, daß erst ein schwaches elektr. Feld aus der verschiedenen Beweglichkeit u. Diffusionsgeschwindigkeit der Elektronen, bzw. Ionen entsteht, welches erstere verzögert u. letztere beschleunigt. Eine Überschlagsrechnung bestätigt diese Möglichkeit. Inzufolge müßte sich im Faradayschen Dunkelraum u. negativen Glimmlicht eine

zur Anreicherung von Elektronen u. positiven Ionen finden u. ein starkes Konzentrationsgefälle zur positiven Säule. — Zur Unters. diente eine von LANGMUIR angegebene Modifikation der Sondenmethode, die im Original genauer beschrieben. Messungen ergaben die von der Theorie geforderte Raumladungsverteilung, Elektronen- u. Ionenhäufung in der Nähe der Kathodenseite der Schichten u. das erwartete Elektronenkonzentrationsgefälle im negativen Glimmlicht u. Faradayschen Hohlraum. (Philos. Magazine [6] **48**. 898—917. 1924. Princeton Univ.) KYROP.

Irène Curie und Nobuo Yamada, Über die Verteilung der Reichweiten der α -Strahlen von Polonium im Sauerstoff und Stickstoff. Nach der früheren Methode von CURIE, C. r. d. l'Acad. des sciences **176**. 434; C. **1923**. I. 1205) wurden die Reichweiten der α -Strahlen von Po in N₂ u. O₂ gemessen. Die Wahrscheinlichkeit für beliebigen Reichweite x ist $e^{-(x-\rho)^2/\alpha^2}$ proportional; ρ die wahrscheinlichste Reichweite, α eine Konstante. α/ρ wurde für Luft zu 0,015 gefunden, jetzt für O₂ u. N₂ übereinstimmend zu 0,0208. Die Abweichung rührt davon her, daß in früheren Messungen dickere Po-Präparate verwendet wurden, deren eigene Absorption nicht zu vernachlässigen war. Bei Berücksichtigung dieser Absorption ändert sich der Wert für O₂ u. N₂ fast auf den für die Luft gültigen. Jedem verhalten sich O₂ u. N₂ gleich; die entgegengesetzte Beobachtung von BRAGG von wechselnder Ionisationsfähigkeit des α -Teilchens längs seiner Bahn hergeleitet. (C. r. d. l'Acad. des sciences **179**. 761—63. 1924.) BIKERMAN.

Jean Thibaud, Über die Absorption und Diffusion von γ -Strahlen sehr großer Energie in den leichten Elementen. Vf. knüpft an seine Unters. über die durch β -Strahlung des RaC photoelektr. erregte Emission von β -Strahlen (vgl. C. r. d. l'Acad. des sciences **178**. 1706. **179**. 165; C. **1924**. II. 2633) an u. untersucht, ob die γ -Strahlung auch mittels einer photoelektr. auslösenden Wrkg. auf Elektronen innerhalb der Atomkerne nachweisbar ist. Er konstatiert, daß die Formel von BRAGG u. PIERCE für die Absorption einer Röntgenstrahlung der Wellenlänge λ oder der Fluoreszenzstrahlung $\tau \cdot A/\rho = C \cdot N^4 \cdot \lambda^3$ für dieses Gebiet der γ -Strahlung, ein Quantenwert etwa ein 10faches der Röntgenstrahlung beträgt, bzgl. der funktionellen Abhängigkeit der Absorption von N nicht mehr gilt; vielmehr ist es bei leichten Elementen, für die gemäß obiger Formel eine Absorption nicht in Frage käme, noch deutlich ein photoelektr. Effekt nachweisbar, sodaß eher eine Proportionalität mit N^2 zu denken ist. Die funktionelle Abhängigkeit von ansteigen des Absorptionskoeffizienten proportional λ^3 findet sich dagegen gut bestätigt. Der innerhalb des strahlenden Atoms zerstreute Anteil der γ -Strahlung, der nicht viel weniger als der infolge von Fluoreszenzstrahlung absorbierte beträgt, verhält sich möglicherweise infolge quantenmäßiger Energieübertragung an einzelne Elektronen u. „Rückstoß“ derselben auf dem Weg des Comptoneffektes in kontinuierliche Strahlung verschiedener Wellenlängen. Eine exakte Feststellung letzterer Erscheinung ist schwierig zu erbringen, gewisse Verss. des Vf. sprechen für ihr Vorhandensein. (C. r. d. l'Acad. des sciences **179**. 815—18. 1924.)

FRANKENBURGER.

Joseph A. Becker, Weiche Röntgenstrahlen und Sekundärelektronen. (Vgl. Proc. National Acad. Sc. Washington **10**. 342; C. **1924**. II. 2448.) Vf. bestimmt die Geschwindigkeitsverteilung von Photoelektronen, welche von weichen Röntgenstrahlen von 150—1500 V an W, Pt, Ag, Al ausgelöst werden, mittels der bisher zur Unters. von β -Strahlen gebräuchlichen magnet. Analyse. Die Photoelektronen, welche in einem Magnetfeld senkrecht stehende Richtung emittiert werden, beschreiben Kreisbahnen, deren Radius dem Quadrat ihrer Geschwindigkeit proportional ist. Jene mit einer bestimmten Geschwindigkeit passieren zwei feststehende Spalten, gelangen nach Beschreibung eines Halbkreises auf die photograph. Platte. Die Spuren zeigen scharfe Linien, deren Energiebetrag annähernd jenem der Primär-

elektronen entspricht. Weiter tritt aber auch eine Bande im Spektrum auf, welche von Elektronen herrührt, die beim Austritt aus dem Sekundärstrahler 4—11 V verloren haben. Man ersieht daraus, daß unter dem Einfluß weicher Röntgenstrahlung freie oder lose gebundene Elektronen leichter abgegeben werden als innere Elektronen. Es wurden aber auch andere Linien erhalten, welche von Elektronen aus verschiedenen Niveaus des Sekundärstrahlers herrühren. Für Al ist die L-Serie für Ag einige Niveaus der N- u. M-Serie u. für W die charakteristischen Linien der N-Serie angeführt. Sämtliche Versuchsergebnisse stimmen mit der Bohrschen Theorie u. mit anderweitigen Resultaten gut überein. (Physical Review [2] 478—85. 1924. Pasadena [Cal.]) BECKER

C. C. Hatley, *Brechungsindex von Calcit für Röntgenstrahlen*. Vf. bestimmt nach der Methode von DAVIS u. TERRILL (Proc. National Acad. Sc. Washington 8. 3. C. 1923. I. 497) den Brechungsindex der K-Mo-Strahlung in Calcit, indem er eine Oberfläche des Krystalles schief zu der Strukturfläche, an welcher die Reflexion stattfindet, abschleift. Ist dieser Winkel zwischen Oberfläche u. Reflexionsfläche nur wenig kleiner als der Gleitwinkel, dann tritt eine Abweichung bei den gemessenen Gleitwinkeln bis zu 1' auf, aus welcher der Brechungsindex berechnet werden kann. Es ergab sich für die Mo-K α_1 -Linie $\mu = 1 - (2,03 \pm 0,1) \cdot 10^{-4}$, was in gutem Einklang mit dem aus der Lorentz'schen Dispersionsformel berechneten Wert steht. Unter der Annahme einer Gitterkonstanten des Kalkspates von $d = 3,028 \cdot 10^{-8}$ cm wurde nach Anbringung einer Korrektur für die Brechung der K α_1 -Mo-Linie neu zu $\lambda = 0,70772 \cdot 10^{-8}$ cm vermessen. (Physical Review [2] 486—94. 1924. Columbia Univ.) BECKER

P. L. Bayley, *Die Färbung der Alkalihalogenide durch Röntgenstrahlen*. Verwendet wurde eine Coolidge-Röhre bei 50000 V u. 3 Milliampère. Gefärbt wurden: CsF, RbF, CaF₂, CsCl, RbCl, KCl, NaCl, LiCl, AgCl, BaCl₂, BeCl₂, CaCl₂, CsBr, RbBr, KBr, KJ, NaJ, CdJ₂, HgJ₂, K₂SiO₃. Auch nach 5-stünd. Exposition wurden nicht gefärbt: KF, NaF, LiF, NaBr, RbJ, ZnCl₂, NH₄Cl. — Bernsteinfarbig gefärbtes NaCl zeigte eine breite Absorptionsbande von 0,3—1,3 μ mit einem Minimum bei 0,46 μ . Purpurfarbenes KCl hatte ein Absorptionsmaximum bei 0,51 μ . Werden diese gefärbten Salze dem Tageslicht ausgesetzt, dann verblassen sie zeitlich nach einer logarithm. Funktion. Diese Ausbleichzeit kann zwischen Sek. u. Tagen schwanken. Bei Bestrahlung mit einer 500 Watt-Glühlampe bleichen gefärbte NaCl, KCl, RbCl u. CsCl augenblicklich aus. Besonders wirksam sind die Wellenlängen 0,51, 0,61, 0,68 u. 0,62 μ . Gefärbtes NaCl u. KCl bleichen am schnellsten bei den Wellenlängen ihres Absorptionsmaximums. (Physical Review [2] 24. 505 bis 501. 1924. Cornell Univ.) BECKER

Karl Becker und Herta Becker-Rose, *Notiz über das Nachleuchten des Calciumwolframat nach der Bestrahlung mit Röntgenstrahlen*. Vf. stellen fest, daß die Nachleuchtedauer von CaWO₄ von verschiedenem Reinheitsgrad nach mehrmaliger Bestrahlung mit Röntgenstrahlen mit der Anzahl dieser Bestrahlungen nach einer annähernd geometr. Reihe wächst. Betrug z. B. die Nachleuchtedauer eines Präparats nach der ersten Bestrahlung 12 Sek., so leuchtete es nach der 8. Bestrahlung schon 650 Sek. nach. Die Farbe des Fluoreszenz- u. Phosphoreszenzlichtes ist von der Art der Verunreinigung unabhängig. Mit zunehmender Strahlenhärte nimmt die Zeit u. Intensität des Nachleuchtens zu. Eine Temperaturerhöhung bewirkt ein rascheres Abklingen unter Erhöhung der Phosphoreszenzintensität. (Ztsch. f. Physik 29. 343. 1924. Berlin, Studiengesellschaft f. elektr. Beleuchtung.) BECKER

A. Kratzer, *Molekulareigenschaften und Bandenspektren*. (Vgl. Physikal. Ztschr. 23. 298; C. 1924. II. 1439). Zusammenfassender Vortrag. (Naturwissenschaften 12. 1054—58. 1924. Münster i. W.) BECKER

Pierce W. Ketchum, *Eine Anwendung des Bohrschen Korrespondenzprinzips zur Erklärung kleiner Quantenzahlen. Mathemat. Ableitung.* (Physical Review [2] 463—65. 1924. Illinois, Univ.) **BECKER.**

G. Subrahmaniam und D. Gunnaiya, *Die Krümmung der Spektrallinien in dem Prismenspektroskop. Herleitung der Krümmungserscheinung aus geometr.-opt. Betrachtungen auf Grund des schiefen Einfalls der Strahlen auf die Hauptebene des Prismas. Demonstration an einigen Beispielen u. Berechnung der maximalen Krümmung aus den Apparatkonstanten von denen der Einfallswinkel abhängt.* (Philos. Magazine [6] 48. 896—98. 1924. Vizianagaram, Indien.) **KYROPOULOS.**

Hermann Mayer, *Absorptionsspektrum und spezifische Wärme des Chlordioxyds.* Hand des von KÄBITZ (Dissertation Bonn 1905) gefundenen experimentellen Materials werden die 49 gemessenen Absorptionsbandkanten des gasförmigen ClO_2 durch Umrechnung der Wellenlängen in 5 Serien mit zusammen 34 Glieder eingeteilt. Diese 34 Bandkanten sind durch die Beziehung

$$y = 20482 + 265,5p + 705n - 2,9n^2$$

gegeben, wenn man zwei sich nicht gegenseitig störende Schwingungen in ClO_2 -Mol. annimmt. Beide Schwingungen haben im Gleichgewicht wenig Energieinhalt,

und die mittlere Quantenzahl $n < \frac{T}{\beta \omega}$ bei Schwingungszahlen, welche größer als

$0 \cdot 10^{13}$ sind, bei Zimmertemp. kleiner als 1 ist. Die unharmon. erste Schwingung hat in angeregten Mol. die Schwingungszahl $2,1 \cdot 10^{13}$, die fast harmon. zweite $0 \cdot 10^{13}$, bzw. $1,6 \cdot 10^{13}$. Von einer dritten Schwingung wurde nichts beobachtet.

Es tritt Abnahme der einen Schwingungsenergie ein, wenn die andere Schwingungsenergie gleichzeitig zunimmt. Im ganzen Absorptionsspektrum tritt anscheinend eine Elektronensprung auf, welcher einer Wellenzahl $20482 + \text{Abstand Kante zu Nulllinie}$ entspricht. Dies sind 60000 cal. pro Mol. — Die spezif. Wärme des ClO_2 bei konstantem Vol. wurde nach der Kundtschen Staubfigurenmethode zu $7,5 \pm 0,5$ cal. pro Mol. gemessen. Daraus geht hervor, daß alle drei Schwingungsfreiheiten zur spezif. Wärme zusammen $\frac{1}{2} R$ bis R beitragen. Eine dritte langsame Schwingung des ClO_2 -Mol. dürfte aus diesem Grund nicht vorhanden sein. (Ztschr. f. physik. Ch. 113. 220—34. 1924. Hannover, Techn. Hochschule.) **BECKER.**

E. B. Ludlam und W. West, *Die ultravioletten Emissionsspektren der Halogene.* Unters. die Emissionsspektren der sorgfältig gereinigten Halogene in Quarzröhren mit Sn-Folie als Außenelektroden bei etwa 7000 V Spannung u. mit Zerlegung des ultravioletten Spektrums durch einen Hilgerquarzspektrographen. Die erhaltenen Emissionsspektren sind von den Absorptionsspektren der Halogene verschieden u. zeigen damit eine Wesensverschiedenheit zwischen den bei der Emission angeregten Oszillatoren u. den n. Molekülen an. Die Emissionsspektren der Halogene zeigen als typ. Merkmale je zwei kontinuierliche Banden mit scharfer Abgrenzung nach der langwelligen Seite hin; letztere liegt für Cl bei 320 u. $265 \mu\mu$; für Br bei 370 u. $295 \mu\mu$; J bei 480 u. $345 \mu\mu$. J zeigt ferner noch ein scharfes Emissionsspektrum mit einem ersten Glied bei $206,1 \mu\mu$ (= vielleicht 1. Glied der Hauptserie des J). Die 2. kontinuierliche Bande wird mit dem Elektronenaffinitätspektrum der Halogenatome identifiziert u. führt zu Werten von 107,3, 96,6 u. 83 kcal. für die Elektronenaffinitäten der Cl , Br u. J -Atome. Die erste Bande ist vermutlich eine von den Moll. herrührende u. wird vielleicht durch die B. der homogenen Moll. aus den Atomen verursacht. (Proc. Roy. Soc. Edinburgh 44. 1924. Edinburgh, Univ.) **FRANKENBURGER.**

William W. Watson, *Das Emissionsspektrum von Wasserdampf.* Die Anwendung der Quantentheorie auf die Bandenspektren ergibt, daß für die beiden

ultravioletten Banden des Wasserdampfspektrums 2811 u. 3064 die OH-Gruppe Träger in Frage kommt. Diese beiden Banden werden vom Vf. mit hoher Dispersion aufgenommen u. die einzelnen Komponenten der Feinstruktur auf 0,0 genau bestimmt. Die Messungen werden in ein Serienschema eingeordnet. Die beiden Banden berechnet sich ein Trägheitsmoment von $1,63 \cdot 10^{-40}$ g/qcm. Es zeigt sich, daß das Endträgheitsmoment von der Rotationsquantennummer unabhängig, während das Anfangsmoment eine Konstante u. von der Rotationsgeschwindigkeit unabhängig ist. Das tabellar. Zahlenmaterial ist ausführlich angegeben. (Astrophys. Journ. **60**. 145—58. 1924. Chicago, Univ.) BECKE.

A. L. Narayan, D. Gunnaiya und K. R. Rao, *Die Absorption von Magnesiumdampf*. Es wird die Lichtabsorption von nicht leuchtendem Mg-Dampf bestimmt, welcher in einem Eisenrohr auf 1200° erhitzt wurde. Es trat die Linie $(1S - 2p_2)$ deutlich als Absorptionslinie auf. Sie ist sehr scharf u. erschien bei höherer Temp. Dagegen trat die Linie 2852 ($1S - 2P$) schon bei tiefer Temp. auf u. zeichnet sich bei Temperaturerhöhung durch eine bemerkenswerte Linienbreite aus. (Astrophys. Journ. **60**. 204—5. 1924. Vizianagaram.) BECKE.

W. F. Meggers, *Regelmäßigkeiten des Spektrums bei Scandium und Yttrium*. Vf. gibt eine Übersicht der im Bogen- u. Funkenspektrum des Sc u. Y auftretenden Dubletts u. Tripletts sowie der zugehörigen Energieniveaus sowie des an diesen Linien Y I u. Y II beobachteten Zeemaneffektes. Das Zahlenmaterial ist in Tabellen geordnet ausführlich angegeben. (Journ. Washington Acad. of Sciences **14**. 419—30. 1924. Bureau of Standards.) BECKE.

Francis M. Walters, *Regelmäßigkeiten im Bogenspektrum des Kobalts*. Im Anschluß an die Auffindung von Regelmäßigkeiten im Bogenspektrum der Fe untersucht Vf. als 2. Element der 8. Gruppe Co. Nach dem Verschiebungsgesetz ist zu erwarten, daß das Bogenspektrum des letzteren aus einer Kombination von Termen sich zusammensetzt, deren maximale Vielfache gerade Zahlen sind, während das Fe-Spektrum Terme mit ungeraden maximalen Vielfachen enthält. Vf. gibt tabellar. 12 Multipletts im Quartettsystem des Bogenspektrums des Co; sie entstehen aus Kombinationen von 2 P-Niveaus, 2 D-Niveaus, 3 F-Niveaus u. einem G-Niveau u. enthalten 88 der 315 Linien des Co der Temp.-Klassen I u. II. Er findet sich, wie erwartet, im Co-Spektrum Terme geradzahlgiger Vielfachheit (Dubletts, Quartetts, Sextetts). Vf. bringt noch Einzelheiten des Co-Spektrums mit solchen des Fe-Spektrums zum Vergleich. (Journ. Washington Acad. of Sciences **14**. 407—12. 1924. Carnegie-Inst. of Techn.) FRANKENBURG.

Robin Hill und Owen Rhys Howell, *Krystallbau und Absorptionsspektren der Cobaltverbindungen*. Die Vff. untersuchten mit Hilfe eines Nuttingphotometers mit HILGER-Wellenlängenspektroskop die Lichtabsorption von Cobaltsalzlösungen festen Cobaltpigmenten bekannter Krystallstruktur, von letzterer das reflektierte Licht, im Hinblick auf systemat. Gesetzmäßigkeiten. Der Vergleich der im Original wiedergegebenen Absorptionskurven führt zu dem Schluß, daß in den blaugefärbten Verbb. das Co-Atom mit vier Atomen oder Gruppen verbunden ist, in der rot gefärbten Verbb. mit sechs. (Philos. Magazine [6] **48**. 833—47. 1924. Cambridge Univ.) KYROPOUL.

A. L. Narayan und K. Rangadhama Rao, *Die Fluoreszenz- und Absorptionsspektren von Wismutdampf bei hohen Temperaturen*. Bei 1300° zeigt Bi-Dampf zwischen 6500 u. 4500 Å ein Absorptionsspektrum mit mehr als 400 Banden. Es ist auch eine orange-gelbe Fluoreszenz zu beobachten, deren Spektrum zwischen 6600 u. 5050 Å 24 Banden aufweist. Einzelheiten sind nicht angegeben. (Nature **14**. 645. 1924. Vizianagram.) BECKE.

George R. Harrison, *Serien der Absorptionsgrenzen in Natriumdampf*. Vf. bestimmt die Durchlässigkeit des Na Dampfes für das Ultraviolett zwischen 5000

150 Å in Abhängigkeit von der Wellenlänge. Als Lichtquelle wird ein Cd-Spektrum benutzt. Es zeigt sich, daß mit abnehmender Wellenlänge die Durchlässigkeit bei 2465 Å ein Maximum erreicht, dann bei der Seriegrenze von 2414 Å in einem scharfen Minimum abfällt u. bei 2200 Å wieder auf den Wert des ersten Minimums ansteigt. Mit noch weiter abnehmender Wellenlänge sinkt die Absorption ab. Es wurden für verschiedene Dampfdichten des Na 11 Durchlässigkeitskurven bestimmt, welche aber alle ähnlich verliefen. Bei dem Maximum 2465 Å beträgt die Durchlässigkeit 34%, bei dem Minimum 2414 etwa 20%. Die diffuse Reflexion der Absorption von H₂ in Sternen zeigt in bezug auf ihre Durchlässigkeitskurve eine bemerkenswerte Ähnlichkeit mit der Hauptserie der Absorption von Na. *Physical Review* [2] **24**. 466—77. 1924. HARVARD Univ.) BECKER.

P. Lasarew, *Über die grundlegende Gleichung der photochemischen Kinetik*. (Vgl. *Compt. rend. d. l'Acad. des sciences* **177**. 1436; C. 1924. I. 1000.) Geschichtliche Übersicht der Arbeiten Vfs. über die photochem. Kinetik. (*Journ. de Chim. physique* **16**. 161—67. 1924. Moskau, Wiss. Inst.) BIKERMAN.

E. C. C. Baly, *Photosynthese*. Kurze Zusammenfassung über die Synthese von CH₂O u. Hexosen aus H₂CO₃ durch ultraviolettes Licht, wobei Vf. besonders die Ergebnisse eigener Unters. berücksichtigt. (Vgl. *Rec. trav. chim. Pays-Bas* **41**. 1922. C. 1923. III. 812; Baly, Heilbron u. Barker, *Journ. Chem. Soc. London* **1921**. 1025; C. 1921. III. 1116.) Die Tatsache, daß nach Belichtung von CO₂-Lsgg. mittels Benedictscher Lsg. *reduzierende Zucker* nachgewiesen werden können, läßt vermuten, daß diese eventuell die ersten erkennbaren Reaktionsprodd. sind, u. daß nachweisbarer HCHO möglicherweise durch photochem. Zers. der Zucker entstanden ist. Hieraus würde sich auch eine Erklärungsmöglichkeit für den bisher nicht gelungenen Nachweis von CH₂O in lebenden Pflanzen ergeben, denn gerade bei diesen Wellenlängen, durch die der Zuckerabbau bewirkt wird, fehlen in natürlichem Licht. — Zur Isolierung der durch Belichtung größerer Mengen von CH₂O zu erhaltenden Hexosen empfiehlt Vf. folgendes Verf.: die durch 14-tägiges Belichten mit 20 l einer 40%ig. CH₂O-Lsg. erhaltene Lsg. hat einen Reduktionswert, der 3% Glucose entspricht. Die Lsg. wird bei 60° im Vakuum möglichst weit eingeengt, wobei von Zeit zu Zeit zur Neutralisation der durch Cannizarosche Umlagerung gebildeten HCOOH etwas CaCO₃ zugegeben wird. Durch Zugabe von Wasser werden aus der konz. Lsg. die Ca-Salze ausgefällt; das Filtrat wird erneut im Vakuum konz. u. mit A. versetzt; das Verf. wird einige Male wiederholt. Zur Entfernung des in A. l. Ca-Glucuronats wird das Filtrat mit wss. ZnSO₄ versetzt, Zn entfernt, das Filtrat hiervon zur Ausfällung von Zn-Glucuronat mit dem gleichen Vol. A. versetzt; das Filtrat wird konz. u. mit A. aufgenommen (einmal wiederholt) u. durch Zugabe von Chlf. zur alkoh. Lsg. die Hexosen als Öl bis schwach bräunlicher Sirup ausgefällt. (*Ind. and Engin. Chem.* **16**. 1016—18. 1924. Liverpool, Univ.) HABERLAND.

E. B. Ludlam, *Der Budde-Effekt im Brom*. Vf. stellt fest, ob die Volumenvermehrung, welche ein abgegrenztes Vol. Cl₂ bei Belichtung zeigt (Budde-Effekt), auch beim Br₂ nachzuweisen ist u. ob aus der spektralen Lage der hierzu nötigen Belichtung Rückschlüsse auf die Energiewerte der Rk. Br₂ → 2Br möglich seien. Es zeigt sich, daß der Effekt in Ggw. von Feuchtigkeit (Bromwasser) deutlich vor sich geht u. im Dunkeln sofort zurückgeht. Das erregende Licht wurde von Quarzstrecken zwischen Al-, Magnesium- oder Duraluminium-Elektroden geliefert. Welche Verss., mittels besonders empfindlicher Spiralmanometer den Budde-Effekt auch im getrockneten Br₂ nachzuweisen, verliefen negativ. Die Annahme, daß trockenes Br₂ die aufgenommene Lichtenergie wieder als Wärme emittiert, während es durch die Ggw. von Wasserdampf dazu befähigt

wird, die absorbierte Lichtenergie zur Dissoziation in Atome zu verwenden. (P. Roy. Soc. Edinburgh **44**. 197—201. 1924.) FRANKENBURGER

Chr. Winther, *Die Oxydation des Jodwasserstoffs*. II. (Antwort an J. Plotnikow) (Vgl. PLOTNIKOW, Ztsch. f. physik. Ch. **111**. 171; C. 1924. II. 1891.) Vf. w. auf eine Anzahl von Mißverständnissen u. Unrichtigkeiten PLOTNIKOWS hin u. 1. die Ergebnisse seiner früheren Arbeit (Ztschr. f. physik. Ch. **108**. 236; C. 1919. I. 2065) aufrecht. (Ztschr. f. physik. Ch. **113**. 275—78. 1924. Kopenhagen.) BE-

K. N. Schaposchnikow, *Rayleigh oder Smoluchowski. Zur Frage über die Lichtstreuung durch Molekulartheilchen*. Nimmt man mit RAYLEIGH an, daß das Licht von einzelnen Moll. oder mit SMOLUCHOWSKI, daß es von Molekülverdichtungen zerstreut wird, in beiden Fällen erhält man teilweise übereinstimmende Resultate (vgl. RAMAN u. RAMANATHAN, Philos. Magazine [6] **45**. 113; C. 1923. III. 12). Vf. vereinigt die beiden Anschauungen, indem er für das Vol., in welchem Dichteschwankungen betrachtet werden, das auf ein Mol. entfallende Vol. einsetzt. Er berechnet die wahrscheinlichste Verteilung des Gesamtvolumens auf diese Elementarzellen u. kommt zum Einsteinschen Ausdruck, aber mit einer wesentlichen Änderung: die Volumänderungen der Elementarzellen erfolgen nicht, wie bei EINSTEIN, isotherm., vielmehr adiabatisch. Infolgedessen muß die Berechnung nach der Einsteinschen Formel für die Avogadro'sche Zahl einen auf das γ -fache gegen den wahren vergrößerten Wert, wenn γ das Verhältnis der spezif. Wärmen (c_p/c_v) des Gases darstellt, liefern. RAMAN u. RAO (Philos. Magazine [6] **45**. 639; C. 1923. I. 589) fanden in der Tat $7,3 \cdot 10^{23}$ statt $6,1 \cdot 10^{23}$. (Ber. Polytechnikum Iwanow-Wosniessensk **8**. 89—97. 1924.) BIKERMAN

Peter Pringsheim und **A. L. Reimann**, *Über die Fluoreszenz des Benzoldampfes bei monochromatischer Erregung*. Vff. erregen das ultraviolette Bandenspektrum des Bzl. mit dem Hg-Bogen, Zn- u. Mn-Funken als monochromat. Lichtquellen. Die Intensität der emittierten Spektren variiert mit dem Druck des Bzl. bei etwa 25 mm läßt sich mit jeder überhaupt wirksamen Wellenlänge der erregenden Strahlung das linienreiche kannelierte Bandenfluoreszenzspektrum hervorrufen; bei Drucken zwischen 0,1 u. 0,6 mm erscheinen statt dessen einige wenige im vollständigen Spektrum sonst relativ lichtschwache Banden, die aber untereinander u. mit der erregenden Linie in keiner klar erkennbaren Serienbeziehung stehen. Mit zunehmendem Druck treten zwischen ihnen die Gruppen des vollständigen Bandenspektrums immer deutlicher hervor; in gleicher Weise wirkt eine Zumischung fremder Gase von höherem Druck. Auch bei dem relativ hohen Druck von 75 mm ist die Bandenfluoreszenz des Bzl.-Dampfes noch mit großer Lichtstärke zu beobachten; nur zieht sie sich wegen der großen Absorbierbarkeit der erregenden Strahlung auf eine dünne Schicht zusammen. In gleicher Weise ist auch noch am reinen fl. Bzl. eine Oberflächenfluoreszenz festzustellen. (Ztsch. f. Physik **29**. 115—24. 1924. Berlin, Physik. Inst.) FRANKENBURGER

A₂. Elektrochemie. Thermochemie.

Irving Langmuir, **C. G. Found** und **A. F. Dittmer**, *Ein neuer Typus einer elektrischen Entladung: Die strömende Entladung*. Vff. verwenden eine Entladungsröhre, in welcher in der Achse eines Glasrohres von 10 cm Durchmesser ein 0,5 mm dicker Wolframdraht ausgespannt ist. Senkrecht zu dieser Röhre geht eine zweite ab, welche in 50 cm Abstand eine Metallscheibe als Anode enthält. Wird der Draht als Glühkathode auf 2500° abs. geheizt u. bei einer Potentialdifferenz zwischen Anode u. Kathode von 250 Volt der Mitte des Entladungsröhres ein Ende einer Hochfrequenzspule genähert, dann setzt eine Lichtbogenentladung mit einer Stromstärke von etwa 1 Ampère durch die Röhre ein, während die Spannung stark abfällt. Bei einer Füllung mit 2—4 mm Ar zeigt sich ein rötliches Leuchten.

essen Spektrum aus einigen Ar-Linien besteht. Ein Magnetfeld ist auf diese Entladung ohne Einfluß. Wird die Kathodenheizung für kurze Zeit unterbrochen, dann steigt die Spannung augenblicklich wieder an, während gleichzeitig etwa 10^{-6} bis 10^{-7} g W von der Kathode zerstäubt werden. Dies macht sich nach dem Wiedereinsetzen der Heizung dadurch bemerkbar, daß die Entladung mit einer lilienfarbenen Farbe einsetzt, welche das W-Spektrum zeigt. Sie geht von den Glaswänden der Röhre aus u. erreicht erst nach einigen Sek. die Anode. Nach etwa 0,5 Sek. geht die Entladung allmählich wieder in den Lichtbogen über, welcher sehr empfindlich auf ein Magnetfeld reagiert. Wird der Bogen gegen die Wand der Röhre abgelenkt, dann tritt an der gegenüberliegenden Seite ein gelblicher Saum auf. Bei der Annäherung des Magnetfeldes an diesem Saum bilden sich golden leuchtende Kügelchen von 5–6 mm Durchmesser aus, welche sich ungleichmäßig parallel zur Oberfläche der Glaswand hin u. her bewegen. Nach einiger Zeit zerfallen sie u. fallen in den Lichtbogen. Eine Unterbrechung des Lichtbogens ohne Verminderung der Glühkathodentemp. für kurze Zeit bedingt nur eine Intensitätsverringerung dieser Erscheinung. Die ganze Art der Entladung erklärt sich zwanglos aus der Verdampfung des W u. der Ausbildung elektr. Doppelschichten in Gasen. (Science 60. 392–94. 1924. Schenectady. N. Y. General Electric Co.)

BECKER.

F. W. Reynolds, *Der Einfluß von Gasen auf den Widerstand und auf den Temperaturkoeffizienten des Widerstands von gespritzten Platinfilmen*. Es wurden 0,2 mm dicke Pt-Filme bei verschiedenen Temp. bis 450° gespritzt u. die Temperaturwiderstandskurven unter wechselnden Bedingungen aufgenommen. Bei 0,001 mm d. sind diese Kurven Gerade. Für dünne Filme ist der Temperaturkoeffizient positiv u. nimmt bei höheren Temp. zu, bis er die für kompaktes Metall gültigen Werte erzielt. Bei sehr dünnen Filmen (Widerstand > 500 Ohm) ist dagegen der Temperaturkoeffizient negativ. Er wird aber positiv, wenn man den Film in der Wärme einer O₂-Atmosphäre aussetzt. Eine Wärmebehandlung allein vermag keine Umkehrung des Temperaturkoeffizienten hervorzurufen. Bei Zimmertemp. verringert sich der Widerstand von k. gespritzten Filmen, während bei h. gespritzten Filmen, welche abgekühlt wurden, O₂ den Widerstand erhöht. Werden sehr dünne Filme zwischen 80 u. 100° der O₂-Atmosphäre ausgesetzt, dann steigt der Widerstand bis zu extrem hohen Werten an u. sinkt nach dem Abkühlen unter den Anfangswert zurück. Andere Gase, wie H₂, He u. CO₂ haben keinerlei Einfluß. Diese Erscheinungen können dadurch erklärt werden, daß beim Spritzen des Films in einer O₂-Atmosphäre H₂ an der Oberfläche adsorbiert wird, welcher dann mit dem O₂ reagiert. Zum Teil wird auch O₂ am Film adsorbiert. (Physical Review [2] 24. 3–31. 1924. CORNELL-UNIV.)

BECKER.

Franz Jirsa und Karl Loris, *Zur Theorie der elektrolytischen Sauerstoffentwicklung bei anodischer Polarisation*. I. Anodenverhältnisse an Mg-, Cd-, Zn-, u. Hg-Elektroden in alkalischen Laugen. Vff. bestimmen die Stromspannungskurven dieser Metalle in 1-n. NaOH gegen eine Calomelektrode. Es zeigt sich, daß bei anod. Polarisation Cd, Hg u. Zn sich zuerst in zweiwertiger Form auflösen u. nach einiger Zeit passiv werden, wobei sich an ihnen O₂ entwickelt. Da diese O₂-Entwicklung bei einem höheren Potential auftritt, als es dem reversiblen Wert für O₂ entspricht, u. zwar bei Zn bei 1,59 V, Cd bei 2,05 V, Hg bei 1,79 V, muß man auf die Existenz von höheren Oxyden als R^{II}O an der Anode schließen. Diese sind instabil, denn nach Ausschalten des polarisierten Stromes sinkt das Potential rasch wieder auf den normalen Wert. Mg geht ebenfalls zweiwertig in Lsg., doch nimmt sein Potential mit wachsender Stromdichte immer negativere Werte an, so daß die Annahme eines höheren instabilen Oxyds hier nicht zutrifft. (Ztschr. f. physik. Chem. 113. 235–40. 1924.)

BECKER.

Franz Jirsa, *Zur Theorie der elektrolytischen Sauerstoffentwicklung bei anodischer Polarisation. II. Die Anodenverhältnisse des Palladiums in alkalischen Lösungen*. (I. vgl. vorst. Ref.; vgl. auch JIRSA u. FABINGER, Ztschr. f. physik. Ch. **109**, 219. 1924. II. 589.) Vf. stellt durch Aufnahme der Stromspannungskurven von anodisch polarisiertem Pd in 1-n. NaOH gegen eine H₂-Elektrode fest, daß Pd in 4 Stdn. oxydiert wird: $\text{Pd} \rightarrow \text{Pd}_2\text{O} \rightarrow \text{PdO} \rightarrow \text{PdO}_2 \rightarrow \text{PdO}_3$. bei 0,15, 0,4–0,95 u. 1,22 Volt. Pd₂O u. PdO₃ sind instabil. Das letztere zerfällt unter O₂-Entwicklung zu PdO₂. Kathod. vorpolarisiertes Pd verhält sich anders wie ein geglühtes Pd, da das letztere mit einer Oxydschicht bedeckt ist u. wie eine Pt-Elektrode wirkt. (Ztschr. f. physik. Ch. **113**, 241–47. 1924. Prag, Tschech. Techn. Hochschule.)

BECKER

Robert Kremann und Paul Gruber v. Rehenburg, *Über die Elektrolyse einiger Zinnlegierungen*. (Unter Benutzung einzelner Verss. von Ing. Budan.) In einer Unterss. einer größeren Reihe von Legierungspaaren hinsichtlich ihrer Elektrolyseeffekte u. deren Abhängigkeit von Stromdichte, Legierungszus., Rohrlänge u. Legierung (vgl. KREMANN, KIENZL u. MARKL, Monatshefte f. Chemie **45**, 133; J. Ch. **1924**, I. 2734) wurden von den Vff. an binären Sn-Legierungen mit Pb, Bi u. Sb weitergeführt u. in Übereinstimmung mit früheren Beobachtungen festgestellt, daß das Metall mit der größten Leitungskapazität stets zur Kathode wandert. Die Ausführung der Verss. u. Analysen war die übliche. Glascapillaren von 0,5–2,0 mm Querschnitt wurden im Gasofen bei entsprechenden Tempp. (Pb-Sn: 350°, Bi-Sn: 300°) u. durchgeleiteten Elektrolysierstrom etwa 4 Stdn. geglüht, nachdem sie mit der geschmolzenen Legierung gefüllt waren. Bei den Sn-Sb-Legierungen mußten wegen des höheren F. Schamottieröhren angewandt werden, die auf etwa 680° erhitzt werden konnten. — Bei der Elektrolyse der Pb-Sn-Legierung mit 37% Pb wandert Sn zur Kathode, Pb zur Anode. Der Elektrolyseeffekt wächst mit steigender Stromdichte u. erreicht bei 16 Amp./qmm einen maximalen Effekt von 11%. Der Effekt steigt mit der Rohrlänge (Grenzrohrlänge 15 cm). Legierungen der Zus. von 50/50 Atom-% zeigen ein Maximum, um je nach den beiden reinen Komponenten gegen 0 abzufallen. Geschmolzene Sn-Bi-Legierungen lassen Bi an der Anode, Sn (mit der größeren Leitungskapazität) zur Kathode wandern. Bei einer Stromdichte von 14 Amp./qmm ist das Maximum noch nicht erreicht. Bei gleichatomiger Zus. ist auch hier ein Maximum. Von der Grenzrohrlänge 15 cm ab werden die Effekte von der Rohrlänge unabhängig. — Bei den untersuchten Sb-Legierungen (50 Atom-%) liegen die maximalen Effekte trotz der hohen Ver-tempp. relativ hoch (etwa 45%), was durch den starken Polaritätsunterschied zwischen metalloiden Sb gegenüber Sn verursacht sein mag. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Chem. **140**, 1–21. 1924. Graz, Univ.)

HORS

Robert Kremann und Albin Kapaun, *Die Elektrolyse geschmolzener Amalgams von Blei, Zinn und Wismut*. (Vgl. vorst. Ref.) Die Elektrolyse der Pb-Amalgams wurde bei etwa 205° mit Legierungen von etwa 50% Zus. (4 Stdn.) durchgeführt, wobei besonders zu beachten war, daß das Rohr nach der Elektrolyse unter Stromdurchfluß erkaltet u. sofort zur Analyse zerteilt wird, da bei längerem Liegen durch Diffusion Ausgleich der Konz. eintritt. Hg wandert zur Anode, Pb zur Kathode. Der Elektrolyseeffekt steigt mit der Stromdichte gleichmäßig an u. hat bei sehr schwacherem Anstieg bei der höchst anwendbaren Stromdichte von 8,7 Amp./qmm noch nicht den Grenzwert erreicht. — Läßt man die abgekühlten Metallfäden an festen Pb-Amalgams längere Zeit liegen, so zeigt sich, daß der Effekt nach 14 Tagen von etwa 7% auf 1,9% sinkt. In einer Reihe von Verss. mit verschiedener Liegezeit wurde eine stetige Abnahme der Elektrolyseeffekte mit steigender Liegezeit beobachtet. Die durch Rückdiffusion eintretenden Konz.-Unterschiede müssen durch sofortige Zerteilung der Metallfäden nach der Elektrolyse behoben werden. (Ztschr. f. physik. Ch. **113**, 241–47. 1924. Prag, Tschech. Techn. Hochschule.)

Abhängigkeit vom Elektrodenabstand äußert sich in steigenden Effekten mit größerer Rohrlänge, wobei ein maximaler Effekt von 8% bei einer Rohrlänge von 30 cm erreicht wird. Gleichatomige Zus. der Amalgame zeigt auch hier bei sonst gleichen Bedingungen maximalen Effekt.

Bei der Elektrolyse von *Sn-Amalgamen* (mitbearbeitet von **Budan**) wandert das Sn zur Kathode u. das Hg zur Anode. Der Kurvenverlauf der Elektrolyseeffekte ist auch hier mit wachsender Stromdichte asymptot. ansteigend. Der Grenzwert der Rohrlänge bei 15–20 Amp./qmm etwa 8,5% Sn betragen (Rohrlänge 20 cm). Grenzwert der Rohrlänge bei 20 cm wahrscheinlich schon überschritten. Die Abhängigkeit vom Elektrodenabstand ist im übrigen analog den früheren Beobachtungen. Der Einfluß des Zus. des Legierungspaares ist auch hier derselbe wie in den früheren Fällen. Die Elektrolyse der *Bi-Amalgame* (bei 230°) zeigte im Gegensatz zu der Wanderungsrichtung des Hg in den obigen Amalgamen hier eine Verschiebung des Hg zur Kathode u. des Bi zur Anode, was im Einklang steht mit der abnehmenden Leitfähigkeit des Hg in den obigen Amalgamen. Der Grenzwert der Rohrlänge bei 15–20 Amp./qmm etwa 38% Bi liegen. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. **140**. 183–205. 1924. Graz, Univ.)

HORST.

Philip S. Danner, *Barium- und Strontiumamalgamelektroden*. (Vgl. Journ. Americ. Chem. Soc. **44**. 2837; C. **1923**. III. 192.) Die EKK. der Ketten Ba (2-phases Amalgam), BaCl₂ (0,1 m.), HgCl, Hg (1.) u. Sr (2-phases Amalgam), SrCl₂ (0,1 m.), HgCl, Hg (2.) wurden gemessen. 3 Typen von Elektrodengefäßen sind beschrieben abgebildet. Aus einer Reihe von Messungen bei 25° ergeben sich als Mittelwerte der EKK. obiger Ketten für (1.) $E = 2,0240$; für (2.) $E = 2,2472$. Diese Werte stimmen miteinander insofern in Einklang als die Verb. des elektropositiveren Ba mit Hg fester ist als die des weniger elektropositiven Sr mit Hg. (Journ. Americ. Chem. Soc. **46**. 2385–90. 1924. Pasadena [Cal.], Univ.)

JOSEPHY.

P. Fischer, *Über die Überspannung des Wasserstoffs an Legierungen*. Vf. bestimmt die Überspannung von H₂ an Kathoden aus folgenden Legierungen von wechselnder Zus.: Cd-Pb, Cd-Sn, Sb-Zn, Sn-Pb, Sn-Zn, Ag-Cd, Cu-Sn, Al-Zn, Ni-Zn, Pt-Pb. Es zeigt sich, daß die Überspannung an diesen Legierungen unabhängig vom %-Gehalt der einzelnen Komponenten ist u. keinerlei extreme Werte aufweist. Die Überspannung der Legierung selbst wird von dem Bestandteil mit der kleineren Überspannung bestimmt. (Ztschr. f. physik. Ch. **113**. 326–28. 1924. Wien, Polytechn. Inst.)

BECKER.

A. W. Pamfilow und **O. S. Fedorowa**, *Über die kathodische Polarisation des Wasserstoffs*. Es wurden die Potentiale von blanken Pt-Kathoden in 2-n. H₂SO₄ bei Stromdichten 0,047 Ampère/qcm gemessen. Die Potentiale (ϵ_h) an verschiedenen Kathoden gehen noch stärker auseinander als die an blanken Pt-Anoden (vgl. Pamfilow, Ber. Polytechnikum Iwanowo-Wosniessensk **7**. 68 [1923]). ϵ_h von gelackten Elektroden ist höher (ca. 0,31 V), als das von nichtbehandelten (ca. 0,16 V) u. das von mit A. u. Ä. gewaschenen (ca. 0,10 V). Das ϵ_h nimmt mit der Zeit zu, u. allmählich, bald sprunghaft; das Wachstum der ϵ_h ist an derselben Elektrode in jeder neuen Polarisation langsamer. — Die Zunahme der Überspannung mit der Stromdichte wurde bei geöffnetem Polarisationsstrom gemessen; es wurde ein C-2000 Umschaltungen pro Minute liefernder Kommutator benutzt. Die Verss. sind nicht genau, jedenfalls widersprechen sie den Ergebnissen NEWBERRY (Journ. Chem. Soc. London **109**. 1359; C. **1917**. I. 727), der eine Abnahme der Überspannung bei wachsender Stromdichte fand. — Die Bewegung der Elektrode veranlaßt das Wachstum der ϵ_h . — Die Überspannung ist an $Au > Ag > Pd > Pt$. — An Pt-Kathoden wurde manchmal ein plötzlicher Abfall des ϵ_h beobachtet; Verss.,

die Rolle des H_2O_2 u. der Pt-Ionen dabei klarzumachen, scheiterten. (Ber. f. physik. technikum Iwanowo-Wosniessensk 8. 20—31. 1924.) BIKERMAN

D. v. Seelen, *Über die elektrische Leitfähigkeit des Steinsalzkrystalles*. V. untersucht die Leitfähigkeit von NaCl-Krystallen bei Temp. zwischen 15 u. 100. Ihr Wert κ läßt sich durch eine Formel $\log \kappa = -A/T + B$ darstellen (T = absol. Temp., A u. B = Konstanten). Innerhalb des Bereiches von 20—100 steigt $\log \kappa$ von 0,3360—17 auf 0,6030—7, während der Temp.-Koeffizient $d \log \kappa / dT$ von 0,05954 auf 0,01545 fällt. Vorbehandlung der Krystalle, Dauerstromdurchgangs u. andere Einflüsse lassen diese Werte innerhalb gewisser Grenzen variieren, was auf die Veränderung von Inhomogenitäten innerhalb der Krystalle sowie auf das Vorhandensein von Verunreinigungen zurückzuführen ist. Die Leitung erfolgt elektrolyt. u. zwar wandern nur die Na^+ -Ionen, was durch direkte Überführungsmessungen festgestellt wird; die Leitfähigkeit ist proportional der Anzahl derjenigen Ionen, die bei der therm. Molekularbewegung eine gewisse Energieschwelle u. Geschwindigkeit in Richtung des angelegten Feldes überschreiten. (Ztschr. f. Physik 29. 125—40. 1924. Braunschweig.) FRANKENBURG

Z. Klemensiewicz, *Das Leitvermögen der Chloride in geschmolzenem Antimonchlorür und die Theorie von Ghosh*. Vf. wendet auf seine früheren Messungen (vgl. Anzeiger Akad. Wiss. Krakau 1908. 485; C. 1908. II. 1850) die Theorie von

GHOSH (Ztschr. f. physik. Ch. 98. 211; C. 1921. III. 1052) an. L in μ , gegen c aufgetragen (μ die Äquivalentfähigkeit bei 98,5°, c die Konz. in Mol/l), ergibt eine

Gerade mit $d \ln \mu / d \sqrt{c} = -0,365$ für KCl , $-0,313$ für $RbCl$ u. $-0,322$ für $NaCl$, während die Theorie $-0,33$ erwarten läßt. Das Verh. ist deswegen merkwürdig, weil die Theorie für Lsgg., deren Elektrolyt u. Lösungsm. ein gemeinschaftliches Ion haben, Anomalien vorhersagt. Die Beweglichkeit von Cl^- in $SbCl_3$ ist tatsächlich sehr hoch: 137,5 (bei 98,5°) gegen 25,5 für K^+ , 16,5 für NH_4^+ , 22,5 für Li^+ , 21,5 für Tl^+ ; das beeinflußt aber die Konzentrationsabhängigkeit der μ nicht. Für $TlCl$ ergibt sich gleichfalls eine Gerade, aber mit der Neigung von $-0,6$. Die Temperaturabhängigkeit der μ für alle obigen Salze u. für $HgCl_2$ ist durchaus ähnlich, wie es die Theorie verlangt; ein Vergleich mit der Temperaturabhängigkeit der DE. konnte nicht durchgeführt werden, da es an Messungen der DE. für $SbCl_3$ bei hohen Temp. mangelt. Das Maximum der μ liegt bei ca. 95°, und man die Viskositätskorrektur anbringt. — Auf die mehrwertigen Salze, die in $SbCl_3$ nur sehr wenig dissoziiert sind, ist die Theorie nicht anwendbar. (Ztschr. f. physik. Ch. 113. 28—34. 1924. Lemberg, Techn. Hochsch.) BIKERMAN

Hugo Fricke, *Eine mathematische Behandlung der elektrischen Leitfähigkeit und Kapazität disperser Systeme*. I. Die elektrische Leitfähigkeit einer Suspension homogener Sphäroide. Erweiterte Wiedergabe der früher veröffentlichten (Journ. of Physiol. 6. 741; C. 1924. II. 2230) mathemat. Ableitung. (Physical Review [2] 24. 575—87. 1924. Cleveland [O.]) BECKE

A. Thiel, *Bemerkungen über Zwitterionen und innere Salze*. Auseinandersetzung mit BLÜH (Ztschr. f. physik. Ch. 111. 251; C. 1924. II. 2386). Näheres vgl. Thiel. DASSLER u. WÜLFKEN (Fortachr. d. Ch., Physik u. physik. Ch. 18. Nr. 3. 1924. C. 1924. II. 2227.) (Ztschr. f. physik. Ch. 113. 53—54. 1924. Marburg, Univ.) BLÜH

Ludwig Ebert, *Zur Bedeutung der dielektrischen Polarisation in reinen Stoffen und Mischungen*. Nicht die DE. ist für das Mol. charakterist., vielmehr die „Molekularpolarisation“ $P = \frac{\epsilon - 1}{\epsilon + 2} \cdot \frac{M}{d}$, worin ϵ die DE., M das Mol.-Gew., d die Dichte der Substanz bedeutet. P setzt sich additiv aus der „Elektronenpolarisation“ P_e

ol.-Refr., „Atompolarisation“ P_A u. „Orientierungspolarisation“ P_0 zusammen. Für eine Dipole enthaltende u. für alle festen (wo die Dipole unbeweglich sind) Stoffe $P_A = P - P_E$. Die P_0 wird aus der Gleichung $P_0 = P - P_A - P_E$ gefunden, wo P_A am Stoff im festen Zustand gemessen wird. Die Größen P_0 , P_A u. werden aus vorliegenden Messungen für zahlreiche Stoffe berechnet. Für nichtpolare Verbb. ist P_A sehr klein (für höhere Paraffine sogar Null), für Dipolsubstanzen größer, sehr groß für Salze. P_0 ist für W ., NH_3 ., *Alkohole* u. einige andere Substanzen beträchtlich größer im gasförmigen als im fl. Zustande. Das ist eine Folge von Assoziation, da in gepaarten Dipolen die Ladungen sich gegenseitig kompensieren; freilich ist auch eine Kettenassoziation möglich, die die Länge des Pols (u. seinen Momenten) vergrößert. In einer homologen Reihe ist die so ermittelte Assoziation um so stärker, je kleiner das Mol. ist. In verschiedenen homologen Reihen ist P_0 um so geringer, je symmetrischer das Mol. gebaut ist. Auch mit der Irrkonstante u. der Konstante a der van der Waalschen Gleichung steht P_0 in einem Zusammenhang. Zum Schluß erörtert Vf. die P in Mischungen, Lsgg. von Zitterionen usw. (Ztschr. f. physik. Ch. **113**. 1—27. 1924. Kopenhagen.) BIK.

Joseph Valasek, *Dielektrische Anomalien in Rochellesalzkrystallen*. (Vgl. Physical Review [2] **20**. 639; C. 1923. III. 1630.) Der Ausschlag eines ballist. Galvanometers, welches mit einem Kondensator, der das *Rochellesalz* als Dielektrikum enthält, verbunden ist, hängt von der Zeit der Ladung u. von der Zeit der Entladung ab. Für eine Aufladezeit von 2 Sek. erreicht der Ausschlag ein Maximum, um dann langsam abzunehmen, z. B. nach 24 Std. auf die Hälfte des ursprünglichen Wertes. Zwischen -15 u. $+20^\circ$ ist diese Erscheinung von der Temp. unabhängig. Der erste Anstieg rührt wahrscheinlich von Restladungen her, während der zeitliche Abfall auf Ermüdungserscheinungen zurückzuführen ist. Wahrscheinlich spielt das Kristallwasser hierbei eine Rolle, denn Trocknen des Salzes verlangsamt die Entladung, während ein Durchtränken mit A. die Ermüdung verstärkt. (Physical Review [2] **24**. 560—68. 1924. Univ. of Minnesota.) BECKER.

Frank C. Isely, *Die Beziehung zwischen den mechanischen und piezoelektrischen Eigenschaften von Rochellesalzkrystallen*. Vf. schneidet einen Rochellesalzkrystall so, daß er durch Beanspruchung die größte piezoelektr. Ladung aufweist, u. mißt die durch eine Zugbeanspruchung entstehende Längsdehnung u. die piezoelektr. Aufladung im Temperaturgebiet von 16 bis 36° . Es zeigt sich in allen Fällen zwischen beiden Erscheinungen eine strenge Parallelität. Bei konstanter Belastung ist die Aufladung bei $22,25^\circ$ ein spitzes Maximum. Die Dehnung zeigt stets in kleineren Anfangswert als den Endwert, welcher bei konstanter Belastung erst nach einiger Zeit erreicht wird. Bei $22,25^\circ$ ist der Unterschied zwischen Anfangs- u. Endwert am größten. Die jeweilige Differenz zwischen den beiden Werten ist der entsprechenden Aufladung (welche vom Anfang an konstant ist) proportional. (Physical Review [2] **24**. 569—74. 1924. Univ. of Kansas.) BECKER.

Iwan Stranski, *Über die Gleichrichterwirkung der Kontaktdetektoren*. Beim Zusammenpressen eines Kations u. seines Anions im Krystall können sie in den dipolaren Zustand übergehen. Im starken elektr. Feld kann diesem Zustande die Elektronenemission seitens des Anions nachfolgen; das Elektron wird vom Kation nachgeliefert. Liegen also, wie in Krystallen, Kationen u. Anionen geordnet, dann der Strom nur in einer Richtung Anion $\rightarrow$ Kation fortpflanzen. Kommt die Spitze des Detektors hauptsächlich mit Kationen (Anionen) in Berührung, so ist der bevorzugte Strom die Richtung Krystall $\rightarrow$ Spitze (Spitze $\rightarrow$ Krystall) an. Die Kationen u. Anionen zugleich berührende Spitze spricht nicht an. (Ztschr. f. physik. Ch. **113**. 131—44. 1924. Berlin, Univ.) BIKERMAN.

Ada M. Malcolm, *Die magnetische Eigenschaft sehr reinen Nickels*. Unters.

des Verh. von sehr reinem Ni unter verschiedenen Bedingungen in Magnetfeld verschiedener Stärke. (Proc. Roy. Soc. Edinburgh **44**. 206—8. 1924.) FRANK.

F. A. Ward, *Das Wärmeleitvermögen von Wismut in einem transversalen Magnetfeld*. Bezüglich der Beeinflussung des Wärmeleitvermögens des Bi durch transversale Magnetfelder sind die Angaben widersprechend. Im vorliegenden wird der Temperaturgradient zwischen elektr. geheizten u. wassergekühlten Punkten im Vakuum gegossener Bi-Stäbe mittels eingelassener Thermoelemente (EK. konstruiert) mit u. ohne Magnetfeld von 5370 cgs gemessen. Besonders wurde die Elimination der Wrkg. der äußeren Wärmequellen (Magnetspulen) geachtet. Es wurde ein Effekt gefunden u. zwar eine Abnahme des Wärmeleitvermögens um 3,22% durch die Einw. des Magnetfeldes. (Philos. Magazine [6] **48**. 971—77. 1924. Chelsea, Polytechn.) KYROPOULIS.

Nicolas Perrakis und **Pierre Bedos**, *Über ein das Ionisationspotential eines Elementes mit dem Siedepunkt desselben verknüpfendes Gesetz*. (Vgl. PERRAKIS, C. r. d. l'Acad. des sciences **179**. 562; C. 1924. II. 2738.) Die „Verdampfungswärme eines Elektrons hat mit dem Ionisationspotential V_m nichts zu tun; sie nimmt mit Temp. zu, V_m ab. Die V_m von He, H₂, Ne, Ar, Kr, Xe, Hg, Cs, Rb, K, Cd, Zn, Mg u. Li befriedigen die Gleichung $V_m = 28,57 \cdot e^{-0,07147/T} + 0,93 \cdot 10^{-4}$, worin T der Kp. der Substanz ist. O₂ u. N₂ fallen aus der Reihe heraus, was ihrer Zweiwertigkeit zusammenhängen dürfte. (C. r. d. l'Acad. des sciences **7**. 756—58. 1924.) BIKERM.

E. Reissmann (mit Unterstützung von **R. Fuchs**), *Die Temperatur des aus dem Lösung entwickelten Dampfes*. Die von SCHREBER (Z. techn. Ph. **4**. 19; C. 1924. III. 180) angeführten Überlegungen zur Begründung der Faradayschen Behauptung werden widerlegt. Durch neue Verss. wurde bewiesen, daß der aus einer Lösung entwickelte Dampf die Temp. der Lsg. hat. Der dazu verwendete, im Original beschriebene u. skizzierte App. gleicht im wesentlichen dem von KNOBLAUH und REIHER (Z. techn. Ph. **4**. 432 [1923]) angegebenen. (Ztschr. f. angew. Ch. **37**. 88 bis 903. 1924. Wolfen [Kr. Bitterfeld].) JUI.

J. A. V. Butler, *Löslichkeit, Lösungswärme und Gitterenergie von Salzen*. (Vgl. Chemistry and Ind. **43**. 634; C. 1924. II. 1047.) An Hand von Tabellen ergibt die Vf., daß ein enger Parallelismus zwischen der Lösungswärme u. der Löslichkeit von Salzen besteht. Es scheint daher die Löslichkeit in erster Linie durch die Lösungswärme bedingt zu sein, wobei allerdings noch besonderen statist. Verhältnisse an der Oberfläche des zu lösenden Körpers Rechnung zu tragen ist. Aus den Fundamentalgrößen, welche die Löslichkeit bestimmen, können die Gitterenergien des Salzes u. die Lösungswärmen der gasförmigen Ionen angenommen werden, aus sich die Lösungswärme des Salzes additiv aus diesen Größen zusammensetzt. V_m berechnet aus den von GRIMM (Ztschr. f. physik. Ch. **102**. 141; C. 1923. 156) angegebenen Werten der Gitterenergien die Hydratationswärmen der Halogenide der Metalle der ersten u. zweiten Gruppe des period. Systems u. findet ganz gute Übereinstimmung mit der Additionsregel. (Ztschr. f. physik. Ch. **113**. 27—38. 1924. Swansea, Univ.) BECIR.

Joan J. Plácințeanu, *Die Abhängigkeit der Verdampfungswärme und der Oberflächenspannung einer Flüssigkeit von den Molekularkräften*. Vf. sucht ein Beziehung zwischen Verdampfungswärme u. Oberflächenspannung einerseits u. die charakterist. Molekulargrößen andererseits aufzustellen, wobei angenommen wird, daß die Flüssigkeitsmoll. Kräfte aufeinander ausüben, welche in die Verbindungslinien der Moll. fallen u. ihrer Gegeneinanderverschiebung proportional sind. Es soll diese Kohäsionskraft nur so lange wirken, bis die Moll. einen bestimmten Abstand d voneinander nicht überschreiten. Mit Hilfe der kinet. Gastheorie

aplaceschen Capillartheorie gelangt Vf. dann zu einer Beziehung $Mr/2\pi = V/d$, wenn γ die Oberflächenspannung u. V die Verdampfungswärme bedeutet. Diese Ableitung stimmt sehr gut, mit einer von HAMMICK (Philos. Magazine [6] **39**. 2; C. 1920. I. 694) aufgestellten empir. Regel überein. (Ztschr. f. physik. Ch. **113**. 10—98. 1924. Berlin.)

BECKER.

Ja. K. Ssyркин, *Die absolute Entropie und die chemischen Konstanten mehratomiger Gase*. Nach den Ausführungen des Verfassers ist ein zweiatomiges Molekül energet. äquivalent einem einatomigen Molekül in einem fünfdimensionalen Geschwindigkeitsraume; d. h. er nimmt die Quanten der Drehbewegung gleichwertig mit denen der geradlinigen Bewegung an. Dann kann die Berechnung der Entropie u. der chem. Konstante C von mehratomigen Gasen, wie bei einatomigen, durchgeführt werden, ohne eine „Symmetriezahl“ oder das Trägheitsmoment herangezogen zu haben. Hat das Mol. n Freiheitsgrade, ist seine

m u. Durchmesser a , so ist $C = \lg \frac{(2\pi m)^{\frac{n}{2}} k^{\frac{1}{2} + \frac{n}{2}} a^{n-3}}{h^n}$. Vergleich mit der

Berechnung fiel günstig aus; die mangelhafte Kenntnis der Molekülgröße verringert die Schärfe der Prüfung. (Ber. Polytechnikum Iwanowo-Wosniessensk **8**. 101—11. Ztschr. f. Physik **24**. 355—65. 1924.)

BIKERMANN.

Samuel Clement Bradford, *Ein Beitrag zur kinetischen Theorie der Verdampfung*. Vf. leitet auf kinet. Wege eine Formel für den Dampfdruck von Flüssigkeiten, die die experimentellen Daten gut wiedergibt. (Philos. Magazine [6] **48**. 936—47. 1924. London, Science Museum.)

KYROPOULOS.

B. Anorganische Chemie.

Max Trautz und Friedrich Geissler, *Neue Messungen des Chlorzerfalls in der Gasphase*. Nachdem K. WOHL (vgl. Ztschr. f. Elektrochem. **30**. 36; C. 1924. I. 1163) zur Hilfe der Explosionsmethode die Zerfallswärme des Cl_2 zu 57 Cal. bestimmt hatte, wurde nun von den Vff. mit der verbesserten Methode von V. MEYER unter Benutzung eines Porzellangefäßes eine neue Unters. des Chlorzerfalls durchgeführt. In Verss. zur Kontrolle der Gefäße (Einzelheiten der App. im Original) mit H_2 zeigten ihre Verwendbarkeit auch für Gase mit größerem Molekelradius. Ein Zerfall des H_2 ließ sich nicht nachweisen. Die bisherigen abweichenden Ergebnisse beruhen oft auch in der Unvollkommenheit der Temp.-Meßvorr. begründet sein. Die Methode der Vff. bestand im Prinzip darin, die bei der Meßtemp. im Reaktionsgefäß vorhandene Menge Cl_2 unmittelbar quantitativ zu bestimmen, um durch Vergleich mit der nach den Gasgesetzen berechneten Molzahl aus den Zerfallsgraden und Gleichgewichtskonstanten die Zerfallswärme des Cl_2 zu berechnen. Aus zahlreichen Verss. zwischen 1151 u. 1264° ließ sich unter Berücksichtigung der Abweichung vom Gasgesetz aus den ermittelten Temp.-Koeffizienten im Mittel die Zerfallswärme des Cl_2 zu 59,5 (± 2) Cal. berechnen. Die chem. Konstante des Chlorzerfalls, aus der Isochore berechnet, liegt zwischen 0,54 u. höchstens 2,27. Sie weicht von dem nach der Sternschen Formel für die chem. Konstante für den Dampfdruck eines therm. einatomigen Dampfes berechneten Wert erheblich ab, was für die einatomigen Dämpfe von K, Na u. J von anderen Forschern ebenfalls bemerkt worden war. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. **140**. 116—48. 1924. Heidelberg, Univ.)

HORST.

Rayleigh, *Aktiver Stickstoff*. Vf. macht darauf aufmerksam, daß er 1911 zum erstenmal diese Bezeichnung für N_2 gebrauchte, welcher sich durch eine besonders hohe chem. Reaktionsfähigkeit auszeichnete. (Nature **114**. 717. 1924. Chelmsford.) BE.

K. F. Bonhoeffer, *Das Verhalten von aktivem Wasserstoff*. Vf. stellt aktiven

*see
errata
V. 96²
p. 3204*

Wasserstoff durch Geisslerentladung in einer H_2 -Atmosphäre von 0,1 bis 1 mm bei 5000 V u. etwa 100 Milliampère dar. Das etwa 2 m lange u. 2 cm dicke Entladungsröhr ist S-förmig gebogen u. steht mit einem elektrolyt. H_2 -Entwicklungsapparat in Verbindung. Der so erhaltene H ist sehr reaktionsfähig. Er reduziert zu Metall Cu₂O, CuO, PbO, Bi₂O₃, Ag₂O, Hg₂O, HgO, CdS, Cu₂S, CuS, Hg₂S, CuCl, Cu₂Cl₂, BiCl₃, AgCl, HgCl, Hg₂Cl, AgBr, CdJ, AgJ, CuF, CuF₂, AgF₂. Dagegen werden nicht reduziert: Al₂O₃, MgO, Cr₂O₃, ZnO, MgCl₂, FeCl₂, CoCl₂, NiCl₂, ZnCl₂, CdCl₂. S, As u. P bilden die entsprechenden H-Verbb., Ölsäure hydriert. Durch die Berührung mit festen Oberflächen, wie Metallstückchen u. Oxyden, wird die Rückbildung des atomaren aktiven H zu molekularem H_2 katalysiert, was durch das Auftreten des Viellinienspektrums des H_2 im Gegensatz zum Balmerpektrum des atomaren H nachweisbar ist. Um den bei dieser Umwandlung auftretenden therm. Effekt zu messen, wurde eine Thermometerkugel mit einer dünnen Schicht des Katalysators (Metallüberzug, Oxyd) überzogen u. der Temperaturanstieg bei Berührung mit dem aktiven H gemessen. Eine andere u. empfindlichere Methode besteht in der Ausnutzung des Radiometereffektes, der dadurch entsteht, daß die Umwandlungswärme ein halbversilbertes Flügelrad in Drehung versetzt. Es zeigte sich, daß als Katalysatoren in Betracht kommen Pt, Pd, W, Fe, Cr, Ag, Cu, Pb, Hg (der Stärke geordnet), sowie MgO, CaO, BaO, Al₂O₃, Cr₂O₃, u. daß nur minimale Schichtdicken notwendig sind. Die katalyt. Wirksamkeit der Metalle zeigt einen deutlichen Parallelismus mit der bei der elektrolyt. H_2 -Entw. an der Kathode aus diesem Metall auftretenden Überspannung. Metalle mit hoher Überspannung zeigen die kleinste katalyt. Wrkg. Die Vorbehandlung des als Katalysator dienenden Metalls ist von Wichtigkeit, indem eine Vorbehandlung mit aktivem H die Wrkg. steigert, eine solche mit Luft oder O₂ sie beeinträchtigt. Aus der Größe des therm. u. chem. Effekts läßt sich die Konz. des aktiven H in der Größenordnung von annähernd 20% schätzen. Zwischen 50 u. 500 Milliampère zeigt sie eine Abhängigkeit von der Stromstärke. Die Annahme, daß der aktivierte atomare H ist, erklärt zwanglos die beobachteten Erscheinungen. (Ztsch. f. physik. Ch. **113**. 199—219. 492. 1924. Berlin-Dahlem, Kaiser WILHELM-Institut für physikal. u. Elektrochemie.)

BECKE.

Ronald George Wreyford Norrish und Eric Keightley Rideal, *Die Bedingungen der Reaktion von Wasserstoff mit Schwefel*. Teil V. *Photochemische Erzeugung*. (IV. vgl. Journ. Chem. Soc. London **123**. 3202; C. **1924**. I. 1332.) Die Angaben von GRAHAM (Proc. Royal Soc. London Serie A. **84**. 311; C. **1910**. II. 1860) über das Absorptionsspektrum von S₂-Dampf wurden nachgeprüft, die maximale Absorption bei einer etwas größeren Wellenlänge, nämlich bei $\lambda = 27,4 \mu$ gefunden. Diese Wellenlänge entspricht nach der Strahlungstheorie einem rit. Inkrement von 51,670 cal pro Mol S₂ in guter Übereinstimmung mit den früher auf anderem Wege berechneten Werten. In Bestätigung dieser Tatsachen analysierte ultraviolettes Licht die B. von H₂S aus den Komponenten, nicht aber jenseits des sichtbaren Spektralgebiets. Der Temperaturkoeffizient der dunklen u. hellen photochem. Rk. wurde bestimmt, ferner die Abhängigkeit der Reaktionsgeschwindigkeit vom Partialdruck des S₂ u. von der Oberfläche des Reaktionsgefäßes. — Aus den Resultaten dieser u. der vorhergehenden Arbeiten wird geschlossen, daß die Aktivierung der S-Molekel durch die Dissoziation einer oder mehrerer Bindungen erreicht wird, was durch Zusammenstoß oder durch Strahlung geschehen kann. Die pro Mol absorbierte Energie ist unabhängig vom Mechanismus der Aktivierung u. eine Funktion der gel. Bindungen. Da Vff. als Aktivierungsinkremente etwa einfache ganze Vielfache von 12700 cal fanden, dürfte dieser Wert der Lsg. der Valenz entsprechen, die obige Zahl 51670 cal also dem Zerfall von S₂ in S (Journ. Chem. Soc. London **125**. 2070—81. 1924. Cambridge, Univ.)

HERTZ.

Picon, *Über die Hydrate von Natriumthiosulfat*. (Vgl. C. r. d. l'Acad. des sciences 178. 1548; C. 1924. II. 1168.) Vf. erstreckt die therm. Unters. der Hydrate von $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ auf das Temp.-Intervall von -25° bis 115° . Die Geschwindigkeit, mit der sich das gel. Gemisch erwärmt, wächst oberhalb des F. Verschiedene Kryohydrate wurden beobachtet. Die Löslichkeit des primären (vgl. YOUNG u. BURKE, Journ. Americ. Chem. Soc. 26. 1413. [1904.]) Pentahydrats ändert sich bis zur Konz. von 10 Mol. $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ in 100 Mol. Gemisch sehr wenig mit der Temp. Die Unters. der sekundären Penta-, Tetra- u. Monohydrate mußte mit größeren Vorsichtsmaßregeln durchgeführt werden. Beim Abkühlen krystallisieren die Lsgg. nicht oberhalb -15° , man erhält dann keine primären Hydrate mehr sondern sekundäre mit 5, 4 u. 3 Mol. H_2O . Das sekundäre Pentahydrat ist metastabil u. geht unter Wärmeentw. in das primäre Pentahydrat über. Übersättigt man die Lsg. des sekundären Hydrates mit 6,25–13 Mol. wasserfreiem Salz in 100 Mol. Mischung u. kühlt auf -25 bis -30° ab, so erhält man ein Hexahydrat F. $14,3^\circ$. Wie das sekundäre Pentahydrat krystallisiert es nicht von selbst aus der Lsg. aus, sondern die Lsg. muß geimpft werden. Bei -25° bildet sich auch ein Dekahydrat, das mit Hilfe des App. von DRAISSE (S. 370) leicht isoliert werden kann. Voluminöse Krystalle F. unter 0° . Analyse ergab 10,07 u. 10,17 Mol. H_2O . Aus diesem scheint ein Salz mit $12\text{H}_2\text{O}$ hervorzustehen, das aber nicht isoliert werden konnte. — Für Konz. von mehr als 10 Mol. wasserfreiem Salz in 100 Mol. Mischung existieren außer dem sekundären Monohydrat nur primäre Salze, Penta-, Di-, Mono-, Semihydrat u. wasserfreies $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$. Durch Entwässern von primärem $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ über P_2O_5 bildet sich $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$, später $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$; $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ u. $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot \frac{1}{2}\text{H}_2\text{O}$ werden dabei mit gebildet. Diese erhält man vielmehr durch Krystallisation übersätt. Lsgg. des Pentahydrats. Die Dampfspannung von $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ beträgt 4,3 mm, von $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 2,5 mm. Nach Ansicht vom Vf. bestehen nicht 5 verschiedene Hydrate wie bei YOUNG u. BURKE (l. c.) sondern nur 2 u. die Zugehörigkeit der vom Vf. gefundenen Hydrate ist folgende (die Zahlen bedeuten die Salze mit dieser Anzahl Mol. H_2O): 12 sekundär F. -10° , 10 primär F. $\sim -8^\circ$, 6 sek. 5 prim., 2 prim. 1 sek., prim. Einzelheiten sind aus Kurven u. Tabellen im Original zu ersehen. Die sekundären Hydrate entstehen bei höheren aber schm. bei tieferen Temp. als die primären u. sind weniger stabil als letztere. Ein primäres Hydrat kann bei der Umwandlung eines sekundären in ein primäres bewirken aber nicht umgekehrt. Einen Umwandlungspunkt eines Hydrats der einen Reihe in ein Hydrat der anderen Reihe ohne fremde Impfung hat Vf. nicht finden können. Die Existenz von Halbhhydrats deutet daraufhin, daß 4 Moleküle sich zu einem zusammenschließen; auch mit den Ergebnissen bei der Zers. durch Wärme in Einklang steht. (Bull. Soc. Chim. de France [4] 35. 1093–1112. 1924.) JOSEPHY.

P. P. Budnikow und A. Ja. Sworykin, *Geschwindigkeit der Löslichung des bei verschiedenen Temperaturen vorgeglühten Kalks*. Reines CaO wurde durch Erhitzen in CaO übergeführt, der Kalk im Überschuß in W. zugetan u. die zeitliche Löslichkeitszunahme desselben unter ständigem Rühren gemessen. Ihre Geschwindigkeit ist als Maß der Hydratationsgeschwindigkeit aufgefaßt, da nur $\text{Ca}(\text{H}_2\text{O})_2$ -Lsgg. leiten. Die Kurve „ $\propto$ gegen Zeit“ ist je nach der Temp. der CaO verschieden. Für die Temp. 800 – 1200° weist sie ein Maximum (bei 5 bis 10 Min.) auf. Am raschesten wird der bei 1100° gewonnene Kalk hydratisiert. Bei 1700° dargestellte zeigt auch nach sehr langer Zeit geringere Leitfähigkeit, also „totgebrannt“; bei 700° ist die Umwandlung des Oxalats noch nicht vollständig. — Der beim Glühen des natürlichen Kalksteins (mit 97,78% CaCO_3) enthaltene CaO wird langsamer hydratisiert, als der bei gleicher Temp. aus Oxalat gewonnene. Die Temp. 1100° wurde wieder als die günstigste gefunden; die „Totgebrannt“ tritt aber bei viel tieferen Temp. ein: der Temp. 1200° entspricht die

Hydratationsdauer von 23 Min., 1400° 51 Min., 1700° mehr als 3 Stdn. — D. gelöschte u. wieder entwässerte Kalk löst sich im W. mit der ursprüngliche Geschwindigkeit. — Zusatz von 2—5% SiO₂ hat nur wenig Einfluß, der von 0 erhöht sogar die Leitfähigkeit (B. einer übersättigten Lsg.?), größere Zusätze senken sie herab. (Ber. Polytechnikum Iwanowo-Wosniessensk 8. 48—54. 1924.) B. I.

P. P. Budnikow und **M. E. Lewin**, *Belebung der toten Modifikationen des Calciumsulfats und Herstellung von Anhydrit- und Gipszement*. Mit geringen Mengen verschiedener Substanzen innig vermischt, erhält der *Anhydrit* (bezw. totgebrannter *Gips*) die Eigenschaft, W. bei mittleren Tempp. zu binden. Die Versuchsergebnisse vgl. BUDNIKOW (Chem.-Ztg. 47. 825; C. 1924. I. 2900). Als wirksam erwiesen sind: NaOH, Na₂HPO₄·2H₂O, NaHSO₄·H₂O, CaO, MgSO₄·7H₂O, MgCl₂·6H₂O, ZrCl₄·2H₂O, Al₂(SO₄)₃·18H₂O, HCl, unwirksam Fe₂O₃ u. Fe. Ein Zusatz von 5% NaHSO₄·H₂O bedingt eine fast völlige Hydratation in 7 Tagen bei 35—36°. Bei nachfolgender Krystallisation des Gipses wird der Katalysator auf der Oberfläche ausgeschieden. Der aus CaSO₄, Katalysator (0,1—10%) u. 35% W. erhaltene Zement wurde auf die Festigkeit geprüft. Die besten Ergebnisse sind wieder mit NaSO₄ (1%) erzielt: die Zerreißfestigkeit war nach 3 Tagen 29,5, nach 7 Tagen 32,8, nach 28 Tagen 49,1 kgm/cm. Ging man von dem Gips aus, so erhielt man den besten Zement nach Entwässerung bei 500°. Sehr wesentlich ist die Feinheit des Mahls. Es wurden Siebe mit 4900 Öffnungen/qcm benutzt. Beim Vermahlen des *Alabsters* erhält man auch einen „Gips“-zement, wenn man NaHSO₄ oder H₂SO₄ beizugibt. (Ber. Polytechnikum Iwanowo-Wosniessensk 8. 32—39. 1924.) BIKERM.

P. P. Budnikow und **E. A. Schilow**, *Über die Ribansche Reaktion*. Div. RIBAN (C. r. d. l'Acad. des sciences 95. 1160 [1882]) entdeckte Rk. verläuft in 3 Stufen: $3\text{CaO} \cdot \text{P}_2\text{O}_5 + 2\text{CO} + 2\text{Cl}_2 = 2\text{CaCl}_2 + 2\text{CO}_2 + \text{CaO} \cdot \text{P}_2\text{O}_5$ u. $\text{CaO} \cdot \text{P}_2\text{O}_5 + 4\text{CO} + 4\text{Cl}_2 = \text{CaCl}_2 + 2\text{POCl}_3 + 4\text{CO}_2$.

SPITALSKI (Ber. üb. wiss.-techn. Arbeiten in der Republik [russ.] 1. 12 [20]) konnte CO-Cl₂-Gemisch durch Phosgen ersetzen. Die Nernstsche Annäherungsgleichung, auf die Rk. mit Phosgen angewandt, ergibt, daß die Rk. bis 1000° praktisch vollständig ist. Ihr Aufhören oberhalb 420° (vgl. SPITALSKI, l. c.) muß also auf einer kinet. Hemmung beruhen. Die Rk. des *Phosgens* mit geglühtem (700°) *Gips* führt ebenfalls zu *CaCl*₂ führt, geht bei Ggw. von Tierkohle auch bei höheren Temp. vor sich; bei 450° wurde eine 99%ig. Ausbeute an *CaCl*₂ erreicht. Den Charakter der Hemmung mußte man also in der Phosphorsäure suchen. In der Tat reagierte mit COCl₂ das *Ca-Metaphosphat* (nach MADRELL dargestellt) um so träger, je höher (bis 600°) es erhitzt wurde. Bei nochmaliger Temperaturerhöhung erlangte das *Meta*-(u. das *Ortho*)-phosphat seine Reaktionsfähigkeit wieder; bei 650—700° in 1,5 Stdn. die Ausbeute von 62%, bei 1000° von 85% beobachtet. — Die Rk. wurde so durchgeführt, daß das Phosphat in einem COCl₂-Strom erhitzt wurde; die Ausbeute, auf Phosgen bezogen, bleibt infolgedessen stets sehr gering, was den Wert der Rk. verringert. — Mit *Phosphorsäure* reagiert COCl₂ bei 250—300° Ggw. von Tierkohle nicht geschwinder, als mit *Ca*-Phosphat. Ähnliches wurde an *AlPO*₄ u. *AgPO*₃ beobachtet. (Ber. Polytechnikum Iwanowo-Wosniessensk 8. 39—47. 1924.) BIKERM.

Philip S. Danner, *Die Darstellung von sehr reinem Barium und Strontium*. Vf. arbeitet eine Methode von GUNTZ u. seinen Schülern (vgl. C. r. d. l'Acad. des sciences 83. 872. [1901]. 141. 1240. [1905]. 143. 339. [1906]) aus, welche auf der Reduktion der Oxyde der Erdalkalien mit Al u. Mg u. nachfolgender Trennung durch Extraktion beruht. Die zur Rk. verwandten Materialien dürfen keine Unreinheiten enthalten. Der Dampfdruck mit dem von Ba u. Sr vergleichbar ist. BaO u. SrO wird durch Entwässern der entsprechenden Hydroxyde dargestellt u. durch Erhitzen unter 5 at Druck in einer eisernen Bombe teilweise in die Peroxyde übergeführt.

am günstigsten ist wenn der Peroxydgehalt ca. 10% des Oxydgehalts beträgt. Das muß frei von Zn u. in Form von grobem Pulver sein. Die Rk. wird durch Einschlagen eines Bogens zwischen den Fe- u. Al-Elektroden in der M. eingeleitet. Der Dest.-App. ist im Original beschrieben u. gezeichnet. Die erhaltenen Silberweißen, krystallin. Kügelchen bestanden zu 99% aus reinem Metall. Beide Metalle sind hämmbar u. ungefähr ebenso hart wie metall. Na. Sr ist etwas weniger reaktionsfähig als Ba. (Journ. Americ. Chem. Soc. **46**. 2382—84. 1924. Pasadena [Calif., Univ.])

JOSEPHY.

H. S. Kurnakow und F. S. Shemtschushny, *Die Gleichgewichte des reziproken Systems Natriumchlorid-Magnesiumsulfat mit Berücksichtigung der natürlichen Salzsolen*. V. betrachten das System $2\text{NaCl} + \text{MgSO}_4 \rightleftharpoons \text{Na}_2\text{SO}_4 + \text{MgCl}_2$, das für die Entstehung der Meer- u. Seesalzablagerungen von so großer Bedeutung ist. Dieses System hat gegenüber dem bereits untersuchten mit den entsprechenden K-Salzen gewisse Besonderheiten, die mit der Fähigkeit des Na_2SO_4 , Hydrate zu bilden, im Zusammenhang stehen. Auch das für die Ausscheidung vieler kaspischer Bitterseen charakterist. Doppelsalz *Astrakanit*, $\text{Na}_2\text{SO}_4 \cdot \text{MgSO}_4 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$, ist diesem System zugehörig. Die Gleichgewichtsisothermen wurden bei 0° u. bei 25° untersucht u. sind in Tabellen u. Diagrammen veranschaulicht. Bei 25° besteht das Gleichgewichtsdiagramm der wss. Lsgg. der reziproken Salzsysteme aus 7 Krystallisationsfeldern, denen die Ausscheidung folgender Phasen entsprechen: *NaCl*, $\text{MgCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ (*Gschoffit*), *Thenardit*, *Glaubersalz*, *Astrakanit*, $\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ (*Epsomit* oder *Reichenardit*) u. $\text{MgSO}_4 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$. Bei 0° fehlen die *Astrakanit*- u. *Thenarditfelder*. Vff. weisen auf die Analogie hin, die zwischen der Struktur des chem. Diagramms u. des kristallograph. Modell besteht. Hier das Gesetz der multiplen Proportionen u. chem. Zus., dort das Gesetz der rationalen Parameter kristallograph. Formen. Das Diagramm von 25° wird zur besseren Übersicht in 4 Quadranten geteilt: Na-, Sr-, Cl- u. Mg-Quadrant. Die B.-Bedingungen der einzelnen Salze u. ihre gegenseitige Abhängigkeit von verschiedenen Faktoren kann aus der geometr. Darst. der einzelnen Felder leicht entnommen werden. Besonders die innere Struktur des NaCl-Feldes, die experimentelle Best. der Krystallisationsbahnen des NaCl fanden eine eingehende Unters. Die experimentell gefundenen Zusammenhänge stimmen in auffallender Weise mit den untersuchten Solen der russ. Binnenseen überein. Die geometr. Behandlung der chem. Diagramme hat sich sehr fruchtbar erwiesen. Die Punkte, Linien u. Flächen der topolog. Komplexe lassen sich nach der Eulerschen Formel bestimmen, wodurch schließlich die der Lage des Feldes u. des Krystallisationspols zum euton. Punkt entsprechenden Krystallisationsbäume konstruiert sind. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. **140**. 149—82. 1924. St. Petersburg, Polytechn. Inst.)

HORST.

John B. Robertson, *Das reziproke Salzpaar $\text{Na}_2\text{Cr}_2\text{O}_7 + 2\text{KCl} \rightleftharpoons \text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7 + 2\text{NaCl}$* . Vff. untersucht die Systeme $\text{KCl}-\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7-\text{H}_2\text{O}$, $\text{NaCl}-\text{Na}_2\text{Cr}_2\text{O}_7-\text{H}_2\text{O}$, $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7-\text{Na}_2\text{Cr}_2\text{O}_7-\text{H}_2\text{O}$ u. $(\text{K}, \text{Na})-(\text{Cl}, \text{Cr}_2\text{O}_7)-\text{H}_2\text{O}$. Bei allen Temp. sind $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ u. NaCl ein beständiges Paar. Höhere Temp. beeinträchtigen zwar die Größe des Anteils für $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ in der Zus. des Gleichgewichts zugunsten von KCl u. NaCl , doch bleibt der Betrag für $\text{Na}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ stets sehr gering. Die in Tabellen u. Diagrammen veranschaulichten Ergebnisse der Unters. werden auf die techn. Darst. von $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ angewandt. (Journ. Soc. Chem. Ind. **43**. T. 334—38. 1924. Edinburgh, Univ.)

HORST.

Priyada Ranjan Rây und Pabitra Nath Das Gupta, *Doppelferrocyanide von Hydrazin und den metallischen Elementen*. *Hydrazinferrocyanid*, $(\text{N}_2\text{H}_5)_4\text{Fe}(\text{CN})_6$, aus Hydrazin u. Ferrocyanwasserstoffsäure, bildet mit Salzen von Schwermetallen unl. Doppelverb., deren Zus. sich je nach der Fällungsmethode ändert. Ähnliche

Fällungsmethoden bei verschiedenen Metallen bewirken nicht übereinstimmend. Der resultierende Doppelverbb. Die erhaltenen Verbb. sind alle unl. in u. verd. Säuren; mit NaOH entstehen die Metallhydroxyde, mit konz. H_2SO_4 ständige Zers. An der Luft sind sie alle zersetzlich, obgleich die Doppelverbb. neutraler Lsg. hergestellt wurden, haben sie meist sauren Charakter u. enthalten weniger bas. Reste, als es dem sauren Ferrocyanidion entspricht. Die zugefällten Doppelferrocyanide scheinen instabil u. gehen unter Verlust von Hydrazin beim Waschen u. Trocknen in saure Verbb. über. Die Fe-Verbb. jedoch neutral.

Versuche. *Hydrazinferrocyanid*, $(N_2H_5)_4Fe(CN)_6$, Kaliumferrocyanid in Lsg. wird mit konz. HCl unter Rühren versetzt, wozu man später Ä. gibt, der voluminösen Nd. von Ä.-Ferrocyanid abscheidet. Die hieraus mit dest. Wasser gewonnene Lsg. von Ferrocyanwasserstoffsäure wird mit Hydrazinhydrat neutralisiert u. mit A. das Hydrazinferrocyanid als körnige hellgelbe M. abgeschieden. *Kupferhydrazinferrocyanid*: Die Lsg. von Hydrazinferrocyanid mit wenigen Tropfen Hydrazinhydrat wird mit $CuCl_2$ -Lsg. versetzt; es scheidet sich als weißer Ndd. Verb. $Cu_3(N_2H_5)_4H(FeCy)_2$ aus. Mit NaOH entsteht hieraus das blaue $Cu_9(NH_4)_4(FeCy)_6$. Überschüssiges Hydrazinferrocyanid gibt mit unzureichendem Cl_2 schokoladebraunes $Cu_8(N_2H_5)_8H_4(FeCy)_7$; in äquivalenten Mengen der Komponenten entsteht der noch tiefer braun gefärbte Nd. von $Cu_7(N_2H_5)_6H_4(FeCy)_6 \cdot 6 H_2O$; überschüssiges $CuCl_2$ liefert eine uneinheitlich zusammengesetzte Verb. Großer Überschuß von Hydrazinferrocyanid gibt mit wenig $CuCl_2$ die an der Luft unbeständige Verb. $Cu_6(N_2H_5)_4(NH_4)_2(FeCy)_3$. — *Nickelhydrazinferrocyanid*: Es wurden in analoger Weise mit stets wechselnden Mengen der beiden Komponenten dargestellt das grüne $Ni_6(N_2H_5)_{11}H_5(FeCy)_7 \cdot 11 H_2O$, das tiefgrüne $Ni_4(N_2H_5)_4H_8(FeCy)_5 \cdot 2 H_2O$, das gelbe $Ni_7(N_2H_5)_6H_5(FeCy)_7 \cdot 12 H_2O$ u. mit überschüssigem $Ni(NO_3)_2$ die gelbbraune Verb. $Ni_7(N_2H_5)_4H_2 \cdot (FeCy)_5 \cdot 15 H_2O$. — *Kobalthydrazinferrocyanid*: Die grünen Salze haben die Zus.: $Co_6(N_2H_5)_8 \cdot (FeCy)_5 \cdot 4 H_2O$ u. $Co_{10}(N_2H_5)_{11}H_5(FeCy)_9 \cdot 11 H_2O$, bei Verwendung von überschüssigem Hydroferrocyanid mit gleichen Mengen der Komponenten $Co_7(N_2H_5)_8H_2(FeCy)_6$. — *Eisenhydrazinferrocyanid*. Die Salze sind blau u. haben die Zus.: $Fe_9''Fe'''(N_2H_5)_9(Fe''Cy)_{10} \cdot 36 H_2O$, $Fe_{11}''Fe_{10}'''(N_2H_5)_8(Fe''Cy)_{15} \cdot 80 H_2O$ u. $Fe_{17}''Fe_{8}'''(N_2H_5)_{12}(Fe''Cy)_{15} \cdot 129 H_2O$. — Die *Zinkhydrazinferrocyanide* sind weiße Ndd. Mit unzureichendem $ZnSO_4$ entsteht $Zn_{13}(N_2H_5)_4H_5(Fe''Cy)_{10} \cdot 19 H_2O$, bei genau gleichen Mengen $Zn_{11}(N_2H_5)_7H_3(Fe''Cy)_8 \cdot 16 H_2O$, mit überschüssigem $ZnSO_4$ die Verb. $Zn_{12}(N_2H_5)_3H_5(Fe''Cy)_8 \cdot 45 H_2O$. Mit Cd- u. In-Salzen wurden Verbb. unbestimmter Zus. erhalten. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Chem. **140**. 81—92. 1924. Calcutta, Univ.)

Ernest Augustus Dancaster, Chloroperbromidgleichgewichte. Außer der qualitativen Feststellung von BERTHELOT (C. r. d. l'Acad. des sciences **94**. 1619 [1879] **100**. 761 [1885]), daß konz. Lsgg. von $BaCl_2$ u. $SrCl_2$ Brom absorbieren u. leuchten, sind in den Arbeiten von JAKOWKIN (Ztschr. f. physik. Ch. **20**. 19 [1896] u. frühere) und in den Arbeiten von NaClJ₂, KClBr₂ u. KBrJ₂ liegen über gemischte Perhalogenide keine Angaben vor. Perhalogenide von Mg u. Al sind überhaupt nicht bekannt. Vf. hat die Dissoziation von $CuCl_2Br_4$, $MgCl_2Br_4$, $CaCl_2Br_4$, $SrCl_2Br_4$, $BaCl_2Br_4$, $CdCl_2Br_4$, $HgCl_2Br_4$ u. $AlCl_3Br_6$ bei 25° nach der Methode von JAKOWKIN bestimmt. Mit Ausnahme der Verbb. von Cd u. Hg verhielten sich alle n., d. h. K_1 lag in der Nähe des Wertes von JAKOWKIN für die Alkaliverbb. bestimmten Wertes von 0,73. Bei Cd u. Hg liegt er höher u. steigt erheblich mit der Konz., die bei den übrigen Metallen nur sehr geringen Einfluß hat. Nimmt man mit VAN NAME u. BROWN (Amer. Journ. Science, SILLIMAN [4] **44**. 105; C. **1918**. I. 904) an, daß nur die n. Moll. u. Ionen sich mit Halogen verbinden können, so läßt sich der „akt.“, d. h. in einfacher molekularer Form vorliegende Teil des Halogenids berechnen. Er steigt bei CdCl₂ u.

H₂ erheblich mit der Verdünnung. (Journ. Chem. Soc. London 125. 2038—43. 1904. London, Birkbeck Coll.)

HERTER.

Edward Oscar North und George D. Beal, *Darstellung, Eigenschaften und Anwendung der Kiesel-(12)-wolframsäure*. I. Die Darstellung der Säure und ihrer Salze. Bei der Darst. nach COPAUX (Bull. Soc. Chim. de France [4] 3. 101; C. 128. I. 1372) wurde die HNO₃, H₂SO₄ oder Essigsäure durch HCl ersetzt u. abgetrennte SiO₂ vor dem Ausäthern abfiltriert. Für die Säure, 4H₂O·SiO₂·12WO₃·10H₂O, stellt Vf. eine Strukturformel auf, die von der Orthokieselsäure abgeleitet ist. Sie bildet n. Salze mit K u. NH₄OH, in welchen 8 H-Atome durch das Metall ersetzt sind. Die Titration mit Methylorange oder Methylrot zeigt einen scharfen Endpunkt, wenn 4 H ersetzt sind. Die Säure bildet stabile, größtenteils unl. Salze mit tertiären organ. Basen. Eine große Anzahl Salze mit Alkaloiden wurden dargestellt: *Pyridinkieselwolframat*, 2H₂O·SiO₂·12WO₃·4C₅H₅N, l. in h. verd. HCl. — *Nicotinsalz*, 2H₂O·SiO₂·12WO₃·4C₆H₇N, weniger l. — *Nicotinsalz*, 2H₂O·SiO₂·12WO₃·2C₁₀H₁₄N₂·5H₂O, bei 60° getrocknet, weiß; bei 100° getrocknet ohne die 5H₂O gelblich. — *Chininsalz*, 2H₂O·SiO₂·12WO₃·2C₂₀H₂₄N₂O₂, unl. in W. u. verd. Säuren. — *Cinchoninsalz*, 2H₂O·SiO₂·12WO₃·2C₁₉H₂₂N₂O·2H₂O, unl. — *Morphin-salz*, 2H₂O·SiO₂·12WO₃·4C₁₇H₁₉NO₃, wl. in A. u. verd. Säuren. — *Codeinsalz*, 2H₂O·SiO₂·12WO₃·4C₁₈H₂₁NO₃, wl. in A. u. verd. Säuren. — *Apomorphinsalz*, 2H₂O·SiO₂·12WO₃·4C₁₇H₁₇NO₂. — *Narceinsalz*, 2H₂O·SiO₂·12WO₃·4C₂₃H₂₇NO₅. — *Nicotinsalz*, 2H₂O·SiO₂·12WO₃·4C₂₃H₂₃NO₇, unl. in W. u. verd. Säuren. — *Stichninsalz*, 2H₂O·SiO₂·12WO₃·4C₂₁H₂₂N₂O₂, unl. — *Brucinsalz*, 2H₂O·SiO₂·12WO₃·4C₂₃H₂₆N₂O₄, unl. — *Cocainsalz*, H₂O·SiO₂·12WO₃·4C₁₇H₂₁NO₄. — *Coffeinsalz*, 2H₂O·SiO₂·12WO₃·4C₈H₁₀N₄O₂. — *Theobrominsalz*, 2H₂O·SiO₂·12WO₃·4C₇H₈N₄O₂. — *Veratrinsalz*, weicht in der Analyse etwas von der Theorie ab, 2H₂O·SiO₂·12WO₃·4C₃₃H₄₉NO₉; die schwache Purpurfarbe vertieft sich beim Erhitzen in verd. H₂SO₄. — *Colchicinsalz*, 2H₂O·SiO₂·12WO₃·4C₂₂H₂₅NO₆, gelb. — *Atropinsalz*, 2H₂O·SiO₂·12WO₃·4C₁₇H₂₃NO₃, wl. in h. verd. HCl. — *Hyoscyamin-salz*, 2H₂O·SiO₂·12WO₃·4C₁₇H₂₃NO₃. — *Berberinsalz*, 2H₂O·SiO₂·12WO₃·4C₂₀H₁₉NO₇, gelblich. — *Hydrastinsalz*, 2H₂O·SiO₂·12WO₃·4C₂₁H₂₁NO₆, blaßgelb. — Die Salze der Tertiärbasen, aus saurer Lsg. gefällt, zeigen eine teilweise Dehydratation, wie bei Bichromaten. (Journ. Amer. Pharm. Assoc. 13. 889—98. 1924. Urbana, Ill. 1925.)

JUNG.

W. Manchot und J. König, *Über Verbindungen von Kohlenoxyd mit Rutheniumverbindungen*. (Vgl. Ber. Dtsch. Chem. Ges. 57. 1157; C. 1924. II. 928.) Die Trihalogenide des Rutheniums RuX₃ addieren bei ca. 250° Kohlenoxyd nach: RuX₃ + 2CO = Ru₂(CO)₂ + X zu Verb., in denen das Ru mit der Koordinationszahl 4 auftritt. Ru₂(CO)₂ u. quantitativ bildet sich das Jodid, am schwersten das Chlorid, entsprechend der Affinität der Halogene. — *Rutheniumdijodid-Kohlenoxyd*, RuJ₂(CO)₂, aus RuJ₃ im CO-Strom bei 250°, bleibt als ockergelbes Pulver zurück. Unl. in W. u. organ. Flüssigkeiten. Beständig gegen konz. HCl, konz. H₂SO₄ zers. erst bei starkem Erhitzen. Zerfällt in Lsg. von Ag(NH₃)₂. Erhitzen in O₂ gibt unter Aufglimmen RuO₂, CO₂. — *Rutheniumdibromid-Kohlenoxyd*, RuBr₂(CO)₂; B. aus RuBr₃ im CO-Strom bei 270—290° als hellorangefarbenes Sublimat. — *Rutheniumdichlorid-Kohlenoxyd*, RuCl₂(CO)₂, B. bei 270°, 8 Stdn. als hellgelbes, flüchtiges Sublimat, Ausbeute gering; zerfällt beim Erhitzen an Luft zu schwarzem Pulver. Wird bei der Darst. zu stark erhitzt, so bildet sich an der Rohrwand ein Spiegel von metall. Ru. Durch Erhitzen B. u. Zers. der flüchtigen Verb. erklärt sich die von JOLY beobachtete Erhitzung der Chlorierung von Ru durch Zusatz von CO; die Einhüllung des Metalls durch unflüchtiges Chlorid wird dadurch verhindert. — Auch Lsgg. von RuCl₃ u. RuBr₃ in W. oder A. addieren langsam CO, erstere in 4 Wochen 19,5 l. pro Atom Ru, letztere 27,5 l. Wahrscheinlich bildet sich hier RuX₃(CO), das dann

auch bei der Rk. in der Hitze das primäre Prod. wäre. (Ber. Dtsch. Chem. 57. 2130—33. 1924. München, Techn. Hochsch.) ARND

C. Mineralogische und geologische Chemie.

Alfred Schoep, *Dumontit, ein neues radioaktives Mineral*. Das neue Mineral das Vf. zu Ehren des belg. Geologen ANDRÉ DUMONT als *Dumontit* bezeichnet stammt aus dem belg. Kongo; es bildet gelbe längliche Prismen. Zus.: 5,78% PbO , 8,65% P_2O_5 , 56,49% UO_3 , 27,19% PbO , 1,01% TeO_3 , oder nach Entfernung der Verunreinigungen: 5,88% H_2O , 8,71% P_2O_5 , 57,57% UO_3 , 27,71% PbO , woraus sich die Formel $2\text{PbO} \cdot 3\text{UO}_3 \cdot \text{P}_2\text{O}_5 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ ergeben würde. Durch $1\frac{1}{2}$ -std. Erhitzen auf 300° werden 5,69% H_2O abgegeben, bei 400° wird die Verb. orangefarbig, über 500° wird O_2 abgespalten, über 900° tritt kein Gewichtsverlust mehr ein, die Verb. zerfällt zu Pulver. (C. r. d. l'Acad. des sciences 179. 693—95. 1924.) L.

J. H. J. Poole und J. Joly, *Die Radioaktivität von Basalten und anderen Gesteinen*. Zweck der vorliegenden Arbeit ist, zu den Unterlagen für die Kenntnis des Radioaktivitätsgehalts des Magmas für geolog. Zeitbestimmungen beizutragen. Die experimentelle Unters. begnügt sich mit der Feststellung des Ra-Gehalts mittels eines Alkalicarbonatschmelzprozesses u. des Thoriumgehalts auf Grund eines neuen Verf. Der Actiniumgehalt wird aus dem Radiumgehalt berechnet. 8 g des pulverisierten Minerals wurden mit Na-K-Carbonat im elektr. Ofen geschmolzen, die entstehende Emanation in ein Elektroskop geleitet u. ihre Aktivität gemessen. Die Schmelze wird mit W. extrahiert u. der Rückstand, der das Th enthält, mit O_2 aufgenommen. Durch Kochen wird die Th-Emanation aus der Lsg. getrieben u. von einem Luftstrom dem Elektroskop zugeleitet. Die Maßnahmen zur Vermeidung von Fehlern werden geschildert. Ca. 58 Mineralien, vorzugsweise Basalte, verschiedener Herkunft, wurden untersucht, ihr Ra- bzw. Th-Gehalt bestimmt u. im einzelnen tabellar., sowie ihr Mittel wiedergegeben. (Philos. Magazine [6.] 8. 819—32. 1924.) KYROPOULOS

Marcel Fourment, *Die mineralischen Vorkommen der Erde*. I. bis IV. tt. Vom Cu, Pb, Ni u. Co wird eine ausführliche Übersicht gegeben. (Rev. de Métallurgie 21. 513—30. 610—23. 670—81. 750—57. 1924.) WILKINSON

George A. Thiel, *Kommerzielle Möglichkeiten des Magnetitschiefers der Cuyana-Kette*. Da die Mesabi Iron Co. einigen Erfolg in der Aufarbeitung des Magnetitgesteins des östlichen Endes der Mesabi-Kette hatte, werden für die Cuyana-Itte die Vorkommen kritisiert u. besprochen. (Engin. Mining Journ. 118. 735—38. 1924. Univ. von Minnesota.) WILKINSON

Robert Schwarz, *Über das Problem der Kaolinbildung*. Nach dem Vf. besteht der primäre Vorgang des Übergangs von Feldspat in Kaolin in einer restlosen Zerlegung des Feldspats in die Komponenten, d. h. in einer durchgreifenden Hydrolyse des Moleküls im Sinne folgenden Schemas:



sekundär erfolgt dann unter besonderen Bedingungen aus den Abbauprodukten die Synthese: die Vereinigung von $\text{Al}(\text{OH})_3$, SiO_2 u. W. zum Kaolin bzw. einer Vorstufe desselben. (Keram. Rdsch. 32. 538—39. 1924. Freiburg i. B.) WECHER

Stan. Landa, *Die bituminösen Cyprisschiefer in Böhmen*. Der Schiefer, aus Schalenresten von *Cypris angusta* Reuss durchsetzt, findet sich im tertiären Kolonienbecken von Falkenau. Die Extraktion des wasserfreien Prod. mit Bzl. ergibt 0,17% einer braunen Schmiere. Berechnet auf grubenfeuchtes Material ergibt die Verschwelungsprobe: Verbrennungswärme = 718 Cal., Heizwert = 478 Cal., = 0,19%, Teer = 3%, Schwelgas (Heizwert 2600 Cal.) u. Verluste = 2%. Aschengehalt des wasserfreien Schiefers = 67—78%. Der geringe Teer- u. N-Gehalt,

der unbedeutende Heizwert lassen die Verwendbarkeit fragwürdig erscheinen. (Nature 106. 1707—8. 1924.)

HERZENBERG.

J. Nolan, *Staub in der Atmosphäre*. Vf. bespricht die Ergebnisse von Untersuchungen in der Luft. Zweckmäßig wird der Staub eines bestimmten Luftvolumens in Deckglas niedergeschlagen u. mikroskop. untersucht. Die Korngröße beträgt 1 oder 2 μ bis zur Sichtbarkeitsgrenze hinunter. Zu verschiedenen Tageszeiten u. in verschiedenen Städten wechselt der Staubgehalt sehr stark. (Nature 106. 220—22. 1924.)

BECKER.

Vegard, *Die Luminescenz des festen Stickstoffs und das Nordlichtspektrum*. Ersetzt sich gegen die Deutung des Lumineszenzspektrums des festen N_2 u. durch Mc LENNAN u. SHRUM (Proc. Royal. Soc. London, Serie A. 106. 138; 1924. II. 1565), welche im Gegensatz zum Vf. (Nature 114. 357; C. 1924. II. 1565) das Lumineszenzspektrum des N_2 mit dem Nordlichtspektrum für nicht übereinstimmend halten. (Nature 114. 715. 1924.)

BECKER.

D. Organische Chemie.

Herbert P. Foran, *Die Kontraktion von Alkohol beim Verdünnen*. Wenn beim Verdünnen von A. mit W. die prozentuale Zunahme des Vol. mit V , die prozentuale Abnahme des Gehalts mit P u. die prozentuale Kontraktion mit C bezeichnet wird, gilt für diese die Beziehung: $C = 3 \cdot (V/P - 1,02)$. Diese Formel verliert ihre Gültigkeit, wenn P über 45% u. V über 90% u. V/P mehr als 1,9 beträgt. Innerhalb dieser Einschränkungen sind die errechneten Kontraktionswerte mit den experimentell ermittelten auf $\pm 0,06$ übereinstimmend. (Journ. Soc. Chem. Ind. 43. 1924. 40. 1924.)

HORST.

Wilhelm Traube, *Über das Verhalten von Natriumäthylatlösungen zu Stickstoff*. Gerade aus den Unterss. von STECHOW (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 57. 1611; 1924. II. 2135) ist in Verb. mit den früheren Unterss. des Vfs. zu schließen, daß C_2H_5ONa nicht mit NO reagiert, so lange sie unzers. ist, daß die Rk. eintritt, sobald infolge Selbstzers. des Äthylats in der Lsg. Ketone entstanden sind. Wenn STECHOW aus einer sich zersetzenden Äthylatlsg. Aceton selbst nicht nachweisen konnte, so liegt dies offenbar daran, daß es in der alkal. Lsg. alsbald zu Nitroäthyl u. Phoron kondensiert wird, die ihrerseits mit NO reagieren (vgl. Ber. Dtsch. Chem. Ges. Ann. 300. 97; C. 98. I. 668), u. daß andererseits bei Selbstzers. des Äthylats in NO-Atmosphäre das allmählich entstehende Aceton infolge seiner Tendenz gerade unter den Bedingungen des Vers. NO anzulagern, mindestens zum Teil in dieser Richtung reagieren wird. — Wenn es sich um Darst. von Isonitramin aus Verb. bekannter Konst. handelt, können die geringen Mengen gleichzeitiger Nebenprod. entstehenden Diisonitraminacetons bzw. Methylendiisonitramins das Bild der Rk. nicht trüben u. die Reindarst. der Isonitramine nicht verhindern. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 57. 2063—65. 1924.)


SPIEGEL.

Max Trénel und Rudolf Wilkendorf, *Zur Kenntnis aliphatischer Nitroverbindungen*. III. (II. vgl. Ber. Dtsch. Chem. Ges. 57. 306; C. 1924. I. 1171.) Vff. beschreiben die früher mit Alkalien beschriebenen Abbau des Nitro-*i*-butylglycerins in alkalischen Lösungen aus, wobei der abgespaltene CH_2O nicht durch Nitroäthyl abgefangen zu werden braucht. — Das Endprod. des oxydativen Abbaus des Nitro-*i*-butylglycerins ist Brompikrin, das auch bei der Darst. des α, γ -Dioxy- β -halogen- β -nitropropan entsteht. — Beim Abbau des Nitro-*i*-butylglycerins mit Hypobromitlauge entsteht Brompikrin, α, γ -Dioxy- β -brom- β -nitropropan u. Dinitrobrommethan. Brompikrin, gelbe, hochexplosible Nadeln, wl. in k. W., ll. in h. W., mit konz. $AgNO_3$ -Lösung gelbbraune, explosible Nadeln. Die entsprechende Behandlung des α, γ -Dioxy- β -nitropropan ergab Brompikrin, β -Oxy- α -brom- α -nitroäthan, Kp_{16} 114°, u.

β -Oxy- α, α -dibrom- α -nitroäthan, Kp.₁₆ 118°. Bei der Darst. des α, γ -Dioxy- β -nitropropans in W. scheidet sich die Verb. in großen Doppelpyramiden ab. Krystallograph. Unters. durch Seifert: Rhombisch — $a : b = 0,918 \pm 0,003$: $c : b = 0,816 \pm 0,014$ opt. negativ. — α, γ -Dioxy- β -natrium- β -nitropropan, stallwasserhaltig u. β -Oxy- α -natrium- α -chlor- α -nitroäthan mit $1\text{H}_2\text{O}$ aus 94%ig A. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 57. 2126—30. 1924.) TRÉNT

H. Hérissay und J. Cheymol, Synthetisierende Wirkung der d-Mannoside in Gegenwart des gewöhnlichen Glykols und des Glycerins. (Journ. Pharm. et Ch. [7] 30. 272—76. Bull. Soc. Chim. Biol. 6. 865—68. 1924. — C. 1924. II. 60.)

T. D. Stewart und Sherwin Maeser, Die Stärke von Trimethylaminoxyd und Trimethylalkoxyammoniumhydroxyden als Basen. Die Struktur von Ammoniumverbindungen. Von den Salzen des Trimethylaminoxys wurden colorimetr. meth. Methylviolett u. Methylorange bzgl. ihrer Hydrolyse bei 20° folgende unters. (CH₃)₃NOHCl, (CH₃)₃NOHJ, (CH₃)₃NOHBr, Ergebnisse tabellar. im Original: Die Unterss. geben eine Erklärung dafür, daß das Aminoxyd eine zu schwache Base ist, um Phenolphthalein zu verändern. Es wurde dann die Acidität wss. Lsg. von Alkoxyammoniumsalzen bei 20° bestimmt; untersucht wurden (CH₃)₃NOC₂H₅J, (CH₃)₃NOC₃H₇J u. (CH₃)₃NOC₄H₉J; die Dissoziationskonstante dieser Basen war ungefähr 1% der von NH₄OH sein. Die Best. der Leitfähigkeit von Trimethylalkoxyammoniumhydroxyden (Tabelle im Original) zeigt, daß diese Verbb. starke Basen sind. Die Alkoxyammoniumjodide sind, wie die Leitfähigkeit zeigt, in wss. Lsg. stark ionisiert, Lsgg. dieser Jodide fallen aus Pb(NO₃)₂-Lsgg. ebenso leicht PbJ₂ wie NaJ. — Über Trimethylaminoxydhydrat ist bei 25° der Dampfdruck nicht größer als 2,5 mm. Die schwache Basizität von Trimethylaminoxydhydrat erklären Vf. durch B. eines nicht ionisierten Hydrats nach folgendem Schema



Darst. von Trimethyläthoxyammoniumjodid: das nach dem Verf. von NOY u. HIBBEN (Journ. Americ. Chem. Soc. 45. 355; C. 1923. III. 297) dargestellte hydratisierte Aminoxyd wird in einer Kältemischung mit 1,5 Mol. C₂H₅J versetzt u. wenig A. zugegeben; nach 12-std. Stehen auf Eis wird das Gemisch auf Zimertemp. gebracht u. der Nd. aus CH₃OH, A., Butylalkohol oder Eg. unter Ausschuß von Feuchtigkeit umkrystallisiert; hieraus Blättchen, Zers. zwischen 133—50° wird durch 1-std. Erhitzen mit Eg. nicht verändert; beim Erhitzen mit Zinn-Geruch nach Acetaldehyd. Das analog dargestellte Methoxyderiv. zers. sich bei ca. 165°. (Journ. Americ. Chem. Soc. 46. 2583—90. 1924. Berkeley [d].) Univ.) HABERLAJ.

Hans Schmalfuß, Studien über die Kondensation von Formaldehyd. I. über die Kondensation mit Magnesiumoxyd. (Nach Verss. von Kurt Kalle.) Im Gegensatz zu negativen Ergebnissen von LOEW fand Vf., daß CH₂O-Lsg. sich mit gelber in auffallend kurzer Zeit, am besten unter Druck (2 Atm.) u. Rühren, kondensieren läßt, wobei die Reaktionsprodd. nur äußerst wenig durch die Hitze zerstört werden. Es entstehen eine Triose, eine Pentose, ferner CH₃-OH u. H-COOH. Die zuletztgenannten Prodd. bilden sich zuerst, u. diese Rk. ist beendet, sobald alles gelbe verbraucht ist; der Zucker erst später, dann in wenig Min. Schließlich entsteht aus dem Zucker noch Säure u. Farbstoff, letzterer erst nach völligem Verbrauch des CH₂O. Die absol. Reaktionsgeschwindigkeit ist der Menge W. etwa umgekehrt, der Menge CH₂O u. derjenigen des gel. MgO direkt proportional. Die Geschwindigkeit, mit der sich der Zucker bildet, nimmt bei starker Vermehrung der Wassermenge nur sehr wenig ab u. wächst sehr wenig bei starker Vermehrung der Konz.

H_2O . Dagegen ist die absol. Geschwindigkeit der B. von Zucker direkt proportional der Menge MgO , die vorher bei der Cannizzaroschen Rk. noch nicht verbraucht wurde. Die Kondensation verläuft um so schneller, je höher Temp. u. sind (auch Rührgeschwindigkeit wirkt steigend), geht aber auch bei 100° unter Überdruck vor sich. — Zur Entfärbung der Zuckerlsg. waren von verschiedenen *Entfärbungsmitteln* die folgenden Mengen äquivalent: 1 g frisch geglühte Kohle, 3 g frisch geglühte Pflanzenkohle, 10 g einmal gebrauchte Tierkohle (frisch geglüht), 30 g Frankonit F. C., 45 g Kaolin, 90 g Tonsil. Wegen der großen Löslichkeit des Zuckers konnte die Lsg. nicht mit der ursprünglichen Schulze'schen Apparatur (vgl. LIEBIGS *Ann.* **271**. 46 [1892]) eingedampft werden. Die App. wurde in einer Weise, die an anderer Stelle eingehend beschrieben werden soll, abgeändert, so daß 3 l Fl. bei 40° in 2 Tagen auf 100 ccm eingeeengt werden können. Der nun aufgetretene Farbstoff wurde mit Tannin-Casein befreit, Mg durch HF , die organ. Säuren nach Zusatz von CuF_2 durch Dialyse in eine Kollodiumhülle mit semipermeabler Membran von $Cu_2Fe(CN)_6$ gegen mit feinem MgO dauernd schwach bas. gehaltene Lsg. von 400 g krystallisiertem Natriumcyanid in 700 ccm W., der noch 50 ccm 25%ig. $K_4Fe(CN)_6$ -Lsg. zugefügt waren. Reagen auf Ketosen u. Dioxyceton fielen positiv aus, auf Aldosen negativ. Es wurden 2 Osazone, $C_{15}H_{16}ON_4$ u. $C_{17}H_{20}O_3N_4$, isoliert. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. **57**. 14. 1924. Hamburg, Univ.)

SPIEGEL.

A. Muller und **E. Peytral**, *Über die schnelle pyrogene Zersetzung des Ameisensäuremethylesters und über das Prinzip der geringsten Änderung des Moleküls*. Bei 1000 mm Pt-Rohr bei ca. 1150° (vgl. PEYTRAL, Bull. Soc. Chim. de France [4] **35**. 1924. II. 2018) gibt Ameisensäuremethylester hauptsächlich CH_2O , CO u. H_2 . Die Best. der Mengen dieser Prodd. bei Variation der Geschwindigkeit, mit der Dämpfe das Rohr passieren, ergibt unter Anwendung der Theorie von L. R. (C. r. d. l'Acad. des sciences **169**. 793; C. **1920**. I. 445), daß CO u. H_2 sekundären Zers. eines Teiles der CH_2O -Moll. entstammen. Das erste Spaltprodukt ist Methanal, die Zers. erfolgt also gemäß dem Prinzip der geringsten Änderung vgl. MULLER, Bull. Soc. Chim. Paris **45**. 440 [1886]. (C. r. d. l'Acad. des sciences **179**. 831—32. 1924.)

SPIEGEL.


Wald C. Stephens, *Die Darstellung von Cyanessigester (Äthylcyanacetat)*. Es wurden die günstigsten Bedingungen für die B. von Cyanessigester nach der Reihenfolge a) Trichloräthylen $\rightarrow$ b) Dichlorvinyläther $\rightarrow$ c) Chloroessigester $\rightarrow$ Cyanessigester ermittelt. Darst. von Dichlorvinyläthyläther: 83 g a) in 150 ccm A. werden mit kleinen Mengen von 11,5 g Na in 90 ccm A. versetzt u. die nach Erwärmen auf $65-75^\circ$ u. Rühren eingeleitet (die Temp. während der Verf. 70° nicht weit überschreiten); nachdem alles C_2H_5ONa zugegeben ist, 1 Stde. auf dem Wasserbad gekocht, u. die Reaktionslsg. in W. gegossen. Der abscheidende Dichlorvinyläther hat nach Trocknen über $CaCl_2$ Kp. 122° . (Ausbeute 81% auf ungesetztes Trichloräthylen bezogen.) — Darst. von Cyanessigester nach dem Verf. von IMBERT (D. R. P. 212 592) aus 75 g des vorigen in 100 ccm absol. A. + Spur $AlCl_3$ (Ausbeute 88,7%). — Darst. von Cyanessigester: Trennung des Chloresters von A. nur unvollkommen gelingt, wird die Reaktionslsg. weiter verarbeitet. Aus 41 g c) + 19 g 94%ig. NaCN in 100 ccm absol. A. wurde durch 2-std. Kochen 30% Cyanessigester erhalten. A. unter vermindertem Druck entfernt u. der Rückstand in W. gegossen; nach Abdestillieren des Cyanesters wird die wss. Schicht mit Ä. extrahiert u. die äth. Lsg. mit A. Ester vereinigt. Kp. $95-102^\circ$. Nebenbei bilden sich reichlich sekundäre Zersprodd. (Azulmsäure). Der Vers. die B. dieser Nebenprodd. auszuschalten durch Anwendung von Natriumsilber- oder Kupfercyanid, $Hg(CN)_2$ u. $Pb(CN)_2$ anstatt von NaCN hatte negative Ergebnisse. In 51%ig. Ausbeute (bezogen auf c)

V. I.

wurde der Cyanester erhalten, wenn $\frac{2}{3}$ Mol. NaCN in 100 ccm A. 90 Min. gekocht wurden. Eine 61%ig. Ausbeute wurde erreicht, wenn bei diesem Vers. NaCN allmählich in kleinen Portionen zugegeben wurde. Umsetzung von Bromessigsäure mit NaCN führte zu keiner besseren Ausbeute. Ein weiterer Vers., bei dem 42 g c) in 70 ccm A. + 20 ccm W. + 8,5 g NaCN (die Hälfte des theoretisch erforderlichen) zur Rk. gebracht wurden, gab 66% Ausbeute bezogen auf NaCN, 47% Ausbeute bezogen auf Chloressigester. Die Verb. kann auch dargestellt werden durch Einw. von KCN auf chloressigsäures K u. Verestern der resultierenden Cyanessigsäure. Da die Isolierung der letzteren schwierig ist, wird die Lsg. direkt verestert. Die Ansicht von PHEPS u. TILLOTSEN (Amer. Jour. Science, SILLIMAN 26. 243 [1908]), daß HCl im Gegensatz zu H_2SO_4 als Katalysator bei der Veresterung ungeeignet ist, da sich mit HCl Malonester bildet, läßt sich nicht aufrecht halten, da nach den Unterss. des Vf. unter geeigneten Bedingungen sehr wenig Malonester gebildet wird. Vf. erhielt aus 50 g Cyanessigsäure + 20 g HCl in 200 ccm absol. A. (die Rk. war nach 1 Stde. beendet), 44 g (= 65%) Cyanessigester u. 8 g Malonester. Wird zunächst nur 1 g HCl angewandt (in 2 Stdn.), der Inhalt des Kolbens danach im Vakuum dest. u. der Rückstand nochmals mit 200 ccm A. + 1 g HCl 1 Stde. gekocht, so wurden 46 g (= 59%) Cyanessigester u. 8 g Malonester erhalten. Das beste Verf. ist folgendes: 50 g Chloressigsäure werden in cyanessigsäures Na übergeführt; die Lsg. wird eingedampft (zum Schluß kurze Zeit auf 135° erhitzt) u. der Rückstand nach Trocknen mit A. bedeckt; zur besseren Zerteilung wird $\frac{1}{2}$ Stde. auf sd. Wasserbad gelassen, die zur B. von Cyanessigsäure erforderliche Menge + geringer Überschuß HCl zugegeben u. nach 12-std. Stehen auf dem Wasserbad erhitzt, um die Veresterung herbeizuführen. (Journ. Soc. Chem. Ind. 43. T. 313—14. 327—28. 1924. Duddington, Neu-Seeland, Univ.)

HABERLAND.


A. Dewael und A. Weckering, Über die primären β - und γ -Methylhexanol. Primäres β -Methylhexanol (VI) wurde nach folgendem Schema synthetisiert:



Äthylester der Amylmalonsäure (III) aus II + Na-Malonester; ölige, schwach äth. riechende Fl., unl. in W., l. in A. u. Ä., K_p_{757} 244—246°, D_{20}^{20} 0,9713, n_D^{20} 1,426. — Amylmalonsäure (IV), weiß, F. 88—89°, l. in W., A., Ä., Bzl. Wird unter Erhitzen auf 120° gespalten in CO_2 u. β -Methylcapronsäure (V), schwer bewegliche Fl., l. in A. u. Ä., wl. in W., K_p_{755} 212—213°, D_{20}^{20} 0,9187, n_D^{20} 1,4222; Äthylester, fruchtartig riechende Fl., K_p_{756} 176—177°, D_{20}^{20} 0,8679, n_D^{20} 1,411; unl. in W., l. in A. u. Ä.; Säurechlorid zers. sich an feuchter Luft, K_p_{751} 163—164°, D_{20}^{20} 0,967; Säureamid, F. 97°, wl. in W., l. in A. u. Ä.; Nitril, bewegliche Fl., K_p_{749} 171—172°, unl. in W., l. in A. u. Ä.; D_{20}^{20} 0,8109, n_D^{20} 1,4143, geht unter Red. mittels Na + A. über in β -Methylhexylamin, farblose Fl. mit ammoniakal. Geruch, wl. in W., K_p_{756} 148—149°, D_{20}^{20} 0,7787, n_D^{20} 1,4257; Oxamid, F. 90 bis 92°, Phenylsulfocarbamilid, F. 42—43°. — Primäres β -Methylhexanol (VI), entsteht durch Hydrierung des Äthylesters von V; wenig bewegliche Fl., riechnach bitteren Mandeln, wl. in W., ll. in A. u. Ä., K_p_{754} 168—169°, D_{20}^{20} 0,8258, n_D^{20} 1,4245; Naphthylurethan, F. 45—47°; Acetat, fruchtartig riechende Fl., K_p_{751} 181—182°.

bei 184°, D.₄²⁰ 0,8743, n_D²⁰ = 1,4156. — β -Methylhexanylechlorid, Kp.₇₅₅ 150—152°, D.₄²⁰ 0,8766, n_D²⁰ = 1,4274; Bromid, Kp.₇₅₅ 168—170°. — β -Methylcapronaldehyd, unangenehm riechende Fl., Kp.₇₅₅ 142—143°, D.₄²⁰ 0,8203, n_D²⁰ = 1,4122; Semicarbazid, F. 108—109°.



Primäres γ -Methylhexanol (XIII) wurde über folgende Verbb. synthetisiert:



2-Methylbutanol-1 (IX), Darst. nach FREUNDLER u. DAMOND (Bull. Soc. Chim. Paris [3] 35. 110) aus der Mg-Verb. von VIII + CH₃O. Bei dieser Rk. werden durch Fraktionieren noch zwei Nebenprodd. erhalten. Bei Kp. 110° nach Behandlung dieser Fraktion mit konz. H₂SO₄ 3,4-Dimethylhexan, C₈H₁₈, entstanden aus ol. VIII, Kp. 117°, D.₄²⁰ 0,7183, n_D²⁰ = 1,4016, u., wie schon FREUNDLER u. DAMOND fanden, Diamylmethylal, dicke Fl., D.₄²⁰ 0,8422, n_D²⁰ = 1,4133, Kp.₇₅₅ 209—210°, beim Kochen mit CH₃OH + wenig HCl übergehend in Methylal. Äthyl-ester der Amylmalonsäure (XI), durch 3-tägiges Kochen von X mit Na-Malonsäure; farblose Fl., ll. in W., Kp.₇₆₁ 250°, D.₄²⁰ 0,9757, n_D²⁰ = 1,42059. — Amylmalonsäure aus Ä. perlmutterglänzende Blättchen, F. 78°. Bei der Darst. von X geht in geringer Menge auch der Äthylester der Diamylmalonsäure, unl. in W., Kp.₇₆₁ 292°, D.₄²⁰ 0,9426; sehr schwer verseifbar; die entsprechende freie Säure konnte als sirupartige M. erhalten werden. — γ -Methylcapronsäure (XII), Kp.₇₅₄ 217—218°, D.₄²⁰ 0,9194, n_D²⁰ = 1,4211, wl. in W., Geruch buttersäureähnlich, wird bei -80° in eine glasartige M. verwandelt; Äthylester, unl. in W., Kp.₇₅₀ 183°, D.₄²⁰ 0,8708, n_D²⁰ = 1,40514; Säurechlorid raucht an der Luft, Kp.₇₆₇ 167—168°, D.₄²⁰ 0,9677; Säureamid, weiße Nadeln, F. 98°, wl. in W.; Anilid, aus wss. A. in W., F. 76,5°; Nitril, unangenehm riechende Fl., Kp.₇₄₀ 180°, D.₄²⁰ 0,8141, n_D²⁰ = 1,4036, unl. in W. — γ -Methylhexylamin, mit Wasserdampf flüchtige Fl., Kp.₇₅₀ 152—153°, D.₄²⁰ 0,7802, n_D²⁰ = 1,42383; geht an Luft unter Absorption von CO₂ in feste, weiße Verb. über; Oxamid, Nadeln, F. 73,5°; Phenylsulfocarbanilid, aus A. mit Lg. gefällt krystallin. M., F. 81°; Naphthylcarbamid, aus A. mit W. gefällt, F. 0°, wl. in organ. Mitteln. — γ -Methylhexanol (XIII), amylalkoholartig riechende Fl., wl. in W., Kp.₇₆₁ 173°, D.₄²⁰ 0,8239, n_D²⁰ = 1,4219; Essigester, Kp.₇₅₇ 190°, D.₄²⁰ 0,8740, n_D²⁰ = 1,4186, unl. in W. Naphthylurethan von XIII, F. 50°. (Bull. Chim. Belgique 33. 495—504. 1924. Louvain, Univ.)

HABERLAND.

A. Dewael, Über eine anomale Reaktion des Propylenchlorhydrins, CH₂OH·CH₂CH₂Cl. Durch Einw. von KCN auf das Chlorhydrin in 80%ig. A. in Ggw. von wenig NaJ wurde statt des erwarteten α -Methyl- β -oxypropionitrils das Nitril β -Oxy-n-buttersäure (I) erhalten; als Nebenprodd. wird ein Gemisch der beiden Nitrile isoliert. Kp. des Oxybutyronitrils 214—215°, D.₂₀²⁰ 0,9938. Die Konst.



der Verb. wurde bestätigt durch Überführen in β -Chlor-n-butyronitril, Kp.₇₆₂ 174—175°, D.₂₀²⁰ 1,078, das durch Erhitzen mit konz. KOH in Crotonsäure übergeführt

wurde. Dehydratation von **I** mittels P_2O_5 gibt ein Gemisch der *Crotonitrile*. erklärt die B. von **I** nach vorstehendem Schema infolge von Hydrolyse des C — Wird **I** mit konz. NaOH behandelt, so scheidet sich die Na-Verb. **II** ab bildet sich auch durch Einw. von C_2H_5ONa . Durch Einw. von C_2H_5J auf **II**, β -Äthoxybutyronitril erhalten. (Bull. Soc. Chim. Belgique **33**. 504—7. 1924. Lov Univ.)

HABERLAND

S. G. Powell, *Die Kondensation von normal-Butyraldehyd mit Methyläthyl- Die in Ggw. von festem oder alkoh. KOH ausgeführte Kondensation gibt 4, 3-methyl-2-heptanon (I); infolge teilweiser Dehydratation des Aldols entsteh ungesätt. Keton (II) in kleiner Menge als Nebenprod.; es bildet bei der Hydrierun eine Verb. die auch durch Hydrolyse von *n*-Butylmethylacetessigester erhalten i was gleichzeitig als Beweis für die Konst. von **I** angesehen werden kann. **I** $C_3H_7CHOH \cdot CH(CH_3) \cdot COCH_3$ **II** $C_3H_7CH : C(CH_3)COCH_3$ **III** $C_4H_9CH(CH_3)C$*

Versuche. 4-Oxy-3-methyl-2-heptanon, $C_8H_{16}O_2$ (**I**), Darst. durch Zutreff lassen von 72 g *n*-Butyraldehyd zu 220 g Methyläthylketon + 50 ccm n. alkohol), danach wird etwas mehr als die berechnete Menge Weinsäure zugegebu K-Tartrat entfernt; nach Abdest. des überschüssigen Ketons wird der Rückst fraktioniert; es geht zunächst bei Kp_{20} 85° kleine Menge **II** über, dan l Kp_{16} 110° **I** als konsistente Fl., $n_D^{20} = 1,442$, D_{20}^{20} 0,9238. — 3-Methyl- Δ^3 -he tenon (*n*. Butylidenmethyläthylketon), $C_8H_{14}O$ (**II**), Darst. am besten aus **I** + er Jod durch Dest. bei 170—175°; bewegl. Fl. von anfangs angenehmem später id lichem Geruch, Kp_{15} 68—69°, $n_D^{10} = 1,451$, D_{10}^{10} 0,8613; Semicarbazon, $C_9H_{11}N$ aus verd. A. F. 164°; Oxim, $C_8H_{15}ON$, ölig, Kp_{20} 119—120°. — 3-Methyl-2-hep $C_8H_{16}O$ (**III**), durch Überleiten der Dämpfe von **II** + H_2 über auf 180° erlzt Ni; bewegliche fruchtartig riechende Fl., Kp_{760} 162°, $n_D^{20} = 1,415$, D_{20}^{20} 0,917 Semicarbazon, $C_9H_{19}ON_3$, aus CH_3OH Tafeln, F. 82°. — 3-Methyl-2-heptanol, $C_8H_{18}O$ aus vorigem in Ä. + $NaHCO_3$ -Lsg. durch Red. mittels Na; farblose Fl.; Kp_{15} bis 173°, $n_D^{13} = 1,436$, D_{13}^{13} 0,8272; wird auch durch Red. von **II** erhte Acetat, $C_{10}H_{20}O_2$, angenehm riechendes Öl, Kp_{15} 185°, $n_D^{21} = 1,418$, D_{21}^{21} 0,854 Bei der Red. von **II** mit Na in Ä. + $NaHCO_3$ entsteht die Verb. ebenfal d neben noch ein nicht näher untersuchtes Prod. mit Kp_{27} 168—175°, $n_D^{15} = 1,415$, D_{15}^{15} 0,9185. — Äthylester der *n*-Butylmethylacetessigsäure, $C_{11}H_{22}O_3 = C_4H_9(C_2H_5)(COCH_3)COOC_2H_5$, durch Methylieren von Na-*n*-Butylacetessigester; angeh riechende Fl., Kp_{10} 120—121°, $n_D^{20} = 1,4320$, D_{20}^{20} 0,9460. (Journ. Americ. Soc. **46**. 2514—17. 1924. Seattle [Wash.], Univ.)

HABERLAND

Lauder W. Jones und **Donald H. Powers**, *Untersuchung einiger eu Hydroxamsäuren von Oxy- und Alkoxyfettsäuren*. (Vgl. JONES u. HURD, Journ. Americ. Chem. Soc. **43**. 2422; C. 1922. III. 509.) Das K-Salz des Benzoyste der Oxyacethydroxamsäure (**I**) wird beim Kochen mit i - $C_6H_{11}OH$ nicht nach 1 zu umgelagert, sondern als Reaktionsprodd. werden Formaldehyd u. *i*-Amylallophan isoliert. Durch sd. A. wird **I** nicht verändert; werden beide jedoch 4 Std auf 120° erhitzt, so entstehen CH_2O , C_6H_5COOK in Äthylallophanat. Mit sd. l. e leidet **I** keine Umlagerung sondern nur Hydrolyse nach Gleichung 2. Di En stehung der Allophanate kann man sich erklären, wenn man Oxymethyliso an als Additionsprod. von CH_2O u. $HNCO$ ansieht, das nach 3. zerfällt; die Endod der Rk. entstehen durch Einw. der Alkohole auf diese Dissoziationsprodd. V haben, da Hydroxamsäuren u. Säureazide ein ähnliches Verh. bei der Umlagr zeigen, die Einw. von A. auf Oxyacetazid, CH_2OHCON_3 , untersucht, das nac de Unterr. von CURTIUS u. HEIDENREICH (Journ. f. prakt. Ch. **52**. 225 [1895]) N-Oxymethylurethan bei dieser Rk. bilden sollte, es wurde jedoch statt dessen Äthall phanat erhalten, eine Verb., die fast denselben F. hatte wie die von CURTIUS u. HEIDENREICH als N-Oxymethylurethan bezeichnete Verb.; dieser Befund, sow d

enschaften des von EINHORN u. BAMBERGER (LIEBIGS Ann. **361**. 130 [1908])
gestellten *N*-Oxymethylurethans deuten darauf hin, daß die von CURTIUS u.
FENREICH erhaltene Verb. ebenfalls Äthylallophanat war. Statt der von
CURTIUS u. MÜLLER (Ber. Dtsch. Chem. Ges. **34**. 2794 [1901]) für die Umlagerung
Säureaziden gegebenen Erklärung, wonach Säureazide mit einer CHOH-Gruppe
Allophanester, die mit einer CH₂OH-Gruppe Oxyurethane geben sollen, haben Vff.
Grund der geschilderten Ergebnisse vorliegender Arbeit u. der Ergebnisse von
CURTIUS u. MÜLLER folgende Hypothese über den Verlauf der Umlagerung auf-
stellt: jede Substanz (Bromamide, Hydroxamsäuren, Säureazide etc.) die eine
OH-Gruppe in α -Stellung hat, gibt bei der Umlagerung einen Aldehyd oder ein
Nitril u. Cyansäure. Findet die Umlagerung in wss. Lsg. statt, so zerfällt HNC(O)
in CO₂ u. NH₃, während in A. Allophanester gebildet wird. Auf das Fehlen einer
OH-Gruppe in *Hydracrylazid*, CH₂OHCH₂CON₃, würde es zurück-
zuführen sein, daß diese Verb. keinen Allophanester gibt. — Die K-Salze der
Ester von *Methoxy- u. Äthoxyacethydroxamsäure* sollten sich in Ggw. von W.
in 4a—c. umlagern; es ergab sich jedoch, nachdem die trocknen K-Salze beim
Erhitzen auf 115—120° C₆H₅COOK u. die *Isocyanate* ROCH₂NCO lieferten, daß die
Hydrolyse aus diesen Isocyanaten entstehenden Amine ROCH₂NH₂ un-
verändert sind u. sofort nach 5a. u. b. zerfallen. — Um eventuell *Methoxymethyl-*
urethane darzustellen, wurde *N*-Methoxymethylphthalimid, C₆H₄(CO₂)₂NCH₂OCH₃,
hydrolysiert, es entstanden jedoch die Zerfallsprodd. nach 5a. u. b. Ebenso wenig
gelingt die Darst. des Chlorhydrats desamins durch Einw. von Chlormethylmethyl-
amin auf NH₃ in Ä. — Das K-Salz des *Benzoyl-ester der β -Methoxypropionhydr-*
säure lagerte sich mit sd. W. nicht zu dem nach 4a—c. zu erwartenden s.
äthyläther um, sondern es entstand *β -Methoxyäthylisocyanat*, eine Verb.,
die auch synthet. durch Erhitzen von AgNCO u. Methoxyäthyljodid erhielten.

1a. I HOCH₂CON^K_{OCOC₆H₅} $\rightarrow$ C₆H₅COOK + HOCH₂N:C:O
ROCH₂NCO + HOR $\rightarrow$ CH₂(OH)NHCOOR 3. CH₂OHN:CO $\rightarrow$ H₂CO + HNC(O)
CH₂(OH)CON(K)OCOC₆H₅ + HOH $\rightarrow$ CH₂(OH)·CON(H)OCOC₆H₅ + KOH
4a. ROCH₂CON(K)OCOC₆H₅ $\rightarrow$ C₆H₅COOK + ROCH₂NCO
4b. ROCH₂NCO + H₂O $\rightarrow$ ROCH₂NH₂ + CO₂
4c. ROCH₂NCO + ROCH₂NH₂ $\rightarrow$ (ROCH₂NH)₂CO
ROCH₂NH₂ $\rightarrow$ ROH + CH₂:NH 5b. CH₂:NH + H₂O $\rightarrow$ HCHO + NH₃
Versuche. *Oxyacethydroxamsäure*, HOCH₂·CONHOH, Darst. durch Ver-
einenlassen einer Lsg. von Äthylglykolat + NH₂OH in A.; Nadeln, F. 85°, ll.
in Ä., unl. in Ä., Essigester, Bzl. u. Lg. — *Benzoyl-ester* aus Essigester + Lg.
in Ä., F. 40°, l. in A., Aceton u. Bzl., unl. in W. u. Ä. — K-Salz des Benzoylesters (I),
F. 100°, l. beim Eintauchen in auf 125° vorgewärmtes Bad; Ag-Salz, C₆H₅O₄Ag,
— *Acetyl-ester der Oxyacethydroxamsäure*, aus h. Bzl. Nadeln, F. 64,5°, l. in
Ä., A., Chlf., Essigester u. W., unl. in Lg. u. Ä.; K-Salz, C₄H₉O₄NK, Ag-Salz,
C₄H₉O₄Ag. — *Methoxyacethydroxamsäure*, CH₃OCH₂CONHOH, aus Essigester +
Lg. in Ä., F. 85,5°, l. in Aceton, Chlf. u. W., unl. in Ä. — *Benzoyl-ester* aus w. Essig-
ester, F. 84,5°, unl. in W. u. Ä., sonst l. in organ. Mitteln; K-Salz des Esters,
C₆H₅O₄NK; Ag-Salz, C₁₀H₁₀O₄Ag, wird beim Erwärmen allmählich dunkel u.
zerfällt bei ca. 100°. — *Acetyl-ester*, CH₃OCH₂CONHOCOCH₃, aus w. Bzl., F. 82°,
l. in Ä. u. Lg.; K-Salz, C₅H₉O₄NK, zerfällt beim Erhitzen in sd. Wasserbad in
die Verb. u. C₆H₅COOK; Ag-Salz, C₅H₉O₄Ag, weiß. — *Methoxymethyliso-*
cyanat, C₃H₅O₂N, synth. dargestellt durch Zugabe von 44 g AgNCO zu 25 g Chlor-
methyläther in 100 cem Ä. (Kühlung durch Kältemischung); schweres zu
flüchtiges Öl, Kp. 87,5° (korr.), zerfällt mit W. in CO₂, NH₃, CH₃OH u. CH₂O;
nachträglichem Stehen Polymerisation zu weißer, glasartiger M.; in äth. Lsg. mit Di-

methylamin, Anilin oder Methylanilin behandelt entstehen substituierte Harnstoffe mit $C_6H_5NHNH_2$ ein krystallin. Semicarbazid. — *Äthoxyacetylhydroxamsäure*, $C_2H_5OCH_2CONHOH$, Reinigung über das Cu-Salz; aus CH_3OH F. $74-76^\circ$, e. längerem Stehen weich werdend. Die Säure entsteht auch durch Einw. von NH_2OH auf Äthoxyacetylchlorid in Bzl.; *Benzoyl ester*, aus A. + W. F. 156° , li. in Aceton, Bzl., Essigester, unl. in Lg. u. W.; K-Salz des Esters, $C_{11}H_{12}O_4NK$, verpufft bei 112° , zerfällt mit sd. W. in CO_2 , NH_3 , CH_2O , A. u. C_6H_5COOK . — *Acetyl ester*, aus Bzl. Nadeln, F. 84° , l. in A., Aceton, Essigester u. W., wl. in Lg.; K-Salz des Esters, $C_6H_{10}O_4NK$. — *Äthoxymethylisocyanat*, $C_4H_7O_2N$, Kp. 106° , reizt zu Tränen, zerfällt mit W. in CO_2 , NH_3 , CH_2O u. A., Verh. gegen Anilin etc. wie die Methoxyverb. — *β-Methoxypropionhydroxamsäure*, $CH_3OC_2H_4CONHOH$, aus dem Methylester der β-Methoxypropionsäure in A. + NH_3 , Reinigung über Cu-Salz; aus A. F. $93-95^\circ$, ll. in W., wl. in Essigester, Ä., u. Lg. — *β-Methoxypropionsäuremethylester*: Darst.: zu einer w. Lsg. von 11 g. Na in 150 cem CH_3OH läßt man allmählich 60 g β-Chlorpropionsäuremethylester tropfen u. kocht danach 1 Stde.; nach 12-std. Stehen wird die alkoh. Lsg. mit 0.5 g. $NaOH$ behandelt; Kp.₇₆₀ $144-145^\circ$. — *β-Methoxypropionsäure* aus β-Chlorpropionsäuremethylester + CH_3ONa ; Kp.₃₀ 126° . — *β-Methoxypropionylchlorid* aus voriger + $SOCl_2$ bei 100° ; Kp.₇₅₈ $135-136^\circ$. — *Benzoyl ester* der β-Methoxypropionhydroxamsäure, aus CH_3OH + W. F. 148° , l. in Aceton, A., Essigester in Bzl.; K-Salz, $C_{11}H_{12}O_4NK$, verpufft bei 110° , mit sd. W. entsteht β-Methoxyäthylisocyanat. — *Acetyl ester*, $C_6H_{11}O_4N$, u. w. Bzl. Nadeln, F. 86° , unl. in Ä. u. Lg., sonst l. in organ. Mitteln; K-Salz, $C_6H_{10}O_4NK$. — *Methoxyäthylchlorid*: 80 g Äthylenchlorhydrin + 126 g $(CH_3O)_2Pb$ werden unter Vorlage eines Kühlers allmählich im Ölbad auf 150° erhitzt; sobald diese Temp. erreicht ist, wird der Inhalt des Destillierkolbens nach Erkalten mit 20%ig. $NaOH$ versetzt [$\frac{1}{2}$ Äquivalent des $(CH_3)_2SO_4$] u. erneut auf 150° erwärmt; das übergegangene Chlorid wird mit 20%ig. $NaOH$ gewaschen u. mit Ä. extrahiert; Kp. 93° ; reagiert selbst bei 140° nicht mit Na oder Zn, wird durch sd. W. nicht angegriffen; mit $AgNCO$ entsteht kein Isocyanat. — *Methoxyäthyljodid*, aus vorigem + NaJ in Aceton suspendiert durch 15-std. Kochen; angenehm riechendes Fl., Kp. $137-138^\circ$; reagiert sehr langsam mit $AgNO_3$, durch Na bei gewöhnlicher Temp. keine Einw. — *Methoxyäthylisocyanat*, $C_4H_7O_2N$, aus vorigem + $AgNCO$ in Ä. bei 148° im Rohr, zu Tränen reizendes Öl, Kp. $123-124^\circ$, reagiert mit KOH sehr langsam. (Journ. Americ. Chem. Soc. **46**. 2518—33. 1924. Princeton [N. J. Univ.])

HABERLAND.

J. Marcusson und G. Wisbar, *Die Zusammensetzung der Lignite.* (Beitrag zur Frage der Kohlebildung.) Bei der Unters. zweier Lignite wurden durch Behandlung mit $NaOH$ unter Druck 9—10% Cellulose isoliert. Aus der alkal. Lsg. wurde eine große Menge Huminstoffe gewonnen. Bei einem pechkohligen Lignit ließ sich der größte Teil erst durch Erhitzung mit 10%ig. $NaOH$ unter Druck auf 200° in Lsg. bringen; von Cellulose waren nur Spuren zugegen. Es handelt sich offenbar um den Übergang von der Braunkohle zur Steinkohle. — Beim Erhitzen von Lignite in hochsd. Mineralöl auf $200-250^\circ$ tritt Abspaltung von CO_2 ein; nach dem Ausdampfen des Öls zeigt die Watte nicht mehr Chlorzinkjodrk., beim Erhitzen mit $NaOH$ entsteht eine braune Lsg., die Huminsäuren enthält. Nach allem stehe man auf dem Standpunkt, daß zur Kohlebildung sowohl Lignin wie Cellulose beigetragen haben. (Ztschr. f. angew. Ch. **37**. 917—18. 1924. Berlin-Dahlem.)

Alfred Schaarschmidt, *Über ein neues Nitrierverfahren mit Hilfe von Isocyanoxiden aus Luft oder Ammoniak.* (I.) Um die Mitwirkg. der konz. Schwefelsäure u. die langwierige Überführung der Stickoxyde aus Luft oder NH_3 in Salpetersäure entbehrlich zu machen, beschreibt Vf. ein Verf., die Stickoxyde direkt zur Herstellung von aromat. Nitro-KW-stoffen zu verwenden. Durch Zusatz von Metallelektrolyten

Cl_3 , FeCl_3) werden die arom. KW-stoffe in einen ungesätt. Zustand gebracht, indem sie sich wie Olefine verhalten u. unter B. von Nitrosaten N_2O_4 glatt reagieren. Die Rk. verläuft unter starker Wärmeentw. Im Gegensatz zu den aus Olefinen gewonnenen Prodd. besitzen diese Additionsprodd. Beständigkeit u. einheitliche Zusammensetzung. Die geringsten Feuchtigkeitsmengen leiten Zers. r. ein. Der neugebildete Komplex besteht aus AlCl_3 , N_2O_4 u. Bzl. u. ist gesätt.; gelingt nicht, eine zweite N_2O_4 -Gruppe anzulagern, ebensowenig wirken Cl u. Br. Die günstigsten Ausbeuten (an Nitrochlorbenzol aus Chlorbenzol) sind bei Zusammenwirken von $\frac{2}{3}$ Mol. AlCl_3 u. 1 Mol. N_2O_4 (Ausbeute 151 g, Mol.-Gew. 157); 1 Komplex hat demnach die Zus. 2AlCl_3 , $3\text{C}_6\text{H}_5$, $3\text{N}_2\text{O}_4$. Die Ausbeuten an p-Verb. verhalten sich wie 23 : 77 u. werden durch die Temp. wenig beeinflusst. Durch W. wird das Metallchlorid aus dem Komplex abgespalten unter Zers. der unbeständigen Additionsverb. von Dihydrobenzol mit N_2O_4 , die sich in Nitrobenzol u. salpetrige Säure zers. Das aus letzterer gewinnbare NO kann von neuem im Prozeß zugeführt werden.


Versuche: Mit **Fritz Telleis**. Die Ausbeuten bei der Einw. verschiedener Mengenverhältnisse von AlCl_3 : N_2O_4 auf Chlorbenzol betrugen bei: $\frac{1}{10}$ Mol. : 1 Mol. 2 g Nitrochlorbenzol, $\frac{1}{2}$: 1 Mol. 110 g, $\frac{2}{3}$: 1 Mol. 151 g, 1 : 1 Mol. 154 g, $\frac{1}{2}$ Mol. 74 g, $\frac{2}{3}$: 2 Mol. 148 g (nur 1 Mol. N_2O_4 an der Rk. beteiligt). Bei 0 bis -25° war das Verhältnis o- : p-Nitrochlorbenzol 20 : 80, bei $+10$ bis $+15^\circ$ 2 : 78, bei 18° 24 : 76, bei $20-23^\circ$ 25 : 75. — Nitrobenzol, aus 200 g Bzl., 90 g AlCl_3 u. 92 g N_2O_4 bei $10-15^\circ$, Ausbeute: 118 g. — Nitrobrombenzol, aus Brombenzol, bei $0-10^\circ$, o- : p-Verb. = 6 : 94. — Cl wirkt auf den Komplex nicht ein; beim Einleiten desselben in die Reaktionsmischung wurde keine Gewichtszunahme beobachtet. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 57. 2065 — 72. 1924. Berlin, Techn. Hochschule.)

ZANDER.

Edmund Brydges Rudhall Prideaux und **Glencoe Ronald Nunn**, Die colorimetrischen Dissoziationskonstanten des Mono- und des Dinitrohydrochinons. Die Absorptionsspektren von Mononitrohydrochinon, dargestellt nach ELBS (Journ. f. prakt. Ch. [2] 48. 179 [1893]) u. von 2,6-Dinitrohydrochinon, dargestellt nach KEHR (Ann. 491. 1. 1. 1902) u. KLOPFENSTEIN (Helv. chim. Acta 6. 952; C. 1924. I. 477) wurden im Spektroskopkomparator von British Drug Houses, teils in Nebelgläsern bei verschiedenem Wärmegrad untersucht. Beide Verbb. sind in saurer Lsg. gelb, gehen mit wachsendem Wärmegrad über orange in violett über. Die colorimetr. Konstanten p_{K_1} (ganz gelb), p_{K_2} (halb orange) u. p_{K_3} (halb violett) sind für die Mononitroverb. 3,25, 7,2 u. 10,2, für die Dinitroverb. 2,8, 5,2 u. 9,05. (Journ. Chem. Soc. London 125. 2110—16. 1924. Nottingham, Univ.)

HERTER.

Rolla N. Harger, Additionsverbindungen von Hydrochinon mit aliphatischen Aminen. Die aus Hydrochinon u. Äthyl-, Dimethyl-, Diäthyl- u. Benzylamin gebildeten Additionsprodd. haben entweder Konst. I oder II oder die Zus. $2\text{C}_6\text{H}_4(\text{OH})_2$, RR' (R = Alkyl, R' = Alkyl oder H); die Konst. dieser letzteren Verbb. ist noch nicht aufgeklärt. Die neuen Verbb. sind nicht sehr beständig; beim Aufheizen in verschlossenem Gefäß macht sich bald Amingeruch bemerkbar; in festem Zustand werden sie durch Luft nicht oxydiert, dagegen tritt in wss. oder alkoh. Lsg. rasche Oxydation ein; wss. Lsgg. reagieren infolge teilweiser Dissoziation der Verbb. alkal. — Allylamin, i-Butylamin, sek. Butylamin u. Amylamin reagieren mit Hydrochinon unter beträchtlicher Entw. von Wärme, die entstehenden Krystalle, die nicht weiter untersucht wurden, sind anscheinend eben-




falls Doppelverb. — *Mono-* u. *Dichlorhydrochinon* scheinen mit aliph. Amin gleichfalls Additionsprodd. zu geben.

Versuche. Verb. $C_{16}H_{23}O_4N = [C_6H_4(OH)_2](C_2H_5)_2NH$, aus 1 Mol. Hydrochinon + 2 Mol. $NH(C_2H_5)_2$ in Ä. (Eiskühlung); durchsichtige Prismen, F. 134° in W., A. u. Ä., wl. in Bzl. u. Lg.; beim Umkrystallisieren aus sd. Toluol tt Verlust an Amin ein; wss. Lsg. wird an Luft rötlich, schließlich braun; äth. benzol. Lsgg. werden nicht oder nur wenig oxydiert. — Verb. $C_8H_{13}O_2N$ $C_6H_4(OH)_2 \cdot (CH_3)_2NH$, aus 1 Mol. Hydrochinon + 3,4 Mol. $NH(CH_3)_2$; aus Ä. F. 111° in W., A. u. Aceton, wl. in Bzl. u. PAe.; beim Stehen werden die Krystalle allmählich undurchsichtig. — Verb. $C_8H_{13}O_2N = C_6H_4(OH)_2 \cdot C_2H_5NH_2$, aus 1 Mol. Hydrochinon + 4,1 Mol. $C_2H_5NH_2$; aus Ä. F. 87–90°; durch 24-std. Stehen in alkoh. Lsg. entsteht *Bisäthylaminochinon*, F. 190°, rote Tafeln. — Verb. $C_{20}H_{24}O_4N_2 = C_6H_4(OH)_2[C_6H_5CH_2NH_2]_2$, aus 1 Mol. Hydrochinon + 1,5 Mol. $C_6H_5CH_2NH_2$, aus sd. Ä. durch Abkühlen auf –18° Nadeln, F. 71°. (Journ. Americ. Chem. Soc. 46. 2536–39. 1924.)

HABERLAND

Rolla N. Harger, *Die Oxydation von Hydrochinon in Gegenwart aliphatischer Amine. Bildung von Bisalkylaminochinonen*. (Vgl. vorst. Ref. u. Proc. Natl. Acad. Sc. Washington 8. 57; C. 1922. III. 355.) Hydrochinon in wss. oder alkoh. Lsgg. primärer oder sekundärer Amine wird durch Luft oder O_2 zu den entsprechenden Bisalkylaminochinonen oxydiert. Die Verb. sind teilweise schon früher von MYLIUS (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 18. 467 [1885]) u. KEHRMANN (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 23. 906 [1890]) dargestellt worden. Der Mechanismus der Oxydation ist jedoch noch nicht klar. Die nach der Gleichung:



erforderliche O_2 -Menge wird nach Verss. des Vf. oft um mehr als das Doppelte überschritten. Zu welcher Nebenoxydation dieser O_2 verbraucht wird, hat bisher nicht festgestellt werden können. Die auf Grund der Befunde von MANCINI (LIEBIGS Ann. 314. 177 [1900]), daß Hydrochinon in alkal. Lsg. Chinon u. H_2O_2 bildet, zu erwartende Anwesenheit von H_2O_2 im Reaktionsgemisch ließ sich nicht bestätigen. H_2O_2 oxydiert Hydrochinon-Amin-Gemische auch zu Bisalkylaminochinonen; eine Oxydation von A. oder Amin, oder weitere Oxydation der Bisalkylaminochinone kommt, wie besondere Verss. ergeben haben, gleichfalls nicht in Frage. Die erste Phase der Rk. besteht wahrscheinlich in B. von Doppelverb. des Hydrochinons mit Amin, die dann oxydiert werden. In einigen Fällen tritt dem Oxydationsgemisch Isonitrilgeruch auf. — Tertiäre Amine u. Hydrochinone bilden bei der Oxydation anscheinend keine Aminochinone.

Versuche. *Bismethylaminochinon*, $C_8H_{10}O_2N_2$, aus 25 g Hydrochinon + 200 cm wss. 6-n. CH_3NH_2 in O_2 -Atmosphäre; aus h. W., A. oder Eg. rote Tafeln, F. 200° (korr.); bei 25° ist 1 Teil l. in 70 Teilen Eg., 1700 Teilen A. oder 9000 Teilen in der Wärme leichter l.; wl. in Chlf. u. Bzl., unl. in Ä., Lg., CCl_4 u. CS_2 , ll. in C_6H_5OH ; beim Kochen mit Zn + HCl wird die Lsg. farblos, hieraus erhält man farblose Tafeln, die an Luft schnell zur ursprünglichen roten Verb. oxydiert werden. — *Bisdimethylaminochinon*, $C_{10}H_{14}O_2N_2$, aus W. rote Nadeln, F. 171° (korr.). Wird ein Gemisch von Hydrochinon, Mono- u. Dimethylamin oxydiert, so scheidet sich Bismethylaminochinon zuerst aus. — *Bisäthylaminochinon*, $C_{10}H_{14}O_2N_2$, durch Oxydation des Hydrochinon- $C_2H_5NH_2$ -Gemisches oder der Additionsverb. $C_6H_4(OH)_2 \cdot C_2H_5NH_2$ darstellbar; aus A. rote Tafeln, F. 212°, ll. in Eg. u. A., wl. in Essigester u. h. W., swl. in k. W., Ä. u. Toluol. — *Bisisobutylaminochinon*, $C_{14}H_{22}O_2N_2$, aus A. rote Tafeln, F. 196°, unl. in W., wl. in Ä., ll. in Eg. Während der Oxydation tritt deutlicher Isonitrilgeruch auf. — *Bis-sek. Butylaminochinon*, $C_{14}H_{22}O_2N_2$, aus A. dunkle Nadeln, F. 160°, l. in A., Eg. u. h. Toluol, wl. in Ä. u. Essigester, unl. in W. — *Bisamylaminochinon*, $C_{18}H_{26}O_2N_2$, aus A. purpurrote, flache Krystalle

70°; aus dem Filtrat wurden dunkelbraune Krystalle erhalten, unl. in W., l. in A. ll. in Ä. — *Bisallylaminochinon*, $C_{12}H_{14}O_2N_2$, aus A. rote Krystalle, F. 195°; während der Oxydation Isonitrilgeruch, die Lsg. fluoresciert grünlich; Oxydation auch ohne Lösungsm. ein. — *Bisbenzylaminochinon*, $C_{20}H_{18}O_2N_2$, aus A. rote Krystalle, F. 246°, l. in Eg., sonst unl. in organ. Mitteln u. W. — Eine 10-n. NH_4OH -Hydrochinonlsg. absorbiert ebenfalls reichlich O_2 , es entsteht dabei jedoch ein gallertartiges Prod. Mit NaOH statt NH_4OH entstehen nach 14-tägiger Oxydation braune Nadeln unbekannter Konst. u. reichliche schwarze MM. (Journ. Americ. Chem. Soc. **46**. 2540—51. 1924. Indianapolis, Univ.)

HABERLAND.

C. M. Brewster, *Schiffsche Basen aus 3,5-Dibromsalicylaldehyd*. Es entstehen bei der Synthese dieser Verbb. zuerst die tiefer gefärbten Formen (im Gegensatz zu nicht Br-substituiertem Aldehyd), die sich in einigen Fällen in die heller gefärbten überführen lassen. Phototropie wurde, in Übereinstimmung mit den Angaben von SENIER u. GALLAGHER (Journ. Chem. Soc. London **113**. 28 [1918]; Journ. I. 451) bei diesen Deriv. nicht gefunden. — *3,5-Dibromsalicylaldehyd*, $C_7H_5Br_2O$, stellt durch Bromieren in Eg.; helle, gelbgrüne Krystalle, F. 81—82°, Geruch schwach; färben die Haut gelb; ll. in Bzl., Ä., Chlf. u. h. A.; wss. Lsg. gelb; mit Wasserdampf flüchtig; Na-Salz hellgelb. Bei einem Vers. zur Darst. des Bromhydrats in der Wärme entstand eine weiße Verb., Zers. bei 250°, l. in h. $C_6H_5NH_2$, unl. in organ. Mitteln u. wss. NaOH; l. in alkoh. NaOH; Konst. nicht ermittelt. — *3,5-Dibromsalicylidenanilin*, $C_{13}H_9ONBr_2$, aus Eg. orangerote Krystalle; A. A., F. 91°; ll. in organ. Mitteln; unl. in wss. NaOH, beim Kochen Zers.; mit sd. verd. H_2SO_4 keine Veränderung; mit HCl-Gas werden die roten Krystalle gelb; Lsg. in Bzl. gibt auf Zusatz von HCl einen gelben Nd., der beim Eindampfen orange rot wird. — *3,5-Dibromsalicyliden-o-toluidin*, $C_{14}H_{11}ONBr_2$, aus A. orangerote Nadeln oder Nadeln, F. 120—121°; Lsg. in Amylalkohol tief orange, beim Eindampfen entsteht eine rötliche M., die beim Abkühlen heller wird. — *3,5-Dibromsalicyliden-p-toluidin*, $C_{14}H_{11}ONBr_2$, aus A. orangerote Nadeln, F. 130°, wl. in Lg., ll. in organ. Mitteln. — *3',5'-Dibromsalicyliden-1-naphthylamin*, $C_{17}H_{11}ONBr_2$, aus A. hell orangegelbe, undurchsichtige Krystalle, F. 138°, l. in A., Bzl. u. Ä., in Lg.; wird die bei Darst. der Verb. erhaltene Schmelze länger als 10 Min. erhitzt, so entsteht eine grünlich-schwarze M., unl. in W., Säuren u. Alkalien, l. in konz. H_2SO_4 , bei Verd. einen kastanienbraunen Nd. gebend. — *3',5'-Dibromsalicyliden-2-naphthylamin*, $C_{17}H_{11}ONBr_2$, aus alkoh. NaOH durch Ansäuern orangefarbenes Pulver, das bei 168° sintert, F. 171°; ll. in Toluol; wl. in Amyl- u. Butylalkohol; aus diesen Krystalle; unl. in wss. NaOH, beim Erwärmen damit keine Veränderung. — *Bis-3,5-dibromsalicyliden-m-phenyldiamin*, $C_{20}H_{12}O_2N_2Br_4$, aus Nitrobenzol + gleichem Vol. A. lachsfarbene Krystalle, F. 225°, swl. in h. A., in Toluol; unl. in Ä. u. Lg., unl. in k., langsam l. in sd. wss. NaOH; Erhitzen der Verb. gibt eine rote Schmelze, die beim Abkühlen gelb wird; dieses gelbe wird bei erneutem Schmelzen dunkler, beim Abkühlen jedoch wieder gelb. — *Bis-3,5-dibromsalicyliden-p-phenyldiamin*, $C_{20}H_{12}O_2N_2Br_4$, aus $C_6H_5NO_2$ tiefrote Krystalle, F. 310° (Zers.); unl. in A., CCl_4 u. Ä., aus Toluol u. Amylalkohol (worin beim Abkühlen orangefarbene Krystalle; die orangefarbenen Krystalle werden beim wiederholten Umkrystallisieren aus $C_6H_5NO_2$ tiefrot, diese aus h. A., Toluol u. Amylalkohol gelb, F. wie die rote Form. — *Bis-3,5-dibromsalicylidenbenzidin*, $C_{18}H_{10}O_2N_2Br_4$, nach Extrahieren der Schmelze mit A. u. Eg. wird der Rückstand in Nitrobenzol gel.; durch Zugabe von gleichem Vol. A. scharlachroter krystallin. Niederschlag, beim Erhitzen ohne F. gegen 300° dunkelrot werdend; unl. in wss. NaOH, beim Kochen keine Veränderung; l. in alkoh. NaOH, beim Ansäuern hellgelber Niederschlag, der allmählich orangerot wird; Lsg. in H_2SO_4 gelb, beim Verd. roter Nd. — *Bis-3,5-dibromsalicylidentianisidin*, $C_{28}H_{20}O_4N_2Br_4$, aus h. Nitrobenzol + A. kastanien-

braunrote Krystalle, F. 305° (Zers.); wl., bezw. unl. in organ. Mitteln; dure wss. NaOH keine Veränderung; Lsg. in konz. H₂SO₄ orangegelb, durch Eing in W. entsteht ein sherryroter Nd., der allmählich dunkler wird. — 3,5-Di salicyliden-*p*-phenylendiamin, C₁₃H₁₀ON₂Br₂, aus A. orangebraune Krystalle, F. l. in organ. Mitteln außer Lg., l. in wss. NaOH. — 3,5-Dibromsalicyliden-*p*-anilin, C₁₃H₈ONBr₃, aus CCl₄, danach öfter aus A. umkrystallisiert carmoisi Krystalle, F. 160°; wl. in A. u. Ä., unl. in Lg.; wl. in wss. NaOH, beim Erw entsteht das gelbe Na-Salz; ll. in Eg., beim Verd. cremefarbener Nd., der allmählich orange wird u. beim Erhitzen auf 120° carmoisinrot sich färbt. — 3,5-Di salicyliden-*p*-phenetidin, C₁₅H₁₃O₂NBr₂, aus CCl₄ orangegelbe rhomb. Krystalle ca. 100° carmoisinrot werdend, F. 133°; wl. in A., unl. in Lg. u. wss. NaOH. — Bis-3,5-dibromsalicyliden-*o*-tolidin, C₂₈H₂₀O₂N₂Br₄, aus C₆H₅NO₂ scharlachrote Krystalle, F. 302° (Zers.), unl. in Aceton, Lg., A. u. wss. NaOH; ll. in alkoh. N. beim Ansäuern gelber Nd., der schnell rot wird. — 3,5-Dibromsalicylaldol-*o*-bromphenylhydrazon, C₁₃H₉ON₂Br₃, aus sd. Nitrobenzol gelbe Nadeln, F. 224° (Zers.), unl. in k. wss. NaOH, swl. in sd. NaOH. (Journ. Americ. Chem. Soc. 46, 2468. 1924. Pullman [Wash.], State Coll.)





HABERLAND

Siegfried Skrapup und Kurt Poller, Beiträge zum Problem der *Umlagerungsreaktion*. I. Zur Kenntnis der indirekten Substitution. Vff. untersuchen den Mechanismus der Umlagerungsreaktion, die bei der indirekten Substitution von *o*-Acetol-deriv. nach den bisher üblichen Ansichten die zweite Phase nach dem primären Eintritt eines Substituenten in die Seitenkette bedeuten. Um die Bildung der *p*-Deriv. aus den Rkk. zwischen *m*-Kresol, Acetylchlorid u. ZnCl₂ zu untersuchen, gehen Vff. von dem sich zweifellos zunächst bildenden *m*-Kresolacetat aus u. setzen ZnCl₂ unter verschiedenen Bedingungen (+ HCl) darauf einwirken. Je nach den Bedingungen werden (neben freiem *m*-Kresol) *o*- oder *o*- u. *p*-Aceto-*m*-kresol erhalten. Die B. der *o*-Verb. gehört im engeren Sinne nicht zu den indirekten Substitutionen, da es sich bei dieser nicht um eine intramol. Umlagerung, sondern um eine Resubstitution handelt: Das *o*-Acylderiv. geht zunächst in Acetylchlorid u. Chlorzinkkresolat CH₃-C₆H₄-OZnCl über, dieses wird in einer bimol. Reaktion an der *o*-Stellung des Kerns resubstituiert. Bei Verwendung eines Säurechlorids (*m*-Hydroxybenzoylchlorid) von höherem Kp. als Acetylchlorid verdrängt das höher sd. Chlorid das flüchtigere Acetylchlorid u. substituiert ebenfalls in *o*-Stellung. Die *o*-Verb. kann nicht aus der *p*-Verb. entstanden sein, da letztere bei der Einw. von m-Kresol allein auf *m*-Kresolacetat nicht erhalten wurde. Wurde dagegen das Gemisch mit HCl gesätt., dann wurde das *p*-Aceto-*m*-kresol erhalten. Die *o*-Verb. stellt demnach die Zwischenphase der Rk. dar, zumal auch die Überführung der *o*-Verb. nach 8-wöchiges Stehenlassen bei gewöhnlicher Temp. oder 4-tägiges Erhitzen auf 140° mit ZnCl₂ + HCl in die *p*-Verb. gelungen ist. Die Überführung der *p*-Verb. in die *o*-Verb. (durch Erhitzen mit ZnCl₂ auf 140°) entspricht der Annahme, dass das Zinkkresolat, aus dem dann ohne HCl nur die *o*-Verb. resubstituiert werden kann.

Versuche. (Vgl. Dissert. POLLER, Würzburg, 1924.) *m*-Kresol wird bei gewöhnlicher Temp. mit Acetylchlorid u. ZnCl₂ stehen gelassen; nach einigen Tagen wird der Nd. abgesaugt, mit Bzl. gewaschen, in h. NaOH gel. u. hieraus das *p*-Aceto-*m*-kresol, F. 127°, gewonnen. Aus dem benzol. Filtrat werden die restl. Phenole durch NaOH entfernt u. aus dem Rückstand das Kresolacetat, Kp. 211°, gewonnen. Die aus dem alkal. Auszug gewonnenen Phenole werden durch Fraktionieren zerlegt in: *m*-Kresol u. *o*-Aceto-*m*-kresol, Kp. 245°, gibt mit konz. FeCl₃-Lsg. Dunkelviolettfröbung, mit Äthylsulfat den Äthyläther, F. 71°. — Bei der Einw. von ZnCl₂ auf Kresolacetat wurden erhalten (neben unl. Kondensationsprodukten) nach 2-wöchigem Stehen bei gewöhnlicher Temp. 75% unverändertes Acetat

50% freies Kresol, nach 4-tägigem Erhitzen auf Wasserbadtemp. 180° Acetat, 20% freies Kresol u. 20% *o*-Acetokresol, nach 4—6-std. Erhitzen auf 140—160°—20% Acetat, freies Kresol u. 20% *o*-Acetokresol. — Bei der Einw. von ZnCl_2 auf Kresolacetat in Ggw. von *m*-Chlorbenzoylchlorid (6 Stdn. unter Durchleiten von bei 140° dest. Acetylchlorid in die Vorlage. Aus dem schwarzteerigen Reaktionsmisch. im Kolben wurde 4-Methyl-2-oxy-3'-chlorbenzophenon isoliert, farblose Kristalle aus PAe., F. 147°. — Phenolacetat gab schlechte Ausbeuten; mit ZnCl_2 1 Woche bei gewöhnlicher Temp. stehen gelassen, dann 4 Tage auf dem Wasserbad erhitzt, gab es *o*- u. *p*-Oxyacetophenon neben freiem Phenol u. unverändertem Acetat; 8-wöchiges Stehen mit ZnCl_2 u. HCl gab nur wenig Ausbeute an *p*-Verb., in *o*-Deriv. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 57. 2033—38. 1924. Würzburg, Univ.) ZAN.

M. Nierenstein, D. G. Wang und J. C. Warr, Die Einwirkung von Diazomethan auf einige aromatische Säurechloride. II. Synthese des Fisetols. (I. vgl. LIBBENS u. NIERENSTEIN, Journ. Chem. Soc. London 107. 1491; C. 1916. I. 96.) Aromat. Säurechloride reagieren mit Diazomethan unter B. von ω -Chloracetophenonen nach: $\text{RCOCl} + \text{CH}_2\text{N}_2 = \text{N}_2 + \text{RCOCH}_2\text{Cl}$. Es wurde aus Diacetyl- β -resorcyloylchlorid (I) mittels Diazomethan ω -Chlor-2,4-diacetoxyacetophenon (II) dargestellt; daraus erhielten Vff. mit sd. Acetanhydrid + Na-Acetat III, das durch Einw. von alkoh. NH_3 in Fisetol (IV) übergeführt wurde.



Versuche. Diacetyl- β -resorcylylchlorid, $\text{C}_{11}\text{H}_9\text{O}_5\text{Cl}$ (I), aus Diacetyl- β -resorcylylure + SOCl_2 in w. Chlf.; aus Lg. Nadeln, F. 37°. — ω -Chlor-2,4-diacetoxyacetophenon, $\text{C}_{12}\text{H}_{11}\text{O}_5\text{Cl}$ (II), aus Bzl. prismat. Nadeln, F. 73°. — ω -2,4-Triacetoxyacetophenon, $\text{C}_{14}\text{H}_{14}\text{O}_7$ (III), aus A. Nadeln, F. 129°. — Fisetol, $\text{C}_8\text{H}_8\text{O}_4$ (IV), 3 g des übrigen in 25 ccm CH_3OH werden mit 75 ccm 5-n. alkoh. NH_3 (trocken) 8 Tage lang in der Kälte stehen gelassen; aus mit HCl schwach angesäuertem W. prismat. Nadeln, F. 189°; Phenylhydrazon, $\text{C}_{14}\text{H}_{14}\text{O}_3\text{N}_2$, F. 109° (Zers.). — 2,4-Dimethylfisetol, $\text{C}_{12}\text{H}_{12}\text{O}_4$, aus IV in Ä. + CH_2N_2 ; aus Bzl. Nadeln, F. 131°, wird durch w. alkal. MnO_4 -Lsg. oxydiert zu 2,4-Dimethyl- β -resorcylsäure, aus W. Nadeln, F. 108—109°. — ω -2,4-Trimethylfisetol, $\text{C}_{11}\text{H}_{14}\text{O}_4$, aus vorigem durch Erhitzen mit CH_3J + Ag_2O , oder aus dem durch Hydrolyse von Tetramethylfisetin zu erhaltenden ω ,4-Dimethylfisetol mittels $(\text{CH}_3)_2\text{SO}_4$; aus A. Nadeln, F. 61—62°. (Journ. Americ. Chem. Soc. 46. 2551—55. 1924. Bristol, Univ.) HABERLAND.

John Chipman, Die Löslichkeit von Benzoesäure in Benzol und Toluol. Die Löslichkeit wurde für beide Lösungsm. von 0—121,7° bestimmt; Ergebnisse tabellar. graph. im Original. Oberhalb 30° ist die molekulare Löslichkeit von Benzoesäure für beide Lösungsm. prakt. dieselbe. Lösungswärmen in cal pro Mol. nahe am F. in Bzl. 4770 cal, in Toluol 4630; von 25—80° in Bzl. 6900, in Toluol 6760; Durchschnitt für beide Systeme im ganzen Temperaturbereich: 6360 cal. (Journ. Americ. Chem. Soc. 46. 2445—48. 1924. Bloomington [Ill.], Univ.) HABERLAND.

L. Havestadt und R. Fricke, Über die Synthese einiger Dipeptide komplizierter natürlicher Aminosäuren. Alanylhistidin, Alanylasparaginsäure, Tyrosylalanin-carbonsäure, Tyrosylasparaginsäure u. Tyrosylhistidincarbonsäure wurden durch Veresterung der zunächst erhaltenen Ester hergestellt, außerdem die Zwischenkörper α -Carbomethoxytyrosin u. Dicarbäthoxytyrosin. Bei Verseifung des Dicarbomethoxytyrosylasparaginsäuredimethylesters findet die Umwandlung von Lactam- in Lactim-form (vgl. LEUCHS u. MANASSE, Ber. Dtsch. Chem. Ges. 40. 3235; C. 1907. II.

973) nicht statt. Verss., das *Säurechlorid des Histidins* herzustellen, schlugen Die erhaltenen Verbb. konnten nur in einigen Fällen zur Krystallisation gebracht werden. Auf opt. Verh. wurden sie nicht geprüft.

Alanylhistidinmethylester, $C_{10}H_{16}O_3N_4$, aus Histidinmethylester u. salzs. Alanylchlorid in Chlf. bei 0°. Schwach gelbliches Öl, ll. in W., A. u. Chlf. Lsg. reagiert stark alkal. — *Alanylhistidin*, $C_9H_{14}O_3N_4$, amorphes Pulver, hygroskop., ll. in W. (Rk. alkal.) u. CH_4O , l. in A., sonst unl., bei Erhitzen mählich weich, gelb, schließlich braun ohne F., in Lsgg. stark dissoziiert. Paulysche Rk. u. Farbrk. mit Br-W. — *Alanylasparaginsäuredimethylester*, $C_9H_{16}O_4N_2$, entsprechend dem ersten aus Asparaginsäuredimethylester, amorphes Pulver, Chlf.), F. 187—188°, l. in Chlf., A. u. W. — *Alanylasparaginsäure*, $C_7H_{12}O_4N_2$, amorphes Pulver, sehr hygroskop., bei Erhitzen Aufschäumen von 155—160°, Färbung von ca. 220° an, sl. in W. (Rk. sauer), unl. in A. usw., in wss. Lsg. gehend dissoziiert. — *Dicarbomethoxytyrosin*, $C_{13}H_{15}O_7N = CH_3O_2C \cdot O \cdot C_6H_4 \cdot CH(CO_2H) \cdot NH \cdot CO_2CH_3$, aus Tyrosin u. Chlorkohlensäuremethylester in Nadelchen, F. 97°, ll. in Ä., A., Aceton u. Chlf., wl. in Essigester, unl. in Bzl., fast unl. in k. W., l. in h. W. mit saurer Rk. — *Dicarbomethoxytyrosylglycin*, gelbliches Öl. — *Dicarbomethoxytyrosylalaninäthylester*, $C_{18}H_{24}O_8N_2$, aus A. u. Zusatz von W., F. 131°, l. in Chlf., A., Essigester u. Aceton, wl. in Bzl., u. W., Ä., PAe., Bzn. — *Tyrosylalanincarbonsäure*, $C_{13}H_{16}O_6N_2$, amorphes Pulver (aus A.), Schäumen gegen 140°, Zers. unter Braunfärbung oberhalb 200°, l. in A., Ä. u. W. (Rk. sauer), wl. in Essigester, unl. in Ä., PAe., Chlf., Bzl. — *Dicarbomethoxytyrosylasparaginsäuredimethylester*, $C_{19}H_{24}O_{10}N_2$, Nadelchen (aus $CH_4O + W.$), F. 101°, l. in Chlf., A., Essigester u. Aceton, wl. in Bzl., unl. in W., Ä., PAe. u. Bzl. — *Tyrosylasparaginsäure*, $C_{13}H_{16}O_6N_2$, schwach gelbliches, amorphes Pulver, Schäumen ca. 120°, Zers. mit Braunfärbung ca. 260°, l. in A. u. Aceton, weniger l. in W., wl. in Essigester, unl. in Ä., Chlf., PAe. u. Bzl. Wss. Lsg. stark sauer. — *Dicarbäthoxytyrosin*, $C_{15}H_{19}O_7N$, F. 96—97°. — *Dicarbäthoxytyrosylchlorid*, aus dem vorigen in $C_2H_5O \cdot Cl$ -Lsg. durch PCl_5 . — *Dicarbäthoxytyrosylhistidinmethylester*, $C_{22}H_{28}O_8N_4$, amorphes Pulver (aus Lsg. in Chlf. durch Ä.), Erweichen unter 100°, Schmelzen ca. 140°, l. in Chlf., A., Essigester u. Aceton, unl. in W., Ä., PAe., Bzl. — *γ-Histidindimethylester*, $C_{16}H_{18}O_6N_4$, amorphes Pulver (aus A.), Schäumen von ca. 140° an, Zers. unter Braunfärbung ca. 270°, l. in W. u. A., leichter in CH_4O , unl. in Chlf., Essigester, Aceton, Bzl. Wss. Lsg. reagiert sauer. Farbrk. mit Br-W. B. Dtsch. Chem. Ges. 57. 2048—54. 1924. Münster, Univ.)

Eug. Bamberger, Über einige (teilweise berichtigende) Angaben aus Literatur und anderen Literaturstellen. Bei der Red. des *(γ-Phenylacryl)-N-phenylnitrons* (*Zimtaldoxim-N-phenyläthers*), $C_8H_5 \cdot N(:O) : CH \cdot CH : CH \cdot C_6H_5$ (vgl. 3A. BERGER u. WEITNAUER, Ber. Dtsch. Chem. Ges. 55. 3380; C. 1923. I. 517). a) Na-Amalgam + A., b) Na + A. entstehen: Base $C_{15}H_{17}N$ (a u. b) I, $C_{15}H_{17}ON$ (a u. b) II, Anilin (a), Benzidin (a u. b), Diphenylin (a) III, p-aminodiphenylamin (a) u. Azobenzol (b) neben viel Harz. — III wurde zur Identifizierung in das Diazoniumsalz u. dieses in den entsprechenden β-Naphtholfarbstoff $C_{32}H_{20}O_2$ übergeführt, aus Bzl. umkrystallisiert, F. 260—262°, wie das aus notor. Diphenyl dargestellte Präparat. — I erwies sich als *N-(γ-Phenylpropyl)-anilin*, fl., f. bei D. 17 1,034, $n_D^{19.4} = 1,59191$, Kp. 190—190,5°. — Chlorhydrat, $C_{15}H_{18}NCl$, als lose Blättchen, F. 169—170°. — Nitrat, F. 171°. — Nitrosamin, $C_{15}H_{18}NO$, schwach gelbliches Öl, zeigt LIEBERMANN'S Rk. — II, feste sek. Base, fast farblos, Nadeln, F. 90—91°, swl. in W., wl. in Ä. u. k. Lg., ist nicht mit dem von B. I. u. MARRI (vgl. Gazz. chim. ital. 54. 99; C. 1924. I. 2349) dargestellten Anilinderivat Hydrozimsäure ident.

Die Red. des *Phenyl-N-phenylnitrons* (*N-Phenyläther des Benzaldoxims*), $C_8H_5 \cdot N$

$\text{N}(\text{:O}): \text{CH} \cdot \text{C}_6\text{H}_5$, durch Na in alkoh. Lsg. führt zum *Benzylanilin*, F. 34–35°. — Analog werden auch andere *Nitrone*, $\text{Ar} \cdot \text{N}(\text{:O}): \text{CH} \cdot \text{Ar}'$, zu den entsprechenden *Benzylanilinen* reduziert. — *Salicylaldoxim-N-phenyläther*, $(\text{o})\text{HO} \cdot \text{C}_6\text{H}_4 \cdot \text{CH} : \text{N}(\text{:O}): (\text{H}_5)$, aus *Salicylaldehyd* u. *Phenylhydroxylamin*, kanariengelbe Krystalle, F. 116°, ergibt *o-Oxybenzylanilin*, $\text{C}_{15}\text{H}_{13}\text{ON}$, aus verd. A. oder Lg., F. 113° (vgl. Dissert. INDERMANN, Zürich 1897). — *Salicylaldoxim-N-tolyläther*, aus *Salicylaldehyd* u. *Tolylhydroxylamin*, gelbe Nadeln aus Bzl., F. 117°, ergibt *o-Oxybenzyl-p-toluidin*, $(\text{H}_{15})\text{ON}$, weiße Nadeln aus Chlf.-Gasolin, F. 122° (vgl. Dissert. L'ORSA, Zürich 1916). — *Salicylaldoxim-N-p-bromphenyläther*, aus *Salicylaldehyd* u. *p-Bromphenylhydroxylamin*, kanariengelbe Blättchen, F. 186–187°, ergibt *o-Oxybenzyl-p-bromanilin*, $(\text{H}_{10})\text{ONBr}$, weiße Nadeln, F. 126° (vgl. Dissert. KÖPCKE, Zürich 1898).

Die Nitrone Ar·N(O):CH·R eignen sich zum Nachweis von Arylhydroxylaminen u. Aldehyden, auch Ketone kondensieren sich mit Phenylhydroxylamin: Acetylacetone gibt kanariengelbe Nadeln, F. 176—176,5° (vgl. Dissert. WEITNAUER, Zürich 1904). — Phenylhydroxylamin gibt mit: *p*-Nitrobenzaldehyd gelbe Nadeln, F. 184—185° (vgl. Dissert. BLASKOPF, 1895, vorgelegt in Basel), *p*-Oxybenzaldehyd farblose Nadeln, F. 214° (vgl. Dissert. HINDERMANN, Zürich 1897), *Furfural* gelbe Nadeln, F. 92°, *Piperonal* gelbstichige Nadeln, F. 133—134°, *Vanillin* orangefarbene Nadeln, F. 217—218° (vgl. Dissert. WEITNAUER, Zürich 1904). — Phenylhydroxylamin gibt mit: *Benzaldehyd* weiße Nadeln, F. 123°, *p*-Nitrobenzaldehyd gelbe Nadeln, F. 147—148°, *m*-Nitrobenzaldehyd hellgelbe Nadeln, F. 133°, *Anisaldehyd* farblose, stark lichtbrechende Nadeln, F. 129°, *Zimtaldehyd* hellgelbe Nadeln, F. 168° (vgl. Dissert. L'ORSA, Zürich 1896). — *o*-Hydroxylamino-*p*-xylol gibt mit: *Benzaldehyd* weiße Nadeln, F. 130°, *p*-Nitrobenzaldehyd grünstichig goldgelbe Nadeln, F. 121—122°, *m*-Nitrobenzaldehyd hell strohgelbe Nadeln, F. 94°, *Anisaldehyd* weiße Nadeln, F. 113,5°, *Zimtaldehyd* schwefelgelbe Nadeln, F. 153° (vgl. Dissert. BAUM, Zürich 1899). — *p*-Chlorphenylhydroxylamin gibt mit: *Benzaldehyd* weiße Prismen, F. 77,5—178°, *p*-Nitrobenzaldehyd gelbe Prismen, F. 192°, *m*-Nitrobenzaldehyd goldgelbe Nadeln, F. 179—180°, *Zimtaldehyd* hellgelbe Nadeln, F. 176—176,5°, *Salicylaldehyd* hellgelbe Nadeln, F. 179,5—180,5°, *Anisaldehyd* weiße Nadeln, F. 174—175° (vgl. Dissert. DEVAS, Zürich 1896). — *p*-Bromphenylhydroxylamin gibt mit: *Benzaldehyd* weiße Nadeln, F. 179,5°, *p*-Nitrobenzaldehyd gelbe Nadeln, F. 209°, *m*-Nitrobenzaldehyd strohgelbe Nadeln, F. 187,5°, *Zimtaldehyd* hellgelbe Nadeln, F. 183—184°.

Bei der Einw. von sd. HBr auf *m*-Tolyldihydroxylamin (vgl. Dissert. SARKISSANZ, Zich 1899, vorgelegt in Basel) entstehen *m*-Azoxyltoluol, $(C_6H_4 \cdot CH_3)_2 : N_2O$, F. 37°, *Minokresol*, $C_6H_3 \cdot NH_2 \cdot CH_3 \cdot OH$, Nadeln aus Bzl., F. 174—175° (korr.), u. *Bromoluidin*, $C_6H_3 \cdot NH_2 \cdot CH_3 \cdot Br$, F. 81—81,5°. In letzterem steht Br nicht in o-Stellung, v. Vf. früher angab, sondern in p-Stellung zur NH_2 -Gruppe, was weiter unten richtig wird. — *Bromacettoluid*, $C_6H_3 \cdot CH_3 \cdot (NHAc) \cdot Br$, Nadeln aus W., F. 103 bis 104°. — *Phenylbromotolylthioharnstoff*, $C_{14}H_{13}N_2BrS$, aus Bromtoluidin u. Phenylthioharnstoff, Rosetten, F. 137°. — *Phenylbromotylthioharnstoff*, $C_{14}H_{13}ON_2Br$, mit Phenylthioharnstoff, Nadelbüschel, F. 207°. — *N-Salicylidenbromtoluidin*, $C_{15}H_{12}ONBr$, mit Salicylaldehyd, schwefelgelbe Nadeln oder abgestumpfte Tetraeder (aus A.), F. 83°. — *Bromacetamino-6-brombenzoesäure*, $C_9H_8O_3NBr$, aus Bromacettoluid durch Oxydation mit $KMnO_4$, derbe Nadeln aus A., F. 196—197° (wasserfrei), Konstitutionsbeweis durch die Synthese auf anderen Wege. — Durch Nitrierung von *o*-Brombenzoesäure, F. 148—149°, entstand *3-Nitro-6-brombenzoesäure*, F. 180—181°, daraus durch Erhitzen mit Sn u. HCl *3-Amino-6-brombenzoesäure*, F. 200—201°, daraus das oben beschriebene *Acetylderiv.* vom F. 196—197°. Br u. CH_3 nehmen daher im Bromtoluidin die o-Stellung ein; daß die NH_2 -Gruppe in p-Stellung zum Br steht, erweist sich aus dem Verh. der *3-Amino-6-brombenzoesäure* bei der Diazotierung u. Überführung in

die 3,6-Dibrombenzoesäure, F. 153°. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 57. 2082—91. Zürich, Polytechnik.)

Ch. Dufraisse, *Beitrag zum Studium der Äthylenstereomerie*. Vf. will zunächst an ungesätt. Ketonen die Ursache zu ergründen suchen, weshalb Stoffe dieser Art schwer in den zu erwartenden stereomeren Formen zu erhalten sind. Die hier liegenden Unterss. erstrecken sich auf *Benzalacetophenon*, $C_6H_5 \cdot CH : CH \cdot CO \cdot$ u. einige Halogenderivv. desselben. I. *Äthylenisomerie von in der Seitenkette bromierten u. dijodierten Benzalacetophenonen*. Eine verbesserte Vorschrift für I. von *Phenylacetylnatrium* u. für dessen Umsetzung mit $C_6H_5 \cdot COCl$ zu *Benzalphenylacetylen* nach MOUREU u. DELANGE (Bull. Soc. Chim. Paris [3] 25. I. C. 1901. I. 892) wird gegeben. *Isomere Dibrombenzalacetophenone* (vgl. C. r. d. l'Acad. des sciences 158. 1691; C. 1914. II. 327) u. *Dijodbenzalacetophenone* (C. r. d. l'Acad. des sciences 170. 1262; C. 1920. III. 189) wurden aus dem Ausgangsmaterial erhalten. Die B-Form der letzten entsteht in um so größerer Menge, je heftiger die Addition des J verläuft. — II. *Krystallographische Untersuchung des Dibrombenzalacetophenons B und des Dijodbenzalacetophenons B*. Die angeführten Messungen zeigen sehr nahe krystallograph. Beziehungen der beiden Verbb., die zu der Annahme gleicher räumlicher Anordnung der Moll. führen. III. *Herstellungsart, Eigenschaften und Konstitution von 2 in der Seitenkette bromierten Benzalacetophenonen*. Das *Brombenzalacetophenon* von WISLICENUS (Bull. Soc. Chim. Paris [3] 308. 226; C. 99. II. 938) (I.) wurde nach dessen Vorschrift aus $C_6H_5 \cdot CH : CBr \cdot CO \cdot C_6H_5$ (II. $C_6H_5 \cdot CBr : CBr \cdot CO \cdot C_6H_5$)

Dibrombenzalacetophenon vom F. 156—157° (vgl. CLAISEN u. CLAPARÈDE, Ber. Dtsch. Chem. Ges. 14. 2464) gewonnen, F. 42—43°, im Block MAQUENNE 43—44°, quadrat. oder rechteckige Blättchen, stets mit blaßgelber Farbe resultierend, ob es ist Vf. im Zweifel, ob es sich um Eigenfarbe handelt. Eine isomere Verb., *Monobromhydrat des Benzoylphenylacetyls* (II.) erhielt Vf. durch Anlagerung von 1 Mol. HBr an Benzoylphenylacetylen in Eg. bei nicht über 5°, hexagonale Blättchen, F. 41—42°, sl. in organ. Lösungsm., besonders in der Wärme, im Gemisch mit vorigem schon bei Zimmertemp. geschm., stets von schwacher, aber gleichmäßiger Färbung. Die Konst. von I. geht daraus hervor, daß die Verb. bei Einwirkung gepulverten NaOH außer Benzoesäure u. Phenylacetylen ein *Monobromstyrol* liefert, das nach der eingehenden Unters. der 3 isomeren Formen (vgl. C. r. d. l'Acad. des sciences 71. 960. 72. 67; C. 1921. I. 445. 666. Es sei auf die in der jetzt erschienenen Abhandlung beschriebene Apparatur zum Absaugen von Krystallen bei tiefer Temp. hingewiesen) die Konst. $C_6H_5 \cdot CH : CHBr$ haben muß. Die entgegen gesetzte Annahme von WISLICENUS basiert auf der Annahme, daß die daraus in alkoh. NaOH entstehende Verb. Dibenzoylmethan sei, was inzwischen (vgl. DUFRESNE u. GÉRALD, Bull. Soc. Chim. de France [4] 31. 1285; C. 1923. III. 1216) widerlegt wurde. I. gibt mit Br ein *Dibromid*, $C_{15}H_{11}OBr_3$, vom F. 103—104°, das mit $KC_2H_3O_2$ in alkoh. Lsg. des α -Brombenzalacetophenon (I.) zurückbildet, II. dagegen ein solches vom F. 98—99°, aus dem unter gleichen Umständen ein Gemisch der beiden stereomeren *Benzoylphenylacetyldibromide*, $C_6H_5 \cdot CBr : CBr \cdot CO \cdot C_6H_5$ gewonnen wird.

IV. *Suche nach den Stereomeren des Benzalacetophenons und seiner beiden isomeren bromderiv. Es wurden zahlreiche Verss., eine zweite stereomere Form des Benzalacetophenons zu gewinnen, angestellt, ohne das gewünschte Ergebnis zu erreichen. Bei Darst. nach CLAISEN (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 20. 657) wurde stets nur eine Form, blaßgelbe hexagonale Blättchen, F. 58°, gewonnen, deren Isomerisierung nach den verschiedenen gebräuchlichen Methoden nicht gelang. Bei Einwirkung von Zn-Staub auf alkoh. Lsgg. der Dihalogenderivv. entstanden nur Kondensationsprodukte in Ggw. von Essigsäure daneben Benzoylphenylacetylen, das nahezu rein bei A.*

ung von durch H_2 reduzierten Fe gewonnen wurde. β -Brombenzalacetophenon ist namentlich mit Fe leicht Benzalacetophenon, aber anscheinend auch nur die bereits bekannte Form, α -Brombenzalacetophenon wird unter gleichen Bedingungen angegriffen. Beide stereomere Formen des 1,3-Diphenyl-2,3-dibrompropanons-1 gehen bei Reduktion ausschließlich das bekannte Benzalacetophenon, das auch allein bei Depolymerisation seines Dimeren (vgl. WIELAND, Ber. Dtsch. Chem. Ges. **37**, 1; C. **1904**. I. 1266) isoliert werden konnte. — α -Brombenzalacetophenon, $C_6H_5 \cdot CBr : CO \cdot C_6H_5$, entsteht aus beiden stereomeren Dibromiden des Benzalacetophenons in der gleichen Form (auch bei niedriger Temp.), die nicht isomerisiert werden konnte. Vielleicht ist die gesuchte stereomere Form in dem stets dabei erhaltenen nichtkrystallisierbaren Öl enthalten, das sich durch Erhitzen auf 200° in die gewöhnliche krystallisierte Form verwandelt. Ebenso wenig konnte eine neue Form des β -Brombenzalacetophenons, $C_6H_5 \cdot CBr : CH \cdot CO \cdot C_6H_5$, nachgewiesen werden. — V. Die Äthylenisomerie der ω -Bromstyrole. (Vgl. C. r. d. Acad. des sciences **172**, 67; C. **1921**. I. 666.) — VI. Stereochemische Betrachtungen. Vf. geht auf die Beziehungen zwischen Färbung u. Krystallhabitus u. möglicher Anordnung ein, ferner auf die Bedeutung der Additions- u. Eliminationsrkk., die Umwandlungen der stereomeren Formen ineinander u. das Gleichgewicht. — Zum Schlusse findet sich eine Zusammenstellung der bisher isolierten stereomeren von Äthylenketonen. (Ann. de Chimie [9] **17**, 133—221. 1922. Coll. France.)

SPIEGEL.

N. D. Zelinsky, Nicht umkehrbare Katalyse der ungesättigten cyclischen Kohlenwasserstoffe. II. Mitt. (I. vgl. Ber. Dtsch. Chem. Ges. **57**, 1066; C. **1924**. II. 838.) Da sich Cyclohexen aus Cyclohexan u. Bzl. katalyt. nicht darstellen läßt, ist die Katalyse des Cyclohexens mittels Pd irreversibel. Vf. untersucht, ob diese leicht u. vollständig verlaufende irreversible Katalyse sich auf sämtliche nicht vollständig hydrogenierte arom. KW-stoffe ausdehnen läßt. — Mit B. Kasansky: Die Methyleyclohexene verhalten sich bei der Pd-Katalyse gleich, die Umwandlung verläuft nach Schema $C_7H_8 \leftarrow 3C_7H_{12} \rightarrow 2C_7H_{14}$. — 1-Methyleyclohexen-1, Kp. $110,5$ bis 111° (korrt.), D_4^{20} 0,8099, $n_D^{17,5} = 1,4499$, wurde bei 116 — 118° über den Pd-Katalysator geleitet, das Katalysat erwies sich als vollständig frei von dem ungesätt. KW-stoff, Geruch nach Toluol, Kp. 100 — 104° , D_4^{20} 0,7930, $n_D^{17} = 1,4451$. — 1-Methyleyclohexen-2 (aus Diäthylanilin u. 1-Methyleyclohexylchlorid-3), Kp. 104° bis 105° , D_4^{20} 0,8009, $n_D^{17} = 1,4451$; Katalysat: Kp. 101 — 104° , D_4^{20} 0,7941, $n_D^{19} = 1,4411$. — 1-Methyleyclohexen-3 (aus 1-Methyleyclohexanol-4 u. PCl_3), Kp. $102,5$ — 103° bis 104° , D_4^{20} 0,8000, $n_D^{18} = 1,4423$; Katalysat: Kp. 101 — 103° , D_4^{20} 0,7966, $n_D^{17,5} = 1,4433$. — Methyleyclohexan (aus dem Jodid des Cyclohexylcarbinols durch Einw. von alkoh. Kali), Kp. 101 — 102° , D_4^{20} 0,8015, $n_D^{18} = 1,4506$, zeigte dasselbe Verhalten bei der Pd-Katalyse (116 — 118°) wie die Methyleyclohexene; Katalysat: Kp. 99 — 105° , D_4^{20} 0,7945, $n_D^{18} = 1,4425$. Die irreversible Katalyse findet demnach auch dann statt, wenn sich die ungesätt. Bindung außerhalb des Ringsystems des Hexamethylenkernes befindet. Um die Anwesenheit von Hexahydrotoluol in den Katalysaten zu beweisen, wurden diese zur Entfernung des Toluols mit verd. Schwefelsäure (7%) behandelt; $\frac{2}{3}$ des Katalysats erwies sich als reines Hexahydrotoluol, D_4^{20} 0,7688, $n_D^{15,5} = 1,4253$. Die Katalysate haben stets eine negative D. als die Ausgangskohlenwasserstoffe, dies steht im Einklang mit der Beobachtung, daß sich beim Vermischen von Bzl. mit Hexamethylen eine negative Kontraktion beobachten läßt, deren Konstante $-2,64$ ist. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. **57**, 1055—57. 1924.)

ZANDER.



N. D. Zelinsky, Die nicht umkehrbare Katalyse der ungesättigten cyclischen Kohlenwasserstoffe. III. Mitt. Kontaktumwandlung des Limonens. (II. vgl. vorst.) Der Mechanismus der Katalyse eines in der Seitenkette ungesätt. KW-stoffs

(*Methylenecyclohexan*) besteht offenbar darin, daß er durch Dehydrogenisierung das unbeständige *Methylenecyclohexadien* (drei konjugierte Äthylenbindungen) übergeht, welches sich dann zu *Toluol* isomerisiert, während die beiden frei gewordenen H-Moll. zwei weitere Moll. *Methylenecyclohexan* zu *Methylcyclohexan* reduziert. Hydroaromat. KW-stoffe mit je einer ungesätt. Bindung im Kern u. in der Seitenkette verhalten sich bei der Katalyse mit Pd wie die einfacheren ungesätt. hydroaromat. KW-stoffe. — *d-Limonen*, Kp. 176,5—177,5°, $n_D^{23} = 1,4716$, wurde dem CO_2 -Strom bei 180—185° der Katalyse (Pd-Asbest) unterworfen. Das Katalysat. zeigte vollständig veränderte Eigenschaften. Es war opt. inaktiv, D. 0,82, $n_D^{24} = 1,4750$, chem. Zus. $\text{C}_{10}\text{H}_{16}$ wie Limonen, Kp.₇₄₃ 173,5—174,5°. Durch Behandlung mit rauchender Schwefelsäure wurde *p-Cymol* ($\frac{2}{3}$ des Vol.) entfernt, der Rückstand erwies sich als *Menthan*, $\text{C}_{10}\text{H}_{20}$, Kp.₇₅₄ 170—171°, D.₁₉ 0,8005, $n_D^{19} = 1,4424$, Mol.-Refr. 46,36. Es entstehen somit aus drei Moll. Limonen zwei Moll. *p-Cymol* u. 1 Mol. *Menthan*. $2\text{C}_{10}\text{H}_{14} \leftarrow 3\text{C}_{10}\text{H}_{16} \rightarrow \text{C}_{10}\text{H}_{20}$. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 57. 2058—59. 1924. Moskau, Univ.) ZANDER

Erich Schmidt und **Walter Bartholomé**, *Zur Kenntnis des Bromtrinitromethans*. III. (II. vgl. SCHMIDT, SCHUMACHER u. ASMUS, Ber. Dtsch. Chem. Ges. 56. 1239; C. 1923. III. 212.) Vff. beschreiben weitere Anwendungen der Methylierung mittels *Bromtrinitromethans* in alkoh. Lsg. die Ester der unterbromigen Säure u. Olefin. Doppelbindungen anzulagern. Die Methode wird ergänzt durch die Behandlung der in Ä. gel. Umsetzungsprodd. mit festem KOH zur Darst. von reineren Verbb. — Mit **Richard Asmus**: (β -Methoxy- γ -brompropyl)-benzol, $\text{C}_6\text{H}_5 \cdot \text{CH}(\text{OCH}_3) \cdot \text{CH}_2\text{Br}$, aus Bromtrinitromethan u. *Allylbenzol* in CH_3OH , farblose Ö. Kp._{0,05} 80—81°, D.₂₀ 1,3134, $n_D^{20} = 1,5349$. — (β -Äthoxy- γ -brompropyl)-benzol, $\text{C}_{11}\text{H}_{15}\text{OBr}$, mit A. als Lösungsm., Kp._{0,04} 85—86°.

β -Methoxy- γ -bromdihydrosafrol, $\text{C}_6\text{H}_3(\text{CH}_2 \cdot \text{CH}[\text{OCH}_3] \cdot \text{CH}_2\text{Br})^1(\text{O}_2\text{CH}_2)^{3,4}$, aus *Safrol* in CH_3OH , farbloses Öl, Kp._{0,8} 138—139°, D.₂₀ 1,4672, $n_D^{20} = 1,559$. — β -Methoxy- γ -bromdihydroesdragol(-o), $\text{C}_6\text{H}_4(\text{CH}_2 \cdot \text{CH}[\text{OCH}_3] \cdot \text{CH}_2\text{Br})^1(\text{OCH}_2)^2$, aus *o-Esdragol* in CH_3OH , farbloses Öl, Kp._{0,1} 101—103°, D.₂₀ 1,3570, $n_D^{20} = 1,52$. — β -Methoxy- γ -bromdihydroesdragol(-p), farbloses Öl, Kp._{0,8} 126—127°, D.₂₀ 1,5370, $n_D^{20} = 1,5370$. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 57. 2039—40. 1924. München, Akad. Wissensch.) ZANDER


M. Bourguet, *Über ein fortlaufendes Verfahren zur Darstellung echter Acetylenkohlenwasserstoffe*. Das Verf. gestattet, ausgehend von einem KW-stoff C_n , auch die homologen Verbb. mit C_{n+1} , C_{n+2} etc. zu synthetisieren. Der hydroaromat. Acetylen-KW-stoff wird in das Na-Deriv. übergeführt, das mittels $(\text{CH}_3)_2\text{SO}_4$ natrium-methyliert wird; durch Behandeln mit NaNH_2 wird der neue KW-stoff natrium-alkylisiert zum echten Acetylen-deriv. isomerisiert:



Das Verf. kann beliebig fortgesetzt werden; um nicht zu große Verluste zu erleiden, empfiehlt es sich, die Rk. 1. in der Kälte durchzuführen u. die Isomerisierung nach 2. bei ca. 160° mit einem höher sd. Lösungsm. als der Kp. des KW-stoffs ist u. mit pulverisiertem NaNH_2 zu bewirken; die Ausbeuten betragen bei den Rkk. durchschnittlich 80%. Ausgehend vom *Cyclohexylpropin*, $\text{C}_6\text{H}_{11} \cdot \text{CH}_2 \cdot \text{C} \equiv \text{CH}$ hat Vff. folgende Verbb. dargestellt: β -Cyclohexylbutin, $\text{C}_6\text{H}_{11} \cdot \text{CH}_2 \cdot \text{C} \equiv \text{C} \cdot \text{CH}_3$, Kp.₁₇ 79°. — *Echtes Cyclohexylbutin*, $\text{C}_6\text{H}_{11}(\text{CH}_2)_2 \cdot \text{C} \equiv \text{CH}$, Kp.₁₇ 70°. — β -Cyclohexylpentin, $\text{C}_6\text{H}_{11}(\text{CH}_2)_2 \cdot \text{C} \equiv \text{C} \cdot \text{CH}_3$, Kp.₁₇ 93°. — *Echtes Cyclohexylpentin*, $\text{C}_6\text{H}_{11}(\text{CH}_2)_3 \cdot \text{C} \equiv \text{C} \cdot \text{CH}_3$, Kp.₁₆ 84°. — β -Cyclohexylhexin, $\text{C}_6\text{H}_{11}(\text{CH}_2)_3 \cdot \text{C} \equiv \text{C} \cdot \text{CH}_3$, Kp.₁₇ 109—110°. — *Echtes Cyclohexylhexin*, $\text{C}_6\text{H}_{11}(\text{CH}_2)_4 \cdot \text{C} \equiv \text{CH}$, Kp.₁₆ 101°. — Alle Verbb. sind farblose Fll., die Pentine riechen anisartig, die substituierten Verbb. haben größere D. u. sind stärker lichtbrechend als die echten KW-stoffe; die letzteren geben mit

oniakal. CuCl einen gelben Nd., mit alkoh. AgNO_3 entstehen weiße krystallin. c.; ihre Na-Verbb. absorbieren leicht CO_2 u. gehen in die entsprechenden Carbonen über; es wurden so folgende Säuren erhalten: $\text{C}_6\text{H}_{11}(\text{CH}_2)_2 \cdot \text{C} : \text{C} \cdot \text{COOH}$, 5—59°. — $\text{C}_6\text{H}_{11}(\text{CH}_2)_3 \cdot \text{C} : \text{C} \cdot \text{COOH}$, nicht krystallisierend. — $\text{C}_6\text{H}_{11}(\text{CH}_2)_4 \cdot \text{C} : \text{C} \cdot \text{COOH}$, F. 40—41°. (C. r. d. l'Acad. des sciences 179. 686—88. 1924.) HA.

Marcel Delépine, *Strukturbeziehungen zwischen den Pinenen und den aus ihnen hervorgehenden Terpincolen und Limonenen*. (Vgl. C. r. d. l'Acad. des sciences 179. C. 1924. II. 1917.) Die Unterss. von GODLEWSKY (Bull. Soc. Chim. Paris 2. 747 [1899]) u. die von BARBIER u. GRIGNARD (Bull. Soc. Chim. de France 548 [1910]) haben gezeigt, daß man, je nach der angewandten Methode, vom Pinen ausgehend, dieses in ein *d*- oder *l*-Ketonolid überführen kann. Formelg. läßt sich der Übergang folgendermaßen erklären: hat *d*-Pinen (I) die Doppelring rechts von $\text{C}(\text{CH}_3)_2$ u. liegt die $\text{C}(\text{CH}_3)_2$ -Brücke vor der Papierebene, so u. das aus I durch Hydratation hervorgehende *Terpincol* Formel (III) haben;



us erhält man das *Ketonolid* (IV), das der Antipode des von BAEYER (Ber. Chem. Ges. 29. 326 [1896]) aus I über Pinonsäure erhaltenen *Methoäthyl-ketonolids* (V) ist. Der Übergang von I in III erfolgt, wie schon früher (vgl. dargelegt worden ist, nicht durch Ringöffnung, sondern wahrscheinlich über Das aus einem Pinen der Formel I hervorgehende *Limonen* muß Konst. VI (C. r. d. l'Acad. des sciences 179. 980—82. 1924.) HABERLAND.

James F. Norris und **R. C. Young**, *Die Darstellung von Triphenylmethan und Einwirkung von Hitze auf Äther und Ester des Triphenylcarbinols*. Die Bestätigung, daß beim Stehen äquivalenter Mengen Triphenylchlormethan u. AlCl_3 Triphenylmethan gebildet wird, führte Vff. zur unten angegebenen Methode darst. von Triphenylmethan. — Da $\text{C}_6\text{H}_5\text{COCl}$ u. Ä. in Ggw. von ZnCl_2 Benzoesäureäthylester + $\text{C}_2\text{H}_5\text{Cl}$ geben, wurde angenommen, daß sich bei Einw. von Ä. + auf Triphenylchlormethan zunächst Triphenylmethyläthyläther bildet, der dann wird; der Äther wurde daher in Ä. mit AlCl_3 behandelt, u. es entstand wie im vorigen Falle Triphenylmethan u. eine zähe M. Triphenylchlormethan + AlCl_3 Butyläther geben ebenfalls Triphenylmethan. Da bei diesen Rkk. $\text{C}_2\text{H}_5\text{Cl}$ + $\text{C}_4\text{H}_9\text{Cl}$ nicht gefunden wurde, diese Verbb. aber in Ggw. von AlCl_3 ohne mit Ä. beständig sind, geht daraus hervor, daß sie mit dem Triphenylmethan reagieren müssen. Vff. nehmen an, daß unter dem Einfluß von AlCl_3 aus Triphenylmethyläther die OC_2H_5 -Gruppe abgespalten wird; durch Verlust von 1 H entsteht aus OC_2H_5 dann *Acetaldehyd*, während Triphenylmethyl zu Triphenylmethan wird. Der gebildete CH_3CHO wird durch AlCl_3 polymerisiert. Wird Triphenylmethan in Ä. mit ZnCl_2 + Zn behandelt, so wird tatsächlich reichlich CH_3CHO gebildet.


Auch durch Erhitzen von Triphenylmethyläthyläther alleine werden $(\text{C}_6\text{H}_5)_3\text{CH}$ VII. 1.

u. CH_3CHO erhalten; der n. Butyläther zerfällt analog in $(\text{C}_6\text{H}_5)_3\text{CH}$ u. *Butyraldehyd*, der Isopropyläther in $(\text{C}_6\text{H}_5)_3\text{CH}$ u. *Aceton*. Die Ester des Triphenylcarbinols halten sich ähnlich. — *Diphenyldichlormethan* in Ä. + AlCl_3 gibt *Benzophenon*. Darst. von *Triphenylmethan*: 292 g Bzl. + 115 g CCl_4 , durch Eiswasser gekühlt werden mit 100 g AlCl_3 versetzt u. die Mischung 48 Stdn. stehen gelassen; dann werden durch den Kühler 110 g Ä. langsam zugegeben; nach 24-std. Stehen auf 650 g Eis + 25 cem konz. HCl gegossen u. 400 cem CS_2 zugegeben; nach Trennung der Schichten wird das Lösungsm. bis 100° abdest. u. der Rückstand fraktioniert; bei $330\text{--}356^\circ$ übergehender Teil wird aus sd. A. umkrystallisiert. F. 92° , Ausbeute 120 g. (Journ. Americ. Chem. Soc. **46**. 2580—83. 1924. Cambridge [Mass.], Inst. of Techn.)

HABERLAN

F. F. Blicke, Die Rk. zwischen metallischem Natrium und aromatischen Aldehyden, Ketonen und Estern. I. Aldehyde. Benzaldehyd u. Na reagieren in absolutem Ä. je nach der Menge des angewandten Na unter B. eines Mono- (I) oder Natriumadditionsprod. (II). Verb. I mit 3-wertigem C muß sich wie die Triphenylmethyle verhalten u. wird leicht in III übergehen, bzw. mit dieser Form im Gleichgewicht sich befinden. Die grüne Farbe von I ist auf chinoide Konst. V zurückführbar. Daß I—III tatsächlich gebildet werden, ergibt sich aus den Produkten der Hydrolyse mit W. In I tritt hierbei an Stelle von ONa die OH-Gruppe; in Verb. zerfällt sofort (vgl. SCHLENK u. WEICKEL, Ber. Dtsch. Chem. Ges. **44**. 387 [1911]) infolge intramolekularer Oxydation u. Red. in $\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_2\text{OH}$ u. $\text{C}_6\text{H}_5\text{CHO}$, die beide isoliert werden konnten. II wird zu $\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_2\text{OH}$ hydrolysiert, III erleidet wie schon BECKMANN u. PAUL (LIEBIGS Ann. **266**. 25 [1891]) gezeigt haben, Hydrolyse zu *Hydrobenzoin*, das Vf. jedoch nicht isolieren konnte. Die genannten Reaktionen sind die primären Vorgänge bei der Einw. von Na auf $\text{C}_6\text{H}_5\text{CHO}$; in Wirklichkeit verläuft die Umsetzung komplizierter. I kann als Alkoholat auch reduzierend wirken, in Ggw. von $\text{C}_6\text{H}_5\text{CHO}$ wird dieses daher zu $\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_2\text{OH}$ red., während I selbst hierbei in V übergeht. Durch Einw. von Na auf den gebildeten Benzylalkohol entstehen weiter Natriumbenzylat u. H, der entweder $\text{C}_6\text{H}_5\text{CHO}$ oder als dreiwertige C-Radikal red. — V wird durch W. hydrolysiert zu dem ungetrennten Glykol Va, das sich sofort in *Benzoin* (Vb) umlagert u. nachgewiesen werden konnte. CLAISEN (Ber. Dtsch. Chem. Ges. **20**. 649 [1887]) hat gezeigt, daß Na-Benzylat größere Mengen $\text{C}_6\text{H}_5\text{CHO}$ in *Benzylbenzoat* überführen kann; dieser Ester wurde bei den vorliegenden Unterss. ebenfalls isoliert. Ferner wurden, in Bestätigung der Befunde von KAMM u. MATTHEWS (Journ. Amer. Pharm. Assoc. **11**. 93 [1923]. I. 1497) *Benzyläther* u. $\text{C}_6\text{H}_5\text{COONa}$ erhalten. — Einw. von 2 Na auf 1 Mol. $\text{C}_6\text{H}_5\text{CHO}$ führt zur B. von II; 2 Mol. hiervon u. 1 Mol. $\text{C}_6\text{H}_5\text{CHO}$ bilden III + $\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_2\text{OH}$; aus III wird bei der Hydrolyse *Hydrobenzoin* erhalten. — ACREE (Amer. Chem. Journ. **29**. 601 [1903]) hat gefunden, daß $\text{C}_6\text{H}_5\text{COOC}_2\text{H}_5$ + $\text{Na} + \text{C}_6\text{H}_5\text{Br}$ *Triphenylcarbinol* bilden, diese Verb. entsteht auch (vgl. FREY, Ber. Dtsch. Chem. Ges. **28**. 2520 [1895]) aus $\text{C}_6\text{H}_5\text{CHO}$, $\text{C}_6\text{H}_5\text{Br}$ + Na. Vf. erklärt die B. des Carbinols folgendermaßen: Es entsteht zunächst I, danach II; 2 Mol. hiervon reagieren mit $2\text{C}_6\text{H}_5\text{Br}$ unter B. von VI, das als Alkoholat $\text{C}_6\text{H}_5\text{CHO}$ red. u. sofort in VII übergeht; durch Einw. von Na geht VII in VIII, dieses mit $2\text{C}_6\text{H}_5\text{Br}$ in IX über, das durch W. zu Triphenylcarbinol (X) hydrolysiert wird. Wird VI aus Benzhydrol + Na dargestellt u. in Ä. mit $\text{C}_6\text{H}_5\text{CHO}$ zur Rk. gebracht, so erhält man $\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_2\text{OH}$ u. eine kleine Menge der dimolekularen Form von VII, die nicht als Benzopinakol, sondern als α -Benzopinakolin isoliert werden konnte. Für die B. von X ist demnach die B. von II maßgebend; ist ihre Entstehung aus I aus irgend einem Grunde nicht möglich, so treten die vorher beschriebenen Rkk. zwischen I u. $\text{C}_6\text{H}_5\text{CHO}$ ein. — Die B. von X aus $\text{C}_6\text{H}_5\text{CO}_2\text{C}_2\text{H}_5$ oder $\text{C}_6\text{H}_5\text{CHO}$ (oder $\text{C}_6\text{H}_5\text{COOC}_6\text{H}_5$) + $\text{C}_6\text{H}_5\text{Br}$ + Na hat NEF (LIEBIGS Ann. **308**. 291 [1899]) so erklärt, daß

zunächst Phenylnatrium bildet, das sich mit dem Ester etc. zu X umsetzt. Es
falls Phenylnatrium tatsächlich gebildet wird, dann *Diphenylcarbinol* ent-
eine Verb., die Vf. nur in einem Falle in ganz geringer Menge bei Einw.
auf $C_6H_5CHO + C_6H_5Br$ erhielt. Daß der vom Vf. angegebene Mechanis-
der Rk. richtig ist, ergibt sich daraus, daß, wenn statt C_6H_5Br *p*-Bromtoluol
oder α -Bromnaphthalin angewandt werden, in jedem Falle außer *Diphenyltolyl-*
carbinol bezw. *Diphenyl- α -naphthylcarbinol* auch $C_6H_5CH_2OH$ entstand.




Versuche. Rk. zwischen $1 C_6H_5CHO + 1 Na$. Es wird in N_2 -Atmosphäre
titet. 42 g $C_6H_5CHO + 9,2$ g Na-Draht in 150 cem absol. Ä. Na wird all-
im Laufe von 2 Stdn. zugegeben. Es bildet sich dabei schließlich ein
Nd. von I; nach 48-std. Stehen bei Zimmertemp. wird die M. in 24 g Essig-
+ 60 g Eis unter Rühren gegossen (N_2 -Atmosphäre); aus der äth. Schicht
isoliert durch fraktionierte Dest.: *Benzylalkohol*, *Benzoessäure*, *Benzyläther*,
Benzoylchlorid, *Benzoat*, *Benzoïn* (durch Überführung in Benzilsäure identifiziert). — Rk.
zwischen $1 C_6H_5CHO$ u. $2 Na$: Nach 8-std. Schütteln in N_2 -Atmosphäre war kein
mehr nachweisbar; das tiefgrüne Additionsprod., das sich abgeschieden
gab bei der Hydrolyse *Benzylalkohol* u. *Hydrobenzoïn*, aus A., F. 134° . —
zwischen $C_6H_5CHO + Na + C_6H_5Br$: 21 g Na (= 7 Atome) in 150 cem Ä.
mit 42 g C_6H_5CHO versetzt; nach 10 Min. werden 83 g (= 4 Mol.) C_6H_5Br
geen u. geschüttelt; es entsteht bald ein tiefblauer Nd., der allmählich dunkel-
ird; nach 24-std. Stehen wird in Essigsäure-Eismischung gegossen, wodurch
T. sofort farblos wird; aus der äth. Schicht wurden isoliert: *Benzylalkohol*,
Diphenylcarbinol u. *Benzoïn*. — Rk. zwischen $C_6H_5CHO + Na + p$ -Brom-
toluol: 16 g Na in 120 cem Ä. + 32 g C_6H_5CHO werden nach kurzer Zeit mit
p-Bromtoluol versetzt; nach 24-std. Stehen Hydrolyse; isoliert wurden: *Benzyl-*
carbinol u. *Diphenyl-p-tolylcarbinol*, identifiziert als *p*-Carboxytriphenylcarbinol, F. 198
 $^\circ$. — Aus $C_6H_5CHO + Na + \alpha$ -Bromnaphthalin wurden analog erhalten:
Diphenyl- α -naphthylcarbinol, identifiziert als *Phenylchrysofluoren*,
F. 195° . (Journ. Americ. Chem. Soc. 46. 2560—71. 1924. Ann Arbor [Mich.],

HABERLAND.

V. R. Orndorff und W. R. Barrett, *i*-Phenolphthalein und einige seiner
Verbindungen. Das zunächst als Nebenprod. bei der fabrikmäßigen Herst. von Phenol-
naphthalin isolierte Prod., das Vf. als *i*-Phenolphthalein bezeichnen, ist ein *o,p*-Dioxy-
phenolphthalid; daß ein OH *o*-, das andere *p*-ständig zum Methan C-Atom steht,

$\text{C}_{13}\text{O}_3\text{N}(\text{COC}_6\text{H}_5)_2$, aus Aceton weiße Nadeln, F. 255° ; wl. in $\text{CH}_3\text{CO}_2\text{C}_2\text{H}_5$ u. Ä., n. in Lg., wird durch k. verd. Alkali nicht angegriffen. — *Tribenzoat*, $\text{C}_{20}\text{H}_{12}\text{O}_3\text{N}(\text{C}_6\text{H}_5)_3$, aus Aceton F. 220° , wl. in Ä., unl. in Lg. — *i-Phenolphthaleinoxim*, $\text{C}_{20}\text{H}_{15}\text{O}_4\text{N}$, bei 160° schwarz werdend, Schmelze beginnt bei 180° , bei 198° ist eine schwarze Fl. gebildet; ll. in A., Essigsäure, Aceton u. Ä., unl. in Bzl.; Lsgg. in Alkali u. H_2SO_4 gelb. — *i-Phenolphthaleinhydrazid*, $\text{C}_{20}\text{H}_{16}\text{O}_3\text{N}_2$, h. konz. Lsgg. in $\text{NH}_2\cdot\text{NH}_2\cdot\text{H}_2\text{O} + i\text{-Phenolphthalein}$ sind anfangs blau, dann grün u. schließlich weiß; diese geben mit W. verd. farblose Krystalle; aus A. umkrystallisiert werden diese bei ca. 210° rot, dann dunkel u. schm. bei $225\text{--}235^\circ$; wl. in $\text{CH}_3\text{CO}_2\text{C}_2\text{H}_5$ u. Ä. swl. in Ä. Chlf., Lg. — *Tribenzoat des Hydrazids*, $\text{C}_{20}\text{H}_{13}\text{O}_3\text{N}_2(\text{COC}_6\text{H}_5)_3$, aus Aceton Nadeln, F. $121\text{--}123^\circ$, unl. in Lg. u. Alkali, sonst ll. in organ. Mitteln. — *i-Phenolphthaleinhydrazid*, $\text{C}_{20}\text{H}_{16}\text{O}_3\text{N}_2$, aus Aceton farblose Krystalle, bei 120° rötlich, nach schwarz werdend, F. $255\text{--}265^\circ$, l. in k. verd. Alkali ohne Farbe; *Tribenzoat*, $\text{C}_{20}\text{H}_{13}\text{O}_3\text{N}_2(\text{COC}_6\text{H}_5)_3$, aus Aceton F. $181\text{--}183^\circ$, unl. in PAe., durch k. verd. Alkali in Ä. Veränderung; *Triacetat*, $\text{C}_{20}\text{H}_{13}\text{O}_3\text{N}_2(\text{COCH}_3)_3$, aus Aceton Nadeln, F. $199\text{--}202^\circ$. — *Tetrabromisphenolphthalein*, $\text{C}_{20}\text{H}_{10}\text{Br}_4\text{O}_4$, aus A. + Ä. Nadeln, F. $277\text{--}279^\circ$, wl. in A., Ä., CH_3COOH u. Bzl.; Lsgg. in 0,01-n. Alkali sehr schwach gelblich, in 0,1-n. Alkali schwach grün, diese Färbung verschwindet schnell; in 1-n. Alkali farblos. *Diacetat des Tetrabromids*, $\text{C}_{20}\text{H}_8\text{O}_4\text{Br}_4(\text{COCH}_3)_2$, aus Essigsäure Nadelaggregate, F. 235° , wl. in Ä. u. Bzl., unl. in Ä. — *Dinatriumsalz des Tetrabromids*, 2 g des Tetrabromids in 100 ccm A. werden mit überschüssiger $\text{C}_2\text{H}_5\text{ONa}$ -Lsg. versetzt, beim Abkühlen wird die grüne Lsg. farblos, es bildet sich ein weißes Krystallpulver ab: Trinatriumsalz der Carbinolsäure, $\text{C}_{20}\text{H}_8\text{O}_5\text{Na}_3$ (I), das beim Stehen über H_2SO_4 übergeht in das grüne Dinatriumsalz (II), das nach zweitägigem Stehen an feuchter Luft in eine rotbraune Paste übergeht. — *Tetraiod-i-phenolphthalein*, $\text{C}_{20}\text{H}_{10}\text{O}_4\text{I}_4$, aus Aceton Nadeln; bei 260° gelb werdend, F. $277\text{--}279^\circ$ zu brauner Fl. unter Jodentw.; swl. in organ. Mitteln; Lsg. in Aceton wird infolge Abscheidung von Jod bald braun; mit NaOH entfärbt wird die Verb. grün, durch Zugabe von W. oder mehr Alkali verändert die Farbe. — *Diacetat des Tetraiodids*, $\text{C}_{20}\text{H}_8\text{I}_4\text{O}_4(\text{COCH}_3)_2$, aus Eg. Nadeln, F. 144° , ll. in Aceton, wl. in A., CH_3COOH , Ä. u. CH_3OH . — *Dihydro-i-phenolphthalein*, $\text{C}_{20}\text{H}_{16}\text{O}_4$ (III), durch Red. von Isphenolphthalein mittels St.-Staub + Essigsäure in der Siedehitze, bis eine Probe mit verd. NaOH keine Färbung gibt; Essigsäure F. $189\text{--}190^\circ$; l. in Alkali ohne Farbe, beim Kp. oder Stehen rot werdend; ll. in h. A., CH_3OH , Essigsäure u. Aceton; *Diacetat*, $\text{C}_{20}\text{H}_{14}\text{O}_4(\text{COCH}_3)_2$, in verd. CH_3COOH F. $143\text{--}144^\circ$, unl. in verd. Alkali. — *p-Oxytriphenylmethan-essigsäure*, $\text{C}_{20}\text{H}_{16}\text{O}_3$, aus i-Phenolphthalein neben III bei Red. mit Zn + HCl in Essigsäure-Lsg.; aus A. Nadeln, F. $210\text{--}211^\circ$; *Acetat*, $\text{C}_{20}\text{H}_{15}\text{O}_3(\text{COCH}_3)$, aus verd. Essigsäure Nadeln, F. 148° , ll. in organ. Mitteln.



$\text{O}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{C}-\text{C}_6\text{H}_4\text{OH}$ (p)

III $\text{C}_6\text{H}_4\text{COOH}$ (o)

findes: in absol. A. gibt a zwei Banden von gleicher Intensität bei den


Die von S. Alice McNulty angestellte Unters. der Absorptionsspektren von Phenolphthalein (a) u. i-Phenolphthalein (b) ergab

Frequenzen 35230 u. 36130; die Kurve von *b* ist der von *a* ähnlich, es zeigen sich zwei Banden bei 35110 u. 36060. In konz. H_2SO_4 : *a* fünf Banden bei 25250, 30850, 35550 u. 38750. *b* hat ebenfalls fünf Banden, die jedoch weniger intensiv sind: die Bande bei 22250 ist nur $\frac{1}{120}$ so stark wie die bei 20250; die übrigen 4 Banden sind bei 20000, 23500, 35000 u. 38500. 33%ig. KOH geben *a* u. *b* ähnliche Kurven mit je 2 Banden: *a* bei 33840650, letztere fünfmal so intensiv wie erstere, *b* bei 34000 das intensive 41150, das weniger intensiv ist als die entsprechenden Banden von *a*. (J. Amer. Chem. Soc. **46**. 2483—97. 1924. Ithaca [N. Y.], CORNELL Univ.) HAR

N. D. Zelinsky und P. Borissow, Über *bicyclo*-[0,3,4]-Nonan und dessen Verhalten bei der Dehydrogenisationskatalyse. Dieses von EIJKMAN (Chem. Weekblad **7**; C. **1903**. II. 989) aus Hydrinden erhaltene Indenoktahydrid konnte von Vff. direkt aus Inden durch 2maliges Überleiten über 30%ig. palladierten Asbest in H_2 -Atmosphäre völlig rein erhalten werden, $K_{p,785}$ 163,5—164,5°, $D_{15,5}^{15,5}$ 0,98, $n_D^{15,5}$ = 1,4711. Dehydrogenierung sowohl mit palladiertem Asbest als auch mit nickeliertem Tonerdehydrat (vgl. ZELINSKY u. KOMAREWSKY, Ber. Dtsch. Chem. Ges. **57**. 667; C. **1924**. I. 2407) bei ca. 300° führte, wie erwartet war, unter alleiniger Inangriffnahme des hexahydroaromat. Kernes zu Indentetrahydrid-1,2,8,9(bicyclo-[0,3,4]-Nonadien-2,4), C_9H_{12} , $K_{p,757}$ 171—172°, $D_{16,5}^{16,5}$ = 0,9274, $n_D^{16,5}$ = 1,53. Wurde die Dehydrogenierung mit dem Ni-Katalysator aber bei 320—325° ausgeführt, so wurde der Pentamethylenring gesprengt u. resultierte ein Katalysat vom K 8 bis 120°, bei dessen Fraktionierung Benzol, Toluol u. vielleicht *o*-Xylol sich ergaben. Durch diesen Katalysator erfolgt derartige Spaltung auch schon bei 300—310°, an die Dämpfe mehrmals über ihn geleitet werden. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. **57**. 2060—61. 1924. Moskau, I. Univ.) SPIEG.

K. Ziegler, H. Grabbe und F. Ulrich, Über den Verlauf der Dimerisation des Triphenylallens. (IV. Mitteilung über mehrfach arylsubstituierte Vinylcarbinole und ihre Derivate. (III. vgl. ZIEGLER, LIEBIGS Ann. **434**. 34; C. **1924**. I. 45.) N. ZIEGLER u. OCHS (Ber. Dtsch. Chem. Ges. **55**. 2260; C. **1922**. III. 1130) festgestellt haben, besitzt die von K. H. MEYER u. SCHUSTER (Ber. Dtsch. Chem. Ges. **55**. 815; C. **1922**. I. 1142) als Triphenylallen angesprochene Verb. das doppelte mol. Gew. Es ist jetzt gelungen, Konst. u. Bildungsmechanismus dieses „dimeren Allens“ vom F. 210° aufzuklären. Es entsteht glatter als aus Diphenylstyrylcarbinol aus dem isomeren 1,3,3-Triphenylallylalkohol, $(\text{C}_6\text{H}_5)_2\text{C}:\text{CH}\cdot\text{CH}(\text{OH})\cdot\text{C}_6\text{H}_5$, bei K. mit Eg. u. einer Spur Mineralsäure. Danach muß in der Tat die Abspaltung von H_2O zunächst zum Triphenylallen führen u. dieses sich weiter dimerisieren. Bei Red. des dimeren Allens $\text{C}_{42}\text{H}_{32}$ mit HJ tritt unter Aufnahme von 4 H wieder Zf. in die einfachere Verb. $\text{C}_{21}\text{H}_{18}$ ein, die aber von dem bei Red. des Triphenylallens zu erwartenden, auf anderem Wege hergestellten 1,1,3-Triphenylpropan durchaus verschieden ist u. sich als ident. mit 1,3-Diphenylhydrinden, durch gelinde Red. von 1,3-Diphenylindens (vgl. CZENSNY, Diss., Halle 1912) leicht erhältlich, erwies. So mit ist das „dimere Allen“ ein Indenderiv., Bis-[1,3-diphenylinden], also Tetraphenyltruxan (IV. oder V.), dessen Tetramethylenring bei der Red. mit HJ aufgespalten wurde. Für seine B. dürfte die vorherige Umlagerung von Triphenylallen in 1,3-Diphenylinden nicht in Betracht kommen, da dieses auf keine Weise in das dimere Truxinderiv. übergeführt werden konnte. Es muß vielmehr zunächst Olymerisation des Triphenylallens (I.) zu einem Cyclobutanderiv. (II. oder III.) erfolgen u. nachher erst der doppelte Indenringschluß. Die von ZIEGLER u. OCHS. c. aus Di-*p*-anisylstyrylcarbinol u. 9-Styrylaxanthenol durch Kochen mit Säure erhaltenen Substanzen müssen dem Tetraphenyltruxan analoge Formeln haben. Es wurde versucht, das monomere Triphenylallen durch möglichst vorsichtige Behandlung des Triphenylallylalkohols mit P_2O_5 herzustellen, dabei entstand aber

in geringen Mengen Tetraphenyltruxan hauptsächlich 1,3-Diphenylinden (VI). Wenig gelang die Darst. aus dem 1,3,3-Triphenylallylchlorid. Diese bei Zimmertemp. recht beständige, durch große Beweglichkeit des Cl ausgezeichnete Verb. geht bei 90° unter stürm. Abgabe von HCl in Tetraphenyltruxan über. Mit Pyridin oder Chinolin gibt sie in W. l. Additionsprodd., die sowohl gegen W. wie gegen Hitze recht beständig sind. Einw. von alkoh. Alkali auf das Chlorid führt nicht zum Ziele, da schon mit CH₃O allein der Methyläther des Triphenylallylkohlols entsteht. Schließlich wurde versucht, substituierte Triphenylallene an den früher (vgl. ZIEGLER, Ber. Dtsch. Chem. Ges. 54. 3003; C. 1922. I. 348) beschriebenen Diarylstyrylmethylperchloraten zu gewinnen nach Analogie des Verh. der Tetraarylallylperchloraten. Aber jene bilden wiederum sehr beständige Pyridiniumsalze, bei deren schließlicher Spaltung nur geringe Mengen der entsprechenden Truxane isoliert werden konnten.



Versuche. 1,3,3-Triphenylallylkohlol-(I), C₂₁H₁₈O, aus der Mg-Verb. aus Diäthylvinylbromid u. Benzaldehyd, Krystalle (aus Chlf. + PAe. oder aus viel Bzn. K. ca. 100°), F. 77—78°, in konz. H₂SO₄ zu tiefgelbem Sulfat l. — Bis-[1,3,3-triphenylallyl]-äther, C₄₂H₃₄O, aus dem vorigen durch Spuren Säure, würfelförmige Krystalle (aus Chlf. + PAe.), F. 156°. — 1,3,3-Triphenylallylmethyläther, C₂₂H₂₀O, Krystallbüschel (aus Aceton oder aus Bzl. + CH₃O), F. 97—98°. Zu allen weiteren Vers. ebenso wie der Alkohol verwendbar. — 1,3,3-Triphenylallylchlorid, C₂₁H₁₇Cl, aus dem Alkohol oder den vorherbeschriebenen Äthern in absol. Ä. mit HCl unter Kühlung, Krystalle, F. 90° (Rotfärbung u. Schäumen). — 1,3-Diphenylinden. Die Angaben von CZENSNY (l. c.) bzgl. Darst. aus 3-Phenylhydrindon u. C₆H₅MgBr sind dahin berichtet, daß das unter 15 mm bei 230° übergehende Öl bei Anwesenheit mit etwas Eg. sofort erstarrt u. 60—70% der Theorie an kristallisiertem Diphenylinden liefert. F. 71—72°. Gegen Säuren sehr beständig. — 1,3-Diphenylinden, C₂₁H₁₈, Nadeln (aus Bzl. u. CH₃O), F. 156—157°. — 1,1,3-Triphenylallylkohlol-(I), C₂₁H₂₀O, aus C₆H₅Br, Mg u. Hydrozimtsäureäthylester, Nadelchen (aus Bzn.), F. 88°, ll. in A., Ä. u. Bzl., wl. in PAe. — 1,1,3-Triphenylpropen-(I), C₂₁H₁₈, aus dem vorigen durch Kochen mit (C₂H₅O)₂O, Krystalle (aus A.), F. 31—32°, mp 225°. (Das von PATERNO u. CHIEFFI [Gazz. chim. ital. 39. II. 429; C. 1910. 33] aus einem ebenfalls bei 88° schmelzenden Triphenylpropylalkohlol erhaltene Triphenylpropen [F. 87—89°], scheint ident. mit dem von Vff. aus dem Einwirkungsgang von 2 Mol. C₆H₅MgBr auf Hydratropasäureester durch Kochen mit (C₂H₅O)₂O erhaltenen 1,1,2-Triphenylpropen-(I), F. 86—87°. Ihr Alkohol müßte danach 1,1,2-

Triphenylpropylalkohol-(1) sein.) — 1,1,3-Triphenylpropan-(1), $C_{21}H_{20}$, aus dem vo mit Na + A., Krystalle (aus CH_4O), F. 46–47°. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 57. 1889 bis 1990. 1924. Marburg, Univ.)

Alvin S. Wheeler und **Mildred Morse**, *Die Chlorierung von 2-Amino-p-xylo* und einige neue Azofarbstoffe. 5-Chlor-2-amino-p-xylo wird als Acetylderiv. erh. wenn 2-Acetamido-p-xylo in der Kälte mit Cl_2 bis zum Auftreten der gelben Irb behandelt wird; die Verb. entsteht auch nach der von CHATTAWAY u. O. (Journ. Chem. Soc. London 75. 1080 [1889]) beschriebenen Methode mittels $Ca + CO_2$. Daß Cl in 5-Stellung sitzt, wurde nachgewiesen durch Überführen Verb. in Dichlorxylo u. dessen Oxydation zu 2,5-Dichlorterephthalsäure. Da azotierte Chlorxyloidin kuppelt mit Phenolen zu Farbstoffen, die Wolle u. Seide mercerisierte Baumwolle weniger gut färben. Keine Kupplung trat ein mit p-Chlorphenol, o- u. p-Nitrophenol, 2,4-Dinitrophenol, p-Kresol, Hydrochinon, Iro gallol u. Carvacrol.



Versuche. 5-Chlor-2-acetamido-p-xylo, $C_{10}H_{12}ONCl$, aus sd. 50%ig. A. viB Tafeln, F. 176°. — Chlorhydrat des 5-Chlor-2-amino-p-xylo, $C_8H_{11}ONCl_2$, viB Nadeln, beim Erhitzen sublimierend; freie Base, aus sd. W. Tafeln, F. 93°. — 5-Chlor-2-acetamido-p-xylo, $C_{10}H_{11}ONCl_2$, dargestellt durch Chlorieren bei 18–20° aus sd. 50%ig. A. weiße Schuppen, F. 167°. — 4(5'-Chlor-2'-p-xylylazo)phenol, $C_{14}H_{13}ONCl$, aus h. Eg. braungelbe Nadeln, F. 223°. — 4(5'-Chlor-2'-p-xylylazo)resorcin, $C_{14}H_{13}O_2Cl$, aus h. Bzl. orangefarbene Nadeln, F. 200–220°. — 2,6-(5'-Chlor-2'-p-xylylbisazo)tho $C_{26}H_{28}ON_4Cl_2$, aus h. Bzl. dunkelbraune Nadeln, F. 290°. — 4-(5'-Chlor-2'-p-xylyzo) 1-naphthol, $C_{18}H_{15}ON_2Cl$, aus h. A. dunkelrote Nadeln, F. 163–164°. — 1-(5'-Chlor-2'-p-xylylazo)-2-naphthol, $C_{18}H_{15}ON_2Cl$, aus h. A. scharlachrote Nadeln, F. 161°. — 1-(5'-Chlor-2'-p-xylylazo)-2-naphthol-6-sulfonsäure, $C_{18}H_{15}O_4N_2ClS$, aus h. A. ot Nadeln, F. über 360°. Ausfärbungen dieser Farbstoffe auf Wolle, Seide u. me rierter Baumwolle vgl. Original. (Journ. Americ. Chem. Soc. 46. 2572–76. 24 Chapel Hill [Nord Carol.] Univ.)

HABERLAI.

N. D. Zelinsky, *Über die Isomerisation des Dekahydronaphthalins*. (Vorläg Mitteil.) Vf. hält für möglich, einen mit einem Methylpentamethylenring m binierter Hexamethylenring durch Isomerisation von Dekahydronaphthalin zu gewinnen. Ein nach der Mol.-Refr. von den beiden Dekahydronaphthalinen er schiedener *KW-stoff* $C_{10}H_{18}$ wurde in Verss. mit **M. Gawedowskaja** durch Be handlung eines gegen Alkali beständigen Chlornaphthans mit rauchender H be 250° erhalten. Monochlornaphthan, $C_{10}H_{17}Cl$, aus Dekalin durch Chlorieren, p 114–116°, $D_{21.5}^{21.5} 1,0588$, $n_D^{21.5} = 1,5121$. Bei Erwärmen dieses Prod. mit aoh KOH auf Wasserbad wurde in 8 Stdn. nur aus $\frac{1}{4}$ desselben HCl abgespalten (te B. eines als Naphthen bezeichneten *KW-stoffs* $C_{10}H_{16}$, Kp. 195–196°, $D_{23}^{23} 0,84 n_D^{23} = 1,4965$, der mit dem cis-Dekalen von EISENLOHR u. POLENSKE (Ber. I ch Chem. Ges. 57. 1642; C. 1924. II. 2399) verwandt ist. Der aus dem beständig Chlor naphthan gewonnene *KW-stoff* $C_{10}H_{18}$ (vgl. oben) hat in der Hauptn Kp.₇₄₃ 185–187°, $D_{22}^{22} 0,8681$, $n_D^{22} = 1,4687$. Das Isomerisationsprod. ist mögli er weise im techn. Dekalin neben cis- u. trans-Dekalin enthalten. (Ber. Dtsch. Cam Ges. 57. 2062–63. 1924. Moskau, I. Univ.)

SPIEGL.

Max Phillips, *Die Darstellung von Methyl-i-propylanthrachinon*. Durch on densation von Phthalanhydrid mit p-Cymol in Ggw. von $AlCl_3$ wurde Cymolbeoe säure (I oder II) erhalten. Der entstandenen Säure kommt wahrscheinlich Koit.






da bei anderen Substitutionen des p-Cymols der Substituent in o-Stellung zu tritt. Mit konz. H_2SO_4 geht I unter Ringschluß in 1-Methyl-4-isopropylanthrachinon über.

Versuche. Cymoylbenzoesäure, $\text{C}_{18}\text{H}_{18}\text{O}_3$ (I bzw. II), aus Bzl. Prismen, F. 124°; Ag-Salz, $\text{C}_{18}\text{H}_{17}\text{O}_3\text{Ag}$. — 1-Methyl-4-i-propylanthrachinon, $\text{C}_{18}\text{H}_{16}\text{O}_2$, aus A. Nadeln, F. 113,8° (korrr.). — Methyl-i-propylanthracenpikrat, $\text{C}_{18}\text{H}_{15}\text{C}_6\text{H}_3(\text{NO}_2)_3\text{O}$, nach Erhitzen des vorigen mit $\text{NH}_4\text{OH} + \text{Zn}$ -Staub bis die anfangs rote Lsg. farblos geworden ist; Extrahieren des Filtrerrückstandes mit sd. A., Zugabe von konz. Pikrinsäurelsg.; braune Nadeln, F. 131° (korrr.). — Dinitromethyl-i-propylanthrachinon, $\text{C}_{18}\text{H}_{14}\text{O}_6\text{N}_2$, aus 5 g des Anthrachinons in 30 ccm konz. H_2SO_4 durch Zugabe von 12 g HNO_3 (D. 1,4) + 12 g H_2SO_4 (D. 1,84) u. $\frac{1}{2}$ -stdg. Erhitzen auf Wasserbad; aus Essigsäure gelbe Nadeln, F. 232° (Zers.). — Anthrachinon-1,4-dicarbonsäure, durch Erhitzen mit HNO_3 (D. 1,1) im Rohr auf 210–220°; aus A. Nadeln, F. 315–316° (Zers.), hieraus mittels $\text{NH}_4\text{OH} + \text{Zn}$ Anthracen-1,4-dicarbonsäure, aus A. Nadeln, F. 320° (Zers.). (Journ. Americ. Chem. Soc. 46. 2533–36. 1924. Washington, Dep. of Agric.)

HABERLAND.

TIFFENEAU, A. ORECHOW und J. LÉVY, Isomerisierung von Äthylendioxyden unter Einwirkung. Mechanismus molekularer Umlagerungen. (Vgl. TIFFENEAU u. LÉVY, Journ. Soc. Chim. de France [4] 33. 735; C. 1924. I. 2246.) Trisubstituierte Äthylendioxyde vom Typus I gehen durch Wärme (Dest.) unter Semihydrobenzoinumlagerung in die entsprechenden Aldehyde (III) über u. zwar wird hierbei wahrscheinlich II als Zwischenprod. gebildet. Es folgt hieraus, daß die Wanderung des aromatischen Radikals nicht die erste Stufe der Umlagerung ist. Es wurden untersucht: a) Phenyl-2-methylpropylenoxyd (I, Ar = C_6H_5 , R = CH_3), das durch langsame Umlagerung in Phenyl-dimethylacetaldehyd (III, R = CH_3 , Ar = C_6H_5); Semi-








b) 1-Anisyl-2-methylpropylenoxyd (I, Ar = $\text{C}_6\text{H}_4\text{OCH}_3$, R = CH_3) dargestellt aus 1-Anisylmethylpropylen + Benzoesäure, Kp.₃₀ 150 bis 160° bei der Dest. unter gewöhnlichem Druck übergehend in Anisyl-dimethylacetaldehyd (III, Ar = $\text{C}_6\text{H}_4\text{OCH}_3$, R = CH_3), Semicarbazon F. 184°; derselbe Aldehyd entsteht auch aus Anisylphenyl-dimethylglykol. Zu Vergleichszwecken wurden dargestellt: 1-Phenyl-2-methylpropylenoxyd, Semicarbazon F. 212–213° u. 2-Anisylbutanon-3, Semicarbazon F. 159–160°. (C. r. d. l'Acad. des sciences 1977–80. 1924.)

HABERLAND.

LENNY GILMAN und CLARENCE C. VERNON, 2-Chlormethylfuran aus 2-Furanol. 2-Chlormethylfuran wurde dargestellt, indem äth. Lsgg. des Carbinols in eine Kältemischung mit SOCl_2 oder HCl -Gas behandelt wurden; um bei letzterem die gebildete W. zu entfernen, wird der Lsg. CaC_2 zugesetzt. Eine Reinigung der Verb. durch Vakuumdest. war nicht möglich, da schon bei ca. 30° starke Zersetzung eintrat. Äth. Lsgg. sind, im Eisschrank aufbewahrt, einige Tage unverändert haltbar. Identifiziert wurde die Verb. durch Überführen in den Äthylacetaldehyd des 2-Furancarbinols, Kp.₂ 67°, Kp. 148–150°, D.₂₀ 0,9888, $n_D^{20} = 1,4316$. (Journ. Americ. Chem. Soc. 46. 2576–79. 1924. Ames [Iowa], State Coll.) HAB.

LÖWENBEIN und H. SIMONIS, Über die Enolate der o-Oxydiphenyllessigsäure. (Mitbearbeitet von H. LANG und W. JACOBUS.) In den durch Kondensation von Phenolen mit Mandelsäure, besser mit Benzaldehydcyanhydrin leicht gebildeten o-Oxydiphenyllessigsäurelactonen (I) ist 1 H glatt durch Alkalimetall ersetzbar. Die entstehenden Alkaliverb. leiten sich von der Enolform des Lactons, nicht Phenyl-2-oxycumaron (II) ab. Die leichte Enolisierung des Lactons zeigt



sich auch bei Einw. von Organomagnesiumverbb., die heftig reagieren, bei üblicher Aufarbeitung aber nur unverändertes Ausgangsmaterial u. z. B. bei Verwendung von CH_3MgJ annähernd die berechnete Menge CH_4 liefern. Sie verhalten sich viel leichter als diejenige des Diphenylessigesters (vgl. STAUDINGER u. M. HELV. chim. Acta 5. 656; C. 1923. I. 418), das Enolat des Diphenylessigesters (WISLICENUS u. MOCKER, Ber. Dtsch. Chem. Ges. 46. 2772; C. 1913. II. 1804) zwischen den Enolaten des vorgenannten u. des Oxydiphenylessigsäurelactons. Na-Enolate der o-Oxydiphenylessigsäurelactone sind sehr reaktionsfähig. Mit Halogenverbb. reagieren sie glatt unter B. von Verbb. des Typus III., indem solchen, die durch Kondens. der Atrolactinsäure mit Phenolen entstehen, in alkoh. Laugen zu den zugehörigen o-Oxysäuren aufgespalten, die durch Säuren in die Lactone III. zurückverwandelt werden, u. mit $\text{C}_6\text{H}_5\text{MgBr}$ unter B. von Verbb. vom Typus eines α -Cumarans (IV.) reagierend. Von sonstigen Reaktionen der Lactonenolate wird besonders das durch Einw. von J entstehende o,o'-Diphenyl-tetraphenylbernsteinsäurebis-lacton (V.) hervorgehoben, das, an sich farblos, in h. h. Lösungsm. bei Temp. über 100° blau wird, die Färbung bei weiterem Erhitzen vertieft, bei Abkühlen wieder verliert (Radikaldissoziation). Wie o-Oxydiphenylessigsäurelacton verhalten sich seine aus p-Kresol bzw. β -Naphthol hergestellten Homologen.



maranyl-(3,3'), $C_{30}H_{22}O_4$, F. unscharf 190—195°, Löslichkeit u. Verh. der Lsgg. beim vorigen. — *3-Äthyl-3-phenylcumaranon*-(2), $C_{16}H_{14}O_2$, Krystalle (aus A.), F. 2°. — *5-Methyl-3-äthyl-3-phenylcumaranon*-(2), $C_{17}H_{16}O_2$, Würfel (aus verd. A.), F. 2°, ll. in den gewöhnlichen organ. Lösungsmm. — *3-Allyl-3-phenylcumaranon*-(2), $C_{14}H_{14}O_2$, flache Prismen (aus A.), F. 68°. — *5-Methyl-3-allyl-3-phenylcumaranon*-(2), $C_{16}H_{16}O_2$, Prismen (aus A. oder Lg.), F. 64°. — *3-Methyl-3-phenyl-4,5-benzocumaranon*-(2), $C_{19}H_{14}O_2$, Nadeln (aus A.), F. 119°, l. in den üblichen organ. Lösungsmm. — *3-Äthyl-3-phenyl-4,5-benzocumaranon*-(2), $C_{20}H_{16}O_2$, flache Prismen (aus A.), F. 143°, ll. in Ä., Bzl., Eg., weniger l. in k. A. u. Lg. — *3-Allyl-3-phenyl-4,5-benzocumaranon*-(2), $C_{21}H_{16}O_2$, Prismen (aus A.), F. 96°. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 72040—48. 1924. Berlin, Techn. Hochsch.)

SPIEGEL.

Gerald E. K. Branch und **H. E. Hudson Branch**, *Einwirkung von Halogenen auf Pyrrol unter Bildung gefärbter Lösungen*. Wird in absol. Ä. suspendiertes Natriumjodkalium mit einer äth. Jodlsg., oder eine Mischung von A., C_2H_5ONa u. Pyrrol in einer alkoh. Jodlsg. versetzt, so entsteht eine farblose Lsg. von Tetraiodpyrrol; dagegen festes J in beiden Fällen zugesetzt, so wird neben wenig Tetraiodpyrrol eine blaue Lsg. erhalten; beim Verdampfen, Stehen an Luft oder in H_2 -Atmosphäre, sowie beim Ansäuern erhält man aus der blauen Lsg. ein schwarzes Pulver; durch NO-Dämpfe werden die blauen Lsgg. farblos; vorsichtige Behandlung mit Säure, Waschen mit W. oder Zugabe von PAe. zu einer alkalifreien, durch C u. Ä. gekühlten Lsg. bewirkt Umschlag nach purpurrot; wird diese Lsg. alkalisch, so tritt wieder Blaufärbung ein. Eingießen der alkoh. Lsg. in W. führt zu einem schwarzen Nd., der bei sofortigem Schütteln mit Ä. teilweise gel. wird. Die Lsgg., die sich analog verhalten, werden auch gewonnen durch Einw. von J auf Pyrrol auf Pyrrol-MgJ oder auf Pyrrol-Hg-Verbb., ferner aus alkal. NaOBr-Lsg. + Pyrrol; bei dieser letzteren Rk. wurde eine purpurfarbene Verb. erhalten, die in purpurrote, in CS_2 eine blaue, in Aceton eine grüne Lsg. gab. Wird eine Mischung von Pyrrol + HgJ_2 in feuchtem Ä. mit äth. Jodlsg. versetzt (1 Atom J auf 1 Mol. Pyrrol), so entsteht unter Lsg. von HgJ_2 eine grüne Lsg.; weitere Zugabe führt zu schwarzem Nd.; wird in diesem Stadium etwas C_2H_5ONa zugegeben, können 2—3 weitere äquivalente J reagieren. Die mit wenig J erhaltene Lsg. wird durch NH_4OH -Zugabe blau, die durch mehr J erhaltenen grünen Lsgg. färben sich mit NH_4OH fleischrot; beide Lsgg. werden beim Ansäuern wieder grün. Zers. der grünen Lsgg. durch Stehen an Luft führt zu schwarzem Hg- u. J-haltigem Pulver. Schnelles Verdampfen der durch NH_4OH erhaltenen fleischroten Lsg. u. Waschen des HgJ_2 gibt ein anscheinend nicht vollständig zersetztes Prod., denn das schwarze Pulver ist teilweise l. in Ä. mit blauer Farbe, die mit Alkali in rot übergeht. — Analyt. Unterss. über das schwarze Pulver, das erhalten wird, wenn eine blaue alkal., alkoh. Lsg. mit W. versetzt wird, ergaben, daß für jedes einatomige Atom Jod 3 H entfernt werden. Die Verbrennung lieferte Zahlen, die auf $C_8H_7N_2O_2J$ deuteten; es ergab sich ferner, daß für jedes Atom J noch $1 O_2$ verbraucht ist. Für B. der blauen u. schwarzen Verb. nehmen Vff. auf Grund der folgenden Gleichungen an:




Die Best. des Wertes von n ist bisher nicht möglich gewesen. Die Eigenschaften der blauen Lsg. deuten eventuell auf das Vorliegen freier Radikale. Es ist jedoch auch denkbar, daß die blaue Verb. ähnlich wie Tripyrrol mit Hilfe der Doppelbindungen entstanden ist u. bei der Zers. Atome mit anormalen Valenzen bilden, die die Ähnlichkeit mit freien Radikalen erzeugen. (Journ. Americ. Chem. Soc. 46. 2469—74. 1924. Berkeley [Cal.], Univ.)

HABERLAND.

Adolf Sonn, Ernst Hotes und Horst Sieg, *Synthetische Versuche in Imidazolgruppe*. (Berichtigung.) In den früher (Ber. Dtsch. Chem. Ges. **57**. C. 1924. II. 470) beschriebenen chlorhaltigen Verbindungen ist „5-chlor-“ an „4-chlor-“ zu setzen. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. **57**. 2134. 1924.)

A. I. M. Kahil und M. Nierenstein, *Untersuchungen in der Chromanreihe* (I. vgl. GREENWOOD u. NIERENSTEIN, Journ. Chem. Soc. London **117**. 1594 1921. I. 622.) Nach unten stehenden Formeln wurde 2-Oxy-3-phenylchroman dargestellt u. dieses in 3-Oxy-3-phenylchroman (VIII) übergeführt.




Versuche. 2-Methoxydiphenylmethylchlorid, $C_{14}H_{11}OCl$, aus 2-Methoxydiphenylcarbinol (dargestellt nach STÖRMER u. FRIDERICI, Ber. Dtsch. Chem. Ges. **41** [1908], F. 141°) + $SOCl_2$ in Chlf.; aus Lg. sternartige Nadeln, F. 93°. — 2-Oxydiphenylphenyllessigsäure, $C_{15}H_{11}O_3$, aus vorigem in sd. Ä. durch $3\frac{1}{2}$ -std. Einleiten CO_2 in Ggw. von aktiviertem Mg; nach Verdampfen des Ä. Zers. durch Eiswasser + HCl; aus W. Nadeln, F. 176—177° (unter CO_2 -Entw.). — 2-Methoxydiphenylacetylchlorid, $C_{15}H_{13}O_2Cl$, aus vorigem in Chlf. + PCl_5 ; aus Lg. Nadeln, F. 6°. — 2-Methoxydiphenylmethylchlormethylketon, $C_{16}H_{15}O_2Cl$ (I), aus vorigem in Ä. — D. azomethan; aus Lg. Tafeln, F. 107°. — 3-Phenylchroman-2-on, $C_{15}H_{12}O_2$ (II), aus Bzl. + $AlCl_3$; aus Lg. Würfel, aus CS_2 Tafeln, F. 76°; II. in organ. Mischl. eine Suspension in konz. H_2SO_4 mit $FeCl_3$ versetzt gibt rotviolette Färbung; *Phenylhydrazon*, $C_{21}H_{18}ON_2$, aus A. gelbe Nadeln, F. 127—128°. — 2-Oxy-3-phenylchroman, $C_{15}H_{14}O_2$ (III), aus II + Acetanhydrid + Zn-Staub in sd. Wasserbad (8 Stdn.) danach Filtrat mit W. verd.; nach 24-std. Stehen erhaltener Nd. wird in Ä. u. einige Stdn. mit verd. H_2SO_4 erwärmt, erneut mit W. gefällt u. in NaOlg. u. durch Säure gefällt; aus Bzl. + Lg. (1:3) Nadeln, F. 87°; Suspension in konz. H_2SO_4 wird durch $FeCl_3$ rotviolett gefärbt, rote Farbe herrscht vor; *Acetylderiv.*, $C_{17}H_{16}O_3$, aus A. + Aceton Nadeln, F. 117°. — 2-Oxy-3-brom-3-phenylchroman, $C_{15}H_{13}O_2Br$ (IV), aus Bzl. Nadeln, F. 157—158°. — 2-Oxy-3-methoxy-3-phenylchroman, $C_{16}H_{16}O_3$ (V), aus IV durch 70-std. Kochen mit CH_3OH ; aus A. prismat. Nadeln, F. 127°; Färbung in H_2SO_4 -Suspension + $FeCl_3$ wie III; *Acetylderiv.*, $C_{18}H_{18}O_4$, aus V in Bzl. + $SOCl_2$; aus Lg. prismat. Nadeln, F. 84°. — 3-Methoxy-3-phenylchroman, $C_{16}H_{16}O$ (VII), aus VI in sd. Ä. + aktiviertem Mg; aus Chlf. Nadeln, F. 41°; nelab. entsteht ein in Chlf. unl. nicht näher unters. Prod. — 3-Oxy-3-phenylchroman, $C_{15}H_{14}O_2$ (VIII), aus vorigem in Bzl. durch Schütteln mit CH_3COCl (5 Stdn. in Chlf. Nadeln, F. 101—102°; Suspension in konz. H_2SO_4 + $FeCl_3$ gibt Vleckenfärbung; *Acetylderiv.*, $C_{17}H_{16}O_3$, aus A. Nadeln, F. 124—125°. (Journ. Americ. Chem. Soc. **46**. 2556—60. 1924. Bristol, Univ.)

HABERLAND.

A. E. Tschitschibabin, *Zur Tautomerie des α -Aminopyridins*. III. Mitt. *Bicyclische Derivate der tautomeren Form des α -Aminopyridins mit Imidazolderiv.* (II. vgl. Ber. Dtsch. Chem. Ges. **57**. 1168; C. 1924. II. 983.) Von den liden

lichen Hydantoinanalogen, dem 1,2-Divinylen-4-oxo-4,5-dihydroimidazol (= 2-Oxo-4,5-dihydropyrimidazol) (I. bzw. tautomere Formel II.) u. 1,2-Divinylen-5-oxodihydroimidazol (= 3-Oxo-2,3-dihydropyrimidazol) (III. bzw. tautomere Formel IV.) wurde I. auf 3 Wegen hergestellt: 1. Durch Einw. von Jod- oder Bromessigester auf α -Aminopyridin in alkoh. Lsg. (Ausbeute 20–30% der Theorie). — 2. Aus der tautomeren Form (VI.) des Pyridylglycins (V.), die sich bei Einw. von K- oder Chloracetat auf α -Aminopyridin in wss. Lsgg. bildet; der Ringschluß tritt hier ein bei Erwärmen der alkal.-wss. Lsgg. ein, besonders leicht aber in sauren Lsg. — 3. Bei Einw. von Chlor- oder Bromacetylchlorid auf α -Aminopyridin in wss. Lsgg. bei Ggw. von Pyridin entstehen mit guten Ausbeuten die Halogenacyl-derivate (VII.), die sich schon bei gelindem Erwärmen zu den Halogenhydraten von I. isomerisieren. Diese Darstellungsart spricht für die Auffassung von I. (II.) als tautomere Form der früheren Feststellungen (vgl. TSCHITSCHIBABIN u. BYLINKIN, Ber. Dtsch. Chem. Ges. 55. 999; C. 1922. I. 1193). Die Konst. VI. ist dadurch erwiesen, daß die betreffende Verb. bei Dest. CO₂ abspaltet unter B. von [*N*-Methyl- α -pyridon] (VIII.). — In I. ist der Imidazolring ungemein beständig. Mit Ätzalkalien entsteht ein salzartige Verbb., deren Struktur wahrscheinlich II. entspricht, durch C₆H₅·COCl je nach den Bedingungen 2 Monobenzoylverbb. (IX. u. X.) u. die Dibenzoylverbb. (XI.), letztere hauptsächlich nach SCHOTTEN-BAUMANN, dagegen in Ggw. von Pyridin IX., noch in Alkalien l., verhältnismäßig sehr beständig, leicht zu XI. überföhrbar, während X., in Alkalien ohne vorherige Verseifung unl., bei milderer Erwär. von C₆H₅·COCl nicht weiter reagiert. — Mit N₂O₃ liefert I. in guter Ausbeute die Isonitrosoverb. (XII.). I. ist sehr leicht oxydierbar, in alkal., besonders in ammoniakal. Lsgg. schon durch Luft-O₂, mit K₃Fe(CN)₆ fast quantitativ unter B. von Ammoniak. in W. u. anderen gewöhnlichen Lösungsmm. unl., in Säuren, in konz. u. NH₃-Fl. l. *Farbstoffs*, dessen saure u. alkal. Lsgg. rot mit blauem



Stich sind, wahrscheinlich von Konst. XIII. — Ein entscheidender Beweis dafür, daß I. nicht durch die Pyrindolformel (XIV.) ersetzt werden kann, ließ sich durch erbringen, daß auch reines α -Amino- β -picolin (XV.), dessen Struktur durch SEIDE (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 57. 1806; C. 1925. I. 86) erwiesen ist, die analogen bicycl. Verb. (XVI.) gibt. Ferner wurden auch aus β, β' -Dibrom- α -aminopyridin die entsprechende bicycl. Verb. (XVII.) u. der entsprechende Farbstoff erhalten. — Vgl. geht noch auf die Veröffentlichungen von REINDEL (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 57. 1381; C. 1924. II. 2158) u. SUCHARDA (Roczniki Chemji 3. 23. 1924. II. 659), die ihn zur Publikation seiner noch nicht abgeschlossenen Versuche veranlaßten, ein. REINDEL'S Erklärungen für die von ihm beobachteten Tatsachen werden als völlig unrichtig bezeichnet, u. auch SUCHARDA'S Verbb. müssen dem des Pyrimidazols sein.

Versuche. *Tautomeres α -Pyridylglycin*, $C_7H_8N_2O_2$ (VI.), schon von REINDEL (l. c.) erhalten, entsteht schon bei 75–85° u. erfährt bei langem Erwärmen auf 100° schon teilweise Ringschluß. Aus h. W. wasserfreie Blättchen, F. 249–250° (s. h. Zers.), bei niedrigeren Temp. in flachen Nadeln mit 1 Mol. H_2O . Gibt bei vorsichtigem Erhitzen nur geringe Verkohlungen u. dunkles öliges Destillat, bei Erhitzen krystallin. erstarrend, Kp. 210–215° (geringe Zers.), sl. in W., nach [N-Methylpyridon]-imid riechend u. durch das Chloroplatinat, $(C_6H_5N_2, HCl)_2PtCl_4 + 2H_2O$, gelborangene flache Nadeln, Zers. wasserfrei 210°, damit identifiziert. — *Chloroplatinat des vorigen*, $(C_7H_8ON_2, HCl)_2PtCl_4 + 5H_2O$, gelbe Nadeln, wasserfrei erhitzt in Capillare etwas dunkler, aber bis 310° nicht geschm. — *2-Oxodihydropyrimidazol* (I.). *Jodhydrat*, $C_7H_6ON_2, HJ + 2C_2H_5O$ (aus h. A.), verliert die Jodfärbung langsam bei 110–120°, dabei aber schon merklich zers. *Bromhydrat*, $C_7H_6ON_2, HBr$. *Chlorhydrat*, Nadeln, bei ca. 230° dunkler, dann allmählich zers. (fl. bei 278°). *Chloroplatinat*, $(C_7H_6ON_2, HCl)_2PtCl_4$, Schüppchen (aus verd. h. Lsg.), Schmelzung 240–250°. *K-Salz*, $C_7H_5ON_2K$, glänzende Schüppchen (aus absol. A.), sl. in W. — *3-Isonitroso-2-oxodihydropyrimidazol*, $C_7H_5O_2N_3$ (XII.), gelbe Nadelchen aus verd. h. W.), F. 229° (starke Zers.), l. in Säuren, Alkalien u. Alkalicarbonaten. *Chloroplatinat*, $(C_7H_5O_2N_3, HCl)_2PtCl_4$, rote Prismen, über 100° allmählich erweichend. — *Chloracetyl- α -aminopyridin*, $C_7H_7ON_2Cl$, weiß, bei Luft u. Licht allmählich rot gefärbt, Blättchen oder flache Nadeln (aus w. PAe.), F. ca. 110°, gleich wieder fest, weiterhin bei ca. 200–220° dunkler, dann wieder geschm. (Zers.). — *Bromacetyl- α -aminopyridin*, $C_7H_7ON_2Br$, Nadeln (aus w. PAe.), F. 91°, sofort wieder fest, dann dunkel bei >225°, Zers. 240°. eizt stark zum Niesen u. bewirkt auf der Haut brennendes Gefühl (Chloracetyl- α -aminopyridin ebenso). — *3'-Methyl-2-oxodihydropyrimidazol* (XVI.). *Bromhydrat*, $C_8H_9O_2Br$, Krystalle (aus h. absol. A.), spielend l. in W. *Chloroplatinat*, $(C_8H_9ON_2, HCl)_2PtCl_4$, rote Krystalle (aus h. W., Dunkelfärbung 240–250°. — *3',5'-Dibrom-2-oxodihydropyrimidazol* (XVII.). *Bromhydrat*, blättrige Krystalle (aus h. A.). *Chloroplatinat*, $(C_7H_5ON_2Br_2Cl)_2PtCl_4$, dunkelorange flache Nadeln. — *Farbstoff aus α -Amino- β -picolin*, $C_{16}H_{14}O_2N_2$, sehr ähnlich demjenigen aus α -Aminopyridin (XIII., vgl. oben), aber etwas leichter l. in W. u. verd. Essigsäure. — *Farbstoff aus α -Amino- β, β' -dibrompyridin*, $C_{14}H_6O_2N_2Br_4$, in Lsgg. von viel stärker blauvioletter Stich als die beiden anderen, weniger l. in NH_3 -Fl. u. Essigsäure. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 57. 2092–2101. 1924. Moskau, Techn. Hochsch.)


SPIELM.

Ernst Koenigs und Otto Jungfer, Über die Sulfurierung des γ -Aminopyridins. (Vgl. KOENIGS u. Mitarbeiter, Ber. Dtsch. Chem. Ges. 57. 173. 1179; C. 1924. II. 977. 978.) γ -Aminopyridin gab bei Erhitzen mit konz. H_2SO_4 in ziemlich guter Ausbeute die Sulfonsäure. Diese ließ sich nach der Methode von WITT (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 42. 2953; C. 1909. II. 1425) diazotieren, erhielt befriedigend bei Verwendung von Kaliummetabisulfit, glatt mit gasförmigen SO_2 (aus Na_2SO_3 u. HCl)

ziehender HNO_3 ; die Diazoverb. kuppelt mit Resorcin zu rotbraunem Farbstoff, bei Verkothen mit A. *Pyridin- β -sulfonsäure*, die zu sicherer Identifizierung nach dem von H. MEYER u. RITTER (Monatshefte f. Chemie **35**. 765; C. **1914**. 53) verbesserten Verf. von O. FISCHER hergestellt wurde. Verkothen der Diazverb. mit W. lieferte *γ -Oxyppyridin- β -sulfonsäure*, die auch durch direktes Sulfieren von *γ -Oxyppyridin* erhalten wurde. — Versuche. *γ -Aminopyridin- β -sulfon* $\text{C}_5\text{H}_6\text{O}_3\text{N}_2\text{S}$, Tafeln, F. 336° , sl. in W., wl. in A. Alkalisalze in W. sl., sz. krystallisiert in Nadelsternen, Na-Salz in Prismen, Zers. 285° . Ba-Salz, da mit $4\text{H}_2\text{O}$. — *Resorcin- γ -azopyridin- β -sulfonsäure*, $\text{C}_{11}\text{H}_9\text{O}_5\text{N}_3\text{S}$, rote Flocken, Umlösen aus W. nicht völlig rein, auf Wolle rotbraun. — *Pyridin- β -sulfon* $\text{C}_5\text{H}_5\text{O}_3\text{NS}$, Prismen (aus sd. W.), F. 339° . — *γ -Oxyppyridin- β -sulfonsäure*, $\text{C}_5\text{H}_5\text{O}_4\text{NS}$, Krystalle (aus W.), F. 265° , ll. in W. (bei Eindampfen der Lsg. etwas swl. in A. Ba-Salz, gelbliche Prismen mit $4\text{H}_2\text{O}$. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 80—82. 1924. Breslau, Univ.)

SPIEGEL.

Ernst Koenigs und **Heinrich Geisler**, *Über 3-Oxy- $[\alpha,\beta]$ -pyridothiophen*. Die Entstehung der noch nicht abgeschlossenen Verss. erfolgt mit Rücksicht auf Arbeiten von REINDEL (Ber. Dtsch. Chem. Ges. **57**. 1381; C. **1924**. II. 2158) u. SCHARDA (Roczniki Chemji **3**. 236; C. **1924**. II. 659). Auch Vff. wollten ein Analogon des Indigos darstellen, gingen aber in der Befürchtung, daß bei Einw. von Chloressigsäure auf α -Aminopyridin Anlagerung des Essigsäurerestes an Iridin-N erfolgen könnte, von *α -Pyridothioglykolsäure*, $\text{C}_5\text{H}_4\text{N}\cdot\text{S}\cdot\text{CH}_2\cdot\text{COOH}$ (ARCKWALD, KLEMM u. TRABERT, Ber. Dtsch. Chem. Ges. **33**. 1556; C. **1900**. 1) aus. Wie die Genannten schon gefunden haben, gibt deren HCl -Salz eine grüne, in wenig W. mit roter Farbe l. Schmelze, bei Verss. in größerer Menge verkohlte aber die Hauptmenge. Auch durch Einw. von POCl_3 auf die *Thioglykolsäure* erhielten Vff. in W. eine rote, in dünner Schicht grüne Färbung, die Lsg. enthielt aber offenbar nur geringe Menge eines leicht zers. Farbstoffs. Erwärmen einer Lsg. der Thioglykolsäure in konz. H_2SO_4 wurde diese intensiv gelb, beim Eingießen in W. erfolgte aber Umschlag in Gelb, u. es wurde neben der Hauptmenge unveränderten Ausgangsmaterials nur in geringen Mengen ein *methylpyridylmercaptan*, durch Abspaltung von CO_2 entstanden, gewonnen, dessen S. noch am N haftet, also an Kern-C gebunden sein mußte. Da die erforderliche Umlagerung unwahrscheinlich ist, wird die Formel eines *3-Oxy- $[\alpha,\beta]$ -pyridothiophen* für die neue Base nur mit Vorbehalt angenommen. — Die Abspaltung von H_2O aus der Thioglykolsäure gelang glatt durch Erhitzen mit $(\text{C}_2\text{H}_5\text{O})_2\text{O}$. Die resultierende gelbe Verb. wird als *3-Oxy- $[\alpha,\beta]$ -pyridothiophen* (Formel nebenst.) bzw. das tautomere Oxodihydrid angesehen trotz teilweise erheblichen Abweichens ihres Verh. von dem des 3-Oxythionaphthens. Der neue Ring wird leicht (schon bei Kochen mit verd. HCl) aufgespalten, u. die Verb. zeigt keine deutliche Neigung zu B. eines indigoiden Farbstoffs. Sie bildet glatt ein Phenylhydrazon u. ein Dibromsubstitutionsprod., das zu B. ein Farbstoffe geneigter zu sein scheint.




Versuche. *Methylpyridyl- α -mercaptan*, $\text{C}_6\text{H}_7\text{NS}$, Nadeln oder Blättchen (aus Lsg. durch W.), F. 54° , ll. in A., den meisten organ. Lösungsm., ferner in Mineralsäuren u. Alkalien, unl. in W. u. Na_2CO_3 -Lsg. *HCl-Salz*, $\text{C}_6\text{H}_8\text{NClS}$, F. 152° , zwl. in k. W.; *Pt-Salz*, orangefarbene Kryställchen, F. 159° . *Ag-Salz*, $\text{C}_6\text{H}_7\text{NSAg}$, weiße Flocken, F. $79-80^\circ$. — *3-Oxy- $[\alpha,\beta]$ -pyridothiophen*, $\text{C}_8\text{H}_5\text{OS}$, gelbe Nadeln (aus h. A.), F. 182° , zl. in Ä., h. A., h. Bzl., unl. in k. W., l. in NaOH, bei schwachem Erwärmen damit mit rotbrauner Farbe gel., dann mit Zusatz von Essigsäure rostbraune, nicht krystallisierbare Flocken. Bei Zusatz

von $K_3Fe(CN)_6$ zur w. alkal. Lsg. Färbung etwas vertieft, keine Abscheidung Farbstoff. — *Phenylhydrazon des vorigen*, $C_{13}H_{11}N_3S$, dunkelrote Nadeln (au F. 146°, ll. in A. u. Ä., unl. in W. — *3-Oxo-2,2-dibrom- $[\alpha,\beta]$ -pyridothiophendihy* $C_7H_3ONBr_2S$, dunkles Öl. $C_7H_3ONBr_2S, HBr$, gelbliche Krystallaggregate (au F. 185°, ll. in h. A. u. h. Eg., sl. in W., aber darin sofort hydrolysiert. ($ONBr_2S)_2, H_2PtCl_6$, orangefarben, krystallin., F. 171°. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 1926—79. 1924. Breslau, Univ.) SPIEL

A. Christiaen, *Beitrag zur Untersuchung der Reaktion zwischen Organomagnesiumverbindungen und Nitrilen. Die α -Aminonitrile.* (Vgl. BRUYLANTS, *Piperidylphenylacetoneitril* in Ä. mit C_2H_5MgBr behandelt, liefert nach Zers. Reaktionsprod. mit W. (wobei HCN entweicht) das schon früher von BRUYLANTS Bull. Acad. roy. Belgique, Classe des sciences [5] 10. 126; C. 1924. II. 33 beschriebene *Äthylphenylpiperidylmethan*, Kp.₁₂ 134°, Kp.₇₆₁ 268°, D.₂₀ 0,9544; Chlorhydrat F. 179°. Mit C_6H_5MgBr entsteht analog *Diphenylpiperidylmethan*, F. 75°; Chlorhydrat F. 249—250°; mit $C_6H_5CH_2MgBr$ entsteht *Phenylbenzylpiperidylmethan*, Kp.₁₈ 198—200°; Chlorhydrat F. 120°, sehr hygroskop. — *Phenylphenylacetoneitril* wird dargestellt durch Schütteln äquimolekularer Menge konz. Lsgg. von Benzaldehydbisulfit, $C_6H_5NH_2$ u. KCN bis sich zwei Schichten gebildet haben; aus der obersten Schicht krystallisiert nach Dekantieren das Nitril aus; aus Ä. F. 85°. Mit C_2H_5MgBr in Ä. behandelt entsteht hierbei unter Erwärmen Gasentw. eine schwarze M. die beim Zers. mit W. (wobei starke Erwärmung eintritt) *Anilin*, wenig *Benzylidenanilin*, $C_{13}H_{11}N$, Tafeln F. 54°, Chlorhydrat ll. in W. an Luft rötlich werdend, u. s. *Diphenyl-diphenylaminoäthan*, $C_{26}H_{24}N_2$, [C₆H₅(C₆H₅NH₂)CH]₂, aus Ä. gelbe Krystalle F. 139° liefert; Einw. von C_2H_5MgBr auf das Nitril liefert dieselben Prodd. Wird die Zers. durch W. ausgeführt, so daß starke Erhitzung eintritt, so bildet sich Benzylidenanilin reichlicher. Die beschriebenen Rkk. verlaufen nach dem C. 1924. II. 337 angegebenen Gleichn. (Bull. Soc. Chim. Belgique 33. 483—90. 1924.) HABERMAN

R. Breckpot, *Beitrag zur Untersuchung der Reaktion zwischen Organomagnesiumverbindungen und Nitrilen. γ -Äthoxybutyronitril.* (Vgl. vorst. Ref.). Durch Zers. von C_2H_5ONa auf γ -Chlorbutyronitril in A. (1-std. Erhitzen auf dem Wasserbade) wurden nach Verdampfen des A. u. Fraktionieren folgende Prodd. isoliert: I. Fraktion Kp. 170—210° γ -Äthoxybutyronitril, Kp.₇₄₄ 180—182°; aus der Fraktion 230—260° durch starkes Abkühlen *Amid der Trimethylencarbonsäure*, aus der Fraktion F. 123—124°, l. in W. u. A., unl. in Ä.; aus der Fraktion 135° einige cc *Trimethylencarbonsäure*. Die Ausbeute an Äthoxynitril wird größer, wenn man die Mengen der alkoh. C_2H_5ONa -Lsg. auf das Chlornitril gießt. — Wird eine ä. Lsg. des Äthoxynitrils tropfenweise zu einer C_2H_5MgBr -Lsg. gegeben (2 Mol. MgBr pro Mol. Nitril) so tritt reichliche Gasentw. ein (24 Liter pro Mol. Nitril); nach 1-std. Erhitzen wird durch W. zers. u. mit Ä. extrahiert. Durch fraktionierte Dest. werden erhalten I. Fraktion Kp. 175—215°. II. Fraktion Kp.₁₅ 195—225° etwa $\frac{1}{3}$ der Gesamtmenge. III. Fraktion Kp.₁₅ 240—250°. Fraktion I besteht wahrscheinlich aus einem Gemisch von *Äthyl- γ -äthoxypropylketon*, Kp. ca. 190° u. dem entsprechenden *Äthyl-Semicarbazon des Ketons*, $C_9H_{19}O_3N_3$, F. 87°. — Die Fraktion II lieferte nach zweimaliger Dest. bei Kp.₁₆ 206—208° ein gelbes, geruchloses, nicht erstarrtes Öl, dessen Analyse auf *dimeres γ -Äthoxybutyronitril* deutete; D.₂₀ 0,9939, $n_D^{20} = 1,44$, unl. in W., ll. in Ä. Bei der Hydrolyse mit w. konz. HCl entsteht neben *N-Hydroxy- γ -äthoxybutyramin* ein gelbes, nach HCN riechendes Öl, das nur halb so viel N enthält, wie das Nitril.



dimere Verb. Vf. schließt hieraus ab, daß das dimere Nitril eine Nitrilgruppe enthält u. neben *N-Hydroxy- γ -äthoxybutyramin* haben muß. In Fraktion III konnte kein Prod. definiert werden. Die Hydrolyse

konz. HCl führt auch hier zur B. von NH_4Cl . (Bull. Soc. Chim. Belgique **33**, 94. 1924. Louvain, Univ.)

HABERLAND.

A. Skita, Über die Kernhydrierung von aromatischen und heterocyclischen Verbindungen mit kolloidem Platin als Katalysator. Entgegen der Angabe von HELFER (H. chim. Acta **6**, 785; C. **1923**. III. 1480) kann Hexahydrophenylenessigpropioninsäure aus o-Phenylenessigpropionsäure durch katalyt. Hydrierung von 6,9 g mit 1 g kolloidalem Pt in saurer Lsg. bei 50° u. 3 Atm. Überdruck in 90 Min. so gut wie quantitativ erhalten werden, also schneller u. mit wesentlich weniger Pt als bei Hydrierung von Pt-Schwarz (Vers. mit **K. Warnat**). Die ursprüngliche Reduktionsgeschwindigkeit des Vfs. ist verbessert worden, nachdem sich gezeigt hatte, daß die Intensität eines Katalysators nicht nur von seiner Oberfläche, sondern auch von seiner Porengröße abhängt u. daß für die meisten Kernhydrierungen ein Schwellenwert für den H_2 -Druck vorhanden ist, unterhalb dessen die Hydrierung träge oder gar nicht erfolgt. In weiterer Berücksichtigung der beschleunigenden Wrkg. von Essigsäure u. HCl konnte die Intensität der Reduktionskatalyse so vergrößert werden, daß aus Benzylamin u. β -Phenyläthylamin rasch u. quantitativ Aminomethylcyclohexan u. β -Aminoäthylcyclohexan gewonnen wurden. i-Chinolin nahm zunächst auch unter solchen Bedingungen nur 4H auf; erhöhte man dann aber durch Zusatz von H_2PtCl_6 -Lsg. die Pt-Konz., so wird fast quantitativ Dekahydro-i-chinolin erhalten.



Verss. mit **H. Reitmeyer**: Aminomethylcyclohexan (vgl. SABATIER u. MAILHE, Compt. rend. l'Acad. des sciences **153**, 160; C. **1911**. II. 953). 10 g käufliches Benzylamin in 30 ccm Eg. wurden mit 30 ccm 10%ig. Lsg. von Gummi arabicum versetzt, der noch 15 ccm wss. H_2PtCl_6 -Lsg. (1,5 g Pt enthaltend) u. 8 ccm kolloidales Pt (0,03 g Pt auf 0,18 g Gummi arabicum) zugefügt wurden. Hydrierung vollständig bei $50-60^\circ$ u. 3 Atm. Überdruck in 8 Stdn. Benzoylverb., $\text{C}_{14}\text{H}_{19}\text{ON}$, Krystalle (aus verd. A.), F. 98° . — β -Aminoäthylcyclohexan (vgl. WALLACH, Nachr. K. Ges. Göttingen **1907**, 60; C. **1907**. II. 53). 10 g β -Phenyläthylamin, in 35 ccm Benzol, u. 10 ccm konz. HCl gel., in 140 ccm kolloidale Pt-Lsg. (1 g Pt u. 6 g Gummi arabicum enthaltend) eingetragen. Red. bei $50-60^\circ$ u. 3 Atm. in $5\frac{1}{2}$ Stdn. Benzoylverb., $\text{C}_{15}\text{H}_{21}\text{ON}$, Nadeln (aus verd. A.), F. 78° . — Py-Tetrahydro-i-chinolin aus Isochinolin, gel. in 40 ccm Eg. u. 10 ccm konz. HCl, Mischung von 18 ccm H_2PtCl_6 -Lsg. (1,5 g Pt enthaltend), 30 ccm 10%ig. Lsg. von Gummi arabicum u. 5 ccm kolloidalem Pt (0,05 g Pt u. 0,3 g Gummi arabicum enthaltend) mit H_2 bei $50-60^\circ$ u. 3 Atm. Überdruck in ca. 3 Stdn. — N- β -Oxäthyl-Py-tetrahydro-i-chinolin, $\text{C}_9\text{H}_{10}\text{N} \cdot \text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$, aus dem vorigen u. Glykolchlorhydrin, Öl, Kp. $166-167^\circ$. Jodmethylat, $\text{C}_{12}\text{H}_{18}\text{ONJ}$, Prismen (aus CH_4O), F. 148° . Acetylderiv. des Jodmethylats, $\text{C}_{12}\text{H}_{17}\text{ONJ}$, Krystalle (aus CH_4O), F. 127° . — Dekahydro-i-chinolin, aus dem vorigen u. einer Mischung, in der es entstanden, unter oben angegebenen Bedingungen in Benzol, Kp. 207° (nach HELFER 208—209). Phenylharnstoff aus dem vorigen, F. 102° . Blättchen (aus verd. A.), F. 123° . (Ber. Dtsch. Chem. Ges. **57**, 1977—1982. 1924. Kiel, Univ.)

SPIEGEL.

Caille und **E. Viel**, Umwandlung der Jodstibinate organischer stickstoffhaltiger Basen in krystallisierte Jodmercurate. (Vgl. C. r. d. l'Acad. des sciences Paris **156**; C. **1924**. I. 1422.) Die l. c. beschriebenen Jodstibinate des Pyridins, Chinolins, Piperazins, Theobromins u. Nicotins werden beim Kochen in verd. Lsg. mit überschüssigem metall. Ag in die gelben, krystallisierten Jodmercurate übergeführt, gleichzeitig entsteht ein schwarzer aus HgJ u. Sb bestehender Niederschlag. Die verhältnismäßig geringe Ausbeute an der Hg-Verb. ist auf Zers. nach 2. zurückzuführen; die hiernach zu erwartenden Verbb. wurden beim Kochen des Jodmercurats mit Hg in salzsaurer Lsg. gefunden, so daß der Gesamtverlauf der

II. 1.

Umsetzung im Falle des Pyridinsalzes wahrscheinlich durch Gleichungen 1. u. 2. wiedergegeben werden kann:



(C. r. d. l'Acad. des sciences 179. 689—90. 1924.)

HABERLAND

E. Biochemie.

E₂. Pflanzenchemie.

Ellery H. Harvey, *Einige physiko-chemische Eigenschaften der Stärke*. I.

Untersucht wurden Kartoffelstärke (a), Maisstärke (b) u. Cassavastärke (c). — D.²¹: a 1,497, b 1,500, c 1,527; spezif. Vol.: a 0,667, b 0,666, c 0,654. — Feuchtigkeit: b 10,6, a 11,2, c 11,0%. — Asche: b 0,069, a 0,250, c 0,062%; Asche alkal. gegen Lackmus, phosphathaltig. — Verbrennungswärme: b 4060, a 3000, c 3941 Calorien per g Originalstärke. — Säure: 5 g Muster + 25 cem dest. V. 3 Stdn. geschüttelt, Fl. filtriert, 1 Teil Filtrat mit $\frac{1}{1}$ n.-NaOH + Phenolphthalein titriert. Der Säuregrad gibt an, wieviel cem dieser NaOH auf 100 g Muster m. Neutralisieren erforderlich sind; b 1,70, a 1,68, c 1,94 Säuregrad. — Größe der Stärkekörner: c 0,005—0,036 mm, Mittel 0,014—0,028 mm, b 0,015—0,030, Me 0,02—0,028 mm, a 0,045—0,100, Mittel 0,055—0,065 mm. — Gelatinierungstemp.: g Stärke wird in 99 cem dest. W. suspendiert, die Suspension mit einem Rührwerk gerührt u. die Wärme langsam gesteigert, bis die milchige Suspension sich in Opaleszenz ändert: c 69—70°, b 71—72°, a 66—67°. — Weiter wurden bestimmt Goldzahl, Kataphoresse, spezif. Wärme, Dampfdichte über Stärkelsgg., Verbrennungswärme, DE., Refraktationsindex (c 1,5331, a 1,5253, b 1,5296), Schnelligkeit des b. setzens, polariskop. Best. der Stärke nach CRISPOS, EWERS u. LINTNERS Vfm (Amer. Journ. Pharm. 96. 752—58. 1924. Lewisburg [Pa.], Bucknell Univ.) DIETZ

E. K. Nelson, *Die nicht flüchtigen Säuren getrockneter Aprikosen*. Getrocknete Aprikosen wurden mit sd. W. extrahiert, das Filtrat nach Konzentrieren zur Ausfällung von Pektinstoffen mit A. versetzt u. die gel. Säuren mittels A. + 2,5% C in die Ester übergeführt; nach Fraktionieren der mit Ä. extrahierten Ester wurden Proben mit Hydrazinhydrat versetzt, die FF. der Hydrazide der einzelnen Fraktionen zeigen die Anwesenheit von l-Äpfelsäure u. Citronensäure im Verhältnis 2,5:1; aus der ersten Fraktion des Estergemischs, Kp.₁₀ 87—100° wurde ein Hydrazid, F. 237—238° isoliert, von dem nicht mit Sicherheit festgestellt werden konnte, ob es ein Deriv. der Oxalsäure ist. (Journ. Americ. Chem. Soc. 46. 1006 bis 2507. 1924. Washington, U. S. Dep. of Agric.)

HABERLAND

Fritz Bischoff, *Öl von Echinacea angustifolia*. Die Unters. zweier Ölprien aus Wurzeln von Echinacea angustifolia ergab, daß der Hauptbestandteil (80%) des flüchtigen Öles ein Tetrahydrosesquiterpen C₁₅H₂₈ zu sein scheint mit 2 Doppelbindungen u. aliphat. Kette. Vf. nimmt die Formel: C₅H₁₁·CH : CH·CH₂·CH : C₅H₁₁ an, in der die Amylgruppen iso-Charakter haben. Durch katalyt. Hydrierung wurde ein Pentadekan, C₁₅H₃₂, F. 8,7°, erhalten. D.¹⁵₄ 0,7727, n²⁵_D = 1,423. Oxidation mit KMnO₄ ergab eine Hexonsäure vom F. 189° (korr.), die bei -17° nicht fest wurde. Dehydrierung mit S lieferte kein faßbares Reaktionsprod. (Journ. Amer. Pharm. Assoc. 13. 898—902. 1924.)

JUN

Katharine Hope Coward, *Einige Beobachtungen über die Extraktion und Schätzung der Lipochrome aus tierischem und pflanzlichem Gewebe*. Die eingehend quantitative brauchbare Resultate gebende Methode ist Verseifung mit wss. K₂CO₃ Lsg. nicht > 20%, wobei möglichst alle Operationen in N-Atmosphäre vorgenommen werden sollen. Nach Unterss. mit TSWETTS chromatograph. Methode existieren

ten Xanthophyll. Fraktionierte Filtration durch Kreidekolonnen ist gut brauchbar zur Trennung von Caroten u. Lycopin. (Biochemical Journ. **18**. 1114—22. 1924. London, Univ.)

WOLFF.

Katharine Hope Coward, *Die Lipochrome ätiolierter Weizenkeimlinge*. Die ätiolierten Weizenkeimlinge sind mit Caroten u. den vier Xanthophyllarten von TSWETT aus grünen Blättern ident., die quantitativ nicht einzeln bestimmt werden können. (Biochemical Journ. **18**. 1123—26. 1924. London, Univ.)

WOLFF.

Kenichiro Ohta, *Studien über die zwei neuen Alkaloide von Cucculus diversifolius*. Aus der Pflanze wurden 2 Alkaloide isoliert: *Kokulin*, $C_{16}H_{20}O_3N \cdot 3H_2O$, F. 162°, $[\alpha]_D^{25} = -76,7^\circ$, u. *Diversin*, $C_{16}H_{20}O_4N$, F. 144—154°, $[\alpha]_D^{25} = +22,04^\circ$. Die Wrkg. der beiden ist qualitativ im wesentlichen übereinstimmend, bei Diversin aber stärker. Bei subcutaner Injektion gesteigerte Reflexerregbarkeit mit spontanen Konvulsionen. Unangenehme Erregung, dann Lähmung des Atmungszentrums, Tod an Atemlähmung. Der Herzmuskel negativ inotrope u. chronotrope Wrkg. Capillaren beim Frosch verengt, beim Kaninchen erweitert. Bei Hunden u. Kaninchen Blutdruck durch Kokulin gesenkt (Erweiterung der Capillaren), durch Diversin zunächst auch (auch Verengung des Herzens), dann aber gesteigert (Erregung des Vasomotorenzentrums). Die Muskulatur von Darm gelähmt, von Uterus erregt (bei hohen Gaben auch kontrahiert), Skelettmuskulatur u. motor. Nerven gelähmt. Diversin wirkt hämolytisch gegenüber Protozoen (etwa wie Chinin) ca. 10-mal stärker als Kokulin; dieses wirkt in geringem Grade die Temp. nach Fieberstich herabzusetzen, jenes kaum. (J. pharm. med. world **3**. 268—72. 1923. Tokyo, Keio univ.; Ber. ges. Physiol. **27**. 180. 1924. Ref. SCHÜBEL.)

SPIEGEL.

James Fitton Couch, *Ein neues aus Lupinus spathulatus (Rydb.) isoliertes Alkaloid, Spathulatin*. Isolierung des *Spathulatins*, $C_{33}H_{64}O_5N_4$, aus den Hülsen: die Hülsen der in Utah u. Colorado wachsenden Lupine werden zerlegt, mit alkoh. Weinsäurelsg. befeuchtet u. mit A. perkoliert; der konzentrierte wird mit so viel Eg. versetzt, daß eine 1%ig. Lsg. entsteht u. danach mit verdünnter 10%ig. neutraler Pb-Acetatlg. versetzt; der grüne Nd. wird nach Absitzen abgeseiht, das Filtrat nach Konzentrieren mit H_2S behandelt u. zu einem dicken Sirup eingedampft; diese M. wurde mit KOH alkal. gemacht, mit W. verd. u. mit Chlf. wiederholt extrahiert; wegen der leichten Löslichkeit des Alkaloids in W. gelang keine vollständige Extraktion; es wurde daher nacheinander mit Ae., Ä. u. Bzl. extrahiert, die äth. Lsg. konnte nicht sicher identifiziert werden; aus PAe. u. Bzl. erhaltenen Prodd. waren ident., sie wurden aus Bzl. umkristallisiert u. bildeten Nadeln mit 1 Mol. Krystallbenzol, F. 86°; beim Trocknen bei $CaCl_2$ u. 85° zerfallen die Krystalle unter Abgabe von Bzl. zu weißem amorphem Pulver, F. 227°; aus A. prismat. Krystalle ohne A., F. 227°. Die freie Base ist l. in A., Bzl., Chlf., Aceton, CCl_4 , Chlf. u. Essigester, unl. in PAe. u. Ä. Die Base reagiert schwach alkal. gegen Lackmus; mit Säuren werden Salze gebildet, die leicht übersätt. Lsgg. bilden u. beim Verdampfen des Lösungsm. schwierig zu trocknen; mit verd. H_2SO_4 tritt Verharzung ein. $[\alpha]_D^{27} = -1,88^\circ$ (5,90 g in 100 ccm Chlf.), $[\alpha]_D^{28.5} = -2,32^\circ$ (6,42 g in 100 ccm A.), $[\alpha]_D^{27.5} = -2,44^\circ$ (6,42 g in 100 ccm W.). Aus W. krystallisiert die Verb. in rhomb. Prismen mit $2H_2O$. Die Krystallgruppen enthält die Verb. nicht, mit Chlf. tritt keine oder nur ganz geringe Menge aus. — *Mercurijodidverb.*, $C_{33}H_{64}O_5N_4 \cdot 3HgJ_2$, erhalten durch Versetzen einer l. in ICl angesäuerten Lsg. mit Mayerschem Reagens; es entsteht ein hellbrauner Niederschlag in W., in frischem Zustande l. in 50%ig. A.; er wird nach Mischen mit verd. NaOH oder CaO mit Bzl. extrahiert; hieraus rhomb. Prismen, F. 164° (Abb. original). — Isolierung des Alkaloids aus den Samen: diese werden zur Entfernung von Fetten in gepulvertem Zustande mit h. Bzl. extrahiert, der Rückstand

mit 5%ig. NaOH alkal. gemacht u. nach Trocknen im Soxhlet mit A. extrahiert nach Verdampfen des A. wird der Rückstand in W. gel., mit HCl angesäuert mit Mayerschem Reagens versetzt bis kein Nd. ausfällt; nach 12-std. Stehen der Nd. mit HCl-haltigem W. gewaschen u. nach Trocknen mit überschüssig. Na₂CO₃ verrieben; die M. wird in W. suspendiert, zur Entfernung von Hg mit behandelt u. das Filtrat eingedampft: dieser Rückstand wird zur Entfernung Na₂CO₃ mit A. behandelt, die Lsg. wieder eingedampft u. diesem Rückstand Alkaloid mit Chlf. entzogen; es erwies sich als ident. mit dem aus den Hülle gehaltenen. Ausbeute 2,54% des Samengewichts. (Journ. Americ. Chem. Soc. 2507—14. 1924. Washington, U. S. Dep. of Agricult.) HABERLAND

O. F. Black, W. W. Eggleston, J. W. Kelly und H. C. Turner, Die Eigenschaften von *Bikukullaria cucullaria* (*Dicentra cucullaria*) und *B. canadensis* (*Dicentra canadensis*). Die an der Luft u. dann bei 100° getrockneten oberird. Pflanzenteile u. Wurzeln wurden besonders mit Ä., Chlf. u. A. im Soxhlet extrahiert u. 1 Teil mit angesäuertem W. behandelt. Die ersteren 3 Extrakte hielten beträchtliche Alkaloidmengen. Aus dem Ä.-Extrakt wurde ein Alkaloid gewonnen, welches durch Verreiben mit verd. HCl gel., u. nach Zusatz von NEH zur alkal. Rk. mit Ä. ausgeschüttelt wurde. Nach Verdampfen des Ä. bis auf kleines Vol. u. Zusatz eines gleich großen Vol. A. schieden sich während des raschen Verdunstens der Mischung warzenförmige Massen prismat. Krystalle aus, welche durch Umkrystallisieren aus einer Mischung von A. u. Chlf. gereinigt wurden. Das bisher unbekannte, von den Vff. *Cucullarin* genannte Alkaloid schmilzt kurz nach seiner Herst. farblos u. nimmt dem Lichte ausgesetzt eine blaue Farbe an. F. 169°, l. in Ä. u. Chlf., unl. in A. Durch gewöhnliche Fällungsmittel für Alkaloide, MAYERS J-JK, kryst. Pikrinsäure u. PtCl₄ wird es nicht geschieden. Eine minimale Menge desselben löste sich sehr langsam in konz. H₂SO₄ unter Violettfärbung der Lsg. die in Braunfärbung übergeht. Als minimale tödliche Dosis des Cucullarins wurden durch subcutane Etnspritzungen bei etwa 100 g schweren Mäusen 0,02 g pro kg Körpergewicht festgestellt. In *B. canadensis* ist das Alkaloid in sehr geringer Menge vorhanden, dementsprechend zeigte diese bei Fütterungsverss. an Kälbern eine 20 mal geringere Giftwrkg. als *B. cucullaria*. (Journ. Agricult. Research 23. 69—78. 1923.) BEER

Frederick B. Power und Victor K. Chesnut, Chemische Untersuchungen über die „Chufa“, den Knollen von *Cyperus esculentus* Linné. Die Knollen der *Cyperus esculentus* Linné enthalten bis zu 28,9% eines fettigen Öls, 12,8% Stärke, 3,2% Zucker [α]_D +65,9°, wenig Gummi u. keine Alkaloide. (Journ. Agricult. Research 26. 69—75. 1923.) TRENNER

Walter F. Baughman und George S. Jamieson, Die Bestandteile des „Cifta“ Öls, eines fettigen Öls aus den Knollen der *Cyperus esculentus* Linné. Das rohe Öl zeigte folgende Konstanten: D.²⁰ 0,9120; Refr.²⁰ 1,4680; Jod-Z. 76,5; VZ. 1,1; SZ. 15,7; AZ. 10,5; REICHERT-MEISZL-Z. 0,2 u. bestand im wesentlichen aus (Cyclohexyliden) hochmolekularer Fettsäuren: Palmitat 11,8%, Stearat 5,2%, Oleat 73%, Linolat 5,9%, Arachidat 0,5%, Lignocerat 0,3%, Myristat Spuren. Außerdem wurde ein Phytostyrylin isoliert; F. 134—135°, farblose Nadeln, Acetylerster, l. in bis 123°. (Journ. Agricult. Research 26. 77—82. 1923.) TRENNER

J. Kurosawa, Die Bestandteile von *Allium scorodoprasum* L. I. Es wurde mehrere organ. P-haltige Säuren isoliert, mehrere organ. Säuren, ebensolche in oder N + S, Verbb. von organ. Basen mit N + S, *Inulin*, schließlich Verbb. die keinen charakterist. Knoblauchgeruch aufweisen, ihn aber bei Einw. von Bakterien erlangen. Nähere Charakteristica fehlen. (Journ. of oriental med. 2. 84—85. 1924. Ber. ges. Physiol. 27. 479. 1924. Ref. WOLFF.) SPIEGEL

E₃. Pflanzenphysiologie. Bakteriologie.

P. Krische, *Neuere Forschungen über die Bedeutung des Kaliums für den pflanzlichen und tierischen Organismus.* (Kali 18. 313—17. 1924. Berlin-Lichterfelde.) BERJU.

F. G. Hobart, *Calcium im Pflanzenstoffwechsel.* Die Bedeutung des Ca-Gehaltes für das n. Wachstum u. Gedeihen wird besprochen. Die Knopsche Wasserkultur besteht aus 1 g KNO₃, 1 g KH₂PO₄, 1 g MgSO₄ u. 3 g Ca(NO₃)₂ in 6 l W.; zu kommt ein Zusatz von einigen Tropfen 5%ig. FeCl₃-Lsg. — Alle grünen Pflanzen brauchen eine gewisse Menge Ca-Salze. (Pharmaceutical Journ. 113. 1924.) DIETZE.

S. Herke, *Die Bedeutung der Wurzelausscheidung bei der Ausnutzung der Phosphorsäure.* Die Ausnutzungsfähigkeit der P₂O₅ steht weder mit der durch die Pflanzen erzeugten gesamten CO₂ noch der Intensität deren Erzeugung im Zusammenhang. Die Zuckerausscheidungen begünstigen wahrscheinlich die P₂O₅-Ausnutzung durch die betreffenden Pflanzen. Durch Ausscheidung von Apfelsäure aus den Wurzeln wird die Fällung der P₂O₅ durch Fe- u. Ca-Salze verhindert. Es ist daher der Apfelsäure eine wichtige Rolle bei der P₂O₅-Ernährung der Pflanzen beschrieben worden. (Különlenyomat a Kisérlatugyi Köslemények 24. 2. 1921; Pfl. Zentrblatt f. Agrik.-Ch. 53. 417—18. 1924.) BERJU.

Alexander Herke, *Die Verwertung der leicht- und schwerlöslichen Phosphorsäure in den verschiedenen Entwicklungsphasen der Pflanzen.* Die Löslichkeit der verschiedenen Phosphate in CO₂ enthaltenden W. oder in einzelnen verd. organ. Säuren ist für deren Verwertung durch die Pflanzen nicht maßgebend. In den ersten Stadien der Entw. verwerten die Pflanzen hauptsächlich die ll. P₂O₅ u. später, besonders stark nach der Blüte zur Zeit der Samenb. auch die swl. P₂O₅. Je nach der Qualität der von den Wurzeln der Pflanzen ausgeschiedenen Stoffe bestehen wesentliche Unterschiede in der Ausnutzungsfähigkeit der swl. P₂O₅. (Különlenyomat a Kisérlatugyi Köslemények 22. 1. 1919; BIED. Zentrblatt f. Agrik.-Ch. 53. 416—17. 1924.) BERJU.

Jules Stoklasa und Jos. Penkava, *Die Radioaktivität der Eruptionsgase des Vesuv und der Solfataren von Campanien und ihr Einfluß auf die Entwicklung von Bakterien und höheren Pflanzen.* Vff. untersuchen zahlreiche Luftproben in verschiedenen Gegenden, um daraus Rückschlüsse auf den Gehalt der dort befindlichen Gase oder Bodensubstanzen auf radioaktive Stoffe zu ziehen. Die Radioaktivität sowohl der Atmosphäre als auch des Bodens begünstigen die Entw. der Kuminosen, vor allem von Spartium juncum u. Robinia pseudo acacia; diese sind am Vesuv äußerst verbreitet. Die Bakterien, welche den N₂ der Luft assimilieren, werden durch Ra-Emanation in ihrer Tätigkeit bedeutend verstärkt, vor allem begünstigen die α -Strahlen die Desassimilation dieser Bakterien u. vermindern bei Ggw. von genügend O₂ ihre Atmungstätigkeit. Sie sind auch am Fuß des Vesuv u. in der Campagna sehr verbreitet. Die unter dem Einfluß der β - u. γ -Strahlen erfolgende B. von Kohlenhydraten in den Blättern übersteigt in südlichen Ländern bedeutend den unter Einfluß der α -Strahlen durch Oxydation entstehenden Verlust. Die strahlende Sonnenenergie bildet zusammen mit der γ -Strahlung des K u. mit Hilfe anorgan. Substanzen in der Chlorophyllzelle organ. Substanz. Die Zers. von KHCO₃ unter dem Einfluß des Lichtes u. radioaktiver Strahlung in Ameisensäure, O₂ u. K₂CO₃ sowie die Zers. der Ameisensäure in Formaldehyd u. O₂ sind die Grundprozesse der Assimilation, bei denen die Radioaktivität des K eine wichtige Rolle spielt. (C. r. d. l'Acad. des sciences 179. 819—822. 1924.) FRANKENBURGER.

Ernst Speyer, *Über die Wirkung verschiedener Wasserstoffionenkonzentrationen auf das Wachstum des Colibacillus in künstlichen Nährböden.* Unterss. an 5 aus

menschlichen Stühlen gezüchteten Colistämmen in Milchsäure-NH₃-Nährboden Zusatz von NaCl u. einem Gemisch von KH₂PO₄ u. K₂HPO₄, dessen [H'] auf verschiedenen Wegen variiert wurde. Es ergab sich Wachstum bei p_H = 4,50 bis Optimum bei ca. 7,00, aber zwischen 5,40 u. 8,40 nur geringe Unterschiede. Im Abimpfen in Nährlsgg. von immer saurerer Rk. gelingt die Gewöhnung der Keime an stark saure Rk. (bis 4,5), während sie bei direkter Abimpfung aus neutral oder bas. Nährboden in stark sauren nicht gedeihen. Die an stark saure Rk. geimpften Keime wachsen dann auch in stark bas. Nährlsgg., wo dies sonst nicht der Fall ist. Das Wachstum der Keime ändert die Rk. der Nährlsgg. unter Annäherung an den Neutralpunkt. — In Bouillon wird stark saure Rk. besser getragen als im künstlichen Nährboden. (Zentralblatt f. Bakter. u. Parasitenk. 1A 93. 340—52. 1924. Frankfurt a. M., Städt. Hyg. Univ.-Inst.) SPIEGEL

O. W. Hunter, *Steigerung des Wachstums von Azotobacter durch Luft*. Die Ansicht SÖHNGENS (Zentralblatt f. Bakter. u. Parasitenk. II. Abt. 40. 5. C. 1915. I. 382), daß dem Azotobacter für reichliches Wachstum im Beijerinck-Nährboden nur O₂ u. N₂ fehlen, wird bestätigt durch die Verss. des Vf., bei denen die Kultur in fl. Nährboden (0,5 g K₂HPO₄, 0,2 g MgSO₄, 0,2 g NaCl u. 10 g Dextrose in 1000 g Leitungswasser) unter ständiger starker Durchleitung eines Luftstroms erfolgte. Das Wachstum erfolgte hier schnell u. üppig unter gleichzeitiger Steigerung der N-Bindung u. im Verhältnis dazu verstärkter Vergärung von Dextrose. Ggw. von CaCO₃, die sonst für Azotobacterkulturen empfohlen werden, hatte unter den vorliegenden Umständen keinen merklichen Einfluß. (Journ. Agric. Research 23. 665—77. 1923.) SPIEGEL

O. W. Hunter, *Eiweißsynthese durch Azotobacter*. Während auf festem Medium gewonnene Azotobactermasse nur 11,81% N enthielt, hatte die aus fl. Medium unter Durchlüftung (vgl. vorst. Ref.) gewonnene 30,56%. Die Ausbeute an Zellen u. damit der Menge der im Nährmittel vorhandenen Dextrose, wobei die relativen Mengen von gebundenem N für je 1 g Dextrose in den untersuchten Medien (0,6—1,1—1,5%) nahe übereinstimmten. Bei Anwendung von Melassen als Energiequelle wurde eine Zellausbeute entsprechend 30,44% der in der Melasse vorhandenen Zucker erreicht, günstiger als mit Dextrose. Es werden dabei sowohl die l. N-Verbb. der Melassen in komplexeres Eiweiß verwandelt, als auch Melassen als Energiequelle für Assimilation des atmosphär. N₂ benutzt. Als Substrat von Stroh zu Dextroselsg. oder Melasse verursachte keine merkliche Steigerung der Menge des fixierten N. (Journ. Agric. Research 24. 263—74. 1923. Internat. Agric. Exp. Station.) SPIEGEL

A. G. Biemond jr., *Einige Bakteriophagenuntersuchungen*. Ultrafiltration und Benutzung des Bechholdsehen App., zeigt, daß die bakteriophage Wrkg. an epizootische kulturelle Elemente geknüpft ist. Die Teilchengröße ist bei demselben Bakteriophage verschieden. Unter 2 von dem gleichen Kranken zu verschiedenen Zeiten gewonnenen bestand der intensiver wirkende aus größeren Elementen. Wie bei anderen Bakterien ist auch der Bakteriophage gegen ultraviolettes Licht empfindlich, wobei die schützende Wrkg. der Bouillon ausgeschaltet wird. Wie andere Forscher fand auch Vf. keinen Übergang des Bakteriophagen ins Vakuumdestillat, wobei das Überspritzen von Tröpfchen durch eine geeignete Vorr. verhindert wird. (Ztschr. f. Hyg. u. Infekt.-Krankh. 103. 681—90. 1924. Delft, Techn. Hochschule.)

H. Licht, *Untersuchungen über den Einfluß der Bakterien auf die Gallensäuren*. Reinkulturen von 2 Colistämmen, von Bact. faec. alcaligenes, Proteus X 19, Typh. u. Pyocyaneusbacillen, Streptoc. pyogenes longus u. Staphyloc. aureus vermehren sich auch bei 14-tägiger Bebrütung mit Galle nicht den nach FOSTER u. HOOPER gemessenen ermittelten Amino-N der Gallensäuren merklich zu verändern. Ebenfalls gelang dies bei Einw. von Stuhlaufschwemmung, also der gewöhnlich vorhandenen

flora u. Darmfermente. Andererseits wurde in Bestätigung der Angaben von LNER u. HEYROVSKY (Arch. d. klin. Chirug. **86**. [1908]) bei Einw. der oben genannten Bakterien, besonders derjenigen der Typhus-Coligruppe, auf Na-Glykolat enthaltende Bouillon Verminderung der gravimetr. bestimm. Gallensäuren festgestellt. Die Veränderungen, welche sonach die Gallensäuren im Darm eventuell auch in den Gallenwegen erfahren können, bestehen also jedenfalls nicht in Sprengung der Kuppelungsstelle von Cholsäure u. Glykokoll bzw. Taurin, sondern offenbar in B. gekuppelter Abbauprodd. (Biochem. Ztschr. **153**. 159—64. 24. Breslau, Univ.) SPIEGEL.

J. Lucien Morris und **E. E. Ecker**, *Harnsäureabbau durch Bakterien und Schimmelpilze*. (Vgl. MORRIS, JERSEY u. WAY, Amer. Journ. Physiol. **70**. 122; 1924. II. 2274.) Faecesaufschwemmung bewirkte in Lsg. von Harnsäure in wenig Tagen beträchtliche Abnahme derselben. Vergleich der Ergebnisse mit u. ohne Zusatz von Desinfizienten macht bakterielle Zers. wahrscheinlich. Von ausgelekrementen gezüchteten Bakterienkulturen zeigte außer einem unbekannten wenig wirksamen Mikroben nur das *Harnsäurebacterium* von UPLANI starke Wrkg. völlige Zerstörung der Harnsäure in 2—3 Tagen). Für Ggw. eines besonderen proteolyt. Fermentes ergab sich kein Anhalt. Bei Zusatz von Glucose mit oder ohne Glycerin vermochten auch pathogene Schimmelpilze Harnsäure abzubauen, aber schwächer als das genannte Bacterium. (Journ. of infect. dis. **34**. 592—98. Cleveland, Western Reserve univ. school of med.; Ber. ges. Physiol. **27**. 451. 1924. 24. Breslau, Univ.) SPIEGEL.

G. Malfitano und **M. Catoire**, *Die Rolle des Eisens bei der Proteolyse durch Aspergillus niger*. Steigende Mengen Fe in der Nährfl. steigern zunächst bis zu einem Optimum die Vitalität u. damit auch die proteolyt. Funktion des Aspergillus. Aber schon bei verlängertem Wachstum u. bei Aufbewahrung des Mycels macht sich ein ungünstiger Einfluß der größeren Fe-Menge auf die proteolyt. Wirksamkeit geltend. (C. r. soc. de biologie **91**. 861—63. 1924.) SPIEGEL.

E₅. Tierphysiologie.

E. Gley und **J. Cheymol**, *Das Vorhandensein von Jod im venösen Blut der Schilddrüse*. Bei Ziegen gelang die Gewinnung genügender Mengen Blut aus der Schilddrüsenvene, um das J nach KENDALL (Journ. Biol. Chem. **19**. 251; C. **1915**. 914) in einer Reihe von Verss. zu bestimmen. Abgesehen von 2 Verss., deren Werte aus der Reihe fielen, ergab sich der mittlere Wert zu 0,191 mg für 1000 ccm Blut. 0,120 mg im allgemeinen Kreislauf. Bei 2 Tieren konnte das Blut aus beiden Venen getrennt untersucht werden; die Werte stimmten hier überein. (C. r. d. Acad. des sciences **179**. 930—32. 1924.) SPIEGEL.

Herbert Davenport Kay, *Änderungen in der Phosphorverteilung im menschlichen Blut während Ammoniumchloridacidosis*. Nach Einnahme von NH_4Cl treten während der Acidose merkliche Veränderungen in der P-Verteilung ein. (Biochemical Journ. **18**. 1133—38. 1924. Cambridge, Bioch. Lab.) WOLFF.

Nathan Rosenthal und **George Baehr**, *Paradoxe Verkürzung der Blutgerinnungszeit nach intravenöser Zufuhr von Natriumcitrat*. Nach langsamer intravenöser Injektion von 3—6 mg Citrat in 30%ig. Lsg. ist die Gerinnungszeit des Blutes bedeutend verkürzt (prakt. Anwendung zur Blutstillung). Kein Einfluß auf Blut-Ca-, Fibrinogen- u. Antithrombingehalt. Der Mechanismus dieser Citratwrkg. ruht auf Veränderung der Blutplättchen in vivo, die sehr rasch in großer Zahl zerstört, aber bald wieder ersetzt werden; die bei der Zerstörung freigewordenen Prothrombinogenase kreisen noch lange im Blute. Bei Enten, die keine Blutplättchen besitzen, tritt auf Na-Citrat keine Änderung der Gerinnungszeit ein. Bei Blutkrankheiten mit herabgesetzter Blutplättchenzahl oder vermutlich minderwertiger Be-

schaffenheit der Blutplättchen folgt einer unbedeutenden Verkürzung der Gerinnungszeit nach 24—48 Stdn. bedeutende Gerinnungshemmung. (Arch. of intern. med. **33**. 535—46. New York, Mount Sinai Hosp.; Ber. ges. Physiol. **27**. 358—39. 1924. Ref. BIEHLER.) SPIEGEL

Allan Beskow, *Die lösende Wirkung des Saponins auf die Plättchen und weissen Körperchen des Blutes in vitro*. Erst bei ziemlich starken Konz., etwa von 0.5% an, bewirkt Saponin in vitro eine deutliche Verminderung der Plättchen, die mit wachsender Konz. bis 2% sich bis zum völligen Verschwinden in 12 Stdn. steigert. Bei den weissen Blutkörperchen tritt hingegen auch bei diesen Konzentrationen keine Verminderung ein. (C. r. soc. de biologie **91**. 1092—95. 1924. Univ.) SPIEGEL

Haruyoshi Senga, *Eine vergleichende Studie über Hyperglykämie, durch Coffein, Theobromin und Theocin hervorgerufen*. Bei gleichen Mengen erhöhen Coffein und Theocin den Blutzuckergehalt stärker als Theobromin. Der Verlauf der Hyperglykämie ist bei allen wesentlich gleich. Auf starke Erhöhung folgt Glykosurie. Da die beiden ersten auch auf das Zentralnervensystem stärker wirken, hält Verf. die hier beobachtete Hyperglykämie für zentral bedingt. (Journ. of oriental medicine **2**. 109. Kyoto, Univ.; Ber. ges. Physiol. **27**. 474. 1924. Ref. SCHÜBEL.) SPIEGEL

Maurice Nicloux und **Georges Fontès**, *Über einige Arten der Bildung von Methämoglobin und über seine Bestimmung*. Kurzes Ref. nach C. r. d. l'Académie des sciences vgl. C. **1924**. II. 848. Nachzutragen ist, daß die B. von Methämoglobin in den Blutkörperchen leicht bei Schütteln der defibrinierten Blutes in O₂-Atmosphäre mit Al-Pulver erfolgt. (Bull. Soc. Chim. Biol. **6**. 728—41. 1924. Straßburg, Acad. de méd.) SPIEGEL

Eric Ponder, *Beobachtungen über den Zusammenhang zwischen Oberfläche und Hämoglobingehalt der Erythrocyten*. Die Bürkersche Formel $\frac{D^2 \pi}{2}$ für die Oberfläche des Erythrocyten berücksichtigt dessen Dicke nicht. Unter Auffassung der Erythrocyten als Rotationsellipsoid, von dem für die beiden Konkavitäten 2 kleine Ellipsoide in Abzug zu bringen sind, gelangt Vf. zu den Formeln:

$$\text{Oberfläche} = 2\pi A_2 + 2\pi AB \frac{\sin h^{-1}e}{e},$$

$$\text{Volumen} = \frac{4\pi A^2 B}{3} - 2 \left[\frac{4\pi a^2 b}{3} \right],$$

worin $e = \sqrt{A_2 - B^2}/B$ die Exzentrizität, A die große, B die kleine Halbachse des Ellipsoids ist, a u. b die großen u. kleinen Halbachsen der zu subtrahierenden

kleinen Ellipsoide. Für die Dicke findet er aus der Literatur ca. $\frac{D}{3.3}$, wobei D wie bei BÜRKER, $= 2a$. Berechnet man von Oberfläche u. Vol. der Erythrocyten verschiedener Säuger, so findet Vf. für den Gehalt an Hämoglobin pro μ^2 Oberfläche nach BÜRKERS Formel eine Variation von $\pm 7.5\%$, nach seiner Formel von $\pm 12\%$, pro μ^3 Vol. von $\pm 28\%$. Die Beziehung $Hb/\text{Vol.} = \text{Konstante}$ kann ebenso gut gelten wie $Hb/\text{Oberfläche} = \text{Konstante}$; beide liegen innerhalb der üblichen Fehlerbreite. (Quart. Journ. of exp. physiol. **14**. 37—47. Edinburgh, Univ. Ber. ges. Physiol. **27**. 355. 1924. Ref. BIEHLER.) SPIEGEL

Eric Ponder, *Die hämolytische Wirkung der Seifen*. Die Stearate, Palmitate u. Oleate wirken in steigender Reihenfolge hämolyt. Zwischen K- u. Na-Seife ist kaum ein Unterschied in der Wrkg. vorhanden. Die Zeitverdünnungskurven haben den üblichen logarithm. Typ, die Zeittemperaturkurven den üblichen hyperbol. Die Prozenzhämolysekurven können außer bei Na-Oleat wegen der Opalescenz in der hämolyt. Konz. nicht genügend erforscht werden. Na-Oleat zeigt die übliche

surve. Serum, Plasma u. auch Hämoglobinlg. hemmen die lyt. Seifenwrkg., eigentlich die der Oleate; sie beschleunigen diese hämolyt. Wrkg. aber, wenn sie zugefügt werden, nachdem die Seife schon auf die Zellen eingewirkt hat. Perio-
dität ist bei den Seifen nicht zu beobachten. Die Gestaltsveränderungen der
Erythrocyten durch die Einw. dieser Seifen sind den durch *Saponin* u. *Gallensalze*
verursachten sehr ähnlich. Die Seifenlsgg. verlieren beim Stehen allmählich ihre
lyt. Kraft. Nach allen Beobachtungen wirken die Seifen wie *Na-Taurocholat*;
dies beruht ihre Wrkg. auf einem Angriff auf die Proteinkomponenten der
Erythrocyten. (Biochemical Journ. 18. 845—51. 1924. Edinburgh, Univ.) WOLFF.

Kurt Samson, *Ein Beitrag zur Kenntnis der Serumglobuline des Menschen*. Bei
Prüfung von Globulinfällungen im Serum, besonders zur Feststellung der ver-
schiedenen Globulinfractionen u. ihrer Labilitätsverhältnisse mittels $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ fand
er Anfangs Kurven, die in keiner Weise erklärbar waren. Dies führte zu neuen
Versuchsarrangements, deren erste Ergebnisse hier wiedergegeben werden. Von
Bedeutung ist völlig neutrale Rk. der $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ -Lsg. Sie ist immer deutlich sauer
auf Lackmus, wenn die h. gesätt. Lsg. durch Kochen hergestellt wird. Vf. behandelt
das des reinsten Salzes von MERCK mit 80—90° h. doppelt dest. W. unter Schütteln
zur möglichst vollständigen Lsg., läßt dann erkalten. Es zeigte sich in ver-
schiedenen Versuchsreihen, daß die maximale Fällung von Globulin beim Neutral-
punkte eintritt, so daß man in solcher Versuchsreihe durch Titration bis zum
Minimum der Fällung die Alkaleszenz von Blutserum bestimmen kann. Dies ist
auch der Fall bei mit Ä. ausgeschütteltem Serum, wo die Fällung an sich stärker
ist. Vf. schließt aus seinen Versuchsergebnissen: Der isoelekt. Punkt des Serum-
globulins liegt im Neutralpunkt ($\text{pH} = 7$). Als isolabiler Körper ist Globulin in
dest. W. unl., aber in Salzlgg. durch B. von Salzglobulinen l.; diese haben einen
anderen isoelekt. Punkt als reines Globulin. (Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper.
Medizin. 41. 311—35. 1924. Hamburg-Friedrichsberg, Psychiatr. Univ.-Klin.) SP.

Alessandro Dalla Volta und **Piero Benedetti**, *Beitrag zur Kenntnis der Be-
ziehungen zwischen physikalisch-chemischem Zustand und biologischer Aktivität menschen-
licher Sera. Die Inaktivierung der Sera durch Äthylalkohol*. Sowohl verd. A. als dest.
A. verursachen in frischen menschlichen Seren Trübung u. Flockung, dest. W.
inaktiviert, wo mit A. höchstens leichte Opaleszenz eintritt. Dieser wirkt
innerhalb bestimmter Serumverdünnungen (1 : 5 bis 1 : 80). Sowohl A. als W.
besitzen innerhalb gewisser Serumverdünnungen, bei beiden verschiedenen, Zerstörung
der komplementären Eigenschaften. Besonders beim A. konnte nachgewiesen
werden, daß dies mit physikal.-chem. Zustandsänderungen des kolloiden Systems
zusammenhängt. (Arch. di scienze biol. 5. 287—307. Bologna, Univ.; Ber. ges. Phy-
sik. 27. 459. 1924. Ref. SELIGMANN.) SPIEGEL.

G. Izar und **S. Fortuna**, *Über den Einfluß kleiner Zuckergaben auf die kom-
plementäblenkende und agglutinierende Wirkung des Blutserums*. Bei Luetikern
nach Einnahme von 100—200 g Saccharose per os die spezif. Komplement-
zerstörungsfähigkeit des Blutserums herab bei Erhöhung der spezif. Ablenkungsfähig-
keit. Ähnlich wirkt subcutane Einspritzung von 10 ccm 4,7%ig. Glucoselsg. (gleiche
Konz. gegen isoton. NaCl-Lsg. oder 10%ig. Eiereiweißlg. sind wirkungslos). Ebenso
steigt (bei Maltafieber) Zunahme der spezif. agglutinierenden Wrkg. durch Zucker-
gaben festgestellt. Bzgl. der Komplementablenkungsfähigkeit ergab sich Begünsti-
gung der Wrkg. durch am vorhergehenden Tage verabreichte Abführmittel, bzgl.
Agglutination nicht. (Klin. Wehschr. 3. 2196. 1924. Catania, Univ.) SPIEGEL.

C. H. Andrewes, *Eine unerklärte Diazofarbreaktion in Urämieseren*. Schwere
Urämiesera gaben bei der indirekten Rk. nach HYMANS VAN DEN BERGH statt der
Rosafärbung orangelederfarbene, bei Stehen verstärkt, bei Alkalisieren kirsch-
rot, dann rasch verschwindend. Bedingung für diese Rk., die in wss. Lsg. nicht

deutlich u. in alkoh. Lsg. viel langsamer als die echte Diazork. auftritt, ist schw. Niereninsuffizienz mit > 200 mg Rest-N in 100 cem. Der dafür verantwortl. Körper konnte bisher nicht festgestellt werden. (Lancet 206. 590—91; Ber. Physiol. 27. 365. 1924. Ref. STRAUZ.)

James Fitton Couch, *Die Entwicklung der chemischen Terminologie. Toxin*. (VII. vgl. Amer. Journ. Pharm. 95. 806; C. 1924. I. 993.) Die verschiedene Bedeutung des Ausdrucks Toxin wird besprochen. Die Ausdrücke Patoxin, Zootoxin D u. Ptomain werden erläutert u. Vorschläge zur Einschränkung ihrer Bedeutung werden gemacht. Der Ausdruck Toxalbumin sollte vermieden werden; er ist unnötig u. setzt Proteinnatur für die Toxine voraus, die durch moderne Kenntnis dieser Stoffe nicht bestätigt wird. (Amer. Journ. Pharm. 95. 746—51. 1924.)

Corbet Page Stewart und **John Burdon Sanderson Haldane**, *Experimentelle Veränderungen des Calciumgehaltes menschlichen Serums und Harns*. Der Ca-Gehalt menschlichen Serums kann um 10—20% durch Zufuhr von CaCl_2 oder Na_2CO_3 durch Einatmung von 6—7% CO_2 oder durch forciertes Atmen erhöht, durch Zufuhr von 10—20% NaHCO_3 erniedrigt werden. Der Ca-Gehalt des Harns steigt auf NH_4Cl -Gaben; durch NaHCO_3 wird er wenig beeinflusst. (Biochemical Jour. 18. 855—57. 1924. Cambridge, Bioch. Lab.)

K. Kiesel, *Oberflächenspannung und oberflächenaktive Stoffe*. Vf. konnte nachweisen, daß die Tropfen des Harns, also auch jeder oberflächenaktive Stoff in haltenden Fl., um so größer werden, je kürzer die Zeit ist, in der jeder Tropfen sich bildet, daß demnach das Tropfengewicht eine parabol. Funktion der Tropfenbildungszeit ist. Als Ursache sieht Vf. die Adsorption der oberflächenaktiven Stoffe an der wachsenden Tropfenoberfläche an. Ein ganz ähnliches Verh. zeigt Wasser demnach aus verschiedengradig assoziierten H_2O -Molekülen besteht. Mit Hilfe der Auswertung der Funktionskurve: Tropfenbildungszeit-Tropfengewicht konnte gezeigt werden, daß die Tropfengewichte verschiedener Harne dann prakt. vergleichbar sind, wenn ihre Ermittlung bei genau derselben Tropfenbildungszeit erfolgt. Unter Berücksichtigung dieser Verhältnisse wird die stalagmometr. Methode sicher brauchbar. Die Oberflächenspannung im Harn kann kein einfacher Vorgang sein, sondern ist ein mehrteiliger Prozeß. Es muß beim Harn unterschieden werden zwischen den im eigentlichen Sinne oberflächenaktiven Körpern, die im W. u. a. grundsätzlich gleiche Wrkg. äußern u. den nur mittelbar oberflächenaktiven Körpern, die nur im Harn die Oberflächenspannung vermindern. Wenn die letzteren heute noch nicht genau bekannt sind, so sind sie doch von wohlbegrenzter Toxizität, denn Vf. konnte sie durch Kohle, Cellulose u. auch durch den Saft des eigenen Harns in einer Form adsorbieren, die der Adsorptionsisotherme entspricht. Ein geringer Teil der Oberflächenwrkg. kann auf das n. Vorhandensein gewisser Krystalloide zurückgeführt werden, etwa $\frac{1}{10}$ der Aktivität sind ursächlich noch nicht aufgeklärt. Sehr vieles spricht für die Kolloidnatur dieser Substanzen, die wesentliche Stoffwechselprodd. der Zelle sind. Es konnte gezeigt werden, daß bei gewissen Krankheiten die Oberflächenaktivität des Harns nicht nur quantitativ von der Norm abweicht, sondern auch, beispielsweise bei Morbus makulosa qualitativ verschiedenes Verh. zeigt. (Dtsch. tierärztl. Wehschr. 32. 697—98. 1924. Gaildorf.)

Laignel-Lavastine und **R. Cornélius**, *Wasserstoffzahl des Harns und Titration der organischen Säuren des Harns bei Angst- und Depressionszuständen*. Die Steigerung des Gehaltes an organ. Säuren bei derartigen Zuständen (vgl. C. r. s. c. biologie 89. 160; C. 1923. III. 950) wurde durch fortgesetzte Unterss. bestätigt. Dabei ist namentlich auch das Verhältnis der organ. Säuren zum Harnstoff eingehend untersucht. Die direkte colorimetr. Best. der $[\text{H}^+]$ zeigte Hypoacidität des Harns an, die all-

ähnlich einer Alkalose des Blutes entspricht. (C. r. soc. de biologie **91**. 872 873. 1924.)

SPIEGEL.

Wm. O. Moor, *Über Urochromogen und Urochrom, nebst einem weiteren Beitrag zum Kenntnis des U-Stoffes*. Zu der Best. von Urochromogen nach WEISZ (Biochem. Ztschr. **112**. 61; C. **1921**. I. 375) weist Vf. darauf hin, daß eine Gelbfärbung auch im Harn mit KMnO_4 durch in kolloidaler Lsg. gehaltenes $\text{Mn}_2\text{O}_3(\text{OH})_2$ herbeigeführt wird. Er unterscheidet die „Desoxydationskraft“ des Harnes von der „Oxydationskraft“. Die letzte äußert sich z. B. gegenüber $\text{FeCl}_3 + \text{K}_3\text{Fe}(\text{CN})_6$ u. gegenüber Phosphorwolframsäure, während jene, wie sie sich gegenüber KMnO_4 äußert, besteht, wenn jene beiden Rkk. nach Zusatz einer gewissen Menge KMnO_4 verschwunden sind, allerdings so, daß KMnO_4 nur noch langsam entfärbt wird. Auch wie der Harn verhält sich nun bei allen genannten Rkk. der U-Stoff, die Vf. kürzlich (Biochem. Ztschr. **149**. 575; C. **1924**. II. 1701) neben Harnstoff findende Substanz. Auch quantitativ hängt hauptsächlich von ihrer Menge die Desoxydationskraft des Harnes ab. Sie ist nach Meinung des Vfs. der quantitativ bedeutendste organ. Bestandteil des Harnes, von ihm in einem der untersuchten Harnen auf ca. 2,33% geschätzt u. von weitgehender biolog. u. patholog. Bedeutung, worin namentlich das Verhältnis zum krystallin. Harnstoff in Betracht kommt. Dieses ließ sich ungefähr ermitteln durch Best. der Desoxydationskraft des alkoh. Extraktes mit KMnO_4 , von dem 100 Gewichtsteile U 134,5 Gewichtsteile desoxydieren, während Harnstoff indifferent ist. N. Harnen geben mit NH_3 u. Phosphorwolframsäure sowie mit $\text{FeCl}_3 + \text{K}_3\text{Fe}(\text{CN})_6$ kräftige Blaufärbungen, deren Intensitätsveränderung auf krankhaften Zustand des Organismus hinweist. — Ein quantitativ wesentlicher Bestandteil des Harns ist ferner das Urochrom, von dem Vf. aus 3 Harnen 0,32–0,4–0,28% nach näher angegebener Methode isolieren konnte. Es ist in A. ganz unl. (Biochem. Ztschr. **153**. 19–38. 1924. Leningrad.) SPIEGEL.

John Addyman Gardner, *Über den Cholesteringehalt von Galle, Blut und Fleisch des Flusspferdes*. Die Galle ist fettarm, enthält aber freies u. verestertes Cholesterin. Der Gesamtcholesteringehalt betrug in dem untersuchten Falle 0,47% des gesamten festen Substanz. Der in Ä. l. Teil der festen Gallenbestandteile enthielt 6,54% freies u. 0,126% verestertes Cholesterin. Der in A. unl. Anteil betrug 0,1 g Cholesterin, zumeist wohl in Esterform. Der in W. u. Ä. l. Teil betrug 0,32 g Cholesterin, hauptsächlich wohl als Ätherschwefelsäure, konnte aber nicht methyliert werden, u. das Cholesterin war nur durch Säurehydrolyse in Freiheit zu setzen. Dieses betrug etwa 74% des gesamten Estercholesterins. Der Prozentsatz an gesamtem Cholesterin ist in dieser Galle viel niedriger als die Werte für Blasengalle bei Haustieren, z. B. der Kuh. Die Mengen an freiem u. Estercholesterin in Blut u. Fleisch befanden sich innerhalb der Grenzen für Pflanzenfresser. (Biochemical Journ. **18**. 777–84. 1924. St. Georges Hosp., Biochem. Lab.) WFF.

Robert Henry Aders Plimmer und **John Lowndes**, *Die Änderungen im Calciumgehalt des Hühnereies während der Entwicklung*. Der Ca-Gehalt des Eies betrug durchschnittlich 0,04 g, er steigt während der Entw. des Hühnchens auf 0,20 g, 0,25 g. Der erste Anstieg erfolgt am 11. Bruttage, dann täglich um 0,02 g, bis das Hühnchen ausgebrütet ist. Ähnlich bei Tauben. Ca- u. CO_2 -Gehalt der Eischale schwanken stark. Auch die Schalenhaut hat einen erhöhten Ca-Gehalt während der Brutzeit; Ca passiert demnach diese Membran. Schalenlose Eier enthalten mehr Ca, als für die Entw. des Embryos nötig ist. Die Schale ist also wichtiger zum Schutze vor Wasserverlust. (Biochemical Journ. **18**. 1163–69. 1924. St. Thomas Hosp. Med. School.) WOLFF.

L. F. Meyer und **E. Nassau**, *Experimentelle Untersuchungen über den Vitamingehalt der Milch*. Frische, aus einem Kuhstall bezogene u. durch keine Zusätze veränderte Milch wurde im Vergleich mit Berliner Kindermilch an Meerschweinchen

verfüttert. Die Tiere erhielten täglich 50—75 ccm der Milch neben etwas Hafer. Es zeigte sich, daß die frische Kuhmilch bei einer Versuchsdauer von vier Wochen neben Hafer verfüttert, Meerschweinchen vor Skorbut schützen und das Wachstum u. Gedeihen der Tiere gewährleisten kann. Diese Tatsache spricht für einen nicht geringen Gehalt frischer Milch an C-Vitaminen. Ganz anders verhält sich die Berliner Kindermilch, die besonders für Säuglingsernährung empfohlen wird. Sämtliche mit dieser Milch gefütterten Vers.-Tiere erkrankten binnen 3 Wochen an Skorbut u. gingen, wenn der Vers. nicht bald abgebrochen wurde, zugrunde. Ebenso verhielt sich die gewöhnliche Berliner Marktmilch u. die sogenannte sterilisierte Milch, die, fein verstaubt kurz auf 72° erhitzt, die Vitamine angeblich schonen soll. Als prakt. Folgerung dieser Verss. gaben Vff. C-Vitamine in Gestalt von Fruchtsäften den Kindern ausgiebiger als früher u. sorgten für Beschaffung frischer Kuhstallmilch. Der Meerschweinchen-Skorbutvers. sollte ganz allgemein unter Qualitätsprüfungen der Milch aufgenommen werden. Die Fähigkeit der Milch u. Skorbutverhütung leidet durch die Sterilisation, einmaliges oder wiederholtes Pasteurisieren nach verschiedenem Verf., Zusatz von Na_2CO_3 u. H_2O_2 . Es konnte fest festgestellt werden, daß eine längere Aufbewahrung frischer Kuhstallmilch in eisgekühltem Zustande, 24—36 Stdn. lang, ihr nichts von der skorbutschützenden Kraft wegnimmt. Schädigend wirken aber alle Maßnahmen, durch die die Milch erhitzt u. oxydiert wird, auch das Durchleiten atmosphär. Luft, auf das C-Vitamin ein. Da die Milchkonservierung in den Großstädten eine unabwendbare Notwendigkeit ist, bleibt vorläufig nur übrig, den Mangel der Milch durch möglichst frühzeitige Zulage C-Vitaminreicher Nahrungsstoffe zu ergänzen. Die Frage der Ziegenmilchanämie wurde gleichfalls durch einen Meerschweinchenvers. zu klären versucht. Die frische Milch einer mit Grünfutter genährten Ziege war nicht imstande, den Skorbut der Meerschweinchen zu verhüten. Es scheint sich demnach um eine tropophen. u. nicht um eine tropotox. Wrkg. der Ziegenmilch zu handeln. (I. Wehschr. 3. 2132—35. 1924. Berlin, Waisenhaus.) FRANKE

J. Kahn und G. Yaure, *Zur Frage der Entstehung der Reaktion des Magensaftes bei der Verdauung*. Die [H⁺] wurde bei Hunden gleichzeitig im großen u. im nach PAWLOW isolierten Hundemagen geprüft. Die Rk. im Magen während der Verdauung entsteht infolge der Alkalisierung der sich absondernden Säure durch verschiedene Faktoren. Der zurückdringende Duodenalsaft hat hier bei der Einstellung der optimalen Rk. scheinbar keine Bedeutung. Diese Einstellung scheint von den in der Nahrung befindlichen Eiweißkörpern u. von den im Magen befindlichen Schleim abhängig zu sein. (PFLÜGERS Arch. d. Physiol. 206. 119—22. 1924. Moskau, Inst. f. biol. Physik.) WOLF

Samuel Andrews, Florence Beattie und Thomas Hugh Milroy, *Der Säure-Basenwechsel im willkürlichen Saugermuskel*. Pferdemuskelpreßsaft hat bei 37° pH 7,18—6,77, erhitzter 6,63—6,18 unter Zunahme des anorgan. Phosphates, die konstanter ist als der Milchsäureanstieg. Die entsprechenden Werte für Hutepreßsaft betragen 7,14—6,20 bzw. 6,69—6,07 mit gleichen Änderungen in der Säure. — Im Preßsaft des gefrorenen Muskels sind mindestens drei Systeme vorhanden, die Basen in leicht verfügbarer Form tragen, nämlich anorgan. Phosphat, die Vorläufer des organ. Phosphats u. die kolloiden oder Proteinsalze. Die beim Erhitzen gebildete Milchsäure holt sich ihre Base aus diesen Systemen. Wenn mit der Säurebildung kein Anstieg des anorgan. Phosphats einhergeht, vermindert sich die Pufferungsfähigkeit. (Biochemical Journ. 18. 993—1008. 1924. Belfast, Univ.) VFF.

Hermann Bernhardt, *Zur Frage des Mineralstoffwechsels bei der Acidose, zugleich ein Beitrag zur Therapie rhachitischer Knochenverkrümmungen*. NH_4Cl ruft eine Acidose hervor. Verfolgt man dabei im Bilanzvers. den Ca-Haushalt, so zeigt sich, daß bei kleinen Dosen die Ca-Ausscheidung im Urin steigt, ohne ab-

Ausscheidung durch den Darm sich wesentlich ändert. Bei großen Dosen tritt aber auch diese beträchtlich an bis zur negativen Ca-Bilanz. Das Mg verhält sich etwa wie Ca, wird aber später angegriffen u. bei Aussetzen des Cl sofort wieder retiniert. (Ztschr. f. klin. Med. 100. 735—41. 1924. Berlin, Strité.)

WOLFF.

Herbert Davenport Kay und **Robert Robison**, *Die Rolle der Phosphate im Kohlenhydratstoffwechsel. I. Die Wirkung des Muskelenzyms auf die organischen Phosphorverbindungen des Blutes. II. Die Wirkung von Insulinzufuhr auf die Verteilung von Phosphorverbindungen in Blut und Muskel.* Die Phosphorsäureester des Blutes wurden mittels des Muskelenzyms untersucht, welches Hexosediphosphorsäureester hydrolysiert, aber nur selten auf Hexosemonophosphorsäureester einwirkt. Der Ester vom Typ der Hexosediphosphorsäure dürfte im Blute vorkommen. Es ist aber sicher, daß der größere Teil der organ. Phosphate, der vom Knochenenzym hydrolysierbar ist, durch Muskelenzym nicht gespalten wird. In dieser Hinsicht zeigt der Ester der wichtigen Bedingung eines spezif. Substrates im Schema der Spezifikation. — Durch *Insulin* werden organ. Phosphorsäureester in den Blutgefäßen synthetisiert auf Kosten des anorgan. Phosphates, das ursprünglich im Blut vorhanden ist, u. aus solchem, das aus dem Gewebe herangezogen ist. Diese Ester sind hauptsächlich von dem Typ, der durch Knochenenzym nicht hydrolysiert wird, aber es ist möglich, daß Zucker oder ein Zuckerderivat in ihr Mol. eintritt. Die Grundlage von 1 Mol. Glucose pro Atom P dürfte die veresterte Phosphorsäure etwa 40% des gleichzeitig aus dem Blut verschwindenden Zuckers in Anspruch nehmen. Nach Insulinzufuhr wurden keine Veränderungen des anorgan. Phosphates oder des gesamten säurel. P in der Muskulatur gefunden, jedoch steigen hydrolysierten Phosphorsäureester (Lactacidogen-P) um 50% an bei 3-stünd. Analyse des bei 38° mazerierten Muskels. Das Phosphat für diese ansteigende Lactacidogenmenge stammt sicher aus anderen P-Verbb. der Muskeln; jedoch ist der Ursprung der entsprechenden Kohlenhydratkomponente unklar. (Biochemical Journal. 18. 1139—51. 1924. Cambridge, Biochem. Lab.; Biochem. Departm. Lister-Institut.)

WOLFF.

F. Plattner, *Zur Frage der Ausscheidung saurer Farbstoffe durch die Leber.* Mit eiweißfreier Indigocarmin-Ringerlsg. durchströmten Froschlebern tritt bei geschlossenen äußeren Gallemengen keine Färbung der Gallencapillaren u. der Gallengalle auf. Bei eiweißhaltiger Lsg. u. sonst gleichen Bedingungen färben sich nur die Gallencapillaren. Diese Färbung tritt bei Gallenblasenfisteln mit eiweißhaltigen wie -freien Lsgg. ein; die Fistelgalle ist gefärbt u. enthält den Farbstoff in höherer Konz., als die Durchströmungssfl. Die Konzentrierung des Farbstoffes wird sich durch Narkose verhindern. (PFLÜGERS Arch. 206. 91—100. 1924. Kiel, Physiol. Inst.)

WOLFF.

Madge Kaye und **Dorothy Jordan Lloyd**, *Über die Biochemie der Haut und die chemische Grundlage der Hautquellung.* Die Hautfibrillen u. -fasern sind in die extracelluläre Fl. eingebettet, die in ihren Eigenschaften den Plasmaproteinen ähnelt. Bei Hauttrocknung mit Albuminkoagulation, also bei Temp. über Bluttemperatur, bei starkem Licht, bei Ggw. von A. bei Zimmertemp., bilden die intercellulären Proteine einen nicht quellenden, unl., nicht elast. Nd. um die Fasern, u. die Wasserabsorptionsfähigkeit der Haut ist vermindert. Solche Haut erweicht sich, wenn sie in W. eingeweicht wird. Substanzen, die denaturiertes Albumin zu kochen oder zerstören, wie *Na-Citrat* oder *Trypsin*, entfernen dieses koagulierte extracelluläre Substanz; so vorbehandelte Haut hat dann wieder eine größere Wasserabsorptionsfähigkeit, wenn auch noch nicht die n. Bedingungen erfüllt sind. Frische Haut absorbiert auch stärker W. als solche, die bei 0° mit A. getrocknet ist. Haut, die bei 37° oder darunter getrocknet ist, kann dem n. Zu-

stande der Wasserabsorption durch Behandlung mit Trypsin näher gebracht werden. Das Trocknen greift demnach weniger die Fibrillen als die interfibrillären Proteine an. Die kolloidale Hautquellung beruht auf dem Netzwerk der Hautfasern. Diese enthalten alles *Collagen*. Die Hautquellung in Säure wie in Alkalien beruht auf der B. ionisierbarer Collagensalze. Die Aufnahme von Säure u. Alkalien wird durch die Struktur nicht beeinflusst. Quellung in saurer Lsg. beruht auf der Ggw. freier NH_2 -Gruppen in der Haut. Entfernung dieser Gruppen mindert die absorbierte u. gebundene Säuremenge. (Biochemical Journ. **18**. 1043—57. 1924.) WOLF

J. Ten Cate, *Der Kaliumgehalt der Durchströmungsflüssigkeit und die Wirkung der Erregung des Vago-Sympathicus auf das Froschherz*. Am isolierten u. anisotrope situ belassenen Herzen kann man bei K-freier Ringerlsg. zwei bestimmte Perioden unterscheiden. In der ersten ist die Vaguswrkg. am Herzen verstärkt wie bei K-armen Durchströmungsverss. Wenn durch längere Durchströmung die K-armung des Herzens zunimmt, beginnt die zweite Periode, in der die Vaguswrkg. schwächer wird u. schließlich aufhört. Es besteht eine gewisse Abhängigkeit von der Jahreszeit. Individuelle Schwankungen hängen vom jeweiligen K-Gehalt des Herzmuskels ab. Die Wrkg. des Sympathicus ist unabhängig vom K-Gehalt der Durchströmungssfl. (Archives néerland. d. Physiol. d. l'homme et des animaux **9**. 558—72. 1924. Amsterdam, Univ.) WOLF

Dietrich Jahn, *Über den Einfluß von Ionen auf die Erregbarkeit des Nerven durch Momentan- und Zeitreize*. Die Erregbarkeit des Nerven gegenüber Momentan- u. Zeitreizen wird durch chem. u. physikal.-chem. Einflüsse stets verändert, zunächst im gleichen Sinne, aber fast niemals im gleichen Maße. Daher verändern sich meist die Reizungsdivisoren gegenüber der Norm; sie werden z. B. durch hypoton. Kll. erhöht, durch hyperton. vermindert. Bemerkenswert ist, daß KCl , KNO_3 , $\text{UO}_2(\text{NO}_3)_2$ u. $\text{Th}(\text{NO}_3)_4$ bei kurzer Einwirkungsdauer die Erregbarkeit des Nerven gegenüber Momentan- u. Zeitreizen durchaus in gleichem Maße steigern. Die Überführung des Nerven in Ringerlsg. ist die Wrkg. der Salze nicht immer rückgängig zu machen, namentlich bei Ca^{++} . Bei länger dauernder Einw. aller n. gewandten Salze u. Lsgg. wird die Erregbarkeit des Nerven geschädigt, bis sie gehoben; sie bleibt nur in Ringerlsg. für lange Zeit unverändert erhalten. (Pflügers Arch. d. Physiol. **206**. 66—80. 1924. Freiburg i. Br., Univ.) WOLF

Susumu Maki, *Über die Wirkung radioaktiver Substanzen auf den isolierten Uterus*. In K-freier Salzlsg. arbeitet der isolierte Schweineuterus bald unregelmäßig, allmählich erschlafft das Organ. Bei K-Zusatz in physiol. Menge tritt nach ca. 5 Min. wieder die n. Tätigkeit für viele Stdn. ein. Einw. von Ra-Strahlen auf den in K-freier Lsg. suspendierten Uterus führt zu kleinen, unregelmäßigen Kontraktionen nach 1—20 Min., aber nur vorübergehend; dagegen tritt bei K-Zusatz wieder vollkommene Erholung ein. Bei Fehlen von Ca in der Tyrodelsg. stillt der Uterus sofort still. Einw. von Ra kann dann kleine, unregelmäßige Kontraktionen auslösen, jedoch das Ca nicht ersetzen. Bei Ggw. n. Tyrodelsg. bewirken Ra-Strahlen eine Beschleunigung u. Regulierung seiner Tätigkeit; die einzelnen Kontraktionen werden dabei kleiner. Die Wrkg. des Ra ähnelt dabei durchaus der von Pilocarpin u. Physostigmin. Auch 2-std. Einw. schädigt nicht. Ebenfalls muscarinartige Einw. am isolierten Esculentenherzen; Beseitigung durch *Atrium*. *RaTh* verursacht am Uterus schon in der Konz. $1:2,5 \cdot 10^{-14}$ Beschleunigung u. Verkleinerung der Kontraktionen. Die verschiedenartigsten Verdünnungen ermöglichen keine Erholung des durch K-Mangel geschädigten Organs herbeizuführen. *Urannitrat* u. *Thoriumnitrat* konnten K nicht ersetzen. In n. Tyrodelsg. wirken beide in Konz. von ca. $1:100\,000$ regulierend auf spontan unregelmäßige Uterusbewegungen ein. K ist nach all diesen Verss. also nicht durch radioakt. Substanzen

zbar. (Biochem. Ztschr. 152. 211—27. 1924. Würzburg, Pharmakol.

WOLFF.

J. J. Bouckaert, *Einfluß des Äthylens auf Atmungsstoffwechsel, Blutdruck und ortes Herz*. Die Ausscheidung von CO_2 ist während tiefer Anästhesie durch im Mittel um 15% vermindert, steigt nach Aussetzen des Mittels allmählich wieder zur Norm. Vol. u. Schnelligkeit der Atmung steigen mit der Dauer Anästhesie, C_2H_4 behindert also das Atmungszentrum nicht. Die Temp. wird drigt, steigt aber nach Aussetzen schnell wieder. Isolierte Herzen von Frosch aninchen wurden in keiner Weise beeinflusst. Wiederholte Anästhesien durch I hatten keinen nachteiligen Einfluß auf den Allgemeinzustand. (C. r. soc. de gie 91. 907—9. Gand, Univ.)

SPIEGEL.

E. Vartia, E. Loveson und A. Korhonen, *Beitrag zur Kenntnis der Wirkung ch konzentrierten Alkohols*. Selbstverss. der Vff. lassen erkennen, daß unter günstigen Bedingungen (große Mengen Bier in kurzer Zeit auf nüchternen an neben wenig ausreichender Nahrung) Bier mit 2,74% A. eine geringe ungung auf Präzisionsarbeitsleistung (Einfädeln von Nähnadeln) üben kann, es von 1,73 u. 2,08% nicht mehr. (Finska läkaresällskbps handlingar 66. 3—65. Helsingfors, Univ.; Ber. ges. Physiol. 27. 470—71. 1924. Ref. I LZ.)

SPIEGEL.

Charles C. Haskell, J. E. Rucker und W. S. Snyder, *Der Wert des Coffeins ntidot des Morphins*. Gleichzeitige oder vorherige Gaben von Coffein erhöhten atzen, Meerschweinchen u. weißen Mäusen die Empfindlichkeit gegen Morphin. icht spielt hierbei ungünstiger Einfluß auf das Herz eine Rolle. (Arch. of eal med. 33. 314—20. Charlottesville, Med. coll. of Virginia; Ber. ges. Physiol. 75. 1924. Ref. SCHÜBEL.)

SPIEGEL.

Harold N. Ets, *Einige chemische Änderungen des Blutes durch Arzneistoffe*. III. *Phizin*. Bei Hunden erzeugt Phlorhizin Hypoglykämie, Zunahme der Lipoide s Cholesterins im Blut, Abnahme der Alkalireserve u. der pH , Zunahme des eiweiß-N. (Amer. Journ. Physiol. 70. 240—46. 1924. Chicago.)

MÜLLER.

E. Rosenberg, *Über Santonin*. Zusammenstellung der pharmakolog. Wrkgg. Santonins. (Dtsch. tierärztl. Wechschr. 32. 695—97. 1924. Berlin, Tierärztl. schule.)

FRANK.

David L. Drabkin und D. J. Edwards, *Die Erzeugung von Anhydrämie durch n*. Bei experimenteller Hypoglykämie, die durch *Insulin* erzeugt wird, nimmt Blutfarbstoffgehalt des Blutes (in %) zu, zugleich damit die Blutzellenzahl, und das Plasmavolumen abnimmt. Das Blut wird also sicher eingedickt. — dieser Verlust an Blutflüssigkeit schnell ein, so sieht man eine Reihe von erscheinungen (Kreislauf), die mit dem Namen „Hypoglykäm. Reaktion“ un- bezeichnet sind. Um auszudrücken, daß die gefährliche Allgemeinwrkg. des us nicht allein durch das Sinken des Blutzuckers hervorgerufen wird, schlagen len Namen „Hyperinsulin dyshexia“ vor. — Sie tritt besonders leicht ein, der Organismus schon an sich wasserarm ist. (Amer. Journ. Physiol. 70. 82. 1924. New York City.)

MÜLLER.

Albert A. Epstein, Nathan Rosenthal, Eugenia H. Maechling und Violet ick, *Studien über die Beziehung der inneren zur äußeren Sekretion des Pankreas*. *biochemische Studie über die Art der Wirkung von Trypsin auf Insulin*. 0,003 mg ügigen Trypsins inaktiviert 1 Einheit Insulin, u. zwar fast sofort bei 3, 18 u. u. bei pH über 4,6. — Reaktivierung durch Ansäuern bis zu pH unter 4,6 t noch nach 42 Stdn. Einw. von Trypsin bei 37,5°. Das Prod. der Rk. von in u. Insulin hat noch die proteolyt. n. Labfermentartige Eigenschaft des yns. — Blutserum verhindert die Wrkg. von Trypsin auf Insulin nicht. Sie her keine proteolyt. — Diese Inaktivierung des Insulins kann unter gewissen

Bedingungen auch im Organismus auftreten. (Amer. Journ. Physiol. **70**. 225 1924. New York City.)

Pagel, *Erfahrungen über ein neues Schlafmittel „Noctal“*. Noctal, (I. D. RIEDEL, Berlin) eine in W. fast unl., in Alkali u. organ. Lösungsm. l. propylbrompropenylbarbitursäure ($C_{10}H_{13}N_2O_3Br$), bewährte sich als leichtes u. gefährliches Schlafmittel bei nervöser Schlaflosigkeit. Nach Schlaf tiefe u. Schlafdauer geschätzt entsprechen im Effekt 0,1 Noctal etwa 0,3 Veronal, 0,5 Ada 1,0 Chloralamid. In einzelnen Fällen erschienen 0,2 Noctal noch 0,3 Lucin überlegen. (Therapie d. Gegenwart **65**. 526. 1924. Offenbach, Stadtkrankenh.)

M. Wakamatsu, *Über den Einfluß der Hitze auf die anästhesierende Wirkung des Cocains*. Die Wrkg. von Lsgg. des Chlorhydrats nimmt bei 100° in 10 Min. nur wenig ab, in 30 Min. ziemlich auffallend, in 2 Stdn. sehr deutlich. Nach Zusatz von NaOH zur Lsg. des Chlorhydrats ist die pharmakolog. Wrkg. viel schneller als die Giftwrkg. (für Mäuse) nicht größer, die Zersetzlichkeit in Hitze aber viel größer. (Acta dermatol. **2**. 367—78. Kyoto, Univ.; Ber. ges. Physiol. **27**. 477. 1924. Berlin.)

Hakan Rydin, *Der Einfluß gewisser Narkotica auf die Herzwirkung des Acetylcholins*. Chlf., Ä. u. Chloralhydrat verstärken in sehr schwachen Dosen erheblich die Hemmwrkg. des Acetylcholins auf das Froeschherz, bewirken dagegen in stärkeren Dosen Hemmung u. selbst völlige Aufhebung dieser Wrkg. Ihre Einflüsse sind vollständig reversibel. (C. r. soc. de biologie **91**. 1098—1101. 1924. Univ.)

W. Hellenbrand und **G. Joachimoglu**, *Über die antiseptische Wirkung von Sublimats in Lösungsmitteln verschiedener Dielektrizitätskonstante*. $HgCl_2$ ist in 100 cem der folgenden Fll. in den angegebenen Mengen l.: Bzl. 0,1 g, Ä. 0,1 g, Chlf. 0,1 g, Nitrobenzol 1,2 g, Glycerin 5,1 g. In den Fll. mit niedriger Dielektrizitätskonstante (Chlf., Bzl., Ä.) bewirkt das gel. Desinficiens keine Erhöhung der antisept. Wrkg. (gegen Milzbrandsporen), wohl aber in denen mit hoher Dielektrizitätskonstante (Nitrobenzol, Glycerin). Dazu paßt auch das bekannte Wachsen der Wrkg. alkoh. Extr. u. Lsgg. mit dem Gehalte an W., mit dem auch Steigen der Dielektrizitätskonstante einhergeht. (Biochem. Ztschr. **153**. 131—36. 1924.)

G. Joachimoglu und **N. Klissiunis**, *Weiteres über die antiseptische Wirkung einiger Quecksilberverbindungen*. Wie bei $HgCl_2$ (vgl. JOACHIMOGLU, Biochem. Ztschr. **134**. 489; C. **1923**. I. 854) wird auch bei $HgBr_2$ u. $Hg(CN)_2$ die antisept. Wrkg. stark durch die $[H^+]$ beeinflusst, mit deren Zunahme wachsend. Durch Zusatz von NaBr wird die Wirksamkeit von $HgBr_2$, durch Zusatz von KCN die von $Hg(CN)_2$ herabgesetzt. Der Einfluß der DE. des Lösungsm. tritt bei $HgBr_2$ nicht so scharf hervor wie bei $HgCl_2$ (vgl. vorst. Ref.). Zwar ist im Gegensatz zu den Lsgg. in Nitrobenzol u. Glycerin (hohe DE.) bei denen in Bzl. u. Ä. die antisept. Wrkg. nachzuweisen, in Chlf. tritt sie aber trotz seiner niedrigen DE. hervor. Löslichkeit des $HgBr_2$ in je 100 cem Bzl. 0,3, Nitrobenzol 0,35, Ameisensäure 0,3, Chlf. 0,27, Ä. 7,0, Glycerin 0,3 g. (Biochem. Ztschr. **153**. 136—43. 1924. Berlin, Univ.)

I. Boas, *Über Kalkpräparate als Antidiarrhoika*. Bei der Behandlung katarrhalischer Darmaffektionen übertrifft $CaCO_3$, zweckmäßig mit $Ca_3(PO_4)_2$ kombiniert, alle sonstigen Antidiarrhoika, besonders die Tanninpräparate, an Wirksamkeit. Das Mittel wirkt bei n. oder gesteigerter HCl-Sekretion möglichst bei leerem Magen gegeben werden. Besonders bewährte sich die Ca-Medikation bei gastrogenen Diarrhöen, in Kombination mit Pankreaspräparaten bei pankreatogenen Diarrhöen u. bei kindlichen Intestinalkatarrhen. Die Ca-Therapie versagt jedoch bei geschwürigen Prozessen. (Dtsch. med. Wchschr. **50**. 1507—8. 1924. Berlin.)

C. Levaditi, S. Nicolau, J. Salgue und R. Schoen, *Wirkungsmechanismus von Wisniums bei der Syphilis*. Nach Injektion von *Trepol* in den Muskel wurden zu verschiedenen Zeiten chem. u. histolog. Unterss. vorgenommen. Es zeigte sich, daß nach 1–4 Wochen u. selbst Monate nach der Injektion die Resorption des Bi bei weitem nicht beendet ist, daß aber nur wenig Bi erforderlich ist, um die Treponemen zu zerstören u. die Schädigungen zur Vernarbung zu bringen. Da der Nachweis des kleinsten Spurens Bi in den Syphilomen selbst nicht gelang, so muß die Verteilung der Treponemen in situ durch mit den bisherigen chem. Methoden nicht erreichbare Mengen erfolgen. Nach den histolog. Ergebnissen wird der Mechanismus der Wrkg. folgendermaßen gedeutet: Die injizierte Verb. wird unter dem Einfluß der Leukozyten dissoziiert, das freigewordene Metall tritt in die Konst. gewisser Eiweißstoffe u. wird assimilierbar. So modifiziert, kommt das Bi mit den Spirochäten an den spezif. Affekten in Kontakt u. wirkt trotz seiner kleinen Menge auf diese wie bei einem intensiven cytolyt. Prozeß zerstörend. (C. r. d. l'Acad. des sciences **179**. 939–42. 1924.) SPIEGEL.

Erich Schmidt, *Tierexperimentelle Untersuchungen über die Beeinflussung der Nierenfunktion durch intravenös einverleibtes Sublimat und Neosalvarsan*. Bei mit HgCl_2 intravenös behandelten Tieren konnte auf Diuresereiz fast immer wieder eine Beschleunigung des Blutstroms in den Nieren festgestellt werden. Bei Verss. mit Neosalvarsan behandelten Tieren war schon frühzeitig bei Anwendung toxischer Dosen eine Schädigung der Gefäße zu beobachten. In Verss. mit dem Linserschen Misch (Neosalvarsan + HgCl_2) zeigte sich die Salvarsankomponente als im Vordergrund der Wrkg. stehend. Es wurde frühzeitige schwerste Gefäßschädigung im allgemeinen Mangel einer funktionell oder anatom. nachweisbaren Hg-Schädigung beobachtet, es tritt demnach eine hochgradige Entgiftung des HgCl_2 ein. (Frage, ob durch Kombination des Neosalvarsans mit einer anderen Hg-Verb. eine weitere Entgiftung zu erzielen ist, konnte nicht weiter verfolgt werden, dürfte auch bei den zu diesen Verss. notwendigen hohen Dosen prakt. bedeutungslos sein.) (Dtsch. med. Wochschr. **50**. 1512–13. 1924. Tübingen, Univ.) FRANK.

Ed. Arning, *Klinische Erfahrungen mit einem neuen Arsenobenzol-Präparat „Albert 102“*. Klin. Bericht über 2jährige Erfahrungen mit „Albert 102“. Es zeigte sich, daß das Salvarsan in der Wrkg. ebenbürtig, in mancher Hinsicht überlegen, das HgCl_2 ist stabiler bei gleicher spirochätocider Kraft. Bei intravenöser Injektion traten keine Geschmacks- u. Geruchswahrnehmungen beobachtet, ferner keine Verdauungsstörungen, kein Ikterus, kein Herpes. Bei über 2000 Applikationen traten niemals schwere Schädigungen, wie Encephalitiden u. Erytheme beobachtet. (Dtsch. med. Wochschr. **3**. 2135–41. 1924. Hamburg, Univ.) FRANK.

E. Gley und Alf. Quinquaud, *Fortbestehen der gefäßerweiternden Wirkung der Albumosen beim schilddrüsenlosen Hunde*. Die Ergebnisse der Vf. widerlegen die Ansicht, daß die bezeichnete Wrkg. intravenös gegebener Albumosen durch Störung der Schilddrüsensekretion zustande komme. (C. r. soc. de biologie **91**. 65. 1924.) SPIEGEL.

H. Kraus, *Über synthetischen Campher*. „Campher Schering“ scheint nach bisherigen pharmakolog. u. klin. Unterss. dem natürlichen ebenbürtig zu sein. Aufnahme in das Arzneibuch müssen noch Methoden zur Prüfung der chem. Identität unter Berücksichtigung der verschiedenen Zwischenprodd. bei der Herstellung gegeben werden. *Hexeton* scheint sehr wirksam, Vf. rät aber zur Vorsicht in der Verabreichung (Anlage von Depots durch intramuskuläre Injektion). (Med. Klinik **33**–35. Berlin, Charité; Ber. ges. Physiol. **27**. 478. 1924. Ref. HEYD.) SPIEGEL.

Marin Viotti, *Die Wirkung des Histamins auf das Herz und die Bedeutung der Histamins in dieser Hinsicht*. Schwache u. starke Gaben Histamin rufen am Herzen folgende Wirkungen hervor: 1. Erregung des Herzes, 2. Steigerung der Herzfrequenz, 3. Erregung der Coronararterien, 4. Erregung der Coronarvenen, 5. Erregung der Coronararterien- u. Venenmuskulatur. (Z. f. exp. Med. **11**. 1. 1924.)

überlebenden Herzen von Kaninchen u. Meerschweinchen eine Steigerung Frequenz, meist auch der Schlaghöhe hervor, mittlere Dosen erniedrigen teilweise nach primärer Erhöhung der zweiten. Nach Atropin erscheint, besonders am Meerschweinchenherzen, die hemmende Wrkg. des Histamins zugunsten (zumeist verstärkten) motor. Wrkg. unterdrückt. Auf die Herzgefäße wirkt deutlich verengend, was durch gleichzeitige Anwendung von Atropin eingeschränkt oder ganz verhindert werden kann. Am Kaninchenherzen scheint die Atropinbehandlung eine vorher bestehende motor. Wrkg. des Histamins schwächen zu können. Vf. glaubt, daß die hemmende Wrkg. des Histamins wesentlich eine vagotrope Erregung bedingt ist, ihre Umwandlung in motor. Wrkg. durch Atropin hauptsächlich durch eine Erregung sympathicotropen Ursprungs. (C. r. soc. de biologie **91**. 1085—88. 1924. Upsala, Univ.) SPIEGEL

Harald Lundberg, *Die Wirkung des Hydrastinins auf die Blutgefäße.* Das Löwen-Trendelenburgsche Präparat vom Frosch bewirkt Hydrastinin (Chlorhydrat von BAYER) zu 0,3% starke Gefäßverengung, nur langsam reversibel, bei 0,1% machen sich daneben starke period. Schwankungen des Gefäßlumen bemerkbar. Bei 0,02% ist die Wrkg. unregelmäßiger, tritt zuweilen auch per Gefäßweiterung auf. Bei noch verdünnten Lsgg. sind (bis 0,005%) auch ohne zuweilen deutliche Verengungen festzustellen. Ca-freie Salzlsg. hemmt das Zustandekommen der Kontraktionen u. stellt, wenn sie in gewöhnlicher Götthlin-Lsg. eingetreten waren, den n. Zustand schnell wieder her, größerer Ca-Gehalt verstärkt die Verengungswrkg. Atropin verstärkt nur wenig unter bestimmten Verhältnissen. Gleichzeitige Anwendung von Ergotamin (SANDOZ) schwächt die Wrkg. von 0,04 u. 0,02% Hydrastinin erheblich oder hebt sie ganz auf. Nach Lundberg nimmt Vf. an, daß die Wrkg. des Hydrastinins auf direkter Erregung der Gefäßkonstriktor. Elemente beruht. (C. r. soc. de biologie **91**. 1095—98. 1924. Upsala, Univ.) SPIEGEL

Carin Viotti, *Die Einwirkung von Ergotamin auf das isolierte und überlebende Herz des Säugetieres.* Am Kaninchenherzen bewirken schwache Lsgg. Hemmung der Schlaghöhe oder der Frequenz oder beider, stärkere primär Erhöhung beider, dann aber auch Minderung der Schlaghöhe. Diese anscheinend vagotrope Hemmungswrkg. tritt am Meerschweinchenherzen bei allen Konz. auf, nur die stärkste angewandte ließ den Einfluß auf die Frequenz vermissen. Bei gleichzeitiger Anwendung von Atropin tritt am Kaninchenherzen durch schwache Konz. von Ergotamin motor. Wrkg., durch starke gar keine hervor u. fehlt solche auch am Meerschweinchenherzen bzgl. der Frequenz. Beim Kaninchen werden die Herzgefäße verengt, nach Atropinisierung aber erweitert, beim Meerschweinchen in beiden Fällen erweitert. (C. r. soc. de biologie **91**. 1101—4. 1924. Upsala, Univ.) SPIEGEL

René van Saceghem, *Wirkung des Hexamethylentetramins (Urotropin) bei tierischen Trypanosomiasen.* Bei Infektionen von Rindern mit *Trypanosoma nelsoni* u. *Tr. cazalboni* ließ Urotropin keine trypanocide Wrkg. erkennen. (C. r. soc. de biologie **91**. 917—18. 1924. Kisenyi, Lab. vétérin. du Congo.) SPIEGEL

René van Saceghem, *Vorläufige Mitteilung über die Wirkung des Bisoxyl bei Trypanosomiasen.* Es gelang nicht mit nach LEVADITI u. NICOLAU hergestelltem Bisoxyl in feuchtem oder trockenem Zustande bei mit *Trypanosoma congolense* infizierten Rindern die Trypanosomen im peripheren Blute zum Verschwinden zu bringen. (C. r. soc. de biologie **91**. 914—17. 1924. Kisenyi, Lab. vétérin. du Congo.) SPIEGEL

Wolfgang Heubner, *Bemerkung zur Eisentherapie.* Nach früheren, nicht veröffentlichten Verss. von MATSUMURA war die Resorption von Fe als kolloidales $\text{Fe}(\text{OH})_3$ in Lsgg. von Eisenzucker, Ferratin u. FeSO_4 am Hundedarm gleich. Trotzdem scheint es nach einem Vers., bei dem gleichzeitig FeSO_4 u. BaCl_2 gegeben

en wurden, daß vielleicht Ferroionen auch eine resorptionsfähige Form des Fe
atellen. (Ztschr. f. klin. Med. **100**. 675—76. 1924. Göttingen, Pharmakol.

WOLFF.

Tryphon Karantassis, *Über die Giftigkeit von Wolfram- und Molybdänverbindungen*. Wo- u. Mo-Salze scheinen als langsam wirkende Gifte zu agieren, die den c unter asphykt. Erscheinungen herbeiführen. Als akut tödliche Gaben für 1 kg (schweinchen bei peroraler bzw. subcutaner Einführung ergaben sich von W bezw. 0,45 g, von Mo 1,2 bzw. 0,75 g. Für den toxikolog. Nachweis können (Organe direkt verascht werden. In der Asche finden sich beide Elemente als ryde. WO_3 wird durch Schmelzen mit Na_2CO_3 l. gemacht. Die alkal. Lsg. 1. Mit HCl u. Zn Blaufärbung. — 2. Mit Sn^{++} zunächst Gelbfärbung, dann Erhitzen mit HCl blauen Nd. — MoO_3 läßt sich der Asche mit Alkali- oder 1. Lsg. entziehen u. in der erhaltenen Lsg. auf folgenden Wegen charakterisieren: indampfen mit 1 Tropfen konz. H_2SO_4 bis fast zur Trockne u. erkalten lassen: tive Blaufärbung. — 2. Behandlung mit Zn oder Sn nach Ansäuern mit HCl H_2SO_4 , Blau-, später Braunfärbung. (Bull. Sciences Pharmacol. **31**. 561—67.

G. V. Bein, *Blausäurevergiftung und akute gelbe Leberatrophy*. Die akute Leberatrophy wurde zum erstenmale als Folge einer HCN-Vergiftung fest- stellt. Diese war entstanden durch Arbeiten in dem schlecht gelüfteten Keller 2 Tage vorher mit HCN durchgasten Dampfmühle u. endete letal. (Zentral- f. inn. Med. **45**. 970—73. 1924. Berlin-Westend, Städt. Krankenh.) SPIEGEL.

Walter B. Meyer, *Zur Klinik der Yohimbinvergiftung*. Klin. Bericht über Vergiftungsfall infolge versehentlichen Einnehmens von etwa 1,8 g Yohimbin. zzt. an Stelle von Aspirin. Es trat tiefes Koma u. hochgradige Zyanose ein, oben deutlicher Priapismus. Nach etwa 6 Stdn. befand sich der Patient wieder kommen wohl. (Dtsch. med. Wchshr. **50**. 1513. 1924. Berlin, Krankenh. end.) FRANK.

F. Pharmazie. Desinfektion.

Bruno Walther, *Hilfsmittel zur Herstellung von Tabletten*. Übersicht über e Tablettenpressen. (Seifensieder-Ztg. **51**. 791—92. 1924. Köln.) K. LINDNER.
Joseph W. E. Harrisson, *Halbbarkeitserhöhende Wirkung gewisser Substanzen Farrel-Dakinlösung*. Borax, $NaHCO_3$, NaCl, Saccharin, Acetanilid erhöhen die arkeit Dakinscher Lsg. In braunen Flaschen hält sich nach KELLY bereite te 3 Monate. Durch Zusatz von NaCl oder Saccharin wird die Kellylsg. für un- ränkte Zeit stabilisiert. (Journ. Amer. Pharm. Assoc. **13**. 902—4. 1924. Phila- ia [Pa.]) JUNG.

Ludwig Kroeber, *Studienergebnisse einer Reihe von Fluidextrakten aus heimischen pflanzen*. (Vgl. Pharm. Zentralhalle **65**. 607; C. **1924**. II. 2679.) *Extractum um Uvae Ursi fluidum* (Bärentraubenblätterfluidextrakt). Verdrängungsf. Teile, W. 7 Teile. D.¹⁹ 1,120, Extrakt 40,25%, Asche 0,63%. Klar, dickfl., dunkelrotbraun, Geruch arom., Geschmack harzig, herb, bitter, adstringierend. V. Trübung u. Nd., kaffeebraun, unl. in verd. HCl, l. in NaOH (dunkelrot-). Mit A. (96%) dunkelbrauner Nd., unl. in NaOH, l. in verd. HCl. Mit $FeCl_3$ grünbraunschwarz, mit Gerbsäure (1 : 10) keine Rk., mit Mayers Reagens gollsg. Trübungen. Mit Fehling beim Erwärmen starke Red. Beim Schütteln V. beständige Schaumentw. Im Filtrate des bei Zusatz einer Lsg. von Pb et aufgetretenen Nd. (Gerbsäure) tritt durch Pb-Essig aufs neue Nd. ein: kin. Schmelze glasartig. Enthält in den Blättern 30—34% Gerbstoff, 6% ssäure, Gallotannin, Ellagsäure, Ellagitannin (gelber Farbstoff), Citronen-

Apfel- (?), China-, Ameisensäure, 0,01% äth. Öl, 1,6—3,5% Arbutin-Hydrochlo-
d-Glucoseäther, Arbutase (Enzym), Methylarbutin, Ursin (?), Urson, Ericolin (?),
der Herst. von Abkochungen wird Befeuchten der zerkleinerten Blätter r
empfohlen. (Pharm. Zentralhalle 65. 640—43. 1924. München-Schwabing.) D

W. Peyer, *Über Cotorinden und Traganth*. A) *Cotorinden*. Stammpflanz
mutlich *Cryptocaria*; Herkunft von Para-Coto steht noch nicht fest. Anato
mkr. Befunde werden beschrieben. Cotorindenauszüge geben folgende Rkk. 1. A
zug 1 : 10: 5 ccm + 25 ccm A. + 1 Tropfen FeCl_3 ; bei echter Coto dunkeloliv
Färbung, bei Para-Coto dunkelvioletten Färbung; 2. Chlf.-Auszug 1 : 10: 3 c
3 ccm HNO_3 (roh), bei Coto Rubin-färbung, bei Para-Coto gelbbraune Färbur
Chlf. — 3—5 ccm Auszug + 10 Tropfen NH_3 , Coto färbt Chlf. gelb, Para
orange; 3. PAe.-Auszug 1 + 3. Auszüge fast farblos, am dunkelsten d
echten Coto; 1 ccm + 3 Tropfen HNO_3 (roh), Säure sofort rubin-, später b
Para-Coto gelb bis blaßrot. — 5 ccm PAe.-Auszug + 1 Tropfen FeCl_3 +
W., bei Coto nichts, bei Para-Coto violetter Ring an der Berührungsgren.
5 ccm PAe.-Auszug + 5 ccm Kalkw., bei Coto farblos, bei Para-Coto grün
Emulsion oder grünliche Schleier. — Wss. Abkochung von echter Coto recz
Fehling stark, Para-Coto viel schwächer. — Echte Coto (Schnitt) in wenige Tp
 HNO_3 gelegt, färbt diese rot, Para-Coto schmutzig gelbbraun. — Kennzahlen: h
Asche 4,2%, l. in HCl (10%), A.-Extrakt 17,6%, Ä.-Extrakt 10,4%, PAe.-Ex
7,3%, W.-Extrakt 16,0, Chlf.-Extrakt 11%, A.-Extrakt nach PAe. 10,4%. —
Coto: Asche 1,2—1,6%, l. in HCl (10%), A.-Extrakt 19,3—27,7%, Ä.-Extral
bis 15%, PAe.-Extrakt 4,2—8,0%, W.-Extrakt 15,2—16,5%, Chlf.-Extrakt 15
15,4, A.-Extrakt nach PAe. 14,9—19,2%.

B) *Traganth* zeigt sehr häufig Zellstruktur mit eingeschlossenen Stärkekörn
Gummi ist strukturlos. Im *Traganth* kommen (im Gegensatz zur Ansicht
TSCHIRCH, ROSENTHALER, RUNNE) oxydierende Enzyme vor. Alle *Traganthe* el
die Guajac- u. die Pyrogallolrkk., die Vf. aber als unzuverlässig ablehnt. H
von Oxydasen im *Traganth*schleim (1 : 50) wird durch Zusatz von Eserin, A
morphin, Hydrochinon, Phenolphthalin, Aloin, Guajakharztinktur, Guajinls
bewiesen. Zum Nachweis der Abwesenheit von Gummi schlägt Vf. vor: Bei
Adrenalin (1 : 1000), Orcin, Gallussäure, Resorcin, Leukomalachitgrün. (a
Zentralhalle 65. 637—40. 1924. Halle, CAESAR & LORETZ A.-G.) DIFZE

H. Rordorf, *Mitteilungen über die neue niederländische Pharmakopöe*. (V
Schweiz. Apoth.-Ztg. 62. 266; C. 1924. II. 717.) Die Sterilisationsverf. für 80 „zu
mittel werden angegeben. Die Darst. von Pulveres, Sirupi, Unguenta u. Tinnu
Prüfung der letzteren auf Aceton, die Simplicia (die Namen der Stammpflan
sind dem „Index Kewensis“ zu entnehmen) u. die Mikroskopie der Pulver
besprochen. (Schweiz. Apoth.-Ztg. 62. 677—80. 1924.) DIFZE

H. Mentzel, *Neue Arzneimittel, Spezialitäten und Vorschriften*. *Agaryl* (FOU
Paris), granuliertes Agarpulver. — *Akesol Muzi*, Kapseln mit Valerianaid
Chinin. — *Alexin*, granuliertes Pulver, Phosphate enthaltend. — *Antacida*
carbonat u. Milchzucker in Tabletten. — *Antalgol Dalloz*, Pyramidonchininscy
gegen Rheumatismus. — *Antiphymol Duval*, Sirup mit 0,02 g Äthylmarceind
bromid u. K.-Guajacolat in 1 Eßlöffel voll. — *Aphodin David*, Abführpillen mit
0,1 g Extr. Frangul., 0,01 g Extr. Bellad. u. 0,05 g Cort. Frangul. — *Ag*
kolloides Ag in Lsg. in blutisoton. Fl. — *Argotonal*, Argent. proteinic. — *A*
As-Trijodid-Lsg., tropfenweise. — *Arsyneuron Bourguignon*, Pulver, in 1 Kaßlöff
0,1 g Na-Methylarsinat u. 0,2 Ca-Glycerophosphat, ebenso in 1 Pille; 1 Ap
0,05 g Na-Kakodylat. — *Aseptol Viel*, Lsg. von 0,2% Äthylmentholaldeld.
Asomese (LASNIER & Co., Reims), Lsg. von KJ, Colchicin. salic., Tonica. — *A*
chinolsalbe, 20% Phenylcinchoninsäureallylester. — *Curaben*, fl. Seife, Fenc

thalinderiv., deren Sulfosäuren, wasserl. Terpene u. äth. Öle, Desinficiens. — *a liquidum (solution)*, Monoäthylharnstoff, carbaminsaurer Äthylester u. Dial, sierbare Fl. — *Ekatabletten*, gegen Arteriosclerose. — *Elixir Benzylis benzoates*, ile Benzylbenzoat, 5 Teile Saccharin, 1,5 Teil Ol. amygd. äther., Ol. Aur., yrin 90 Teile, A. bis zu 1000 Teilen. — *Ferrum-Richard Just* (RICH. JUST, elen-A.), assimilierbares, kolloidgebundenes Eiweiß-Phosphat-Fe-Mn-Peptonat. — alt (A. WANDER, Bern), trocknes Lebertranpräparat. — *Mirion* (Alpine A.-G., tein-Schafftenau), Hexamethylentetraminiodidgelatinat, bei Lues u. Arthritis nans. — *Pastilles Acard*, 2 g Cocain. hydrochl., 200 mg KClO_3 , 200 mg Borax, r Saccharin u. Vanillin. — *Pollysac* (Zyma-Erlangen), Dialepat aus Pollen nder Gräser, 1 Tropfen mit 1 ccm CaCl_2 -Lsg. (1%) bei Heufieberkranken zur rztung. — *Pulvis dentifricius* nach Dr. W. ANDRESON, auch *Dentorno*, *Cavex*, aral, aus Weinsäure u. Gelatine, CaHPO_4 , CaCO_3 , MgCO_3 , NaCl, NaHCO_3 , arin u. Ol.-Menth. — *Rawatol*, Rattengift mit 40% HF-Verbb. — *Revival* J. F. SCHULTZE & Co., Berlin W 9), in 100 Teilen Extr. Thymi 4, Succ. Junip. tr. Aurant. 0,5, Kal. sulfogujacol. 5,0, Calc. glycerinophosph. 3,5, KJ 1,0, enz. 0,5, A. 4,0, W. 6,0, Sir. simpl. 72,0. (Pharm. Zentralhalle 65. 644—46.

DIETZE.

-, *Neue Arzneimittel*. *Anästan Syngala* (Syngala, Wien II), p-Aminobenzoe- thylester, Ersatz für Anästhesin. — *Depressin* (Dr. LABOSCHIN, Berlin NW 21), osen-Gelatine in 7 verschiedenen Stärken aus nicht virulenten Colikulturen, uskulär bei Arteriosklerose. — *Sanochrysin*, bisher Aurocin, Na-An Cl_3 , gegen ukulose. — *Valiren* (Dr. LABOSCHIN, Berlin NW 21), Baldrian u. NH_3 , ohne Pharm. Ztg. 69. 1157. 1924.)

DIETZE.

-, *Spezialitäten und Geheimmittel*. *Homburg 194* (Chem.-ph. A.-G., Bad burg), durch Lecithin dispergiertes u. biolog. verstärktes Bi-Präparat; in 1 ccm B Bi, intramuskulär gegen floride Frühsyphilis. — *Ristosan* (STOCK & HEUB- S. Bamberg), Acid. boric., Menthol, Novocain, Ristol, Extr. flor. Chamomill., ol., Fol. Hamamel., Thigenol, gegen Hämorrhoidalleiden u. Analfissuren in ti-u. Zäpfchenform. — *Schnupfensalbe* (MERZ & Co., Frankfurt a. M.-Rödel- Acid. aminobenzäthyl., Menthol u. Acid. boric. in wasserl. Salbengrundlage. nedo-Asthmalösung (Zanoniwerk, Stettin-Grünhof), „Lsg. seltener Pflanzen- te in Verb. mit Nebennierenextrakt u. dem nitros. Salz des Atrop.“ (Apoth.- 9. 1317—18. 1924.)

DIETZE.

. *Zakarias*, *Die neue Salbentechnik der Apotheken mit der „Kolloidsalbe“*. Die Kolloidsalbe „*Physiol*“ (Hersteller: Polydyn-Werke, kolloidchem. t., Staab bei Pilsen) beruht auf kolloidchem. Grundlage, besitzt die unent- en Eigenschaften der Fette, ist gut deckend, macht die Haut weich, schmiegt- saugt u. trocknet augenblicklich ein, fettet u. schmutzt nicht u. läßt die ihr ylebten Arzneimittel (man braucht nur $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{3}$ der bisher üblichen Dosen, da tivitàt der Mittel gegenüber den fettigen Grundlagen enorm erhöht ist) in aut eindringen. Die Verarbeitungsmethoden werden angegeben. (Pharm. allhalle 65. 621—23. 1924. Frankfurt a. M., Univ., Inst. f. Kolloidforschung.) DI. . *Scherber*, *Über die Anwendung eines Glycerinpflanzen Schleimpräparates (Glyce- ricigen) in der dermatologischen Praxis*. *Glycerinomucigen* (Herst. WEISS u. Co., e besteht in der Hauptsache aus Glycerin, etwa 7% ZnO , je 5% Amylum u. en u. einem aus einer in Kleinasien wachsenden Leguminosenart hergest. enschleim. Es bewährte sich als Hautkosmetikum u. bei gewissen Ekzemen, ette u. Vaseline nicht vertrugen. (Therapie d. Gegenwart 65. 526—28. 1924. Rudolfspital.)

FRANK.

. *Cevidalli*, *Über Adsorptionsphänomene in der Toxikologie der Blausäure*. rd auf Gefahren hingewiesen, die nach Desinfektion mit HCN durch Ad

sorption derselben an Gegenstände wie Matratzen hervorgerufen werden können. Derartige Adsorption wird durch Verss. an Meerschweinchen erwiesen. Es wird empfohlen, solche Gegenstände nach der Desinfektion mit w. Luft zu ventilieren (Arch. ital. de biol. **73**. 61—64; Ber. ges. Physiol. **27**. 468. 1924. Ref. RENNEN).

Erdöl- und Kohle-Verwertung A.-G., Berlin, und **Franz Zernik**, Ir. Wilmersdorf, *Herstellung von geruchlosen Naphthensäureestern*, 1. dad. gek., daß *Naphthensäure* nach der für die Herst. von Benzylestern üblichen Weise in Benzylester überführt. — 2. dad. gek., daß man Naphthensäuren nach der Herst. von primären Glykolestern üblichen Weise in die Oxyäthylester überführt. — Beispiele sind angegeben für die Herst. des *Naphthensäurebenzylesters*, färbungs- und geruchloses Öl, Kp.₁₅ 160—240°, durch Einw. von *Benzylalkohol* auf Naphthensäure in Ggw. von konz. H₂SO₄ bei erhöhter Temp., bezw. von C₆H₅CH₂·Cl auf naphthensaures Na bei 150°, — sowie von *Naphthensäuremonoxyäthylester*, gelbes Öl, Kp.₁₅ 140—300°, D.₁₅ 1,0101, von schwach fruchtartigem Geruch durch Erhitzen von äquimolekularen Mengen *Äthylenchlorhydrin* u. naphthensaurem Na auf 150°. Während die freie Naphthensäure u. ihre Ester mit niedrig molekularen Alkoholen, sei es verd. oder konz., einen starken, widrigen u. anhaftenden Geruch besitzen, u. auch die Benzylester anderer organ. Säuren stark aromatisch riechen, sind die erwähnten Naphthensäureester fast geruchlos. Sie haben wertvolle anästhetische Eigenschaften u. finden therapeut. Verwendung. (**D. R. P. 373849** K 1 vom 31/12. 1921, ausg. 16/4. 1923 u. **D. R. P. 402992** [Zus. Pat.] Kl. 12 o von 28/12. 1922, ausg. 19/9. 1924.)

SCHOTTLÄNDER

Gesellschaft für Chemische Industrie in Basel, Basel (Schweiz), *Darstellung des Calciumsalzes der organischen, im Milcheasein enthaltenen Phosphorverbindungen*, 1. dad. gek., daß man das Casein mit Trypsin in schwach ammoniakal. Lsg. zur Abscheidung der verunreinigenden Fettsäuren verdaut, die abfiltriert u. Verdauungsfl. unmittelbar mit l. Ca-Salzen u. A. ausfällt, das ausgefallte Ca-Salz in wss. Lsg. behufs weiterer Reinigung mit A. umfällt u. trocknet. — 2. dad. gek., daß man aus der abgepreßten Verdauungsfl. vorgängig der Abscheidung des Calciumsalzes die P-Verb. in Form eines unl. Schwermetallsalzes ausfällt, die Fällung u. Schwermetall befreit, die so erhaltene Lsg. neutralisiert u., wie unter 1. angegeben, auf das Ca-Salz weiterverarbeitet. — Man läßt z. B. in wss. NH₃ aufgeschwemmtes Casein mit Trypsin oder feingemahlener frischer Bauchspeicheldrüse u. Öl während 48 Stdn. bei 40° stehen, filtriert von den flockig ausgeschiedenen Fettsäuren ab, setzt zu dem klaren Filtrat eine konz. CaCl₂- oder Ca-Acetatlsg. zu, filtriert den Nd. ab, löst in W. u. fällt von neuem mit A. — Man kann auch von den ausgeschiedenen Fettsäuren befreite Filtrat auch mit Pb-Acetat oder Lig. versetzen, den Metallnd. mit H₂S oder H₂SO₄ zersetzen, alsdann das Filtrat mit NH₃ bis zur alkal. Rk. versetzen u. wie oben weiter verarbeiten. Das trockne weiße in W. ll., indifferent schmeckendes Pulver mit 4,5—5% P, 10—11% Ca, 11,5% N, eignet sich zur therapeut. Verwendung in allen Fällen, bei denen die P-Ernährung des Organismus gefördert werden soll. (**D. R. P. 401272** K 1 vom 13/3. 1923, ausg. 29/8. 1924. Schwz. Prior. 27/7. 1922. **Schwz. P. 131** vom 27/7. 1922, ausg. 16/1. 1924. **E. P. 210698** vom 4/7. 1923, ausg. 28/12. 1924.)

SCHOTTLÄNDER

Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Leverkusen b. Köln, *Darstellung von basischen Wismutsalzen*, (Erfinder: **Hans Hahl**, Elberfeld), *Darstellung von basischen Wismutsalzen*, 1. dad. gek., daß man Bi-Salze oder Bi(OH)₃ auf Dijodadipinsäure oder ihre Salze einwirken läßt. — Man läßt z. B. zu einer wss. Lsg. von diiodadipinsaurem Na eine Lsg. von Bi(NO₃)₃ in 50% ig. CH₃CO₂H u. gleichzeitig n. NaOH derart einfließen, daß die Fl. dauernd sauer auf Lackmus reagiert

verd. $\text{CH}_3\text{CO}_2\text{H}$ u. W. ausgewaschene Nd. wird an der Luft getrocknet. Das *dijodadipinsäure Bi*, hellgelbes, lichtempfindliches Pulver, mit Mineralsäuren bepalend, findet therapeut. Verwendung zur Wundbehandlung. Nicht nur das aldehydform gebundene Bi, sondern auch das aliphat. gebundene J ist leicht abspaltbar. — Das gleiche Prod. entsteht auch beim Schütteln einer Lsg. von α, α' -Dijodadipinsäure in wss. Na-Acetatlg. mit $\text{Bi}(\text{OH})_3$. (D. R. P. 403 051 Kl. 12o vom 8. 1922, abs. 19/9. 1924.) SCHOTTLÄNDER.

G. Analyse. Laboratorium.

—, „Sartorius Reitersicherung“ für Analysen- und Präzisionswagen. Durch die Reitersicherung, einen Hohlkörper, in den der Reiter heraufgezogen wird, wird ein Umdrehen, eine Drehung u. das Pendeln des Reiters verhindert. (Ztschr. f. angew. Chem. 37. 861—62. Chem.-Ztg. 48. 915. 1924.) JUNG.

Frank Porter, Eine automatische Töplerpumpe. Zum Arbeiten mit He im Röntgen Research Laboratory wurde die Töplerpumpe auf automat. Betrieb umgebaut, ohne daß die Glasapparatur kompliziert wurde wie bei den bisherigen Typen. Das Ein- u. Ausschalten geschieht elektr. durch ein Doppelselenoid, das durch einen Hebel mit vier Anschlägen in Bewegung setzt, wodurch je nach der Stellung der Pumpe, Atmosphärendruck oder Unterdruck auf das Quecksilber im Niveaurohr wirkt. (Ind. and Engin. Chem. 16. 731—32. 1924. Bureau of Mines, Washington D. C.) W. A. ROTH.

Norman Holt Hartshorne, Ein Apparat zur viscosimetrischen Bestimmung von Übergangspunkten. Der App. besteht aus einem 25 cm langen, 5—6 cm weiten Messingglas, in das mittels eines Gummistopfens das gleichzeitig als Rührer ausgediente Viscosimeter eingeführt ist. Er gestattet Bereitung der Lsg. u. Best. der Verweilzeit im gleichen Gefäß u. dadurch erhebliche Zeitersparnis. Mit seiner Hilfe lassen sich die Übergangspunkte $\text{Na}_2\text{SO}_4 \cdot 10\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Na}_2\text{SO}_4$, $\text{NiSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{NiSO}_4 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ u. $\text{Na}_2\text{HPO}_4 \cdot 12\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Na}_2\text{HPO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ zu 32,55, 29,3 bzw. 35,5° bestimmen. Der im Vergleich mit den Werten anderer Autoren niedrige Wert bei Na_2HPO_4 wird auf Unreinheit des Salzes zurückgeführt. Die anderen Werte stimmen mit denen der Literatur gut überein. Der App. ist nicht geeignet zu Arbeiten mit Substanzen, die flüchtige Hydrolysenprodd. geben, wie Na_2CO_3 , das bei längerem Rühren verloren geht. (Journ. Chem. Soc. London 125. 2096—99. 1924. London, Univ.) HERT.

K. Schaefer, Schnellviscosimeter. (Vgl. KLEVER, Ztschr. f. angew. Ch. 37. 696; 1924. II. 1960.) Die Idee, eine Glaspipette zu verwenden, ist bereits von STERN (Chem.-Ztg. 47. 291; C. 1923. II. 1097) veröffentlicht. Betriebssichere Resultate lassen sich nur bei Verwendung eines größeren Pipetteninhalts erhalten werden. (Ztschr. f. angew. Ch. 37. 860.) JUNG.

Helmut W. Klever, Schnellviscosimeter. (Vgl. SCHÄFER, vorst. Ref.) Glasviscosimeter wurden schon 1900 von KEILLY verwendet. Das Prioritätsdatum des Vfs. fällt 4 Jahre vor dem Erscheinen der Arbeit STERNs. Das Kennzeichnende gegenüber allem Vorbekannten ist die Heizung des Vorratsgefäßes u. der Meßpipette mit ein u. dasselbe Fl.-Bad. Das kleine Vol. macht die Anwendung einer Eichkurve notwendig. Selbst das Ostwaldsche Viscosimeter kann mit dem Engler-Viscosimeter in einfache Beziehung gebracht werden. (Ztschr. f. angew. Ch. 37. 861. 1924.) JUNG.

Ernst Cohen und H. R. Bruins, Ein Präzisionsverfahren zur Bestimmung von Viskositätskoeffizienten in beliebigen Lösungsmitteln. II. (I. vgl. Ztschr. f. physik. Ch. 1924. 349; C. 1923. I. 947.) Die Ggw. von Schmiermittel zwischen den das Diffusionsgefäß bildenden Glasplatten ändert die Länge des Konzentrationsgefälles. Als Schmiermittel werden Paraffinöl u. Vaseline verwendet. Das Anbringen dieser

Korrektur ändert den Diffusionskoeffizienten des KCl bei 20,00° von 1,445 qcm (l. c.) auf 1,448 qcm/Tag. Für wenig präzise Messungen ist die Korrektur belanglos (Ztschr. f. physik. Ch. **113**. 157—59. 1924. Utrecht, VAN'T HOFF-Lab.) BIKER

J. Gicklhorn und **R. Keller**, *Über elektive Vitalfärbungen*. Vorläufige Mitteilung. KELLER hat früher schon (vgl. Biochem. Ztschr. **128**. 409; C. **1922**. I. 195) betont, daß die elektr. Potentiale in lebenden Geweben zu den stärksten Faktoren der gewöhnlichen Vitalfärbung zu zählen sind. Es wird jetzt gezeigt, es durch systemat. Einteilung der Farbstoffe nach ihrem elektr. Wanderungsvermögen ihrer Dispersität u. unter Berücksichtigung des Ladungssinnes der Zellelemente gelingt, im lebenden Tiere jedes Organ spezif. auszufärben, seine Oxydations- und Reduktionskräfte durch geeignete Farbkörper sichtbar zu machen. Die mit einer rasch und starker Reduktionswirkung während ihrer Tätigkeit ausgestatteten Neuronen sind unter bestimmten Umständen auch auffallende Oxydationsorte. Durch Kombination von Farbstoffen mit Alkaloiden gelingt es, einzelne Neurone, periphere Sinneszellen, Nervenfasern, Ganglienzellen am lebenden Tiere gesondert zu färben und wieder zu reduzieren u. neu zu färben. Es werden an diese Feststellungen und Beobachtungen blickte auf wichtige Aufklärungen mittels der elektiven Färbungen geknüpft (Biochem. Ztschr. **153**. 2—13. 1924. Prag.) SPIEGEL

Edgar Wöhlisch, *Zur Technik der Reihenmessungen mit der Gaskette*. Beschreibung einer Anordnung, bei der das Herausziehen des KCl aus der Gaskette vermieden u. gleichzeitiges Kippen aller Elektroden ermöglicht wird. (Biochem. Ztschr. **153**. 129—30. 1924. Würzburg, Univ.) SPIEGEL

Max Trénel, *Über eine einfache Vorrichtung für elektrochemische Potentialmessungen*. Das früher (Internat. Mitteil. f. Bodenkunde **14**. 27; C. **1924**. I. 13) beschriebene Gerät ist so vervollkommen worden, daß es auch für andere Zwecke als bodenkundliche benutzt werden kann, insbesondere für die elektrometrische Analyse. An Stelle des Tonzylinders werden Zylinder aus porösem Porzellan verwendet, die innerhalb 48 Stdn. prakt. diffusionsfrei sind. Der Porzellanzyylinder enthält die Bezugs elektrode, eine 0,01-n. HCl, die 0,09-m. KCl enthält, u. tritt direkt in die zu untersuchende Lsg. ein. Die Eigenschaft der Bezugs elektrode, gebrauchsfertigem Zustand transportabel zu sein, erlaubt die quantitative Untersuchung von Wässern, Abwässern, Pflanzensäften, Ackerböden, techn. Prodd. wie Spurensstoffe, Düngemittel mit für die Praxis ausreichender Genauigkeit, ohne die Substanzen aus ihren natürlichen Lagerungsverhältnissen entfernen zu müssen.

Die Messungen werden mit einem kleinen Kompensator (24 × 24.16 cm) vom Vf. „Azidimeter“ genannt — ausgeführt. Auf dem Azidimeter sind die pH-Werte direkt ablesbar, was dadurch ermöglicht ist, daß der Temp.-Koeffizient durch Veränderung der an den Enden der Kompensationsbrücke angelegten Spannung ausgeschaltet wird. Diesem Zwecke dienen zwei Drehwiderstände u. ein Ampèremeter. Bei Verwendung eines H-Hebers nach E. MÜLLER u. getrockneten Gefäßen können auch H₂-Elektroden verwendet werden. In dieser Schaltung kann sich das Gerät auch für wissenschaftliche Messungen. — Soll mit dem Azidimeter elektrometr. titriert werden, so stellt man die Kompensationskurbel je nach der Säure auf die entsprechende P_H u. läßt die Maßfl. unter Rühren so lang zu tropfen, bis die Nadel des Galvanoskops durch 0 geht. (Ztschr. f. Elektrochemie **30**. 544—48. 1924.) TRÉNEL

Aug. Noll, *Chloramin als Jodersatz in der analytischen Chemie*. Chloramin ist vorteilhaft bei der Jodometrie als Ersatz für Jodlsg. verwendet werden. Die Titration erfolgt mit arseniger Säure oder gegen Thiosulfat mittels KJ-Lsg. (Chem. Ztg. **48**. 845—46. 1924. Tilsit.) J.G.

P. W. Solotarew, *Muffelofen mit Gasheizung für Elementaranalyse*. Das Verbrennungsrohr liegt in einem Rohr aus Kaolin-Asbest-Gemisch, welches von einem

von ähnlichen Rohr umgeben ist; die Flammengase strömen im von diesen gebildeten ringförmigen Kanal. Das äußere Rohr ist mit einem Asbestmantel geschützt. Das innere Kaolinrohr trägt Verdickungen dort, wo es unmittelbar den Bunsenbrennern liegt, was eine gleichmäßige Erwärmung gewährleistet. (Polytechnikum Iwanowo-Wosniessensk 8. 75—76. 1924.) BIKERMAN.

L. J. Simon, *Über die Anwendungsbedingungen der Silberchromschwefelsäure zur Kohlenstoffbestimmung.* (Vgl. C. r. d. l'Acad. des sciences 178. 1816; 1924. II. 729.) Das Verf. zur Best. von C als CO₂ durch Oxydation mittels H₂SO₄ u. Ag₂Cr₂O₇ zeigt, daß zwischen der Menge (p) des Bichromats u. der Oxydationsdauer (n) eine bestimmte Beziehung besteht, die sich annähernd durch die Gleichung $n + 3p = 40$ ausdrücken läßt. Das Vol. des entweichenden Gases wird eventuell auch noch dadurch vergrößert, daß O₂ aus dem Bichromat abgetrieben wird. Nach den Unterss. des Vfs. tritt die O₂-Abspaltung nicht ein, wenn zur Oxydation 4 g Ag₂Cr₂O₇ bzw. 12 g benutzt werden u. das Erhitzen entweder 30 oder 4 Min. dauert. (C. r. d. l'Acad. des sciences 179. 975—77. 1924.)

HABERLAND:

de La Condamine, *Über die Bestimmung von Kohlenoxyd in industriellen Gasen.* Vf. hat die Absorption von CO gemischt mit N₂ 1. durch Cu₂SO₄ in Ggw. H₂SO₄ (vgl. DAMIENS, C. r. d. l'Acad. des sciences 178. 2178; C. 1924. II. 12. durch eine ammoniakal. CuCl-Lsg. (750 g H₂O, 150 g NH₄Cl, 100 g CuCl, 10 ccm NH₃ [D. 0,9]) u. 3. eine salzsaure CuCl-Lsg. (400 g H₂O, 40 g CuCl, 200 ccm HCl) bestimmt. Bei Darst. von 2. wurde ein vollkommen weißes u. ein wenig grünlich gefärbtes CuCl benutzt; es ergab sich, daß die Verwendung des letzteren vorteilhafter ist; bei 3. wurde nur das grünliche Salz angewandt. Ein Vergleich der Absorption durch 2. u. 3. ergibt (Tabelle im Original), daß 3. vorteilhafter ist, besonders wenn CO-reiche Gase analysiert werden sollen; bei beiden ist zur vollständigen Absorption des CO entweder häufiges Erneuern oder Verwendung eines großen Vol. der Lsgg. erforderlich; am vorteilhaftesten ist Lsg. 1.; aus 5 Teilen CuO + 100 Teilen 66%ig. H₂SO₄ bereitete Lsg. absorbiert das 10fache ihres Vol. an CO; bzgl. der Geschwindigkeit der Absorption sind Lsgg. 2. u. 3. Lsg. 1. überlegen. (C. r. d. l'Acad. des sciences 179. 691—92. 1924.) HAB.

Elemente und anorganische Verbindungen.

J. Curtman, C. Margulies und W. Plechner, *Eine neue und schnelle Methode zur Entfernung von Phosphaten bei der systematischen qualitativen Analyse.* Entf. das Filtrat vom H₂S-Nd. H₃PO₄, so versetzt man mit NH₄Cl u. ZrOCl₂, macht H₃ alkal. u. kocht nach Zusatz von etwas Asbest 2 Min., säuert mit HCl leicht nochmals 3 Min. u. filtriert vom ausgeschiedenen Zr(OH)PO₄ ab. Im Filtrat trennt man wie üblich Co u. Ni von den übrigen Metallen der (NH₄)₂S-Gruppe, die man folgendermaßen nachweist. Das saure Filtrat von CoS u. NiS auf 1 ccm eingedampft, mit W. aufgenommen, alkal. gemacht u. mit Na₂O₂ oxyd. Ist der Nd. weiß, so enthält er nur Zr, ist er farbig, so prüft man auf Mn. Die Ggw. von Zr stört dabei nicht. Hat man auf Al zu prüfen, so kocht man das Filtrat von Mn u. Fe mit NH₃ u. entfernt etwa noch vorhandenes NH₄Cl-haltiger, salzsaurer Lsg. mit Na₂HPO₄. Al weist man im Filtrat vom (NH₄)₂PO₄ mit NH₃ nach. Der Nachweis von Cr u. Zn wird durch Zr nicht getrübt. Da der (NH₄)₂S-Nd. alles Zr enthält, kann man Erdalkalien u. Alkalien im Filtrat wie üblich bestimmen. Die Arbeit enthält Beleganalysen u. genaue Arbeitsvorschriften. (Chem. News 129. 299—301. 315—17. 1924. New York, Coll. of Chem. and Phys. Exptl. Sta.)

HERTER.

W. Pamfilow und W. S. Iofinow, *Über die Bestimmung von Chloraten und Perchloraten.* Zwecks Best. der ClO₃' neben CrO₄' (wie bei elektrolyt.

HClO₃-Herst.) wird *Chromsäure* mit Pb(CH₃COO)₂ gefällt u. das Filtrat mit reduziert; Titration des überschüssigen Fe⁺. — Der zweite Teil deckt sich einer früheren Notiz (vgl. Chem.-Ztg. 48. 541; C. 1924. II. 1611). (Ber. F. technikum Iwanowo-Wosniessensk 8. 54—57. 1924.)

BIKERMA

Leon A. Congdon, Fred J. Brown und R. Kenneth Friedel, *Kritische Studien über Analysenmethoden. XIII. Kohlenstoff.* (XII. vgl. Chem. News 129. C. 1924. II. 2600.) Verschiedene Methoden zur Best. von C in Stahl u. F. wurden in einer größeren Anzahl von Analysen verglichen. Ihre Genauigkeit in der Reihenfolge: 1. Isolierung des C durch K-Cu-Chlorid u. trockene Verbrennung im Shimer-Pt-Tiegel. 2. Direkte Verbrennung der Probe im Shimertiegel. 3. Colorimetr. Best. mit HNO₃. 4. Nasse Verbrennung mit H₂Cr₂O₇ des isolierten C. 5. Nasse Verbrennung der Probe ohne Isolierung des C. Am schnellsten u. mit prakt. meist ausreichender Genauigkeit ist 3. ausführbar. Es empfiehlt sich Vergleich mit der Färbung einer Fe-Probe von bekanntem, dem der zu analysierenden Substanz naheliegenden C-Gehalt. (Chem. News 129. 253—57. 1924.)

Martin Leo, *Zur Bestimmung des Kupfers als Sulfür.* Beim Glühen des Sulfids kann man an Stelle von H₂ vorteilhaft Leuchtgas verwenden. Zum Einleiten des Rosetiegels benutzt man eine Tonpfeife. (Chem.-Ztg. 48. 841. 1924. März.)

JUN.

Finotti, *Einfache Schnellmethode zur Bestimmung des Sn-Gehaltes in Legierungen u. dgl.* Das Verf. besteht darin, daß das in HCl gel. Sn mittels zugetropfte KClO₃-Lsg. oxydiert u. dann mit Ferrum reductum reduziert wird. Nach Auffüllen auf bestimmtes Vol. erfolgt Filtration u. Eintragen eines aliquot pipettierten Teils in einen Kochkolben. Hierauf Zugabe von HCl, W. u. etwas Al-Präparat. Umschwenken, dann Kochen bis zur Lsg. des Sn-Schwammes. Nach Abkühlen Zugabe von HCl sowie Stärkelslg., dann Titr. mit 1/10-n. Jodlsg. Stäube u. Schlämme werden mit Na₂O₂ ohne Sodazusatz aufgeschlossen u. in HCl gelöst. Dann reduziert mit Eisenpulver usw. Titerstellung mit Titerzinn „Kahlbaum“. (Chem.-Ztg. 48. 1082. 1922.)

OEHL.

Adolf Seuthe, *Beitrag zur Titration des Zinns in Weißmetallen mit Kaliumbromat.* Vf. kommt bei der Nachprüfung einzelner Methoden zum Schluß, daß lediglich die von FINOTTI (vorst. Ref.) einwandfreie Werte liefert u. auch nur dann, wenn statt mit Kaliumbromat mit Jodlsg. titriert wird. (Mitt. Versuchsanstalt der Deutsch-Luxemburg. Bergwerks- u. Hütten-A.-G. Dortmund 1. 169—78. 1922. Sep.)

OEHL.





R. A. Fisher und Sven Odén, *Die Theorie der mechanischen Analyse von Sedimentgesteinen mittels der automatischen Wage.* Vf. diskutieren die theoretischen Grundlagen für die Absatz-Geschwindigkeiten von Suspensionen verschiedener Teilchengrößen in Abhängigkeit von der Wassertiefe u. damit dem Flüssigkeitsdruck, bei dem die Sedimentierung vor sich geht, sowie von Strömungen verschiedener Art innerhalb der Fl. (Proc. Roy. Soc. Edinburgh 44. 98—111. 1924.)

FRANKENBURG.



Organische Substanzen.

A. W. Francis und A. J. Hill, *Untersuchungen über den dirigierenden Einfluss von Substituenten im Benzolkern. I. Eine chemische Methode zur Bestimmung der meta-Isomeren in einigen disubstituierten Benzolderivaten.* Die Methode beruht darauf, daß wenn in einer Verb. NH₂- u. OH-Gruppen anwesend sind, diese beim Bromieren in wss. Lsg. Br in sämtliche noch substituierbaren o- u. p-Stellungen dirigieren; alle m-Amino- u. Phenolverb. bilden Tribromsubstitutionsprodd. mit 1, 2, 4 u. 6, die o- u. p-Verb. Dibromide mit Br in 4, 6 u. 2, 6; das verbrauchte Br ist daher ein Maßstab für die anwesende Menge m-Verb. Zur Analyse von tri-

bb. ist es erforderlich, diese zunächst quantitativ mittels TiCl_3 in *Aminoverbb.* durchzuführen (Gleichung 1); diese Lsgg. können direkt titriert werden. Statt Br_2 kann ein Gemisch von $\text{KBrO}_3 + \text{KBr}$ angewandt werden, das nach 2. Br titriert. Da bei der Substitution HBr frei wird, der einen Teil des KBr ersetzen kann, genügt die in 3. angegebene KBr -Menge; das überschüssige TiCl_3 reagiert außerdem mit KBrO_3 nach 4.



Bei der Ausführung der Br -Titration treten oft Schwierigkeiten auf infolge von Nebenrk., diese können sich äußern a) in Oxydation u. Zers. des Mol., b) in der Ausfällung nur teilweise bromierter Verb., c) in Abspaltung gewisser Gruppen (OH , SO_3H u. CHO). Nach a) werden verändert: *o*- u. *m*-Toluidin, die *Phenylendiamine*, *o*- u. *p*-Aminophenole, *p*-Phenetidin u. *Brenzcatechin*; bei den Toluidinen *Phenylendiamin* u. *p*-Aminophenol unterbleibt die Zers., wenn bei 0° gearbeitet wird. b) kann durch Zugabe von reichlich Lösungsm. ausgeschaltet werden. Die durch c) bedingte Veränderung kann ebenfalls verhindert werden durch Arbeiten bei niedriger Temp. Für einige Säuren sind nachstehend die Tempp. angegeben, bei denen durch Br keine Abspaltung von Gruppen eintritt; die eingeklammerten Zahlen geben die Tempp. an, bei denen die Gruppen quantitativ abgespalten werden: *o*- u. *p*-Oxybenzoesäure -5° (20°), *o*- u. *p*-Aminobenzoesäure 0° (40°), *o*- u. *p*-Benzaldehyd 10° (40°), *o*- u. *p*-Aminobenzaldehyd 15° (45°), *Sulfanilsäure* 0° (20°). Wenn genügend A. vorhanden, um die Ausfällung von Dibromiden zu verhindern, so findet in den letztgenannten Fällen quantitative Zers. schon bei 20° statt, die Endprodukte können als *Tribromphenol* bzw. *Tribromanilin* bestimmt werden. Die CHO -Gruppe wird, wie besondere Verss. ergeben haben, als CO abgespalten; vielleicht findet sich zunächst das hypothet. Formylbromid, HCOBr , das zu CO u. HBr zers. wird. Hat eine Verb. zwei OH - oder NH_2 -Gruppen, so werden die *m*-Derivv. tribromiert, bei den *o*- u. *p*-Verb. ist der dirigierende Einfluß entgegengesetzt, es werden kein Br verbraucht werden. Wird *m*-Phenylendiamin bromiert, so tritt auch bei 0° Zers. ein, wenn ca. $\frac{2}{3}$ des erforderlichen Br verbraucht sind. Wird jedoch die entsprechende Menge Resorcin zugegeben, so werden beide Verb. quantitativ bei Zimmertemp. tribromiert. Es bildet sich wahrscheinlich zunächst Verb. $\text{C}_6\text{H}_4\text{Br}_2\text{O}_2$; da in den Kern nur 3 Br eintreten können, wird das 4. zur Oxydation in Ggw. von Resorcin wirkt dieses jedoch als Acceptor für das freie Br u. die Oxydation bleibt aus. Die Br -Titration kann auch auf einige trisubstituierte Verb. ausgedehnt werden; *Thymol* wird quantitativ dibromiert, *Vanillin* geht in ein Monobromderiv. über, wenn bei 0° gearbeitet wird, bei höherer Temp. findet teilweise Abspaltung der CHO -Gruppe statt. *Phloroglucin* wird quantitativ tribromiert; werden 2 weitere Mol. Br zugegeben, so geht der Nd. in Lsg., es entsteht wahrscheinlich I, mit einem 6. Mol. Br entsteht ein öliger Nd. (II), der durch Titration mit $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ nach Zugabe von KJ in *Tribromphloroglucin* zerfällt. — Zur



t. von Amino- u. Phenolverbb. wird folgendermaßen verfahren: $\frac{1}{1000}$ Mol. Verb. in 10–25 ccm W., verd. H_2SO_4 oder A. wird mit geringem Überschuß 0,13-n. KBr -Lsg. versetzt u. KBrO_3 zugegeben, worauf mit ca. 7 ccm 50%ig. H_2O_4 angesäuert wird; es entsteht hierbei Gelbfärbung infolge überschüssigem Br , meistens auch ein Nd. Durch Zugabe von KJ -Lsg. wird J frei, das mit 0,1-n. $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ titriert wird. — Best. von Nitroverb. $\frac{1}{2}$ Millimol. werden (eventuell

mittels wenig Alkali oder Säure) in 25 cem W. oder A. gel. Die Lsg. wird 25 cem 50%ig. H_2SO_4 angesäuert u. in CO_2 -Atmosphäre (zur Verhinderung der Oxidation von TiCl_3) zum Kp. erhitzt; dann werden 50 cem 0,25-n. TiCl_3 zugegeben u. die Lsg. 5 Min. gekocht, danach wird im CO_2 -Strom abgekühlt, mit überschüssigem KBrO_3 + KBr -Lsg. versetzt, KJ zugegeben u. freies J mit $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ bestimmt. S. flüchtige Verb. zu analysieren (*Nitrotoluole*, *Nitrochlorbenzole*), so wird das mit O gefüllte Gefäß mit der alkoh. Lsg. der zu untersuchenden Verb. versetzt, TiCl_3 der Kälte zugegeben u. die Lsg. zum Kp. erhitzt, wonach wie vorher verfahren wird. Über Darst. der Lsgg. u. Analysenbeispiele vgl. Original. (Journ. Amer. Chem. Soc. **46**. 2498—2505. 1924. New Haven [Conn.], Yale Univ.) HABERLAND

G. G. Powarnin und A. W. Belikow, *Über die quantitative Bestimmung des Erythrens*. Die übliche Bestimmungsmethode des Erythrens — das Auffangen des Gases in Brom, die Dest. mit Wasserdampf des über Nacht gestandenen Gemisches u. das Wägen des im Destillationskolben bleibenden Erythrentetrabromids — ergibt meistens zu niedrige (bis um 35%) Werte. Deshalb ist eine neue Methode ausgearbeitet worden. Das Gas wird über einer an Erythren u. NaCl gesättigten Lsg. gesammelt, dann im A. adsorbiert (A. löst leicht 40 Voll. Erythren auf); das übrig gebliebene Gas wird über CaCl_2 geleitet, um A. festzuhalten. Die alll. Erythrenlsg. wird mit einer Br -Lsg. in CCl_4 im Überschuß versetzt u. entweder nach 5 Min. oder nach 24 Stdn. mit einer Lsg. von Na_2SO_3 + 2NaOH titriert. Zurücktitration mit Br -Lsg. (KJ -Stärke als Indicator). Die Anlagerung des ersten Br_2 ist in 5 Min. bei 0° vollzogen, die Anlagerung des zweiten dauert 24 Stdn. bei Zimmertemp. Da ein Teil des Br mit dem A. der Erythrenlsg. unter B. von Br reagiert, so muß noch die Acidität nach der Titrierung des freien Br bestimmt werden. Die Rk. mit Na_2SO_3 + 2NaOH ändert die Acidität nicht:



Ist die M. des als HBr gefundenen Br b u. die gesamte verbrauchte Br -Menge a , so entfällt auf Erythren $a - 2b$ Br . Sind noch Äthylen u. seine Homologen vorhanden, so ermittelt man die M. des Erythrens aus der auf die Sättigung der zweiten Doppelbindung verbrauchten Br -Menge u. die Äthylene als Differenz. Fehler $\pm 10\%$. (Journ. Russ. Phys.-Chem. Ges. **55**. 226—34. 1924. Lab. d. Inst. „Resinotrasts“.)

BIKERMAN

Bestandteile von Pflanzen und Tieren.

Guy E. Youngburg und George W. Pucher, *Untersuchungen über Penicillinstoffwechsel*. I. *Eine colorimetrische Methode zur Bestimmung von Furfural*. Das Verf. benutzt die Rotfärbung mit Anilin u. Essigsäure. Als Stammlsg. für die colorimetr. Vergleiche dient Lsg. von 1 g Furfural in 100 cem mit Toluol gett. W., das auch zur Herst. der verschiedenen Verdünnungen benutzt wird. (Journ. Biol. Chem. **61**. 741—46. 1924. Buffalo, Univ. of Buffalo; Gen. Hosp.) SPIEGEL

M. Bálint und P. Ruszczyński, *Eine Mikromethode zur Bestimmung von organischen Substanzen*. Wegen Aussalzens mit $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ kam eine N-Best. nicht in Frage. Brauchbar erwies sich die KMnO_4 -Methode nach WINKLER mit einem Abänderungen. (Biochem. Ztschr. **152**. 246—49. 1924.) WOLFE

Paul Ruszczyński, *Die Fällungskurve der Serumweißkörper*. Obwohl die Fällungskurve bei Halbsättigung mit $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ nur selten eine ausfallsfreie Zone zeigt, kann man trotzdem aus ihrem Verlauf die Existenz zweier wohlcharakterisierter Fraktionen herauslesen, die durch Zwischenglieder verbunden werden, deren Zugehörigkeit durch Konvention definiert ist, aber nicht aus ihrer Natur heraus zwingend gefordert werden kann. (Biochem. Ztschr. **152**. 250—56. 1924. Berlin, Charité.) WOLFE

Sidney James Buchanan Connell, *Die colorimetrische Bestimmung von Lycopin*. Die Lycopinslg., die 0,5 mg im Liter enthält, in PAe. (F. $< 40^\circ$) gel., wird bei 1 cm Schichtdicke mit einer Standardlg. verglichen (von 0,02%ig. $K_2Cr_2O_7$ -Lsg. 1,5%ig. Ni-freier $CoSO_4$ -Lsg. werden die 6,9 bzw. 135,0 mg äquivalenten Mengen gemischt, auf 100 cem aufgefüllt; gemischt für mindestens 24 Stdn. haltbar). Vergleich im Stanfordcolorimeter. Fehler beträchtlich unter 1%. (Biochemical Journ. 58 1127—28. 1924. London, Univ.)

WOLFF.

Alan H. Ware, *Eine anscheinend spezifische Probe auf Tannine*. Vf. beschreibt eine neue Probe auf Tannine u. gewisse andere chromogene Phenole; das Reagens ist das Ferri-Ammoncitrat der Br. Pharm. zusammen mit 30% NH_4 -Acetatlg. Sehr verschiedene Resultate wurden mit Tanninen u. Hämatoxylin erhalten, die untereinander u. mit anderen wasserl. Stoffen differieren. Tannin allein wird bei diesem Vf. vollständig gefällt; Hämatoxylin nur unvollständig. Kein anderes wasserl. Phenol oder phenol. Glucosid scheint Ndd. in neutraler Lsg. zu geben, nur eine purviolette Färbung entsteht mit Catechin, Protocatechusäure, Pyrogallol, Gallussäure u. Brasilin. Die Farbe verändert sich in intensivrot auf Zusatz von NH_3 . Instabil. Extraktivstoffe, die phenol. Körper oder andere als oben genannte enthalten, geben eine starke Braunfärbung, aber meist erst nach Zusatz von NH_3 . Bekanntes Caffetannin u. Hopfentannin werden nicht gefällt. Alle Pflanzenextrakte, welche bei dieser Probe einen Ndd. geben, liefern ein deutliches Resultat bei der Goldschlägerhäutchenprobe u. geben auch positive Werte mit der modifizierten erweiterten STIASNY-Probe, die Vf. früher beschrieben hat. Die Probe scheint sehr ganz spezif. für Tannine zu sein u. liefert auch wertvolle Resultate mit gewissen anderen phenol. Substanzen. (Analyst 49. 467—71. 1924. Exeter, Univ. Coll.) Dr.

J. A. Smorodinzew und A. N. Adowa, *Bereitung von Standards zur colorimetrischen Bestimmung des Trypsins*. Die Methode von PALLADIN (PFLÜGERS Archiv. 137. 337; C. 1910. II. 1096) unter Verwendung von mit Spritblau gefärbtem Fibrin wird verbessert. Da A. das Fibrin der Verdauung weniger zugänglich ist, erfolgt die Färbung statt mit alkoh. mit Glycerinlg. (0,05%ig.) des Farbstoffes. Die Vergleichslsgg., die durch Verdauung so gefärbten Fibrins erhalten werden, bleiben durch Zusatz der gleichen Menge Glycerin haltbar. Toluol u. NaF befeuchten sich als antisept. Zusätze nicht. Für Best. der trypt. Kraft in frischen Pflanzenextrakten sind die Vergleichslsgg. nicht mit W., sondern mit derselben verdünnten Fl. zu verdünnen. (Biochem. Ztschr. 153. 14—18. 1924. Moskau, Staatl. Univ.)

SPIEGEL.

E. Kohn-Abrest, *Nachweis giftiger Gase im Blute*. In einen Kolben von 400 bis 500 cem Inhalt ist ein Hahntrichter eingeschliffen, dessen Rohr bis an den Boden reicht. Vom Halse des Kolbens führt ein Rohr schräg aufwärts, dann, mit Rücksicht versehen, horizontal zu einem damit verschmolzenen U-Rohr, das unten in einer kugelförmigen Erweiterung (I) von 35 cem Inhalt mit unterem Hahn endet u. in einen mit k. W. beschickten Kühler eingesenkt wird; an dieses Rohr schließt sich eine Gaswaschflasche (II) von 100 cem Inhalt, mit 20 cem $\frac{1}{50}$ -n. $AgNO_3$ -Lsg. an, die u. schließlich das Gefäß III zum Auffangen der in I nicht kondensierten Gase II nicht absorbierten Gase. Mittels dieses App. können in derselben Blutprobe A., H_2S , HCN , CO_2 u. CO bestimmt werden. Nachdem der ganze App. (im Original) mittels Wasserstrahlpumpe u. Hg-Pumpe völlig evakuiert ist, taucht man in den zur Hälfte in W. von $80-85^\circ$ tauchenden Kolben das Blut (möglichst 50 cem) unter sorglichem Vermeiden des Eintrittes von Luft, dann, wenn das Blut aufgeschäumen vorüber ist, mit gleicher Vorsicht ein gleiches Vol. gesätt. wss. Extrakt von Weinsäure oder Phosphorsäure einfließen u. die Gasentw. vollständig abwarten (15—20 Min.), wobei die naheliegenden Hähne zweckmäßig durch Eiskühlung

geschützt werden. Dann wird der Hahn am Verbindungsrohr geschlossen, n. Entfernen des Kühlers durch Öffnen des Hahnes von I langsam Luft zugelassen. Es findet sich nun in I A., in II noch ein Teil von diesem, falls die Kühlung I ungenügend war, ferner die Ag-Verbb. von H_2S n. HCN , in III CO_2 u. CO , restlichen Kolbeninhalt eventuell Sulfoeyanide u. nichtflüchtige Gifte. (C. r. l'Acad. des sciences **179**. 903—6. 1924.) SPIEGEL

C. Jimenez Diaz und **B. Sanchez Cuenca**, *Zur Mikrobestimmung des I. zuckers.* (Bemerkung zu einer gleichnamigen Arbeit von Dresel und Rothmann.) finden die Hagedorn-Jessensche Methode in ihrer ursprünglichen Ausführung s. brauchbar. Wendet man aber das von DRESEL u. ROTHMANN (Biochem. Zts. **146**. 538; C. **1924**. II. 738) angegebene Saugblättchenverf. dabei an, so sind die Ergebnisse zu niedrig u. ungleich. Ursache dieses Übelstandes ist die schnelle Koagulation u. Impermeabilisierung des in den Blättchen aufgesaugten Blutes durch Kontakt mit der $\text{Zn}(\text{OH})_2$ -Fl. (Biochem. Ztschr. **153**. 97—99. 1924. Sevilla Univ.) SPIEGEL

Wilhelm Tron, *Die Verwendung des Seitzschen Entkeimungsfilters zur Entkeimung von Rotlaufserum.* Das Seitzsche Filter (EK-Filter Nr. 30/IV), eine Filterpresse mit Asbestschichten, hat sich für den vorliegenden Zweck bzgl. Keimsicherheit, Mengenleistung u. Schonung des Seruntiters durchaus bewährt. (Zentralblatt f. Bakter. u. Parasitenk. I. Abt. **93**. 380—91. 1924. Gießen, Hessische Städt. Rotlaufimpfanst.) SPIEGEL

Andrew Picken Orr, *Eine colorimetrische Methode zur direkten Ammoniakbestimmung im Harn.* Die Methode beruht auf dem Verf. von THOMAS (Bull. Chim. de France [4] **13**. 398; C. **1913**. II. 64). Zur Vermeidung der Rk. mit Harnstoff arbeitet man in der Kälte u. mit beträchtlichem Phenolüberschuß. — 20 ccm Harn werden auf 100 ccm mit dest. W. verd., davon 5 ccm zu 4,5 g reinem Phenol gegeben, hierzu 20 ccm NaOCl -Lsg. (1 Teil frischer Handelslsg. + 1 Teil dest. W.) geschüttelt, nach 5 Min. Farbentw. wird alles in 100 ccm dest. W. gegossen, u. 250 ccm aufgefüllt. Ebenso werden 5 ccm Standard- $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ -Lsg. behandelt u. hält 0,1 mg NH_3 -N im ccm; 0,04716 g reines $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ in 1 Liter dest. W. gelöst. Dann wird verglichen. Ist der Standard z. B. 20 bei Farbgleichheit, so lautet die

Formel zur Berechnung:
$$\frac{x}{20} = \frac{0,5}{\text{mg NH}_3\text{-N in 1 ccm Harn}}$$
 (Biochem. J. **18**. 806—8. 1924. Glasgow, Physiol. Inst.) WOLFF

B. Schwenke, *Zur Methodik der quantitativen Harnsäurebestimmung im Harn.* Die Best. der Harnsäure mit dem Uricometer nach RUHEMANN (Berl. klin. Wchschr. **39**. 27. 55; C. **1902**. I. 784) ist für die Praxis völlig unzureichend. Die Werte liegen zwischen 0,34—0,41‰, gegen 0,39—0,69‰ (titrim. nach HOPKINS). Genaue Werte erhält man nach dem Verf. von HOPKINS, das titrimetr. u. gravimetr. beschrieben wird. (Pharm. Ztg. **69**. 1156. 1924. Leipzig, Engel-Apotheke.) DIETZ

Jos. W. E. Harrisson, *Phthalsäurediäthylester in Jodtinktur.* Zum Nachweis von Phthalsäurediäthylester in Jodtinktur verdampft u. erhitzt man den Rückstand von 20 ccm in einer Porzellanschale, nimmt mit 25 ccm h. W. auf, filtriert, wäscht mit h. W. jodfrei u. verdampft das Filtrat in einer tarierten Glasschale, wägt u. rechnet den Jodidgehalt u. prüft nach U. S. P. — Geringe Mengen Ester können durch Ausschütteln der mit $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ entfärbten u. mit NaOH schwach alkalisch gemachten Tinktur mit PAe. , Verdunsten des Auszugs u. Kosten gefunden werden. Phthalsäurediäthylester hat einen bestimmten u. eigenen Geschmack. (Amer. J. Pharm. **96**. 758—59. 1924. Philadelphia [Pa.], La Wall Lab.) DIETZ

H. Angewandte Chemie.

I. Allgemeine chemische Technologie.

W. Kaempfer, *Die Verwendung von Sandstrahlgebläsen in der chemischen Industrie*. Vf. beschreibt die Verwendung von Sandstrahlgebläsen (Bad. Maschinenfabrik Durlach) zur Reinigung von Kesseln, Apparaten, eisernen Fässern usw. (Chem.-Ztg. 48. 873—74. 1924. Durlach.)

JUNG.

—, *Eine neue Dickstoffpumpe*. Die Universalpumpe „Kobra“ der Firma A. BORSIG, Berlin-Tegel, ist eine liegende Kolbenpumpe, deren Pumpenkörper als Träger für ein Fahrgestell ausgebildet ist. Die Kolbenabdichtung erfolgt ohne Stopfbuchse durch Ledermanschetten; an Stelle der Ventilkugeln aus Gummi ist die Pumpe mit Eisenkugeln ausgerüstet. (Chem.-Ztg. 48. 856. 1924.)

JUNG.

William T. W. Miller, *Kugel- und Rohrmühlenauskleidung*. Die neuesten Maschinen, die sich besonders durch hohe Wirksamkeit beim Zerkleinern auszeichnen, werden an Abbildungen erläutert. (Engin. Mining Journ. 118. 613—17. 1924. Sheffield, England.)

WILKE.

F. W. Horst, *Paraffin als Apparatedichtungsmittel*. Vf. beschreibt die Anwendung von Paraffinstopfen u. die Verb. zweier Rohre durch eine Paraffinmuffe. (Chem. Apparatur 11. 161—62. 1924.)

JUNG.

—, *Filterplatten großer Festigkeit*. Die neuen Platten, die die NORTON Co., Worcester, Mass., hergestellt, werden aus elektr. geschmolzenen Tonerdekörnern, die im Ofen mit einem Tonerdeglaß verkittet sind, hergestellt u. sollen durch Säuren u. schwach alkal. Fl. prakt. nicht angegriffen werden. Sie sind nicht nur zur Filtration von starken u. h. Alkalilaugen u. von HF. Plötzliche Schwankungen der Temp. zwischen 20 u. 100° schaden nicht, die Platten sind bis 900° brauchbar, wenn sie vorher allmählich angewärmt werden. (Chem. Engineering 31. 509. 1924.)

WILKE.

B. D. Kelly, *Fortlaufende Vakuumfilter im Cyanidprozeß*. Auf Grund der zu KELLINGER erreichten Fortschritte bei Anwendung geeigneter Filtration bei der Gewinnung, machte Vf. auf die großen Vorteile einer Serienfiltration aufmerksam, deren Wirkungsgrad er berechnet. Bis jetzt soll nur die Argonaut Co., Ltd., zu Dane, Ontario, diesen Prozeß anwenden. (Engin. Mining Journ. 118. 569—73. 1924. Timmins [Ont.])

WILKE.

Henry Hanson, *Fortlaufende Vakuumfilter im Cyanidprozeß*. Vf. bringt einige Berechnungen über die Ansicht von KELLY (s. vorst. Ref.) zur Frage der Serienfiltration. (Engin. Mining Journ. 118. 702. 1924. Toronto [Ont.])

WILKE.

L. B. Eames, *Fortlaufende Vakuumfilter im Cyanidprozeß*. Vf., der bis 1916 KELLINGER tätig war, stellt auf Grund seiner Notizen fest, daß KELLYS (s. vorst.) Berechnungen mit der Praxis nicht restlos übereinstimmen u. möchte daher die allgemeine Anwendbarkeit des neuen Verf. bezweifeln. (Engin. Mining Journ. 118. 703. 1924. Denver [Colo.])

WILKE.

W. Graulich, *Über Trockenanlagen*. Darst. der zu beachtenden Gesichtspunkte. (Chem.-Ztg. 48. 876—77. 1924. Hamburg.)

JUNG.

Waldemar Torwald, *Gesichtspunkte für die Auswahl des Extraktionssystems*. Beschreibung und Kritik der stehenden und rotierenden Extraktionsapparate, besonderer Berücksichtigung ihrer Leistungsfähigkeit. Kritische Beschreibung verschiedener Systeme von Extraktionsapp. unter besonderer Berücksichtigung der Extraktoren der Maschinenfabrik C. SCHLOTTERHOSE & Co., Geestemünde. Rotierende Extraktoren mit Rührwerk sind für Massenverarbeitung zweckmäßiger als stehende. (Chem.-Ztg. 48. 853—55. 874—76. 1924.)

JUNG.

—, *Vakuumverdampfer mit einem Trommeltrockner verbunden*. Ausführliche Konstruktionsangabe eines App., welcher die Anreicherung der zu verdampfenden Fl. u. vollständige Trocknung eines Körpers in einem fortlaufenden Arbeitszyklus gestattet. (Chem. Metallurg. Engineering 31. 747—48. 1924.) BECKER-ROSE

Alfred W. Porter, *Über den Wirkungsgrad von Kältemaschinen, die nach dem Drosselexpansionsprinzip arbeiten*. An Druckvolumen u. Temp.-Entropiediagramm wird gezeigt, daß der Wirkungsgrad dieser Maschinen geringer ist als derjenige der Zylinderexpansionsmaschinen. (Philos. Magazine [6] 48. 1006—10. 1924. London.) KYROPOULOS

Witkowitz Bergbau- und Eisenhütten-Gewerkschaft und Adolf Andor Witkowitz, Mähren, *Vorrichtung zum ununterbrochenen Auslaugen*, bestehend aus einer Anzahl auf einer ansteigenden Bahn hintereinander angebrachter Auslaugegefäße, dad. gek., daß die mit verschließbarem Bodenauslauf versehenen Gefäße fahrbar u. in solcher Weise angeordnet sind, daß beim Hinaufschieben des mit frischem Gut beschickten Gefäßes auf das untere Ende der Bahn infolge der durch eintretenden Bewegung der übrigen Gefäße das auf dem oberen Ende der Bahn befindliche Gefäß von dieser abgehoben wird, wobei über dem oberen Ende der Bahn zweckmäßig ein mit Umklapprinne versehenes Zuleitungsrohr für das Auslaugefl. u. unterhalb der Bahn eine längs dieser verlaufende Rinne vorgesehen ist. (D. R. P. 405 673 Kl. 12c vom 13/9. 1922, ausg. 7/11. 1924.) KAUSCH

Bruno Waeser, Berlin, *Auslaugen von Rohätzalkalischmelzen* mit W. d. anderen Lösungsm., dad. gek., daß man bei ungefähr +35° Anfangstemp. die Melze möglichst Luftabschluß mit event. bereits ätzend alkal. Wässern arbeitet u. die Konz. nicht über 18° Bé. steigen läßt. (D. R. P. 405 849 Kl. 121 vom 23/6. 1922, ausg. 8/11. 1924.) KAUSCH

Maschinenbau-Anstalt Humboldt, Köln-Kalk, *Verfahren und Vorrichtung zur Erzeugung feinsten Flüssigkeitsnebel*, 1. dad. gek., daß die Fl. unter erhöhtem Druck in einen rotierenden Hohlzylinder eingeführt wird, dessen stabile Wand aus einem porösem Material besteht. — 3. Kreiselzerstäuber, dad. gek., daß die poröse Wand des Zylinders aus einzelnen ringförmigen, mit länglichen Löchern versehenen Blechen besteht, welche derart aufeinandergestapelt wurden, daß die Löcher der Ringe zu denen der folgenden einen Winkel von 90° bzw. einen spitzen oder stumpfen Winkel bilden. 3 weitere Ansprüche kennzeichnen Ausführungsfine des Verf. u. der Vorr. (D. R. P. 406 146 Kl. 12a vom 27/4. 1922, ausg. 1/11. 1924.) KAUSCH

Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co. (Erfinder: **Alfred Schumacher**) **Leverkusen b. Köln a. Rh.**, *Vorrichtung zur gleichmäßigen Verteilung des Waschwassers auf rotierenden Nutschen*, dad. gek., daß ein Band, zweckmäßig aus Gumm Tuch bestehend, die Materialschicht von Beginn der Waschzone bis zu ihrem Ende bedeckt. — Ein weiterer Anspruch betrifft eine Ausführungsform der Vorr. (D. R. P. 405 635 Kl. 12d vom 18/9. 1923, ausg. 6/11. 1924.) KAUSCH

Otto Kurz, Gelsenkirchen, und **Elektrische Gasreinigungs-G. m. b. H.**, **hannover**, *Vorrichtung zur elektrischen Gasreinigung* mit Elektroden, die aus einem Belassung von Zwischenräumen oder Spalten übereinander aufgebauten wägerechten oder geneigten Stangen oder Röhren bestehen, dad. gek., daß die Stangen oder Röhren an beiden Enden mit Verdickungen, Wulsten, Muffen o. dgl. versehen sind, die beim Aufeinanderlegen Spalten für den Gasdurchtritt zwischen den einzelnen Elementen ergeben u. in Führungskulissen in ihrer Lage übereinandergehalten u. geführt werden. — 2 weitere Ansprüche kennzeichnen Ausführungsformen der Vorr. (D. R. P. 405 714 Kl. 12e vom 14/3. 1922, ausg. 12/11. 1924.) KAUSCH

Erich Oppen, Hannover, *Anordnung von Isolatoren elektrischer Gasreiniger*, dad. gek., daß die Verbindungslöcher in der Zone geringsten Druckunterschiedes in der Gaskammer u. der Außenluft angeordnet sind. — 2 weitere Ansprüche in weiteren Ausführungsformen der Anordnung. (D. R. P. 406062 Kl. 12e vom 15/6. 1922, ausg. 13/11. 1924.)

KAUSCH.

Arbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning (Erfinder: **Max Nuß**), Höchst a. M., *Verfahren von Gas- und Dampfgemischen durch Absorption mittels Kohle*. (D. R. P. 406093 Kl. 12e vom 25/3. 1922, ausg. 17/11. 1924. Zus. zu D. R. P. 396212; C. 1924. 21. — C. 1924. I. 2621 [A. P. 1481221].)

KAUSCH.

Fugo Andriessens, Zürich, und **Gesellschaft für Chemische Industrie in Basel**, *Durchführung endothermer Gasreaktionen*. (D. R. P. 406200 Kl. 12h vom 4/2. 1922, ausg. 15/11. 1924. Schwz. Prior. 25/2. 1921. — C. 1923. II. 560.) **Karbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co.** (Erfinder: **Heinz Thienemann**), *Verfahren zur Trocknen von Luft, Gasen oder Dämpfen*, 1. dad. gek., daß man sie über bzw. durch *Bauxit* leitet, der durch Erhitzen auf 400—600° C. entwässert wird. — 2. Wiederbrauchbarmachen des nach 1. benutzten *Bauxits*, dad. gek., daß man ihn durch erneutes Erhitzen wieder entwässert. (D. R. P. 406356 Kl. 12e vom 7/1. 1922, ausg. 18/11. 1924.)

KAUSCH.

Techno-Chemical-Laboratories, Limited, London, *Verdampfen und Destillieren flüssigkeiten*, unter stufenweiser Verdampfung derselben in einem Mehrkörper-Apparat, unter Wiederbenutzung der Brügendämpfe nach deren Komprimierung, dad. gek., daß die Brüden zwischen jedem Verdampfkörper dem steigenden Kp. entsprechend in der Weise komprimiert werden, daß die Temp. in jedem Verdampfkörper höchstens um 3° höher ist, als die Siedetemp. der Lsg., wobei letztere in jedem Verdampfkörper wiederholt im Kreislauf in dünner Schicht über die Heizfläche herabrieselt. (D. R. P. 405912 Kl. 12a vom 13/10. 1912, ausg. 11/11. 1924. Prior. 14/10. 1911.)

KAUSCH.

Maschinenbau Akt.-Ges. Balcke, Bochum, *Kaminkühler zum Kühlen heißer Gase*, 1. dad. gek., daß an sich bekannte Scheibenkühler in dem unteren Teile des Kaminkühlers angeordnet sind. — 2. gek. durch die Vereinigung mit einem Kaminkühler in den Scheibenkaminkühler hineingebauten, im Betriebe nachgeschalteten oder Rieselkaminkühler. (D. R. P. 406192 Kl. 12e vom 8/8. 1922, ausg. 1924.)

KAUSCH.

Albert Klein, Stuttgart, *Kältemittel*, dad. gek., daß es aus einer Mischung der Isomeren des *Dichloräthylens* in direktem Verhältnis ihrer Dampfdrucke bei Verdampfungstemp. besteht. (D. R. P. 406029 Kl. 17a vom 19/8. 1923, ausg. 1924.)

KAUSCH.

Theodor Steen, Charlottenburg, *Verfahren und Vorrichtung zur Umwandlung gasförmiger Körper durch Absorption eines Gases in Ggw. eines Katalysators*, wobei dem Katalysator gemischte u. vom Gas durchströmte Fl. einen geschlossenen Kreislauf aufführt u. dabei in einem Autoklaven regenartig durch den gaserfüllten Raum herabfällt, 1. dad. gek., daß auch während des Hochhebens der mit dem Katalysator gemischten Fl. in dem Autoklaven die zu behandelnde Fl. von dem Gas durchströmte wird. — 2. Vorr., bestehend aus einem mit einem Kompressor verbundenen Autoklaven, dad. gek., daß in dem Autoklaven ein Gasverteilungsrohr u. ein Gasflüssigkeitsheber angeordnet sind, welche der Kompressor abwechselnd mit Druckgas speist. — 2 weitere Ansprüche kennzeichnen Ausführungsformen der Vorrichtung u. der Vorr. (D. R. P. 406252 Kl. 12g vom 23/11. 1920, ausg. 18/11. 1924.)

KAUSCH.

III. Elektrotechnik.

Audubert, *Die Struktur der elektrochemischen Niederschläge*. Vf. unter-
I. 1.

scheidet folgende Gruppen elektrochem. Nd.: I. Die Geschwindigkeit der Kr. entw. ist größer als die Keimbildung. II. Die Geschwindigkeit der B. Entw. der Kerne sind fast gleich, die erstere etwas größer als die zweite (re. Strukturen mit feinem Korn). III. Die Geschwindigkeit der Keimbildung i Wachstumsschnelligkeit ganz bedeutend überlegen. Dabei sind 2 Arten zu scheiden: a) „zerrissene“ u. b) „pulverige“ Ndd., wo nur eine sehr geringe Krystalle größer sind. Komplexe Lsgg. verursachen Strukturneigungen I $\rightarrow$ IIIa, ebenso der Zusatz von Kolloiden u. die Konzentrationserhöhung des Elektrolyten. Vergrößerung der Stromdichte bringt die Strukturneigung I $\rightarrow$ II $\rightarrow$ III (a). Temperaturerhöhung I $\rightarrow$ II $\rightarrow$ bei mittleren Temp. III $\rightarrow$ II $\rightarrow$ bei höheren Temp. u. Elektrolytbewegung I $\rightarrow$ II $\rightarrow$ IIIa. (Rev. de Métall. 21. 567—84. 1924.)

J. A. Seede, *Horizontaler Ringinduktionsofen*. Beschreibung dieser T. Vergleich mit dem elektr. Lichtbogenofen. (Iron Age 114. 1281—82. 1924. See tady [N. Y.], Gen. Elektr. Co.)

M. H. Hunt, *Herstellung von Hochspannungsisolatoren*. Vf. beschreibt e das Rohmaterial zu stellenden Anforderungen, die Herst. der Körper, das Form Trocknen u. Glasieren, das Brennen u. die Prüfung der Isolatoren auf etwa 300 volt. (Chem. Metallurg. Engineering 31. 729—33. 1924. Emeryville, Cal.)

Harry Burton Hartman, Scottsdale, Pennsylvanien, *Ozonisator*. Der in Linie für die Wasserreinigung bestimmte Ozonisator besteht aus zwei getren Abteilungen, besitzt senkrecht angeordnete, Wärme abstrahlende Rippen, eine vorgesehene Luftzutrittsöffnung u. eine O₃-Abgabekammer. Zwischen beiden teilen liegt eine O₃-Erzeugereinheit mit zwischen zwei Dielektriken befindl Elektrode. (E. P. 187558 vom 23/5. 1922, ausg. 16/11. 1922.)

Adolf Barth, Frankfurt a. M., *Elektrolysierzelle* mit zwischen Kathode u. n angeordneter, vom Elektrolyten unmittelbar gespeister Diaphragmenzelle, da daß diese am oberen u. unteren Ende je mit einem Abflußrohr für den erschl bezw. einem Zuflußrohr für den angereicherten Elektrolyten versehen ist, dieser selbsttätig in dauernder Zirkulation in die Diaphragmenzelle gelangt. (IR 405674 Kl. 121 vom 12/2. 1922, ausg. 12/11. 1924.)

Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co. (Erfinder: **Paul Imhoff**), e kusen b. Köln a. Rh., *Elektrolytische Zelle* unter Verwendung einer Kathode, el die Form von Flachrinnenrosten besitzt, in deren dem Diaphragma zugelh Mulden auf der wirksamen Seite der Kathode sich die Alkalilauge sammlt. 2. dad. gek., daß die muldenförmigen Roststäbe der vorgenannten Kathode d eng aneinandergesetzte Vierkant-, Hochkant oder Flachkantroststäbe bezw. Vn eisen oder T-Eisen ersetzt werden. (D. R. P. 405788 Kl. 121 vom 27/11. 1921, ausg. 11/11. 1924.)

Chile Exploration Company, New York, *Elektrode*. (D. R. P. 403741 l. vom 25/9. 1923, ausg. 11/10. 1924. A. Prior. 16/3. 1923. — C. 1924. II. 744 l.)

Deutsche Gold- & Silber-Scheide-Anstalt vorm. Rössler, Frankfur. *Elektroden für anodische Oxydationsverfahren*, bestehend aus Legierungen u. einem unedlen Metall, insbesondere Cu u. Ni, deren Pt-Gehalt 50% ni wesentlich untersteigt. (D. R. P. 405711 Kl. 121 vom 22/1. 1921, ausg. 6/11. 1924.)

IV. Wasser; Abwasser.

Erwin Link, *Schnellfilteranlage von 30000 cbm Tagesleistung für das wasserwerk Berg der Stadt Stuttgart*. (Gas- u. Wasserfach 67. 593—96. 6— 631—32. 1924. Stuttgart, Städt. Wasserwerk.)

SPLITTGEIER

G. Delhaye, *Die Bekämpfung der Anfrassungen und Kesselsteinbildung bei Kesseln*. Bei nicht in Betrieb befindlichen Kesseln greift k. W. mit Na_2CO_3 -Lösung die Kesselbleche an. Mit Rücksicht auf die Kesselsteinbildung u. die Anfrassungen ist für den Betrieb ein Gehalt von 0,5–1 g je Liter empfehlenswert. Die Kesselbleche sind dann gut geschützt. — Armaturen aus Bronze sind gegen Anfrass widerstandsfähiger als solche aus Gelbguß. Sie müssen aus den besten Werkstoffen hergestellt werden. Ni-Bronzen u. Ni-Al-Bronzen haben sich gegen Alkalien als widerstandsfähig bewährt. — Die üblichen Widerstandsgläser zerfallen, sobald der Natrongehalt 0,5% überschreitet. Ein seit einiger Zeit im Handel befindliches Glas mit hohem Borsäuregehalt trübt sich nicht. Die Zersetzbarkeit des Glases ist nicht auf den Natrongehalt zurückzuführen, sie findet hauptsächlich statt, wo der Dampf mit dem Glas in Berührung kommt.

Die unter verschiedenen Namen im Handel befindlichen Mittel gegen Kesselstein haben nicht die ihnen von ihren Herstellern nachgerühmten Eigenschaften, sondern sind in vielen sogar schädlich. Die Analysen der Kesselflüssigkeit „Coco“, einer Mischung aus Soda, ferner von „Odenal“ u. „Renal“ zeigten, daß sie teils wertlose, teils die Kesselwänden schädliche Bestandteile enthalten u. zu hohem Alkaliegehalt (Zucker, Migrosin, Gerbsäure u. a. organ. Körper, BaCl_2 , NaCl). — Das beste Mittel ist, Na_2CO_3 dem Speisewasser in solcher Menge zuzufügen, daß die Alkalität des Kesselwassers im Kessel auf rd. 0,55% Na_2CO_3 gehalten wird. — Vor den angeblichen Kohlensparmitteln wie „Vulcos“, „Rhena“, „Carbonit“ ist zu warnen, da sie wertlos u. nicht geeignet sind, die Verbrennung der Kohle zu vervollständigen. „Rhena“ ist trockenes ziegelrotes Pulver. Es enthält Nitrate, Sulfate, Nitrate u. Chloride des Na, Ca u. Mg, auch etwas Fe_2O_3 u. zwar Nitrate (berechnet als NO_3) 41,7% u. 2,61% H_2O . Ein anderes ähnliches Mittel bestand fast aus Na_2SO_4 u. NaCl , die in einen die Eigenschaften eines Dextrins zeigenden Stoff eingebettet waren. Da die Na-Salze die Flamme stark gelb färben, wirkt es stärker u. erweckt beim Heizer den Anschein lebhafterer Verbrennung. *Fédération Industr. Chim. de Belgique* 1924. 344–54. 392–97. 458–61.

NEUFELD.

Victor H. Kadish, *Aktivierter Kloakenschlamm — seine Herstellung und sein Wert*. Beschreibung einer sanitären Abwasser-Reinigungsanlage in Milwaukee, Wis., in welcher täglich 85 Million Gallonen Sielwasser verarbeitet werden, u. durch Einleiten von Luft in die Klärbassins ein sich schnell absetzender Schlamm gewonnen wird, aus welchem durch kontinuierliche Filtration mittels rotierender Vakuumfilter Fäkal Kuchen mit 75–80% W. gewonnen werden, die durch folgendes Trocknen auf Band- u. Schneckengängen bis auf einen Wassergehalt von 10% u. weniger getrocknet werden. Der so gewonnene Fäkaldünger enthält Gesamt-N von dem 71,5% leicht aufnehmbar sind. Um ein schnelles Filtrieren zu ermöglichen, wird der Schlamm mit so viel H_2SO_4 versetzt, daß sein ursprünglicher pH-Wert von 7–7,5 auf 3,3–3,6 reduziert wird. Nach den bisher ausgetesteten Gefäß- u. Düngungsverss. ist der so gewonnene Dünger, bezogen auf die N-Mengen, dem getrockneten Blut als gleichwertig zu erhalten u. auch für den ersten von Mischdüngern gut zu verwenden. *Amer. Fertilizer* 60. 78–81.

BERJU.

van Smit, *Das Abwasserreinigungsverfahren mit aktiviertem Schlamm*. Zusammenfassende Darst. über Entw. des Verf., Vergleich der verschiedenen Ausführungsarten, der Schlammverwertungsfrage, der Schlamm-trocknung, Düngewert, Kosten, Erfahrungen in Holland. (*Chem. Weekblad* 21. 505–11. 1924. Amsterdam.) **GROSZK. Amberger**, *Über Volumen-Wassermesser*. Die Möglichkeit, sehr geringe Wassermengen auch wieder relativ große Wassermengen genau messen zu können, ist nur bei den Volumenmessern, deren Vor- u. Nachteile auseinander gesetzt

sowohl die Ringe als die Flecken des Lauediagramms auftreten. (C. r. d. sciences **179**. 818—19. 1924.)

FRANKENBURGER.

P. Devaucelle, Courbevoie, Frankreich, und **F. Bensa**, Genua, *Ammoniak*. Alkali- oder Erdalkaliverbb., Kohle u. N₂ wird in üblicher Weise Cyanid gestellt u. das noch glühende Erzeugnis unter Vermeidung der Abkühlung der Röhre mittels Wasserdampf zersetzt. (Schwed. P. **53895** vom 31/12. 1920, 28/2. 1923, u. D. R. P. **348068** Kl. 12k vom 9/7. 1920, ausg. 28/1. 1922. Vor. 9/9. 1914.)

KÜHLING.

Sodische Anilin- & Soda-Fabrik, Ludwigshafen a. Rh. (Erfinder: **Robert Schbach**, Ludwigshafen und **Johann Giesen**, Heidelberg), *Gewinnung von Ammonitrat und Chlorammonium* aus KCl u. NH₄NO₃, 1. dad. gek., daß von einer NH₄NO₃ u. in der Regel auch von NH₄Cl bei genügend hoher Temp. gesättigten Ausgangen wird, welche einen so großen Überschuß an NH₄NO₃ enthält, daß bei der gewählten Ausgangstemp. eine Abscheidung von KCl nicht stattfinden kann. — 2. dad. gek., daß die mit W. oder mit KCl-Lsg. verd. Ausgangslauge zur Abscheidung des KNO₃ auf gewöhnliche Temp. abgekühlt wird u. die getrennte Lauge nach Einengen u. Zusatz von KCl u. NH₄NO₃ u. Abscheidung einer gewonnenen KNO₃ äquivalenten Menge NH₄Cl im Kreislauf mitverwendet wird. (D. R. P. **406202** Kl. 12l vom 10/4. 1923, ausg. 14/11. 1924.) KAUSCH.

Sodische Anilin- & Soda-Fabrik (Erfinder: **Alwin Mittasch** und **Robert Schbach**), Ludwigshafen a. Rh., *Herstellung von Alkalinitrat aus Alkalichlorid und Ammonitrat*, dad. gek., daß aus einer Alkalichlorid u. (NH₄)NO₃ enthaltenden Lsg. durch Zusatz von NH₃ u. Kühlung Alkalinitrat abgeschieden wird, worauf das Abtreiben des NH₃ durch erneute Kühlung oder Zugabe von Alkalichlorid u. (NH₄)NO₃ oder Anwendung mehrerer oder aller dieser Mittel NH₄Cl zur Abkühlung gebracht u. darauf zweckmäßig Umsetzungen unter Verwendung der Lsg. im Kreislauf wiederholt werden. (D. R. P. **406294** Kl. 12l vom 22/3. 1923, ausg. 17/11. 1924.)

KAUSCH.

Chemania Verein Chemischer Fabriken Act.-Ges. Zweigniederlassung Mannheim (Erfinder: **Friedrich Rüsberg**), Mannheim, *Gewinnung von Sulfaten aus Alkalien*, insbesondere der fixen Alkalien, durch doppelte Umsetzung von SO₄ mit entsprechenden wasserl. Salzen, der fixen Alkalien, dad. gek., daß die Abscheidung der Sulfate in Ggw. von NH₃ erfolgt. (D. R. P. **405922** Kl. 12l vom 14/3. 1922, ausg. 11/11. 1924.)

KAUSCH.

Chemania Verein Chemischer Fabriken Act.-Ges. Zweigniederlassung Mannheim (Erfinder: **Friedrich Rüsberg**), Mannheim, *Herstellung von wasserfreiem Natriumsulfat aus seinen wasserhaltigen Krystallen oder Lösungen*, 1. dad. gek., daß die Abscheidung der wasserfreien Salze in Ggw. von NaCl u. NH₃ erfolgt. — 2. dad. gek., daß die ammoniakal. NaCl-haltigen Mutterlauge nach entfeindender Anreicherung mit NaCl in der Ammoniak-sodafabrikation Verwendung findet. (D. R. P. **405923** Kl. 12l vom 29/3. 1922, ausg. 8/11. 1924.) KAUSCH.

Gaschinenbau-Anstalt Humboldt, Köln-Kalk, *Herstellung von Alkalicarbonaten aus Salzen*, 1. dad. gek., daß Alkalisulfatlsgg. der Elektrolyse unterworfen werden u. nach Anwendung einer unangreifbaren Anode, die auf dem Boden des Elektrolysegefäßes liegt u. mit einem unl. Carbonat bedeckt ist, u. einer Kathode, die gegenüber der Anode gegenüber befindet. — 2. dad. gek., daß als Kathode eine poröse Elektrode verwendet wird, durch deren Poren die gebildete Alkalicarbonatlsg. konzentriert abgezogen werden kann. (D. R. P. **406079** Kl. 12l vom 2/6. 1922, 4/11. 1924.)

KAUSCH.

Gaschinenbau-Anstalt Humboldt, Köln-Kalk, *Herstellung von Alkalicarbonaten aus Alkalisulfat und Kohlenoxyd* oder CO enthaltenden Gasgemischen, 1. dad. gek.,

daß die Rk. bei Anwendung von Unterdruck bei Temp. zwischen 400 u. 500° durchgeföhrt wird. — 2. dad. gek., daß die Einw. laut 1. in Ggw. von geringen Mengen eines katalyt. wirkenden Stoffes, wie NH_3 , organ. Aminen oder Stickoxyd erfolgt. (D. R. P. 406080 Kl. 121 vom 20/6. 1922, ausg. 13/11. 1924.) KAUSCH.

Courtaulds Limited, London, *Ausscheidung von Natriumcarbonat aus einer Lösung von kaustischer Soda*. (D. R. P. 405715 Kl. 121 vom 10/6. 1922, ausg. 13/11. 1924. E. Prior. 11/6. 1921. — C. 1922. IV. 876.) KAUSCH.

Deutsche Solvay-Werke Akt.-Ges., Bernburg, Anh., *Erhöhung des Schmelzgewichtes von pulverförmigem Schüttgut, insbesondere Soda*, durch Zusammenpressen. — 1. dad. gek., daß man aus dem Schüttgut hergestellte Preßkörper so weit zerkleinert, daß man das Material wieder in schüttbarer Form erhält. (D. R. P. 406251 Kl. 121 vom 24/6. 1923, ausg. 17/11. 1924.) KAUSCH.

Kali-Forschungs-Anstalt G. m. b. H., Staßfurt-Leopoldshall, *Darstellung von Glaubersalz aus den Löserückständen der Chlorkaliumfabrikation durch Auslaugen mit h. W.*, 1. dad. gek., daß die so erhaltenen Laugen durch Zugabe von 10% Bittersalz, Astrakanit, Löweit, Vanthoffit oder deren Gemischen auf die für die Krystallisation bei bestimmter tiefer Temp. günstigste Konz. gebracht werden, so daß die größte Ausbeute an Glaubersalz neben etwas NaCl als Krystalle u. in der Lauge mit dem höchstmöglichen MgCl_2 -Gehalt erhalten wird. — 2. dad. gek., daß außer den nach bekannten Verf. erhaltenen Doppelsalzen auch Gemische derselben mit anderen Salzen dazu verwendet werden, um die günstigste Konz. der Lauge herbeizuföhren. (D. R. P. 405921 Kl. 121 vom 28/3. 1923, ausg. 13/11. 1924.) KAUSCH.

Actiengesellschaft für Anilin-Fabrikation, Berlin-Treptow (Erfinder: **Richard Heimann**, Dessau i. Anhalt, und **Fritz Ackermann**, Wolfen i. Anhalt), *Herstellung der Nitrats des Kaliums, Bariums und Strontiums*, 1. dad. gek., daß $\text{Mg}(\text{OH})_2$ mit den Sulfiden dieser Metalle umgesetzt wird. — 2. dad. gek., daß $\text{Mg}(\text{NO}_3)_2$ mit den Sulfiden der genannten Metalle umgesetzt, das dabei entstandene $\text{Mg}(\text{OH})_2$ mit Salpeter in das $\text{Mg}(\text{NO}_3)_2$ zurückverwandelt u. dieses mit einer neuen Menge Sulfides zur Umsetzung gebracht wird. (D. R. P. 406412 Kl. 121 vom 20/6. 1922, ausg. 18/11. 1924.) KAUSCH.

Paul Askenasy und **Max Dreifuß**, Karlsruhe i. B., *Herstellung von Teräuren aus Aluminiumsulfat durch Behandlung mit reduzierenden Mitteln*, 1. dad. gek., daß man unreines Fe-haltiges $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ in Ggw. von reduzierenden Gasen, flüchtigen festen KW-stoffen oder ähnlich wirkenden Reduktionsmitteln auf eine Temp. erhitzt, bei der die H_2SO_4 bis zum S bzw. H_2S reduziert wird, erhitzt, bis die gebildete H_2 weitgehend unl. geworden ist u. dann die Al_2O_3 von den Verunreinigungen (z. B. Fe_2O_3 , Eisencarbid, FeS) durch bekannte Mittel trennt, während der entstehende S u. H_2S sowie etwa vorhandenes SO_2 in bekannter Weise gewonnen oder weiterverarbeitet werden. — 2. weitere Ansprüche betreffen Ausführungsformen des Verfahrens. (D. R. P. 406063 Kl. 12m vom 23/4. 1920, ausg. 13/11. 1924.) KAUSCH.

Badische Anilin- & Soda-Fabrik, Ludwigshafen a. Rh., *Aufschließe von Chromeisenstein*, 1. dad. gek., daß man das Mineral bei einer unter 700° liegenden Temp., zweckmäßig bei beginnender Rotglut, mit H_2 oder anderen vornehmlich H_2 enthaltenden, reduzierenden Gasen u. dann mit Säure, insbesondere starker HNO_3 , u. zwar zweckmäßig solcher vom höchsten Kp., in der Wärme behandelt. — 2. dad. gek., daß man den Chromeisenstein gegenüber der Säure im Überschuß anwandelt. — 3. daß gek., daß man der zum Aufschließen dienenden HNO_3 einen T. H_2 bei einer früheren Aufschließung erhaltenen H_2CrO_4 -haltigen Lsg. zusetzt. (D. R. P. 405924 Kl. 12m vom 12/1. 1923, ausg. 11/11. 1924.) KAUSCH.

VII. Agrikulturchemie; Düngemittel; Boden.

-, *Neuzeitliche Maschinen für die Kunstdünger-Industrie*. Beschreibung des Magneten u. Magettrommelscheiders Bauart Ullrich, des Knochenschlagers, der Hammernühlen für Knochengut u. der Dreiwalzenringmühle des Grusonwerkes für Phosphate. (Chem.-Ztg. **48**. 836—37. 1924.) JUNG.

I. J. Feilitzen, *Der Wert der Kalkabfälle der Sulfatcelluloseindustrie als Verbesserungs- und Düngemittel*. Vorschläge für die Verwertung u. Behandlung Kalkabfälle der schwed. Sulfatcellulosefabriken. Nach den Verss. des Vfs. sind diese Abfälle unbedenklich bei der Kultur der Moorböden u. zur Verwertung der physikal. Bodenbeschaffenheit verwendet werden. (Kungl. Landt.-Akad. Handlingar och Tidskrift **71**. 567—87. 1922; BIED. Zentralblatt f. Agrik.-Ch. **53**. 411—12. 1924.)

BERJU.

Hudig und C. Mayer, *Der Einfluß saurer und alkalischer Düngung auf das Wachstum der Pflanzen*. Aus den Ergebnissen ihrer 6-jährigen Verss. folgern sie, daß mit Ausnahme einiger ganz seltener Fälle saure Dünger nie auf sauren Böden gegeben werden dürfen auf sauren Böden Leguminosen nicht oder nur schlecht gedeihen u. Kartoffeln einen schwach sauren Boden verlangen. Durch Kalkungsverss. kann die zur Neutralisation saurer Böden nötige Kalkmenge festgestellt werden. (Verslagen van landbouwkundige onderzoekingen d. Rijkslandbouwkundige Proefstations **26**. 60—86. 1922; BIED. Zentralblatt f. Agrik.-Ch. **53**. 404—5. 1924. Ref. SCHÄTZLEIN.)

BERJU.

Graftiau, J. Giele und P. Hardy, *Untersuchungen über die Düngewirkung von zermahlenen Kalium- und Natriumphosphate*. Vergleichende Gefäßverss. (vgl. Bull. Soc. Chim. Belgique **31**. 22; C. 1922. I. 1088) mit einem Gefäßverss. mit 15,55% Gesamt-P₂O₅ bezw. 14,05% citratl. P₂O₅, „Supra A“ u. „Supra B“ mit 10,80% Gesamt-P₂O₅, von der nur etwas mehr als die Hälfte citratl. war, u. einem Gefäßverss. mit dessen Herst. K- u. Na-Verbb. als Flußmittel verwendet wurden. „Potassique“ u. „S. sodique“ zeigten die ersteren 3 Prodd. gleich gute Wrkkg. „S. sodique“ lieferte keine gleichmäßigen Resultate. Durch diese Verss. werden die Verss. der Vff. mit geschmolzenen u. darauf fein zermahlenen Phosphaten verglichen. (Bull. Soc. Chim. Belgique **33**. 451—62. 1924.)

BERJU.

Graftiau, *Untersuchungen über die Nachwirkung von Phosphorsäuredüngern*. In den Gefäßverss. wurde gefunden, daß ungefähr 50% der dem Boden gegebenen P₂O₅ durch 2 Ernten verbraucht wurden. Unterss. über das Verh. des verbleibenden Restes der P₂O₅ der verwendeten Düngemittel (Superphosphat Schlacke, Phosphatschlacken „Vesta“ u. Supra u. Präzipität) in dem folgenden Jahre. Auch bei der nächsten Ernte eine gute Ausnutzung der verbliebenen P₂O₅. Der Rückgang der P₂O₅ im Boden wurde nicht beobachtet. (Bull. Soc. Chim. Belgique **33**. 462—65. 1924.)

BERJU.

P. Neumann, *Über einige Wertmerkmale des Haferkorns und über den Einfluß der Düngung, insbesondere der Phosphatdüngung auf diese*. Unterss. über die Wertkonstanten beim Hafer. Korngröße, 1000 Korngewicht, Maßgewicht u. die Beziehungen dieser Merkmale zu einander zeigten, daß beim Hafer weniger als bei den anderen Getreidesorten einzelne Eigenschaften u. Merkmale unbedingt bestimmend sind. Für die Beurteilung des Hafers ist außer dem Korngewicht u. dem Spelzenghalt auch die Korngröße u. die D. mit heran- zu ziehen. Auch durch eine starke Düngung wurde das Haferkorn in der Aus- sicht u. Beschaffenheit nicht greifbar beeinflußt. (Landw. Jahrb. **60**. 671—87. 1923. Berlin, Versuchs- u. Forschungsanst. für Getreidebearbeitung.)

BERJU.

Graftiau und P. Hardy, *Versuche über den Düngewert des Ammonsulfats*. Bei einem Vergleich der Düngewirkg. des Ammonsulfatsalpers mit der

des NaNO_3 durch Gefäßverss. zeigte ersteres eine schnellere Wrkg. als letztes, doch wurde die schnellere Wrkg. des Ammonsulfatsalpeters durch die b. Nachwrkg. des NaNO_3 für die nächstfolgende Frucht ausgeglichen. Es ist nach den beiden Düngemitteln der gleiche Wirkungswert zuzuschreiben. (Soc. Chim. Belgique **33**. 465—67. 1924.) BEU

R. H. Robinson, *Wirkung des Natriumnitrits im Boden*. Bei Gefäßverss. wurde NaNO_2 in sauren Böden sehr schnell u. in neutralen Böden langsamer, wobei fast sämtlicher N verloren ging. Zusatz von CaCO_3 u. Ca(OH)_2 verzögerte zwar die Zers. der Nitrite, bewirkte aber keine Umbildung der Nitrite in N₂ (Journ. Agricult. Research **26**. 1—7. 1923. Oregon, Agric. Exper.-Stat.) BEU

D. Fehér und I. Vági, *Untersuchungen über die Einwirkung von Nitriten auf das Wachstum der Pflanzen*. Nr. 2. TREITZ hat für möglich gehalten, daß die in den ungar. Alkaliböden in den h. Sommermonaten der Ggw. von Nitriten, die 0,27—1,64 mg pro kg in solchen Böden fand, zuzuschreiben sei. Vff. zeigten Verss. mit Gartenboden, dem Nitrit zugesetzt wurde, daß selbst bei >1 g N in 1 kg Boden in 4 Wochen keine Schädigung von Weizenpflanzen in verschiedenen Stadien der Entw. eintritt. (Biochem. Ztschr. **153**. 156—58. 1924. Sopron, Ungar. Hochsch. f. Berg- u. Forstingenieure.) SPIEL

S. Herke, *Über den Einfluß der Phosphorsäure auf den Zuckerzerfall im Boden*. Durch Ggw. l. P_2O_5 wird der Zuckerzerfall im Boden, gemessen an der CO_2 -Entw., gesteigert. Steigende P_2O_5 -Gaben verursachten eine zunehmende CO_2 -Entw. Zusatz von CaCO_3 begünstigte den Zuckerzerfall, ebenso $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ u. geringe Mengen NaNO_3 u. auf gewissen Böden auch K_2SO_4 . In Kulturlsgg. wirkten dagegen 0,01% NaNO_3 hemmend auf die Zers. des Zuckers. (Különlenyomat a Kiserlő Közlönyek **18**. 5—6. 1915; BIED. Zentralblatt f. Agrik.-Ch. **53**. 42—43. 1924.) BEU

Jehiel Davidson und J. A. Le Clerc, *Wirkung der in den verschiedenen Wachstumsstadien angewendeten verschiedenen anorganischen Stickstoffverbindungen auf den Ertrag, die Zusammensetzung und die Qualität des Weizens*. Durch in den ersten Entwicklungsstadien gegebene anorgan. N-Verbb. wurden Höchstsernten erzielt. Während der Zeit des Schossens verabreichte anorgan. Dünger verbesserte die Qualität der Weizenkörner bzgl. ihrer „Gelbfruchtigkeit“ u. ihres P₂O₅-Gehaltes; ebenso wurde hierdurch ein proteinreicheres Stroh gewonnen. Verss. in Züchtungen zwischen dem N-Gehalt u. dem 1000 Körner- u. dem Scheffelgewicht wurden nicht beobachtet, desgleichen auch keine durch die verschiedenen N-Frmn. bewirkte Unterschiede. N-Gaben während der ersten beiden Wachstumsstadien verursachten eine Depression des P_2O_5 -Gehaltes in den Körnern u. in dem Stroh, eine Depression des Aschen-SiO₂- u. P_2O_5 -Gehaltes. (Journ. Agricult. Research **55**—68. 1923, U. S. A. Dep. of Agric.) BEU

Georges Truffaut und N. Bezssonoff, *Über Mais, der sich normal entwickelt, indem er nur den durch Bakterien gebundenen Stickstoff ausnutzt*. In N₂-reichtem Medium vermochten sich Maispflanzen zu entwickeln, wenn mit N-bindenden Bakterien geimpft wurde. (C. r. soc. de biologie **91**. 1077—78. 1924.) SPIEL

E. W. Schmidt, *Über die Ausmittlung eines Pflanzenschutzmittels aus seinen fungizide Bewertung*. (Vgl. KOTTE. Ztschr. f. angew. Ch. **37**. 508; C. **194**. 1126.) Erwiderung. Botrytis wurde als Testmaterial gewählt, da seine Sporen resistenter als die aller Erregerpilze von Pflanzenkrankheiten sind. (Ztschr. f. angew. Ch. **37**. 903. 1924. Hannover.) JG.

C. T. Dowell und Paul Menaul, *Wirkung des Erhitzens im Autoklav auf die Giftigkeit des Baumwollensaatmehles*. Fütterungsverss. an jungen Scheinwürmern mit vorher im Autoklaven erhitztem Baumwollensaatmehl zeigten, daß hierdurch

1. Baumwollensaatmehl eigentümliche Gift zerstört wird. (Journ. Agricult. Research 26. 9—10. 1923. Oklahoma, Agric. Exper.-Stat.) BERJU.

H. Niklas und W. Hirschberger, *Eine neue Methode zur raschen Ermittlung der Phosphorsäurebedürftigkeit unserer Böden*. Die „Azotobactermethode“ nach CRISTENSEN zur Best. des Kalkbedarfs der Ackerböden kann auch zur Best. der Phosphorsäurebedürftigkeit verwendet werden. Die Prüfung wird wie folgt vorgenommen: 5 g lufttrockener Boden werden mit 20 ccm einer Nährlsg., bestehend aus 2 g Mannit, 0,2 g KCl, 0,3 g K₂SO₄ auf 1000 ccm dest. W., in einen kleinen Erlenmeyer gegeben u. mit Azotobacter geimpft. Säure Böden werden vorher mit 0,2 g CaCO₃ versetzt. Die Entwicklung der Azotobacterkultur erfolgt in einem Reibschrank bei 25° u. ist nach 4—5 Tagen beendet. — Die Ergebnisse der Azotobactermethode stehen nach dem bisher vorliegenden Material in Übereinstimmung mit den Methoden nach LEMMERMAN u. NEUBAUER. (Ztschr. f. angew. Ch. 37. 1924. 56. 1924. Hochsch. Weihenstephan.) TRÉNEL.

VIII. Metallurgie; Metallographie; Metallverarbeitung.

Henry Hyman, *Alte Schriftsteller über Metallurgie*. I. Agricola. Die „De Re Metallica“ erschien im Jahre 1556 u. legte den Grundstein zur metallurg. Wissenschaft. Das Buch enthält mehrere hundert Seiten u. zahlreiche Abbildungen. Wegen seiner für damalige Zeiten großen Objektivität blieb es über zwei Jahrhunderte das maßgebende Werk. Es behandelt das gesamte Gebiet der Metallurgie, Gewinnung der Mineralien, Herst. der Metalle, Waschen, Mahlen, Schmelzen usw. Auch über Herst. von Mineralsäuren ist einiges zu finden. GEORGIUS AGRICOLA oder GEORG BAUER war 1494 in Glauchau in Sachsen geboren, wurde Lehrer, studierte dann in Italien Naturwissenschaften u. Medizin u. war später Bürgermeister von Chemnitz. (Metal Ind. [London] 25. 388. 1924.) WILKE.

A. C. Halferdahl, *Genauigkeit bei der Probeentnahme metallurgischer Materialien*. Beitrag, der auf Grund mathemat. Überlegungen die Wichtigkeit der genauen Probeentnahme für Durchschnittsaufstellungen des Betriebes nachweist. (Engin. Mining Journ. Press 118. 731. 1924. Anyox, Brit. Columbia.) WILKE.

St. Reiner und W. Feldmann, *Beitrag zur Frage der Reduktion von Eisenerzen durch Gase*. Auf Grund laboratoriumsmäßig ausgeführter Verss. (Prüfung der Red. des Koksofengases auf einige Erze bei steigend wechselnder Temp., Gasgeschwindigkeit u. Gasmenge, Verwendung auch von H, Verfolg des Verlaufs der Red. usw.) u. an Hand von Kurven wird dargetan, daß eine vollständige Red. von Eisenerzen durch Gase kaum zu erreichen ist u. die bisher darauf aufgebauten Verff. wirtschaftlich sind. (Mitt. Versuchsanstalt Deutsch-Luxemburg. Bergwerks- u. Hütten-A.-G. Dortmund 1. 121—31. 1924. Sep.) OEHLER.

R. H. Ledbetter, *Hochofenpraxis im Birminghamdistrikt*. Es werden Erzsorten, Zahl u. Einrichtung der Hochöfen angegeben, sowie Gasreinigung, Gaserzeugung von Bessemereisen unter Verwendung von Stahlbrocken u. Schlackenverwendung beschrieben. (Iron Age 114. 1128—30. 1924.) OEHLER.

G. Bulle, *Wirkungsgrade im Betriebe des Siemens-Martin-Ofens*. Vf. unterscheidet zunächst einen metallurg. u. einen Ofenwirkungsgrad. Dieser setzt sich zusammen aus dem Wirkungsgrad des Arbeitsraumes, dem des Ofensystems, dem Wirkungsgradfaktor, dem Wirkungsgrad der Feuerung, gegebenenfalls noch dem Wirkungsgrad hinsichtlich der Betriebszeit u. der Ofenreise. Bei Generatorbetrieb ist auch der Gaserzeugerwirkungsgrad von Bedeutung, der sich aus dem Verflüchtigungswirkungsgrad u. dem Wirkungsgrad der Gaserzeugerwartung zusammensetzt. Aus all diesem ergibt sich der Ofenwirkungsgrad η . Es ist heutzutage beim Taillorverf. $\eta = 0,20$ — $0,30$, beim Roheisen-Erz-Verf. $\eta = 0,10$ — $0,20$, beim Talbot-

ofen $\eta = 0,02-0,05$. Trotzdem ist der Kohlenverbrauch in den 3 Fällen gleich. (Stahl u. Eisen **44**. 1324—30. 1924. Düsseldorf.) LÜDER

W. Hülsbruch, *Die Gasumsetzungen in den Regeneratoren der mit einem Gemisch aus Hochofen- und Koksofengas beheizten Siemens-Martin-Öfen*. Vf. legt Grund eingehender Verss. zahlenmäßig u. mittels beigelegter Kurven dar, daß beim Vorwärmen genannten Gasgemisches auftretenden Veränderungen (Erhöhung des H- u. CO-Gehaltes, Auftreten von freiem C usw.) von Temp., Erhitzungszeit, Konz. abhängig sind. Der bei einer Kammertemp. von $1000-1100^{\circ}$ erzielte Wärmegewinn ($15-18\%$) ist bei längerem Verweilen des Gases in der Kammer von einer Erhöhung der latenten Wärme begleitet. Der bei der Vorwärmung entstandene freie C wird z. T. wieder vergast. (Mitt. Versuchsanstalt Deutsch-Luxemburger Bergwerks- u. Hütten-A.-G. Dortmund **1**. 131—52. 1924. Sep.) OEHLER

Charles H. Fulton und **J. Burns Read**, *Ein neuer Röstofen für Zinkflotationskonzentrate*. Es werden detailliertere Angaben, insbesondere über das metallurg. Verh. u. die erhaltenen Resultate gegeben. Die Verss. führten zu dem Ergebnis, daß größere Öfen viel vorteilhafter arbeiten würden. Das zu den Verss. benutzte Material bestand aus $31,4\%$ S, $44,3\%$ Zn u. $11,6\%$ Fe als Durchschnitt u. wuchs bis zu 2% S — meistens als Sulfat — abgeröstet, während der Gehalt des Gases an SO_2 zwischen $3-7\%$ schwankte. (Trans. Amer. Inst. Mining and Metallurgy, Eng. **1924**. Nr. 1362. 22 Seiten. Missouri School of Mines and Metallurgy u. Mesquite Exploration Co., Denver [Colo.]) WILKE

Richard S. McCaffery, *Zusammensetzung von Hochofenschlacken*. Vf. legt in der Hand planebener Zeichnung u. eines räumlichen Modells die Zus. der Hochofenschlacke dar: 17 Verb. von SiO_2 , Al_2O_3 , CaO u. MgO unter sich plus noch 4 Endkomponenten jeder Hochofenschlacke: SiO_2 , Al_2O_3 , CaO u. MgO , zusammen 21 Konstituenten. Als unbedingt fehlerhaft wird die Zuzählung des chem. Äquivalents von MgO zu dem des CaO bezeichnet. Geringe Schwankungen in der Endzus. der Schlacke bewirken Auftreten großer Unterschiede in den Arbeitsergebnissen bei Verwendung der Schlacke im Hochofen. In einem größeren Modell ist die Zus. amerikan., engl., französ., deutscher u. schwed. Hochofenschlacke anschaulich; hierzu außerdem Tabellen. (Iron Age **114**. 1130—31. 1924. Madison [Wis.]) OEHLER

C. E. Ireland, *Schlackenziegel und andere Schlackenprodukte*. Die in besonderen Gruben zerkleinerte u. dann gesiebte Schlacke findet in größeren Stücken Verwendung bei Uferregulierungen, beim Hochstraßen-, Häuser- u. Brückenbau sowie bei Pflasterungen. Sie ist vorzüglich mörtelbindend. — Der durch Sieben durch das $\frac{1}{4}$ Zollsieb erhaltene Schlackensand wird auf Ziegel von ungewöhnlicher Härte u. bester Mörtelbindung verarbeitet (der Ausdehnungskoeffizient der Bestandteile dieser Ziegel u. des Mörtels ist prakt. der gleiche). (Iron Age **114**. 1179. 1924. Birmingham, [Ala.]) OEHLER

E. J. Lowry, *Abfall Eisen und -Stahl. — Metallurgische Phase*. Die Metallabfallindustrie wird der des Roheisens als ebenbürtig an die Seite gestellt. Beseitigung von Zeitersparnis, besserem Stahl in größerer Menge u. Kostenvermindern bei Verwendung von Altmetall. (Iron Age **114**, 1179—81. 1924. Chicago.) OEHLER

K. Daeves, *Der Einfluß der Korngröße auf die Verlustziffern von Dynamo- und Transformatorenblechen*. Vf. stellt den Einfluß der Korngröße in Transformatoren- u. Dynamoblechen auf den Wattverlust fest. Es ergibt sich eine lineare Abhängigkeit, indem mit zunehmender Korngröße senkrecht zu den Kraftlinien die Wärmeverlustziffern sinken. Andererseits scheinen parallel zu den Kraftlinien viele Korngrenzen einen günstigen Einfluß auf die Wattverlustziffer auszuüben, so daß bei günstiger Ausnützung ein Transformatorenblech möglichst lang gestreckt, aber flache Krystallite enthalten soll. Enthält das Blech mehr als $0,2\%$ Si, dann ist

die durch vorangegangene Kaltbearbeitung hervorgerufene Korngrößenänderung durch eine spätere Glühbehandlung nicht rückgängig machen. Von $-0,11\%$ C nimmt mit steigendem C-Gehalt die Verlustziffer linear zu, von $3,7$ bis $4,2\%$ Si linear ab. Bei höherem Si-Gehalt nimmt auch hier die Verlustziffer um P bewirkt zwischen $0,005$ — $0,02\%$ eine Verschlechterung oberhalb $0,02\%$ eine Verbesserung. Doch ist in diesem Fall die Abhängigkeit nicht linear. Mn ist zwischen $0,05$ u. $0,3\%$ ohne Einfluß. Für die Verlustziffern in Si-haltigen Blechen u. Walztemp. u. Walzdruck von größter Bedeutung. (Stahl u. Eisen **44**. 1283 [1286. 1924. Düsseldorf.)

BECKER-ROSE.

F. Schmitz, Über das chemische Verhalten von Eisen-Kohlenstoff-Legierungen im reinigten Stickstoffstrom bei 1100 bis 1300° . Vf. vertritt gegenüber OBERHOFFER u. HEGER (Stahl u. Eisen **43**. 1151. 1474; C. **1924**. I. 99. II. 235) die Ansicht, daß N bei Temp. von 1100 — 1300° gegenüber C u. Si im Stahl völlig neutral verhält. OBERHOFFER u. HEGER entgegen. (Stahl u. Eisen **44**. 1145—48. 1924. Düsseldorf.)

LÜDER.

James A. Barr, Die Fabrikation von Ferrophosphor bei Rockdale, Tenn. Amerikanischer Ferrophosphor hat folgende typ. Analyse: 18 — 22% P, 76 — 80% Fe, $0,2\%$ O, $0,1\%$ S, $0,1\%$ Si, $0,1\%$ C u. $0,2\%$ Mn. Eisenerz (Limonit aufgearbeitet mit 45% Fe, 5% SiO₂, 2% P), Phosphatgestein (etwa 76 — 78% Ca₃P₂O₈, $4,5\%$ SiO₂ u. 5% CaCO₃), Schwefelsäurezuschlag u. Koks werden unter Reduktionsbedingungen im Hochofen eingeschmolzen. Im ununterbrochenen Betriebe wird das Fe-P hergestellt. Die abfallende Schlacke enthält rund 44% SiO₂, 35% CaO, 5% FeO, 5% Al₂O₃, 1% P₂O₅ u. 1% S. (Trans. Amer. Inst. Mining and Metallurg. Eng. **1924**. Nr. 1380. Mt. Pleasant [Tenn.])

WILKE.

C. E. Mac Quigg, Einige Anwendungen von Hochchromeisenlegierungen im Maschinenbau. Vf. bespricht die wünschenswerten Eigenschaften von Legierungen, hohen Temp. u. starken Korrosionen ausgesetzt sind, im besonderen die eines Stahls mit 25 — 30% Cr, je 1% Si u. Mn u. einem C-Gehalt von $0,1$ — 3% , je nach den gewünschten Eigenschaften. Nach den Gußeigenschaften u. Bearbeitbarkeit wird besonders eingehend die Korrosionsbeständigkeit besprochen. Cr-Stahl mit 26 bis 28% Cr ist bei 1150° unbegrenzt gegen Oxydation beständig, CO greift erst über 1100° oder 1200° merklich an. Laboratoriumsverss. zeigen, daß bis zu 1000° S u. aggressive Gase ohne Einfluß sind. Dies u. die Festigkeitseigenschaften ermöglichen die Verwendung von Fe-Cr-Stahl unter entsprechender Änderung der prozentualen Zus. im ganzen Maschinenbau ein weites Anwendungsfeld. (Metal Ind. [London] **25**. 310. 332—34. 1924.)

WILKE.

Victor Truant, Eigenschaften französischer Roheisen. Es wird eine Zusammenfassung der Haupteigenschaften der beiden in Frankreich hergestellten Eisensorten: Phosphor-Guß- u. Schmiedeeisen, 2. Hämatit-Guß- u. Schmiedeeisen unter Berücksichtigung von Analysen geboten. Bei 1. findet noch Unterteilung statt in: Phosphorhartguß, Halb-Phosphorhartguß u. Phosphor-Schmiedeeisen. Bei letzterem wird eine Definierung der beiden Typen Grau- u. Weißeisen. Die Analysen geben den quantitativen Gehalt an Si, Mn, S, P, Graphit, gebundenem u. Gesamt-C an. Schließlich werden die Verwendungsarten für die einzelnen Eisensorten beschrieben. (Age **114**. 1243—44. 1924.)

OEHLER.

Eduard Maurer, Über ein Gußeisendiagramm. Vf. erläutert ein Diagramm, welches das Gefüge des Gußeisens festzustellen erlaubt, wenn die enthaltenen Mengen Si u. C bekannt sind. Die Koordinaten sind die Gehalte von Si u. C, die Diagrammfläche weist drei Gebiete auf, das Gebiet des weißen Gußeisens, das des ferrit. u. das des ferrit. Gußeisens. Es wird dann der Kruppsche Spezialguß, ein weiß. Gußeisen, besprochen, dessen Festigkeitseigenschaften sehr gut u. von der

Abkühlungsgeschwindigkeit weitestgehend unabhängig sind. (Gießereiztg. **21**. 45 bis 463. 1924. Essen.) LÜDER

Vulcan, *Die mechanischen Untersuchungen von Gußeisen*. Vf. bespricht die verschiedenen Methoden der Ermittlung der physikal. Eigenschaften, u. zwar Biege-Zug-, Härte-, Schlag- u. Druckfestigkeit u. das dazugehörige Schrifttum. (Meta Ind. [London] **25**. 307—9. 331—32. 1924.) WILKE.

George F. Comstock, *Kaltziehen von Eisendraht und die dabei gefundenen Eigenschaften*. Nachdem Vf. die Änderungen der physikal. Eigenschaften bei allmählich verstärktem Kaltziehen früher (Iron Age **114**. 621; C. **1924**. II. 2556) besprochen hat, hoffte er durch mkr. Unters. das seltsame Verh. der Drähte in bezu auf ihre Festigkeit ergründen zu können. Aber dies sowie das Studium der Korngröße bei den verschiedenen starken Rdd. gab keine Aufklärung. (Iron Age **114**. 705—7. 1924. Titanium Alloy Mfg. Co., Niagara Falls [N. Y.]) WILKE.

J. Kent Smith, *N im Stahl — Vorbeugung oder Abhilfe?* Es werden die Al-lasse besprochen, aus denen N sich im Stahl vorfinden kann (N-Gehalt des verwendeten Eisens oder Eintritt von N im Laufe der Fabrikation). Als Vorbeugungsmittel wird besonders Verwendung von Tieftemp.-Eisen empfohlen, während als Zusätze zur Entfernung von N aus Eisen u. Stahl B (ungeeignet), Ti, V u. Zr genannt werden. (Iron Age **114**. 1209—10. 1924.) OEHLER.

P. Eyermann, *Stähle bei den höchsten Arbeitstemperaturen*. Vf. gibt in Diagrammen die Reißfestigkeit u. Reißdehnung von Stählen mit W, Cr, Si, Cr-Ni-Zusätzen zwischen 500 u. 1200° wieder. Mit steigender Temp. nimmt die Reißfestigkeit u. die Elastizitätsgrenze ab, um sich in Nähe des F. Null zu nähern. Die Reißdehnung nimmt mit steigender Temp. bei allen Stählen zu, mit Ausnahme jener, welche 2% Si u. 1—3% Cr-Ni enthalten. Diese Stähle zeigen ein Minimum der Dehnung bei 1000°. Die Querschnittsverminderung an der Reißstelle hängt weitgehend von den Zusätzen ab. Allgemein nimmt sie bis etwa 700 oder 800° stark zu, um dann nur noch kleine Änderungen zu erfahren. Bei den Legierungsstählen tritt oberhalb von 1000° wieder eine Abnahme der Querkonstruktion ein, während sie bei gewöhnlichem Werkzeugsstahl nach geringer Abnahme weiter zunimmt. Dies ist für die Warmbearbeitung der Stähle von Wichtigkeit. (Iron Age **114**. 1270—73. 1924.) BECKER.

Georg Wazau, *Anlaßsprödigkeit in Stahl*. Drei typ. Brüche, die durch übereinanderlagerung von „Kaltbearbeitung“ entstanden sind, nämlich Schmiedestücke mit schwieriger Form u. dünnen Abmessungen, Gewindeschneiden mit unscharfen Schnitten, Stanzen u. Nietlöchern u. „Anlassen“ durch Feuerzinken, Anwärmen vor dem Teeranstrich, sowie Warmnietung, werden beschrieben. Die Anlaßsprödigkeit wird mit dem Fryschen Ätzmittel angezeigt. Übereinstimmung mit den Unters. FRYs ergab sich, daß die Frysche Erscheinung nicht verschwindet beim Erhitzen des Prüfstücks bis zu Wärmegraden, die der Werkstoff die Zähigkeit wieder zurückgeben. Beim Vorhandensein von Linien-scheren darf man deshalb nicht ohne weiteres auf Brüchigkeit schließen. Es konnte bestätigt werden, daß der Zug- u. Biegevers. meistens ohne Wert für Unters. von Bruchursachen in geschmiedeten u. gewalzten Stücken ist. Es ist ratsam, alle diejenigen Teile, die möglicherweise einer „Kaltbearbeitung“ ausgesetzt waren, sorgfältig auszuglühen, wenn sie nachher Erwärmungen im Gebiete der Blauwärme erleiden sollen (s. auch Schweißungen). (Ztschr. Ver. Dtsch. Ing. **69**. 1185—90. 1924. Kristiania.) WILKE.

F. Rapatz, *Der Einfluß der ledeburitischen Gefügebestandteile bei der Erzeugung und Behandlung von Dreh- und Schnittstählen*. Zu den ledeburit. Stählen gehören die C-Stähle mit über 1,7% C, die Schnellarbeitsstähle mit 0,5—0,9% C, 3—6% W, 10—20% W, die Cr-Stähle mit 1,4—2,5% C u. 4—14% Cr u. die Drehstähle mit

—1,5% C, 4–6% W u. etwas Cr u. V. — Vf. hat zunächst die Größe des Netzwerkes untersucht, u. hat festgestellt, daß das Netzwerk umso feiner ist, je mehr ledeburitbildende Bestandteile (C, Cr, W) vorhanden sind. — Die Prüfung der Härte verschiedener warm behandelter Stähle zeigte eine verringerte Härtefähigkeit bei Stählen, die mit Legierungsbestandteilen gewissermaßen überladen waren (z. B. 0,65% C, 5,20% Cr, 24,72% W, 1,97% Mo, 1,0% V, 2,29% Co). — Ferner wurde der Einfluß verschiedener Erstarrungsbedingungen untersucht u. eine sehr ungleiche Korngröße in den verschiedenen Teilen eines in einer Kokille gegossenen Blockes festgestellt. Im Innern des Blockes erfolgt die Abkühlung normalerweise zu langsam, um ein feines Netzwerk entstehen zu lassen. — Beim Schmieden von Blöcken größerer Querschnitte ist es schwierig, eine gleichmäßige Verteilung des Carbides zu erhalten. — Die Korngröße ledeburit. Stähle wird beim Erhitzen bis 1150° gar nicht, bei höherer Temp. nur wenig geändert. Der F. des ledeburits im Cr-Stahl liegt zwischen 1150 u. 1160°, im W-Stahl zwischen 1200 u. 1300°. (Stahl u. Eisen **44**. 1133–38. 1924. Düsseldorf.) LÜDER.

A. E. Kennelly, *Der reziproke Wert der Permeabilität des kürzlich entdeckten Legierstahles, Permalloy*. Vf. sucht die Werte von ARNOLD u. ELMEN über ihre wunderbare Legierung (Journ. Franklin Inst. **195**. 621; C. **1924**. I. 1261) weiter zu interpretieren u. kommt zu dem Schluß, daß bis zur magnet. Kraft $H = 4$ Permalloy der allgemeinen Regel magnet. Stähle in bezug auf den reziproken Wert der Permeabilität gehorcht. (Journ. Franklin Inst. **197**. 623–27. 1924.) WILKE.

Torajirō Ishiwara, *Die Wirkung der Verunreinigungen auf die Dendritenstruktur in Kohlenstoffstählen und ihre Diffusion bei hohen Temperaturen*. Schnelles Abkühlen im Erstarrungsintervall begünstigt die B. von Dendriten im Stahl. Der C im Stahl beeinflußt diese Krystallisation sehr wenig. Von den 3 Elementen Mn, Si u. P ist die Wrkg. des P am deutlichsten, während die des Mn am schwächsten ist. Die Wrkg. des Si liegt zwischen der des Mn u. P. Die minimalsten Anteile dieser Elemente, die das Fe noch dendrit. machen, stimmen beinahe mit den maximalen Beträgen dieser Elemente überein, die für gewöhnlich im üblichen Stahl vorhanden sind. Die Diffusion von C im Fe ist bei hohen Temp. sehr schnell. Mn beschleunigt diesen Vorgang, während Si u. P ihn verzögern. Dies ist auch Grund für die Graphitb. in Gußeisen, das Si-haltig ist. Die Diffusion von Mn u. P ist unter 1400° sehr langsam, um sich darüber ganz bedeutend bemerkbar zu machen. Die dendrit. Struktur im gewöhnlichen Stahl verliert sich durch Erhitzen auf Temp. von 100–200° unter der Liquiduslinie, im Falle von reinem C-Stahl gelingt dies schon durch 3-std. Erhitzen auf 1100–1200°. Die Ggw. von Mn, P u. Cu macht das 6-std. auf 1000° erwärmte Fe bei der Makroätzung auf einer Cu-Lsg. (Stead) elektronegat. S positiv, während die Wrkg. des Si innerhalb des untersuchten Gehaltes nicht regelmäßig ist. Die Diffusionsgeschwindigkeit des C im Fe wächst mit zunehmender Temp. sehr schnell. Folgende Formel gilt für den Bereich von 950 u. 1300°: $v = e^{c(t-t')}$, wobei v die Diffusionsgeschwindigkeit, t die Temp. in °C u. t' u. c 2 Konstanten sind. Vf. gibt eine plausible Erklärung für die umgekehrte Verteilung des C in den Dendriten. (The science reports of the Tōhoku imp. univ. **12**. 309–32. 1924.) WILKE.

Kōtarō Honda, *Kohlenstoff- und Spannungswirkungen auf die spezifische Wärme von Kohlenstoffstählen*. (The science reports of the Tōhoku imp. univ. **12**. 347–58. 1924. — C. **1924**. I. 588.) WILKE.

N. A. Aall, *Weichmachen eines martensitischen Nickelstahls*. Das martensit. Gefüge eines Ni-Stahl 0,63% C u. 13,7% Ni) läßt sich durch Anlassen bei 300° leicht in ein osmondit. leicht bearbeitbares Gefüge umwandeln. Enthält der Stahl Martensit, dann muß dieser erst in Martensit durch Tempern bei etwa 600° u. dann

durch abermaliges Erhitzen auf 300° in Osmondit umgewandelt werden. Denn 300° tritt noch keine Austenit-Martensitumwandlung ein, während diese Temp. optimale Umwandlungstemp. Martensit-Osmondit ist. Der osmondit. Stahl besitzt eine Brinellhärte von etwa 330 u. ist leicht zu sägen u. zu bohren. Die Abkühlungsgeschwindigkeit ist auf die Härte des Osmondits ohne Einfluß. (Stahl Eisen **44**. 1080—81. 1924. Aachen.)

BECKER-ROSE

W. H. Hatfield, *Korrosionsbeständiger Chromstahl*. Besonders die Stähle 12—16% Cr wurden eingehender untersucht. Wenn man von der Korrosionsbeständigkeit eines Stahles oder einer Legierung gegenüber Säuren o. dgl. spricht, so müssen Konz., Temp. u. allgemeine Versuchsbedingungen näher angegeben werden, z. B. wurden zwei gleiche Stücke korrosionsbeständigen Stahles 10% H₂SO₄ ausgesetzt, das eine war neu hergerichtet u. poliert, während das andere vorher 24 Std. HNO₃, D. 1,20, ausgesetzt war. Trotzdem die Oberfläche des letzten Stückes vollkommen gereinigt war, unterschied es sich im Verh. von dem anderen; es blieb mehrere Std. passiv, während das nur polierte Stück einige Std. nicht reagierte, um dann eine Gasentwicklung zu zeigen. Bekannt ist auch, daß korrosionsbeständiger Stahl, der lange in Benutzung ist, deutlich einem neu in Betrieb genommenen überlegen ist. In den Korrosionsverss. des Vfs. wurde besonders nochmals metallurg. gereinigter Cr-Stahl benutzt, damit die Reproduzierbarkeit der Verss. durch Einschlüsse nicht illusor. wird. In einer großen Tabelle sind die angreifenden u. die nicht angreifenden Lsgg., Dämpfe, Schmelzen u. zusammengestellt. Dabei zeigte sich auch, daß die übliche Methode des Verdampfens von einem Tropfen Essig keine einwandfreien Resultate gibt, da der handelsübliche Essig verschiedene Konz. hatte u. sogar manchmal nur verd. Essigsäure war, die den Stahl dann — im Vergleich zum Essig — stark angriff. (Chrom Metallurg. Engineering **31**. 544—46. 1924. Brown Firth Lab., Sheffield.)

WILLIAMS

W. Jenge und **H. Buchholz**, *Der Einfluß der Wärmebehandlung auf magnetischen Eigenschaften von Chromstahl*. Es werden Glühen u. Härten an Chromstahl u. der Einfluß dieser Behandlung auf magnet. Eigenschaften u. Gefüge besprochen. (Mitt. Versuchsanstalt Deutsch-Luxemburg. Bergwerks- u. Hütten-Abt. Dortmund **1**. 152—60. 1924. Sep.)

OEHLER

J. B. Johnson und **S. A. Christiansen**, *Material für Ventile, die hohen Temperaturen ausgesetzt sind*. Die Ergebnisse von Verss. im Laboratorium u. mit 1- u. mehr Zylindermaschinen, die für den Flugzeugbau benutzt werden, ergaben, daß kein Material allen Anforderungen genügt. Hoch-Ni-Cr-Stahl, Monelmetall, 14% Cr-Stahl u. W-Stahl kommen überhaupt nicht in Betracht, nur ein Co-Cr- u. ein Si-Cr-Stahl innerhalb geringer Schwankungen in der Zus. näherte sich am meisten den zu stellenden Anforderungen. (Metal Ind. [London] **25**. 358. 1924.)

Frank L. Estep, *Die Herstellung von Walzzinn in Indien*. Vf. schildert die Richtung u. Einrichtung eines Zinnwalzwerks in Indien (besondere hygien. Maßnahmen, Maschinen, Heiß- u. Kaltwalzverff., Herst. von Öl- u. Petroleumkannen usw. aus Sn). (Iron Age **114**. 1122—28. 1197—98. 1261. 1924.)

OEHLER

A. Juliá Sauri, *Das Aluminium und seine Anwendungen in der chemischen Industrie*. In der Kompilation sind wertvolle Zusammenstellungen von Aluminiumloten u. von Analysen von Handels-Al. Die verschiedenen Arten der Einw. in Säuren, Salzen u. Basen auf Al werden zusammengestellt u. Schutzmaßregeln angegeben. (Quimica e Industria **1**. 193—99. 1924.)

W. A. ROT

Blair Burwell, *Pachuca: Die Heimat des Patioverfahrens*. Pachuca, eine der ältesten Bergbaudistrikte Mexikos, produziert mehr Ag als jeder andere Distrikt der Welt. Es wird eine eingehende Beschreibung des Gebietes u. der Metallgewinnung gegeben. (Engin. Mining Journ.-Press **118**. 725—30. 1924. Pachuca, Hidalgo, Mexiko.)

WILKINSON

C. W. Davis, *Wiedergewinnungsmethoden von Platin, Iridium, Palladium, Gold und Silber aus Juwelierrückständen*. Das Bureau of Mines der Vereinigten Staaten hat 20 verschiedene Analysengänge, die für sich allein oder auch kombiniert angewandt werden, je nach der Zus. des aufzuarbeitenden Materials, ausgearbeitet. Es gibt 3 Klassen Legierungen: 1. Die wertvollen Metalle sind alle, frei oder legiert, in jedem Verhältnis vorhanden mit Ausnahme, daß — wenn eine Legierung vorliegt, die eine oder mehrere Metalle Pb, Ir, Pa enthält — sie frei von Au, Ag und beträchtlichen Mengen Cu u. Zn sein muß oder umgekehrt. Zn oder Sn darf nicht vorhanden sein. In der 2. Gruppe sind die Legierungen, die nur bestimmte Metalle in einer Tabelle zu entnehmende Metalle frei oder legiert in jedem Verhältnis enthalten. Für die 3. Gruppe trifft dasselbe zu mit der Ausnahme, daß bei einer Ag-Legierung, das Verhältnis Ag zu Au 3 u. mehr zu 1 sein muß oder die Menge des Ag muß klein sein. Betreffs der zahlreichen Methoden muß auf die Literatur verwiesen werden. (Metal Ind. [London] 25. 396—97. 423—25. 426. 1924. Bureau of Mines.) **WILKE.**

—, *Ist Osmium giftig?* Hinsweis auf die Giftigkeit des OsO_4 u. auf die Notwendigkeit von Vorsichtsmaßregeln (Abzüge, Gesichts-, Atem- u. Handschutz) bei der Os-Verarbeitung. (Chem. Metallurg. Engineering 31. 743. 1924.) **BECKER-R.**

Isamu Igarasi, *Das Altern von geschreckten Legierungen*. Da Alterungserscheinungen in Legierungen nur auftreten 1. bei Metallen, die eine Transformation oder ein Eutektoid besitzen u. von höheren Temp. abgeschreckt werden oder der Transformation usw. entsprechen u. 2. bei den Legierungen, deren einer Bestandteil mit steigender Temp. schnell löslicher in einem zweiten wird, so versuchte diese Erscheinungen mit einem besonders gebauten Differential-Dilatometer an der Ausdehnung der Legierungen zu verfolgen. Fe mit 0,9% C (bei 701, 730, 795 u. 855° geschreckt), Al-Zn-Legierungen 25, 45, 75, 81% (Tempp. zwischen 240 u. 400°), Al-Cu-Legierungen, Al-Mg-Legierungen, Duralamine u. Al-Cu-Mg-Legierungen wurden untersucht u. die Alterungserscheinung an der Veränderung der Länge gemessen. (The science reports of the Tôhoku imp. univ. 12. 333—45. 1924.) **WILKE.**

Francis W. Rowe, *Der Einfluß der Gußtemperatur und -masse auf Marine-Ni-Metall*. Die Angaben sind ein Auszug aus vielen typ. Ergebnissen der Versuche, um die vielen widersprechenden Angaben des Schrifttums über diese Legierung richtig zu stellen. Bei 1200°, 1150° u. 1100° wurde Probestücke von 30 cm Länge u. einem Querschnitt $1,2 \times 1,2$, $2,5 \times 2,5$ u. 5×5 cm gegossen. Die Analyse ergab 87,54% Cu, 10,16% Sn, 0,28% Pb, 0,03% Fe, 1,88% Zn u. wenig Ni u. Sb. Die Verss. zeigten, daß die Probestücke mit dem geringsten Querschnitt u. der niedrigsten Gußtemp. die besten Eigenschaften hatten. Dabei wiesen bemerkenswerterweise die 5 cm breiten Stücke einen größeren Härteunterschied zwischen außen u. innen auf. (Metal Ind. [London] 25. 299. 303. 1924.) **WILKE.**

Tomojiro Tanabe, *Das Aluminium-Zinksystem*. Das Diagramm wurde auf Grund von elektr. Widerstands- u. therm. Ausdehnungsmessungen zusammengestellt. Stimmt im allgemeinen mit dem von HANSON u. GAYLOR überein. Die Natur der Transformation bei 270° wurde in Übereinstimmung mit HANSON als eutektoid festgestellt. Sie reicht von 0,5 bis rund 75% Al. Das Altern wurde hauptsächlich dilatometrisch untersucht u. stimmt bis auf einige Fälle ebenfalls mit HANSON u. GAYLOR überein. Es wurde gefunden, daß alle Legierungen mit eutektoider Zus. bei 270° eine plötzliche Härteänderung hatten. Die mechan. Eigenschaften der Legierungen bis zu 24% Zn wurden systemat. untersucht. Unter 18% Zn werden die Eigenschaften durch Schrecken nicht verbessert. (Metal Ind. [London] 25. 330. 1924.) **WILKE.**

Oliver Smalley, *Die Herstellung hochwertiger Aluminium und Bronzepulver*. Anschluß an die Geschichte der Herst. dieser Pulver (Metal Ind. [London] 24.

273; C. 1924. I. 2816) wird die Auswahl der Rohmaterialien, ihre Behandlung Vorbereitung u. die Herst. des Al-Pulvers ganz besonders eingehend behandelt. Schwierig ist das Färben des Al-Pulvers, was an besonderen Beispielen erläutert wird. Über die Beständigkeit des gefärbten Pulvers läßt sich allgemein nur sagen, daß sie je nach der Verwendung verschieden sein kann. Besonders wenn es Ersatz für Cu- oder Bronze pulver benutzt werden soll, muß das gefärbte Al-Pulver den üblichen Anforderungen der teuren Pulver ebenfalls genügen. (Metal Ind. [London] 24. 297—98. 493—94. 569—70. 25. 169—70. 369—71. 1924.) WILK.

Francis W. Rowe, *Die Wirkung der Gußtemperatur und der Wärmebehandlung auf eine hohe Zinnbronze*. Die untersuchte Legierung hatte 84,0% Cu, 15,9 Sn u. 0,05% P u. ist eine Bronze mit dem höchsten Sn-Gehalt, die im Maschinenbau benutzt wird. Diese Legierung widersteht auch einer bestimmten Korrosion. Da bisweilen ohne ersichtliche Gründe schlechteres Material gewonnen wurde, erfolgten eingehende Verss. Die größte Härte erhielt man bei der niedrigsten Gußtemp., aber bei sehr niedrigen Tempp. (etwa 1050°) entsteht eine Legierung schlechten physikal. Eigenschaften, da die α -Primärkrystalle bei diesen Tempp. einem Netz von δ -Krystallen umgeben sind. In vorliegendem Falle ist 1130—1150° die beste Gußtemp. Eine Wärmebehandlung verschafft keinen Vorteil. (Metal Ind. [London] 25. 304—6. 1924.) WILK.

Moneo, *Die Herstellung von Manganbronzegußstücken*. I. Ein 50,8 kg hydriertes Gußstück. II. Ein Dampfkessel. Es werden an Hand von Zeichnungen Einzelheiten der Herst. gegeben. (Metal Ind. [London] 25. 377—78. 419—20. 1924.) WILK.

Richard Mailänder, *Über den Einfluß der Belastungsdauer auf die Kallendruckhärte*. Es wurde ein Verf. ausgearbeitet, das gestattet, an einem einzigen Eindruck die Änderung der Eindrucktiefe in bestimmten Zeitabständen mit Hilfe der bekannten Spiegelapparate von MARTENS zu messen, ohne den Druck zu unterbrechen. Läßt man einen Fehler von 3% gegenüber der mit 5 Min. gemessenen Härte zu, so reicht für Flußeisen u. Stahl eine Belastungsdauer von 10 Sek. aus. Für Weicheisen sind 20 Sek., für Metalle, wie Zn, 2—3 Min. erforderlich, wobei zu beachten ist, daß diese Metalle auch nach 5 Min. den Beharrungszustand noch nicht erreicht haben. Das untersuchte Cu zeigte einen sehr geringen Einfluß der Belastungsdauer. (Kruppsche Monatshefte 5. 209—13. 1924.) WILK.

—, *Ein verbesserter Skleroskopapparat*. Die Shore Instrument & Manufacturing Co., VAN WYK Ave., Jamaica [N. Y.] hat einen verbesserten Apparat auf den Markt gebracht, der so mit der Luftzuführung, die von einem Motor betrieben wird, verbunden ist, daß der Hammer nicht ein zweites Mal auf das Metall fällt (scab also der Hammer geschont wird) u. automat. angezogen wird u. wieder fällt. Es ist möglich, in kurzer Zeit eine große Metallfläche einwandfrei zu prüfen. (Can. Metallurg. Engineering 31. 549—50. 1924.) WILK.

Ad. Fry, *Optische Temperaturmessung in der Praxis*. Nach einer kurzen Besprechung der opt. Temperaturmessungen werden die in der Arbeit gewonnenen Berichtigungswerte für einige im Eisenhüttenbetrieb häufig vorkommende Meßaufgaben in einem Kurvenblatt dargestellt. Sie geben die Berichtigungen für Messungen im dunklen Raum an. Auf Grund der Beobachtung, daß fl. Oxyd- oder Schlackenhäutchen auf geschmolzenem Metall sowie die in Gießstrahlen erscheinenden Spiegelungstreifen prakt. wie ein opt. schwarzer Körper strahlen, wird vorgeschlagen, für die opt. Temperaturmessung fl. Stahls die Strahlung der heißen Stellen, Oxyd- oder Schlackenhäutchen bezw. Spiegelungstreifen mit in Betracht zu ziehen. Es sind für die im Hüttenbetrieb häufigsten Meßaufgaben Richtlinien für die prakt. Ausführung der opt. Temperaturmessungen angegeben. Es wird angegeben, bei allen opt. Temperaturmessungen die Art ihrer Ausführung u. Be-

aufs genaueste anzugeben, damit vergleichbare Werte erhalten werden. (Umschau 28. 193—201. Stahl u. Eisen 44. 1398—1405. 1924.) WILKE.
Paul Oberhoffer und Mia Toussaint, *Über ein Verfahren zur Entwicklung artmannschen Linien (Kraftwirkungslinien)*. Um auf einer deformierten Fe-Fließlinien sichtbar zu machen, wurde diese $\frac{1}{2}$ Stde. auf 200° angelassen, geschliffen u. gegenüber einer Kathode auf Fe-, Cu- oder Ni-Blech unter Anwendung eines Akkumulators oder durch bloßes Kurzschließen elektrolyt. geätzt. Elektrolyt diente z. B. eine Lsg. von 300 g FeCl₃, 10 cem HCl in 3000 cem W. 10% Lsgg. lieferten den gleich guten Erfolg, HNO₃ u. H₂SO₄ waren unbrauchbar. Die Ätzung dauerte bei Anwendung eines 4 Volt-Akkumulators u. 3 Amp./qdm Stromdichte normalerweise $\frac{1}{2}$ Stde. Nach Unterbrechung der Elektrolyse ist die auf dem Schliff befindliche Schicht mit einem weichen Nadeln abzuwischen u. gegebenenfalls noch mit etwas Schmirgelpapier zu befeuchten. (Stahl u. Eisen 44. 1330—32. 1924. Aachen.) LÜDER.

Errel, Funken. Hinweis auf die photograph. Unters. von Funken, welche beim Schleifen von verschiedenen Stahlsorten auftreten. Mittels einer besonderen Vorrichtung, welche das Schleifen der Stähle in einer CO₂- oder O₂-Atmosphäre gestattet, werden die Funken, welche für jeden Stahl charakter. Bilder zeigen, aufgenommen. (Umschau 28. 914—16. 1924.) BECKER-ROSE.

Cleaner, *Moderne Reinigungsmethoden für Metalle*. Beschreibung der neuesten Maschinen u. Apparate, die sich in Amerika sehr gut bewährt haben. (Ind. [New York] 22. 402—4. 1924.) WILKE.

Carl Pardun, *Über die wissenschaftlichen Grundlagen des Schleudergusses*. Zunächst eine Entwicklungsgeschichte des Schleudergusses. — Die Gattierung soll man am besten so, daß z. B. bei der Rohrerzeugung eine eutekt. Legierung entsteht. Auch andere Zus. sind brauchbar, jedoch ändert sich der F. u. die Schmelztemp. — Beim Schleudern erfolgt bei der großen Abkühlungsgeschwindigkeit eine günstige Graphitbildung, obendrein eine Entmischung der Gefügeanteile in Feise, daß die Festigkeitsvermindernden Stoffe — Sulfide u. überteutischer Art — auf der Innenoberfläche von Hohlkörpern angereichert werden. Infolgedessen sind die mechan. Eigenschaften des Schleudergusses, insbesondere Biege- u. Zugfestigkeit, wesentlich besser als die vom Sandguß. — Kurzes Glühen der Gußstücke übt durch Ausgleich der inneren Spannungen einen günstigen Einfluß aus. (Stahl u. Eisen 44. 905—11. 1044—48. 1200—1208. 1924. Gelsenkirchen.) LÜDER.
Eine neue Glühvorrichtung für Bandeisen. Kurze Beschreibung mit erläuterten Zeichnungen des von H. A. FISHER entworfenen Ofens. (Iron Age 114. 1924.) WILKE.

Spengler, *Zur Frage des Lötens von Aluminium*. Bemerkungen zu den Angaben ROSTOKSKYS (Ztschr. f. angew. Ch. 37. 754; C. 1924. II. 2295). (Ztschr. f. angew. Ch. 37. 918—19. 1924. Dessau.) JUNG.

Heinz Bablik, *Die Höhe der Zinkaufnahme beim Feuerverzinken*. Vf. untersucht den Einfluß der Tauchdauer, der Temp. des Zn-Bades, der chem. Zus. des Bades, der Stärke des Bleches u. der Art des zu verzinkenden Fe auf die Zn-Aufnahme beim Feuerverzinken. Die Zn-Aufnahme an Fe-Blechen war desto größer, je länger die Tauchdauer war. Die optimale Temp. beträgt 420—450°. Oberhalb 450° ist die Aschen- u. Hartzinkbildung schon zu groß. Bei Blechen unterhalb 0,5 mm Dicke u. Eintauchzeiten von 30 Sek. ist die Blechstärke ohne Einfluß. Die chem. Zus. des Zn-Bades betrug 98,9% Zn, 0,99% Pb, 0,06% Fe. Ein höherer Fe-Gehalt wirkt ungünstig. Al-haltige Bäder zeichnen sich durch eine große Löslichkeit aus. (0,63% Al.) Bleche mit viel Schlacken lassen sich nicht verzinken. Besonders niedrige Zn-Aufnahme zeigen FeSi-haltige Bleche. (Stahl u. Eisen 44. 1370—71. 1924. Brunn a. G., Nied.-Österr.) BECKER-ROSE.

Sherard Cowper-Coles, *Das Elektroverzinken von Blechen*. Um mit der Verzinkung in Wettbewerb treten zu können, muß die Zn-Abscheidung glänzend sein, so daß keine Nachbehandlung notwendig ist; es muß möglich sein, das bei hoher Stromdichte u. geringer Spannung niederzuschlagen; es darf kein Fe vom elektr. Kontakt mit den Stücken zurückbleiben; gleichmäßig guter Kontakt muß für jedes Stück verbürgt u. die Herst. automat. u. fortlaufend sein. 1. Punkte alle zu erfüllen ist sehr schwer. Es werden nun die App. beschrieben, die diesem Ziele am nächsten kommen, der von LANGBEIN u. die App. des Vf. (Ind. [London] 25. 393—94. 1924.) WILE.

Sherard Cowper-Coles, *Apparate für Elektroverzinkung kleiner Artikel*. Hauptschwierigkeiten liegen in der geringen Wirksamkeit in der hohen Spannung. Es werden die verschiedenen App. besprochen u. ihre Eignung untersucht. (Ind. [London] 25. 345—48. 1924.) WILE.

St. Reiner, *Vergleichende Korrosionsversuche mit spritzverzinkten und feuerverzinkten Eisenplatten*. Vf. weist die Überlegenheit der Spritzverzinkung gegenüber der Feuerverzinkung nach: große Widerstandsfähigkeit gegen die Einwirkung von Wasserdampf bei wechselnden Tempp. Reinigung der zu verzinkenden Gegenstände mittels Sandstrahlgebläses unerlässlich. (Mitt. Versuchsanstalt Deutsch-Luxemburg. Bergwerks- u. Hütten-A.-G. Dortmund 1. 166—69. 1924. Sep.) OEEB.

Robert J. Anderson und **George M. Enos**, *Korrosionsbeständige Legierungen zum Gebrauch in Grubenwasser*. Die Zus. des Grubenwassers der Kohlengruben wird besprochen u. hervorgehoben, daß der Gehalt an freier H_2SO_4 fast allein die starke Korrosion bewirkt. Die H_2SO_4 kann in den einzelnen Gruben u. Bezugsstellen sehr schwanken, innerhalb einer Spur u. 18000 Teile pro Million. Das Grubenwasser zu neutralisieren ist vollkommen unmöglich. Es wird eine Zusammenfassung aller Versuche des U. S. Bureau of Mines, die während der letzten 7 Jahre in Gruben sowie im Laboratorium ausgeführt wurden, gegeben. Die üblichen Handelssorten von Fe u. Stahl werden sehr schnell angegriffen. Von 45 verschiedenen Metallen u. Legierungen waren nur 5 beständig: nämlich hoch Cr-haltiger Stahl (29,5% Cr, 0,27% Mn, 0,36% C, 0,53% Si), 2 Cr-Ni-Si-Stähle (23,87% Ni, 12,96% Cr, 3,40% Si u. 29,60% Ni, 10,73% Cr, 3,26% Si), hoch Si-haltiges Mangan-eisen (13,8% Si, 0,76% C) u. eine Ni-Cr-Fe-Legierung. Die Mikrostruktur verschiedener Materialien nach der Korrosion wurde untersucht u. besprochen. Die Ergebnisse von beschleunigten elektrolyt. Korrosionen zeigten roh dieselbe Art der Gewichtsverluste wie die über längere Zeit in Grubenwasser ausgeführten Vers. Auf Grund all dieser Verss. ist eine Liste von in Grubenwasser beständigen Metallen aufgestellt u. ihre Anwendbarkeit als Konstruktionsmaterial der Grubeneinrichtung angegeben worden. Zum Schluß besprechen Vf. die heutzutage wichtigsten Korrosionsprobleme, die in den Kohlengruben noch zu lösen sind. (Proceedings of the American Society for Testing Materials 24. II. 14 Seiten. 1924. U. S. Bureau of Mines, Pittsburgh, Pa. u. Univ. Cincinnati. Sep.) WILE.

Robert J. Anderson und **George M. Enos**, *Ein beschleunigtes elektrolytisches Korrosionsverfahren*. Zuerst wurde versucht, durch Einblasen von O in die Elektrolytensfl. (Grubenwasser) die Korrosion zu beschleunigen. Die Gewichtsverluste waren aber nicht höher als die, die durch übliche Eintauchverf. in langen Zeiträumen erhalten wurden. Darauf wurden die bis jetzt empfohlenen elektrolyt. Verf. untersucht u. eine besondere Methode ausgearbeitet. Ein entsprechendes Stück des Metalles oder der Legierung, die untersucht werden soll, rotiert als Anode der Korrosionsfl. Kathode ist ein Pd-Draht. Die Stromdichte beträgt 0,18 Amp. den qm der Anodenoberfläche. Mit Grubenwasser als Elektrolyten u. gewöhnlicher Inz. als Anode wurde nach 8 Stdn. ein genügend großer Gewichtsverlust erreicht. Durch Verss. an einer großen Zahl von Metallen zeigte sich, daß das elektrolyt.

10 Mal schneller verläuft als der Vers. ohne Beschleunigung. (Proceedings of the American Society of Testing Materials 24. II. 20 Seiten. 1924. U. S. Bureau of Mines, Pittsburgh, Pa. u. Univ. Cincinnati. Sep.)

J. R. Evans, *Die Einwirkung von Salzlösungen auf Eisen und Stahl in Gegenwart von Sauerstoff*. Der Einfluß von W., Lsgg. von KCl , K_2SO_4 , KNO_3 , $ZnSO_4$, Na_3PO_4 , $K_3Fe(CN)_6$ u. $K_2Cr_2O_7$ in Tropfenform auf Eisen u. Stahl wird untersucht. Die Einw. beruht in den meisten Fällen auf elektrochem. Wrkg. an dem Zentrum des Tropfens, an das der Luftsauerstoff nicht vordringen kann u. das positiv elektr. wird, u. der Peripherie des Tropfens, die dem Luftsauerstoff ausgesetzt ist u. die negativ elektr. wird. Angegriffen wird für gewöhnlich das Material unter dem Zentrum des Tropfens, während es unter der Peripherie bleibt. Die Geschwindigkeit des Angriffs hängt davon ab, ob die anod. oder kat. entstehenden Prodd. l. oder unl. sind. Bei reinem W. bildet sich an der Anode $Fe(OH)_2$, das l. ist u. sich nach dem Rande hin ausbreitet u. dort oxydiert zu $Fe(OH)_3$. Da dieses fast unl. ist, bildet es einen braunen Ring an der Peripherie des Tropfens, bis zu dem Sauerstoff in die Fl. diffundieren kann. Schließlich breitet es sich aus u. überzieht den ganzen Tropfen mit einer Membran. KCl , K_2SO_4 u. KNO_3 bildet l. Prodd. an Anode u. Kathode u. beschleunigt daher die Geschwindigkeit der Korrosion. $ZnSO_4$ bildet an der Anode unl. Prodd. an der Kathode dagegen ein unl. Prod. u. verhindert so an der Peripherie das Eindringen des Luftsauerstoffs. Dadurch wird das Maß der Einw. herabgesetzt. Na_3PO_4 u. $K_3Fe(CN)_6$ bilden an der Kathode ein l., an der Anode dagegen unl. Prod. Dieser unl. Stoff setzt sich auf dem Eisen fest u. verhindert so teilweise zerstörende Einw. $K_2Cr_2O_7$ verursacht Passivität des Eisens auch an der Kathode, zu denen Sauerstoff nicht gelangen kann; das Eisen wird daher überhaupt nicht angegriffen. (Journ. Soc. Chem. Ind. 43. T. 315—22. 1924.) **GOTTFR.**

William Henry Dyson, Nr. Guildford, und **Leslie Aitchinson**, Birmingham, *Chlorierv Verfahren*. (D. R. P. 404527 Kl. 40a vom 6/10. 1921, ausg. 27/10. 1923. Priorr. 28/10. 1920 u. 27/7. 1921. — C. 1922. IV. 151. 633.) **KÜHLING.**

Electro Metallurgical Company, New York, *Unschädlichmachung eines die Schwefelgrenze überschreitenden Schwefelgehalts im Stahl*. (D. R. P. 404001 Kl. 18b vom 6. 1923, ausg. 10/10. 1924. A. Prior. 11/8. 1922. — C. 1924. I. 104.) **KÜHLING.**

Mersch, Kupfer- und Messingwerke, Akt.-Ges., Berlin, *Aluminothermische Erzeugung von Aluminium*. (D. R. P. 405444 Kl. 40a vom 30/9. 1921, ausg. 31/10. 1924. — C. 1924. I. 1864.)

Richard Tindall Leighton Hove, und **Friedrich Demel**, Twickenham, Eng., *Elektrolytische Herstellung von Blattgold*. (D. R. P. 404895 Kl. 48a vom 10. 1923, ausg. 28/10. 1924. E. Prior. 26/10. 1922. — C. 1924. II. 402.) **KÜHLING.**

British Ulco Company, Ltd., London, *Hartbleilegierung*, welche im wesentlichen aus Pb u. einer kleinen Menge (weniger als 2%) metall. Ca zusammengesetzt ist u. ein Sb u. Sn enthält. An Stelle von Ca kann auch Ba verwendet werden. (D. R. P. 8504 u. 8505 vom 14/2. 1920, ausg. 15/3. 1923. A. Priorr. 26/7. u. 13/8. 1920.)

OECKER.

IX. Organische Präparate.

H. Killeffer, *Die Synthese von Phenol. Sulfonierung im Dampfungszustande*. Beschreibung u. Abbildung einer nach dem Verf. von **TYRER** (A. P. 1210725) arbeitenden Anlage zur Herst. von Phenol. (Ind. and Engin. Chem. 16. 1924. New York.)

HABERLAND.

Holf Plaueln, Offenbach a. M., *Herstellung von Bleiacetaten aus metall. Pb*

durch Luft in Ggw. von $\text{CH}_3\text{CO}_2\text{H}$ oder neutraler essigsaurer Pb-Lsg., dad. daß beim Einblasen der Luft mit einem Düsenkegel die Lösefl. in einem Kreis durch das Pb ausschließlich vertikal nach oben u. durch einen Zwischenraum zwischen dem schmalen turmartigen Reaktionsgefäß u. dem konzentriert darin geordneten Pb-Behälter nach unten geführt wird. — Das Verf. ermöglicht schnelle u. vollständige Umwandlung des metall. Pb, ohne Anwendung von Druck u. unter Vermeidung des lebensgefährlichen Einhackens der Pb-MM. Menschenhand. Selbst schwer oxydierbares Sb-haltiges Roh-, sowie Alblei sich mit gleicher Schnelligkeit, wie das bisher benutzte doppelt gereinigte Wblei verarbeiten. (**D. R. P. 402791** Kl. 12o vom 31/10. 1923, ausg. 23/9. 1924.) SCHOTTLÄND.

E. Merck (Erfinder: **Otto Wolfes** und **Justus Petersen**), Darmstadt, Herstellung von *Wismutkakodylat*, dad. gek., daß man *Kakodylsäure* auf Bi_2O_3 , $\text{Bi}(\text{OH})_3$ oder kakodylsaurer Salze auf Bi-Salze einwirken läßt. — Beispiele sind gegeben für die Herst. des Salzes aus Kakodylsäure u. $\text{Bi}(\text{OH})_3$, sowie aus Kakodylat u. Bi-Sulfat. Das in W. unzersetzt II. *Wismutkakodylat* bildet aus W. krystallisiert farblose, Krystallwasser enthaltende Prismen oder Nadeln. (**D. 403054** Kl. 12o vom 8/7. 1923, ausg. 22/9. 1924.) SCHOTTLÄND.

Camille Deguide, Enghien, Frankr., Herstellung von *Bariumcyanid*. (**D. 405066** Kl. 12k vom 7/11. 1923, ausg. 25/10. 1924. F. Prior. 13/12. 1922. 1924. II. 2367.) KÜHLER.

Herman A. Metz, übert. von: **Alfred E. Sherndal**, New York, V. S. A., Herstellung von komplexen Silberalkaliverbindungen des *Diaminodioxyarsenobenzols*. Alkal. Lsgg. des 3,3'-Diamino-4,4'-dioxyarsenobenzols werden mit frisch gefälltem Ag_2O behandelt. — Man trägt z. B. in eine wss. Lsg. des Dinatriumsalzes des *aminodioxyarsenobenzols* allmählich unter gutem Rühren Ag_2O ein, das durch Zugabe von wss. NaOH zu einer wss. AgNO_3 -Lsg. bis zur schwach alkal. Reaktion Lackmus u. Auswaschen des Nd. mit W. vom NaNO_3 bereitet wurde, wobei Ag_2O unter B. einer dunkelbraunen Lsg. gel. wird. Man rührt noch einige Minuten, filtriert die Lsg. u. gießt sie in A., Ä. oder ein Gemisch aus A. u. Ä., wobei die *Ag-Na-Verb.* des 3,3'-Diamino-4,4'-dioxyarsenobenzols in braunen Flocken ausfällt, die mit A. u. Ä. gewaschen u. im Vakuum getrocknet werden. Das ca. 13% As u. 24% Ag enthaltende, in W. u. physiolog. NaCl-Lsg. unl. Prod. findet zu therapeutischen Injektionen therapeut. Verwendung. Die wss. Lsg. hat schwach alkal. Reaktion u. ist frei von giftigen anorgan. Salzen. (**A. P. 1446216** vom 23/4. 1921, ausf. 20/2. 1923. **Can. P. 235166** vom 8/3. 1923, ausg. 23/10. 1923.) SCHOTTLÄND.

Chemische Fabrik von Heyden A.-G. (Erfinder: **Richard Feibelmann**), Radebeul-Dresden, Herstellung von *N-Methylolverbindungen aromatischer Sulfonamide*, dad. gek., daß man *Formaldehyd* bei Ggw. alkal. Kondensationsmittel in sehr verdünnter wss. Lsg. auf aromat. Sulfonamide einwirken läßt. — Geeignete alkal. Kondensationsmittel sind Na_2CO_3 , K_2CO_3 oder NaCN . Z. B. läßt man bei ca. 70° beigemischte von K_2CO_3 eine 0,5%ig. wss. CH_2O -Lsg. auf *p-Toluolsulfonamid* einwirken. Die anfängs klare Lsg. trübt sich bald, wird milchig, u. beim Erkalten krystallisiert das *N-Methylol-p-toluolsulfamid*, aus; Nadeln, F. 137°, gibt beim Erwärmen in konz. H_2SO_4 eine tief kirschrote Färbung, spaltet beim Erhitzen CH_2O ab, entscheidet beim Lösen in Alkali. — Das in analoger Weise erhaltliche *N-Methylolbenzolsulfamid*, F. 125°, gibt mit konz. H_2SO_4 nicht die ausgesprochene Färbung wie das Toluolderiv., dem es in den übrigen Eigenschaften gleicht. Die therapeut. Verwendung findenden Prodd. verharzen beim Erhitzen auf höhere Temp. (**D. 403718** Kl. 12o vom 18/5. 1922, ausg. 3/10. 1924.) SCHOTTLÄND.

Chemische Fabrik von Heyden A.-G. (Erfinder: **Curt Philipp**), Radebeul-Dresden, Herstellung von trockenen, haltbaren Mischungen von Salzen stickstoffhaltiger aromatischer Sulfonamide, dad. gek., daß man diese Salze in feinsten

sind mit solchen wasserfreien Salzen organ. oder anorgan. Säuren vermischt, die mit Krystallwasser krystallisieren. — Man vermischt z. B. rohes *Toluol* mit *Chloramidnatrium* mit 40 bezw. 35% W. bei gewöhnlicher Temp. im Kneten in einer Kugelmühle mit Na_2CO_3 (Ammoniaksoda) bezw. wasserfreiem Natrium und erhält ein vollkommen trockenes, staubfreies, auch beim Lagern nicht zu anbackendes weißes Pulver. Die Prodd. finden als *Bleichmittel* techn. Verwendung. (D. R. P. 402983 Kl. 12o vom 31/5. 1922, ausg. 19/9. 1924.) SCHOTTLÄNDER.

Gesellschaft für Chemische Industrie in Basel, Basel (Schweiz), *Arylamide* *Orymnaphthalin-4-carbonsäure*. Zu den Ref. nach Schwz. P. 99280; C. 1923. 19 u. Schwz. PP. 100363. 100364. 100365 [Zus. Patt.]; C. 1924. I, 2011 ist zu tragen, daß die Arylamide im Gegensatz zu der freien 1-Oxy-naphthalin-4-carbonsäure mit Diazoverbb. in glatter Weise unter B. von *o*-Oxyazofarbstoffen reagieren, während die freie Säure hierbei die CO_2H -Gruppe abspaltet. (D. R. P. 402983 Kl. 12o vom 15/2. 1922, ausg. 31/10. 1924.) SCHOTTLÄNDER.

X. Farben; Färberei; Druckerei.

Carl Reinking, *Über die Kenntnis des Indigos und der Küpenfärberei im Altertum*. Geschichtliche Angaben nach VITRUV (13 v. Chr.), DIOSCORIDES u. PLINUS dem Älteren (23—79 n. Chr.) (MELLIANDS Textilber. 5. 733—34. 1924.) SÜVERN.

Ernst Conrad Lang, *Zur Theorie der Färbung*. Bei dem sehr komplizierten Färbeprozess sind außer der Oberflächenenergie noch elektr. u. chem. Kräfte wirksam. Die Adsorptionstheorie von GEORGIEVICS (Chem.-Ztg. 38. 445; C. 1914. I. 1788) erklärt die ganzen Vorgänge am besten. Elektr. Ladungen können eine große Rolle spielen, sie können sogar manchmal dafür ausschlaggebend sein, ob eine Adsorption stattfinden kann oder nicht. (MELLIANDS Textilber. 5. 732—33. 1924.) SÜVERN.

Ernst Eduard Herzinger, *Das Appretieren und Färben der baumwollenen Engländer und Tuche*. Das Färben mit substantiven u. S-Farbstoffen, sowie das Vorappretieren in den einzelnen Stufen ist beschrieben. (Ztschr. f. ges. Textiltech. 485—86. 1924.) SÜVERN.

Holland Ellis, *Das Färben von Acetylseide. Das Verfahren des kolloidalen Färbens*. (Chem. Trade Journ. 75. 395—97. — C. 1924. II. 2205.) SÜVERN.

Walter Wagner, *Über Aquarell- und Temperafarben. Ein Kapitel angewandter Chemie*. Nach Erörterungen über Korngröße, Dispersität u. Entmischen werden die an gute Aquarell- u. Temperafarben zu stellenden Anforderungen besprochen. Für die Pigmente ist Isodispersität im Rahmen des prakt. Möglichen u. die beste Elektrolytfreiheit zu fordern. Für Wasserfarben wären kolloidale Farbstoffe zu bevorzugen, aber echt l. ganz, grob suspensioide nach Möglichkeit auszuwählen. Isodispersität von Mischfarbenkomponenten ist hier besonders wichtig. Gelb. in den Tuben hat man sich durch die Oberflächenspannung vermittelnde Zusätze (Ochsengalle, Monopol- u. Türkischrotölpräparate) oder alkal. Mittel zu schützen. Für Tempera- oder Emulsionsfarben wäre kolloide Lsg. notwendig, mit Rücksicht auf die Gefahr des Durchschlagens u. Abblätterns. Einmal erwünscht, doch kann bei Farben, die in dieser Hinsicht einwandfrei die Grenze überschritten werden. Haltbarkeit in der Tube hängt in erster Linie von den verwendeten Emulsionen ab. Grobdisperse Farben sind nach Möglichkeit auszuschließen. Für Aquarellfarben sind Teerfarben als durchweg geeignet, vielfach auch kolloid l. besonders geeignet. Zu bevorzugen sind solche, die weder von Natur wasser- u. spritunl. oder dies durch Verlacken geworden sind. Auch für Emulsionsfarben dürfen Teerfarbstoffe, die prakt. nicht durchweg, nicht außer acht gelassen werden, sie können für neue selbständige Bedeutung sein. Sie dürfen aber nur solange als dringend erforderlich

gerieben werden. Auf Abblättern u. Durchschlagen ist besonders zu prüfen. Zu prüfen ist auch, ob nicht öl- u. leimfreie Gründe diese Gefahr beseitigen. Kollende Emulsionsfarben haften auf mit Celluloseester grundiertem Material sehr. Liegt bei Ölfarben ein Bedürfnis nach Einführung bestimmter Teerfarben, deren Dispersität hinderlich ist, so könnte man sie auf ein grobes Substrat, z. B. Spat, fällen oder sie damit kollern. Möglicherweise läßt sich durch leim- u. ölfreie Grundierung die Hauptgefahr für die Verwendung feindisperser Pigmente überwinden. (Chem.-Ztg. 48. 793—95. 814—16. 1924.) SÜVER

Friedrich Huth, *Schutzanstriche für Beton*. Erfahrungen mit solchen Anstrichen (Siderosthen, Lubrose, Inertol u. a.). Mißerfolge an einer Stelle dürfen nicht verallgemeinert werden, da die örtlichen Verhältnisse berücksichtigt werden müssen. Weiter werden die zerstörenden Einw. des Öls auf Beton u. die Schutzmaßnahmen (Schutzanstrich Lithurin entsprechend den Keßlerschen Fluan, Margalit) dagegen besprochen. (Brennereiztg. 41. 176. 1924.) RÜHL

P. Heermann, *Über die Einwirkung der ultravioletten Strahlen auf Farbstoff- und Faserstoffsysteme*. Unter Mitarbeit von **H. Sommer**. Es wurde geprüft, inwiefern das Sonnenlicht bei der prakt. Licht- u. We'rechtheitsprüfung durch das Licht der Hg-Dampflampe ersetzt werden kann. Es ergab sich, daß in dem U-I-Strahl bisher ein vollwertiger Ersatz für das Tages- oder Sonnenlicht nicht zu sehen ist. Die in vielen Fällen wohl auftretende Übereinstimmung reicht für exakte wissenschaftl. Verss., wie sie die Farbenfabriken bei Einführung neuer Farbstoffe ausführen, nicht aus. Zudem verhalten sich die Farbstoffsysteme auf Wolle anders als auf pflanzl. Faserstoffen, sie zeigen eine größere Widerstandsfähigkeit gegen U-Strahlen als z. B. Baumwollfärbungen. Zur schnellen Orientierung, ob eine bessere oder minderwertige Färbung vorliegt, kann die U-Belichtung dienen, verlässlich sind ihre Ergebnisse aber nicht. Ferner wurde geprüft, wie sich feine Garne aus den verschiedenen Faserstoffen, Kammzug u. Jutefaserbündel im U-I-Strahl verhalten. Baumwolle ist sehr empfindlich, weniger Flachs, Jute ist fast so lichtempfindlich wie Baumwolle, Glanzstoff ist fast so widerstandsfähig wie Flachs. Nitro- u. Viscoseseide immer noch lichtfester als Baumwolle u. Jute. Rohwolle zeigt annähernd die gleiche Lichtempfindlichkeit wie Baumwolle u. Jute, chromte Wolle eine bessere. Seide ist die lichtempfindlichste Faser, die mineral. erschwerte ist nur wenig lichtempfindlicher. Die für Monopolschwarz vorerschwerte Seide ist ebenso lichtempfindlich wie die Couleureerschwerung. Durch die Blauholzgelb- oder -färbung wird sie aber völlig umgewandelt, ihre absol. Festigkeit u. Dehnbarkeit steigt erheblich an, ihre Lichtwiderstandsfähigkeit wächst um Hunderte von %. In dem Blauholz scheint ein idealer Acceptor für die schädlichen Strahlen vorzuliegen. (Chem.-Ztg. 48. 813—14. 834—35; Melliands Textilber. 5. 745-49. 1924.) SÜVER

Arthur Hammer, Berlin, *Bleichen von Waschgut mit Ozon*. Man leitet während des Waschens stark verd. Ozon, z. B. ozonisierte Luft in das Waschwasser. (Holz 3116 vom 11/12. 1920, Ausz. veröff. 16/4. 1923. D. Prior. 14/7. 1919.) FRAN

Jean Marius Champin, Rhône, Frankreich, *Färben von Samt im Stück*. Das Stück wird über Walzen, die mit Flanell überzogen sind, geführt, die untere Walze taucht in ein Gefäß, das die Farbflotte enthält; zum Färben verwendet man eine Lsg. eines Farbstoffes in einem Gemisch von Bzn. u. Terpentinöl; nach dem Färben wird der Samt noch feucht gebürstet u. getrocknet. (F. P. 557 671 vom 21/10. 1922, ausg. 13/8. 1923.) FRAN

Établissement Pinatel et Chapuis, Loire, Frankreich, *Appretieren von elastischen Geweben und Bändern*. Man bringt die Appreturmasse mit Hilfe von Walzen an

ewebe u. führt es dann zum Trocknen spiralförmig über eine von innen heiz-
trockenwalze. (F. P. 558472 vom 7/11. 1922, ausg. 28/8. 1923.) FRANZ.

XV. Gärungsgewerbe.

Pasinetti, *Die alkoholische Vergärung der Datteln*. Zus. der Datteln: W. Asche 2,1, Eiweiß 2,2, Fette 0,7, Cellulose 3,2, N-freie Substanzen 75%,
er reduzierende Zucker 51,6, Saccharose 1,25, Pentosane 4,4%. Aus Datteln
tellter sterilisierter Most hatte 22% Trockensubstanz, 0,5% Asche, 18,5%
l., vergor nach Zusatz von Keimen von der Datteloberfläche bei 30° kräftig
e. B. von Gas. Die im vergorenen Most gefundenen Hefen u. Bakterien werden
leben. Bei Verss. mit daraus gewonnenen Reinkulturen wurde keine besonders
B Ausbeute an A. erreicht, mit anderen, bekannten Arten 11–13%. Neben
stehen wein-, bier- u. essigähnliche Prodd. (Boll. dell' Ist. sieroterap. Milanese
(–79; Ber. ges. Physiol. 27. 446. 1924. Ref. SELIGMANN.) SPIEGEL.

Charles Schweizer, *Die Industrien der Hefe*. Übersicht über neuere Literatur.
e und Industrie 12. 623–37. 1924.) A. R. F. HESSE.

Hönig, *Schalenfilter in der Prefhefefabrikation*. Vf. empfiehlt die Verwendung
halenfilter, die bereits in der Bierbrauerei u. in der Wein- u. Likörindustrie
ndet werden, u. bespricht deren Herrichtung u. Wirksamkeit. (Brennereiztg.
4. 1924.) RÜHLE.

Ehrich, *Über die Reinheit des Malzes*. Während des Weltkrieges u. in
chriegsjahren ist die Reinigung der Braugerste ganz vernachlässigt worden
Malz sehr unrein (zahlreiche halbe mit Schimmel befallene Körner u. a.) in
rkehr gekommen. Man sollte vom Braumalze jetzt wieder Reinheit, saubere
g u. Sortierung verlangen. (Allg. Brauer- u. Hopfenztg. 64. 1089. 1924.
s.) RÜHLE.

Roos und E. Hugues, *Das Senföl in der Weinbehandlung*. An Stelle von
ird Senföl als Frischhaltungsmittel empfohlen, da es in geringen Mengen
Weinkrankheiten stark wirksam, unschädlich u. leicht wieder zu beseitigen
erner verrät sich eine übermäßige Menge ($> 1,5$ mg/l) im Geschmack. (Ann.
lsifications 17. 413–24. 1924. L'Hérault, Station Oenologique.) GROSZFELD.

Mumme, *Die Bedeutung der Limonadenherstellung für den Brauereibetrieb*.
erst von Fruchtlimonade als Nebenbetrieb in den Brauereien wird erörtert
fohlen. Die Imprägnierung mit CO₂ geschieht am besten k. (Allg. Brauer-
fenztg. 64. 1125–26. 1924.) GROSZFELD.

Javillier, *Die Nucleinsäure der Hefe und ihre Prüfung*. Zusammenstellung
ter Tatsachen über die Konst. der Nucleinsäuren u. besonders der Hefe-
säure, die jetzt neben einigen ihrer Salze von verschiedenen Fabriken für
zweck. Zwecke hergestellt wird. Man kann für sie die Formel C₃₈H₄₉O₂₉N₁₅P₄
len, für das neutrale Na-Salz C₃₈H₄₅O₂₉N₁₅P₄Na₄. Für Prüfung der Handels-
ate, die zunächst bei 100–105° zu trocknen sind, empfiehlt Vf. außer der
lung der physikal. Eigenschaften besonders Best. von P, N u. Verhältnis
das 59,08:100 sein muß, beim Na-Salz auch die Menge Veraschungsprod.
). Vorteilhaft ist Ergänzung dieser Werte durch Best. des Purin-N u. seines
nisses zum Gesamt-N. Unter einer Anzahl untersuchter Handelspräparate
ch ein gefälschtes, bei dem zwar der P-Gehalt annähernd richtig war, N
st völlig fehlte. Es soll ferner stets auf Abwesenheit von Eiweiß (Biuretrk.)
kogen (Jodrk.) geprüft werden. (Bull. Sciences Pharmacol. 31. 506–13.
). 1924. Paris, Fac. des Sciences; Inst. des Recherches agronom.) SPIEGEL.
Charles Schweizer, *Die Frage des Bierhefennachweises in Prefhefe*. An Stelle
chiedenen vorgeschlagenen, aber wenig sicheren Verff. wurde mit Erfolg
t, auf Weichharz- α des Hopfens zu prüfen (Grünfärbung mit CuSO₄-Lsg.).

Die Rk. war selbst nach 10-maliger Behandlung von Bierhefe mit $(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3$ noch positiv. Zu diesem Nachweis behandelt man 1 g Preßhefe mit 2 ccm CH_2Br_2 , filtriert u. fügt einen Tropfen gesätt. CuSO_4 -Lsg. zu; Vergleichsvers. mit reiner Preßhefe. Noch 20% Bierhefe in Preßhefe waren so eben nachzuweisen. (Lebensmittelunters. u. Hyg. **15**. 211—16. 1924. Bern, Eidg. Gesundheitsamt.) GROSZFEI.

Marc Bridel, Anwendung des biochemischen Verfahrens der Charakterisierung von Glucose zum Nachweis der Maltase im Malz. (Bull. Soc. Chim. Biol. **6**. 705. 1924. — C. 1924. II. 251.) SPIEGEL.

L. Roos, Die chemische Bestimmung des Alkohols. Die Rk.: $2\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7 + 8\text{H}_2\text{SO}_4 + 3\text{C}_2\text{H}_5\text{OH} = 3\text{CH}_3\cdot\text{COOH} + 2\text{Cr}_2(\text{SO}_4)_3 + 2\text{K}_2\text{SO}_4 + 11\text{H}_2\text{O}$ verläuft unvollständig unter B. von Aldehyd. (Ann. des Falsifications **17**. 410. 1924. L'Hérault, Station Oenologique.) GROSZFEI.

B. G. Hartmann, Bericht über die Genauigkeitsgrenze bei der Bestimmung kleiner Alkoholmengen in Bieren. Die auf D. u. Brechungswert beruhenden Verff. scheitern an ausreichender Genauigkeit. Vorgeschlagen wird zur Erhöhung der Genauigkeit von 100 auf 50 ccm zu dest. (Journ. Assoc. Official Agricult. Chemists **7**. 133. 1923. Chicago, U. S. Food and Drug Inspection Station.) GROSZFEI.

P. Balavoine, Eine Farbenreaktion des Apfelweines. (Mitt. Lebensmittelunters. u. Hyg. **15**. 216—18. 1924. Genf, Lab. cantonal. — C. 1924. II. 2432.) GROSZFEI.

W. C. Geagley, Bericht über Weinessige. Die Best. von Glycerin, Trochinsäure, Glycerinsäure u. nichtflüchtigen Säuren scheint Vf. für weitere Verss. weniger wichtig als die Best. von A., Zucker, Polarisierung u. Färbung, sowie ferner die physikalische Prüfung, die zu einer amtlich vorgeschriebenen Methode gemacht werden soll. (Journ. Assoc. Official Agricult. Chemists **7**. 134—35. 1923. Lansing [Mich.], Department of Agriculture.) GROSZFEI.

Zellstoffabrik Waldhof und Otto Lührs, Mannheim-Waldhof, Gärbockbau einbau zur Beförderung der Gärung, bestehend aus einem oder mehreren übereinanderliegenden, in beliebiger Richtung schräg ansteigenden Böden, gek. durch einen oder mehrere über dem Einbau angeordnete, mit entsprechenden schräggerichteten Prallflächen versehene Flüssigkeitsverteiler, welche eine gleichmäßige Zirkulation der gärenden Fl. bewirken. — Es wird ein leichtes Entweichen des CO_2 ermöglicht. (D. R. P. 402 087 Kl. 6b vom 29/11. 1921, ausg. 13/9. 1924.) OELKE.

Franz X. Hartmann, Bad Pyrmont, Beseitigung des Schaumes bei gärenden und kochenden Flüssigkeiten, insbesondere bei Würzen der Lufthefefabrikation durch Absaugen des Schaumes u. Verwendung von Prallflächen, dad. gek., daß der Schaum schon während des Absaugens durch Entlangführen an gegenübergestellten Flächen zerteilt u. dabei in Fl. übergeführt wird. — Es wird ein wirkungsvolleres Niederschlagen des Schaumes als bisher ermöglicht u. zwecks geringerem Kraftverbrauch. (D. R. P. 402 085 Kl. 6a vom 9/7. 1922, ausg. 13/9. 1924.) OELKE.

Kymmene Aktiebolag, Kuusankoski, Finland, Preßhefe, welche durch Gären von Sulfitablauge unter Verwendung von Torula- oder Oidiumhefen hergestellt wird. (N. P. 38584 vom 11/11. 1919, ausg. 17/12. 1923.) OELKE.

U. S. Industrial Alcohol Co., West Virginia, übert. von: **A. A. Backlund**, Baltimore Maryland, Absoluter Alkohol. Man setzt dem wasserhaltigen A. z. Bzl. zu u. dest., wobei der eine Teil des Destillats eine sich gleichbleibende Mischung der 3 Komponenten enthält. während der andere Teil aus A. u. Bzl. besteht, der durch Dest. getrennt werden. (A. P. 1508435 vom 5/4. 1921, ausg. 13/9. 1924.) OELKE.

XVI. Nahrungsmittel; Genußmittel; Futtermittel.

J. G. Archibald, *Die Einwirkung von Natriumhydroxyd auf Zusammensetzung, Verdaulichkeit und Futterwert von Getreidehülsen und anderem faserigen Material*. Verdaulichkeit u. Futterwert von Getreidehülsen zu vergrößern, unterwirft Vf. Hülsen von Hafer, Gerste, Reis, Baumwollsamens u. Flachsschäben der Einw. NaOH-Lsgg. (1—3%) nach dem Verf. von E. BECKMANN. Bei einer Konz. von 5, waren Verdaulichkeit u. Futterwert von Hafer, Gerste- u. Reishülsen bemerkens- erhöht; bei Baumwollsamens u. Flachs negative Resultate. (Journ. Agricult. Research **27**. 245—65. 1924. U. S. Dep. of Agric.)

TRÉNEL.

W. C. Taber und **M. L. Offutt**, *Neue Analysen von Kakaobohnen und deren Be- st.* 30 Proben reiner Bohnen mit im Mittel: 53,77% Fett, 7,50% Asche, 3,84% in W. unl., 0,157% in Säure unl., 7,21% Rohfaser. Entsprechende W. für 6 Proben Schalen: 5,79, 15,36, 10,21, 4,52, 17,88. (Journ. Assoc. Official Agricult. Chemists **7**. 147—50. 1923. Philadelphia, U. S. Food and Drug Inspect. Washington, Bureau of Chem.)

GROSZFELD.

Nicolas L. Cosmovici, *Werden die Eiweißstoffe der Milch im Laufe der Lab- gerinnung gespalten?* (Vgl. C. r. soc. de biologie **91**. 649; C. **1924**. II. 2301.) Hier hat die Umwandlung des Caseins in Paracasein durch Lab daraus ge- lassen, daß Oxalatmilch nicht durch Lab, wohl aber durch Kochen nach Einw. selber gerinnt. Vf. zeigen, daß zur Zeit, wo die Kochgerinnung eintritt, keine Senkung der Oberflächenspannung besteht. Diese vermindert sich erst allmählich, wenn man die mit Lab versetzte Oxalatmilch längere Zeit bebrütet, u. sie ist dann umso weniger verändert, je mehr Oxalat zugegen ist. Die dadurch angezeigte Senkung ist also eine sekundäre Erscheinung. Sie tritt auch im Serum von durch Labgeronnener Milch auf, stärker, wenn ihr noch Casein zugefügt wird. Wird das Serum einer durch Lab zum Gerinnen gebrachten Oxalatmilch gekocht, so tritt dann auch in 24 Stdn. die Erniedrigung der Oberflächenspannung aus, sie ist also einem im Lab vorhandenen proteolyt. Ferment zuzuschreiben. Die Verss. bestätigen die Ansicht von DUCLAUX, daß die Labgerinnung ein Phänomen ledig- lich physikal. Molekularadhäsion ist. Das Paracasein ist danach nichts anderes als Casein, das, wenn ihm (in der Oxalatmilch) die nötige Menge Ca fehlt, nicht durch Lab gerinnt. (C. r. soc. de biologie **91**. 885—88. 1924. École des Hautes Études.)

SPIEGEL.

A. Wright und **B. H. Shaw**, *Untersuchung über gemeinschaftliches Ein- wirken von Sudangras mit einer Leguminose*. Nach den Ergebnissen dieser Unterss. kann durch gemeinschaftliches Einsäuern von Pflanzen mit hohem Proteingehalt (Bohnen oder Kuhbohnen) mit kohlenstoffhydratreichem Heu (Sudangras) keine wesentlichen Vorteile erzielt. (Journ. Agricult. Research **28**. 255—59. 1924. U. S. A. Dep. of Agric.)

BERJU.

H. Bailey, *Bericht über Nahrungsmittel aus Getreide*. Empfohlen werden als Futterbest. in Backwaren aus Getreide das Verf. von C. R. SMITH (Journ. Assoc. Official Agricult. Chemists **6**. 61) als amtliches Verf., ferner zur Cl-Best. in ge- wöhnlichem Mehle das Verf. von O. S. RASK (Journ. Assoc. Official Agricult. Chemists **6**. 61). Es empfiehlt sich aber, über Verf. zur Cl-Best. in gebleichten Mehlen weitere Verss. anzustellen. (Journ. Assoc. Official Agricult. Chemists **7**. 129—33. 1924. St. Paul [Minn.], Agricult. Experim. Station.)

GROSZFELD.

J. Wichmann, *Bericht über Pektinbestimmung in Früchten und Frucht- saften*. Pektin erwies sich in 80—90%ig. A. als swl. (<10 mg/220 ccm). Es kann bei reinem Pektin unsichtbar bleiben, flockt aber durch Elektrolyte. Das Verf. von CARRÉ-HAYNES (Biochemical Journ. **16**. 60; C. **1922**. IV. 615) liefert nur dann richtige Werte, wenn der Nd. von Ca-Pektat sorgfältig ausgewaschen

wird, die Beseitigung des CaCl_2 aus dem kolloiden Nd. ist schwierig; bestimmten Mengen Zucker, Weinsäure, Citronensäure, H_3PO_4 wirken bei den Versuchsbedingungen nicht erhöhend auf das Ergebnis. Ca-Pektat u. Pektinsäure nach WICHMANN CHERNOFF sind in der Zus. verschieden. Manches spricht dafür, daß Ca-Pe ein Gemisch ist, es kann durch sd. verd. HCl in Pektinsäure umgesetzt werden. Wenn kein Gemisch, ist es eine Zwischenstufe zwischen Pektin u. Pektinsäure. (Journ. Assoc. Official Agricult. Chemists 7. 107—12. 1923. Denver, Food and Drug Inspection Station.) GROSZFEI

R. W. Hiltz, Bericht über Wasserbestimmung in getrockneten Früchten. Grund von an 15 verschiedenen Stellen ausgeführten Verss. wird für alle Früchte Trocknung von 5—10 g Substanz im Vakuum (<100 mm Hg) in Schalen von 8,5 cm Durchmesser, 12 Std. bei 70° , bei Durchleitung von etwas wasserfreier (d. h. H_2SO_4) Luft empfohlen. Bei Rosinen rühre man 5 g Substanz mit 2 g feinverteilter Asbest an u. trockne zuerst auf h. W. vor. — Nur bei getrockneten Äpfeln 4-std. Trocknung im Dampftrockenschrank empfohlen. (Journ. Assoc. Official Agricult. Chemists 7. 112—18. San Francisco, U. S. Food and Drug Inspection Station, U. S. Appraiser's Building.) GROSZFEI

Arthur E. Paul, Bericht über Gewürze und andere Würzmittel. In einem Senf anrichtemittel aus Baumwollsaatöl, Peanußöl, Olivenöl, Weinessig, Senf, Zucker, Salz, Eidottern, Borsäure wurden von 4 verschiedenen Untersuchern unabhängig voneinander die berechneten Bestandteile, wie W., Zucker, Säure, Ölmenge, Lecithin, P_2O_5 , in befriedigender Menge wiedergefunden u. die Art der Öle qualitativ nachgewiesen. — Angabe einer entfettenden Vorbehandlung von Senf mit A. — Zweck des Best. der Rohfaser. (Journ. Assoc. Official Agricult. Chemists 7. 138—14. 1923. Chicago, U. S. Food and Drug Inspection Station, Transportation Building.) GROSZFEI

Raymond Hertwig und **J. I. Palmore**, Zusammensetzung von Senfkleien. Handelsmittel mit besonderer Berücksichtigung des Nachweises von zugesetzter Senfsubstanz in zubereitetem Senf. An Schwankungen für 43 Senfsamen (bzw. 19 Kleien) wurde ermittelt (auf wasser- u. fettfreie Substanz) für N 6,42—8,35 (2,70—5,92), Rohfaser 7,20—11,10 (14,1—29,2), P_2O_5 2,28—4,40 (0,40—2,42), CaO 0,734—1,734 (0,86 bis 1,910), MgO 0,616—1,326 (0,266—0,792), N : Rohfaser = 0,56—1,00 (0,09—0,42), P_2O_5 : Rohfaser = 0,28—0,49 (0,01—0,17), MgO : Rohfaser = 0,07—0,16 (0,01—0,06), CaO : Rohfaser = 0,79—1,71 (1,2—7,2), F = CaO $\times$ Rohfaser : ($\text{P}_2\text{O}_5 \times \text{N}$) = 0,26—0,78 (1,0 bis 52,3), F : MgO = 0,21—0,88 (1,6—196,6). Mittels dieser Zahlen lassen sich Zusätze von Senfkleien nachweisen. (Journ. Assoc. Official Agricult. Chemists 7. 170—73. 1923. Washington, Food Control Laboratory, Bureau of Chemistry.) GROSZFEI

R. E. Andrew, Bericht über Tee. Zur Best. des Coffeins wird das Verf. von BAILEY-ANDREW, das mit dem Verf. von POWER-CHESNUT übereinstimmende Verfahren lieferte, empfohlen, zur Best. des Wasserextraktes das folgende: 2 g in 500 ccm Kolben mit 200 ccm W. 1 Stde. unter Rückkühlung sd., abkühlen, auffüllen, mischen, 50 ccm verdampfen, bei 100° 1 Stde. trocknen. (Journ. Assoc. Official Agricult. Chemists 7. 154—58. 1923. New Haven [Conn], Agricultural Experiment Station.) GROSZFEI

V. A. Pease, Bericht über die Bestimmung von Kakaoschalen in Kakaoprodukten. Der Bericht zeigt, daß in der letzten Zeit besondere Verbesserungen in den üblichen Verff. nicht gemacht worden sind. Vergleichende Bestst. nach 4 in Amerika üblichen Zählverff., deren Ergebnisse nur unerheblich voneinander abwichen. (Journ. Assoc. Official Agricult. Chemists 7. 141—46. 1923. Washington, Bureau of Chemistry.) GROSZFEI

Walter F. Baughman, Bericht über Verfahren zur Prüfung von Kakaobutter. Auf Grund von Verss. mit künstlichen Fettgemischen durch 7 verschiedenen Bearbeiter wird zum Nachweise einer Verfälschung mit Cocos-, Palmkern-, Baumall- oder Samenöl u. Stearin, Maisöl, Peanußöl usw. die Best. der krit. Lösungstemp. ab-

ANTA, zum Nachweise von Talg, gehärteten Ölen u. Paraffin die Best. der Löslichkeit in Aceton + CCl_4 nach BLOOMBERG empfohlen. (Journ. Assoc. Official Agricult. Chemists 7. 150—54. 1923. Washington, Bureau of Chemistry.) GROSZF.

Jh. Arragon, *Nachweis und mikrochemische Bestimmung der Samenbestandteile von Schalen in den Kakaosorten*. Gefordert wird Kakao u. Schokolade mit mehr als 5% Schalen in der fettfreien Trockenmasse im Handel zu verbieten. Nachweis der Schalen durch Behandeln von 5 g entfettetem Kakao mit 10 ccm Antiformin, anschließender mkr. Prüfung. Vergleich mit Kakao mit 5% Schalengehalt. — Schokolade, nach Entfernung des Zuckers ähnliches Verf. (Mitt. Lebensmittelunters. u. Hyg. 15. 219—21. 1924. Lausanne.) GROSZSFELD.

Jh. Arragon, *Fehlerquellen in der Beurteilung der Backpulver*. Die zu entweichende CO_2 -Menge wird statt auf 1 kg Mehl besser auf 100 g des Backpulvers bezogen. Abänderungsvorschlag für das Schweiz. Lebensmittelbuch. (Mitt. Lebensmittelunters. u. Hyg. 15. 221—23. 1924. Lausanne.) GROSZSFELD.

Vilhelm Müller, *Fettbestimmung in Würsten nach dem acid-butyrometrischen Verfahren*. Vf. erhielt nach dem bei Käse üblichen van Gulik'schen Verf. brauchbare Werte. Notwendig war aber die Fleischmasse nach Hacken in der Mühle (mit Lochdurchmesser) noch im Mörser zu zerreiben. Genaue Arbeitsvorschrift original. (Mitt. Lebensmittelunters. u. Hyg. 15. 208—11. 1924. Bern, Eidg. Gesundheitsamt.) GROSZSFELD.

O. Dahlberg, *Vergleichende Prüfung der Röse-Gottlieb u. Babcock-Verfahren zur Fettbestimmung*. Angabe einer Abänderung des RÖSE-GOTTLIEB-Verf., die praktische Werte liefert. Ausführung: Die abgewogenen Mengen Substanz in Mojonnier-Skollen genau wie beim Originalverf. behandeln, dann aber zentrifugieren im Röhrig'schen App. stehen zu lassen. Von diesen Ergebnissen wichen die BABCOCK ab im Mittel bei Milch $-0,09$ (0 bis $-0,12$), Rahm $+0,13$ ($-0,22$ bis $+0,50$), Magermilch $-0,075$ ($-0,035$ bis $-0,10$), Buttermilch $-0,348$ ($-0,20$ bis $-0,50$). (Journ. Assoc. Official Agricult. Chemists 7. 159—69. 1923. San Francisco, Research Laboratories, California Central Creameries.) GROSZSFELD.

Ritz Baumann, Düsseldorf, *Konservieren von flüssigen oder mehr oder weniger festen Stoffen, insbesondere von Nahrungsmitteln*, dad. gek., daß den zu konservierenden Stoffen I., nicht giftige Rhodansalze, z. B. Rhodankalium oder Rhodannatrium in fester Form oder in Lsg. zugesetzt werden. (D. R. P. 405658 Kl. 53c vom 11/12 1922, aüsg. 3/11. 1924.) OELKER.

Hugo Emil Kohl, Dresden, *Einrichtung für Silos zur Haltbarmachung von Futter*. Zur Konservierung von Saftfutter mittels des elektr. Stromes ordnet er bekanntlich in dem mit Futter gefüllten Silo die Elektroden so an, daß der elektr. Strom im wesentlichen senkrecht zur Fläche der Elektroden verläuft. Diesen bekannten Einrichtungen unterscheidet sich der Erfindungsgegenstand dadurch, daß die Elektroden nach ihrem unteren Ende zu verjüngt sind, wobei die Elektroden mit Schlitzlöchern versehenen Isolatoren befestigt werden. — Das Herausnehmen der Elektroden wird wesentlich erleichtert u. die dabei entstehenden Verunreinigungen werden durch das zusammensackende Futter rasch geschlossen, wodurch Neubildungen vermieden werden. (D. R. P. 402471 Kl. 53g vom 16/12. 1922, aüsg. 24/9. 1924.) OELKER.

Elektro-Futter G. m. b. H., Dresden, (Erfinder: Gerold Pfister, Dresden), *Verfahren zum Haltbarmachen von safthaltigen Pflanzenstoffen, insbesondere von Viehfutter durch elektrischen Strom*, dad. gek., daß die den Umfang des Behälters umgebende Eisenbewehrung derartig unterteilt ist, daß keine ringförmig geschlossenen Stromlinien für magnet. Kraftlinien oder elektr. Ströme entstehen. — Eine Erwärmung

des Mauerwerks wird dadurch vermieden. (D. R. P. 403901 Kl. 53 g vom 18. 1922, ausg. 18/10. 1924.) OELKE

Landwirtschaftliche Industrie- und Handelsgesellschaft m. b. H., Schwiebs, und **Richard von der Heide**, Charlottenburg, *Kindernährmittel*. Die Herstellung dieses vitaminhaltigen, verdauungsregelnden, nicht kleisternden Nahrungsmittels erfolgt in der Weise, daß man ungeschälte *Kartoffeln* oder ähnliche Knollenfrüchte in Schnitten- oder Scheibenform bei möglichst niedriger Temp. trocknet, dann ebenfalls bei niedriger Temp. (etwa 60°), zweckmäßig im Vakuum röstet u. dann auf höchstens 60° zu Pulver vermahlt. (D. R. P. 405659 Kl. 53 k vom 12/9. 1922, ausg. 4/11. 1924.) OELKE

Société E. Barbet et Fils et Cie., Frankreich, *Extraktion von Fruchtsäften*. Man verwendet method. angeordnete Wasch- u. Einweichapp. (F. P. 25808 vom 12/10. 1921, ausg. 28/5. 1922. Zus. zu F. P. 549812; C. 1924. II. 2302.) KAUSCH

The Milk Oil Corporation, Wilmington, Del., übert. von: **Charles E. Noh**. Montclair, N. Y., V. St. A., *Dauernd haltbare Milch oder Sahne* wird erhalten durch Emulgieren von reinem Milchlöffel, W. u. einem Verdickungsmittel, wie vegetabil. Gummi, wobei Milchlöffel u. W. in solchen Mengen zur Anwendung kommen, wie sie in der natürlichen Milch enthalten sind. (A. P. 1509083 vom 2/11. 1922, ausg. 16/9. 1924.) OELKE

The Milk Oil Corporation, Wilmington, Del., übert. von: **Charles E. Noh**. Montclair, N. J., V. St. A., *Verfahren zum Kirnen von Sahne*. Die Sahne wird, nachdem man sie mit einer solchen Menge W. vermischt hat, die der bei ihrer Gewinnung abgeschiedenen Menge Magermilch entspricht, nochmals durch eine Milchscheuler geführt u. erst dann gekirnt. Es werden auf diese Weise die Stoffe aus der Sahne ausgewaschen, welche wie Casein, Albumin etc., die Agglomerieren der Fettkörperchen beim Kirnen erschweren. (A. P. 1509084 vom 21/12. 1922, ausg. 16/9. 1924.) OELKE

The Milk Oil Corporation, Wilmington, Del., übert. von: **Charles E. Noh**. Montclair, N. J., V. St. A., *Herstellung von Schlagsahne*. Man bereitet zunächst eine Kunstmilch durch Emulgieren u. Homogenisieren von reinem Milchlöffel, Magermilch u. W., scheidet aus dieser Kunstmilch durch Zentrifugieren die Sahne ab, kühlt u. schlägt sie in üblicher Weise zu Schaum. — Es soll auf diese Weise eine dauerhafte Schlagsahne erhalten werden, welche keine anderen Bestandteile gelöst oder suspendierten Milchbestandteile als Fett enthält. (A. P. 1509085 vom 19/1. 1923, ausg. 16/9. 1924.) OELKE

The Milk Oil Corporation, Wilmington, Del., übert. von: **Charles E. Noh**. Montclair, N. J., V. St. A., *Dauernd haltbare Butter*, welche dadurch erhalten wird, daß man reines Milchlöffel mit W. u. einem nicht zersetzlichen Verdickungsmittel, wie Gelatine, Agar-Agar, Gummi arabicum o. dgl. emulgiert, wobei man das Verdickungsmittel in einer Menge anwendet, die den nicht fettigen Bestandteilen der Naturbutter entspricht. (A. P. 1509082 vom 2/11. 1922, ausg. 16/9. 1924.) OELKE

The Milk Oil Corporation, Wilmington, Del., übert. von: **Charles E. Noh**. Montclair, N. J., V. St. A., *Herstellung von Butter aus Kunstmilch ohne Kirnen*. Man emulgiert reines Milchlöffel, Trockenmagermilch u. W. bei einer über den Festpunkt des Fettes liegenden Temp., derart, daß eine Paste von hoher Fettkonz. erhalten wird, kühlt diese Paste bis auf eine Temp. ab, bei welcher die Fettkörperchen das Bestreben haben, sich zu agglomerieren, u. unterwirft die M. alsdann einer Pressung, wodurch die Fetteilchen vereinigt u. die Buttermilch entfernt wird. An Stelle von Trockenmagermilch wird nach einer anderen Ausführungsform gewöhnliche Milch, Magermilch oder Kunstmilch benutzt. (A. P. 1509086, 1509087 u. 1509088 vom 28/3. 1924 bzw. 11/4. 1924, ausg. 16/9. 1924.) OELKE

XVIII. Faser- und Spinnstoffe; Papier; Cellulose; Kunststoffe.

Thomas H. Kearney und **C. S. Scofield**, *Der Salzgehalt der Baumwollenfaser*. Durchschnitt waren 85% der in den Baumwollenfasern enthaltenen Salze im V. l. Die Hygroskopizität der Fasern wurde durch die Entfernung der im W. Salze nicht wesentlich beeinflusst u. die in salinen Böden wachsenden Pflanzen hatten keine größere Wasserkapazität als die in salzärmeren Böden gewachsenen. Es sind daher gewisse Schwierigkeiten, die sich beim Verspinnen ägypt. Pima Baumwolle unter gewissen atmosphär. Verhältnissen zeigen, nicht dem Salzgehalt der Faser zuzuschreiben. (Journ. Agricult. Research **28**. 293—95. 1924. U. S. A. p. of Agric.)

BERJU.

C. A. Lovell, *Papierherstellung aus Weizenstroh*. Das Aufschließen mit Ca(OH)_2 u. die Verarbeitung des Stoffs auf Pappe ist beschrieben. (Chem. Metallurg. Engineering **31**. 459—62. 1924. Hutchinson, Kan.)

SÜVERN.

Janata, *Der Einfluß des Wassers auf die Papierfaser während des Fabrikationsprozesses*. Das Verh. der Cellulose zum W. beim Holländern, Schleifen, Entwässern u. Trocknen ist besprochen. (Papierfabr. **22**. Verein der Zellstoff- u. Papier-Chemiker u. -Ingenieure. 529—33. 1924.)

SÜVERN.

H. Hillringhaus, *Das Waschen oder Entschwefeln der Viscosekunstseide*. Die Waschmaschine der Firma TILLM. GERBER SÖHNE u. GEBR. WANSLEBEN, Crefeld, u. der die Maschinenteile von den Chemikalien nicht angegriffen werden können u. die eine erhebliche Arbeitsersparnis ergibt, wird empfohlen. (Melliands Textilber. **31**. 1924.)

SÜVERN.

Samuel Wein, *Die Herstellung von Phonographenmatrizen*. Eine Übersicht der Gebrauch befindlichen modernen Methoden. (Metal Ind. [New York] **22**. 405—406. Metal Ind. [London] **25**. 447—48. 1924.)

WILKE.

Erwin Benesch, *Bestimmung der Kupferzahl von Cellulosen*. Vf. teilt ein der Cu-Zahl bei Cellulose angepaßtes Verf. von ADANTI (Boll. Chim. Farm. **55**. C. 1919. II. 505) mit. (Chem.-Ztg. **48**. 861. 1924. Blumau [Österreich].) JUNG.

Walther Loew Beer, Brünn, Tschechoslowakei, *Säuern von Fasergut vor dem Carbonisieren*, 1. dad. gek., daß die Carbonisierungsf. nur auf die Oberfläche des Gutes aufgebracht wird. — 2. dad. gek., daß die Carbonisierungsf. durch Drücken u. mittels gravierter Walzen aufgebracht wird. — 3. gek. durch die Verwendung verdickten Carbonisierungsmitteln. (D. R. P. **406044** Kl. 29b. vom 9/2. 1924, v. 11/11. 1924.)

KAUSCH.

Bruno Possanner von Ehrenthal, Köthen, Anhalt, *Herstellung leicht gebleichter Cellulosefasern*. Beliebige Rohfaserstoffe, wie Hanf, Stroh, Jute, Nesselfaser usw., werden der sauren Hydrolyse unterworfen, danach mit verd. Alkalilsg. behandelt u. schließlich nach dem Waschen mit W. der Einw. einer Fett- oder Ölemulsion unterworfen. (A. P. **1509273** vom 8/7. 1921, ausg. 23/9. 1924.)

OELKER.

Fritz Kempter, Stuttgart, *Rückgewinnung von in Altpapier enthaltenen, fettigen Stoffen*, die in entsprechend erhitztem W. schmelzbar u. spezif. leichter als W. sind, dad. gek., daß die zerkleinerten Papierabfälle zusammen mit dem h. W. in einem Behälter, gegebenenfalls unter Zerkaserung, in Bewegung gehalten u. dabei durch ein oben im Behälter angebrachtes Sieb am Aufsteigen verhindert werden, so daß nur das geschmolzene Fett durch das Sieb hindurchtritt u. von W. entfernt wird. — Die Benutzung chem. Mittel erübrigt sich. (D. R. P. **405218** vom 20/10. 1922, ausg. 28/10. 1924.)

OELKER.

Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning, Höchst a. M. (Erfinder: **K. Franz**, Frankfurt a. M., und **Franz Dotzel**, Höchst a. M.), *Darstellung von*

farbgemustertem Papier durch Übertragung von auf einem Sieb oder Filz gebildeten Fasergruppen auf eine noch feuchte Papierbahn, dad. gek., daß das Aufbringen der Fasergruppen auf das Sieb oder den Filz mittels einer Einrichtung erfolgt, welche aus einem mittels Exzenter quer zur Papierbahn beweglichen Stell besteht, welches Auslaufstücke aus elast. Material besitzt, die auf dem Trichterstellbar angeordnet sind. — 2. dad. gek., daß man außer den Fasergruppen farblose oder gefärbte Tropfen auf das Sieb oder den Filz auffallen läßt. (D. R. P. 405613 Kl. 55f vom 26/1. 1922, ausg. 4/11. 1924.) OELKE

Chemische Fabrik Dr. Adolf Heinemann A.-G., Frankfurt a. M. (Erfinder **Edmund Schnabel**, Worms a. Rh.), *Herstellung von Kohlepapier*, dad. gek., als als Lösungs- bzw. Suspensionsmittel für den Farbstoff hydrierte Öle oder Löss verwendet sind. — Das so erzeugte Kohlepapier zeigt einen schönen gleichmäßigen Hochglanz, der nicht schwindet; die Farbmasse färbt kaum ab, so daß eine Verschmutzung des Unterlegpapiers vermieden wird. (D. R. P. 405842 Kl. 55f vom 1/3. 1922, ausg. 8/11. 1924.) OELKE

Todd Protectograph Company Inc., Rochester, N. Y., übert. von: **Walton J. Murray**, Boston, Mass., V. St. A., *Herstellung von Sicherheitspapier*. Zur Herstellung unveränderlicher Zeichen im Papier imprägniert man dieses mit einem Nitrit, behandelt es hierauf mit einer Fl., welche beim Durchdringen des Papiers HNO_2 entwickelt u. mit dieser einen Farbstoff, z. B. einen Azofarbstoff bildet. Ähnliche derartige Fl. können z. B. Lsgg. von Aminen u. Phenolen in Fettsäuren verwendet werden. (A. P. 1509872 vom 9/6. 1921. ausg. 30/9. 1924.) OELKE

Chemische Fabrik Dr. Adolf Heinemann A.-G., Frankfurt a. M. (Erfinder **Edmund Schnabel**, Worms a. Rh.), *Herstellung von Wachspapiermatrizen für vervielfältigungsapparate*, dad. gek., daß als Zusatz zur Wachsmasse hydrierte Öle oder Fette verwendet werden. — 2. dad. gek., daß der Wachsmasse ein Farbstoff eingegeben wird. — Die Matrizen sind zäh u. elast. u. verunreinigen das Unterlegpapier nicht durch Verschmieren. (D. R. P. 405841 Kl. 55f vom 1/3. 1922, ausg. 8/11. 1924.) OELKE

Carl G. Schwalbe, Eberswalde, *Aufschließung pflanzlicher Rohfaserstoffe* in 1. Art zur Herstellung von Zellstoff, 1. dad. gek., daß man zur Aufschwemmung in Wasser oder swl. Sulfite verwendet, deren Löslichkeit durch Zusatz lösender Stoffe, wie Zucker oder Salze organ. Säuren, erhöht wird. — 2. dad. gek., daß man zur Aufschl. unl. oder swl. Sulfite Fl. verwendet, welche gewisse Mengen von Zuckern oder Salzen organ. Säuren enthalten, wie z. B. Melasse, Sulfitalblauge u. a. — Die Löslichkeit der unl. oder swl. Sulfite, z. B. des CaSO_3 , wird derart gesteigert, daß auch mit Hilfe dieses unl. Sulfits allein eine Aufschließung verholzter Pflanzenstoffe bewirkt werden kann. (D. R. P. 405950 Kl. 55b vom 2/6. 1923, ausg. 10/11. 1924.) C.

Maschinenbau-Anstalt Humboldt, Köln-Kalk, *Herstellung von verspinnbaren Kupferoxydammoniak-Zellstofflösungen* mittels Kolloidmühlen unter Verwendung von Cu-Pulver oder unl. Cu Verbb., wie CuCO_3 , Cu(OH)_2 usw. als Ausgangsmaterialien. — dad. gek., daß man die Reaktionskomponenten in schnelllaufenden Dispersionsmaschinen aufeinander u. auf die Cellulose in Anwesenheit von geringen Mengen von organ. Amidoverbb. als dispersionsbeschleunigende Mittel zur Einw. gelangen läßt. (D. R. P. 406311 Kl. 29b vom 18/3. 1923, ausg. 17/11. 1924.) KAUSCH

Ph. Nebrich, vorm. Reinicke & Jasper, G. m. b. H., Cöthen, Anhalt, *Verwertung der Kocherabwärme und -abgase zum Aufschließen von Schäl- und Sägespänen*. 1. dad. gek., daß die Kocher in mit den Schäl- u. Sägespänen gefüllte besondere Behälter abgasen, so daß der Inhalt dieser Behälter durch die Wärme der Abgase zunächst gedämpft u. dann mittels der sich hierbei kondensierenden Fl. gelöst wird. — 2. dad. gek., daß der direkte Wärmeaustausch der Abgase u. die Kondensationswrgk. in 2 Behältern vorgenommen wird, wobei der aus jedem der Behälter

Wärmer austretende Abdampf mit dem Kondensat in den Laugenkreislauf des äußeren Behälters geleitet wird. (D. R. P. 405698 Kl. 55b vom 17/11. 1923, ausg. 8/1. 1924.) OELKER.

Paul Knichalik, Magdeburg, *Geruchlosmachen der Abgase der Sulfatzellstoff-Fabriken*, dad. gek., daß man die Mercaptane u. andere übelriechende Stoffe entziehenden Abgase durch dünne Schwarzlauge leitet. (D. R. P. 405612 Kl. 55b vom 17/11. 1923, ausg. 7/11. 1924.) OELKER.

Actien-Gesellschaft für Anilin-Fabrikation, Berlin-Treptow (Erfinder: **Joseph Eber**, Dessau i. Anhalt, und **Paul Eckert**, Dessau-Ziebigk i. Anhalt), *Herstellung von Gebilden aus Viscose*, dad. gek., daß man der Löselauge für das Xanthogenat eine Lsgg. von Alkalisilicaten zufügt u. die Lsg. in üblicher Weise verspinnt. (D. R. P. 405601 Kl. 29b vom 23/8. 1923, ausg. 8/11. 1924.) KAUSCH.

Naamlooze Vennootschap Hollandsche Kunstzijde Industrie (Erfinder: **Eggert**), *Herstellung leicht filtrierbarer Viscoselösungen*. Man läßt die Alkalilauge auf vorher evakuierte Cellulose einwirken. (Schwed. P. 55202 vom 16/7. 1923, ausg. 25/9. 1923. Holl. Prior. 13/1. 1920.) FRANZ.

Henry Dreyfus, London, England, *Celluloseacetatmassen*. Als Gelatinierungsmittel verwendet man Toluoldialkylsulfonamide, insbesondere die noch bei 0° fl. Mische von o- u. p-Toluoldialkylsulfonamide. o-Toluoldimethylsulfonamid, Kp.₂ 144–152°. o-Toluoldiäthylsulfonamid, Kp.₂ 152–155°. (A. P. 1508928 vom 5/8. 1923, ausg. 16/9. 1924.) FRANZ.

Deutsche Sprengstoff-Akt.-Ges., Hamburg, *Imprägnieren von Vulkanisierplatten für Straßenbahnen und daraus hergestellten Gegenständen*, dad. gek., daß man diese mit einer Kollodiumlsg. behandelt. — Die so behandelten Gegenstände werden auch nach Berührung mit W. nicht unansehnlich u. behalten ihre Elastizität. (D. R. P. 40785 Kl. 55f vom 19/4. 1922, ausg. 7/11. 1924.) OELKER.

X. Brennstoffe; Teerdestillation; Beleuchtung; Heizung.

E. Steinhoff, *Beitrag zur Frage des feuerfesten Mauerwerks bei der Kohlen-Ofenfeuerung*. Vf. beschreibt den stark zerstörenden Einfluß, den zwei Kohlenarten schon bei 1400° auf zwei Typen von Silicasteinen ausübten. Bei der Verwendung von besserer Kohle war der schädliche Einfluß wesentlich geringer. (Mitt. Versuchsanstalt Deutsch-Luxemburg. Bergwerks- u. Hütten-A.-G. Dortmund 1. 160–66. 1923. Sep.) OEHLER.

A. Riedler, *Feuergefährliche flüssige Brennstoffe und die Verfahren, sie betriebsfähig zu lagern*. Polemik mit STRACHE (Österr. Chem.-Ztg. 27. 19; C. 1924. I. 1. (Österr. Chem.-Ztg. 27. 91–95. 100–106. 1924.) JUNG.

H. Strache, *Feuergefährliche flüssige Brennstoffe und die Verfahren, sie betriebsfähig zu lagern*. Erwiderung an RIEDLER (vorst. Ref.) (Österr. Chem.-Ztg. 27. 106–107. 1924. Wien.) JUNG.

—, *Der stehende Schmelofen*. Allgemeine Prinzipien bei der Tieftemperaturverkokung. Beschreibung von feststehenden u. drehenden Ofenkonstruktionen, Schmelöfen der Meguin A. G. Einzelheiten seines Baues u. Arbeitsweise. Gewinnung der Nebenprodd. u. Ausbeute derselben. (Stahl u. Eisen 44. 1286 bis 1292. 1924.) BECKER-ROSE.

Harald Nielsen, *Tieftemperaturverkokung, einige neuere Ansichten über die Verhältnisse über die einschlägigen Probleme*. Vf. stellt Betrachtungen über den wirtschaftlichen Wert der Prodd. der Tieftemperaturverkokung an. Die festen Verkokungsprodd. sind wertvoll für Feuerungszwecke, speziell für Staubfeuerung. Gase sind ebenfalls brauchbare Prodd. Über den Wert der Öle kann nichts gesagt werden, da die Kenntnis ihrer Eigenschaften noch in den Anfängen

steht. Eine Drehofenanlage mit Innenheizung durch h. Gase wird kurz beschrieben. (Chem. Trade Journ. 75. 549—51. 1924.) BIELENBERG

Harald Nielsen, *Tieftemperaturverkokung*. Inhalt deckt sich im allgemeinen mit einer anderen Veröffentlichung des Vfs. (vgl. vorst. Ref.). Das vom Vf. gearbeitete Verf. wird etwas ausführlicher beschrieben. Das zur Verkokung n. Heizgas wird aus erzeugtem Koks als Wassergas gewonnen. Beim Verschmelzen tritt Mischung mit den Schwelgasen ein. Das Mischgas wird von Teerbewerten befreit u. nochmals zur Verschmelzung benutzt. Die anfallende Koksmasse wird wiederum zu Wassergas vergast bzw. als rauchloser Brennstoff in den Handel gebracht. Das entstehende Mischgas ist gewissermaßen zweimal carburiert. Wassergas mit gutem Heizwert. (Gas Journ. 168. 434—38. 1924.) BIELENBERG

H. Strache und **R. Harnoucourt**, *Vorläufige Mitteilung über die Carbonylzahlen von Kohlen*. Die von STRACHE früher ausgearbeitete Methode der Best. der Carbonylzahlen von Vff. modifiziert worden; ausführliche Mitteilung hierüber wird in Aussicht gestellt. Mit der geänderten Methode ist der Carbonylgehalt einiger Braun- u. Steinkohlen bestimmt worden. Er schwankte zwischen 0,14—0,37% bezogen auf die Kohle. Da durch Oxydation die Aldehyd- u. Keto-Gruppen verändert werden kann die Best. der Carbonylzahlen etwas über den Grad der Verwitterung der Kohle aussagen. Unterss. weiterer Inkohlungsprodd. werden noch vorgenommen. (Brennstoffchemie 5. 350—51. 1924. Wien, Techn. Hochschule.) BIELENBERG

C. H. Borrmann, *Ein neues Verfahren zur Benzolgewinnung durch Abwärmung*. Eine Beschreibung des Arbeitsganges nach D. R. P. 326730 (C. 1921. II. 147). Zur Beheizung werden an Stelle des sonst üblichen Wasserdampfes die h. Abgasen aus Koksöfen u. Retorten verwandt. (Brennstoffchemie 5. 349—50. 1924. Essen.) J. E.

H. D. H. Drane, *Die Anlage und der Betrieb von Gaswaschtürmen*. Theorie u. experimentelle Ergebnisse einer Unters. über die Wirkungsweise von Gaswaschtürmen unter Zugrundelegung der Beziehungen, die sich zwischen zu behandelnder Gasmenge, Vol. der Waschfl. u. dem Löslichkeitskoeffizienten des zu extrahierenden Gases einstellen. Die mit CO₂ ausgeführten Verss. legten dar, daß der Löslichkeitskoeffizient unabhängig von der im Absorptionsraum verfügbaren Menge Flüssigkeit, aber mit der wachsenden Konz. des Gasstromes erheblich größer wird. Dargestellte Erfahrungen werden mathemat. ausgewertet u. der Konstruktion neuer Anlagen zugrunde gelegt. (Journ. Soc. Chem. Ind. 43. T. 329—34. 1924. London.) HORN

Mineralölwerke Rhenania A.-G. Laboratorium, *Weitere Beiträge zur Untersuchung von Benzol, Benzin und Terpentinöl*. (Vgl. PRITZKER u. JUNGKUNZ, Chem. Ztg. 48. 455; C. 1924. II. 1042.) Bzl. u. Toluol sind aus Borneo-Bzn. fabrikmäßig gewonnen worden. Die von der Shell-Co. empfohlenen Benzine gelten als stilles Gemisch von Bzn. u. Bzl. Eine Menge cycl. KW-stoffe befinden sich in diesen Benzin mit natürlichem Bzl.-Gehalt. „Sangajol“ enthält cycl. Verbb. PRITZKER u. JUNGKUNZ fügen eine Erwiderung an. (Chem.-Ztg. 48. 857. 1924.) J. E.

v. d. Heyden und **Typke**, *Transformatoröle*. (Ztschr. f. angew. Chem. 37. 853—55. — C. 1924. II. 2103.) RÜHE

J. D. Davis, *Calorimetrischer Apparat für die Messung von Reaktionswärmen bei hohen Temperaturen, namentlich für die Verkokungswärme von Kohle*. Ihre Verbesserung der elektr. Temp.-Messung, Verringerung des Wärmeaustausches an man bei gewöhnlicher Temp. auf 1 Promille u. genauer messen, während für die Messung bei hohen Temp. erst wenig getan ist. — Beim Verkokten ist die entwickelte Wärme $\frac{1}{100} - \frac{1}{300}$ der zuzuführenden. Vf. arbeitet mit einem *Doppelkammerkalorimeter*, das in einem gemeinsamen, elektr. geheizten Mantelgefäß voll Wasser eingebettet ist. Die Korrektur für den Wärmeaustausch wird bestimmt, indem man die Temp. der einen Calorimeters u. des Wassermantels gleichmacht u. die Temp. in dem anderen

an gleichen variiert; die Korrektion ist größer als erwartet, drum wird nach dem Verkokungsvers. ein möglichst gleicher blinder Vers. angestellt u. die Differenz der Resultate als *Verkokungswärme* angenommen. Messung der Temp.-Differenz mittels Cu-Konstantan-Thermosäulen. In jedem Calorimeter steht eine Verbrennungs-Öl-Ölbe, deren Wand nicht säurefest zu sein braucht; in jeder Bombe befindet sich ein Quarzbecher mit äußerem Heizwiderstand u. ein Pt-Pt-Rh-Element; die inneren Einrichtungen sind in bezug auf Widerstand u. Gewicht nach Möglichkeit ident. Gleich angeordnet. Alle Schaltungen u. Meßanordnungen werden abgebildet; die Heizung des Wassermantels wird durch ein Galvanometer automat. eingeschaltet, es sich eine Temp.-Differenz gebildet hat.

Die Verkokung von 1 g Kohle geschieht in einer Stickstoffatmosphäre; dem Stickstoff u. beiden Bomben wird durch Zirkulieren über gelbem P jeder Sauerstoff entzogen. Die Verdampfung von W. in den Calorimetern wird durch überschichteten Paraffin-liq. verhindert. Die Verkokung geschieht bei ca. 500°; jedes Calorimeter wird mit ca. 8500 cal. beheizt, die Unsicherheit (Schwanken der Korrektion) beträgt nur 1 cal., die *Verkokungswärme* von Kokskohle ist von der Größenordnung 1000 cal. — 10 Kohlearten werden untersucht u. mit genauen Analysen vor u. nach der Verkokung angegeben. Verkokung in Wasserstoffatmosphäre gibt stets höhere Werte als in Stickstoffatmosphäre. Die Verkokungswärme im Koksofen hängt stark von den Versuchsbedingungen (Temp., zeitlicher Temp.-Gang) ab, auch dem App. des Vfs. können Schwankungen von 20% eintreten. Steigt die Verkokungstemp. über 500°, so wird die Verkokungswärme kleiner, oberhalb 650° überlegen die endothermen Rkk. (Ind. and Engin. Chem. 16. 726—30. 1924. Pittsburgh, Exper. Station, Bureau of Mines.)

W. A. ROTH.

S. de Waard, *Verbesserte Rauchgasuntersuchung*. Abänderung des bekannten Verfahrens, bestimmt zur raschen Feststellung des Unverbrannten in Rauchgasen. Aus dem nach besonderer Verbrennung neu entstehenden CO₂ u. aus der Volumverminderung läßt sich der Gehalt an unverbrannten Gasen (CH₄, H₂, CO) annähernd bestimmen, indem man die gefundenen Zahlen unter der Annahme auswertet, daß maximal nur CH₄ u. CO, das zweite Mal nur H₂ u. CO unverbrannt vorhanden sind; das Mittel aus den beiden so gefundenen Verlusten durch Unverbranntes weicht von dem wahren Verlust nur wenig ab. (De Ingenieur 1924. Nr. 7; Arch. für Warmewirtsch. 5. 208. 1924. Ref. SCHACK.)

SPLITTGERBER.

Richard Archer Butler, Central Falls, Rhode Island, V. St. A., *Herstellung von flüssigen Brennstoffen*. (D. R. P. 404864 Kl. 10b vom 19/10. 1922, ausg. 23/10. 1923. — C. 1923. IV. 970.)

OELKER.

Fritz Landsberg, Berlin-Wilmersdorf, *Schwelofen*. Bei der Schwelung von Kohle, Schiefer, Torf etc. zur Gewinnung von Urteer in außenbeheizten Retorten zur sicheren Vermeidung der Zers. wertvoller Teerdämpfe die Berührung des Schwelgutes mit den beheizten Wänden vermieden u. die Wärmeübertragung durch Umlagerung vorgesehen werden. Hierbei ist es von Bedeutung, daß das Schwelgut auf großer freier Oberfläche gelagert u. wiederholt umgewendet wird, damit die Zersetzungszeugnisse leicht entweichen können u. eine längere Berührung derselben mit dem h. Schwelgut vermieden wird. Zur Erfüllung dieser Bedingungen werden an sich bekannte, aus zwei konzentrisch beheizten, gegeneinander bewegten Zylindern bestehende Ofen, dadurch verbessert worden, daß zum Zwecke der Umlagerung einer möglichst großen Heizfläche u. zur besseren Lagerung u. Fortbewegung des Gutes zwischen den beiden Zylindern, der feststehende innere Zylinder aus von dachförmigen Körpern trägt, die in der Senkrechten gegeneinander verschiebbar sind, während an dem äußeren drehbaren Zylinder ebene Tragbleche befestigt sind, die zwischen die Reihen der Dachkörper ragend das Schwelgut tragen.

VII. 1.

u. durch Schlitze allmählich entsprechend der Drehung des beweglichen Zylinders von einer Dachkörperreihe auf die nächst untere gleiten lassen. (D. R. P. 403954 Kl. 10a vom 21/12. 1921, ausg. 9/10. 1924.) OELKE

David Aufhäuser, Hamburg, *Vorrichtung zum Entwässern von Teer* durch Destillieren desselben mit Leichtöl, bestehend aus einem mit der Teerblase verbundenen, nach unten kegelförmig verjüngten u. mit einem Kühler versehenen Scheidegefäß, an welchem Probierhähne angebracht sind u. in welches die Dämpfe durch ein Rohr eintreten, während das Leichtöl durch ein zunächst kleineres Stützrohr in die Höhe gehendes Heberrohr in ununterbrochenem Betriebe in die Destillationsblase zurückgeführt, das W. dagegen in einem solchen Maße abgezapft wird, daß das Niveau des Leichtöles in dem Scheidegefäß eine gewisse Höhe nicht überschreitet. (D. R. P. 403925 Kl. 12r vom 3/7. 1923, ausg. 10/10. 1924.) OELKE

Badische Anilin- & Soda-Fabrik, Ludwigshafen a. Rh., Erfinder: **Wilhelm Pungs**, Ludwigshafen a. Rh.), *Herstellung von viscosen Ölen aus Teerölen*, dad. gek., daß man auf Teeröle HCl-Gas in Ggw. von aktiviertem Al einwirken läßt. — in Prodd. auf Teeröle vorzügliche Schmiermittel dar. (D. R. P. 405255 Kl. 23c vom 14. 1922, ausg. 30/10. 1924.) OELKE

Minerals Separation North American Corporation, New York, übert. von **Rhetherford B. Martin**, New York, *Herstellung von oxydierten Kohlenstoffverbindungen*. Man bringt ein Mineralöl, z. B. Petroleum, in einem beschränkten Raum in Ggw. eines Luftstroms mit einem erhitzten, harten, kohlenstoffhaltigen Material z. B. Koks, in Berührung, wodurch ölige Körper erhalten werden, die sich weiter anderem z. B. für das Schaumschwimmverf. verwenden lassen. (A. P. 151016 vom 3/6. 1921, ausg. 30/9. 1924.) OELKE

Richard Fleming, Swamscott, Massachusetts, V. St. A., *Spalten von Kohlenwasserstoffölen*. Hochsd. u. niedrig sd. KW-stoffe werden von unten in senkrecht angeordnete Röhren, die von den Feuerungsgasen umspült werden, eingeleitet unter einem Druck von 5—7 at auf Spalttemp. erhitzt. Die Heizrohre münden oben in einen Behälter, von dessen oberem Ende die gebildeten Dämpfe zu einem Kondensator geleitet werden; hinter dem Kondensator ist ein Ventil angebracht durch das der Druck in der Vorr. geregelt werden. (Holl. P. 7059 vom 12. 1919, ausg. 15/6. 1922. A. Prior. 17/11. 1916.) FRAN

Sinclair Refining Company, Chicago, V. St. A., *Spalten von Kohlenwasserstoffölen*. Man erhitzt die KW-stofföle schnell auf Spalttemp. u. leitet sie von unten durch senkrecht in der Heizzone angeordnete Röhren. (Holl. P. 7356 vom 12. 1918, ausg. 15/8. 1922.) FRAN

Walter Friedmann, Buenos-Aires, Argent., *Entwässerung und Destillation von Roherdöl mittels Gasen*. Es wird als Abtreibungsmittel erwärmtes Erdgas verwendet. — Gegenüber dem bekannten Vorschlag, vorgewärmte KW-stoffe zu verwenden, welche aus dem Destillationsgut selbst herrühren, bietet das Verf. den Vorteil, daß das Erdöl gleichzeitig entwässert wird. Außerdem wird die Viscosität der Öle erhöht. (D. R. P. 405533 Kl. 23b vom 16/6. 1922, ausg. 1/11. 1924.) OELKE

Compagnie Générale d'Exploitation des Brevets et Procédés de Raffinerie, **peration Brégeat Société Anonyme**, Brüssel, *Herabsetzung der Verdunstungsgeschwindigkeit leichtflüchtiger Kohlenwasserstoffe*, insbesondere des aus Erdgas gewonnenen Gasolins, dad. gek., daß man geringe Mengen leicht brennbarer hochsd. Verbh. der arom. Reihe, wie Tetrahydronaphthalin, Dekahydronaphthalin, Isaxhydronaphthalin usw. beimischt. — Es genügen schon geringe Mengen dieser Stoffe etwa 2—4%, um den Dampfdruck der Mischung beträchtlich herabzusetzen. (D. R. P. 405534 Kl. 23b vom 6/9. 1923, ausg. 1/11. 1924. Oe. Prior. 21/4. 1923.) OELKE

Fred E. Hosmer, Shreveport, Louisiana, *Gewinnung von Gasolin aus natürlichen Gasen*. Das Gas wird komprimiert u. gekühlt u. das dadurch gebietete

Kondensat von den nicht kondensierten Gasen getrennt. Aus dem Kondensat werden dann die leicht flüchtigen Öle durch Verdampfen entfernt u. die rückbleibenden niedrig sd. Öle zum Waschen der nicht kondensierten Gase benutzt. (D. R. P. 1510433 vom 4/5. 1922, ausg. 30/9. 1924.)

OELKER.

Alfred George Marshall, Purley, Engl., *Herstellung von Mischungen eines in Mineralöl nicht vollkommen löslichen nichtmineralischen Öles mit einem Mineralöl*, dad. gek., daß die beiden Ölarten in solchem Verhältnis miteinander gemischt werden, daß eine Abscheidung beim Stehen vor sich geht, nachdem die Öle innig gemischt worden sind, oder daß die beiden Ölsorten ineinander gel. werden u. daß die untere u. obere Schicht nach der Trennung gesondert abgezogen werden. — Es werden zwei Lsgg. erhalten, von denen die eine aus einem Mineralöl besteht, welchem die in dem nichtmineral. Öl l. Bestandteile entfernt sind u. die anderweitig einen Teil des nichtmineral. Öles enthält, während die andere Lsg. aus dem nichtmineral. Öl u. gewissen Bestandteilen des Mineralöls besteht. (D. R. P. 148 Kl. 23c vom 13/7. 1923, ausg. 9/10. 1924. E. Prior. 2/12. 1922.) OELKER.

Franz Andrasek und Josef Drechsler, Tschechoslowakei, *Masse zum Dichten von Achsbuchsen*. Fein zerkleinerte Metalle, die Eisen oder Stahl nicht annehmen, wie Pb oder Pb-Legierungen werden mit Asbest, Graphit u. einem Schmieröl vermischt u. in der Presse geformt. Das Metall kann man zerkleinern, indem man das geschmolzene Metall durch einen feuersicher gemachten Beutel drückt oder durch ein Sieb aus genügender Höhe fallen läßt oder k. Metall auf mechan. Wege zerkleinert. (F. P. 557635 vom 20/10. 1922, ausg. 11/8. 1923. D. Prior. 22/10. 1922.)

FRANZ.

Leopold Siederer, Wien, *Verfahren zum Imprägnieren, Durchfärben und Haltmachen von frisch gefälltem Holz*, dad. gek., daß das frisch gefällte Holz mit einer Lsg. eines Ca-, Na- oder NH₄-Albuminats im Gemenge mit einer Lsg. von Wasserglas u. u. Wasserglas unter Zusatz geeigneter Farbstoffe einer Druckimprägnierung unterworfen wird. — Die Imprägnierfl. besteht aus einer Lsg. von ca. 10 Teilen Casein, etwa 2 Teilen CaO, NaOH oder NH₃, etwa 10 Teilen Wasserglas, etwa 10 Teilen Na₂B₄O₇, etwa 2 Teilen Farbstoff u. ca. 200 Teilen W. unter Benutzung des natürlichen Gefäßsystems des Holzes u. unter Erhaltung der natürlichen Faserstruktur nach Verdrängung des leicht zur Gärung neigenden Saftes gelingt es so, das Holz derart in seiner ganzen M. zu imprägnieren, daß beim Trocknen eine hohe Härte annimmt u. ihm erteilte Färbungen dauernd hält. Die Imprägnierung erfolgt unter Verwendung k. Lsgg., u. zwar solange das Holz noch in frischem Zustande ist. Das Casein wirkt als Bindeglied zwischen Holz u. Farbstoff, wobei es durch die Ggw. von Na₂B₄O₇ u. Wasserglas unterstützt wird, so daß eine lichtechte beständige Färbung entsteht. (D. R. P. 403013 vom 1/4. 1923, ausg. 19/9. 1924. Oe. Prior. 23/11. 1922. Oe. P. 96683 vom 23/11. 1922, ausg. 25/4. 1924. F. P. 573224 vom 19/11. 1923, ausg. 20/6. 1923. Oe. Prior. 23/11. 1922.)

SCHOTTLÄNDER.

Victor Scholz, Jauer, Schles., *Verfahren zum Imprägnieren von Holz, Stroh, Bast* unter Anwendung von Lsgg., die man durch Behandlung von lohgerem Holz mit Alkali erhält, dad. gek., daß man zwecks Konservierung der Stoffe diese abseind, gegebenenfalls unter Anwendung von Druck u. Vakuum, mit den vorerwähnten Lederlsgg. einerseits u. andererseits mit solchen wss. Lsgg. von Salzen, Zn usw. imprägniert, welche an sich Bakteriengifte sind u. mit der Gerbleim- (Gerbleim-)Lsg. vorher neutralisiert sein kann. — Zur Imprägnierung werden Holz, Stroh, Weidenruten, Rottang oder Bast mit der, zwecks Verhinderung der Lsg. des Lignins durch freies Alkali, neutralisierten Lederlsg. gekocht. Man läßt abtropfen u. bringt die Stoffe in ein zweites, verd. wss. Lsgg. von Salzen

des Cu, Zn, Pb, Al, Fe, As oder Ba enthaltendes Fällbad, in dem sie bis zur vollständigen Fällung der in die Fasern eingedrungenen Lederlsg. gekocht werden. Da so imprägniertes Holz oder Stroh sich mit W. nicht netzen u. ganz gerundet sind, benötigen sie keinerlei Firnis- oder Schellack- oder Wachsanzstrich. Bei den angegebenen für die Imprägnierung von *Eisenbahnschwellen* mit Lederlsg. CuSO₄, sowie von *Stroh* mit Lederlsg. u. Al₂(SO₄)₃. (D. R. P. 403564 Kl. 38b 12/4. 1922, ausg. 4/10. 1924. Zus. zu D. R. P. 363703; C. 1923. II. 274.) SCHOT

XXII. Leim; Gelatine; Klebmittel usw.

C. R. Smith, *Bericht über Gelatine*. Das bisherige Verf. zur Cu-Best. aus versuchsweise beibehalten werden. Weitere Verss., ebenso zur Best. von Z erscheinen zweckmäßig. (Journ. Assoc. Official Agricult. Chemists 7. 135—37. 92 Washington. Bureau of Chemistry.) GROSZFE.

H. Bechhold, *Studien über Leim und Gelatine*. Die bisher übliche Beschreibung „Klarheit“ — Beobachtung von Schreibmaschinenschrift durch eine 13 cm hohe Schicht 3%ig. Lsgg. — ist ganz unzulänglich. Die Verwendung des Kleinmann'schen *Nephelometers* (Herst. SCHMIDT u. HAENSCH, Berlin) gibt hingegen gut differenzierbare Werte. Gemessen wird dabei die Helligkeit, welche durch Abbeugung der trübenden Teilchen (Tyndalleffekt) in das Gesichtsfeld gelangt. Als „Trübung“ wird der reziproke Wert des Nephelometereffektes, bezogen auf eine sehr klare Standardgelatine, bezeichnet. Die üblichen *Gallertfestigkeitsbest.* sind mangelhaft, vor allem da sie die Elastizität der Gele nicht berücksichtigen u. anzeigen. Vergleichsweise mit dem Schadeschen Elastometer (Herst. A. ZWICKERT, Kiel), bei welchem der Eindruck, den ein belastetes Blättchen in die Gelatineoberfläche macht, mittels eines Schreibhebels in 10-facher Vergrößerung auf eine sich drehende Millimeterpapierwalze übertragen wird, geben rasch gut vergleichbare Werte. Es werden die Gewichte verglichen, die 1 mm (auf dem Millimeterpapier 10 mm) tiefe Einsenkungen bewirken. Durch abwechselnde u. steigende Belastung u. Entlastungen entstehen ferner auf dem sich drehenden Papier zusammenhängende Vertikal- u. Horizontallinien, die wie Zinnen einer Mauerkrone aussehen. Bei vollkommener Elastizität guter Gelatinen stellt sich sofort bei Belastung oder Entlastung ein bestimmtes Niveau ein, das auf der Trommel sich durch eine Horizontale dokumentiert, während bei mangelhaft elast. Leimen die allmähliche Einstellung des Niveaus gegen die Horizontale geneigte Linien zeichnet. Der direkt als tang. auf dem Millimeterpapier ablesbare Winkel gibt das Maß für die Qualität des Leims an: je größer der tang., desto schlechter der Leim. (Ztschr. f. angew. Ch. 37. 5(—7) 1924. Frankfurt a. M., Inst. für Kolloidforschung.) GERNGISS.

Georg Lauter, Frankfurt a. M., *Klebmittel für festes Schuhleder*, dad. ge. da die üblichen Klebstoffe zugesetzt sind, welche die Klebstoff abstoßende Wirkung des fetten Leders aufheben, z. B. Mg-Verbb., wie MgO, MgCO₃, Talk oder event. CaCO₃. (D. R. P. 404548 Kl. 22i vom 7/7. 1922, ausg. 18/10. 1924.) OELER.

P. J. F. Souviron, Tarbes, Frankr., *Mischungen zum Verschließen von ichen* z. B. bestehend aus einer Lsg. von 40 Teilen CaCl₂ in 60 Teilen W., 100 g (mm) schnitzel u. 200 g CaCO₃. Durch Zusatz von Gummi wird die Lsg. dickflüssig gemacht. (E. P. 221496 vom 29/8. 1924, Auszug veröff. 5/11. 1924. Prie 3/1923.) KAICH.

C. F. D. Forss, Katrineholm, *Feuchtigkeitsbeständiger Klebstoff*. In 90 Teilen Wasserglas werden 10—50 Teile nicht verhärtetes Harz gel. (Schad. 153395 vom 14/10. 1921, ausg. 14/3. 1923.) KÜHNIG.

Chemisches Zentralblatt.

925 Band I.

Nr. 4.

28. Januar.



A. Allgemeine und physikalische Chemie.

- W. N. Ipatjew**, Zum Andenken an L. A. Tschugajew. Schilderung der Persönlichkeit. (Ann. Inst. de Platine 3. 5—13. 1924 [Russ.] Sep.) **BIKERMÄN.**
- E. Ch. Fritzmann**, L. A. Tschugajew, Biographische Notiz. Geb. 17/10. 73; Magister, 1906 Doktor der Chemie, 1908—22 Prof. an der Univ. Petersburg. (Ann. Inst. de Platine 3. 15—32. 1924 [Russ.] Sep.) **BIKERMÄN.**
- G. W. Pigulewski**, Das Werk L. A. Tschugajews auf dem Gebiete der organischen Chemie. Übersicht u. Bibliographie. (Ann. Inst. de Platine 3. 33—46. 1924 [Russ.] Sep.) **BIKERMÄN.**
- A. A. Grinberg**, Die Arbeiten von L. A. Tschugajew über die optischen Eigenschaften chemischer Verbindungen. Übersicht u. Bibliographie. (Ann. Inst. de Platine 3. 47—59. 1924 [Russ.] Sep.) **BIKERMÄN.**
- W. G. Chlopin**, Über L. A. Tschugajews Arbeiten auf dem Gebiete der Komplexbildungen. (Die erste, Moskauer Periode.) Übersicht u. Bibliographie für die Jahre 1903—1910. (Ann. Inst. de Platine 3. 60—69. 1924 [Russ.] Sep.) **BIKERMÄN.**
- I. I. Tschernjajew**, Untersuchungen L. A. Tschugajews auf dem Gebiete der Komplexe. (Die zweite, Petersburger Periode.) Übersicht u. Bibliographie für die Jahre 1910—1922. (Ann. Inst. de Platine 3. 70—75. 1924. [Russ.] Sep.) **BIKERMÄN.**
- W. W. Lebedinski**, Übersicht über die Arbeiten L. A. Tschugajews betreffend Platin begleitenden Metalle. Die letzte Unters. des Forschers wurde den Iridium- und Rhodiumkomplexen (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 56. 2067; C. 1923. III. 1386) gewidmet. (Ann. Inst. de Platine 3. 76—80. 1924 [Russ.] Sep.) **BIKERMÄN.**
- W. W. Lebedinski**, Institut für die Erforschung des Platins und anderer edler Metalle. Das Institut (Sitz St. Petersburg) ist von TSCHUGAJEW im Jahre 1917 begründet worden u. stand unter dessen Leitung bis zum Tode des Forschers. (Ann. Inst. de Platine 3. 81—84. 1924 [Russ.] Sep.) **BIKERMÄN.**
- J. K. Klimow**, Dem Andenken von L. A. Tschugajew. Würdigung des Verstandes L. A. TSCHUGAJEWS um die Gründung u. das Gedeihen der chem. Versuchsanstalt auf der Watny-Insel bei St. Petersburg. (Ann. Inst. de Platine 3. 85—88. 1924 [Russ.] Sep.) **BIKERMÄN.**
- Francesco Giordani**, Vorlesungsapparat zur Demonstration des Mechanismus der mehrfach wirkenden Verdampfer. (Annali Chim. Appl. 14. 310—13. 1924. Mailand, Scuola Sup. Politecn.) **ZANDER.**
- F. O. Rice, Charles F. Fryling und W. Andrew Wesolowski**, Die Beziehung zwischen dem Temperaturkoeffizienten und dem Mechanismus einer chemischen Reaktion. (Vgl. Rice, Journ. Americ. Chem. Soc. 45. 2808; C. 1924. I. 722.) Ein charakterist. Merkmal für alle zwischen gel. Stoffen mit meßbarer Geschwindigkeit verlaufenden Rkk. ist, daß diese meist organ. Rkk. katalyt. sind. Die Theorie, welche erklären soll, daß bei einer Temp.-Erhöhung von 10° die Rk.-Geschwindigkeit um 200—400% wächst, muß auf der Verallgemeinerung folgender Beobachtungen fußen: 1. die Rkk. zerfallen in verhältnismäßig wenig Klassen, von denen eine charakterist. Temp.-Koeffizienten hat, so ist z. B. für die Hydrolyse durch HCl in wss. Lsg. aller Fettsäureester, aller β -substituierten Halogenfettsäure- und Cyanessigester u. Homologe, Äthylglykolate u. Homologe $k_{35}/k_{25} = 2.4$; das

zeigt, daß der Temp.-Koeffizient weitgehend unabhängig vom Substrat ist. 2. Temp.-Koeffizient einer Rk. hängt von dem jeweiligen Katalysator ab, so ist für die Hydrolyse von Äthylacetat u. einer Reihe von Oxy- u. Alkyloxyfettestern durch wss. NaOH $k_{35}/k_{25} = 1,8$ im Vergleich zur entsprechenden Hydrolyse durch HCl, wobei $k_{35}/k_{25} = 2,4$ etc. 3. Der Temp.-Koeffizient ist unabhängig von Faktoren, welche das Lösungsm. verändern, z. B. seine Viscosität, DE., Brechungsindex etc. — Vff. nennen ein nicht hydratisiertes Ion ein „Protion“, ein nicht hydratisiertes H-Ion oder ein H-Protion ist demnach dasselbe wie das „Proton“. Daß HCl in A. 1000 mal katalyt. aktiver ist als in W. erklären Vff. durch die Annahme, daß die Konz. des H-Protions in A. 1000 mal so groß ist als seine Konz. in W. bei gleicher HCl-Konz. Aus diesem Verh. u. aus der großen Affinität des H-Protions zu W. (ca. 260000 cal. pro Mol.) wird geschlossen, daß nur ein sehr endlich kleiner Bruchteil der Gesamtheit der H-Ionen als Protionen vorhanden ist, dasselbe gilt für das Hydroxylprotion. — In allen Fällen, wo ein Gleichgewicht stark nach einer Seite verschoben ist, werden die auf der anderen Seite des Gleichgewichts stehenden Moleküle „zurückbleibende Moleküle“, „Restmoleküle“ (residual molecules) genannt, sie sind stets nur in geringer Konz. vorhanden, u. ihre Konz. ändern sich schnell mit der Temp., sie bestimmen die Temp.-Koeffizienten, so ist z. B. in $\text{CH}_3\text{COCH}_3 + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{CH}_3\text{COCH}_2\cdot\text{H}_2\text{O}$ das nicht hydratisierte CH_3COCH_3 ein Restmolekül, weil das Gleichgewicht wegen der Mischbarkeit von Aceton mit W. stark nach rechts verschoben ist, während in $(\text{CH}_3)_3\text{CCOC}(\text{CH}_3)_3 + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons (\text{CH}_3)_3\text{CCOC}(\text{CH}_3)_2\cdot\text{H}_2\text{O}$ die rechte Seite von dem Restmolekül gebildet wird, weil Hexamethylacetone in W. unl. ist. Für eine Rk. mit meßbarer Geschwindigkeit verläuft, wird gefordert, daß mindestens ein Reaktionspartner ein Restmolekül sei, u. damit wird die Existenz langsame, unimolekularer Rk. geleugnet. — Ferner wird die Berechnung der Geschwindigkeit auf Grund von Messungen durchgeführt, u. die neue Theorie bereits untersuchte Rk. (vgl. auch RICE u. LEMKIN, Journ. Americ. Chem. Soc. 45. 1896; C. 1923. III. 1585) angewandt. (Journ. Americ. Chem. Soc. 46. 244–254. 1924. New York [N. Y.], Univ. Heights.) JOSEF HOLLUTA

Josef Holluta und Alfred Martini, Kinetik und Reaktionsmechanismus der Ferrisalzreduktion durch Thiosulfat in schwach saurer Lösung. Vff. gehen davon aus, daß die Rolle der bei der Red. von Ferrisalz durch Thiosulfat intermediär gebildeten, komplexen Ferrithiosulfatverb. auf reaktionskinet. Wege zu ermitteln [H] bis zu 0,1 Mol pro Liter u. bei Anwendung von 0,001–0,005 Molen des Reduktionsmittels Teilnehmer ist die Geschwindigkeit der Rk. $2\text{Fe}^{+++} + 2\text{S}_2\text{O}_3^{--} \rightleftharpoons 2\text{Fe}^{++} + \text{S}_4\text{O}_6^{--}$ bequem meßbar. Als geeignetes Reagens, den Prozeß in jedem Augenblicke zum Stillstand zu bringen, erwiesen sich phosphorsaure Phosphatlgg., welche mit Ferrionen einen auch bei hoher Acidität stabilen Komplex bilden, u. gegen ein unverbrauchtes $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ auch bei Ggw. von Ferrosalzüberschüssen quantitativ jodometrisch zu bestimmen. Es zeigt sich, daß die Red. tatsächlich von starkem Iodüberschuß begleitet ist. Der Verlauf der Rk. ist charakteristisch für einen durch End- oder Zwischenprod. katalysierten Vorgang. Die anfangs intensive Iodfärbung verschwindet allmählich. Die Ursache der Störung läßt sich durch einen großen FeCl_3 -Überschuß beseitigen u. die Ordnung der Rk. für FeCl_3 wird nun nach der Methode von HOLLUTA (Ztschr. f. physik. Ch. 102. 36; C. 1922. III. 12) bestimmt, welche ergibt, daß ein Mol. FeCl_3 an der Rk. teilnimmt. Die Gesamtordnung ist von 2. Ordnung. Das Thiosulfation nimmt an der Zus. einer der mit je einem Mol. sich umsetzenden Molekülgattungen teil. Überschuß von $\text{S}_2\text{O}_3^{--}$ übt eine verzögernde Wrkg. aus, besonders bei geringer [H]. Im Laufe der Rk. wird durch den mit wachsendem Verbrauch des Überschusses eine Geschwindigkeitserhöhung erzielt, die jedoch gegen Ende der Rk. wieder sinkt. Eine Zers. des Thiosulfats durch

nen wird unter den angewandten Bedingungen nicht angenommen. FeCl_3 -Überschuß wirkt beschleunigend auf die Rk. Bei geringer $[\text{H}^+]$ hingegen wird die Reaktionsbeschleunigung durch FeCl_3 -Überschuß deutlich verzögert. Dieser Wechsel von Vff. durch Ggw. geringer Mengen FeOH^{2+} -Ionen erklärt. Bei Unters. der Neutralsalzwirkg. auf die Rk. wird in Übereinstimmung mit BROENSTEDTS Theorie der Reaktionsgeschwindigkeit (Ztschr. f. physik. Ch. 102. 169; C. 1923. I. 3) festgestellt, daß sie stark negativ ist. Damit steht auch die Abschwächung der Konzentrationswirkg. beider Rk.-Teilnehmer beim Verlauf der Rk. in Neutralisat. (NaCl-Lsgg.) in Einklang. Folgendes Schema wird für den Mechanismus der Rk. aufgestellt:



Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 140. 206—26. 1924. Brünn, Dtsch. Techn. Hochsch.) Jos. Karl Jellinek und Leo Winogradoff, *Über die Statik und Kinetik der Reaktion $\text{H}_3\text{AsO}_3 + \text{H}_3\text{AsO}_3 + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons 2\text{FeCl}_2 + \text{H}_3\text{AsO}_4 + 2\text{HCl}$* (Vgl. Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 129. 15; C. 1924. I. 75.) Vff. stellen das Gleichgewicht obiger Rk. bei 25°C. 127° unter beträchtlicher Variation aller Komponenten fest. $K = 3,54 \cdot 10^{-2}$. $\kappa = 1,17 \cdot 10^{-1}$ Moll/Liter. Die Wärmetönung der Rk. beträgt 18000 cal, die Oxidation von 1 Mol H_3AsO_3 nach außen gegeben werden. Die aus der Reaktionsisochore berechnete Gleichgewichtskonstante für Zimmertemp. stimmt mit der aus dem Ferri-Ferropotential u. Arsenit-Arseniatpotential ermittelten gut überein. Die Rk. verläuft von der Ferriseite allem Anschein nach trimolekular, der Geschwindigkeitskoeffizient steigt pro 10° um das 1,7fache an, durch HCl wird die Rk. stark katalysiert. Allem Anschein nach ist die Rk. auch von der Ferroseite bimolekular, der Geschwindigkeitskoeffizient steigt pro 10° um das 3fache, HCl wirkt ebenfalls katalysierend auch auf dieser Seite. Kleine Verunreinigungen, die entweder aus dem reductum oder KH_2AsO_4 stammen, beeinflussen den absol. Wert des Geschwindigkeitskoeffizienten der Ferroseite beträchtlich. — Vff. haben eine Methode entwickelt zur Analyse eines Gemisches von Ferri- u. Ferrosalz, Arsenit u. Arseniat, u. zur Best. des Säuregehalts einer Ferrisalzlg. (Ztschr. f. Elektrochem. 77—90. 1924. Danzig, Techn. Hochsch.)

ULMANN.

Richard Kuhn und Paul Jacob, *Über Mutarotation. Ein Beitrag zur Theorie der chemischen Reaktionsgeschwindigkeit*. Vff. untersuchen den Verlauf der Mutarotation verschiedener Zuckerarten bei wechselnder Wasserstoffzahl u. bei verschiedenen Salzgehalten der Lsgg., wie sie in Form von Puffergemischen bei enzymat. Verss. angewandt werden. Da eine bas. Dissoziationskonstante des Rohrzuckers durch direkte elektrometr. Messungen nicht feststellbar ist, wird diese für die Säure aus deren Säuredissoziationskonstanten u. ihrem Stabilitätsmaximum, nämlich dem Minimum der Mutarotationsgeschwindigkeit, das EULER u. HEDELIUS (vgl. Ztschr. 107. 150; C. 1920. III. 581) dem isoelektr. Punkt gleichsetzen, berechnet. Bei gleicher Konz. von Rohrzucker-Saccharase- u. von Rohrzucker- H^+ verläuft die Fermentkatalyse mindestens 1000 Mal schneller als die Inversion durch HCl. — Die mit verd. HCl- u. Bicarbonatlsgg. ausgeführten Verss. über die Geschwindigkeit der Mutarotation der Glucose ergeben bei 25° nahezu übereinstimmende Reaktionskonstanten zwischen $[\text{H}^+] = 10^{-3}$ u. $[\text{H}^+] = 10^{-7}$; innerhalb dieses Gebietes war die geringste Reaktionsgeschwindigkeit bei $\text{pH} = 4,8$. Die Dissoziationskonstante von sorgfältig gereinigter Glucose wurde bei 20° $K_a = 6,6 \cdot 10^{-13}$, auf 25° umgerechnet $K_a = 10,5 \cdot 10^{-13}$ gefunden. Es läßt sich für jede $[\text{H}^+]$ die Konz. der Glucoseanionen berechnen, u. es folgt, daß bei konstanter Reaktionsgeschwindigkeit im sauren u. im alkal. Gebiet die Konzentration der Kationen u. Anionen sich wie 2,1 : 1 verhalten müssen. Der Mittel-

wert der Basendissoziationskonstanten wird aus mehreren Versuchsreihen zu $7,8 \cdot 10^{-17}$ (25°) berechnet. — Für die Geschwindigkeit der Mutarotation wird Formel: $k = 0,0104 + 0,334 [H^+] + 9345 [OH^-]$ abgeleitet; die Proportionalität von k mit $[H^+]$ u. k ist bei Katalysatorkonz. von etwa 0,1–0,001 n. genau erfüllt. Bei größeren Aciditäten nimmt die Reaktionsgeschwindigkeit stärker zu, als es der elektronen Affinität der H-Ionen entspricht; der Faktor 0,334 ist somit für verschiedene pH -Intervalle etwas verschieden. OH-Ionen katalysieren demnach etwa 28000 mal so schnell als H-Ionen. Dieses Verhältnis kommt dadurch zustande, daß in Lsgg., von denen eine ebensoviel H-Ionen wie die andere OH-Ionen enthält, 13500 mal so viele Anionen als Kationen gebildet werden, u. daß die ersteren 2,1 mal so schnell reagieren. Der isoelekt. Punkt der Glucose ist bei $pH = 4,88$; für seine Beziehung zum Stabilitätsmaximum oder -minimum wird eine Beziehung aufgestellt.

Die Umlagerungsgeschwindigkeit der α -Glucose wird durch Zusatz von Natriumsalzen in zweifacher Weise beeinflusst. Erstens wird durch den Salzzusatz die thermodynam. Aktivität der H-Ionen verändert u. zweitens ergibt sich auch bei Berücksichtigung der pH -Verschiebung eine Änderung der Reaktionsgeschwindigkeit. Im Gegensatz zu den hydrolyt. Vorgängen ist bei der Mutarotation die Reaktionsbeschleunigung durch Neutralsalze in saurer Lsg. ausschließlich auf die Zunahme der H-Ionenaktivität zurückzuführen. Vergleicht man die Reaktionskonstanten, die sich mit u. ohne Salz bei übereinstimmender H^+ -Aktivität ergeben, so findet man, daß die Neutralsalze im ganzen untersuchten Gebiet nicht fördern, sondern im Gegenteil hemmen. Vff. nehmen im Gegensatz zu BRÖNTJE (vgl. Ztschr. f. physik. Ch. 102. 169; C. 1923. I. 562) an, daß die Reaktionsgeschwindigkeit nicht der Konz., sondern der Aktivität der reaktionsvermittelnden Moleküle proportional ist. Während NaCl u. LiCl im Stabilitätsmaximum gleich stark hemmen, nimmt die unter Berücksichtigung der pH -Verschiebung gefundene Hemmung durch Li⁺ mit steigender Acidität stärker zu als die Hemmung durch Na⁺. Die Aktivität der Glucose u. ihrer Ionen wird durch Ionen beeinflusst, zu denen gewissen Anionen ausgesprochen spezif. Wrkgg. zukommen. Bei der Mutarotation der α -Glucose in Acetatgemischen stimmt die pH -Kurve der Mutarotation zwischen $pH = 3$ u. $pH = 7$ mit der Dissoziationskurve der Essigsäure überein; sind also nur die Acetationen wirksam. In Phosphatgemischen sind die Zunahmen der Mutarotationsgeschwindigkeit nicht mehr der OH-Ionenkonz., sondern der Aktivität der sekundären Phosphationen proportional. Bei Anwendung von Citratgemischen kommt den sekundären Citrationen ein größeres Wirkungsvermögen als den tertiären. — Vergleicht man die Mutarotation von α -Lactose, α -Glucose u. α -Galaktose u. β -Mannose in Citratlsgg., so findet man, daß die minimale Umlagerungsgeschwindigkeit um so größer ist, je kleiner die entsprechende $[H^+]$ ist. Eine Ausnahme bildet nur die Arabinose, deren Mutarotationsminimum bei $pH = 3,2$ liegt.

Die Mutarotation ist entweder durch eine Ring-Kettentautomerie, bezw. durch Oxo-Cyclodesmotropie zu erklären oder durch unmittelbaren Platzwechsel der Substituenten am C-Atom 1, der ohne Ringöffnung erfolgt. Die Hydrattheorie ist von Vff. für sehr unwahrscheinlich. — Die Konst. der Glucose u. ihrer Ionen ist nach Ansicht der Vff. noch zweifelhaft. Während verschiedene Umstände gegen die Theorie von Enolionen sprechen, erblicken Vff. im Verhalten der Zucker gegen $KMnO_4$ in alkal. Lsg., das für eine langsame B. der Enolionen aus den primären Amino-Gruppen spricht, ein wichtiges Argument zugunsten der Enoltheorie. Das Minimum des Reduktionsvermögens von $KMnO_4$ durch Glucose in Phosphatgemischen erreicht sich über das nämliche Aciditätsgebiet wie das Minimum der Mutarotationsgeschwindigkeit ($pH = 3,0-4,5$); entsprechende Ergebnisse bei Lactose u. Arabinose. Die Zunahme der Reduktionswerte in alkal. Lsg. hängt mit Enolmoll. zusammen.

Geschwindigkeit der Enolisierung ist der Konz. der primären Zuckerionen proportional. In phosphathaltigen *Fructosellsgg.* tritt bei $[H] = 10^{-3}$ – 10^{-4} eine besonders reaktionsfähige Form der Fructose in nachweisbarer Menge auf. Für derartige, leicht durchführbare Zuckermodifikationen kommen, wie für die Kationen der Zucker, weniger in Betracht als solche mit verändertem O-Ring in Betracht.

Versuchsteil. Die Messungen wurden bei 25° ausgeführt. Die Reaktionskonstante ergab sich für 5% *Glucose* in $\frac{1}{10000}$ -n. u. $\frac{1}{2000}$ -n. HCl zu: $k \cdot 10^4 = 104$ bzw. 103,6. Die p_H -Bestst. wurden nach der Gaskettenmethode ausgeführt. Für *Glucose* in 0,75 mol. Phosphatlsg. ($p_H = 3,3$ – $3,4$): $k \cdot 10^4 = 739$ – 742 . — Umlageungsgeschwindigkeit der α -*Glucose* in Lsgg. von wechselndem HCl- u. $NaHCO_3$ -Gehalt: $k \cdot 10^4 = 794$ ($\frac{1}{5}$ -n. HCl), 104 ($\frac{1}{10000}$ -n. HCl), 110 ($\frac{1}{1000}$ -n. $NaHCO_3$); 424 ($\frac{1}{1000}$ -n. $NaHCO_3$). Es folgen zahlreiche Messungen, deren Ergebnisse in Tabellen zusammengestellt sind, über die Beziehungen zwischen Reaktionsgeschwindigkeit u. $[OH^-]$, zwischen $[H^+]$ u. Mutarotation in saurer Lsg. u. über die Umlageungsgeschwindigkeit der Anionen. Die Basendissoziationskonstante der *Glucose* ergibt sich zu: $K_b = 7,8 \cdot 10^{-17}$, die Säuredissoziationskonstante zu: $6,61 \cdot 10^{-13}$ (bei 25° umgerechnet auf 25° : $10,5 \cdot 10^{-13}$). — Einfluß von Neutralsalzen auf die Mutarationsgeschwindigkeit in HCl- u. $NaHCO_3$ -Lsg.: Von den Alkalisalzen erhöhen sich *LiCl* u. *NaCl* die Aktivität der H-Ionen; u. *LiCl* verzögert zwischen $p_H = 3$ u. $p_H = 6$ um etwa 10%, während es in $\frac{1}{100}$ -n. HCl ohne jegliche Wrkg. in $\frac{1}{10}$ -n. HCl eine Reaktionsbeschleunigung von 30% bewirkt. Es wurden ferner untersucht die Chloride von *K*, *Rb* u. *Cs*, *KBr*, *KJ* u. KNO_3 . — Die Absolutwerte der Reaktionskonstanten der α -*Glucose* bei 25° betragen in Puffergemischen $\frac{1}{10}$ -n. Acetat: $k \cdot 10^4 = 115$ ($p_H = 3$ – 4), $\frac{1}{30}$ mol. Phosphat: 136 ($p_H = 3$ bis 4), Citrat-HCl 125 ($p_H = 3,0$). Die Mutarotation einiger Zuckerarten in $\frac{1}{10}$ -n. Puffergemischen wird gemessen für *Glucose* $k \cdot 10^4 = 127$, *Lactose* 94, *Galaktose* 36, *Mannose* 364, *Arabinose* 499 ($p_H = 3,4$). — Über das Verh. bei der Einw. von CO_2 bei wechselnder Acidität wurden untersucht: *Glucose*, *Fructose*, *Mannose* u. *Glucose*. (Ztschr. f. physik. Ch. 113. 389–431. 1924. München, Akad. d. Wiss.) ZAN.

F. Sauerwald und K. Knehans, Über die Temperaturabhängigkeit der Härte, als spezifische Verdrängungsarbeit definiert ist, bei Metallen. Zu den Metallen linearer Abhängigkeit der Fallhärte von der Temp., *Sn*, *Al*, *Cu*, *Sb*, über die bereits berichtet ist (vgl. Ztschr. f. Metallkunde 16. 315; C. 1924. II. 2202), tritt *Pb*, bei dem die Messungen bis 267° ausgeführt werden konnten. Zwischen 25° – 267° fällt die Härte von 7,44 bis 4,24 mmkg/mm². Bei den Metallen *Mg*, *Zn*, *Ni* zeigen sowohl die Temp.-Härte-Kurven als auch die Kurven des Rückpralls einen unregelmäßigen Verlauf, was vielleicht durch Umwandlungen kryptograph. definierter Formen bedingt ist, wenn diese auch bei *Mg* nicht bekannt sind. Bei diesem Metall ist auch die Abweichung der Temp.-Härte-Kurve von einer Geraden am schwächsten, sie setzt sich aus einzelnen Geradenstücken zusammen. Aus den Verss. ließen sich Rückschlüsse auf die elast. Eigenschaften der Materialien, auf das Krystallisationsvermögen bei den verschiedenen Temp. ziehen, wie sich bei verschiedenen Temp. Deformationen in das Innere der Metalle ausbreiten. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 140. 227–42. 1924. Breslau, Univ. Hochsch.) JOSEPHY.

Edouard Saerens, Kompressibilität, innerer Druck und chemische Affinität. Journ. Americ. Chem. Soc. 46. 934; C. 1924. II. 423.) Nach der Theorie des kompressiblen Atoms (RICHARDS, Journ. Americ. Chem. Soc. 36. 2438; C. 1915. I. 101) ist der innere Druck in einer Verb., der ausgeübt wird durch Kräfte der Anziehung u. der chem. Affinität, gleichmäßig auf alle Atome verteilt. Für den inneren Druck eines binären Halogenids stellt Vf. den Satz auf, daß die spezif. Kompressibilität jedes der beiden Elemente konstant u. gleich der der Verb. ist. Dadurch

ergibt sich die Möglichkeit, die Kurve Mol.-Vol./spezif. Kompressibilität zu konstruieren. Zwei Klassen von Metallen sind zu unterscheiden: Alkali- u. Erdmetalle sind kompressibler als ihre Salze im Gegensatz zu Ag, Cu, Pb, Tl, Fe, deren Salze größere Kompressibilität zeigen als die freien Metalle. Halogenometallen der ersten Art entstehen durchweg unter Kontraktion u. Erhöhung des inneren Druckes, während bei den Metallen der zweiten Art das Eigenvolumen unter Verminderung des inneren Druckes zwar zunimmt, jedoch wie im Falle von AgCl u. AgBr von einer überwiegenden Kontraktion des Halogens verdeckt werden kann. So erklärt sich die scheinbar anormale Dilatation des AgJ (TlJ) durch die Überlegenheit der Vergrößerung des Eigenvolumens des Ag gegenüber der Kontraktion des J₂. Die Kontinuität sämtlicher Kurven Mol.-Vol./spezif. Kompressibilität ist zu Gunsten der Auffassung, daß chem. Affinität u. Kohäsion als Manifestationen desselben Grundphänomens in verschiedenen Bezirken zu interpretieren sind. Durch Extrapolation der Kurve At.-Vol./atomare Kompressibilität des Ag gelangt Vf. zu der entsprechenden Kurve des Rb. Die Verschiedenartigkeit der beiden Metalle mit gleicher äußerer Elektronenkonfiguration ist in Zusammenhang zu bringen mit der großen Differenz der inneren Drucke (Rb 1,5; Ag 20—30 at. 10⁴).

Die Kompressibilität erweist sich allgemein als Funktion des Mol.-Vol. u. des inneren Druckes. Die Beziehung zum inneren Druck (P) hat die Form einer Gleichung von dem Typus $(\beta + a) \cdot (P + b) = K$ (a , b u. $K = \text{konst.}$). Für die Zustandekommen einer Verb. aus Elementen der genannten Art ist es notwendig, daß die Kurven, die die Veränderlichkeit der spezif. Kompressibilität mit dem inneren Druck für die betreffenden Komponenten darstellen, sich schneiden. In diesen Schnittpunkten besitzen beide Komponenten denselben inneren Druck u. die fertige Verb. Beachtet man, daß die Affinität der Alkalimetalle etc. zu den Halogenen in der Reihenfolge J, Br, Cl steigt, während die des Ag etc. in gleichem Sinne fällt, so tritt die Verschiedenartigkeit der beiden obenerwähnten Metallklassen besonders scharf hervor, u. gleichzeitig erklärt sich zwanglos der große Unterschied der Bildungswärmen zweier Verb. von so ähnlicher Stabilität wie NaCl u. AgCl (Journ. de Chim. physique 21. 265—80. 1924. Brüssel, Univ.) GOLTERMANN.

Ernst Cohen und H. R. Bruins, *Der Zusammenhang zwischen Diffusionsgeschwindigkeit, Viscosität und äußerem Druck*. (Vgl. Koninkl. Akad. van Wetensch. Amsterdam, Wisk. en Natk. Afd. 33. 199; C. 1924. II. 442.) Vf. beschreiben eine Methode zwecks Ausführung genauer Viscositätsmessungen, auch bei hohem inneren Druck. An Hand dieser Methode wurde der Einfluß des äußeren Druckes auf die Viscosität von Hg (bei 20°) untersucht. Die Viscosität wird durch einen Druck von 100 at. um 4,8% erhöht. Da die Diffusionsgeschwindigkeit eines Metalles in Hg unter denselben Bedingungen um 5% abnimmt, gilt daher die Beziehung: das Produkt aus Diffusionsgeschwindigkeit und Viscosität ist konstant, unabhängig vom äußeren Druck. (Koninkl. Akad. van Wetensch. Amsterdam, Wisk. en Natk. Afd. 33. 667—77. 1924. Utrecht.) K. WILHELM.

L. J. Simon, *Verfolgung der Neutralisation der Chlorsäure mittels der Viscosimetrie*. Vf. erstreckt seine früheren viscosimetr. Unterss. (vgl. C. r. d. l'Acad. des sciences 178. 1076. 1606; C. 1924. II. 20. 1428) nun auch auf eine einbas. Säure auf HClO₃. Die Konstanten der hyperbol. Gleichung: $\eta \times 10^4 = k(a - b) + b$ [Druckfehler in der l. c. angegebenen Gleichung: ergeben sich zu $a = 33,3$, $b = 37,38$; $k = 32,56$, wenn $\eta \times 10^4 = 139,32$ bei 8,3° u. $\eta \times 10^4 = 92$ bei 25,2° für 1-n. HClO₃. Die Viscosität während der Neutralisation mit KOH u. NaOH wurde bei 15° untersucht. Das Minimum der Viscosität tritt für beide Basen bei dem äquimolekularen Verhältnis von Säure u. Base auf, d. h. bei der neutralen Salze. Die Viscositäten der wss. Lsgg. als Funktion des Äquivalenzgewichtes (Θ -molar) werden durch folgende linearen Gleichungen dargestellt:

$\text{HClO}_3: \eta \times 10^4 = 112,54 + 4,38 \theta \quad (0,5 < \theta < 2)$
 $\text{NaClO}_3: \eta \times 10^4 = 112 + 8,52 \theta \quad (0,25 < \theta < 1)$
 $\text{KClO}_3: \eta \times 10^4 = 112,46 - 3,32 \theta \quad (0,25 < \theta < 0,5)$

(r. d. l'Acad. des sciences 179. 822–25. 1924.)

JOSEPHY.


H. G. Grimm (nach Versuchen mit **Erich Köstermann**, **Gustav Wagner** und **Paul Beyersdorfer**), *Neuartige Mischkrystalle. 7. Mitteilung über Ioneneigenschaften chemische Tatsachen.* (Vgl. Ztschr. f. Krystallogr. 57. 574; C. 1923. III. 1507.)
 Nach Vf. kommt es bei der B. von Mischkrystallen in polar gebauten Substanzen darauf an, daß Ladung, Bau u. Größe der Ionen die Einstellung eines ähnlichen Gitterabstandes ermöglichen; chem. Analogie spielt keine ausschlaggebende Rolle. Mit **Erich Köstermann** zeigt Vf., daß sich aus einer *NaBr*-Lsg. Krystalle mit frischen Spaltflächen von *PbS* orientiert zu ihrer Unterlage ausscheiden. Auch mit *NaCl* gelingt der Vers., nicht mehr mit *RbBr*. Weiter lassen sich Mischkrystallbildung zwischen *NaBr* bzw. *NaCl* u. *KOH* wie auch bei verschiedenen Alkalihalogenid-Stoffpaaren nachweisen, so bei *RbCl* u. *NaJ*. Mit **Gustav Wagner** untersucht Vf. die Befähigung des Stoffpaares *BaSO₄* u. *KMnO₄* zur Mischkrystallbildung. Die quantitativ-analyt. u. mkr. Unters. der erhaltenen roten Krystalle zeigen, daß bei konstanter Ba^{++} - u. SO_4^{--} -Menge u. konstanter Temp., die in das Gittergitter von *BaSO₄* eingebaute *KMnO₄*-Menge mit der bei der Ausfällung in der Lsg. befindlichen *KMnO₄*-Menge, bis zu einem Maximum von ca. 8 Molprozenten wächst; bei weiterer Steigerung der *KMnO₄*-Konz. in der Lsg. nimmt die eingebaute *KMnO₄*-Menge wieder etwas ab. Erhöhung der Temp. vergrößert die Möglichkeit *KMnO₄* einzubauen. Abnahme der Ba^{++} - u. SO_4^{--} -Ionenkonz. begünstigt das Einbauen von *KMnO₄* unter gleichzeitig erfolgender Zunahme der Gitterchengröße. Diese „neuartigen“ Mischkrystalle sind, nachdem oberflächliches *KNO₃* entfernt ist, unempfindlich gegen Säuren u. Laugen, gegen Oxydations- u. Reduktionsmittel; sie sind aber lichtempfindlich. Dagegen gibt *BaSO₄* mit *NaMnO₄* krystalline, etwas bläulichere, Krystalle, die zerfallen allmählich. Weiter lassen sich vereinigen *Ba*-, *Sr*-, *PbSO₄*- mit *K*-, *NH₄*-, *NaMnO₄*; *Ba*-, *Sr*-, *PbSeO₄* mit *KNO₃*; *BaCrO₄* mit *KMnO₄*; *KBF₄* mit *KMnO₄* u. *BaSO₄*; *CaCO₃* mit *NaNO₃*. Die Farbtiefe der gefärbten Mischkrystalle, welche ein qualitatives Maß für die eingebaute Menge darstellt, ist um so größer, je ähnlicher die top. Achsen der Komponenten sind. Farbenunterss. der Vff. an verschiedenen Mischkrystallreihen zeigen, daß bei Ausfällung von SO_4^{--} gemeinsam mit MnO_4^{--} , mit Ba^{++} Krystalle erhalten werden, deren Farbe je nach dem MnO_4^{--} -Gehalt von hellviolett, über violett bis dunkelblaugrün geht, u. die bis zu einem erheblichen MnO_4^{--} -Gehalt die chem. Unangreifbarkeit des *BaSO₄* aufweisen. Mischkrystalle von *SrCrO₄* u. *SrMnO₄* zeigen Farben von hellgelbgrün über dunkelgrün bis blau; Mischkrystalle von *BaCrO₄* u. *BaMnO₄* zeigen bei geringem MnO_4^{--} -Gehalt Abnahme der Farbstärke vom Gelb des *BaCrO₄* zu einem blassen Schwefelgelb, welches dann über graublau u. indigoblau zur Farbe des reinen *BaMnO₄* vertieft. Mischkrystalle von *BaSO₄* mit *BaFeO₄* sind hellbraun bis ziegelrot, in ihnen ist das hochempfindliche *FeO₄* vor chem. Angriffen ebenfalls so lange geschützt, als *BaSO₄* unangegriffen bleibt. Weitere Mischkrystallreihen erhält man allmählich, wenn man Verbb. vom Typus *MXO₄*, in denen $\text{M}^{VI} = \text{Ba}, \text{Sr}, \text{Pb}$ u. $\text{X}^{VI} = \text{S}, \text{Se}, \text{Cr}, \text{Mn}, \text{Fe}, \text{Mo}, \text{W}$ ist, durch gemeinsame Fällung herstellt. Mit **Paul Beyersdorfer** zeigt Vf., daß man fast alle oben erwähnten Mischkrystalle zur Erzeugung von lichtechten Färbungen auf Seide, Kunstseide, Wolle, Baumwolle, Leder benutzen kann. (Ztschr. f. Elektrochem. 30. 467–73. 1924. München, Ber. Akad. d. Wiss.)

ULMANN.


A. Quartaroli, *Neuere Untersuchungen über Autokatalysatoren.* Die Zers. von verschiedenen Konz. durch Metallhydroxyde bzw. Oxyde wird quantitativ

verfolgt. Untersucht wird die Einw. von folgenden Elementen: Cr, Mn, Fe, Ni, Cu, Ag, Au, Hg, Pb, Bi, Mg, Zn, Al, Cd. Bei den Verss. wurde nicht nur die Konz. des H_2O_2 , sondern auch die der Oxyde bzw. Hydroxyde variiert. (führliche Tabellen im Original.) (Gazz. chim. ital. 54. 713—50. 1924. Pisa, Th. Hochsch.)

K. A. Hofmann und Alfred Dolde, Beschleunigung der Knallgaskatalyse von Sauerstoffüberträger und durch Wechselstrom. (Vgl. K. A. Hofmann, Ber. Dtsch. Chem. Ges. 56. 1166; C. 1923. III. 190.) Die an dem mit wss. Elektrolyten benetzten Pt-Kontakt nach dem zweistufigen Schema:



verlaufende Knallgaskatalyse, die sowohl durch die B. von Platinhydrid wie auch durch die B. von trägem Platindaueroxyd beträchtlich geschwächt wird, kann auch den vorliegenden Verss. der Vff. durch O_2 -Überträger u. durch Anlegung von Wechselstrom wesentlich gefördert werden. Die Anlegung von Wechselstrom hindert die während der Katalyse eintretende B. von Pt-Hydrid u. Pt-Oxy. Beim Zutritt von H_2 - u. O_2 -Molekülen aus dem Gas zum Pt eilt H_2 dem O_2 voraus, weil ersterer viermal rascher die benetzende Fl.-Haut durchdringt u. so wird Pt sehr schnell zu einem kräftigen Pt-H-Pol, der auf O_2 unter B. von H_2O als Titansulfat reduzierend wirkt. Durch den Zusatz von kleinen Mengen Vanadylsulfat zur 1-n. H_2SO_4 , welches ein schnell reduzierbares u. wieder oxydierbares Oxyd vorstellt, gelingt es durch Abkürzung der Zeit für die Diffusion des O_2 durch die Fl.-Haut, die Katalysegeschwindigkeit G zu erhöhen. Noch bei einem O_2 -Geh. von 45% wird Vanadylsulfat merklich oxydiert, hingegen schon bei 5% O_2 werden die niederen Oxyde teilweise wieder oxydiert. Die Vermittelung der B. von H_2 zwischen Pt-H u. O_2 entspricht dem Schema:



Nach O_2 -Vorbeladung des Kontakts tritt eine erhebliche Steigerung des G ein, wenn 0,5 g VO_3/NH_3 zugesetzt werden. Diese Steigerung kann nicht durch einfachen Verbrauch von H_2 seitens der Vanadinsäure vorgetauscht werden. Vielmehr wird sie bewirkt durch eine sehr geringe Menge am Pt-Kontakt adsorbiertes niederes Vanadinoxid (V^{IV}), wodurch der O_2 nach Pt-H rascher als durch Diffusion übermittelt wird. Aus V^{V} bildet sich dieses Oxyd während der Katalyse, wie die Zunahme des G nach mehrmaliger Füllung mit Knallgas erkennen läßt. Auch die Schädigung durch H_2 -Vorbeladung wird durch das wirksame Oxyd zum Verschwinden gebracht. Aus der Farbe der Lsg. am Kontakt erhellt, daß nicht V^{III} oder V^{II} sondern V^{IV} der wirksame Überträger sein muß, denn nach längerer Katalyse ist diese blau dem V^{IV} entsprechend, nachdem vorher die entsprechenden Mischfarben von gelb (V^{V}) u. blau (grünlich) aufgetreten waren.

Bei reiner 1-n. H_2SO_4 liegt das Maximum von G bei 40% O_2 im Knallgas, durch die Anwesenheit von V^{IV} wird dieses Maximum jedoch schon bei der niedrigen O_2 -Konz. des Knallgases erreicht. Nach wiederholter Füllung mit 25% O_2 sinkt der Wert von G u. am Kontakt tritt die nur von H_2O_2 herstammende Farbe von Vanadinsäure auf. H_2 ist zwar hier noch mit 75% bei der Bedeckung des Pt. geschüssig u. man könnte eine vollständige Red. des O_2 zu H_2O erwarten; doch in der bei überschüssigem Gehalt an H_2 die Fähigkeit des Pt, als Pt-H-Pol zu wirken, O_2 gelangt somit schneller zum Kontakt, als er dort reduziert werden kann. In der ersten Red.-Stufe (H_2O_2) bleibt erhalten, das aufoxydierte Vanadinoxid wird nicht mehr reduziert, sondern bildet mit H_2O_2 die Pervanadinsäure.

Die bei der Anlegung von Wechselstrom gemachte Beobachtung, daß die B. von Pt-Daueroxyden u. Hydriden verhindert wird, tritt in ihrer Wrkg. erst nach 1 Minute ein u. kann nicht dadurch verursacht sein, daß die abwechselnden Pol. der Elektrolyse von den Molekülen des Knallgases verbraucht werden. Der Effekt

Periodenzahl des Wechselstromes ist von 50 an nur gering. Auch Auflockerung Pt u. Ozonisierung des Knallgases kann die Wrkg. nicht erklären. Somit ist die Wechselfrequenz entscheidend, sondern die Stromstärke. Die Beseitigung Störungen durch das Oxyd u. Hydrid ist nach Ablauf von 1 Minute erfolgt. Nach dieser Zeit hat auch die frühere Beladung des Kontakts keinen Einfluß auf die Entw. von G. Nebenher können auch die mit der Ionenwanderung zusammenhängenden Konvektionsströme in der adsorbierten Fl.-Haut den Zutritt H_2 u. O_2 zu der katalysierenden Oberfläche des Pt erleichtern. (Ber. Dtsch. n. Ges. 57. 1969—76. 1924. Berlin, Techn. Hochsch.)

HORST.

Max Bodenstein, *Ein Beitrag zur Theorie der katalytischen Hydrierung* durch H_2 . Auf Grund von Messungen mit **Buchholz** um festzustellen, bei welchem Verhältnis $H_2 : O_2$ aus einer wasserstoffbeladenen Elektrode eine sauerstoffbeladene, konnte Vf. bestätigen, daß H_2 u. O_2 am Pt unverträglich sind, es tritt sofort H_2O ein. Daher ist es ganz unwahrscheinlich, daß ein Platinsuperoxyd der Katalysator der Hydrierungsreaktionen sein kann, welches abwechselnd H_2 addiert abgibt. Die Reaktionsbeschleunigung bei der Hydrierung — wie allgemein bei heterogenen Katalyse — läßt sich darauf zurückführen, daß die an der Oberfläche des festen Körpers adsorbierten Mol. infolge der von dieser Oberfläche ausströmenden Kraftfelder deformiert werden, daß sie also nicht mehr die reaktionsunfähigen Gebilde darstellen, wie im Gasraum. Mit dieser Auffassung ist auch die Reaktion verträglich, daß durch lange Behandlung mit H_2 der Katalysator an Wirksamkeit einbüßt, die durch O_2 dann regeneriert werden kann. (LIEBIGS ANN. 4. 177—85. 1924. Berlin, Univ.)

ULMANN.

A. Atomstruktur. Radiochemie. Photochemie.

C. T. Zahn, *Das elektrische Moment gasförmiger Moleküle der Halogenwasserstoffe*. Vf. beschreibt die von ihm benutzte Versuchsanordnung u. Meßmethode. Meßergebnisse lassen sich gut durch die DEBYESche Gleichung $(\epsilon - 1) \cdot v \cdot T = A + B$ darstellen, wo v spezif. Vol. u. T die absol. Temp. bedeuten. Es wurde gefunden: 0,001040 (HCl), 0,001212 (HBr) u. 0,001856 (HJ); für B : 0,895 (HCl), 0,52 (HBr) u. 0,12 (HJ). Die für das elektr. Moment der Moll. gefundenen Werte sind, in 10^{-18} e. g. s.-Einheiten: 1,034 (HCl), 0,79 (HBr) u. 0,38 (HJ). Die Werte für $(\epsilon - 1) \cdot 10^6$ bei 0° u. 760 mm Hg sind 265, 518, 581 u. 572 für H_2 , O_2 , N_2 , $Luft$, — wahrscheinlich innerhalb $\frac{1}{2}\%$ genau. (Physical Review [2] 24. 417. 1924. Princeton-Univ.)

K. WOLF.

A. T. Waterman, *Die Variation der thermionischen Emission mit der Temperatur und die Konzentration freier Elektronen in Leitern*. Vf. diskutiert seine Physical Review [2] 22. 259; C. 1924. I. 1486) u. die Dushmansche Formel. Versuchsdaten sind nicht genügend genau, um zwischen beiden Formeln zu unterscheiden. Es werden die Konz. freier Elektronen in verschiedenen Metallen, u. CaO aus Versuchsdaten berechnet. Für Metalle bei 0° ergibt sich für die Konz. eine Größenordnung von 10^{17} pro cem; die Konz. nimmt mit steigender Temp. ab. (Physical Review [2] 24. 366—67. 1924. Yale Univ.)

K. WOLF.

P. A. M. Dirac, *Die Bedingungen für das statistische Gleichgewicht zwischen Materie, Elektronen und Strahlung*. (Vgl. Proc. Cambridge Philos. Soc. 22. 131; C. 1924. II. 1060). Vf. zeigt bezüglich reversibler Rkk. (vgl. KLEIN u. ROSSELAND, Z. f. Physik 4. 46; C. 1921. III. 694), daß die van't Hoffsche Isochore universelle Geltung besitzt. Aus dem Planckschen Strahlungsgesetz wird abgeleitet, daß jeder Strahlung emittierende Vorgang durch äußere Strahlung derselben Frequenz angeregt wird u. das Verhältnis zwischen angeregter u. spontaner Emission unabhängig von der Natur des Vorganges u. umgekehrt proportional der dritten Potenz der Frequenz ist. Vf. wendet seine Rechenmethode an auf die Ableitung

von Formeln (SAHA, FOWLER) für den Ionisationsgrad eines Gases. (Proc. Soc. London Serie A 106. 581—96. 1924. Cambridge.) K. W.

C. A. Mackay, *Ionisationspotentiale mehratomiger Gase*. Vf. bestimmt Ionisationspotentiale für He u. 15 anorgan. Gase. Es ergaben sich nachstehende Zahlen in Volt: He 24,5, H₂ 15,8, N₂ 16,3, O₂ 12,5; 16,1, HCl 13,8, HBr 12,8, HI 12,8, W. 13,2, NH₃ 11,1, Cl₂ 13,2, Br₂ 12,8, J₂ 10,0, NO 9,4, CO₂ 14,3, C₂H₄ 15,6, H₂S 10,4. Die Diskussion über die thermochem. Methode zur Best. von Ionisationspotentialen ist im Original nachzulesen. (Physical Review [2] 24. 31—32. 1924. Princeton, Univ.) K. W.

Ragnar Holm, *Der gegenwärtige Stand der Theorie des Glimmstroms*. Zusammenfassender Bericht mit ausführlichem Literaturnachweis. (Physikal. Zeitschrift 25. 497—535. 1924.) BEH.

P. L. Kapitza, *Die Bahnen von α -Strahlen in einem starken magnetischen Feld*. (Vgl. Proc. Royal Soc. London Serie A 102. 48; C. 1923. I. 9.) Vf. beschreibt einen Wilsonschen Expansionsapp. zur Erzeugung von α -Strahlenbahnen in einem magnet. Feld. Es wurden diese gekrümmten Bahnen in Luft u. H₂ photographisch aufgenommen, gemessen (unter Mitarbeit von E. J. Laurmann) u. der Mittelwert von e/v der α -Teilchen für verschiedene Teile des Bereiches von 1—20 m. angegeben. Schließlich wird die Geschwindigkeitskurve der α -Teilchen am Ende ihrer Bahn abgeleitet. (Proc. Royal Soc. London Serie A 106. 602—22. 1924.) K. W.

L. F. Bates, *Über die Reichweite von α -Teilchen in seltenen Gasen*. (Vgl. BATES u. ROGERS, Nature 112. 435; C. 1924. II. 427.) Vf. beschreibt die von ihm benutzten App. Für die mit He, Ne, Ar, Kr, Xe durchgeführten Verss. wurde die Scintillationsmethode angewandt. Für die Beziehung zwischen Bremskraft u. At.-Gew. wird folgende Formel aufgestellt: $\log(\text{Bremskraft}) = 0,65 \cdot \log(\text{At.-Gew.}) - 1,1$. (Proc. Royal Soc. London Serie A 106. 622—32. 1924. Cambridge.) K. W.

D. H. Black, *Das β -Strahlenspektrum von Mesothorium 2*. (Vgl. ELLIS, Proc. Royal Soc. London Serie A 101. 1; C. 1922. I. 1353.) Das in 5 Tabellen angeordnete Zahlenmaterial stützt die Theorie, daß die Elektronen von den verschiedenen Energieniveaus im Atom durch γ -Kernstrahlen emittiert werden, u. daß die γ -Strahlung durch Energieübergänge im Kern entstehen. (Proc. Royal Soc. London Serie A 106. 632—40. 1924. Cambridge.) K. W.

D. R. Hartree, *Über einige Beziehungen zwischen den optischen Spektren verschiedener Atome gleicher Elektronenstruktur*. I. Li- und Na-ähnliche Atome. (Proc. Royal Soc. London Serie A 106. 552—80. 1924. — C. 1925. I. 198.) K. W.

J. H. van Vleck, *Die Absorption der Strahlung durch mehrfach periodische Bahnen, und ihre Beziehung zum Korrespondenzprinzip und dem Rayleigh-Jeans-Gesetz*. I. Einige Erweiterungen des Korrespondenzprinzips. (Vgl. Philos. Magazine [6] 44. 842; C. 1923. III. 889.) Vf. behandelt zunächst die quantentheoretische Lösung des Problems. Das Korrespondenzprinzip wird in der Weise erweitert, daß sowohl Absorption wie auch spontane Emission umfaßt. Es wird gezeigt, daß die quantendifferentielle Dispersion sich asymptot. derjenigen Dispersion nähert, die sich gemäß der klass. Theorie aus der wirklich mehrfach period. Bahn in stationären Zuständen ergibt. Diese asymptot. Beziehung für die allgemein nicht degenerierten mehrfach period. Bahn ist als wichtiges Argument für die Kramerssche Formel anzuspreehen. (Physical Review [2] 24. 330—46. 1924.) K. W.

J. H. van Vleck, *Die Absorption der Strahlung durch mehrfach periodische Bahnen und ihre Beziehung zum Korrespondenzprinzip und dem Rayleigh-Jeans-Gesetz*. II. Berechnung der Absorption durch mehrfach periodische Bahnen. (Vorst. Ref.). Mathematisch. (Physical Review [2] 24. 347—65. 1924. Princeton Univ.) K. W.

K. Schierkolk, *Das ultrarote Absorptionsspektrum des Ammoniaks*. Messungen der Absorption des NH_3 von $0,589 \mu$ bis $14,4 \mu$, wobei Vf. eine Reihe neuer sehr intensiver Banden namentlich im kurzwelligen Ultrarot feststellt u. verschiedene Banden weiter auflöst. Einige Werte für das Trägheitsmoment des NH_3 werden angegeben. (Ztschr. f. Physik **29**. 277—87. 1924. Hannover.) **ULMANN.**

W. Dahmen, *Über das Funkenspektrum des Kaliums*. I. Mitt. Tabellar. Wiederholung der Messungen des K-Funkenspektrum von $3400-7000 \text{ \AA}$. Bei qualitativem Vergleich kann die Ähnlichkeit des K- mit dem Ar-Spektrum als gesichert angenommen werden. (Ztschr. f. Physik **29**. 264—66. 1924. Bonn, Univ.) **ULMANN.**

A. L. Narayan, D. Gunnaiya und K. R. Rao, *Absorption und Dispersion von Natriumdampf*. (Proc. Royal. Soc. London, Serie A. **106**. 596—601. — C. 1924. I. 1559.) **K. WOLF.**

Felix Joachim v. Wiśniewski, *Zur Theorie des Funkenspektrums des Aluminiums*, thematisch. (Physikal. Ztschr. **25**. 477—80. 1924.) **K. WOLF.**

Felix Joachim v. Wiśniewski, *Das Bogenspektrum von Natrium*. Vf. entwickelt eine Theorie der Serienterme des Bogenspektrums von Na. (Physikal. Ztschr. **25**. 480—82. 1924.) **K. WOLF.**

J. H. Reiniers jr., *Das Spektrum von Eisen-Kohlenstoffgemischen*. Nach TROWBRIDGE (Philos. Magazine **41**. 450 [1896]) fehlt im Bogenspektrum (Elektrode aus 30% Fe u. 70% C) das C-Spektrum. Vf. überprüft die Angaben von TROWBRIDGE u. gelangt zu folgendem Ergebnis: Ein „Kohlenstoffeisentropfen“ wurde als Cyan- u. Kohlenstoff-Banden untersucht, indem der Tropfen halbiert u. jede Hälfte als Elektrode bei einer Gleichstrombogenentladung benutzt wurde. Der Fe-Gehalt konnte nicht unter 75% gebracht werden. Cyan- u. C-Banden waren nicht zu beobachten. Verss. mit Elektroden aus reduziertem Fe-Pulver u. pulvrigem C zeigen zunächst, daß Eisentröpfchen gebildet werden u. zwar bei geringem Fe-Gehalt winzig kleine u. nur wenige. Bei zunehmendem Fe-Gehalt werden sie größer u. zahlreicher, während bei einem Fe-Gehalt $>60\%$ die Gesamtelektrodenoberfläche bald eine flüssige Kuppe aufweist, in der dieselben Erscheinungen wie bei „Eisenkohlenstofftropfen“ auftreten. Bei 30% Fe in den Elektroden tritt die C-Banden (ebenso die anderen Cyanbanden) stark auf. Werden die Aufnahmen gemacht, nachdem sich die Kuppen auf den Elektroden gebildet haben, so werden die C-Banden unterdrückt. Dadurch, daß nach Entfernung der Kuppen der Lichtbogen gezwungen wird, das Eisenkohlenstoffgemisch anzugreifen, treten die C-Banden wieder auf, z. B. λ 3885 bei ca. 90% Fe. Es besteht demnach ein prinzipieller Unterschied im Verh. zwischen den sog. „Eisenkohlenstofftropfen“ u. Eisenkohlenstoffgemischen. — Vf. untersuchte ferner die mit homogenen Cu-C-Gemischen als Elektroden erhaltenen Spektren auf die C-Banden λ 5165, 30 bis zu 33% Cu. Hierbei wird die Bande mit zunehmendem Cu-Gehalt schwächer, aber nicht unterdrückt. (Koninkl. Akad. van Wetensch Amsterdam, Wisk. en Natk. Afd. **33**. 655—660. 1924. Utrecht.) **K. WOLF.**

St. Procopiu, *Über die Breite der Bogenspektrenlinien bei verschiedenen Drucken*. (J. C. r. d. l'Acad. des sciences **178**. 1368; C. 1924. II. 1055.) Unter Anwendung der Interferenzmethode wurde die Variation der Breite der Bogenserienlinien zwischen Zn, Cd, Ca, Al mit dem Druck, zwischen 1 u. 760 mm Hg untersucht. Es zeigt sich, daß in qualitativer Übereinstimmung mit der Stark'schen Hypothese der Einfluß des intramolekularen Feldes, die Breite mit der Ordnungszahl der Reihe zunimmt. Die Breite kathod. emittierter Funkenlinien ist größer als die der anod. emittierten. Die Flammenlinien sind breiter als die Bogen- oder Funkenlinien. Vf. deutet die beiden letzten Ergebnisse entsprechend der Stark'schen Hypothese, durch den Einfluß der die untersuchten Strahlungen zu

emittieren befähigte Teilchenzahl. (Journ. de Physique et le Radium [6] 5. 2 bis 224. 1924.) K. WOL.

E. Warburg, *Die Quantenregeln in der Photochemie*. Die von EINSTEIN in die photochem. Erscheinungen erweiterte Plancksche Quantenhypothese besagt, daß bei der Absorption nur eine bestimmte Anzahl der Moleküle beansprucht wird, nämlich soviel, als in der absorbierten Strahlung Quanten $h\nu$ enthalten sind. Es wird angenommen, daß immer nur ein Quant absorbiert wird. Die mittlere kinetische Translationsenergie eines Gasmol. bei 20° ist nur der 163. Teil eines Quantes $h\nu$, $\lambda = 0,2 \mu$. Daraus erklärt sich die hohe Wirksamkeit absorbierten Lichtes, insbesondere solche von kurzer Wellenlänge. Die Beanspruchung des Mol. ist unabhängig von der Frequenz, unabhängig von der Intensität der Strahlung. Das Einsteinsche Äquivalentgesetz ist dem Faradayschen Gesetz der elektrolyt. Erscheinungen parallel zu setzen, nur mit dem Unterschied, daß im allgemeinen die Anzahl der Primärprozesse nicht gleich der Anzahl der beanspruchten Moleküle ist, es gilt also nur für den Grenzfall, daß beide Zahlen gleich sind. Bestätigungen liegen vor bei der B. von O₃ aus O₂, bei der Zers. von HBr, von HJ, von Bi in Ggw. von C₆H₁₂, von Cl₂ in Ggw. von CCl₃Br, von Monochloressigsäure. Nüchternen ersten drei Fälle sind beweisend, da die übrigen Rkk. auch im Dunkeln stattfinden. Für die Assimilation der Pflanzen wurde die Gültigkeit des Äquivalentgesetzes durch O. WARBURG wahrscheinlich gemacht. — Energieabgabe während des Absorptionsaktes hat Nichtgültigkeit des Äquivalentgesetzes zur Folge. Ist das Quantum für eine Dissoziationsarbeit zu klein, so kann trotzdem Umsatz eintreten, dann beanspruchte Mol. das aufgenommene Quant mitzuführen befähigt ist, beim Zusammenstoß mit einem unbeanspruchten ist Rk. möglich. Für die von WEIGER entdeckte Sensibilität der Ozonzers. durch Cl nimmt BONHÖFFER Gültigkeit des Äquivalentgesetzes an. (Naturwissenschaften 12. 1058—63. 1924.) KELLERMAN.

Tomasz Bialobjeski, *Betrachtungen über innere Diffusion und wahre Absorption des Lichtes*. Mathematisch. (Journ. de Physique et le Radium [6] 5. 269—79. 1924.) K. WOL.

Y. Ricard, *Zur Theorie der Diffusion des Lichtes in Flüssigkeiten*. Mathematisch. (Journ. de Physique et le Radium [6] 5. 280—88. 1924.) K. WOL.

Seiichi Higuchi, *Über die Absorption nahezu infraroter Strahlung von Alaunen*. (Vgl. SCHÄFER u. SCHUBERT, Ann. der Physik [4] 50. 337. 55. 37. C. 1916. II. 453. 1918. II. 306 u. VEGARD, Ann. der Physik [4] 58. 291; C. 1919. I. 812.) Die starken Absorptionsbanden der Alaune liegen für AlRb(SO₄)₃·12H₂O bei $\lambda_1 = 3,52 \mu$, $\lambda_2 = 3,05 \mu$; CrNH₄(SO₄)₃·12H₂O bei $\lambda_1 = 3,30 \mu$, $\lambda_2 = 3,1 \mu$; AlNH₄(SO₄)₃·12H₂O bei $\lambda_1 = 3,42 \mu$, $\lambda_2 = 3,02 \mu$; RbNH₄(SO₄)₃·12H₂O bei $\lambda_1 = 3,50 \mu$, $\lambda_2 = 3,05 \mu$; TiNH₄(SO₄)₃·12H₂O bei $\lambda_1 = 3,45 \mu$, $\lambda_2 = 3,1 \mu$; AlK(SO₄)₃·12H₂O bei $\lambda_1 = 3,35 \mu$, $\lambda_2 = 3,10 \mu$; CrK(SO₄)₃·12H₂O bei $\lambda_1 = 3, \mu$, $\lambda_2 = 3,05 \mu$. Da die Lage des Maximums der Energieverteilung dem Reflexionsmaximum entspricht, bestätigen diese Unterss. die Ergebnisse von SCHÄFER (The Science Reports of the Tôhoku imp. Univ. 12. 359—63. 1924.) JOSEPH.

E. Warburg, *Kritisches zu der Arbeit von W. Th. Anderson jr. Die Photolyse von Kaliumnitratlösungen*. Vf. weist die von ANDERSON (Journ. Americ. Chem. Soc. 46. 797; C. 1924. II. 426) an seiner Berechnung der spezif. photochem. Wkg. bei der Zers. von KNO₃ geübte Kritik zurück, da bei seinen eigenen Verss. die gebildete Nitritmenge stets so klein war, daß sie die Wrg. des Lichts auf den ursprünglichen Photolyten nicht merklich beeinflusste. (Ztschr. f. Physik 29. 44. 1924. Charlottenburg.) KRÜGI.

H. Berthoud und A. Bellenot, *Beitrag zum Studium der Photochemie der Halogene. Wirkung des Lichts auf die Reaktionen von Brom oder Jod mit Kaliumoxalat*. (Journ. de Chim. physique 21. 308—50. 1924. — C. 1924. II. 585.) GLT.

Rudolf Tomaschek, *Über die Phosphoreszenzeigenschaften der seltenen Erden-Erdalkaliphosphore.* II. (I. vgl. Ann. der Physik [4] 75, 109; C. 1924, II. 1.) Die vom Vf. gefundenen Gesetzmäßigkeiten im Einfluß des Grundmaterials auf den Aufspeicherungs- u. Emissionsvorgang werden zusammengestellt, durch Verss. an Sm-Oxyd- u. -Sulfidphosphoren ergänzt u. die Lenardschen Vorstellungen über den Aufbau u. Phosphoreszenzmechanismus weiter entwickelt. Mit steigendem Atomgewicht des Erdalkalis geht die Erregungsverteilung für das gleiche Maximum der Emissionen in längeren, das Emissionsspektrum unter Abnahme der Dublett-Intensität in die Hauptlinien zu kürzeren Wellen über; ferner tritt Veränderung der relativen Intensität der Teilgruppen u., besonders bei ZnS, starke Verschiebung der relativen Helligkeit der einzelnen Linien ein. Die Schärfe der Linien nimmt beim Übergang von Ca- zu Ba-Phosphoren ab. Oxydphosphore besitzen im allgemeinen eine höhere Phosphoreszenzfähigkeit, höhere Temperaturlage u. größere Linienschärfe. Das Spektrum ist gegenüber den Sulfidphosphoren nach längeren Wellen verschoben bei gleichzeitiger Verbreiterung des Doppellinienabstandes. ZnS wirkt wie ein Filter. Die Zusammengehörigkeit über das ganze Spektrum verteilter Linien zu einer Gruppe geht aus der Gleichheit der Erregungsverteilung der Teilgruppen bei Erregung mit monochromat. Licht verschiedener Wellenlänge bei konstanter Temp. hervor. Der ident. Abklingungsverlauf der Linien bei verschiedenen Tempp. hervor. Das Spektrum aller Sm-Phosphore ist in drei gleichartig aufgebaute Häufungen eingeteilt, die wahrscheinlich durch magnet. Einflüsse aufgespaltene Linien darstellen.

Die Möglichkeit zur B. von Phosphoreszenzzentren beruht nach Ansicht des Vf. auf der Fähigkeit der Erdalkalimetalle zur Betätigung von Nebenvalenzen, durch die eine größere Zahl von Erdalkalisulfid- bzw. -Oxydmolekülen zu einem Komplex vereinigt u. die Anlagerung des Gattungsatoms der Schwermetallverbindungen an ein Erdalkaliatom bewirkt wird. Der von Ca zu Ba fallenden Bildungswärme der Sulfide entspricht die Abnahme der Fähigkeit zur Zentrenbildung, Lockerung der Bindung Gattungssatom—Erdalkaliatom unter Festigung der Bindung Gattungssatom—Schwermetallatom, u. Verminderung der Gestörtheit der Elektronenbahnen der letzteren, woraus sich das Sinken der Lichtsumme, die Verringerung der Wellenlängenabstände u., den Starkeschen Vorstellungen zufolge, die Verschiebung der Erregungsverteilung u. des Emissionsspektrums ergibt. Die lichtelektr. Wrkg. der Erregung greift an den für die Bindung zwischen Gattungssatom u. Zentrum maßgebenden Elektronen an; die Änderung des Valenzfeldes des Gattungsatoms bewirkt dann eine Deformation der Elektronenbahnen des Schwermetallatoms, die bei der Ueberkehr des lichtelektr. Elektrons zur Gleichgewichtslage unter Lichtemission erfolgt. Die Erregungsverteilung ist als Funktion des Valenzfeldes des Erdalkali-Gattungssatoms verwachsen, von der DE. des Grundmaterials abhängig, aber vom Schwermetall weitgehend unabhängig, sofern nicht eine verschiedenartige Valenzänderung desselben das Auftreten verschiedener Serienarten veranlaßt. Dagegen zeichnet die scharfe, für das Erdmetall charakterist. u. durch die DE. nicht beeinflußte Linienemission den Emissionsvorgang als einen im Atominneren des Metalls verlaufenden Prozeß. (Ann. der Physik [4] 75, 561—97. 1924. Heidelberg, Univ.) KRÜGER.

A. Predwoditelew und N. Netschajewa, *Über die Wirkung der Schichtdicke auf den photoelektrischen Effekt in Farbstoffen.* Auf silbernen Scheiben werden Schichten von Fuchsin, Krystallviolett, Trimethylrosanilin u. Methylviolett B extra (CLAUM) mit einer maximalen Dicke von ca. $1\ \mu$ hergestellt u. im Vakuum mit einer Heraeusquarzlampe belichtet. Der erhaltene Photostrom zeigt als Funktion der Schichtdicke ausgesprochene Periodizität. Auf Grund von Überlegungen über den Einfluß der benachbarten Moleküle auf die Bahnen der am photoelektr. Effekt

beteiligten Elektronen wird eine Formel für die Extremwerte des Photostroms aufgestellt, die mit den Versuchsergebnissen in befriedigender Weise übereinstimmt (Ztschr. f. Physik 29. 332—42. 1924. Moskau, Univ.)

KRÜGER.

A₂. Elektrochemie. Thermochemie.

L. Dunoyer und P. Toulon, Über eine bemerkenswerte Eigenschaft der positiven Säule des Quecksilberlichtbogens. Relais für starke Lichtbögen. Vff. untersuchen Bedingungen, unter denen die Wrkg. einer Außenelektrode auf die positive Säule des Hg-Lichtbogens im Vakuum stattfindet. Apparative Einzelheiten werden eingehend diskutiert. (Journ. de Physique et le Radium [6] 5. 257—68. 1924.) K. VON

Herbert E. Ives, Minimale Bogenlängencharakteristiken. (Journ. Franklin Inst. 193. 437—72. 1924.) K. WOLFF.

Otto Stern, Zur Theorie der elektrolytischen Doppelschicht. Der Potentialsprung zwischen zwei Phasen (z. B. einem Metall u. einer Fl.), dessen absol. Größe physik. thermodynam. festgelegt ist, besteht aus zwei räumlich gesonderten Teilen, einer der Helmholtzschen submolekularen, anderer der Gouyschen (vgl. GOUY, Compt. rend. d. l'Acad. des sciences 149. 654; C. 1909. II. 2059) diffusen Doppelschicht. Das erste Potentialgefälle erstreckt sich zwischen der geladenen Metalloberfläche u. den Schwerpunkten der Ladungen der vom Metall adsorbierten Ionen. Diese „Doppelschicht“, deren Gesamtladung im allgemeinen nicht Null ist, erzeugt in der Fl. ein elektr. Feld, in welchem eine ungleichmäßige Verteilung der Ionen stattfindet; das zweite Potentialgefälle hängt nun mit derselben nach der Poissonschen Gleichung $\Delta \psi = 4 \pi \rho^2$ zusammen. Die Ladungsdichte der adsorbierten Ionenschicht (η_1) ist durch die Differenz der auf 1 qcm adsorbierten positiven (n_+) bzw. negativen (n_-) Ionen bestimmt. Die beiden n können nach der Langmuirschen Adsorptionstheorie berechnet werden: ist φ das spezif. Adsorptionspotential, ψ_1 das Potential in der Helmholtzschen Doppelschicht, ε die Elementarladung, z die Sättigungskonz. der Ionen an der Oberfläche u. c die Ionenkonz. (in Molenbrüchen) in der Lsg., so gilt:

$$n_+ = z / \left(2 + \frac{1}{c} \cdot e^{\varphi_+ + \varepsilon \psi_1 / kT} \right), \quad n_- = z / \left(2 + \frac{1}{c} \cdot e^{\varphi_- - \varepsilon \psi_1 / kT} \right).$$

Wird vereinfachend für das mittlere Potential der diffusen Doppelschicht wieder ψ_0 gesetzt, so erhält man die Gleichung:

$$K_0 (\psi_0 - \psi_1) = F(n_- - n_+) + \sqrt{\frac{DRT}{2\pi \cdot 18}} c \left(e^{\varepsilon \psi_1 / 2kT} - e^{-\varepsilon \psi_1 / 2kT} \right),$$

worin links die Ladung der Metalloberfläche (η_0), rechts die Ladung der elektrolytischen Doppelschicht steht. K_0 ist die Kapazität der Helmholtzschen Doppelschicht (aus elektrocapillaren Parabeln zu entnehmen!), D = DE. des W., F = Faraday. — Anwendung der Formel auf die elektrocapillaren Erscheinungen ergibt: die Elektrocapillarkurve ist nur symmetr., wenn $\varphi_+ = \varphi_-$. Ist es nicht der Fall, so verschwindet beim Maximum der Oberflächenspannung ($\eta_0 = 0$) ψ_0 nicht, nur ist die Ladung der adsorbierten Ionen umgekehrt gleich der in der diffusen Schicht enthaltenen Ladung. Aus der Gestalt der Elektrocapillarkurve φ zu berechnen ist nicht zulässig, weil K_0 mit der Konz. veränderlich ist. — Anwendung auf elektrokinet. Erscheinungen: Das elektrokinet. Potential ζ kann gleich ψ_1 angenommen werden. Ist die adsorbierte Ladung sehr groß im Vergleich zur diffusen, ist $K_0 (\psi_0 - \zeta) = F(n_- - n_+)$; die Gleichung ist in c quadrat., es wird als die Kurve für ζ als Funktion von c aufgetragen ein Maximum oder Minimum zeigen. Die dem Extremwert entsprechende Konz. $c_m = e^{(\varphi_+ + \varphi_-) / 2kT}$; $\varphi_+ + \varphi_-$ ist mit der Adsorptionswärme gleichbedeutend; man erhält für sie aus elektrokinet. Angaben die Werte 10000—15000 cal./g.-Äq. — Da manche in den Formeln vor-

ende Größen unbekannt sind u. bei der Ableitung starke Idealisierung verwendet wurde, sind sonstige quantitative Vergleich unmöglich. (Ztschr. f. Elektrochem. 30. 508—16. 1924. Hamburg.)

BIKERMANN.

B. Fricke und C. Rohmann, *Über Flüssigkeitspotentiale an Laugengrenzen*. wurden die EKK. der Ketten von der Art — Hg | Hg₂Cl₂ | 0,1-n. KCl |

HCOONa | 0,1-n. NaOH | α -n. NaOH | α -n. HCOONa | 0,1-n. KCl | Hg₂Cl₂ | Hg +

essen. Die Potentiale an Grenzen *b* u. *d* wurden entgegengerichtet gleich angenommen, die EK. an der Grenze *a* nach PLANCK, die an Grenze *e* nach PENDERSON (Ztschr. f. physik. Ch. 59. 118; C. 1907. I. 1768) berechnet u. dadurch die EK. der Grenze *c* ermittelt. Für die Korrektionsglieder wurden also die Werte der verd. Lsgg. gültig vorausgesetzt; die EK. an *c* wurde ihrerseits mit der EK. verglichen. Die in der Nernstschen Formel für die Flüssigkeitsketten vorkommenden Ionenkonz. sind dabei einfach gleich der Bruttokonz. der Lauge. Da die Abnahme der Dissoziation oder der gleichwertige Einfluß der elektrost. Kräfte die wirksame Konz. der stärkeren Lauge empfindlicher herabsetzt als die wirksame Konz. der verdünnten, so könnte man erwarten, daß die beobachteten *c*-Spannungen um so weiter hinter den theoret. zurückliegen, je höher α ist. Das Umgekehrte war der Fall; bei $\alpha = 6$ z. B. betrug die berechnete EK. an Grenze *c* $62 \cdot 10^{-3}$ V (bei 30°), die beobachtete $82,2 \cdot 10^{-3}$ V. Bei geringeren α stimmen die theoret. u. die beobachteten *c*-Spannungen überein: 24,4 bzw. $24,2 \cdot 10^{-3}$ V bei $\alpha = 0,5$; 45,4 bzw. $46,6 \cdot 10^{-3}$ V bei $\alpha = 1$. Schaltet man zwischen HCOONa u. 0,1-n. KCl noch 0,1-n. HCOONa, so wird das Potential an *a* aufgehoben u. bleibt als Korrektionsglied nur die EK. der Grenze α -n. HCOONa | HCOONa, die nach NERNST berechnet wird. Die aus solchen Ketten bestimmte *c*-Spannung fällt etwas (um $2-3 \cdot 10^{-3}$ V) niedriger aus, der Gang bleibt aber derselbe. KOH zeigt dieselbe Erscheinung. — Ermittelt man die *c*-Spannung aus Ketten, wie — Hg | Hg₂Cl₂ | 0,1-n. KCl | 0,05-n. HCOONa | 0,1-n. NaOH | NaOH | $\alpha/2$ -n. HCOONa | 0,05-n. HCOONa | 0,1-n. KCl | Hg₂Cl₂ | Hg +, so

erhält man wesentlich niedrigere Spannungen (für $\alpha = 6$ $66,9 \cdot 10^{-3}$ statt wie oben 10^{-3} V). Vff. ersehen den Grund dafür in der Annahme der Gleichheit der *d*-Spannung: die EK. der konzentrierteren Lsgg. ist höher, als die Theorie ergibt, die *d*-Spannung also größer als die *b*-Spannung. Auch diese Erscheinung ist an KOH beobachtet. — Als wichtige Fehlerquelle erwies sich die Polarisationsänderung an den Flüssigkeitsgrenzen, die davon herrührt, daß die Kompensation der EK. der Kette (es wurde nach der Poggendorfschen Methode gearbeitet, mit einem elektrometer als Nullinstrument) nicht vollkommen ist, so daß in der Kette ein polarisierender Strom fließt. Ist die Flächengröße der Flüssigkeitsgrenzen klein (Capillarheber), so kann die Polarisation die gesuchte EK. fast ganz verhehlen. — Wird bei der Grenze *c* eine konzentrierte KCl-Lsg. eingeschoben, so wird die EK. der Kette sehr erheblich (um $56 \cdot 10^{-3}$ V bei $\alpha = 6$). (Ztschr. f. Elektrochem. 30. 537—44. 1924. Münster, Univ.)

BIKERMANN.

A. V. Butler, *Über den Sitz der elektromotorischen Kraft in der galvanischen Zelle* (Vgl. S. 17 u. LANGMUIR, Trans. Amer. Electr. Soc. 29. 125 [1916]). Zweck der Arbeit ist, die osmot. Theorie der Stromerzeugung in der galvan. Zelle u. ihre Ergänzung, die Gibbs-Helmholtzsche Gleichung mit der Auffassung zu verknüpfen, die der Kontaktpotentialdifferenz der Metalle (Voltpotential) einen wesentlichen Anteil an der gesamten EK. zuschreibt. Vff. stützt sich auf die Arbeiten von MILLIKAN u. Mitarbeitern (Physical Review 7. 18 [1916] u. 13. 236 [1917]), sowie von HENNINGS u. KADESCH (Physical Review 8. 217 [1918]), welche

insbesondere eine angenäherte Beziehung zwischen Voltapotentiale u. Elektronenaustrittsarbeit fanden. Die tabellar. Zusammenstellung der Werte der Normalpotentiale der Metalle, bezogen auf die Wasserstoffelektrode (H_2 -Pt) u. der Differenzen der Elektronenaustrittsarbeiten zwischen den einzelnen Metallen u. Platin führen den Vf. zu dem Schluß, daß die EKK. der galvan. Zellen größtenteils dem Voltapotentiale zuzuschreiben sind. Die energet. Betrachtung berücksichtigt die Vorgänge an den Elektroden u. an der metall. Berührungsstelle. Ohne der Auffassung des Vfs. von den Vorgängen zu widersprechen, ist sie doch mit den Unsicherheiten der Daten der Elektronenaustrittsarbeit behaftet. Die dynam. Betrachtung der Vorgänge an den Elektroden u. an der Metallstoßstelle führt den Vf. zu einer Gleichung für die EK., deren Differentiation zur Gibbs-Helmholtzschen Gleichung führt. Konsequenzen der dargelegten Auffassung wären: Unabhängigkeit des Voltapotentiale einer Zelle mit unangreifbarer Elektrode, an der sich ein umkehrbarer Oxydationsprozeß vollzieht, vom Material der Elektrode u. (möglicherweise) der von GARIBOLDI (Journ. Americ. Chem. Soc. 45. 37; C. 1923. III. 882) bestätigte Billitzersche Theorie des absoluten Elektrodenpotentials der 0,1-n. Kalomelektrode bei Benutzung von Ag als Nullelektrode als Folge des Voltapotentiale Hg-Ag. (Philos. Magazine [4] 48. 927—35. 1924. Swansea, Univ.) KRYOPOLITS.

Herman D. Nyberg, *Das Nybergelement*. Das Element besteht aus 10%ig. NaOH u. Kohle. Das Zn wird bis zu 1—2% Hg amalgamiert, was die Verwendung von billigeren Sorten ermöglicht. Die Kohle ist 5—10 mm stark bei 800° vorerhitzt u. mit Paraffin durchgetränkt (mit Ausnahme der in W. eintauchenden Oberfläche, die natürlich benetzbar bleiben muß). Der Zweck der Paraffinierung ist, der als Depolarisation wirkenden Luft Zutritt zur Lsg. zu verschaffen. Das Element im Element abspielende Rk. ist $Zn + H_2O + O = Zn(OH)_2$. Die EMK. des Elementes ist 1,0—1,18 V, die Kapazität 50 Ampèrestdn. bei 1 Amp. Stromstärke 181 Ampèrestdn. bei 0,1 Amp. Sein Gewicht ist 1300 g, das Vol. ca. 1 Liter. Es ist patentiert (vgl. D. R. P. 387072; C. 1924. I. 1083). (Ztschr. f. Elektrochem. 30. 549—52. 1924. Mariannefund [Schweden].) BIKERM.

Robert Müller, *Bemerkungen zur Abhandlung von A. Smits über das elektrochemische Verhalten des Magnesiums*. Nach SMITS (Ztschr. f. Elektrochem. 30. 202; C. 1924. II. 808) erklärt sich das relativ zum amalgamierten Mg edlere Potential der reinen Mg-Elektroden durch die Trägheit der Gleichgewichtseinstellung zwischen „aktivem“ u. „passivem“ Mg, so daß das an Mg-Elektroden gemessene Potential das Gleichgewicht nicht entspricht. Dem Vf. (vgl. MÜLLER, HÖLZL, KNAUS, PLANZ, PRETT, Monatshefte f. Chemie 44. 219; C. 1924. I. 1322) ist es gelungen, die Lösungs- u. Abscheidungspotentiale von Mg an Mg- u. Hg-Elektroden in Pridmore-Lösung zu messen; das Lösungspotential ist mit dem Abscheidungspotential in beiden Fällen ident., stellt also das wahre Gleichgewichtspotential dar. Aber auch in Pyridin-Lösung, das amalgamierte Mg unedler als das reine (um 0,4 V). Man muß also die Smits'sche Erklärung fallen lassen. (Ztschr. f. Elektrochem. 30. 552—53. 1924. Graz, Univ.) BIKERM.

Eugen Spitalsky, *Studien über die elektrochemische Polarisation und über die Elektrodenvorgänge*. Zu einer einwandfreien Messung von Polarisations- u. Depolarisationserscheinungen müssen folgende Bedingungen erfüllt sein: Man muß das wirkliche Potential der polarisierten Elektrode in verschiedenen, innerhalb gewisser Grenzen regulierbaren Zeitintervallen innerhalb erster Sekundenteile nach der Unterbrechung des Polarisationsstromes messen u. auf diese Weise die Geschwindigkeit der Selbstdepolarisation der Elektrode verfolgen können. Die dazu nötige Unterbrechung des Polarisationsstromes darf aber den n. Verlauf der Elektrolyse nicht stören, soll also nur den kleinsten Teil der Elektrolysendauer ausmachen. V. hat zu diesem Zweck einen sehr langsam (10—30 Umdrehungen pro Min.) rotierenden

Kommutator gebaut, dessen einfache Konstruktion aus einer Abbildung u. Beschreibung klar hervorgeht. Genauere Angaben über die zahlreichen Messungen werden später veröffentlicht werden, es werden nur kurz einige an der O₂-Elektrode anfgew. u. Abwesenheit chem. Depolarisatoren, an der H₂-Pt-Elektrode u. an der Ag-Elektrode in KCN gemachte Beobachtungen mitgeteilt. Vf. schließt mit dem Satz: Daß sich bei uns so komplizierte Verhältnisse ergeben, entspricht vollständig der wahrscheinlich höchst verwickelten Natur der Erscheinungen an der Oberfläche u. der Tiefe der Metallelektrode selbst, u. es scheint mir, daß die systemat. Anwendung u. weitere Anpassung der von mir ausgearbeiteten Methode schließlich den direktesten Weg sein wird, um den ebenso komplizierten wie interessanten Erscheinungen bei der Entladung der Ionen u. besonders der Ionen der gasförmigen Elektrode experimentell u. nicht nur abstrakttheoret. näherzutreten zu können. (Ztschr. Elektrochem. 30. 491—93. 1924. Moskau, Univ.)

HEBTER.

Erling Schreiner, Zur Hydratation einwertiger Ionen. (Vgl. Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 121. 321; C. 1922. III. 467.) Bei Anwendung der Bjerrumschen Theorie mit Vf. auf Grund von elektromotor. Aktivitätsmessungen u. Gefrierpunktsbest. für H⁺, bei Benutzung von gesätt. Chinhydronelektroden, die Hydratationszahl $n = 10 - 11$; $Li^+ = 6,5 - 7,5$; $OH^- = 6,5 - 7$; $F^- = \text{ca. } 6,5$. Auch bei Benutzung von Tensionsmessungswerten von HCl u. HBr über konz. Lsgg. findet hohe Hydratationszahlen für H⁺. Von 0—5 Mol HCl/1000 g W. kann man mit H⁺ u. Cl⁻ durchschnittlich mit einer Gesamthydratationszahl $m + n = 10 - 11$ rechnen; bei 5—7 ist $m + n = 7$ u. bei 7—10 = 5. Wird der Dissoziationsgrad von H₂O bei Ggw. von Elektrolyten (Neutralsalze) u. Nichtelektrolyten (Zucker) so behandelt, daß mit der Aktivität von H⁺ u. OH⁻ in Verb. mit der Hydratationszahl der 2 Ionen gerechnet wird, so findet man das Ionenkonzentrationsprodukt im ersten Fall bis zu einem Maximum erhöht; Nichtelektrolyte bewirken ein beträchtliches Sinken. Mit dem Wert 0,2 für die Aktivitätskonstante der Ionen des W. ist die maximale Wrkg. von KCl bei ca. 0,5 m u. von MgSO₄ bei ca. 2,5 m; das Ionenkonzentrationsprodukt des W. ist bei diesen Konz. 1,6- bzw. 5-mal größer als ohne Ggw. von fremden Ionen; in einer 1-molaren Zuckerlsg. ist es 0,6-mal vermindert. Aus den Hydratationszahlen lassen sich die entsprechenden Ionenradien in wss. Lsg. berechnen, wobei Vf. annimmt, daß das Hydratationswasser sich als Schale um das Ion lagert, dessen Ladung in der Mitte lokalisiert ist. Die Größe der berechneten fiktiven Ionenradien für das Kation u. Anion steht in einem konstanten Verhältnis zu den von BJERRUM berechneten Minimalabständen zwischen den Ionenladungen für Elektrolyte in wss. Lsg. Nimmt man an, daß die Radien des hydratisierten Cl⁻, Br⁻ u. J⁻ den BRAGGSchen Wirkungsradien für Rb⁺ u. Cs⁺ gleich sind, so ergibt sich, daß dasselbe Verhältnis für Chlorid, Bromid u. Jodid der genannten Elemente gültig ist. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 121. 333—69. 1924. Kristiania, Univ.)

ULMANN.

Ralph de Laer Kronig, Änderungen der Leitfähigkeit von Selen infolge Elektronenbombardements. Eine Selenzelle wurde einem Elektronenbombardement bis zu 100 A-Amp. u. 95 V ausgesetzt. Die Zunahme der Leitfähigkeit ΔC mit der Stromstärke I u. der Spannung V ist in guter Übereinstimmung mit der theoret. Formel $C = \sqrt{1 + kJV} - 1$, worin k das Verhältnis der pro Watt erzeugten Ionen zur spontan erzeugten Ionenzahl pro Sek. bedeutet, u. 98,5 beträgt. (Physical Review [2] 24. 377—82. 1924. Columbia-Univ.)

K. WOLF.

Georg Stetter, Leitfähigkeitsmessungen an Marmor. Wie anzunehmen war, ist die Leitfähigkeit des Marmors eine große Abhängigkeit von der Luftfeuchtigkeit. Der spezif. Widerstand von Marmor (CaCO₃ krystallin) liegt jedenfalls zwischen 10^{15} u. $10^{18} \Omega$. Leitfähigkeitsmessungen lassen sich verschiedentlich zur Kon-

stitutionsbest. von Gesteinen verwenden. (Physikal. Ztschr. 25. 441—43. 1924. W. Univ.) ULMAN.

W. Esmarch, *Zur Frage über den elektrischen Widerstand metallischer Aggregate*. Vf. hebt im Anschluß an die Arbeiten von LICHTENECKER (Physikal. Ztschr. 193; C. 1924. II. 918) hervor, daß er die theoret. Berechnungsweise LICHTENECKERS beanstandet habe, auf Grund experimenteller Nachprüfung (Schachbrettmodell) empir. Wert der abgeleiteten Formel ausdrücklich anerkennt. (Physikal. Ztschr. 484—85. 1924. Berlin-Siemensstadt.) K. WOLFF.

G. Breit und H. Kamerlingh Onnes, *Vorläufige Messungen betreffend die Dielektrizitätskonstante von flüssigem Wasserstoff und die Änderung der Dielektrizitätskonstante von flüssigem Sauerstoff mit der Temperatur*. Es werden die nächsten Methode u. Versuchsanordnungen beschrieben. Die für die DE. von fl. H₂ u. für die Änderung der DE. von fl. O₂ unterhalb des Kp. erhaltenen Meßresultate sind aus zwei Tabellen zu entnehmen. (Koninkl. Akad. van Wetensch. Amsterdam, Wisk. en Natk. Afd. 33. 705—8. 1924.) K. WOLFF.

M. Wolfke und H. Kamerlingh Onnes, *Über die Dielektrizitätskonstante von flüssigem und festem Wasserstoff*. Die DE. wird berechnet als Verhältnis der Kapazität des mit fl. bzw. festem H₂ gefüllten Kondensators, zu seiner Kapazität bei derselben Temp. im Vakuum. Für die DE. von fl. H₂ beim n. Kp. ergab sich $K = 1,225 \pm 0,001$. Es wurden ferner Verss. über die Abhängigkeit der DE. von fl. u. festem H₂ von der Temp. durchgeführt. Aus den tabellar. geordneten Ergebnissen folgt, daß die DE. von fl. H₂ mit sinkender Temp. zunimmt bis zur Nähe des F., wo sie ihren größten Wert erreicht u. dann bei weiterem Sinken der Temp. für festes H₂ wieder abnimmt. Ein derartiges Verh. zeigt die DE. von fl. H₂ (J. SNARDI, Ztschr. f. Physik 9. 153; C. 1923. I. 627) beim Übergang eines Stoffes aus der fl. in die feste Phase des öfteren. (Koninkl. Akad. van Wetensch. Amsterdam, Wisk. en Natk. Afd. 33. 701—4. 1924. Leiden.) K. WOLFF.

M. Wolfke und H. Kamerlingh Onnes, *Weitere Versuche mit flüssigem Helium*. **V.** *Über die Dielektrizitätskonstante von flüssigem Helium*. Es wurde die DE. von fl. He beim Kp. mit Hilfe sehr schneller Frequenzen bestimmt. (Vgl. BEAN, Physical Review [2] 22. 399; C. 1924. I. 2075.) Die Verss. ergaben $K = 0,999 \pm 0,001$, was einer Kp.-Temp. von He von 4,2° K. entspricht. (Koninkl. Akad. van Wetensch. Amsterdam, Wisk. en Natk. Afd. 33. 696—700. 1924. Leiden.) K. WOLFF.

L. G. Hector, *Die magnetische Suszeptibilität von Helium, Neon, Argon und Stickstoff*. Unter Benutzung der App. von WILLS u. HECTOR (Physical Review [2] 23. 209 [1924]) ergab sich bei 20° u. 760 mm Hg für He, Ne, Ar u. N₂ entsprechende Werte: —0,780, —2,77, —7,52 u. —4,91. (Jede Zahl ist mit 10^{-10} zu multiplizieren.) Diese Ergebnisse entsprechen der Größenordnung, die die Paulische Abänderung der Langevinschen Theorie des Diamagnetismus fordert u. stimmen mit den von OERSTED (Ztschr. f. Physik 19. 347; C. 1924. I. 611) vorausgesagten Werten überein. (Physical Review [2] 24. 418—25. 1924. Columbia Univ.) K. WOLFF.

N. Nikitin, *Anwendung des Thomsonschen Kreises zur Untersuchung der magnetischen Spektra*. Aus Messungen des Hochfrequenzwiderstandes u. des Selbstinduktionskoeffizienten des Thomsonschen Kreises läßt sich die scheinbare magnet. Permeabilität des Fe bestimmen. Die gefundenen Werte stehen mit der von LANGEVIN elast. Theorie der magnet. Spektra in Übereinstimmung. (Ztschr. f. Physik 23. 288—93. 1924. Moskau, Magnet. Lab.) ULMAN.

George E. Davis, *Diffusionskoeffizienten einiger Alkalisalzdämpfe in der Bunsenflamme*. Die Temp. der Flamme war 1436°. Im Mittel ergab sich für den Diffusionskoeffizienten K : LiCl 12,4, Li₂SO₄ 9,7, NaCl 19,0, Na₂SO₄ 16,4, K₂SO₄ 11,1, Rb₂SO₄ 11,7, Caesiumsulfat 8,4. Diese Werte sind wahrscheinlich bis auf 10% genau. (Physical. Review [2] 24. 383—95. 1924. Ames, Iowa.) K. WOLFF.

Wilhelm Biltz und Walter Holverscheid, *Beiträge zur systematischen Veredtschaftslehre. XXX. Über die Bildungswärmen intermetallischer Verbindungen. Zinnlegierungen.* (XXIX. vgl. Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. **134**. 37; C. **1924**. 1574.) Untersucht wurden die Bildungswärmen von Ca , Sn , $\text{Ca} + 3\text{Sn}$, CaSn_3 , $2\text{Mg} + \text{Sn}$, Mg_3Sn , Na , $\text{Na} + 2\text{Sn}$, NaSn_2 , $\text{Na} + \text{Sn}$, NaSn , $4\text{Na} + 3\text{Sn}$, NaSn_3 , $2\text{Na} + \text{Sn}$, Na_3Sn , $4\text{Na} + \text{Sn}$, Na_4Sn . Calorimetr. Lösungsm. war Ferrisid-Salzsäure, hergestellt durch Sättigen von zimmerwarmer 8-er HCl mit kryst. Fe_3Cl_3 u. Verd. dieser Lsg. mit 8-er Säure im Verhältnis 1:5. Die früher aufgestellten zwei allgemeinen Ergebnisse über die Energetik der Legierungen werden durch diese Verss. bestätigt: 1. Die Bildungswärmen verschieden zusammengesetzter Metallmetall. Verb. gleicher Metallpaare ordnen sich in Abhängigkeit von ihrer Valenzzahl der einen Komponente in ein Affinitäts-Valenzdiagramm so, wie das sonst, insbesondere bei Komplexverb. festgestellt war, 2. Die Bildungswärmen gleich oder vergleichbar zusammengesetzter intermetall. Verb. verschiedener Metalle sind umso größer, je unedler die an der Verb. beteiligten Metalle sind. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. **140**. 261—76. 1924. Hannover, Techn. Hochschule.) GOTTFRIED.

J. Wüst und E. Lange, *Messungen von Lösungswärmen einiger Alkalihalogenide in der äußersten Verdünnung bis zur Sättigung.* Die Meßmethode war die adiab. Methode von SWIENTOSLAWSKI (Journ. Russ. Phys.-Chem. Ges. **46**. 1302; C. **1915**. 291) ausgebildeten Form. Bei negativen Wärmetönungen wurde das W. im Calorimeter nach Beendigung des Auflösungsvorganges wieder auf die Ausgangstemp. von 25° mit elektr. Strom erwärmt, bei positiven kühlte man zuerst mit Hilfe des verdampfenden Ä. auf 25° ab u. heizte dann elektr. auf die vorher durch die Lösung erzeugte Höchsttemp. auf. Die aufgewendete elektr. Energie ist der Lösungswärme gleich. Es wurden in eine bestimmte Flüssigkeitsgrenze nach u. nach neue Portionen eingetragen, so daß die beobachteten Wärmetönungen die „intermetallären Lösungswärmen“ waren. Durch deren Summierung erhält man „integrale Lösungswärmen“ (Z). Diese beiden Größen sind (nur in Kurven) für NaCl , NaBr , KCl , KBr u. KJ wiedergegeben, als Funktionen der Konz. — Die intermetallären Lösungswärmen der K-Salze steigen mit wachsender Konz. langsamer, die der Na-Salze nehmen sogar bei hohen Konz., nachdem sie durch ein Maximum gegangen sind, ab. Die Konzentrationsabhängigkeit der integralen Lösungswärmen ist durch die Dehnungsarbeit u. die Hydratation der Salze bestimmt; der erste Faktor für alle Salze den nämlichen Wert hat, hängt das Individuelle der Kurve „Z-Konz.“ von der Hydratationsenergie der betreffenden Ionen ab. Es ergibt sich heraus, daß die bei völliger Hydratation vom Ion gebundene W.-Menge mit steigendem Vol. des Ions abnimmt. (Ztschr. f. Elektrochem. **30**. 523—28. 1924. München.)

BIKERMANN.

A. Eucken, *Über die Dissoziationswärme der Sauerstoff- und Stickstoffmolekel.* EUCKEN u. KARWAT, Ztschr. f. physik. Ch. **112**. 467; C. **1924**. II. 2738.) Verschiedene Anzeichen, insbesondere die Größe der aus dem Anstieg der spezif. Wärme bei hohen Tempp. zu entnehmenden Eigenschwingung der Atome im Mol., sprechen dafür, daß die Dissoziationswärme des O_2 u. N_2 etwas mehr als 400 Cal. beträgt. (LIEBIGS Ann. **440**. 111—21. 1924.) ULMANN.

A₃. Kolloidchemie. Capillarchemie.

N. P. Peskow, *Barophorese.* (Kurzes Ref. nach Kolloid-Ztschr. vgl. C. **1924**. 14.) Nachzutragen ist, daß Vf. mit der Erklärung von SZEGVARI (Kolloid-Ztschr. **33**. 324; C. **1924**. I. 1331) einverstanden ist u. dieselbe auf eigene Versuchsergebnisse anwendet. Er macht auch darauf aufmerksam, daß ältere Diffusionsversuche durch Barophorese entstellt sein können. Die Erscheinung spielt wahr-

scheinlich in der Biologie eine Rolle u. kann für die Technik verwertet werden. (Ber. Polytechnikum Iwanowo-Wosniessensk 8. 76—89. 1924.) BIKERMAN

Emil Hatschek, *Das Schrumpfen der Gelatine*. (Vgl. THOMPSON, Nature 4. 576; C. 1924. II. 2825.) Vf. beschreibt die Schrumpfungsfikuren von Polyedern der Gelatine, welche beim Eintrocknen dadurch entstehen, daß die Ecken zuerst austrocknen. Diese sind ähnlich, aber nicht gleich jenen Figuren, welche entstehen würden, wenn die Oberflächenspannung an demselben Körper dem kleinsten Wert zustrebt, wie z. B. bei einem zwischen Drähten ausgespannten Seifenfilm. (Natur 114. 643—44. 1924. London.) BECKER-ROS

P. Lecomte du Noüy, *Das Oberflächengleichgewicht kolloider Lösungen*. (I. vgl. Science 59. 580; C. 1924. II. 1062.) Vf. zeigt in Fortsetzung seiner Vers. mit Na-Oleat, daß in Lsgg. das weniger oberflächenaktive Kolloid bestrebt ist, als aktive Kolloid zu adsorbieren, so daß dessen Einfluß auf die Oberflächenspannung gehemmt wird. Die Unters. von Lsgg. verschiedener Kolloide (Serum, Albumen, Gummi arabicum, Saponin, Farbstoffe) in physiol. NaCl-Lsg. zeigen nach dem Verdampfen des W. den Einfluß des Kolloids auf die Salzkristallisation. Bei einer Konz. von 10^{-2} Serum, 10^{-3} Saponin u. Na-Oleat erscheinen period. Ringe aus kleinen Krystallen. Die Verss. zeigen, wie Krystalloide von Kolloiden in derselben Lsg. adsorbiert werden. (Science 60. 337—38. 1924. ROCKEFELLER Inst.) K. W. F.

John H. Yoe, *Die Adsorption von arseniger Säure an wässrigem Aluminiumoxyd*. Vf. untersucht den Einfluß äußerer Bedingungen auf die Adsorption von As_2O_3 durch Al_2O_3 in W., doch geht er nicht wie LOCKEMANN u. PAUCKE (Ztschr. f. Chem. u. Ind. der Kolloide 8. 273; C. 1911. II. 417) von Alaunen aus, sondern Al_2O_3 wurde durch Mischen verd. Lsgg. von $Al(NO_3)_3$ u. NH_4OH in äquivalenten Mengen u. Koagulieren durch Erhitzen dargestellt. Es wurde im allgemeinen folgendermaßen verfahren: 15 cem einer Standardlg. ($41,3 \text{ g } Al(NO_3)_3 \cdot 9H_2O$ p.l.) wurden mit 145 cem dest. W. in einem Pyrexbecher, der mit einem Rührer mit 500 Umdrehungen pro Min. versehen war, auf 0, 25, 50, 75 oder 100° gebracht. Dann wurden tropfenweise 50,6 cem 0,1-n. NH_4OH zugesetzt. Nach der Fällung wurde das Gemisch auf Zimmertemp. gebracht, in eine Glasstöpselflasche von 270 cem Inhalt gegeben, auf 265 cem verd. u. eine gemessene Menge H_3AsO_3 zugesetzt. Die Flaschen wurden fest verschlossen sofort in einen Thermostaten von 25° gesetzt. Zur Analyse wurden nach bestimmten Zeiten Teile von 50 cem der verbleibenden Fl. entnommen, verd. u. mit Jodlag. titriert. Dabei zeigte sich, daß bei 50° u. höheren Temp. gebildete $Al(OH)_3$ nicht ausfiel, sondern in W. ein kolloidales Sol bildete. Beim Zusatz der Säure trat Koagulation ein. Die Adsorption verläuft anfangs sehr schnell, in den ersten 5 Min. haben ungefähr 50% der Gesamtadsorption stattgefunden. Nach 24 Stdn. wurde ein scheinbares Gleichgewicht erreicht, bei dem nach 232 Stdn. war die Adsorption etwas fortgeschritten. Für das langsame Fortsetzen der Adsorption werden Gründe besprochen. Nach 24- u. 72-std. Verss. wurden Adsorptionsisothermen aufgestellt, die für 232-std. Verss. allerdings eher mehr gelten. Bei 25° ist die Adsorption des bei 0° dargestellten Oxyds ungefähr 2,5 mal größer als die des bei 100° dargestellten u. ungefähr 5,5 mal größer als die des bei 100° gebildeten u. 24 Stdn. am Rückflußkühler gekochten Oxyds. Die Adsorption nimmt also mit wachsender B.-Temp. des Oxyds ab, wahrscheinlich weil bei höherer Temp. der Nd. weniger flockig ist. (Journ. Americ. Chem. Soc. 46. 2390—97. 1924. Virginia, Univ.) JOSEPH

B. Anorganische Chemie.

Ortwin von Deines, *Zur Kenntnis der Wasserstoffpersulfide*. Wird in ca. 0° . H_3PO_2 gasförmiges SO_2 eingeleitet, so tritt starke Wärmeentwicklung ein u. es

er Zeit scheiden sich Tropfen ab, bestehend aus einem Gemisch von Wasser-
persulfid u. einer Verb. dieses Stoffes mit großer Menge gelöstem S. Bemerkens-
ist, daß bevor sich das Persulfid aus einem organ. Lösungsm., mit welchem
schütteln läßt, ausscheidet, *monokliner S* auskrystallisiert; kleine, perl-
ergänzende Blättchen, die schnell zu Büscheln monokliner Nadeln anwachsen,
sich dann bald in rhomb. S zu verwandeln. (LIEBIGS Ann. **440**. 213—14.
Berlin, Univ.) ULMANN.

A. Damiens, *Über die Suboxyde des Tellurs*. Vf. nimmt die Verss. von DIVERS
HIMOZÉ (Ber. Dtsch. Chem. Ges. **16**. 1004 [1883]) auf, nach denen das Suboxyd
durch Zers. eines Sulfoxyds entstehen soll, welches durch Einw. von SO_3 auf
gebildet wird. Für den Vorgang sind die Gleichungen $\text{Te} + \text{SO}_3 = \text{TeSO}_3$
 $\text{TeSO}_3 = \text{SO}_2 + \text{TeO}$ angegeben. Andererseits soll auch amorphes, teilweise
iertes Te des Handels dieses Suboxyd enthalten. Entw. von SO_2 beginnt nach
Verss. des Vfs. schon bei 90° , der größte Teil entweicht bei 190 — 210° , zur
tändigen Entfernung sind 450° nötig, bei dieser Temp. dest. auch reines Te
b, u. es bleibt TeO_2 zurück. TeO war nicht nachweisbar; u. das amorphe teil-
e an der Luft oxydierte Te erwies sich als Gemisch von Te u. TeO_2 . Zur
ung der Existenz des TeO versuchte Vf. die Schmelzkurve für das System
 TeO_2 zu bestimmen, doch war die Ausführung unmöglich, denn unter Atmo-
sphärendruck schm. Te zuerst u. trennt sich durch die Flüchtigkeit schnell vom
e. (C. r. d. l'Acad. des sciences **179**. 829—31. 1924.) JOSEPHY.

M. Volmer, *Über die Existenz des Oxoniumperchlorats*. Aus der Analogie der
Oxoniumsalze mit den Ammoniumsalzen ist auf Ähnlichkeit der Krystallgitter
der Verb. zu schließen; auch ist zu erwarten, daß der Raumbedarf von NH_4^+
 OH_3^+ ziemlich gleich sein wird. Vf. untersucht daher das Gitter von krystallin.
 $\text{ClO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$ u. von NH_4ClO_4 röntgenograph. Die gefundenen Diagramme sind
praxis identisch; die Anordnung der Atome in beiden Verb. ist also die
gleiche. — Für festes OH_3ClO_4 berechnet Vf. D. = 1,88. (LIEBIGS Ann. **440**. 200 bis
1924. Berlin, Techn. Hochsch.) ULMANN.

Albin Kurtenacker und Friedrich Wengefeld, *Die Katalyse des Hydroxylamins*.
untersuchen die Einw. von Vanadin-, Molybdänsäure, Kupfer- u. Eisensalz auf
Hydroxylamin. Sie finden, daß Vanadinsäure in stark saurer Lsg. ausschließlich
zierend wirkt. In schwach saurer u. neutraler Lsg. wird ein erheblicher Teil
Hydroxylamins katalyt. zersetzt unter hauptsächlichlicher B. von NH_3 u. N_2O . In
ach alkal. Lsg. findet Zers. statt unter vorwiegender B. von NO . In stark
k. Lsg. keine Einw. Molybdänsäure wirkt in saurer Lsg. zersetzend unter B.
viel NO . In alkal. Lsg. keine Rk. Kupfersulfat zersetzt Hydroxylamin in
neutraler u. schwach saurer Lsg. unter B. von NO . In alkal. Lsg. tritt Oxydation
unter ausschließlicher B. von N_2O . In starker saurer Lsg. keine Einw. Ferri-
loxydiert in saurer Lsg. zu N_2O , in neutraler bildet sich daneben etwas N_2 ,
kal. Lsg. wirkt das Eisenhydroxyd zersetzend u. auch hier entsteht in geringer
eige NO . Zur Erklärung der Zersetzungsvorgänge nehmen Vff. an, daß die
katalyt. wirksamen Stoffe durch das Hydroxylamin in rascher Aufeinanderfolge
oxydiert u. wieder rückoxydiert werden auf Grund der experimentellen Tatsache,
daß NH_2OH in alkal. Lsg. durch V^{IV} , Mo^{V} , sowie durch $\text{Fe}(\text{OH})_2$ quantitativ zu
reduziert wird. Die B. von NO im Bereich der katalyt. Zers. erklären Vff.
ant, daß bei der Oxydation der zunächst gebildeten niederen Wertigkeitsstufen
Katalysatoren peroxydartige Verb. entstehen, die weiteres NH_2OH energ.
rieren. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. **140**. 301—18. 1924. Brunn, Techn.
sch.) GOTTFRIED.

W. Rekschinski, *Über die Darstellung des Phosphortrichlorids und Phosphor-
mids aus dem roten Phosphor*. PCl_3 entsteht spontan aus dem gelben P u.

Cl_2 oder aus PCl_5 u. rotem P, nicht aber aus Cl_2 u. rotem P. Man kann ab, vom roten P ausgehend, einen kleinen Teil davon in die gelbe Modifikation überführen, die mit Cl_2 PCl_3 gibt, welches nun das Reagieren des übrigen roten ermöglicht. Die Verwirklichung des Gedankens: roter P wird in eine Retorte getragen, in deren Hals ein Rohr eingeführt wird. Durch dieses Rohr verdrängt man Luft mit CO_2 , erwärmt dann die Retorte, bis ein Beschlag vom gelben P an den Wänden sichtbar ist, u. läßt Cl_2 durchströmen. — PBr_3 wird dargestellt, indem man zu in einem Rundkolben befindlichem P aus einem Tropftrichter Br_2 fließen läßt; der Kolben ist mit einem Rückkühler u. einem CaCl_2 -Rohr versehen. (Transact. Inst. Pure Chem. Reagents 1924. Nr. 3. 46—49 [Russ.] Sep.) BIKERMAN

Philip F. Weatherill, Eine Revision des Atomgewichts von Antimon. Die Analyse von Antimontrichlorid. SbCl_3 wurde aus den reinen Elementen im Vakuum dargestellt, mehrmals im Vakuum in einem App., der nur aus Glas bestand, über reinstem Sb dest., damit das freie Cl_2 an das Metall gebunden wurde. Das Gewicht der kleinen Glaskugeln, in die SbCl_3 hineindest. wurde, u. die im Vakuum abgeschmolzen waren, wurde durch Differenz der Wägung der Kügelchen mit Anschlusscapillare vor dem Füllen u. der Wägung der Capillaren, die sorgfältig gereinigt waren, nach dem Abschmelzen bestimmt. Zur Analyse wurde die genau bestimmte Menge SbCl_3 in einer Lsg. von reiner Weinsäure gel., so daß auf je 1 g SbCl_3 4,8 g Weinsäure kamen. Die für Sb = 121,77 berechnete Menge Ag wurden reinster HNO_3 gel. u. verd., so daß nicht mehr als 10 g pro l waren. AgI_3 wurde nun quantitativ in kleinen Teilen zum SbCl_3 zugesetzt, nach jeder Zugabe geschüttelt. Mit AgCl wurde nur im Raum mit rubinrotem Licht gearbeitet. Nachdem mindestens eine Woche lang 5 oder 6 mal täglich geschüttelt worden war, wurden die Flaschen mit Eis gekühlt u. Proben nephelometr. mit AgNO_3 u. Cl geprüft, der Endpunkt des Gleichgewichts war auf 0,1 mg Ag genau. Das Mittel von neun Analysen ergab das Verhältnis SbCl_3 zu Ag = $0,704864 \pm 0,00006$ u. das At.-Gew. des Sb zu $121,748 \pm 0,00086$. (Journ. Americ. Chem. Soc. 6. 2437—45. 1924. Ann Arbor [Mich.], Univ.) JOSEPH

Hugo Weil und Martin Adler, Über Borsäureverbindungen des Brenzcatechins. Vff. teilen mit, daß sie das von ROSENHEIM u. VERMEHREN (vgl. Ber. Dtsch. Chem. Ges. 57. 1337; C. 1924. II. 2015) beschriebene K- bzw. NH_4 -Salz der Brenzcatechin-Borsäure-Verb. schon vor 2 Jahren hergestellt haben. Die Zus. der betreffenden Salze war seinerzeit durch die Best. von C, H u. N bewiesen worden u. hat in den Analysen von B u. K durch ROSENHEIM u. VERMEHREN eine Bestätigung gefunden. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 57. 2091. 1924. München, Lab. H. WEIL.) HORS

A. von Antropoff, Die Gleichgewichte in den Dreistoffsystemen Natriumchlorid-Natriumhydroxyd-Wasser und Kaliumchlorid-Kaliumhydroxyd-Wasser. (Nach Vss. gemeinsam mit A. Marceau und W. Sommer.) Mit A. Marceau bestimmt Vff. durch Analyse der gesätt. Lsgg., der Systeme $\text{NaCl-NaOH-H}_2\text{O}$ u. $\text{KCl-KOH-H}_2\text{O}$, hauptsächlich die Löslichkeit der Chloride als Funktion der Temp. u. der Laugenkonz. vom Bereich der ternären eutekt. Punkte —32,8 bzw. —67,4° bis +8°. Zahlreiche Tabellen u. Diagramme veranschaulichen die Messungsergebnisse. Die Löslichkeit der Chloride nimmt mit steigender Alkalikonz. zuerst ab, um dann wieder anzusteigen. Nach Sicherstellung der Isothermen u. Isobaren lassen sich leicht die günstigsten Bedingungen für die Abscheidung der Chloride aus den Laugen, wie auch die Fällung von NaCl aus Laugen beim Eindampfen u. Abkühlen bestimmen. Werden die Dreistoffsysteme in Dreieckskoordinaten in der Ebene räumlich eingetragen, so bleibt zwischen den von Vff. untersuchten Gebieten u. den wasserfreien Zweistoffsystemen noch eine erhebliche Lücke, die nur durch therm. Analysen bei Ggw. von Wasserdampf geschlossen werden kann (Mitteilung von W. Sommer). Nach Besprechung der Siedekurven der einschlagenden Zei-

systeme diskutiert Vf. die Siedekurven der Dreistoffsysteme. Hier stößt man bei fortgesetztem Sieden, sobald Sättigung an NaCl erreicht ist, auf die erste Siedekurve. Darauf scheidet sich NaCl aus, u. NaOH-Konz. u. Siedetemp. steigen. Nach Erreichend der Siedkurve bis der Punkt erreicht ist, in dem eine, vom H_2O -Scheitel gezogene Gerade die Kurve berührt. Bei weiterem Sieden steigt die Temp., u. das ausgeschiedene NaCl löst sich. Dieser Prozeß ist beendet, beim Schnittpunkt mit der Geraden, die durch den H_2O -Scheitel u. den Punkt, der der ursprünglichen Zus. der Lsg. entspricht, gezogen wird. Weiterhin entweicht H_2O . (Ztschr. elektrochem. 30. 457—67. 1924. Karlsruhe.)

ULMANN.

G. Tacchini, *Thermische Analyse des Systems Lithiumfluorid-Magnesiumfluorid*. Er hatte F. 840° , F. des MgF_2 wurde annäherungsweise zu 1400° bestimmt. Die Abkühlungskurve der Gemische wurde bis zu 300° herab verfolgt u. ergab kein Eutektikum. Hieraus u. aus den Ergebnissen der Erstarrungspunkte der einzelnen Gemische ergibt sich, daß Li_2F_2 u. MgF_2 Mischkrystalle in allen Verhältnissen bilden können. (Gazz. chim. ital. 54. 777—80. 1924. Mailand, Polytechn.)

O. Hönigschmid und E. Zintl, *Über das Atomgewicht des Hafniums*. (Vorläufige Mitteilung.) (Vgl. S. 28.) Aus einem Hafniumoxydpräparat mit ungefähr 0,5% Gehalt an Zirkon bestimmten Vf. das At.-Gew. des Hf zu 171,88. Ergibt man die 6% Zirkonoxyd in Anrechnung, so ergibt sich rechner. für das Hf At.-Gew. von 180,8. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 140. 335—36. 1924. München, Chemie.)

GOTTFRIED.

Fr. Hans, *Oxydation des dreiwertigen Chroms durch Silberoxyd in alkalischer Lösung*. Vf. weist an Hand quantitativer Bestst. nach, daß sich alkal. Chromoxyd durch $AgNO_3$ in der Hitze quantitativ zu Chromat oxydieren lassen nach der Gleichung $Cr_2O_3 + 3Ag_2O = 2CrO_3 + 6Ag$. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 140. 33—38. 1924. Würzburg, Univ.)

GOTTFRIED.

J. Lifschitz, *Relativ-asymmetrische Synthese bei Schwermetallkomplexen*. (Vgl. Ztschr. f. physik. Ch. 105. 27; C. 1923. III. 473.) Es wurde d-Alanin mit $Co(OH)_2$ dargestellt. Das rote β -Isomere des tri-d-alaninkobalti-Salzes war vollkommen unl. in H_2O . Es kann, wie das rac., ohne Zers. in 50% H_2SO_4 gelöst werden. Die gemessene Drehung dieser Lsgg. wird durch eine Kurve III (spez. Drehung—Wellenlänge in Ä.-E.) wiedergegeben. Die ursprüngliche Mutterlauge des roten Salzes ist intensiv violett gefärbt. Durch Fraktionieren erhält man ein violettes Salz, das dem Leyschen α -Salz ähnlich ist. Die Drehungen des umkrystallisierten Salzes in 50% H_2SO_4 sind aus Kurven I u. I' ersichtlich. Die Mutterlauge dieses Salzes enthält neben α -Salz ein außerordentlich l. u. etwas dunkler purpurgefärbtes Salz. Das reine α -Salz ist etwas hygroskop., seine Drehungen in H_2O u. 50% H_2SO_4 werden durch die Kurven II u. II' veranschaulicht. Beide Salze sind als Schwermetallkomplexe anzusprechen, die nur eine verschiedene Zahl Moll. Krystallwasser enthalten. Vf. schließt aus den gemessenen Drehungen, daß die α - u. die β -Isomere nichts anderes sind als die partiellen Antipoden $d[Co-d-Alanin_3]$ u. $l[Co-d-Alanin_3]$, u. daß hier also eine relativ-asymmetr. Synthese stattgefunden hat. (Inkl. Akad. van Wetensch. Amsterdam, Wisk. en Natk. Afd. 33. 661—66. 1924.)

K. WOLF.


Rudolf Robl, *Über die Löslichkeit von Nickel in kohlensäurehaltigem Wasser*. Die Vers. des Vfs. beweisen, daß Ni ebenso wie Fe von CO_2 -haltigem W. unter Einwirkung von W.-haltigem $NiCO_3$ erheblich angegriffen wird. Die Beobachtung Schönlank's u. die Befunde von TRAUBE-MENGARINI u. SCALA (Ztschr. f. Chem. u. Ind. Kolloide 10. 113; C. 1912. I. 1813) beruhen auf diesem Vorgang. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 37. 938—39. 1924. Breslau.)

JUNG.

R. J. Meyer und H. Nachod, *Die Sulfate des vierwertigen Urans*. Durch Vers. zeigen Vf., daß aus der mit 2 Mol. konz. H_2SO_4 versetzten u. elektrolyt.

reduzierten Lsg. von $\text{UO}_2\text{SO}_4 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ beim Verdunsten über H_2SO_4 , oder durch Eindampfen bei mittlerer Temp. (bis 75°), oder durch Fällung mit A. $\text{U}(\text{SO}_4)_2 \cdot 8\text{H}_2\text{O}$ erhalten wird. Zur Darst. von $\text{U}(\text{SO}_4)_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ wird dieselbe Lsg., ohne zu kühlen, so lange unter Umrühren mit konz. H_2SO_4 versetzt, bis keine Abscheidung mehr eintritt. Bei 68° liegt der scheinbare Umwandlungspunkt der beiden Hydrate. Löslichkeitsbestst. u. Messungen der Gefrierpunktserniedrigung in schwefelsaurem Lsg. weisen darauf hin, daß beide Hydrate in ihrer Molekularstruktur von einander abweichen. Das 4-Hydrat weist unter den gleichen Bedingungen in verd. Lsg. die doppelte Molekulargröße auf wie das 8-Hydrat. Der beobachtete Schnittpunkt der Löslichkeitslinien bei 26° ist aber nicht als Umwandlungspunkt zu deuten, sondern er ist nur die Folge des entgegengesetzten Vorzeichens des Temperaturkoeffizienten der Löslichkeit. Man hat es in der Lsg. des 4-Hydrates wahrscheinlich mit einer Art von Polymerisation zu tun, die durch höhere Temp. begünstigt wird. Vff. vermuten Autokomplexbildung. Auf die Ähnlichkeit mit den isomorphen Thoriumsulfaten wird hingewiesen. (LIEBIGS Ann. 440. 186—99. 1924. Ber. d. phys.-chem. Wiss.-chem. Lab.) ULMAN.

Roger C. Wells, *Reaktion zwischen Ferrosalzen und Cuprosalzen*. In saurer Lsg. wird das Cuproion durch $\text{Fe}(\text{OH})_2$ zu metall. Cu reduziert. In saurer Lsg. tritt bei Ggw. von viel NaCl u. CuCl selbst bei niedriger $[\text{H}^+]$ keine Red. ein. In konz. Lsg. bei starker NaOCOCH_3 - u. FeCl_2 -Konz. wird Cu ausgefällt.



Die Verss. wurden quantitativ bei verschiedener $[\text{H}^+]$ ausgeführt. (Amer. Journ. Science, SILLIMAN [5] 8. 428—33. 1924.) ENSZL.

A. Duboin, *Über die Silicatverbindungen des Cadmiums*. Durch Zusammenmischen und Schmelzen von K_2F_2 mit SiO_2 , in dem CdO bis zur Sättigung gelöst wird, Erkte erhalten u. Zugabe von KCl u. erneutes Schmelzen, wird ein Gemisch von Krystallen erhalten, die sich durch verschiedene schwere Lsgg. trennen lassen. Die leichteren prismat. Krystalle haben die Zus. $\text{K}_2\text{O} \cdot \text{CdO} \cdot 4\text{SiO}_2$ u. werden durch HCl zersetzt. D., 3,086. In ganz geringer Ausbeute wird ein Körper von der ungefähren Zus. $2\text{CdO} \cdot \text{SiO}_2$ erhalten, der immer K_2O -haltig ist. Durch Ersatz von CdO durch BaO entstehen in Ggw. von KCl klare, gelbliche, prismat. Krystalle der Zus. $3\text{CdO} \cdot 4\text{SiO}_2$. (C. r. d. l'Acad. des sciences 179. 769—71. 1924.) ENSZL.

Bernhard Neumann und Helmut Richter, *Versuche zur Abscheidung von Wolframmetall aus Wolframsalzlösungen*. Durch Verss. zeigen Vff., daß ähnlich wie bei Wolframat, auch durch Elektrolyse von Wolframdoppeloxalat u. Wolframdoppelcyanid nur niedere Oxyde, aber nie Metall zur Abscheidung gebracht werden kann. Bei der Verwendung organ. Lösungsm., in denen WCl_6 sich löst, ist die Lsgg. in Aceton u. Pyridin so schlecht, daß nur durch Einleiten von trockenem HCl-Gas die Leitfähigkeit so verbessert werden konnte, daß eine Zeit lang Strom hindurchzubringen war. Eine Abscheidung von Metall oder Oxyd fand nicht statt. In Glycerin konnte eine geringe Metallabscheidung erhalten werden. Irgendwelche techn. Aussicht zur Gewinnung von W bietet dieser Weg auch nicht. (Ztschr. Elektrochem. 30. 474—77. 1924. Breslau, Techn. Hochsch.) ULMAN.

H. v. Wartenberg, *Über Osmiumtetroxyd*. Werden OsO_4 -haltige Lsgg. in Wasser unter Kochen zum Dioxihydrat reduziert u. versucht man es im H_2 -Strom weiter zu reduzieren, so tritt bei ca. 150° Explosion ein unter H_2O -Abgabe. Dieses wird vermieden, indem man das „Hydrat“ unausgewaschen läßt, eventuell NaCl zusetzt, was jede Verpuffung hindert. — Auf der verschiedenen Löslichkeit von OsO_4 in W. : 6,47 : 100 g (18°) u. CCl_4 : 250 : 100 g (20°), gründet Vf. ein Ausschüttelverfahren. — Den Dampfdruck von festem OsO_4 bestimmt Vf. zu:

$$\log p_{\text{Atm.}} = -13500/4,57 T + 7,83; \quad \text{fl.} = -10100/4,57 T + 5,49. \\ \text{F. } 40,1^\circ; \text{ Kp. } 129^\circ. \text{ Krit. Temp. } 404,8; \text{ krit. Vol. } 0,007; \text{ krit. Druck (berechnet)}$$

(st. — Mol. Schmelzwärme (calorimetr. bestimmt) $3,41 \pm 2\%$ Cal. — Die Schmelzgrenze liegt bei $2 \cdot 10^{-5}$ mg./cm. — Die Oberflächenspannung beim F. ist 3 dyn/cm. — D_{fest} 4,91; D_{fl} 4,44. — Mol. Bildungswärme 93,4 Cal. $\pm 1,5\%$. — Dampf ist bei 1500° völlig stabil. — Spezif. Leitvermögen ist kleiner als 10^{-11} rez. Ω . — Brechungsexponent für fl. $\text{OsO}_4 = 1,56$ (45°). (LIEBIGS ANN. 4 97—110. 1924. Danzig, Techn. Hochsch.) ULMANN.


D. Organische Chemie.

Robert N. Pease und Chi Chao Yung, *Die Lage des Gleichgewichts bei der Äther-Äther-Reaktion bei 130 und 275°*. (Vgl. Journ. Americ. Chem. Soc. 46. C. 1924. I. 1909.) Zur Best. der Lage des Gleichgewichts der Rk. $2\text{C}_2\text{H}_5\text{OH} \rightleftharpoons \text{C}_2\text{H}_5\text{OC}_2\text{H}_5 + \text{H}_2\text{O}$ wurden zwei Reihen von Messungen ausgeführt, eine bei 275° mit H_2SO_4 als Katalysator, die zweite bei 130° mit einem Gemisch von konz. H_2SO_4 u. H_2O als Katalysator, nachdem sichergestellt war, daß die Rk. auch von rechts nach links verläuft. Die Lage des Gleichgewichts wurde aus der Zu- oder Abnahme des Volumens gefunden, wenn Gemische bekannter Zus. von A., Ä. u. W. der Rk. überlassen wurden. In allen Gemischen waren Ä. u. W. in äquimolekularem Verhältnis vorhanden. Die Best. des Ä. erfolgte durch seine Trennung durch Zusatz gesätt. Na_2CO_3 -Lsg. u. direkter Best. des Vol. des Ä. u. Zufügen eines Korrektionsgliedes, das für verschiedene Mengen vorher bestimmt u. graph. angegeben ist. Bei den Versuchen mit Al_2O_3 , dargestellt vom Fixed Nitrogen Research Lab., war C_2H_4 nicht in merkenswerter Menge entstanden. Die Gleichgewichtskonstante $K_{275} = 0,66$, die maximale Menge Ä., die in Ä. in der Dampfphase bei 275° umgewandelt werden kann, beträgt 62,0%. W. setzt die Wirksamkeit des Katalysators etwas herab. Bei 130° genügten $3\frac{1}{2}$ Stdn. für die Rk. $K_{130} = 8,0$. Die maximale Umwandlung von A. in Ä. beträgt in der Dampfphase bei 130° 85,0%. Die Änderung der freien Energie der Rk. wurde zu -3210 cal. u. die freie Bildungsenergie von Ä. aus W. bei 25° zu -35900 cal. berechnet. (Journ. Americ. Chem. Soc. 46. 1924. 2405. 1924. Virginia, Univ.) JOSEPHY.

J. B. Senderens, *Allgemeine Methode zur Darstellung von Äthern*. (Vgl. C. r. Acad. des sciences 178. 1412; C. 1924. II. 322.) Darst. von Propyläther: 100 Vol. Propylalkohol + 40 Vol. H_2SO_4 (66 Bé.) oder besser 60 Vol. $\text{H}_2\text{SO}_4 + 2\text{H}_2\text{O}$ in 2—3 Stdn. auf $125-130^\circ$ erhitzt (absteigender Kühler); angenehm riechende Äther. Kp. $86-88^\circ$. — Butyläther, 100 Vol. Butylalkohol + 25—30 Vol. H_2SO_4 (66 Bé.) in 2—3 Stdn. unter Rückfluß gekocht; nach Erkalten Zugabe von W., Isolierung des Äthers aus der oberen der beiden Schichten nach dem unten für i-Propyläther angegebenen Verf.; Kp. $140-141^\circ$. — i-Butyläther, aus 100 Vol. des Alkohols + 10 Vol. H_2SO_4 (66 Bé.) bei $120-122^\circ$, Kp. $102-104^\circ$. — i-Amyläther aus 100 Vol. Amylalkohol + 10 Vol. H_2SO_4 (66 Bé.) bei $130-135^\circ$; Abtrennung durch Zugabe von W. u. Dest. der oberen Schicht; Kp. $169-170^\circ$, kor. $171-172^\circ$. — i-Propyläther aus gleichen Voll. i-Propylalkohol + Hydrat $\text{H}_2\text{SO}_4 + 2\text{H}_2\text{O}$ oder aus fast gleichen Voll. Alkohol u. Äther bei der Dest. erhalten; man fraktioniert als einer Vigreux-Kolonne u. behandelt den unterhalb 75° übergehenden Anteil mit gleichem Vol. H_2SO_4 (36 Bé.), hierdurch wird der Alkohol gel., der Äther ist fl. Kp. $67-68^\circ$, $D_{4^\circ}^{17} 0,7282$. — Sek. Butyläther aus 100 Vol. sek. Butylalkohol + 5—6 Vol. H_2SO_4 (66 Bé.) bei $103-104^\circ$; es empfiehlt sich, die Dest. einmal zu wiederholen; Rückstand des Kolbens wird mit doppeltem Vol. W. versetzt u. abgeschiedener Äther dann mit dem Destillat vereinigt; Isolierung des Äthers wie vorher; Kp. $120-122^\circ$, $D_{4^\circ}^{17} 0,761$; Geruch mentholartig. — Sek. Amyläther, aus 100 Vol. des Alkohols + 1—1,5 Vol. H_2SO_4 (66 Bé.) bei 135° ; es empfiehlt sich, die Dest. über, der Kolbenrückstand enthält dieses, den Äther u. den Alkohol;

diese sind durch fraktionierte Dest. trennbar; Kp. des Äthers 263—264° (753 D.¹⁵ 0,807; Ausbeute 35% der Theorie; beim Kochen mit 2% H₂SO₄ entsteht u. Octen. (C. r. d. l'Acad. des sciences 179. 1015—19. 1924.) HABERLAND.

Erich Müller und Friedrich Müller, *Die katalytische Zersetzung der Ameisensäure*. III. (II. vgl. E. MÜLLER u. KEIL, Ztschr. f. Elektrochem. 29. 396; C. 124. I. 1910.) Analog, wie l. c. für Os gezeigt u. in neuen Verss. bestätigt werden wirken auch bei Ru, Rh, Pd, Ir u. Pt die Verbb. weit stärker katalyt. als die Metalle, selbst wenn diese in feiner Verteilung vorliegen. Diese Metalle u. Verbb. wirken schwächer als Os, ausgenommen Ru in Form des Hydroxyds, das an Wrkg. das Os weit übertrifft u. gleich diesem zur B. von kolloidalen Ionen neigt. Die frühere Erfahrung, daß die katalyt. Wrkg. stark vom Dispersitätsgrad abhängt, fand also weitere Bestätigung. Zur Deutung der Erscheinungen korrigiert Vff. auf die früher (E. MÜLLER, Ztschr. f. Elektrochem. 29. 264; C. 1924. I. 124) angenommene B. von „Oxyameisensäure“, H-C(:O):O, zurück. In der Elektroenschreibweise von KNORR (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 129. 109; C. 1924. I. 183)




wäre ihre B. durch die Formel E zu erklären, der Ameisensäure käme die Formel zu. Dann ist auch das Gleichgewicht $\text{A} \rightleftharpoons \text{B} \rightleftharpoons \text{F}$ möglich. Da in E u. F nur durch 1 Elektron mit C verknüpft ist, werden diese Verbb. instabil und setzen sich um nach $2\text{E} \rightarrow \text{H}_2 + \equiv\text{O}-\text{C}\equiv\text{O}\equiv$ u. $\text{F} \rightarrow \text{H}-\text{H} + \text{CO}$ u. wird angenommen, daß die Metalle bei genügend geringer Teilchengröße in die intramolekularen Kraftfelder von E u. F eindringen u. die Elektronen von metastabilen Bahnen in stabile lenken können. (Ztschr. f. Elektrochem. 30. 49 bis 497. 1924. Dresden.) HERTZ.

Gilbert T. Morgan und Arthur R. Bowen, *Beobachtungen über die höheren Fettsäuren*. I. *Die höheren gesättigten Fettsäuren der Kakaobutter*. Kakaothe kann nicht zur Gewinnung von Eikosansäure verwandt werden. Fraktionierte Krystallisation der Fettsäuren u. fraktionierte Fällung ihrer Magnesiumsalze führt zu keiner höheren Fettsäure als Stearinsäure. Die bei der Verseifung der Kakaobutter gewonnenen Fettsäuren wurden nach der Methode mit Magnesiumacetat in gesätt. u. ungesätt. getrennt. Die erste Fraktion der gesätt. Säuren (F. 3,0) erwies sich als Stearinsäure (Mischprobe mit Eikosansäure F. 64—67°), aus der zweiten Fraktion (60 g) wurden 0,3 g der am wenigsten l. Säure erhalten, F. 3,5. Mischprobe mit Eikosansäure F. 64,5°. — *n-Eikosansäure* wurde aus Erucasäure u. aus Widdertalg dargestellt, F. 74,5—75°, Methylester F. 45,5—46,5°, Äthylester F. 41,5°. — *Arachinsäure* wurde aus Arachisöl nach demselben Verf. isoliert, F. 74°, Mischprobe mit *n-Eikosansäure* F. 67—68°.

II. *Die Existenz bimolekularer Komplexe der höheren gesättigten Fettsäuren*. Aus der kryoskop. Unters. des Systems *Eikosansäure-Stearinsäure* ergibt sich die Existenz einer bimol. Komplexverb. aus 1 Mol. jeder Komponenten = 1,4% C₂₀H₄₀O₂ + 47,6% C₁₈H₃₆O₂. Da sich auch im System *Stearinsäure-Palmitinsäure* die entsprechende Komplexverb. (47,5% Stearin- + 52,5% Palmitinsäure) isolieren lassen, weisen Vff. auf die Unmöglichkeit hin, derartige Verbb. durch fraktionierte Krystallisation zu trennen. Den gewöhnlichen Reinheitsprüfungen gegenüber verhalten sie sich wie einheitliche Verbb. Diese Ergebnisse stehen in Übereinstimmung mit denen von MÜLLER u. SHEARER (vgl. Journ. Chem. Soc. London 123. 156; C. 1924. I. 892), wonach die höheren gesätt. Fettsäuren selbst bimol. sind. (Journ. Soc. Chem. Ind. 43. T. 346—48. 1924. Birmingham, Univ.) ZANDER.

Charles Frederick Allpress und William Maw, *Die Carbonate von Äthylenglykol und ähnlichen Verbindungen.* (Vgl. ALLPRESS u. HAWORTH, Journ. Chem. Soc. London 125. 1223; C. 1924. II. 2023.) Beim Durchleiten von Phosgen durch Äthylenglykol entsteht Äthylencarbonat (I), die Verb. entsteht auch aus Chlorkohlensäureester + Dinatriumäthylenglykol. Dicarbomethoxy- u. Äthoxyglykol (II) entsteht aus Glykol u. Chlorkohlensäureester in Ggw. von Pyridin; entsprechende Tricarbäthoxyderivate wurden analog aus Glycerin dargestellt. Wird statt Pyridin Äthylalkohol bei der Kondensation angewandt, so entsteht Monocarbomethoxyglycerincarbonat (III); diese Verb. (wie auch das entsprechende Äthoxyderiv.) entsteht auch aus Chlorkohlensäureestern u. der Dinatriumverb. des Glycerins. Durch Säuren, Alkalien u. Natriumalkoholat werden die Verbb. vollständig hydrolysiert. Aus Triäthoxyglycerin läßt sich durch Zugabe von 1 Mol. Ba(OH)₂ eine COOC₂H₅-Gruppe abspalten. Werden wss. alkoh. Lsgg. der Kohlensäureester mit Ba(OH)₂ behandelt, so bildet sich allmählich BaCO₃, als Zwischenprodd. werden wahrscheinlich die IV entsprechenden Ba-Salze gebildet. — Einw. von 1 Mol. Chlorbromsäureester auf Glykole führt nicht zu Monocarbäthoxyglykol, sondern zu I, da das intermediär gebildete Carbäthoxyglykol 1 Mol. C₂H₅OH abspaltert.




Versuche. Äthylencarbonat (I), gibt mit methylalkoh. CH₃ONa einen Nd. von Dimethylcarbonat. — Dicarbomethoxyglykol, C₆H₁₀O₆ (II, R = CH₃), aus Äthylglykol + 3 Mol. Pyridin in Chlf. (Eiskühlung) durch Zugabe von 3 Mol. Chlorkohlensäureester in Chlf. u. 1-std. Schütteln; bewegliche Fl., Kp.₃ 101°, nicht flüchtig mit W. u. Chlf., sonst l. in organ. Mitteln. — Dicarbäthoxyglykol, C₈H₁₄O₆, charakterist. riechende Fl., Kp.₇₆₀ 240—250°, Kp.₂ 116—117°; bei 1-std. Erhitzen unter Rückfluß keine Zers. — Monocarbomethoxyglycerincarbonat, C₇H₁₀O₆ (R = CH₃), aus 1 Mol. Glycerin + 5 Mol. Chlorkohlensäureester + 2-n. NaOH, wss. Lsg. dauernd alkal. bleibt; aus A. Nadeln, F. 88°, l. in Aceton u. h. A., wl. in Bzl., unl. in W. — Monocarbäthoxyglycerincarbonat, C₇H₁₀O₆ (III, R = C₂H₅), zähe Fl., Kp. 304—306°. — Tricarbomethoxyglycerin, C₉H₁₄O₇, zähe Fl., Kp. 152°, l. in organ. Mitteln außer PÄe. — Tricarbäthoxyglycerin, C₁₂H₂₀O₇, zähe Fl., Kp.₇₆₀ 168—169°. — Dicarbäthoxyglycerin, C₉H₁₆O₇, viscose Fl., Kp. 162—163°. — Dicarbäthoxydiäthyltartrat, C₁₁H₂₂O₁₀, aus 10 g Weinsäure + 11,6 g Pyridin + 16 g Chlorkohlensäureester, gelbes Öl, Kp._{0,4} 173°, [α]_D = +14,9° (c = 3,0 in A.); werden statt Pyridin 2 g Na zur Rk. angewandt, so entsteht nur eine geringe Menge einer opt.-inakt. Verb., Kp._{0,6} 174°, F. 75°. (Journ. Chem. Soc. London 125. 2259—64. 1924. Newcastle-upon-Tyne, HABERLAND.)

Billon, Über die der allgemeinen Formel RCH(NH₂)(CH₂OH)R₁R₂ entsprechenden primären β-Aminoalkohole. Durch Red. des Oxims des Diäthylacetessigsäureäthylesters mittels Na + A. wurde β-Amino-α,α-diäthylbutanol (R = CH₃, R₂ = C₂H₅) erhalten. Darst. des Oxims: 22 g NH₂OH·HCl + 42 g Diäthylacetat in W. werden versetzt mit 40 g des Esters u. danach A. zugegeben, bis eine homogene Lsg. entstanden ist; es wird 30 Stdn. auf dem Wasserbad erhitzt, bis der Eindampf des Oxim mit Ä. extrahiert; Kp.₁₅ 148°, aus Ä.-Lg. Krystalle, F. 10°. — Darst. des Aminoalkohols: 36 g Oxim in 600 g absol. A. werden einmal mit 100 g Na versetzt (heftige Rk.), es wird bis zur Auflösung des Na im Metallbade erhitzt u. dann mit W. versetzt. Im Vakuum wird A. abdest. u. das Destillat in einer mit HCl beschickten, auf -18° gekühlten Vorlage aufgefangen. Das Dest. dest., Rückstände beider Dest. vereint, mit Ä. extrahiert, äth. Lsg. mit


HCl behandelt; aus der salzsauren Lsg. erhaltenes Chlorhydrat wird zers., Aminoalkohol in Ä. gel. u. dest.; bis 150° bei gewöhnlichem Druck, danach 22 mm. Kp.₂₂ 132°; Chlorhydrat des Aminoalkohols aus A. F. 115°; Benzoylhydrat des Chlorhydrats aus A. F. 180°. (C. r. d. l'Acad. des sciences 179. 1054 1924.)

HABERLAND.

John Baldwin Shoesmith und Robert Henry Slater, Polaritätswirkungen bei den isomeren ω -Bromxylole und den isomeren Jodtoluolen. (Vgl. SHOESMITH u. SLATER, Journ. Chem. Soc. London 125. 1312; C. 1914. 1083.) Die Leichtigkeit, mit der I—III bei 60° (sd. Chlf.) hydrolysiert werden sollte nach der Theorie der induzierten wechselnden Polarität sein: $p > o > m$. Die Leichtigkeit der Red. durch HJ müßte sein: $m > o > p$. Das Experiment hat die Annahme bestätigt (Tabelle im Original). Alle Verbb. sind, infolge des durch die CH_3 -Gruppe ausgeübten polaren Einflusses, leichter hydrolysierbar als nicht substituiertes Benzylbromid. III wird leichter hydrolysiert als das entsprechende Jodderivat. Bei IV—VI war die Leichtigkeit der Red. $o > p > m$, da hier Hagen dem „Schlüsselatom“ eine Stelle näher liegt.



Die Annahme LOWRYS (Journ. Chem. Soc. London 123. 822; C. 1923. III. 74) daß induzierte wechselnde Polarität nur bei vollkommen konjugierten Verbb. bemerkbar macht, wird durch die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit widerlegt. Nach Ansicht der Vff. begünstigt der Benzolring die Wrkgg. der induzierten Polarität. — Die Darst. der Verbb. I—III geschah auf folgendem Wege:



o-Tolunitril, Kp. 202—204°, *m*-Tolunitril, Kp. 210—212°. — *p*-Tolunitril, Kp. 210 bis 217°. — *o*-Tolylmethylamin, Kp. 200—202°. — *m*-Tolylmethylamin, Kp. 198—200°. — *p*-Tolylmethylamin, Kp. 194—196°. — *o*-Tolylcarbinol, aus Ä. F. 33°, Kp. 111 bis 114°. — *m*-Tolylcarbinol, Kp.₁₀ 108—111°. — *p*-Tolylcarbinol, F. 60°. — *o*- ω -Bromxylole (I), F. 20°, Kp.₁₁ 102°. — *m*- ω -Bromxylole (II), Kp.₃ 97—99°. — *p*- ω -Bromxylole (III), F. 35,5°, Kp.₆ 100°. Die Red. wurde bei 25° mit Eg.-HJ (0,70 H pro cem) ausgeführt. Als Reduktionsprodd. wurden nach 40 Stdn. isoliert: *o*-Jodxylole (IV), F. 33—34°, *o*-Jod-*p*-xylole (V), F. 46—47°, u. Benzyljodid aus I, III u. VI. CH₂Br; aus II wurde *m*-Xylole erhalten. — Red. von IV u. VI führte zu Toluolen (Journ. Chem. Soc. London 125. 2278—83. 1924. Edinburgh, Univ.) HABERLAND.

Frederick Stanley Kipping, Organische Derivate des Siliciums. Teil XXIX. Komplexe Silicokohlenwasserstoffe $[\text{Si}(\text{C}_6\text{H}_5)_2]_n$. (XXIX. vgl. PINK u. KIPPING, Journ. Chem. Soc. London 123. 2830; C. 1924. I. 1361.) Außer den beiden früher beschriebenen Reaktionsprodd. bei der Einw. von Na auf Diphenylsilicyldichlorid (vgl. KIPPING u. SANDS, Journ. Chem. Soc. London 119. 848; C. 1921. III. 949 u. KIPPING, Journ. Chem. Soc. London 123. 2590; C. 1924. I. 304) entstehen bei dieser Rk. noch zwei andere Silico-KW-stoffe der Formel $[\text{Si}(\text{C}_6\text{H}_5)_2]_n$. Verb. I ist sehr wenig reaktionsfähig, sie ist beständig gegen J, sd. CCl_4 , sd. $\text{C}_6\text{H}_5\text{NO}_2$ sowie Alkalien u. Pipendin. Sie kann eventuell angesehen werden als Dodekaphenylcyclasilicohexan $[\text{Si}(\text{C}_6\text{H}_5)_2]_6$, entstanden aus 1 Mol. $\text{Si}(\text{C}_6\text{H}_5)_2\text{Cl} \cdot \text{Si}(\text{C}_6\text{H}_5)_2\text{Cl}$ u. 1 Mol. $\text{Si}(\text{C}_6\text{H}_5)_2\text{Cl} \cdot [\text{Si}(\text{C}_6\text{H}_5)_2]_4$ oder als Hexadekaphenylcyclasilicoctan, entstanden aus 2 Mol. der letzteren Verbb. Eine Best. des Mol.-Gew. war wegen der geringen Löslichkeit von I nicht

lich. — Der andere KW-stoff (II) konnte bisher nur als zum Teil gelatinöses erhalten werden; er ist in organ. Mitteln vollkommen unl., durch sd. CCl_4 , J tritt keine Veränderung ein, durch Alkalien u. Piperidin wird er vollkommen in *Diphenylsilicandiol* u. dessen Kondensationsprodd. nach der Gleichung: $\text{Si}(\text{C}_6\text{H}_5)_2 + 2\text{H}_2\text{O} = \text{Si}(\text{C}_6\text{H}_5)_2(\text{OH})_2 + \text{H}_2$; durch HNO_3 oder KMnO_4 wird II oxydiert, mit sd. $\text{C}_6\text{H}_5\text{NO}_2$ findet vollständige Zers. statt. Aus dem chem. Verh. guten Vf., daß die Verb. zwei Si^{IV} -Atome enthält u. konstituiert ist nach $\text{Si}(\text{C}_6\text{H}_5)_2 \cdot [\text{Si}(\text{C}_6\text{H}_5)_2]_1 \cdot \text{Si}(\text{C}_6\text{H}_5)_2$ oder $\text{Si}(\text{C}_6\text{H}_5)_2 \cdot [\text{Si}(\text{C}_6\text{H}_5)_2]_6 \cdot \text{Si}(\text{C}_6\text{H}_5)_2$. Die Trägheit von J gegenüber Jod u. halogenhaltigen Verb. ist vielleicht darauf zurückzuführen, daß die Si^{IV} -Atome maskiert sind dadurch, daß 2 Mol. des von KIPPING u. SANDS beschriebene „ungesätt.“ KW-stoffs zu II sich vereinigt haben.

Versuche. Verb. $[\text{Si}(\text{C}_6\text{H}_5)_2]_n$ (I), diese Verb. wird neben dem „ungesätt. Stoff“ aus dem Toluolextrakt erhalten; beide sind trennbar durch Behandeln mit Bzl. suspendierten Gemischs mit J, wodurch I ungel. bleibt; aus Bzl. mkr. seitige Pyramiden u. Rhomboeder, die nach wenigen Min. an Luft undurchdringl. werden; bei 75° sind 0,6 g l. in 100 g Bzl., in sd. Toluol 0,7 g; l. auch in geschmolzenem Campher u. sd. Benzylalkohol; swl. in sd. Nitrobenzol u. CCl_4 ; Einw. von $\text{C}_6\text{H}_5\text{ONa}$ bei 220° führt zu keiner Umsetzung. — Verb. $[\text{Si}(\text{C}_6\text{H}_5)_2]_n$ wird isoliert aus dem nach Extrahieren des Reaktionsprod. mit Toluol erhalten blauen unl. Rückstand (zum Teil aus Na u. NaCl bestehend), indem dieser mit A. + Essigsäure versetzt wird; nach Zugabe von W. wird der graue Rückstand mit sd. W. gut gewaschen u. schließlich zur Entfernung von I wiederholt 16 Stdn. lang mit sd. Benzol behandelt. Der unl. Rückstand geht aus II; graues, etwas gelatinöses Pulver, das immer noch etwas I enthält; empfiehlt sich daher, aus dem blauen Prod. I zunächst durch sd. Toluol zu entfernen, den mit A. u. Essigsäure behandelten Rückstand nach Waschen mit W. auf mehrwöchige Diffusion zu reinigen, das Prod. mit Aceton u. schließlich mit Bzl. zu waschen; die Verb. verpufft beim Erhitzen auf dem Pt-Blech; durch ständ. Erhitzen mit sd. W. entsteht eine schwach gelbe Lsg. u. eine geringe Menge in Aceton u. Bzl. l. Verb.; l. ölige Prodd. entstehen auch (unter heftiger K. mit HNO_3 -haltiger w. Essigsäure, diese sind l. in alkoh. KOH ohne Entw. von H_2 , aus der alkoh. Lsg. erhält man nach Eindampfen u. Ansäuern *Diphenylsilicandiol*; mit w. Nitrobenzol quillt II ohne chem. verändert zu werden auf; bei kurzem Kochen hiermit geht II allmählich in Lsg.; das hieraus erhaltene dunkelbraune Öl gibt bei der Hydrolyse mit alkoh. KOH das K-Deriv. des *Diphenylsilicandiols*. Einw. von sd. wss. Piperidin + Alkali auf II führte in einem Falle zu *tetraaanhdyrotetrakisidiphenylsilicandiol*, in allen anderen Fällen wurden nur die genannten Prodd. erhalten. (Journ. Chem. Soc. London 125. 2291—97. 1924. Birmingham, Univ. Coll.)

HABERLAND.

Harold Burton und Charles Stanley Gibson, Eine bequeme Methode zur Darstellung von Arsinsäuren aus den entsprechenden Chlorarsinen. Tertiäre Chlorarsine werden durch Na-p-Toluolsulfonchloramid (= Chloramin T) zu den entsprechenden Arsinsäuren oxydiert. 1 Mol. des Chlorarsins in Aceton (20 ccm pro g Substanz) wird mit einer 10%ig. Lsg. von 2 Mol. Chloramin T in W. versetzt u. 10 min. gekocht. Isolierung der Säuren durch Extraktion mit Na_2CO_3 -Lsg. Darzustellen wurden: *n-Butylarsinsäure* aus n-Butylchlorarsin, F. 160° , l. in W. — *Phenylarsinsäure*, $\text{C}_6\text{H}_5\text{O}_3\text{As}$, aus W. Nadeln, F. $163\text{—}164^\circ$. — *Diphenylarsinsäure*, F. $9\text{—}170^\circ$. — *Phenarsazinsäure*, $\text{C}_{12}\text{H}_{10}\text{O}_2\text{NAs}$, aus 10-Chlor-5,10-dioxyphenarsazin; Nadeln; die von WIELAND u. REINHEIMER (LIEBIGS Ann. 423. 1; C. 1921. III. 21) durch Umkrystallisieren der Säure aus Eg. erhaltenen Krystalle sind wahrscheinlich das Acetat der Verb.; Chlorhydrat, $\text{C}_{12}\text{H}_{11}\text{O}_2\text{NClAs}$, aus A. Nadeln, F. $10\text{—}205^\circ$ (Zers.); Nitrat, $\text{C}_{12}\text{H}_{11}\text{O}_5\text{N}_2\text{As}$, aus Gemisch von h. verd. HNO_3 + A.

hellgelbe Nadeln ohne bestimmten F.; Sulfat, $C_{14}H_{12}O_8N_2SAs_2$, aus A. + B. Prismen, F. 138–140° (Zers.). *N-Acetylphenarsazinsäure*, $C_{11}H_{12}O_3NAs$, aus d. folgenden Verb. dargestellt; aus wss. A. flache Prismen mit $2H_2O$, F. 244–245° (Zers.), unl. in W. — *10-Chlor-5-acetyl-5,10-dihydrophenarsazin*, $C_{14}H_{11}ONClAs$, aus der acetylfreien Verb. in Bzl. + CH_3COCl durch 4std. Kochen; aus Bzl. N. F. 229–230°. — *N-Propionylphenarsazinsäure*, $C_{15}H_{14}O_3NAs$, aus nachgen. Verb. dargestellt; F. 232° (Zers.), unl. in W. u. A. — *10-Chlor-5-propionyl-5,10-dihydrophenarsazin*, $C_{15}H_{13}ONClAs$, aus der propionylfreien Verb. durch 10std. K. h. mit Propionanhydrid in Xylol + wenig Pyridin; aus Bzl.-PAc. Tafeln, F. 136–137°. — *N-Benzoylphenarsazinsäure*, $C_{19}H_{11}O_3NAs$, aus der nächsten Verb. dargestellt; Prismen, F. 250° (Zers.). — *10-Chlor-5-benzoyl-5,10-dihydrophenarsazin*, $C_{19}H_{10}ONClAs$, aus Bzl. F. 180–181°. (Journ. Chem. Soc. London 125. 2271–2272. 1924. London, GUYS Hospital.)


HABERLAND.

C. M. Keyworth, *Arylaminsalze einiger Sulfonsäuren der Benzolreihe*. I. *Eisensulfonsäure*. (Vgl. FORSTER u. KEYWORTH, Journ. Soc. Chem. Ind. 43. T. 299; C. 1924. II. 2582.) Nachstehende Salze der Benzolsulfonsäure wurde aus dem Ba- oder Ca-Salz + Arylamin + HCl dargestellt (FF. korr.): *Anilinsalz*, aus h. W. Nadeln, F. 240°; 11,3/100 bei 19° (= 100 Gewichtsteile gesätt. Lsg. entlt. 11,3 g Salz). — *o-Tolidinsalz*, aus A. weiße Nadeln, F. 176°, 20/100 bei 16°. — *m-Tolidinsalz*, Nadeln oder Prismen, F. 173°; 9,1/100 bei 18°. — *p-Tolidinsalz*, weiße Nadeln, F. 205°; 7,4/100 bei 16°. — *α-Naphthylaminsalz*, weiße Nadeln, F. 234°; 0,77/100 bei 14°, ll. in h. W. — *β-Naphthylaminsalz*, weiße Tafeln, F. 244°; 0,59/100 bei 14°, weniger l. in h. W. als voriges. — *p-Nitro-o-tolidinsalz*, hellgelbe Nadeln, F. 222°; 1,84/100 bei 15°. — *m-Nitroanilinsalz*, gelbe Tafeln, F. 223° (Zers.); 3,85/100 bei 15°. — *m-Xylidinsalz* aus A. F. 233°; 1,46/100 bei 16°. — *Benzidinsalz*, F. über 330°; 0,59/100 bei 16°. — *o-Tolidinsalz*, grauweiße Tafeln, F. 310°; 1,45/100 bei 15°, ll. in h. W. — *Dianisidinsalz*, graue Nadeln, F. 177°. — *m-Phenylendiaminsalz*, graue Prismen, F. über 320°; 19/100 bei 17°. — *p-Phenylendiaminsalz*, Tafeln, F. über 320°; 2,57/100 bei 10°. — *p-Kloranilinsalz* weiße Tafeln, F. 235°; 2,51/100 bei 20°. — *o-Chloranilinsalz*, F. 203°. — *ps-Cumidinsalz*, aus W. oder A. weiße Nadeln, F. 117°. — *p-Anisidinsalz*, weiße Nadeln, F. 182°; 12,8/100 bei 16°. — *p-Phenetidinsalz*, Nadeln, F. 171°; 21/100 bei 17°, sehr ll. in h. W. — N-substituierte Arylamine bilden nur schwierig Salze. Mit m-Nitro-p-toluidin u. β-Aminoanthrachinon wurden keine Salze gebildet. Bas. Salze aus Diaminen konnten nicht in reinem Zustande erhalten werden. (Journ. Soc. Chem. Ind. 43. T. 341–42. 1924. Liverpool, Univ.)


HABERLAND.

Fr. Fichter und Ernst Stocker, *Über die elektrochemische Oxydation von Benzolsulfosäure, Toluol-o-sulfosäure und Benzol-p-disulfosäure und die dabei auftretenden Persäuren*. Kurzes Ref. nach Trans. Amer. Electr. Soc. vgl. C. 191. I. 631. Nachzutragen ist folgendes: bei der Elektrolyse von Benzolsulfosäure rührt man mit Diaphragma *Fumarsäure*, ohne Diaphragma ein Gemisch von *Fumar- und Bernsteinsäure*. — Die Isolierung von *Brenzcatechinsulfosäure* erfolgt, nachdem Chinon u. zweibas. Fettsäuren mit Ä. extrahiert worden sind, durch Neutralisation der wss. Lsg. mit $BaCO_3$ (bis Kongopapier nicht mehr gebläut, Lackmus aber noch gerötet wird); das Filtrat hiervon wird mit bas. Pb-Acetat versetzt, wodurch das Pb-Salz der Brenzcatechinsulfosäure, $C_8H_4O_6S_2Pb_2$, ausfällt; hieraus die freie Säure als Ba-Salz, $(C_8H_4O_6S_2)_2Ba$, braune Krusten; gibt mit $FeCl_3$ Grünfärbung, die durch Na_2CO_3 rot wird. Durch Methylieren der freien Säure erhält man *Veratrolsulfosäure*; K-Salz, $C_8H_4O_6SK$. — Daß bei der Einw. von konz. H_2O_2 auf Benzolsulfosäureanhydrid vorübergehend *Benzolsulfopersäure* entsteht, ergibt sich daraus, daß die verd. Lsg. aus KBr-Lsg. Br frei macht. Eine Mischung von Benzolsulfopersäure


drid mit Eg. + 100%ig. H_2O_2 gibt bei Zusatz von Pd-Mehr heftige Rk. (bis-
en Entzündung) u. Zers. — Schemat. läßt sich die elektrolyt. Oxydation von
sulfosäure durch folgende Formeln darstellen:



Elektrolyse von n. *Toluol-o-sulfosäure* legg. an Pt- oder PbO_2 -Anode mit
0 Amp./qcm u. 24 Farad/Mol. ergab gleich am Anfang starke Oxydationswrkg.
anolyten, ein Zeichen dafür, daß auch hier zunächst eine *Persäure* gebildet
ist. Als Reaktionsprodd. wurden isoliert. a) *Mesaconsäure*, $C_5H_6O_4$, nach Subli-
mation im Vakuum (11 mm, Badtemp. 135—140°) F. 199°; diese Verb. wurde bei
Zerlegung von Pb-Elektroden u. Diaphragma erhalten; an Pt-Anoden erhaltenes
Produkt hatte F. 159—160° (Itaconsäure?). b) Durch Geruch erkennbar war *Chinon*
oder *Chinon*?. c) Eine durch bas. Pb-Acetat fällbare Sulfosäure, der Analyse nach
Brenzcatechinsulfocarbonsäure; Ba-Salz, $C_6H_4O_7S$ Ba; gibt mit $FeCl_3$ intensive
Färbung. Das Reaktionsschema ist wahrscheinlich folgendes:




Benzol-p-disulfosäure-Lsg mit 0,005 Amp./qcm elektrolysiert gab nach Verbrauch
100 Farad/Mol. geringe Mengen *Fumarsäure*; als Hauptprod. wurde eine durch
Pb-Acetat fällbare Sulfosäure erhalten; die Pb- oder Ba-Salze konnten jedoch
nicht in einheitlicher Zus. erhalten werden, es schienen Gemische von *brenzcatechin-*
säure u. *phenol-2,5-disulfosäure* Ba vorzuliegen. Hypothes. Reaktionsschema:



Chem. Acta 7. 1064—78. 1924. Basel, Anst. f. anorg. Chem.) HABERLAND.


Lacroix, Über die elektrolytische Reduktion des 3,3'-Dinitrodiphenylsulfons
infolge seiner Umwandlung in 3,3'-Diaminodiphenylsulfon. Zu der schon nach
d. l'Acad. des sciences referierten Arbeit (C. 1924. I. 1785) werden die aus-
geführten Versuchsergebnisse veröffentlicht. (Bull. Soc. Chim. de France [4] 35.
1924. 3—50. 1924. Toulouse, Inst. de Chim.) HABERLAND.

Kuverji Gossai Naik und Chaturbhai Shankarbhay Patel, Umsetzung von
Phenylmonochlorid mit organischen Säureamiden. II. (I. vgl. NAIK, Journ. Chem.
Soc. London 119. 1166; C. 1921. III. 1120.) Bei Einw. von S_2Cl_2 auf NH_2 einer-
seits auf Säureamide (Oxamid, Phthalamid etc.) andererseits hatten sich zwei
Typen ergeben; im ersten Falle fand heftige Rk. statt, im letzteren trat keine
Rk. ein; dazwischen ergaben sich Fälle (Acetamid, Benzamid) in denen ein Mono-
sulfid, z. B. $(CH_3CONH)_2S$, entstand. Durch Schwächung des Säurerestes sollte nun
erreicht werden, die Reaktionsfähigkeit der NH_2 -Gruppe so zu vermehren, daß
aus der Diimido-(Hydrazin-)deriv. entstanden. Der Zweck wurde erreicht
durch Einw. von S_2Cl_2 auf *i-Butyramid*, *Valeramid* u. *Capronamid*, die nach Schema 1)
verhalten. — *Trichloracetamid* reagierte analog, mit *Monochloracetamid* entstand da-
bei das Monosulfid. *Cyanacetamid* reagiert nach Schema 2) indem die CH_2 -Gruppe
tritt. — *i-Butyranilid* u. *Phenylacetanilid* gehen mit S_2Cl_2 wie *Salicylamid*
(s. c.) ein Disulfid (Schema 3); *Acetylsalicylanilid* bildet dagegen ein Trisulfid
(Schema 4).



Versuche. *s. Dicaproylhydrazin*, $\text{C}_{12}\text{H}_{24}\text{O}_2\text{N}_2$, aus 3 g Capronamid - S_2Cl_2 in 50 cem sd. PAe.; aus Bzl. Tafeln, F. 111–112°, ll. in Bzl., A., Acet. w. W., wl. in Chlf., unl. in PAe. u. CS_2 ; wird durch alkoh. Na_2S zu Capronamid red. — *s. Divalerylhydrazin*, $\text{C}_{10}\text{H}_{20}\text{O}_2\text{N}_2$, aus Bzl. Tafeln, F. 123°, Lösliche bei vorigem. — *s. Di-*i*-butyrylhydrazin*, $\text{C}_8\text{H}_{16}\text{O}_2\text{N}_2$, aus Bzl. weiße Tafeln, 11 bis 121°. — *N-Sulfidochloracetamid*, $\text{C}_4\text{H}_6\text{O}_2\text{N}_2\text{Cl}_2\text{S}$, aus Monochloracetamid + S_2Cl_2 in sd. Bzl.; aus h. A. weiße Krystalle, F. 165° unter Zers., gelbe Schmel. — *s. Hexachlordiacetylhydrazin*, $\text{C}_4\text{H}_2\text{O}_2\text{N}_2\text{Cl}_6$, aus Bzl. weiße Nadeln, F. 148–149°. — *Cyanacetamiddisulfid*, $\text{C}_6\text{H}_6\text{O}_4\text{N}_2\text{S}_2$, F. 103° (Zers.), unl. in Bzl., PAe. u. CS_2 , in A. Hydrolyse; bei längerem Stehen Zers. zu schwarzer M. — *s. Di-*i*-butyryldiacetylphenyldisulfid*, $\text{C}_{20}\text{H}_{24}\text{O}_2\text{N}_2\text{S}_2$, aus Bzl. indigofarbiges körniges Pulver, F. 110–102°, ll. in Bzl., Lsg. ist violett gefärbt. — *s. Diphenyldiacetyldiaminodiphenyldisulfid*, $\text{C}_{28}\text{H}_{24}\text{O}_2\text{N}_2\text{S}_2$, aus Bzl. durch PAe. gefällt, F. 162–163°. Geht auf Behandlung mit HNO_3 (D. 1,5) bei niedriger Temp. über in *s. Tetranitrodiphenyldiacetyldiaminodiphenyldisulfid*, $\text{C}_{28}\text{H}_{20}\text{O}_{10}\text{N}_6\text{S}_2$, durch Zugabe von W. als gelber Niederschlag gefällt, F. 148–150° (Zers.). — *s. Diacetoxydianilinodiformyldiphenyltrithiol*, $\text{C}_{30}\text{H}_{24}\text{O}_6\text{N}_2\text{S}_3$ (Gleichung 4), aus Bzl. mit PAe. gefällt hellgelbes Pulver, F. 148–150° (Zers.). (Quaterly Journ. Indian Chem.-Soc. 1. 27–35. 1924. Baroda, Coll.)

Prafulla Chandra Rây, Wechselnde Wertigkeit des Goldes gegenüber Mercapto- und Thio- radikalen. Teil I. (Vgl. Journ. Chem. Soc. London 123. 133; C. 1923. 188). *Diäthylldisulfid* gibt mit AuCl_3 eine Verb., der entweder Konst. I (2-wertig) oder II (4-wertig) zukommt; bei dieser Rk. kann auch Verb. III bilden werden, in der Au 2- u. 3-wertig ist. Einw. von AuCl_3 auf *Monokäthylthioäthylenglykol* führt zu IV mit Au^{II} u. Au^{III} . Der aus *Benzaldiäthylentetrasulfid* mit AuCl_3 entstehenden Verb. kommt Konst. V zu. Durch Einw. von AuCl_3 auf *Isopropyläthylentrisulfid* wird dieses zu *Diäthylendisulfid* (A) aufgespalten, es entstehen verschiedene Verbb.: 6 A, Au_2Cl_3 ; 5 A, Au_3Cl_5 (VI); 4 A, Au_3Cl_4 ; 4 A, Au_3Cl_2 ; 3 A, Au_2Cl_3 ; 3 A, Au_2Cl_2 ; in diesen Derivv. ist Au abwechselnd 2- u. 3-wertig. Wird bei hien



Verb. (78°) gearbeitet, so wird (A) in Äthylendisulfid gespalten, es entsteht Verb. $(C_2H_5)_2Au_2Cl_2$. — Verb. mit 5-wertigem Au (VII u. VIII) werden erhalten aus Äthylentrisulfid + $AuCl_3$. Verb. IX entsteht aus Natriumdithioäthylenglykol + $AuCl_3$ in Acetonlsg.; in äth. Lsg. reagiert das Dinatriumsalz nach untenstehender Gleichung.

Versuche. Verb. $C_4H_{10}S_2Au_2Cl_4$ (I bzw. II), die mit überschüssigem $AuCl_3$ erhaltene gelbe zähe M. krystallisiert beim Reiben; wird am Licht infolge Absorption von Au langsam dunkler. — Verb. $(C_2H_5)_2S_2, Au_4Cl_2$ (III), durch Extrahieren der bei Darst. von I erhaltenen zähen M. mit Ä.; weißes Pulver. — Verb. $C_4H_8S_4Au_3Cl$ (X), Darst. durch 3—4 std. Kochen; hellbraun. — Verb. $C_4H_8S_4Au_4Cl$ (IV), braun. — Verb. $C_{26}H_{38}OS_8Au_3Cl_4$ (V + $[C_2H_5]_2O$), aus A. + Ä., rötliches Pulver. — Verb. $C_{24}H_{48}S_{12}, Au_4Cl_3 = 6[(C_2H_5)_2S_2], Au_4Cl_3$, aus 0,1940 g Benzaldehydentrisulfid in 5 ccm A. + 2 ccm alkoh. $AuCl_3$ -Lsg. (1 ccm = 0,0510 g Au) in 5°; die Verb. entsteht auch bei tieferen Tempp. als 55° u. wechselnder Konz. der Komponenten. — Verb. $5[(C_2H_5)_2S_2], Au_3Cl_5, 1\frac{1}{2}(C_2H_5)_2O$ (VI), aus 0,2474 g Trisulfid in 5 ccm Ä. (Eiswasserkühlung) + überschüssiges $AuCl_3$ in Ä.; braunes Pulver. — Verb. $4[(C_2H_5)_2S_2], Au_3Cl_4, \frac{1}{2}(C_2H_5)_2O$, erhalten durch Mischen der Komponenten in unbestimmtem Verhältnis. — Verb. $4[(C_2H_5)_2S_2], Au_3Cl_2$, 0,13 g Trisulfid in 1 ccm A. auf 72° erhitzt u. mit 10 ccm alkoh. $AuCl_3$ (1 ccm = 0,0155 g Au) versetzt — Verb. $3[(C_2H_5)_2S_2], Au_3Cl_2, C_2H_5OH$, aus 0,4991 g Trisulfid in A. durch Zugabe von 1 ccm alkoh. $AuCl_3$ (= 0,0623 g Au; purpurfarben, u. Mk. braun u. schmutzig. — Verb. $3[(C_2H_5)_2S_2], Au_3Cl_2, C_2H_5OH$, aus 0,3582 g Trisulfid in 25 ccm A. auf 60° + überschüssiges alkoh. $AuCl_3$. — Dinatriumdithioäthylenglykol, $C_2H_4S_2Na_2$, in äth. Lsg. des Glykols + fein verteiltem Na; krystallin. Pulver. — Verb. $C_4H_8S_4Au_2$ (IX), Darst. in der Wärme. — Verb. $(C_2H_5)_3S_2, 2AuCl_3$ (VII), durch Erhitzen alkoh. Lsgg. der Komponenten; orangefarben; aus dem Filtrat durch Einengen Verb. $C_6H_{12}S_3AuCl_2$ (VIII), weiße Krystalle. (Quaterly Journ. Indian Soc. 1. 63—73. 1924. Calcutta, Univ.)


HABERLAND.

L. F. Hunter, Mitteilung über die Darstellung von Ditolylthioharnstoffen und Thiocyanaten. Vf. weist darauf hin, daß bei der Darst. genannter Verbb. unangenehm riechende von Zwischen- oder Nebenprodd. stammende Dämpfe auftreten; die nachteilige physiolog. Eigenschaften besaßen. Die Vergiftung bleibt mehrere Tage bestehen; Vf. führt sie zum Teil auf CS_2 -Dämpfe zurück. Auch bei der Darst. von 1-Methylbenzothiazol tritt bei der Dest. ein hoch sd. Prod. mit ähnlichen Eigenschaften auf. (Chem. News 129. 344—45. 1924. Highbury New Park, Essex Lab.)

HABERLAND.

L. Briner, W. Plüss und H. Paillard, Untersuchungen über die katalytische Oxidation von Phenol-Alkohol-Systemen. (Vgl. BRINER, FERRERO u. DE LUSERNA, Ber. chim. Acta 7. 282; C. 1924. I. 2693.) Die l. c. angegebene B. einer unvollständigen Verb. durch Überleiten von $C_6H_5OH-CH_3OH$ -Dämpfen über erhitztes Al_2O_3 wurde erneut nachgeprüft u. gefunden, daß genannte Verb. Hexamethylbenzol, C_6H_6 (I), ist; seine Isolierung kann, da es in k. A. u. CH_3OH unl. ist, leicht erfolgen; durch Sublimation erhält man es als weiße Nadeln, F. 163,5—164°. Im weiteren Verlauf der Unterss. hat sich herausgestellt, daß I auch stets gebildet wird, wenn statt C_6H_5OH Di- oder Trioxybenzole angewandt werden. Aus den obigen Versuchsergebnissen ist folgendes hervorzuheben: Überleiten von C_6H_5OH allein über auf 416° erhitztes Al_2O_3 führt zur B. von sehr wenig Phenylacetylen; die Hauptmenge C_6H_5OH wird unverändert zurückgewonnen; wird ThO_2 anstatt Al_2O_3 benutzt, so wird die Ausbeute an $(C_6H_5)_2O$ nur mäßig erhöht. — CH_3OH wird durch Al_2O_3 bei 408° leicht dehydratisiert, es werden 40% Methyläther erhalten. Das Gemisch $C_6H_5OH-CH_3OH$ wurde eingehender untersucht, wobei ein klarer Unterschied in der Wirkungsweise von Al_2O_3 u. ThO_2 hervortrat; mit Al_2O_3 I.

ersterem wurde I neben unverändertem C_6H_5OH u. CH_3OH sowie $(CH_3)_2O$ erhalten. ThO_2 als Katalysator lieferte nur fl. Reaktionsprodd., unter denen *Anisol* identifiziert wurde. Wird statt in CO_2 - in N_2 -Atmosphäre gearbeitet, so werden dieselben Ergebnisse erhalten. Bzgl. der gebildeten Menge I (mit Al_2O_3 als Katalysator) ergibt sich, daß um so mehr gebildet wird, je größer der Überschuß von CH_3OH zu C_6H_5OH ist; es werden 49,3% I erhalten, wenn Gewicht von $C_6H_5OH : CH_3OH = 1$ ist, bei gleichen Teilen entstehen nur 15% I. Als optimale Temp. wurden 412–440° festgestellt, oberhalb 450° tritt Harzb. ein. Aus *o*-Kresol (16,3 g) + 12 g CH_3OH wurden — wie die folgenden Verss. stets mit Al_2O_3 — bei 403° erhalten 24,7% I, aus *m*-Kresol 3,6% I, aus *p*-Kresol 23,3% I; aus 15,2 g 1,4,5-Xylen 78,1 g CH_3OH bei 412° 54% I, aus 5,2 g 1,3,5-Xylenol + 45,9 g CH_3OH 55,6%. Mit *Resorcin*- CH_3OH wurden bei 451° 43% I erhalten; bei *Pyrogallol* waren dagegen die Ausbeuten sehr gering, da durch die hohe Temp. Zers. des *Pyrogallols* eintrat. — Um Klarheit über die bei der Rk. etwa entstehenden Gase zu erhalten, wurde zunächst das Verb. von CH_3OH gegenüber Al_2O_3 untersucht; es ergab sich, daß hierbei nicht nur Dehydratisierung, sondern auch eine Dehydrierung stattfindet; letztere ist bei 358° wenig ausgesprochen, wird jedoch bei 425° kräftiger. Daß die Hälfte des CH_3OH in CO u. H_2 gespalten wird; diese Gase können unter Zerfall von $HCHO$ entstanden sein, der, wie besondere Verss. ergeben haben, bei dieser Temp. nicht mehr beständig ist. C_6H_5OH bildet durch Einw. von Al_2O_3 bei 410–420° keine Gase, es tritt nur geringe Dehydratation ein. Daß der bei der Verb. von CH_3OH gebildete H_2 in C_6H_5OH - CH_3OH -Gemischen auf die OH-Gruppe des Phenols reduzierend wirkt, ergibt sich daraus, daß aus einem solchen Stoffgemisch weniger H_2 entwickelt wird, als wenn nur CH_3OH allein anwesend ist. Als Grund der experimentellen Befunde stellen Vff. für den Gesamtverlauf der Rk. die Gleichung 1. auf. Die B. von I wird auf Grund thermochem. Bedingungen am günstigsten; Vff. haben berechnet, daß pro 1 Mol. C_6H_5OH u. 2–7 Mol. C_6H_5OH folgende Wärmemengen frei werden: 8,7; 19,2; 26,4; 49,3; 57,0 u. 60,7 Cal. Vorherkommen läßt sich die bevorzugte B. von I jedoch nicht energet. erklären, bei 1 Mol. C_6H_5 + 6 Mol. CH_3OH würden 63,4 Cal. entwickeln, die B. von I nicht in diesem Falle aber nicht statt. Die günstigeren Ergebnisse mit C_6H_5OH ergeben ein weiteres Beispiel für die erhöhte Reaktionsfähigkeit eines Benzolkerns, in dem H durch OH substituiert worden ist.



Es wurden ferner Gemische von β -Naphthol + CH_3OH bei Temp. bis 440° mit Al_2O_3 behandelt u. analoge Ergebnisse erzielt wie mit C_6H_5OH - CH_3OH -Gemischen. Das hierbei entstehende Reaktionsprod. hat sich als ein noch unbekanntes *1-methyl-naphthalin*, $C_{11}H_{16}$, erwiesen; es wurde bei 13 mm oberhalb 136° als ein Öl erhalten, nach Abkühlen auf -15° aus A. weiße Nadeln, F. 104–105°; bei 10 mm aus A. orangefarbene Nadeln, F. 184–185°; die unterhalb Kp_{13} 136° übergehenden Anteile scheinen ein Gemisch verschieden methylierter Naphthalinderivv. zu sein. Gemische von C_6H_5OH - C_2H_5OH gaben bei 400–435° keine äthylierten Naphthalinderivv. homologen; zu erklären ist dies daraus, daß C_2H_5OH bei diesen Temp. in Al_2O_3 zerfällt u. kein H_2 wie bei CH_3OH entsteht, der die OH-Gruppe in CH_3OH red. könnte. Die Reaktionsprodd. bestanden in diesem Falle anscheinend aus Phenolderivv. (Helv. chim. Acta 7. 1046–56. 1924. Genf, Univ.) HABE AN

Gaetano Charrier und Alessandro Beretta, Einwirkung des Nitrosobenzols auf o-Nitroanilin. Im Gegensatz zu m- u. p-Nitroanilin, die mit Nitrosobenzol Nitroazobenzol übergehen, bildet o-Nitroanilin mit Nitrosobenzol das o-Nitro-p'-nitrosodiphenylamin, dem Vff. wegen seiner intensiven Farbe u. seiner Löslichkeit in Alkalien die chinoidale Form o-Nitrophenylimino-p-benzochinonoxim zuschreiben. Durch Oxydationsmittel wird das Di- u. Trinitroderiv. dargestellt. Das als

erem Wege synthet. dargestellte Nitrosoderiv. erwies sich als mit dem ident.


Versuche: *o*-Nitro-*p*'-nitrosodiphenylamin, $C_{12}H_9O_3N_3$ (I), granatrote Nadeln aus A., F. 175°, in Alkalien mit intensiv orangeroter Farbe l. — *o,p*'-Dinitrodiphenylamin, $C_{12}H_9O_4N_3$, aus vorigem u. H_2O_2 , orangerote Nadeln aus A., F. 217°. — *p,p*'-Trinitrodiphenylamin, $C_{12}H_6O_6N_4$, aus dem Nitrosoderiv. u. HNO_3 , citronengelbes prism. Nadeln aus Essigsäure, F. 186–187°. — *o*-Nitrodiphenylnitrosamin, aus *o*-Nitrodiphenylamin u. HNO_3 , F. 99–100°, gibt in äth. Lsg. durch Einw. von verdünnter HCl Umlagerung zu I. (Atti R. Accad. dei Lincei, Roma [5] 33. II. 1917–73. 1924. Pavia, Univ.)

ZANDER.

William Henry Perkin jun., Robert Robinson und Francis Wilbert Stoye, Darstellung von 2,3-Dimethoxybenzaldehyd. (Vgl. PERKIN, ROBERTS u. ROBINSON, Journ. Chem. Soc. London 105. 2389; C. 1915. I. 10.) Das durch Nitrierung von Veratrumaldehyd erhaltene Mononitroderiv. ist, wie sich jetzt herausgestellt hat, ein Gemisch von 6- u. 5-Nitro-2,3-dimethoxybenzaldehyd; das aus dem Prod. mit p-Toluidin erhaltene Gemisch der Schiffschen Basen, trennbar durch fraktionierte Kristallisation aus A., gab bei der Hydrolyse die genannten Verbh. Anzeichen für die Anwesenheit einer dritten Verb. im Nitriergemisch sind vorhanden. Die Ursache des 5- u. 6-Nitroderiv. ist darauf zurückzuführen, daß die m-dirigierende CHO-Gruppe des *o*-Veratrumaldehyds einerseits *o*-, andererseits m-ständig zu OCH_3 ist. Nach den bisher bekannten Substitutionsregeln müßte infolgedessen die CHO-Gruppe unter dem Einfluß der *o*- OCH_3 -Gruppe auf die Substitution vermindern u. eine Nitrierung an der 6-Stellung begünstigen; ster. Hinderung u. der Umstand, daß die CHO-Gruppe nur schwach m-dirigierend wirkt, schließen die alleinige B. des 6-Nitroderiv. aus. Versuche. Das nach der l. c. angegebenen Methode aus *o*-Veratrumaldehyd erhaltene Nitroprod. wird 10 Min. mit p-Toluidin auf dem Wasserbad erhitzt, nach Abheben von A. wird bis zur vollständigen Lsg. erhitzt. Beim Abkühlen fällt zuerst 5-Nitro-2,3-dimethoxybenzyliden-p-toluidin, $C_{16}H_{17}O_4N_3$, Nadeln, F. 143°; danach 6-Nitro-2,3-dimethoxybenzyliden-p-toluidin, aus A. rhomb. Tafeln, F. 104°. — 5-Nitro-2,3-dimethoxybenzylidenanilin, $(C_{15}H_{15}O_4N_2)$, B. u. Isolierung wie Toluidinderiv.; aus A. Nadeln, F. 122°; Chlorhydrat wird gegen 180° rot, F. 200°; außerdem entsteht: 6-Nitro-2,3-dimethoxybenzylidenanilin, Nadeln, F. 84°, Chlorhydrat F. 156° (Zers.). — 6-Nitro-2,3-dimethoxybenzaldehyd, $C_9H_7O_5N$, aus Bzl.-PAE. Nadeln, F. 115° liefert mit Aceton u. NaOH kein Indigotinderiv. — Dimethylacetal, $C_{11}H_{15}O_6N$, aus CH_3OH u. A., F. 89°. — Phenylhydrazon aus A. hellrote hexagonale Tafeln, F. 179°. — Semicarbazon aus A. Nadeln, F. 210°. — Oxim aus A. Nadeln, F. 155°. — 6-Nitro-2,3-dimethoxybenzaldehyd, $C_9H_7O_5N$, aus Bzl.-Lg. Nadeln, F. 110°, mit Aceton + A. entsteht ein Tetramethoxyindigotinderiv. — Dimethylacetal aus CH_3OH u. A., an Luft u. Licht bald grün werdend, F. 72°. — Phenylhydrazon aus A. braune Prismen, F. 138°. — Semicarbazon aus A. Nadeln, F. 227–228°. — Oxim, ebenso, F. 130°. — 6-Nitro-2,3-dimethoxybenzoesäure, aus W. flache Prismen, F. 130°. (Journ. Chem. Soc. London 125. 2355–58. 1924. Oxford u. Manchester, HABERLAND.)

Charles Moureu, Charles Dufraisse und Harold Blatt, Über das Phenyläthylindiphenylcarbinol. Äther. II. (I. vgl. MOUREU, DUFRAISSE u. MACKALL, Journ. Soc. Chim. de France [4] 33. 934; C. 1923. III. 1611.) Das l. c. beschriebene Indigotinderiv. (I) entsteht durch Einw. von CH_3OH u. H_2SO_4 auf Phenyläthylindiphenylcarbinol (I) erhaltene Indigotinderiv. (F. 124–125°) ist der Methyläther des Carbinols (III; $R = CH_3$). Bei Einw. von $CH_3OH + H_2SO_4$ wird auch in diesem Falle β -Phenylbenzaldehyd (II) erhalten. Diese Beobachtung ließ Vff. vermuten, daß es möglich sein müßte, bei Einw. von A. + H_2SO_4 (vgl. l. c.) nicht nur II zu erhalten, sondern auch den Äthyläther (III; $R = C_2H_5$); wurde der Vers. unterbrochen, kurz nachdem A.

+ H_2SO_4 zu **I** zugegeben worden war, so wurde dieser Äther tatsächlich erhalten analog konnte der *Propyläther* dargestellt werden. Alle drei Äther gehen unter Einwirkung von Säure in **II** über. Bei der Umsetzung von **I** mit Alkoholen u. H_2SO_4 müßte demnach zwei Rkk. nebeneinander laufen: die irreversible B. von **II** u. die reversible Rk. der B. von **III**. Die letztere Rk. muß, da die Äther zuerst auftreten, die schnellere sein. Die Isomerisation von **I** zu **II** erklären Vff. so, daß eine Wanderung der OH-Gruppe stattfindet u. danach Tautomerisierung eintritt. Es wäre auch denkbar, daß die Isomerisation nach Schema a) erfolgt; obgleich β, β -Diphenyl- β -oxypropioiphenon (**IV**) an sich unter den vorliegenden Bedingungen kein **II** liefert (vgl. SMEDLEY, Journ. Chem. Soc. London **97**, 1494 [1910]) ist es möglich, daß es in statu nascendi reaktionsfähiger ist u. leicht in **II** übergehen kann. Daß die Isomerisation von **I** zu **II** unter gelinder Energiezufuhr eintritt, ergibt sich daraus, daß **I** einen großen Energieüberschuß über **II** hat (vgl. nachst. Ref.).



Versuche. *Phenyläthinyldiphenylcarbinol*, aus Lg. F. 81–82°. — *Methyläther des Carbinols*, $\text{C}_{22}\text{H}_{18}\text{O}$ (**III**; $\text{R} = \text{CH}_3$), Darst. aus dem Chlorwasserstoffester (vgl. l. c.) + CH_3ONa , aus **I** + CH_3J in Ggw. von KOH, aus 14 g **I** + 14 ccm CH_3OH + 14 ccm H_2SO_4 (66 Bé.) durch 2–3 Min. langes Kochen u. schließl. Ausfällung aus dem Äthyl- oder Propyläther mittels CH_3OH + H_2SO_4 ; aus A. F. 123,5–240°, unl. in CH_3OH u. Lg., l. in Ä., Bzl. u. Chlf.; absorbiert bei gewöhnlicher Temp. kein Br, KMnO_4 wird nicht entfärbt, mit $\text{C}_2\text{H}_5\text{MgBr}$ keine Gasentw. — *Äthyläther des Carbinols*, $\text{C}_{23}\text{H}_{20}\text{O}$ (**III**, $\text{R} = \text{C}_2\text{H}_5$), Darst. nach den drei erstgenannten Methoden; am besten nach folgendem Verf.: 7 g **I** in 70 ccm absol. A. + 10 ccm H_2SO_4 (66 Bé.) werden nach 5 Min. mit 259 ccm W. + 100 ccm Ä. durchgeschüttelt u. die äth. Lsg. weiter verarbeitet; aus A. vorsichtig umkrystallisiert (um l. Abscheidung zu verhindern) weiße Krystalle, F. 51–52°, l. in üblichen organ. Mitteln. — *Propyläther des Carbinols*, $\text{C}_{24}\text{H}_{22}\text{O}$ (**III**; $\text{R} = \text{C}_3\text{H}_7$), Kp. 198°, l. bis 43°, l. in organ. Mitteln; Löslichkeit der drei Äther in CH_3OH , A., C_3H_7 , PAe. vgl. Tabelle im Original. — β -Phenylbenzalacetophenon (**II**), aus der entsprechenden Äthern mittels der entsprechenden Alkohole + H_2SO_4 durch längeres Schütteln (**III**; $\text{R} = \text{CH}_3$ 10 Tage, $\text{R} = \text{C}_2\text{H}_5$ 1 1/4 Stde., $\text{R} = \text{C}_3\text{H}_7$ 1 1/2 Stde.); gelb, l. bis 88°. Einw. von Essigsäure + H_2SO_4 auf den Methyläther gibt zuerst orangefarbene, dann grüne Färbung, es entsteht ebenfalls **II**. Auch durch HBr läßt sich der Methyläther in **II** überführen. In beiden letzten Fällen findet zuerst Emulsifizierung u. dann Isomerisation statt. Gegen sd. Alkalien sind die drei Äther beständig. (Bull. Soc. Chim. de France [4] **35**, 1412–24. 1924.) HABERLAND.

Philippe Landrieu und Harold Blatt, *Thermochemische Untersuchungen der Diphenylphenyläthinyldiphenylcarbinole und seiner Derivate*. (Vgl. vorst. Ref.) Es benutzt nachstehend: Q = Verbrennungswärme pro g, C_v = molekulare Bildungswärme bei konstantem Vol.; C_p bei konstantem Druck, $B.W.$ = Bildungswärme. *Diphenylphenyläthinyldiphenylcarbinol* (**I** des vorst. Ref.). $Q = 9047$ cal., $C_v = 257$ Cal., $C_p = 2569$ Cal., $B.W. = -37$ Cal. — β -Phenylbenzalacetophenon (**II**), $Q = 891$ cal.

$\Delta H_f = 2544$ Cal., $C_p = 2542$ Cal., $B.W. = -10$ Cal. — *Methyläther des Carbinols* ($R = CH_3$), $Q = 9181$ cal., $C_v = 2737$ Cal., $C_p = 2735$ Cal., $B.W. = -39$ Cal. — *Äthyläther des Carbinols*, $Q = 9255$ cal., $C_v = 2889$ Cal.; $C_p = 2887$ Cal., $\Delta H_f = -28$ Cal. — *Propyläther des Carbinols*, $Q = 9335$ cal., $C_v = 3045$ Cal., $\Delta H_f = 3042$ Cal., $B.W. = -20$ Cal. — β, β -Diphenyl- β -oxypropionphenon (IV), $Q = 8994$ cal., $C_v = 2536$ Cal., $C_p = 2534$ Cal., $B.W. = +67$ Cal. — *Benzophenon*, $Q = 8536$ cal., $C_v = 1554$ Cal., $C_p = 1553$ Cal., $B.W. = +18$ Cal. Die Auswertung dieser thermochem. Daten bestätigt die Konst. der in vorst. Ref. genannten Werte (Bull. Soc. Chim. de France [4] **35**. 1424—36. 1924. Paris, Collège de France.)

HABERLAND.


A. Uspenski, Über das spezifische Gewicht der einen Trimethylenring enthaltenden Kohlenwasserstoffe und über einige andere physikalische Konstanten alicyclischer Verbindungen. An den vom Vf. dargestellten Dibromiden des Cyclohexans u. seiner Homologen (vgl. Arb. Inst. f. chem.-reine Reagenzien, Lief. 2. 5; C. 1924. II. 1582) hat er an Dibrombutanen bemerkt zwei Gesetzmäßigkeiten: der K_p der Dibromide nimmt mit der relativen Entfernung beider Br-Atome; die D nimmt in der Reihenfolge 1,2- > 1,4- > 1,3-Dibromid ab. Die aus Dibromcyclohexanen dargestellten homologen KW-stoffe mit einem Trimethylenring sind spezif. schwerer als isomere ungesättigte KW-stoffe, wie auch übrige Trimethylen-derivate schwerer sind als isomere gesättigte. Eine Doppelbindung als einen „Dimethylenring“ auffassend, verallgemeinert man die vorangehende Beobachtung dahin, daß die D von isomeren KW-stoffen mit Vergrößerung des Ringes Hand in Hand geht. Verbindet man, unter Entfernung von 2 H, den Kohlenstoff 1 $H \cdot \overset{1}{CH_2} \cdot \overset{2}{CH_2} \cdot \overset{3}{CH_2} \cdot \overset{4}{CH_2} \cdot \overset{5}{CH_2} \cdot \overset{6}{CH_2} \cdot H$ mit dem Kohlenstoff 2 bzw. 3 u. s. f., so erhält man immer spezif. schwerere Verbb. (Trans. Inst. Pure Chem. Reagents **1924** Nr. 3. 5—17. [Russ.] Sep.)

BIKERMANN.

Alfred Schaarschmidt, Untersuchungen mit Stickstofftetroxyd. Gesätt. Paraffinkohlenwasserstoffe sind außerordentlich widerstandsfähig gegen N_2O_4 , in der Kälte werden sie erst bei wochenlangem Stehen in nennenswerten Mengen angegriffen unter Verflüchtigung. Die Angreifbarkeit ist offenbar bei den geraden Ketten am schwächsten, nimmt bei den ungeraden zu, sie steigt in der Reihenfolge: Normalbenzin < Isoparbenzin < fl. Paraffin. Es bilden sich *Fettsäuren*, aus diesen weiter *Oxalsäure* u. CO_2 , u. nur wenig stickoxydhaltige Prodd. Für die Verss. wurde reines N_2O_4 verwandt. — In *Normal-* bzw. *Schwerbenzin* trat bei gewöhnlicher Verdünnung sofort Lsg. ein. Bei Abbruch der Verss. hatten sich zwei Schichten gebildet, eine rotbraune u. eine olivfarbene; die ausgeschiedenen Krystalle bestanden aus Oxalsäure. Die Dest.-Prodd. bestanden aus unverändertem Bzn. u. sauren Anilinderivaten, der Rückstand (von mentholartigem Geruch) erlitt bei 100° Zers. unter Bz. in einen Nebel u. Spuren nitroser Gase. HCN konnte nachgewiesen werden. — In *fl. Paraffin* trat trotz heftigen Schüttelns keine Mischung ein. Die neutralen Dest.-Prodd. waren dickfl. braune Öle, die sich beim Erhitzen teilweise zers.; die sauren Dest.-Prodd., zähe, rotbraune MM., die nach Fettsäuren rochen, zers. sich bei 80° unter Entwicklung nitroser Gase; mit Alkohol u. H_2SO_4 gaben sie beim Erwärmen Ester; N-Gehalt betrug 3,6%. Oxalsäure weniger gebildet als bei Bzn. — Die Einw. von N_2O_4 auf Paraffin beim Erhitzen, die Vf. zur Aufklärung der Explosion in Bodio untersuchte (Ztschr. f. angew. Ch. **36**. 565; C. 1924. I. 1079), führte sehr rasch zur Explosion (unter Druck im geschlossenen App.). Durch die benutzte Vorrr. war es nicht möglich, Druck u. Temp. beim Erwärmen abzulesen, sowie die Substanz selbst (Verflüchtigung) zu beobachten. Bzn. u. N_2O_4 wurden im Gewichtsverhältnis 1 : 3 eingelegt. Bei $25-30^\circ$ fing die Fl. an zu sieden, die Farbe ging über braungelb in rotbraun über. Einige Min. vor dem Zertrümmern des Rohres stieg der Druck an, gleichzeitig braunschwarze Färbung der M. Die Temp., bei der das

Rohr platzte, schwankte zwischen 91 u. 150°, die Dauer des Erhitzens bis zu Platzen betrug 28—110 Min., die Dauer der Drucksteigerung von 5—100 at 6 13 Min. Aus den Verss. ist zu ersehen, daß es sich auch bei höheren Temp. lediglich um eine stufenweise Red. des N_2O_4 handelt. Es bildet zunächst N_2O , daraus weitere Red.-Prodd. bis zum N herunter, bei B. der letzteren starke Drucksteigerung. Selbsterwärmung trat bei den Rkk. nicht ein, da sie durch Abkühlung unterbrochen oder verlangsamt, durch Wiedererhitzen beschleunigt werden konnte. Die Behauptungen BERLS (vgl. Ztschr. f. angew. Ch. **37**. 164; C. **1924**. I. 2) sind demnach unzutreffend.

Ungesätt. aliphat. KW-stoffe bilden mit N_2O_4 unmittelbar stickstoffhaltige Prodd., die sich zum Teil schon bei gewöhnlicher Temp. zers. u. explosible Eigenschaften besitzen. Vf. unterscheidet a) isomere *Nitrosate* $O_2N-CHR-CHR-NO$, $ONO-CHR-CHR-ONO$, $ON-CHR-CHR-ONO_2$, $O_2N-CHR-CHR-ONO$



b) *Pseudonitrosite*, von nebenst. Formulierung

c) Polymerisationsprodd. Die Zersetzlichkeit

Additionsprodd. ist um so größer, je tiefer

Temp. bei der Addition gehalten wurde (vgl. die Tiefkühler in Bodio). — *Amide* bildet mit N_2O_4 klebrige, grünlichgefärbte Krystalle, bei der Zers. Entw. nitro. Gase, gehen nach längerem Erhitzen in ein hellgrünes Öl über. — *Cyclohexane* bildet bei tiefer Temp. mit N_2O_4 ein dunkelgrünes, von farblosen Krystallen durchsetztes Öl, bei den übrigen Verss. nur das Öl, das ständig Gas entwickelt. Bei der Zers. verbleibt ein gelbbraunes Öl, aus dem sich Krystalle abscheiden. Die auftretenden Rkk. sind sehr kompliziert u. weitgehend von den Einflüssen der Temp. abhängig. Die bei der Zers. entwickelten Gasmengen (unter 0° farbloses Gas, über 0° Gemisch von Stickoxyden) sind sehr beträchtlich u. können enorm Drucke erzeugen. Über das Verh. der *aromat. KW-stoffe* gegen N_2O_4 vgl. S. 56 u. SCHAARSCHMIDT u. SMOLLA, Ber. Dtsch. Chem. Ges. **57**. 32; C. **1924**. I. 58 (Ztschr. f. angew. Ch. **37**. 933—38. 1924. Berlin, Techn. Hochsch.) ZANDE.







Albert Thomas Fuller und Joseph Kenyon, Spaltung von α -Terpineol. Die Spaltung von *d,l*- α -Terpineol gelang, indem der saure Phthalsäureester mittels Bismut- oder Strychnin in den *l*-Brucin- bzw. *l*-Strychnin-*l*-ester übergeführt wurde. Die Mutterlauge aus diesen Verbl. gab auf Zusatz von Morphin oder Cinchonidin die *l*-Morphin- bzw. *l*-Cinchonidin-*d*-ester; aus diesen Salzen wurden die *l*- u. *d*-Terpineole u. aus diesen die opt.-akt. α -Terpineole erhalten. Die Rotationsdispersion in Ä. Bzl., Cyclohexan, Chlf., CS_2 u. Ä. (in 4—5%ig. Lsg. bestimmt) scheint einfach zu sein, denn die Kurve $1/\alpha$ über λ^2 gab eine gerade Linie. Die Rotation ist bei fast allen genannten Lösungsm. nahezu dieselbe; Bzl. bewirkt geringe Exaltation, während in CS_2 die $[\alpha]$ -Werte um 30% höher sind. Es wurde auch versucht, *d,l*- α -Terpineol durch Überführung in den sauren *d*-Camphersäureester u. fraktioniert. Krystallisation des *d*- α -Phenyläthylaminsalzes zu spalten, der Vers. gelang jedoch nicht. — Der saure Phthalsäure- α -terpinylester gab bei der Wasserdampfdest. in Ggw. von NaOH unter teilweiser Hydrolyse u. Dehydratation *d*- α -Terpineol u. *d*-Limonen. — Die *aliphat. Ester des l*-Terpineols wurden dargestellt, indem mittelst C_2H_5MgCl das Terpeneol in die Verb. $C_{10}H_{17}OMgCl$ übergeführt wurde, die durch Einw. des entsprechenden Säureanhydrids in den Ester überging; die Ester drehen in demselben Sinne wie das Ausgangsterpineol; die physikal. Konstanten ähneln sich wie in homologen Reihen üblich.




Versuche. Saurer Phthalsäureester des *d,l*- α -Terpineols: die durch Einwirkung fein gepulverten K (39 g) + 165 g Terpeneol + 2 1/2 l Bzl. erhaltene Lsg. wird allmählich zugegeben zu 148 g Phthalanhydrid in 1 1/2 l Bzl. (erhebliche Wärme entw.); nach 12 Stdn. wird vorsichtig auf Eis u. W. gegossen, die Bzl.-Lsg. mit Na_2CO_3 extrahiert u. wss. Schicht u. Extrakt angesäuert; aus Essigsäure (2 Stde.)

mat. Stäbchen, F. 117—118°. — *l*-Brucinsalz des sauren Phthalsäureesters des *l*-Terpineols, Darst. am besten in CH_3OH ; rhomb. Krystalle, F. 150°. — Strychnin-*l*-Terpineol-Esters aus A. prismat. Nadeln, F. 207°. Aus beiden Salzen erhaltener Phthalsäureester des *l*-Terpineols zeigte nach 17-maligem Umkrystallisieren aus CH_3OH in 5%ig. Lsg. $[\alpha]_D = -36,7^\circ$. — Morphinsalz des sauren *d*-Terpinylphthalats CH_3OH rhomb. Krystalle, F. 142°; hieraus saurer Phthalsäureester des *d*-Terpineols, nach 25-maligem Umkrystallisieren aus CH_3OH $[\alpha]_D = +36,7^\circ$. — *d*- α -Terpineol (festem Zustande), $[\alpha]$ für andere Temp., sowie in CS_2 , A., Bzl., Chlf., Cyclohexan u. Ä. bei verschiedenen Wellenlängen vgl. Tabellen im Original; $D_{11,5}^{20} 0,9475$, $D_{11,5}^{20} 0,9179$, bei $74,5^\circ$ 0,8945, bei 97° 0,8729, bei 120° 0,8525; Phenylurethan Pae. , danach aus CH_3OH prismat. Nadeln, F. 109,5°; Nitrosocchlorid aus wss. CH_3OH Blättchen, F. 107—108°, $[\alpha]_{358} = +555^\circ$. *l*- α Terpineol, F. 37,0°, $D_{11,5}^{20} = -100,5^\circ$ (fest), $D_{11,5}^{20} 0,9402$, bei $21,5^\circ$ 0,9388, bei 25° 0,9364, bei $36,5^\circ$ 0,9169, bei 50° 0,9158, bei $59,5^\circ$ 0,9078. — Ameisensäureester, $D_{11,5}^{20} 0,9889$, bei 36° 0,9810, bei $53,5^\circ$ 0,9530. bei $72,3^\circ$ 0,9400. — Essigester, $D_{11,5}^{20} 0,9659$, bei 51° 0,9384, bei 70° 0,9206, bei 91° 0,9032. — Propionsäureester, $D_{11,5}^{20} 0,9525$, bei $40,7^\circ$ 0,9350, bei $59,7^\circ$ 0,9197, bei 79° 0,9029. — *n*-Buttersäureester, $D_{11,5}^{20} 0,9455$, bei 53° 0,9182, bei 68° 0,9064, bei 92° 0,8862. — *n*-Valeriansäureester, $D_{11,5}^{20} 0,9424$, bei 45° 0,9183, bei 60° 0,9062, bei $79,5^\circ$ 0,8910. Die Ester der Butter- u. Valeriansäure haben schwachen Geruch dieser Säuren, die übrigen Ester riechen terpenartig. Rotation der Ester des *d*-Terpineols in verschiedenen Mitteln u. bei verschiedenen Wellenlängen vgl. Tabellen im Original. (Journ. Chem. Soc. London 125. 2304—16. (1. Battersea, Polytechn.)

HABERLAND.


Marcel Delépine, Über den Ursprung des Fenchols bei der Reaktion von Béchardat und Lafont. Kurzes Ref. nach C. r. d. l'Acad. des sciences vgl. C. R. 1917. II. 1917. Nachzutragen ist folgendes: Bei Einw. von Benzoesäure auf *l*-Pinen (*Nopin*) wurde außer den früher genannten Verbb. auch *d*-Pinen festgestellt; dieselbe Umwandlung von β - in α -Pinen wurde durch Erhitzen mit Triäthyl-essigsäure erzielt. — Einw. von gasförmiger HCl auf α -*d*-Pinen führt zu *l*-Pinen, Borneol u. Fenchol. Zum Verständnis des Übergangs von α - (*I*) u. β -Pinen (*II*) in Bornyl- oder Fenchylester mittels Säuren nimmt Vf. an, daß in diesen Pinen die CH -Gruppe der Ausgangspunkt für drei Zweige ist, die sich in der Folge in geeigneten CH-Gruppe wieder vereinigen. Durch Projizieren der ausge-
teten Zweige ergeben sich, unter Weglassung der unteren CH-Gruppe, die
Pinen *III* u. *IV*. Durch Addition einer Säure HX entsteht als Zwischenverb.
Wird hierin X gegen CH_3 -C- CH_3 vertauscht, so resultiert ein Bornylester (*VI*),
Austausch gegen CH_2 entsteht Fenchylester (*VII*). Die B. von Camphen (*Xa*





u. b) aus Borneol (VIII) ergibt sich, wenn die C-CH₃-Gruppe als Ausgangspunkt genommen wird, durch Wanderung der OH-Gruppe unter B. von Camphenhydrat (IX), woraus durch Abspaltung von H₂O X gebildet wird. Die Umlagerung ergibt hier aus denselben Gründen, die HENRY (C. r. d. l'Acad. des sciences 144, 5 [1907]) für die B. von Methylisopropylen aus Pinakolyalkohol angegeben hat (Bull. Soc. Chim. de France [4] 35, 1463--92, 1924, Paris, Fac. d. Pharm.) H.

F. Kehrman und Eduard Falke, *Über einige Oxoniumperbromide*. Die von SCHÜTZENBERGER (Bull. Soc. Chim. Paris [2] 19, 8 [1873]) beschriebene Verb. von Äthyläther u. Br [nach dessen Ansicht (C₂H₅)₂O + 3Br] ist auf Grund der vorliegenden Unterss. ein *Perbromid des Diäthylloxoniums* (I). Die von v. BAËYE u. VILLIGER (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 34, 2692 [1901]) ausgesprochene Vermutung, daß das von STEINER (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 7, 184 [1874]) bei Darst. von Bromessigsäure erhaltene Nebenprod. ein *Perbromid des Essigsäurebromhydrats* (II) wäre, haben Vff. durch die Analyse bestätigen können. Das von WÜRTZ (Ann. Chim. Phys. [3] 69, 321 [1863]) aus Äthylenoxyd u. Br erhaltene Prod. ist das *Oxoniumtribromid des Diäthylendioxyds* (III); ein ähnliches Oxoniumperbromid (IV) ist bekannt von WALLACH u. BRASS (Liebigs Ann. 225, 291 [1884]) aus Cineol + Br erhaltene Prod.






Versuche. *Tribromid des Diäthylloxoniums*, C₄H₁₁OBr₃ (I), 5 ccm ungereinigtes Ä. werden bei 0° tropfenweise mit Br versetzt; sobald die Mischung siedet, wird mit Eis-Kochsalz gekühlt; rote Krystallblättchen. — *Oxoniumtribromid der Essigsäure*, C₄H₇O₄Br₃ (II), durch ein Gemisch gleicher Moll. Br₂ u. CH₃COOH in HBr geleitet; rote Krystalle. — *Oxoniumtribromid des Diäthylendioxyds*, C₄H₈(Br)₃ (III), 2 Mol Äthylenoxyd + 1 Mol Br₂ bleiben 12 Stdn. in Kältemischung in zugeschmolzenem Rohr stehen; gelbrote Krystalle. — *Oxoniumtribromid des Cineols*, C₁₀H₁₉OBr₃, Darst. nach WALLACH u. BRASS (l. c.) orangefarbene Nadeln. (Helv. chim. Acta 7, 992--95, 1924, Lausanne, Univ.) HABERLAND.

E. Briner, Th. Egger und H. Paillard, *Untersuchungen über die Oxydation mittels Ozon. II. Darstellung von Campher*. (I. vgl. BRINER, PATRY u. DEJOU)

IA, Helv. chim. Acta 7. 62; C. 1924. I. 1772.) Die Oxydation von *Borneol* u. *i-Borneol* durch O_3 zu *Campher* wird am vorteilhaftesten in CH_3COOH , CCl_4 oder in ausgeführt. Die unter wechselnden Bedingungen ausgeführte Ozonisation (ellen im Original) hatte das Ergebnis, daß die Ausbeute an *Campher* um so geringer ist, je länger die Einw. von O_3 dauert; zurückzuführen ist dies darauf, ein Teil des *Camphers* zu *Camphersäure* oxydiert wird. Die Ausbeute an *Campher* ist um so größer, je tiefer die Temp. ist; durch 1-std. Ozonisation in (un bei einer Konz. von 8,5 Vol.-% O_3 wurde bei -20° eine Ausbeute von 50%, bei -80° von 92,7% erhalten. Bei gewöhnlicher Temp. bedingt eine Er- (5 ng der O_3 -Konz. starke Abnahme der Ausbeute, bei tiefer Temp. (-20°) macht (e der Unterschied nicht so deutlich bemerkbar. Die *Campherausbeuten* aus (eol liegen bei gleichen Bedingungen um etwa 10% höher als aus *i-Borneol*. (isierung von *Camphen* führte nicht zu *Campher*, sondern zu einem Ozonid, das (h W. gespalten wurde in das δ -Oxylacton der *Camphenylonsäure* u. *Camphenylon*. (iv. von O_3 auf *Camphendämpfe* (vgl. D. R. P. 64180 [1890], Frdl. 3. 882) führte (nen. Vff. berechnen, daß zur Darst. von 1 kg *Campher* 7 Kilowattstunden er- (erlich sein würden, wenn pro Kilowattstunde 50 g O_3 erzeugt werden. (Helv. (h. Acta 7. 1018—22. 1924. Genf, Univ.)

HABERLAND.

H. Rupe und E. Hodel, Die katalytische Reduktion des *i-Butylcyanides* und *α -Cyanamphers*. (Vgl. RUPE u. BECHERER, Helv. chim. Acta 6. 880; C. 1923. I. 1468.) Die katalyt. Red. von *i-Butylcyanid* verläuft analog dem l. c. an- (eben Schema, es wurde *sek. Di-i-amylamin* erhalten. Die Red. von *d-Cyan- (ampher* verläuft anfangs ähnlich; der durch Hydrolyse des *Aldims* entstandene (hyd (I) lagert sich dann jedoch in *Oxymethylencampher* um, u. diese Verb. (ilt mit dem bei der Red. ebenfalls entstandenen primären Amin *Methylen- (amher- α -camphomethylamin* (II); die Konst. von II ergibt sich daraus, daß das (hydrat II durch HCl in *Oxymethylencampher* u. *Camphomethylaminchlorhydrat* (III) (alten wird. II wird unter den angewandten Versuchsbedingungen nicht weiter (e die stark bas. Eigenschaften der Verb. verhindern anscheinend den weiteren (itt von H_2 . — Ein Teil des bei der Red. gebildeten *Oxymethylencamphers* (i zu *Camphylcarbinol* red., durch Abspaltung von H_2O entsteht hieraus *Me- (ncampher*, der seinerseits durch Hydrierung in *Methylcampher* übergeht.






Versuche. *Sek. Di-i-amylamin*, 30 g *i-Butyl-*
cyanid in 150 ccm A. + 150 ccm W. + 35 ccm
Essigester + 60 g Ni-Katalysator werden 23½ Stdn.

yiert; beim Öffnen des Gefäßes Geruch nach NH_3 ; bei Wasserdampfdest. geht
eßlich ein Öl über; Kp.₁₃ 70—75°. Nichtbewegliche schwach gelbliche Fl.,
ab Eiskühlung zu Blättchen erstarrend; Chlorhydrat des *Di-i-amylamins*,
 $24NCl$, aus h. W. perlmutterglänzende Blättchen, F. 289°; *Nitrosamin* gelbes
l-Red. von α -Cyanampher: 50 g in 900 ccm A. + 300 ccm W. + 900 ccm
essigester + 120 g Ni-Katalysator werden hydriert bis ca. 11 l H_2 aufgenommen
(23½ Stdn.); bei der Wasserdampfdest. geht *Methylcampher* über, Kp.₁₀ 91—93°,
5—36°. Rückstand von der Wasserdampfdest. wird in Ä. gel. u. nach Trocknen
i HCl-Gas behandelt (kurze Zeit, um Verschmierung zu verhindern) hierdurch
ilt man das *Chlorhydrat des Methylencampher- α -camphomethylamins*, $C_{22}H_{33}O_2N$, HCl,
 CH_3OH u. A., unl. in Ä., Bzl. u. Bzn.; freie Base, $C_{22}H_{33}O_2N$ (II), aus Bzl.
helförmig vereinigte Prismen, bei 147° erweichend, F. 152°, ll. in CH_3OH , A.,
Toluol, Aceton u. Essigester, l. in Ä. u. Bzl. Alkoh. Lsg. + $FeCl_3$ tief
selgrün, beim Kochen rotviolett (Ferrisalz des *Oxymethylencamphers*) werdend.

— *Camphomethylamin* (III), aus II in konz. HCl durch Eingießen in sd. W. d. nach $\frac{1}{2}$ Stde. kochen u. ausäthern. Äth. Lsg. wird mit NaOH gewaschen b. keine FeCl_3 -Rk. gibt; aus der alkal. Lsg. durch Ansäuern *Oxymethylencampher* fällt, aus der salzsauren Lsg. durch Eindampfen *Chlorhydrat des Camphomethylamins*, $\text{C}_{11}\text{H}_{19}\text{ON}$, HCl, aus A. oder W. Nadeln; Chloraurat, $\text{C}_{11}\text{H}_{20}\text{ONCl}_2\text{Au}$, die gelbe Prismen, Zers. bei 198° ; wl. in h. W., hiermit teilweise Zers.; freie Base II ölig, Geruch stark bas., unangenehm campherartig; Kp._{11} $126-128^\circ$; bei der Vak. dest. geht bei Kp._{11} $112-126^\circ$ etwas *Methylencampher* als gelbes Öl über; bei Verb. entsteht neben NH_3 auch, wenn III in alkal. Lsg. mit Wasserdampf erhitzt wird. — *Phenylthioharnstoffderiv. des Camphomethylamins*, $\text{C}_{18}\text{H}_{20}\text{ON}_2\text{S}$, aus A. (ro) Zugabe von wenig W. Säulenbüschel, F. 136° , ll. in organ. Mitteln außer Bz. — *i-Dimethylcampheramin* entstand in einem Falle durch Kondensation von Methylcampher u. Camphomethylamin bei der Vakuumdest. von III, Chlorhydrat, $\text{C}_{22}\text{H}_{36}\text{O}_2\text{NCl}$, aus h. W. weiße Blättchen, Zers. oberhalb 265° unter Schwarzfärbung; Oxalat aus h. W. Nadeln, bei $248-249^\circ$ erweichend, F. 258° unter Zers. — Vers. zur Darst. von III durch Hydrierung von Amidomethylencampher in verd. A. Essigester + Ni-Katalysator schlugen fehl; das Benzoylderiv. der Amidomethylcamphersäure verb. war ebenfalls nicht hydrierbar. (Helv. chim. Acta 7. 1023—30. 1924. J. Anst. f. organ. Ch.)

HABERLAB.

W. I. Pastanogow, Über die Mutarotation der Camphocarbonsäure. Vgl. S. 60.) Die alkoh. Lsgg. der Camphocarbonsäure (I) haben gleich nach der Herstellung $[\alpha]_D^{18} = 67,37^\circ$, nach $2\frac{1}{2}$ Stdn. $60,91^\circ$, die Lsgg. in m-Xylol entsprechend $543,40,26^\circ$. (Vgl. PASTANOGOW, Diss. Univ. Zürich 1915.) Die Ansicht, daß es sich um eine langsame Einstellung des Keto-Enol-Gleichgewichts handelt, wird durch die Tatsache bestätigt, das die Bromcamphocarbonsäure (II) u. ihre Deriv. eine Mutarotation zeigen. Es wurde versucht, die Hypothese noch durch folgende Versuche zu stützen. 1. Es wurden das kryoskop. Mol.-Gew. u. die Drehung von I in Bzl. u. Eg. bestimmt. Das Mol.-Gew. ist zeitlich konstant (ca. 197 in Eg., ca. 280-290 in Bzl.), die α nimmt ab (für eine Lsg. von 0,5782 g/25 cem Eg. von $5,08$ auf $4,40$ in 25 Min., für eine Lsg. von 0,7590 g/25 cem Bzl. von $2,35$ auf $2,15^\circ$ in 20 Min. die Rohrlänge 20 cm, Temp. $19,5^\circ$); die Mutarotation rührt also von keiner Polymerisation her. 2. Um zeitliche Änderung des Gehaltes an Enolform zu ermitteln wurden die refraktometr. u. die Methode von K. H. MEYER (LIEBIGS Ann. 1881. 212; C. 1911. I. 1534) ohne Erfolg angewandt. Die Methode von HIEBER (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 54. 902; C. 1921. IV. 170) ergab eine zeitliche Zunahme der Enolform, was im Widerspruch mit der Regel steht, wonach der Enolform ein stärkerer Drehung zukommt. Für die nur in Ketoform vorkommende Bromcamphocarbonsäure liefert die Hiebersche Methode einen noch höheren Gehalt an Enolform. Die Ursache ihres Versagens wurde in der B. eines Komplexsalzes $\text{R}_2\text{Cu} \cdot 2\text{CuAc}_2$ erkannt ($\text{R}_2 = \text{III}$, $\text{Ac} = \text{CH}_3\text{COO}$), welches vermutlich mit beiden Formen der I in unmittelbarem Gleichgewicht steht. In wss. A. ist das Komplex-





salz unl., in Chlf. besteht das Gleichgewicht $\text{R}_2\text{Cu} \cdot 2\text{CuAc}_2 \rightleftharpoons \text{R}_2\text{Cu} + 2\text{CuAc}_2$, die entsprechenden Konz. seien c_1, c_2, c_3 . Man bestimmt c_3 aus der Konz. von CuAc_2 in der wss.-alkoh. Schicht u. dem bekannten Verteilungskoeffizienten zwischen wss. A. u. Chlf.; c_1 aus der Gesamtkonz. des Chlf. an Eg. u. der c_2 aus der Gesamtkonz. des Cu in Chlf., c_1 u. c_3 . Da Cu-Acetat in Chlf. Doppelenol bildet (vgl. unten), so hat die Gleichgewichtskonstante die Größe $k = \frac{c_1 \cdot c_3}{c_2}$. k erwies sich in der Tat ziemlich konzentrationsunabhängig (0,351—0,389), ein Beweis dafür, daß die Formel für das Komplexsalz richtig getroffen war u. daß

Mischgewichte mit den beiden Formen der I nicht sehr verschieden sind. Das Complexsalz $R'_2Cu \cdot 2CuAc_2$ ($R' = II$) wurde nach demselben Verf. nachgewiesen; $d = 1,97$ l/millimol. In allen Verss. ging prakt. die gesamte I bzw. II in Chlf. über. — Bei Verteilungsverss. des $CuAc_2$ zwischen wss. A. u. Chlf. wurde der Druck $C = c_{Alk} / \sqrt{c_{Ch}}$ konstant gefunden; für Chlf. u. 39% A. ist $C = 50,2$, für Chlf. u. 31% A. $C = 80,5$. Ist $CuAc_2$ in wss. A. monomolekular gel., so muß Chlf. doppelte Moll. bilden. — Experimentelles: *Camphocarbonsäure*, aus W. bei 5–70° krystallisiert, F. 126,5–127,5°. — *Camphocarbonsäuremethylester*, aus I, H u. gasförmigen HCl, Kp._{15–18} 123–124°; in einem 10 cm-Rohr ist $\alpha_D^{20} = 1,30$, nach 5 Tagen 66,66°. — *Bromcamphocarbonsäure*, F. 109,5°. (Ber. Polytechn. Iwanowo Wosniessensk 8. 5–20. 1924.)

BIKERMANN.

Henry Burgess, *Neue Halogenderivate des Camphers*. (IV. u. V. Mitt.) IV. *Einwirkung von Hydroxylamin auf α - und α' -Chlorcampher und -Bromcampher*. V. *Einwirkung von Natriummethylat und -äthylat auf α, β -Dibromcampher*. *Bildung von Natrium- und Äthyl- α -Bromcampholensäure*. (III. vgl. BURGESS u. LOWRY, Journ. Chem. Soc. London 123. 1867; C. 1924. I. 1026.) 120 g α -Bromcampher in 300 ccm absol. Ä. wurden 20 Stdn. gekocht mit 96 g NH_2OH , HCl (= 3,2 Mol.) + 150 g wasserfreie Na-Acetate; nach Verdampfen des Ä. wurde aus dem mit NaOH extrahierten Rückstand durch Ansäuern β -Campherchinondioxim erhalten, aus A. F. 240°, nebenbei entstehen in Ä. leichter l. Prodd., die nicht näher untersucht wurden; *Dibenzoylcampher*, F. 188–188,5°, *Peroxyd* F. 144,5°. Dasselbe Dioxim wird analog aus α - u. α' -Chlor- sowie α' -Bromcampher erhalten. — Das durch Einw. von Natriumalkylaten auf α, β -Dibromcampher (vgl. I. c.) neben α', β -Dibromcampher erhaltene Prod. ist als Äthyl- oder Äthylester der α -Bromcampholensäure (I) aufzufassen. Hydrolyse von I mit sd. wss. KOH führt zur entsprechenden freien α -Oxysäure u. zu einer öligen Substanz, die vermutlich durch Abspaltung von HBr aus der I entsprechenden freien Säure entstanden ist u. Konst. II hat. Durch Einw. von NH_3 auf I entstehen isomere Br-Deriv., die als α - u. α' -Bromcamphenamide (I NH_2 statt OR) angesehen sind. Ob die stereoisomeren Verbb. aus I infolge Einw. von NH_3 entstanden sind, oder ob I ein Gemisch der Isomeren ist, hat sich bisher nicht entscheiden lassen. Die großen Unterschiede der Rotation des Methyl- u. Äthylesters machen die letztere Annahme nicht unwahrscheinlich.



Versuche. α -Bromcampholensäureäthylester, $C_{12}H_{19}O_2Br$ (I, $R = C_2H_5$), wird erhalten durch Zugabe von W. zur alkoh. Reaktionsfl. bei der Darst. von α', β -Dibromcampher aus α, β -Dibromcampher + C_2H_5ONa ; gereinigt durch fraktionierte Verdampf- u. dreimalige Vakuumdest.; terpenartig riechendes Öl, Kp.₁₅ 140°, $d_{20} = 1,235$, unl. in W., mischbar mit organ. Mitteln, beim Aufbewahren allmählich gelblichgelb werdend, $[\alpha]_D^{20} = -68,50^\circ$ (in Bzl., 11,2915 g in 63,705 g Lsg., $l = 6$), andere Werte vgl. Tabelle im Original. Die Rotationsdispersion, wie auch die des Methylsters, ist eine einfache. — α -Bromcampholensäuremethylester, $C_{11}H_{17}O_2Br$ (I, $R = CH_3$), durch 5-std. Kochen von 30 g α, β -Dibromcampher + 100 ccm CH_3OH + 45 ccm 2,2-n. CH_3ONa , ölig, Kp.₁₄ 134°, $D_{20}^{20} 1,0327$, $[\alpha]_D^{20} = -64^\circ$ (in Bzl., 9,9263 g in 20,795 g Lsg., $l = 2$), andere Werte im Original. — α -Campholensäure, $C_{10}H_{16}O_3$, aus Ä. Tafeln, F. 103°, nach dreimaligem Umkrystallisieren aus Lg. $[\alpha]_{5461} = -50^\circ$ (0,67 g in 100 ccm Chlf.), ll. in Chlf., Ace on W., l. in h. Bzl. u. Lg., wl. in W. Cu-Salz hellblau, F. 197–198° (Zers.), unl. in Chlf.; der aus Ä. nicht krystallisierende Rückstand II (?) gibt mit $AgNO_3$ u. Acetat weiße Ndd., mit Cu-Acetat hellgrünes Cu-Salz. l. in Chlf., Aceton u. Ä.,

hieraus nach Verdampfen des Lösungsm. F. 201° (Zers.). — α -Bromcampholen C₁₀H₁₆ONBr, aus 5 g Methylester I in 50 ccm A. durch Sättigen mit NH₃ l. nach vierwöchigem Stehen erneut mit NH₃ gesätt.; aus Lg. oder Bzl. Pri. F. 110—111°, $[\alpha]_{5780} = -29^\circ$, $[\alpha]_{5461} = -32^\circ$, $[\alpha]_{5358} = -54^\circ$ (0,343 g in 1 ccm A.). — α' -Bromcampholenamid wird als weniger l. Prod. bei der fraktionierten Krystallisation des vorigen erhalten; aus A. kompakte Krystalle, aus Lg. z. Stäbchen, F. 112,5°, $[\alpha]_{5780} = +45^\circ$, $[\alpha]_{5461} = +52^\circ$, $[\alpha]_{4358} = +96^\circ$ (0,18 g in 15 ccm A.). Als drittes Prod. (unbekannter Konst.) wird eine Verb. mit F. isoliert. (Journ. Chem. Soc. London 125. 2375—81. 1924. Cambridge, Univ.)

F. Kehrmann, Konstitution und Farbe. X. Zur Frage nach der Konstitution der farbigen Derivate des Triphenylmethans. (IX. vgl. Helv. chim. Acta 7. 36. C. 1924. II. 2462.) An Hand bekannter Tatsachen weist Vf. darauf hin, daß die farbigen Deriv. des Triphenylmethans in drei Gruppen zerfallen: a) *p*-chinoid Triphenylmethanfarbstoffe, wozu Iminbasen, Fuchstone, Imonium- u. Oxoniumsalze gehören; b) farbige Salze, die aus Triphenylcarbinol u. seinen Analogen durch Mineralsäuren entstehen: Triphenylmethylperchlorat, — Sulfat, farbige Hohl-doppelsalze etc. Diese sind als Carboniumsalze aufzufassen. Auch die Lsgg. von Triphenylmethanfarbstoffen (Parafuchsin, Malachitgrün) in konz. LS enthalten Carboniumsalze; diese Auffassung wird gestützt durch das Verhalten von Parafuchsin in konz. H₂SO₄ bei Verd. mit W. (vgl. KEHRMANN u. WENZELBACH, Dtsch. Chem. Ges. 34. 3817 [1901]); c) farbige freie Radikale, die ihre Farbkraft in der ungesätt. Natur des C verdanken. — Die Frage, ob die Wernerschen Anschauungen auf die farbigen Triphenylmethanderiv., insoweit sie Salze sind, anwendbar sind, bejaht Vf. in Übereinstimmung mit anderen Autoren; es folgt jedoch hieraus, daß die anderen auf Grund der Eigenschaften u. Rkk. der farbigen Salze abgeleiteten Formeln damit ungültig werden. (Helv. chim. Acta 7. 1057—62. 1924. Lausanne, Univ.)

O. L. Brady und R. P. Mehta, Die Isomerie der Oxime. Teil XX. Die isomeren *p*-Nitrobenzophenonoxime und ihre vier Methyläther. (XIX. vgl. BRADY u. GRAYSON, Journ. Chem. Soc. London 125. 1418; C. 1924. II. 1343.) Die nach der Hantzsch-Wernerschen stereochem. Theorie der Oxime zu erwartenden vier Methyläther wurden erhalten durch Methylieren von *anti*- u. *syn*-*p*-Nitrobenzophenonoximen. Aus der *anti*-Verb. entstand der *anti*-*O*-Methyläther I u. der *anti*-*N*-Methyläther (II), aus der *syn*-Verb. der *syn*-*O*-Methyläther (III), der *syn*-*N*-Methyläther (IV) u. zwei weitere. Die Konst. dieser Verbb. wurde dadurch bewiesen, daß I u. III u. II u. IV nach a), II u. IV nach b) zerfielen. I u. III lassen sich durch HCl nicht weiter zerlegen, II u. IV zerfallen in zwei Teile. Die B. von II aus dem *syn*-Oxim ist darauf zurückzuführen, daß dieses Oxim im Augenblick der B. des *N*-Äthers (IV) eine teilweise Umlagerung erleidet. — *Syn*- u. *anti*-Oxim geben bei Einw. von Acetanhydrid das Acetyl-deriv. des *anti*-Oxims; analog wird aus beiden Oximen + C₆H₅NCO nur das Carbanil-deriv. des *anti*-Oxims erhalten.



a) $\text{R} \cdot \text{R}'\text{C} : \text{NOCH}_3 + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{RR}'\text{CO} + \text{H}_2\text{NOCH}_3 \longrightarrow \text{NH}_3 + \text{CH}_3\text{J} + \text{H}_2\text{O}$
 b) $\text{RR}'\text{C} : \text{N}(\text{CH}_3) : \text{O} + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{RR}'\text{CO} + \text{NH}(\text{CH}_3) \cdot \text{OH} \longrightarrow \text{NH}_2\text{CH}_3 + \text{H}_2\text{O}$

Versuche. 70 g *p*-Nitrobenzophenon in 700 ccm A. suspendiert werden mählich versetzt mit wss. Lsg. von 75 g NH₂OH, HCl; nach 12-std. Stehen wird 3 Stdn. auf sd. Wasserbad gekocht; das nach Abkühlen sich ausscheidende Oxim umgesetzte Keton wird entfernt, die Lsg. mit 2 1/2 l W. versetzt u. auf Eis gite

ausgefällene Öl erstarrt ist. Isolierung von *anti-p-Nitrobenzophenonoxim*, O_3N_2 ; das erstarrte Öl wird bei $80-90^\circ$ in möglichst wenig 2-n. NaOH gel., wird abgekühlt u. die nach $\frac{1}{2}$ -std. Stehen abgeschiedenen Krystalle des Na-Salzes des *anti-Oxims* entfernt; diese werden in h. 2-n. NaOH gel. u. durch CO_2 *Oxim* gefällt; aus A. gelbe prismat. Krystalle, F. 158° ; beim Aufbewahren im Vak. über festem NaOH ziemlich beständig. — *syn-p-Nitrobenzophenonoxim*, O_3N_2 , die nach Entfernung des vorigen Na-Salzes erhaltene Lsg. wird mit CO_2 gesätt. u. der Nd. nach Trocknen im Exsiccator in möglichst wenig h. A. gel.; Abkühlen erhaltener Nd. (F. $118-124^\circ$) wird nochmals in h. A. gel. u. auf -20° abgekühlt, wodurch *anti-Oxim* ausfällt; das Filtrat wird auf -20° abgekühlt u. ausfallende Nd. wiederholt aus A. umkrystallisiert, bis die zuerst ausfallenden Teile an *anti-Oxim* entfernt sind. Braungelbes Pulver, F. 115° , das sich leichter als voriges. — *N-Methyläther des anti-p-Nitrobenzophenonoxims*, $C_{14}H_{12}O_3N_2$ (II), dem *anti-Oxim* in NaOH + CH_3OH + $(CH_3)_2SO_4$ (Eiskühlung) erhaltene Lsg. von brauner zäher M. abgossen, mit Ä. durchgeschüttelt u. diese Lsg. zum Vorschein der zähen M. benutzt; der danach hinterbleibende Rückstand wird mit Ä. extrahiert, unl. Rückstand gibt aus CH_3OH II, gelbe Tafeln, F. 147° ; der Extrakt wird mit gleichem Vol. PAe. versetzt, Nd. in h. PAe. danach in CH_3OH gel. hieraus: *O-Methyläther des anti-p-Nitrobenzophenonoxims*, $C_{11}H_{12}O_3N_2$ (I), geliche Blättchen, F. 93° . — *N-Methyläther des syn-p-Nitrobenzophenonoxims*, O_3N_2 (IV), durch Methylieren des *syn-Oxims* erhaltener Nd. wird mit Ä. befeuchtet, äth. Lsg. mit PAe. versetzt, Nd. mit in Ä. unl. Rückstand vereint; er besteht aus II u. IV; trennbar durch Lösen in wenig Chlf. u. Zutropfen von PAe. zur bleibenden Trübung; durch Abkühlen in Kältemischung Abscheidung von IV aus h. Bzl. gelbes krystallin. Pulver, F. 176° . — *O-Methyläther des syn-p-Nitrobenzophenonoxims*, $C_{11}H_{12}O_3N_2$ (III), durch Eindampfen der bei Darst. von IV erhaltenen Ä.-PAe. Lsg.; aus CH_3OH Prismen, F. 96° . — *Acetyl-anti-p-Nitrobenzophenonoxim*, $C_{15}H_{12}O_4N_2$, aus Bzl. Nadeln, F. 178° . — *Carbanilino-anti-p-nitrobenzophenonoxim*, aus Chlf. weißes Krystallpulver, F. 181° (Zers.). (Journ. Chem. Soc. London 125. 2297—2304. 1924. London, Univ.)

HABERLAND.

R. F. Hunter, *Die Beweglichkeit symmetrischer dreizähliger Systeme*. II. Die Verhältnisse bei den durch die o-Phenylengruppe begrenzten Systemen und Indenaten. (I. vgl. Chem. News 128. 181; C. 1924. I. 2246.) Ausführliche Wiederholung der Ergebnisse der Arbeit von INGOLD u. PIGGOTT (Journ. Chem. Soc. London 1469; C. 1923. III. 762). (Chem. News 129. 348—53. 1924. Highbury New)

HABERLAND.


Bernardo Oddo und G. Sanna, *Über Diindylmethan*. (Atti R. Accad. dei Lincei, Roma [5] 33. II. 167—70. 1924. — C. 1924. II. 2584.)

ZANDER.

John Baldwin Shoesmith und John Haldane, *Kondensation von Diphenylamidin mit Phenolen*. II. *Die allgemeine Natur der Reaktion*. (I. vgl. Journ. Chem. Soc. London 123. 2704; C. 1924. I. 2114.) Die Kondensation von Diphenylamidin (I) wurde ausgeführt mit *Resorcinmonomethyläther*, *Guajacol*, *Pyrogallol*, *Resorcinol* u. den *Kresolen*; Hydrolyse des Kondensationsprodd. führte in allen Fällen zu o-ständigen Oxyaldehyden; daß die Rk. über das l. c. angegebene Zwischenstadium verläuft, ergibt sich daraus, daß jetzt bei der Kondensation mit β -Naphthol (*1-naphthylidenanilin*, mit *Resorcin 4,6-Dioxy-1-phthalylidenbis-anilin*, $C_8H_7(OH)_2 \cdot C_6H_5$) isoliert werden konnten. *See Hunter p. 502*

Versuche. 2-Oxy-1-naphthaldehyd, 7 g I + 5 g β -Naphthol werden 6 Stdn. bei 130° erhitzt, dann mit 16 ccm 10%ig. NaOH versetzt, abgespaltenes Anilin mit Wasserdampf entfernt, filtrierte Lsg. angesäuert u. der Aldehyd über die mit Wasser dargestellte Schiff'sche Base isoliert; aus A. gelbe Prismen, F. 81° . — 2-Oxy-1-naphthaldehyd, Darst. analog vorigem (6 Stdn. bei 95°), aus A. F. $58-59^\circ$. —

2-Oxy-4-methoxybenzaldehyd, aus Resorcinmonomethyläther, 2 Stdn. bei 183° aus A. F. 41°, Ausbeute 20%. — 2-Oxy-3-methoxybenzaldehyd, aus Guajacol, 6 Stdn. bei 210°, Ausbeute 10%. — 2,3,4-Trioxybenzaldehyd aus Pyrogallol, 4 Stdn. bei 110°, Ausbeute 20%. — 2-Oxy-3-methylbenzaldehyd, aus o-Kresol, 6 Stdn. bei 183°, Ausbeute 25%. — 2-Oxy-4-methylbenzaldehyd, F. 59°, aus m-Kresol, 6 Stdn. bei 183°, Ausbeute ca. 20%. — 2-Oxy-5-methylbenzaldehyd, F. 56°, aus p-Kresol, 6 Stdn. bei 193°, Ausbeute 15%. — Salicylaldehyd aus Phenol, 6 Stdn. bei 183°. — 1-naphthylidenanilin aus W. A. + wenig Anilin gelbe Nadeln, F. 92—93°. — 4,6-Dioxy-*i*-phthalylidenbisanilin, das Rohprod. der Kondensation wird mit Wasser gewaschen u. aus A. umkrystallisiert, F. 202—203°. — Keine Aldehyde werden erhalten bei Kondensation von I mit Brenzcatechin, Hydrochinon, Phloroglucin, p-Nitrophenol; der in diesen Fällen auftretende Geruch nach C_6H_5NC u. darauf hin, daß I sich zers. hat nach:



(Journ. Chem. Soc. London 125. 2405—07. 1924. Edinburgh, Univ.) HABERMAN.

P. H. Hermans, Über die Reaktion einiger Glykole mit Aceton. (Ein Beitrag zur Kenntnis der feineren räumlichen Konfiguration organischer Moleküle.) V. Ber. Dtsch. Chem. Ges. 57. 824; C. 1924. II. 650.) Nur bei besonders günstiger Lage der OH-Gruppen der Glykole findet eine Vereinigung mit dem Borsäuremethyläther statt. Bei verschiedenen Gruppen einander konstitutiv ähnlicher Diöle wurde eine qualitative Parallelität in ihrer Fähigkeit zur B. von sauren Borsäureverbb. u. Acetonverbb. nachgewiesen. Diese Erscheinung wird in Übereinstimmung mit den Beobachtungen von BÖESECKEN u. VAN LOON zurückgeführt auf eine Übereinstimmung in den räumlichen Bedingungen beim Zustandekommen beider Rkk. Vf. untersucht die Reaktionsgeschwindigkeiten u. Gleichgewichte mit Aceton von *cis*-1,2-Hydrindiol u. *cis*-1,2- (oder *a*.)-Tetrahydronaphthalindiol, *cis*-2,3- (oder *s*.)-Tetrahydronaphthalindiol u. den beiden stereoisomeren Hydrobenzoinen; das früher als *i*-Hydrobenzoin bezeichnete Isomere nennt Vf. *rac*-Deriv., das andere *i*-Deriv. (inakt.). Die Messungen wurden mit einer Aceton-W.-Mischung bekannter Zus. als Lösungsm. ausgeführt. Zwischen den thermodynam. Größen der Rk. u. dem hypothet. Reaktionsvermögen leitet Vf. theoret. Beziehungen her u. entwirft für die Hydrobenzoine mittels einfacher Annahmen ein Bild des Molekülmechanismus, das mit den gemeinsamen thermodynam. Größen in guter Übereinstimmung steht: Zwei Phenylgruppen gleichen Mol. stoßen einander stark ab; die verschiedenen Konfigurationen entstehen nur infolge einer Drehbarkeit um die zentrale C—C-Bindung, während die intramol. Bewegungen unmerklich gering sind. Vf. führt den Begriff der „sterischen Inkrements“ ein, das als Unterteil des krit. Inkrements aufzufassen werden muß; es wird dargestellt durch die Richtungsenergie, die dem Molekül bei Aktivierung zugeführt werden muß, bevor es mit dem Acetonmol. reagieren kann.

Versuchsteil. Aus Inden wurde das Indenoxymbromid u. aus diesem das Indenoxyd dargestellt (vgl. POPE u. READ, Journ. Chem. Soc. London 101. 758; C. 1924. II. 435). Beim Stehenlassen des Oxyds mit einer essigsäuren Aceton-W.-Mischung bei Zimmertemp. erfolgte Hydratation zum *cis*- u. *trans*-Hydrindindiol (als Acetonverb., F. 71°). Bei der Verseifung der Acetonverb. entsteht neben der *cis*-Verb. auch die *trans*-Verb. In reinem Zustande wurde es aus Indenoxyd durch Oxydation mit $KMnO_4$ in alkoh. Lsg. bei —40 bis —50° erhalten (als *cis*-Verb. gebildet). — Analog *cis*-1,2-Tetrahydronaphthalindiol (nur *cis*-Verb. gebildet). — Aus dem Dibromid des *s*. Dihydronaphthalins (aus Naphthalin Na u. A.) wurde mit Ag-Acetat des Diacetat erhalten, hieraus durch Verseifung ein Gemisch von *trans*- u. *cis*-2,3-Tetrahydronaphthalindiol, letzteres durch Acetonverb. (F. 78°) isoliert. Das *cis*-Diol (F. 122—122,4°) ist in reinem Zustande schwer durch Verseifung der Acetonverb. zu erhalten. — *i*-Hydrobenzoin.

zoin durch Red. mit Na-Amalgam, F. 136°. — *Acetonverb.*, Blättchen aus W., F. 62°. — *rac.-Hydrobenzoin*, aus monomerem *Glyoxal* (dieses aus polymerem Glyoxal u. P_2O_5) u. Phenyl-Mg-Br in äth. Lsg., F. 119,5°. — *Acetonverb.*, F. etwa 45°, Kp._{3,5} 142–144°, schwer zu reinigen. — Die Ergebnisse der Gleichgewichts- u. Geschwindigkeitsmessungen sind in Tabellen zusammengestellt, bzgl. Einzelheiten muß auf das Original verwiesen werden. Außer den oben erwähnten Verbh. mißt Vf. auch die Gleichgewichte beim *cis-1,2-Cyclohexandiol*. (Ztschr. f. physik. Ch. **113**, 337–84. 1924.)

ZANDER.




P. H. Hermans, *Beobachtungen über die Adsorption der beiden stereoisomeren Hydrobenzoinen an Kohle*. (Vgl. vorst. Ref.) Vf. schließt aus der räumlichen Konst. der beiden stereoisomeren *Hydrobenzoinen*, daß die Bedingungen für die Adsorption der i-Isomeren weniger günstig sind als beim r-Deriv., was durch eine Reihe von Vers. bestätigt wird. r-Hydrobenzoin wird sowohl in wss., wie in alkoh. Lsg. an Adsorptionskohle leichter adsorbiert. Es ist dies um so bemerkenswerter, als das am leichtesten adsorbierbare Isomere zugleich am besten l. ist, während in der Regel eine höhere Löslichkeit mit einer geringeren Adsorbierbarkeit Hand in Hand geht. Bei der Malein- u. der Fumarsäure erhöht die einseitige Verteilung der Carboxylgruppen die Löslichkeit in W., vermindert aber auch die Adsorbierbarkeit. (Ztschr. f. physik. Ch. **113**, 385–88. 1924. Delft, Techn. Hochsch.) ZAN.

Gilbert T. Morgan und H. M. Stanley, *Studien in der Acenaphthenreihe. 4-Aminoacenaphthen*. Vff. beschreiben die Darst. des 4-Aminoacenaphthens aus 5-Aminoacenaphthen. Die N-Acylderiv. des letzteren gehen beim Nitrieren in r-Deriv. über (vgl. SACHS u. MOSEBACH, Ber. Dtsch. Chem. Ges. **44**, 2858; Z. 911. II. 1693), aus denen durch Hydrolyse das 4-Nitro-5-aminoacenaphthen entsteht. Da die direkte Eliminierung der Aminogruppe durch Diazotierung nicht möglich war, wurde diese zunächst durch Jod ersetzt zu 5-Jod-4-nitroacenaphthen, und dieses durch Red. in das 4-Aminoacenaphthen übergeführt. Bei der Red. des Mono-deriv. des 5-Jodacenaphthens (Stellung der NO_2 -Gruppe fraglich, wahrscheinlich der 8) entsteht das 5-Aminoacenaphthen; Red. des 5-Jod-6-nitroacenaphthens führt ebenfalls zum 5-Aminoderiv.

Versuche. 5-Aminoacenaphthen, aus 5-Nitroacenaphthen mit $Na_2S_2O_4$, F. 108°. — 4-Acetylaminoacenaphthen (F. 192°) gibt mit HNO_3 4-Nitro-5-acetylaminoacenaphthen, F. 51°; Hydrolyse nach 12 Stdn. mit sd. alkoh. HCl unvollständig. — 5-Benzoylaminoacenaphthen (F. 211°) gibt mit HNO_3 4-Nitro-5-benzoylaminoacenaphthen, F. 141, O_3N_2 , blaßgelbe Nadeln aus Eg., F. 233°, durch HCl auch unter Druck nicht hydrolysierbar. — 5-Formylaminoacenaphthen, $C_{13}H_{11}ON$, Nadeln aus verd. A., F. 72°. — 4-Nitro-5-formylaminoacenaphthen, $C_{13}H_{10}O_3N_2$, gelbe Nadeln aus Eg., F. 27°, l. in A. u. Chlf. — 4-Nitro-5-aminoacenaphthen, $C_{12}H_{10}O_2N_2$, aus vorigem durch Hydrolyse in alkoh. HCl, F. 219°, l. in A. u. Eg., gibt nach der Diazotierung durch Erhitzen einen roten flockigen Nd., F. über 270°. — 5-Jod-4-nitroacenaphthen, $C_{12}H_8O_2NJ$, aus dem Nitroamin durch Diazotierung, Zusatz von KJ und Erhitzen auf 70°, gelblichrote Nadeln aus A. u. hellem Petroleum, F. 148°, unl. in V., wl. in Eg., ll. in Chlf., Ä. u. Bzl. — 4-Aminoacenaphthen, aus vorigem durch Red. mit Sn u. HCl (katalyt. Hydrierung durch H mit Pd als Katalysator führte nicht zum Ziele), Nadeln aus W., prismat. Nadeln aus verd. A., F. 87°, l. in den üblichen organ. Lösungsmitteln. — Pikrat, gelbe Nadeln, Zers. bei 190–200°. — Das 4-Aminoderiv. gibt beim Diazotieren eine fast farblose Diazoslg. im Gegensatz zum 5-Aminoderiv. (dunkelblau). Acetanaphthen-4-diazoniumchlorid kuppelt mit 1. β -Naphthol u. mit Resorcin zu roten, bezw. orangefarbenen Azofarbstoffen. — 4-Acetylaminoacenaphthen, $C_{14}H_{13}ON$, Prismen aus verd. A. oder Eg., F. 175–176°. — 4-Benzoylaminoacenaphthen, $C_{19}H_{15}ON$, schwach gelbe Nadeln aus Essigsäure, F. 96°. — 5-Jodacenaphthen, aus Acenaphthen u. Jod bei Ggw. von gelbem HgO ,

braunes Öl, über das orangegelbe *Pikrat* (F. 100°) gereinigt. Nitrierung ergab Fraktionen: a) 5-Jod-6-nitroacenaphthen, $C_{12}H_8O_2NJ$, schwachgelbe Nadeln aus F. 179—180°, wl. in A., ll. in anderen organ. Lösungsm., wurde nach der mit Sn u. HCl als 5-Aminoacenaphthenpikrat identifiziert, gelbe Nadeln aus A., bei 190—200°. — b) 5-Jod-2-nitroacenaphthen, $C_{12}H_8O_2NJ$, schwachgelbe Nadeln aus Eg., F. 151—153°, besser l. als a); für die Nitrogruppe kommen Stellung 3, 7, in Frage, da Nitrierung in der gesätt. Kette unwahrscheinlich ist. (Journ. Chem. Ind. 43. T. 343—46. 1924. Birmingham, Univ.) ZANDER


M. Battégay und Alb. M. Amuat, Über die Acylhydrazinoanthrachinone. BATTEGAY u. DASSIGNY, Bull. Soc. Chim. de France [4] 35. 211; C. 1924. I. 9. Die Acylhydrazinoanthrachinone, $C_{14}H_7O_2NH \cdot NH \cdot COR$, werden leicht durch Acylieren von α - bzw. β -Hydrazinoanthrachinon. Bei der Acylierung des α -Deriv. tritt häufig unter Abspaltung von H_2O Ringschluß zum Pyrazolanthron ein. Der Ringschluß kann vermieden werden, wenn bei nicht zu hoher Temp. gearbeitet wird, oder wenn bas. Mittel (Na-Acetat) zugefügt werden. Die Acylhydrazinoverbb. sind lebhaft gefärbt, sie sind unl. in W. u. üblichen organ. Mischlsg. die Lsg. in k. konz. H_2SO_4 ist rot, durch Zugabe von W. wird die unveränderte Verb. flockig ausgefällt; wird die H_2SO_4 -Lsg. erhitzt, so geht die Farbe in orange über, durch Zugabe von W. werden die Pyrazolanthrone ausgefällt. Mit Alkalien entstehen grüne bis violette Salze, die jedoch nicht in reinem Zust. isoliert werden konnten; sie werden durch CO_2 in die ursprünglichen Verbb. zerlegt. Die K-Salze der α -Deriv. sind im allgemeinen stärker gefärbt als die β -Deriv. Wegen ihrer Unlöslichkeit können Ausfärbungen auf Baumwolle und Wolle nur mittels der Hydrosulfitküpe bewirkt werden; Wolle wird gelb bis orange gefärbt, die Ausfärbungen sind kräftiger als mit Acylaminoverbb. erhaltene auf Baumwolle werden sehr schwache unechte Färbungen erhalten. Zur Prüfung des spektr. Verh. der Acylhydrazinoanthrachinone wurden Lsgg. in konz. H_2SO_4 benutzt. Diese Lsgg. sind bei den β -Deriv. dunkler (bläulicher) als bei den α -Verb. In Oleum (20% SO_3) sind die α -Verb. bläulich, die β -Deriv. rötlich. Absorptionskurven für α - u. β -Benzoylhydrazinoanthrachinon im Original; die Kurven unterscheiden sich deutlich. Durch Zusatz von Borsäure wird die Farbe der α -Verb. stark verändert; die vorher rote Lsg. wird violett, die H_2SO_4 -Lsg. der β -Deriv. wird durch Zugabe von Borsäure nicht verändert. Im Ultraviolett haben die α -Verb. eine Bande zwischen λ 290 u. 220 (Maximum bei λ 264), die β -Verb. hat zwei Banden mit Maximis bei λ 303 u. 254; nach dem sichtbaren Spektrum haben beide Verb. eine kleinere Bande; α bei λ 300, β bei λ 400. Die Unterschiede der Farbe der H_2SO_4 -Lsgg. der α - u. β -Acylhydrazinoanthrachinone farben Vff. darauf zurück, daß die Acylhydrazinogruppe den ungesätt. Charakter des Keton-C-Atoms im Anthrachinon abschwächt. Die durch Oleum bewirkte Vertiefung der gefärbten Lsgg. ist entweder darauf zurückzuführen, daß bei den Additionsverb. H_2SO_4 -Keton SO_3 an Stelle von H_2SO_4 tritt oder auf Doppelanhydromie.




Versuche. α -Benzoylhydrazinoanthrachinon, $C_{21}H_{14}O_3N_2$, 5 g α -Hydranthrachinon + 15 g C_6H_5COCl + 5 g Na-Acetat in 30 cem Nitrobenzol wä 1/2 Stde. lang gekocht; aus Anisol oder Eg. gelbe Krystalle, F. 269—27. — Benzoylpyrazolanthron, $C_{21}H_{12}O_3N_2$ (analog I); Darst. wie voriges, ohne Na-Acetat.

durch Benzoylieren von I; aus Nitrobenzol cremefarbene Krystalle, F. 235°; in A., Essigsäure u. h. Pyridin, Lsg. in konz. H₂SO₄ orange gelb, in Oleum orange; mit alkoh. KOH Verseifung u. B. des roten Pyrazolanthronkaliums, das grün fluoresciert. — β -Benzoylhydrazinoanthrachinon, C₂₄H₁₄O₃N₂, mittels Benzoessäure + ZnCl₂; aus Nitrobenzol gelbe Krystalle, F. 292°, l. in w. Anisol u. Eg., in Pyridin. — α -Formylhydrazinoanthrachinon, C₁₅H₁₀O₃N₂, durch Einw. 90%ig. H₂O; aus Nitrobenzol bräunlichgelbe Krystalle, F. 282°; Lsg. in konz. H₂SO₄ violettrot, auf Zusatz von Borsäure violettrot werdend; Lsg. in Oleum blau, in alkoh. ebenso. — β -Formylhydrazinoanthrachinon, C₁₅H₁₀O₃N₂, aus Nitrobenzol oder in alkoh. gelbe Krystalle, F. ca. 304°, Lsg. in konz. H₂SO₄ violettrot. — α -Acetylhydrazinoanthrachinon, C₁₆H₁₂O₃N₂, aus h. Pyridin oder Nitrobenzol orangefarbene Krystalle, F. 312°, Lsg. in konz. H₂SO₄ granatrot, in Oleum blau, in alkoh. KOH gelblich. — β -Acetylhydrazinoanthrachinon, C₁₆H₁₂O₃N₂, aus Nitrobenzol gelbe Krystalle, F. 284°, Lsg. in konz. H₂SO₄ violettrot, in Oleum grün, in KOH blau. — α -Phthaloylhydrazinoanthrachinon, C₂₂H₁₂O₄N₂, aus Nitrobenzol oder Eg. orange gelbe Krystalle, F. 300°, l. auch in h. Pyridin; Lsg. in konz. H₂SO₄ violettrot, durch Zusatz von Borsäure violetter werdend, in alkoh. KOH grün. — β -Phthaloylhydrazinoanthrachinon, C₂₂H₁₂O₄N₂, hellgelbe Krystalle, F. 320°, Lsg. in konz. H₂SO₄ violettrot in Oleum grün, ebenso in alkoh. KOH. Außer der Kondensation trat auch Abspaltung bei Darst. der Verbb. ein, so daß diesen eventuell Konst. II oder III zukommt. — α -Tetrachlorphthaloylhydrazinoanthrachinon, C₂₂H₂O₄N₂Cl₄, aus Nitrobenzol orange gelbe Krystalle, F. 310°; Lsg. in konz. H₂SO₄ schmutzigrot, auf Zusatz von Borsäure violett werdend, in Oleum blau, in alkoh. KOH grünlich blau. — β -Tetrachlorphthaloylhydrazinoanthrachinon, C₂₂H₂O₄N₂Cl₄, grünlichgelbe Krystalle, F. 320°; Lsg. in konz. H₂SO₄ violettrot, in Oleum grün, in alkoh. KOH blau. (Bull. Soc. Chim. de France [4] 35. 1450—62. 1924.) HABERLAND.

J. Schroeter, Über den Chemismus der Auf- und Abbaureaktionen mittels Aluminiumchlorids. Vf. sucht die verschiedenen Wrkkg. des AlCl₃ zu erklären, indem er B. die Synthese des Toluols aus Bzl. u. CH₃Cl nach folgendem Schema abwickeln läßt:




Unter der Annahme, daß die Neigung zum Austausch von HCl gegen Halogenalkyle in den Verbb. Ar·AlCl₂, HCl sehr groß ist, erhält man an Hand des Schemas b die Erklärung sowohl für die abbauende, wie die aufbauende Wrkkg. des AlCl₃:




Für die im Versuchsteil näher erörterten Umwandlungen von Tetralin (I) durch katalyt. Wrkg. des AlCl₃ ergeben sich nach Übertragung obiger einfacher Ergebnisse folgende Reaktionsschema:


a) I in α -Phenyl- δ -2-tetralylbutan (III):




d) Rückverwandlung von III in 2 Moll. I:



e) III in s. Okthracen (V) u. Bzl.:



f) V in s. Oktanthren (II) u. umgekehrt:



Diese Rkk. beruhen alle, wie der Vergleich mit dem einfachen Beispiel des Bzl. u. Toluol lehrt, darauf, daß die metallorgan. AlCl_3 -Chlorhydratgruppe, AlCl_2H , große Neigung hat, das H-Atom des IC gegen einen Alkylrest auszutauschen. Bei der nur aufbauenden Wrkg. des AlCl_3 (Synthese) sind mindestens molekulare Mengen AlCl_3 erforderlich, während die

auf- und abbauenden Rkk. nur geringe Mengen als Katalysator benötigen. Erstere verlangen indifferente Verd.-Mittel, letztere keine, aber höhere Temp. V weist schließlich noch darauf hin, daß die zur Aufklärung der Steinkohlensäurebildung interessante Frage der leichten Umwandlung von Naphthalin, Anthracen u. Phenanthren gegenseitig ineinander durch die leichte Dehydrierung bzw. Hydrierung von Tetralin, Okthracen u. Oktanthren u. ihre Umwandlung ineinander der Beantwortung näher geführt ist.

Versuchsteil. (Gemeinschaftlich mit E. van Hulle, A. Gluschke, G. H. Müller.) Tetralin (I) (1500 g) wird mit AlCl_3 (30 g) versetzt u. 6–7 Std. bei 50–70° gerührt. Nach dem Erkalten u. Trennen von der Al-Verb. wird bei Kp._{15} 120° Vorlauf aus Bzl. u. Tetralin; bei Kp._{15} 120–160° Zwischenfraktion; die nach weiterem Fraktionieren neben Tetralin zwischen 125–130° (11 mm) eine sich erstarrende Verb. in Blättern vom F. 93° u. Kp._{11} 128° lieferte, die eine molekulare Zus. $\text{C}_{11}\text{H}_{24}$ hat u. wahrscheinlich als ein-Perhydroanthracen anzusprechen ist. Dieser KW-stoff, aus A. umkrystallisiert, ist gegen Br, HNO_3 , H_2SO_4 u. KNO_3 beständig. — Zwischen 160 u. 190° (15 mm) geht die Hauptfraktion (Oktanthren-Oktanthrenfraktion) über. Die ausscheidenden Krystalle von Okthracen (s. Oktahydroanthracen), $\text{C}_{11}\text{H}_{18}$ (V), werden aus Eg. umkrystallisiert u. bilden große Blätter vom F. 73–74° (Kp._{760} 293–295°, Kp._{12} 167°). V wurde mit S bei 180–220° (6 Stdn.) im Säbelkolben zu Anthracen dehydriert. Die Dehydrierung konnte auch mit Zn-Staub oder Cu durchgeführt werden. — Aus der Mutterlauge von V wurde eine seiner Struktur nach noch nicht näher aufgeklärte Verb. $\text{C}_{12}\text{H}_{16}$ isoliert auf A. F. 54–55°. — Der Hauptteil des bei gewöhnlicher Temp. fl. Öles, das bei Kp._{15} 172–175° dest., ist s.-Oktahydrophenanthren, Oktanthren, $\text{C}_{14}\text{H}_{18}$ (II), F. 3,7°.

Kp_{10} 295°, Kp_{13} 167,5°, D_{20} 1,026. II konnte mit S zum Phenanthren dehydriert werden.




Auf die Fraktion von V u. II folgt nach einer kleinen Zwischenfraktion die Hauptfraktion bei Kp_{15} 230—245°, die aus viscosen, fluoreszierendem, gelbem Öl bestand. Weitere Fraktionierung liefert α -Phenyl- δ -2-tetralyl, $\text{C}_{20}\text{H}_{24}$ (III), Kp_{13} 236—237°, $\text{D}_{22.5}$ 1,0172. Dieser Körper ist nicht ganz identisch, wie aus der Dehydrierung hervorging. Die Dehydrierung von III mit S wurde bei 200—290° ausgeführt. Aus dem Destillat (Kp_{14} 250—290°) wurden durch fraktionierte Krystallisation mit A. u. PAe. einmal das bei 182—184° schmelzende 2,2'-Dinaphthyl, $\text{C}_{20}\text{H}_{14}$ (Pikrat, F. 185—186°), u. als Hauptkörper der Dehydrierung das α -Phenyl- δ -naphthylbutan, $\text{C}_{20}\text{H}_{20}$, F. 80,5—82°, ll. in PAe. u. A. Die Fraktion von III bestand demnach aus etwa 95% III u. 5% IV. Die Oxydation der öligen Fraktion von III mit Permanganat ergab Benzoesäure u. Tricarbonsäure. Durch Oxydation mit Chromsäure u. Eg. wird ein gelbes, dickes Öl ($\text{Kp}_{0,01}$ 214—216° erhalten, das entweder 2-(δ -Phenylbutyl)-5- oder 8-tetralon, $\text{C}_{20}\text{H}_{20}\text{O}$, vorstellt u. ein in A. wl. Semicarbazone, $\text{C}_{21}\text{H}_{25}\text{ON}_3$, F. 199—200°, ein $\text{C}_{20}\text{H}_{23}\text{ON}$, F. 126—128°, u. ein Oximacetat, $\text{C}_{22}\text{H}_{25}\text{O}_2\text{N}$, F. 91—92,5°, gibt. — III entstehen durch Einw. von AlCl_3 bei der Vakuumdest. oder bei gewöhnlicher Temp. (50—60°; 6 Stdn.) 2 Moll. Tetralin. — Aus den höchst siedenden Anteilen der Fraktion von III krystallisiert 2,6'-Ditetralyl, $\text{C}_{20}\text{H}_{22}$ (IV), F. 53—54° aus. Durch Dehydrierung mit 4 Atomen S wird hieraus 2,2'-Dinaphthyl, mit Permanganat entsteht eine Tricarbonsäure $\text{C}_{10}\text{H}_8\text{O}_6$ (vermutlich 1,2,4-Phthaleissäure), F. 201,5°, aus W.

Umlagerung des Okthracens in Oktanthren. V wird mit AlCl_3 gesiebt auf dem Wasserbad bei 70—80° 3 Stdn. verrührt. Der äth. Extrakt ergibt bei Kp_{14} 167—170° ein erstarrendes Öl, das von den Krystallen von V befreit im Vakuum destilliert. II enthält. Reinigung über die Sulfonsäure u. das Na-Salz, F. 16,5°. — Oktahydrotriphenylen, $\text{C}_{18}\text{H}_{24}$ (VI), F. 232—233° (korr.) aus Bzl.-Eg., aus dem Dest. von V u. II als gelbe, durch Sublimation farblose Krystalle erhalten. Im Sublimationskolben hinterbleibt eine gelbe Verb. polycycl. Natur, schmilzt vom F. 320°. Der Ä.-Rückstand von VI enthält ein Öl der Zus. Phenylen- δ -thracenylbutan, $\text{C}_6\text{H}_4 \cdot (\text{CH}_2 \cdot \text{CH}_2 \cdot \text{CH}_2 \cdot \text{CH}_2 \cdot \text{C}_{14}\text{H}_{17})_2$, u. Tetralylloktanthylenyl, $\text{C}_{10}\text{H}_{11} \cdot (\text{CH}_2)_4 \cdot \text{C}_{14}\text{H}_{17}$, wie der Zerfall in V, II u. I gelehrt hat. — II auf dem Wasserbad 4 Stdn. unter Turbinieren mit AlCl_3 bei 80° behandelt, lieferte II zurück den gleichen Anteil an V u. die oben bei der umgekehrten Umwandlung beobachteten Reaktionsprodd. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 57. 1990—2003.

HORST.

Schroeter, Über Hydrierung des Anthracens. (Vgl. vorst. Ref.) Die Struktur der hydrierten Anthracene ist bislang falsch gedeutet worden. Für das bekannte Oktanthracen (I) ist durch Entaminierung von Dihydro- β -anthranin erwiesen worden, daß es als Meso- oder 9,10-Deriv. betrachtet werden muß. Die Hydrierung unreinigten Anthracens im Rührautoklaven liefert analog der glatten Hydrierung von Phthalin hier Oktahydroanthracen (Okthracen) (III), das auch als Tetralin mit S erhalten worden war. III gehört nun ebenfalls zu den leicht zugänglichen Körpern. Die Red. von III führt über I zu Tetracen (II) u. ist von einer H-Wandlung begleitet. III wurde schrittweise aus Tetralin aufgebaut unter Vermeidung umlagernder Reagenzien. Gleichzeitig war eine analoge Synthese des Oktanthracens zu dessen Strukturbeweis möglich. Der Gang war folgender: Tetralin gibt mit Thionylchlorid 1- u. 2-Tetralacylchlorid. Das 2-Chlorid wird mit Na-Malonat zu 2-Tetralacetylmalonester u. Verseifung u. CO_2 -Abspaltung in 2-Tetroylpropionat (IV), diese dann in 2-Tetralylbuttersäure (V) übergeführt. Aus dem Chlorid (IV) Säuren unter HCl-Abspaltung 4-Oktanthyrenon u. 1-Okthracenon (VI), welche



letzteres durch Red. mit Zn u. HCl **III** liefert. Aus **III** wird andererseits durch Oxydation **VI** erhalten. Vf. bespricht dann die widersprechenden Angaben von M. GODCHOT (Contribution à l'étude des hydrures d'anthracène, Paris 1907) über Oktahydroanthracenverb., die fast völlig auf falschen Formulierungen beruhen. Das „Hexahydroanthron“ von GODCHOT ist nach den synthet. Beweisen des Verf. ident. mit 1-Oktthracenon (**VI**). — Aus **I** wird nach weiterer H_2 -Aufnahme Dihydroanthracen [in Analogie mit Tetralin Tetrhacen (**II**) genannt] gebildet, für die Konst. so gedeutet wird, daß **II** wahrscheinlich ein Naphthalinderiv. ist. Dasselbe in der Literatur als β -Tetrahydroanthracen bekannte Hydrierungsprod. wird vermutlich ein höheres Hydrierungsprod., verunreinigt mit Mesodihydroanthracen, vorstellen. **VI** wird durch Red. in 1-Oktthracenol (**X**) u. dieses in 1-Oktthracenylaldehyd (**XI**) verwandelt. In Analogie mit ähnlich gebauten Körpern kann für **X** und **XI** eine mesotropie in Betracht gezogen werden.



VI: R = CO

X: R = CH(OH)

XI: R = CH.NH.CO.NH₂



Versuchsteil. (Gemeinschaftlich mit A. Gluschke, E. van Hulle, S. Göck.) Bei der Hydrierung des Anthracens in einem Tetralinkatalysatorgemisch unter 10–20 atm. H_2 -Druck im Rührautoklaven beginnt die Absorption bei 120–140° u. verläuft zunächst sehr rasch. Es wird alsbald mehr H aufgenommen, als der B. des Dihydroanthracens entspricht. Der Autoklaveninhalt wurde destilliert. Das Reaktionsgemisch ging bei Kp_{13} 165–172° über u. zeigte den unscharfen F. 3–4° bei 95°. Mit Pikrinsäure wurde das Tetrhacen als Pikrat abgetrennt; aus der Mutterlauge scheidet sich das meso-Dihydranthracen, $C_{14}H_{12}$ (**I**), in farblosen Prismen aus A. F. 107–109°. — Als Beweis der Konst. letzterer Verb. wurde 5 g 1-Antanthramin mit Na u. Amylalkohol reduziert zum Dihydroanthramin, das in 2-Antanthramin gel., mit $NaNO_2$ diazotiert wurde. Die filtrierte Diazoniumlsg. wurde dann in Ätherlsg. von 5 g $SnCl_2$ in konz. HCl eingetragen, wodurch das Chlorhydrat des β -Tetraazinodihydroanthracens als weißes Pulver ausgeschieden wird. Die freie Base ist unbeständig. Durch Verkochen mit Alkali u. $CuSO_4$ u. nachheriger Wasserdampfdest. wird **I** erhalten. — Tetrhacen, $C_{14}H_{14}$ (**II**), aus Anthracen durch Hydrierung bei 140–170° während 10 Min. Rohprod. (Kp_{14} 170–173°, F. 8–9°) wurde in absol. A. gel. u. als Tetrhacenpikrat, $C_{14}H_{14} \cdot C_6H_5O_7N_3$, rotgelbe Ad. vom F. 116–117°. Der hieraus mit verd. NH_4OH abgeschiedene KW-stoff bildet glänzende Blättchen vom F. 103–105° aus A. Auch aus **I** wird **II** durch Hydrierung bei 180° erhalten. Mit 2 Moll. Br bildet sich ein Dibromsubstitutionsprod. von $C_{14}H_{12}Br_2$, F. 166–168°, gelbliche Blättchen. Mit $KMnO_4$ entsteht aus **II** Anthracensäure. — Tetrhacenchinon, $C_{14}H_{12}O_2$, aus **II** durch Oxydation mit CrO_3 u. Eggenbergs Nadeln, F. 155,5° aus Eg. Durch Zn-Staub u. Alkali Red., nach Durchleiten in Luft-Rückoxydation des gebildeten Hydrochinons zu dem sehr reinen gelben

non vom F. 156—158°. — *Okthracen*, $C_{14}H_{20}$ (III), durch weitere H-Aufnahme der Hydrierung kann Anthracen vollständig in III übergeführt werden; aus glänzende Blätter vom F. 73—74°. Bei absichtlicher Überhydrierung wurde nützlich *Dekahydroanthracen*, $C_{14}H_{20}$, F. 30—35°, Kp.₁₀ 147—152°, erhalten.

2-Tetralacylchlorid, $C_{10}H_{11} \cdot CO \cdot CH_2 \cdot Cl$, aus Tetralin, Chloracetylchlorid u. P_2O_5 Rückflußkühler (190°). Die Auszüge mit Bzl. liefern eine Fraktion von 190 bis bei 12 mm, die nach dem Erstarren aus A. umkrystallisiert farblose Nadeln F. 63—64° (Kp.₁₇ 202—203°) liefert. — Semicarbazon, F. 173°. — 2-Tetroesäure *Tetrahydronaphthalin-2-carbonsäure*, $C_{10}H_{11} \cdot COOH$, aus dem Chlorid durch Kochen NaOCl u. überschüssigem Alkali; aus verd. A. F. 151—152°. — 1-Tetralacylchlorid, $C_{10}H_{11} \cdot CO \cdot CH_2 \cdot Cl$, Kp._{0.2} 140—142°, aus der Mutterlauge des 1-Chlorids. Semicarbazon, F. 142—143°. — 2-Tetralacylmalonsäure, $C_{10}H_{11} \cdot CO \cdot CH_2 \cdot COOH$, Na-Malonester wird nach u. nach mit 2-Tetralacylchlorid versetzt u. (in. zum Sieden erhitzt, A. abdest. u. der 2-Tetralacylmalonsäureester mit 20% ig. KH verseift. Mit HCl fällt ein übersaures K-Salz, das durch Erwärmen mit HCl die freie Säure, Nadelchen aus W. oder A., zerlegt wird. — β -2-Tetroylpropion- säure, $C_{10}H_{11} \cdot CO \cdot CH_2 \cdot CH_2 \cdot COOH$ (IV), Nadeln vom F. 121—122° aus Lg.-Bzl., in V. wl., ll. in Ä. u. A., bildet sich aus dem übersauren Salz der Tetralacylmalonsäure durch CO_2 -Abspaltung. — γ -Tetra-

$C_{14}H_{14}O_2$, $C_{10}H_{11} \cdot C \begin{array}{l} \text{CH} - \text{CH}_2 \\ \text{O} - \text{CO} \end{array}$ *lycrotolacton* (nebensteh. Formel), aus IV mit Essigsäureanhydrid, Nadeln vom F. 97—98° aus A. — γ -2-Tetralylbuttersäure, $C_{14}H_{18}O_2$ (V),

IV mit Zn u. HCl, Kp.₁₅ 218—220°, l. in organ. Lösungsm., wl. in W., aus Essigsäure F. 50—52°. — V mit PCl_5 auf 60—80° erwärmt, das $POCl_3$ entfernt das Rk.-Gemisch im Vakuum dest. Bei 190—200° (15 mm) gehen die Ketone über. Ausbeute gering. Zu ihrer Trennung sind ungeeignet die Phenylhydrazone, welche bei der Spaltung mit Mineralsäuren Carbazole geben. *Phenylhydrazon* des *Okthracenons*, Nadeln, F. 115—118°, zers. — 1,2-*Okthracenophenocarbazol*, $C_{20}H_{19}N$, A. weiße Blättchen, F. 208° (Pikrat, schwarze Nadelchen, F. 144—145°). — 4-*Oktanthrenonphenylhydrazon* (in der Mutterlauge) durch Kochen mit HCl: 4-*Oktanthrenonphenocarbazol*, $C_{20}H_{19}N$, Nadeln vom F. 142° aus A. (Pikrat, schwarze Nadeln, F. 135—137°). Zur Trennung geeignet sind die Semicarbazone: *Okthracenonsemicarbazon*, $C_{15}H_{19}ON_3$, F. 250—251° (Zers.) aus Eg. — Hieraus durch Kochen mit 2-n. HCl Spaltung zu 1-*Okthracenon*, $C_{14}H_{16}O$ (VI), aus PAe. F. 48°, Kp.₁₃ 205—207°. — 4-*Oktanthrenonsemicarbazon*, $C_{15}H_{19}ON_3$, F. 229—231°.

VI ergab durch Red. mit amalgamiertem Zn u. konz. HCl *Okthracen* vom F. 74°, mit Eg. u. 86% ig. Chromsäure innerhalb 2 Stdn. zu VI oxydiert wird. Im Rück-

stand das Godchotsche „Dihydrooxanthranol“ (Tetracenchinon, $C_6H_4 \begin{array}{c} \text{CO} \\ \text{CO} \end{array} C_6H_5$).

Oxydation kann auch mit $Na_2Cr_2O_7$ u. H_2SO_4 (6 Stdn., 80°) vorgenommen werden. — 1-Benzyl- Δ^1 -hexahydroanthracen, $C_{21}H_{22}$ (VII), Kp.₁₆ 240—245°, zähfl. Darst. aus Benzylchlorid in 3-facher Menge Ä. gel. u. Mg mit 2 Tropfen Nethyl, zu dem VI in Ä. gel. gegeben wird. Zerlegung durch Eis-HCl u. Dest. — Pikrat von VII, F. 120—122°. — 1-Benzyltetrhacen, $C_{21}H_{20}$ (VIII), Nadeln, VII in Eg. mit Br in Eg.; auf Zusatz von W. ein Bromidgemisch, das durch Erwärmen in Eg.-Lsg. gespalten wird. — 1-Benzyllokthracen, $C_{21}H_{21}$, viscoses Öl, Kp.₁ 244—246°, aus VII im Rührautoklaven mit Tetralinkatalysatorgemisch (150° in.) Das Br-Substitutionsprod. (mit 1 Mol. Br₂ in Eg.), Blättchen vom F. 106°. Wird III mit Benzaldehyd u. KOH gekocht, so bildet sich 2-Benzyliden-1-*Okthracenon*, $(C_{10}H_{11}O) : CH \cdot C_6H_5$ (IX), gelbliche Nadelchen, F. 140° aus Essigester. Hieraus durch Red. mit Na u. absol. A. 2-Benzyl-1-okthracenol, $C_{21}H_{21}O$, weiße Neln, F. 168—170° aus PAe. Die Dehydratation mit $KHSO_4$ bei 170° liefert

2-Benzyl- Δ^1 -hexahydroanthracen, $C_{21}H_{22}$, Kp_{13} 255—258°. Pikrat, rote Blättchen vom F. 80—100°, die leicht dissoziieren. — *2-Benzylhexahydroanthracendibromid*, $C_{21}H_{22}Br_2$, F. 119—120°. — *2-Benzyllokthracen*, $C_{21}H_{22}$, aus IX durch Red. im Vakuum autoklaven, Nadelchen vom F. 65—66° (Kp_{13} 248—251°) aus Eg. — *1-Okthracenol*, $C_{14}H_{16}O$ (X), aus VI durch Red. mit Na u. absol. A.; aus A. u. Lg. F. 94—95°. (GODCHOTS Oktahydroanthranol F. 81—82°). Beide Prodd. sind ident., da Platinurethane gleichen F.: Nadelchen aus Aceton, F. 153° (GODCHOT, F. 152°). — *1-Okthracenylharnstoff*, $C_{15}H_{20}ON_2$ (XI), aus X u. Harnstoff in 90%ig. A. (weiße Tropfen H_2SO_4) nach 5 Min. Kochen u. mehrstd. Stehen; Nadelchen aus A., F. 155°. — *Okthracen-meso-sulfonsäure*, $C_{14}H_{17}\cdot SO_3H$, aus III mit konz. H_2SO_4 unter Rühren bei 70°. Na-Salz sind weiße Blättchen. — *Okthracen-meso-sulfochlorid*, $CH_3\cdot SO_2Cl$, aus dem Na-Salz mit PCl_5 oder III mit Chlorsulfonsäure; Nadelchen, F. 87° aus Lg. — *Sulfamid*, $C_{14}H_{17}\cdot SO_2\cdot NH_2$, Nadeln, F. 227—228°. — Aus dem Säurechlorid erhält man mit $NaHSO_3$ das Na-Salz der *Okthracensulfinsäure*, $CH_3\cdot SO_2Na$. — Zur Oxydation von III zu *Pyromellitsäure*, $C_6H_2\cdot (COOH)_4 + H_2O$, gibt man zur Lsg. von III in W. unter Rühren (10 Stdn.) gepulvertes $KMnO_4$, MnO_2 absaugen, Filtrat mit H_2SO_4 ansäuern, mit wenig $KMnO_4$ versetzen, freies H_2SO_4 mit $BaCl_2$ fällen, Filtrat einengen. Beim Erkalten scheidet sich die *Pyromellitsäure* aus (Ausbeute 90%), F. 264°. — Das Anhydrid, F. 286°, erhält man durch Sublimation der Säure bei 290° unter 13 mm. *Pyromellitein*, $C_{34}H_{18}O_{10}$, als rotgelbe Krystalle, aus dem Anhydrid, Resorcin u. $ZnCl_2$ bei 220°. — *Pyromellitsäure*, aus Pyromellitein in Pyridin mit Br, blaurotes Pulver, färbt Seide blaurötlich. — *Tereanilsäure* (*p*-*Diaminoterephthalsäure*), $C_8H_8O_4N_2$, aus Pyromellitsäure in wässr. Eis suspendiert mit einer Lsg. von $NaOCl$ u. $NaOH$ unter Schütteln, wobei Fällung durch SO_2 als hellgelbes, feines Krystallpulver. Aus HCl krystallisiert in Prismen das Dichlorhydrat; Sulfat u. andere Salze werden durch W. hydrolysiert. Na-Salz, gelbes Pulver; Cu-Salz, grüngelb. — *p-Diaminoterephthalsäureäthylester*, rote Krystalle aus A. durch Veresterung mit HCl u. absol. A., F. 168°. — *Pyromellitsäurediimid*, $C_6H_2[(CO)_2NH]_2$, aus dem NH_4 -Salz durch Erhitzen im NH_3 -strom auf 200°; aus Pyridin seidige Nadeln. Beim Erwärmen mit $NaOH$ entsteht *pyromellitaminsäures Na*, $C_6H_2(CO\cdot NH_2)_2\cdot (COONa)_2$, in wässr. Krystallen. (Ber. tso Chem. Ges. 57. 2003—24. 1924.)

G. Schroeter, Über Hydrierung des Phenanthrens. (Vgl. vorst. Ref.) Auch für die hydrierten Phenanthrene gilt dasselbe wie bei den Anthracenen, d. h. der einwandfreie Strukturbeweis noch aussteht, u. daß wohl die meisten der bisher beschriebenen Verbb. nicht rein erhalten waren. Die Hydrierung ließ sich auch hier nachdem die Reinigung des Phenanthrens gelungen war, in analoger Weise wie bei Naphthalin durchführen. Als überwiegendes Hauptprod. wird Oktahydrophenanthren, *Oktanthren* (I), erhalten, das ident. gefunden wurde mit den Prodd. der Red. von $AlCl_3$ mit Tetralin u. Okthracen. Durch Chromsäure Oxydation hauptsächlich zu *1-Oktanthrenon* (IV) neben wenig *4-Oktanthrenon*. IV wird auch aus *1-Tetralylbuttersäure* synthet. erhalten; *4-Oktanthrenon* ist mit dem aus *2-Tetralylbuttersäure* erhaltenen cycl. Keton ident. Hierdurch ist die symmetr. Struktur eines 1,2,3,4,5,6,7,8-Oktahydrophenanthrens bewiesen. Ein weiterer Beweis ist die Oxydation von IV zu *Mellophansäure*, für welche Tetracarbonsäure auf zwei verschiedenen Wege eine bequeme Darst. gefunden ist. Der sek. Alkohol *Oktanthrenol* entsteht durch Red. von IV mit Na u. absol. A. Auf Grund seines Verh. muß wie für die *5-Tetralol* u. *1-Okthracenol* Desmotropie angenommen werden. — *Tetralin* (*1,2,3,4-Tetrahydrophenanthren*), wurde einerseits durch partielle Dehydrierung von I, andererseits durch vorsichtige katalyt. Red. von Phenanthren erhalten u. bildet eine wohlkrystallisierte Verb. vom F. 33—34°. In dem öligen „ α -Tetrahydrophenanthren“ der Literatur dürfte unreines Tetanthren vorliegen.

Versuchsteil. (Gemeinsam mit E. van Hulle u. H. Müller.) Durch Na gereinigtes Phenanthren wird im Rührautoklaven mit Tetralin-Katalysatorgemisch bei 200° 1 Stde. hydriert (Aufnahme von 4 Moll. H₂). Die Hauptfraktion liefert das Anthren (I), das über die Sulfonsäure gereinigt bei 16,7° schmolz. — 4-Oktanthrenon-sulfocarbazon, C₁₅H₁₉ON₃, F. 229—231°, wl. in den meisten organ. Lösungsm., ll. in 2g. — 4-Oktanthrenon, C₁₄H₁₆O, Kp.₁₂ 194—196°, aus dem Semicarbazon durch Erhitzen mit HCl, ll. in A., Ä., Bzl. — Oxim, C₁₄H₁₆:NOH, F. 164—165° aus CH₃-CO- u. 1-Tetralacylmalonsäure, C₁₅H₁₆O₅ (II), durch 1-stdg. Erwärmen von Na-Malonat mit Tetralacylchlorid; übersaures Salz von II, C₁₅H₁₁·CO·CH₂·CH·(COOH)₂, C₁₁·CO·CH₂·CH·(COOH)·(COOK) + H₂O. — β-1-Tetroylpropionsäure, C₁₁H₁₆O₅ (I), Nadelchen vom F. 93—94° aus Bzl.-PAc., wl. in W., ll. in Ä. u. A.; sie entsteht aus dem übersauren Salz von II (über das saure) durch CO₂-Abspaltung bei 11—140°. — γ-1-Tetralylbuttersäure, C₁₁H₁₈O₃, Nadelchen aus Lg., F. 94—95°, K₁₂ 219—222°, ll. in A., Ä., wl. in Lg.; Darst. durch Red. von III mit amalgamirtem Zn u. HCl. — 1-Oktanthrenon, C₁₄H₁₆O (IV), Prismen, F. 81—82° aus Lg., K₁₂ 206—208°, ll. in Ä. u. Bzl., wl. in A. u. Lg. Darst. aus III durch HCl-Absetzung mit PCl₅. — Durch Oxydation von I mit CrO₃ u. Eg. (1 Stde.) entsteht IV; Sulfocarbazon F. 254—256°; Oxim, F. 185°. Die Mutterlauge des Ä.-Auszuges vom R. kstande der Oxydation liefert noch ein Gemisch von 4-Oktanthrenon mit IV. Durch Oxydation des I mit CrO₃ liefert 90—95% vom IV u. 5—10% von 4-Oktanthrenon. — Die Red. von IV mit Na u. absol. A. ergibt 1-Oktanthrenol, C₁₄H₁₈O, Neln vom F. 94° aus Lg. — 1-Oktanthrenylharnstoff, C₁₅H₂₀ON₂, F. 234° aus Ä. — 1-Oktanthrenylphenylurethan, C₂₁H₂₃O₂N, F. 194° aus Aceton u. A. — Oktanthren-sulfonsäure, Na-Salz, C₁₁H₁₇·SO₃Na + 3H₂O, aus I mit konz. H₂SO₄ bei 70°, weiße Neln aus W. — Oktanthrensulfocchlorid, C₁₁H₁₇·SO₂Cl, F. 130—131° aus Lg. — Oktanthrensulfanilid, C₁₁H₁₇·SO₂·NH·C₆H₅, F. 188—189°. — Oktanthrensulfamid, C₁₁H₁₇·SO₂·NH₂, F. 158—160°. — 9-Oktanthrenacylchlorid, C₁₆H₁₉OCl, F. 81° aus P₂O₅ oder CH₃·OH; Darst. aus I mit Chloracetylchlorid u. P₂O₅ durch Erhitzen bei 175° (5 Stdn.) blau dest. unter 0,33 mm Druck bei 186°. — Oktanthren-9-carbonsäure, C₁₅H₁₈O₂, F. 239—240° aus Eg., wl. in W., Bzl., Ä.; Darst. aus dem 9-Oktanthrenacylchlorid durch Verkothen mit 1,7%ig. alkal. NaOCl-Lsg. Die gleiche Säure wurde erhalten aus I u. Oxalylchlorid (gel. in CS₂) durch Zusatz von AlCl₃ (1 Stde.) zur gekühlten Mischung. F. u. Misch.-F. ident. — Mellophansäure, C₁₀H₈O₈, aus I durch Oxydation mit KMnO₄ auf dem Wasserbad. Aus HCl krystallisiert die reine Säure mit F. 238—242° (Zers.) im offenen Röhrchen, F. 264—267° (Zers.) in beiderseits geschlossenen Röhrchen. Das durch Sublimation im Vakuum entstehende Anhydrid zeigt wechselnden F. (186—193°). — Aus I kann durch Erhitzen mit S bei 220° eine noch unaufgeklärte Verb. vom F. 204—207° erhalten werden, neben einem Öl, dessen Pikrat, C₁₁H₁₄·C₆H₃O₇N₃, bei 107—108° (aus Ä.) schmolz; durch Zerlegung mit verd. Ammoniak entsteht der KW-stoff Tetanthren, C₁₄H₁₄, F. 33—34°, Blätter aus CH₃OH. Zu letzterer Verb. führt auch die partielle R. des Phenanthrens. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 57. 2025—32. 1924. Berlin, Tierk. Hochschule.)

HORST.

Margaret Grosvenor Tomkinson, Kondensation von Acetylen und Schwefelwasserstoff in Gegenwart von Katalysatoren. Die experimentellen Ergebnisse der Arbeit bestätigen die von TSCHITSCHIBABIN (Journ. Russ. Phys.-Chem. Ges. 47. 1916. I. 920) festgestellte Tatsache, daß Metalloxyde die B. von Thiophen aus C₂H₂ u. H₂S katalysieren; in jedem Falle wird das Oxyd unter Abspaltung von H₂O in das Sulfid übergeführt. Wird Sulfid allein benutzt, so tritt die B. von Thiophen ebenfalls ein. Al₂O₃ (auch das besonders wirksame von SABATIER) wirkt unterhalb 450° nicht katalyt., über dieser Temp. tritt Zers. ein. Mit Fe₂O₃, Fe- u. anderen Metallsulfiden wurde bei 300—350° ein Öl erhalten, das an-

scheinend ident. ist mit dem von STEINKOPF u. HEROLD (LIEBIGS Ann. **428**, C. **1923**, I. 1438) beschriebenen. Bei einem Vers. mit Fe_2O_3 u. $3.1 \text{ H}_2\text{S} + 61$ pro Stde. wurden nach 9 Stdn. 30 g einer öligen Fl. erhalten, die bei fraktion. Dest. Acetaldehyd, 30–40% Thiophen u. eine bei ca. 200° sd. Fl. gab, die Thiohomologe zu enthalten schien; der Rückstand des Dest.-Kolbens enthielt 22, ein Zeichen dafür, daß der größte Teil des Oxyds in Sulfid übergegangen. Ähnliche Resultate wurden erhalten mit: FeS , Ni_2O_3 , NiS , CoS , CuO , CuS , V , MnO_2 . Geringe Wrkg. zeigte Al_2S_3 , wirkungslos bei 450 – 500° waren PbO , Silicagel. Mit MoO_3 , weniger reichlich mit ZnO , ZnS , CdS wurde bei 300 – 400° ein blaupurpurnes Destillat unbekannter Konst. erhalten, Thiophen hatte sich gebildet. (Journ. Chem. Soc. London **125**, 2264–66, 1924. Edgbaston, Univ. Birmingham.)

HABERLAND.

William Ogilvy Kermack, *Synthesen in der Indolreihe*. I. Kondensation von 2-Nitro-p-toluylsäureäthylester mit Oxalester in Ggw. von $\text{C}_2\text{H}_5\text{ONa}$ führt zu 2-Nitro-4-carbäthoxyphenylbrenztraubensäureäthylester; durch Red. geht diese Verb. über in Indol-2,6-dicarbonsäureester, woraus durch Hydrolyse die freie Säure zu erhalten ist. — 2-Nitro-p-tolunitril + $(\text{COOC}_2\text{H}_5)_2$ kondensieren sich zu 2-Nitro-4-cyanphenylbrenztraubensäureäthylester; Red. dieser Verb. führt zu 6-Cyanindol-2-carbonsäureester; die hieraus zu erhaltende freie Säure liefert mit Aminodimethylacetat 6-Cyanindol-2-carboxydimethylacetalylamid (I); Verss., diese Verb. durch alkoh. HCl unter Ringschluß in ein Indoldiazin- oder Carbolinderiv. überzuführen (v. KERMACK, PERKIN u. ROBINSON, Journ. Chem. Soc. London **121**, 1872; C. **9**, I. 1173) mißlingen; anscheinend wirkt die positive Cyangruppe im Benzolkern günstig auf die Reaktionsfähigkeit der H-Atome im Pyrrolkern. — Hervorzuheben ist, daß mit Ausnahme von 6-Cyanindol-Indol-6-carbonsäure die hier beschriebenen Indolderivv. nur nach längerem Kochen mit Ehrlichschem Reagens eine Färbung geben.








Versuche. 2-Nitro-p-toluylsäure, Darst. durch Lösen von 27,2 g p-Toluylsäure in einem warmen Gemisch von je 80 ccm HNO_3 , D. 1,5 u. 1,42, F. 187 – 18° . 2-Nitro-p-toluylsäureäthylester gelbliches Öl, Kp._{10} 163 – 170° . — 2-Nitro-4-carbäthoxyphenylbrenztraubensäureäthylester, $\text{C}_{14}\text{H}_{15}\text{O}_7\text{N}$, Darst. durch 12-std. Stehenlassen bei 37° ; aus Essigsäure, danach aus Bzl. gelbliche Nadeln, F. 88 – 89° . — Indol-2,6-dicarbonsäureäthylester, $\text{C}_{14}\text{H}_{15}\text{O}_4\text{N}$, aus voriger in sd. Eg. + Zn -Staub, danach aus Bzl. hellgelbe Nadeln, F. 132° , gibt keine Färbung mit Alkalien. — Indol-2,6-dicarbonsäure, $\text{C}_{10}\text{H}_7\text{O}_4\text{N}$, aus Eg. weiße Nadeln mit Krystall-Eg., der nach längerem Trocknen bei 120 – 130° abgegeben wird, kein F. bis 310° ; mit EHRLICH'S Reagens nach längerem Kochen Rotfärbung, die durch Zugabe von NaNO_2 tiefer wird. 2-Nitro-p-tolunitril durch 1-std. Stehen des Nitrils mit 94% ig. HNO_3 ; aus Essigsäure hellgelbe Nadeln, F. 107 – 108° . — 2-Nitro-4-cyanphenylbrenztraubensäureäthylester, $\text{C}_{12}\text{H}_{10}\text{O}_5\text{N}_2$, 8 g der vorigen in 30 ccm A. + 30 g Oxalester (bei 41 g werden nach Abkühlen mit Lsg. von 2,3 g Na in 100 ccm A. versetzt, nach längerer Zeit bei 40° belassen; aus Bzl.-PAe., danach aus A. hellgelbe Nadeln, F. 107° , l. in Alkalien mit roter Farbe. — 6-Cyanindol-2-carbonsäureäthylester, $\text{C}_{12}\text{H}_{10}\text{O}_4\text{N}_2$, aus Bzl. grünlich-gelbe Nadeln, F. 171° . — 6-Cyanindol-2-carboxydimethylacetalylamid, $\text{C}_{14}\text{H}_{15}\text{O}_3\text{N}_3$ (I), vorige Säure wird mit CH_3COCl + PCl_5 in das Chlorid verwandelt, der nach Entfernung von CH_3COCl erhaltene Rückstand in w. Chlf. gel. u. mit 2 Mol. Aminodimethylacetat versetzt, aus A. gelbe Nadeln, F. 215° ; mit Ehrlichschem Reagens nur nach längerem Kochen u. Zugabe von HCl langsame Rotfärbung (dichroit., in dünner Schicht grün).

Abkühlen wieder verschwindet; auf Zusatz von NaNO_2 wird die Farbe grün, Erhitzen blau; diese Färbung bleibt bestehen bei Zugabe von W. — 6-Cyanindigo, $\text{C}_8\text{H}_5\text{N}_3$, durch Erhitzen der 2-Carbonsäure mit CaO ; aus h. A. Nadeln, 129—130°; aus W. Tafeln; reagiert mit Ehrlichschem Reagens schon bei gewöhnlicher Temp. unter Rotfärbung; in dünnerer Schicht beim Erhitzen blau, diese Farbe verschwindet beim Abkühlen; mit NaNO_2 Vertiefung der roten Farbe; mit Indigotin + HCl Rotfärbung, in dünner Schicht gelblich schimmernd, durch Zugabe von W. hieraus brauner Nd., durch Zugabe von Alkali bläulich-rote Färbung. — 6-Carbonsäure, $\text{C}_8\text{H}_7\text{O}_2\text{N}$, aus Essigsäure weiße Nadeln, F. 243—244°; Verh. mit Ehrlichschem Reagens wie vorige. (Journ. Chem. Soc. London 125. 2285—91. 1901. Edinburgh, Royal Coll. of Physicians.)

HABERLAND.

L. Kalb und E. Berrer, Untersuchungen in der Indigogruppe. V. 5,7,5',7'-Tetrajodindigo und verwandte Verbindungen. (IV. vgl. Ber. Dtsch. Chem. Ges. 45. 2136; 1912. II. 1214.) Im Gegensatz zu Cl u. Br wirkt elementares J auf die Bisulfite des Dehydroindigo fast gar nicht ein. Doch gelang die Jodierung mit Chlorjod, führte zum 5,7,5',7'-Tetrajoddehydroindigonatriumbisulfite. Die Stellung der J-Atome wurde durch Oxydation mit Chromsäure zu 5,7-Dijodisatin (IV) u. dessen weitere Jodierung mit H_2O_2 in 3,5-Dijodanthranilsäure bewiesen werden. Damit war die Konst. des 5,7,5',7'-Tetrajodindigos (III) erwiesen. Auch für die Darst. von 5,5'-Dijodindigo ist bei entsprechend geringerer Halogenmenge dieser Weg zur Gewinnung gangbar. — Vergleichende Küpentrübungen auf Baumwolle zeigten, daß die starke Beschwerung des Mol. mit J die Nuance nach Grün zu tiefte. Die tetraiodierte Bisulfiteverb. ist etwa 3 mal so lichtempfindlich wie das Bromderiv. u. dieses wieder $4\frac{1}{2}$ mal mehr wie die Cl -Verb. Das unsubstituierte Dehydroindigobisulfite ist seltener Weise doppelt so lichtempfindlich wie die Verb. Wenn die Lichtempfindlichkeit der halogenfreien Verb. gleich 1 gesetzt wird, so erhält man die Werte: 1, 0,48, 2,17, 6,50 in der Reihe Cl , Br , J . Auch in großem Überschuß von Chlorjod gelingt es nicht, 2 J-Atome in das Isatin einzuführen. Hierbei entsteht nur das 5-Jodisatin. Es muß also der Umweg über die Dehydroindigo-Bisulfiteverb. gewählt werden. Die Eigenschaften entsprechen der Bromverb. J ist ziemlich fest gebunden; man kann zu Dijodanthranilsäure oxydieren u. zum entsprechenden Dioxindol reduzieren. Es wurde die Existenz von verschiedenen Formen des 5,7-Dijodisatins nachgewiesen. Beide Formen sind vollkommen beständig. Die gelbe ist weniger stabil als die rote u. geht bei hoher Temp. (200—205°) in diese über. Sie bilden gleichartige Lsgg., doch besitzen sie darin ihre Sonderexistenz. Die verschiedenen Lösungsm. wirken umher u. erklären die Mischlsgg., die auch feste Mischformen zur Folge haben. Die Verb. kann über das Pyridinadditionsprod. leicht festgelegt werden, was bei den meisten Lösungsm. nicht einheitlich gelingt. Da Polymorphie u. Polymerie in Betracht kommen können, dürfte ein Isomeriefall vorliegen, der vielleicht Erklärung der Isatindesmotropie beitragen kann. Auch beim Dibromisatin wurde diese Isomerie u. das Gleichgewicht der 2 Formen beobachtet. Durch Kondensation des Dijodisatins mit 3-Oxythionaphthen wurde 3-(5',7-Dijodindol)-2-thio-


V X = $\text{O} \cdot \text{SO}_2\text{Na}$ VI X = CN VII X = H

naphthenindigo (VIII) u. aus diesem durch Spaltung mit alkoh. Na *5,7-Dijodo-3-aldehyd* (IX) erhalten. Das Verh. letzterer Verb. spricht für eine tautomere methylenform.

Versuchsteil. Innerhalb 1 Stde. wird fl. *Chlorjod* in die auf 5° gekühlte von *Dehydroindigonatriumbisulfid* (I) in W. eingerührt. Nach 2-std. Rührens saugen des J-Nd. u. Zerstören der Jodsäure u. des J im Filtrat durch NaHCO_3 u. späteres Aussalzen wird das rohe *5,7,5'-7'-Tetrajoddehydroindigonatriumbisulfid*, $\text{C}_{16}\text{H}_5\text{O}_2\text{J}_4$, $2\text{NaHSO}_3 + 2\text{H}_2\text{O}$ (II), gewonnen. Ausschalten Tageslichtes u. gute Kühlung ist geboten. Das durch Auflösen u. Wiederausfällen aus W. gereinigte II ist ein gelbes Pulver. Unreine Präparate zersetzen sich unter B. von Tetraiodindigo. — Setzt man zu der Lsg., die II enthält, 3 Teil u. 1 Teil konz. HCl u. erhitzt 20 Min. zum Kochen, so wird II zers. unter I *5,7,5',7'-Tetrajodindigo*, $\text{C}_{16}\text{H}_5\text{O}_2\text{N}_2\text{J}_4$ (III), (Zers. unter J-Entw.), in den üblichen Lösungsm. unl.; Reinigung durch Auskochen mit Eg. oder verd. NaOH oder Auskochen in Ä. — *5,7-Dijodisatin*, $\text{C}_8\text{H}_5\text{O}_2\text{NJ}_2$ (IV), Darst. durch Oxydation der von J-schlamm filtrierten Fl., die II enthält, mit $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ u. H_2SO_4 . Aus dem entstehenden Nd. wird das J durch Wasserdampf abgetrieben. Die weitere Reinigung wird durch sehr verd. NaOH vorgenommen. Aus A. oder Eg. wird die rote Form in wässriger Lösung erhalten; bei 240° Zers. unter Entw. von J-Dämpfen. Aus Aceton, Nitrobenzol, Toluol u. Dekahydronaphthalin scheiden sich meist beide Formen u. Mischformen ab. Die Reindarst. der gelben Form gelingt aus Pyridin als Lösungsm.; vor der Zers. bei 240° Umwandlung in die rote Form. — *5,7-Dijodisatin-3-phenylhydrazon*, $\text{C}_{14}\text{H}_9\text{ON}_3\text{J}_2$, gelbe Nadeln, wl. in A. u. Aceton, Zers. bei 200°. — *5,7-Dijodisatinnatriumbisulfid* (V), entsteht beim Schütteln der Komponenten mit etwas Ä., mkr. weiße Blättchen. — *5,7-Dijodisatincyanhydrin*, $\text{C}_8\text{H}_7\text{O}_2\text{N}_2\text{J}_2$ (VI), farblose, linsenförmige Krystalle aus verd. wässriger Lsg. in W. u. Ä., ll. in Eg. Darst. aus IV durch Verreiben mit wasserfreier HCl u. einigen Körnchen KCN. Rk.-Gemisch 12 Stdn. mit konz. HCl unter Eiskühlung stehen lassen. Man verd. mit Eis u. wäscht mit W. — Durch Oxydation von V mit 3%ig. H_2O_2 in alkal. Lsg. wurde *3,5-Dijodanthranilsäure* vom F. 230° erhalten. — *5,7-Dijoddioxindol*, $\text{C}_8\text{H}_5\text{O}_2\text{NJ}_2$ (VII), aus II in A. durch Kochen (2 Std.) unter phosphoriger Säure am Rückflußkühler. Das farblose krystalline *Dijoddioxindol* wird zur Reinigung mit A. gewaschen. In W. u. HCl ist die Verb. unl., in h. A., ll. in k. Eg. u. Pyridin. Bei 220° völlige Verkohlung. — *3-(5',7'-Dijodindol)-2-thionaphthenindigo*, $\text{C}_{16}\text{H}_7\text{O}_2\text{NJ}_2\text{S}$ (VIII), Darst. aus IV, 3-Oxythionaphthalen-2-carbonsäure, A. u. 20%ig. Na_2CO_3 -Lsg. durch Kochen des Gemisches unter Luftabzug während 1 Stde. Der Farbstoff wird mit W. u. verd. HCl gewaschen u. mit Ä. ausgekocht. Dunkelrote Nadeln aus Nitrobenzol; wl. bis unl. in den üblichen Lösungsm. — *5,7-Dijodoxindol-3-aldehyd*, $\text{C}_8\text{H}_5\text{O}_2\text{NJ}_2$ (IX), schwach gelbe Blättchen aus Eg. u. dann aus Aceton mit viel Blutkohle. Bei 200° Bräunung, 230° Verfärbung u. gelbes Sublimat, 230–265° völlige Zers. u. teilweises Schmelzen. Dargestellt aus vorigem Farbstoff, der in einer Lsg. von Na in A. zu feiner Verteilung eingerührt wird. Durchrühren unter Luftabschluß u. vorsichtiges Erwärmen, bis die farblosen Nadeln der Na-Verb. des Aldehyds gebildet haben. Langes Erhitzen vermeiden; Rkk. in wenigen Min. vollendet. Der Aldehyd wird aus der abgeschiedenen Na-Verb. durch verd. Eg. abgeschieden. — *Phenylhydrazon*, $\text{C}_{15}\text{H}_{11}\text{ON}_3\text{J}_2$, gelbe Nadeln vom F. 226° (Zers.). — *5,7-Dijodoxindol-3-aldehydanil*, $\text{C}_{15}\text{H}_{10}\text{ON}_2\text{J}_2$, gelbe Nadeln, Zers. bei 275°. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 57. 2105–17. 1924.) H. C. STILES

L. Kälb und L. Vogel, Untersuchungen in der Indigogruppe. VI. *4,4'-Lehtetraiodindigo, 5,6,7,5',6',7'-Hexajodindigo und verwandte Verbindungen* (vgl. vorst. Ref.) Auch wenn die benachbarten 4,4'- oder 6,6'-Stellungen der Indigo-sulfidverb. des Dehydroindigo bereits mit Halogen besetzt sind, kann die Joer





übergeführt werden, die dann zu 6-fach jodierten oder gemischt halogenierten Indigofarbstoffen wie Isatinen führt. Ausgehend von 4,4'-Dichlorindigo (I) wird 4,4'-Dichlordehydroindigo-C-acetat (II), Dichlordehydroindigo (III) u. Dichlordehydroindigobisulfat (IV) hergestellt. Mit Chlorjod wird IV in bekannter Weise in Dichlor-5,7,5',7'-tetrajoddehydroindigobisulfat (V) u. dieses durch Verkothen mit Jod in Dichlortetrajodindigo (VI) übergeführt. Das aus IV darstellbare 4-Chlor-5,7-dijodisatin (VII) zeigte nicht die beim Dijodisatin beobachtete Isomerie. — 4,4'-Dijodindigo (VIII) wurde in analoger Weise schließlich in Hexajodindigo (IX) übergeführt. In dieser Reihe läßt das Krystallisationsvermögen eine weitere Vertiefung der Farbe ist nicht wahrzunehmen, wenn 4 J-Atome an 4,4'-Dichlorindigo eingeführt werden. Durch die ungeheure Belastung mit J-Atomen kann ein sehr reines Grün erhalten werden, doch geht die techn. Verwendbarkeit dabei verloren. Die hochjodierten Indigofarbstoffe lassen sich nur schwer verküpen u. die Luftempfindlichkeit der Küpen ist gering. Bzgl. der Lichtempfindlichkeit der Dehydroindigobisulfatverbb. wurden die Beobachtungen von B. u. BERRER bestätigt gefunden. — Um VIII in besserer Ausbeute zu gewinnen, wurde versucht, den 2-Nitro-4-jodbenzaldehyd über 2-Nitro-4-aminotoluol in Nitro-4-jodtoluol darzustellen. Die Oxydation mit Chromsäure in Eg.-Essigsäureanhydrid-H₂SO₄ lieferte jedoch bei niedriger Temp. statt des erwarteten Aldehyds die 2-Nitro-4-jodbenzoesäure direkt in sehr reinem Zustand. Für das Phenylglycincarbonsäure-Verf. zum 6,6'-Dijodindigo war damit ein günstiger Weg gefunden, von dem Friedländerschen Weg (für Dibromindigo) aber insofern etwas abweichend, als die Oxydation der CH₃-Gruppe vor der Red. der NO₂-Gruppe ausgeführt und durch Acetylierung u. Entacetylierung gespart wurden. Der Weg geht aus folgendem Schema klar hervor:



Versuchsteil. 4,4'-Dichlordehydroindigo-C-acetat, C₂₀H₁₄O₆N₂Cl₂ (II), aus I durch Oxydation mit KMnO₄ in Eg., Ausbeute 79,3%, Nadeln, wl. in Bzl. u. Chlf. — 4,4'-Dichlordehydroindigo, C₁₆H₆O₂N₂Cl₂ (III), aus II mit Bzl. u. Pyridin erwärmen und kurz kochen; lange braune Spieße, wl. in Bzl., ll. in h. Nitrobenzol. — 4,4'-Dichlordehydroindigonatriumbisulfat (IV), gelbe Würfel, ll. in W., weniger lichtempfindlich, beständig; aus W. krystallisiert IV mit 2 Moll. H₂O. — 4,4'-Dichlor-5,7,5',7'-tetrajoddehydroindigonatriumbisulfat (V), aus warmem W. lange Prismen oder Nadeln (7 Moll. H₂O); bedeutend lichtempfindlicher als IV, aus dem es mit Chlorjod dargestellt wird. — 4,4'-Dichlor-5,7,5',7'-tetrajodindigo, C₁₆H₂O₂N₂Cl₂J₄ (VI), durch Jodierung von IV; Farbe grünstichigblau; aus Nitrobenzol u. Chinolon in Nadeln. — 4-Chlor-5,7-dijodisatin, C₈H₂O₂NClJ₂ (VII), rote Nadeln aus Bzl. u. Toluol, Zers. 222—225°. — o-Nitro-p-jodbenzoesäure, C₇H₄O₄NJ, Darst. aus o-Nitro-p-jodtoluol, das in einer Mischung von Eg. u. Essigsäureanhydrid gelöst wird. Hierzu konz. H₂SO₄ u. im Verlauf von 2—3 Stdn. Chromsäure. Dann 10 Min. rühren (Temp. 5—15°). Nach 12-std. Stehen grüner Brei auf Eis gießen. Nach dem klaren Lsg. krystallisiert die Säure in weißen Blättchen vom F. 192—193°. Red. zur o-Amino-p-jodbenzoesäure erfolgt mit FeSO₄ u. NH₃ (Ausbeute 88%). — o-Jodphenylglycin-o-carbonsäure, C₈H₄O₄NJ, gelblichweiße Nadeln aus verd. A., Zers. 253—255°. Die Amino-jodbenzoesäure wird mit 15%ig. NaOH gel. u. eine Lösung von Chloressigsäure in 15% NaOH hinzugegeben, 24 Stdn. bei 40—43° erhitzen. Aus der sodaalkal. Lsg. mit verd. H₂SO₄ heiß fällen u. absaugen. Die

Verb. ist wl. in W., ll. in A. u. Ä. — 6,6'-Dijodindigo, $C_{16}H_2O_2N_2J_2$ (VIII); phenylglycin-o-carbonsäure mit der gleichen Gewichtsmenge Na-Acetat in Säureanhydrid 1 Stde. kochen; Anhydrid im Vakuum abdampfen, Rückstand in W. behandeln, wodurch sich 6-Jod-1,3-diacetylindoxyl abscheidet. Mit verd. l. verseift u. durch Luftstrom oxydiert. Ausbeute 83,3%, Reinigen durch Umlösen mit Hydrosulfit u. verd. NaOH (Zusatz von A.). Nadelchen aus Chinolin-Phthalsäureester sechseckige blaue Blättchen. — 6,6'-Dijoddehydroindigo- $C_{20}H_{14}O_6N_2J_2$, aus VIII durch Oxydation mit $KMnO_4$ in Eg., blaßgraues Pulver, wl. in Bzl. u. Chlf. — 6,6'-Dijoddehydroindigo, $C_{16}H_2O_2N_2J_2$, rotbraune Spieß, in Ä., wl. in Toluol. — 6,6'-Dijoddehydroindigonatriumbisulfid, Prismen mit H_2O , lichtempfindlicher als das analoge Dichlorid, ll. in W. — 5,6,7,5',6',7'-Dijoddehydroindigokaliumbisulfid, $C_{16}H_2O_2N_2J_6 \cdot 2KHSO_3$, Nadelchen aus warmer ohne Krystall-W. — 5,6,7,5',6',7'-Hexajodindigo, $C_{16}H_2O_2N_2J_6$ (IX), gereinigt stumpf blaugrünes Pulver, unl. in Aceton u. Eg., in o-Dichlorbenzol l. mit gelber Farbe. Reinigung durch Umkühlen, Oxydation der Küpe träge. — 5,6,7-Triiodoindigo, $C_8H_2O_2NJ_3$, aus Nitrobenzol braune Rhomben, aus Aceton sechseckige Blättchen, Na-Salz, gelbe flache Nadeln. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 57. 2117—25. 1924. München. Bay. Akad. d. Wissensch.)

P. Karrer, G. H. Diechmann und William T. Haebler, Weiteres über die Stellung und Umwandlung der *i*-Nitrosoacetanilide. (Vgl. KARRER u. HAEBLER, Ber. chim. Acta 7. 534; C. 1924. II. 183.) *i*-Nitrosoacet-*p*-aminophenolallyläther geht durch Red. über in die Glycylverb. des *p*-Aminophenolallyläthers. — *i*-Nitrosoacet-4-aminoantipyrin gibt analog Glycyl-4-aminoantipyrin. *i*-Nitrosoacetarsanilsäure, $Na_2S_2O_4$ red., geht in Diglycyl-*p,p'*-diaminoarsenobenzol über, durch Red. mit H_3PO_3 wird unter Umständen nur der AsO_3H_2 -Rest. red. — 3,3'-Diglycyldiamino-4,4'-dioxyarsenobenzol wird durch Red. von 3-*i*-Nitrosoacetamino-4-oxyphenylglycylsäure erhalten. — *i*-Nitrosoacetanilid wird durch $SOCl_2$ unter Abspaltung von HCl übergeführt in Cyanameisensäureanilid, $C_6H_5NHCOCN$; eine ähnliche Anhydrierung erleidet *i*-Nitrosoacetanthranilsäure, die intermediär entstehende Verb. I geht durch nochmalige Anhydrierung über in Cyanformylanthranil (II); die Oxidation dieser Verb. ergibt sich daraus, daß bei unvollständiger Verseifung Isatonsäure entsteht, bei vollkommener Verseifung bildet sich Anthranilsäure u. HCN. Ein. v. 1 Cl_2 auf *i*-Nitrosoacetanilid erfolgt über III unter B. von Oxanilhydrocyananilinchlorid (IV).



Versuche. *i*-Nitrosoacetyl-*p*-aminophenolallyläther, $C_{11}H_{13}O_3N_2$, 5 g *p*-aminophenolallyläther werden mit $2\frac{1}{2}$ -facher Menge Hydroxylaminsulfosäurelsg. (v. SANDMEYER, Helv. chim. Acta 2. 234; C. 1919. III. 491) übergossen u. inn. gel.; dann wird die berechnete Menge Chloralhydrat zugegeben u. 2 Stdn. a. d. Wasserbad erhitzt. Aus A. bräunliche Tafeln, F. 177—178° (vorheriges Sintern). *p*-Aminophenolallylätherglycid, $C_{11}H_{11}O_3N_2$, aus vorigem in A. + verd. H_2SO_4 (elektrolyt. Red. bei 40—50° (3,5—4 Amp.); aus h. W. + einigen Tropfen A. F. 98—99°. — *i*-Nitrosoacetyl-4-aminoantipyrin, $C_{18}H_{11}O_3N_4$, aus 2 g 4-Aminoantipyrin + 2 g Chloralhydrat + 50 ccm Hydroxylaminsulfosäurelsg. Nach 2 Stdn. Stehen abgeschiedenes Öl wird entfernt, aus überstehender Lsg. nach mehrstünd. Stehen gelbliche Krystalle, F. 190—194° (vorher starkes Sintern). — *Aminopyringlycid*, konnte nicht krystallisiert erhalten werden, da, wie auch einige Salze, stark hygroskop.; Pikrolonat, $C_{23}H_{24}O_7N_8$, aus A. gelbe Nadeln, F. 225—226°, unter


20°. — *i*-Nitrosoacetarsanilsäure, $C_8H_7O_3N_2As$, aus *p*-Amidophenylarsinsäure; bis gelbliche Krystalle, ll. in Alkalien, Na_2CO_3 u. h. W., unl. in A. u. Ä. — *i*-Nitrosoacetamino-4-oxypheylarsinsäure, $C_8H_7O_6N_2As = C_6H_3(AsO_3H_2)^1(NHCOCH : C^3(OH)^4$, aus 3-Amino-4-oxypheylarsinsäure; aus h. W. oder Eg. bräunliche Krystalle, in A. leichter l. als vorige. — 3,3'-Diglycyldiamino-4,4'-dioxyarsenobenzol, aus g. der vorigen in 15 cem W. + zur Lsg. erforderlichem KOH + Spur KJ in Eingießen in gekühlte Lsg. von 35 cem konz. HCl + 7 g $SnCl_2$; die Verb. als Chlorhydrat in gelben Flocken aus; l. in W. u. überschüssigen kaust. Alkalien. — *Cyanformylanilid*, Darst. durch $1\frac{1}{2}$ -std. Erwärmen von 5 g *i*-Nitrosoacetanilid + 15 cem $SOCl_2$; aus Bzl., danach aus Lg. Blättchen, F. unscharf bei 120°. — *Cyanformylanthränil*, $C_{10}H_7O_2N_2$ (II), aus Bzl. nach einmaligem Umschütteln mit W. weiße Nadeln, F. 123°; kann auch durch Sublimation erzeugt werden; ll. in A., Aceton, Chlf. u. h. Bzl., unl. in Lg. Hieraus durch -lg. Kochen mit W. + wenig A. *Isatosäure*, $C_8H_5O_3N$, aus h. W. gelbliche Nadeln, F. 235–238°; durch $1\frac{1}{2}$ -std. Kochen erfolgt vollständige Hydrolyse. — *Hydroxamsäurechlorid*, $C_8H_7O_2N_2Cl$ (IV), durch Einleiten der erforderlichen Menge Cl_2 in Lsg. von 2 g *i*-Nitrosoacetanilid in 30%ig. A. + 5% HCl-Gas; nach Erhitzen mit W. ausgeäthert, äth. Lsg. mit Lg. versetzt; Nd. aus Bzl. weiße Blättchen, F. 172–173°. — *i*-Nitrosoacetyl-*p*-aminoazobenzol, $C_{11}H_{12}O_2N_4 = C_6H_5N : N \cdot p-NHCOCH : NOH$, das durch Lösen in NaOH u. Füllen mit HCl erhaltene Verb. wird aus A. umkrystallisiert: braune Blättchen, F. 214°. — *i*-Nitrosoacetyl-*toluazo-p*-toluidin, $C_{16}H_{16}O_2N_4 = p-CH_3 \cdot C_6H_4N : N \cdot C_6H_3(CH_3)^3(NHCOCH : NOH)^6$, braungelbe Blättchen, F. ca. 194°. — *i*-Nitrosoacetyl-*o*-toluazo-*o*-toluidin, $C_{16}H_{16}O_2N_4 = o-CH_3 \cdot C_6H_4N : N \cdot C_6H_3(CH_3)^3(NHCOCH : NOH)^4$. (Helv. chim. Acta 1931–39. 1924. Zürich, Univ.)

HABERLAND.

Frederick Daniel Chattaway und Charles Richard Noël Strouts, Halogen-substituierte 1-Arylpyrazolone. 1-*o*-Chlorphenyl-3-methyl-5-pyrazolon, $C_{10}H_9ON_2Cl$, durch Erhitzen von Acetessigester-*o*-chlorphenylhydrazon auf 150–170° bis A. abdestilliert ist; aus h. A. weiße Prismen, F. 199°; Chlorhydrat, $C_{10}H_9ON_2Cl \cdot HCl$, aus konz. HCl weiße Nadeln, F. 154°, bei 172° Zers. in voriges u. HCl; 4-Oximinopyrazolon durch Zutreffenlassen von 1 g des vorigen + 0,4 g $NaNO_2$ + wenig wss. A. in überschüssige, durch Kältemischung gekühlte HCl; aus A. goldbraune Prismen, F. 174°, wl. in sd. W., Lsg. in NaOH rot, durch Ansäuern fällt die ungelöste Verb. wieder aus; 4-Benzylidenderiv., $C_{16}H_{13}ON_2Cl$ (Druckfehler im Original), aus sd. A. orangefarbene rhomb. Prismen, F. 159°. — 1-*o*-Chlorphenyl-3-methyl-5-pyrazolon-4-azo-*o*-chlorbenzol, $C_{16}H_{12}ON_4Cl_2$, aus Chlf.-A. goldgelbe Prismen, F. 120°. — 1-*o*-Chlorphenyl-2,3-dimethyl-5-pyrazolon (*o*-Chlorantipyryn), $C_{11}H_{11}ON_2Cl$, aus dem erstgenannten Pyrazolon in $CH_3OH + CH_3J$ bei 100–120° (10 Stdn.), aus h. A. Rhomben, F. 113°, ll. in W., Lsg. schmeckt bitter. — 1-*m*-Chlorphenyl-3-methyl-5-pyrazolon, $C_{10}H_9ON_2Cl$, aus A. Prismen, F. 131°; Chlorhydrat, $C_{10}H_9ON_2Cl \cdot HCl$, aus konz. HCl weiße Nadeln, F. 184° (unter HCl-Entw.); 4-Oximinoderiv., $C_{10}H_9ON_2Cl$, aus sd. W. orangefarbene Nadeln, F. 173° (Zers.); 4-Benzylidenderiv., $C_{16}H_{13}ON_2Cl$, aus h. A. rote Nadeln, F. 128°. — 1-*m*-Chlorphenyl-3-methyl-4-*i*-propyl-5-pyrazolon, $C_{13}H_{13}ON_2Cl$, aus dem *m*-Chlorphenylpyrazolon + sd. Aceton; aus A. schwefelgelbe Nadeln, F. 110°. — 1-*m*-Chlorphenyl-3-methyl-5-pyrazolon-2,4'-dichlorbenzol, $C_{16}H_{11}ON_4Cl_3$, aus Chlf.-A. goldbraune Nadeln, F. 190°. — 1-*m*-Chlorphenyl-2,3-dimethyl-5-pyrazolon (*m*-Chlorantipyryn), $C_{11}H_{11}ON_2Cl$, aus Chlf.-A. Tafeln, F. 89–90°, wl. in W., Lsg. schmeckt sehr bitter; ll. in A., Ä. u. Chlf. Chlorpyrazolblau, $C_{20}H_{11}O_2N_4Cl_2$, 2 g Bis-1-*m*-Chlorphenyl-3-methyl-5-pyrazolon stellt durch Erhitzen des Pyrazolons [2 g] mit 0,3 g Phenylhydrazin bis NH_3 -Entweichen beendet) + überschüssiges $NaNO_2$ werden in NaOH gel. u. zu überschüssiger Lsg. gegeben; aus Chlf. durch Zugabe von wenig P.Ae. dunkelblaues Krystall.

pulver, F. 209° (Zers.). unl. in organ. Mitteln außer Chlf., wird durch Reduktionsmittel wieder zum Bispyrazolon; wird auch erhalten, wenn das m-Chlorphenylpyrazolon mit FeCl_3 gekocht wird; die anderen hier genannten Chlorphenylpyrazolone geben diese Rk. mit FeCl_3 nicht. — *Chlorhydrat des 1-p-Chlorphenyl-3-methyl-5-pyrazolons*, $\text{C}_{10}\text{H}_9\text{ON}_2\text{Cl}$, HCl , Prismen, F. 194—195° (Zers.); 4-Oximidinderiv., $\text{C}_{10}\text{H}_8\text{O}_2\text{N}_3\text{Cl}$, aus sd. W. (worin swl.) orangefarbige Nadeln, F. 180° (Zers.). unl. in organ. Mitteln; aus A. in mehreren Modifikationen krystallisierend; unl. in Form ziegelrote trikline Prismen, stabile Form orangefarbene Nadeln; werden in Form mit wenig A. in verschlossenem Gefäß belassen, so gehen im Laufe von 14 Tagen die Prismen in die Nadeln über; 4-Benzylidenderiv., $\text{C}_{16}\text{H}_{13}\text{ON}_2\text{Cl}$, aus A. scharlachrote Prismen, F. 156°. — 1-p-Chlorphenyl-3-methyl-5-pyrazolon-4-azobenzol, $\text{C}_{16}\text{H}_{12}\text{ON}_4\text{Cl}_2$, aus Bzl. orangefarbene Nadeln, F. 232°. — 1-p-Chlorphenyl-2,3-dimethyl-5-pyrazolon (p-Chlorantipyrin), $\text{C}_{11}\text{H}_{11}\text{ON}_2\text{Cl}$, aus h. Toluol Tafeln, F. 212°. unl. in organ. Mitteln u. W., Lsg. schmeckt bitter. — Bis-1-p-Chlorphenyl-3-methyl-5-pyrazolon, $\text{C}_{20}\text{H}_{16}\text{O}_2\text{N}_4\text{Cl}_2$, unl. in organ. Mitteln; aus alkal. Lsg. durch Ansäuern weißes Pulver; beim Erhitzen Zers. — p-Chlorpyrazolblau, $\text{C}_{20}\text{H}_{14}\text{O}_2\text{N}_4\text{Cl}_2$, aus h. durch Zugabe von Ä. blaue Nadeln, Lsg. in Chlf. u. konz. H_2SO_4 indigoblaue Nadeln, 300° Zers. — 1,2',4'-Dichlorphenyl-3-methyl-5-pyrazolon, $\text{C}_{10}\text{H}_8\text{ON}_2\text{Cl}_2$, aus h. A. scharlachrote Prismen, F. 178°; Chlorhydrat, $\text{C}_{10}\text{H}_8\text{ON}_2\text{Cl}_2\text{HCl}$, aus konz. HCl weiße Nadeln, F. 153°, bei weiterem Erhitzen bei 170° Abspaltung von HCl ; 4-Oximininderiv., $\text{C}_{10}\text{H}_7\text{O}_2\text{N}_3\text{Cl}_2$, aus sd. W. kanariengelbe Nadeln, F. 166—168° (Zers.); 4-Benzylidenderiv., $\text{C}_{17}\text{H}_{12}\text{ON}_2\text{Cl}_2$, aus sd. A. orangefarbene rhomb. Krystalle, F. 131°. — 1,2',4'-Dichlorphenyl-3-methyl-5-pyrazolon-4-azobenzol, $\text{C}_{16}\text{H}_{12}\text{ON}_4\text{Cl}_2$, aus A. orangefarbene Nadeln, F. 137—138°. — 1,2',4'-Dichlorphenyl-2,3-dimethyl-5-pyrazolon, $\text{C}_{11}\text{H}_{10}\text{ON}_2\text{Cl}_2$, aus Aceton Prismen, F. 143°, wl. in W., Lsg. schmeckt bitter. (Monatsh. Chem. Soc. London 125. 2423—27. 1924. Oxford, The Queens Coll.) HABERMAN.

Gopál Chandra Chakravarti, *Die Farbe komplexer Diazole*. Teil I. 1',2'-Naphthimidazol-2-phenyl-o-carbonsäure (I) geht durch Acetanhydrid unter Abspaltung von H_2O über in das orangegelbe 1,2-o-Benzoylen-1,3-naphthodiazol (II); 1,2,4,6-Naphthoylen-1,3-benzodiazol (III) ist intensiv gelb gefärbt. 1,2-(1',8')-Naphthodiazol-1,3-(2')-methylbenzodiazol (IV) hat tiefgelbe Farbe; 1,2-(1',8')-Naphthoylen-1,3-(1,2-naphthimidazol (V) ist orangefarb. Die Verbb. III—V enthalten einen kondensierten Pyridin- u. Imidazolring; ihre Farbe zeigt, daß dieses System, ebenso wie kondensierte Pyrrol-Imidazolringe, chromophore Eigenschaften besitzt. 1,2-o-Benzoylen-1,3-(2')-methylbenzodiazol (VI) ist gelb. Ein Vergleich mit der Farbe der Verbb. II—V zeigt, daß bei letzteren durch die erhöhte Ringzahl die Farbe vertieft ist.





Versuche. Toluylenamidinbenzenyl-o-carbonsäure, $\text{C}_{15}\text{H}_{12}\text{O}_2\text{N}_2$, aus 1,4-Toluylendiamin + Phthalanhydrid in A. durch 3-std. Kochen; aus Essigsäure

0–262°, l. in Mineralsäuren, Alkali u. Alkalicarbonaten, unl. in W., Chlf., n. Ä. u. Toluol. — 1,2-o-Benzoylen-1,3-methylbenzodiazol, $C_{15}H_{10}ON_2$ (VI), biert beim Erhitzen des vorigen; aus A. gelbe Krystalle, F. 166°, Lsg. in H_2SO_4 gelb mit grüner Schattierung. — 1',2'-Naphthimidazol-2-phenyl-o-carbon- $C_{18}H_{12}O_3N_2$ (I), durch Kochen äquimolek. Mengen Phthalanhydrid + 1,2- $1,2$ -naphthylendiamin in absol. A.; aus Nitrobenzol F. über 300°. — o-Aminonaphthal- $C_{16}H_{12}O_2N_2$, aus o-Phenylendiamin + Naphthalanhydrid in A. Nach Erkalten ener Nd. wird mit Na_2CO_3 behandelt; in Lsg. geht Benzimidazol-2-naphthyl- $C_{18}H_{12}O_3N_2$, F. 265–269°; in Na_2CO_3 unl. hinterbleibt das Phthalanil; Waschen mit W. F. 145° (Zers. u. vorheriges Erweichen). Acetylderiv. des $C_{20}H_{14}O_3N_2$, aus Eg. F. 224°. — Benzoylderiv., $C_{25}H_{18}O_4N_2$, aus $C_{10}H_8N_2$ + W. gelbe Nadeln, F. 209°. — N-Äthylverb., $C_{20}H_{16}O_2N_2$, aus A. F. 235°. — 1,2-(1',8')-Naphthoylen-1,3-benzodiazol, $C_{18}H_{12}ON_2$ (III), durch 2–3-std. en von Aminonaphthalanil oder Benzimidazolnaphthylcarbonsäure auf 210 bis aus A. tiefgelbe Nadeln, F. 198°; entsteht auch durch Kochen der beiden f. mit Acetanhydrid. — o-Aminotolynaphthalimid, $C_{19}H_{11}O_2N_2$, aus Naphthal- rid + o-Toluylendiamin in sd. A.; aus Xylol (Lsg. fluoresciert intensiv grün) lbe Krystalle, F. 196°. — Tolimidazol-2(1')-naphthyl-8'-carbonsäure, $C_{19}H_{14}O_3N_2$, aus dem in Xylol unl. Anteil des vorigen Reaktionsprod. durch Extrahieren lkalı u. Ansäuern; nach Waschen mit W. F. 273–275°. — 1,2-(1',8)-Naphtho- 3-methylbenzodiazol, $C_{19}H_{13}ON_2$ (IV), durch Erhitzen von Aminotolynaphthal- Destillat aus A. tiefgelbe Nadeln, F. 187°. — 2'-Amino-N-(1')-naphthyl-naphthal- $C_{20}H_{14}O_2N_2$, aus Naphthalanhydrid + 1,2-Naphthylendiamin in sd. A.; Nd. mit A., Aceton u. CS_2 extrahiert, unl. Rückstand aus Nitrobenzol umkrystalli- F. über 300°. — 1,2-(1',8')-Naphthoylen-1,3-naphthimidazol, $C_{22}H_{12}ON_2$ (V), Dest. des vorigen; aus A. orangerote Krystalle, F. 256°, Lsg. in konz. H_2SO_4 mit grüner Schattierung. (Quarterly Journ. Indian Chem.-Soc. 1. 19–26. 1924. ta, Univ.)

HÄBERLAND.


eslie Randal Ridgway und Robert Robinson, Ein neuer Weg zu den 3 -Carbäthoxyamino- p -methoxyacetophenon. Durch Kondensation von 2-Oxy-3-äthoxybenzaldehyd mit 2-Bäthoxyamino- p -methoxyacetophenon in Eg. + HCl erhielten Vff. 3-Carbäthoxy- 4'-methoxy-8-äthoxy-2-phenylbenzopyryliumchlorid (I); durch w. 20%ig. HCl hydrolysiert zu 3-Oxy-4'-methoxy-8-äthoxy-2-phenylbenzopyryliumchlorid, das t. erhalten wird aus 2-Oxy-3-äthoxybenzaldehyd + ω -Acetoxy- p -methoxy- phenon in Ä. + HCl-Gas; durch partielle Hydrolyse von 3,4'-Dimethoxy- 2-phenylbenzopyryliumchlorid war diese Verb. nicht zu erhalten.



ersuche. Carbäthoxyamino- p -methoxyacetophenon, $C_{12}H_{15}O_4N$, durch ab- elnde Zugabe von 12 g $NaHCO_3$ u. 2,4 g Chlorkohlensäureester zu 7 g p -methoxyacetophenonstannichlorid in W.; nach 1-std. Stehen erhaltener ird mit sd. A. extrahiert; Nadeln, F. 76°. — 3-Carbäthoxyamino-8-methoxy- ylbenzopyranylmethyläther, $C_{30}H_{21}O_5N$, aus o-Vanillin + ω -Carbäthoxyamino- phenon in Eg. + HCl-Gas; nach 12-std. Stehen durch Zugabe von W. er- er Nd. wird 15 Min. mit CH_3OH gekocht; nach 2-maligem Umkrystallisieren H_2O Prismen, F. 101°. — Äthyläther, $C_{21}H_{23}O_5N$, Prismen, F. 111°; durch H_2O Mineralsäuren keine Veränderung, beim Erhitzen tritt die orangerote Farbe oniumsalze auf. — 3-Carbäthoxyamino-4'-methoxy-8-äthoxy-2-phenylbenzo- mchlorid (I), wird bei der Darst. als dunkelrotes, beim Reiben erstarrendes

Öl erhalten, umkrystallisierbar aus mit HCl gesätt. Chlf. durch Zugabe von durch W. entsteht hieraus die Pseudobase als graue M., die durch Kochen in CH_3OH übergeht in 3-Carbäthoxyamino-4'-methoxy-8-äthoxy-2-phenylbenzopyryliummethyläther, $\text{C}_{22}\text{H}_{25}\text{O}_6\text{N}$ (II), aus CH_3OH Prismen, F. 104° ; durch k. konz. H_2SO_4 keine Veränderung, beim Erwärmen B. des orangeroten Pyryliumsalzes; Lsg. in verd. NaOH gelb, durch wenig HCl farblos, durch mehr Säure tief orange (wohl infolge B. nachgenannter Verb.). — 3-Oxy-4'-methoxy-8-äthoxy-2-phenylbenzopyryliumchlorid, $\text{C}_{18}\text{H}_{17}\text{O}_4\text{Cl}$, aus verd. HCl carminrote Nadeln mit 0,5 aq., F. 170° (Zers.); wl. in HCl, Lsg. citronengelb; durch k. W. keine Veränderung, beim Erhitzen entsteht farblose Lsg. der Pseudobase, beim Ansäuern das rote Oxoniumsalz, das der Lsg. durch i-Amylalkohol entzogen werden kann; der Extrakt wird durch Na-Acetat sofort farblos; Bromid rote Nadeln, F. 197° (Zers.); Ferrichlorid $\text{C}_{18}\text{H}_{17}\text{O}_4\text{Cl}_4\text{Fe}$, $\text{C}_{18}\text{H}_{17}\text{O}_4\text{Cl}_4\text{Fe}$, aus Essigsäure orangerote Tafeln, F. 196° (Zers.); 3,4'-Dimethoxy-8-äthoxy-2-phenylbenzopyryliumchlorid, $\text{C}_{19}\text{H}_{19}\text{O}_4\text{Cl}$, 3,5 H_2O , aus ω ,4-Dimethoxyacetophenon; aus verd. HCl rote Nadeln, F. 160° (Zers.); Bromid kastanienbraune Nadeln, F. $135-138^\circ$ (Zers.); wird durch $3\frac{1}{2}$ -std. Erhitzen in HBr-gesätt. Essigsäure im Rohr auf 100° entmethyliert; das entstandene Bromid bildet rote Nadeln, F. 155° , Lsg. wird durch Na-Acetat rot. — 3,4'-Dimethoxy-8-äthoxy-2-phenylbenzopyryliumferrichlorid, $\text{C}_{19}\text{H}_{19}\text{O}_4\text{Cl}_4\text{Fe}$, aus Essigsäure rote Nadeln, F. 166° ; Lsg. in A. gelb, in Chlf. orange. (Journ. Chem. Soc. London 1924, 2240—44. 1924. Manchester, Univ.)

HABERLAND.




A. Schönberg, Über die Darstellung von Dixanthylon aus Xanthion. (Vollständige Mitteilung.) Die von ARNESEN und seinen Mitarbeitern (S. 83) vergeblich versuchte Umwandlung von Xanthion (I) in Dixanthylon (II) gelang nach Versuchsversuchen von H. Krüll leicht in folgender Weise: 4 g Xanthion u. 15 g Cu-Pulver werden in einem Reagenzglas durchleiten von CO_2 1 Stde. auf 200° (Badtemp.) erwärmt, nach Erkalten

Bzl. gel., filtrierte Lsg. nach Einengen auf 15 ccm in Wärme mit A. bis zur beginnenden Trübung versetzt. Nach 48 Stdn. haben sich 2,2 g Dixanthylon abgeschieden. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 57. 2133. 1924. Berlin, Techn. Hochsch. S. 83.)

Richard Isaac Edward Hall, Die Einwirkung von Natrium auf die Ester von o- und p-Kresol. Außer regeneriertem o- u. p-Kresol erhielt Vf. durch Einwirkung von Na auf o-Kresolacetat: 2,8-Dimethylchromon, 1-Oxy-3,5-dimethylxanthon, wahrscheinlich eine kleine Menge o-Kresotinsäure; aus p-Kresolacetat + Na wurden erhalten p-Kresotinsäure, 1-Oxy-3,7-dimethylxanthon u. 2,6-Dimethylchromon. — Die Einw. von Na wurde nach der von PERKIN (Journ. Chem. Soc. London 119. 28. C. 1922. I. 42) angegebenen Methode durchgeführt. Aus o-Kresolacetat dest. ab zunächst Aceton u. Essigester über. Das Reaktionsgemisch wird mit W. versetzt u. das Öl mit Ä. extrahiert; hieraus 2,8-Dimethylchromon, aus PAe. Prismen, F. 110° , Kp.₁₂ $170-185^\circ$. Die nach Behandeln mit Ä. erhaltene braune wss. Schicht wird angesäuert, mit Ä. extrahiert u. mit NH_4OH geschüttelt; die ammoniakal. Lsg. wird nach Ansäuern o-Kresotinsäure. Aus der äth. Lsg. erhaltenes Öl gab bei der Dest. o-Kresol u. 1-Oxy-3,5-dimethylxanthon, aus CH_3OH Nadeln, F. 145° , Kp.₁₀ $225-228^\circ$. — Aus p-Kresolacetat wurden analog erhalten: 2,6-Dimethylchromon, $\text{C}_{11}\text{H}_{10}\text{O}$, aus PAe. Nadeln, F. $101,5^\circ$, Kp.₁₀ $155-160^\circ$, mit alkoh. KOH tiefrote Lsg. gebildet. — 1-Oxy-3,7-dimethylxanthon, aus A. Tafeln, F. 165° , Kp.₁₂ 220° . — p-Kresotinsäure, aus W. Nadeln, F. 150° , mit FeCl_3 Violettfärbung. (Journ. Chem. Soc. London 1924, 2266—68. 1924. Oxford, DYSON PERRINS Lab.)

HABERLAND.

Siman Bihari Dey und Karnad Krishna Row, *Die Reaktionsfähigkeit der Mengengruppe in Cumarin-4-essigsäuren und ihren Estern. Kondensation mit Salicylaldehyd zu 4,3'-Dicumarylen*. (Vgl. Journ. Chem. Soc. London **125**: 554; C. I. 2592.) Vff. stellten fest, daß die CH_3 -Gruppe in Cumarinessigestern gegenüber Salicylaldehyd reaktionsfähiger ist als in Phenylessigestern; bei den freien tritt der Unterschied weniger hervor. Bei der Kondensation von Cumaryl-essigester mit Salicylaldehyd entstehen nach unten stehendem Schema 4,3'-Dicumaryle (I). Der Einfluß, den OH-Gruppen auf die Kondensation ausüben, wird sichtbar, daß 7-Oxycumarin-4-essigester leicht mit dem Aldehyd reagiert, 7-Oxycumarinessigester dagegen kein Dicumaryl liefert. Resorecylaldehyd kondensiert sich mit den Estern nur nach der Perkinsehen Methode (in Ggw. von Acetat); in Ggw. von Pyridin (KNOEVENAGEL) tritt keine Kondensation ein. Dicumaryle sind nur langsam l. in Alkali, aus diesen Lsgg. werden sie beim Erhitzen unverändert ausgefällt; wird bei tiefer Temp. angesäuert, so fallen zunächst instabile cumarinsäureähnliche Säuren aus, die l. sind in Na_2CO_3 , bei weiterem Stehen diese Eigenschaft jedoch verlieren u. in die ursprünglichen Verbb. übergehen. Mit NaHSO_3 bilden die Dicumaryle keine Additionsverbb. (vgl. l. c.). Die Bromierung der Dicumaryle gelingt leicht, es ist jedoch schwierig, nur 1 Br einzuführen. Dibromide bilden sich leicht. 7-Methyl-4,3'-dicumaryldibromid muß in 3-Stellung haben, denn mit sd. alkoh. KOH entstand ein 3'-Cumaryl-3-cumaran-2-carbonsäurebromderiv.; ob das zweite Br in 6-Stellung sich befindet, ist nicht sicher.



Versuche. Darst. der Cumarin-4-essigsäuren: 24 g Citronensäure + 32 cem H_2SO_4 werden nach $\frac{1}{2}$ -std. Schütteln allmählich auf 70° erwärmt u. 10 bis 15 min. bei dieser Temp. belassen; nach beendeter CO-Entw. wird durch Eis gekühlt u. $\frac{1}{10}$ Mol des erforderlichen Phenols oder Naphthols + 14 cem konz. H_2SO_4 allmählich zugegeben, wobei die Temp. nicht über 10° steigen darf. Nach 12-std. Erhitzen in Eis wird die M. in W. gegossen u. der Nd. mit etwa 1 l 0,1-n. Na_2CO_3 -Lösung 10 Min. auf sd. Wasserbad digeriert; beim Ansäuern des Filtrats erhält man Cumarinessigsäure; der in Na_2CO_3 unl. Anteil besteht aus dem entsprechenden Methylcumarin. — 3'-Cumaryl-4- α -naphthopyron, $\text{C}_{22}\text{H}_{12}\text{O}_4$, aus α -Naphthopyron-säurem Na (aus 4 g Säure) + 3,3 g Salicylaldehyd + 12 g Acetanhydrid bei $60-70^\circ$ (6—7 Stdn.); aus Nitrobenzol + A. hellgelbe Nadeln, F. 255° ; wl. in sd. Eg., unl. in organ. Mitteln. Verh. gegen Alkali vgl. oben. Die Verb. entsteht aus 3 g Salicylaldehyd + 5,6 g α -Naphthopyron-4-essigester in A. + 5 bis 10 Tropfen Pyridin. — 6'-Brom-3'-cumaryl-4- α -naphthopyron, $\text{C}_{22}\text{H}_{11}\text{O}_4\text{Br}$, aus 5-Bromsalicylaldehyd nach der letztgenannten Methode; aus Nitrobenzol + Essigsäure hellgelbe Nadeln, F. 292° . — 6'-Chlor-3'-cumaryl-4- α -naphthopyron, $\text{C}_{22}\text{H}_{11}\text{O}_4\text{Cl}$, aus Nitrobenzol + A. hellgelbe Nadeln, F. $276-277^\circ$. — 6',8'-Dichlor-3'-cumaryl-4- α -naphthopyron, $\text{C}_{22}\text{H}_{10}\text{O}_4\text{Cl}_2$, goldgelbe Nadeln, F. 301° . — 6'-Nitro-3'-cumaryl-4- α -naphthopyron, $\text{C}_{22}\text{H}_{11}\text{O}_6\text{N}$, tiefgelbe Nadeln, bei 310° allmählich unter Zers. dunkel werdend; ll. in w. verd. NaOH mit tieferer Farbe; beim Ansäuern in der Kälte fällt eine ziemlich beständige Cumarinsäure aus. — 7'-Acetoxy-3'-cumaryl-4- α -naphthopyron, $\text{C}_{24}\text{H}_{14}\text{O}_6$, aus 2,75 g Resorecylaldehyd + 5,5 g naphthopyron-4-essigester in Na + 10 g Acetanhydrid bei $160-170^\circ$ (6 Stdn.); aus Nitrobenzol + A. hellgelbe prismat. Nadeln, bei 270° dunkel werdend, F. $282-284^\circ$; Hydrolyse

führte zu dunkler zäher M. — *3'-β-Naphthocumaryl-4-α-naphthopyron*, $C_{22}H_{12}O_4$, aus 2 g 2-Oxy-1-naphthaldehyd + 3 g α -Naphthopyron-4-essigester in 30 ccm A. + wenig Piperidin (3—4 Std. unter Rückfluß); aus Nitrobenzol hellgelbe Krystalle, ohne F. bis 310°. — *3'-Cumaryl-4-β-naphthopyron*, $C_{22}H_{12}O_4$, durch Kochen von 4 g β -Naphthopyron-4-essigester + 2 g Salicylaldehyd + 6 Tropfen Piperidin in 50 ccm A.; aus Nitrobenzol + A. gelbliche Nadeln, F. 282°. — *6'-Brom-3'-cumaryl-4-β-naphthopyron*, $C_{22}H_{11}O_4Cl$, aus 5-Chlorsalicylaldehyd; aus Eg. sd. gelbliche prismat. Nadeln, bei 270° dunkel werdend, F. 276—278°. — *6'-Brom-cumaryl-4-β-naphthopyron*, $C_{22}H_{11}O_4Br$, aus Essigsäure gelbe prismat. Nadeln, F. 282°. — *7-Methyl-4,3'-dicumaryl*, $C_{19}H_{12}O_4$, aus Essigsäure Nadeln, F. 247°. — *7-Methyl-6'-brom-4,3'-dicumaryl*, $C_{19}H_{11}O_4Br$, aus Nitrobenzol + Essigsäure farnartige Nadeln, F. 292°. — *7-Methyl-6'-chlor-4,3'-dicumaryl*, $C_{19}H_{11}O_4Cl$, aus Essigsäure Nadeln, F. 288°. — *7-Methyl-6',8'-dichlor-4,3'-dicumaryl*, $C_{19}H_{10}O_4Cl_2$, hellgelbe Nadeln, F. 286°. — *Verb. $C_{19}H_{12}O_5Ag_2$* , aus 7-Methyl-4,3'-dicumaryl durch Kochen mit A. Ansäuern mit HNO_3 u. Zugabe von $AgNO_3$; anscheinend entstanden durch Spaltung nur eines der beiden Pyronringe an der nicht substituierten 3-Stellung. — *3,3'-Dibrom-7-methyl-4,3'-dicumaryl*, $C_{19}H_{10}O_4Br_2$, aus Nitrobenzol hexagonale Tafeln, F. 280—282°. — *6'-Methyl-2-brom-3-(3'-cumaryl)-benzofuran-2-carbonsäure*, $C_{19}H_{12}O_5$, aus voriger + sd. alkoh. NaOH; aus Eg. dünne Nadeln, F. 260° (unter Gasdruck). l. in Na_2CO_3 , Lsg. in konz. H_2SO_4 gelb, in der Wärme tiefrot. — *7-Oxy-3'-cumaryl*, $C_{18}H_{10}O_5$, aus Essigsäure Nadeln, bei 300° dunkel werdend, F. 311°. l. in Alkali gelb, nicht fluoreszierend; Acetylderiv. aus Essigsäure wollige Nadeln, F. 253°; Benzoylderiv. Nadeln, F. 234°. — *7-Methoxy-4,3'-dicumaryl*, $C_{19}H_{12}O_4$, 7-Methoxycumarinessigester; prismat. Nadeln, F. 241°. — *7-Oxy-6'-brom-3'-cumaryl*, $C_{18}H_9O_5Br$, aus Eg. Nadeln, F. 308—310° (Zers.). — *7-Acetoxy-6'-brom-3'-cumaryl*, $C_{20}H_{11}O_6Br$, Nadeln, F. 247—248°. — *6-Chlor-3-phenylcumarin*, $C_{15}H_9O_2$, phenylessigsäure Na + 5-Chlorsalicylaldehyd + Acetanhydrid bei 150—160° (5 Std.) in Na_2CO_3 unl. Rückstand aus 50%ig. Essigsäure Nadeln, F. 200°. Der in Na_2CO_3 unl. Anteil war vermutlich *Acetoxyphenylcumarsäure* aus A., F. 190°. — *6-Brom-3-phenylcumarin*, $C_{15}H_8O_2Br$, Nadeln, F. 193°. — *6,8-Dichlor-3-phenylcumarin*, $C_{15}H_7Cl_2O_2$, aus Essigsäure Prismen, F. 195,5°. — *7-Acetoxy-3-phenylcumarin*, $C_{17}H_{13}O_3$, Resorcydaldehyd in Ggw. von Na-Acetat; F. 186°. — *7-Oxy-3-phenylcumarin*, $C_{15}H_{10}O_3$, aus vorigem durch Hydrolyse; aus A. tetragonale Prismen, F. 209°. alkoh. Lsg. fluoresciert purpurn, alkal. Lsg. bläulich. (Quarterly Journ. nat. Chem.-Soc. 1. 107—22. 1924. Madras, Presidency Coll.) HABERLIN




Brian Duncan Shaw, *2,6-Distyrylpyridin und seine Derivate*. Die von LADENBURG (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 36. 118 [1903]) als *Diphenylpyridylcyclopropyl* beschriebene Verb., die dieser Autor aus α -Picolin + C_6H_5CHO erhalten hat, nach den Unterss. des Vf. *2,6-Distyrylpyridin*; bei der Ladenburgschen Synthese ist die Verb. entstanden aus dem das α -Picolin begleitenden 2,6-Lutidin. Durch Bromieren der Verb. nach dem von SCHUSTER (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 2. 22 [1892]) angegebenen Verf. entsteht nicht das Tetrabromid, sondern ein Dibromid.

Versuche. *2,6-Distyrylpyridin*, aus unreinem α -Picolin + $C_6H_5CH=CH_2$ dargestellt; aus dem Chlorhydrat durch h. Pyridin zerlegt weiße Nadeln, F. 215° in benzol. oder alkoh. Lsg. fluoresciert violett; Chlorhydrat aus A. goldgelbe Nadeln, F. 215° (in zugeschmolzenem Röhrchen). — *2,6-Distyrylpyridindibromid*, $C_{21}H_{17}NBr_2$, aus 2 g der vorigen in 20 ccm sd. CS_2 + 1,26 g Br in CS_2 ; aus Bzl.-Chlf. Nadeln, F. 214—215° (leichte Zers.), unl. in A. u. PAe. — *2,6-Distyrylpyridintetrabromid*, durch mehrstdg. Kochen der Base mit Br in CCl_4 ; rhomb. Prismen, F. 179° (Erweichung von HBr), l. in Chlf., unl. in A. — *2,6-Distyrylpyridindichlorid*, $C_{21}H_{17}NCl_2$, in CCl_4 Nadeln, F. 213°, unl. in A. — *2,6-Di-β-phenyläthylpiperidin*, $C_{21}H_{27}N$, aus Base mittels Na + sd. Amylalkohol; ölig, Kp.₂₀ 290—295°; Oxalat, $C_{21}H_{27}N$, (H)

Nadeln, F. 179°; Chlorhydrat, $C_{21}H_{27}N$, HCl, aus A. Nadeln, F. 183°, wl. in Nitrat aus A. Tafeln, F. 167—170° (Zers.), wl. in W. (Journ. Chem. Soc. London 125. 2363—65. 1924. Nottingham, Univ.)

HABERLAND.

William Hobson Mills, William Harold Palmer und Margaret G. Tomlinson, *Pyridofluoren und einige seiner Derivate*. Durch Einw. von konz. H_2SO_4 auf Phenyllutidindicarbonsäure (I) über in 1,3-Dimethylpyridofluoren-4-carbonsäure, aus der durch $KMnO_4$ Pyridofluoren-1,3,4-tricarbonsäure erhalten wird; Red. dieser Säure mit HJ führt zu Pyridofluoren-1,3,4-tricarbonsäure, deren Ca-Salz beim Erhitzen mit Natronkalk in Pyridofluoren (III) übergeht. Abspaltung der $COOH$ -Gruppe aus II gibt 1,3-Dimethylpyridofluoren, das zum entsprechenden Fluoren werden kann. Die Tatsache, daß 9-Acetoxy- u. 9-Aminofluorene in stereoisomeren Formen existieren, sowie der Umstand, daß II (ebenso wie Diphensäure) bei dehydratisierenden Mitteln nicht zur nochmaligen B. eines Fünfringes gebracht werden konnte, deuten darauf hin, daß die Ringe in II nicht in einer Ebene liegen.



Versuche. 4-Phenyllutidindicarbonsäure (I), Darst. nach KIRCHNER (Ber. Chem. Ges. 25. 2786 [1892]) durch Hydrolyse des aus $C_6H_5CHO + Acetoxyster + NH_3$ erhaltenen Diäthylesters (vgl. SCHIFF u. PULITI, Ber. Dtsch. Chem. Ges. 16. 1607 [1883]); aus verd. HCl farblose Krystalle, F. 296° (Zers.). — 1,3-Dimethylpyridofluoren-4-carbonsäure, $C_{15}H_{11}O_3N$ (II), wird bei der Darst. als f., $C_{15}H_{11}O_3N$, $\frac{1}{2}H_2SO_4$, erhalten, das aus 50%ig. Essigsäure mit $3H_2O$ krytallisiert u. tief gelbe Prismen, F. 275—276° bildet; hieraus durch Lösen in NaOH Flöten mit HCl gelbe Krystalle von II, F. 280,5° (Zers.), wl. in W. u. A.; S: wl. in k. W. — Pyridofluoren-1,3,4-tricarbonsäure, $C_{15}H_7O_6N$, aus h. W. (wenig HCl gefällt gelbe Tafeln, F. 203° (Zers.); bei vorsichtigem Erhitzen die Säure danach wieder fest u. schm. bei 255°; wl. in Ä. u. A., ll. in h. W. d. A. — Pyridofluoren-1,3,4-tricarbonsäure, $C_{15}H_9O_6N$, durch 8-std. Erhitzen origin mit HJ (Kp. 126°) auf 130°; aus W. Nadeln, F. 255°. — Pyridofluoren, $C_{14}H_{11}N$ (III), aus PAe. schwach gelbliche Nadeln, F. 74,5°, wenn das Tricalciumsalz mit Natronkalk dest. wird; durch Dest. der freien Säure alleine aus h. W. se Nadeln, F. 78°. — 1,3-Dimethylpyridofluoren, $C_{14}H_{11}ON$, aus PAe. Nadeln, F. 87,5°. — 1,3-Dimethylpyridofluoren, $C_{14}H_{13}N$, aus A. Nadeln, F. 87,5°, wl. in Bzl., d. Ä. — Dest. von Pyridofluorentricarbonsäure im Vakuum gab anscheinend Fluoren, aus PAe. Nadeln, F. 130°. (Journ. Chem. Soc. London 125. 2365—70. 1924. Cambridge, Univ.)

HABERLAND.

Karrer und Ch. Gränacher, *Über Reduktion von Dioxidydhidropyrazinäther*. Red. von o,o-Dibenzyl-2,5-dioxidydhidropyrazin führt unter Abspaltung der H_2 -Gruppen zu Piperazin. 3 g des Äthers in 300 ccm sd. Amylalkohol allmählich mit Na versetzt, bis dieses sich nicht mehr löst; die erkaltete Lsg. in w. W. gel. u. mit HCl angesäuert; nach Durchschütteln wird Amylalkohol abgetrennt, wss. Lsg. einige Male mit Ä. durchgeschüttelt, die wss. saure Lsg. verdampft u. der Rückstand nach Zugabe von wenig W. u. festem KOH dest. Destillat enthält auch eine flüchtige ammoniakal. riechende Base (Äthanolamin?); diese wird mittels HCl Piperazinchlorhydrat als Nadeln, vermischt mit dem


Chlorhydrat der anderen Base (Prismen) erhalten; gereinigt durch wiederholt krystallisieren aus wenig W. + A. — Piperazinpikrat, $C_{16}H_{16}O_{14}N_8$, aus mikrokrySTALLIN., schwefelgelbe Prismen. (Helv. chim. Acta 7. 1062—64. Zürich, Univ.)

HABERL
Frederick Barry Kipping und **William Jackson Pope**, *Die Spaltung d,l-Diphenylpropylendiamin und d,l-1,4-Diphenyl-2-methylpiperazin*. Das von SONZJANZ (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 25. 3271 [1892]) aus Anilin u. Propylen als Öl erhaltene *d,l-Diphenylpropylendiamin*, $C_6H_5NH \cdot CH_2 \cdot CH(CH_3) \cdot NHC_6H_5$, krystallisiert beim Impfen mit der l-Verb. in Nadeln, F. 28—29°. Aus der l-Lsg. + d-Campher- β -sulfonsäure erhält man ein Öl, das beim Verreiben mit Wasser erstarrt: *l-Diphenylpropylendiamin-d-campher- β -sulfonat*, $C_{15}H_{18}N_2 \cdot 2 C_{10}H_{16}O_4S$, Aceton + A. Nadeln, F. 173°, ll. in h. A., wl. in W., Aceton u. Essig. $[\alpha]_{Hg}^{20} = +22,7^\circ$ (0,1990 g in 20 ccm A., $l = 2$). — *l-Diphenylpropylenamin*, $C_{15}H_{18}N_2$, aus vorigem mittels NaOH u. Extrahieren mit Ä., Tafeln, F. 44—50°, in organ. Mitteln, $[\alpha]_{Hg}^{20} = -23,7^\circ$ (0,4581 g in 25 ccm A., $l = 2$), $[\alpha]_{D}^{20} = -17,88^\circ$ (2,8971 g in 25 ccm A., $l = 2$). — Die Rückstände bei der Darst. d. l-Verb. wurden in das l-Campher- β -sulfonat verwandelt, hieraus *d-Diphenylpropylendiamin*, F. 44—45°, $[\alpha]_{Hg}^{20} = +24,4^\circ$ (0,4582 g in 25 ccm A., $l = 2$), $[\alpha]_{D}^{20} = +18,38^\circ$ (2,9137 g in 25 ccm A., $l = 2$). — *d-Diacetyldiphenylpropylenamin*, $C_{19}H_{22}O_2N_2$, aus Acetanhydrid (wie auch l-Diacetylderiv.) F. 101—102°, $[\alpha]_{D}^{20} = +142^\circ$ (0,1578 g in 25 ccm A., $l = 2$). *l-Diacetylderiv.*, $[\alpha]_{Hg}^{20} = -138^\circ$ (0,5 g in 25 ccm A., $l = 2$). — *d- u. l-Dibenzoylderiv.*, $C_{39}H_{26}O_2N_2$, aus A. F. 144°, ll. in A., Chlf., Bzl. u. CS_2 , $[\alpha]_{Hg}^{20} = +221^\circ$ (0,2544 g in 25 ccm A., $l = 2$) u. $[\alpha]_{Hg}^{20} = -218^\circ$ (0,2541 g in 25 ccm A., $l = 2$). — *d,l-erster sulfonyldiphenylpropylendiamin*, $C_{21}H_{22}O_2N_2S$, aus der d,l-Base + $C_6H_5SO_2Cl$ (als das Chlorhydrat, $C_{21}H_{22}O_2N_2S \cdot HCl$, aus A. F. 212—213°, unl. in W.; hieraus nannte Verb., aus A. F. 151—152°. *d- u. l-Benzolsulfonyldiphenylpropylenamin* Chlorhydrate beider Verb. aus A. F. 228°, freie Basen aus A. Nadeln, F. 311—312°; *d-Base* $[\alpha]_{Hg}^{20} = -39,6^\circ$ (0,3225 g in 25 ccm Aceton, $l = 2$); *l-Base* $[\alpha]_{Hg}^{20} = +32,31^\circ$ g in 25 ccm Aceton, $l = 2$). — *d,l-1,4-Diphenyl-2-methylpiperazin*, $C_{17}H_{20}N_2$, Darst. nach TRAPESONZJANZ (l. c.), F. 102—103°. — *d- u. l-1,4-Diphenyl-2-methylpiperazin* wurden analog aus den entsprechenden akt. Diphenylpropylendiaminen dargestellt, F. 96°; *l-Verb.* $[\alpha]_{Hg}^{20} = +24,5^\circ$ (1,0767 in 25 ccm Chlf.), $[\alpha]_{D}^{20} = -25,2^\circ$ (1,0432 g in 25 ccm Chlf.). — *l-1,4-Diphenyl-2-methylpiperazin-d-campher- β -sulfonat*, $C_{37}H_{52}O_8N_2S_2 = C_{17}H_{20}N_2 \cdot 2 C_{10}H_{16}O_4S$, aus der d,l-Base + d-Camphersulfonsäure; aus Aceton + A. F. 175°, $[\alpha]_{Hg}^{20} = +32,9^\circ$ (0,54 g in 23 ccm A., $l = 2$); hieraus durch Hydrolyse mit NH_4OH erhaltene Verbb. dieselbe Rotation wie die synthet. aus l-Diphenylpropylendiamin hergestellt. Verbb. tritt demnach bei dieser letzten Rk. keine Racemisierung ein. (Journ. Chem. Soc. London 125. 2396—99. 1924. Cambridge, Univ.)

HABERL
F. Kehrman und **François Cherpillod**, *Neue Synthesen in der Gruppe der Chinonimidfarbstoffe*. V. Über Synthesen ausgehend von Oxybenzochinon. (I. KEHRMAN, Ber. Dtsch. Chem. Ges. 56. 2398; C. 1924. I. 341.) Kurzes Res. in Helv. chim. Acta vgl. C. 1924. II. 48. Nachzutragen ist: das l. c. beschriebene Azoniumsalz (IV [Formel, wie alle nachgenannten, vgl. C. 1924. II. 48]) geht durch Alkalien in einen unbeständigen Körper über, der, nach Analogiefällen zu schließen, entweder *Methylprasindon* oder ein Hydrat (A) davon ist.

Versuche. β -Oxyphenazin, $C_{12}H_8N_2O$, Darst. aus 3,5 g Oxybenzochinon in 50 ccm Eg. + 3,7 g o-Phenylendiamin; die entstehenden gelben Krystalle (erhalten in NaOH gel. (etwas Fluorindin bleibt ungel.); durch Ansäuern mit Essigsäure stehen dunkelrote, krystallwasserhaltige Krystalle, die bei 110° oder durch

lisieren aus A. in das goldgelbe Azin übergehen; F. 253—254° (Zers.); Lsg. in konz. H_2SO_4 dichroit.: olivgrün in dünner, blutrot in dicker Schicht, auf Zugabe von konz. H_2SO_4 goldgelb werdend; Lsg. in Laugen gelblichrot; *Acetylderiv.*, $\text{C}_{14}\text{H}_{10}\text{N}_2\text{O}_2$, aus Bzl. oder A. hellgelbe Krystalle, F. 152°, unl. in W., l. in Eg. — *Oxymethyl-deriv.*, $\text{C}_{13}\text{H}_{10}\text{N}_2\text{O}$ (B oder C), aus o-Toluylendiaminchlorhydrat in Eg. + Oxychinon in Ggw. von Na-Acetat; Reinigung über das Acetylderiv.; aus A. orangefarbene Krystalle, F. 248°, unl. in W., swl. in Chlf. u. Bzl.; alkoh. Lsg. fluoresciert gelblich; Lsg. in konz. H_2SO_4 rötlich-gelbbraun, durch W. gelb werdend; Lsg. in NaOH gelblich. *Acetylverb.* aus Bzl. hellgelbe Krystalle, F. 207°. — 3-Oxynaphthophenazin, $\text{C}_{13}\text{H}_8\text{N}_2\text{O}$ (I), aus 1,4 g o-Naphthylendiaminchlorhydrat + 0,9 g Na-Acetat + 15 ccm 5 ccm W. + 0,8 g Oxychinon; durch Zugabe von W. erhaltener Nd. wird




aus I extrahiert, hieraus I gefällt durch Ansäuern; aus 2 Teilen A. + 1 Teil orange rote Nadeln, Zers. bei 285—287°, unl. in W., l. in Eg. u. A. mit orangefarbener Farbe u. schwacher Fluorescenz; Lsg. in konz. H_2SO_4 fuchsinrot, durch W. gelb werdend. Bei der Extraktion des Nd. mit NaOH bleibt ein unl. Nebenprodukt unbekannter Konst. zurück; aus Bzl. dunkelrote Krystalle, Lsg. in konz. H_2SO_4 grünlichblau, durch W. Fällung dunkelroter Flocken; äth. Lsg. fluoresciert gelblich. — *Acetylverb. von I*, aus Bzl. hellgelbe Nadelchen, F. 216,5°. 2 g dieser in 20—30 g $\text{C}_6\text{H}_5\text{NO}_2$ werden bei 120° mit geringem Überschuß $(\text{CH}_3)_2\text{SO}_4$ 1 Min. auf 130° erwärmt u. nach 4—5 std. Stehen mit Ä. versetzt; Nd. extrahiert u. mit 25% ige HClO_4 versetzt; nach 12 std. Stehen fällt das Perchlorat des Methylaposafranons (entsprechend D) aus. Die wss. Lsg., die die entsprechende isomere Verb. neben Methylaposafranon enthält, wird mit Na-Acetat versetzt, wodurch *Methylaposafranon*, $\text{C}_{13}\text{H}_{10}\text{N}_2$, frei wird, entfernbare durch Auswaschen mit Chlf., aus h. W. dunkelrote Blättchen, F. 185°, ll. in W., A., Bzl., Chlf. u. verd. Säuren, letztere Lsgg. gelb; Salze: Chlorid orangegelblich; Chloroplatinat, $(\text{C}_{13}\text{H}_{11}\text{ON}_2\text{Cl})_2$, PtCl_4 (D), orangerote Blättchen; Lsg. der Salze u. der Salze in konz. H_2SO_4 in dünner Schicht olivgrün, in dicker Schicht rot; auf Zugabe von W. tritt orangegelbe Farbe der einsäuerigen Salze, nach Erhitzen die gelblich-fuchsinrote des Aposafranons auf. — *Isomeres Chloroplatinat*, $(\text{C}_{13}\text{H}_{11}\text{ON}_2\text{Cl})_2$, PtCl_4 (E), aus der vom Methylaposafranon befreiten Mutterlauge orangerote Krystalle, swl. in W.; Nitrat orangegelb; die diesen Salzen entsprechende freie violettblaue Base konnte nicht in festem Zustande isoliert werden: das Perchlorat in konz. H_2SO_4 grünlichgelb in dünner, purpurrot in dicker Schicht; auf Zusatz von W. entsteht die orangegelbe Farbe der einsäuerigen Salze. — *Methylaposafranon (II)*, aus gleichen Moll. o-Amidodiphenylamin + Oxychinon in Eg. erhitzt; F. 242°; Ausbeute weniger als 1%. — *Phenoxazon (V)*, aus Rubinon + 0,8 g o-Aminophenol in 5 ccm sd. Eg.; nach Erkalten wird Triphenylamin durch W. gefällt, Filtrat mit Ä. ausgeschüttelt, äth. Lsg. mit HCl ge-

waschen, solange noch Violettfrärbung auftritt u. äth. Lsg. nicht mehr fluorescirt. Äth. Lsg. danach mit NaOH geschüttelt (alkal. Lsg. rotbraun) u. dann eingedunstet. Hieraus V als kleine gelbe Kryställchen, Ausbeute weniger als 1 mg. — Einw. 2—3 Mol. Anilin auf Oxychinon in A. gibt, nachdem die Lsg. braun geworden, mit W. u. NaOH versetzt wurde, s. *Dianilinochinon* (VI), braune Krystalle. Ansäuern des Filtrats erhaltenen violetter Nd. wird mit Ä. extrahiert, hieraus Lösen in NaOH u. Fällen mit Essigsäure *Anilinooxychinon* (VIII), aus A. Krystalle. In Ä. unl. olivgrünes Pulver, besteht aus *Anilinooxychinonanilin* (Helv. chim. Acta 7. 973—80. 1924.)

HABERLAND

F. Kehrman und **Eduard Falke**, *Neue Synthesen in der Gruppe der Farbstoffe*. VI. Über einige sich vom Stilbazonium ableitende Farbstoffe der safraninreihe. (V. vgl. vorst. Ref.) Chlor-o-aminodiphenylamin (I) kondensiert mit Benzil unter B. des chlorierten Phenylstilbazoniums (II), in dem Cl beseitigt u. leicht durch Aminreste austauschbar ist. Mit Anilin u. Dimethylamin u. so Verbb. III u. IV erhalten. Bzgl. des Farbtons u. der Farbstärke zeige die Verbb. große Ähnlichkeit mit Aposafranin; sie lassen sich jedoch wie die amidierten Stilbazoniumsalze (vgl. KEHRMANN u. MESSINGER, Ber. Dtsch. Chem. Ges. 24. 1239 [1891]) leicht in hellgelbe Pseudobasen überführen.




Versuche. 3-Chlorphenylstilbazonium (II), Darst. aus gleichen Moll. Th. hydrat von I + Benzil in A. [Wasserbad], grünlichgelbe Nadeln, wl. in W.; Chlorat, $C_{26}H_{18}O_4N_2Cl_2$, citronengelbe Nadeln; Lsg. in konz. H_2SO_4 weinrot (zu saürliches Salz), durch W. citronengelb werdend. Zugabe von Lauge zu Ig. Salze fällt die Pseudobase, $C_{26}H_{19}ON_2Cl$ (V), aus; aus A. hellgelbliche Kryst. unl. in W., Lsgg. in A., Ä. oder Bzl. hellgelb. — Verb. $C_{32}H_{24}N_3Cl$ (III), aus durch Kochen mit Anilin u. Zugabe von HCl; aus A. braunviolette, rissig glänzende Nadeln, unl. in W., Lsg. in A. u. Eg. rotviolett, in konz. H_2SO_4 unrot, durch W. blaugrün, dann rotviolett werdend. Alkoh. Lsg. wird durch W. NaOH dunkelblau, dann schnell hellgelb, hieraus durch W. Pseudobase, $C_{32}H_{25}ON_3$ (V), gelbe Nadeln, unl. in W., l. in organ. Mitteln mit gelber Farbe u. hegrü Fluorescenz. Auf Zusatz von Lauge verschwindet die Fluorescenz (B. eines Salzes der Base?), auf Zusatz von Mineralsäure tritt die violette Farbe der Säres auf. — Einw. von Dimethylamin (33%ig) in A. auf II bei 150° im Rol (6 12 Stdn.), auskochen des nach Verdunsten des A. erhaltenen Rückstandes mit (Lsg. fuchsinrot) u. Zugabe von $HClO_4$ führt zum Perchlorat von IV, $C_{28}H_{21}Cl$ rotviolett Pulver, swl. in sd. W. mit rotvioletter Farbe; aus A. oder Eg. unl. rote Nadeln; Lsgg. schmecken bitter, chininähnlich; Lsg. in konz. H_2SO_4 kirschrot, durch wenig W. grün, durch viel W. violettrot werdend; alkoh. Lsg. Zusatz von Lauge sofort gelb, Lsg. fluoresciert grün; diese Lsg. enthält wahrscheinlich die Pseudobase. (Helv. chim. Acta 7. 981—84. 1924.)

HABERLAND

F. Kehrman und **Pierre Prunier**, *Neue Synthesen in der Gruppe der Farbstoffe*. VII. Über 1-Aminophenazin. (VI. vgl. vorst. Ref.) Das von IET


MOLL (Ber. Dtsch. Chem. Ges. **26**. 2184 [1893]) beschriebene *Diiminobrenzcatechin* reagiert mit o-Diaminen in der Form **I**. Mit o-Phenylendiamin entsteht *1,3-Diaminophenazin* (**II**); das Monochlorhydrat dieser Base liefert mit Acetanhydrid aus der 1NH_2 -Gruppe *acetylierte Deriv.* (**IV**). Die B. dieser Verb. ist so zu ersehen, daß das einsäurige Salz der p-chinoiden Formel **III** entspricht, wodurch eine NH_2 -Gruppe reaktionsfähig bleibt. Das Acetylderiv. in konz. H_2SO_4 mit Eis behandelt, reagiert als o-chinoides Salz (**IV**) u. ist diazotierbar. — Kondensation von **I** mit o-Aminodiphenylaminchlorhydrat führt zu dem schon früher von KRAMM u. KRAMER (Ber. Dtsch. Chem. Ges. **33**. 3074 [1900]) auf anderem Wege erhaltenen *Isophenosafranin* (**V**).



Versuche. Nitrierung von Diacetylbrencatechin nach den Angaben von KRAMM u. MOLL (l. c.) führt nicht, wie diese Autoren annahmen, zum Diacetylbrenzcatechin, sondern nur zu *Dinitromonoacetylbrenzcatechin*, $\text{C}_8\text{H}_6\text{N}_2\text{O}_7$, aus W. hellgelbe Blättchen, F. 120° , Alkalisalze goldgelb. — *Dinitrodiacetylbrenzcatechin*, $\text{C}_{10}\text{H}_8\text{O}_8\text{N}_2$, aus W. hellgelbe Blättchen, F. $112-114^\circ$, unl. in W., mit sd. W. Verseifung zu vorigem. — *Diamino-o-chinon* (**I**), 6 g Sulfat des 5-Diaminobrenzcatechins in 100 cem W. werden auf 1 l verd. u. unter gutem Umrühren tropfenweise mit NH_4OH versetzt; mit Schütteln u. NH_4OH -Zugabe wird die Färbung tiefer, wenn keine Violettfärbung u. Krystallabscheidung mehr stattfindet; gelbbraune, fast schwarze Nadeln. — *Isophenosafranin* (**V**), Darst. aus den Komponenten in Eg. bei $30-40^\circ$; Isolierung als Perchlorat. — *1,3-Diaminophenazin*, $\text{C}_{12}\text{H}_8\text{N}_4$ (**II**), Fällung der Reaktionslg. mit NH_4OH , Nd. mit Bzl. extrahiert; hieraus erhält man rote Blättchen, F. 225° unter teilweiser Zers.; wl. in k. W., l. in sd. W. mit violetter Farbe, l. in A.; Lsg. in Eg. dunkelolivgrün (einsäuriges Acetat), in verd. Schicht bei durchfallendem Licht grün, in dickerer Schicht purpurfarben; in konz. H_2SO_4 gelbbraun (dreisäuriges Salz), durch W. anfangs fuchsinrot (einsäuriges Salz), dann grün (einsäuriges Salz); Perchlorat aus sd. wenig HClO_4 -haltigem W. dunkelgrüne Prismen. — *1-Acetamino-4-aminophenazin* (entsprechend **IV**), aus dem Monoperchlorat von **II** suspendiert in 5 Teilen Acetanhydrid extrahiert, das *Monoperchlorat des Acetaminoaminophenazins*, $\text{C}_{14}\text{H}_{13}\text{O}_5\text{N}_4\text{Cl}$ (**IV**, Ac = CH_3CO), rothraunes Pulver; wss. Lsg. + NH_4OH orangerote Färbung, hieraus ebenfalls rote Krystalle der freien Base, die mit konz. H_2SO_4 grünlichgelbe, durch W. fuchsinrot werdende Lsg. gibt. — *1-Acetaminophenazin*, $\text{C}_{14}\text{H}_{11}\text{ON}_3$, aus dem acetylierten Perchlorat in konz. H_2SO_4 + NaNO_2 ; nach 1-std. Stehen auf Eis wird in verd. f. Vol. gekühlten A. gegossen, nach einer weiteren Stde. auf Eis; erhaltene gelbliche Lsg. wird mit Na_2CO_3 fast neutralisiert u. mit PAe. ausgeschüttelt; hieraus erhält man Nadeln, unl. in W., ll. in PAe., A., Ä., Bzl. mit gelber Farbe; Lsg. in konz. H_2SO_4 gelblich-blutrot, durch Zugabe von Eis goldgelb, durch W. kirschrot werdend. — *Aminophenazin*, $\text{C}_{12}\text{H}_9\text{N}_3$, aus vorigem mittels w. konz. H_2SO_4 ; aus A. schwarz-blasse Blättchen, F. 172° , unl. in W., ll. in Ä. u. A. mit dunkelroter Farbe; alkoh. Lsg. + viel Eg. dunkelblau (einsäuriges Acetat); Lsg. in konz. H_2SO_4 citronengelb,

durch W. grün u. schließlich blau werdend; beim Alkalisieren tritt die rote der Base auf. (Helv. chim. Acta 7. 984—91. 1924. Lausanne, Univ.) HABER.


Prafulla Kumar Bose, Thiodiazine. I. Kondensation von Thiosemicarbaziden mit ω -Bromacetophenon. In äquimolekularen Mengen geben beide Verb. i. A. das Hydrobromid des 2-Amino-5-phenyl-1,3,4-thiodiazins (III). Wird die Mtlauge mit Aceton versetzt, so fällt das Hydrobromid des 2-Keto-4-phenyl-2,3-dihydro-1,3-thiazol-4-propylenhydrazons (V) aus. Diese Verb. entsteht auch, wenn das ω -Bromacetophenon + 1-Acetylthiosemicarbid erhaltene Acetylderiv. verseift Base mit Aceton zur Rk. gebracht wird, sowie ferner aus Acetonthiosemicarbazid + ω -Bromacetophenon. Den Mechanismus der B. der beiden Basen III erklärt Vf. so, daß sich zunächst aus Thiosemicarbazid + ω -Bromacetophenon d. Additionsprod. I bildet, das durch Abspaltung von HBr in S-Phenacylthiosemicarbazid (II) übergeht; durch Abspaltung von H₂O entstehen hieraus III + IV. Die Menge, in der beide gebildet werden, hängt von dem bas. Charakter der beiden NH₂-Gruppen des Thiosemicarbazids ab; da die 1NH₂-Gruppe basischer als die 4NH₂-Gruppe, wird III vorzugsweise gebildet (Verhältnis III:IV = 1:1). Durch Verminderung der Basizität müßte demnach mehr IV entstehen; eine Fällung, die durch B. des Acetylderiv. von IV aus 1-Acetylthiosemicarbazid erfüllt wird.



Versuche. 2-Keto-4-phenyl-2,3-dihydro-1,3-thiazol-4-propylenhydrazon (V), aus CH₃OH hexagonale Tafeln, F. 123°, an Luft bald rötlich werdend; Hydrobromid Tafeln, F. 225—226°. — 2-Amino-5-phenyl-1,3,4-thiodiazin (III), aus salzsaurer Lsg. mit Na₂CO₃ gefällt F. 125—126°, wird an Luft infolge Oxydation allmählich braun, ll. in organ. Mitteln; Hydrobromid, C₉H₁₀N₃SBz aus A. durch Zusatz von Ä. weiße Nadeln, F. 197°. Chlorhydrat, C₉H₁₀N₃SCl aus A. + Ä. rechteckige Tafeln, F. 205° (Zers.); Pikrat aus A. oder Aceton gelbe Tafeln, F. 215° (Zers.); Chloraurat, C₉H₁₀N₃SCl₂Au, aus h. W. goldgelbe Nadeln, F. 166—167° (Zers.); Acetylverb., C₁₁H₁₁ON₃S, aus Eg. Nadeln, F. 172—173°; Benzoylderiv., C₁₆H₁₅ON₃S, aus Pyridin Nadeln, F. 170°; beide letzteren sind l. in wässr. Alkali, hieraus amorph durch Säuren fällbar. — Jodhydrat des 2-Methylamino-5-phenyl-1,3,4-thiodiazins (?), C₁₀H₁₂N₃SJ, aus III durch Kochen mit CH₃J; aus Ä. prismat. Nadeln, F. 223° (Zers.). Hydrojodid des Äthylderiv., rechteckige Tafeln, F. 234° (Zers.); beide sind l. in h. W. u. geben mit Alkalien oder Na₂CO₃ farblos nicht krystallisierendes Öl. — 2-Phenylthiocarbamid des 5-Phenyl-1,3,4-thiodiazins, C₁₆H₁₄N₄S₂, aus 1 Mol III + 1 Mol C₆H₅NCS; aus Pyridin gelbe Tafeln, F. 151 bis 180°. — K-Salz des 2-Phenylsulfonylamino-5-phenyl-1,3,4-thiodiazins, C₁₅H₁₃O₃S₂, aus voriger + 2 Mol alkoh. KOH + 1 Mol C₆H₅SO₂Cl; aus A. Nadeln, ll. in wässr. Alkali, hieraus das freie Sulfonamid konnte, da es sehr hygroskop. war, nicht gewonnen werden. — Verb. C₁₀H₉N₃S₃ (III); statt NH₂: NHCSSH, aus 1 Mol III, 1 Mol alkoh. KOH + Überschuß von CS₂ (Wasserbad); aus A. gelbe Nadeln, F. 181—182° (Zers.). — Monomethylderiv., C₁₁H₁₁N₃S₃, aus Pyridin gelbe hexagonale Tafeln, F. 151. — 2-Keto-4-phenyl-2,3-dihydro-1,3-thiazolacetylhydrazon, C₁₁H₁₁ON₃S, aus h. A. rötliche Nadeln, F. 196—197°; l. in Alkali, Lsg. wird an Luft grünlich-blau, beim Anue

h; die Färbung verschwindet nach einigen Stdn. Hieraus durch Verseifen
to-4-phenyl-2,3-dihydro-1,3-thiazolhydrazon, $C_9H_9N_3S$ (IV), aus A. Nadeln, F. 167
68°, starke Base, an Luft braun werdend. — 2-Keto-4-phenyldihydro-1,3-thiazol-
hydrazon, $C_{17}H_{15}N_3S$, aus IV + Anisaldehyd; aus A. rötlich-weiße Nadeln,
F. 25° (Zers.). (Quaterly Journ. Indian Chem.-Soc. 1. 51—62. 1924. Calcutta,
HABERLAND.)

Max Polonovski und Michel Polonovski, Untersuchung über die Alkaloide
Calabarbohne. (XIII.) Tautomere Formen des Eserins; Nitroso- und Benzoyl-
ate. (XII. vgl. Bull. Soc. Chim. de France [4] 33. 1126; C. 1924. I. 780.)
Reff. nach C. r. d. l'Acad. des sciences vgl. C. 1924. II. 2269, speziell C.
II. 1593. Nachzutragen ist, daß Vff. die Entstehung von Eserinol (II) u.
in (IV) von der hypothet. Verb. Eserinal (I) nach folgendem Schema herleiten:



Eserinhydrat. H — OH
Soc. Chim. de France [4] 35. 1492—1522. 1924.)

HABERLAND.

André Job, René Reich und Paul Vergnaud, Über die Existenz von Arsen-
sauerstoffsverbindungen und einige ihrer Reaktionen. Kurzes Ref. nach C. r. d.
Acad. des sciences vgl. C. 1924. I. 1359. Nachzutragen ist: Diphenylarsin u.
MgBr reagieren analog wie Monophenylarsin: unter Entw. von C_2H_6 entsteht
 $(C_6H_5)_2AsMgBr$ als kristallin. Nd. Aus C_2H_5ZnJ u. $C_6H_5AsH_2$ entsteht Verb.
 $As(ZnJ)_2$ neben C_2H_6 . — Äthylester der Phenylarsindicarbonsäure, C_6H_5As-
 $(C_2H_5)_2$, (vgl. l. c.) wird bei -60° noch nicht fest, Kp_{15} 146° , D_{25}^{25} 1,312,
 n_D^{20} 1,5442, mischbar mit organ. Mitteln, unl. in W.; durch k. W. keine Hydro-
lyse; durch J, $KMnO_4$ oder H_2O_2 sofortige Zers.; Verseifung mit alkoh. KOH führt
zu Phenylarsin, nebenbei entsteht eine geringe Menge Phenylarsinoxyd u. $HCO_2C_2H_5$.
Analog aus $(C_6H_5)_2AsMgBr$ + Chlorameisensäureester dargestellte Ester hat
F. 160° . — Phenylarsinodiacetyl, $C_6H_5As(COCH_3)_2$, entsteht aus $C_6H_5AsMgBr$ +
 CH_3COCl ; gelbes durchdringend riechendes Öl Kp_{10} $128-128,5^\circ$; oxydiert sich
an Luft unter Wärmeentw. u. B. stechender Dämpfe; in äth. Lsg. allmäh-
liche Oxydation zu Phenylarsinoxyd; mit CH_3J entsteht Trimethylphenylarsonium-
jodid u. CH_3COJ . Mit C_6H_5COCl reagiert $C_6H_5AsMgBr$ analog, das Reaktionsprod.
sehr oxydabel u. wurde daher nicht näher untersucht. — Bei Einw. von
 CO in Toluol auf $C_6H_5AsMgBr$ entsteht unter CO -Entw. Arsenobenzol, aus
 $(C_6H_5)_2AsMgBr$ bildet sich bei der analogen Rk. Phenylkakodyl. Arsenobenzol u.
Phenylkakodyl bilden sich auch bei Einw. von $C_2H_4Br_2$ auf $C_6H_5As(MgBr)_2$. — Phenyl-
arsin (I), Darst.: 13,5 g β, β' -Dichloräthylsulfid in Bzl. werden allmählich zu-
gegeben zu äth. Lsg. von $C_6H_5As(MgBr)_2$ (aus 14,7 g $C_6H_5AsH_2$) u. 1 Stde. beim

$C_6H_5As \begin{matrix} \text{CH}_2-\text{CH}_2 \\ \text{CH}_2-\text{CH}_2 \end{matrix} S$
Kp. gehalten; Zers. des Reaktionsprod. durch
angesäuertes Eiswasser; die gleichzeitig aus-
fallende harzige M. (As-haltige Polymerisations-
produkt) wird in Pyridin gel. u. mit Ä. versetzt; äth. Lsg. mit voriger vereinigt u.

mit angesäuertem W. ausgeschüttelt; nach Verdampfen des Ä. wird in P.Ae. hieraus erhaltene M. dest.; aus h. A. Blättchen, F. 38°, Kp. 134°; bildet mit I ein krystallin. Additionsverb., wl. in Aceton, aus Eg. Krystalle, F. 181° (Zers.). HgJ₂ werden schwach gelbliche Krystalle erhalten, l. in Aceton, w. Bzl. u. Essigsäure, F. 153° (Zers.). — *Phenylthiarsanmethylsulfoniumjodid*, aus I + CH₃J; h. W., F. 226°, bildet mit HgJ₂ hellgelbe Krystalle, F. 147°; mit AgNO₃ unter Abscheidung von AgJ das Sulfoniumnitrat, ll. in W., hieraus farblose Krystalle. (Bull. Soc. Chim. de France [4] 35. 1404—12. 1924. Conservatoire national des Arts et Métiers.)

HABERLAND.

Wo. Pauli, *Untersuchungen an elektrolytfreien, wasserlöslichen Proteinkörpern*. I. Mitt. *Die Elektrodialyse*. Das Verf. beruht darauf, daß in der Regel eine Dialyse vorgereinigtes Material verwandt wird, namentlich dort, wo es geht, ein elektrolyt. Prodd. empfindlich ist. Die angewandten Ströme überschreiten allgemein nicht eine Dichte von 0,8 bis 0,3 MA pro qcm Membranfläche. Unter diesen Verhältnissen ist es ohne weiteres möglich, zwei Pergamentpapier- oder Kollodiummembranen zur Abgrenzung des Kolloids zu gebrauchen. Die Elektrodialyse führt auf diesem Wege, meist in 48 Stdn. zum Ziel u. anschließend bei 440 Volt direkter Spannung ausgeführt werden. (Biochem. Ztschr. 152. 355—59. 1924. Wien, Univ.)

WOLFF.

M. Adolf und Wo. Pauli, *Untersuchungen an elektrolytfreien, wasserlöslichen Proteinkörpern*. II. Mitt. *Beziehungen zu Kohlensäure*. 1. Zum erstenmal wird beobachtet, daß sich die in W. l. Eiweißkörper des Serums u. Eiklars sowie das Glutin durch Elektrodialyse auf einen schließlich konstanten, niedrigsten Wert der Leitfähigkeit bringen lassen, der bei einer gewissen Verdünnung des Ovalbumins gänzlich den vorhandenen H-Ionen u. den zugehörigen negativen Eiweißkationen entspricht. An der Luft wächst die Leitfähigkeit des Elektrodialyse-eiweißes u. es noch mehr bei Durchleiten von CO₂ an, ohne daß die H-Dissoziation eine Veränderung erfährt. In Übereinstimmung damit bleibt dabei die anod. Wanderung des Albumins u. wohl auch sein isoelektr. Punkt im Acetatpuffergemisch unverändert. Die CO₂-Wrkg. auf diese Eiweißstoffe ist durch Elektrodialyse vollständig reversibel. Diese Eiweißkörper unterscheiden sich vom Verh. reine Eiweiß gegen CO₂ stark. Die Tatsache der unter der Einw. der CO₂ der Luft u. nach Sättigung im CO₂-Strom ungeänderten [H⁺] u. elektr. Eiweißwanderung zusammen mit der Höhe des auf diese Einw. zurückzuführenden Leitfähigkeitsanstiegs zwingt uns anscheinend zu der Annahme, daß hierbei eine gleichzeitige positiver u. negativer Eiweißionen durch Rk. mit den Ionen H⁺ u. HCO₃⁻ gebildet werden. Diese Zahl beträgt ein Vielfaches der unter H-Ionisation wandernden Eiweißmoleküle. (Biochem. Ztschr. 152. 360—72. 1924. Wien, Univ.)

E. Biochemie.

W. Vernadsky, *Über die Darstellung der chemischen Zusammensetzung der lebenden Substanz*. Man soll die Zus. in Gewichts-% der chem. Elemente oder % der Atome angeben. Die Bedeutung der einzelnen Elemente tritt dabei in verschiedenem Grade zutage. (C. r. d. l'Acad. des sciences 179. 1215—17. 1924 S.)

Ernst Wertheimer, *Weitere Untersuchungen an der lebenden Froschhautmembran*. VII. Mitteilung (vgl. auch PFLÜGERS Arch. d. Physiol. 201. 591; C. 92. I. 1207.) Weitere Befunde sprechen für die Bedeutung der an. Osmose bei der lebenden Membran. Untersucht wird die Wasserbewegung, die eintritt, wenn ein Kation in der Membran 1-, 2- oder 3-wertiges Kation u. außen 1- bzw. mehrwertiges Anion sich befindet. Dabei gilt die Regel, daß das W. sich trotz gleichem osmot. Druck der Innen- u. Außenfl. vom mehrwertigen Anion zum mehrwertigen Kation

regt. Dagegen geht die Wasserbewegung von dem mehrwertigen Kation zum wertigen Anion. Dieser Satz gilt voll nur für lebende Membran. Nicht allein Wertigkeit der Anionen u. Kationen ist für die anomale Osmose maßgebend; bestehen unter den einwertigen Anionen u. Kationen deutliche Unterschiede, die sich in folgenden Reihen ausdrücken lassen, wenn wir z. B. die Wasserbewegung nach Citrat verfolgen: $\text{Na} > \text{K} > \text{NH}_4 > \text{Li}$ u. $\text{Cl} > \text{NO}_3 > \text{Acetat}$, wobei Na u. Cl die größte Wasserbewegung nach Citrat zeigen. In der Durchdringungsgeschwindigkeit der Chloride durch die Froschhautmembran ordnen sich Salze nach folgender Kationenreihe: $\text{Mg} < \text{Ca} < \text{Na} < \text{Rb} < \text{Cs}$, $\text{NH}_4 < \text{Li}$; gleiche Reihe gilt auch, wenn wir die Permeabilität von Na_2SO_4 u. Na_2HPO_4 achten u. als Außenfl. die Chloride mit verschiedenen Kationen benutzen. Die Anionenreihe wechselt mit verschiedenem Kation der Innenfl.: Bei NaCl als Innenfl. lautet die Reihe $\text{NO}_3 < \text{Acetat} < \text{Sulfat} < \text{Citrat}$. Bei Verwendung von K. ist der Unterschied in $\text{NO}_3 < \text{Citrat}$ schon kleiner geworden; nehmen wir Li, so ist $\text{NO}_3 = \text{Citrat}$; kommt endlich ein zweiwertiges Kation in die Innenfl., dreht sich die Anionenreihe um u. es besteht die Wirkungsreihe: $\text{NO}_3 > \text{Acetat} > \text{Sulfat} > \text{Phosphat} > \text{Citrat}$. (PFLÜGERS Arch. d. Physiol. **206**. 162 u. 171. 1924. Halle, Univ.)


WOLFF.

Michael Bálint, *Ein Beweis für die Konstanz der $[H^+]$ der lebenden Bakterien*. Bei Staphylokokken herrscht selbst nach fünfwöchigem Verweilen in einem Medium von $p_H = \text{etwa } 3,5$ im Innern der Zelle noch immer die n. $[H^+]$ zwischen 7 (Lackmus rein blau) u. 8,0 (Rosolsäure noch orange). (Biochem. Ztschr. **152**. 9-93. 1924. Berlin, Univ.)

WOLFF.

E₁. Enzymchemie.

Hans v. Euler, *Affinitätsprobleme*. Auf Grund früherer Arbeiten (KUHN, Ztschr. f. physiol. Ch. **129**. 57; C. **1923**. III. 1173; JOSEPHSON, Ztschr. f. physiol. Ch. **136**. 62; C. **1924**. II. 478) sucht Vf. ein Bild der Affinitätsgrößen zwischen Enzym u. Substrat zu geben. Er betont nochmals (vgl. KUHN, Naturwissenschaften **1732**; C. **1923**. III. 1416, u. EULER u. JOSEPHSON, Ztschr. f. physiol. Ch. **133**. 2; C. **1924**. I. 2152), daß die Bindung des Enzyms nicht an der Stelle des Substrats stattfindet, an der die Spaltung erfolgt. — Für Saccharose erscheinen die erhaltenen Tatsachen zu ergeben, daß die Bindung an zwei Stellen des Saccharose-Residues erfolgt, von denen eine im Fructose- u. die andere im Glucoserest sich befindet. Man muß also auch zwei Affinitätskonstanten messen können, deren Produkt Konstante K_M von MICHAELIS ergibt. — Als Analogiefall wird die durch die Gleichgewichtskonz. der Reaktionsteilnehmer gemessene Affinität zwischen 2 Mol. Milchsäure betrachtet, für die drei Gleichgewichtszustände bestehen:



In verd. Lsg. gelten die Gleichungen: 1. $\text{Lactid} = K \cdot [\text{Milchsäure}] \cdot [\text{Milchsäure}]$; 2. $\text{Lactylsäure} = K^1 \cdot [\text{Milchsäure}] \cdot [\text{Milchsäure}]$; 3. $\text{Lactid} = K^2 \cdot [\text{Lactylsäure}]$, so daß für eine gegebene Milchsäurekonz. gilt: $K = K^1 \cdot K^2$. Bei den zu Lactylsäure bezw. Lactid in Analogie gesetzten Verbb. Rohrzucker u. Enzym:

Rohrzucker

Rohrzucker

I	1	
---	---	--


II	1		2
----	---	--	---

Saccharose

Saccharose

und die Konstante K_M ebenfalls in die Konstanten K_M^1 u. K_M^2 aufzulösen sein

(wobei mit 1 die Affinität zur Fructose, mit 2 die zur Glucose bezeichnet wird). Unter der Annahme daß die Affinitäten zu den Zuckerresten gleich denen zu den freien Zuckern sind u. daß sie sich gegenseitig nicht beeinflussen, berechnet man $K_M^1 \times K_M^2 = 9 \times 6,4 = 57,6$, während $K_M = 54$ ermittelt wurde (die Zahlen sind von JOSEPHSON, K_M^2 bezieht sich auf α -Glucose); dieser Übereinstimmung der Zahlen wird vor Ausführung neuer Verss. kein größerer Wert beizulegen. — Die Befunde von KUHN bzw. JOSEPHSON über die mit Saccharase ident. „Raffinase“, daß sich die Affinität Raffinose-„Raffinase“ zur Affinität Saccharose-Saccharase wie 17:1 verhält, wird durch folgende Figuren versinnbildlicht, die zeigen, daß die an der Spaltung unbeteiligte Seitengruppe die Affinität beeinflußt:



Hieraus würde sich K_M^2 für Melibiose zu 0,33 berechnen, was in der Größenordnung mit Messungen von JOSEPHSON übereinstimmt. — Die Wrkg. eines Katalysators erklärt Vf. dadurch, daß dieser an einer der Affinitätsstellen zwischen Enzym u. Substrat das Bindeglied bildet. Bei der Gärung wird gleichzeitig Phosphatase u. ein Gärungsenzym gebunden. Die Anwendung der Hardenschen Gärgleichung ergibt dann, daß ein Mol. Glucose in einen Teil höheren u. einen Teil niedrigeren Energiegehaltes zerfällt, womit die Ausnützung der Gärenergie fundiert synthet. Rkk. erklärbar ist. — Zum Schluß bringt Vf. noch experimentell zu prüfende Folgerungen. (Arkiv för Kemi, Min. och Geol. 9. Nr. 13. 1—7. 1924. Stockholm. Hochsch.)

A. R. F. HESS

Hans Pringsheim und Alexander Genin, Über die fermentative Spaltung von Salepmannans. VI. Mitteilung über Hemicellulosen. (V. vgl. PRINGSHEIM u. KUSENBERG, Ztschr. f. physiol. Ch. 137. 265; C. 1924. II. 1210.) In den Malzauszügen findet sich ein Ferment, das Mannan aus den Knollen von *Tubera Salep* quantitativ in Mannose zerlegt. Diese Mannosidase besteht ähnlich wie die Lichenase aus 2 Teilfermenten, von denen das eine das Polysaccharid bis zur Mannobiose zerlegt, während das andere ähnlich wie die Cellobiase, deren Aktivitätsoptimum bei $pH = 4,9$ bis 5,0 festgestellt wurde, durch mehrmonatiges Altern zerstört wird. Die Mannobiose ist wahrscheinlich ident. mit der Cellobiase. Das Mannobiosephenylhydrazon ist wasserlöslich u. läßt sich mit Benzaldehyd in die krystallisierte Mannobiose zurückverwandeln, welche möglicherweise ident. ist mit der von BOURQUELOT u. HERISSEY (Journ. Pharm. et Chim. 21. (7), 81; C. 1920. I. 701) synthetisierten Biose. Bei der Mannobiose handelt es sich wahrscheinlich um eine β -Mannosidomannose. — Zur Destillation des Salepmannans werden 100 g Knollen bei Zimmertemp. mehrere Tage mit 500 ccm W. stehen gelassen, die Lsg. auf 3 l konz. u. 1 l A. zugesetzt. Der abgeschiedene Niederschlag wurde mit A. u. A. + Ä. entwässert. Das Mannan ist in wasser suspendiert, opt. inaktiv. Nach der Hydrolyse mit HCl wurde Mannose vom $[\alpha]_D^{23} = +1,6^\circ$ isoliert. — Mannobiosephenylhydrazon, $C_{18}H_{28}O_{10}N_2$. B. durch Zugabe von CH_3COCl zu der konz. Lsg. der durch partielle Hydrolyse von Mannan mit dem Malzauszug erhaltenen Mannobiose. Krystalle aus W. + Pyridin. F. 99° (unkorr.). Nach Zerlegung des Phenylhydrazons mit C_6H_5CHO kryst. aus der konz. wss. Lsg. die Mannobiose, sternenförmige Prismen $[\alpha]_D^{23} = +12,8^\circ$. (Ztschr. f. physiol. Ch. 140. 299—304. 1924. Berlin, Univ.)

GUGGENHEIM

J. Temminck Groll, Einfluß der Wasserstoffionenkonzentration auf die Wirkung einiger Amylasen. (Archives néerland. d. Physiol. de l'homme et des animaux 9. 520—38. 1924. — C. 1924. II. 1595.)

WOLFF

E₂. Pflanzenchemie.

Marc Bridel, Über das Vorhandensein sehr großer Mengen von freier Maltose in den frischen Knollen von *Umbilicus pendulinus* D. C. Nachdem durch die biochem. Methode das V. von Maltose in den Knollen nachgewiesen war, konnten davon 4% in kristallisiertem Zustande isoliert werden. (C. r. d. l'Acad. des sciences 1924. 1190—92. 1924.) SPIEGEL.

H. Colin, Bildung, Verteilung und Umlauf des Inulins im Stengel von *Topinambur*. Aus seinen Unterss. zieht V. folgende Schlüsse: Inulin wandert mehr in die inneren Teile des Stengels als durch die äußeren. So erklärt es sich, daß die Schälung an irgendeinem Teile des Stengels ohne wesentliche Wrkg. auf den Gehalt der Knollen bleibt. Der Bast ist nicht der einzige Ort, an dem sich Inulin durch Kondensation von Hexosen bildet. Die durch den Blattstiel gelieferten Zucker, Gemenge von Saccharose, Dextrose u. Lävulose, dringen durch die Rinde in den Zentralzylinder ein, sowohl in das Mark wie in die Holzzellen. Von diesem Zucker wird nicht sofort verbraucht, wandert von oben nach unten u. wird im Laufe dieser Wanderung zu Inulin kondensiert, so daß dieses sich nach unten zu Inulin vermehrt, während die Zucker verschwinden. (C. r. d. l'Acad. des sciences 1924. 1186—88. 1924.) SPIEGEL.

A. Contardi, Phosphorderivate des Inosits aus *Hevea brasiliensis*. Durch Erhitzen mit verd. HCl oder H₂SO₄ verändert *Quebrachit* seine chem. Eigenschaften nicht, nur seine opt. Aktivität, die nicht durch ein a. C-Atom, sondern durch die Verteilung der Hydroxyle u. Methoxyle im Raum verursacht ist. Die Verteilung dieser Gruppen ist anscheinend ziemlich stabil u. kann nicht ohne Zerstörung des Moleküls verändert werden. Durch Behandlung mit W. unter Druck u. hoher Temp. erfolgt teilweise Entmethylierung zum *l-Inosit*. Oxydation des *Quebrachits* mit konz. HNO₃ führte zur Leuconsäure (wie Inosit). Veresterung mit H₃PO₄ führte zur *Quebrachitpentaphosphorsäure*, die auch aus dem Pentaacetat durch Ersatz der Acetylgruppen durch Phosphorsäurereste erhalten wurde.

Versuchsteil: Verwandt wurde Latex von *Hevea brasiliensis*. Der daraus gewonnene u. aus W. umkristallisierte *Quebrachit* hatte F. 191°, $[\alpha] = -80^\circ$. — Oxidation mit konz. HNO₃ ergab *Leuconsäure*, Zers. bei 160°, ll. in W. (vgl. Gazz. chim. ital. 51. 109; C. 1921. III. 629). Pentoxim, gelb, wl. in W., verpufft bei 70°. — *Pentaacetylverb.*, farblose Nadeln aus verd. Essigsäure, F. 91°, zl. in Chlf., in A.; $[\alpha] = -16,78^\circ$ (in Chlf.). — *Quebrachitpentaphosphorsäure*, $[\alpha] = -23,28^\circ$. — Salz, C₇H₉O₂₁P₅Ba₅ + 5H₂O. — *l-Inosithexaphosphorsäure*, aus *l-Inosit* (F. 238°) mit H₃PO₄, $\alpha = -5,20^\circ$ (im 2 dm-Rohr bei 13°). Ba-Salz, C₆H₆(PO₄)₆Ba₆ + 3H₂O. (Atti Chim. Appl. 14. 281—89. 1924. Mailand, Scuola Sup. d. Agricolt.) ZANDER.

Valentino Morani, Das Vorkommen von *A'-Menthenon-3* im ätherischen Öl der *anischen Mentha pulegium*. In dem aus Sizilien stammenden äther. Öl von *Mentha pulegium* var. *hirsuta* Guß ist *Pulegon* nicht enthalten; das wichtigste darin vorkommende Keton ist das *A'-Menthenon-3*, das l-, sowie das rac. Isomere. Eine im Jahre 1923 stammende Probe wurde sowohl mit Na-Bisulfit als auch mit Bisulfit extrahiert. Im ersten Falle wurde ein fast inakt. Keton C₁₀H₁₆O erhalten, das sich als *A'-Menthenon-3* erwies. Mit Hydroxylamin gab dieses ein Oxim u. ein Oxyaminooxime, α - u. β -Modifikation. Die Oxyaminoketone verhalten sich bei der Oxydation verschieden, je nachdem die Oxyaminogruppe an sekundären oder tertiären C gebunden ist. Im ersten Falle resultieren ungefärbte *Dioxime*, im zweiten Falle *Nitrosoverb.*, die in Lsg. himmelblau gefärbt sind. Die Oxydation des Ketons mit FeCl₃ führte zum *Thymol*. Mit Semicarbazid wurde ein α - u. ein β -Semicarbazon u. ein *Semicarbazidsemicarbazon* erhalten. — Das mit Na-Bisulfit extrahierte Keton war linksdrehend, durch Dest. bei gewöhnlichem Druck verminderte

sich die opt. Aktivität. Die Identität mit *M'-Menthenon-3* wurde außer durch analyt. Rk. auch durch die *Benzylidenverb.* nachgewiesen. Da die gemessenen Werte der Mol.-Refr. mit den berechneten nicht übereinstimmen, nimmt Vf. Enolumlagerung an; die für die zwei konjugierten Doppelbindungen ($C_{10}H_{15}\cdot OH$) berechneten Werte stimmen alsdann mit den ermittelten überein.

Versuchsteil. Die Kennzahlen der äther. Öle von *Mentha pulegium* aus den Jahren 1920, 21 u. 23 weichen zum Teil erheblich voneinander ab; D_{15}^{15} 0,9 bis 0,9258, $\alpha_D^{16,5(20)} = +1,08$ bis $+10,65^\circ$, $n_D^{25(17)} = 1,4657$ — $1,4707$, Ketongew. 49,66—54,5%. — Mit Na-Sulfit extrahierte Ketone: D_{15}^{15} 0,93491, $\alpha_D^{17} = +0,9$ — 1. Fraktion Kp._{760,4} 233—235°, $\alpha_D^{15} = +0,75^\circ$; 2. Fraktion Kp._{760,4} 235—237°, D_{15}^{55} 0,93777, $\alpha_D^{15} = +0,35^\circ$, $n_D^{28,5} = 1,48464$, Mol.-Refr. 46,98 (ber. für $C_{10}H_{15}\cdot OH$ 45,82, für $C_{10}H_{15}\cdot OH$ 46,76). — Das mit Semicarbazid erhaltene Reaktionsgerüst wurde durch verd. A. fraktioniert. β -Semicarbazon, $C_{11}H_{19}ON_3$, l. in 70%ig. A. F. 174—175°. Der in 70%ig. A. unl. Anteil wurde durch 95%ig. A. fraktioniert. α -Semicarbazon, l. in 95%ig. A., unl. in 70%ig. A., F. 224—225° (Zers.). α -Semicarbazidsemicarbazon, $C_{12}H_{24}O_2N_6$, unl. in 70%ig. u. 95%ig. A., F. 217°. — *Phenylcarbaminyldiazon*, $C_{17}H_{23}ON_3$, aus α - u. β -Semicarbazon u. Anilin das gleiche Irid. F. 193,5—194°. — *Oxim*, $C_{10}H_{17}ON$, aus 70%ig. A., F. 118—119°. — *Oxyaminooximalat*, F. 191—192°. — α -Oxyaminooxim, $C_{10}H_{20}O_2N_2$, F. 171,5—172°, mit verd. schüssigem $NH_2\cdot OH$. — β -Oxyaminooxim, F. 187—188°. — *Benzylidenverb.*, aus dem Keton u. Benzaldehyd, Kp.₁₂ 223—227°; aus $CH_3\cdot OH$, F. 60—61°. — Mit NE-Sulfit extrahierte Ketone: D_{15}^{15} 0,93873, $\alpha_D^{13} = -8,16^\circ$. — Der größere Teil der Ketone war in Lsg. geblieben: D_{15}^{15} 0,94041; $\alpha_D^{15} = -20,15^\circ$; 1. Fraktion 33 bis 234,7°, $\alpha_D^{22} = -16,44^\circ$; 2. Fraktion 234—236,2°, $\alpha_D^{22} = -18,15^\circ$, $n_D^{29} = 1,479$ Mol.-Refr. 46,98. — Derivv. der 2. Fraktion im allgemeinen wie bei den mit Na-Sulfit extrahierten Ketonen. *Semicarbazone*, $C_{11}H_{19}ON_3$, F. 174—180° u. F. 224—225°. — *Oxim*, $C_{10}H_{17}ON$, F. 116—118°. — *Oxyaminooximalat*, F. 192—193°. — Das bei der Extraktion mit Na_2SO_3 zurückgebliebene äther. Öl hatte: D_{15}^{15} 0,912, $\alpha_D^{16} = +65,51^\circ$; der Rückstand von der Extraktion mit $NaHSO_3$: D_{15}^{15} 0,917, $\alpha_D^{15} = +47,85^\circ$. (Annali Chim. Appl. 14. 292—303. 1924. Palermo, Univ.) ZANER.

Valentino Morani, Das ätherische Öl von *Ptychotis verticillata* Duby (IC). In der Einleitung gibt Vf. eine Übersicht über verschiedene äther. Öle von *Thymus*, *Origanum*- u. *Ptychotis*arten u. deren Gehalt an *Thymol*, *Carvacrol* u. *Cineol*. Das äther. Öl von *Ptychotis verticillata* Duby (D. C.) wurde mit Wasserdampf aus dem orangegelbes Öl, Geruch nach *Thymol*, D_{15}^{15} 0,92378, $\alpha_D^{23} = +5,11^\circ$, $n_D^{17} = 1,5027$, l. bei 20° in 80%ig. A. 1:1,8, in 70%ig. A. 1:20. Es enthält ca. 42% *Thymol* u. wenig *Carvacrol*. (Annali Chim. Appl. 14. 275—81. 1924. Palermo, Univ.) ZANER.

R. Cerighelli, Über das Indol der Blüten des spanischen Jasmins. Nach den bisherigen Unterss. des Vfs. ist Indol als n. Bestandteil der Blüte von *Jasminum grandiflorum* L. anzusehen. In der frischen Blüte mag es, entsprechend der Ansicht von HESSE (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 34. 2929; C. 1901. II. 930), wohl in einem komplexen Verb. vorliegen, aber beim Welken wird es alsbald in Freiheit gesetzt u. entweicht in die Atmosphäre. Während der Nacht häuft es sich in den Blütengeweben an, verschwindet aber, sobald das Licht auf die Pflanzen wirkt. Sobald die Blüte abgepflückt ist, wird Indol weiter frei, häuft sich aber nur an, wenn die Blüten in einem beschränkten Luftvol. verwahrt werden, wobei es 5—6 mg in 100 g nicht zu überschreiten scheint. Die so verwahrten Blüten liefern daher sowohl bei Dest. wie bei Extraktion Indol, bei 24° in 24 Stdn. in 3—4 facher Menge von derjenigen, die sie anhäufen können. (C. r. d. l'Acad. des sciences 179. 1924. bis 195. 1924.) SPIEGEL.

V. Lubimenko, Über die Chlorophyllmenge bei marinen Algen. Vf. hat (unter Braun- u. Rotalgen des Schwarzen Meeres (Jaffa, Sebastopol) bzgl. ihres Chlorophyllgehalts untersucht. (C. r. d. l'Acad. des sciences 179. 1924. bis 195. 1924.) SPIEGEL.

gehalts untersucht u. festgestellt, daß dieser im Vergleich zu höheren Pflanzen unter ähnlichen Lichtverhältnissen wachsen, bedeutend niedriger ist. Die Tatsache, daß gerade Schattenpflanzen reichlicher Chlorophyll enthalten u. die vorstehenden Untersuchungsergebnisse an Algen, deuten darauf hin, daß die Photothese bei letzteren vielleicht sich von der der höheren Pflanzen unterscheidet. Bei einer dicht an der Oberfläche vorkommenden Rotalge (*Laurentia Coronops*) wurde die geringste Menge Chlorophyll gefunden (0,08 g pro kg Frischgewicht), während die von 19–55 m Tiefe vorkommende Rotalge *Phyllophora rubens* wesentlich mehr Chlorophyll (0,37 bzw. 0,32 g) enthielt. (C. r. d. l'Acad. des sciences 1073–76. 1924.)

HABERLAND.

Marc Bridel, Über die wahre Natur des in der Rinde von *Betula lenta* L. vorhandenen *Salicylsäuremethylesterglucosids*. (Journ. Pharm. et Chim. [7] 30. 304–310. 1924. — C. 1924. II. 2666.)

BEHRLE.

Michel Polonovski, Bildungsweise und Bedeutung der Alkaloide in der Pflanze. Die Frage der über genanntes Thema aufgestellten Hypothesen. Als geeignetste Definition für den Begriff Alkaloide hält Vf. folgende: Alkaloide sind stickstoffhaltige, größtenteils cycl. organ. Verbb., die mehr oder weniger bas. reagieren u. in Pflanzen, akzessor. auch in Tieren, vorkommen; sie besitzen sehr oft starke physiol. u. pharmakodynam. Wrkg. u. zeigen gegenüber gewissen chem. Reagenzien charakterist. hartes Verh. Vf. ist der Ansicht, daß die B. der Alkaloide in der Pflanze schrittweise synthet. wie im Laboratorium erfolgt, sondern daß nach einem bestimmten Art charakterist. Typus gewisse komplizierte Verbb. von vorneherein entstehen (unité dynamique alcaloidogène), die einfacheren Derivv. entstehen aus diesen durch Abbau. Bzgl. der Bedeutung der Alkaloide muß festgestellt werden, daß sie, wenn auch nicht als Abfallstoffe, so doch als sekundäre Prodd. aufzufassen sind, die nur indirekt Anteil am Stoffwechsel u. der Entw. oder Erhaltung der Pflanze haben. (Bull. Soc. Chim. de France [4] 35. 1365–98. 1924. Lille, Fac. de Med.)

HABERLAND.

E₃. Pflanzenphysiologie. Bakteriologie.

Jean Effront, Einfluß der Konstanz des Nährbodens auf die Entwicklung und chemische Arbeit der Mikroorganismen. Fügt man zu einer Nährlsg. die übliche Menge eines wesentlichen Bestandteiles nicht von vornherein zu, sondern allmählich im Laufe der Züchtung, so daß der Gehalt daran konstant bleibt, so werden Wachstum u. chem. Tätigkeit der Mikroorganismen erheblich modifiziert. So wurde die Züchtung von *Aspergillus niger* in Raulinscher Lsg. unter Konstanz des N-Gehalts eine mehr als doppelt so große Ernte erreicht, bei *Saccharomyces* in mineral. Nährlsg. mit Aminosäuren von der Spaltung pflanzlicher Caseine u. Zucker unter Konstanz der Mineralstoffe etwa das gleiche Ergebnis wie sonst, unter Konstanz des Wassers schon eine gewisse Erhöhung des Wachstums u. Verminderung der Ausbeute an A., unter Konstanz des N aber eine Erhöhung der Hefeausschüttung auf mehr als das vierfache unter völligem Verschwinden des A., wobei der N-Gehalt der züchtenden Hefe höher als sonst war. (C. r. soc. de biologie 91. 1175–78. 1924.)

SPIEGEL.

Denis Bach, Über die Giftigkeit und den Nährwert des Ammoniumacetats für verschiedene Pilze. (Vgl. C. r. d. l'Acad. des sciences 178. 2194; C. 1924. II. 1105.) Im Unterss. erstreckten sich außer auf das Acetat auch auf die Salze der Ameisensäure, Propionsäure u. Buttersäure. Sie zeigen, daß in künstlichem Nährboden bei anderen Zus. die NH₄-Salze der einbas. Fettsäuren gute N-Quellen für *Aspergillus* sein können. Die nicht dissoziierten Säuren aber sind giftig, u. die Giftigkeit hängt ab von der Konz. des NH₄-Salzes u. vom p_H des Mediums, Alkalität vermindert, Ansäuerung erhöht sie. Diese Folge des Ansäuerns kann aber

keine unmittelbare Wrkg. der H⁺ sein, die an sich diese Wrkg. nicht haben, so muß auf sekundären Rkk. auf andere Bestandteile des Mediums beruhen. (C. r. d. l'Acad. des sciences **179**. 1085—87. 1924.) SPIEGEL

J. Bordet und **M. Bordet**, *Das bakteriolytische Vermögen des Colostrums u. Milch*. Die banalen Mikroben der Luft sind meist recht empfindlich gegen Colostrum. Die empfindlichen Arten werden dadurch sehr schnell u. stark bakteriolyt. beeinflusst, ebenso durch n. Milch. Gegen gewisse Stämme des *B. coli*, *Typhusbacillus*, *Cholera vibrio* tritt diese Wrkg. nur ganz schwach oder gar nicht hervor. Ähnelt den von Tränen, Nasenschleim, Eiereiweiß bekannt gewordenen. Als gegen das lyt. Prinzip konnten bisher nicht gewonnen werden. (C. r. d. l'Acad. des sciences **179**. 1109—13. 1924.) SPIEGEL

Y. Nishiwaki, *Biologische Untersuchungen über den Kojipilz des Okazaki-Hatchomiso-Koji und der Kabocha-bana des Tome-Koji*. Der Pilz wird auf Grund der vorliegenden Unterss. als ident. mit *Oidium lupuli* MATTHEWS et LOTT bezeichnet. *Monilia sitophila* (Mont.) SACCARDO angesprochen. Er bildet die als Kabocha-Hatchomoso-Koji bezeichneten Prodd. u. soll nach WENT auf Java bei der Kultivation eines wohlschmeckenden Kuchens, Ontjom, aus Erdnüssen durch seine Erythrospore eine wichtige Rolle spielen, dürfte in gewisser Beziehung den *Aspergillus oryzae* u. dessen Varietäten übertreffen. (Zentralblatt f. Bakter. u. Parasitenk. II. Abt. **63**. 25—28. 1924.) SPIEGEL

Y. Nishiwaki, *Sojabereitung mit Oidium lupuli, Aspergillus oryzae und Rhizopus Japonicus*. Vergleichende Verss. lassen das *Oidium lupuli* (vgl. vorst. Ref.) dem *Aspergillus* für die Herst. von Soja fast ausschließlich verwendeten *Aspergillus* überlegen erscheinen. Es wird selbst bei höherer Temp. nur von wenigen fremden Mikroben infiziert u. enthält nützliche Enzyme. *Rhizopus* ist dagegen nicht geeignet, es nur wenig Soja von schlechter Qualität. (Zentralblatt f. Bakter. u. Parasitenk. II. Abt. **63**. 28—30. 1924. Osaka, Techn. Hochschule.) SPIEGEL

L. Elion, *Eine thermophile, Sulfat reduzierende Bakterie*. *Vibrio thioniodesulfuricans* ähnelt im Aussehen u. anderen Eigenschaften *Microspira desulfurans* u. *Microsp. aestuarii*, hat aber sein Temperaturoptimum bei ca. 55°. Deutliche H₂S-Entw. von H₂S ist bis herunter zu ca. 30° u. herauf zu ca. 65° zu erkennen. Merkwürdigerweise wurde dieser Organismus aus dem Schlamm eines mit einer dicken Eisschicht bedeckten Grabens gewonnen. (Zentralblatt f. Bakter. u. Parasitenk. II. Abt. **63**. 58—67. 1. Tafel. 1924. Delft, Techn. Hochschule.) SPIEGEL

K. Aoi, *Über eine neue Agar zersetzende Bodenbakterienart*. (Vorläufig Mitteilung.) Die neue Art wurde in Stallmist, in dem Reisstroh als Einstreu verwendet war, u. im Boden der Versuchsstation gefunden, u. zwar in Begleitung gewisser Cellulosebakterien, deren Reinkultur noch nicht geglückt ist. Vf. ist der Ansicht, daß jene gemeinsam mit anderen Mikroorganismen die Zellwandstoffzersetzung u. dadurch die Tätigkeit der eigentlichen Cellulosebakterien ermöglicht. Sie gedeiht in Bouillon oder auf gewöhnlichem Nähragar nicht, aber sehr gut auf Kellermannscher Lsg. mit 0,1—0,2% Agar, in Granscher Lsg. nur bei 0,1—0,3% NaCl. Das rote Mannan (Konjak) aus *Amorphophallus konjak* kann auf dieser C-Quelle dienen u. wird dabei verflüssigt. Die Art ist obligat aerob u. wird auf Agarlsg. bei ca. 45° in 10 Min. abgetötet. (Zentralblatt f. Bakter. u. Parasitenk. II. Abt. **63**. 30—32. 1924. Tokyo [Japan], Zentr. Landw. Vers.-Stat.) SPIEGEL

Y. Nishiwaki, *Die optimale Temperatur für das Wachstum und die Dextranbildung des Aspergillus Oryzae*. Entgegen Angaben von HENNEBERG u. von WIMPEL wurde die optimale Temp. für Wachstum der Kojipilze u. B. von Diastase bei 33,5—34,5° gefunden. Als Wachstumsgrenztemp. ergaben sich 7—9 u. 44—46° (Zentralblatt f. Bakter. u. Parasitenk. II. Abt. **63**. 102—6. 1924. Osaka, Techn. Hochschule.) SPIEGEL

7. Nishiwaki, *Über eine neue sporenbildende Rotheffe*. Die beschriebene Art, *Saccharomyces rosea* bezeichnet. In Zuckerlsg. ruft sie keine Gärung hervor, ebenbürtig in Kojiextrakt, dem NaCl, Essigsäure u. A. zugesetzt sind; sie wird hier von *Saccharomyces Saké* YABÉ u. *Bact. Kuetzingianum* HANSEN verdrängt, daher auf die Bereitung von *Soja*, *Saké* u. *Essig* keinen schädlichen Einfluß (Zentralblatt f. Bakter. u. Parasitenk. II. Abt. **63**. 21—24. 1924. Osaka, Univ. Hochsch.) SPIEGEL.

8. J. Kluyver und C. B. van Niel, *Über Spiegelbilder erzeugende Hefenarten*. Die neue Hefengattung *Sporobolomyces*. Bei gewissen, namentlich japan. Hefen, zeigten sich, wenn die Kulturschalen umgekehrt verwahrt waren, auf dem Deckel scharfe Spiegelbilder von einem Teile der auf der Platte vorhandenen farbigen Kolonien. Diese Erscheinung wird auf Abschleuderung von Zellen aus den Kolonien zurückgeführt, u. es wird eine neue Gattung aufgestellt, für die die Bezeichnung „*Sporobolomyces*“ vorgeschlagen wird. Sie wird definiert als rötlich- oder lachsfarbige, hefenartige Organismen, welche sich durch Knospung vermehren. Der Stoffwechsel ist durchaus oxydativer Natur, Gärung fehlt. Ein Teil der Zellen erzeugt auf gut ausgebildeten Sterigmen in die Luft hineinragende, typ. röhren- oder sichelförmige Sporen, welche nach der Reife durch einen eigenartigen Mechanismus abgeschleudert werden.“ Es werden vorläufig 3 Arten der Gattung unterschieden, *Sp. salmonicolor*, *Sp. roseus* u. *Sp. tenuis*. (Zentralblatt f. Bakter. u. Parasitenk. II. Abt. **63**. 1—20. 2 Tafeln. 1924. Delft [Holland], Univ. Hochsch.) SPIEGEL.

9. Hemendra Kumar Sen, *Die Reduktion von unsymmetrischem Dichloraceton*. 250 g Rohrzucker werden gel. in 2,5 l W. von 40° u. mit 250 g Preßhefe versetzt. Nach 15 Min. wird im Laufe von 3—4 Stdn. eine 25%ig. alkoh. Lösung von 10 g *a. Dichloraceton* zugegeben u. das Gärgefäß über Nacht bei 35° belassen. Die Red. zu opt.-akt. *Dichlor-i-propylalkohol*, $C_3H_6OCl_2$, ist innerhalb dieser Zeit wahrscheinlich schon beendet; um vollständige Red. zu erzielen gibt man aber noch 100 g Hefe hinzu u. läßt 2 Tage stehen. Der Dichloralkohol wird aus der trierten Lsg. durch Ä. extrahiert. Ausbeute 54% der Theorie. Angenehm riechende Fl. Kp. 146—148°, D. 1,33, $[\alpha]_D = -9^\circ$, wl. in W., ll. in A. u. Ä., brennend, süßlich. *Urethanderiv.*, $C_4H_7O_2NCl_2$, aus W. (worin 2% l.) mit Nadeln, F. 61—63°; $\alpha = -2,226^\circ$ ($l = 1$ dm, 0,3336 g in 2 ccm absol. A.); Verb. hat gute narkot. Wrkg.: 0,25 g in 25 ccm W. + 2 ccm Glycerin betäubt bei einem 4,5 Pfd. schweren Kaninchen 11-std. ununterbrochenen Schlaf. — Red. von *Monochloraceton* (KAHLBAUM) durch Hefe erwies sich, wohl infolge Unreinheit höher chlorierter Prodd., schwieriger, da mit dieser Verb. die Gärung zum Stillstand kam. Die Ausbeute betrug nicht mehr als 25% *Monochlor-i-propylalkohol*, Kp. 127°. (Quarterly Journ. Indian Chem.-Soc. **1**. 1—8. 1924. Calcutta, Kaiser WILH.-Inst.) HABERLAND.

10. Auguste Lumière, *Über die Regelmäßigkeit der Milchsäuregärung in Gegenwart von Chlorid*. (Vgl. Ann. Inst. Pasteur **38**. 848; C. 1924. II. 2670.) Ausführlichere, von Verss. gestützte Polemik gegen RICHET u. CARDOT (Ann. Inst. Pasteur **38**. 1045—51. 1924. II. 2670.) (Ann. Inst. Pasteur **38**. 1045—51. 1924.) SPIEGEL.

E₅. Tierphysiologie.

11. Hermann Vollmer, *Zum Blutchemismus der pharmakologischen Vagusreizung*. Pharmakolog. Vagusreizung durch *Pilocarpin* u. *Cholin* fand Vf. keine einflussreiche Wirkung u. bei Berücksichtigung der Blutkonz. überhaupt keine nennenswerten Änderungen des Gehaltes von Ca u. K im Blutserum von Kindern. (Klin. Wochenschr. **3**. 2285—87. 1924. Kaiserin AUGUSTE VIKTORIA-Haus.) SPIEGEL.

M. Eisler, *Über die Aufnahme von Hämotoxin und Agglutinin durch verschieden vorbehandelte rote Blutkörperchen*. Gewaschenes Kaninchenblut w. Rohruckerlsg. vom Hämotoxin des *Vibrio Kadikjö* schwerer gel. als in ph. NaCl-Lsg. u. bindet in ersterem Medium auch weniger Gift. Werden die Zuckerlsg. vorbehandelten Blutkörperchen in NaCl-Lsg. übertragen, so verliert sie sich nun gegen das Gift wie nur mit NaCl-Lsg. behandelte Zellen. Auch gewissen Konzz. von Tannin präparierte Kaninchenerythrocyten weisen Vibriolysin gegenüber eine erhöhte Resistenz auf, die auch dann erhalten bleibt, wenn solche Erythrocyten nachträglich in physiol. NaCl-Lsg. aufgenommen werden. Auch hier ist die Verminderung der Löslichkeit mit einer herabgesetzten Bindungsfähigkeit für das Toxin verbunden. In Heilverss. mit NaCl- u. Tanninblut denen dem letzteren wegen seiner schwereren Löslichkeit 4—8 mal mehr Gift zugesetzt werden mag, konnte dennoch in beiden Blutproben durch die gleiche Dosis Heilserum etwa der gleiche Effekt erzielt werden. Mit spezif. Serum sensibilisiertes Hammelblut wird etwas schlechter vom Vibriotoxin gel. als nicht sensibilisiertes. bindet auch weniger Gift. Antitoxin vermögen sensibilisierte Blutkörperchen nicht an sich zu ziehen. Ebenso wenig n. Erythrocyten, wenn sie in einem mit Metanblau gefärbten antitox. Serum suspendiert werden, obwohl sie den Farbstoff in merklichem Maße aufnehmen. (PFLÜGERS Arch. d. Physiol. 205. 531—46. 1924. Wien, Staatl. serotherapeut. Inst.)

M. Weinberg und **P. Goy**, *Vergleichende Untersuchung des formolierten und des jodierten Botulinustoxins*. (Vgl. C. r. soc. de biologie 91. 148; C. 1924. II. 2.) Das Botulinustoxin kann auch durch J entgiftet werden. Dabei sind J-KJ₃ nicht verwendbar, weil mit so behandeltem Toxin injizierte Tiere häufig erhöhte örtliche Schädigungen zeigen u. an Anaphylaxie sterben, wohl aber J-Tk. Auch mit dem jodierten Toxin kann man Kaninchen immunisieren u. ziehen schnell Antibotulinustoxin von hoher Wirksamkeit erhalten, doch waren die Ergebnisse mit dem Formolpräparat stets besser. (C. r. soc. de biologie 91. 114—124. 1924.)

Paul Nélis, *Die Einwirkung des Natriumoleats auf das Diphtherietoxin*. (Vgl. RAUBITSCHKE u. RUSS, Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therapie I. 13. C. 1909. I. 1173.) Das mit Na-Oleat versetzte Toxin wird vollständig zerstört, so daß es durch eine Behandlung, die zur Regeneration in dem Komplex von Antitoxin führt, seine Wirksamkeit nicht wiedergewinnt. Die Erklärung dafür. RAUBITSCHKE u. RUSS (l. c.) für die Wrkg. der Seife gegeben haben, kann nicht zutreffen, es scheint sich vielmehr um eine Art Katalysatorwrkg. zu handeln. (C. r. soc. de biologie 91. 1159—62. 1924. Gand, Univ.)

Fritz Lasch, *Über Cholesterin im Liquor cerebrospinalis*. Bei 20 Gesunden u. Kranken konnte nie Cholesterin im Liquor nachgewiesen werden außer in 2 Fällen, bei dem der Liquor sehr stark hämorrhag. war. Zwischen positiver Nachweis u. Ggw. von Cholesterin im Liquor besteht kein Zusammenhang. Bei einem Kranken mit Icterus trat Gallenfarbstoff, aber kein Cholesterin in den Liquor über trotz sehr erhöhter Cholesterinwerte im Serum. Nicht Undurchlässigkeit der Meningeen könnte die Ursache für das Fehlen des Cholesterins im Liquor sein, sondern wahrscheinlich die Zus. des Liquors selbst. (Biochem. Ztschr. 153. 150—55. 1924. Wien, Univ.)

Paul Wels, *Zur Wirkung der Röntgenstrahlen auf die Gewebsatmung*. (Vgl. PFLÜGERS Arch. d. Physiol. 203. 263; C. 1924. II. 494.) Bei Bestrahlung des tier. Gesamtorganismus wie auch bei der des überlebenden Organs üben die Röntgenstrahlen keinen Einfluß auf den Energiewechsel des Gewebes aus. Die Ergebnisse der Verss. sind eine Bestätigung der früheren (l. c.) (PFLÜGERS Arch. d. Physiol. 203. 268—73. 1924. Kiel, Med. Kl.)

Shyotaro Tsukamoto, *Experimentelle Untersuchungen zur dynamischen Wirkung von Vitaminen auf Wachstumsvorgänge bei vitaminreicher Ernährung*. Bei genügendem Vitamin Gehalt bewirkt eine allgemeine hochgradige Salzarmut der Nahrung nur eine geringfügige Hemmung in der Gewichtszunahme sehr junger Ratten. Hoher Salzgehalt der Nahrung ändert hieran nichts. Bei etwas älteren Ratten bewirkt Zellsalzarmut eine Senkung des Körpergewichts. Der Verlauf des Körpergewichts scheint von dem Mischungsverhältnis der Salze weitgehend abhängig zu sein. Besonders von dem gegenseitigen Verhältnis zwischen NaCl u. Zellsalz. Salzarmut der Nahrung verzögert die Regeneration von Knochen, wenn auch dies in hohem Maße. (Biochem. Ztschr. **151**. 216—26. 1924. Berlin, Pathol. Univ.-Arzt.)

Newton Kugelmaß und Irvine Mc Quarrie, *Die Photoaktivität von Rachitis heilenden Stoffen und die Photolyse der Oxyprodukte durch ultraviolette Strahlung*. Zur Hilfe photograph. Platten, die für ultraviolette Strahlen empfindlich sind, ließ Kugelmaß nachweisen, daß eine Reihe von antirachit. wirksamen Stoffen wie Lebertran, eine nicht verseifbare Fraktion daraus, Eigelb, Galle, Hydrochinon bei der Oxydation photograph. Platten durch Quarzschrime, aber nicht durch Glasschrime hin- und her schwärzen. Stoffe, welche die Rachitis nicht heilen, wie Leinsamenöl, Erdnöl, Baumwollsaamenöl, Schweineschmalz wirken auf die photograph. Platte überhaupt nicht ein. Blut schwärzt die photograph. Platte ebenfalls durch Quarz aber nicht durch Glas. Diese Verss. deuten darauf hin, daß die die Rachitis heilenden Stoffe ultraviolette Strahlen aussenden. Die Oxydation spielt hierbei eine Rolle. Vermutlich ist die Wrkg. der Rachitis heilenden Stoffe ebenso wie die des antirachit. u. der Hg-Dampflampe auf die Aussendung ultravioletter Strahlen zurückzuführen. (Science **60**. 272—74. 1924. Yale Univ.)

L. Steenbock, *Die Übertragung wachstumsfördernder und verkalkungsfördernder Eigenschaften auf eine Nahrung durch Bestrahlung mit Licht*. Durch Bestrahlung von Nahrungsgemische u. vitaminarme Fette dieselben Wrkgg. bekommen wie Vitamin enthaltenden Stoffe. Wurden bestrahlte Ratten mit nicht bestrahlten Tieren in den gleichen Käfig gebracht, so konnten sie auf die bestrahlten Tiere eine wachstumsfördernde Wrkg. übertragen. (Science **60**. 224—25. 1924. Wisconsin Univ.)

Alfred F. Hess, *Über die Erzeugung antirachitischer Eigenschaften in Nahrungsgemischen durch Bestrahlung mit Licht*. (Vgl. vorst. Ref.) Baumwollsaamenöl, das eine Stunde lang mit einer Hg-Dampfquarzlampe intensiv bestrahlt wurde, bewirkt — wie früher gefunden — die Fähigkeit bei Ratten Rachitis zu verhüten, während das unbestrahlte Öl unwirksam war. Die Wirksamkeit von Lebertran wird durch Bestrahlung verstärkt werden. (Science **60**. 269. 1924. New York, Columbia Univ.)

Baude und L. Deglaude, *Die Wirkung des Mangels an Faktor A auf das Funktionieren des Herzens wie in der histolog. Struktur desselben waren*. Im Funktionieren des Herzens wie in der histolog. Struktur desselben waren Ratten an Vitamin A mangelhafter Nahrung gefütterten Ratten keine wesentlichen Veränderungen festzustellen. (C. r. soc. de biologie **91**. 1116—18. 1924. Inst. de physiologie, Paris.)

W. Seuffert und E. Marks, *Weitere Beiträge zur Frage der Beeinflussung des Eiweißzerfallswertes durch Aminosäuren*. (Vgl. SEUFFERT, Ztschr. f. Biologie **80**. 1924. I. 2717.) Auch bei einer den Calorienbedarf reichlich deckenden Grundfütterung führte Verabfolgung eines Gemisches von einfachen Aminosäuren zu erheblicher Verminderung des Zerfallswertes von Körpereiweiß, um 40 u. 80%. In einem Falle stimmten dabei N- u. S-Bilanz gut überein, deren Ergebnis ergab sich die aus der S-Bilanz errechnete Ersparnis an Körpereiweiß

zu nur 25% der aus der N-Bilanz errechneten. (Ztschr. f. Biologie 82. 24. 1924. Berlin, Tierärztl. Hochsch.) SPIEGLER

Eliane Le Breton und **Charles Kayser**, *Über den Stoffwechsel der beim Diabetes insipidus.* (Vgl. LE BRETON u. SCHAEFFER, C. r. d. l'Acad. des sciences 178. 1320; C. 1924. II. 73.) Die Veränderungen der Polyurie u. der 24 Stdn. ausgeschiedenen Menge Purinbasen außer Harnsäure gingen bei den untersuchten Kranken parallel. Mit steigender Polyurie verminderte sich das Verhältnis Harnsäure : Hypoxanthin. (C. r. d. l'Acad. des sciences 179. 1218—19. C. r. soc. de biologie 91. 1135—37. 1924. Straßburg, Fac. de méd.) SPIEGLER

E. S. London, **Nina Kotschnew**, **M. P. Kalmykow**, **N. J. Schocho** und **Tamara Abaschydze**, *Zur Kenntnis des intermediären Stoffwechsels.* III. (E. KOTSCHNEFF, PFLÜGERS Arch. d. Physiol. 201. 362; C. 1924. I. 794.) Mittels Angiostomiemethode lassen sich allgemeine Sätze für den intermediären Stoffwechsel aufstellen (an Fistelhunden). Der Charakter der Darmresorption ist ein elektiver. Die verschiedenen Milchbestandteile z. B. werden, nach dem chem. Bestandteile des Pfortaderblutes zu urteilen, getrennt aufgesaugt. Die dem nüchternen Zustand des Organismus eigene einheitliche Blutzus. weist während des Fortschreitens der Darmresorption in Zusammenhang mit den Durchströmungsbezirken Verschiedenheiten auf. Mitunter läßt sich die Zweiseitigkeit des intermediären Stoffwechsels feststellen. Die Ausfuhr der intermediären Stoffe aus dem Blutgefäßsystem erfolgt hinter deren Zufuhr stets zurück.

Der verschiedene Zuckergehalt des strömenden Blutes erklärt sich durch die verschiedene Resorptionsintensität der Zuckerarten im Darm u. die verschiedene Zurückhaltungsintensität derselben in der Leber u. in den Muskeln. Während drei Faktoren im Einzelfall wirken, kann durch gleichzeitige Analysen des Blutes in der Pfortader, Lebervene, der arteriellen u. venösen peripheren Gefäße festgestellt werden. *Lactose* wird bei direkter Zufuhr in den Darm sehr langsam u. spärlich aufgenom- men, wird von der Leber ungenügend zurückgehalten. Dagegen wird der Milchzucker nach oralen Milchgaben ebenso schnell wie Traubenzucker resorbiert, von der Leber fast vollauf zurückgehalten u. steht in seiner Wirkg. auf der Blutzuckerkurve Glucoselegg. gleicher Konz. sehr nahe. In W. gel. Glucose verursacht eine ebenso starke Hyperglykämie mit Höhepunkt zu gleicher Zeit als in Milch gel. Glucose. Milch scheint die Resorption von Glucose nicht zu fördern. Nach intravenöser Injektion von 0,5 g Glucose direkt in die Pfortader bei gleichzeitiger Blutentnahme aus der Lebervene verdoppelt sich der Blutzuckerwert in letzterer, was auf eine erhöhte Durchlässigkeit der Leber für Glucose bei steigender Konz. in der Pfortader hinweist. *Galaktose* wird aus dem Darm sehr schnell resorbiert, der Zucker wird relativ mehr durch die Muskulatur als durch die Leber zurückgehalten. *Lävulose* wird langsamer als Glucose aufgenommen, die etwaige Insuffizienz der Leber ist nach Lävulose größer als nach Glucose. Im intermediären Stoffwechsel hat man bei Eiweißzufuhr nicht nur mit resorbierten Aminosäuren, welche aus dem Darm kommen, sondern auch mit Polypeptiden zu rechnen, welche aus der Leber kommen. — Bis jetzt liegt kein direkter Beweis für die Annahme einer Resorption der unveränderten Darmfermente vor. Trotz längerer Verweilens von Pankreassaft im Darm gelang es weder in der Pfortader noch in der Lebervene noch in den peripheren Gefäßen, eine Zunahme der untersuchten Fermente festzustellen. — Beim nüchternen Hunde konnten keine Regelmäßigkeiten im *Oxydase*- u. *Katalase*gehalt des arteriellen, venösen oder Pfortaderblutes festgestellt werden. Mit Beginn der Resorption ändert sich der Gehalt an diesen Fermenten, am deutlichsten in der Muskulatur; so weist das aus der Pfortader strömende Blut der Vena femoralis einen gesteigerten Gehalt an diesen Fermenten auf. — Der W.- u. Salzgehalt des Blutes schwankt während der Verdauung

- ein Seiten der n. Werte. (PFLÜGERS Arch. d. Physiol. 205. 482—505. 1924. engrad, Inst. f. exp. Med.) WOLFF.
- Miguel Ozorio de Almeida**, *Die Einwirkung des Zuckers auf die Lungen-
ation.* Bei Zufuhr genügender Mengen Zucker wird der Regulierungskoeffizient
Lungendurchlüftung, den Vf. nach einer besonderen Bechnungsmethode er-
ilt, erhöht. (C. r. soc. de biologie 91. 1122—24. 1924.) SPIEGEL.
- Hideo Yoshida**, *Über die Harnbildung in der Froschniere.* Bei Durchströmung
einer modifizierten Ringerlsg. wird ein stark hypoton. Harn abgeschieden; die
einnung des NaCl (0,65%) geht bis zu 0,144%. Wird die Ringerlsg. durch
a-Zusatz hyperton. gemacht, so steigt der NaCl-Gehalt des Harns, während seine
e abnimmt; aber er bleibt hypoton., bis die Sekretion bei etwa 1% aufhört.
t wird im Harn in steigendem Maße angereichert, während Chlorid zugleich
g verd. wird. Bei Zuleitung des Sulfats von der Nierenpfortader aus tritt nur
u wenig in den Harn über. Die Anreicherung beruht also auf Wasserresorption
u die Kanälchen. Wie Sulfat verhalten sich Äthylsulfat, Phosphat, Tartrat,
cyanid u. Cyanol. Citrat scheint die Niere zu schädigen. Bromid wird ähnlich
Chlorid verd., nur schwächer. Sulfat wird daneben konz. Jodid u. Rhodanid
a ohne Konzentrationsänderung durch die Niere hindurch, u. zwar passieren
eicht nur die Glomeruli, sondern auch die Kanälchenwandungen. Daneben
i Sulfat konz., Chlorid verd. — Enthält die Durchströmungsl. 0,01% KCl, so
ert die Niere mit Konz. des K. Die indifferente Konz. ist erst etwa 0,0075%.
e größer Verd. wird K eingespart, bei höherem Gehalt stets konz. Ähnlich
t as Verh. gegenüber Ca, die indifferente Konz. liegt hier aber über der der
ierlsg. (0,02%) bei 0,025%. Rb wird unter allen Umständen konz., wenn es
elle von K zugeführt wird; jedoch schädigt es anscheinend die Niere. NH₄
i stark konz. abgeschieden; HgCl₂-Vergiftung der Kanälchenwandungen hebt
e Konz. auf. — Harnstoff wird stets von der Niere konz. — Traubenzucker wird
halb einer gewissen Konz. in der Durchströmungsl. von der Niere durch Rück-
sption eingespart; bei Zufuhr in größerer Konz. wird er nicht konz. abgeschieden.
lose u. Rohrzucker passieren die Niere ohne Konzentrationsänderung. Galactose
u etwas verd., dagegen nicht konz. werden. (PFLÜGERS Arch. d. Physiol. 206.
4-302. 1924. Kiel, Physiol. Inst.) WOLFF.
- A. Broening**, *Über den Sauerstoffverbrauch in den Nebennieren.* Elektr. Reizung
i. splanchnicus maior u. sensibler Nerven bewirkt bei Hunden ein Ansteigen des
erbrauches in der Nebenniere. Da während der Reizung derselben Nerven
adrenalin Gehalt des Nebennierenvenenblutes zunimmt, so kann der O₂-Verbrauch
s Maß der Intensität der Arbeit der Nebenniere betrachtet werden. Injektion
ol. Mengen von Schilddrüsenextrakt bewirkt ein Ansteigen des O₂-Verbrauches,
tore Dosen vermindern ihn; ebenso große wie kleine Dosen Pankreasextrakt.
xtraktion der Schilddrüse hat auf den O₂-Wechsel in der Nebenniere keinen
eren Einfluß (vielleicht Verminderung des O₂-Verbrauches). Das bedeutende
nigen des O₂-Verbrauches nach Injektionen von Schilddrüsenextrakt u. das
hbleiben der Adrenalinsekretion unter derselben Bedingung kann vielleicht
urch erklärt werden, daß die Schilddrüse hauptsächlich auf die Rindensubstanz
n. Einfluß ausübt. Die Verminderung des O₂-Verbrauches durch Pankreas-
kt würde für seine Wrkg. auf die Rinde sprechen, da die Adrenalinsekretion
u Injektion von Pankreasextrakt sich fast gar nicht ändert. (PFLÜGERS Arch.
ysiol. 205. 571—77. 1924. Kasan, Physiol. Inst.) WOLFF.
- N. Scheinfinkel**, *Studien über antagonistische Nerven.* Nr. 24. *Nachweis der
ilisierung von Kalium im Herzen durch Reizung des Nervus vagus.* Der von
ER, ABELIN, ERB u. SCHEINFINKEL (Ztschr. f. Biologie 78. 297; C. 1923. III.
4 durch biol. Methoden erbrachte Beweis für Mobilisierung von K im Herzen

bei Vagusreizung wird durch den chem.-analyt. Nachweis ergänzt. (Ztsch. Biologie 82. 285—90. 1924. Bern, Univ.)

Tatsuo Seo, *Über ein eigentümliches, durch Salzgemische hervorgerufenes Kontraktionsphänomen*. Wenn man einem Muskel längere Zeit in einem elektroarmen Gemisch liegen läßt, das ein Na-Salz mit mehrwertigem Anion (S₂O₃, Tartrat, Citrat) u. eines mit einwertigem Anion (Cl, Br, J, NO₃, SCN) in geeigneter Verhältnis enthält, so spricht der Muskel auf rhyth. Reize derart an, daß er bei einer oder wenigen starken Kontraktionen rasch u. mit Kontraktur ermüdet, bei Weiterreizung dann aber wieder erholt u. längere Zeit n. kontrahiert. Das Phänomen ist durch sympath. u. parasympath. Gifte, Narcotica, KCl, CaCl₂, sowie Muskelgifte u. einige Alkaloide zum Verschwinden zu bringen. Gegen KCN unempfindlich. Vom Nerven aus ist es nicht hervorzurufen. (PFLÜGERS Arch. d. Physiol. 205. 518—30. 1924. Kiel, Physiol. Inst.)

Friedrich Bernhard, *Über die Glucosepermeabilität der Froschleber*. Bei Durchströmung der überlebenden Froschleber im Herbst mit Ringerlösung steigt dem Zuckerzusatz lag der Punkt, bei dem Zucker von der Leber wiederum genommen, noch abgegeben wurde, bei 0,133% Glucose der Nährfl. Bei Heuschke Winter-, wie bei Juniverss. trat bei einer Konz. von 0,2—0,4% Glucose in die Leber über. Die Froschleber ist demnach zu allen Jahreszeiten nach beiden Seiten für Traubenzucker durchlässig. Bei den bei der angewandten Methode verwendeten Zuckerkonz. war es nicht möglich, bei einer herausgeschnittenen pankreasdiabet. Leber Zuckeraufnahme zu erzwingen. Die Ursache liegt aber nicht darin, daß sich die Permeabilität der Leberzelle für Traubenzucker im Pankreasdiabetes ändert, sondern darin, daß im Pankreasdiabetes die Zuckerkonz. in der Leber groß ist, so daß ein Diffusionsgefälle von der Durchströmungsfl. zur Leber nicht zustande kommen kann. Die Abhängigkeit der Glucoseaufnahme u. -abgabe von dem Glucosegehalt der Durchströmungsfl. macht es wahrscheinlich, daß es sich dabei um eine einfache Diffusion handelt. (Biochem. Ztschr. 153. 61—70. 1924. Mannheim, Städt. Krankenanst.)

Rudolf Mond, *Untersuchungen am isolierten Dünndarm des Frosches*. Ein Beitrag zur Frage der gerichteten Permeabilität und der einseitigen Resistenz tierischer Membranen. Mittels einer neuen Methode kann der Froschdarm von der Außenwelt intestinalis communis aus isoliert durchströmt u. Gefäßfl. sowie Darminhalt laufend analysiert werden. Der Säurefarbstoff *Cyanol extra*, welcher lipoidurpermeabel ist, passiert die Darmmembran in der Richtung von den Gefäßen in den Darm, dagegen nicht in der Resorptionsrichtung. Durchlässigkeit für Cyanol in der Resorptionsrichtung kann erzwungen werden 1. durch Erhöhung des osmot. Drucks des Darminhalts auf das 8—9fache der isoton. Konz.; die Ionen wirken dann permeabilitätssteigernd in der Reihenfolge $\text{SCN}^- > \text{Br}^-, \text{Cl}^- > \text{SO}_4^{2-}$ u. $\text{K}^+ > \text{Ca}^{2+}$; 2. durch Erhöhung der [H⁺] des Darminhalts auf $\text{pH} = 3,7$; 3. bei unverändertem Darminhalt durch Steigerung der [H⁺] der Gefäßdurchströmungsfl. auf $\text{pH} = 5,0$. Priinsekundäres Phosphat oder Phosphatgemisch ($\text{pH} = 7,4$), der Durchströmungsfl. in Verhältnis 1 : 9 NaCl zugesetzt, bewirken Übertritt von Cyanol aus dem Darm in die Gefäße, während weit höhere Phosphatkonz. im Darminhalt die Unreversibilität für Cyanol in die Gefäße nicht beeinflussen. Oberflächenaktive Stoffe wie *Linolensäure* wirken erst in hohen Konz. permeabilitätssteigernd. *Lauroylol* in Konz. bis zu $\frac{1}{15}$ -m. übt keinen Einfluß auf die Permeabilität aus. Auch die Durchlässigkeit des Darms für Cyanol in der Richtung von den Gefäßen in das Darmlumen wirkt Erhöhung der Ca^{2+} - oder SO_4^{2-} -Konz. der Gefäßdurchströmungsfl. hemmend. *Isobutylurethan* u. *Heptylalkohol* sowie *KCN* beeinflussen die irreversible Permeabilität nicht. (PFLÜGERS Arch. d. Physiol. 206. 172—93. 1924. Kiel, Physiol. Inst.)

Theodor Brugsch und **Hans Horsters**, *Cholere und Choleretica. Ein Beitrag zur Physiologie der Galle. II. Mitteilung. Hypo- und Hypercholeresen.* (I. vgl. Ztschr. f. d. ges. exp. Medizin **38**. 367; C. **1924**. I. 1826.) Der Viscositätsquotient ist ein guter Maßstab, um sofort die cholagog., d. h. Schleim aus den abführenden Gallenwegen mitführende Galle von der choleret., d. h. durch die Leberzellen absondernden schleimarmen Galle zu unterscheiden. Z. B. ist der hohe Quotient der Galle auf die Einw. des *Atophans* hin ein strikter Hinweis auf die starke choleret. Wrkg. des *Atophans*. Aus dem Anstieg des Quotienten kann man eine Vermehrung der gesamten Gallensäureausscheidung ablesen. — Die Nahrung ist auch auf die Gallenausscheidung einflußreich. Man kann z. B. durch Vergrößerung der Kohlenhydratzufuhr eine Vermehrung der Gallenmenge erzielen. — Nach der Vergrößerung des Oberflächen- u. des Viscositätsquotienten bewirken *Atophan* u. *Insulin* eine starke choleret. Effekt; ohne solchen sind *Tonophosphan*, *Atoxyl*, Na_2HPO_4 , *Chinolin*, *i-Borneol*, *Menthol*, *Pilocarpin*, *Eukupin*, *Chinin*. Dem *Chinin* ist ein starker choleret. Effekt nicht abzusprechen, ebenso dem *Terpineol*. *Adrenalin* bewirkt eine Vermehrung der Gallensäureausscheidung bewirken *Atophan*, *Insulin* u. *Chinin*. Weiter wurden noch *Urethan*, *Vuzin*, *Optochin* u. *Chinolin* untersucht. (Ztschr. f. d. ges. exp. Medizin **43**. 517—38. 1924. Berlin, Charité.)

WOLFF.

A. P. Winogradow, *Einfluß der Nahrungsstoffe auf die Gallensekretion. Experimentelle Untersuchung.* Verss. an Hunden. Die Gallenabsonderung erfolgt bei Ernährung beständig im Laufe von 24 Stdn. u. unterliegt großen Schwankungen, steigt bald um 100% oder fällt um 75%; eine scharfe Erhöhung beobachtet man in den ersten 4—5 Stdn. nach dem Essen. Die tägliche Gallenabsonderung verändert sich ziemlich bedeutend im Laufe mehr oder weniger Zeiträume, bei gleicher Kost u. gleichen Lebensbedingungen, u. zwar natürlich in den Beziehungen der fl. u. festen Teile zueinander. Die tägliche Menge der Galle u. ihre festen Bestandteile wachsen mit dem Gewicht des Tieres. Die tägliche Menge der fl. u. festen Bestandteile der Galle sind auf 1 kg Körpergewicht desto größer, je kleiner das Gewicht des Tieres ist. Die tägliche Gallenabsonderung vergrößert sich nicht unter dem Einfluß überschüssig dem Organismus zuzuführenden Wassers. Die Menge der Galle u. ihre Beschaffenheit sind von der eingenommenen Nahrung abhängig. Eine n. Gallenabsonderung findet statt, wenn die Nahrungsbedürfnisse des Organismus befriedigt sind. Bei ungenügender Nahrung (Abführen, teilweises Hungern) wird die Menge der fl. u. festen Bestandteile der Galle verringert u. die Galle verdünnt. Fleisch, Brot u. Milch üben bei gleichwertigen Eiweißmengen auf die Gallenabsonderung die gleiche Wrkg. aus. Mehr überschüssigen Eiweißes kann die Gallenmenge am 1. Tage etwas vermehren, hebt den absol. Gehalt an festen Stoffen bedeutend während der ersten 2—3 Tage, wenn der %-Gehalt an festen u. in A. l. Stoffen im Steigen ist; später schwindet dieser Einfluß des Eiweißes allmählich. Bei reichlicher Eiweißnahrung (Fleischeiweiß) eine schwache Erhöhung der fl. Teile der Galle hervor. Lebererkrankung als Nahrung erhöht die Gallenmenge bedeutend, vergrößert die Menge der festen Stoffe etwas u. macht die Galle bedeutend dünnflüssiger. Bei Ernährung der Leber wächst ihr Einfluß auf die Gallenabsonderung längere Zeit nach Beendigung der Zufuhr. Bei Abwesenheit von Kohlenhydraten rufen große Eiweißmengen statt Zunahme Abnahme der Gallenmenge hervor. Ggw. von Fetten bei Eiweißnahrung erhält die Gallenabsonderung in n. Grenzen, ihr völliges Fehlen übt keinen Einfluß. Zufuhr überschüssigen Fettes vermindert die Galle schwach, vergrößert etwas die Menge der fl. Teile der Galle in den ersten Tagen; später ist die Wrkg. der Fette auf die Gallensekretion sehr schwach. Ggw. von Kohlenhydraten ist für eine n. Gallenabsonderung unbedingt notwendig. Gleichwirkende Mengen

Fett u. Eiweiß ersetzen nicht immer die Kohlenhydrate bei der B. der Galle (er die Leber. Ausschließliche Fleischnahrung mit viel Eiweiß verringert die A sonderung der Galle u. dickt sie ein. Ausschließliche Pflanzennahrung beein die Gallenabsonderung nicht. Milchdiät ruft ein Verringern der fl. u. 1te Gallenbestandteile in den ersten 3—4 Tagen hervor u. verd. die Galle, verdie aber während der folgenden Tage. (PFLÜGERS Arch. d. Physiol. 205. 590. 2 1924. Neuruss. Univ.) Wor.

Dimitry Prjanischnikow, *Asparagin und Harnstoff*. (Physiologische Par Nach Überlegungen u. Verss. an wachsenden Pflanzen können folgende Haupt die der B. von Asparagin u. Harnstoff gemeinsam sind, herausgehoben we Beide Amide sind in ihrer Hauptm. keine primären Prodd. der hydrolyt. Ei spaltung, sondern bilden sich auf sekundärem Wege, wobei zu ihrer Synthes allen Dingen NH_3 dient, welches durch Oxydation der Aminosäuren erhalten ir Beide Amide bilden sich auch mit großer Leichtigkeit auf Kosten des von auße zu geführten NH_3 , mit dem selbstverständlichen Unterschied, daß zur B. von Asparag noch ein Rest der unoxydierten C-Kette nötig ist, während zur B. von Har to NH_3 u. CO_2 genügen. Nicht nur die Art, sondern auch der physiol. Sinn d des einen u. anderen Amids ist vollkommen gleich — er besteht in der Entgim des NH_3 , gegen den die höheren Organismen im Pflanzen- wie im Tierreiche rel empfindlich sind bei alkal. u. auch bei neutraler Rk. des Mediums. Da b Mangel an Kohlenhydraten die Pflanzen empfindlicher gegen NH_3 werden, isle halb verständlich, weil die Pflanze keinen Harnstoff bilden kann u. die Bvo Asparagin durch Mangel an Kohlenhydraten erschwert ist; von Pflanzen kin nur Pilze Harnstoff bilden. Das weitere Schicksal von Harnstoff u. Asparag i verschieden; jenes wird ausgeschieden, dieses als Reserve-N gestapelt. Isc Unterschied hat aber seine prinzipielle Bedeutung verloren, seitdem man auc b tier. Organismen die Fähigkeit beobachtet hat, das NH_3 mit Keto- u. Oxyssäu z Aminosäuren zu binden. Bei Ggw. des entsprechenden N-freien Materials brauch auch der tier. Organismus NH_3 nicht als Harnstoff auszuschcheiden, sondern ka von neuem mit unoxydierten C-Ketten verbinden, wie es gewöhnlich im Pflaer organismus geschieht. (Biochem. Ztschr. 150. 407—23. 1924. Moskau, Landw. ta Petrowsko-Rasumowskoje.) Wor.

Hans Lieb, *Cerebrosidspeicherung bei Splenomegalie, Typus Gaucher*. it Mitwirkung von **M. Mladenović**. In Weiterführung der von EPSTEIN (Bio Ztschr. 145. 398; C. 1924. I. 2384) begonnenen Unters. des alkoh. Extrakte d Milz von Gaucherkranken gelang es durch Zusatz von kaltgesätt. alkoh. HgCl_2 zu dem bei 40° erhaltenen A.-Extrakt eine Fraktion abzutrennen, die sich ac Zerlegung mit H_2S ident. mit *Kerasin*; $\text{C}_{47}\text{H}_{91}\text{O}_8\text{N}$, erwies. Ausbeute ca. 8,5% d Milztrockenpulpers. Eine kleine Menge (ca. 1,5%) dieses Körpers findet sich in der Siedefraktion des A.-Auszuges. Krystalle aus A., F. (Klärungspunkt) 83 nach Erweichen 175°. Aus Essigäther Klärungspunkt 180°, sl. in CH_3OH A Aceton, Chlf. u. Bzl., unl. in Ä. Mit konz. H_2SO_4 erst gelb, dann purp [α]_D wechselt stark je nach der Konz. u. Lösungsmm.: in 4,115% ig. alkoh. [α]_D⁵⁹ = -4,52°, in 3,023% ig. Chlf. Lsg. [α]_D⁵⁸ = -9,37°, in 2,723% ig. Lsgv Chlf. + 10% Pyridin [α]_D⁵⁷ = -10,99°. Mol.-Gew. nach RAST gefunden 80 Bei der Hydrolyse mit methylalkoh. H_2SO_4 entstanden die von THERFER (ABDERHALDENS Handb. d. biolog. Arbeitsmeth., Abt. I, T. 6, 160) beschrieb Spaltprodd.: Lignocerinsäure, Sphingosin u. d-Galaktose. Aus dem analoge gestellten A.-Auszug der n. Milztrockensubstanz konnte mit HgCl_2 nur ein geng Nd. erzielt werden, aus dem sich kein Kerasin isolieren ließ, so daß feststeht sich die Gauchermilz durch den abnorm hohen Kerasingehalt kennzeichnet. (Zeh f. physiol. Ch. 140. 305—13. 1924. Graz, Univ.) GUGGENHEI.

Goldscheider und R. Ehrmann, *Untersuchungen über den Temperatursinn. Über die Einwirkung von Kohlensäure und Sauerstoff auf die Wärmennerven. Regelmäßige Angaben über die chem. Reizwrkg. der CO₂ u. des O₂ auf die Wärmennerven u. über den Einfluß der Feuchtigkeit bei diesen Gasen u. der Luft.* (PFLÜGERS Arch. d. Physiol. **206**. 303—7. 1924. Berlin, Univ.) WOLFF.

Goldscheider und H. Hahn, *Untersuchungen über den Temperatursinn. II. Die chemische Reizung und Lähmung der Temperaturnerven. Schichtungstheorie. Paradoxe Wärmeempfindung. Hitzeempfindung.* (I. vgl. vorst. Ref.) Die chem. Stoffe, welche die Wärmennerven (druck- u. schmerzleitenden) Nerven der Haut reizen, erregen, zum Teil in ähnlichen Verhältnissen, auch die Temperaturnerven, welche in ihrer spezif. Qualität unterscheiden. Einige Stoffe erregen die Temperaturnerven stärker als die übrigen Wärmennerven mit individueller Affinität zu den Kälte- bzw. Wärmennerven. Bei Schnittwunden tritt die Reizung der Temperaturnerven schneller ein als bei oberflächlicher Anwendung. Bei intracutaner Einverleibung tritt die reizende Wrkg. die lähmende zurück. Die chem. Reizung betrifft neben den leitenden Nervenfasern auch die in den Endapp. enthaltenen oder diesen zunächst liegenden. Percutane Injektion von Chloroformwasser, Stovain, 8%ig. NaCl-Lsg., Kataphorese von 1%ig. Cocainlsg., percutane Anwendung von Eg. u. Chlf. lähmen die Kälte- u. Wärmennerven stärker als die Wärmennerven, ohne jedoch ausschließlich Kälteanästhesie hervorzubringen. Die Lehre von der Schichtung der Kälte- u. Wärmennerven steht zu den Verss. in Widerspruch; die Endigungen liegen in der gleichen Schicht. Die paradoxe Wärmeempfindung ist eine ebenso regelmäßige Erscheinung wie die paradoxe Kälteempfindung. (PFLÜGERS Arch. d. Physiol. **206**. 308—24. 1924. Berlin, Univ.) WOLFF.

Goldscheider und G. Joachimoglu, *Untersuchungen über den Temperatursinn. III. Über die Wirkung von Chlorderivaten des Methans, Äthans und Äthylens, sowie einiger anderer Stoffe auf die Hautnerven.* (II. vgl. vorst. Ref.) Geprüft auf: CH₃Cl₂, Chlf., CCl₄, CH₂Cl·CH₂Cl, CH₃·CHCl₂, CHCl₂·CHCl₂, CCl₃·CHCl₂, CCl₃·CHCl, CHCl·CHCl: CCl₂, CCl₂: CCl₂. Alle rufen eine spezif. Reizung der Temperaturnerven u. der taktilen bzw. Schmerznerven hervor. Die beobachteten Temperaturempfindungen können nicht physikal. erklärt werden. Ob zuerst Kälte- oder Wärmeempfindung auftritt, hängt von der Kälte- bzw. Wärmeempfindlichkeit der betreffenden Hautstelle ab. Je niedriger der Kp., um so schneller tritt die Wrkg. ein. Die ungesätt. Äthylenderivv. sind wirksamer als die Methan- u. Äthanderivv. NH₃, NaOH, Menthol, Ä., A., Campher in Ä. gel., Cantharidin, Senföl, Chloroform reizen gleichfalls die Temperaturnerven. — Das Vermögen, in die Haut einzudringen, ist bei den verschiedenen Verbb. verschieden. (PFLÜGERS Arch. d. Physiol. **206**. 325—36. 1924. Berlin, Univ.) WOLFF.

Go Banderati, *Einwirkung der Alkohole auf die erregbaren motorischen Rinden des Hundes.* Auf die freigelegte Hirnrinde von Hunden wird nach dem Verfahren von BAGLIONI u. AMANTEA 1%ig. Strychninlsg. appliziert. Nach dem Sichtwerden des Krampfes wird die mit Strychnin getränkte Scheibe entfernt u. auf das entsprechende Zentrum mittels eines Wattebauschs ein Alkohol gegeben. Methyl-, Propyl-, i-Butyl-, Amyl-, Allyl- u. Caprylalkohol zeigen eine vorübergehende krampferregende Wrkg. Nach Entfernung des mit dem Alkohol getränkten Wattebauschs tritt der Krampf wieder, jedoch schwächer. — Bei experimenteller Epilepsie des Hundes (nach AMANTEA) wirken tägliche subcutane Injektionen von 1 cem Ä. 1 Woche lang fortgesetzt, in leichten Fällen verstärkend, in stärker vorliegenden Fällen antiepileptisch; die Einw. des Ä. muß demnach eine mittelbare Wirkung auf das kranken Wesen jedoch vorläufig nicht erklärt werden kann. (Atti R. Accad. Lincei, Roma [5] **33**. II. 201—2. 1924.) ZANDER.

Carlo Mannella, *Die Einwirkung des Strychnins auf das Fortleben des präparierten Nervenzentrums.* (Vgl. vorst. Ref.) Vf. beobachtet die Dauer des Fortlebens (Sichtbarwerden von Reflexbewegungen) der nach der Methode von BACCHETTI präparierten Nervenzentren von *Bufo vulgaris*. Applikation von 0,5%ig. Strychninlösung wirkt im allgemeinen verlängernd. (Atti R. Accad. dei Lincei, Roma [5] **33**. II. 204—5. 1924. Rom, Univ.) ZANIB.

Carlo Petacci, *Die Einwirkung des Äthylalkohols auf das Fortleben des präparierten Nervenzentrums.* (Vgl. vorst. Ref.) Bei präparierten Zentren von *Bufo vulgaris*, die in NaCl-Lsg. u. 0,1—0,4%ig. A. gehalten wurden, waren keine wesentlichen Einflüsse zu beobachten. Das Fortleben der präparierten Zentren sank mit steigendem A.- u. sinkendem NaCl-Gehalt abzunehmen. Ein verhältnismäßig langes Fortleben zeigte ein in 0,5%ig. NaCl-Lsg. u. dann in 1%ig. A. gehaltenes Präparat. Unmittelbar nach dem Übergang aus der NaCl-Lsg. in die alkoholische zeigte sich ein Anstieg der Reflexfähigkeit, welche stufenweise schnell bis zur Höhe oder allmählich bis zum Verschwinden abnahm. (Atti R. Accad. dei Lincei, Roma [5] **33**. II. 205—6. 1924.) ZANIB.

Palmira Tavoraro, *Die direkte Einwirkung des Strychnins und verschiedener Alkohole auf das präparierte Nervenzentrum.* (Vgl. vorst. Ref.) Direkte Applikation von Methyl-, Äthyl-, Propyl-, i-Butyl- u. Caprylalkohol auf die Oberfläche des Nervenzentrums posterior des präparierten Nervenzentrums von *Bufo vulgaris* bewirkt eine depressive Wrkg., die sich bis zur vollständigen Unreizbarkeit des Zentrums steigern kann, besonders bei Präparaten, die vorher mit Strychnin behandelt wurden. Die Unreizbarkeit verschwindet langsam einige Std. nach der Applikation. — Das Fortleben von n. u. mit Strychnin behandelten Zentren wurde durch Methyl-, Äthyl-, Propyl- u. i-Butylalkohol verlängert, durch Allyl- u. Caprylalkohol verkürzt. (Atti R. Accad. dei Lincei, Roma [5] **33**. II. 206—8. 1924. Rom, Univ.) ZANIB.

Lucien Brouha und Henri Fredericq, *Die vasodilatatorische Wirkung von Aminosäuren auf isolierte Arterienschnitte.* (Vgl. BROUHA, C. r. soc. de biologie 1924. 634; C. 1924. II. 207.) Die wirksamen Aminosäuren bewirken Verminderung des Arterientonus sowohl an peripheren Arterien (Femoralis, Carotis), als auch an visceralen (Renalis). Die gefäßerweiternde Wrkg. in isolierten Organen läßt sich danach zu gutem Teile auf derartige Beeinflussung der Arterien zurückführen. Ob die Wrkg. sich auch auf Capillarnetz u. Venen erstreckt, bleibt noch zu prüfen. (C. r. soc. de biologie **91**. 1169—71. 1924. Liège, Inst. LÉON FREDERICQ.) SPGL.

E. Keeser, *Zur Kenntnis der Wirkungen undissoziierter Arzneimittel.* (Vgl. Biochem. Ztschr. **144**. 536; C. 1924. I. 1829.) Phenol, eine schwache Säure, ist im sauren Bakterienvers. im Sauren, also bei zurückgedrängter Dissoziation, stärker wirksam als im Alkalischen. Die Phenylschwefelsäure ist außerordentlich wenig giftig. Das Ergebnis, daß die undissoziierten Stoffe wirksamer sind als die dissoziierten, steht in einem weiten Grenzen gültiges Prinzip darzustellen (z. B. Chininalkaloide, Guaidin, Trypaflavin). Die Aufnahme dieser undissoziierten Gifte erfolgt durch die elektrophile Wrkg. der Oberflächenaktivität im Zusammenhang mit der Erniedrigung der Löslichkeit. Indessen brauchen die Stoffe nicht oberflächenaktiv oder schlecht löslich zu sein; in diesem Falle handelt es sich nicht um eine unspezif. Adsorption, sondern um spezif. chem. Wrkgg. Ferner können die undissoziierten Moll. zu griechischen Komplexen von der Ladung des hochmolekularen Ions sich assoziieren; auf diese Weise kommt eine elektropolare Adsorption zustande, die dann zu einer beschränkten starken Anreicherung an der Oberfläche führt. (Biochem. Ztschr. **150**. 51—2. 1924. Berlin, Univ.) WOLF.

E. J. Lesser, *Der Gaswechsel der Maus nach Injektion von Zuckerlösung und Insulin.* Die Abnahme der Oxydationsgeschwindigkeit bei Mäusen nach Insulin tritt nur nach großen Dosen auf. Insulindosen, die die Oxydationsgeschwindigkeit

mehr verändern, als Zuckerinjektion allein es tut, steigern deutlich den Quotienten. Berechnung des verbrannten Zuckers auf Grund des respiratorischen Quotienten ergibt, daß die Zuckerverbrennung bei großen Insulindosen langverläuft als bei kleinen, obwohl in diesem Falle der durch chem. Analyse nachweisbare Zucker (bei Berücksichtigung des Glykogengehaltes) schneller abwindet. Außer Verbrennung des Traubenzuckers u. Glykogensynthese muß noch einen Vorgang geben, der unter Insulinwrkg. zum Verschwinden von Traubenzucker führt. Die von BISSINGER, LESSER u. ZIPF (Klin. Wchschr. 2. C. 1924. II. 77) gezogene Schlußfolgerung, daß Insulin die Traubenzuckerabfuhr beschleunige, ist durch den Respirationsvers. bestätigt worden. (Biochem. Ztschr. 153. 39—60. 1924. Mannheim, Städt. Krankenanstalten.) WOLFF.

Emil Abderhalden und Ernst Wertheimer, *Studien über den Einfluß der Ernährung auf die Wirkung bestimmter Inkretstoffe. II. Insulin- und Adrenalinwirkung bei verschiedenartig ernährten Tieren.* (I. vgl. PFLÜGERS Arch. d. Physiol. 205. 439; C. 1924. II. 500.) Kohlenhydratfrei ernährte Ratten reagieren bei gutem Nahrungszustand auffallend schwächer auf Insulin als reichlich mit Kohlenhydraten ernährte Tiere. Das wird bewiesen durch Verfolgung des äußeren Verh. der Tiere während der Temperaturkurve, durch Best. des Blutzuckers, dessen Wert beim kohlenhydratfrei ernährten Tier viel weniger sinkt als beim gemischt ernährten Tier, während der Gaswechselverss.: die CO₂-Produktion sinkt beim kohlenhydratfrei ernährten Tier viel weniger als beim gemischt ernährten Kontrolltier. Dagegen antworten kohlenhydratfrei ernährte Ratten auf Adrenalin mit einer stärkeren Hyperglykämie als die mit reichlich Kohlenhydraten gefütterten Tiere. Die Steigerung des Blutzuckers auf Adrenalin tritt nur bei gemischt ernährten Ratten ein; bei kohlenhydratfrei ernährten Tieren ist sie entweder gar nicht zu beobachten, oder nur ein geringer Anstieg. Der Temperaturwechsel sinkt sogar. Bei gemischter Ernährung hält die Wärmeregulation länger stand als bei kohlenhydratfreier Kost, bei der die Tiere bei Überhitzung durch Unterkühlung früher starben als bei gemischtem Futter. Bei Versagen der Wärmeregulation finden wir bei Überhitzung eine ausgesprochene Hyperglykämie, bei Unterkühlung eine Hypoglykämie. (PFLÜGERS Arch. d. Physiol. 205. 547—58. 1924. Halle, Verh. d. Ges. f. exp. Med.) WOLFF.

Emil Abderhalden und Ernst Wertheimer, *Studien über den Einfluß der Ernährung auf die Wirkung bestimmter Inkretstoffe. III. Insulin- und Adrenalinwirkung bei Verabreichung „saurer“ bzw. „basischer“ Nahrung.* (II. vgl. vorst. Ref.) Ratten mit saurer Nahrung (Hafertiere) reagieren auf Insulin weit schwächer als mit basischer (Grünfüttertiere), gemessen an der Blutzuckersenkung, reagieren auf Adrenalin mit einer ausgesprochen stärkeren Hyperglykämie als die mit saurer Nahrung ernährten. Die Alkalireserve ist bei Hafertieren gegenüber den Grünfüttertieren deutlich herabgesetzt. Die Blutkörperchensenkungsgeschwindigkeit ist bei alkalischen Tieren viel größer als bei den „sauren“. Die Kohlenhydrate u. die Eiweißstoffe der Nahrung, die Rk. im Organismus nach der einen oder anderen Seite zu machen, können wir als Regulatoren der Insulin-Adrenalinwrkg. auf den Blutzucker ansprechen. (PFLÜGERS Arch. d. Physiol. 205. 559—70. 1924. Halle, Verh. d. Ges. f. exp. Med.) WOLFF.

E. de Jongh, *Über die Konzentrationswirkungskurve des Insulins und über die Wirkung von Antidiabetika.* Vf. hat festgestellt, daß das gleiche Insulinpräparat bei verschiedenen Konzentrationen verschiedene Wirkungen besitzt. Zur Erklärung wird in der Abhandlung ein zweiter, entgegengesetzt wirkender (Blutzucker erhöhender) Stoff angenommen, der in höheren Konzentrationen wirksam wird (Antidiabetin) u. erhebliche Unterschiede in der Kaninchenwirksamkeit u. der klin. Wirksamkeit der betreffenden Präparate bedingen kann. Die Konzentrationswirkungskurve des Insulins scheint

geradlinig zu sein, die des Antiinsulins die Form einer Adsorptionskurve zu sitzen. (Nederl. Tijdschr. Geneeskunde 68. II. 2115—22. 1924. Amsterdam, Univ. S

R. Meissner, *Über Kombinationen sedativ wirkender Substanzen*. Am In bewirken *Bromalkalien* auch in größeren Dosen keinen Schlaf. *Urethan* ruft ei wesentlichen Erscheinungen hervor, bewirkt aber in größeren Dosen Benome heit u. Schwäche der Extremitäten, ebenso *Bromural*. Auch kleine *Scopolamin* gaben führen nicht zum Schlaf. Bei Mischung zweier dieser Substanz kleineren Dosen gab es nie einen sichtlichen Erfolg, dagegen bei größeren zwei eine verstärkte Wrkg., aber in der angedeuteten Richtung u. meist nicht n tiefen Schlaf; es war mehr eine summierte als eine potenzierte Wrkg. zu beoba Gegenüber *Scopolamin* schwankt die individuelle Empfindlichkeit stark; fied ungebrauchte Tiere vertragen es in größeren Dosen besser als schwache, kränk Mit *Narcein* war keine überzeugend hypnot. oder narkot. Wrkg. zu erzielen, u bei Menschen nicht. Bei Menschen konnte mit Kombinationen kleinerer os von Sedativis u. Hypnoticis oft Schlaf erzielt werden, z. B. durch *Bromul Kodein*, *Urethan* + *KBr*, *Bromural* + *Urethan* + *Aspirin*, *Urethan* + *Phenacet*. *Pyramidon*, *Bromural* + *Phenacetin*. (Ztschr. f. d. ges. exp. Medizin 43. 35—4 1924. Breslau, Univ.)

WOLF.

A. Koritschan, *Über das neue Sedativum Abasin*. *Abasin*, *Acetylbrodmid* *acetylcarbamid* der Farbenfabriken vorm. FR. BAYER & Co., ist nach de fahrungen des Vfs. als energ. wirkendes Beruhigungsmittel zu bezeichnen, da f von Nebenwrkgg. ist, besonders auch kein Müdigkeitsgefühl erzeugt. Vode nicht acetylierten *Adalin* hat es ferner den Vorteil besserer Löslichkeit. (ie klin. Wchschr. 37. 4 Seiten. 1924. Sep. Wien, FRANZ JOSEF-Ambulatorium.) p.

Ludwig Laband, *Über Abasin, ein neues Sedativum*. (Vgl. vorst. Ref.) u Vf. fand *Abasin* als eigentliches Sedativum bestens bewährt bei allgemein nebs Störungen aller Art, besonders auch bei Herzneurosen (auch bei Magen- u. ri neurosen). Ferner empfiehlt er die Anwendung bei nervöser Agrypnie, nerle Krampfhusten oder Schlaflosigkeit infolge Hustenreizes bei verschiedensten Luge erkrankungen. Für alle diese Fälle genügen in der Regel Gaben von 0,25; hartnäckigen Fällen zu wiederholen oder zu verdoppeln. Bei ausgesproch Basedowscher Krankheit wurden keine bemerkenswerten Erfolge gesehen E schwererer chron. Schlaflosigkeit waren Gaben von 0,5 bis 0,75 g erforderlich bi empfiehlt sich Kombination mit einem der üblichen Schlafmittel. Schwere leu krankheiten oder starke Blutdruckanomalien bilden keine Gegenindication. (Thap d. Gegenwart 65. 1 Seite. 1924. Sep. Tegel-Berlin.)

SPIEL.

M. M. Ellis und Ö. W. Barlow, *Barbitursäurenarkose*. II. *Blutzucker und Bl gerinnungszeit während Barbitursäurehypothermie*. (I. vgl. ELLIS, Journ. lab and Exp. Therapeutics 21. 323; C. 1923. III. 1111.) Während der ersten St der Barbitursäurenarkose findet man bei Tauben u. Katzen eine Senkung de Bl zuckerspiegels, der bis zur 44. Stde. langsam zur Norm zurückkehrt. D G rinnungszeit ist anfangs verkürzt u. kehrt in der 20.—44. Stde. zur Norm zück Beide Kurven laufen etwa parallel miteinander. (Journ. Pharm. and Exp. 'er peutics 24. 259—64. 1924. Columbia, Univ. of Missouri.)

WOLF.

Erich Marcuse, *Erfahrungen mit dem neuen Lokalanästheticum Tucai* *Tutocain*, salzsaures Salz eines racem. *p-Aminobenzoyl-α-dimethylamino-β-thy γ-butanols*, in W. bis zu 15% mit neutraler Rk. I., ergab sich bei zahlre Operations als noch in sehr verd. Lsg. (1/3%) wirksames, ungiftiges u. har Lokalanästheticum. Es wurden weder irgendwelche örtliche Gewebsschädigge nach allgemein tox. Nebenwrkgg. beobachtet. (Dtsch. med. Wchschr. 50. 2 ite 1924. Sep. Berlin, RUDOLF VIRCHOW-Krankenh.)

SPIEL.

skar Wiedhopf, *Erfahrungen mit dem neuen Lokalanästheticum Tutocain bei chirurgischen Operationen.* (Vgl. vorst. Ref.) In Hautquaddelverss. sich Tutocain in $\frac{1}{5}$ - u. $\frac{1}{2}$ °ig. Lsgg. etwa doppelt so wirksam wie die Konz. von Novocain. Seine Wrkg. wird wesentlich gesteigert durch Zusatz 4% Kaliumsulfat. Trotzdem befriedigte $\frac{1}{8}$ °ig. Lsg. nicht, sondern wurde $\frac{1}{5}$ °ig. Lsg. mit oder ohne Adrenalin verwendet. Man erhält dann zuverlässige Anästhesie, dabei traten keinerlei Intoxikationserscheinungen auf, auch nicht bei hohen Lsgg. (Münch. med. Wchschr. 71. 6 Seiten. 1924. Sep. Marburg a. L.,

SPIEGEL.

ans Krebs, *Tutocain, ein neues Anästheticum und dessen Anwendung in der Heilkunde.* (Vgl. vorst. Ref.) Das Präparat hat sich zur subconjunctivalen subcutanen Injektion, meist auch zur Instillation durchaus brauchbar gezeigt. (1) Bindehautsack eingeträufelt, erzeugt es weder Druckschädigung am Auge noch Epithelschädigungen an der Cornea. Als Infiltrationsanästheticum ist es nach kleinen Mengen Suprarenin subconjunctival u. subcutan durchaus zuverlässig. Es werden 1—2°ig. Lsgg. benutzt. Die Wrkg. hält mehrere Std. an. (Münch. med. Wchschr. 71. 3 Seiten. 1924. Sep. Bonn, Univ.)

SPIEGEL.

Läwen, *Fortschritte in der Sakralanästhesie.* (Vgl. vorst. Ref.) Eine ganze Reihe von Operationen konnte nach extraduraler Einverleibung der „Normaldosis“ Tutocain (30 ccm 1°ig. Lsg. mit 0,4° Kaliumsulfat u. Suprarenin) gut ausgeführt werden, besonders bewährte sich die dadurch erreichte Anästhesie für Cystoskopie. Man kann danach auch an den Extremitäten weitgehende Hypästhesien eintreten lassen, die Beine u. Unterbauchgegend umfassende Beeinflussung wurde mit Leichtigkeit erreicht, aber doch für operative Zwecke nicht zuverlässig genug u. verbunden mit Allgemeinerscheinungen (Pulssteigerung u. Schweißausbruch). (Münch. med. Wchschr. 71. 1000—03. Sep. Marburg a. L., Univ.)

SPIEGEL.

ans Grimsehl, *Tutocain, ein neues Lokalanästheticum.* Die Anästhesie setzt sich ein u. geht tief. Verwendet wurden $\frac{1}{4}$ - oder $\frac{1}{2}$ °ig. Lsgg. mit oder ohne Zusatz von NaCl oder K₂SO₄ mit 1 Tropfen 1°ig. Suprareninlg. auf 1 ccm. Nicht selten traten störenden Nebenerscheinungen, auch nicht Schwellung u. Narkose. (Deutsche Zahnärztliche Wochenschrift 27. 3 Seiten. 1924. Sep. Berlin, Univ.)

SPIEGEL.

ritz Schlesinger, *Sipon, Hämorrhoidalzäpfchen „Bayer“.* Die Siponzäpfchen enthalten *dijodadipinsäures Bi* mit Zusätzen von Cycloform u. Gerbsäure. Sowohl adstringierende u. desinfizierende wie der schmerzstillende Effekt kommen zu. Die Wrkg. Wegen der völligen Ungiftigkeit sind die Zäpfchen nicht nur bei Hämorrhoidalleiden verwendbar, sondern auch in der Kinderpraxis als milde Mittel zur Verhärtung u. Kotverhaltung, ferner bei entzündlichen Erscheinungen der Perianalhaut, Schründen u. Erosionen des After, schmerzhafter Stuhlverhaltung, Mastdarmcarcinomen, Darmtuberkulose, Tenesmen, in der Schwangerschaft. Sie scheinen als Analgeticum bei Beschwerden von Kranken mit Ulcus ani nützlich zu sein. Hervorgehoben wird die Dauer der Wrkg. (Therapeut. Gegenwart 65. 2 Seiten. 1924. Sep. Stettin.)

SPIEGEL.

rassel, *Siponstuhlzäpfchen bei Hämorrhoiden.* Bestätigung der guten Wrkgg. (Vgl. vorst. Ref.). (Dtsch. med. Wchschr. 50. 1 Seite. 1924. Sep. Leipzig.)

SP.

phoepe, *Erfahrungen mit Jothion.* Das Präparat (Farbenfabriken vorm. F. Bayer & Co.) wird bei percutaner Anwendung sehr gut u. ohne irgendwelche Nebenwirkungen getragen. Die Resorption von Jod erfolgt rasch u. intensiver, dabei länger anhaltend als aus Jodtinktur oder 5°ig. KJ-Salbe. Da auf diese Weise rascher therapeut. Effekt u. volle J-Wrkg. zu erreichen ist, kommt die locale Anwendung von Jothion besonders auch als Ersatz peroraler Jodgaben

in Betracht. (Therapie d. Gegenwart 65. 3 Seiten. 1924. Sep. Breslau, f. d. Krankenh. Allerheiligen.) SPIEG.

Hans Kern, *Über Eldoform bei Säuglingsdiarrhöen*. Eldoformtabletten (BAYER & Co.) wurden mit Erfolg in den Fällen benutzt, wo bei Fütterungs-Heilmahlungen der Fortschritt nicht befriedigte, ferner prophylakt. bei drohender Dyspepsie. (Therapie d. Gegenwart 65. 1 Seite. 1924. Sep. Stuttgart-Waiblingen.) SPIEG.

Hans Hirsch, *Novasurol in der Herzpraxis*. Bericht über einen Fall, bei dem während eines ganzen Jahres der Kranke trotz immer wieder nachlassender Diät diese durch Gebrauch von Novasurol immer wieder in Gang brachte u. eine gewissen Grad von Kompensation der Herztätigkeit aufrecht hielt. (Therapie d. Gegenwart 65. 1 Seite. 1924. Sep. Charlottenburg.) SPIEG.

F. Scheid, *Über „Hexeton Bayer“ und seine Bedeutung für die chirurgisch-gynäkologische Praxis*. Es wurden je 1,2 ccm 1%ig. Lsg. intravenös u. 2,4 ccm 10%ig. Lsg. intramuskulär abwechselnd 3—4 mal täglich in der Prophylaxe- u. Therapie postoperativer Komplikationen mit promptem Erfolg verwendet. (Zentralblatt f. Chirurgie 1924. 794—97. Sep. Berlin-Lichtenberg, Städt. Krankenh.) SPIEG.

Erich Rominger, *Hexeton statt Campheröl in der Kinderpraxis*. (Vgl. vorst. Ref.). Es wird über Erfahrungen berichtet, nach denen Hexeton bei Kindern die volle Campherwrkg. zeigt u. dem Campheröl bzgl. Promptheit der Wrkg. auf den Kreislauf u. Atmung überlegen ist. (Münch. med. Wchschr. 71. 6 Seiten 1924. Sep. Freiburg, Univ.) SPIEG.

Oskar Löwinger, *Hexeton als Expektorans*. (Vgl. vorst. Ref.). Hexeton intramuskulär injiziert, in dieser Richtung besser als Campheröl u., wohl infolge seiner vollständigen Resorption, ohne die bei diesem auftretenden Belästigungen, wenn die Injektionen auch von nervösen Patienten oft schmerzlich empfunden wurden. (Wien. klin. Wchschr. 37. 3 Seiten. 1924. Sep. Wien, Allg. Poliklin.) SPIEG.

Emil Abderhalden und Ernst Gellhorn, *Weiterer Beitrag zur Kenntnis der Wirkungssteigerung von Adrenalin durch Aminosäuren*. (Vgl. PFLÜGERS Arch. d. Physiol. 203. 42; C. 1924. II. 497.) Am überlebenden Meerschweinchendarm wird die Adrenalinwrkg. durch aliph., homocycl. u. heterocycl. Aminosäuren (Konz. 1 : 25000—200000 gesteigert. Angewandt wurden Glykokoll, *D*-Alanin, *D*-Leucin, 3-Dihydro-*l*-tyrosin, *l*-Tyrosin, *D*-Tyrosin, Histidin, Tryptophan, Glutaminsäure, Pyrrolidincarbonsäure u. Prolin. Die Wirkungssteigerung äußert sich in einer gegenüber dem Kontrollvers. verstärkten Herabsetzung des Tonus u. Lähmung der automat. Kontraktionen. Die Wrkg. ist völlig reversibel. Auch am Vasa blüterorgan ist die im stereochem. Bau der Aminosäuren begründete opt. Aktivität auf die Stärke der Rk. ohne Einfluß. Während Glutaminsäure in deutlicher Weise die Adrenalinwrkg. verstärkt, ist sein Anhydrid, die Pyrrolidincarbonsäure, in jedem Einfluß auf die sympath. Endapp. (PFLÜGERS Arch. d. Physiol. 206. 15—17. 1924. Halle, Univ.) WOIF.

W. R. Heß und K. v. Neergaard, *Die Beziehungen der Acetylcholinwirkung des Skelettmuskels zur Einzelzuckung und zum Tetanus*. Am künstlich durchströmten Froschmuskel gibt Einw. von Adrenalin sehr unsichere Resultate. Acetylcholinvergiftung anlaßt eine Verkürzung vom Ausmaß einer maximalen Einzelzuckung. Atropin hemmt die Acetylcholincontraktur reversibel. Atropin beeinflusst auch den Verlauf der Einzelzuckung (vgl. aber RIESSER u. NEUSCHLOSZ, Arch. f. exp. Path. u. Pharmacol. 91. 342; C. 1922. I. 512). Wegen der hohen Konz. verbietet sich eine direkte Bezugnahme des Acetylcholineffektes auf parasymph. Innervation des Skelettmuskels. Einzelzuckung u. Acetylcholinverkürzung superponieren sich. (PFLÜGERS Arch. d. Physiol. 205. 506—17. 1924. Zürich, Physiol. Inst.) WOIF.

Lecloux, *Untersuchungen über den Einfluß der Fette auf den Teerkrebs bei Maus*. Wurden zwischen die Behandlungen mit Teer solche mit Lsg. von ölna Na eingeschoben, so wurde das Auftreten von Papillomen sehr verzögert. von freier Ölsäure in Bzl. scheint ebenso zu wirken. (C. r. soc. de biologie 55—57. 1924. Liège, Univ.)

SPIEGEL.

Freund, *Zur Kieselsäurebehandlung der Lungentuberkulose*. Nachdem Vf. von der guten Resorbierbarkeit des *Silistrens* (Kieselsäuretetraglykolesters) erugt hatte, hat er es bei einer Anzahl Lungentuberkulöser angewendet u. bei den Patienten, bei denen die Erkrankung produktiv-cirrhot. oder rein cirrhot. charakter hatte, günstige Beeinflussung der subjektiven u. objektiven Symptome stellt. (Therapie d. Gegenwart 65. 2 Seiten. 1924. Sep. Neukölln, Städt. enh. Hasenheide.)

SPIEGEL.

Dios, *Versuche der Behandlung von „mal de caderas“ durch Bayer 205*. Experimentell erzeugte Erkrankungen führten in 1 Falle beim Pferd zum Tode des chstieres, anscheinend infolge von allzulangen Injektionspausen mit Bayer 205. In anderen Falle erhielt ein infiziertes Pferd 4 g Bayer 205 intravenös, dann nach 70 ccm Blut aus dem ersten Vers. u. war dann trypanosomenfrei, ebenso und nach einer einzigen Injektion von Bayer 205. Auch bei einer Präventiv- elon an Hunden überstanden dieselben gut eine nachträgliche Infektion, und infizierte Kontrollhunde eingegangen sind. (C. r. soc. de biologie 91. 233. 1924. Buenos Aires, Bakteriolog. Inst.)

TENNENBAUM.

Robert Lévy, *Über den Mechanismus der Hämolyse durch das Skorpionengift. Vergleich mit anderen Giften*. Ganz analoge Ergebnisse wie mit dem Gifte des Sandfußes (C. r. d. l'Acad. des sciences 177. 1326; C. 1924. I. 687) u. in- sen auch in Bestätigung von Angaben BELFANTIS mit dem Gifte der Bienen. Vf. auch mit demjenigen des Skorpions *Heterometrus maurus*. (C. r. d. sciences 179. 1093—95. 1924.)

SPIEGEL.

G. Analyse. Laboratorium.

Mayer, *Nutsche aus Porzellan für warm oder kalt zu haltendes Filtriergut*. Nutsche besitzt hohle Wandungen mit Zu- u. Abflußleitung für h. W. oder k. W. Zu beziehen durch Porzellanfabrik PH. ROSENTHAL & Co., A.-G., Markt- v. i. Bayern. (Ztschr. f. angew. Ch. 37. 945. Frankfurt a. M. 1924.) JUNG.

Puschin und J. Grebenschtschikow, *Über die Anwendung der pyro- metrischen Methode zur Untersuchung von Gleichgewichten bei hohen Drucken*. (Vgl. Chem. Soc. London 123. 2721; C. 1924. I. 462.) Die Best. der Krystalli- sationstemp. bei hohem Druck vermittelt einer näher beschriebenen pyrometr. Vor- richtung bietet verschiedene Vorteile vor der manometr. Methode. Es genügt nur 1—2 g Substanz notwendig u. die nur kurze Zeit dauernde Unters. ge- schieht gleichzeitig die Best. der Krystallisationstemp. bei verschiedenem Druck, die Abschätzung der Veränderung der Krystallisationswärme mit dem Druck u. die Best. von Gleichgewichten in mehrkomponentigen Systemen. Vff. untersuchen *Trimethylcarbinol*, *Urethan*, *p-Toluidin*, *Bzl.*, *Phenol*, *p-Nitroanisol* u. *Trimethylcarbinol*. Die erhaltenen Versuchsergebnisse werden tabellar. u. graph. wieder- gegeben. (Ztschr. f. physik. Ch. 113. 57—78. 1924. Petrograd, Elektrotechn.

ULMANN.

P. Carman, *Eine Elektrometernmethode für die Messung der Dielektrizitäts- konstanten von Flüssigkeiten*. Vf. beschreibt die elektr. Schaltungen des benutzten Elektrometers u. leitet die für die Best. der DEE. erforderliche Formel ab. Die Messung ergab für die DE. von destilliertem W. bei 25° den Wert 78,07. (Physical Review [2] 24. 396—99. 1924. Univ. Illinois.)

K. WOLF.

W. U. Behrens und C. Drucker, *Eine neue Methode zur Bestimmung der spezifischen Wärme von Metallen*. Nach einer geschichtlichen Einleitung beschreibt Vf. die von ihnen angewandte Apparatur zur Best. der spezif. Wärme von Metallen u. diskutieren die Methode. Ein dünner Metalldraht wird im Vakuum auf konstante Temp. erhitzt, dann eine bestimmte elektr. Energie zugeführt, u. die bewirkte Temperaturerhöhung durch Messung des Widerstandes vor u. unmittelbar nach dem Erhitzen ermittelt. Auf die Wärmeverluste wird durch nochmalige Widerstandsmessung kurze Zeit nach dem Heizversuch geschlossen. Nach einer zweiten Messung wird ein Versuchsdraht, der auf Zimmertemp. bleibt, von demselben Strom durchgeflossen u. die Differenz der relativen Widerstandsänderungen gemessen. Die Berechnung der spezif. Wärme nötige Kenntnis des Temperaturkoeffizienten des Widerstandes wird durch Widerstandsmessungen des Versuchsdrahtes bei verschiedenen Temp. gewonnen. Des näheren untersuchen Vf. das Zn zwischen 0—225°, es treten keinerlei Anomalien auf, gleich ob harte oder weiche, oder schnell oder langsam gekühlte Drähte verwendet werden. Der vermutliche Umwandlungspunkt des Zn zwischen 100 u. 200° ließ sich demnach nicht nachweisen. (Ztschr. f. physik. Ch. **113**. 79—110. 1924. Leipzig.) ULMAN.

O. Scarpa, *Methode zur Messung des inneren Widerstandes von Batterie- und Akkumulatoren*. (Annali Chim. Appl. **14**. 306—9. 1924. Turin, Politecn.) ZADLER.

H. Rheinboldt, *Einfache Apparate zur thermischen Analyse*. Vf. beschreibt (Abbildungen im Original) eine Vereinfachung des von SCHEUER (Ztschr. f. physik. Ch. **72**. 518; C. **1910**. II. 1) verwendeten App. u. eine Modifikation, die das Erhitzen eines trocknen Gasstroms bei feuchtigkeits- oder luftempfindlichen Substanzen ermöglicht. (Ztschr. f. angew. Ch. **37**. 960—61. Bonn a. Rh. 1924.) JUG.

Elemente und anorganische Verbindungen.

N. Tananajew, *Qualitative Analyse der Elemente der I.—III. Gruppe in ihrer gemeinschaftlichen Gegenwart mit besonderer Berücksichtigung der Tüpfelanalyse*. Die Analyse erstreckt sich auf die Elemente: Ag, Hg, Pb, Bi, Cu, Al, Fe, Mn, Cr, Zn u. Cd. Der Nachweis dieser Elemente ist auf zwei Arten möglich. I. Jedes Element kann in Ggw. von anderen nachgewiesen werden, ohne dass ein systemat. Analysengang zu benutzen. Nur in einigen Fällen (Zn, Cd) ist eine vollständige Zuteilung der zu prüfenden Elemente nötig. Vf. nennt sein Verf. fraktionierte Analyse. Die Lsg. muß die salpetersauren Salze enthalten. Fe^{II} u. Hg^I nass zu Fe^{III} u. Hg^{II} oxydiert werden. Dauer einer Analyse etwa $\frac{3}{4}$ Stdn. H₂SO₄ nicht verwandt. II. Die Elemente werden als Sulfide bzw. Hydroxyde gefallt auf Grund verschiedener Löslichkeit in verschiedenen starken Säuren in einzelnen Gruppen zerlegt u. dann getrennt nachgewiesen. Dauer der Analyse 1½—2 Stdn. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. **140**. 320—34. 1924. Kiew.) GOTTFRED.

P. Saccardi, *Vereinfachungen in der qualitativen Untersuchung einiger Kationen*. Vf. beschreibt ein neues Verf. für die qualitative Trennung der Elemente der Schwefelwasserstoffgruppe. In der zweiten Untergruppe werden Pb u. Bi auf den bisher üblichen Methoden entfernt; Cu u. Cd werden auf Grund ihres Verhaltens dem Fe gegenüber getrennt. Der elektrolyt. Lösungsdruck des Fe steht zwischen denen von Cu u. Cd; Fe verdrängt aus der blauen sauren Lsg. Cu, aber nicht Cd. Nach vollständiger Entfärbung wird die Lsg. verd. u. Cd mittels H₂S gefällt. In der ersten Untergruppe werden As, Au u. Pt wie üblich entfernt, H₂S auf der Lsg. entfernt u. zu der salzsauren Lsg. etwas metall. Mg hinzugefügt. Eiweiß der Lsg. wird mit HgCl₂ versetzt, besser noch kocht man in stark salzsaure Lsg. mit etwas As₂O₃. Im ersten Falle erhält man mit Sn einen Nd. von Hg₂Cl₂ metall. Hg, im zweiten Falle einen dunklen Nd. von metall. As (BETTENDORF). Einen anderen Teil der Sn u. Sb enthaltenden Lsg. versetzt man mit einem bloßen

an Chlorwasser, wodurch SnCl_2 in SnCl_4 übergeht u. Sb als wasserunl. Nd. von Sb_2O_3 ausfällt. (Annali Chim. Appl. 14. 303—5. 1924. Camerino, ZANDER.

Aedonitzki, Zur Frage über die Bestimmung der Schwefelsäure bei Anwesenheit von Aluminium. I. Bei Ggw. von Al^{+++} ergibt die Best. von SO_4^{--} , als zu niedrige Werte. Vf. fand, daß der Verlust mit der Konz. des Al -Salzes zunimmt, wenn die Fällung in der Siedehitze vorgenommen wurde; abnimmt, wenn die Fällung in der Kälte zu umständlich ist, versuchte Vf. die umgekehrte Fällung, bei welcher das zu analysierende Gemisch von AlCl_3 in W. zu einer BaCl_2 -Lsg. zugesetzt wurde. Dabei erhält man zu SO_4^{--} , der Überschuß nimmt mit der Konz. des AlCl_3 zu. Die verwendeten Substanzen enthielten: H_2SO_4 8,7—8,8 g/l; $\text{AlCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 66 g/l; $\text{BaCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 60 g/l; 17% HCl . (Transact. Inst. Pure Chem. Reagents. 1924. Nr. 3. 35—44. [Russ.] BIKERMAN.

M. Litterscheid und H. Löwenheim, Über die qualitative und quantitative Bestimmung des Natriumdithionats. Qualitativ ist das Natriumdithionat des Handels, dessen W.-Gehalt nicht immer der Formel $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_6 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ entspricht, auf SO_4^{--} , Cl^- , CO_3^{--} , Ca^{++} , Ba^{++} , Mg^{++} u. andere Metallionen zu prüfen. Nachdem die Reinheit des Salzes sichergestellt ist, wird zur quantitativen Best. von seinem Zerfall in Na_2SO_4 Gebrauch gemacht, indem entweder gewichtsanalyt. Na_2SO_4 oder maßanalyt. bestimmt wird. Die W.-Abgabe beginnt bei 60° , bei 100° wird das W. vollständig abgegeben. SO_2 -Abspaltung setzt bei 200° ein u. vollzieht sich bei 240° bis 260° schnell vollständig. (Chem.-Ztg. 48. 881—83. 1924.) JOSEPHY.

Algar Beyne, Titrimetrische Zinkbestimmung. (Vgl. Bull. Soc. Chim. Belgique 1933; C. 1924. II. 1832.) Vf. weist darauf hin, daß bei der Titration des Zinkes nach dem Schaffner-Verf. nicht immer eine korrekte Bezeichnung des Verf. angegeben wird, da das Schaffnersche Verf. vielfach von anderen Autoren abgeändert worden ist. Die Unterschiede u. Bezeichnungen der angewandten Methoden (belg. Verf., französische Methode, deutsches Verf. u. Methode Vieille Montagne) werden erörtert. (Bull. Soc. Chim. Belgique 33. 507—16. 1924.) HABERLAND.

Carl Kieper, Verbesserte Maßanalyse für Bestimmung von Zink. Die Zn -Lsg. wird mit einem Überschuß von $\frac{1}{10}$ -n. Na_2S -Lsg. versetzt, nach Erwärmen filtriert, der Filtrat Na_2S in essigsaurer Lsg. mit J zurücktitriert. (Chem.-Ztg. 48. 893. JUNG. See

Lassieur, Elektrolytische Trennung des Kupfers, Antimons und Wismuts von Zinn. (Vgl. C. r. d. l'Acad. des sciences 178. 847; C. 1924. 1871.) Die elektrolyt. Trennung Bi-Pb wird in salpetersaurer oder salpeter-salzsaurer Lsg. (auf 100 Teile Lsg. 10 Teile Säure) in Ggw. von Hydroxylaminchlorhydrat als Reduktionsmittel mit einem Potential von 200—240 mV ausgeführt. Die Trennung Cu-Pb erfolgt bei 170 mV unter sonst gleichen Bedingungen ohne jede Schwierigkeit. SbCl_3 wird aus der Lsg. als schlecht haftender Nd. gefällt, mit 5-wertigem Sb ist die Fällung bei 20 mV gut, Pb scheidet sich auf der Pb-Kathode oder mit Sb bedeckten Kathode bei 350 mV ab. Bei Ggw. von mehr als 0,200 g Pb auf 100 ccm Elektrolyt fällt Sb Pb ein, u. die Trennung muß wiederholt werden. (C. r. d. l'Acad. des sciences 179. 632—34. 1924.) JOSEPHY.

Lassieur, Elektrolytische Trennung von Kupfer, Antimon, Blei und Zinn. Elektrolyt. Trennung von Cu, Sb u. Pb ist bereits beschrieben (vgl. vorst. Ref.). Ggw. von Sn fällt dieses in salzsaurer Lsg. mit Pb zusammen aus, eine Trennung ist ohne einfache Einstellung des Kathodenpotentials gelingt nicht. Die Trennung von Cu u. Sn erfolgt in flußsaurer Lsg., die mit Stannisalzen eine F-haltige Komplexe bildet, aus der das Sn nicht elektrolyt. niedergeschlagen wird. Bei Ggw. von Hydroxylaminchlorhydrat wird das Pb unter Benutzung des beschriebenen Verf. (II. 1. 37

App. (vgl. C. r. d. l'Acad. des sciences **177**. 1114; C. **1924**. I. 2387) mit Hilfspotential von 400 mV bei 60° in wenigen Min. abgeschieden, dann kühl auf 20° ab. Die Trennung ist nur genau, wenn weniger als 1,50 g Sn vorhanden sind. Zur Best. von Sn in der vom Pb befreiten Lsg. fügt man BaCl_2 u. Ammoniumoxalat, verd., erwärmt u. elektrolysiert mit einer Cu-Kathode. Ggw. von Sb Sn durch den Strom red. werden kann, so muß vor der Trennung von Pb die Lsg. mit H_2O_2 oxydiert werden, da Stannosalze mit HF keine Komplexe bilden. (C. r. d. l'Acad. des sciences **179**. 827—29. 1924.) JOSEPH

L. Bornet, *Einige Farbreaktionen des Kryogenins mit Schwermetallen*. Eine neutrale wss. Lsg. von Kryogenin, zweckmäßig noch etwas ungel. enthalten, folgende Färbungen: Mit Cu-Salzen lebhaftes Rot (bei geringen Mengen Rose), colorimetr. Best. von Cu verwendbar; mit Hg-Salzen pfirsichblütenfarbige Färbung, dann violetten Nd.; mit Fe^{III} -Salzen Braunrot. Diese Rkk. werden durch einen träglichen Zusatz von 1—2 Tropfen H_2O_2 -Lsg. verschärft. Bei Zusatz von zu viel Chromaten oder Dichromaten in stark salzsaurer Lsg. zu Kryogenin in Salzsäurestanz entwickelt sich weinrote Färbung. (Journ. Pharm. et Chim. [7] **30**. 358. 1924.) SPIEL

Paul H. M.-P. Brinton und **Arthur E. Stoppel**, *Untersuchungen über das Glühen von Niederschlägen*. II. Die Umwandlung von Molybdänsulfid in Oxid. Die Flüchtigkeit von Molybdäntrioxyd. (I. vgl. BRINTON u. PAGEL, Journ. Amer. Chem. Soc. **45**. 1460; C. **1923**. IV. 975.) Als höchste Temp., bei welcher Molybdän sicher ohne Verlust durch Verflüchtigung gegläht werden kann, wird annähernd 600° gefunden. Feuchtes, mit Schwefelwasserstoffwasser gewaschenes MoS_2 wird in einer Muffel, bestehend aus einem 50 cm Porzellantiegel, der auf seinem Boden eine Asbestplatte von 4 mm Dicke enthält, u. einem den Nd. enthaltenden aus einem Dreieck in dem äußeren hängenden, zweiten Tiegel, über einem Tirrillbrenner mit einer 12,5 cm hohen Flamme, deren Spitze 8 cm vom Boden der Muffel entfernt, vollständig in MoO_3 übergeführt werden. Oxydationsmittel sind dabei überflüssig. (Journ. Americ. Chem. Soc. **46**. 2454—57. 1924. Minneapolis [Minnesota], Univ. of Minn.) JOSEPH

Shin'ichi Aoyama, *Verfahren zur quantitativen Trennung von Platin und Iridium*. (The Science Reports of the Tôhoku imp. Univ. **12**. 365—92. 1924. C. **1924**. I. 1980.) JOSEPH

Organische Substanzen.

G. Tellera, *Quantitative Bestimmung des Mirbanöles*. Das Nitrobenzol wird aus dem zu untersuchenden Prod. abdest., dann zu Anilin reduziert, dieses durch Titration mit Br-Wasser bestimmt. (Boll. Chim. Farm. **63**. 657—58. 1924. Milano, Farmacia di Brera.) SPIEL

Allan Winter Rowe und **Edward Parkhurst Phelps**, *Ätheruntersuchungen*. II. *Quantitative Bestimmung von Peroxyd als Verunreinigung*. (Vgl. Journ. Ind. Engin. Chem. **16**. 896; C. **1924**. II. 2597.) Zur Best. von $(\text{C}_2\text{H}_5)_2\text{O}_2$ in Äthern empfehlen Vff. auf Grund ihrer Unterss. folgende (vorläufig beste) Methode: 10 ccm des zu untersuchenden Ä. werden versetzt mit 15 ccm einer 5%igen KI -Lsg. + KJ-Lsg. (United States Pharmacop. **1916**) + 15 ccm H_2SO_4 (aus 100 ccm H_2SO_4 D. 1,84 + 300 ccm W.) + 25 ccm Ä. (gereinigt nach GIRARD u. CUNLIFF) und nach mehrtägiges Stehenlassen von 11 95%ig. Ä. mit 3—4 g m-Phenylendiaminhydrat u. Fraktionieren, wobei nur die Mittelfraktion aufgefangen wird. Bei der Best. des freigemachten J durch Titration mit 0,1-n. $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$. Die Rk. ist zur Analyse sache nach 15 Min. beendet (Einzelheiten vgl. Tabelle im Original). Iren Sonnenlicht ist bei der Best. auszuschließen. Verunreinigung des Ä. mit CH_3CHO beeinflusst das Endergebnis der Titration nicht, 2% CH_3CHO ab

ndergebnis um etwa 0,003% Peroxyd. (Journ. Americ. Chem. Soc. **46**. 2078
35. 1924. Boston [Mass.], Evans Memorial.) HABERLAND.

Bestandteile von Pflanzen und Tieren.

Francis Charles Kelly und Alfred Dudley Husband, *Methode zur Bestimmung kleinster Mengen von Jod in biologischem Material*. Die Kendallsche Methode (vgl. Journ. Biol. Chem. **43**. 149; C. 1920. IV. 598) wurde mit kleinen Modifikationen geeignet befunden. (Biochemical Journ. **18**. 951—56. 1924. Aberdeen, WTT Res. Inst.) SPIEGEL.

Abriel Bertrand, *Beobachtungen über eine Mikrobestimmungsmethode des Siliciums und über den Gehalt gewisser Organe an diesem Metalloid*. ISAACS (Bull. Chim. Biol. **6**. 157; C. 1924. II. 2778) hat ein Verf. angegeben, darauf beruht, daß Silicomolybdat u. Phosphomolybdat durch Na_2SO_3 zu blauen Verbindungen umgewandelt werden, daß sich aber bei Erwärmen von Silicaten u. Phosphaten in der Lsg. mit NH_4 -Molybdat in Ggw. gewisser Konzz. von Essigsäure lediglich Phosphomolybdat bilden soll. Vf. weist zunächst darauf hin, daß die Rk. zwar sehr empfindlich ist, aber das Maximum erst allmählich erreicht, man daher zum colorimetrischen Vergleich mit einer älteren Fl. mindestens $\frac{1}{4}$ Stde. nach Zusatz des Sulfits warten muß. Der Unterschied in der Best. von Silico- u. Phosphomolybdat ist zu groß, um eine richtige Best. der Kieselsäure bei Ggw. von Phosphorsäure nach der Technik von ISAACS zu gestatten. Daher ist auch die Angabe desselben, daß die Probe besonders Si-reich sei, bei dessen hohem Gehalte an P zweifelhaft. (Bull. Chim. Biol. **6**. 656—58. 1924.) SPIEGEL.

John Addyman Gardner und Francis William Fox, *Eine kritische Untersuchung der Methoden zur Bestimmung von Cholesterin und seinen Estern in Geweben*. (I. vgl. GARDNER u. WILLIAMS, Biochemical Journ. **15**. 363; C. 1921. IV. 57.) Die jetzigen Unterss. betreffen die Fehlerquellen, die durch mangelnde Spaltung der Cholesterinester bei den verschiedenen Verseifungsmethoden entstehen. Verss. mit den Estern der Ölsäure, Palmitinsäure, Stearinsäure, Arachidinsäure u. Cerotinsäure rechtfertigen die Methode der Spaltung in äth. Lsg. mit überflüssiger alkoh. $\text{C}_2\text{H}_5\text{ONa}$ -Lsg. in der Kälte. Für die Vorbehandlung der Gewebe empfiehlt das Verf. von FEX (Biochem. Ztschr. **104**. 82; C. 1920. III. 159) bewährte Vorzüge der Cholesterylschwefelsäure werden durch alkal. Mittel nicht verseift, sondern nur durch Kochen mit Säuren. In solcher Form (u. das dürfte auch für Fettsäureester, die vielleicht vorkommen, gelten) vorhandenes Cholesterin kann sich also der Best. nach den üblichen Verff. entziehen. Das wie sonst behandelte Material muß dann mit Säure, z. B. Eg., einige Stdn. gekocht werden. Dann kann die Essigsäure abdest. oder neutralisieren, dann das verseifte Cholesterin extrahieren. (Biochemical Journ. **18**. 1058—69. 1924. St. GEORGES.)

SPIEGEL.

Shizuchi Kawahara, *Über eine neue Methode der quantitativen Pepsinbestimmung (Kongorotmethode)*. Die Methode beruht auf dem Farbenumschlag, den eine mit Kongorot versetzte $\frac{1}{2}\%$ ig. Lsg. von Eieralbumin (MERCK) mit einem $\frac{1}{8}$ — $\frac{1}{10}$ -n. Kongorotgehalt durch pept. Verdauung erfährt. Als Maß der pept. Wrkg. gilt die Kongorotkonz. des Pepsins, die noch einen deutlichen Umschlag in Blauviolett bewirkt. (PFLÜGERS Arch. d. Physiol. **206**. 360—68. 1924. Wien, Inst. f. allg. u. exper. Physiol.) WOLFF.

Shizuchi Kawahara und Oskar Peczenik, *Über eine Modifikation der quantitativen Pepsinbestimmung angegebenen Kongorotmethode zum quantitativen Nachweis von peptischen Fermenten*. Die Modifikation der im vorst. Ref. beschriebenen Methode besteht darin, daß auf Zusatz von HCl nach der Verdauungszeit ein

Farbenumschlag auftritt, welcher die stattgefundene Verdauung anzeigt. (Pfl. Arch. d. Physiol. 206. 369—72. 1924.) WO

R. Fabre und Détrois, Über die Ursache eines häufigen Fehlers bei der Bestimmung des Blutcalciums. Spektrosk. Unters. der nach den verschiedenen f Best. des Ca im Blute gebräuchlichen Verff. erhaltenen Ndd. von Ca-Oxalat stets die Ggw. von Mg. (C. r. soc. de biologie 91. 1127—28. 1924. Hôp. NECKEL

A. Baird Hastings und Julius Sendroy jr., Studien über Acidosis. XI. colorimetrische Bestimmung der Wasserstoffionenkonzentration des Blutes bei Temperatur ohne Pufferstandards. (XIX. vgl. CULLEN, Journ. Biol. Chem. 51. C. 1922. IV. 529.) Bei Benutzung von Paaren von Vergleichsröhrchen mit wechselnden Verhältnissen der alkal. u. sauren Form des Indicators kann Phenolphthalein pufferfreien Lsgg. an Stelle der Phosphatpuffer zur Best. der p_H -Werte in Blut oder Serum mit einer Fehlergrenze von $\pm 0,02$ benutzt werden. Innerhalb dieser gleichen Fehlergrenze stimmen die Ergebnisse der colorimetr. u. elektrometr. Best. an der gleichen Blutprobe überein, wenn beide Bestst. bei gleicher Temp. vorgenommen werden. Werden die Ablesungen am verd. Plasma bei Körpertemperatur geführt, so ist die von CULLEN (l. c.) für Bestst. bei Zimmertemp. angegebene Korrektur unnötig. (Journ. Biol. Chem. 61. 695—710. 1924. ROCKEFELLER Inst. med. res.) SPIEL

A. Grigaut, Colorimetrische Methode zur Lecithinbestimmung im Blut. untersucht den ätherl. Anteil der Blutphosphatide, die allgemein als Lecithine bezeichnet werden. Dabei wird der Lecithinphosphor in einem Salpeter-Schwefelsäuregemisch in Orthophosphorsäure umgewandelt [u. colorimetr. mittels der Methode von DENIGÈS bestimmt. — Die Reagentien, sowie die Technik der Best. werden näher geschildert. — Das Verf. arbeitete mit einer unteren Fehlergrenze von 3% . Der so bestimmte Lecithingehalt variiert normalerweise zwischen 1,7–1,9 g im l des menschlichen Serums u. beträgt in den Blutkörperchen 2,5 g im l. (C. r. soc. de biologie 91. 1014—17. 1924.) TENNENBERG

J. M. Oppelt Sans und R. Oppelt Sans, Praktische Bestimmung des Harstoffs im Urin. Ein neues Verfahren zur Bestimmung dieses Körpers. Statt NaBr wird mit KBr versetzte Chlorkalklsg. verwendet. (Quimica e Industria 1. 2: 1924.) SPIEL

Marie Walrand, Experimentelle Studie über die Ausscheidung des Cocains. I. Nachweis des Cocains bei toxiolog. Analysen verursacht große Schwierigkeit, da man es wegen der Zersetzlichkeit nur kurz nach der Einführung in den Organismus wieder finden kann. Nur das titrimetr. Verf. lieferte genaue Resultate. In per os oder hypodermat. genommene Cocain findet sich zum Teil in den Harn. Die ausgeschiedenen Mengen sind regelmäßig höher als nach hypoderm. Injektion. Im Harn zers. sich Cocain bei der Gärung schnell. Das per os gewonnene Cocain verschwindet schnell in den Verdauungsorganen. Hypodermat. angewendet in Form eines im Magendarmkanal einen Weg zur Ausscheidung. Seine Ggw. wurde in gleicher Weise im Speichel, im Auswurf u. in den Ausleerungen gefunden. In die Milch von Ziegen geht es nicht über. Nach dem Einnehmen kann es im Verdauungsorgan, Harnapparat u. in der Leber gefunden werden, nach subkutaner Anwendung in den meisten Eingeweiden. Das Nervensystem scheint es nicht zu fixieren. Die Galle von Tieren enthält ziemlich große Mengen nach subkutaner Anwendung. Im Organismus zers. es sich. Die Rkk. auf CH_3OH u. $C_6H_5 \cdot COOH$ genügen nicht, um auf eine Cocainvergiftung schließen zu können. Nur die Kennzeichnung der Ekgonins in den Prodd. u. analysierten Eingeweiden u. die Rekonstitution des Cocains daraus läßt mit Sicherheit die Ggw. dieses Alkaloids erkennen. (Ann. Pharm. de Belgique 6. 701—4. 717—25. 741—44. 757—66. 781—83. 1924.) Lüttich, Univ.) DRZE

Henry N. Jones, Mitteilung über *Cellobios* als differenzierenden Zucker für gewisse Bakterien. *Cellobios*, ein aus Cellulose durch Acetolyse u. Verseifung der gewonnenen Octaacetylverb. gewonnenes Disaccharid, kann nach den bisherigen zur Differenzierung gewisser Arten innerhalb der Gattungen *Escherichia* u. *Enterobacter* dienen. So können gewisse Stämme von *Escherichia neapolitana* in zwei Gruppen getrennt werden, von denen die eine den Zucker unter sehr reichlicher Gasvergärung, die andere gar nicht auf ihn einwirkt. (Science **60**. 455. 1924. *Science*, Univ.)

SPIEGEL.

André Adolphe Constant Langrand, Paris, Meßvorrichtung für chemische Analysen mit Saugglocke. (D. R. P. 405 092 Kl. 421 vom 7/8. 1923, ausg. 1/11. 1924. F. Prior. 12/9. 1922. — C. 1923. IV. 789.)

KÜHLING.

G. I. Contracting Company, Philadelphia, Pennsylvanien, übert. von: **H. Fulweiler**, Wallingford, Pennsylvanien, *Quantitative Bestimmung von Sauerstoff in Leucht- und anderem Gas*. Man speist einen Träger mit Sauerstoff in verschiedenen Verbb., die verschieden auf verschiedene H_2S -Konz. einwirken, diesen Träger einem bestimmten, zu prüfenden Gasstrom eine bestimmte Zeit lang, bestimmt die Konz. des H_2S in dem Gas durch gekühlte Sulfide. (A. P. 1 923 vom 12/1. 1922, ausg. 21/10. 1924.)

KAUSCH.

H. Angewandte Chemie.

I. Allgemeine chemische Technologie.

W. L. Jones, Verwendung des Abdampfes von Dampfmaschinen für Heizzwecke. Bei einem Heizzampftrieb ist es vorteilhaft, Abdampf einer Gegendruckmaschine anzapfdampf einer Kondensationsmaschine zu Heizzwecken zu verwenden. Die Höhe der wirtschaftlichen Überhitzung des Frischdampfes bestimmt, ob Abdampf oder Anzapfdampf zu nehmen ist, richtet sich nach dem Verhältnis zwischen Kraftdampfbedarf u. Heizzampfbedarf. Versuchsergebnisse mit den errechneten Betriebsbedingungen verglichen u. die Regelungsbedingungen der Abzapfung versprochen. (Feuerungstechnik **13**. 24—28. 1924.)

Ugo Cambi, Filtration und Dekantation in der chemischen Industrie. Die Grundlagen des Filtrierens u. Dekantierens werden besprochen. Außerdem wird V. ausführlich die in der Technik gebräuchlichen Filtrier- u. Dekantierungen. (Giorn. di Chim. ind. ed appl. **6**. 485—95. 1924.)

GOTTFRIED.

Eg. Poncèlet und **E. de Soignie**, Das Verfahren nach Cottrell. I. Theorie. Nach COTTRELL zur Reinigung von Gasen von Staub durch Niederf. dieses auf elektr. Wege wird zunächst eingehend hinsichtlich seiner theoret. Grundlagen, der Apparatur u. der Ausführungsart im allgemeinen besprochen. (Fédération Industr. Chim. de Belgique **1924**. 516—22. 1924.)

RÜHLE.

W. L. Jones, Die graphische Ermittlung der erforderlichen Heizflächen von Röhrentrocknern, sowie der Leistungsverhältnisse der einzelnen Apparate. Zur Beurteilung eines Trockenapp. läßt sich durch wenige Verss. eine Kennzahl des App. feststellen, die gegeben ist durch das Verhältnis der Verdampfung zur Trockendampftemp. bei gleicher Verdunstungstemp. u. die sich im Diagramm als eine gerade Linie darstellt. Nach der Neigung dieser Geraden zur Trockendampftemp. wird der App. beurteilt. (Braunkohle **23**. 553—56. 574—79. 1924. Freie Presse.)

NEIDHARDT.

W. L. Heuser, Wärmewirtschaftliche Betriebsführung von Kondensationsapparaten. V. bespricht die Ursachen schlechten Betriebsvakuums u. die Mittel zur Vermeidung desselben. Erörtert, wie durch Ausnutzung der Kühlwasserwärme die Wärmewirt-

schaft des Betriebs noch verbessert werden kann. (Die Wärme 47. 54/1924.)

Herman B. Kipper, Muskegon, Michigan, *Durchführung chemischer Reaktionen*. Die Reaktionsstoffe u. Katalysatoren werden durch schnell rotierende Hämme bewegt während des Fortschreitens der Rk. (A. P. 1512225 vom 23/6. 1924, ausg. 21/10. 1924.)

Sprengluft-Gesellschaft m. b. H., Berlin, *Einführung von flüssiger Luft in anderen verflüssigten Gasen in Gefäße*, dad. gek., daß die beim Füllen eines Gefäßes entweichenden k. Gase dazu benutzt werden, weitere Gefäße vorzuheizen. (Oe. P. 97477 vom 14/5. 1923, ausg. 10/7. 1924.)

Volkmar Kohlschütter, Bern, Schweiz, *Dispersionen fester Körper von bestimmten Graden*. Eine feste Substanz wird mit Gasen oder Fl. so zur Dispersion gebracht, daß sich ein anderer fester Körper von bestimmtem Dispersitätsgrad in der Dispersion befindet. (A. P. 1512897 vom 30/8. 1921, ausg. 21/10. 1921.)

B. E. Eldred, Great Neck, Long Island, New York, *Trennen von Ölen*. Man benutzt dazu Öl; die wertvollen Stoffe bilden dabei eine Schicht u. werden an der Oberfläche der Fl. zurückgehalten. (E. P. 220716 vom 23/5. 1923, ausg. 18/9. 1924.)

P. G. Somerville, London und **E. C. Williams**, Huddersfield, *Trennen von Flüssigkeiten, Gasen und Dämpfen durch Kieselsäuregel*. (E. P. 220899 vom 23/5. 1923, ausg. 18/9. 1924.)

Heinrich Nolze, Kaiserslautern, *Vorrichtung zum Reinigen von Gasen* f. verschiedene, Exhaustoren, Desintegrator-Exhaustoren zwecks Eifelreinigung. Verschiedenen Pressungen mit dem gleichen Reinigergrade, dad. gek., daß die festen Schaufeln noch radial verschiebbare u. abnehmbare Aufsätze vorgesehen sind. (D. R. P. 406336 Kl. 12e vom 17/3. 1923, ausg. 21/11. 1924.)

Metallbank und Metallurgische Gesellschaft Akt.-Ges., Frankfurt a. M., *Elektrischer Gasreiniger mit Elektrodenerschütterungsvorrichtung* nach D. R. P. 392046. 1. dad. gek., daß die an einem Durchführungsisolator befestigte Membran in dem Gasraum liegenden inneren Ende des Isolators angeordnet ist. Zwei Ansprüche kennzeichnen Ausführungsformen des Verf. (D. R. P. 406451 Kl. 12e vom 13/3. 1924, ausg. 26/11. 1924. Zus. zu D. R. P. 392046; C. 1924. I. 2295.)

Siemens-Schuckertwerke G. m. b. H. (Erfinder: **Carl Hahn**), Siemens & Halske, Berlin, *Verfahren und Einrichtung zur Verhütung der Ablagerung von Staubteilchen aus Gasen in wagerechten Rohrleitungen*, 1. dad. gek., daß einerseits in den Gasen enthaltenen Schwebeteilchen vor ihrem Eintritt in die Leitung in diesen selbst elektr. aufgeladen u. andererseits die Rohrwandungen im gleichen Sinne geladen werden. — 2. Einrichtung, dad. gek., daß die Rohre oder Leitungen im Innern mit einer isoliert angebrachten leitenden Schicht ausgekleidet sind, die elektr. geladen wird. — 20 weitere Patentansprüche kennzeichnen Ausführungsformen des Verf. u. der Einrichtung. (D. R. P. 406672 Kl. 12e vom 20/11. 1923, ausg. 26/11. 1924.)

Synthetic Ammonia & Nitrates Ltd., Stockton on Tees, übert. von **W. Kniskern**, Syracuse, New York, *Trennung von Gasgemischen durch Verflüssigung*. Das Gemisch wird stufenweise gekühlt durch verdampfende, fl. Kühlmittel bei verhältnismäßig niedrigerem Druck. Die Dämpfe werden wieder komprimiert u. wieder gekühlt. (E. P. 220655 vom 16/8. 1924, Auszug veröff. 15/10. 1924. Priorität 1923.)

Otto-Léo Borner, Zürich, *Verfahren und Vorrichtung zum Trocknen, Lösen, Brennen oder zur sonstigen thermischen oder chemischen Behandlung von zerkleinerten körnigen oder pulverförmigen Stoffen*. Man läßt die Stoffe auf untereinander angeordneten Flächenpartien herabgleiten, die derart angeordnet sind, daß sie allseits

ene, miteinander in Verb. stehende Kanalpartien bilden, u. die in Richtung
bewegung des zu behandelnden Gutes derart schwingen, daß sie das Gut
während das wirksame therm. oder chem. Medium sich in Bahnen durch
chläuse bewegt, die der Bahn des Gutes parallel liegen. (**Schwz. P. 105989**
3/9. 1923, ausg. 1/8. 1924. D. Priorr. 14. u. 16/12. 1922 u. 9/8. 1923.) OEL.
e Gle. d'Exon. des Brevets et Procédés de Récupération Brégeat
é Anonyme, Brüssel, Wiedergewinnung flüchtiger Stoffe aus Gasen mittels
elsäure. Man setzt zu der H_2SO_4 vor ihrer Verwendung als Absorptions-
KW-stoffe der arom. Reihe (Bzl., Naphthalin, Anthrazen oder deren Homo-
inu. (**Oe. P. 97672** vom 17/4. 1923, ausg. 25/8. 1924.) KAUSCH.

e Gle. d'Exon. des Brevets et Procédés de Récupération Brégeat
é Anonyme, Brüssel, Auswaschen und Wiedergewinnen von flüchtigen Lösungs-
e, wie Benzol, Benzin, Äther usw. aus diese enthaltenden Gasen. Als Waschfl.
die Hydrierungsprodd. der Phenole allein oder in Mischung mit bekannten
en Waschfl. wie Teeröle, Vaselineöle, Kresole usw. (**Oe. P. 97671** vom 17/4.
3. 1923, ausg. 25/8. 1924.) KAUSCH.

erst Berl, Darmstadt, Abscheidung und Konzentrierung von in Verdünnungs-
oder in Lösung befindlichen Alkoholen, Aldehyden, Ketonen, Äthern und Säuren,
ek., daß die genannten Stoffe aus Verdünnungsgasen mit Eiswasser oder
erhigten Salzsgg. herausgewaschen u. daß diese Lsgg. der organ. Stoffe mit
h Körpern, die mit den zu gewinnenden Stoffen Molekülverb. geben, die in
s. Lsg. schwer l. oder unl. sind, durchgeschüttelt — bei Vorliegen rein wss.
r. weckmäßig nach Zusatz von Neutralsalzen — u. daß die mit dem zu ge-
unden Stoff nunmehr beladenen Zusatzstoffe durch einfaches Erhitzen, gegebenen-
unter Zuführung von Wasserdampf, ganz oder teilweise vom aufgenommenen
befreit werden. (**D. R. P. 406620** Kl. 12e vom 22/12. 1922, ausg. 25/11.
4.)

dré Chenard, Cognac, Frankreich, Destillieren und Rektifizieren von Flüssig-
nischen, dad. gek., daß die aus der Blase entweichenden Dämpfe unmittelbar
gegen die Außenluft offenes Rohr von entsprechender, u. zwar bedeutender
g mit nur aufsteigenden oder abwechselnd aufsteigenden u. fallenden Win-
g. geleitet u. die sich bildenden Kondensate in der Reihenfolge, in der sie
ten, z. B. mittels Sackrohren, nach weiter dem Blasenaustritt zu gelegenen
e des Kühlrohres zurückgeleitet werden. (**Oe. P. 97893** vom 7/5. 1923, ausg.
9. 1924. F. Prior. 7/5. 1922.) KAUSCH.

tiengesellschaft Kummeler & Matter, Aarau (Schweiz), Eindampfen von
keiten. Zwecks Ermöglichung des Eindampfens von Fll., die flüchtige Be-
ile abgeben, wird in die Brüden h. W. (h. Kondensat der Heizkammer) ein-
pt. (**Oe. P. 97910** vom 29/9. 1922, ausg. 25/9. 1924.) KAUSCH.

ilhelm Schwarzenauer, Hannover, Wärmepumpe für Verdampfer, Trocken-
a u. ä., 1. dad. gek., daß die Verdichtung der Brüden oder Gasen durch
l. Verdichter geschieht, welche mit den Brüden u. Gasen gegenüber indiffe-
Fll. betrieben werden. — 2. dad. gek., daß außer durch die Verdichtung von
oder Dämpfen auch durch die Betriebsfl. Wärme zugeführt wird. — 3. Die
ung des Abscheidebehälters als Wärmespeicher zum Ausgleich von Schwan-
g im Bedarf an Heißdampf. (**D. R. P. 406022** Kl. 12a vom 30/6. 1922,
20/11. 1924.) KAUSCH.

ul H. Buch und Howard M. Groff, Trenton, N. J., Gefrierverfahren. Man
einem nichterstarrenden Körper (Salzsg.) eine flüchtige, gefrorene Fl. solcher
echarften (Äthylchlorid) expandieren, daß als Nebenprod. ein Schmiermittel
st. Hierauf komprimiert u. kondensiert man das expandierte Kältemittel u.
holt das Verf. (**A. P. 1510759** vom 6/2. 1922, ausg. 7/10. 1924.) KAUSCH.

Synthetic Ammonia & Nitrates Ltd., Stockton on Tees, übert.
W. Schultze, Syracuse, New York, *Katalysatoren* insbesondere für die Um-
 rung von CO in CO₂ durch Wasserdampf werden zu Tabletten komprimiert.
 (E. P. 220649 vom 16/8. 1924, Auszug veröff. 16/10. 1924. Prior. 16/8. 1923)

Charles J. S. Miller, Franklin, Pa., V. St. A., *Mittel zum Vertreiben von*
Wasserflächen liegenden Nebelschichten bzw. zur Verhütung der Nebelbildung
 stehend aus einer Mischung von Öl (vegetabil. oder Mineralöl) u. einer flüch-
 Fl., wie Ammoniaklgg., welches Gemisch auf der Wasseroberfläche ausge-
 wird. (A. P. 1512783 vom 5/12. 1922, ausg. 21/10. 1924.) OEL

V. Anorganische Industrie.

Giacomo Fauser, *Die synthetische Ammoniakindustrie in Italien.* (Gin-
 Chim. ind. ed appl. 6. 471—84. 1924.) GOTTFRED

R. E. Hall, H. A. Jackson und Grant Fitch, *Relative Löslichkeit von u.*
Bleischmelzschlacke, Chromerz und Silicatfiltersand in heißen, alkalischen W.
 Die chem. Gleichgewichte, welche bei Behandeln obiger Silicatverbb. mit h.
 Wässern im Gegensatz zu sauren auftreten u. ihr Einfluß auf die Löslichk-
 Materials werden an Beispielen besprochen. Als Filtermassen für h. alk.
 eignen sich vor allem solche Silicatverbb., in welchen die Basenkomponente
 Mg oder Ca besteht, also *Pyroxene* u. *Amphibole*, vor allem *Diabas* u. *Basalt* (I-
 and Engin. Chem. 16. 701—3. 1924. Pittsburgh [Pa.]) GRAM

Oskar Kausch, *Vorrichtungen zur Herstellung und Wiederbelebungs-
 Kohlen.* Vf. beschreibt an Hand von Abbildungen App. verschiedener Ein-
 (OSTREJKO, SCHOLZ, SAUER, WYNBERG) in denen akt. Kohle hergestell-
 regeneriert werden kann. (Chem. Apparatur 11. 173—75. 1924.) NEIDHART

—, *Die fabrikmäßige Darstellung von Jodnatrium.* Beschreibung der Fabrikat-
 aus Eisenjodürjodid. (Chem.-Ztg. 48. 899—900. 1924.) JIG

Urlyn Clifton Tainton, Johannesburg, Transvaal, *Behandlung von re-*
 Durch Aufschluß von Erzen mit H₂SO₄ erhältlicher Brei wird mit einem lu-
 H₂SO₄ zersetzbaren Fluorid behandelt. Alsdann läßt sich der Brei leichter filtern.
 (A. P. 1511785 vom 2/10. 1919, ausg. 14/10. 1924.) KATZ

William P. Thornton, Chicago, *Schwefel aus Erzen.* S-Erz wird dun-
 gereinigt, dann ausgebreitet u. mit h. W. der S. ausgeschmolzen. (A. P. 1523
 vom 4/6. 1919, ausg. 21/10. 1924.) KATZ

W. Büsching, Halle, Saale, *Darstellung chemisch reiner, starker Schwefelsä-*
 aus Rohschwefelsäure mittels Destillation aus Gußeisengefäßen u. Dephlegmat-
 1. dad. gek., daß man derart arbeitet, daß ein Rektifikat von höherem S.
 218° einerseits u. ein solches von weniger als 218° andererseits erzeugt wir,
 beide für sich getrennt gewonnen werden. — 2. dad. gek., daß die Rektifikat-
 einrichtung aus mindestens zwei Teilen besteht, deren jeder eine besonder-
 dem anderen Teil unabhängige Dephlegmationseinrichtung besitzt. (D. R. P. 464
 Kl. 12i vom 6/1. 1923, ausg. 21/11. 1924.) KATZ

Metallbank und Metallurgische Gesellschaft Akt.-Ges. (Erfinder: K-
Krayer), Frankfurt a. M., *Herstellung von Kammerkrystallen*, dad. gek., daß S-
 haltige Gase mit einer Nitrose in innige Berührung gebracht werden, deren au-
 gradigkeit dem Wassergehalt der SO₂-Gase angepaßt ist, worauf das Gasgn-
 durch einen Absetzraum für die entstehenden Kammerkrystalle geleitet wi-
 (D. R. P. 406454 Kl. 12i vom 8/4. 1923, ausg. 26/11. 1924.) KATZ

Georg Ornstein, Charlottenburg, *Herstellung von Lösungen von Hypochlorit-
 oder freier unterchloriger Säure*, 1. dad. gek., daß übersättigte Lsgg. oder Emulsi-
 von Cl₂ in W. mit Suspensionen nicht oder schwer in W. l. Stoffe zussam-

echt werden, die mit Cl_2 unter B. von Hypochloriten oder freier unterchloriger zu reagieren vermögen. — 4. dad. gek., daß man fl. Cl_2 mittels eines Druck-erstromes in die Suspension hineinversprüht. (D. R. P. 406452 Kl. 12i vom 1/11. 1922, ausg. 21/11. 1924.)

KAUSCH.

L. Casale, Rom, *Ammoniaksynthese*. Das synthetisierte Gasgemisch wird nach beidung des entstandenen NH_3 dem Reaktionsbehälter immer wieder zugeführt, i der Umlauf der Gasmischung dadurch bewirkt wird, daß das vom Kondent kommende Gas in den Innenraum einer Injektordüse geleitet wird, deren unraum das erforderliche Frischgas unter einem Druck zugeführt wird, welcher der kreisenden Gasmischung um 10–100 Atm. übersteigt. (E. P. 221956 vom 1/11. 1922, ausg. 16/10. 1924.)

KÜHLING.

Nitrogen Corporation of Providence, V. St. A., *Ammoniaksynthese*. (N. P. 43 vom 31/3. 1920, ausg. 26/11. 1923. — C. 1922. II. 315 [E. P. 143550].) KÜH.

Air Liquide, Soc. an. pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés ges Claude, Paris, *Synthese des Ammoniaks mittels Hyperdruckes* (Kurzes Ref. F. P. 525927 vgl. C. 1922. II. 511), 1. dad. gek., daß die durch die Rk. ent- lade Wärme durch bekannte Mittel, z. B. durch die für die Rk. bestimmten.

so abgeleitet wird, daß sie weder ganz noch teilweise die drucktragende Be- wand durchströmt, vielmehr eine nennenswerte Wärmeströmung durch die lung von innen nach außen durch besondere Schutzmittel, insbesondere An- ung eines Wärmeschutzes an der Außenseite der Wandung verhindert wird. dad. gek., daß die Außenseite der Behälterwandung auf eine Temp. erhitzt r die ein wenig höher ist als die auf deren Innenseite herrschende Temp. — llen Rohrbrüche vermieden werden. (D. R. P. 404687 Kl. 12k vom 1/4. 1921, 20/10. 1924. F. Prior. 7/4. 1920.)

KÜHLING.

Badische Anilin- & Soda-Fabrik (Erfinder: Wilhelm Gaus und Wilhelm i), Ludwigshafen a. Rh., *Erzeugung von Stickstoff-Wasserstoffgemischen* für die met. Gewinnung von NH_3 nach D. R. P. 306303, 1. dad. gek., daß die den erzeugern zugeführten Vergasungsmittel durch einen elektr. Lichtbogen vor- ht werden. — 2. dad. gek., daß im Falle der Verarbeitung minderwertiger, ssondere aschereicher Brennstoffe Gaserzeuger mit fl. Schlackenabstich ver- et werden. (D. R. P. 406496 Kl. 12i vom 8/11. 1922, ausg. 21/11. 1924. su D. R. P. 306303; C. 1922. IV. 362.)

KAUSCH.

Synthetic Ammonia & Nitrates, Ltd., Stockton-on-Tees, England, übert. von: Greathouse, Washington, V. St. A., *Ammoniumnitrat*. Nitrose Gase, welche durch katalyt. Oxydation von NH_3 gewonnen worden sind, werden durch m Turm geleitet, in dem ihnen W. entgegenrieselt. Die vom W. nicht gel- gelangen in eine Oxydationskommer u. von dieser in eine Reihe hintereinander- alteter, mit der Lsg. von $\text{NH}_4 \cdot \text{H} \cdot \text{CO}_3$ oder einer ähnlichen Ammoniumverb. fter Behälter, in denen sich eine NH_4NO_3 u. NH_4NO_2 enthaltende Lsg. bildet. e wird in einem weiteren Behälter mittels der wss. Lsg. oxydiert, welche sich rsterwähnten Rieselturm gebildet hatte u. die hierbei frei werdenden Gase n den neu von Katalysatorraum kommenden Gasen beigemischt. (E. P. 221514 13/9. 1924, Auszug veröff. 5/11. 1924. Prior. 6/9. 1923.)

KÜHLING.

Émile Augustin Barbet, Paris, Argon, Helium und andere seltene Gase aus y. Das verflüssigte Gemisch der seltenen Gase, das die gewöhnlichen Luft- eadteile im Verhältnis der atmosphär. Luft enthält, wird einem kontinuierlichen fikationsverf. unterworfen, indem das verdichtete Destillat der höher sd. Frak- i aus der Rektifikation als Rückfluß verwendet wird u. ein Teil des letzteren talt des einen der seltenen Bestandteile in reinem Zustande u. als Fl. abge- g wird, nachdem sie durch die aufsteigenden Gase wieder zum Sieden gebracht e. (A. P. 1512268 vom 8/7. 1919, ausg. 21/10. 1924.)

KAUSCH.

Soc. Anon. l'Air Liquide, Société anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Georges Claude, Paris, übert. von: **Jean le Rouge**, Boulogne-sur-Seine, *Trennung der Luftbestandteile*. Die Rektifikation wird unter einem Zwischen- und Enddruck zwischen dem Anfangsdruck der komprimierten Gase u. deren Enddruck nach völliger Expansion durchgeführt. Die Gase von der Rektifikation werden nach teilweiser Wiedererhitzung der Expansion bis zum Anfangsdruck u. der Leistung äußerer Arbeit unterworfen u. die dabei entstehende Kälte benützt zum Kühlen der zu verflüssigenden Luft. (Can. P. 237111 vom 27/3. 1923, ausg. 15/1. 1924.) KAUSCH.

B. Laporte Limited, Luton, Engl., übert. von: **Horace Edward Alcock**, Luton, *Phosphorsäure*. Man läßt auf ein Phosphat BaS einwirken u. zersetzt es mit erhaltenen Bariumphosphatnd. mit H₂SO₄. (A. P. 1511929 vom 5/5. 1924, ausg. 14/10. 1924.) KAUSCH.

Rhenania, Verein Chemischer Fabriken Act.-Ges., Aachen (Erfinder **J. Müller**, Mannheim-Feudenheim), *Gewinnung von Antimonchlorür und elementarem Schwefel* aus Schwefelantimonverb., 1. dad. gek., daß man Sb₂S₃ mit unzureichenden Mengen Cl₂ behandelt, das aufgeschlossene Prod. der Dest. unterwirft, wovon man aus dem Destillationsrückstand elementaren S mit Hilfe geeigneter Lösungs- in bekannter Weise gewinnt. — 4 weitere Ansprüche kennzeichnen Ausführungsformen dieses Verf. (D. R. P. 406673 Kl. 12i vom 21/12. 1923, ausg. 21/10. 1924.) KAUSCH.

Metallurgical Development Corporation, Boston, Mass., übert. von: **Ernest W. Wescott**, Niagara Falls, New York, *Nutzbarmachung arseniger Nebenprodukte*. Das bei der Chlorination von Erzen erzeugte AsCl₃ wird mit W. gemischt, das durch Hydrolyse aus ersterem entstandene As₂O₃ entfernt u. die Mutterlauge chloriert, um As₂O₃ hervorzubringen, worauf die Fl. zwecks Erzeugung von Arsenaten neutralisiert wird. (A. P. 1512733 vom 18/3. 1921, ausg. 21/10. 1924.) KAUSCH.

Metallurgical Development Corporation, Boston, übert. von: **Ernest W. Wescott**, Niagara Falls, *Reinigen von Arsenchlorid*. Ein As-Erz wird chloriert, u. Cl₂ bei hoher Temp., die resultierenden Gase werden abgekühlt auf eine Temp. über dem Verflüssigungspunkt des AsCl₃, das kondensierte FeCl₃ u. Staub werden abgeschieden, das fl. AsCl₃ abgekühlt u. mit As₂O₃ erhitzt. (A. P. 1512734 vom 30/3. 1921, ausg. 21/10. 1924.) KAUSCH.

Bourt, Boulton & Haywood Limited, London, *Verbesserung der Gewinnung von Entfärbungskohle*. (D. R. P. 406554 Kl. 12i vom 24/6. 1922, ausg. 22/11. 1924.) E. Prior. 26/4. 1922. — C. 1923. IV. 478.) KAUSCH.

Weaver Company, Milwaukee, Wisconsin, übert. von: **Victor M. Weaver**, Thorold, Ontario, Canada, *Phosgen*. Man behandelt eine O₂ enthaltende Substanz mit Cl₂ in Ggw. von C:



(A. P. 1511646 vom 7/1. 1918, ausg. 14/10. 1924.) KAUSCH.

Badische Anilin- & Soda-Fabrik (Erfinder: **Robert Griesbach**), Ludwigshafen a. Rh., *Gewinnung von Alkalisalpeter und Chlorammonium aus Alkalien und Ammonnitrat*, 1. dad. gek., daß man Methylalkohol allein oder im Gemisch mit W. als Umsetzungsfl. verwendet. — 2. dad. gek., daß man der wss. Lsg. der Ausgangssalze Methylalkohol zusetzt, um zunächst Alkalinitrat u. sodann nach Abdest. des Methylalkohols NH₄Cl zur Abscheidung zu bringen, während die Mutterlauge im Kreisprozeß weiter verwendet wird. — 3. dad. gek., daß man von unreinem Methylalkohol ausgeht u. diesen im Laufe des Verf. in reiner Form gewinnt. (D. R. P. 406413 Kl. 12i vom 17/5. 1923, ausg. 21/11. 1924.) KAUSCH.

Volf & Co., Pulver- und Sprengstoff-Fabrik (Erfinder: **Heinrich Hampel**),
 aode b. Hannover, *Kalisalpeter aus Kalirohsalzen* nach D. R. P. 401479, 1. dad.
 k daß die bei der Rohsalzbehandlung in Anwendung kommende $Mg(NO_3)_2$ -Lauge
 r zur Entchlorung von Kieserit verwendet wird. — 2. dad. gek., daß zur Aus-
 aeung des Löserückstandes die den Kieserit separierende Lauge Anwendung
 d. (D. R. P. 405457 Kl. 121 vom 29/4. 1922, ausg. 31/10. 1924. Zus. zu D. R. P.
 19; C. 1924. II. 2783.)

KAUSCH.


Volf & Co., Pulver- und Sprengstoff-Fabrik (Erfinder: **Heinrich Hampel**),
 aode; Hannover, *Kalisalpeter aus Kalirohsalzen* nach D. R. P. 335819 (C. 1921,
 7), dad. gek., daß man die Waschlauge des Löserückstandes bzw. des
 ilensatzes der Salpeterendlauge zuschlägt, um die dabei entstehende Lauge, die
 e noch mit anderen Betriebslaugen, insbesondere mit $Mg(NO_3)_2$ -Lsg., verd.
 r als Löselauge zur Behandlung des Rohsalzes zu verwenden. (D. R. P. 405579
 l. 21 vom 4/1. 1922, ausg. 1/11. 1924. Zus. zu D. R. P. 403996; C. 1924. II.

KAUSCH.

Kali-Forschungs-Anstalt G. m. b. H. und Hans Friedrich, Staßfurt-Leopolds-
 il *Darstellung von Kaliumsulfat aus Carnallit und Bittersalz* unter Gewinnung
 n Kaliendlauge, 1. dad. gek., daß das Verf. in drei oder mehr Phasen erfolgt,
 de nacheinander aus den Ausgangsmaterialien zuerst bei hoher Temp. Lang-
 in u. KCl neben überschüssigem Carnallit erhalten wird u. diese Salze dann
 i mittlerer Temp. unter schrittweiser Umgehung von $MgSO_4$ mit KCl in K_2SO_4
 Cl₂ schließlich in reines K_2SO_4 umgewandelt werden, u. daß die beim Decken
 etzterhaltenen Salzes gewonnene Lauge schrittweise unter allmählichem An-
 ein der Temp. dem Gange des Salzes entgegengeführt wird, oder daß die Um-
 tzung zu K_2SO_4 unter Einführung der Ausgangsmaterialien einerseits u. von W.
 derseits im Gegenstrom in an sich bekannter Weise in kontinuierlichen App.
 ft. — 2. dad. gek., daß statt des Bittersalzes unter entsprechender Verringerung
 rgeführten Wassermenge h. $MgSO_4$ -Lsgg. verwendet werden. — 3. dad. gek.,
 ßler verwendete Carnallit, soweit derselbe nicht bei der Krystallisation wieder
 anen wird, durch KCl u. die Carnallitmutterlauge (Kaliendlauge) ersetzt wird.
 . P. 406363 Kl. 121 vom 19/6. 1923, ausg. 21/11. 1924.)

KAUSCH.

Crasselli Chemical Company, Cleveland, Ohio, übert. von: **Henry Howard**,
 e land, *Doppelsalz von Natriumfluorid und Ammoniumsulfat*. Man läßt 1 Mol.
 Na_2SO_4 mit 1 Mol. HF u. 1 Mol. NH_3 in wss. Lsg. in Rk. treten:



1511560 vom 30/6. 1922, ausg. 14/10. 1924.)

KAUSCH.

Gesellschaft für Kohlentechnik m. b. H. (Erfinder: **W. Gluud**), Dortmund-
 w, *Gewinnung von kohlensaurem oder doppeltkohlensaurem Natrium* unter gleich-
 iter Gewinnung von festem NH_4Cl nach D. R. P. 399901, 1. dad. gek., daß der
 at, NH_4Cl u. NH_3 enthaltenden Lsg. zunächst nur NH_3 u. CO_2 , bzw. deren
 en. zugesetzt werden, worauf nach Abscheidung des gefällten $NaHCO_3$ bzw.
 ir NH_4 -Verbb. enthaltenden Doppelsalze die Mutterlauge mit NaCl versetzt u.
 r abscheiden der NH_4Cl die ausgefallenen Verunreinigungen des NaCl abfiltriert
 ern. — 2. dad. gek., daß die Umsetzung von NH_3 u. CO_2 bzw. deren Verbb.
 $NaHCO_3$ bei einer Temp. von 30—40° vorgenommen wird. (D. R. P. 406674
 l. 21 vom 30/11. 1922, ausg. 25/11. 1924. Zus. zu D. R. P. 399901; C. 1924. II.

KAUSCH.

Wilhelm Schwarzenauer, Hannover, *Gewinnung von wasserfreiem Natrium-*
sulfat aus Kieserit und Kochsalz, dad. gek., daß zuerst aus diesen Salzen in wss.
 g in der Wärme Vanthoffit gebildet wird, der alsdann für sich durch noch-
 e Behandlung in der Wärme mit NaCl u. wss. Lsg. unter B. von wasser-

freiem Na_2SO_4 umgesetzt wird. (D. R. P. 406555 Kl. 121 vom 3/4. 1921, 21/11. 1924.) KAUSC

Herman B. Kipper, Muskegon, Michigan, *Salzsäure und Natriumsulfat*. aus NaCl u. H_2SO_4 gebildete Gemisch von NaHSO_4 , Na_2SO_4 u. NaCl wird Behandlung mit sich schnell bewegendes Hämmern u. dgl. von $200-800^\circ$ erlzt (A. P. 1512226 vom 24/10. 1922, ausg. 21/10. 1924.) KAUSC

George Stirke Kilbourn, Owen Sund, Ontario, Canada, *Kalk aus Magn oder Dolomit*. Man calciniert die Ausgangstoffe, schlämmt sie u. läßt sie abse worauf man einen Wasserstrom durch ein Sieb von 200 Maschen einführt. Kalk wird fortgespült u. der Magnesit scheidet sich ab. (Can. P. 236992 31/7. 1923, ausg. 15/1. 1924.) KAUSC

Austro-American Magnesite Company (öst.-amerik. Magnesit Gesellschaft) **G. m. b. H.**, Radenthein, Kärnten, *Kaustischbrennen von natürlichen krystallin Magnesiten im Drehofen*. (D. R. P. 406074 Kl. 80b vom 14/3. 1916, 1.11. 1924. Oe. Prior. 2/6. 1915. — C. 1922. II. 78.) KÜHLIN

Texas Company, New York, übert. von: **George W. Gray**, New York, *Aluminiumchlorid*. Zur Herst. der AlCl_3 dient eine Retorte, die sich in einem befindet u. mit einem Cl_2 -Erzeuger in Verb. steht. (A. P. 1512419 vom 21. 1921, ausg. 21/10. 1924.) KAUSC

Texas Company, New York, übert. von: **Frank W. Hall**, Port Arthur, Texas, *Aluminiumchlorid*. Al_2O_3 -haltiges Material wird durch Cl_2 in AlCl_3 übergeführt u. der Rückstand sowie die Chloriddämpfe werden mit KW-stoffölen in Berührung gebracht, worauf die AlCl_3 enthaltende Fl. von deren Rückstände getrennt wird. (A. P. 1512420 vom 27/12. 1921, ausg. 21/10. 1924.) KAUSC

E. C. Klipstein & Sons Co., New York, übert. von: **Bernard H. Jacobson**, Charleston, West Virginia, *Wasserfreie Metallchloride*. (Can. P. 237452 vom 18. 1922, ausg. 29/1. 1924. — C. 1924. I. 1087 [A. P. 1474479].) KAUSC

Consortium für elektrochemische Industrie G. m. b. H., München, *Herstellung wasserfreier Chloride*. Kurzes Ref. nach E. P. 176811; C. 1922. IV. 32. Nachzutragen ist folgendes: Zur Herst. von SiCl_4 wird z. B. ein Gemisch aus Kieselerde u. fein gepulvertem Koks mit W. zu Briketts geformt u. durch Erhitzen unter Luftabschluß getrocknet. Hierauf wird über die bis zur Rotglut erhitzte M. ein Gemisch aus Cl_2 u. S_2Cl_2 geleitet. Durch Kondensation wird der größte Teil des SiCl_4 u. das S_2Cl_2 abgeschieden. Der Rest des SiCl_4 wird durch Absorption gewonnen. — Weitere Beispiele für die Herst. von: *Aluminiumchlorid* aus Al_2O_3 , Koks, Cl_2 u. S_2Cl_2 , — von: *Zirkonchlorid* aus ZrO_2 u. Kohle bei heller Rotglut — von: *Titanchlorid* u. *Eisenchlorid* aus *Rutil* u. Kohle, sind angegeben. — Der Zusatz von Metallchloriden, wie Alkali- oder Erdalkalichloriden, ZnCl_2 , MgCl_2 , FeCl_2 oder AlCl_3 zu dem Gemisch aus Oxyd u. Kohle läßt sich die Reaktionstemp. erheblich herabsetzen, vorzugsweise bei der Herst. von SiCl_4 aus SiO_2 . Diese Metallchloride lassen sich auch während der Rk. selbst aus den entsprechenden Metalloxyden oder Salzen, wie Silicaten, erzeugen. Ebenso kann man das S_2Cl_2 im Verlauf der Herst. der wasserfreien Chloride durch Zugabe von S oder S-Verbb., wie Pyrit, CaSO_4 oder Na_2SO_4 , zu dem Gemisch aus Metalloxyd u. Kohle herstellen. (F. P. 548691 vom 10/3. 1922, ausg. 20/1. 1923. D. Prior. 11/3. 1921.) SCHOTT

Norman Underwood, Oaktown, Virginia, *Arsenverbindungen*. Man läßt auf ein Pb-Salz CuSO_4 einwirken in einem sauren Medium u. führt das gebildete PbO in Pb(OH)_2 durch ein Alkalihydroxyd über, worauf man As_2O_3 hinzusetzt. (A. P. 1512432 vom 7/9. 1922, ausg. 21/10. 1924.) KAUSC

J. Michael & Co., Berlin, *Chromalaun*. Ferrochrom wird als Anode im H_2SO_4 -Bad der Elektrolyse unterworfen. (Oe. P. 97908 vom 28/8. 1922, ausg. 2/9. 1924.) KAUSC

B. Price und Quirk Barton & Co., Ltd., London, *Bleioxyd*. Gelbes Pb wird durch Ein- u. Aufblasen von h. Luft oder Dampf oxydiert. 220 823 vom 17/9. 1923, ausg. 18/9. 1924.) KAUSCH.

Hebr. Himmelsbach Aktiengesellschaft, Freiburg i. B., *Quecksilberchlorid*. 97 656 vom 14/10. 1920, ausg. 25/8. 1924. — C. 1921. IV. 107 [D. R. P. 41.) KAUSCH.

Massell Company, Cleveland, Ohio, übert. von: Henry Howard, Cleveland, *synthetischer Kryolith*. Man setzt unl. Al_2F_6 zu NaF u. NH_4F u. digeriert den synthetischen Kryolith in einer Lsg. eines Na-Salzes in einer starken Säure. (A. P. 1 61 vom 8/6. 1923, ausg. 14/10. 1924.) KAUSCH.

VII. Agrikulturchemie; Düngemittel; Boden.

Mach, *Düngungsversuche zu Kartoffeln zum Vergleich von ganzer und halber Düngergabe bei entsprechender Zugabe von Kunstdünger*. Nach den Ergebnissen auf verschiedenen Böden ausgeführten Felddüngungsverss. wird durch eine Vergrößerung der Stalldüngergaben kein Schaden angerichtet, wenn der Ausfall an Nährstoffen durch entsprechende Kunstdüngergaben gedeckt wird. (Ztschr. f. Landw. u. Düngung Abt. B. 3. 449—55. 1924. Augustenburg i. Baden.) BERJU.

Lehmann, *Über die Ersetzbarkeit des Stalldüngers durch mineralischen Düngungsmittel*. Die vorstehend mitgeteilten Ergebnisse bestätigen, daß der CO₂-Ausstoß bei Stalldüngern nicht die Bedeutung beizumessen ist, welche ihr von anderen Forschern zugeschrieben wird. Einige ältere hier zitierte Verss. des Vf. u. von anderen ausgeführte Unterss. führten zu dem gleichen Ergebnis. (Ztschr. f. Landw. u. Düngung Abt. B. 3. 456—60. 1924. Berlin, Landw. Hochsch.) BE.

Kreuzpointer, *Der Einfluß des Kalis bei Kopfsalat auf Frühreife und Salatzugabe*. Durch 40%ig. K-Salz wird die Frühernte des Kopfsalates bedeutend gefördert. Zur Bekämpfung der Salatzugabe empfiehlt Vf. bei der Vorbehandlung 50 g K-Salz u. 100 g CaCO₃ pro qm Kastenfläche zu geben. Durch Behandlung des Salates mit Kalkpulver wird die Salatzugabe zwar wirksam bekämpft, aber die Frühreife vermindert. Das K darf nicht als Kopfdüngung gegeben werden. (Ernährung d. Pflanze 1924—57. 1924. Heilanst. Haus Oberbayern.) BERJU.

Chaussin, *Studie über das lösliche Medium und über die unlöslichen Gewebe im Laufe der Entwicklung des Getreides. Einfluß eines vollkommenen mineralischen Düngemittels*. Das Blatt scheint im Laufe der Entw. bemerkenswerte Konstanz zu zeigen; das Trockengewicht bleibt bei Düngung mit geringen Schwankungen zwischen 10% und 20%, das mittlere Mol.-Gew. des l. Anteils um ca. 144, das Verhältnis der Trockensubstanz zum gesamten Trockenrückstand des l. Teiles in sehr engen Grenzen zwischen 10% und 20%, ungefähr 10-mal mehr als in den unl. Geweben. Abgesehen von der Entw. ist die Konstanz dieses Verhältnisses eine allgemeine Eigenschaft der verschiedenen Pflanzenarten. — Der Stengel hat stets geringeren Δ als das Blatt, das Verhältnis Mol.-Gew. steigt darin mit dem Gange der Anreicherung an Reservestoffen. — Anwendung von Mineraldünger steigert der osmot. Druck u. das Verhältnis Mineralbestandteile zum Gesamttrockenextrakt. Am Extrakt des Stengels u. der Blätter zeigen die Kulturserien die bessere Assimilation. Aus dem Extrakt scheinen die Gramineen die Mineralbestandteile schlechter als viele andere Pflanzen zu entnehmen. (C. r. d. l'Acad. des sciences 179. 1195—97. 1924.) SP.

Liechti und Ernst Truninger, *Beiträge zur vegetativen Untersuchung von Cyanidstickstoffs*. Aus den Ergebnissen ihrer Vegetationsverss. mit reinem Cyanid u. Dicyandiamid u. Verss. über die vegetative Wrkg. des im W. u. Säuren im CaCN₂ folgern Vf., daß ein Dicyandiamidgehalt den Wert des CaCN₂ mindert, wenn auch eine direkt schädigende Wrkg. desselben auf die Pflanzen

bei schwacher Düngung (50 kg N/ha) erst bei verhältnismäßig hohem Anteil des N-Verb. (bis 5%) eintreten kann. Reines Dicyandiamid u. dicyandiamidhaltiges CaCN_2 verlieren mit der Zeit ihre schädliche Wrkg. Eine etwaige günstige N-Nrkg. dürfte aber die im ersten Jahre eingetretenen Ertragsschädigungen kaum auszugleichen vermögen. Normales CaCN_2 u. reines Cyanamid ergeben keine N-Nrkg. Der bei der Extraktion des CaCN_2 mit W. u. HNO_3 im Rückstand erbleibende N-Rest fällt für die Bewertung des CaCN_2 außer Betracht. (Landw. Jahrb. d. Schweiz **38**. 445—59. 1924. Bern-Liebefeld, Agrik.-Chem. Anst.) BERL.

S. A. Waksman, *Mikrobiologische Analyse des Bodens als Index der Bodenfruchtbarkeit*. VI. Nitrifikation. (Vgl. Soil Science **15**. 241; C. 1924. II. 2365.) Aus den Ergebnissen seiner Unterss. folgert Vf., daß die Nitrifikationsvorgänge im Boden in gleicher Weise Anhaltspunkte für die Beurteilung der Bodenfruchtbarkeit geben können, wie die Feststellung der Mikroorganismenanzahl. (Soil Science **6**. 479—82. 1923; Exp. Stat. Rec. **50**. 517. 1924.) BERL.

Alfred Gehring und **Gustav Brothuhn**, *Über die Einwirkung der Beizung von Rübenknäulen auf die biologischen Vorgänge des Bodens*. Es werden in größerer Zahl Beobachtungen über den Einfluß der Beizung (mit Uspulun, Germisan, Tiantin, Segetan) von Rübenknäulen auf die Bakterien in den damit bepflanzten Böden verschiedener Art angeführt, auch vergleichsweise die Verhältnisse nach dem Einsaat anderer Pflanzen in gleiche Böden berücksichtigt. Im allgemeinen ergibt sich unter dem Einfluß der gebeizten Knäule eine Erhöhung der Bakterienzahl ohne Änderung der Verhältnisse bzgl. Nitrifikation u. Denitrifikation u. Fäulnis im Boden. Vf. halten jedoch für möglich, daß die Beizmittel neben Abtöten der am Knäuel haftenden Krankheitskeime eine schwache Desinfektion der umgebenden Bodenteilchen herbeiführen können, wodurch die für das Rübenpflanzen schädlichen Keime des Bodens etwas zurückgedrängt werden. (Zentralblatt f. Bakteriol. u. Parasitenk. II. Abt. **63**. 67—101. 1924. Braunschweig, Landw. Vers.-Stat.) S.

C. C. Mc Donnell, *Neuere Fortschritte auf dem Gebiete der Insekten- und Pilzbekämpfungsmittel*. (Vgl. Mc DONNELL u. NEALON, Journ. Ind. and Engin. Chem. **16**. 819; C. 1924. II. 1867.) Sammelbericht über die Zus. u. Anwendung von As-Präparaten, Ölemulsionen, Nicotinlsgg., pflanzliche Prodd., HCN u. CS zur Insektenbekämpfung, sowie von Cu-, Hg-, S u. CaS-Lsgg. zur Pilzbekämpfung. (Journ. Ind. and Engin. Chem. **16**. 1007—12. 1924. Washington [D.C.]) GRIME.

E. A. Back und **R. T. Cotton**, *Wirksame Anwendung von Blausäuregas zum Schutze von in 240 Pfund-Säcken eingelagerten Kichererbsen (cicer arietinum)*. Vf. untersuchten die Einw. einer Begasung mit Blausäure auf verschiedene Insekten, die der in großen Speichern eingelagerten Erbsenernte von Nordmexiko im Jahre 1918 gefährlich geworden waren. Die Vergasung der Speicher wird nicht durch die Vf., sondern durch einen „Berufsbegaser“ vorgenommen. Die Unters. der Einw. auf die verschiedenen Schädlinge wurde durch die Vf. ausgeführt. Auf je 1000 Kubikfuß wurden 2½ Pfund 98—99% Natriumcyanid angewandt u. die Vergasung 48 Stdn. bei einer Temp. von 58—75° F. durchgeführt ohne jedoch die Speicher luftdicht abzuschließen. Die 240 Pfund-Säcke waren teils 4—5 Sack, teils 18 Sack hoch aufgestapelt. — Es wurde festgestellt, daß insbesondere der Hauptschädling, der viergefleckte Bohnenrüsselkäfer, *Bruchus quadrimaculatus* — u. auch *Rizopertha dominica* — kleiner Kornbohrer, *Lasiomeria serricorne* — Tabakskäfer, u. *Plodia interpunctella* — Indische Mehlmotte werden die angegebene Vergasung wirksam bekämpft werden können. — *Sitophilus oryzae* — Reiserüsselkäfer u. *Sitotroga cerealella* — eine Kornmotte zeigten sich erblühter widerstandsfähiger gegen Blausäuregas. (Journ. Agricult. Research **28**. 64—66. 1924.) TRÉL.

[A. A. Cardinell, *Farbindicatoren für Rostdesinfizientien*. Um zu kontrollieren, die Behandlung mit an sich farblosen Desinfektionslsgg. wie der Hg-Glycerinlsg. REIMER-DAY ordnungsgemäß ausgeführt ist, wird ein Farbstoff wie Methylen- oder besser noch Fuchsinrot der Lsg. zugesetzt. (Science 60. 455. 1924. e gan Agric. Coll.)

SPIEGEL.

henania Verein Chemischer Fabriken A.-G., Aachen, und Gustav Adolf ecelius, Stolberg, Rhld., *Herstellung von Düngemitteln*. (D. R. P. 405832 Kl. 16 r./6. 1918, ausg. 8/11. 1924. — C. 1921. IV. 340 [F. P. 518579].) KÜHLING.

verseas Ins. Ex. Fert. Pty Ltd., Australien, *Schädlingsvertilgungs- und mittel*, bestehend aus $HgCl_2$, MnO_2 , Borax u. Superphosphat. An Stelle von t kann auch $MnSO_4$, $MnCl_2$ oder ein anderes Mangansalz, an Stelle von Super- hat ein anderes bekanntes Düngemittel verwendet werden. Das Mittel ver- tkleintiere, wie Termiten, Käfer oder deren Larven u. dgl., bezw. verhindert e Angriff auf die Pflanzen. (F. P. 574134 vom 5/12. 1923, ausg. 5/7.

KÜHLING.

ugène Teppet, Isère, Frankreich, *Unkrautvertilgungsmittel*, bestehend aus Cl_3 oder $KClO_3$ in fester Form oder in wss. Lsg., mit oder ohne Zusatz anderer er Verb., insbesondere Na_2CO_3 oder K_2CO_3 , bezw. $Na_2Cr_2O_7$ oder $K_2Cr_2O_7$. 547599 vom 31/1. 1922, ausg. 19/12. 1922.)

SCHOTTLÄNDER.

mile Charles Camille Roubaud und Raymond Alexandre Veillon, *Mittel ertilgung der Larven von Stechmücken*, bestehend aus einem Gemisch von omethylen u. dem gleichen Volumen Pflanzenmehl, wie Blattpulver, Sägemehl, apulver, zweckmäßig von harzreichen Hölzern. — Zum Gebrauch wird das t in dünner Schicht auf die Oberfläche der stehenden Gewässer, wie Teiche, ie oder Wasserreservoir, gestreut. Es tötet die Larven von Stechmücken her ab als das bisher verwendete Petroleum. Für Vieh, Fische u. Pflanzen- ten ist es vollkommen unschädlich. (F. P. 559296 vom 30/11. 1922, ausg. 9/1923.)

SCHOTTLÄNDER.

eneral Laboratories, Madison, übert. von: Harley F. Wilson u. William ldfield, Madison, Wisconsin, V. St. A., *Desinfektion von Bienenstöcken u. dgl.* anere der Bienenstöcke wird mit einer Lsg. von Hypochloriten, welche freies t enthält bestäubt oder bestrichen. Zweckmäßig verwendet man eine Lsg., e 3% $NaOCl$ u. 8—9% Na_2CO_3 enthält. (A. P. 1511857 vom 24/11. 1922, g 14/10. 1924.)

OELKER.

VII. Metallurgie; Metallographie; Metallverarbeitung.

. Francke, *Die bergbauliche Entwicklung des Tanganjika-Territoriums*. [Deutsch- aika.] (Glückauf 60. 1086—89. 1924. Aachen.)

ENSZLIN.

. Diepschlag, *Allgemeine Gesichtspunkte für den Bau von Martinöfen*. Vf. pht die Wärmeverhältnisse u. den Wärmeübergang im Martinofen u. leitet a allgemeine Grundsätze für den Bau u. die Bauformen der Martinöfen u. azugehörigen Wärmespeicher ab. (Ztschr. Ver. Dtsch. Ing. 68. 1233—36.

NEIDHARDT.

mes T. Mac Kenzie, *Die Anwendung des elektrischen Ofens*. (Foundry 52. 0. 1924. Cleveland [O.])

LÜDER.

. Parravano und A. Scortecchi, *Über den in Eisenlegierungen enthaltenen Stick-* (Vgl. Chimie et Industrie 1924. Mai-Sondernummer. 312; C. 1924. II. 1851.) e in den *Eisenlegierungen* existiert der *Stickstoff* in zwei Formen, gebunden u. In einigen Fällen kann sich die zweite Form in die erste umwandeln. Der Galt selbst schwankt innerhalb weiter Grenzen; das Schmelzen führt im all- nen zu einer Verminderung des Totalgasgehalts. Der N-Gehalt in 100 g

Material schwankte bei *Ferromangan* zwischen 6,8 u. 176 cem, bei *Ferrochrom* zwischen 2,1 u. 17,3 cem, bei *Ferrovand* zwischen 1,6 u. 25 cem, bei *Ferrotitan* zwischen 3,2 u. 17 cem u. bei *Silicocalcium* (52% Si, 20% Ca, 4% Al) zwischen 11482 cem. (Annali Chim. Appl. **14**. 289—91. 1924. Mailand, Ist. Scient. Tecnico.)

H. A. Ruth, *Die neue „Magma Kupfer“ Hütte*. Die Einrichtung der neuen Hütte der MAGMA COPPER CO. in der Nähe von Superior, Ariz., die unter verschiedenen Bedingungen 100 Tonnen Konzentrates, 150 Tonnen zerkleinertes Erz, 54 Tonnen Flusstein u. 42 Tonnen Konverterschlacke pro Tag verarbeitet, wird beschrieben. Seit dem 1. März 1924 ist die Hütte in Betrieb. (Engin. Mining Journ.-Press **118**, S. 693. 1924. San Francisco.)

H. Moore, *Die Wirkung stärker werdenden Kaltwalzens auf die Brinellhärte von Kupfer*. Elektrolyt-Cu hoher Reinheit wurde geschmolzen, mit Mn desoxydirt u. in Kokillen gegossen. Die Stücke enthielten 0,16% Mn u. wurden nach dem Erwärmen bei 650° von 7,9 cm bis zu 0,03 cm Dicke kalt ausgewalzt u. nach dem Abkühlen auf 50% ig. Red. die Brinellhärte bestimmt. Die Ergebnisse zeigen, daß entgegen der Ansicht von RAWDON u. MUTCHLER (Metal Ind. [London] **24**. 171; C. 1924. I. 3) die Härte stets mit der Kaltbearbeitung zunimmt. Vf. achtete stets darauf, daß bei der Kaltbearbeitung des Metalles entstehende Wärme möglichst schnell u. vollständig abgeführt wurde. (Metal Ind. [London] **25**. 326—27. 1924. Research Department, Woolwich.)

G. D. van Arsdale, *Waschrückstände vom Auslaugen der Kupfererze*. Die Gewinnung der in den Waschrückständen zurückgehaltenen Lsg. wird besprochen. Die Schwierigkeit ist dabei, daß größere Mengen Waschl. benötigt werden, so daß die dann gewonnene Lsg. ganz bedeutend verd. ist. Ein Eindampfen einer solchen Lsg. kommt wegen der großen Kosten nicht in Frage. Dabei braucht man aber einen elektrolyt. Abscheidung einen bestimmten Cu-Gehalt. Die Abscheidung als Zerkupfer aus diesen Lsgg. macht das Cu teurer als das elektrolyt. gewonnene. Vf. berechnet den Wirkungsgrad der verschiedenen Auslaugemöglichkeiten, um die Gewinnung des restlichen Cu zu ermöglichen. (Engin. Mining Journ.-Press **118**, S. 653—55. 1924.)

Douglas H. Ingall, *Die Beziehung zwischen der Zugfestigkeit, Temperatur und Kaltbearbeitung in einigen reinen Metallen und einzelnen festen Lösungen*. Im Vergleich mit den früheren Verss. mit Cu (Metal Ind. [London] **23**. 271; C. 1924. I. 242) mit neueren zu vergleichen sind, hat Vf. genau dieselbe Versuchsanordnung u. die Durchführung bei den jetzigen wieder angewandt. Die Zugfestigkeitskurven der untersuchten Materialien zeigen eine gerade Linie bei niederen Temp., um bei einer krit. „Inflektionstemp.“ in eine Hochtemperaturkurve überzugehen. Es ist anzunehmen, daß die gerade Linie oder Tieftemperaturkurve ihre Richtung ändern, wenn eine allotrope oder Phasenänderung in einem der Bestandteile stattfindet. Diese „krit. Inflektionstemp.“ oder Temperaturbereich wird die desjenigen Bestandteiles sein, der die niedrigste individuelle krit. Inflektionstemp. hat, u. wird unter Materialbedingungen beeinflussbar sein wie Kaltbearbeitung u. vielleicht auch Korngröße u. Verteilung der Bestandteile. Die Hochtemperaturkurve kann aus 2 oder mehreren Teilen bestehen. Wie beim Cu schon festgestellt gilt für die gerade Linie die Gleichung $y = a - bx$. Für $y = 0$ (wobei $x = a/b$). Für die angelassenen Drähte von Ag, Al, Ni u. Cu wurden die Werte von x für a/b , wenn $y = 0$, ausgerechnet, u. mit dem entsprechenden Wert für F dividiert. Dabei kam bei allen 4 Metallen im Mittel 0,800 heraus, so daß eine Beziehung zwischen den Konstanten a u. b gefunden war, die auch weiterhergestellt — bei den genau eingehaltenen Versuchsbedingungen — den ersten Teil der Kurve auch rechnerisch festzulegen. Durch Extrapolation der beiden Kurvenarten konnte die krit. Inflektionstemp. ermittelt werden. Wurde die absolut krit.

onstemp. der obigen reinen Metalle in angelassenem Zustande, durch ihre Schmelzpunkttemperatur dividiert, so erhielt Vf. den Faktor 0,47. Durch aufgedeckte Beziehung ist man nun imstande, das Ende der Tieftemperatur, die krit. Inflektionstemp., ebenfalls zu berechnen, wobei sich ergab, daß sie bei $+10^{\circ}$ u. für Sn bei -30° liegt. Vf. ist der Ansicht, daß beim Überk der Literatur der Festigkeiten von Metallen bei höheren Temp. es den in hat, als ob die Metalle sich in teils krystallinem teils viscosen Zustande an. Wenn nur die Hochtemperaturkurve diesen Viscositätsfluß anzeigt, so in der krit. Inflektionstemp. für den Maschinenbau erhöhte Bedeutung zu. Ein oder Legierung wäre jenseits dieser Temp. nur brauchbar, wenn es Zug- suchungen ausgesetzt würde, die kleiner sind als der Flußwiderstand, der uch führt. Durch Experiment wurde die „krit. Inflektionstemp.“ bestimmt (165°), Cu (365°), Ni (500°) u. Ag (310°), berechnet von Au (355°), Fe (575°), (3°) usw. Es ist nun möglich, Kalt- u. Warmarbeit wissenschaftlich zu de- r: Kaltbearbeitung ist die mechan. Deformation eines Metalles unter seiner flektionstemp. u. Warmbearbeitung über derselben. (Metal Ind. [London] 25, b. 1924.)

WILKE.

J. D. Edwards und Robert S. Archer, *Die neuen Aluminiumsilicium-* gen. (Vgl. EDWARDS, Chem. Metallurg. Engineering 27. 654; C. 1923. II.) Die Abhandlung will eine vollständige Übersicht geben. Gleichzeitig wird Theorie über die „modifizierten“ Legierungen gegeben. Vor allem wird die Legierung mit 13% Si u. etwa 0,5% Fe besprochen, die bekanntlich durch Schmelzflußzusatz von Natriumfluorid wie auch reinem Na eine beträchtliche Verfeinerung u. damit hervorragende mechan. Eigenschaften erhält. Die modifizierte Legierung mit 13% Si (die eutekt. Zus. der binären Legierung liegt bei 13% Si u. 577°) besteht aus Al-Dendriden in einer Grundmasse von feinverteiltem Si. Es wurde die Beobachtung gemacht, daß die Erstarrungstemp. bis um 12° erniedrigt werden konnte durch die Art der Abkühlung u. die Menge der modifizierenden Substanz. Die ganzen Versuchsergebnisse lassen es als sicher erscheinen, daß die Krystallisation des überschüssigen Si ganz oder größtenteils unterdrückt ist. In dem Al-Si-System ist ein wahres Eutektikum u. ein metastabiler Zustand, der durch Unterkühlung in Ggw. der modifizierenden Substanz eintritt, u. der eine Feinverfeinerung der Si-Konz. in der geschmolzenen Legierung beim Erstarren erlaubt. Die Theorie wird auch dadurch bekräftigt, daß der F. einer modifizierten Legierung mit Na übereinstimmt. Die Ursache dieser Modifikation ist sicherlich das Natrium, da es ist nur wenig l., sogar in geschmolzenem Al nur wenig u. diese Löslichkeit nimmt rasch mit fallender Temp. ab, so daß es in festem Al prakt. unl. ist. In Na vielleicht bei 750° zugegeben, so löst sich entsprechend den Löslichkeitsverhältnissen bei dieser Temp. ein bestimmter Teil u. wahrscheinlich wird auch ein Teil Na mechan. durch Rühren in der Legierung zerstreut. Beim Abkühlen bilden sich nun der geringe gel. Anteil Na aus u. bildet eine große Zahl sehr kleiner Teilchen, die eine zeitlang von kolloidaler Größe sind. Diese kleinen Teilchen bilden letzten Endes die Ursache der feinkörnigen Struktur. Es müßte sich nach dieser Theorie durchaus möglich sein, auch mit anderen anorgan. Stoffen eine Kornverfeinerung entweder allein oder mit Na bedeutend verstärkt zu erzielen, möglicherweise auch bei anderen Legierungen. Vf. geben außerdem noch eine andere Theorie, nach der das Alkalimetall als Schutzkolloid wirkt. Da Na in der Legierung als 0,02% in der Legierung enthalten ist u. die modifizierende Wrkg. verfehlt, wenn die Legierung im geschmolzenen Zustande längere Zeit stehen bleibt, so ist es an man weitere Stützpunkte für die Annahme der ersten Theorie. (Chem. Metallurg. Engineering 31. 504—8. 1924. Aluminium Co. of America.) WILKE.

P. Oberhoffer und Ernst Zingg, *Über die Schalenbildung beim Temperen*

prozeß. Für die störungsfreie Durchführung des Tempergusses ist die Gas- von großer Bedeutung. Es wurde erneut festgestellt, daß die dem Diagramm BOUDOUARD u. SCHENCK entsprechenden Bedingungen sich einstellen. — Schalenbildung wird verhütet, wenn man neben Einhaltung einer nicht zu Temp. eine günstige Zus. des Tempermittels wählt ($\text{FeO} : \text{Fe}_2\text{O}_3 = 9$). Die Neuzur Schalenbildung wächst bei zunehmendem Si-Gehalt des Tempergutes. — begünstigt die Oberflächenstörungen, was durch Zusatz von Mn abgeschwächt werden scheint. (Stahl u. Eisen 44. 1197—1200. 1924. Aachen.) LÜHR

J. Newton Friend, D. W. Hammond und G. W. Trobridge, *Der Einfluß der Emulsoide auf die Löslichkeit von Eisen*. Emulsoide oder schützende Körper üben einen sehr deutlichen verzögernden Einfluß auf die Eisenkorrosion aus. Die Verzögerung wird durch die Adsorption der Emulsoide verursacht. Es wird besprochen, wie man natürliche u. andere Gewässer behandeln könnte, um sie gegen Fe- u. Nichteisenmetalle wenig korrodierend zu machen. Bei diesen Verss. wurden kleine Eisenplatten in Bleiacetatslgg., welchen bestimmte kleine Mengen Ag zugesetzt waren, aufgehängt. Die Ergebnisse zeigen eine deutliche Korrosionsverzögerung mit steigender Agar-Konz. Andere Eisenplatten wurden in CuSO_4 Lsg. mit 0,05% Emulsoid enthielten, mit demselben Erfolge gehängt. Die Korrosion wächst mit der Temp., bei Zusatz von Emulsoiden steigt zuerst auch die prozentuale Verzögerung gering mit der Temp., um dann später zu fallen. In verd. Lsg. war bei schneller Rotation der Platten keine Korrosionsverminderung wahrnehmbar. Daß eiserne Küchengeräte sich beim Gebrauch wenig abnutzen, muß man nicht in den schützenden Eigenschaften der kolloidalen Nahrungsmittel, die in ihnen gelöst werden, zuschreiben. (Trans. Amer. Electr. Soc. 46. 12 Seiten. 1924. Mun. Sch. School, Birmingham. Sep.) WICK

William E. Greenawalt, Denver, V. St. A., *Metallurgisches Verfahren*. In Zn, Au u. Ag enthaltende Erze werden durch Schwimmverf., mechan. Scheidung, in 3 Teile zerlegt, welche reich an Pb bezw. Cu bezw. Zn u. arm an den übrigen Metallen sind. Der bleireiche Teil wird geröstet, dann mit etwas W. vermischt und gibt u. hierauf unter Zusatz von Kohle u. Flußmittel verschmolzen, wobei Pb, Cu, Edelmetalle ausschmelzen, Cu als Matte erhalten wird u. Zn in die Schlacke übergeht. Der kupferreiche Teil wird unter Zusatz der erhaltenen Matte u. zwecks Pyrit abgeröstet u. das Erzeugnis mit W. u. verd. Säuren ausgelaugt u. die Lsg. elektrolysiert, wobei die Hauptmenge des Cu u. eine zinkhaltige saure Lsg. erhalten wird, welche zum Auslaugen weiterer Anteile benutzt wird. Der zinkreiche Teil wird ebenfalls durch Rösten, soweit möglich, l. gemacht, mit verd. H_2SO_4 beizt, die Ablauge von der vorerwähnten Kupferelektrolyse ausgezogen, die Lsg. durch Elektrolyse vom Cu befreit u. elektrolysiert. (A. P. 1509947 vom 22/7. 1921, ausg. 30. 1924.) KÜHNIG

Andrews & Company Ltd. und Arthur Mc Dougall Ducham, *Industrielle Herstellung von Erz- oder Brennstoffbriketten o. dgl.* (E. P. 197433 vom 18. 1922, ausg. 7/6. 1923. — C. 1924. I. 593 [F. P. 562097].) OEIER

Stefanus Johannes Vermaes, Delft, und **Leonard Louis Jaques van Inden**, s'Gravenhage, *Metalle aus Erzen*. (D. R. P. 405803 Kl. 40a vom 11/11. 1921, ausg. 8/11. 1924. Holl. Priorr. 12/11. u. 14/11. 1921. — C. 1923. II. 672. 681 KÜHNIG

Ralph E. Sayre, New Rochelle, N. Y., *Erzkonzentration nach dem Schwimmschwimmverfahren*. Man unterwirft das Erz in Form eines alkal. gemachten Erzes in Ggw. eines Schwermetallxanthats u. eines Schaumerzeugungsmittels dem üblichen Schwimmprozeß. — Die Schwermetallxanthate, besonders Bleixanthat, haben eine ausgezeichnete selektive Wrkg. auf sulfid. Erze. (A. P. 1512139 vom 24/1. 1921, ausg. 21/10. 1924.) OEIER

G. Perkins, T. J. Taplin und Metals Production, Ltd., London, Auslaugen Metallverbindungen aus Erzen. Die gegebenenfalls vorbehandelten Erze werden v. ammoniakal. Lsgg. behandelt, deren Gehalt an NH_3 dem Gehalt an den gegebenenfalls vorhandenen Metall-, besonders Cu-Verbb., angepaßt ist. Die erhaltenen Lsgg. werden mit Luft behandelt u. zum Auslaugen weiterer Erzmengen benutzt, von der belüftet usw., wobei die verwendete Luft zwecks Erhaltung des von ihr gebundenen NH_3 wiederholt benutzt u. schließlich in Rieseltürmen gewaschen wird. Die Cu- u. dgl. Verbb. angereicherten Lsgg. werden durch Dest. von etwa 80% NH_3 Gehalts an NH_3 befreit, der Rückstand zunächst zum Auslaugen armer Erze benutzt u. schließlich, zwecks Gewinnung des gesamten NH_3 unter Zusatz von NaCl oder K_2CO_3 oder der entsprechenden Carbonate dest. (E. P. 220720 vom 15. 1923, ausg. 18/9. 1924.) KÜHLING.

Gar Arthur Ashcroft, London, Chlorierscheidverfahren für Blei-, Zink-, Nickel- u. dgl. (D. R. P. 404927 Kl. 40a vom 10/7. 1923, ausg. 23/10. 1924. Prior. 14/7. 1922. — C. 1923. IV. 793.) KÜHLING.

Etchells, Bradway, A. Popplewell und L. Cameron & Son, Ltd., Sheffield, Legierungen. Die Legierungen enthalten neben Fe 26—50% Ni, 5 bis 10% C, nicht mehr als 0,25% C u. gegebenenfalls bis zu 2% Mn, Si, Al, Mg, Cu, P, Mo, W, V, U, Cu oder Ti oder mehrere dieser Elemente. Das Ni kann ganz oder teilweise durch Co ersetzt werden. Bei der Herst. werden vor der Reduktion die Oxyde der genannten Elemente durch Si, Mg oder Al reduziert. Die Legierungen sind säurefest u. zur Herst. von Tafel- u. Kochgeschirr geeignet. (E. P. 220710 vom 22/5. 1923, ausg. 18/9. 1924.) KÜHLING.

Edihütte, Kladno, Tschecho-Slowakei, Legierungen, welche neben Fe 9 bis 20—36% Ni, nicht mehr als 0,2% C u. nicht mehr als 1% Si oder Mn oder Cu enthalten, z. B. eine 15% Cr, 22% Ni, 0,5% C, 0,3% Si, 0,5% Mn u. dgl. enthaltende M. Die Legierungen sind säurebeständig. (E. P. 221511 vom 14. 1924, Auszug veröff. 5/11. 1924. Prior. 5/9. 1923.) KÜHLING.

Mathesius und H. Mathesius, Charlottenburg, Legierungen. Die kohlenstoffhaltigen Legierungen enthalten neben Fe bis zu 6% Ti u. gegebenenfalls Mn, Cr, Cu, W, Mo oder V oder mehrere dieser Metalle. Zur Herst. wird möglichst saureisernes Fe geschmolzen, Mn, Cr usw. oder mehrere von ihnen u. dann Ti oder Titan zugegeben, oder es wird Fe unter einer aus CaO , Mangan- u. Titan-oxiden bestehenden Schlacke entkohlt, worauf die im Titaneisenerz enthaltene Verbb. mittels Al zu Metall reduziert wird, welches sich im Eisenbad auflöst. Es kann auch zunächst bei Abwesenheit von Titanerz entkohlt, dann die Schlacke durch eine aus Titaneisenerz u. CaO bestehende Schlacke ersetzt u. diese durch Petroleumkoks oder CaC_2 reduziert werden. (E. P. 221529 vom 11/4. 1923, ausg. 10. 1924.) KÜHLING.

Société anonyme des Hauts-Fourneaux Forges et Acieries de Pompey, Herstellung von manganreichem Stahl. (D. R. P. 405677 Kl. 18b vom 14/7. 1924, ausg. 4/11. 1924. F. Prior. 31/7. 1922. — C. 1924. I. 104.) KÜHLING.

Amloose Vennootschap Philips Gloeilampenfabriken, Eindhoven, Niederl., übert. von: D. Coster, Haarlem, Holl. und G. von Hevesy, Kopenhagen, Gewinnung von Hafnium und Zirkonium. Die beiden Metalle werden durch fraktionierte Krystallisation der einfachen oder komplexen Oxalate getrennt. (E. P. 221530 vom 18/7. 1924, Auszug veröff. 22/10. 1924. Prior. 25/8. 1923.) KAUSCH.

Arthur H. Lawry, Goldfield, V. St. A., Fällern von Edelmetallen aus Cyanid-Lsgg. Die Lsgg. werden mit Aktivkohle behandelt, welche auch aus verdünnten Lsgg. die Gesamtmenge an Edelmetallen ohne oder unter geringem Verlust als Cyanid fällt. (A. P. 1509156 vom 22/8. 1922, ausg. 23/9. 1924.) KÜHLING.

E. I. du Pont de Nemours & Company, Wilmington, übert. von: **W. S. Calcott**, Pennsgrove, V. St. A., *Bleialkalimetalllegierungen*. Blei u. ein Metall, vorzugsweise Na werden, zweckmäßig in dem der Formel $PbNa$ entsprechenden Mengenverhältnis zunächst in einer Atm. von CO_2 , dann unter Schutzdecke von Kaliumnatriumhydroxyd zusammengeschmolzen u. das Ge- von KOH u. $NaOH$ nach dem Erstarren der Legierung abgegossen. (A. P. 1510 vom 23/10. 1922, ausg. 23/9. 1924.) KÜHN

Richard Walter, Düsseldorf, *Legierungen*. (A. P. 1509624 vom 26/6. 1924, ausg. 23/9. 1924. — C. 1922. IV. 243 [E. P. 143553].) KÜHN

W. C. Heraeus Ges., Hanau, *Legierungen* für Kompaß-, Grammophon- u. dgl., bestehend aus W, 10—15% Pt u. bis zu 1,5% C. Zur Herst. werden Bestandteile gemischt, gepreßt u. in einem Strom eines reduzierenden Gases elektr. Lichtbogen ausgesetzt. (E. P. 221786 vom 21/8. 1924. Auszug veröff. 1924. Prior. 10/9. 1923.) KÜHN

Aladar Pacz, Cleveland Heights, V. St. A., *Legierungen* von großer mäßiger Wärmeausdehnung u. guter Gießfähigkeit werden durch Zusammenschmelzen von 87—97% Cu, 2—5% Si u. 1—10% Al erhalten, zweckmäßig in der Weise Si u. Al zunächst für sich legiert u. die Legierung dem Kupferbad zugefügt. (A. P. 1510242 vom 1/6. 1920, ausg. 30/9. 1924.) KÜHN

M. Dreifuss, Baden-Baden, *Legierungen*, bestehend aus Cu, Al, Ni, Pb, vorzugsweise 73—81,5% Cu, 10—11% Al, 6—10% Ni, 2—5% Pb u. 0,5—1% Si. Die Legierungen sind zur Herst. von Kesseln oder Überzügen von Kesseln geeignet, welche gegen die Einw. von Säuren u. Salzen beständig sein müssen. Zu Zwecks Herst. der Überzüge werden die Legierungen entweder in fester Form oder die mit Borax behandelten u. auf Rotglut erhitzten Kesselwände aufgebracht, sie werden in geschmolzenem Zustande über die erhitzten Kesselwände gegossen oder die Kessel werden wiederholt in die geschmolzene Legierung eingetaucht. Man kann auch die Bestandteile der Legierung einzeln aufbringen. (E. P. 2017 vom 1/8. 1923, ausg. 18/9. 1924.) KÜHN

J. Debuigne, Paris, *Metalle und Legierungen*. Das aluminotherm. Verfahren zur Herst. von Metallen oder Legierungen, vorzugsweise C- u. Si-armem Mn wird, die Reaktionstemp. zu verringern u. die Red. von SiO_2 zu verhindern, bei Gegenwart inerte oder schlackenbildender Stoffe, z. B. Oxyde, Hydroxyde oder Salze, vorzugsweise $Ca(OH)_2$ durchgeführt. Oxyde sind durch Behandeln mit angesäuerten oder sauren Gasen von Carbonaten zu befreien. Aus der Schlacke können Zuschläge zurückgewonnen u. zu weiteren Vorgängen gleicher Art verwendet werden. Es kann die Schlacke auf Al-Verbb. verarbeitet werden. (E. P. 221233 vom 1/8. 1924, Auszug veröff. 29/10. 1924. Prior. 31/8. 1923.) KÜHN

Western Electric Co., Ltd., London, übert. von: **Western Electric Co. Inc.**, New York, *Legierungen*, bestehend aus 10—50% Ag, 1,5—5% Sn u. 45—80% Cu, z. B. aus 15% Ag, 2—4% Sn u. 81—83% Cu. Die Legierungen sind zur Herstellung von Drahtgittern in Telephonen, Sendern u. dgl. geeignet. (E. P. 22177 vom 16/7. 1924, ausg. 9/10. 1924.) KÜHN

Vereinigte Aluminium-Werke, Akt.-Ges., Lautawerk, Lausitz, *Aluminiumlegierungen*. Die vorzugsweise Cu u. Si enthaltenden, aber Mg-freien Legierungen werden auf etwa 500° erhitzt u. ausgewalzt. Das Erzeugnis wird etwa 3 Stdn. auf etwa 500° erhitzt, an der Luft oder durch Tauchen in Öl, W. o. dgl. abgekühlt, dann bei niedriger Temp. gehärtet. (E. P. 220602 vom 4/7. 1924, Auszug veröff. 8/10. 1924. Prior. 16/8. 1923.) KÜHN

Chemische Fabrik Griesheim-Elektron, Frankfurt a. M., *Legierung* zur Herstellung von Kolben für Verbrennungskraftmaschinen, welche aus 98—99,8% Mg u. 2,2% Cu bestehen. (E. P. 220602 vom 4/7. 1924, Auszug veröff. 8/10. 1924. Prior. 16/8. 1923.) KÜHN

- geht u. bis zu 35—50 Brinell gehärtet ist. (E. P. 221873 vom 21/6. 1923, 16/10. 1924.) KÜHLING.
- Western Electric Co., Ltd., London, übert. von: Western Electric Co., Inc., New York, *Lötmittel*. Das Lötmittel ist als Hohlzylinder ausgebildet, in dessen Mitte ein Flußmittel, wie Harz, u. ein Lösungsm., wie Naphthalin, Anthracen u. Naphthol angeordnet sind. (E. P. 222044 vom 21/3. 1924, ausg. 16/10. 1924.) KÜHLING.
- General Electric Company, New York, übert. von: Heinrich Baumhauer, New York, *Harte Werkzeuge*. Man sättigt die Poren eines geformten Carbidmetalls mit einem Metall. (A. P. 1512191 vom 27/12. 1922, ausg. 21/10. 1924.) KAUSCH.
- H. Mellquist, Stockholm, *Schutzüberzüge*. Schutzüberzüge auf Metallen, die durch Oxydation dgl. werden erhalten, wenn die zu überziehenden Stoffe als Anoden bei der Elektrolyse alkal. oder ammoniakal. Lsgg. von Blei- oder Mangansalzen von Weinsäuren, z. B. Weinsäure verwendet werden. Die Elektrolyte werden z. B. durch Erhitzen einer freien Ätzalkali enthaltenden wss. Lsg. von K- oder KNa mit überschüssigem PbO oder Mn₂O₃ erhalten. Die Anoden werden durch Sandstrahlgebläse oder chem. gereinigt. Der Überzug wird gewaschen u. dann mit Paraffinwachs oder Pyroxylin bedeckt, wodurch er eine schwarze Farbe annimmt. (E. P. 220944 vom 18/8. 1924. Auszug veröff. 22/10. 1924. Prior. 23/8. 1923.) KÜHLING.
- W. Wilshaas, Vacha a. d. Werra, übert. von: Schilling & Co., Ges., Philippsburg, *Schutzfarben für Metalle*, bestehend aus einer zweckmäßig in der Mühle bereiteten Mischung von Pb u. PbO in Leinöl. Das PbO wird durch Erhitzen in Leinöl, unter Oxydation des letzteren, zu Metall reduziert. (E. P. 221224 vom 18/8. 1924, Auszug veröff. 29/10. 1924. Prior. 28/8. 1923.) KÜHLING.
- Carl Ludwig Bayer, Schaan, Liechtenstein, *Schutz von Metallflächen*. (Schwz. P. 210055 vom 12/4. 1923, ausg. 2/6. 1924. D. Prior. 16/1. 1923. — C. 1924. I. 210055.) KÜHLING.

IX. Organische Präparate.

- S. Industrial Alcohol Co., Inc., West Virginia, übert. von: Arthur A. Schottländer, Baltimore, Maryland, V. St. A., *Herstellung von Äthylchlorid*. Man leitet A. u. A.-Dampf über einen derart hoch erhitzten Katalysator, daß das bei 1. gebildete W. ausgetrieben wird. — Z. B. wird das HCl-Gas-A.-Dampf durch über seinen F. erhitztes geschmolzenes ZnCl₂, dann durch ein Gefäß, in dem sich das abgespaltene W. u. ein Teil des nicht in Rk. getretenen A. befinden, geleitet u. abgesaugt werden, geleitet. Aus diesem Gefäß treten das Äthylchlorid u. der Rest A. u. HCl in einen mit W. gekühlten Kondensator u. schließlich in 3 hintereinander geschaltete Waschgefäße. Im ersten befindet sich W. zur Absorption des HCl-Gases, im zweiten 10%ig. wss. NaOH, die den Rest der HCl absorbieren, u. im dritten H₂SO₄ 66° Bé., zur Befreiung des C₂H₅Cl von dem letzten u. zur Trocknung des C₂H₅Cl, das dann beim Austritt aus dem letzten Gefäß kondensiert wird. Bei dem C₂H₅Cl in einer Ausbeute von 80—85% umgewandten A. liefernden Verf. wird die B. von Ä. vermieden. In analoger Weise lassen sich andere ein- u. mehrwertige Alkohole mit beliebigen anorgan. Säuren verestern, z. B. mit HNO₃, HNO₂, H₂SO₄, SO₂, Phthalsäureanhydrid, CH₃·CO₂H u. deren Anhydrid. An Stelle von Alkoholen kann man auch andere Äther verwenden, wie Ä., Dipropyläther, Äthylenoxyd u. Propylenoxyd. (A. P. 1509463 vom 4/11. 1921, ausg. 23/9. 1924.) SCHOTTLÄNDER.
- Carl Linckrodt Chemical Works, übert. von: Edward Mallinckrodt, jr., St. Louis, Missouri, V. St. A., *Herstellung von luftfreiem Äther*. Der lufthaltige Ä. wird durch eine am Boden durch eine Dampfschlange beheizte Destillierkolonne, aus

deren oberen Ende ein Teil der mit Luft vermischten Ä.-Dämpfe in ein Kondensatorkolonne geleitet wird. Von hier aus wird ein Teil des von Luft befreiten Ä. in die Destillierkolonne zurückgeleitet, während der mit Luft u. anderen flüchtigen Verunreinigungen vermischte Rest aus dem ersten Kondensator in einen zweiten geleitet u. dann in ein Sammelgefäß übergeführt wird. Das so kondensierte Ä. wird als gewöhnlicher Handelsäther verwertet. Die Rückleitung des luftfreien Ä. aus dem ersten Kondensator in die Destillierkolonne wird so oft wiederholt, bis sich in dieser nur noch vollständig luftfreier Ä. befindet. Der reine Ä. fließt vom Boden der Kolonne in ein mit einem Gasometer verbundenes Sammelgefäß, aus diesem in eine geeignete, gegen Luftzutritt abgeschlossene Abfüllvorrichtung. **1508563** vom 15/2. 1923, ausg. 16/9. 1924. **Can. P. 235165** vom 6/3. 1923, ausg. 23/10. 1923.) SCHOTTLÄNDER.

Augustin Amédée Louis Joseph Damiens und **Marie Charles Joseph Elysée de Loisy**, Paris, und **Olivier Joseph Gislain Piette**, Brüssel, *Herstellung von Diäthylsulfat aus Äthylen*. Man leitet C_2H_4 bei ca. $15-0^\circ$ in 9% H_2SO_4 in Ggw. von Cu_2O oder anderen Cu-Verbb., die mit $H_2SO_4 \cdot Cu_2SO_4$ löslich sind, als Katalysatoren (hierzu vgl. auch DAMIENS, C. r. d. l'Acad. des sciences 17585; C. 1923. I. 293.) (**F. P. 556175** vom 12/12. 1921, ausg. 13/7. 1923.) SCHOTTLÄNDER.

Adolphe Jean Baptiste Jouve, Frankreich, *Herstellung von Acetaldehyd aus Acetylen*. Man leitet in ein mit W., metall. Hg u. $FeCl_3$ beschicktes, geschlossenes u. mit Rührwerk versehenes Gefäß unter kräftigem Rühren langsam C_2H_2 ein u. gibt gleichzeitig $FeCl_3$ in kleinen Anteilen solange hinzu, als noch C_2H_2 absorbiert wird. Ein Teil des gebildeten CH_3CHO bleibt in Lsg., während der Rest gasförmig entweicht u. kondensiert wird. Der im Reaktionsgemisch befindliche CH_3CHO wird durch geeignete Mittel entfernt, die Fe-haltige Fl. abdekantiert, der Oxydation unterworfen u. erneut verwendet. Ein Zusatz von H_2SO_4 zu der Reaktionslösung erleichtert die spätere Abtrennung des CH_3CHO . Das Verf. macht die Uebersäuerung des Hg entbehrlich, da lediglich das bei der Rk. entstandene $FeCl_3$ zu $FeCl_3$ oxydiert werden muß. (**F. P. 552152** vom 14/10. 1921, ausg. 25/10. 1923.) SCHOTTLÄNDER.

Carbide and Carbon Chemicals Corporation, New York, übert. von **Charles O. Young**, Pittsburgh, Pennsylvania, *Herstellung von Oxalsäure*. Man läßt im geschlossenen Gefäß durch eine wss. Lsg. von durch Oxydation Oxalsäure liefernden Stoffen, wie Kohlenhydraten oder Glykol, ein gasförmiges Gemisch aus N-Oxyden u. O_2 im Kreislauf strömen u. gibt zur Vervollständigung der Rk. ein unverd. O_2 hinzu. — Z. B. wird ein kräftiger Strom eines Gemisches aus N_2 u. O_2 durch eine 40—50%ig. auf $60-80^\circ$ erhaltene wss. Glykollsg. geleitet; die überschüssigen Gase werden am oberen Ende des Gefäßes gesammelt u. mittels einer Pumpe erneut durch die Lsg. getrieben. Der bei der Rk. absorbierte O. wird zeitweise durch neue Mengen des reinen Gases ersetzt, so daß er stets im Überschuß vorhanden ist. Nach 6—7 Std. wird die Lsg. abgezogen u. gekühlt, wobei die Oxalsäure auskristallisiert. Nach Filtration wird die nicht oxydierte Glykollsg. u. gel. Oxalsäure enthaltende Mutterlauge zusammen mit einer neuen Glykollsg. in den Reaktionsturm zurückgegeben u. das Verf. wiederholt. Neben N-Oxyden, N_2 , Luft u. CO_2 enthaltenden Abgasen werden zeitweise auch einen Auslaß des Reaktionsgefäßes abgelassen u. durch eine Alkalilsg. geleitet, der die wertvollen N-Oxyde als Alkalinitrat oder -nitrit aufgefangen u. so Verlust an ihnen fast ganz vermieden werden. Die Verwendung von Katalysatoren empfiehlt sich nicht, da z. B. kleine Mengen in HNO_3 gel. V_2O_5 die Oxydation der Glykole verzögern. Durch den Zusatz von reinem O_2 werden die bei der Umd. des N_2O_4 auf das Glykol mit entstanden niederen N-Oxyde wieder zu N_2O_4 oxydiert.

des so besser ausgenützt. Die Ausbeuten an Oxalsäure betragen 70—80%,
 eberie. (A. P. 1509575 vom 5/4. 1920, ausg. 23/9. 1924.) SCHOTTLÄNDER.
 adische Anilin & Soda-Fabrik, Ludwigshafen a. Rh., *Blausäure*. (Teilref.
 F. P. 568423 vgl. C. 1924. II. 545.) Gemische von CO u. NH₃, welche auch
 er N₂ enthalten können, oder Dämpfe von *Formamid* oder *ameisensaurem*
 welche aus CO u. NH₃ unter Druck bei Ggw. von W. hergestellt werden,
 en über erhitztes, durchscheinendes kleinporiges Al₂O₃ von glasiger Oberfläche
 eit. Dieser Katalysator, der auch Oxyde oder Hydroxyde anderer Metalle,
 h, Zr oder U, enthalten kann, wird durch Fällen von wss. Lsgg. von Alu-
 insalzen, denen gegebenenfalls l. Salze der erwähnten anderen Metalle bei-
 sind, mit NH₃, Waschen, Trocknen u. schnelles Glühen des Nd. gewonnen.
 erwendung des Gemisches von CO u. NH₃ wird der Katalysator auf 500 bis
 beim Arbeiten mit Formamid u. Ammoniumformiat auf 300° erhitzt. (E. P.
 1 vom 5/7. 1923, ausg. 18/9. 1924.) KÜHLING.

enneth Claude Bailey, Irland, *Herstellung von Harnstoff, Thioharnstoff*
 deren *Substitutionsprodukten*. Ein Gemisch aus CO₂ u. NH₃ durchströmt bei
 gt ein Quarz- oder Porzellanrohr, in dem sich ein konzentriertes, gelagertes, von
 V durchströmtes Glasrohr befindet. Zweckmäßig verwendet man NH₃ im
 yhuß u. arbeitet in Ggw. eines W. bindenden Katalysators, wie ThO₂ oder
 O. Durch die plötzliche Abkühlung der erhitzten Gase wird die Ausbeute an
 rstoff, der sich an der k. Glaswand niederschlägt, beträchtlich erhöht (vgl.
 h. r. d. l'Acad. des sciences 175, 279; C. 1922. III. 1289.) — Unter völlig
 en Bedingungen, sowie in Ggw. eines H₂S bindenden Katalysators, wie CdS,
 man aus CS₂ u. NH₃ *Thioharnstoff*. — Ersetzt man das NH₃ durch *aliphät.*
aromat. Amine, so lassen sich die entsprechenden *substituierten Harnstoffe* u.
urnstoffe gewinnen. (F. P. 554520 vom 27/7. 1922, ausg. 12/6. 1923.) SCHOTTL.

ndré Weiss, Frankreich, *Herstellung von aromatischen Oxyaldehyden und*
Derivaten. Phenole oder deren Derivv. werden mit *aromat. Nitroverbind.* in
 alkoh. Lsg. in Ggw. eines Katalysators erhitzt. — Geeignete Nitroverbind.
 itrosophenole, Nitrosobenzol, p-Nitrosodialkylanilin, Nitrosonaphthole. Z. B.
 r Hälfte seines Gewichtes mit HCl gesätt. *Methylalkohol* mit 1-Nitroso-2-oxy-
 halin vermischt u. in Ggw. von CuO als Katalysator zum Sieden erhitzt. Hierauf
 an langsam *Phenol* hinzu u. läßt 4 Stdn. kochen, verd. die alkoh. Lsg. mit
 dest. den überschüssigen CH₃OH mit Wasserdampf ab. Nach dem Erkalten
 der entstandene *p-Oxybenzaldehyd* extrahiert u. durch Dest. im Vakuum sowie
 illisation aus W. gereinigt. (F. P. 546570 vom 31/1. 1922, ausg. 16/11.

SCHOTTLÄNDER.

aphime Levienne, Paris, Frankreich, *Herstellung eines Trichlornaphthalins*.
 rhitzt 1 Mol. Naphthalin mit 3 Mol. Cl₂ unter Druck auf 150—160°. — Das
 rlnaphthalin, C₁₀H₅Cl₃, F. 80°, Kp. 277°, sublimierbar, von campherähnlichem
 u, ll. in Alkoholen, Äthern, fetten Ölen, Aceton u. den üblichen Lösungsmm.
 mpher u. Nitrocellulose, farblos u. durchsichtig, findet als *Campherersatz*-
 bei der Herst. von Celluloid, plast. MM. u. Lacken, ferner als Antisepticum
 nfektionsmittel Verwendung. (F. P. 559926 vom 21/3. 1922, ausg. 24/9.

SCHOTTLÄNDER.

X. Farben; Färberei; Druckerei.

F. Meyer, *Antike Färbemethoden als Vorstufen der modernen Farben-*
ie. Angaben über Reinigen, Beizen, Färben u. Abziehen aus dem griech.
 im lassen eine hohe Entw. der damaligen auf reiner Empirie beruhenden
 teredlung erkennen. (Ztschr. f. ges. Textilind. 27, 458—60, 1924. Bonn.) St.

Wilhelm Christ, *Die Bedeutung des Ruths-Speichers für Färbereien*. Vb richtet über die günstigen Ergebnisse, die durch Einbau einer Ruths-Speichers in der Textilausrüstungsges. m. b. H. in Krefeld durch die Gutehoffnungshütte in Oberhausen erzielt worden sind: Verbesserung u. Erhöhung der Produktion Kohlen- u. Heizflächenersparnis, Verminderung des Fremdstrombezuges. D Wärme 47. 548—50. 562—66. 1924.) NEIDHART.

Paul Ruggli und **Albert Fischli**, *Über den Einfluß der Teilchengröße Farbstoffen auf den Färbevorgang*. (IV. Mitteilung über Färbevorgänge.) (III. Helv. chim. Acta 7. 514; C. 1924. II. 244.) Um die Teilchengröße verschiedener Farbstoffe miteinander zu vergleichen, wurden die Diffusionsgeschwindigkeiten nachgenannter Farbstoffe in 4%ig. Gelatinelsg. bestimmt: Farbstoffe aus; 1. Anilinschäffersalz, 2. Sulfanilsäure + β -Naphthol, 3. Anilin + R-Salz, 4. Anilin + G-Salz, 5. Sulfanilsäure + Schäffersalz, 6. Anilin + Naphtholtrisulfosäure, 7. Sulfanilsäure + R-Salz, 8. Sulfanilsäure + G-Salz, 9. Sulfanilsäure + Naphtholtrisulfosäure, 10. Krystallviolett; von substantiven Farbstoffen wurden untersucht: 11. Erika B, 12. Chrysophenin G, 13. Diaminreinblau, 14. Diaminschwarz R, 15. Benzopurpurin 4B, 16. Benzoazurin G. Ergebnisse nach 12, 36, 60 u. 84 td vgl. Tabelle im Original; es ergibt sich aus dieser Tabelle ein deutlicher Unterschied zwischen den schnell diffundierenden Farbstoffen 1—10 (innerhalb 84 td 23—31 mm) u. den langsam diffundierenden substantiven Farbstoffen (innerhalb derselben Zeit 0—10 mm). Eine Abhängigkeit der Diffusionsgeschwindigkeit vom Sulfonierungsgrad der Verbb. 1—9 hat sich nicht feststellen lassen; von den Farbstoffen 11—16 diffundiert 11 am schnellsten. — Folgende violettblaue anilinfarbstoffe, die in neutralem Bad Baumwolle mehr blau, Wolle mehr kräftig rot färben, wurden bzgl. der Änderung der Nuancen der Flotten, der gebräuten Flotten u. der Ausfärbungen auf Wolle oder Baumwolle (in letzterem Falle mit Zusatz von A.) untersucht: 17. Diaminblau 3 R, 18. Benzoazurin G, 19. Azoblaulack 20. Benzoblau 4 R, 21. Diaminschwarz R O, 22. Direktgrau R. Ergebnisse tabelliert im Original. Temperaturerhöhung verschiebt in der Regel die Nuance der Färbung nach rot; nur 17. wird mehr blau bis 60°, die Blaufärbung geht bei weiterer Erhöhung der Temp. wieder etwas zurück. Ein Vergleich der Baumwoll- u. der Wollfärbung zeigte, daß Wolle durchweg röter als Baumwolle gefärbt wird. Vergleicht man die Baumwollausfärbung mit der nach der Färbung zurückbleibenden Flotte, so ergibt sich (mit Ausnahme von 19.), daß erstere mehr blau, letztere mehr rotlicher ist. Derselbe Vergleich mit Wolle angestellt, ergibt, daß bei 17., 18. u. 19. wie erwartet die Farbe der Wolle röter als die der gebrauchten Flotte ist, bei 20. war das Ergebnis zweifelhaft, bei 20. zeigte sich entgegengesetztes Verh. — Essigsäure von A. färbt die ursprüngliche Flotte röter, nur 20. wurde kaum verändert. Essigsäure von Essigsäure verschiebt die Farbe der Flotte (wenn überhaupt) gegen blau. Alkali gegen rot; 20. wurde durch beide Mittel blauer. Eine k. Lsg. von 20. ist blauer als eine heiße; durch Filtrieren erhält man ein rötliches Filtrat u. einen blauen Rückstand, der beim Auskochen mit dest. W. eine violette Lsg. mit reichlichem Schaum gibt; bei fortgesetztem Kochen entstehen immer bläulichere Filtrate, bleibt ein blauer Rückstand. Die größten Teile dieses Farbstoffs überschreiten anscheinend die zum Färben erforderliche Teilchengröße. Die Verss. mit anderen Farbstoffen 18.—22. bestätigen die von HALLER u. RUSSINA (Kolloid-Ztsch. 3. 249; C. 1922. IV. 550) vertretene Anschauung, daß in diesen Farbstofflsg. verschieden große Teilchen existieren. (Helv. chim. Acta 7. 1013—18. 1924. Anst. f. organ. Ch.) HABERLAND.

Johannes Pfleger, *Superoxydbleiche der Baumwolle*. (Vgl. S. 167.) Das Patent des D.R.P. 284761 der Deutschen Gold u. Silber-Scheideanstalt vormals Roessler (C. 1915. II. 210) war das erste gute O₂-Bleichverf. für Rohwolle.

Es arbeitet mit angemessener Flottenlänge, angemessener Temp., angemessener Konz. unter Zusatz eines stabilisierend wirkenden Mittels. (Melliands Ber. 5. 729—30. 1924.) SÜVERN.

A. Tigerstedt, *Alizarinrot- und -rosa auf nicht geöltem Stoff*. Setzt man zu Druckfarbe ein Prod., welches man durch Versetzen von Ricinusölsulfosäure mit Formaldehyd oder durch Einw. von Formaldehyd auf Ricinusöl u. nachträglich Sulfieren erhalten hat, so erzielt man dasselbe wie auf geöltem Stoff. (Soc. ind. Mulhouse 90. 555. 1924.) SÜVERN.

J. F. Budgen, *Cadmiumverbindungen in der Industrie. Verwendung in Anstrichen, Farben und Emailen*. Die Herst. der verschiedenen Cd-Sulfide, ihre Eigenschaften u. Prüfung, u. ihre Anwendung in Anstrichen, Farben, im Zeugdruck, im Färben von Kautschuk u. in der Keramik ist beschrieben. Weitere Angaben beziehen sich auf Cd-Zn-Ba-Pigmente sowie Cd-Lithopone. (Chem. Trade Journ. 41—43. 1924.) SÜVERN.

Ch. Coffignier, *Die Antimonweißfarben*. Die Herst. der Antimonweißfarben u. ihre Eigenschaften werden besprochen. Die Farben haben, wenn sie auch nicht die hervorragenden Eigenschaften der Titanweiß zeigen, doch eine gute Deckkraft, sind für Außenanstriche u. sind weniger empfindlich gegen H₂S u. weniger giftig als Pb-Farben. Zur Behebung einiger Mängel ist es unerlässlich, dem Antimonweiß 20—30% Zinkweiß zuzusetzen, die Mischung trocknet besser, verarbeitet leichter u. gibt einen härteren Überzug. (Rev. de chimie ind. 33. 262—65. 1924.) SÜVERN.

Erh. Bogner, *Zur Kenntnis der Cadmiumfarben*. Angaben über das mkr. Verhalten, chem. Unters. u. Maleigenschaften. (Farbe u. Lack 1924. 480—81. 1924.) SÜVERN.

A. H. Walker und E. F. Hickson, *Einige Beobachtungen über Aluminiumfarben*. Eine Al-Farbe mit 25—30% Al-Pulver in gekochtem Leinöl oder einem anderen aus diesem u. spar-Firnis (?) gibt einen haltbaren Außenanstrich, wenn 1—2 Anstriche aufgebracht werden. 2 Anstriche sind gut auf Metall, 1 Anstrich ist für Holz zu empfehlen. 15% Al wirken nicht so gut, gekochtes Leinöl ist besser als andere Öle. Al-Farben in verschlossenen Behältern können Gase entwickeln u. die Behälter zersprengen. Bei senkrechten Anstrichen ist zu beachten, daß kein Abfließen eintritt. Einzelheiten über verschiedene Anwendungsweisen. (Chem. Engineering 31. 693—96. 1914.) SÜVERN.

Charles Raczkowski, *Indanthrenblau*. Verss., beim Drucken großer Fonds Indanthrenblau die teure Weinsäure, die unegale Färbungen gibt, zu ersetzen, indem man, daß Glucose vollkommen gleichmäßige Färbungen zu liefern imstande ist. (Soc. ind. Mulhouse 90. 553—54. 1924.) SÜVERN.

Ch. Coffignier, *Das Dickwerden der Lackfarben*. (Vgl. Bull. Soc. Chim. de Paris [4] 35. 898; C. 1924. II. 1980.) Aus mitgeteilten Verss. wird geschlossen, daß die Natur der Acidität von Firnissen von Wichtigkeit ist. Ein verhältnismäßig schwach saurer Firnis kann schneller zur Verdickung führen als ein anderer mit höherer Acidität. Nur die Verwendung fast neutraler Firnisse aus verschiedenen Harzen oder die Vermeidung von Pigmenten mit bas. Bestandteilen ermöglicht es, zu nicht dickwerdenden Farben zu gelangen. Mit RAGG (Farben-Ztg. 4. 9. 1923) wird angenommen, daß bei einem mageren Firnis mit nicht neutralisiertem Kolophonium das Dickwerden durch B. von Pb-Abietinat erklärt werden kann. Diese Erklärung ist aber nicht am Platz bei Firnissen aus neutralisiertem Kolophonium oder mit viel Öl, auch nicht bei Bleiweißfarben mit gelbem Mn-Resinat als Trockenmittel. (Rev. gén. des Colloids 2. 201—4. 1923.) SÜVERN.

Oswald PreiBer, *Rationelle Fabrikation schwarzer Druckfarben*. (Vgl. Farbztg. 29. 1841; C. 1924. II. 2702.) Angaben über Reibmaschinen für Rotationsfarben, Selbstkonstruktion einer Etagenmaschine, die Stabilisierung der schwarzen Druckfirnisse, das Abstimmen schwarzer Druckfarbenkonsistenzen, das Abstimmen der Spezialfarben u. verschiedene Anreibungsmethoden für Illustrationsfarben (Farben-Ztg. 30. 453—55. 1924.) SÜVER

Hans Klatte, *Neuerungen im Rostschutz*. Nach Betrachtungen über die Rosten sich abspielenden Vorgänge werden die gegen Rost vorgeschlagenen *Anstrichmittel*, hauptsächlich nach der Patentliteratur u. die Rostentfernungsmittel besprochen. (Farbe u. Lack 1924. 431—32. 455.) SÜVER

Carl Ernest Julius Goedecke, Manchester, übert. von: **Wilhelm Eberlin**, Kochel, Oberbayern, *Silicate*. Man behandelt bas. Farbstoffe mit Al-Silicaten, die entfärbende oder basenaustauschende Eigenschaften besitzen u. einer Menge Farbstoffe, die nicht hinreicht, den Farbstoff zu lösen. Die Mischung wird erhitzt. (Ca P. 238 611 vom 14/8. 1923, ausg. 11/3. 1924.) KAUSCH

New Jersey Zinc Company, New York, *Herstellung von Farbstoffen aus eisensaltigen Zinkerzen*. (D. R. P. 404 624 Kl. 22f vom 21/7. 1920, ausg. 21/10. 1924. A. Prior. 26/10. 1917. — C. 1922. IV. 713.) KÜHLIN

Th. Goldschmidt Akt.-Ges., Essen, *Farben*. Die nach dem Verf. des IP. 189 132 (C. 1923. II. 729) gewonnene hochdisperse Bleiglätte wird, gegebenenfalls unter Zusatz von Ruß oder einem anderen Farbstoff, mit einem Bindemittel, wie Öl oder Lack, vermischt. (E. P. 220 316 vom 6/8. 1924. Auszug veröff. 10/8. 1924. Prior. 9/8. 1923.) KÜHLIN

Nevil Monroe Hopkins, New York, *Feuerbeständiger Anstrich bestehend aus W., Rohöl u. Na₂SiO₃, u. mehr als 25% fein verteiltem Asbest, Lithopone, Kiesel u. Kaolin*. (Can. P. 237 347 vom 8/6. 1923, ausg. 29/1. 1924.) KAUSCH

Nevil Monroe Hopkins, New York, *Feuer- und wetterbeständiger Anstrich bestehend aus einem wasserfesten Häutchen mit Farbstoff u. mehr denn 60% fein verteilten Borax*. (Can. P. 237 355 vom 8/1. 1923, ausg. 29/1. 1924.) KAUSCH

Samuel Allan Armstrong, Detroit, Mich., übert. von: **Edward R. Stovall**, Portland, Ind., *Isolier- und Schutzanstrich erhalten durch Behandeln von SiC mit einer Lsg. von NaOH u. Mischen mit Na₂SiO₃*. (Can. P. 237 511 vom 5/12. 1921, ausg. 29/1. 1924.) KAUSCH

Oscar Brandenberger, Zürich, *Anstrichmittel*. (Oe. P. 97 401 vom 13/5. 1922, ausg. 10/7. 1924. Schwz. Prior. 14/5. 1921. — C. 1922. IV. 552 [E. P. 179 961].) KAUSCH

XI. Harze; Lacke; Firnis.

F. M. Beegle, *Herstellung von Estergummi auf kaufmännischer Grundlage*. (Vgl. Ind. and Engin. Chem. 16. 953; C. 1924. II. 2704.) Estergummi wird hergestellt durch Kondensation von 600 Teilen Harz, 75 Teilen Glycerin u. ca. 40 Teilen Holzöl. Nach Verss. des Vfs. ist es nicht nötig in geschlossenen Apparaten zu arbeiten, wenn man beim Erhitzen unter 375° F. bleibt. Al-Kessel sind wirksamer als Cu-Kessel. (Ind. and Engin. Chem. 16. 1075—76. 1924. Cleveland [Oh.].) GRIMM

A. Tschirch, *Die Schellackfabrikation in Britisch-Indien*. Einzelheiten über den Hand-, den Maschinen- u. den Alkoholprozeß. (Schweiz. Apoth.-Ztg. 62. 17 bis 719. 1924.) SÜVER

Henry A. Gardner, *Erscheinungen an Farben und Firnissen, welche auf kolloidalen Wirkungen beruhen*. Angaben über die netzende Wrkg. von Bindemitteln u. Verdünnungsmitteln auf Pigmente, Mahlen der Farbpasten, Ölaufnahme der Pigmente während des Mahlens, Textur der Pigmente, Verteilung u. Farbkraft von

gentpulvern, selektive Adsorption in Farben, Adsorption von Pigment an
gent, Plastizität u. Deckkraft von Farben, Kautschuklsgg., elektr. Ladungen
arbkörperchen, Capillarität u. Oberflächenspannung, physikal. Beständigkeit
rben, Gelatinierung infolge Adsorption, Körnigwerden von Farben, Brown-
Bewegung, Emulsionen, Dispersionsgrad von Gummen in Firnissen, Deck-
al von Firnissen, Polymerisationserscheinungen, Veränderung der Viscosität von
ri sen, bleichende Wrkg. von W. auf Firnishäute, Einw. der Textur des CaO
iner Verwendung zur Herst. bestimmter Firnisse, Rolle der Fettsäuren in
r n, Erscheinungen an Farben u. Firnissen, welche auf gegenseitigen Wrkgg.
r verschiedenen Bestandteile beruhen. (Rev. gén. des Colloids 2. 228—34.

SÜVERN.

Richard Hueter, *Hydroterpin, ein neues Lösungsmittel für die Lack- und
rindustrie*. Das von der Continentalen Terpentin-Ges. m. b. H., Wien I,
reges, der J. D. RIEDEL Akt.-Ges. in den Handel gebrachte Hydroterpin be-
h im wesentlichen aus terpenartigen KW-stoffen u. ist frei von arom. u.
p. t. Bestandteilen. Eigenschaften, Anwendungsweise u. Verh. werden ge-
niert. Hydroterpin ist ein hochwertiges Lösungsm. für die Lack- u. Farben-
rie u. kann als Ersatz für amerikan. u. französ. Terpentinöl empfohlen werden.
ien-Ztg. 30. 348—49. 1924.)

SÜVERN.

-, *Einige Lehren aus der Praxis des Trocknens der Ölfarben und Lacke*. An-
b über Kochen von Leinöl, Trockenmittel, Wrkg. der Pigmente, Harzfirnisse,
gn von Firnissen, Trocknen der Magerlacke, Wrkg. der Hartharze. (Farbe u.
e 1924. 454. 468.)

SÜVERN.

.. **Samtleben**, *Beitrag zur Trockendauer von Standöl*. Verss. die Trocken-
u durch Verwendung der leinölsäuren Salze zweier katalyt. wirkender Metalle
zusetzen, ergaben, daß Standöl gleich den Lacken in 2 Phasen aufdrocknet,
erhärtet es oberflächlich u. dann trocknet es durch. Eine Verstärkung der
oenwrkg. des Co war durch Zusatz von Mn oder Pb nicht zu beobachten.
ot die stärkste Trockenwrkg. aus, nur eine Kombination mit Pb kommt ihm
n (Farben-Ztg. 30. 400. 1924. Loitsch b. Weida.)

SÜVERN.

.. **Cuénot**, *Ein Ersatz für Terpentinöl, Dipterocarpusöl*. Angaben über Ge-
ng u. Eigenschaften des indochines. Holzöls. Das Öl eignet sich allein oder
emisch mit Terpentinöl zur Herst. von Firnis. Es verharzt leicht u. gibt dem
r einen besonderen Glanz. Besonders für billige Firnisse ist es brauchbar.
r seine geringe Entflammbarkeit eignet es sich für Arbeiten in der Wärme,
n kann es für Sikkative, für die Kautschukindustrie u. enkaust. Wachsmalerei
ndet werden. (Rev. chimie ind. 33. 259—62. 1924.)

SÜVERN.

Vürth, *Das Zentrifugieren der Lacke*. Nach Besprechung der Zentrifugen
HEINE, der De Laval Separator Company, von DÜRKOPP, RUDOLF
G., KRUPP, der Zentrifugal Separators Ltd., der Superzentrifuge von
HITH u. des Vickcen Centrifugal Separators bezeichnet Vf. die App. als
eltnismäßig einfach gebaut, leicht zu reinigen u. zu handhaben u. hebt hervor,
3ie wenig Platz u. Kraft gebrauchen. Es ist wahrscheinlich, daß sie die
trapp. verdrängen werden. (Farben-Ztg. 30. 289—91. 1924.)

SÜVERN.

anfred Ragg, *Teerlacke als Unterwasserfarben*. Teerlacke schützen weder
g. Rost noch gegen Anwuchs, sie sind nicht licht- u. wetterbeständig, außer-
erhindert ihre schwarze Farbe trotz der Billigkeit ihre allgemeine Anwendbar-
t. (Farben-Ztg. 30. 186. 1924.)

SÜVERN.

hanpat Rai, übert. von: **Vaikunth P. Mehta**, New York, V. St. A., *Harz-
Kondensationsprodukte aus Phenolen und Formaldehyd*. Annähernd molekulare
n von Phenol u. CH₂O werden in Ggw. von KOH u. NH₃ unter Zusatz von

1–10% Glycerin unter stark vermindertem Druck zunächst bis zur B. einer ölig. Fl. erhitzt, diese dann in Formen gegossen u. weiter unter stark vermindertem Druck bis zur B. eines festen Prod. erhitzt, worauf schließlich die Härtung bei höheren Temp. erfolgt. — Setzt man zu dem Reaktionsgemisch 2–10% Glycerin, so werden helle u. transparente Harze erhalten; mehr als 10% Glycerin geben ein hygroskop. Prod. Durch die Anwendung des Vakuums bei der Kondensation u. den Glycerinzusatz wird eine vollständige Entfernung des W. erzielt. Die konz. H₂SO₄ klar l., in A. wl. Harze sind besonders lichtbeständig. (A. P. 1438 vom 12/6. 1923, ausg. 12/2. 1924.) SCHOTTLÄNDER




Henry A. Gardner, Washington, District of Columbia, *Farbenbindemittel, Eigenschaften und plastische Massen*. Die durch Chlorieren von Mineralölen u. darauffolgende Abspaltung von HCl erhältlichen ungesätt. Öle werden mit chines. Holzöl vermischt, durch diesen Zusatz wird die Polymerisation des Holzöls beschleunigt, die Polymerisation kann auch in Ggw. von Verdünnungsmitteln vorgenommen werden; in Lsg. des Gemisches der ungesätt. Öle mit Holzöl in flüchtigen Ölen kann als Farbenbindemittel oder Lack verwendet werden. Die Polymerisation bei gewöhnlicher Temp. wird durch Schwefelchlorid beschleunigt, das Prod. kann als Kautschukersatz, Linoleum usw. verwendet werden. (A. P. 1463883 vom 14/6. 1920, ausg. 7/8. 1923.) FRANZ

J. R. Köhler, Stockholm, Schweden, *Lacke*. Man löst ein Gemisch aus oxydierten amorphen Harzsäuren mit Celluloseester, Celluloid usw. in A., CH₃CO, Aceton usw. (Schwed. P. 53760 vom 30/1. 1920, ausg. 14/2. 1923.) FRANZ

XII. Kautschuk; Guttapercha; Balata.


R. O. Bishop und V. R. Greenstreet, *Dichlorhydrochinon als ein Präventivmittel gegen die Fleckenkrankheit des Kautschuks*. 35 ccm einer 4%ig. Lsg. von Dichlorhydrochinon zu 0,75 gal Milchsaft mit 15% Kautschuk genügen die Fleckenkrankheit zu verhüten, wenn die Lsg. dem Milchsaft direkt zugesetzt wird. Bei bloßer Durchweichung des Kautschuks mit der Lsg. wird Schimmelbildung nicht in dem gleichen Maße verhindert. Die angegebene Menge hindert nicht die Reifung des Kautschuks. (Malagan Agr. Jour. 11. 129–31. 1923; Exp. Stat. 1923. 50. 452.) BERG

H. Fechter, *Beiträge zur Kenntnis des Vulkanisationsproblems. II. Die Vulkanisation des Kautschuks und die Alterung seiner Vulkanisate als Gelreaktion*. (I. vgl. Kolloidchem. Beihefte 19. 47; C. 1924. I. 2207.) Da die Beschleunigerkatalyse zumeist eine Rk. von Metalloxyden oder basischen Stoffen mit Säurebestandteilen natürlicher oder künstlicher Beschleuniger in sich schließen, ist die *Vulkanisationsbeschleunigung* vornehmlich durch die B. von Salzen zu erklären, die Vulkanisation ist als ein gewisser Krystallisationsvorgang aufzufassen, als B. von Gallerten durch die Phasenrkk. der Beschleuniger. Die Reaktionsfähigkeit des S ist durch eine mol. Form bedingt. Das gewöhnliche S₈-Mol. erreicht beim Erhitzen bei 250° ein Polymerisationsmaximum, darüber hinaus erhitzt, erfolgt Dissoziation des polymeren S unter B. von Schwefelthiozoniden (I.), bei 500° Dithiozon (II.), bei 1000° Disulfid (III.).



Während S erst bei höherer Temp. ein reaktionsfähiges Thiozon S_x·S₈ bildet, ergibt z. B. NaS viel leichter das entsprechende Na-Thiozonat, Na₂S·S₈. Vgl. ältere Literatur für die Wahrscheinlichkeit, daß die Beschleuniger bzw. ihre akt. Strukturbestandteile mit S in ähnlicher Weise reagieren u. durch Vermittlung des S-Thiozons mit Polypren in Verbund treten. Die Vulkanisationsrkk. erscheint danach als die durch chem. Valenzkräfte verursachte Verb. der kolloiden Phase des Polyprens mit der

lloiden festen Phase des Beschleunigersystems durch Vermittlung von thio-
tem S. Als erste Rk.-Komponente nimmt Vf. die B. von Beschleunigerthio-
an. Das Polypren wird als großer geschlossener Ring aufgefaßt, dessen
zue Glieder die 8-er Ringe des Octans darstellen, die durch gegenüberliegende
inbindungen je doppelt miteinander verbunden sind; gegen die Theorie der
risation des Kautschuks (Wechsel der Mol.-Größe des Polyprens durch Valenz-
agswechsel) spricht die kolloidchem. Auffassung der Desaggregationsvorgänge
autschuks. Dieses Polypren wird als mol.-disperse Form des Kautschuk-
toffs angesehen. Die Addition der Beschleunigerthiozonide erfolgt unter
g einer Brückenbindung.



ie Bindung des S erfolgt in zwei verschiedenen Formen, zuerst als $S_x = S$,
st dann weiter abgebaut wird, wenn der freie S verbraucht ist, d. h. bei der
nisationsumkehr. Die Vulkanisate mit dem 6-wertigen mittelständigen S-Atom
deständiger als die Totalvulkanisate mit dem ungesätt. 4-wertigen S-Atom.

as Beschleunigungssystem besteht aus der Beschleunigungsbasis (saure Funktion)
da Aktivator (Oxyd oder Base). Die Dithiocarbamate, Dithiocarbonate, Xan-
t Mercaptide, Mercaptobenzothiazole u. Thiurame, die mit ZnO als Aktivator
ercaptide für die Vulkanisationsrk. bilden, enthalten die wirksame Gruppe
CS—; Glycerin, Phenol, Acetaldehydammoniak, Hexamethylenetetramin, Säure-
u. Harzsäuren enthalten (bezw. bilden) die wirksamen-Gruppen $\equiv \text{COH}$ oder
CO, als Aktivatoren kommen hier in Betracht: Alkalihydroxyde, $\text{Ca}(\text{OH})_2$,
(I)₂, NH_3 u. dessen Derivv., PbO. Die natürlichen Vulkanisationsbeschleuniger
autschuks gehören meist unter die letzte Klasse. — Die Einw. des PbO ver-
n zwei Phasen, 1. Salzbildung aus PbO u. den Kautschukharzsäuren, 2. Lsg.
ereits eingeleiteten Salzbildung. Diese diskontinuierliche Rk. [Gegensatz zu
(I)₂ u. $\text{Ca}(\text{OH})_2$] ist auf die Rk. von PbO mit S, B. von unl. PbS u. Frei-
n von O zurückzuführen; daneben tritt eine vergrößerte Elastizität u. be-
liche Vulkanisationsumkehr in Erscheinung. — Die Anwendung mehrerer Akti-
vatoren führt zu der potenzierten Aktivierung, die auf die

B. von Orthothiozonaten (A) zurückzuführen ist, die durch
die Atombeschwerung labil u. daher außerordentlich reak-
tionsfähig sind. — Die Hauptursache der chem. Alterungen
ist atmosphär. Einww. zuzuschreiben. Die Alterungsver-
änderungen der elast. Eigenschaften durch progressive Vul-

ation sind divergente Erscheinungen, die in Beziehung stehen zur Vulkan-
sumkehr durch progressive Vulkanisation. Beide Erscheinungen sind auf
ativ differenzierte Zustände der S-Bindung zurückzuführen, auf das Verh. der
ulfide, die durch progressive Bindung von freiem S einen polymeren Abbau
ebundenen S erfahren. — Zum Schluß gibt Vf. noch eine Theorie der elast.
ä: der S-Vulkanisate als Netzkrystallisation gelbildender Systeme. (Kolloid-
Beihefte 20. 78—137. 1924. Barmen-Lichtenplatz.)

ZANDER.

J. Ultée, *Kautschukfreie Milchsäfte*. Die übliche indirekte Best. von Kaut-
a (100-W.-Eiweiß-Asche-Harz) ist ungenau u. bei Kautschuk $< 1\%$ völlig
abar. Besser kochte Vf. Trockenrückstand oder Koagulum mit A. erschöpfend
og mit Bzl. den Kautschuk aus u. fällte mit A. Kein Nd. beweist Abwesen-
on Kautschuk u. Guttapercha. — Im *Milchsaft von Antiaris toxicaria* Lesch.
so entgegen Angaben von WIESNER 0,55% Kautschuk nachgewiesen. Eine
ge von LENZ, daß Milchsaft von *Euphorbia gregaria* Marloth kautschukfrei

sei, ist ungenügend bewiesen. Milchsafte von *Artocarpus integra* Merr. lieferte gegen anderen Angaben 0,94% Nd. mit A. Als frei von Kautschuk oder Gu-percha fand Vf. den typ. Milchsafte von *Broussonetia papyrifera* Vent, Rk. 887 D.²⁵ 1,0475, Zus. des Trockenrückstandes (36,55%): Asche 1,83%, Eiweiß 28,0%, den von *Artocarpus elastica* Reinw., der mit W. geknetet steinharte M., mit Schnitz 4,30%, W. 1,07%, Eiweiß = 0,27%, liefert, u. den gerbstoffreichen Milchsafte *Jatropha Curcas* L. (Bulletin du Jardin Botanique de Buitenzorg [3] 6. 264—1924. Malang.-Sep.)

GROSZFELE

The Naugatuck Chemical Company, Naugatuck, Connecticut, übert. v. **Sidney Marsh Cadwell**, Leonia, New Jersey, V. St. A., *Kondensationsprodukt* aus *Anilin* und *Acetaldehyd*. Man bringt ca. 1 Mol. CH_3CHO auf etwas mehr als 2 Mol. Anilin in Ggw. von W. von der pH $1 \cdot 10^{-2}$ — $1 \cdot 10^{-9}$ zur Einw. — ZB. werden Na-Acetat u. Eg. in W. gel., in die Lsg. bei ca. 21° CH_3CHO eingeleitet u. unter kräftigem Rühren während 2 Stdn. zu der Lsg. Anilin gegeben, wobei die Temp. nicht über 40 — 50° steigen soll. Man rührt bei dieser Temp. weitere 3 Stn., läßt über Nacht stehen, saugt die überstehende Fl. ab u. dest. das *Reaktionsprod.* im Vakuum bei 140° ab. Es findet als *Vulkanisationsbeschleuniger* bei der Herstellung von Kautschuk Verwendung. An Stelle von Eg. u. Na-Acetat kann man zwecks Regelung der pH der wss. Lsg. andere Stoffe, wie HCl oder Na-Borat, verwenden. (E. P. 216478 vom 31/7. 1923, ausg. 16/7. 1924. A. Prior. 26/5. 1923.) SCHOTT

Pfennig-Schulmacher-Werke G. m. b. H., Barmen, *Herstellung von Hammelmehl*, dad. gek., daß das Horn auf nassem Wege geschliffen wird. — Man eilt in einem Arbeitsgang bei geringem Kraftaufwand ein sehr feines Prod. von gleichmäßiger Korngröße. (D. R. P. 394141 Kl. 39a vom 28/2. 1922, ausg. 1/1. 1924.)

FRAN

XIV. Zucker; Kohlenhydrate; Stärke.

Hermann Guthertz, *Neuheiten im Zuckerfabrikbetriebe*. Zusammenfassende Besprechung bei Gelegenheit eines Vortrages. (Ztschr. f. Zuckerind. d. tschosl. Rep. 49. 38—40. 47—48. 54—56. 63—64. 70—72. 1924. Selyer Zuckerfabr.) RÜE.

Rollwagen, *Die Dampfturbine in der Zuckerfabrik, ihr Vergleich mit der Kohnmaschine und Erfahrungen mit dem elektrischen Betriebe*. Zusammenfassende betriebs-techn. Erörterung bei Gelegenheit eines Vortrages an Hand von Skizzen. (Zentralblatt f. Zuckerind. 32. 1223—26. 1924. M.-Gladbach.)

RÜHL

Ivar Fogelberg, *Etwas über Zuckerschnitzel und Schnitzeltrocknung*. In der Zuckerfabrik GENEVAD, die nach dem Steffenschen Brühverf. arbeitet, gelings jetzt, *Zuckerschnitzel* mit nur etwa 20% Zuckergehalt zu gewinnen, entsprechend 1,6—1,8% des Polarisationszuckers der Rübe bei einer Ausbeute an Schnitzeln von 8—9%. Die Trocknung der Schnitzel gelingt mit gegen früher um etwa die Hälfte geringerem Kohlenverbrauche in einer neuzeitlichen Trockenanlage der Fab Imperial in Meißen. (Zentralblatt f. Zuckerind. 32. 1226—27. 1924. Genevad.) RÜE.

A. Linsbauer und **Jar. Fiser**, *Studium über die Saftverfärbung in den verschiedenen Systemen von Verdampfanlagen*. Die hauptsächlichsten Ergebnisse der Unters. der Vff. sind: Die Farbkonz. des Dicksaftes ist vorwiegend von der des Dünnsaftes abhängig. Als Ursache der Verfärbung bei gut kreisenden Säften sind in erster Linie die organ. Nichtzuckerstoffe anzusehen, vermutlich organ. N-Substanzen, die den sogenannten schädlichen N enthalten. Die Verfärbung des eingedampften Saftes wächst proportional mit der Eindickung der Säfte nur in steher einfacher Verdampfanlage. In den übrigen kombinierten Verdampfsystemen nimmt die Verfärbung zwar auch mit der Saftkonz. zu, aber ohne eine bestimmte Rel., da hier eine ganze Reihe von Einww. rein techn. Art in Betracht kommen.

über erörtern. Durch die Unterss. der Vff. wurde festgestellt, daß die durch-
liche Erhöhung der Farbe gegenüber dem Dünnsafte bei der Druckver-
ing 59% beträgt, während sie in den unter Luftleere arbeitenden Anlagen
er 90% unter sonst gleichen Bedingungen der techn. Arbeit ausmacht.
st Cukrovárnické 42. 337; Ztschr. f. Zuckerind. d. tschoslovak. Rep. 49. 25—29.
41—47. 49—54. 57—63. 65—70. 1924.) RÜHLE.

rich K. O. Schmidt, A) Versuche über die Anwendung des Invertins. B) Mehr-
Anwendung derselben Invertinmenge. Die bereits in einem kurzen Bericht
galtete Arbeit (Ztschr. Ver. Dtsch. Zuckerind. 1923. 440; C. 1924. I. 1719)
d ausführlich unter Angabe der Versuchsergebnisse besprochen. (Ztschr. Ver.
Zuckerind. 1924. 727—86. 1924. Inst. f. Zuckerind.) RÜHLE.

Charles Sunder, Die Hydrolyse der Stärke durch Wasserstoffsulphoxyd. Ein
Appretur geeigneteres Stärkepräparat als es durch längeres Kochen mit W.
n werden kann wird erzielt, wenn man die Stärke mit H₂O₂ behandelt.
s u. Anwendung des Präparates ist beschrieben. (Bull. Soc. ind. Mulhouse
8—61. 1924.) SÜVERN.

Nottin, Bestimmung von Maltose in Gegenwart anderer reduzierender Zucker
Benutzung der Barfoedschen Lösung. (Ann. Chim. analyt. appl. [2] 6. 321
3. 1924. — C. 1924. II. 1861.) BEHRLE.

Laval Separator Company, New York, übert. von: Cyrus Howard Hap-
Nutley, N. J., Reinigen von Zuckerrohrsaft. Man unterwirft den Saft zu-
nn mit einer Lsg. von Paraffin in CCl₄ einem Schleuderprozeß, wobei das
verhältnis dieser beiden Stoffe so gewählt wird, daß die D. der Lsg. größer
a die des Saftes. (A. P. 1509355 vom 7/5. 1921, ausg. 23/9. 1924.) OELKER.
John James Hood, London, John Clark, Essex, und Percy George Clark,
ca, Reinigung von Rohzuckersäften und Zuckerlösungen. Die Säfte bzw. Lsgg.
n durch ein, gebranntes Magnesit u. ein kohlenstoffhaltiges Material ent-
teles Filter geleitet. — Wenn das Filtermaterial seine Wirksamkeit verloren
ird es unter Ausschluß von Luft ausgeglüht u. dann von neuem benutzt.
E 1511472 vom 4/11. 1919, ausg. 14/10. 1924.) OELKER.

owalski Syndikat, Berlin, Reinigung von Abläufen der Zuckerfabrikation
Kalk, Baryt u. dgl. u. SO₂ gemäß dem Pat. 363559, dad. gek., daß die mit
k Baryt u. dgl. geschiedenen Abläufe mit SO₂ bis zu einer ausgesprochenen
zeit, deren Höhe von der Reinheit des Ablaufes abhängt, geschwefelt u.
a filtriert u. auf Füllmasse verkocht werden. — Es wird eine beträchtliche
ausbeute an Zucker erzielt. (D. R. P. 405570 Kl. 89c vom 30/3. 1920, ausg.
l. 1924. Zus. zu D. P. R. 363559; C. 1923. II. 484 [Reinzucker-Ges. f. Patent-
rtung m. b. H.]). OELKER.

George Washington, Brooklyn, N. Y., Zuckerhaltiges Präparat. Zur Herst.
ell. Pulvers aus Zucker u. einem l. geschmackgebenden Stoff, z. B. Citronen-
ermischt man die Lsgg. beider Stoffe, dampft das Gemisch ein u. trocknet
ückstand unter niedrigem Druck u. bei einer Temp., welche unter dem F.
offe liegt u. keine geschmackverändernde Wrkg. auf den Citronensaft ausübt.
esteht hierbei eine trockne schaumartige M., welche beim Zerkleinern ein aus
nen, glasigen Blättchen bestehendes Pulver ergibt. (A. P. 1512731 vom 7/6.
8. ausg. 21/10. 1924.) OELKER.

orn Products Refining Company, New York, übert. von: William B. New-
k Riverside, Illinois, Traubenzucker in Krystallform. Eine durch Inversion von
ch (Maisstärke) erhaltene Dextrosolsg. wird bis zu einer D. von etwa 40° B_é
ampft u. dann in einem besonderen, mit Kühlmantel u. Rührwerk versehenen
ter nach Zusatz fertiger Traubenzuckerkrystalle zur Krystallisation gebracht.

Die abgeschiedene Krystallmasse wird durch Zentrifugieren von der Mutterlauge getrennt u. mit W. gewaschen. — Es werden einheitliche Krystalle von krystallin. Form erhalten. (A. P. 1508569 vom 16/11. 1922, ausg. 16/9. 1924.) C.

General Laboratories, Madison, übert. von: **Harley F. Wilson** und **William A. Hadfield**, Madison, Wisconsin, V. St. A., *Herstellung von sterilem Bienenwachs*. Man vermischt eine Kohlenhydratlsg. mit mindestens 2% einer Lsg., welche NaOCl u. 8—9% Na₂CO₃ enthält. (A. P. 1511856 vom 24/11. 1922, ausg. 14/1924.) OELKE

XVI. Nahrungsmittel; Genußmittel; Futtermittel.

Jacob William Spensley und **The Chemical Engineering Company (Manchester) Ltd.**, Manchester, *Behandlung fetthaltiger Nahrungsmittel*. Die Nahrungsmittel bzw. die zu ihrer Herst. dienenden Stoffe werden zum Zwecke einer schnellen u. innigen Mischung ein- oder mehrmals durch eine mit hoher Geschwindigkeit umlaufende u. an ihrem Umfang mit einem Austrittsschlitz versehene Stiftscheibenmühle geschickt. — Das Verf. eignet sich zur Herst. von Schokolade, fetthaltigen Backpräparaten, Margarine u. dgl. (E. P. 200176 vom 4/4. 1922, ausg. 2/8. 1923.) OELKE

Samson Katzprowsky, New York, *Konservieren von Früchten*. Man taucht die getrockneten Früchte in eine h. Lsg., welche Pektin, Zucker u. eine Säure, z. B. Weinsäure, enthält, u. trocknet sie nach dem Herausnehmen aus dem B., wobei ein durchsichtiger Überzug auf den Früchten entsteht, welcher das Kristallisieren von Zucker auf der Oberfläche verhindert. (A. P. 1510679 vom 21/10. 1922, ausg. 7/10. 1924.) OELKE

William Hickman Cloud, Seattle, Washington, V. St. A., *Behandlung von Früchten, Gemüse etc.* Die Früchte, z. B. Äpfel, werden getrocknet, in schlechte Stücke geschnitten u. durch eine perforierte Platte gepreßt, worauf die so erhaltenen Krümel bei gleichmäßiger Hitze geröstet werden. — Bei dieser Behandlung soll der ursprüngliche Geschmack der Früchte etc. erhalten bleiben. (E. P. 193614 vom 13/1. 1922, ausg. 22/3. 1923.) OELKE

Ward Baking Company, Amerika, *Herstellung eines insbesondere für Diabetiker geeigneten Brotes*. Die Herstellung des Brotes erfolgt in an sich bekannter Weise unter Verwendung eines Teiges, welcher in der Hauptsache aus Weizenkleberei besteht, wobei diesem oder der Hefe u. den sonstigen Teigbestandteilen Erdnöl zugesetzt wird. Es soll dadurch ein Brot von besserer Beschaffenheit erhalten werden. (F. P. 557388 vom 13/10. 1922, ausg. 8/8. 1923.) OELKE

Ward Baking Company, New York, *Herstellung von gesäuertem Brot*. (Schwz. P. 106202 vom 2/10. 1922, ausg. 16/8. 1924. A. Prior. 1/10. 1921. C. 1924. II. 2210. [E. P. 186633].) OELKE

Ward Baking Company, New York, übert. von: **Charles Hoffman**, Tuckahoe, und **Harry Davett Grigsby** und **Nathan Mantin (Gregor)**, New York, *Nährmittel*. (Can. P. 237940 vom 4/11. 1921, ausg. 19/2. 1924. — C. 1924 II. 2210. [E. P. 186633].) OELKE

The American Cotton Oil Company, New York, übert. von: **Cecil Octavius Phillips**, New York, *Nährmittel*, welches durch Kochen von Sojabohnenmehl mit einer CaCl₂-Lsg. u. nachfolgendes Auspressen des Öles aus der M. erhalten wird. (A. P. 1510606 vom 22/11. 1921, ausg. 7/10. 1924.) OELKE

The Thermokept Corporation, New York City, übert. von: **W. W. Willin**, Brooklyn, N. Y., *Behandlung von Cocosnüssen*. Zur Herst. eines gleichmäßigen Cocosnußpräparates bringt man bestimmte Mengen des fein geschabten Nußfleisches in geeignete Behälter u. füllt diese mit gesüßter Cocosnußmilch. (Can. P. 23736 vom 3/7. 1923, ausg. 19/2. 1924.) OELKE

International Milk Products Company, Oconomowoc, übert. von: **George Rod**, Oconomowoc, Wisconsin, V. St. A., *Herstellung eines der menschlichen Milch ähnlichen Milchpräparats*. Frische n. Kuhmilch wird bis auf etwa ihres ursprünglichen Vol. eingedampft, dann dialysiert, um den Aschengehalt zu setzen, danach mit reinem Milchezucker u. Sahne vermischt, die aus derselben Milch gewonnen wurden, u. schließlich mit soviel W. verd., daß das Prod. aufweist, die der natürlichen menschlichen Milch entspricht. (A. P. 1511808 vom 7/1. 1920, ausg. 14/10. 1924.) OELKER.

Edley Ralph Marston, Australien, *Gewinnung von Casein und Lactose aus Milch*. Man behandelt die Milch unter Rühren bei etwa 50° mit einem Überschuß an NaO , scheidet die unl. Prodd. ab, fällt das Casein aus der Lsg. in Form von Caseinat oder als l. Casein aus, neutralisiert das Filtrat unter Verwendung von Phenolphthalein mit verd. HCl u. dampft die Fl. zwecks Gewinnung von Lactose ab. (F. P. 561060 vom 15/1. 1923, ausg. 16/10. 1923.) OELKER.

XVII. Fette; Wachse; Seifen; Waschmittel.

Herman Lesch, *Die moderne Ö Raffination und deren Anlagen*. Vf. beschreibt das Verf. der Ö Raffination mit NaOH -Lauge, welche am besten mit einer Viskositätsstärke von 3,5—4,5° Bé bei 100—104° ausgeführt wird, das Bleichen mit NaO -Lauge, die Desodorisierung der neutralisierten u. gebleichten Öle mit strömendem Wasserdampf sowie die apparativen Verbesserungen der letzten Zeit. (Seifensieder-Ztg. 51. 734—36. 1924. Hamburg.) K. LINDNER.

Carl Braun, *Kaliseifen mit Cocosöl und Palmkernöl*. Die Verwendung von Cocosöl u. Palmkernöl zur Herst. kalt gerührter Na-Seifen, fl. K-Seifen für Automaten, glatter K-Seifen, Silberschmierseifen u. fester K-Seifen wird besprochen. (Seifensieder-Ztg. 51. 805—6. 1924.) K. LINDNER.

Carl Braun, *Transparente Toilettenseife für den Export*. Besonders geeignete Fette für transparente Toilettenseifen, die nach den Tropen oder durch die Tropen exportiert werden, sind Preßtalg aus der Speisefettfabrikation, Cochincocosöl u. Ricinusöl u. deren Pressung. Nicht ganz frische Fette müssen vorher mit starker NaOH gereinigt werden. Transparenz u. genügende Geschmeidigkeit wird durch Zusatz von Glycerin u. Zuckerlsg. erreicht. Der Fabrikationsgang wird beschrieben u. ein geeigneter Ansatz mitgeteilt. (Seifensieder-Ztg. 51. 734. 1924.) K. LINDNER.

Carl Braun, *Hochgefüllte glatte Schmierseife*. Es werden einige Ansätze für Schmierseifen, die mit Kartoffelmehl gefüllt sind u. 400—500% Ausbeute aufweisen, mitgeteilt. (Seifensieder-Ztg. 51. 733. 1924.) K. LINDNER.

Carl Braun, *Zum Bleichen von Schmier- und Kernseifen mit Hilfe von Kaliumperoxyd*. $\text{K}_2\text{S}_2\text{O}_8$, welches von den Chemischen Werken KIRCHHOFF & NEUBAUER unter der Bezeichnung „Peroxol“ in den Handel gebracht wird, eignet sich besonders zum Bleichen von Schmier- u. Kernseifen. Es wird kurz vor dem Ende des Siedeprozesses zugesetzt u. seine Reaktionsprodd. sind den Schmierseifen als störende Füllmittel, bei den Kernseifen im Leimnd. bzw. in der Unterlage zu entfernen. Vf. führt Bleichverss. von 40% ige Schmierseifen mit 4 g „Peroxol“ pro 100 g Seife aus. Das Bleichmittel wird mit wenig W. aufgeschwemmt, mit KOH neutralisiert oder schwach alkal. gemacht u. der sd. Seife zugerührt. Die Bleichung dauert 20 Min. beendet. Für ganz dunkle Seifen, die mit „Peroxol“ nicht gebleicht werden, empfiehlt Vf. eine Nachbleiche mit „Decrolin“ der Bad. Sodafabrik. In der Praxis ist das Bleichmittel der Seife vor dem Abgießen zuzusetzen. Zum Schluß ist auf akt. O zu prüfen u. derselbe durch H_2O zu entfernen. Kernseifen werden in gleicher Weise mit höchstens 1% „Peroxol“ nach der Fettverseifung gebleicht, das Sieden 2 Stdn. fortgesetzt u. abgeseiht. Der Leim wird auf akt. O geprüft. Das „Peroxol“ wird in diesem

Falle mit NaOH-Lauge aufgeschlämmt. (Seifensieder-Ztg. 51. 804—5. 1924. Ber Wilmersdorf.) K. LINDNER

R. Klein, *Pilierte Feinseifen*. Nähere Angaben über die *Apparatur* bestehend aus Spanhobelmaschine, Trockenkammer, Walzenmaschine, Misch- u. Knetmaschine, Strangpresse, Stückenschneidemaschine u. Pendelpressen, wie sie für die Fabrikation piliierter Feinseifen erforderlich ist. Vf. bespricht den Gang zur Herst. derartiger Seifen. Der Ansatz für Grundseife soll nur reine Fette unter Ausschluß trockener u. halbtrocknender Öle enthalten. Am geeignetsten ist die Zusammenstellung 60—70% Talg oder gebleichtes Palmöl, 15—25% Schweinefett u. 15% Coccol. Es wird auf 2 Wassern gesotten u. mit 20—24 grädigem Salzw. ausgesalzen. (Ztschr. Dtsch. Öl- u. Fettind. 44. 531—32. 1924.) K. LINDNER

K. Backmann, *Die neue Piliermaschine*. (Ztschr. Dtsch. Öl- u. Fettind. 44. 515—16. 1924. Helmstedt i. Br. — C. 1924. II. 901.) K. LINDNER

—, *Durchscheinende Feinseifen*. Ansatz u. Arbeitsweise, nach denen die Gewinnung einer fast völlig transparenten Seife gelang. (Ztschr. Dtsch. Öl- u. Fettind. 44. 607. 1924.) HELLE

L. Lascaray und C. Bergell, *Über die Alkaliverseifung der Fette*. Vff. erörtern von theoret. Gesichtspunkten aus die Vorbedingung für die *Neutralfetterseifung*. Vom Standpunkt der Langmuir-Harkinschen Theorie ist anzunehmen, daß die Verseifung an den nach dem W. gesichteten Estergruppen einsetzt u. folgedessen durch eine möglichst feine Emulgierung befördert wird. Die wasserlöslichkeit der Fette in W. ist verschwindend klein u. tritt gegenüber dem durch die Emulgierung bewirkten Effekt zurück.

Vff. prüfen ihre Auffassung an der Verseifung von 50% Fett — 50% wasser-säuregemischen mit $\frac{1}{2}$ -n. alkoh. — wss. KOH-Lsgg., deren Gehalt an A. sich von 96—0° variieren. Der Verseifungsgrad in % wird nach 10 Min. u. 2 Stdn. analytisch ermittelt. Der Verseifungsgrad sinkt bei abnehmender A.-Konz. schnell auf ein Minimum, um zum reinen W. hin wieder anzusteigen, ohne jedoch den Verseifungsgrad der hochprozentig alkoh. Laugen zu erreichen. Während bei den alkalischen Laugen die Löslichkeit der Fette im A. die Verseifung fördert, sinkt die Verseifungsgeschwindigkeit parallel mit der Löslichkeitabnahme der Fette im A.-Gemisch. Bei weiterer Abnahme des A. macht sich das Emulgierungsvermögen der wss. Seifenlsg. bemerkbar, welches dasjenige der alkoh. Seifenlsgg. übersteigt. Bei der Annahme, daß die Verseifungsrk. der Triglyceride bimolekular verläuft, u. hierbei Di- u. Monoglyceride entstehen, dürften letztere infolge ihrer stärkeren Polarität dem W. gegenüber an der Grenzfläche festgehalten u. dort im weiteren Verlauf der Rk. verseift werden. Aus diesem Grunde sind Mono- u. Diglyceride in partiell verseiften Fetten nicht nachweisbar. (Seifensieder-Ztg. 51. 755-58. 1924. Berlin.) K. LINDNER

W. Heim, *Über Schmitzelseifenpulver*. Waschpulver mit höherem Seifengehalt lassen sich schwerer mahlen als fettarme Pulver u. backen beim Abfüllen zusammen. Deshalb werden heute vielfach Grundseifenpulver mit geringem Fettgehalt nachträglich mit Seifenschnitzeln vermisch. Vf. beschreibt die Herstellung des Grundseifenpulvers sowie von Seifenschnitzeln oder -nudeln mittels Strangpresse bzw. Reibmaschine. (Ztschr. Dtsch. Öl- u. Fettind. 44. 513—14. 1924.) K. LINDNER

Maurice de Kegel, *Die Natriumsilicate oder Wasserglas und ihre Verwendung als Reinigungsmittel*. Nach Besprechung der Herst. der Silicate wird als besonders wirksam das krystallisierte Mono-Na-Silicat bezeichnet, welches auch desinfizierend u. keine Faserschwächung bewirkt. (Rev. Chimie ind. 33. 266—72. 1924.) STUBER

Valter Czerny, *Zur Bestimmung der Jodzahl nach der Methode von Margosches.* Methode eignet sich nur für genügend alkoholl. Stoffe. Um sie auch für die unl. hochschmelzenden Fette anwendbar zu machen, verfährt Vf. nach einem Vorgehen von GRÜN wie folgt: die eingewogene Substanz wird in A., der 1—2% Jod enthält, so lange erhitzt, bis sich nach dem Abkühlen keine Krystalle mehr bilden. Die umgeesterten Fette reagieren alsdann nach der Methode von MARGOSCHES quantitativ. (Ztschr. Dtsch. Öl- u. Fettind. **44**. 605. 1924. Lab. d. Reichs-Anstalt für Fettindustrie, Schicht A. G., Aussig a. E.)

HELLER.

L. von Fellenberg, *Über den Nachweis der Ranzigkeit von Fetten und Ölen.* Verf.: Reagens 5 g Fuchsin, w. in 800 ccm W. gel. + 12 g Na₂SO₃ (kryst.) in 100 ccm W. + 100 ccm n.-HCl, aufgefüllt auf 1 l; Benutzung erst am folgenden Tage, Aufbewahrung dunkel. Rk.: 1 ccm Öl oder 1 ccm geschmolzenes mit gleicher Menge PAe. verd. Fett wird mit 1—2 ccm Reagens 1/2 Min. kräftig geschüttelt u. 1 Min. beobachtet: Keine Färbung beweist Unverdorbenheit, starke Färbung (sichtl. oder wss. Schicht) Verdorbenheit. Bei schwächsten Färbungen (= 10 bis 20 mg Acetaldehyd in 1 l, Vergleichsprobe!) sind Geschmacksprobe u. übrige Analysewerte zu berücksichtigen. 50 vergleichende Verss. mit Rk. nach Kreis u. Schütz. Prüfung zeigten befriedigende Übereinstimmung mit Sinnesprobe, weniger mit Rk. nach Kreis. Öle mit Färbung im wss. Anteil sind verdorbener als im reinen. Formaldehyd war unter den Zersetzungsprodd. der Fette nicht nachweisbar. Bei der Rk. nach Kreis reagieren andere Körper als mit Fuchsin-H₂SO₃. (Lebensmittelunters. u. Hyg. **15**. 198—208. 1924. Bern, Eidg. Gesundheits-Anstalt.)

GROSZFIELD.

Rob. Jungkunz, *Beiträge zur Untersuchung von cocos- oder palmkernölhaltigen Fetten.* Richtigstellung der Angaben WELWARTS (Seifensieder-Ztg. **51**. 689; C. **1924**. **8**), die durch Berechnungsfehler entsteht. Vf. weist ferner nach, daß Neutralfett in Mengen von 3% u. wenig mehr unbedenklich bei den direkten u. indirekten Fettsäurenbestst. mitbestimmt werden kann. Soll das Neutralfett als unbedenklich angegeben werden, muß es gesondert bestimmt werden. Die Angabe WELWARTS, daß Neutralfett bei 105° flüchtig ist, weist Vf. als falsch zurück. (Seifensieder-Ztg. **51**. 758—59. 1924. Basel.)

K. LINDNER.

Knigge, *Unverseiftes Neutralfett.* Vf. untersuchte den Gehalt von Fein- u. grobverseiftem Neutralfett nach verschiedenen Methoden. Ausschütteln der Fettsäuren mit Ä. lieferte mit nach der Konventionsmethode bestimmten übereinstimmende Werte. (Ztschr. Dtsch. Öl- u. Fettind. **44**. 14. Berlin-Lichterfelde.)

HELLER.

Knigge, *Die Prüfung des Glycerins.* Kennzeichnung der verschiedenen Sorten des Handels u. Darst. der üblichen Untersuchungsmethoden. (Allg. Öl- u. Fettztg. **21**. 679. 1924. Sep. Berlin-Lichterfelde.)

HELLER.

Went Extraction Refrigeration Co., Ltd., Manchester, Engl., *Extraktion von Fetten, Ölen, ätherischen Ölen u. dgl. aus solche enthaltenden Materialien.* (D. R. P. **233** Kl. 23a vom 16/3. 1923, ausg. 31/10. 1924. — C. **1924**. II. 2214.) **OELKER**, *Chemische Anilin- & Soda-Fabrik* (Erfinder: **Alwin Mittasch** und **Martin** **Went**, Ludwigshafen a. Rh.), *Oxydationsprodukte aus Paraffinkohlenwasserstoffen.* Ref. nach F. P. 552416; C. **1923**. IV. 471. Nachzutragen ist folgendes: Paraffin selbst können auch Ceresin, Vaseline, Paraffinöl, KW-stofföle (zweckmäßig Vorbehandlung mit fl. SO₂) der Oxydation unterworfen werden. Wesentliches des Verf. ist, daß die zu oxydierende Fl. mit indifferenten oder auch katalytisch wirkenden, geformten u. formbeständigen Körpern von großer Oberflächenverhältnis ist, wie Ringen oder Kugeln oder beliebigen anderen Körpern aus Glas, Porzellan, Metall, ferner Metallspänen, auch von katalyt. wirkenden

Metallen, wie Fe oder Mn. Porosität der Füllkörper ist im allgemeinen unerwünscht, vielmehr sind dichte Körper oder solche mit glatter Oberfläche vorzuziehen. Sonders vorteilhaft werden die geformten Körper nicht nur bis an die Oberfläche der ruhenden Fl. eingetragen, sondern noch in größerer Höhe aufgeschichtet, daß sie vor dem Blasen über die Oberfläche mehr oder weniger weit hinausragen, beim Blasen selbst aber infolge des Emporwirbelns u. Schäumens der Fl. an den Vorgänge mitwirken. Blasgeschwindigkeit u. Schichthöhe der M. werden zweckmäßig in geeigneter Weise aufeinander eingestellt. Die Mitbenutzung der Füllkörper ermöglicht eine ebenso schnelle oder schnellere Oxydation der KW. unter Anwendung von Luft als bei der bekannten Arbeitsweise unter Anwendung von O₂. Die Verteilung des Gases durch Füllkörper macht außerdem die Verwendung von Rührwerken oder anderen mechan. Mitteln entbehrlich. Das kann auch unter erhöhtem Druck u. unter Anwendung von Lösungsmitteln ausgenutzt werden. (D. R. P. 405850 Kl. 12o vom 3/6. 1921, ausg. 8/11. 1924.) SCHOTTLAND

William H. Rees, Berkeley, Californien, *Katalysator*. Man stellt eine für die Fetthärtung geeigneten Katalysator her, indem man eine Lsg. eines wirkenden Katalysators (z. B. Nickelformiat) von trockener, h. Kieselgur absorbieren läßt, worauf die M. getrocknet wird. (A. P. 1511520 vom 15/6. 1920, ausg. 1/11. 1924.) KAUFMANN

Technical Research Works, Ltd. und **E. J. Lush**, London, *Katalysator* für die Fetthärtung. Ni wird aktiviert u. wieder aktiviert durch HClO oder Salze mit darauf folgender Red. in H₂. (E. P. 221000 vom 31/5. 1923, ausg. 15/11. 1924.) KAUFMANN

De Nordiske Fabriker, De. No. Fa. A/S., Christiania, Norwegen, *Herstellung von Katalysatoren für das Hydrieren von ungesättigten organischen Verbindungen*. Man versetzt die Lsg. eines Ni- oder Co-Salzes, NiSO₄ mit der Lsg. von Na₂Aluminat, wäscht den Nd., trocknet u. leitet bei 300—400° einen H₂-Strom darüber, der Katalysator kann auf indifferente Körper, Kieselgur, niedergeschlagen werden, er eignet sich zum Hydrieren von ungesätt. Fetten oder Fettsäuren. (H. L. 7970 vom 5/2. 1920, ausg. 13/1. 1923. D. Prior. 17/3. 1919.) FR. Z.

Elisabeth Harter, Würzburg, *Fetthärtungskatalysatoren*. Man versetzt die für diese Zwecke gebräuchlichen Metalle (Pt, P, Rh, Ni, Fe, Co, Cu usw.) mit SiO₂-haltigen Stoffen. (Oe. P. 97681 vom 5/4. 1921, ausg. 25/8. 1924.) KAUFMANN

Process Engineers Inc., New York, übert. von: **Judson A. De Cew**, oder **Vernon**, N. Y., *Herstellung von Seifenpulver*. H. Lsgg. von Seife u. Na₂CO₃ wird in feiner Verteilung in einem Behälter zusammengeführt u. gemischt u. das Gemisch in diesem durch eine Zerstäubungsdüse in einen anderen Raum gepreßt, in dem sich das Seifenpulver bildet u. zu Boden fällt. (A. P. 1512211 vom 22/3. 1921, ausg. 21/10. 1924.) OELBR.

Willy Franke, Breslau, *Beschickungsvorrichtung für Seifenpulvertrockenmaschinen*. (D. R. P. 404016 Kl. 23f vom 19/12. 1923, ausg. 11/10. 1924.) OELBR.

Carl Jäger G. m. b. H. Anilinfarben-Fabrik, Düsseldorf-Derendorf (Erlangen), **Franz Pohl**, Düsseldorf, *Seifen aus Naphtensäuren*, dad. gek., daß diese nach der Verseifung mit H₂SO₄ behandelt werden. — Es werden Seifen erhalten, die weniger unangenehm riechen als die bisher aus Naphtensäuren hergestellten, sie sind weniger dunkelgefärbt u. eine bessere Schaumbildung u. Waschkraft aufweisen. (D. R. P. 406345 Kl. 23e vom 3/12. 1922, ausg. 26/11. 1924.) OELBR.

Kendall Products Corporation, New York, V. St. A., *Herstellung eines Reinigungsmittels*. Pflanzliche, an Stärke oder Protein reiche Stoffe werden in Gegenwart eines wasserfreien Alkalisalzes, das große Mengen Krystallwasser aufnehmen kann, mit NaOH aufgeschlossen. Man vermischt z. B. Getreidemehl, Hülsenfrüch., u.

u. wasserfreien Na_2CO_3 ; der Mischung kann man auch verseifbare Fette u. entsprechend größere Menge NaOH zusetzen. (Schwz. P. 104511 vom 8/2. 1924, ausg. 1/5. 1924.) FRANZ.

h. Tengler, Tägerwilen, Thurgau, Schweiz, *Herstellung eines Reinigungs-* Man setzt einer fl. Seifenmasse unter ständigem Rühren fl. oder gasförmiges u. (Schwz. P. 104799 vom 25/6. 1923, ausg. 16/5. 1924.) FRANZ.

XVIII. Faser- und Spinnstoffe; Papier; Cellulose; Kunststoffe.

ltmann, *Die neuesten Aufschließungsverfahren von Stroh und Schilf.* (Papier-Verein der Zellstoff- u. Papier-Chemiker u. -Ingenieure 22. 558. 1924. -- 14. II. 1033.) SÜVERN.

leemann, *Die Sumpfschneide — Cladium mariscus — eine neue Cellulosepflanze.* Pflanze kommt massenhaft im Maremmen- u. Seengebiet der Westküste Italiens, in der Mündung des La Plata u. auch sonst in Argentinien, aber nur vereinzelt in Deutschland vor. Sie ist leicht zu einer schönen, brauchbaren Cellulose aufzuschließen. Die Ausbeute ist günstig u. beträgt im Durchschnitt $\frac{1}{4}$ des trocknen Pflanzens. Die Pflanze kann grün u. getrocknet gleich gut verarbeitet werden. Aus Cellulose lassen sich allein oder gemischt mit anderen Faserstoffen gute Papiere herstellen. Da die Faser sehr fein ist, muß der Aufschluß vorsichtig sein. (Papierfabr. 22. 477—80. 1924.) SÜVERN.

l. Justin-Mueller, *Hydratisierung gebleichter Baumwolle im Vergleich zu ungebleichter Baumwolle.* Es zeigte sich, daß gebleichte Baumwolle stärker als ungebleichte. Bei Trockenverss. ergab sich, daß gebleichte Baumwolle bis zu 10% mehr W. verlor als ungebleichte. (Bull. Soc. ind. Mulhouse 90. 557—58. 1924.) SÜVERN.

litz Junge, *Was bedeutet die Anwendung von Fettlösungsmitteln der Textilindustrie?* Die Anwendung dreier Präparate der Chem. Fabrik Milch & Co. des Hexorans, Perpentols u. der Cyklorane beim Waschen von Wolle u. von Baumwolle wird beschrieben. (Ztschr. f. ges. Textilind. 27. 460—61. 1924.) SÜVERN.

Arthur Harris, John V. Lawrence und Zonja Wallen Lawrence, *Chloridgehalt des Blattgewebesafes von ägyptischer und binnenländischer (amerikanischer) Baumwolle.* Vf. haben früher nachgewiesen, daß der Blattgewebesafte von Pima-Baumwolle einen höheren osmot. Druck u. höhere spezif. Leitfähigkeit als einheim. Baumwolle, obwohl beide Sorten auf demselben Boden (mit gleicher Bewässerung) gezogen worden waren. Zur Erklärung dieser Erscheinung können Vf. jetzt zeigen, daß der Chloridgehalt des Blattzellsafes der Pima-Sorte erheblich höher ist als der der einheim. Sorten (Meade Lone Star u. Upland cotton). Der höhere Chloridgehalt deutet möglicherweise an, daß die ägypt. Baumwolle eine größere Fähigkeit besitzt, auf salzigen Böden zu wachsen. — Um den Einfluß des verschiedenartigen Bodens zu erhalten, wurden die verschiedenen Sorten gleichförmig auf das verfügbare Land verteilt. Die Vegetationsverss. erstrecken sich auf die Jahre 1920, 1922 u. 1923. (Agric. Research 28. 695—704. 1924.) TRÉNEL.

l. Fichter und Fritz Reichart, *Beiträge zur Erschwerung der Seide mit Chlorid.* FICHTER u. MÜLLER (Chem.-Ztg. 38. 693; C. 1914. II. 668) hatten die Hypothese aufgestellt, daß bei der Beschwerung von Seide durch SnCl_4 es sich um eine Additionsprod. aus den Polypeptiden der Seidenfaser u. SnCl_4 handelt. ELÖD (S. 166) hat demgegenüber geltend gemacht, daß die Additions- als Stannichloridpentahydrat aufzufassen sei. Zur Stütze der von FICHTER

u. MÜLLER vertretenen Ansicht haben Vff. verschiedene Seidensorten mit von 10 ccm SnCl_4 in 40 ccm wasserfreiem Toluol im Rohr 3 Stdn. lang be-
 handelt; nach Auswaschen unter Fernhaltung von Luftfeuchtigkeit wurde
 erhaltene Prod. analysiert. Erfolgt die B. als SnCl_4 , so muß das zurückbleibende
 SnO_2 57,82% der ersten Gewichtszunahme ausmachen, während wenn die B.
 als $\text{SnCl}_4 + 5\text{H}_2\text{O}$ erfolgt nur 42,98% SnO_2 gefunden werden dürfen. Die
 erhaltenen Werte (Tabelle im Original) schließen die letztere Möglichkeit aus.
 Ähnliche SnCl_4 -Additionsverbb. werden erhalten, wenn man Aminosäureester
 Bzl. mit benzol. SnCl_4 versetzt. Aus *Glykokolläthylester* wurde erhalten
 $(\text{C}_4\text{H}_9\text{O}_2\text{N})_2\text{SnCl}_4$, als gelbliche glasartige hygroskop. M.; die Verb. trübt sich
 der Mutterlauge beim Stehen (infolge Luftfeuchtigkeit), es scheiden sich allmählich
 Krystalle von *Glykokollesterchlorhydrat* ab. Eine analoge Verb. wird mit *Tyrosin*
 erhalten. *Alaninäthylester* verhält sich ebenso wie *Glykokollester*. — Anhang
 berichten Vff. über das Verh. von TiCl_4 u. SnCl_4 gegen *Eisessig*. *Titandichlorid*
diacetat, $\text{TiCl}_2(\text{CH}_3\text{COO})_2$, bildet sich, wenn TiCl_4 langsam zu Eg. + wenig
 anhydrid getropft wird, als gelblichweiße Krystalle, die beim Erhitzen verflüchtigen
 u. durch A. u. W. sofort zers. werden, unl. in indifferenten Mitteln. — *Sn*
dichloriddiacetat, $\text{SnCl}_2(\text{CH}_3\text{COO})_2$, bildet sich analog als weißes krystallin. Pulv.
 Eigenschaften wie voriges. (Helv. chim. Acta 7. 1078—82. 1924. Basel, Abt.
 anorg. Ch.)

HABERLAND

F. Ahrens, *Walzenbezüge, deren Herstellung und Behandlung*. Angaben über die
 Herrichtung des Eisenkerns, Vulkanisieren des Kautschuküberzugs, Ablöschen
 Hartgummischicht. (Papierfabr. Verein der Zellstoff- u. Papier-Chemiker
 gemeine 22. 556—57. 1924. Hildesheim.)

SÜVIN.

v. Lassberg, *Abfallwärmen in Zellstoff- und Papierfabriken*. Die aus
 verschiedenen Wärmeträger gebundene Abfallwärme wird ihrer Größe nach festge-
 stellt, ihre bisherige Verwertung u. ihre zukünftige Verwertungsmöglichkeit wird
 besprochen, besonders in bezug auf die Brüden der Trockenpartien, die Entspannungs-
 dämpfe der Kocher u. die Kesselabgase. Die Gründe für die schwere Verwert-
 barkeit der Abfallwärmen werden dargelegt, in einer Zusammenstellung aller Abfall-
 wärmen wird ihre absol. u. verhältnismäßige Größe gegenübergestellt. Neu Ver-
 wendungszwecke der Abfallwärme werden erörtert. Bei entsprechenden Maßnahmen
 sind in einer Zellstoffabrik noch sehr große Mengen Wärme zu sparen. (Papi-
 fabr. 22. 461—72. 1924.)

SÜVIN.

W. J. Lawrence, *Das Leimen von Kraftpapieren*. Angaben über den zu ver-
 wendenden Leim, die Menge davon, den Freiharzgehalt, den Einfluß der Härte
 W. u. der Temp. sowie Form u. Zeitpunkt des Leinzusatzes. (Papierfabr. 22.
 489—90. 1924.)

SÜVIN.

Paul Ernst Altmann, *Herstellung von Papier aus reinem Roggen- oder Weizen-
 stroh ohne Kalk*. Der Aufschluß des Strohes durch Kochen bei 6 at mit 10% AgCl
 oder bei 2 at mit Nachkollern mit 5% NaOH liefert eine längere, festere Faser
 als der Aufschluß mit Kalk; die Papiere haben keinen gelben Schein. (Chem.-Ztg. 48.
 881. 1924.)

JAG.

Erik Hägglund und Carl B. Björkman, *Untersuchungen über die Chemie der
 Sulfitzellstoffkochung*. I. Aus den angestellten Verss. (Tabellen im Original) ergeben
 sich folgende Schlüsse: Der Verbrauch von SO_2 während der Kochung schankt
 Bei niedrigem Gehalt an CaO (z. B. 3 g auf 100 g trocknes Holz) kann die Kochung
 mit einem Verbrauch von 9 g SO_2 beendet werden u. einen guten Zellstoff liefern.
 Werden größere CaO -Mengen verwendet, so steigt der Verbrauch an SO_2 während
 der Kochung erheblich. Ist der Kalkgehalt der Kochlauge größer als etw. 4,8
 pro 100 g Holz, so führen Schwankungen der CaO -Mengen bei konstanter SO_2 -

et zu keiner wesentlichen Änderung des SO₂-Verbrauches. Je größer der Gehalt der Kochlauge an SO₂ ist, um so größer ist der Verbrauch; dieser kann 70% der Gesamtmenge betragen. Die lose gebundene SO₂ beträgt höchstens 3,5 g pro 100 Holz. Die Zellstoffausbeute ist von dem CaO-Gehalt der Kochlauge, bezogen auf die Einheit Holz, stark abhängig; bei zu hohem CaO-Gehalt muß entsprechend mehr SO₂ verbraucht werden, um die Kochung in n. Zeit zu beenden. Der red. Zucker ist von dem Verhältnis SO₂ : CaO abhängig. „Schwarzkochung“, d. h. Dunkelfärbung des Zellstoffes, ist nicht ident. mit Dunkelfärbung der Lauge; Schwarzkochung tritt erst ein, nachdem alles Sulfat verbraucht ist. Die Aciditätsmenge der Lauge ist auf B. von H₂SO₄ u. freier Lignosulfonsäure zurückzuführen; diese entsteht nicht durch Hydrolyse aus letzterer, sondern nach der Gleichung: $\text{L}_2\text{O}_3 = 2\text{H}_2\text{SO}_4 + \text{S} + \text{H}_2\text{O}$. — Bei Verwendung einer Kochlauge, in welcher Sulfat verbraucht ist, büßt der Zellstoff erheblich an Festigkeit ein. Diesen Verlust stellt man nicht nach der Mitscherlichprobe fest, sondern am besten durch Veränderung der Farbe der Lauge, die unter diesen Umständen braun wird. — Während der Kochung gebildete Essigsäure u. Ameisensäure ist unerheblich; sie werden erhalten in 12 Verss. (bezogen auf 100 g Holz) 0,04–0,09 g HCOOH u. 0,2 g CH₃COOH; die letztgenannte Menge entspricht der Abspaltung von HCO-Rest aus 1 Mol. α-Lignin. (Svensk Kem. Tidskr. 36. 133–55. 1924. Åbo, Kamie.)

HABERLAND.

Arthur St. Klein, *Untersuchungen über die Chemie der Sulfitzellstoffkochung*. (glvorst. Ref.) Ergänzende Literaturangaben zur vorstehend referierten Arbeit. Hinweis darauf, daß die Farbenbezeichnung der Ablaugen durch eine durch Vergleich von hellen u. dunklen Mineralölen empir. hergestellte Skala erfolgen kann. (Svensk Kem. Tidskr. 36. 193–94. 1924. Berlin-Dahlem.)

HABERLAND.

Rik Hägglund und F. W. Klingstedt, *Untersuchungen über die Kohlenstoffbestandteile eines Sulfitzellstoffes*. Zellstoff wurde teils direkt, teils nach vorheriger Auflösung in konz. HCl oder nach Extraktion mit NaOH der Dest. nach TOLLENS unterworfen; es ergab sich dabei, daß der Pentosangehalt des nicht inerten HCl-Hydrolysats nur etwa 80% des auf Grund der direkten Furfurolbestimmung des Zellstoffes zu erwartenden Betrages ausmacht; es müssen demnach im Zellstoff außer Pentosan Verbb. vorhanden sein, die bei der HCl-Dest. Stoffe liefern, wie Phloroglucidnd. geben, die aber durch konz. HCl so verändert werden, daß sie nach Verd. u. Dest. nach TOLLENS nicht mehr bemerkbar sind. Die Annahme solcher Verbb. ergibt sich auch aus folgenden Beobachtungen: ein mit C₂O-extrahierter Zellstoff hinterläßt einen Rückstand, der nach erneuter Behandlung mit Alkali einen Pentosangehalt von ca. 3% aufweist. Nach Lösen dieses Rückstandes in hochkonz. HCl u. Ermittlung des Pentosangehaltes des nicht invertierten Hydrolysats wird derselbe Pentosanwert wie für den mit Lauge behandelten Zellstoff erhalten. Die Stoffe, die bei der direkten Furfuroldest. erscheinen, nach vorheriger Auflösung in konz. HCl aber nicht mehr nachweisbar sind, müssen l. in Pentosan sein; Vff. berechnen, daß ihre Menge etwa 1,8% beträgt. — Da von den Pentosanen ein Teil wl. in Alkali ist, muß angenommen werden, daß außer den in Pentosanen im Zellstoff auch noch solche mit höherem Mol.-Gew. vorhanden. — Von den Phloroglucidndd. war ein Teil l. in A. u. bestand aus einer Gruppe von verzweigten M. Vff. konnten mittels verschiedener Farbrk. feststellen, daß im Zellstoff aus Fructoseresten aufgebaute Polysaccharide vorhanden sind. Die quantitative Unters. ergab folgende Zus. des lignin- u. aschefreien Zellstoffes: 87% Cellulose, 6% Mannan, 4,5% Xylan u. 2,5% Lävulan. — Die Best. von Mannose im durch H₂SO₄ oder HCl erhaltenen Hydrolysats wurde auf folgende Art durchgeführt: 1 g des erhaltenen Zuckers in 10 g 60%ig. A. + 1 g frisch dest. Natriumhydrazin in 1,6 g 25%ig. Essigsäure bleiben 36 Stdn. ruhig bei 15–16° stehen;

der körnige Nd. wird im Goochtiiegel abgesaugt, mit 10 cem k. W., 20 cem 10 cem Ä. farblos gewaschen u. im Vakuum über H_2SO_4 getrocknet. Es bildet (sobald der Mannosegehalt weniger als 10% des Zuckers beträgt) ein bestimmtes Gleichgewicht zwischen dem ausfallenden Mannosephenylhydrazon u. dem bleibenden Mannose- u. Glucosephenylhydrazon aus. Aus einer im Original veröffentlichten empir. hergestellten Kurve kann man aus dem Gewicht des gefallenen Mannosephenylhydrazons den Mannosegehalt des Zuckers bestimmen. Prüfung des Hydrolysats auf Galaktose, Arabinose u. Methylpentosen fiel negativ aus. (Cellulosechemie 5. 57—64. Beilage zu Papierfabr. 22. 1924. Åbo, Akad.)

Hugo Krause, *Bemerkungen zu der Abhandlung von Erik Hägglund und F. W. Klingstedt: Untersuchungen über die Kohlenhydratbestandteile eines Zellulosestoffs.* (Vgl. vorst. Ref.) Polemik bzgl. des vom Vf. früher (Chem. Ind 24. 217 [1906]) angegebenen Verf. zur Best. von Fructose in Ablaugenzuckern. (Cellulosechemie 5. 88. Beilage zu Papierfabr. 22. 1924. Dresden.)

B. H. Moerbeek, *Gasmasse bei der Sulfitaugenbereitung.* (Vgl. KOCH, Wochbl. f. Papierfabr. 55. Sondernummer 89; C. 1924. II. 1295.) Angaben über das Brennen im Herreshof- u. Wedge-Ofen u. über Waschen u. Reinigen der O-Gase. Der Abbrand ist schwer zu verwerten. (Wochbl. f. Papierfabr. 55. 2397-9. 1924. Amsterdam.)

Felix Fritz, *Über Verflüssigen von Holzölgelatine.* Holzölgelatine kann man Nutzen in der Linoleumindustrie verarbeitet werden. Bei der Herst. des Linoleumzements kann das feste Holzöl ohne Besorgnis zusammen mit dem Linoxyn u. dem Kolophonium verschmolzen werden, was besonders leicht dann ausführbar ist, wenn zu jedem Ansatz nur geringe Mengen hinzugefügt werden. Die Vorschläge, die gelatinierte Holzöl auch für Anstrichzwecke nutzbar zu machen, werden besprochen. (Farben-Ztg. 30. 399—400. 1924. Berlin.)

Alsa Soci  t   Anonyme, Basel, *Hohles k  nstliches Textilgut.* Man vermischt eine Lsg., die Gas in gel  ster oder gebundener Form enth  lt. Die Gasl  se werden auf chem. oder therm. Wege entwickelt. (Oe. P. 97502 vom 24/11. 1921, ausg. 25/7. 1924.)

Gottfried Kr  nzlin, Sorau, N.-L., *Gewinnung einer wie Baumwolle verarbeitbaren (kotonisierten) Faser aus Flachsabf  llen u. dgl.,* bei welcher das Material zun  chst zwecks Entholzung einer mechan. Behandlung u. dann zwecks Entfernen der Inkrustaten einem Chlorungsverf. unterworfen wird, dad. gek., da   das entholtzte Material vor dem Chlorungsverfahren einer bis zur Zerst  rung der hierauf abbauf  higen Inkrusten getriebenen   berr  stung ausgesetzt wird u. die nachherige waschung des R  stgutes in diesem verbliebenen Inkrusten durch Einw. von alkalk- oder $NaOCl$ -Lsg. oder Elektrolytlauge entfernt werden. (D. R. P. 415060. Kl. 29b vom 17/12. 1921, ausg. 21/11. 1924.)

Process Engineers Inc., New York,   bert. von: **Judson A. De Cew**, und **Vernon, N. Y.**, *Mittel zum Leimen von Papier*, welches aus etwa 5 Tln. Harz, 1 Tln. Alaun u. 90 Tln. Leim besteht, u. zweckm   ig in der Weise hergestellt wird, da   man eine Harzseife in einem Schutzkolloid l  st, desgl. $Al_2(SO_4)_3$ u. dann diese L  sg. miteinander vermischt. (A. P. 1512212 vom 27/10. 1921, ausg. 21/10. 1924.)

Process Engineers Inc., New York,   bert. von: **Judson A. De Cew**, und **Vernon, N. Y.**, *Papierleim*, welcher 5 Tle. Harzleim, 5 Tle. Alaun u. etwa 1 Tln. eines St  rkeprod. in kolloidaler Lsg. enth  lt. Zur Herst. des Leimes l  st man eine Harzseife in dem St  rkeprod., ebenso $Al_2(SO_4)_3$, u. vermischt die beiden L  sg. miteinander. (A. P. 1512213 vom 9/2. 1923, ausg. 21/10. 1924.)

British Dyestuffs Corporation Limited, **Arthur G. Green** und **Keat** und **H. Saunders**, Manchester, England, *F  rben und Drucken von Celluloseacetat*

- P. 395636 Kl. 8m vom 14/3. 1923, ausg. 21/5. 1924. E. Prior. 18/3., 30/8. u. 1922. — C. 1923. IV. 948.) FRANZ.
- ark W. Marsden, Philadelphia, Pa., V. St. A., *Herstellung von Cellulose aus pflanzlichen Abfallstoffen*. Die Ausgangsprod., wie Stroh, Maisstengel etc. werden schmutz befreit, der Einw. von Dampf bei einer Temp. von 170° F. unterworfen, danach zerfasert u. der Gärung überlassen. Die entstandenen Kohlenhydrate werden abdest. u. in A. übergeführt, während der Rückstand in einen geschlossenen Behälter unter Druck zwecks Entfernung der inkrustierenden Bestandteile mit Alkalien oder Säuren behandelt u. dann ausgewaschen wird. (A. P. 16155 vom 10/7. 1923, ausg. 7/10. 1924.) OELKER.
- société Anonyme des Etablissements A. Olier, Clermont-Ferrand, Frankr., *Herstellung von Zellstoff aus holzhaltigem Rohstoff*. (D. R. P. 404506 Kl. 55b vom 4/1921, ausg. 18/10. 1924. — C. 1923. IV. 960; 1924. I. 1125.) OELKER.
- West Virginia Pulp and Paper Company, New York, übert. von: Viggo Jensen, Brooklyn, N. Y., *Herstellung von Zellstoff aus Stroh u. dgl.* Man kocht Stroh unter Druck in einer starken wss. Lsg. von $MgSO_3$, entfernt dann die Asche, mischt die erhaltene Fasermasse mit W. zu einem Brei u. behandelt diesen mit gasförmiger SO_2 . (A. P. 1511664 vom 19/7. 1920, ausg. 14/10. 1924.) OELKER.
- ritz Kempter, Stuttgart, *Tränkung von Zellstoff mit Lauge für Zwecke der Papierherstellung*, wobei sowohl die Zuführung der Lauge zum Zellstoff als auch die Entfernung der überschüssigen Lauge in einem u. demselben Gefäß vorgenommen wird, 1. gek. durch die Verwendung eines Gefäßes, das durch den Vorstoß seinen Abschluß findet, derart, daß nicht nur die Lauge dem Einfluß der atmosphärischen Luft möglichst entzogen, sondern auch tunlichst verhütet ist, in die Bestandteile sich dem Preßdruck entziehen. — Einrichtung, gek. durch mindestens zwei Preßtöpfe, die wechselweise mit einem Vorpreßstempel (zwecks Vorstügens der Zellstoffstücke) oder mit Einlaßvorr. für Lauge oder mit einem Abpreßstempel (zwecks Auspressens der überschüssigen Lauge) u. Ablaßvorr. für die Lauge zusammenwirken, in solcher Anordnung, daß ein Preßopf gefüllt werden kann während in dem oder den anderen Preßtöpfen die Trocknung u. Pressung stattfindet. (D. R. P. 406333 Kl. 29b vom 3/9. 1920, ausg. 21/11. 1924.) KAUSCH.
- ereinigte Glanzstoff-Fabriken A.-G. Elberfeld, Elberfeld (Erfinder: Richard Mönkemeyer und Arthur Zart, Oberbruch, Kr. Heinsberg b. Aachen), *Herstellung von Cellulosenatronabfalllauge*. (D. R. P. 406497 Kl. 121 vom 21/9. 1920, ausg. 21/11. 1924. — C. 1924. I. 524.) KAUSCH.
- hemische Werke vormals Auergesellschaft m. b. H. Kommanditgesellschaft, Berlin, *Oxydation organischer Stoffe in alkalischen Flüssigkeiten*. Kurzes Pat. nach A. P. 1499798 u. E. P. 217685. — C. 1924. II. 1741. Nachzutragen ist folgendes: Das Verf. betrifft die Wiedergewinnung von Natronlauge aus Natronabflaugen u. Mercerisierabfallflüssigkeiten. Als Oxydationsmittel kommen $NaClO_3$, N-Oxyde, $NaNO_3$ u. $NaNO_2$ in Betracht, als Katalysatoren Schwermetalle, deren Oxyde, Salze u. Gemische dieser Stoffe. Die Oxydation kann durch gleichzeitiges Einleiten von O_2 oder an diesem angereicherten Gasen beschleunigt werden. Die Ablauge wird in einem senkrechten turmförmigen Autoklaven über Katalysatoren, gegebenenfalls wiederholt, herabrieseln gelassen. Beispiele sind angegeben für das Erhitzen einer 14% NaOH enthaltenden *Natronzellstoffablauge* unter Druck auf 140—180° mit $NaClO_3$ in Ggw. eines Cu-Drahtnetzes als Katalysator, bzw. mit $NaNO_3$ in Ggw. von Fe_2O_3 als Katalysator. Die organ. Bestandteile der Ablauge (Pektinstoffe, Lignine u. Harze) werden hierbei vollständig zu CO_2 u. W. oxydiert. Das bei der Rk. entstandene Na_2CO_3 kann leicht durch Zugabe von HCl in $NaCl$ u. CO_2 überführen u. $NaCl$ in $NaOH$ zurückverwandelt werden. (F. P. 559515 vom 7/12. 1922, ausg. 17/9. 1923. D. Prior. 18/3. 1922.) SCHOTTLÄNDER.

Paverin Akt.-Ges., Charlottenburg, *Kräuselung von Kunstseide und ähnlichen künstlichen Fäden*, dad. gek., daß man das Prod. einer Nachbehandlung unter bei welcher man zuerst eine Quellung mittels geeigneter Lsgg., welche unter geeigneten Umständen die Cellulose zu lösen vermögen, z. B. Alkalilauge, ZnCl_2 , Rhodanidlsgg. oder Mischungen derselben, u. nachher eine Schrumpfung mit geeigneter Fll. oder Lsgg., z. B. Salzlsgg. oder anorgan. oder organ. Säuren oder wasserentziehende Mittel, wie A., Aceton usw. vornimmt u. schließlich die Spannung trocknet. (D. R. P. 406506 Kl. 29b vom 8/10. 1922, ausg. 1924.) KAUS.

Akt.-Ges. für Anilin-Fabrikation, Treptow-Berlin, *Kunstseide*. Man spinnst Viscose mit geringerem als dem n. Gehalt an Cellulose u. geringer Viscosität. (E. P. 220934 vom 11/7. 1924, Auszug veröff. 22/10. 1924. i. 20/8. 1923.) KAUS.

William Marshall, Cheadle Hulme, England, *Kunstseide enthaltende Gewebe*. Man webt die Gewebe aus unvollständig mercerisiertem Baumwollgarn u. Acetylcellulosegarn u. unterwirft sie alsdann der Einw. eines ätzenden, alkal. Mercerisierungsmittel, wobei die Einw. des letzteren auf die Acetylcellulose durch Aufrechterhaltung der Mercerisierstärke bei niederen Tempp. verhütet wird. (A. P. 1574 vom 13/10. 1923, ausg. 14/10. 1924.) KAUS.

Akt.-Ges. für Anilin-Fabrikation, Treptow, Berlin, *Viscose und Kunstseide*. Zur Lauge zum Lösen des Xanthats setzt man ein anorgan. Kolloid (Na_2O) zu. (E. P. 220935 vom 11/7. 1924, Auszug veröff. 22/10. 1924. Pror. 22/8. 1923 K.)

William Porter Dreaper, London, *Fäden großer Feinheit aus Viscoselösungen*. Das Spinnbad enthält in saurer Lsg. 1—8% eines NH_4 -Salzes z. B. 20% NH_4SCN 7—14% H_2SO_4 u. 1—8% $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$. (Schwz. P. 106179 vom 30/10. 1923, us 1/8. 1924. E. Prior. 4/11. 1922.) KAUS.

Glanzfäden-Akt.-Ges., Berlin-Dahlem, *Herstellung von selbst bei äusserst hoher Feinheit sehr gleichmäßiger Cellulosegebilden aus Viscoselösungen*. (D. R. P. 319100 Kl. 29b vom 4/9. 1921, ausg. 24/11. 1924. — C. 1923. II. 111.) KAUS.

Adolf Kämpf, Premnitz, Deutschland, *Wollfabrikate aus Viscoselösungen*. Die erforderliche Prozeß der Lsg., der Filtration u. die Lüftung usw. werden zwischen 0—10° durchgeführt, um die Reifung der Viscose möglichst zu vermindern. (Cl. P. 238242 vom 26/5. 1922, ausg. 4/3. 1924.) KAUS.

XIX. Brennstoffe; Teerdestillation; Beleuchtung; Heizung

D. J. W. Kreulen, *Ein weiterer Beitrag zu dem Thema: Koksasche, Koksbeschaffenheit und Aschengehalt in Abhängigkeit von der Korngröße*. Vf. bestätigt die von KATTWINKEL u. LAMBRIS u. MÜLLER (Brennstoffchemie 5. 81. 84; C. 923. II. 1871. 1875) gemachten Beobachtungen, daß die zur Koksbest. verwendete Probe in bezug auf Korngröße sehr ungleichmäßig beschaffen ist, daß aber gerade die Korngröße sowohl auf die Menge wie auch auf die physikal. Beschaffenheit des Koksrückstandes von deutlichem Einfluß ist. Auch der Wassergehalt spielt eine Rolle hinsichtlich der Koksasche. (Brennstoffchemie 5. 233. 1924. Rottlamm Chem. Lab. d. Steenkohlen-Handelsvereinigung.) BIELENEB.G.

H. von Jüptner, *Zur Vergasung der Brennstoffe*. Vf. untersucht die bei den Vorgängen u. Gleichgewichtsbedingungen, die bei verschiedenen Vergasungsverfahren der Kohle auftreten: Vergasung mit reinem Sauerstoff, mit atmosphär. Luft mit Wasserdampf (Wassergas), mit Luft u. Wasserdampf abwechselnd (Halb-Wassergas), Vergasung im Hochofen (Gichtgas) u. Vergasung durch den Saugstempel von Metalloxyden (im elektr. Ofen zur Erzeugung von Eisen u. CaC_2). Die Betrachtungen sollen hauptsächlich auf theoret. Basis einen Vergleich der ver-

bedenen Vergasungsmethoden ermöglichen. (Feuerungstechnik 13. 21—24. 1924.) NEIDHARDT.

A. Ssachanow und I. Lutschinski, *Das Wasser aus Bohrlochern des Rayons Grosnyi*. Die Ergebnisse früherer Analysen (vgl. Neftjanoe i slancevoe Chozjajstvo 6. 239; C. 1924. II. 2565) wurden zur Best. der Zus. des W. in verschiedenen Horizonten verwertet. (Neftjanoe i slancevoe Chozjajstvo 6. 323—28. 1924. Grosnyi.) BIKERMAN.

L. Gurwitsch und B. Kaminer, *Über den Ersatz des Wasserdampfes durch Erdöl bei der Erdöldestillation*. Es wurden Laboratoriumsverss. über die fraktionierte Dest. von Erdölprodd. im Gasstrom statt Wasserdampfstrom ausgeführt. Die Dest. wurde der Masut unterworfen, weil seine hoch sdd. Destillationsprodd. sich aus dem Gasstrom abzuschneiden sind u. weil bei seiner gegenwärtigen Benützung der meiste Wasserdampf verbraucht wird. Als Gas wurden einmal das Erdgas aus Erdöl, einmal die Rauchgase verwendet. Parallel wurden Verss. mit 250° erhitztem Wasserdampf angestellt. — Die Destillate im Gasstrom haben eine D., Viscosität u. höheren Zündpunkt als die bei derselben Temp. mit Wasserdampf übergehenden Destillate. Beispiel: ein Masut, D.¹⁵ 0,918, Zündpunkt 186°, Brenken 186°, Viscosität nach ENGLER bei 50° 12,0, mit 26% Harzbestandteil, gab drei Fraktionen (bis 348—350°, bis 362° u. bis 375—376°), deren DD. waren: 0,8818 bzw. 0,8874; 0,9057 bzw. 0,9064; 0,9162 bzw. 0,9162. Der Zündpunkt der zweiten Fraktion war 186 bzw. 192°, die Viscosität bei 50° 3,65 bzw. 3,81. Die Dest. im Gasstrom schont also das Erdgas mehr als die Dest. mit Wasserdampf; eine Erklärung dafür können Vff. nicht finden. Daß sie nicht im Temperaturunterschied (das Gas wurde k., der Wasserdampf h. eingeführt) zu suchen ist, zeigten Verss. mit vorher erhitztem Gas. — Die Dest. mit Rauchgasen liefert Fraktionen, die der der Wasserdampfdest. ähnlich sind, die Rauchgase entbehren also einer Schutzwirkg. Übersteigt der O₂-Gehalt der Rauchgase 2%, so nehmen die harzigen Bestandteile des Destillates u. des Rückstandes zu. Die Acidität der Destillate bleibt aber unverändert, gleich der der Wasserdampfdestillate u. beträchtlich geringer als die der Wasserdampfdestillate. Die Reinigung der Rauchgasdestillate mit H₂SO₄ ist schwieriger als die der Wasserdampfdestillate. (Neftjanoe i slancevoe Chozjajstvo 7. 334—40. 1924. Baku, „Alefth“.) BIKERMAN.

D. Wandycz und S. Suknarowski, *Versuche über Destillation von Erdöl auf glatten Oberflächen*. Hochsd. Naphthaanteile zersetzen sich bei der Dest. infolge der hohen Temp., geringer Verdampfungsgeschwindigkeit u. eines Überhitzens an den Gefäßwänden. Um die Zers. zu verhindern, muß die Dest. unterhalb der Zersetzungstemp. der KW-stoffe vor sich gehen. Dieses ist auf 2 Wegen versucht worden: 1. Durch Dampfdruckverminderung über der Fl. mittels einer Vakuumdest., was infolge apparativer Schwierigkeiten nur zum Teil möglich war, 2. Ersatz des Wasserdampfes durch Abdampfen bei gleichzeitiger Benutzung genügend großer Verdampfungsflächen. Dieses letztere wird im folgenden ausführlich besprochen, worauf die Verf. von KUBIERSCHKY, KÖHNS, SEIDENSCHNUR u. insbesondere das von MOŚCICKI näher eingegangen wird. In Anlehnung an dieses letztere nahmen Vff. eine Reihe von Verss. zur Feststellung der Abhängigkeit der Ausbeute der Destillationsprodd. von gegebenen Bedingungen, auch die Möglichkeit der Fortführung der Dest. bis zum Asphalt. Es wurde dabei nicht vom Erdöl selbst, sondern von den nach Dest. von Bzn. u. Kerosin verbliebenen Fraktionen ausgegangen.

I. (Mitbearbeitet von Chmura.) Der Versuchsapp. bestand aus einem Destillationskessel mit Überhitzer zur Erzeugung von überhitztem Benzindampf als Heizendes Medium, ferner aus 2 Kolonnen (Verdampfungs- u. Kondensations-

kolonne), dem Vorwärmer für den zu dest. Stoff u. einem Wasserkühler für Benzindämpfe mit entsprechenden Verbindungsstücken u. Armatur. Der App. war so ein-
 seine maximale Leistungsfähigkeit war auf 2,5 kg Material pro Stde. im kontinuierlichen Betrieb berechnet. Im Verlauf der Operation wurden die im Kessel erzeugten Benzindämpfe im Überhitzer auf die erforderliche Temp. gebracht, passierten beide Kolonnen u. kamen, nach der Kondensation im Wasserkühler, in den Kessel zurück. Dieser Kreislauf wurde fortgesetzt, bis beide Kolonnen auf die Destillations- resp. Kondensationstemp. gebracht worden waren. Bei der eigentlichen Destillation blieb der Kreislauf der Benzindämpfe, sowie die Temp. unverändert. Das zu dest. Material wurde oben in die erste Kolonne (im Gegenstromprinzip) eingeführt, begegnete dort den Benzindämpfen u. verdampfte teilweise. Der verdampfte Anteil wurde in der 2. Kolonne kondensiert, der nicht verdampfte Rückstand floß durch den unteren Teil der 1. Kolonne ab. Die am leichtesten verdampfenden Bestandteile ließen sich nicht in der 2. Kolonne kondensieren, sondern gelangten mit den Benzindämpfen in den Wasserkühler, u. wurden besonders nach beendeter Operation durch Verjagen von Bzn. gewonnen. Die in den hochsd. Ölteilen enthaltenen geringen Mengen Bzn. wurden durch Lüften oder Abdunsten entfernt. Der in der 1. Kolonne verdampfte in der 1. Kolonne abgeflossene Rückstand wurde bei einer höheren Temp. dest. usw., bis schließlich nur Asphalt zurückgeblieben war. Der proz. wies in einigen wesentlichen Beziehungen von dem durch MOSCICKI angegebenen ab.

Die in der oben geschilderten Weise erhaltenen Prodd. sind heller als die aus der gewöhnlichen Dest. gewonnenen, mit ausgesprochener violetter bis dunkelgrüner Fluoreszenz, durchsichtig in dünner Schicht, sogar bei den schwersten Fraktionen, außerdem fast geruchlos. Die Viscosität ging bis 8,7 E₂₀ u. der Flammpunkt bis 314°, was bisher aus Ölen poln. Provenienz nicht erreicht worden ist u. den Eigenschaften der amerikan. raffinierten Zylinderöle nahekommt. Diese Destillate lassen sich außerordentlich leicht raffinieren. — In besonderen Verss. wurden noch diese Prodd. mit den bei Hochvakuumdest. (Verf. von SCHNEIDER) u. bei Verwendung von überhitztem Wasserdampf statt Bzn. erhaltenen verglichen. Es ergab sich aus den Verss., daß mittels der beschriebenen Methode das Erdöl bis zum Asphalt in direkt verkäufliche Prodd. zerlegt werden kann, auch wurde die Temperaturfrage mit einiger Annäherung geklärt. Die Verwertung von schwerem Bzn. erwies sich als unzweckmäßig; die Dampfspannung der erhitzenden Mediums müßte in einem möglichst großen Abstand zu derjenigen des am leichtesten destillierbaren Fraktionen liegen. — Die Verss. bestätigen die Annahme, daß das Verf. von MOSCICKI für die erhaltende Dest. günstige Bedingungen schafft. Diese Ergebnisse, sowie auch die Arbeitsbedingungen werden durch die reichen Tabellen ausführlich erläutert. (Przemysł Chemiczny 8. 201—22. 1924.) Raffinerie „Jedlicze“.)

L. Gurwitsch, Zur Frage über die Erstarrung von paraffinhaltigen Produkten. Daß durch die Adsorption des fl. Lösungsm. an Paraffinkristalle die Erstarrung der Paraffinlsgg. im Erdöl erklärt wird (vgl. SSACHANOW, Neftjanoe i slancevoe chozjajstvo 6. 820; C. 1924. II. 1874), findet Vf. für unwahrscheinlich. Die übliche Vorstellung eines feinen Paraffinnetzes, in dessen Maschen sich das zähe Lösungsm. staut, genügt, um alle bekannten Tatsachen zu begreifen. (Neftjanoe i slancevoe chozjajstvo 7. 350—51. 1924.)

B. Maxorow, Über die Abscheidung des Paraffins aus Masut mittels chemischer Reagentien. Nach einer ausgedehnten Literaturübersicht teilt Vf. eigene Versuche mit. In drei Becher wurden je 100 g auf 100° erwärmten Masuts eingetragen u., nachdem die Temp. 30—50° erreicht hat, in einen 10 g u. in den zweiten 5 g fällende Substanz zugegeben; der dritte Becher diente zur Kontrolle. Die nach 2 Tagen abgeschiedenen

wurden filtriert u. gewogen, von den Filtraten der unterhalb 270° übergehende (mit fallender Substanz) abdestilliert, zum Rückstand gleiche M. Kerosin gesetzt u. die maximale E. der Fl. bestimmt. Man erhielt also zwei Größen zur Beurteilung der fallenden Kraft der Substanz: die Masse des Nd. (M) u. den maximalen Erstarrungspunkt (E_m) des verd. Rückstandes. M ist nur im Falle des (10%) um 60% größer als im Kontrollbecher, alle übrigen Substanzen wirken schwächer, so Aceton, Phenol, Kresol, CS₂. Eg., Buttersäure, Naphthensäure, Pyridin, Chinolin, Terpentinöl u. Essigester begünstigen die Fällung in, hemmen in großen Konz. Toluol u. Amylalkohol sind gänzlich unwirksam. mit dem des Kontrollbeckers in allen Fällen prakt. identisch. Der geringe B der erhöhten M auf den E_m erklärt sich dadurch, daß der Nd. verhältnismäßig wenig Paraffin u. viel Harz enthält; E_m ist aber vor allem vom Paraffin abhängig. Eine Paraffinabscheidung können also chem. Fällungsmittel bewirken. (Neftjanoe i slancevoe Chozjajstvo 7. 352—61. 1924. Moskau, BIKERMAN.)

Tytschinin und N. Butkow, *Über Niederschlagsbildung in Transformatorölen*. Die spontanen Ndd. in Transformatorölen sind Salze organ. Säuren (C₂₀), die bei Oxydation der Öle entstehen. Die Oxydation wird durch Metalle beschleunigt, vor allem durch Pb; Cu ist weniger wirksam, Zn, Sn u. Fe nicht. Die Säurebildung bei Ggw. von Pb geht mit wachsender Geschwindigkeit vor sich; in ersten Stdn. war sie nicht merklich. Verschiedene Öle verhalten ganz verschieden; der Gehalt an harzigen Bestandteilen unter 2% ist belanglos. Die Harzbildung in mit Floridin gereinigten Ölen verläuft schneller als in unreinigten. — Vff. empfehlen demnach folgende (in Rußland übliche) Prüfungsverfahren der Transformatoröle: 100 ccm Öl werden bei Ggw. von Kupfernetz (15 mm) 70 Stdn. lang mit O₂ (6—7 l/Std.) behandelt; die Temp. soll 120° sein. Das noch h. Öl wird in einen graduierten Zylinder übergeführt u. das abgesetzten Nd. abgelesen. Daneben muß auch die Acidität u. der Harzgehalt des Öls bestimmt werden. (Neftjanoe i slancevoe Chozjajstvo 7. 341—49. 1924. Elektrotechn. Inst. von GRINEWETZKI u. KIRSCH.) BIKERMAN.

Ritz Wirth, *Die Ursachen der Schlackenbildung bei Braunkohlenfeuerung*. Es werden die Ursachen der Schlackenbildung bei Braunkohlenbriketts erörtert (Höhe der Brennungstemp., Anwesenheit von Alkalien u. Chloriden) u. Mittel zur Vermeidung angegeben (Feinmahlung vor der Brikettierung u. Erniedrigung des Aschenmeltpunktes durch „Mineralisatoren“). (Die Wärme 47. 541—42. 1924.) **NEI.**
ans Lehmann, *Die Untersuchung der Brennstoffe*. Eine schnell ausführbare Untersuchungsmethode zur Best. von Feuchtigkeit, Koksausbeute u. Backfähigkeit u. Heizwert ist beschrieben. Der Heizwert wird durch Veraschen mit PbO aus erhaltenen Pb berechnet. (Papierfabr. 22. 657—58. 1924. Robschütz Sa.) SÜV.

Henri du Bristesselin, Octave Dubois, Rouen, Frederick William Tabb, Leon Vornier, Rouen, und Leon Hertenbein, Levallois Perrel, Frankreich, *Behandlung von Brennstoffen*. Die im trocknen Zustand fein gemahlene Ausgangssubstanz wie Kohle u. dgl., werden mit einer Emulsion von Pech in W. gemischt, auf die M. abgepreßt u. bei einer Temp. von 200—250° getrocknet wird, um die flüchtigen Bestandteile durch Dest. zu entfernen u. so die Entwicklung unangenehm riechender Dämpfe bei der Verwendung der Brennstoffe zu verhüten. (197639 vom 6/12. 1922, ausg. 11/7. 1923. F. Prior. 12/5. 1922.) **OELKER.**
Minerals Separation North American Corporation, New York, übert. von **William Warwick Stenning, Percy Thomas Williams, Walter Henry Beasley, Arthur Beresford Middleton, London, Engl.**, *Behandlung fein verteilter Kohle für die Brikettherstellung*. Die feinen Kohlenteilchen werden in wss. Suspension

bei n. Temp. mit einem Ausflockungsmittel behandelt, danach vom W getrennt u. zusammen mit größeren Kohlenteilchen in einem kreisenden Strom h., mit einem geeigneten Bindemittel versetzten W. durchgerührt. Das dabei ausflockende Gemisch wird dann einer Pressung unterworfen, um das W. zu entfernen u. Briketten zu erzeugen. (A. P. 1512499 vom 11/11. 1922, ausg. 21/10. 1924.) OELKE

Midland Coal Products Ltd., Ironville, und **Alfred Fisher**, East Kirby, Nottingham, Engl., *Koksrikette*. Man vermischt fein verteilte Kohle mit einem Bindemittel, formt aus der M. Brikette u. verkocht diese in einer senkrecht stehenden Retorte, wobei die erforderliche Hitze durch Verbrennung eines Teils der Brikette im unteren Teil der Retorte erzeugt wird. (E. P. 198503 vom 31/3. 1922, ausg. 28/6. 1923.) OELKE

Wilhelm Gensecke, Bad Homburg v. d. H., *Ausnutzung der Abwärme bei Trocknungsvorgängen, insbesondere bei der Braunkohlenbrikettfabrikation*, dad. gek., daß durch die bei dem Trocknungsvorgang entstehenden Brüden unter Zwischenschaltung eines Wärmeaustauschers Warmwasser zur Beheizung der Vortrockner erzeugt wird, wobei im Vortrockner ausreichende Luftmengen durch die zu trocknende Kohle geleitet werden. — 2. dad. gek., daß die durch den Vortrockner geleitete Luft vorher erhitzt wird. — Der Trockenvorgang gestaltet sich einfacher bei den bisher üblichen Verff., da die Dampferzeugung fortfällt. (D. R. P. 405749 Kl. 46d vom 15/3. 1924, ausg. 1/11. 1924.) OELKE

Walter Edwin Trent, Washington, Col., *Brennstoff*. Man vermischt Kohlenpulver im feuchtem Zustande mit einem KW-stoffgemisch, das Fraktionen von verschiedenem Kp. enthält, erhitzt die so erhaltene plast. M. auf eine Temp., welche zur Verdampfung der niedriger sd. Fraktion ausreicht, u. kühlt den Rückstand ab, der dann einen harten Brennstoff bildet, der in Form von Stücken, Briketten o. dgl. zur Verwendung gelangen kann. — Die abdest. niedrig sd. Fraktion wird komprimiert u. wieder benutzt. (A. P. 1512427 vom 9/2. 1924, ausg. 21/10. 1924.) OELKE

Berlin-Burger Eisenwerk Akt.-Ges., Berlin, *Gaserzeuger mit eingehäuteter Schwelkammer*, dad. gek., daß die Schwelkammer hohlwandig u. von einem Füllmittel durchflossen ist, u. daß ihr Unterteil gegen ihren kegeligen Boden in einer Höhe einstellbar ist. — Die Einrichtung, die zur Vergasung von Rohbraunkohle mit hohem Feuchtigkeitsgehalt dienen soll, hat den Zweck, den hohen W.-Gehalt der Rohbraunkohle unter Ausnutzung der Abwärme der Heizgase zu entfernen, ohne daß hierbei auch nur teilweise Entgasung der Braunkohle stattfindet, wodurch sonst der Heizwert des erzeugten Gases verschlechtert werden würde. (D. R. P. 404718 Kl. 24e vom 19/4. 1921, ausg. 22/10. 1924.) OELKE

The Barrett Company, New Jersey, übert. von: **Ray P. Perry**, Upper Montclair, New Jersey, *Koksherstellung*. Man dest. Steinkohlenteer unter Durchleiten eines indifferenten Gases, bis ein Rückstand verbleibt, der einen F. von etwa 40 F. zeigt, u. dest. dann diesen Rückstand. (A. P. 1511192 vom 10/12. 1919, ausg. 7/10. 1924.) OELKE

Société de Recherches et de Perfectionnements Industriels, Paris, und **Emile-Baptiste Gustave Bascou**, Neuilly s. Seine, *Wiedergewinnung des Öleus aus den unter Mitverwendung desselben nach dem Schwimmverfahren behandelten Sten.* Die bei der Reinigung von Kohle u. dgl. durch Verrühren derselben mit W. erhaltenen breiigen MM. werden der Einw. von Hitze u. Druck, z. B. in Ferpressen, unterworfen. (E. P. 198346 vom 14/4. 1923, ausg. 25/7. 1923. F. 10r. 29/5. 1922.) OELKE

Erwin Blummer, Berlin, *Destillation von Teeren und Kohlenwasserstoffen*. Die zu destillierenden Prodd. werden in einem Druckbehälter, der gegebenenfalls mit Verteilungskörpern (Raschigringen o. dgl.) gefüllt sein kann, von unten nach oben durch eine geschmolzene Metallmasse geleitet, u. zwar derart, daß sie eht

den hoch erhitzten Wänden des Behälters in Berührung kommen, wodurch das Aceton von Kohle an den Heizwänden u. mithin Material- u. Wärmeverluste vermieden werden. Die durch das Metall hindurchgeführten, hoch erhitzten Öle sammeln sich im oberen Teil des Behälters, wo sie durch plötzliches Aufheben in ein Gefäß zur Destillation gebracht werden. (E. P. 182868 vom 29/3. 1921, ausg. 1/8. 1923.) OELKER.

Agirio Dissousgas G. m. b. H., Köln-Deutz, *Füllen von Acetylenflaschen mit Aceton*. dad. gek., daß es durch Erzeugung eines Vakuums in einen Behälter gebracht, aus diesem in die Acetylenflasche einfließen gelassen wird. — Das Aceton wird in einem Gefäß zum Teil u. der dadurch erzielte Überdruck genügt, um die geringe Differenz zu überwinden u. das Aceton in die Acetylenflasche zu befördern. (E. P. 405976 Kl. 26b vom 20/3. 1924, ausg. 15/11. 1924.) OELKER.

Acétylène Dissous & Applications de l'Acétylène, Paris, *Poröses Material zum Füllen von Acetylen unter Druck zu füllende Behälter*, welches aus einem Gemisch der Asbest, Kieselsäure, Holzkohle, Baumwolle etc.) mit dem Aceton besteht. (E. P. 182868 vom 13/6. 1922, ausg. 9/8. 1923. F. Prior. 13/6. 1922.) OELKER.

Alwin Letts Oliver, San Francisco, übert. von: **Samuel H. Dolbear**, San Francisco, Calif., *Gewinnung von Öl aus Ölschiefer*. Der Schiefer wird pulverisiert, mit Wasser zu einem Brei angerührt u. dem Schaumswimmverf. unterworfen, worauf der mit dem Schaum abgetrennten Teile der destruktiven Dest. unterworfen wird. (A. P. 1510983 vom 11/11. 1920, ausg. 7/10. 1924.) OELKER.

Henry Curties, London, *Brennstoff*, welcher durch Vermischen von gemahlenem Schiefer mit KNO₃ u. Pressen des Gemisches in geeignete Formen erhalten wird. Der Brennstoff soll an Stelle von Kohle, insbesondere beim Brennen von Ziegeln Verwendung finden. (E. P. 193148 vom 18/11. 1921, ausg. 15/3. 1923.) OELKER.

William Stanley Smith, London, *Herstellung von festen und halbfesten Brennstoffen*. Ölschiefer wird in Pulverform mit einem Bindemittel (Pech, Teer, Bitumen, Schmierölen etc.) vermischt u. die Mischung in den bekannten Maschinen in Ziegeln, Blöcken etc. gepreßt, gegebenenfalls nach Zusatz anderer Stoffe, wie Sand, Stroh, Sägemehl, Kreide, Müll, Abfallfetten, Papierabfall usw. (E. P. 193148 vom 31/12. 1921, ausg. 3/5. 1923.) OELKER.

S. E. Company, V. St. A., *Gewinnung von Mineralölen durch Destillation von Ölschiefer*. Der Ölschiefer wird in einem vertikalen hohen Zylinder, der oben verschlossen werden kann, eingefüllt, der obere Teil wird entzündet u. durch den Verbrennungsdruck Luft u. erforderlichenfalls auch Dampf von oben nach unten durchgeführt. Die durch das Verbrennen entstehende Wärme treibt die Destillationsapparate nach unten, wo sie gesammelt u. abgelassen werden. (F. P. 565048 vom 23. 1923, ausg. 17/1. 1924.) FRANZ.

Edward Bradley, Wolverhampton, *Brennstoff*, zu dessen Herst. gepulverte Brennstoffe, wie Kreide, Asche, gemahlene Ziegelsteine u. dgl. mit brennbaren, insbesondere Petroleum gemischt u. dann unter Zusatz eines Bindemittels zu Briketten gepreßt werden. (E. P. 189515 vom 29/8. 1921, ausg. 28/12. 1921.) OELKER.

Co. P. Amend, New York, *Umwandlung von Rohpetroleum u. dgl. durch Erhitzen in niedrig siedende Kohlenwasserstoffe*. Man bringt das Rohpetroleum zu einem fl. u. dann im dampfförmigen Zustande mit Kohle in Berührung, welche einen elektr. Strom auf eine zwischen Rot- u. Weißglühhitze liegende Temp. erhitzt, u. zwar unter höherem Druck, welcher sowohl während der Spaltung als während der Kondensation der Dämpfe aufrecht erhalten wird. (A. P. 182868 vom 8/6. 1917, ausg. 21/10. 1924.) OELKER.

Otto P. Amend, New York, *Umwandlung von Mineralölen in niedriger siedende Kohlenwasserstoffe*. Öle mit einem Kp. von etwa 150° werden mit einem nicht leitenden Konduktor in Berührung gebracht, durch den ein elektr. Strom von niedriger Spannung u. hoher Stromstärke geleitet wird, wodurch der Konduktor auf eine zwischen Rot- u. Weißglühhitze liegende Temp. gebracht wird. Gleichzeitig leitet man ein permanentes Gas ein, unterwirft die Fl. einem durch die entwickelten Dämpfe erzeugten Druck von 2—3 at u. kondensiert dann die entstandenen gekühlten Dämpfe. (A. P. 1512263 vom 8/6. 1917, ausg. 21/10. 1924.) OELER.

The U. S. Gasoline Manufacturing Corporation, übert. von: **William J. Knox**, New York City, *Herstellung von Kohlenwasserstoffverbindungen*. Man erhitze KW-stoff-Dampf, welcher aus einem fl. KW-stoff entwickelt wird, auf eine zur Dissoziation genügende Temp., bringt ihn dann an einer anderen Stelle mit einer Oberfläche des fl. KW-stoffes in Berührung, wodurch aus diesem wieder Dampf entwickelt wird, benutzt das so erhaltene Dampfgemisch zur Entw. weiteren KW-stoff-Dampfes an der ersten Stelle u. bringt schließlich das Gemisch dieser gesamten Dämpfe zur Kondensation. (Can. P. 237278 vom 24/8. 1922, ausg. 21/10. 1924.) OELER.

Henry Clay Wade, Los Angeles, Calif., *Behandlung von Petroleumölen*. Man leitet ein erhitztes Gemisch von Petroleum u. W. zwecks Spaltung unter Druck in eine Kammer, in welcher es plötzlich vom Druck befreit wird. Das so expandierte Gemisch wird weiter erhitzt u. danach der Einw. eines Katalysators unterworfen. (Can. P. 238092 vom 15/2. 1923, ausg. 26/2. 1924.) OELER.

Standard Oil Company, San Francisco, Calif., übert. von: **William N. Ivimey**, Oakland, und **George A. Davidson**, Berkeley, Calif., *Behandlung des beim Aufarbeiten von Petroleum mit Schwefelsäure erhaltenen sauren Schlammes*. Man vermischt den Schlamm mit W., leitet Dampf ein, um die M. auf eine zur Hydrolyse geeignete Temp. (330—375° F.) zu bringen u. vollendet die Hydrolyse durch die Zerlegung des Schlammes in H₂SO₄ u. Teer, indem man ihn in einer geschlossenen Retorte unter Aufrechterhaltung jener Temp. unter einem Druck setzt, welcher 50 Pfund pro Quadratzoll übersteigt. (A. P. 1511721 vom 19/6. 1922, ausg. 4/11. 1924.) OELER.

John Foley, Wayne, Pennsylvania, V. St. A., *Holzimprägnierungsmittel*. Salze mit fungiciden Eigenschaften, wie ZnCl₂, NaF, CuSO₄ oder HgCl₂, werden in einer Lösungsm. gel., das beständigere Emulsionen mit Ölen liefert als W., u. die resultierende Salzlsg. mit Petroleum vermischt. — Als besonders geeignetes Lösungsmittel erweist sich A. Man verwendet Lsgg. solcher Konz., daß ihre D. annähernd derjenigen des Petroleums entspricht. Wird das in üblicher Weise mit derartigen Emulsionen imprägniertes Holz W. oder Luftfeuchtigkeit ausgesetzt, so wirkt die fungicide Mittel nicht so leicht ausgelaugt als bei Verwendung wässr. Emulsionen. Der als Lösungsm. dienende A. kann durch vorsichtiges Eindampfen u. Kondensation wiedergewonnen werden, bevor das Holz den Imprägnierkessel verläßt. (A. P. 1512414 vom 22/11. 1921, ausg. 21/10. 1924.) SCHOTTLÄNDER.

Rudolf Freudenberg, Wien, Österreich, *Holzersatz*. Kurzes Ref. nach E. 191472; C. 1923. II. 1132. Nachzutragen ist, daß als Eiweißlsg. vorzugsweise eine solche von Blutalbumin verwendet wird. Das Erhitzen des aus Holzmehl, Holzabfällen, CaO, Blutalbuminlsg., Alkalisilicaten u. W. bestehenden Gemisches unter hohem Druck erfolgt zweckmäßig bei ca. 100°. Die Silicatlsg. dient zur Beständigigmachen der M. gegen k. u. h. W. (F. P. 560819 vom 9/1. 1923, ausg. 11/10. 1923. Oe. Prior. 11/1. 1922.) SCHOTTLÄNDER.

Schluß der Redaktion: den 5. Januar 1925.

Chemisches Zentralblatt.

1925 Band I.

Nr. 5.

4. Februar.

A. Allgemeine und physikalische Chemie.

Ch. M. van Deventer, *Wer hat die optische Inaktivität von geschmolzenem Quarz entdeckt?* In PASTEURS Lehre der molekularen Dissymetrie spielt die Tatsache eine große Rolle, daß kristallisierter Quarz opt. akt. ist, geschmolzener Quarz opt. inakt. PASTEUR erwähnt den Entdecker dieser Tatsache nicht. Vf. stellte die obige Frage u. gelangt auf Grund histor. Studien zu dem Ergebnis: etwa 1820 hat BREWSTER festgestellt, daß geschmolzener Quarz opt. inakt. ist. (Chem. Zentralbl. 21. 552—53. 1924. Amsterdam.)

K. WOLF.

Walter Straub, *Rudolf Gottlieb* †. Nachruf mit Würdigung des Lebenswerkes am 31. Oktober 1924 in Heidelberg verstorbenen hervorragenden Pharmakologen. (Münch. med. Wchschr. 71. 1757. 1924. München.)

FRANK.

C. A. Mitchell, *Otto Hehner* †. 25. 11. 1853 bis 9. 9. 1924. Nachruf. Würdigung des wissenschaftlichen Tätigkeits des bekannten engl. Nahrungsmittelchemikers nach seiner Herkunft. (Analyst 49. 501—5. 1924.)

RÜHLE.

J. M. Eder, *Dr. Ernst König* †. Nachruf auf den Photochemiker, Chefchemiker der Höchster Farbwerke. (Chem.-Ztg. 48. 905. 1924. Wien.)

JUNG.

Ernst Wiechmann, *Über die Bedeutung einiger physikalisch-chemischer Begriffe.* Bedeutung der physikal. Chemie für die Medizin wird an einigen wichtigen Stellen dargelegt. (Münch. med. Wchschr. 71. 1762—65. 1924.)

FRANK.

Helen Somersby French und **Thomas Martin Lowry**, *Studien über Koordinationen. I. Absorptionsspektren und Koordination einiger Kupferverbindungen.* (Vgl. J. CHEM. Soc., Chemistry and Ind. 43. 218; C. 1924. I. 2678.) Nach bisheriger Anschauung war die Entscheidung, ob ein metall. Deriv. einer organ. Verb. koordiniert

auf stabilere Komplexe beschränkt. Um auch für solche Verb., deren Stabilität durch Lösungsm. beeinflusst wird, die Koordinationsfrage zu beantworten, mußten Methoden angewandt werden, die von den Stabilitätsverhältnissen unabhängig waren. Nach der gebräuchlichen Koordinationsprüfung mußten zwar höheren Homologen der organ. Cu-Salze, nicht aber die niederen, den koordinierten Verb. zugezählt werden, da letztere die gewöhnlichen Eigenschaften metall. zeigen, erstere aber unl. in W., dafür aber l. in organ. Lösungsm. sind. Vff. gingen durch quantitative Messungen der Absorptionsspektren von anorgan. u. organ. Cu-Verbb. die neuerliche Anschauung, daß auch den durch W. zersetzlichen niederen Homologen der organ. Cu-Salze u. ähnlichen Verb. Koordination zukommt. Die Messungen wurden vorgenommen an: 1. Verb. des Typus von *Cu-Acetylaceton*, die nachgewiesenermaßen koordiniert sind, 2. *Cu-Salzen* der homologen Reihen einbas. *Fettsäuren* vom *Cu-Formiat* bis zum *Cu-Capronat*, 3. zweibas. *Säuren* von der *Bernsteinsäure* bis zur *Azelainsäure*, 4. von *CuSO₄* in W., *CuNO₃* in W. u. *CuCl₂* in W. allein u. in Ggw. von KCl u. *CaCl₂*. Frühere Beobachtungen im sichtbaren Gebiet hatten zwar bemerkenswerte Abweichungen im Spektrum der organ. u. nichtwss. Lsgg. erkennen lassen, gleichzeitig aber deutete der Verlauf auf darauf hin, daß das Maximum der selektiven Absorption entweder dicht an der Grenze des sichtbaren Teils oder über ihm liegt u. daß das Minimum vom Maximum der Übereinanderlagerung zweier Banden der selektiven Absorption, eine der Banden im ultravioletten Gebiet abhängig ist. Die Beobachtungen

VII. 1.

mußten dabei ins infrarote u. ultraviolette Gebiet ausgedehnt werden. Hier ergab sich, daß 1. eine „Cu“-Bande im Rot oder Infrarot für das Absorptionsspektrum maßgebend ist, deren Lage u. Stärke wenig mit dem Radikal variiert, das mit dem Metall verbunden ist, 2. eine ultraviolette Bande, deren Lage fast vollständig von dem entsprechenden Radikal bzw. Anion beeinflußt wird.

Das Cu-Deriv. von *Acetylaceton* in A. oder Chlf. gel. zeigt im Ultraviolettspektrum eine Bande maximaler Stärke $\log \epsilon = 4,25$ u. $\lambda = 3000 \text{ \AA}$, wäh. Acetylaceton allein die Konstanten $\log \epsilon = 4,03$ u. $\lambda = 2724 \text{ \AA}$ aufweist. Cu-Deriv. von *Acetessigester*; maximale Dichte $\log \epsilon = 3,54$, $\lambda = 2700 \text{ \AA}$; *Acetessigester* gel. $\log \epsilon = 3,21$, $\lambda = 2411 \text{ \AA}$. Cu-Deriv. des *Benzoylcampfers* in alkoh. Lsg. $\log \epsilon = 4,1$ u. $\lambda = 3300 \text{ \AA}$; Enolform der Muttersubstanz $\log \epsilon = 4,1$ u. $\lambda = 3100 \text{ \AA}$. — Cu-Salze *fetter Säuren* zeigen keine ultraviolette Bande. Zahlreiche Kurven gehen durch einen gemeinsamen Punkt bei $\log \epsilon = 2,8$ u. $\lambda = 3000 \text{ \AA}$. Die wss. Lsgg. absorbieren bedeutend weniger als die Lsgg. in A. u. Chlf. — Wss. Lsgg. anorgan. Cu-Salze (CuCl_2 , CuNO_3 , CuSO_4) zeigen nur allgemeine Absorption mit auffälliger Analogie zu den untersuchten Cu-Salzen von *Ameisensäure*, *Essigsäure* u. *Propionsäure* gel. in W. Der Wert für CuNO_3 erreicht $\log \epsilon = 1,27$ u. $\lambda = 3000 \text{ \AA}$. Durch den Zusatz von CaCl_2 wird der Wert von CuCl_2 allein um $2000 \text{ \AA}$ erhöht auf $\lambda = 4600 \text{ \AA}$ u. $\log \epsilon = 1,4$.

Die blaue Farbe der Cuprisalze ist der selektiven Absorption roten Lichts zuzuschreiben. In Ggw. eines Überschusses von KCl liegt die rote Absorptionsbande von CuCl_2 ($m/25$) bei $\log \epsilon = 0,74$, $\lambda = 9600 \text{ \AA}$. Durch Lösen in 95% A. (at W.) wird der gegenteilige Effekt, Steigerung von $\log \epsilon$ auf 1,55 erreicht (at W. allein $\log \epsilon = 1,1$). Auch wss. Lsgg. organ. Cu-Salze (*Cu-Formiat*, *-Acetat*, *-Propionat*) zeigen stärkere Absorption u. größere Wellenlängen als wss. Lsgg. anorgan. Cu-Salzen. Auch hier wurde der Einfluß anderer Lösungsm. wie A. u. Chlf. untersucht u. irreführende Beobachtungen wahrgenommen. Der Einfluß des Lösungsm. auf die Cu-Bande bei koordinativen Derivv. von Diketonen ist nicht bedeutend. Die Lage der Bande ist ähnlich, aber schwächer als bei den Salzen der fetten Säuren. — Der vielfache Farbenübergang der verschiedenen Cu-Verbb. muß dem Umstand zukommen, daß die rote u. die ultraviolette Bande von beiden Seiten des Spektrums sich in der Mitte des sichtbaren Teiles schneiden, was ein Minimum von Absorption, bzw. ein Maximum der Fortpflanzungsgeschwindigkeit zur Folge hat ($5000 \text{ \AA}$). Die vorherrschende Stärke der Cu-Bande, die Differenz der Absorptionskraft zwischen Maximum u. Minimum u. die Wellenlänge dieses Minimum sind für die betreffende Farbe bestimmend. Der Zusammenhang zwischen Farbe, Wellenlänge, $\log$ des Extinktionskoeffizienten, Lösungsm. u. Konz. der betreffenden Cu-Derivv. erhellt aus den zahlreichen dem Original beigefügten Tabellen. Auf den Unterschied von den Ni- u. Co-Salzen wird hingewiesen; im Gegensatz zu letzteren ist für die einfachen Salze des Cu erwiesen, daß die infrarote Bande mehr u. mehr nach dem Gebiet kürzerer Wellenlängen verschoben u. nicht durch eine genau festgelegte Bande direkt ersetzt wird.

Die Ergebnisse der Unterss. lassen die Struktur dieser Cu-Derivv. im Hinblick auf koordinativer Betrachtung als von vierfacher Koordination beherrscht erscheinen. Wahrscheinlich ist die Lage der Bande in erheblichem Maße abhängig von der Festigkeit mit der die in Frage kommenden Elektronen an den entsprechenden Radikalen des Zentralatoms haften, mehr als von der Masse dieser Radikale. Die Cu-Salze der fetten Säuren im undissoziierten Zustand sind ebenso koordinativ gebaut wie die mehr stabilen Cu-Verbb., wie z. B. undissoziiertes Cu-Acetat ebenso koordinativ wie Acetylaceton ist. Durch W. wird das Acetat gel., u. bildet mit einem koordinativen W.-Komplex u. freie bzw. hydratisierte Acetationen. Die elektrolyt. Dissoziation einer organ. Cu-Verb. hängt nicht von dem Vorhandensein

inativer Struktur ab, sondern von der relativen Stabilität des koordinativen Complexes der organ. Radikale oder der Komplexe des Cu mit W. Die Farbe des Cu-Verbb. ist eine Abhängige der vorherrschenden roten Bande, die für das Atom charakterist. u. der ultravioletten Bande die vom Anion bezw. organ. Salz abhängig ist. (Proc. Royal Soc. London, Serie A. 106. 489—512.)

HORST.

Charles Moureu, Charles Dufraisse und **Marinus Badoche**, *Autoxydation und oxygene Wirkung*. XII. Untersuchungen über die aktive autoxydable Form des Acroleins. (XI. vgl. MOUREU u. DUFRAISSE, Rec. trav. chim. Pays-Bas 43. 645; 1924. II. 2631.) Zur Erklärung von Autoxydation u. antioxygener Wrkg. ist über ihre Mitteilungen angenommen worden, daß, wenn A die gewöhnliche Form die aktive Form des autoxydablen Körpers ist, die Wrkg. antioxygener Verbb. besteht, daß sie A' wieder in A zurückführen. Beim Acrolein kann die akt.

Form Autoxydation (AO) oder Kondensation zu Disacryl (D) erfahren (vgl. nebenst. Schema). Da kleine Mengen Hydrochinon die Autoxydation verzögern, wurde unter Bedingungen, die die Autoxydation ausschließen (vgl. MOUREU u. DUFRAISSE, Bull. Chim. de France [4] 31. 1152; C. 1923. III. 194) der Übergang von A in D untersucht. Es ergab sich, daß Hydrochinon auch die Kondensation verzögert; Entscheidung darüber, ob die Rk. $A \rightarrow A'$ oder $A' \rightarrow D$ beeinflußt wird, ließ sich nicht fällen. Jedenfalls ergibt sich aus den Verss., daß der inaktivierende Einfluß des Hydrochinons gegenüber Acrolein zu gering ist, um eine befriedigende Erklärung der antioxygenen Hydrochinonwrkg. zu geben. — Es wurde dann der Einfluß des Lichts auf die Umwandlung von A in AO oder D untersucht. Die Verss. hatten folgende Ergebnisse: 1. B von Disacryl ($A \rightarrow D$). Sonnenlicht in Abwesenheit von O_2 beschleunigt die B. von D ganz außerordentlich; Belichtung während 1 Min. liefert so viel D, wie in der Dunkelheit in einem Jahre; die Umwandlung wird nur durch die blauen u. violetten Strahlen bewirkt; in Abwesenheit von O_2 ($< 1/100000$) in Abwesenheit von Licht beschleunigen ebenso wie die B. von D; Licht + O_2 bewirken Kondensation. 2. Autoxydation ($A \rightarrow AO$). Sie wird durch Licht nur wenig beschleunigt, die katalyt. Wrkg. ist 100000 mal geringer als bei 1.; das sichtbare Licht aktiviert daher nur sehr wenig A zu A'. Die Aktivierung des Acroleins muß entweder auf innere Ursachen (Molekülstöße) oder auf andere Strahlen als sie das sichtbare Spektrum enthalten zurückgeführt werden. (C. r. d. l'Acad. des sciences 179. 1229—35. 1924.) HAB.

Richard Lorenz und **W. Herz**, *Über eine neue Beziehung zwischen Nullpunktschmelz- und kritischer Temperatur*. Vff. leiten rechner. eine Beziehung zwischen Nullpunktschmelz- u. krit. Temp. ab. Durch ihre Rechnung kommen sie zu dem Ergebnis, daß diese Beziehung bei „gewöhnlichen“ Stoffen in befriedigender Annäherung erfüllt zu sein scheint, daß aber Abweichungen in dem Maße auftreten, wie sie sich von dem Verh. der „gewöhnlichen“ entfernen. (Ztschr. f. anorg. u. phys. Chem. 140. 379—83. 1924.)

GOTTFRIED.

Richard Lorenz und **W. Herz**, *Raumerfüllungszahlen bei flüssigen Gemischen*. Vff. vergleichen die rechner. erhaltenen Raumerfüllungszahlen von Gemischen zweier Komponenten mit der von Lsgg. eines festen Stoffes in einer Fl. mit dem experimentellen Ergebnis. Vff. untersuchten Tetrachlorkohlenstoffäthylacetat, Tetrachlorkohlenstoffäthyljodid, Tetrachlorkohlenstoff- C_6H_6 , C_6H_6 -Äthylchlorid, C_6H_6 -Eg., Äthylchlorid, Propylenbromid, Chlf.-Aceton, Ä.-Terpentinöl, $C_6H_5-NH_2$ -A., Aceton- C_6H_6 , Äthylbromidpropylalkohol, A.- CS_2 , KCl in W. bei 18°, NaCl in W. bei 18°. Die berechneten Werte stimmen fast nie genau überein, doch ist bei einigen Gemischen der Unterschied so gering, daß man an Versuchsfehler denken könnte. Der höchste

beobachtete Fehler beträgt 8,3%. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. **140**. 399—400. 1924. Frankfurt, Univ.; Breslau, Univ.)

GOTTFRIED

B. Cabrera, J. R. Mourello, A. del Campo, E. Moles und T. Batuecas, *Die Bericht der spanischen Atomgewichtskommission*. (2. vgl. Anales soc. espanola Fis. Quim. **21**. 57; C. **1923**. III. 330.) Vorgeschlagene Änderungen: Ga = (73,74) La = 138,9, Si = 28,06, B = 10,82. In der Atomgewichtstafel für 1924 figurieren sie mit 69,7, 138,9 u. 28,0₆, 10,8₂. Silber wird mit 107,88 angegeben, Zirkon mit 90,6. (Anales soc. espanola Fis. Quim. **22**. 367—82. 1924.)

W. A. ROSE

T. Batuecas, *Revision des Literaturgewichtes von Methyläther unter Normalbedingungen und der Abweichungen des Gases vom Avogadro'schen Gesetz*. (Vgl. C. r. d. l'Académie des sciences **179**. 440. 565; C. **1924**. II. 1908. 2731.) Für Methyläther hatte Batuecas 1908 $L_0 = 2,1096$ u. BATUECAS ($1 + \lambda$) = 1,0254 gefunden, die zu dem unvollkommenen At.-Gew. des Kohlenstoffs 12,033 führten. Vf. bestimmt daher die L_0 -Werte mit denselben Präparaten neu. Das Gas wird nach zwei verschiedenen Methoden dargestellt, aus $\text{CH}_3\text{OH} +$ geglühtem Al_2O_3 bei 275—300° u. + H_2SO_4 bei 80—90°. Das Gas muß mit konz. KOH-Lsg. gewaschen werden, weil L_0 zu klein, wahrscheinlich wegen eines kleinen Formaldehydgehaltes. Die D.-Best. (in zwei Kolben von 772 u. 220 ccm Inhalt) geschieht ganz nach der üblichen Genfer Methode: Wägungsgenauigkeit 0,05 mg, Messung der Druckänderung $\pm 0,1$ mm. Das Resultat der 10 Versuchsreihen ist unabhängig von der Art der Herst. $L_0 = 2,1097 \pm 0,00008$, also mit BAUMES Wert übereinstimmend. — Vf. bestimmt den Kompressibilitätskoeffizienten des Gases direkt bei 0° in einem Präparat mit 5 Kugeln, im wesentlichen nach der klass. Genfer Methode (Genauigkeit der Druckmessung $\pm 0,01$ mm); die Messungen schließen sich direkt der Best. d. L_0 an. Die 5 p - u. v -Werte werden nach der Formel $p v = a - b \cdot p$ kombiniert, so daß eine Messung 4 Daten für $1 + \lambda$ liefert. 6 Reihen werden wiedergegeben, fast alle mit dem aus $\text{CH}_3\text{OH} + \text{H}_2\text{SO}_4$ hergestellten Gas. ($1 + \lambda$) nimmt merklich mit sinkendem Druck ab, von etwa 1,027 bei 760—500 mm bis etwa 1,025 bei 250—180 mm. Da bei kleinen Drucken die Kondensation auf der Glaswand die Resultate fälschen kann, wird nur der für $1 - \frac{2}{3}$ Atmosphären gefundene Wert 1,0270 benutzt, der mit obigem L_0 -Wert zu einem Mol.-Gew. 46,044 u. zu einem At.-Gew. von C 11,998 führt. Die Abweichung vom Boyle-Mariotteschen Gesetz zwischen 1 u. 0 at ist dann 0,0263. Damit ist die Anwendbarkeit der physikalisch-chem. Methoden zur Mol.- u. At.-Gew.-Best. aufs neue gezeigt. Wenn auch bei anderen Gasen die Fehlerquelle der Kondensation auf den Glaswandungen (bei Arbeiten bei ca. 1 at ausgeschaltet werden kann, bedeutet das einen großen Fortschritt. (Anales soc. espanola Fis. Quim. **22**. 409—31. 1924. Madrid, Lab. d. Invest. Fis.)

W. A. ROSE

James Kendall und James F. White, *Die Trennung der Isotopen durch Ionwanderung*. Nach der früher entwickelten Methode (KENDALL und CRITTENDEN Proc. National Acad. Sc. Washington **9**. 75; C. **1923**. I. 1477) prüfen Vf. die Möglichkeit der Isotopentrennung durch Verwendung sehr langer Röhren (bis 1 m), in welchen sie die Entmischung von Ionengemischen mit Hilfe der verschiedenen großen Beweglichkeit der einzelnen Ionen bestimmen. KJ - u. KCNS -Lsgg. lassen sich auf diese Weise leicht trennen, da die Wanderungsgeschwindigkeit des J -Ions etwa 16mal größer ist, als jene des CNS' -Ions. Das Gleiche ist bei Ba' - u. Ca' -Ionen der Fall, wo die Beweglichkeit des Ba' von jener des Ca' um 8% verschieden ist. Zwischen Ba' -Ion u. Sr' -Ion ist ein Unterschied von nur 5%, so daß hier nur eine teilweise Trennung möglich ist. Noch geringer ist der Unterschied zwischen Cl' u. J' -Ion. Doch ist auch hier eine partielle Trennung möglich. Auch bei den Isotopen Cl^{35} u. Cl^{37} , deren Beweglichkeit sich um 1,7% unterscheiden muß, läßt sich eine Anreicherung des einen Isotops nach dieser Methode stattfinden. Doch in

analyt. Methoden zum Nachweis zu ungenau, um dies festzustellen. Ein exakter Nachweis über Anreicherung eines Isotopen an einem Ende der Röhre könnte nur durch das Massenspektrographen erbracht werden. (Proc. National Acad. Sc. Washington **10**. 458—61. 1924. Columbia, Univ.)

BECKER.

Felix Stumpf, *Zur Frage der Quecksilberisotopen*. Vf. erörtert die Möglichkeit, daß von den 4 durch die Aston'sche Kanalstrahlenanalyse gefundenen At.-Geww. 202, 200 u. 197 der Hg-Isotopen das letzte nicht dem Hg, sondern entsprechend den Beobachtungen MIETHES dem Gold angehört, das bei der Versuchsanordnung mit dem Hg sich gebildet hat. Zur Prüfung der Annahme wird vorgeschlagen, die Linie 197 auf einer unbelegten Platte aufzufangen, wobei auf der betreffenden Seite eine Rotfärbung entstehen müßte, wenn die Strahlen dem Au zugehören. (Z. f. Physik **30**. 173—74. 1924. Neubabelsberg.)

BEHRLE.

J. Frenkel, *Zur Theorie der Kohäsionskräfte in festen Dielektrika*. II. (Vgl. Z. f. Physik **25**. 1; C. **1924**. II. 912.) Die mathemat. Ausführungen ergeben für Diamanten sehr ähnliche, aber weniger gute Resultate, während für NaCl eine bessere Übereinstimmung mit der Erfahrung erreicht wird. Vf. diskutiert auch den Einfluß der gegenseitigen Polarisierung der Atome (oder Ionen) auf die Attraktions- u. Repulsionskräfte u. zeigt die Möglichkeit einer dynam. Erklärung der letzteren im Anschluß an die Quantentheorie der (anormalen) Dispersion. (Z. f. Physik **30**. 50—62. 1924. Leningrad.)

K. WOLF.

Carl Wagner, *Die Oberflächenspannung verdünnter Elektrolytlösungen*. Eine Elektrostat. in einem Medium von großer DE. befindliche Ladung wird von der Oberfläche gegen ein Medium von kleiner DE. abgestoßen. Die nahe an der Oberfläche liegenden Lösungsschichten sind also verdünnter als das Innere; diese Konzentrationsabnahme ist aber mit der Konzentrationsabhängigkeit der Oberflächenspannung nach der GIBBS'schen Adsorptionsgleichung verknüpft. Die Verteilung der Ionen hängt aber nicht nur mit der Differenz der DEE. der Phasen zusammen, vielmehr auch mit dem von Nachbarionen herrührenden Potential, welches Vf. nach der DEBYE-HÜCKEL'schen Theorie ermittelt. Setzt man für den mittleren Durchmesser der Ionen $3,76 \cdot 10^{-8}$ cm, so erhält man eine allgemeine Konzentrationsabhängigkeit der Oberflächenspannung. Eine genaue Übereinstimmung mit der Erfahrung (vgl. HEYDWEILLER, Ann. der Physik [4] **33**. 145; C. **1910**. II. 849) ist schon deswegen unmöglich, weil die gemessenen Konzentrationsabhängigkeiten für jedes Salz charakteristisch sind; der allgemeine Verlauf aber wird durch Li-Salze) richtig wiedergegeben. (Physikal. Ztschr. **25**. 474—77. 1924. Leipzig, Univ.)

BIKERMAN.

Jarl Barus, *Die Diffusion von Wasserstoff in Luft, welche mittels des Interferometermanometers gemessen wurde*. Vf. bestimmt nach einer früher entwickelten Methode (Proc. National Acad. Sc. Washington **10**. 153. 349; C. **1924**. II. 160.) die Diffusionskoeffizienten von H_2 in Luft unter Verwendung von Manometermessungen verschiedener Abmessung. Die erhaltenen Werte schwankten bei $22-23^\circ$ zwischen $a = 1,002$ bis $1,045$ cm/sec., wenn a^2 der Diffusionskoeffizient ist. (Proc. National Acad. Sc. Washington **10**. 447—52. 1924. Brown, Univ.)

BECKER.

Christina Cruickshank Miller, *Das Stokes-Einsteinsche Gesetz für die Diffusion in Lösungen*. Vf. stellt Diffusionsverss. mit verd. Jodlsgg. an, um die Gültigkeit des Stokes-Einsteinschen Gesetzes zu prüfen (zwischen 8 u. 20°). Letzteres Gesetz postuliert, daß für ein u. denselben diffundierenden Stoff für verschiedene Diffusionsmedien das Produkt DZ (Diffusionskoeffizient $\times$ Viskosität des Mediums) einen konstanten Wert besitzt; die Verss. ergaben, daß dies für die Diffusion des J in verdünnten organ. Lösungsmitt. nicht der Fall ist, auch ist keine Beziehung zwischen der Veränderlichkeit von DZ mit Verwendung der verschiedenen Medien u. irgend welchen Eigenschaften derselben zu erkennen. Für wss. Bromidlsgg. ergibt sich

DZ als einigermaßen konstant, für Jodidlsgg. wächst sein Wert mit wachsender Jodidkonz. Diese Ergebnisse beweisen, daß der Diffusionsvorgang verwickelt ist, als es die dem Stokesschen Gesetz zugrundeliegende Vorstellung annimmt. (Royal Soc. London Serie A **106**. 724—49; 1924. Edinburgh, Univ.) FRANKES.

W. Manchot, M. Jahrstorfer und H. Zepter, *Untersuchungen über Gaslöslichkeit und Hydratation*. Vff. untersuchen die Löslichkeit von Stickoxydul u. Acetylen in wss. Lsgg. bei 25° für eine große Anzahl Substanzen über ein ausgedehntes Konzentrationsgebiet nach der S. 724 beschriebenen Methode. Untersucht wurden Lsgg. von NH_4Cl , KCl , NaCl , CaCl_2 , BaCl_2 , NH_4Br , KBr , NaBr , NH_4NO_3 , KNO_3 , NaNO_3 , $\text{Mg}(\text{NO}_3)_2$, $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2$, $\text{Zn}(\text{NO}_3)_2$, $\text{Cd}(\text{NO}_3)_2$, $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$, $\text{Al}(\text{NO}_3)_3$, $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$, K_2SO_4 , MgSO_4 , ZnSO_4 , MnSO_4 , FeSO_4 , CoSO_4 , NiSO_4 , $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$, $\text{Fe}_2(\text{O}_4)_3$, $\text{Cr}_2(\text{SO}_4)_3$, Na_2HPO_4 , Na_3PO_4 , KJO_4 . Vff. berechnen die Absorption stets auf die gleiche Wassermenge, z. B. auf eine Lsg. von Molen in 1000 g W., während bei der Gaslöslichkeit nur auf das Volumen der Lsg. berechnet wurde.

Vff. finden, daß die Lsgg. um so weniger Gas absorbieren, je konzentrierter sie sind. Die molekulare Löslichkeitserniedrigung, ausgedrückt in Molen Wasser, nimmt dagegen mit steigender Konz. ab. Ferner sind die schon von früheren Beobachtern festgestellten Regelmäßigkeiten in der Reihenfolge, in der die einzelnen Salze erniedrigend auf die Gasabsorption einwirken, bestätigt gefunden worden. Die von 1 Mol Salz gebundene Wassermenge bei den Verss. mit N_2O u. C_2H_2 sind gleich. Abweichungen treten namentlich bei den Nitraten auf. Diese behaupten wahrscheinlich darauf, daß das C_2H_2 in diesen Lsgg. in einem sehr geringen Betrage chem. verändert wird. HNO_3 , HCl u. H_2SO_4 zeigten bei Verss. mit N_2O ein abweichendes Verh. gegenüber den Salzen. Mit steigender Konzentration nimmt die Löslichkeitsverminderung ab u. geht schließlich in Löslichkeitszunahme über. Verss. mit C_2H_2 in dieser Richtung wurden nicht angeestellt, weil hier besonders leicht Komplikationen durch den chem. Charakter des Gases zu befürchten waren. — Organ. Stoffe zeigen ein sehr verschiedenes Verh. Sie bewirken Löslichkeitsverminderung, andere bedeutende Löslichkeitszunahme. Zum Schluß versuchten Vff. die von 1 Ion beanspruchte Wassermenge in Molen für eine Anzahl Ionen näherungsweise zu berechnen. Für eine Reihe von Werten finden Vff. Übereinstimmung auf mehreren unabhängigen Wegen. (Ztschr. f. physik. u. allg. Ch. **141**. 45—81. 1924. München, Techn. Hochsch.) GOTTFRIED.

M. Wrewski, *Wärmekapazität wäflriger Lösungen von Chlorwasserstoff u. Ammoniak bei verschiedenen Temperaturen usw.* Berichtigung zahlreicher Druck- u. Übersetzungsfehler in den gleichnamigen Arbeiten Vfs. (Ztschr. f. physik. Ch. **112**. 83; C. 1924. II. 2514.) (Ztschr. f. physik. Ch. **113**. 490—91. 1924.) BIKERM.

Alb. Colson, *Bedingungen des Löslichkeitsmaximums; der Fall des Gipses*. differenziert die VAN'T HOFFsche Gleichung $p = CRT$ u. bekommt:

$$dp/dT = R(C + T \cdot dC/dT).$$

Die CLAPEYRON-CLAUSIUSsche Gleichung, auf die Löslichkeit angewandt, vermag zu zeigen, daß die Lösungswärme Null ist, wenn dp/dT (worin p den osmot. Druck der gesätt. Lsg. bedeutet) Null ist. Nun setzt Vf. diese beiden dp/dT gleich u. findet daraus, daß beim Maximum der Löslichkeit (d. h. $dC/dT = 0$) die Lösungswärme nicht Null ist. Eine experimentelle Bestätigung erbringt Vf., indem er überschüssiges Gipslsgg. (aus bei 140° getrocknetem Gips) im Calorimeter das überschüssige Salz abscheiden läßt. Dabei wird, auf 1 g CaSO_4 bezogen, ca. 8—9 cal. gebunden (Compt. r. d. l'Acad. des sciences **179**. 1041—43. 1924.) BIKERM.

A. Schleicher, *Über Pseudokomplexe*. Vf. zeigt, daß man bei den Kristallstrukturen zwischen echten u. unechten oder Pseudokomplexen unterscheiden muß. Erstere besitzen Existenzfähigkeit für sich, charakterist. Eigenschaften u. eine bestimmte hohe Eigensymmetrie, letztere dagegen besitzen jene nicht u. nur niedrige.

metrie. Ferner zeigt Vf., daß die B. der echten wie der Pseudokomplexe auf Koordinationsvermögen der Atome zurückzuführen ist u. daß die Krystallgitter Molekularverwachsungen angesehen werden können, welche auf Grund einer mnten — niederen Eigensymmetrie des Mol. u. nach gewissen kristallograph. garen Gesetzen, analog den Zwillingsbildungen, erfolgen. Sie sind an das mmenfallen der Atomlagen mit den Symmetrieelementen geknüpft. (Ztschr. f. g. u. allg. Ch. **140**. 371—78. 1924. Aachen, Techn. Hochsch.) GOTTFRIED.

A₁. Atomstruktur. Radiochemie. Photochemie.

Max Planck, *Zur Quantenstatistik des Bohrschen Atommodells*. Bei der Quantenstatik eines einzelnen Bohrschen H-Atoms hat sich die eigentümliche Schwierigkeit ergeben, daß die Zustandssumme des Atoms $Z = \sum e^{-E/kT}$, von $n = 1$ bis ∞ erstreckt, eine divergierende Reihe darstellt. Vf. zeigt, wie man auf direktem Wege den Wert von Z u. damit die freie Energie des Gases ohne jede Unbestimmtheit berechnen kann. (Ann. der Physik [4] **75**. 673—84. 1924. Berlin.) K. WOLF.

Paul D. Foote, *Stickstoff und Uran*. Vf. macht auf eine ältere Arbeit von **LEBRAND** (Amer. Journ. Science, SILLIMAN **140**. 384 [1890]) aufmerksam, welche die Uranminerale bis zu 2,5% nachweist. Der N₂ wurde einwandfrei durch Analyse u. durch Entladung im Geißlerrohr nachgewiesen. Da das At.-Gew. des N₂ nähernd ein ganzes Vielfaches des At.-Gew. von N₂ ist, hält der Vf. die Möglichkeit offen, ob der U-Kern aus N₂-Kernen besteht. Die Emission eines Atoms aus einem U-Atom würde das fehlende u. wahrscheinlich instabile Element mit der Ordnungszahl 85 ergeben. (Nature **114**. 789. 1924. Washington Bureau of Standards.)

BECKER-ROSE.

J. Beckenkamp, *Beziehungen zwischen der Feinstruktur der beiden kristallinen Formen des Kohlenstoffs und des Zinksulfids*. (Vgl. Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. **137**. 249; C. **1924**. II. 1431.) Vf. stellt eine Anzahl von Hypothesen über den Aufbau des Diamants, Graphits, Zinkblende u. Wurtzits auf. Besonders die räumliche Elektronenanordnung um die Atomschwerpunkte dieser Strukturen wird betrachtet, wobei die röntgenograph. bestimmten Strukturmodelle als Grundlage dienen. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. **140**. 277—91. 1924. Würzburg, Univ.) BE.

H. J. Spanner, *Über die thermische Emission elektrisch geladener Teilchen*. Vf. hat eine Reihe von Verss. über die Emission positiver u. negativer Teilchen bei verschiedenen Temp. angestellt, zwecks Beantwortung einiger der beim Emissionsvorgang unklaren Fragen. Die erste Frage beschäftigt sich mit der Art der Emissionselementarelektronen. Unterss. von Leitfähigkeit u. Elektronenemission an den Alkalioxyden u. einigen Mischungen lassen eine enge Verwandtschaft von den Elektronen der Leitung zu denen der Emission erkennen. Die zweite Frage nach den Materialkonstanten A u. B der Richardsonschen Gleichung, wird durch Experimente dahin beantwortet, daß der Faktor A als universelle Konstante für Oxyde der II., III. u. IV. Gruppe des period. Systems anzusehen ist, während B sich als eine Funktion der Kernladungszahl (Z) u. der Anzahl (N) der Valenzelektronen emittierenden Atome durch eine Gleichung darstellen läßt. — Schließlich wird eine dritte Frage nach dem Einfluß der metallischen Verbindungskomponente auf die Elektronenemission einer Metallverb. gesucht. Die Experimente an Sulfiden, Carbiden, Fluoriden, Arseniden u. Hydriden zeigen, daß die Elektronenemission dieser Verb. mit einem bestimmten Metallatom fast dieselbe ist, mit Ausnahme einer sehr erhöhten Emission beim Hydrid (CaH₂). Gerade die Ausnahmefälle der Hydride, bei denen anzunehmen ist, daß nicht nur das Ca-Atom, sondern auch das H-Atom bei der in Frage kommenden Temp. emittieren kann, bestätigen das allgemeine Gesetz für die Elektronenemission einer Verb. erkennen, das folgendermaßen formuliert: Elektronenemission einer Verb. = Emission der

Einzelteile + Störungsglied. (Ann. d. Physik [4] **75**. 609—33. 1924. Irl. Univ.) K. WCF.

F. Guéry, *Über das magnetische Feld eines bewegten Elektrons*. Math. Überlegungen, auf deren Grund Vf. schließt, daß das magnet. Feld eines Elektrons mehr als ein mathemat. Ausdruck ohne physikal. Bedeutung ist. (C. r. d. l'Acad. des sciences **179**. 895—97. 1924.) ENSZIN.

E. Fermi, *Über die Theorie des Stoßes zwischen Atomen und elektrisch geladenen Teilchen*. Mathemat. (Ztschr. f. Physik **29**. 315—27. 1924. Rom.) BECKR.

Henry A. Barton, *Negative und doppelt positiv geladene Ionen im Argon*. Vf. untersucht mittels der Kanalstrahlenanalyse von SMYTH die Ionisierungsstufe des Ar u. stellt fest, daß erst von einem Wert der beschleunigenden Feldstärke = 7 ab durch Elektronenstoß Ar⁺-Ionen gebildet werden; Ar⁺⁺-Ionen treten erst ab 45 V beschleunigender Feldstärke auf, was gegen eine Identifizierung der letzteren mit den Trägern des 1. Teils des „blauen“ Ar-Spektrums spricht, welches ab 44 angeregt wird. Vf. weist auch die Entstehung negativ geladener Ionen in größerer Menge in denjenigen Teilen der Entladungsröhre nach, in welche die Energie der stoßenden Elektronen gerade zur Anregung der Ar-Atome ausreicht, was für eine Elektronenaffinität der angeregten Ar-Atome spricht. (Naturwiss. **11**. 826—27. 1924.) FRANKENBURG.

G. Hertz, *Die Anregungs- und Ionisierungsspannungen der Edelgase*. M. **R. H. Kloppers**, mißt Vf. die Anregungs- u. Ionisierungsspannungen von Ar u. Kr durch Zählung der nach Zusammenstoßen mit der Geschwindigkeit Null zurückbleibenden Elektronen (vgl. Koninkl. Akad. van Wetensch. Amsterdam, Wis. Natk. Afd. **31**. 244; C. **1923**. I. 885). An Stelle des Glühdrahtes wurde eine potentialoxydkathode als Elektronenquelle benutzt. Für Kr wurden die Anregungsspannungen (in V) 9,9; 10,5; 11,5; 12,1 für X 8,3; 9,9; 11,0 gefunden, von denen angenommen wird, daß sie nicht einzelnen Termen, sondern Gruppen nahe zusammenliegender Terme entsprechen. Mit **J. C. Scharp de Visser** wurde der absolutwert der Ionisierungsspannung des Ne durch Messung der Intensität verschiedener Neonlinien in ihrer Abhängigkeit von der Geschwindigkeit der stoßenden Elektronen kontrolliert. Die so erhaltenen Werte der Anregungsspannungen stimmen innerhalb der Fehlergrenzen mit den aus der Ionisierungsspannung u. den Serienformeln berechneten überein. Die Ionisierungsspannungen in V sind für He 4,0; Ne 21,5; Ar 15,4; Kr 13,3; X 11,5. (Naturwissenschaften **12**. 1211. 1924. München.) JOSEPH.

Louis A. Turner, *Quantendefekt und Ordnungszahl. II. Die Ionisationspotentiale der seltenen Gase und der Halogenwasserstoffe*. (I. vgl. Philos. Magazine [6] **48**. 384; C. **1924**. II. 2733.) Vf. zeigt, daß eine lineare Funktion zwischen der Ordnungszahl u. den Quantendefekten, berechnet aus den Ionisationspotentialen der seltenen Gase, aus den zweiten Ionisationspotentialen der seltenen Gase u. aus den Halogenwasserstoffmoll., besteht. Auf Grund obiger Beziehungen werden folgende krit. Potentiale vorhergesagt: Ionisationspotential von Ra Em $27,5 \pm 1,5$ V; Auftreten eines „blauen“ Spektrums von Ne $45,2 \pm 1,2$ V; Ionisationspotential von H $17,9 \pm 0,5$ V. (Philos. Magazine [6] **48**. 1010—14. 1924. Princeton [N. J.]) K. WCF.

Jean Becquerel, *Die Radioaktivität*. Vf. gibt einen Überblick über die Geschichte u. Entwicklung der Radioaktivität unter besonderer Berücksichtigung der Bedeutung der Arbeiten von HENRI BECQUEREL. Die Hauptgesetze der Radioaktivität werden besprochen u. ihr Anteil an der Erforschung des Aufbaus der Materie dargelegt. (Rev. gén. des Sciences pures et appl. **35**. 565—72. 597—600. 1924. Paris.) PHILL.

Lise Meitner, *Über die Energieentwicklung bei radioaktiven Zerfallsprozessen*. Vf. entwickelt kurz die neueren Anschauungen von den Vorgängen, die sich bei

ausstrahlung der α , β u. γ -Strahlen im Atominnern abspielen u. besonders den Zusammenhang der γ -Strahlung mit den sekundären β -Strahlen. Die Absorption der Wellenstrahlung beruht darauf, daß der Strahl ein im Atom gebundenes Elektron unter Abgabe seiner gesamten Energie ablöst. Daher muß sich die Energie des Wellenstrahls in der Ablösungsarbeit des Elektrons u. in der ihm übertragenen kinetischen Energie wiederfinden. Dadurch, daß die von einem zerfallenden radioaktiven Atom emittierten γ -Strahlen in den verschiedenen Niveaus der eigenen Elektronen absorbiert werden, entsteht das sekundäre β -Strahlenspektrum. Da man die Halbwertszeiten aus der Röntgenspektroskopie kennt und die Energie der β -Strahlen durch ihre Ablenkung im Magnetfeld messen kann, kann man die Halbwertszeit der primären γ -Strahlen u. damit auch die Wellenlänge bestimmen. Bei der Berechnung der gesamten γ -Strahlenenergie, die beim Zerfall des Ra bis zum Ende frei wird, kommt man auf 11,6% der gesamten bei dieser Umwandlung freiwerdenden α -Strahlenenergie. Bisher hatte man aus Absorptionsmessungen die gesamte γ -Strahlenenergie zusammen nur mit 9% angenommen. Für die noch unbekannte Energie der primären β -Strahlen des RaB u. RaC nimmt Vf. einen der mittleren Halbwertszeit dieser beiden Prodd. entsprechend größeren Wert der kinetischen Energie der β -Strahlen des RaE an. Danach müßte die gesamte β - u. γ -Strahlenenergie 20–21% der α -Strahlenenergie betragen, u. man erhält dann für 1 g Ra im Gleichgewicht mit seinen Zerfallsprodd. bis RaC einschl. in 1 Jahr eine entwickelte Energiemenge $1,58-1,60 \cdot 10^5$ Erg/Sek. oder 136–137, 6 cal/Stde. Dieser Wert stimmt sehr gut überein mit der experimentell bestimmten von 1 g Ra entwickelten Wärmemenge, u. man kann daher daraus schließen, daß die Geschwindigkeit der primären β -Strahlen von RaB u. RaC mit durchschnittlich 50% Lichtgeschwindigkeit richtig angesetzt ist. (Naturwissenschaften 12. 1146–1150. 1924. Kaiser WILH.-Inst., Berlin-Dahlem.)

PHILIPP.

Hahn, Untersuchung oberflächenreicher Substanzen nach radioaktiven Methoden und ihre Anwendung auf chemische und radioaktive Probleme. Vf. berichtet in seinem I. Teil über „Das Emanierungsvermögen feinverteilter Niederschläge als Mittel zum Studium von Oberflächen“ (vgl. O. HAHN und O. MÜLLER, Z. f. Elektrochem. 27. 189; C. 1923. IV. 485.). Er untersucht insbesondere die Emanierungsfähigkeit von Eisenhydrogelen. Werden die Präparate in feuchter Luft aufbewahrt, ändert sich das Emanierungsvermögen kaum, während es in trockener Luft sehr rasch geringer wird. Da dieser Vorgang völlig reversibel ist, kann es sein, daß bei dem „Altern“ in trockener Luft nicht um eine Krystallvergrößerung handelt, sondern nur um eine Wasserabgabe aus dem Innern der Hohlräume der oberflächenreichen Präparate. Dieselben Versuche wurden auch mit Eisenalkogelen durchgeführt. Die verschiedene Oberflächengröße von frischem, 10 Jahre u. 20 Jahre altem Eisensol läßt sich nach dem Emanierungsverfahren sehr deutlich nachweisen. Nickelhydroxyd ist der Alterungsvorgang nicht völlig reversibel, hier tritt bei dem Austrocknen wohl noch ein Wachsen der Krystalle ein. — Durch gemeinsame Verss. mit **F. Bobek** wurde die Frage untersucht, ob man durch Festlegung der Fixpunkte, für die nach der Panethschen Indikatormethode zur Best. absol. Oberflächen die absol. Oberfläche u. ferner das Emanierungsvermögen bestimmt würden, die Kurve erhalten könne, aus der man mit Hilfe des leicht bestimmbareren Emanierungsvermögens die Oberfläche ablesen könne. Eine Kurve scheint hier jedoch nicht möglich zu sein, das „hydrophobe“ Bleisulfid hat bei gleicher Oberfläche ein geringeres Emanierungsvermögen als die „hydrophilen“ Körper Thoroxalat u. Thorsubphosphat. — Im Teil der Arbeit prüft Vf. auf Grund von gemeinschaftlich mit **B. Kerschke** durchgeführten Verss. „Das Adsorptionsvermögen feinverteilter Niederschläge.“ Es zeigt sich, daß Hydroxyde, die unter normalen Bedingungen der Luftfeuchtigkeit aufbewahrt werden, keinerlei Adsorptionsvermögen für Emanation erkennen lassen

(wichtige Voraussetzung für die Brauchbarkeit der Emaniermethode), dagegen extremer Trocknung stark adsorbieren. Es genügt jedoch nur 5 Min. langes Aufenthalt an feuchter Luft, um das Adsorptionsvermögen dieser völlig ausgetrockneten Hydroxyde wieder stark herabzusetzen. Dagegen zeigen die akt. Kohlen in allen Umständen (feucht, trocken oder ausgeglüht, mit CO₂ oder arseniger Säure vergiftet) ein bedeutend höheres Adsorptionsvermögen als ein unter den extrinsischen Bedingungen getrocknetes Eisenhydroxyd; für sie ist also die Emaniermethode nicht anwendbar. — Der III. Teil handelt von der „Herstellung hochemanierender radioaktiver Präparate.“ Die unter Benutzung der Erfahrungen des I. Teils hergestellten u. aufbewahrten Ac-Präparate emanieren zu 50%, die Th-Präparate zu 75—85%. Bei der Kurzlebigkeit der Ac- u. Th-Emanationen (Halbwertszeit 3,9 bzw. 54 Sek.) zerfällt ein beträchtlicher Teil bereits, bevor er aus dem Präparat herauskommt. Besonders wichtig war nun die Herstellung von trockenem Zustande hochemanierenden Ra-Präparaten, da man hier bisher nur mit Lsgg. arbeitete, aus denen eine völlige Gewinnung der Emanation nur auf sehr umständlichen Wegen möglich war. Die in Gemeinschaft mit J. Heidegger durchgeführten Verss. lieferten feste Ra-Präparate, die bei gewöhnlicher Temperatur 98—99% emanieren u. bei Aufbewahrung an feuchter Luft kaum altern. (Naturwissenschaften 12. 1140—45. 1924. Kaiser WILHELM-Inst. f. Chemie, Berlin-Dahlem).

Otto Hahn, *Das Emanierungsvermögen feinverteilter Niederschläge als Maß zur Prüfung von Oberflächenänderungen.* Ausführlicher Bericht des I. Teils bereits vorst. referierten Arbeit. (LIEBIGS Ann. 440. 121—139. 1924.)

K. G. Emeléus, *Die Zahl der β -Teilchen von RaE.* Vf. bestimmt zunächst mit Hilfe des Geigerschen Spitzenzählers (vgl. Ztschr. f. Physik 27. 7; C. 95. II. 1887) die Zahl der von RaE—F im Gleichgewicht ausgesandten α - u. β -Teilchen. Durch ein Magnetfeld wurden dann die β -Teilchen abgelenkt u. die Zahl der α -Teilchen allein bestimmt. Die Differenz ergibt die Zahl der β -Teilchen. Das Präparat befand sich in einem weitgehend evakuierten Glasrohr, das zum Abschluß hin mit einer Glimmerfolie von 12 mm Luftäquivalent abgeschlossen war. Außerdem war der Zähler mit einer Folie von 8 mm Luftäquivalent verschlossen. Auf der Aufnahme einer Absorptionskurve durch Zwischenschaltung verschiedener Glimmerfolien ohne Magnetfeld konnte auf die Absorption 0 extrapoliert werden. So ergab sich, daß 24,5 β -Teilchen 17,1 von der Quelle ausgesandten α -Teilchen entsprachen. Bringt man nach KOVARIK mit 23% den dadurch verursachten Effekt in Abzug, daß β -Teilchen, die vom Präparat in entgegengesetzter Richtung ausgesandt werden, durch Zusammenstöße in dem Glasrohr aber ihre Richtung ändern haben u. so in den Zähler gelangen konnten, so ergibt sich, daß bei RaE für jedes zerfallende Atom ein β -Teilchen ausgesandt wird. (Proc. Cambridge Philos. Soc. 22. 400—404. 1924.)

E. V. Appleton, K. G. Emeléus und M. A. F. Barnett, *Einige Experimente mit einem α -Strahlenzähler.* Um die Wirksamkeit des Spitzenzählers zu untersuchen, haben die Vff. zahlreiche Verss. angestellt. Sie vergleichen die in der Zählkammer unter bestimmten Bedingungen auftretenden selbständigen Entladungen mit den durch Eintritt eines α -Teilchens verursachten Entladungsstößen. Bei Herabsetzung des Druckes in der Zählkammer auf 20 mm treten bei 70 V Spannung kleine Entladungen auf, die bei weiterer Druckerniedrigung größer und zahlreicher werden u. schließlich in eine ständige oszillierende Entladung übergehen. Die Form dieser Entladungen u. der durch Eintritt eines α -Teilchens bedingten wurde mit einem Oszillographen bestimmt. Es zeigte sich fast völlige Übereinstimmung der Kurvenform, so daß angenommen werden muß, daß die Entladungsimpulse beim Zählen der α -Teilchen von der Wiederaufladung der elektrostatischen

azität des Zählers herrühren. Mit Hilfe einer Zählkammer, deren Wandungen aus Glas waren, konnten auch die Leuchterscheinungen bei den Entladungen betrachtet werden. Die Abhängigkeit der Frequenz der selbständigen Entladungen von der Kapazität, dem Widerstand u. dem Druck werden eingehend untersucht. — Gegensatz zu KUTZNER (Ztschr. f. Physik **23**. 117; C. **1924**. II. 150) stellen sie fest, daß für die Entladungen die Kapazität u. der Widerstand des Systems belanglos sind. Von der Anschauung ausgehend, daß für das sofortige Abfließen der bei Eintritt eines α -Teilchens eingesetzten Entladung eine Hysterese der Entladung von entscheidender Bedeutung ist, geben die Vf. auch für diese charakteristische Eigenschaft des Zählers eine anschauliche Erklärung unter Darlegung der Wirksamkeit des für die Zählung notwendigen hohen Widerstandes. — Mit Hilfe eines empfindlichen Capillarelektrometers wurde als Gesamtelektrizitätsmenge, die bei Eintritt eines α -Teilchens durch den Zähler fließt, 10^{-10} Coulomb gemessen. Auch bei Verwendung eines besonders kleinen Widerstandes auf 10^{-6} Coulomb hin. Danach ist die durch den Zähler erreichte Multiplikation der Wrkg. eines α -Teilchens von der Größenordnung 10^5 – 10^9 . (Proc. Cambridge Philos. Soc. **22**. 434–53. 1924.)

PHILIPP.

4. G. Barkla, *Einige neuere Untersuchungen an Röntgenstrahlen: Das Beugungsphänomen*. Vf. bespricht die Absorptions- u. Ionisationserscheinungen bei homogenen Röntgenstrahlen (K, L, M-Serie), welche, als noch unbekannt, vom Vf. als Beugungsstrahlen bezeichnet wurden, sowie die Beziehung dieser Erscheinungen zur Beugung. (Nature **114**. 753–55. 1924.)

BECKER.

5. W. Seitz, *Über die Asymmetrie der Entladung von Röntgenelektronen*. Vf. untersucht die Aufladung, die ein dünnes Celluloidblättchen, das auf einer Seite kathod. Zerstäubung mit einem Metallüberzug versehen ist, erfährt, wenn ein Röntgenstrahl einmal auf der Metallseite, das andere Mal auf der Celluloidseite auftrifft. Da nur auf einer Seite des Blättchens Elektronen ausgelöst werden, ist auf die Weise die Asymmetrie der Strahlung, das ist das Verhältnis der Austritts- u. Eintrittsstrahlung E_a/E_i bestimmt werden. Es zeigt sich an Al, Cu, Ag, Pb, daß E_a/E_i mit steigendem At.-Gew. abnimmt. Als Strahlung wurde Röntgenstrahlung verwendet. Werden die ausgelösten langsamen Elektronen durch ein Gegenfeld von 50 V zurückgehalten, dann nimmt die Asymmetrie bei leichten Elementen stärker zu als bei den schweren. Mit zunehmender Gegenspannung nimmt die Asymmetrie noch weiter an. Durch Ablenkung der ausgelösten Elektronen in einem Magnetfeld soll weiter die Frage entschieden werden, ob die Asymmetrie darauf beruht, daß die Atome in Richtung des einfallenden Röntgenstrahls mehr Elektronen abschießen als entgegengesetzt dazu, oder ob primär die Zahl der ausgelösten Elektronen nach beiden Richtungen gleich ist, dagegen die Geschwindigkeitsverteilung in beiden Richtungen ungleich ist. Hier ergab sich, daß die Elektronengeschwindigkeiten in beiden Fällen gleich sind. Die Intensität der langsamsten Elektronen ist auf der Eintrittseite merklich größer, dagegen die Intensität der schnellsten Elektronen auf der Austrittseite. Daraus folgt, daß die Asymmetrie im wesentlichen auf die schnellen Photoelektronen u. nur zum kleinen Teil auf die Streuelektronen zurückzuführen ist. (Ztschr. f. Physik **25**. 546–50. 1924. Aachen.)

BECKER.

6. Hugo Fricke und O. Glasser, *Über die durch Röntgenstrahlen in Elementen erzeugten Atomgewichts ausgelösten sekundären Elektronen*. Vff. bestimmen denjenigen Teil der durch Röntgenstrahlen in Luft ausgelösten Ionisation, der auf Rechnung der Rückstoßelektronen zu setzen ist. Dadurch ist auch eine indirekte Best. der Energie der Rückstoßelektronenemission möglich, welche andererseits nach der Rutherford'schen Theorie berechenbar ist. Es werden die Ionisationsströme gemessen, die durch Röntgenstrahlen in kleinen Ionisationskammern aus Graphit, Harnstoff,

Maleinsäure, NH_4NO_3 , $NaNO_3$, Mg , Al , KNO_3 , S , Cu erzeugt werden. werden folgende Annahmen gemacht, daß Röntgenstrahlen in leichten Elementen zwei Arten sekundärer Elektronen hervorrufen, die allein für die durch Strahlung verursachte Ionisation in Frage kommen. Die Elektronen der einen Art sind einem photoelektr. Effekt zuzuschreiben. Ihre Energie beträgt bei Verweilen harter Röntgenstrahlen u. leichter Elemente $h\nu$, u. ihre Anzahl pro Grammelat u. pro Strahlenenergieeinheit ist der dritten Potenz der Ordnungszahl (bei $h\nu$ der mittleren Ordnungszahl) proportional. Die Elektronen der anderen Art werden bei dem Streuvorgang gebildet. Die Geschwindigkeit u. Anzahl dieser Rückstoßelektronen ist pro Grammelat von der Ordnungszahl unabhängig. Wird eine Ionisationskammer verwendet, deren Abmessungen im Vergleich zur Reichweite der Elektronen klein sind, so läßt sich der Ionisationsstrom additiv berechnen zu

$$I = \mu_1 N^3 / V_1 + \mu_2 / V_2,$$

wenn μ_1 u. V_1 der Absorptionskoeffizient der Röntgenstrahlen vom photoelektr. Typus in dem Material der Ionisationskammer ist u. V_1 die Volt angibt, die für ein Ion für ein Photoelektron gebraucht werden. μ_2 u. V_2 beziehen sich auf ein Rückstoßelektron, N ist die effektive Ordnungszahl des Kammermaterials. Eine Kammer mit zwei verschieden harten Strahlenarten (gefiltert) gearbeitet u. das Verhältnis

$$\left(\frac{\mu_1 N}{V_1} \right) / \left(\frac{\mu_2}{V_2} \right) \text{ für } \lambda_{\text{eff.}} = 0,180 \text{ \AA} \text{ zu } 0,28 \text{ u. für } \lambda_{\text{eff.}} = 0,115 \text{ \AA} \text{ zu } 0,08$$

gemessen. Mit den nach der Comptonschen Theorie berechneten Werten zeigt sich eine Übereinstimmung in der Größenordnung, wenn auch Abweichungen in den Zahlenwerten beträchtlich sind. V_1/V_2 kann annähernd als 1 angenommen werden. (Ztschr. f. Physik **29**. 374—82. Proc. National Acad. Sc. Washington **10**. 44—47. 1924. Cleveland [O.])

BECHTOLD

P. P. Ewald, *Über den Brechungsindex für Röntgenstrahlen und die Abweichungen vom Bragg'schen Reflexionsgesetz*. (Ztschr. f. Physik **30**. 1—13. 9. 1924. Stuttgart.)

K. W. F.

B. A. Patterson, *Krystallanalyse durch Zerstreuung von Röntgenstrahlen*. (Vf. Physical Review [2] **23**. 552; C. 1924. II. 1432.) Beschreibung der Methode und die Verwendungsmöglichkeit der Krystallanalyse durch Röntgenstrahlen. (Inc. Engin. Chem. **16**. 689—91. 1924. Troy [N. Y.], Polytechn. Inst.)

BECHTOLD

A. March, *Kontinuierliches Röntgenspektrum und Plancksches Strahlungsgesetz*. Vf. gibt einen zusammenfassenden Bericht über seine früheren Arbeiten (Physik. Ztschr. **22**. 429; C. 1921. III. 922). In der dargestellten Theorie des kontinuierlichen Spektrums werden die Beziehungen des kontinuierlichen Spektrums zu den Gesetzen der Wärmestrahlung untersucht. (Ann. d. Phys. [4] **75**. 711—42. 9. 1924. Innsbruck.)

K. W. F.

K. F. Niessen, *Ableitung des Planckschen Strahlungsgesetzes für Atomstrahlung bei zwei Freiheitsgraden*. Mathematisch. (Ann. d. Phys. [4] **75**. 743—80. 9. 1924. Utrecht.)

K. W. F.

J. H. Jones und J. C. Boyce, *Die Konstanten der Rydberg-Ritzschen Gleichung*. Vf. weisen auf eine theoret. Erklärungsmöglichkeit der Abweichungen hin, welche die Spektraltermen von Elementen gegenüber den Termen des Spektrums des H-Atoms aufweisen. Es werden Atome bzw. Ionen behandelt, bei denen — analog wie beim H-Atom — ein einzelnes Elektron in einer Bahn mit relativ großem Radius den Atomrumpf umkreist, also z. B. Na , Ca^+ , Al^{++} usw. Die Abweichungen der Werte der in den Seriengleichungen auftretenden Konstanten von ihren, für das H-Spektrum geltenden Werten beruhen auf der, gegenüber dem dimensionlosen H^+ -Kern vorhandenen räumlichen Ausdehnung der Atomrümpfe der anderen Elemente u. der unvollkommenen Abschirmung der Überschußladungen durch die, in Ban-

geringer Quantenzahlen kreisenden Elektronen. Vff. entwickeln mathemat. Beziehungen, die sich aus diesen Anschauungen ergeben, u. zeigen, daß der experimentelle Befund hiermit in Einklang steht. (Proc. Royal Soc. London Serie A. 1773—84. 1924. Kings Coll., London.)

FRANKENBURGER.

Paul D. Foote und **Arthur E. Ruark**, *Die elektrodenlose Entladung*. Vff. schreiben einige Beobachtungen bei der elektrodenlosen Ringentladung. Wird der Druck im Innern des Entladungsrohres stark erniedrigt, dann geht das Spektrum ins Funkenspektrum über. Hg u. J₂ bei -50° u. 0,002 mm Druck zeigten eine hellleuchtende Entladung. Wird die Zuleitung zu dem Ring unterbrochen, so wird die ganze Röhre von einem gleichmäßigen Leuchten erfüllt, welches von der Moll. des Dampfes, nicht aber von den Atomen herrührt. In H₂ wurden von der Balmer-Serie nur einige Glieder beobachtet. In N₂ treten Linien des aktiven N₂ auf. Bei den Verss. mit Hg schlug sich an der Innenseite der Röhre an der Stelle, wo außen der Ring liegt, ein glänzender Hg-Spiegel nieder. Dieser resultiert von der Tangentialbeschleunigung her, welche den Hg-Ionen durch das ringförmige elektr. Feld erteilt wird. (Nature 114. 750. 1924. Washington, Bureau of Standards.)

BECKER.

Victor Henri und **M. C. Teves**, *Absorptionsspektrum des Schwefeldampfes und Beziehung zur Struktur der Moleküle*. Der Schwefeldampf befand sich in einem Entladungsrohr. Die Lichtquelle war eine Funkenstrecke zwischen zwei Cu-Elektroden; diese Funken liefern ein kontinuierliches Spektrum bis 2300 Å. Die Meßgenauigkeit: 0,01—0,02 Å. — Die Moll. S₃ u. S₈ weisen ein kontinuierliches Absorptionsspektrum auf; für 20 mm Druck u. 5 cm dicke Schicht liegt die Grenze der Absorption bei ca. 2700 Å. Das Absorptionsspektrum von S₂-Moll. setzt sich aus drei Bezirken zusammen. 1. Zwischen 3700 u. 2794,2 Å erstreckt sich ein feines gedrehtes Bandenspektrum, welches der gequantelten Rotation der Mol. entspricht. Es umfaßt 14 Bandengruppen mit Grundfrequenz 397 cm⁻¹ (zwischen 2794,2 u. 2792 Å) u. 9 Bandengruppen mit Grundfrequenz 700 cm⁻¹ (zwischen 2948 u. 3700 Å). Das sehr komplizierte Spektrum (mehr als 5000 Linien) konnte entziffert werden, indem das gleichzeitige Auftauchen verwandter Banden bei Dampfdruckzunahme beobachtet wurde. Jede Bande hat einen positiven ($\nu = \nu_0 + c_1(2m + 1) + m^2c_2$), einen negativen ($\nu = \nu_0 - c_1(2m - 1) + m^2c_2$) u. einen Nullzweig ($\nu = \nu_0 + m^2c_2$); $c_1 = 2$ cm⁻¹, $c_2 = -0,2$ cm⁻¹, woraus sich das Trägheitsmoment des normalen S₂-Mol. zu $13,8 \cdot 10^{-40}$ berechnet. 2. Zwischen 2794,2 u. 2792 Å werden 8 Bandengruppen aus 1—2 Å breiten Banden beobachtet. Die Abwesenheit einer feineren Struktur zeigt, daß die Molekülrotation nicht mehr untersucht wird. (Vgl. HENRI u. DE LASZLO, Proc. Royal Soc. London, Serie A 1662; C. 1924. II. 803.) Die Grundfrequenz ist hier 360 cm⁻¹. 3. Zwischen 2792 u. 2975 Å bilden 6 breite (10—15 Å) Banden mit Grundfrequenz 300 cm⁻¹ ein Kontinuum. Der Wellenlänge 2592 Å entspricht das Potential 4,77 V, während MOHLER für das Resonanzpotential des Schwefeldampfes 4,78 V gefunden hat. Die Größen sind augenscheinlich ident.; das dritte Spektrumsgebiet kommt von Mol. mit auf höhere Energiestufe gehobenen Elektronen zu. (C. r. d. l'Acad. des sciences 179. 1156—59; Nature 114. 894—95. 1924. Zürich, Univ.) BIKERMAN.

Hr. Füchtbauer, **F. Waibel** und **E. Holm**, *Über eine Absorptionslinie des J-Dampfes*. Mit Hilfe eines Zn-Funkens wird die Absorptionslinie 2062,1 Å des J₂ gemessen, indem J-Dampf in einem Quarzrohr im elektr. Ofen auf 1050° erhitzt wird. Bei dieser Temp. u. bei geringem Partialdruck ist J₂ weitgehend in Atome dissoziiert. O₂ zeigt bei hoher Temp. ein Absorptionsspektrum zwischen 1930 u. 2000 Å, welches mit steigender Temp. immer intensiver wird u. nach längeren Wellenlängen sich verfolgen läßt. (Ztschr. f. Physik 29. 367—71. 1924. Rostock, Univ.)

BECKER.

Maria Faßbender, *Untersuchungen über das negative Stickstoffbandenspektrum*. Das vom Ultraviolett bis weit in das sichtbare Gebiet sich erstreckende negative Bandenspektrum des N_2 wurde mit möglichst großer Auflösung aufgenommen. Das Zahlenmaterial ist aus 16 Tabellen ersichtlich. Alle Linien lassen sich eindeutig zuordnen. Es wurden die Termzuordnung, Zweige, Nulllinien u. Intensitätsverlauf bestimmt. (Ztschr. f. Physik **30**. 73—92. 1924. Bonn, Univ.) K. W. F.

J. C. Mc Lennan und **W. W. Shaver**, *Über die Serienspektren, das violette und infrarote Spektrum des Siliciums*. Das äußerste ultraviolette Spektrum des Si-Funkens im Vakuum wurde im Bereich von $\lambda = 2000 \text{ \AA}$ bis $\lambda = 5800 \text{ \AA}$ untersucht, u. 50 neue Linien sind dabei beobachtet. 21 nach FOWLER (vgl. Proc. Royal Soc. London, Serie A. **103**. 413; C. **1923**. III. 816) zum Si IV, dem dionisierten Si-Atom, gehörende Linien, von denen 8 zuvor nicht beobachtet worden waren, wurden aus Vakuumfunkenpektrogrammen gefunden. In Luft wurde das Funken- u. Bogenspektrum des Si zwischen $2300 \text{ u. } 1842 \text{ \AA}$ mit einem Vakuumspektrographen untersucht, wobei ebenfalls neue Linien gefunden wurden. Das Vakuumbogenspektrum wurde mit einem Fluoritspektrographen zwischen $1500 \text{ u. } 1500 \text{ \AA}$ geprüft. Im infraroten Spektrum wurden im Bereich $\lambda = 6300 \text{ u. } 11235 \text{ \AA}$ 33 Linien beobachtet. Sämtliche Wellenlängen u. Schwingungszahlen der beobachteten Linien sind berechnet u. in Tabellen zusammengestellt. Das gesamte Spektrum wurde auf Serienbeziehungen geprüft. (Proc. Trans. Roy. Soc. (Canada) **[3]** **18**. Sekt. III. 1—22. 1924.) JOSELYN

Agate Carst, *Über das kontinuierliche Wasserstoffspektrum*. Vgl. überprüfte Verss. von STARK (Ann. der Physik **[4]** **52**. 255; C. **1917**. II. 4) über das ultraviolette H_2 -Spektrum, unter Anwendung der von STARK benutzten Methode der erhaltenen Spektrogramme zeigten trotz der Kühlung als Verunreinigung stets die Hg-Linie 2536. Es ergab sich: Das kontinuierliche H_2 -Spektrum trat auf, wenn a) H_2 -Kanalstrahlen in H_2 verliefen, b) wenn N_2 Kanalstrahlen in H_2 verliefen, trat nicht auf, wenn H_2 -Kanalstrahlen in N_2 verliefen. Der Schwärzungswert war für a) u. b) der gleiche. Wegen Überlagerung des Viellinienspektrums war es schwierig, den genauen Anfang des Spektrums festzustellen. Er lag zwischen H_γ u. H_γ , so daß H_γ , H_δ u. H_ϵ deutlich auf den kontinuierlichen Hintergrund sichtbar waren. — Das kurzwellige Ende des Spektrums war nur ein scheinbares Minimum. Die Schwärzung nimmt jenseits $2300 \text{ \AA}$ E. wegen der beginnenden Absorption an Quarz sehr plötzlich ab. Auf dem Wienschen Spektrogramm ist bei der Wellenlänge $\lambda = 4000 \text{ \AA}$ E. ein deutliches Minimum der Schwärzung zu bemerken. Dies ist die Wellenlänge, bei der das Spektrum in STARKS Unterss. aufhört. Die Tatsache, daß das kontinuierliche Spektrum im Kanalstrahl nur in ruhender Intensität auftritt, mit dem des Geißlerrohrs übereinstimmt, seinen Anfang im Sichtbaren hat, der mit dem Druck veränderlich ist, läßt es gesichert erscheinen, daß sein Träger das H_2 -Mol. ist. Jedenfalls hat es mit dem Bohrschen kontinuierlichen Spektrum nichts zu tun. (Ann. der Physik **[4]** **75**. 665—721. 1924.) K. W. F.

O. W. Richardson und **T. Tanaka**, *Die Zündungs- und Abreißpotentiale der Elektronenentladungen in Wasserstoff*. Vgl. untersuchen eingehend die Potentiale der schwachen Wellen, bei welchen das Einsetzen u. das Abreißen der verschiedenen Entladungsformen in verd. H_2 -Atmosphäre erfolgt; mittels sorgfältiger Reinigung des benutzten Gases, oftmaliges Ausglühen der verwendeten Quarzröhre, in der förmige Ausgestaltung der elektronenemittierenden Zone der Kathode (Bedeckung einer nur sehr kleinen Fläche mit BaO) erreichen sie Reproduzierbarkeit der Beobachtungen. Sie studieren den Einfluß der Stärke der Elektronenemission an der Kathode, des H_2 -Druckes u. des Elektrodenabstandes auf die Zündungs- u. Abreißpotentiale der einzelnen Entladungsformen u. gelangen zu dem Schluß, daß der Wert, dem das Minimum-Abreißpotential bei kleinen Elektrodenabständen entspricht,

tot. nähert, gleich dem Ionisierungspotential des Gases ist. Ferner folgern aus ihren Messungen sowie der spektralen Zus. der Entladungserscheinungen, die — bei etwa 16 V erfolgende — erste Ionisierung des Wasserstoffs als ein $\text{H}_2 \rightarrow \text{H}_2^+ + e$ zu deuten ist. (Proc. Royal Soc. London Serie A. **106**. 32. 1924.)

FRANKENBURGER.

W. Richardson und T. Tanaka, *Über eine P, Q und R-Kombination im Viellinienspektrum des Wasserstoffs*. (Vgl. vorst. Ref.). Vff. ordnen eine Anzahl Viellinienspektrum des H_2 bei Anregung desselben durch Elektronenstoß in Entladungsröhre (1 mm Druck) auftretenden Linien unter Berücksichtigung Intensität u. der Art ihres Auftretens in anders erzeugten Entladungen in ein. Die hierbei zu Tage tretenden Gesetzmäßigkeiten gestatten Rückschlüsse die Größe der für das H_2 -Mol. maßgebenden Quantenzahlen (Elektronenrotationen, Rotationen u. Schwingungen) u. hieraus auf das Trägheitsmoment Mol. Letzteres ergibt sich für den Anfangszustand bei der Emission der ersten Serie zu $6,2415 \cdot 10^{-41} \text{ g/cm}^2$, für den Endzustand zu $4,7979 \cdot 10^{-41} \text{ g/cm}^2$; der Wert beträgt das Dreifache des aus den „Fulcher“-Banden des H_2 errechneten Trägheitsmomentes. Dies läßt vermuten, daß die von den Vff. als Basis der Betrachtungen gewählten Linien des Viellinienspektrums des H_2 einem anderen Mol., vielleicht einem H_3 -Mol. zuzuordnen sind. (Proc. Royal Soc. London Serie A. **106**. 663—78. 1924.)

FRANKENBURGER.

I. W. Shaver, *Über die äußersten ultravioletten Spektren der Alkalimetalle*. (Proc. Trans. Roy. Soc. Canada [3] **17**. Sekt. III. 131; C. **1924**. II. 582.) Die Spektren der elektrodenlosen Entladung wurden in den Dämpfen von Na, K, Rb, Cs mit einem Fluoritspektrographen untersucht, da nur K im Bereich des Fluorits (2002 Å), ein starkes Spektrum gab, wurden die Spektren von Cs u. Rb mit Quarzspektrographen zwischen 1850 u. 2300 Å untersucht. Außer den von RYER (Journ. de Physique et le Radium [6] **3**. 261; C. **1923**. III. 186) beobachteten Linien sind von Vff. noch neue gefunden. Verss. mit Na waren ohne Erfolg, vielleicht weil die Temp. des App. nicht über 350° gesteigert werden konnte. Die Spektren wurden Schwingungszahlen gefunden, welche mit Werten, die von RYER (Astrophys. Journ. **57**. 185; C. **1924**. I. 1633) aus Energieniveaus berechnet wurden übereinstimmen. (Proc. Trans. Roy. Soc. Canada [3] **18**. Sekt. III. 23—34. Toronto, Univ.)

JOSEPHY.

Barratt, *Absorptionsspektren gemischter Metaldämpfe*. Vff. stellt fest, daß in den Spektren der Dämpfe von Mg mit solchen der Alkalimetalle sowie der Dämpfe von Na mit denen der Alkalimetalle diesen eigentümliche Bandenspektren auftreten (z. B. in Na-K-Dampfgemischen). Dies spricht für das Vorhandensein flüchtiger Verbindungen dieser Metalle in den Dampfgemischen. Weiterhin beobachtet Vff. in den Absorptionsspektren von Rb u. Cs-Dampf die Linien der Serien 1 S-md in Absorption, was die Feststellung, die dem Auswahlprinzip insofern zuwiderläuft, als daß diese, bei Wechsel von 2 Einheiten der azimuthalen Quantenzahl anzeigenden Linien in der Umgebung eines elektr. Feldes auftreten. (Nature **114**. 827. 1923.) FRANKENB.

M. Pool, *Die Messung der Absorption im ultravioletten Spektrum*. Vff. mißt die Absorption im Ultraviolett zwischen 2400 u. 2900 von Lsgg. von MgCl_2 , CaCl_2 , SrCl_2 u. BaCl_2 , indem er sich einer Versuchsanordnung bedient, bei welcher das Licht einer Nitrallampe durch eine Linse parallel gerichtet wird, dann einen Sektor einer veränderlicher Öffnung u. hinter diesem das Absorptionsgefäß passiert. Hierauf wird das Lichtbündel durch eine zweite Linse auf den Spalt eines Monochromators geworfen u. dann durch Schwärzung einer photograph. Platte seine Intensität gemessen. Die Lichtintensität des ursprünglichen Lichtes wurde in einer zweiten Messung durch Verengung des Sektorspaltes soweit geschwächt, bis es die gleiche Intensität besaß wie bei der ersten Messung nach Durchgang der Absorptionslgg.

Als Maß für die Absorption diente der Unterschied in den Sektoröffnungen u. ohne Absorptionsff. Die Wellenlänge wurde durch Veränderung der in bestimmt, indem diese so eingestellt wurden, daß für eine bestimmte Welle der Strahlengang genau parallel war. Bei den untersuchten Erdalkalich nimmt mit abnehmender Wellenlänge im Ultraviolett der Absorptionskoeffizient (Ztschr. f. Physik **29**. 311—14. 1924. Utrecht.)

M. A. Catalán, *Die Struktur des Eisenspektrums*. (Vgl. Nature **113**. 88 192; C. **1924**. II. 583. 1559.) Nach der Arbeit von LAPORTE (Ztschr. f. Physik **1**; C. **1924**. II. 2121) wird über die auch vom Vf. entdeckten Multipletts des Eisen berichtet. Sie sind noch nicht mit allen Linien bekannt, wenn der Vf. auch ihnen hinzufügen kann. Stets stimmt die beobachtete u. die berechnete Wellenlänge genügend überein. Die Linien der Multipletts werden übersichtlich u. vollständig zusammengestellt. (Anales soc. espanola Fis. Quim. **22**. 398—408. 1924. Madrid. Lab. de Invest. Fis.)

Otto Oldenberg, *Über ein Lichtfilter für die Quecksilberlinie*. Vf. beschreibt ein Lichtfilter für die 2537 Linie des Hg. Es wird ein Quarzkolben mit zwei parallelen Stirnflächen von 40 cm Durchmesser mit Cl₂ von etwa 5,5 at gefüllt. Cl₂ eine starke Absorption zwischen 2537 u. 4358 Å aufweist, ergibt sich ein brauchbares Filter für die Hg-Lampe. Kürzere Wellenlängen als 2537 nm durch Gelatine, Glycerin oder Thiophen abfiltriert werden. (Ztschr. f. Physik **2**. 328—31. 1924. Göttingen, Univ.)

F. Simeon und E. S. Dreblow, *Spektrale Beobachtungen am Kupferbogen*. Läßt man einen Lichtbogen zwischen zwei Kupferblöcken bei 220 V u. 3 A abbrennen, dann zeigen die Linien unterhalb 2800 Å Intensitätsschwankungen zwischen dem Spektrum in der Mitte des Bogens u. an den Polen. Am positiven Pol sind die ultravioletten Linien stärker als am negativen. Eine Anzahl von Linien war überhaupt nur am positiven Pol sichtbar. Die Messungen zwischen 224 u. 2112 Å sind angeführt. (Nature **114**. 751. 1924. London.)

Hildegard Stücklen, *Das Absorptionsspektrum des neutralen und des ionisierten Cadmiumatoms im Unterwasserfunken*. (Vgl. Physikal. Ztschr. **25**. 401; C. **1924**. II. 2515.) Die Methode des Unterwasserfunkens wird diskutiert u. das Absorptionsspektrum des Cd aufgenommen. Das Unterwasserspektrum zeigt Emissions- u. Absorptionslinien auf kontinuierlichem Hintergrunde. Die Absorptionslinien werden in 6 Gruppen geteilt, wovon jede schwerer erscheint als die ihr vorangehende. Die am leichtesten auftretenden Absorptionslinien im Bogen- u. Funkenspektrum entsprechen dem Übergang des Elektrons im neutralen u. im ionisiertem Atom der Normalbahn in die nächst höhere. (Ztschr. f. Physik **30**. 24—39. 1924. Leipzig. Univ.)

J. C. Mc Lennan, J. F. T. Young und A. B. Mc Lay, *Über Absorptionsspektren und Serienspektren des Zinns*. Das Bogenspektrum von Sn wurde zwischen 2 u. 1850 Å gemessen u. durch neue Linien vervollständigt. Das Absorptionsspektrum von n. Sn-Dampf bei 1200° umfaßt 17 Linien. Durch die Methode von MC LENNAN u. LANG (vgl. Proc. Royal Soc. London, Serie A. **95**. 285; C. **1924**. III. 37), die in H₂-Atm. angewandt wurde, wurden im Bogenspektrum 40 neue Linien im Schumanngebiet gefunden. Gruppen konstanter Schwingungszahldifferenzen sind in Tabellen zusammengestellt. Einzelheiten u. das Zahlenmaterial müssen im Original nachgesehen werden. Im infraroten Gebiet des Sn-Ig-spektrums werden ebenfalls Gruppen diskutiert. Ionisations- u. Resonanzpotentiale wurden zu 7,3 u. 4,3 bzw. 4,8 V berechnet. (Proc. Trans. Roy. Soc. Canada **18**. Sekt. III. 57—75. 1924.)

J. C. Mc Lennan, J. F. T. Young und A. B. Mc Lay, *Über Absorptionsspektren und Serienspektren des Bleis*. (Vgl. vorst. Ref.). Bei der Messung des Ig-

erums von Pb zwischen 2250 u. 1850 Å wurden viele neue Linien gefunden. Aufnahme des Spektrums in H₂ mit einem Fluoritspektrographen ergab 12 neue Linien. Die Ergebnisse u. Berechnungen bestätigen u. erweitern die Angaben der Serien nach THORSEN (Naturwissenschaften **11**. 78; C. **1923**. I. 1007) u. MOTRIAN (Naturwissenschaften **11**. 225; C. **1923**. I. 1413). (Proc. Trans. Roy. Soc. Canada [3] **18**. Sekt. III. 77—88. 1924.)

JOSEPHY.

George L. Keenan, Die optischen Eigenschaften einiger Aminosäuren. Krystall- u. opt. Eigenschaften, nach der Immersionsmethode festgestellt, werden unter Mitwirkung von Abb. mitgeteilt für Alanin, Asparaginsäure, Cystin, Glutaminsäure, Glykoll, Leucin, Phenylalanin, Serin, Tryptophan, Tyrosin u. Valin. Als Immersionsfl. dienten Gemische von SQUIBBS Mineralöl ($n = 1,49$), Monochlornaphthalin ($n = 1,64$), Monobromnaphthalin ($n = 1,66$), zuweilen auch CH₂J₂ ($n = 1,74$) in solchen Verhältnissen, daß jedes Gemisch vom nächsten sich im n um 0,005 unterscheidet. (Journ. Biol. Chem. **62**. 163—71. 1924. Washington, U.S. Dep. of Agric.) SP. Vorländer und R. Walter, Die erzwungene Doppelbrechung der amorphen Substanzen im Zusammenhange mit der molekularen Gestalt. Vf. messen die Doppelbrechung, welche in amorphen Fll. auftritt, wenn sich diese in einem äußeren Flüssigkeitsgefäß befindet, in dessen Achse ein Vollzylinder rotiert. Bedeutet D die erzwungene Doppelbrechung in der wirbelnden Fl., u die Tourenzahl des rotierenden Zylinders u. Z die Zähigkeit, dann ergibt sich eine für die betreffende Fl. charakteristische „spezif. Doppelbrechung“ $[D] = D/uZ$. Für Glykol, Pinakon, Tetraäthylvinakon, Dihydrocarveol, α -Methylcyclohexanol, m -Methylcyclohexanol, Linalool, Citricarbonsäureäthylester ist $[D] = 0$, da diese Moll. stark verzweigt sind u. keine Längsausdehnung besitzen. Wird die Zähigkeit größer, dann zeigen auch diese Moll. eine Längsausdehnung u. nicht lineare Moll. ein merkliches $[D]$ wie Glycerin, α -Cyclohexyl- α -butanol, Milchsäure, Acetylpropionyl, Äthyltartrat. Bei Fettsäuren wächst $[D]$ mit zunehmender Kettenlänge; Milchsäure, α -Oxybuttersäure, n -Heptylsäure, n -Caprylsäure, n -Nonylsäure, Oleinsäure. Die Glyceride verhalten sich wie die Fettsäuren, werden die $[D]$ -Werte durch die Veresterung relativ kleiner; Triacetin, Tri- n -butylacetat, Tri- i -valerin, Tri- n -caproin, Tri- n -caprylin, Triolein. Bei arom. Verb. u. die para-Substituenten ein größeres $[D]$; o- m-, p-Verb. von Acetyl-oxybenzoesäureäthylester, n -Butyryloxybenzoesäureäthylester, Tolyldiazin. Ferner Zimtsäure- n -butylester, p -Methoxyzimtsäure- n -butylester, p -Methoxy- α -methylzimtsäure- n -butylester. Auch hier wird durch Kettenverzweigung $[D]$ geschwächt. Hydrozimtsäure- n -Propyl, β -Diphenylpropionsäure-Äthyl, zimtsäure-Äthyl-, i -Propyl, n -Propyl, n -Butyl. Doppelbindung verstärkt $[D]$. Zimtsäure-Propyl, Benzyl, Cyclohexyl, die entsprechenden Hydroverb. Phenylpropylalkohol, Zimtalkohol, Citronellalkohol, Geraniol, C₁₈H₃₀, C₁₈H₂₈. — Es ergibt sich des Weiteren ein Einfluß der molekularen Gestalt auf die Anisotropie der Öle. Doch wird die Anisotropie der amorphen Fll. bei weitem nicht erreicht. (Physikal. Ztschr. **25**. 571—75. 1924. Leipzig.)

BECKER.

Niels Bohr, Zur Polarisation des Fluoreszenzlichtes. Vf. sucht zur Deutung der experimentellen Ergebnisse von WOOD u. ELLETT (Proc. Royal Soc. London **103**. 396; C. **1923**. III. 885) die Schwierigkeiten zu umgehen, welche die Anwendung der Quantentheorie bei der theoret. Behandlung der Polarisation des Fluoreszenzlichtes mit sich bringt. Man kann eine Erklärung dieser Erscheinung unter Anlehnung an die Prinzipien erhalten, die der quantentheoret. Deutung der Spektrallinien zugrunde liegen. (Naturwissenschaften **12**. 1115—17. 1924. Kopenhagen.)

BECKER.

Donat, Über sensibilisierte Fluoreszenz. Vf. weist die sensibilisierte Fluoreszenz des In bei Bestrahlung eines Gasgemisches von Hg u. In mit der Hg-Resonanzlinie 2536,7 Å bei 900° nach; die gefundenen Linien werden abgesehen von Hg.

den Linien $\lambda = 2837 \text{ \AA}$ u. $\lambda = 2957 \text{ \AA}$ durch das Grotriansche Serienschema friedigend erklärt. As u. Sb zeigten unter analogen Bedingungen keine Fluoreszenz. Bei Zusatz von Ar bzw. N_2 zu einem mit der Linie $2536,7 \text{ \AA}$ bei 100 u. 600 cm^{-1} strahlten Hg-Tl-Dampfgemisch wird die Hg-Resonanzfluoreszenz wenig beeinträchtigt, während die Tl-Linien mit steigendem Druck des Gasgemisches zunächst wesentlich lichtstärker werden, um dann mehr oder weniger zu verlieren; Zusatz von H_2 vermindert die Tl-Fluoreszenz u. die Hg-Resonanzfluoreszenz gleicher Weise. Vf. schließt, daß Zusammenstöße von angeregtem Hg im $^3\text{P}_1$ -Zustand u. im metastabilen 2p_3 -Zustand bei der Übertragung der Anregung auf die Tl-Atome zusammenwirken. (Ztschr. f. Physik **29**. 345—55. 1924. Göttingen Univ.)

Wilhelm Hanle, Über magnetische Beeinflussung der Polarisation der Resonanzfluoreszenz. (Ztschr. f. Physik **30**. 93—105. 1924. Göttingen.)

B. Gudden und R. Pohl, Zum Mechanismus des lichtelektrischen Primärstromes in Krystallen. (Vgl. Ztschr. f. Physik **6**. 248; C. **1922**. III. 1112.) Vf. behandeln insbesondere den positiven Anteil des lichtelektr. Primärstromes. Diese Erscheinungen kommen sowohl unter Einwirkung langwelligen Lichtes wie der therm. Molekularbewegung zustande kommen. Durch spektrale Ausmessung wird gezeigt, wie sich der Verlauf der opt. Absorption des Diamanten weiter nach langen Wellen erstreckt, wenn die Störungen des Diamantgitters durch positive Ladungen vergrößert werden, die durch den Abfluß des negativen Anteils des lichtelektr. Primärstromes zurückbleiben. Die lichtelektr. Erscheinungen lassen sich anscheinend, so weit es sich um den Mechanismus des lichtelektr. Primärstromes handelt, in allen Krystallen einheitlich behandeln. (Ztschr. f. Physik **30**. 14—23. 1924. Göttingen, Univ.)

Washington del Regno, Über die photoelektrische Emission des Seleniums. Vf. untersucht das Emissionsvermögen des Se in der Dunkelheit u. unter dem Einfluß des Lichtes u. kommt zu dem experimentellen Schluß, daß ein Unterschied zwischen dem Emissionsvermögen des Se in der Dunkelheit u. unter dem Einfluß des Lichtes nicht nachweisbar ist. (Atti R. Accad. dei Lincei, Roma **33**. II. 163—67. 1924.)

René Audubert, Die Photovoltaizität der Silberhalogenide und der Entwicklungsmechanismus des latenten Bildes in der Photographie. (Vgl. S. 201.) Ag-Elektrode mit dünnen (dem ersten bis dritten Violett entsprechenden) AgCl- bzw. AgBr-Schichten bedeckt, werden im roten Licht negativ, wobei die Ladung allmählich zurückgeht, im blauen Licht zunächst stark negativ, dann Null u. positiv. Wenn das blaue Licht mehrere Male nacheinander, so verschwindet allmählich der negative Effekt u. bleibt nur der positive (Elektronenabgabe); der negative Effekt des blauen Lichtes tritt aber wieder auf, wenn man die „ermattete“ Elektrode mit rotem Licht bestrahlt. In dickeren Schichten geben AgCl u. AgBr nur den positiven Effekt, Ag_2S nur den negativen Effekt. — Die Erscheinungen ermöglichen eine Erklärung der Entstehung des latenten Bildes. In der Silberchlorid-Gelatine-Emulsion bilden sich komplexe Micellen mit Wasserhüllen umgeben, die gel. u. dissoziiertes Agl enthalten. Beim Anprallen des Lichtes auf ein Korn wird ein Elektron abgeschudelt, es trifft ein Ag^+ in der Wasserhülle u. entladet es. Die so entstandenen Ag^0 -Atome dienen als Krystallisationskeime bei der darauffolgenden Entwicklung. Nach der Elektronenabgabe wird durch die negative Ladung der Körner erleichtert, die Ladungsdichte des Kornes wächst mit seinem Durchmesser; daraus die große Empfindlichkeit gröberer Emulsionen. (C. r. d. l'Acad. des sciences **179**. 163—164. 1924.)

A₂. Elektrochemie. Thermochemie.

E. Wiegand, Über die Gesamtstrahlung des Leuchtkörpers der Nernstlampe bei verschiedenen Temperaturen. Vf. stellte sich die Aufgabe festzustellen, ob die

Körper irgendwelche Zusammenhänge zwischen Gesamtstrahlung u. anderen Temperaturfunktionen aus den erhaltenen Werten abzuleiten waren. Zu diesem Zweck wurden die *Nernstmasse* der üblichen Zus. ($\text{ZrO}_2 + 15\% \text{ Yttererden}$), U_3O_8 , Kohlestäbe (SIEMENS & Co., Lichtenberg) untersucht. Die Gesamtstrahlung des Leuchtkörpers der Nernstlampe wurde zwischen 1000 u. 2300°, die des U_3O_8 zwischen 900 u. 1440° gemessen u. mit der des Pt u. W verglichen. Aus den Versuchen ergibt sich, daß bei Oxyden hohes Strahlungsvermögen immer mit guter Leitfähigkeit verbunden ist. Diesem Zusammenhang scheint allgemeine Bedeutung zukommen. (Ztschr. f. Physik **30**, 40—49. 1924. Berlin.) K. WOLF.

Bruhat und **M. Pauthenier**, *Über die Theorie der Elektrostriktion in isolierenden Flüssigkeiten*. Die Helmholtz-Lippmannsche Formel für die Elektro-

striktion $\theta = \frac{\kappa E^2}{8\pi} \left(\frac{\partial \varepsilon}{\partial \theta} \right)$ wird neu abgeleitet u. erweitert: sie gilt nicht nur für isotherme Änderung (dabei sind $\theta = v_0 - v/v_0$, v_0 das Anfangsvol., v das Vol. im elektr. Feld E , κ die Kompressibilität bei isothermer Kompression, ε die DE.), sondern auch für die adiabat., wobei aber κ die Kompressibilität bei adiabat. Kompression u. $\partial \varepsilon / \partial \theta$ die Abgeleitete bei konstanter Entropie u. E bedeuten. (C. r. d. Acad. des sciences **179**, 1257—60. 1924.)

BIKERMAN.

E. Frivold, *Beitrag zur Kenntnis des sogenannten anomalen Verhaltens von Elektrolyten*. (Kurz. Ref. nach Naturwissenschaften vgl. C. **1924**, II. 1058). Formel für den osmot. Koeffizient (die tatsächliche Dampfdruckerniedrigung, dividiert durch die theoret.) γ lautet: $1 - \gamma = \varepsilon^2 \cdot x \cdot \sum c_i z_i^2 \sigma_i / 6 D \cdot k \cdot T \cdot \sum c_i$, ε die Ladungseinheit, x die charakterist. reziproke Länge der Debye-Hückel-Theorie, c_i Konz. in Molenbruch, z_i die Wertigkeit des i -ten Ions, D die Diffusionskoeffizienten, σ_i eine Funktion des Ionenradius. Man erhält eine genügende Übereinstimmung mit der Erfahrung, wenn man den mittleren Durchmesser von Cl^- in CH_3OH gleich $5,4 \cdot 10^{-8}$, in A. gleich $3,96 \cdot 10^{-8}$, in Propylalkohol $7,32 \cdot 10^{-8}$ cm setzt. Diese eine willkürliche Konstante genügt aber nicht, um das Verh. stärkerer Lsgg. wiederzugeben, wo die sogenannte Hydratation auftritt. (Physikal. Ztschr. **25**, 465—73. 1924. Christiania.)

BIKERMAN.

Malsch und **M. Wien**, *Über den Temperaturkoeffizienten elektrolytischer Widerstände bei Erwärmung durch ganz kurze Stromstöße*. Vf. messen den Temperaturkoeffizienten elektrolyt. Widerstände durch kurze Stromstöße, indem sie eine Kondensatorentladung durch den Elektrolyten gehen lassen, welche ihn gleichzeitig erwärmt. Der Widerstand wird mittels des Stromeffektes gemessen und mit einem anderen Widerstand verglichen, bei dem die Erwärmung nicht merklich ist. Durch Erhöhung der Entladespannung die Stromwärme gesteigert wird, kann man aus 4—5 solcher Widerstandsmessungen bei verschiedener Spannung den Temperaturkoeffizienten ermitteln. Dabei zeigt sich, daß bei plötzlicher Erwärmung um 1—7 Sek. eines elektrolyt. Widerstandes der Temperaturkoeffizient zunächst durch die Änderung der Zähigkeit des Elektrolyten bedingt ist. Er beträgt für die Ionen in w. Lsg. 2,2%. Die Ionen selbst sind noch unverändert u. ihre Beweglichkeit erfolgt den Reibungsgesetzen entsprechend. Bei länger andauernder Erwärmung von 10^{-6} bis 10^{-5} Sekunden ist die Änderung des Temperaturkoeffizienten auf eine Konstitutionsänderung im Elektrolyten zurückzuführen. Diese Rkk. erfolgen umso schneller, je konzentrierter die Elektrolytlsg. ist. Bestimmt wurde der Temperaturkoeffizient zwischen $t = 2 \cdot 10^{-7}$ Sek. u. $t = \infty$ an NaCl , KHSO_4 , H_2SO_4 , H_3BO_3 in H_2O , CdJ_2 in Aceton u. NaCl in Rohrzuckerlsg. Abweichungen vom Ohmschen Gesetz treten nie auf. (Physikal. Ztschr. **25**, 559—62. 1924.)

BECKER.

R. Gordon, *Polarisation und Konzentrationsänderungen an der Kathode während der Elektrolyse von Kupfersalzen*. Die bei der Elektrolyse von Cu-Salzen

an der Kathode beobachteten Polarisationen sind größer als die nach der Theorie von ROSEBRUGH u. MILLER erwarteten. Im Augenblick des Stromschlusses tritt die Anfangspolarisation Π_0 auf, u. die kathod. Polarisation während der Entladung von CuSO_4 bis zum Beginn der H_2 -Entw. folgt der empir. Gleichung:

$$\Pi = \Pi_0 + 0,188 \log z_0/z,$$

wobei z_0 die Cu-Konz. im Elektrolyten, z die Cu-Konz. an der Kathode ist, hängt von der Natur der Kathodenoberfläche, dem Zeitraum der seit ihrem Gebrauch als Anode verstrichen ist, u. von der Konz. der H_2SO_4 im Elektrolyten ab, ist hingegen unabhängig von der Cu-Konz. im Elektrolyten u. von der Stromdichte an der Kathode, wenn diese nicht unter 1 Amp./qdm fällt. Bei Verw. von CuCl_2 u. Cu_2Cl_2 konnten ähnliche Beziehungen aufgestellt werden. (Proc. Roy. Soc. Canada [3] 18. Sekt. III. 116—17. 1924.) JOSEPH

Ch. Féry, *Insulfatisierbarer Bleisammler*. Vf. konnte zeigen (vgl. Bu. Chim. de France [4] 25. 223; C. 1919. III. 1032), daß sich im Bleisammler die Rk. $2\text{Pb} + \text{H}_2\text{SO}_4 + \text{Pb}_2\text{O}_5 = \text{Pb}_2\text{SO}_4 + 2\text{PbO}_2 + \text{H}_2\text{O}$ abspielt. Bei spontaner Entladung dagegen findet die Rk. $\text{Pb}_2 + \text{H}_2\text{SO}_4 + \text{O} = \text{Pb}_2\text{SO}_4 + \text{H}_2\text{O}$ u. an der Kathode $\text{Pb}_2\text{SO}_4 + \text{H}_2\text{SO}_4 + \text{O} = 2\text{PbSO}_4 + \text{H}_2\text{O}$ statt; die negative Platte wird disintegriert u. unbrauchbar. Um der Entladung vorzubeugen, genügt es, die atmosp. Luft von der Platte fernzuhalten; dazu genügt es, die Platte, statt senkrecht, recht auf dem Boden des Kastens zu befestigen. Um noch die Diffusion von H_2 an die Anode zu verhindern, wird der Elektrodenraum mit einer porösen Masse gefüllt. Der so angefertigte Akkumulator verliert in 26 Monaten nur 66% seiner Ladung u. kann danach glatt aufgeladen werden. (C. r. d. l'Acad. des sciences 17. 1156. 1924.) BIKERMAN

G. Grube, *Die Überspannung des Wasserstoffes an Arsenkathoden und die elektromotorische Verhältnisse des Arsenwasserstoffes*. Nach Versuchen von H. Ielke u. Vf. verwendet zur Best. der Überspannung von H an As elektrolyt. überlegene Cu-Elektroden, auf welchen As als äußerst feinkristalliner blauer Niederschlag geschlagen ist. An eine solche Zelle, welche als Elektrolyt H_2SO_4 oder NaOH mit wechselnder Konz. enthielt, wurden allmählich steigende Spannungen angelegt, mittels eines Galvanometers die jeweils fließenden Ströme gemessen. Gleichzeitig wurde das Kathodenpotential gegen eine Kalomelelektrode bestimmt. Dabei ergab sich, daß mit wechselnder Stromdichte sich das Kathodenpotential in einer charakteristischen Kurve nach unedleren Werten verschiebt u. in der Nähe desjenigen Potentials, dem die Entw. von gasförmigem H_2 beginnt, scharf umbiegt. H_2 -Entw. tritt ein bei H_2SO_4 bei $-0,284$ V., 0,1-n. H_2SO_4 $-0,358$ V., 1-n. NaOH $-1,016$ V., 0,1-n. NaOH $-0,948$ V. Diese Werte für die Überspannung von H an As-Kathoden sind mit dem Potential verglichen, das beim Zerfall des AsH_3 in demselben Elektrolyten auftritt. In H_2SO_4 ist AsH_3 elektromotor. nicht wirksam. Dagegen kann der Zerfall in NaOH verfolgt werden, u. zwar ergaben sich die Zerfallspotentiale 96,7% AsH_3 (Verunreinigung ist H_2) an einer platiniierten Pt-Kathode in 0,1-n. NaOH zu denselben Werten wie die Überspannungen des H an As-Kathode. Damit scheint die Theorie bewiesen zu sein, welche die Überspannung des H dadurch erklärt, daß als Zwischenprodd. Hydride an der Kathode gebildet werden. AsH_3 ist auch in dem an As-Kathoden gebildeten Gas nachweisbar. (Ztschr. f. Elektrochem. 30. 517—23. 1924. Stuttgart.) BECKER

M. J. Mulligan, *Eine Untersuchung der Leitfähigkeit geglühter und nicht geglühter Natronkalkgläser*. Der beträchtliche Unterschied (ca. 200%) in der Leitfähigkeit geglühter u. nicht geglühter Natronkalkgläser wird bis zu 160% durch direkte Messung festgestellt. Der Charakter der Funktion, welche die Abhängigkeit der Leitfähigkeit von der Temp. darstellt, ist in beiden gleich, so daß der Gradunterschied besteht. Die Annahme eines Unterschieds im Grad der Ionisation

iden Fällen erklärt die Erscheinung am besten. (Proc. Trans. Roy. Soc. Lond. [3] 18. Sekt. III. 120—21. 1924.)

JOSEPHY.

Karl Lichtenecker, *Die Temperaturwiderstandsfunktion metallischer Leiter*. Physikal. Ztschr. 25. 169. 193; C. 1924. II. 439. 918.) Vf. leitet die Temperaturwiderstandsfunktion eines metall. Leiters unter der Annahme ab, daß ein Metall aus Partikelchen bestehe, welche ausschließlich die Leitfähigkeit bedingen u. aus einer zweiten Art von Teilchen, die keinen Anteil daran haben. Dabei können bei einem gewissen Zeitpunkt Teilchen der ersten Art in die der zweiten Art übergehen oder umgekehrt, so daß sich das Mischungsverhältnis beider Komponenten als temperaturabhängig erweist. Die analyt. Ableitung ergibt dann eine Temp.-Widerstandsfunktion, welche in sehr guter Übereinstimmung mit den gemessenen Werten verläuft u. die Erscheinungen der Suprafluidität widerspricht. (Physikal. Ztschr. 25. 550—51. 1924. Reichenberg i. B.) BE.

Merle Randall und Albert P. Vanselow, *Die Aktivitätskoeffizienten von verdünnten wässerigen Lösungen von Chlorwasserstoff, Thallochlorid und Bleinitrat*. Best. der Aktivitätskoeffizienten werden 3 von einander unabhängige Methoden benutzt, die Methode der Gefrierpunktsniedrigung, der EK. u. Löslichkeitsmessungen. Der mittlere Aktivitätskoeffizient γ ist definiert durch $\gamma = a_{\pm} / m_{\pm}$, $m_{\pm}$ die mittlere Molarität u. $a_{\pm}$ die mittlere Aktivität der Ionen (vgl. RANDALL, Journ. Americ. Chem. Soc. 43. 1112; C. 1922. III. 316) ist. Vgl. ihre Gefrierpunktsmessungen mit einem App. aus, der im Original genau abgebildet ist, u. der hinsichtlich des von ADAMS (Journ. Americ. Chem. Soc. 37. 481; C. 1915. I. 1248) benutzten App. einige Abänderungen enthält. Wird eine Methode zur Kalibrierung des Whiteschen Potentiometers (Journ. Chem. Soc. 36. 2011; C. 1915. I. 722) beschrieben, u. Leitfähigkeitsmessungen werden ausgeführt an verd. Lsgg. von HCl , $TlCl$ u. $Pb(NO_3)_2$. Die Messungen der Gefrierpunktsniedrigungen mit HCl berechneten Aktivitätskoeffizienten stimmen mit den aus Messungen der EK. berechneten befriedigend überein, bei $TlCl$ besteht Übereinstimmung mit den aus Löslichkeitsmessungen berechneten Aktivitätskoeffizienten. Es stimmen also die nach verschiedenen Methoden berechneten Aktivitätskoeffizienten untereinander überein, aber sie stimmen nicht mit den aus der theoret. Gleichung von DEBYE u. HÜCKEL u. der integrierten Gleichung von BRÖNSTED u. LA MER berechneten überein. (Journ. Chem. Soc. 46. 2418—37. 1924. Berkeley [Cal.], Univ.)

JOSEPHY.

Goetz, *Das thermoelektrische Verhalten des reinen Eisens an seinen Umwandlungspunkten*. (Vgl. Physikal. Ztschr. 24. 377; C. 1923. I. 6.) Vf. mißt das thermoelektr. Verh. des Fe gegen Pt bei seinen 4 Modifikationsstufen zwischen Zimmertemp. u. Zimmertemp. Zu diesem Zweck verwendet er einen Elektrolyteisendraht, von der Mitte an auf einen bedeutend geringeren Querschnitt ausgezogen, so daß sich hier bei elektr. Heizung des Drahtes infolge der sprunghaften Querschnittsverminderung auch ein großes Temperaturgefälle bemerkbar machte. An beiden Enden war der Draht an Eisenstäben befestigt. In gleicher Entfernung vom Mittelpunkt waren an die dünne u. an die dicke Hälfte des Drahtes zwei Pt -Drähte angelötet. Die Temp. der Lötstellen u. das Temperaturgefälle beim Querschnittsabbau des Drahtes konnte mittels eines Mikropyrometers gemessen werden. Es wurde also zwischen den Enden des Drahtes u. den Lötstellen an der dünnen u. dicken Seite die Thermokraft zwischen Fe bei Zimmertemp. u. dem jeweils verschieden hoch erhitzten Fe -Draht gemessen, zwischen den Lötstellen die Thermokraft Fe (heiß)/ Pt u. Fe (kühl)/ Pt . Die Messungen zeigen, daß beim Übergang der kub. flächenzentrierten Modifikation des α , β u. γ des kub. raumzentrierte γ - Fe ein starker Abfall von dE/dT auftritt,

welcher bei der umgekehrt verlaufenden Umwandlung des γ -Fe in das δ -Fe ebenfalls umkehrt. Das raumzentrierte Gitter ist also thermoelekt. positiv gegenüber dem flächenzentrierten. Es ist daher im flächenzentrierten Gitter, wo die Diffusionsgeschwindigkeit der Elektronen geringer ist, der Anstieg der Elektronenkonz. oder die Diffusionsgeschwindigkeit der Elektronen geringer als im raumzentrierten Gitter. Geht man daher vom raumzentrierten Gitter zum flächenzentrierten über, dann steigt D. u. damit der Temperaturkoeffizient der Elektronendiffusionsgeschwindigkeit sprunghaft an. Man findet im magnet. u. glühelekt. Verh. des Fe zeigen dessen thermoelekt. Verhältnisse gewisse Parallelität. Doch zeigt die Glühelektronenemission bei der γ/δ -Umwandlung eine dem thermoelekt. Verh. bei diesem Punkt entgegengesetzte Vorzeichenänderung, welche im Widerspruch mit den bisherigen Theorien der Elektr. Leitung in Metallen steht. (Physikal. Ztschr. **25**. 562—71. 1924. Göttingen Univ.)

A. Schtschukarew, *Untersuchungen über die magnetochemischen Erscheinungen*. (Vgl. SCHTSCHUKAREW, Physikal. Ztschr. **15**. 670; C. **1914**. II. 1415 u. 1416.) Zusammenfassender Bericht über die frühere Veröffentlichung Vfs. Nachzutragen: Der Magneteffekt bei elektrolyt. Rkk., d. h. die Entstehung im Magnetfeld einer EMK. zwischen zwei symmetr. zu einer arbeitenden Elektrode in den Elektroden eingetauchten Pt-Platten, wird beseitigt, wenn man zwischen der Elektroden-Platten einen Glasring einführt: die von der Elektrode ausgehende elektr. Strömung erfüllt nur einen kleinen u. genau begrenzten Raum. Der Magneteffekt verschwindet, sobald die Elektrolyse unterbrochen ist; er bleibt bestehen, wenn man den Elektrolyten mit Elektrolyseprod. sättigt — so eine BaCl_2 -Lsg. mit Cl_2 gesättigt; beweist, daß er mit der Polarisation durch Elektrolyseprod. nichts zu tun hat. Einen zweiten Fall des magnetochem. Effektes in reagierenden Gasen fand V. bei der Rk. zwischen NO u. O_2 . Der Strom des Effektes ist dem Ionisationsstrom entgegengerichtet. (Ztschr. f. physik. Ch. **113**. 441—63. 1924. Charkow, Physik. Inst.)

A. Duperier, *Thermomagnetische Untersuchung einiger Lösungen*. (Vgl. BERNARD u. DUPERIER, Anales soc. espanola Fis. Quim. **22**. 160; C. **1924**. II. 59.) Temp. der Lsgg. im Ofen ist nicht überall die gleiche, so daß mit einer mittleren Temp. gerechnet werden muß; die durch Einwäge hergestellten Lsgg. werden im Vakuum luftfrei gekocht. Untersucht werden drei Lsgg. von *Manganochlorid*, zwei von *Manganonitrat* u. zwei von *Nickelonitrat* (Salze von KAHLBAUM); die untersuchten Lsgg. werden analysiert. Die Suszeptibilität der Anionen wird als Funktion der Temp. unveränderlich angenommen, der Temp.-Koeffizient des W. ist bekannt, so daß die Temp.-Abhängigkeit der Suszeptibilität der Kationen $\delta\chi/\chi_{20}$ aus den gemessenen Werten für die Lsgg. abgeleitet werden kann. Das Curie-Weißsche Gesetz $\chi_{c,T}(T + \Delta) = C_m$ erlaubt die Werte von Δ graph. abzuleiten, wenn man das Verhältnis $\chi_{c,20} : \chi_{c,T}$ als Funktion der Temp. aufzeichnet. Δ war oft als positiv angenommen, das ist nicht der Fall: Δ ist negativ, von der Konz. u. der Art des Salzes fast unabhängig, für Mn^{++} im Mittel -25 , für Ni^{++} -2 . — Der Temp.-Koeffizient der Suszeptibilität des W. rührt augenscheinlich von der Polymerisation des H_2O her. Da sich diese nun nicht nur mit der Temp., sondern auch mit der Konz. der gel. Salzmolekeln ändert, untersucht V. eine 28%ig. *Magnesiumchloridlösung*. Wenn das Salz keinen Temp.-Koeffizienten hat u. sich die Suszeptibilität des W. u. des gel. Salzes addieren, sollte man $\delta\chi/\chi_{20}$ für W. finden. Das ist nicht der Fall, weil auch das Salz das W. depolymerisiert. Das wird bei Mn^{++} nicht merklich, bei Ni^{++} etwas bemerkbar sein, beim Ni^{++} ändern sich die Werte in der Tat etwas stärker mit der Konz. — Schließlich wird unter Benutzung der gefundenen Werte von Δ u. älteren Zahlen für Lsgg. verschiedener Konz. die

Magnetonen berechnet: für das Mangan in Nitratslgg. ergibt sich $28,07 \pm 0,09$, Chloridslgg. $28,05 \pm 0,06$, für Nickel in Nitratslgg. $15,96 \pm 0,05$, beide Werte ganzzahlig, für feste Mn-Salze hatte sich 29 ergeben, für feste Ni-Salze ebenfalls 16 Magnetonen. (Anales soc. espanola Fis. Quim. **22**, 383—97. 1924. Madrid, Lab. de Invest. Fis.) W. A. ROTH.

B. Cabrera, Die Konstante Δ in dem modifizierten Curieschen Gesetz. Die Veränderlichkeit der molekularen Suszeptibilität wird in weitem Temp.-Intervall durch die Curie-Weissche Formel $\chi_m(T + \Delta) = C_m$ wiedergegeben, wo C_m für den betr. Körper charakterist. sind, während LANGEVINS Theorie zu der Formel $\chi_m \cdot T = C_m$ führt. EHRENFESTS Annahme, daß die magnet. Achse durch Drehung der gesamten Elektronenbewegungen einen Richtungswechsel erleidet, ist für schwachen Punkte. Nimmt man WEISS' Theorie von der Ganzzahligkeit der Magnetonen an, so folgt, daß die Organisation der Elektronenschalen immer so sein muß, daß das resultierende magnet. Moment ein Multiplum des Magnetons sein steht nicht entgegen, daß in einzelnen Schalen eine Umkehrung der Bewegung stattfindet, wodurch die magnet. Achse um bestimmte Winkel verschoben wird. Durch die Wrkg. des äußeren Feldes u. (namentlich bei Fl.) der Wärmeeinwirkung kann die Achse ihre Richtung außerdem kontinuierlich verändern, nach dem Boltzmannschen Verteilungsgesetz. — Eine genauere Diskussion ergibt, daß Δ ein Faktor in sich schließt, der mit der Dichtigkeit der paramagnet. Substanz in Beziehung steht u. Δ u. Δ sind bei Mischungen von O₂ u. N₂ symmetrisch, auch in anderen Fällen. Eine theoret. Erklärung des vielfach herangezogenen molekularen magnet. Feldes ist nicht möglich. Der Gültigkeitsbereich der Curie-Weisschen Formel ist für verschiedene Stoffe sehr ungleich, ohne daß sich Regelmäßigkeiten ergaben. Ob eine potentielle Energie, die eine Funktion der Kristallstruktur ist, mitspielt (FOËX, Thèse Straßburg), ist unsicher. Fe⁺⁺ u. Co⁺⁺ eignen sich wegen ihrer Komplexbildung schlecht, um theoret. Fragen zu entscheiden, die von DUPERIER (vgl. vorst. Ref.) studierten Kationen Ni⁺⁺ u. Mn⁺⁺, während die Curie-Weissche Formel fast streng gilt, was durch die Annahme des molekularen Feldes nicht zu erklären ist, eher durch Vorstellungen wie die von EHRENFEST. Wahrscheinlich handelt es sich um eine *Deformationserscheinung*: chem. Bindungen des paramagnet. Atoms deformieren das Elektronensystem auf eine Weise, daß das magnet. Moment resultiert. Eine quantitative Erklärung ist auch auf Grund dieser Anschauung nicht möglich, aber qualitativ erklärt sie manche Erscheinungen besser als das Molekularfeld, z. B. die bei einer bestimmten Temp. ohne physikal.-chem. Änderungen des Körpers auftretenden plötzlichen Umschüßel des magnet. Moments; doch kann man auf die Hypothese des Molekularfeldes wegen des Zusammenhanges von Δ mit der Dichtigkeit der paramagnet. Substanz nicht ganz verzichten; Δ ist eine Funktion verschiedener Größen. (Anales soc. espanola Fis. Quim. **22**, 463—73. 1924. Madrid, Lab. de Invest. Fis.) W. A. ROTH.

Titosi Tominaga, Über Ammoniakbildung in der stickstoffhaltigen Knallgasreaktion. Vf. setzt die Verss. von MAXTED (Journ. Chem. Soc. London **115**, 1919. C. 1919. III. 309) über die NH₃-Bildung bei Verbrennung eines Gemisches von N₂ + 3H₂ mit Knallgas fort. Es wird N₂ + H₂ in verschiedenen Mischungsverhältnissen in einem Druckflammenapparat von HABER u. COATES (Zschr. f. physik. Ch. **69**, 337. [1909]) mit O₂ gemischt u. unter wechselndem Druck verbrannt. Reaktionsprodd. werden in Waschflaschen absorbiert u. analysiert. Der H₂-Gehalt des Restgases u. damit der verbleibende N₂-Gehalt wurde nach der Bunsen-Methode mittels einer Explosionspipette nach Zufügen von O₂ bestimmt. In allen Verss. trat neben H₂O u. NH₃ als Reaktionsprod. auch NO auf. Die Menge der Flamme hängt nicht nur von dem Mischungsverhältnis des Gases, sondern auch von dem Druck ab, da hier die Dissoziation des Wasserdampfes schon

eine Rolle spielt. Es ergibt sich hieraus eine Möglichkeit, die Flammenten berechnen. Mit wachsendem Volumverhältnis H_2/N_2 und steigendem Druck diese zu, doch sind die Unterschiede klein. Bei geringer Flammengröße sind Ausbeuten an NO u. NH_3 größer als bei hohen Flammen. Die Ausbeuten von NO u. NH_3 liegen bei den meisten Verss. in derselben Größenordnung. Wird die Flamme nicht gekühlt, dann verbessert sich die Ausbeute. Die günstigste Ausbeute wurde bei einer kleinen Flamme, welche pro Stde. 0,195 Moll. H_2O erhalten. Es ergab sich in diesem Fall $NH_3/H_2O = 24,2 \cdot 10^{-4}$, $NO/H_2O = 23,6 \cdot 10^{-4}$ bei 21 at Druck. Bei gewöhnlichem Druck u. großer Flamme mit 0,78 Mol. H_2O pro Stde. sanken diese beiden Verhältniszahlen auf $2,22 \cdot 10^{-4}$, bezw. $2,7 \cdot 10^{-4}$ herab. Die Flammentemp. schwankte zwischen 2930° u. 3660° abs. Die Apparatur ist ausführlich wiedergegeben. (Ztschr. f. Elektrochem. **30**. 528—34. 1924. J. Dahlen. Kaiser Wilhelm Inst. f. physikal. Chemie u. Elektrochemie.) BECHER.

Richard Lorenz und **W. Herz**, *Zur Kenntnis der Siedepunktverhältnisse geschmolzenen Salzen*. Vf. stellen fest, daß die Beziehung $T_{(p=15)} / T_s = 1,7$ ($T_{(p=15)}$ absol. gezählter Kp_{15} , $T_s = Kp_{760}$) bei Salzen sehr genau gilt. Dieses experimentelle Material zur Prüfung wird Arbeiten von v. WARTENBERG u. seinen Schülern (vgl. v. WARTENBERG u. BOSSE, Ztschr. f. Elektrochem. **28**. 384; C. 92. I. 495 u. frühere) entnommen. Bei Cu_2Cl_2 , Cu_2Br_2 , Cu_2J_2 , TlF weicht der Quotient wenn auch nicht erheblich, von obiger Formel ab, was zum Teil auf Vermeidung von Schwierigkeiten beruhen wird. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. **141**. 131—32. 1924. Frankfurt u. Breslau, Univv.) JOSELY.

E. Carrière und **Arnaud**, *Bestimmung der Siedepunkt- und Verdampfungskurve von Gemischen aus Chlorwasserstoff und Wasser bei 760 mm Druck*. werden tabellar. u. graph. die Zuss. der Fl. u. des Dampfes bei 1 at Druck zwischen 19 u. 110° angegeben. Das konstant (bei 110°) sd. Gemisch enthält 20,15% HCl . Das 26,6% HCl enthaltende Gemisch sd. bei 102° ; sein Dampf besteht aus 2,0% HCl . (C. r. d. l'Acad. des sciences **179**. 1265—67. 1924.) BIKERIN.

W. Busse, *Über Schallgeschwindigkeit und Verhältnis der spezifischen Wärmen von organischen Flüssigkeiten*. Vf. bestimmte mit im wesentlichen der gleichen Versuchsanordnung wie DOERSING (Ann. der Physik **25**. 227 [1908]) die Schallgeschwindigkeit u. adiabat. Elastizität folgender Verbb.: CH_4 , C_2H_6 , C_3H_8 , C_4H_{10} , CS_2 , $CHCl_3$, C_2H_5OH , C_6H_6 , C_6H_{14} , CH_3NO_2 , CH_3OH , $C_5H_{11}OH$, C_3H_8O , C_6H_5Cl , $C_6H_5NO_2$, $C_6H_5NH_2$, $C_6H_5C_2H_5$, $C_6H_5CH_3$, $o-C_6H_4(NO_2)CH_3$, $o-C_6H_4(NH_2)CH_3$, $m-C_6H_4(NH_2)CH_3$, $m-C_6H_4(OH)CH_3$. Den aus isotherm. u. adiabat. Kompressibilität K u. K' errechneten Verhältnissen der spezif. Wärmen sind die in der Tabelle zur Seite gestellt, welche sich aus der thermodynam. begründeten Formel $x = K \sigma c_p / (K \sigma c_p - T \beta^2)$ errechnen lassen, in welcher T die absol. Temp., β der kub. Ausdehnungskoeffizienten, K u. σ isotherm. Kompressibilität u. D., c_p die spezif. Wärme bei konstantem Druck bedeuten. Die so verschieden gewordenen x -Werte stehen in guter Übereinstimmung. Betrachtet man x als Funktion der Atomzahl in denjenigen Verbb., in denen diese ohne wesentliche Änderung der Atomzusammensetzung u. Atombindung variiert, so ergibt sich in Zusammenfassung, daß x innerhalb ein u. derselben Phase mit wachsender Atomzahl abnimmt; es nimmt wenn fett- oder arom. gebundener H substituiert wird u. zwar besonders wenn dies durch die Gruppen NO_2 , NH_2 u. OH geschieht. (Ann. der Physik **179**. 657—64. 1924. Freiburg i. Br., Physikal. Institut.) K. W. F.

John Bright Ferguson und **W. B. Hope**, *Die Bildungswärmen von Ionen in wässrigen Wasser-Lösungen bei $75^\circ C$* . (Vgl. Proc. Trans. Roy. Soc. Canada. [3] **17**. Ser. II. 160; C. 1924. II. 440.) Das Maximum der Bildungswärme, 5 cal pro g Li , bei

z eine Lsg. mit 61 Gewichts-% Phenol. (Proc. Trans. Roy. Soc. Canada [3] 18. S. 121. 1924.)

JOSEPHY.

John Bright Ferguson und W. S. Funnell, *Die Dampfdrucke von Lösungen von Phenol und Wasser bei 75°*. (Vgl. vorst. Ref.) Die Messungen wurden mit einem Differentialtensimeter ausgeführt, das aus 2 Glaskugeln, die durch ein mit Wasser gefülltes U-Rohr verbunden sind, besteht. Die Kugeln wurden in ein W.-Bad getaucht, u. das herausragende Rohr elektr. auf eine höhere Temp. als das Bad getaucht. Die Schwierigkeit, die Fll. von Luft zu befreien, wurde dadurch gelöst, daß sie über die krit. Temp. erhitzt wurden, vorher u. nachher wurde evakuiert. Der Dampfdruck von W. bei 75° wurde zu 289,1 mm genommen; bei den folgenden Temperaturen (Gewichts-%) an Phenol waren die Dampfdrucke in mm Hg 7,19% 0 mm; 23,33% 290,2 mm; 46,81% 290,1 mm; 56,76% 289,2 mm. (Proc. Trans. Roy. Soc. Canada [3] 18. S. 122—23. 1924.)

JOSEPHY.

I. Sirk, *Die Berechnung des Moleküldurchmessers aus Verdampfungswärme und Oberflächenspannung*. Vf. modifiziert die Ostwaldsche Formel zur Berechnung des Moleküldurchmessers aus der Verdampfungswärme u. der Oberflächenspannung mit Berücksichtigung der BORN u. Courentschen Formel bei der Quantentheorie der Berechnung der Eötvöskonstanten u. unter Zuhilfenahme der Debyeschen Formel zur Berechnung des stat. Anteils der Oberflächenspannung aus molekularen Größen. Es ergibt sich der Moleküldurchmesser $s \cdot 10^8 = \sqrt[3]{0,184 \frac{M^2 \lambda_i}{T_k D}}$. Die Werte werden für He, H₂, N₂, CO, Ar, O₂, CO₂, N₂O, CH₃Cl, Cl₂, i-Pentan, Aceton, Methylacetat, Äthylacetat, CHCl₃, Bzl. berechnet u. mit den sich aus der Ostwaldschen Formel u. aus der kinet. Gastheorie ergebenden Werten verglichen. Mit den letzteren stimmten die Berechnungen des Vfs. besser überein als mit der Ostwaldschen Formel. Doch ergab sich ein annähernd konstantes Verhältnis von 1,37 im Mittel, da die nach obiger Formel berechneten Werte zu groß waren. (Physikal. Ztschr. 25. 545—46. 1924. Wien.)

BECKER.

E. Verschaffelt, *Die Dampftension und die Verdampfungswärme bei niedrigen Temperaturen*. (Vgl. Journ. de Physique et le Radium [6] 4. 158; C. 1924. I. 1138.) Nach der bekannten Gleichung: $d \log p / d T = \lambda / R T^2$ werden für niedrige Temp. die Dampftension p u. die molekulare Verdampfungswärme λ miteinander verknüpft. Es wird die Frage auf, ob diese Gleichung, die bei relativ niedrigen Temp. anwendbar ist, um so exakter wird, je mehr man sich dem absol. Nullpunkt nähert. Die mathemat. Ausführungen sind im Original nachzulesen. Wird obige Gleichung angewandt, so stellt man eine Hypothese auf, die durch die Resultate der Messungen bestätigt zu werden scheint. (Archives néerland. sc. exact. et nat. II A] 8. 109—35. 1924.)

K. WOLF.

Faust, *Binäre Flüssigkeitsgemische*. Mit **Curt Littmann** sind Verdampfungswärmen von einigen binären Gemischen bei 20—21° nach der dynam. Methode aus den Dampfdrücken von Luft durch die Mischung bestimmt. Die molekulare Verdampfungswärme von Aceton wurde zu 8,10 cal. gefunden, von Chlf.: 8,08; von Ä.: 7,56; von CH₂Cl-CH₂Cl: 8,34; Bzl.: 8,17; CS₂: 6,60. Die Verdampfungswärmen der Gemische sind größer, als der Additivität entspräche, in Fällen Aceton + Chlf., Aceton + Ä., Chlf.; geringer im Falle CS₂ + Aceton, gleich im System Bzl. + Äthylencarbonat. Eine zu große Verdampfungswärme deutet auf eine Verb. zwischen den Komponenten hin, eine zu kleine auf die Abnahme der Assoziation durch Verdampfung. Im zweiten Bestandteil. Dampfdruckmessungen u. andere Angaben, die einen Zusammenhang über den molekularen Zustand des Gemisches zu ziehen gestatten, bestätigen die Folgerungen der gegenwärtigen Messungen. (Ztschr. f. physik. Ch. 32—89. 1924.)

BIKERMANN.

A. Eucken, E. Karwat und F. Fried, *Die Konstante in der thermodynamischen Dampfdruckgleichung bei mehratomigen Molekeln*. Auf Grund älterer Beobachtungen werden die chem. Konstanten von H_2 , O_2 , J_2 , CO , H_2O , CO_2 , unter Benutzung neuer Messungen des Wärmehaltes der Kondensate, diejenigen von N_2 , Cl_2 , HCl , HBr , HJ , NH_3 nach einem einheitlichen Verf. neu berechnet. Für Drücke von der Größenordnung 1 at. werden allgemein Korrektionsglieder eingebracht, die auf Abweichungen vom Verh. idealer Gase Rücksicht nehmen. Die systematische Kritik der Fehlerquellen sei auf das Studium der Originalarbeiten verwiesen. Die i -Werte stimmen mit den aus dem Trägheitsmoment usw. berechneten der Größenordnung nach überein. (Ztschr. f. Physik **29**. 1—35. 1924.) C₃

A. Eucken und F. Fried, *Über die Nullpunktsentropie kondensierter Gase*. Die Integrationskonstante i_k der Reaktionsisobare soll nach dem Nernst'schen Theorem gleich $\sum i$ (i chem. Konstante der Reaktionsteilnehmer) sein. Die Beziehung wird durch Auswertung des vorhandenen Beobachtungsmaterials über Gleichgewichte für eine Reihe von Rk. geprüft, für welche die i -Werte auf Grund der vorst. referierten Arbeit bekannt sind. Es zeigt sich, daß die Gleichung $i_k = \sum i$ in einer Reihe von Fällen nicht erfüllt ist. Die Abweichungen sind so groß, daß dieses Ergebnis nach Ansicht der Vff. über jeden Zweifel erhaben ist. Es ist auf das Vorhandensein einer endlichen Nullpunktsentropie mancher Komponenten zu schließen. Im Falle des Wasserstoffs läßt sich gute Übereinstimmung erreichen, wenn man die Nullpunktsentropie gleich $R \ln 2$ setzt. (Ztschr. f. Physik **29**. 1—35. 1924. Breslau, Techn. Hochschule.) C₄E

Rud. Suhrmann und Kurt v. Lüde, *Die spezifische Wärme des Broms bei tiefen Temperaturen und seine chemische Konstante*. Neue Messungen der Molwärme von Br bei tiefen Temp. (bis zu 20,5° absol.) werden mitgeteilt. Mittels der Messungen und unter Benutzung des sonst vorliegenden Beobachtungsmaterials wird auf sorgfältiger Abschätzung aller Fehlerquellen die chem. Konstante zu $+2,546$ cal. und die Verdampfungswärme beim absol. Nullpunkt zu 10980 cal. berechnet. (Ztschr. f. Physik **29**. 71—77. 1924. Breslau, Techn. Hochschule.) C₄E

A. Glaser, *Über eine neue Erscheinung am Diamagnetismus der Gase*. Die diamagnet. Suszeptibilität von H_2 , N_2 , CO_2 wird bei Drücken unterhalb 1 at. mit dem ponderomotor. Feldwirkung auf einen paramagnet. Glasstab gemessen, der an einem Torsionskopf mit Quarzfaden zwischen den Polen eines DUBOIS-Magneten aufgehängt ist. Die Messungen ergaben eine Abweichung von der linearen Annahme der Suszeptibilität mit fallendem Druck, derart, daß der linear extrahierte Wert bei einem für jedes Gas individuellen Druck um das Dreifache überschritten wird. Es wird versucht, die Erscheinung durch den Diamagnetismus der Moleküle zu deuten. (Ann. der Physik [4] **75**. 459—488. 1924. München, Univ.) C₄E

O. Maass und D. M. Morrison, *Die Wirkung von Molekularanziehungen auf den Gesamtdruck eines Gasgemisches*. Die Ergebnisse der Arbeit bilden einen Beitrag der bereits nach Journ. Franklin. Inst. **198**. 145 (C. 1924. II. 2381) referierten Arbeit. (Proc. Trans. Roy. Soc. Canada [3] **18**. Sekt. III. 49—55. 1924. Montreal [Can.], McGill Univ.) C₄E

A₃. Kolloidchemie. Capillarchemie.

G. Bakker, *Zur Thermodynamik der Capillarschicht*. Mathematisch. (Abh. Physik [4] **75**. 685—710. 1924.) K. VPLE

A. Boutaric und M. Vuillaume, *Beitrag zum Studium des kolloidalen Schwefels*. Zusammenfassende Darst. früherer Arbeiten über die Herst. des S_8 , das Absorptionsspektrum, Einfluß physikal.-chem. Faktoren auf die mittlere Größe der Teilchen u. über Dichten u. Viscositäten (vgl. BOUTARIC u. SIMONET, Bul. Acad. roy. Belgique, Classe des sciences **10**. 150; C. 1924. II. 286). Die Abhängig-

Die Flockung vom Absorptionskoeffizienten, von der Bewegung der Lsgg., von der Viskosität, von der Konz. der Elektrolytlsgg. u. des Kolloids, von der mittleren Größe der Teilchen u. schließlich der Einfluß verschiedener organ. Fll. auf die Flockung von Arsensulfidsols werden ausführlich besprochen u. die Messungen in Kurvenform u. Tabellen übersichtlich zusammengestellt. (Journ. de Chim. physique 1947—64. 1924. Dijon, Univ.) HORST.

A. Gutbier und **H. O. Meyer**, *Kolloidales Blei(IV)-oxyd aus Blei(IV)-acetat*. Die Herst. des kolloidalen Pb(IV)-oxyd aus Blei(IV)-acetat geschieht nach Vff. so, daß man in 250 ccm 0,3%ige Lsg. von Gummi arabicum 30 ccm 5-n. NH₃ fließen läßt u. unter schnellem Rühren bei gewöhnlicher Temp. nach u. nach 1,5 g trocknes Blei(IV)-acetat in einzelnen kleinen Anteilen einträgt. Das entstandene kolloidale System wird von geringen Mengen ausgeschiedener brauner Flocken abfiltriert u. einer möglichst schnell verlaufenden Dialyse unterworfen. — Die reinen Präparate sind tief gelblichbraun u. manchmal schwach trübe. Bei längerem Aufbewahren der Fll. scheiden sie nach u. nach weiße Ndd. von Pb(II)-oxydhydrat an den Gefäßwänden ab. — Die Analyse ergab sich der Gehalt von 100 ccm Fll. zu 180 mg wasserfreiem PbO₂. (Monatsh. f. anorg. u. allg. Ch. 141. 95—100. 1924. Jena, Univ.) GOTTFRIED.

R. Sucharipa, *Experimentelle Werte über Pektin-Zucker-Säuregele*. Die B. einer Pektin-Zucker-Säure-Gele ist abhängig von einem Gehalte der Lsg. an Zucker u. von den Verhältnissen dieser drei Stoffe zueinander, der Art des Pektins u. von anderen Umständen. Die Unters. des Vfs. bezweckt, die Wichtigkeit einiger dieser Faktoren zu zeigen; die wichtigsten Ergebnisse sind: Wärme beschleunigt die B. der Gele nicht. Die B. solcher Gele ist keine chem. Rk.; es ist die Koagulation von Pektin in dem fl. Zucker-Säuremittel. Pektin ist wl. in Zucker-Säurelsgg. geringer Konz. Die Mutterlauge scheidet sich selbst aus sehr zähen Gallerten aus, wobei in geringerem Grade als aus weichen. Der feste Teil enthält nach dem Auswaschen mit A. nur Pektin, der fl. enthält die ganze Säure, Zucker, Spuren Pektin u. wenig CH₃OH. Pektine verschiedener Herkunft u. Darst. enthalten auch verschiedene Mengen Methoxyl; bei 5 Proben rohen u. gereinigten Pektins schwankten die Werte von 8,90 bis 12,32%. Rohpektine unterscheiden sich von gereinigten Pektinen nicht nur durch ihren Aschegehalt (Abnahme bei Reinigung), sondern auch durch den höheren Gehalt an organ. Verunreinigungen, denn der Methoxylgehalt ist bei gereinigten Proben rohen Pektins etwa um $\frac{1}{3}$ geringer als in den gereinigten Pektinen. Die verschiedenen methoxylierten Pektine bilden Lsgg. verschiedener Viskosität. Es werden zwei Verff. zum Vergleiche der gelbildenden Eigenschaften verschiedener Pektine besprochen u. der dazu verwendete App. an Hand einer Abbildung beschrieben. Die Festigkeit der gebildeten Gele nimmt mit zunehmendem Methoxylgehalte zu. Langes u. hohes Erhitzen sowie Druck zerstören das Gelbildungsvermögen der Pektine. (Journ. Assoc. Official Agricult. Chemists 7. 57—68. 1923. Washington, D.C.) RÜHLE.

Percy Archibald Sporing, *Gleichgewicht einer Natriumchloridlösung beiderseits einer Pergamentmembran in Gegenwart von Natriumcaseinat*. Die Ergebnisse der Unters. stehen in Übereinstimmung mit der Theorie der Membrangleichgewichte. Das Ionengleichgewicht [Na][Cl] ist auf jener Seite der Membran größer, wo das Caseinsalz vorhanden ist. Die Annahme vollständiger Dissoziation von Na-Caseinat ist demnach unrichtig. Für den Fall, daß das Ionenprod. beiderseits gleich wird, lassen sich die hierzu erforderlichen Dissoziationswerte des Caseinsalzes schätzungsweise bestimmen. Sie werden mit den Ergebnissen der Unterss. von PAULY verglichen. (Journ. Chem. Soc. London 125. 2316—19. 1924. London, Univ.) HORST.

Glaude Fromageot und **René Wurmser**, *Adsorption einiger organischer Substanzen und ihrer Natriumsalze*. Je 125 ccm von 0,01-n. Lsgg. wurden mit 5 g eines reinen Kohle 5 Min. lang geschüttelt u. die Konz. des Filtrates chem. oder

spektroskop. (mittels ultravioletter Strahlen) bestimmt. Die Reihe der Säuren der abnehmender Adsorption: Citronen- > Bernstein-, Oxal- > Brenztrauben- Propion- > Ameisen- > Essigsäure. Na-Salze von Ameisen-, Essig-, Bernstein-, Citronensäure u. Mg-Citrat werden nicht merklich adsorbiert; Na-Propion- Na-Oxalat < Na-Pyrotartrat. Die Reihenfolge der Säuren stimmt also mit der Salze nicht überein, ebenso wenig mit der Reihenfolge der Affinitätskonstanten. Die Adsorption von Oxal- u. Citronensäure wurde nach Zusatz verschiedener Mengen gemessen; sie nimmt fortwährend mit der $[H^+]$ zu. (C. r. d. l'Acad. des sciences **179**. 972—74. 1924.)

BIKERN

R. Sissingh, *Optische Experimentaluntersuchung über Oberflächenschichten auf Glas und Bestimmung ihrer Dicke*. Die auf Glas gebildeten Übergangsschichten sind nichts anderes als Schichten aus kondensierter Luft, die sich aus einigen Atomschichten zusammensetzen. Allmählich bilden sich dickere Übergangsschichten, die einige Dutzend Atomschichten enthalten. Es ist sehr unwahrscheinlich, daß letztere aus Luft bestehen; man muß hier besonders den Einfluß des Wasserdampfes auf Glas in Betracht ziehen. (Archives néerland. sc. exact. et nat. [IIA] **142**—53. 1924.)

K. W.

B. Anorganische Chemie.

A. Vila, *Über die Reduktion der Schwefelsäure zu Schwefelwasserstoff*. Die in der Gleichung: $H_2SO_4 + 4H_2 = 4H_2O + H_2S$ angegebene Red. verläuft quantitativ, wenn die Dämpfe von sd. H_2SO_4 vermisch mit H_2 durch ein auf 750° erhitztes Rohr geleitet werden. Als Kontaksubstanz wird SiO_2 (rotglühend) benutzt. Wenn zu schnell erhitzt oder ist die H_2 -Zufuhr ungenügend, so ist die Red. unvollständig und es scheidet sich S ab. (C. r. d. l'Acad. des sciences **179**. 1163—65. 1924.)

E. H. Riesenfeld, *Über die Bildung und Zersetzung von Polythionaten*. (V. FOERSTER S. 209 u. JOSEPHY Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. **135**. 21; C. **1924**. 287.) Für die Hypothese des Vfs. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. **119**. 225; C. **1923**. I. 243), daß eine von der Oxydationsstufe des SO sich ableitende Verb. als Zwischenprod. bei der B. der Polythionate auftritt, sprechen manche Erscheinungen, obwohl alle Bemühungen, diese Verb. zu isolieren, bisher gescheitert sind. Daß aber von FOERSTER u. MOMMSEN (Ber. Dtsch. Chem. Ges. **57**. 258; C. **1924**. I. 113) angenommene Sulfoxylsäure dabei in merklicher Konz. nicht vorhanden ist, steht außer Zweifel. Vf. schließt sich der Ansicht von JOSEPHY (l. c.) an, daß bei der Zers. von Polythionaten Thiosulfat nicht in merklicher Konz. entsteht. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. **141**. 109—10. 1924. Berlin, Univ.)

JOSEFY

John Eggert, *Zur Kinetik des Natriumthiosulfats. Über die Landolt-Reaktion*. Nach Versuchen von **Erwin Heisenberg**. (III. vgl. Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. **139**. 310; C. **1924**. II. 2730.) Die katalyt. Wrkg. des $Na_2S_2O_3$ auf die Landolt-Reaktion wird untersucht, u. es ergibt sich, daß $Na_2S_2O_3$ wahrscheinlich ein Katalysator ist. Die Dushman-Rk.: $JO_3' + 5J' + 6H' = 3J_2 + 3H_2O$ ist. Die Reaktionsgeschwindigkeit wird durch $2,5 \cdot 10^{-9}$ Mol $Na_2S_2O_3$ um 7% herabgesetzt, wenn im Ganzen 10^{-4} Mol Substanz reagieren. Die Konz. des Katalysators im Rk.-Gemisch beträgt $2,5 \cdot 10^{-4}$ Mol, d. h. der mittlere Abstand der katalysierenden Teilchen beträgt $0,5 \mu$. Die Abhängigkeit der Reaktionsbeschleunigung von der Konz. des Katalysators läßt sich quantitativ berechnen. Aus der Rk. folgt, daß SO_3'' schneller mit JO_3' reagiert als S_2O_3'' . Diese Tatsache wird dadurch gedeutet, daß ein Dreierstadium der Rk.: $J_2 + SO_3'' + H_2O = SO_4'' + 2H' + 2J'$ wahrscheinlicher ist als ein Zweierstadium: $J_2 + 2S_2O_3'' = S_4O_6'' + 2J'$, da der Abstand zweier S_2O_3'' $0,5 \mu$ im Mittel beträgt. Die Empfindlichkeit der Rk. wird mit ähnlichen Fällen verglichen und ist z. B. 20mal größer als die bisher empfindlichste Schwefelrk. von FISCHER (Ber.

h. Chem. Ges. **16**. 2234. [1883]. (Ztschr. f. Elektrochem. **30**. 501—3. 1924. en, Univ.) JOSEPHY.

Albin Kurtenacker und **Friedrich Wengfeld**, *Über die Oxydation des Hydr- mins. II.* (I. vgl. Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. **131**. 27; C. 1924. I. 465 u. S. 477.) untersuchen die bei der Oxydation des NH_2OH mittels $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ u. HgCl_2 ent- enden Prodd. Durch $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ wird in schwach saurer Lsg. etwa die Hälfte NH_2OH zu HNO_3 oxydiert. Außerdem bildet sich ein Gas, das gegen die neu- Lsg. zu neben N_2O zunehmend größere Prozentsätze an NO enthält. In sehr saurer Lsg. sinkt der Anteil des NH_2OH , der zu HNO_3 oxydiert wird, bis zu zig u. einige Prozent; dementsprechend entsteht mehr Gas, das hier aus reinem besteht. In alkal. Lsg. wird noch weniger HNO_3 gebildet, das Gas enthält e als kein NO , dagegen größere Mengen N_2 . Eine vollständige Oxydation des NH_2OH durch $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ wird unter den eingehaltenen Bedingungen anscheinend nur schwach saurer Lsg. erreicht. — HgCl_2 wirkt auf NH_2OH in saurer u. neutraler nicht ein. Aber auch mit Laugezusatz ist der Rk.-Verlauf sehr unregelmäßig ter den eingehaltenen Bedingungen unvollständig. Die während der Rk. ent- elten Gase enthalten meist beträchtliche Mengen NO . Nur in ausgesprochen e Lsg. entsteht kein NO . Außer den gasförmigen Oxydationsprodd. entsteht e Nitrit, das qualitativ nachgewiesen wird. Bzgl. der B. des NO bei der Oxy- i des NH_2OH , nehmen Vff. an, daß intermediär die Angelische Nitrohydroxyl- säure $(\text{NO})\text{N}(\text{OH})_2$ entsteht, durch deren Zerfall das NO in Freiheit gesetzt wird. r. f. anorg. u. allg. Ch. **141**. 119—30. 1924. Brünn, Techn. Hochschule.) GOTTFR. t. **Friedel** und **G. Ribaud**, *Über eine Umwandlung des Diamanten.* (C. r. d. l. des sciences **178**. 1126—29. 1924. — C. 1924. II. 1324.) BEHRLE.

P. Lebeau und **M. Picon**, *Über die Umwandlung des Diamanten im Vakuum her Temperatur.* In einem weitgehend evakuierten Graphitrohr erhitzt, er- d der Diamant folgende Veränderungen: 1. 1 Stde. bei 1500° : farblose Diamanten n schwarz an den Krystallkanten; ein grauschwarzer brasilian. Carbonado r ganz schwarz; dennoch war das HNO_3 - KClO_3 -Gemisch wirkungslos. 2. 1 Stde. 1300 — 1850° : 18—40% gingen in Graphit über; die inneren Teile jedes Steins n im HNO_3 - KClO_3 -Gemisch unl., nahmen aber die schwarze Färbung an. 3. 1 Stde. bei 1925° : ähnliche Ergebnisse, die Graphitausbeute betrug 6—48%. 4. 1 Min. bei 2000° : die Umwandlung vollzieht sich auf 90%. 5. 1 Stde. bei 2000° : vollständige Umwandlung. — Die von FRIEDEL u. RIBAUD (vorst. Ref.) be- teteten Ausbauchungen u. Explosionen bleiben also im Vakuum aus. (C. r. d. l. des sciences **179**. 1059—61. 1924.)

BIKERMANN.

Hönigschmid und **M. Steinheil**, *Zur Kenntnis des Atomgewichtes des Siliciums. ase des Siliciumchlorids.* Vff. bestimmen das At.-Gew. des Si aus dem Ver- t: $\text{SiCl}_4 : 4\text{Ag}$ u. finden es zu **28,105**. Das SiCl_4 war durch fraktionierte Dest. u. im Vakuum gereinigt u. durch 0° -Tensionsbest. als vollkommen rein erkannt. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. **141**. 101—8. 1924. München, Akad. d. Wissensch.) GOTTFRIED. **Ernst Paneth**, *Über Kondensation und Wiederverdampfung von aktiviertem Wasserstoff.* Nach Verss. mit **Kurt Peters**. Vf. beschreibt zwei Verff. zur Darst. von aktiviertem H_2 . Beim Leiten eines gereinigten H_2 -Stromes über einen glühenden Nernststift bei 1—10 mm Druck entsteht H_3 , welcher durch seine Rk. bei Zimmer- temp. mit S zu H_2S nachweisbar ist. Dabei wird allerdings der Nernststift zum Nernststift stark reduziert, so daß er bald ausgewechselt werden muß. Es genügten aber 2 Min. Brenndauer, um auf diese Weise merkliche Mengen von H_3 nachzu- weisen. Eine zweite Methode zur Darst. des H_3 bestand darin, daß H_2 durch eine Kapillare von etwa 800° geleitet wurde, wenn der Druck 0,01—100 mm betrug. In diesem Fall ließ sich H_3 mittels der H_2S -Methode nachweisen. Diese Methode des aktivierten Wasserstoffs unterscheidet sich von dem bei elektr. Ent-

ladungen entstehenden atomaren H dadurch, daß sie im Gegensatz zu dem letzteren bei Atomsphärendruck beständig ist, Glaswolle ohne Umwandlung in H_2 passieren kann u. bei Kondensation u. Wiederverdampfung aktiv bleibt. Ebenso wie H_2 mag auch H_3 das gelbe WO_3 zum blauen WO_2 zu reduzieren. (Ztschr. f. Elektrochem. 30. 504—8. 1924. Berlin.)

Paul Pascal, Über den Begriff der Hexametaphosphate und die Darstellung derselben. (Vgl. S. 27.) Das aus dem bis zum F. erhitzten Na-Trimetaphosphat dargestellte Salz von Graham leitet besser als weniger sorgfältig angefertigtes Paraparat des Na-Hexametaphosphates: $\lambda_{1024} = 54,2$, $\lambda_{32} = 34,0$ (bei 25°). Nach der Ostwald-Waldenschen Regel muß also das Salz ein zweiwertiges Anion bilden. Das scheinbare Mol.-Gew. des Salzes in W. beträgt 242, woraus folgt, daß das Salzmol. weniger als 7 $NaPO_3$ enthält, sogar bei der Annahme der vollständigen Dissoziation. Die Anzahl der Na-Atome im Mol. muß ein Vielfaches von 3 sein, weil $\frac{1}{3}$ des Na durch Pb ersetzbar ist. Es ist also die Formel des Salzes $Na_2[(PO_3)_6Na_4]$. — Das Salz von GRAHAM bildet mit Pb-Salzen langsam eine Verbindung. Wird derselbe mit Sulfaten zers., so entsteht ein vom ursprünglichen abweichendes Phosphat: es gibt den Pb-Nd. augenblicklich, seine Lsgg. sind noch stärker isomorphisiert (für das K-Salz betragen: $\lambda_{1024} = 142$, $\lambda_{32} = 89,3$), das scheinbare Mol.-Gew. ist 81. Diese neuen Salze sollen wieder Hexametaphosphate sein, die aber nicht nur K', sondern auch PO_3' abdissoziieren können. Die Unbeständigkeit des $Na_2[(PO_3)_6Na_4]$ erklärt den leichten Übergang von Estern der Hexametaphosphate zu anderen Hexametaphosphaten. (C. r. d. l'Acad. des sciences 179. 966—68. 1924.) BIKERMAN.

O. Hönigschmid und A. Meuwesen, Revision des Atomgewichts des Yttriums. Analyse des Yttriumchlorids. I. Mitt. Vff. bestimmen neu das At.-Gew. des Yttriums den Verhältnissen $YCl_3 : 3AgCl$ u. $YCl_3 : 3Ag$ u. finden als den zur Zeit wahrscheinlichsten Wert $88,950 \pm 0,005$. Besondere Schwierigkeit macht die richtige Verwässerung des YCl_3 , die ausführlich beschrieben wird. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 140. 341—56. 1924. München, Akad. d. Wissensch.) GOTTFRED.

Josef Holluta und Alfred Martini, Die Autokatalyse bei der Reaktion von Natriumthiosulfat mit Ferrichlorid-Natriumthiosulfat. (Vgl. S. 458.) Vff. versuchen die Anfangsbeschleunigung der Rk. von $FeCl_3$ mit $Na_2S_2O_3$ zu erklären. Die Endprodd. Fe^{2+} u. $S_4O_6^{2-}$ autokatalysieren die Rk. nicht. Wie die Verss. ergaben verzögert $S_4O_6^{2-}$ die Rk. schwach, Fe^{2+} stärker. Der Einfluß der Fe^{2+} auf die Geschwindigkeit der Rk. wird durch eine Gleichung mathemat. formuliert. Auch der bei der Zers. des $Na_2S_2O_3$ auftretende S bedingt nicht die hohe Anfangsbeschleunigung, zumal da die Geschwindigkeit der Lsgg. auch nur gering ist. Auch Prüfung auf Störungen bei der Abstopfung der Rk. blieb für die Ursache der Erscheinung ohne Erfolg. Am wahrscheinlichsten läßt sich die hohe Anfangsbeschleunigung durch negative Katalyse bei der Rk. verschwindenden Komplexes $[Fe(S_2O_3)_2]'$ erklären, was auch durch die abnorm hohen Temp.-Koeffizienten $k_{t+10}/k_t = 4,13$ in schwach saurer Lösung bestätigt wird. Große Konz. an Phosphat wirkt nicht nur verzögernd auf die Ferrisalzred. durch $Na_2S_2O_3$, sondern ändert auch den Mechanismus der Rk. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 141. 23—37. 1924. Brünn, Dtsch. Techn. Hochsch.) JOSEF.

A. Classen und Georg Strauch, Atomgewichtsbestimmung von Wismut. Vff. gestalten die Methode der At.-Gew.-Best. des Bi (vgl. CLASSEN u. NEY Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 115. 329; C. 1921. III. 96), Rk. des Triphenyls des Bi mit ICl_3 u. Überführung des Oxalats durch Erhitzen im O_2 -Strom in reines Oxyd, auf. Es wird festgestellt, daß ihre Exaktheit den Anforderungen einer Best. des At.-Gew. entspricht. Rastbach. — metall. Bi wurde nach Umschmelzen in KCN in einem Verbrennungsrohr beim Erhitzen durch Überleiten eines mit Br_2 gesätt. CO_2 -Stroms in $BiBr_3$ umgewandelt. Die Temp. wurde allmählich auf 450° gesteigert, so daß das $BiBr_3$ in die Vorlage sublimierte. Unter Kühlung mit Eis-Kochsalz-Mischung wurde es dann in einer

che Lsg. von Mg-Äthylbromid eingetragen, u. nachdem die zuerst lebhafte Rk. gelassen hatte, wurde das Gemisch noch einige Stdn. am Rückflußkühler auf Wasserbad erhitzt u. dann auf gestoßenes Eis gegossen. Nach Auswaschen trocknen der äth. Lsg. wurde das *Bi-Triphenyl* nach Abdampfen des Ä. durch Wasserdampfdest. gereinigt, in A. umkrystallisiert u. dann im Hochvakuum. Auch der A. u. die Oxalsäure wurden vor der Verwendung gereinigt. Bei fest. konnte der Tiegel, in dem das Destillat aufgefangen wurde, im Wägen verschlossen werden, so daß jede Berührung mit der Außenluft vermieden wurde. Okklusion von Gasen innerhalb des Bi-Triphenyls konnte nicht eintreten, da einerseits im Vakuum gearbeitet wurde, andererseits das Destillat im Tiegel erstarrte, u. die M. nur eine kleine Oberfläche hatte, diese bot zwar der Zersetzung von $H_2C_2O_4$ große Schwierigkeiten, die dadurch überwunden wurden, daß Oxalsäure in kleine, zylinderförmige Stückchen zusammengepreßt auf das feste Bi-Triphenyl gelegt u. zur Vorsicht noch mit lockerer Oxalsäure überschichtet wurde. Bei 7–80° schmolz das Bi-Triphenyl, die Oxalsäurestückchen saugten es vollständig auf, so daß Rk. eintrat. A. wurde dabei nicht verwandt. Das Bzl. kondensierte nicht, wurde abgelassen. Nach Beendigung der Rk. wurde die überschüssige $H_2C_2O_4$ vertrieben, die sich im oberen Teil des Rohres festsetzte, so daß eine bessere Spülvorr. nötig war. Bei 220–230° trat langsamer Zerfall in Oxyd ein, bei 250° Temp. wurde 15–16 Stdn. konstant gehalten, zu hohe Temp. gibt Anlaß zur Zersetzung. Dann wurde bei 350–400° mit dem Einleiten von O_2 begonnen, bis schließlich mehrere Stdn. auf 750° erhitzt u. dann im Luftstrom erkalten gelassen. Das erhaltene Bi_2O_3 war frei von C, blaßgelb, fast weiß. Das Mittel der gefundenen Werte für das At.-Gew. des Bi ist **208,989**. Der Richardssche Einleitetapp. mit Verbrennungsrohr u. Trockensystem für zugeleitete Luft bzw. O_2 ist original gezeichnet u. die Handhabung des Ganzen genau beschrieben. Von Vorteil für die Genauigkeit der Arbeit ist, daß Einwäge, Verbrennung u. Auswäge im selben Gefäß ausgeführt wurden. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. **141**. 82–94. 1924 Aachen, Techn. Hochschule.)

JOSEPHY.

Hurt Lindner und Antonie Köhler, Über die Chloride des zweiwertigen Wolframs, Wolframs und Tantals. IV. Mitt. Die Derivate des 3-Wolfram-6-chlorids. Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. **137**. 66; C. **1924**. II. 1325.) Durch die beabsichtigte Einw. von Al-Staub (4 Mol.) auf reines WCl_6 (3 Mol.) in Ggw. von WCl_6 läßt sich W^{VI} bis zur zweiten Wertigkeitsstufe reduzieren (vgl. Ber. Dtsch. Chem. Ges. **55**. 1458; C. **1922**. III. 118). An Stelle von Al können GRIGNARDS wie Zn- oder Pb-Pulver mit geringerem Erfolge als Reduktionsmittel benutzt werden. Verss., Reduktionsverb. durch Erhitzen von WCl_6 im H_2 -, bzw. NH_3 -Strom zu erhalten, scheiterten. Auch die Schmelzflußelektrolyse führte zu keinem

als der stark salzsauren Lsg. des Al-Reduktionsprod. krystallisiert die Chlorosäure des W^{III} in gelben Nadeln. Durch Entwässerungen machen Vff. die Konstitutionsformel $H[W_3Cl_7 \cdot H_2O] \cdot 3H_2O$ wahrscheinlich. Als Entwässerungsprod. tritt infolge therm. Zerfalls das Konstitutionswasser enthaltende Chlorid $[W_3Cl_6 \cdot H_2O]$ in alkoh. Lsg. der Chlorosäure weisen Vff. mit Ag-Benzoeat die Dissoziation der Al-Atome nach. Konz. H_2SO_4 spaltet bei Wasserbadtemp. aus der Chlorosäure 3 Mol. HCl unter B. eines Sulfats ab. Die vorliegenden W^{III} -Verb. scheinen nach einem relativ beständigen Neutralteil $[W_3Cl_4]$ ähnlich wie die entsprechenden W^{IV} -Verb. zu enthalten. Die Chlorosäure wird durch viel W. u. wss. Lsgg. der Chlorosäure fast momentan hydrolysiert u. sehr schnell unter B. von H_2 oxydiert. Sehr rasch W. hydrolysiert unter Entstehung des Chloride $[W_3Cl_4 \cdot 2H_2O]Cl_2$. Durch Umlage verschiedener Chlorosäuren. $C_5H_5N \cdot H[W_3Cl_7 \cdot H_2O]$; durch Umlage der Chlorosäure (1 Mol.) in A. mit Pyridin (1 Mol.) in A.; perlmutterähnliche

Blättchen. — $(C_5H_5N)_3H_3[W_3Cl_9]$; durch Umsetzen einer alkoh.-salzsauren Lsg. d. Chlorosäure mit einer alkoh.-salzsauren Lsg. von $C_5H_5N \cdot HCl$; kleine gelbe kt. eder. Die Verb. verliert beim Erhitzen bis 140° 2 Mol. $C_5H_5N \cdot HCl$. — $C_5H_5N \cdot H[W_3Cl_7]$, ohne Konstitutionswasser; entsteht aus der vorigen Verb. durch therm. Zerfall. — $C_5H_5N \cdot H[W_3Cl_7] \cdot 3H_2O$; durch Umsetzen der wss.-salzsauren Lsg. d. Chlorosäure mit wss. $C_5H_5N \cdot HCl$ -Lsg. Die Verb. verliert bei 36° ihr Krystallwass. u. geht in die vorige über. — $C_2H_4(NH_2)_2H_2[W_3Cl_7]_2 \cdot 2H_2O$; durch Umsetzen wss.-salzsauren Chlorosäurelsg. mit Äthylendiaminlsg. — $C_5H_5N \cdot H[W_3Cl_7 \cdot C_5H_5N] \cdot 2C_4H_{10}O$; durch Füllen der Chlorosäurelsg. in Pyridin mit Ä. im Überschuß. Die Verb. enthält ein amminartiges Anion u. gibt leicht Ä. ab.

Chlorobromosäuren u. Salze. Im Gegensatz zu den entsprechenden Chlorosäuren tauschen die W^{VI} -Verbb. leicht ein Teil ihrer Cl-Atome gegen Br. a. $H[W_3Br_4Cl_3 \cdot H_2O] \cdot 9H_2O$; krystallisiert aus der Lsg. der Chlorosäure in sd. oder HBr-Lsg.; gelbe Blättchen. Die Verb. zeigt das gleiche Verh. wie die Chlorosäure. — $(C_5H_5N)_3H_3[W_3Br_6Cl_3]$; durch Umsetzen der alkoh.-bromwasserstoffsauren Lsg. der Chlorosäure mit der Lsg. von $C_5H_5N \cdot HBr$ in Ä. Die Verb. verliert beim Erhitzen bis 140° 2 Mol. $C_5H_5N \cdot HBr$. — $C_5H_5N \cdot H[W_3Br_4Cl_3]$; durch therm. Zerfall der vorigen. — *Molekulargewichtsbest. der Verb. $C_5H_5N \cdot H[W_3Cl_7]$ nach der röntgenoskop. Methode in Nitrobenzol ergeben eindeutig Trimolekularität des W^{VI} d. vorliegenden Reihe.* (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. **140**. 357—67. 1924. Berlin u. Oranienburg.)

K. LINDNER.

C. Mineralogische und geologische Chemie.

A. Lacroix, *Archibald Geikie*. Nachruf auf den am 28. XII. 1835 zu Edinburgh geborenen, am 9. XI. 1924 zu Haslemere verstorbenen ehemaligen Direktor des engl. Museums für prakt. Geologie. (C. r. d. l'Acad. des sciences **179** 10 bis 1004. 1924.)

HABERLAND.

Ugo Panichi, *Betrachtungen über das spezifische Gewicht von Mineralien und krystallisierten chemischen Mischungen*. Mathematisch. (Atti R. Accad. dei lincei Roma [5] **33**. II. 182—88. 1924.)

GOTTFRED.

H. Ungemach, *Über den Antlerit*. Die aus der Lagerstätte von Chugucana (Chile) von verschiedenen Vff. als Brachantit beschriebenen Mineralien sind in Wirklichkeit Antlerit. Sie kommen eingewachsen in Quarz u. Sereziit vor. Die Verh. sind smaragd- bis tiefdunkelgrün, ähnlich dem Atakamit u. haben das Atomverhältnis $a:b:c = 0,5038:1:0,6868$. (Bull. Soc. franç. Minéral. **47**. 12—13. 1924.)

ENSZINGER.

J. Mélon, *Beitrag zum Studium der optischen Eigenschaften des Chalkanthit*. (Bull. Soc. franç. Minéral. **47**. 141—46. 1924.)

ENSZINGER.

L. J. Spencer, *Ein Einschuß von Magnetit in Diamant*. (Mineral. Magazine **20**. 245—47. 1924.)

ENSZINGER.

M. S. Krishnan, *Bemerkung über den Kordierit aus einem Kordieritgneis bei Madura, Madras, Indien*. Die Krystalle sind im Handstück dunkel olivgrün ohne krystallograph. Begrenzung. D. 2,598. Analyse vgl. Original. (Mineral. Magazine **20**. 248—51. 1924.)

ENSZINGER.

A. N. Winchell, *Die Zusammensetzung des Melilit*. Melilit baut sich hauptsächlich aus Gehlenit $Ca_2O \cdot Al_2O_3 \cdot SiO_2$ u. Äkermanit $CaO \cdot MgO \cdot 2SiO_2$ auf, in denen MgO durch FeO, Al_2O_3 durch Fe_2O_3 , MgO durch CaO ersetzt sein können, wobei dem kann K_2O u. Na_2O in das Molekül eintreten. Überschuß an SiO_2 und an die D., nicht aber auf die Lichtbrechung einen Einfluß auf. (Amer. Journ. Science **SILLIMAN** [5] **8**. 375—84. 1924. Wisconsin Univ.)

ENSZINGER.

P. Tschirwinski, *Über den Melnikovit*. Melnikovit hat die Zus. $Fe^{2+}O \cdot$

- 2—4,3, die Härte 2—3 u. ist magnetisch. Er ist schwarz u. stellt wahrscheinlich die amorphe Form des FeS_2 dar. Beschreibung der Darst. u. natürlichen B. (Soc. franç. Minéral **47**. 129—33. 1924.) ENSZLIN.
- J. Heiland**, *Die bisherigen Ergebnisse magnetischer Messungen über nord-südlichen Salzhorsten*. Die Salzlager verraten sich durch eine stark negative Anomalie der Vertikalintensität des erdmagnet. Feldes. Die Methode ist indirekt, da die Anomalie auf den Gipshut zurückzuführen ist. (Ztschr. Dtsch. Geol. Ges. Abt. B. **76**. 101—11. 1924.) ENSZLIN.
- A. van Werveke**, *Über eine Fehlbohrung auf Kalisalze bei Allschwil in der Nähe von Basel und über die Herkunft des Tertiärmeeres und der Kalisalze im Bodensee*. (Kali **18**. 345—48. 1924.) ENSZLIN.
- Robert H. Sayre**, *Arsenerzlagertstätten in den Vereinigten Staaten*. (Engin. Journ. Press **118**. 929—32. 1924.) ENSZLIN.
- L. Dumas**, *Über die Beryllagerstätte von Ambatofisaorana (Madagaskar)*. Der Beryll kommt als ein Hauptbestandteil eines Granitpegmatits neben Quarz Mikroklin vor. (Bull. Soc. franç. Minéral. **47**. 172—73. 1924.) ENSZLIN.
- Barthouz**, *Die Pyrite von Maïdan-Peck (Serbien)*. Die Lagerstätte ist durch tekton. Differentiation entstanden. (C. r. d. l'Acad. des sciences **179**. 982—84. 1924.) ENSZLIN.
- Lacroix**, *Bemerkungen über die Dissogenite, verglichen mit dem Evergreenit von Colorado*. Dissogenite sind Gesteine, die in der Hauptsache aus grünem Quarz, dann Alkalifeldspäten wenig oder keinem Quarz, Wollastonit, Skapolit u. Sphäerulit bestehen. Sie treten nur in Kontaktzonen der Magmen auf. Zu ihnen gehören auch der Evergreenit. (C. r. d. l'Acad. des sciences **179**. 945—50. 1924.) ENSZ.
- H. Erdmannsdoerffer**, *Über Gesteine des Bodeganges im Harz*. (Ztschr. Dtsch. Geol. Ges. Abt. B. **76**. 114—26. 1924.) ENSZLIN.
- Marcel Solignac**, *Die Eruptivgesteine des Archipels von Galit*. Es werden in der Gegend amphibolhaltige Monzonitgranite u. ein Alkalimikrogranit mit groben Pegmatiten beschrieben. (C. r. d. l'Acad. des sciences **179**. 906—9. 1924.) ENSZLIN.
- David Rotman-Roman**, *Über einige Eruptivgesteine von Yémen*. (Vgl. C. r. d. l'Acad. des sciences **179**. 469; C. **1924**. II. 2238.) Die beschriebenen u. analysierten Gesteine sind Comendite u. verschiedene Trachyte. (C. r. d. l'Acad. des sciences **179**. 772—75. 1924.) ENSZLIN.
- Louis Barrabé und Pierre Viennot**, *Über die Entdeckung einer petroleumführenden Schicht bei Gabian (Hérault)*. Die nach Durchbohrung des oberen Trias in 20 m Tiefe erreichte Schicht lieferte im September 1924 pro Stde. 40 l Petroleum, in 106,75 m entströmen der Quelle im Durchschnitt 500—600 l pro Stde.; das Öl ist dunkelbraun u. fluoresziert grün; D.¹⁵ 0,8464, es enthält 10,35% Kohlenstoff u. nur Spuren von Asphalt; zwischen 225—300° gehen 26,05%, oberhalb 300° 73,95% über. (C. r. d. l'Acad. des sciences **179**. 1179—81. 1924.) HABERLAND.
- Lebeau**, *Über die Anwesenheit von Äthan in einem schlagenden Wetter aus der Grube von Gagnières*. Die analyt. Unters. der Probe (fraktioniertes Ausfrieren mit Wasser) ergab folgende Zus. des Gases: 56,70% Luft, 8,75% N, 32,50% CH_4 , 0,02% C_2H_6 , 0,02% Äthylen-KW-stoffe u. 1,09% CO_2 . (C. r. d. l'Acad. des sciences **179**. 770—71. 1924.) HABERLAND.
- Henrijean und W. Kopaczewski**, *Die Kolloide und die Mineralwässer von Bismut*. Gemmen auf Grund von Leitfähigkeitsmessungen, Unterss. über Capillarizitätsmessungen, der Ausflockung auf Zusatz einer konz. wss. Lsg. von J_2 , Messungen des osmot. Drucks zu der Ansicht, daß in den eisenhaltigen Mineralwässern ein kolloidales, u. zwar ein elektropositives Hydrosol des Fe vorhanden sein muß. (C. r. d. l'Acad. des sciences **179**. 909—12. 1924.) ENSZLIN.

d'Arsonval und **Bordas**, *Die Kolloide und die Mineralwässer*. Vff. knüpfen an die Abhandlung von **HENRIJEAN** u. **KOPACZEWSKI** (vorst. Ref.) einige Bemerkungen über die eventuelle Vermeidung von Ndd. nach Abfüllen von Mineralwässern. (C. r. d. l'Acad. des sciences **179**. 912—13. 1924.) ENSZL.

B. Bleyer, *Das Mineralwasser des Bades Adelholzen in Oberbayern*. Die *Primusquelle* in Adelholzen (Bayern) besitzt einen auffallend hohen Gehalt an Rb. In 1 kg des W. sind 0,001907 g Rb-Ion enthalten. Keine in- u. ausländ. Quellen mit Ausnahme einer Mineralquelle im Kaukasus besitzt einen derartig hohen Gehalt an Rb. Die Messung der Rb-Strahlung war mit den üblichen Methoden nicht durchführbar. (Münch. med. Wchscr. **71**. 1756—57. 1924. Weihenstephan, Lad. Hochschule; München, Labor. MERCK, BOEHRINGEN u. KNOLL.) FRANK.

Hercules Corti, *Beitrag zur Untersuchung der thermomineralischen Wässer von Puente del Inca*. Die Quellen entspringen auf dem rechten Ufer des Rio de las Cuevas, 2720 m ü. M. an der transandischen Bahn; Temp. 35—36°, Charakter der Quellen gleich; gelblicher Absatz von Travertin u. Limonit; einige Quellen entwickeln beim Stehen sekundär H_2S . Ein Teil des W. ist Oberflächenwasser, der Rest ist die Temp. im Winter am höchsten. Der CO_2 -Gehalt spricht für vulkan. Ursprung aus geringer Tiefe. Die Radioaktivität wechselt (4—11 Machееinheiten in 10 Litern) während die entwickelten Gase stärker sind (2,6—4,3 Machееinheiten pro Liter). Es handelt sich um Radiumemanation. Die Zus. des W. der Quellen wird teilweise wiedergegeben: Hauptmenge NaCl, weniger $CaSO_4$, CO_2 u. H_2SO_4 etwa gleich, SiO_2 , $Al_2O_3 + Fe_2O_3$, etwas MgO. (Anales Asociación Química Argentina **1**. 101. 1924. Sep.) W. A. ROSE.

F. W. Aston, *Die Seltenheit der Edelgase auf der Erde*. (Vgl. Nature **114**. 856; C. **1924**. II. 577.) Vf. stellt drei Hypothesen zur Erklärung des geringen Vorkommens der Edelgase auf der Erde auf: 1. Die Methode zur Berechnung der Häufigkeit ist falsch, da z. B. das Erdinnere nicht berücksichtigt ist. 2. Die Seltenheit ist durch Kerneigenschaften, z. B. durch Unbeständigkeit, begründet. Am wahrscheinlichsten ist 3. daß die Erde nur ein Millionstel der Edelgase an Gesamtmenge enthält, was durch die Entstehungsgeschichte der Erde bedingt sein kann. (Nature **114**. 786. 1924. Cambridge.) BECKER-ROSE.

M. Risco, *Spektralanalyse des Meteoriten vom 19. Juni 1924*. Es wurde in der Nacht am 19/6. 1924 zu Olivenza, Provinz Badajoz (Spanien) gefallenen Meteorite untersucht. Gesamtgewicht von ca. 100 kg Mg, Al, Si, K, Ca, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, u. Ba festgestellt. (C. r. d. l'Acad. des sciences **179**. 771—72. 1924.) ENSZL.

David Hooper, *Eßbare Erde von Travancore*. Vf. gibt die Analyse einer tonartigen Erde von Travancore, welche von den Eingeborenen gegessen wird. Sie besteht aus: Kieselsäurehydrat, hellgelber Ton, fein verteilter Feldspat, Mergel, gelber Ton, brauner Ton, grauer kalkhaltiger Ton, roter glimmerhaltiger Lehm, altes Schiefer, Laterit, Halloysit, schwärzlich grauer Ton, braune u. Infusorienerde. (Nature **114**. 789. 1924. Bristol, Univ.) BECKER-ROSE.

D. Organische Chemie.

J. J. Sudborough, *Die systematische Nomenklatur polycyclischer Kohlenwasserstoffe*. Das vom Vf. vorgeschlagene Nomenklatorsystem, daß sich auf alle polycycl. Verb. anwenden läßt, beruht auf folgenden Regeln: Der Hauptring, d. h. der Verb. den charakterist. Namen gibt, wird immer so groß wie möglich gewählt, d. h. die Brücke wird immer so kurz wie möglich gewählt u. die längere Kette den Hauptring eingeschlossen. Alle Bindungen zwischen C-Atomen des Hauptrings mit Ausnahme der direkten Bindungen je zweier benachbarter C-Atome, werden als Brücken genannt, deren Zahl durch eine fette arab. Ziffer u. ein großes a

gt wird. Bei direkten Bindungen werden die Nummern der verbundenen Atome hinter dem B zugesetzt; bei Doppelbindungen, die als einfache Brücken betrachtet werden, wird die niedrigere Nummer wiederholt. Brücken, die von Methen-, substituierten Methen- oder Polymethengruppe gebildet werden, werden als bivalente Substituenten betrachtet; der Name des Substituenten wird unmittelbar hinter dem B angehängt, dann folgen die Nummern der C-Atome, die die Brücke bilden. Methin $>CH-$ als Brückensubstituent dreiwertig, $>C<$ vierwertig. Die Bezifferung der C-Atome erfolgt im Sinne des Uhrzeigers, das Ausgangsatom ist immer ein ternäres, wenn möglich ein quaternäres Atom, d. h. ein C-Atom, von dem eine oder zwei Brücken abgehen. Die Nummern der Brücken werden fortlaufend im Anschluß an die des Grundringes verteilt. Bei Ggw. mehrerer Brücken zählen zuerst die C-Atome der Brücke, die das C-Atom 1 ausgeht. Naphthalin ist nach diesem System also: 1 B-1 : 1 : 6-bicyclo- $\Delta^{2:4:7:9}$ -tetraen, Acenaphthen: 1 B-carbo-1 : 4 : 12 : 8 : 8-cycloundeca- $\Delta^{9:11}$ -tetraen. Das System ist auch auf Spirane anwendbar. (Journ. of the Indian Inst. of Science 7. 145—65. 1924.)

ZANDER.

J. Sudborough, *Die systematische Nomenklatur von heterocyclischen Verbindungen polycyclischer Struktur*. Bei monocycl. Heterocyclen wird der charakteristische Name aus der Zahl der Atome, die den Ring bilden (einschließlich der Nichtkohlenstoffatome), hergeleitet, dem das Präfix *heterocyclo* zugesetzt wird. Zwischen dem Präfix u. dem charakterist. Namen stehen die Glieder des Ringes, die nicht Kohlenstoffatome sind (mit Ortsbezeichnung). Vf. schlägt vor für: $>O$ Oxa, für $>S$ Thia, für $>NH$ Imin u. für $>AsH$ Arsin. Doppelbindungen, gleichgültig ob zwischen Kohlenstoff u. C u. N oder C u. O (Oxoniumverbb.), werden durch Δ wie bei den isocycl. Verbb. angegeben. Die Bezifferung beginnt bei den Nichtkohlenstoffatomen, deren Reihenfolge der Priorität ist O, S, N, As. Morpholin ist demnach: *Heterocyclo-oxaiminhexan*, Pyrimidin ist: *Heterocyclo-1 : 3-diiminhexa- $\Delta^{1:3:5}$ -trien*. — Bei polycycl. Heterocyclen, die O, S oder N in der Brücke enthalten, ist die Nomenklatur genau analog der der isocycl. Verbb. (vgl. vorst. Ref.). Tropin ist demnach: *ethylimin-1 : 8 : 4-cycloheptan-6-ol*. Bei Verbb., die die Nichtkohlenstoffatome im Ring enthalten, wird letzterer so groß wie möglich gewählt; sind zwei Ringe möglich, einer isocycl. u. der andere heterocycl., so wird der erstere gewählt; es darf jedoch kein kleinerer Grundring gewählt werden, um O oder N in die Brücke zu bringen. Chinolin ist demnach: 1 B-1 : 1 : 6-heterocyclo-2-imindecacyclo-2-oxadeca- $\Delta^{4:6:8:10}$ -tetraen-3-on, Isatin ist: 1 B-1 : 5-heterocyclo-2-iminnona- $\Delta^{5:7:9}$ -trien-3 : 4-dion. (Journ. of the Indian Inst. of Science 7. 181—95. 1924.)


ZANDER.

J. Sudborough und **P. Ramaswami Ayyar**, *Räumliche Anordnung (cage) von polycyclischen Kohlenstoffverbindungen*. Vf. geben die Darst. der räumlichen Modelle einer Reihe von polycycl. Verbb. (Journ. of the Indian Inst. of Science 7. 166—81. 1924.)

ZANDER.

C. Lind und **D. C. Bardwell**, *Direkte Synthese höherer Kohlenwasserstoffe aus Radon*. Aus C_2H_6 entstanden in Berührung mit Ra Em (Radon) eine Fl. u. H_2 . Die Fl., rötlichbraun (wahrscheinlich durch kolloidalen C) gefärbt, hat ungefähr die Dampfspannung des Octans. Es wird der Reaktionsmechanismus unter der Annahme, daß zunächst durch die α -Partikel Elektronen aus C_2H_6 entfernt werden, diskutiert. — Nach einer Privatmitteilung von **Boltwood** hat dieser mit **Rutherford** festgestellt, daß ein Paraffinstopfen, der eine Quantität Radon abschloß, unschmelzbar war, während gleichzeitig Entw. von H_2 eingetreten war. (Science 60. 1924.)

SPIEGEL.




einfache Colaminorthophosphorsäureester. Letzterer ist infolge seiner Unlöslichkeit in Bzl. vom Cephalin zu trennen. Durch Umkrystallisieren aus A., Bzl. u. Aceton mit Aceton entsteht analysenreines Cephalin. — Cephalin löst sich nach zunehmender Quellung klar in W. Die alkoh. Lsg. ist gegen Lackmoid neutral, Phenolphthalein verhält es sich als einbas. Säure. Alkoh. HCl-Lsg. bewirkt Färbung zu Diglycerid-ortho-phosphorsäureäthylester. (Chem. Umschau a. d. Geb. Pharm., Öle, Wachse, Harze 31. 228—29. 1924.)

K. LINDNER.

R. Nakai, Gemischte Dismutation der Aldehyde. II. (I. vgl. NORD, Biochem. Ztschr. 1925; C. 1920. III. 508.) Die gemischte Cannizzarische Rk. wurde weiter untersucht bei Acetaldehyd + Furfurol, Furfurol + Isobutyraldehyd, Acetaldehyd + Chloral u. Acetaldehyd + Bromal. Durch besondere Verss. konnte die Annahme bestätigt werden, daß dabei der B. von gemischten Estern eine isochrone Umlagerung von Dialkyläthern vorangeht. Von bisher unbekannten Estern konnten in diesen Verss. isoliert werden Isobuttersäurefurylester, Brenzschleimsäureisoamyl-ester, Essigsäuretribromäthylester u. Tribromessigsäuretribromäthylester, die dann auch auf anderem Wege hergestellt wurden. Aus den Reaktionsprodd. der Systeme Acetaldehyd + Chloral bzw. Bromal konnten ferner Trichloräthylalkohol bzw. Tribromäthylalkohol mit Ausbeuten von 87 u. 90% der Theorie gewonnen werden.

Brenzschleimsäureisoamylester, $\text{C}_{10}\text{H}_{14}\text{O}_3$, Fl. von birnenartigem Geruch, K_p_{11} 111—115, D_4^{20} 1,0367. — Isobuttersäurefurylester, $\text{C}_9\text{H}_{12}\text{O}_3$, K_p_{15} 85—86°, D_4^{20} 1,03. — Essigsäuretribromäthylester, $\text{C}_4\text{H}_5\text{O}_2\text{Br}_3$, äth. riechende Fl., K_p_{14} 105—105,5°, D_4^{20} 1,09—109,3°, $K_p_{765,5}$ 225—227° [Zers.], D_4^{20} 2,2577. — Tribromessigsäuretribromäthylester, $\text{C}_4\text{H}_2\text{O}_2\text{Br}_6$, Krystalle (aus CH_4O oder PAe.), F. 69°, $K_p_{15,5}$ 206—207°. (Biochem. Ztschr. 152. 258—75. 1924. Berlin, Tierärztl. Hochsch.) SPIEGEL.

V. Grignard und **M. Dubien**, Einwirkung von Organomagnesiumverbindungen auf Butyridenaceton und sein Ketol. Kurzes Ref. nach C. r. d. l'Acad. des sciences 1924. I. 37. Nachzutragen ist folgendes: die Einw. von Organomagnesiumverbindungen auf Butyridenaceton verläuft nicht wie KOHLER (Journ. Americ. Chem. Soc. 1911 [1907]) für einige β -Äthylenketone angegeben hat, nach dem Schema:



sondern bei der Hydrolyse ein gesätt. Keton entstehen müßte, sondern es entstehen β -Äthylenalkohole, die leicht dehydratisiert werden zu Diäthylen-KW-stoffen. Die Einw. von Organo-Mg-Verbb. auf das Ketol des Butyridenacetons (4,2-Heptanon) führt zu den entsprechenden Glykolen, die bei der Dest. durch W.-Abspaltung in β -Äthylenalkohole übergehen.

Versuche. 4,2-Heptanon, $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_2\text{CHOHCH}_2\text{COCH}_3$, 200 g Aceton + 100 ccm 12—15%ig. NaOH werden im Laufe von 6 Stdn. bei 15—20° unter Rühren mit 100 g n-Butylaldehyd versetzt; nach vollständiger Verseifung wird noch 1 Stde. gerührt; schwach riechende Fl., K_p_{12} 92—94°, D_4^{13} 0,9466, n_D^{20} 1,4368. — 3,2-Heptenenon (Butyridenaceton), aus vorigem durch Dest. in 10%iger Spur J_2 ; angenehm riechende Fl., K_p 156—157°, K_p_{19} 61—62°, frisch farblos, bei längerem Stehen (auch im Dunkeln) gelblich werdend, D_4^{10} 0,8667, n_D^{20} 1,4448; um die Verb. zur Umsetzung mit Mg-Verbb. vollständig wasserfrei zu erhalten, wird sie mit $\frac{1}{3}$ wasserfreiem Bzl. gemischt u. langsam dest.; Semi-karbinol, F. 118°. — 2-Äthyl-3-hexanol-1 (Dibutanol) (vgl. l. c.), K_p_6 85—87°, n_D^{20} 0,9466, n_D^{13} 1,4368. — a) 2-Methyl-3-heptenol-2 (Dimethyl- α -pentencarbinol), $\text{C}(\text{OH})(\text{CH}_3):\text{CH}:\text{CH}_2\cdot\text{CH}_2\cdot\text{CH}_3$, aus Butyridenaceton + CH_3MgJ , angenehm riechende Fl., K_p_{14} 62—63°, $D_4^{10,5}$ 0,8397, $n_D^{10,5}$ 1,4416. — b) 3-Methyl-4-octenol-3

See
errata
P 3063

(*Methyläthyl- α -pentencarbinol*), $\text{CH}_3 \cdot \text{CH}_2 \cdot \text{C}(\text{OH})(\text{CH}_3) - \text{CH} : \text{CH} \cdot \text{CH}_2 \cdot \text{CH}_2 \cdot \text{CH}_3$, $\text{C}_2\text{H}_5\text{MgBr}$, Kp._{15} 74—75°, $D._{12}^{12}$ 0,8614, $n_D^{12} = 1,4390$. — e) *4-Methyl-5-nonenol*, (*Methylpropyl- α -pentencarbinol*), $(\text{C}_3\text{H}_7)(\text{CH}_3)\text{C}(\text{OH}) \cdot \text{CH} : \text{CH} \cdot \text{CH}_2 \cdot \text{CH}_2 \cdot \text{CH}_3$, $\text{C}_3\text{H}_7\text{MgBr}$, Kp._{15} 87—88°, $D._{10,5}^{10,5}$ 0,8422, $n_D^{10,5} = 1,4424$. — d) *5-Methyl-6-decenol*, (*Methylbutyl- α -pentencarbinol*), aus $\text{C}_4\text{H}_9\text{MgBr}$, Kp._{14} 94—95°, $D._{12,5}^{12,5}$ 0,8401, $n_D^{12,5} = 1,4481$. — e) *2,4-Dimethyl-5-nonenol-4* (*Methyl-i-butyl- α -pentencarbinol*), Kp._{15} 91—92°, $D._{10}^{10}$ 0,8364, $n_D^{10} = 1,4412$. — f) *7,5-Dimethyl-6-decenol-5* (*Methyl-i-amyl- α -pentencarbinol*), Kp._{15} 82—83°. — g) *1-Phenyl-1-methyl-2-hexenol-1* (*Phenylmethyl- α -pentencarbinol*), $(\text{C}_6\text{H}_5)(\text{CH}_3)\text{C}(\text{OH})\text{CH} : \text{CH} \cdot (\text{CH}_2)_2 \cdot \text{CH}_3$, aus $\text{C}_6\text{H}_5\text{MgBr}$, Kp._8 115—116°, $D._{10}^{10}$ 0,9614, $n_D^{10} = 1,5345$; die Ausbeute ist gering, da bei der Dest. Diphenyl auch höher kondensierte Nebenprodd. entstehen, u. da bei der Dest. im Vakuum (12—15 mm) eine Spaltung eintritt in *Acetophenon* u. α -Penten; nach 2-facher Dest. bei gewöhnlichem Druck findet nur Dehydratation u. nicht Spaltung statt. Die Dehydratation der genannten Alkohole wird am besten ausgeführt durch 2-fache Dest., durch Erhitzen mit Acetanhydrid oder Metaphosphorsäure. Nach 2-facher Dest. Spuren konz. H_2SO_4 wirken ebenfalls dehydratisierend, im ersteren Falle wird jedoch oft jodierte KW-stoffe erhalten, in letzterem findet, besonders bei den höhermolekularen Alkoholen, oft Ketonspaltung statt. Die erhaltenen Äthylalkohole spalten von HBr ein. — *2-Methyl-1,3-heptadien*, $\text{CH}_2 : \text{C}(\text{CH}_3) \cdot \text{CH} : \text{CH} \cdot (\text{CH}_2)_2 \cdot \text{CH}_3$, aus a) durch Erhitzen mit Acetanhydrid oder durch Dest. in Ggw. von H_2SO_4 , Kp._{745} 129—131°, hierbei leicht verharzend; $D._{13}^{13}$ 0,7673, $n_D^{13} = 1,4603$. — *3-Methyl-2,4-octadien*, $\text{CH}_3 \cdot \text{CH} : \text{C}(\text{CH}_3) \cdot \text{CH} : \text{CH} \cdot (\text{CH}_2)_2 \cdot \text{CH}_3$, aus b) analog vorgehend dargestellt, Kp._{750} 155—157°, $D._{13}^{13}$ 0,7817, $n_D^{13} = 1,4626$; nebenbei entsteht auch *2-Methyl-2,4-octadien* aus den Ozonidsplattprodd. hervorgeht, eine geringe Menge *3-Methen-4-octadien*, $\text{CH}_3 \cdot \text{CH}_2 : \text{C}(\text{CH}_2) \cdot \text{CH} : \text{CH} \cdot (\text{CH}_2)_2 \cdot \text{CH}_3$. — *4-Methyl-3,5-nonadien*, $\text{CH}_3 \cdot \text{CH}_2 : \text{C}(\text{CH}_3) \cdot \text{CH} : \text{CH} \cdot (\text{CH}_2)_3 \cdot \text{CH}_3$, aus c); angenehm riechende Fl., Kp._{745} 170—171°, $D._{13}^{13}$ 0,7873, $n_D^{13} = 1,4595$, nebenbei entsteht wahrscheinlich eine geringe Menge *4-Methen-5-nonen*. — *5-Methyl-4,6-dekadien*, $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_2\text{CH} : \text{C}(\text{CH}_3) \cdot \text{CH} : \text{CH}_2 \cdot \text{CH}_2 \cdot \text{CH}_3$, aus d) durch 8-stünd. Erhitzen mit HPO_3 auf 140—150°, Kp._{742} 187—188°, $D._{14}^{14}$ 0,8817, $n_D^{14} = 1,4603$. — *2,4-Dimethyl-3,5-nonadien*, $(\text{CH}_3)_2\text{CH} - \text{CH}_2 : \text{C}(\text{CH}_3) \cdot \text{CH} : \text{CH} \cdot (\text{CH}_2)_2 \cdot \text{CH}_3$, Kp._{752} 181—183°, $D._{14}^{14}$ 0,7931, $n_D^{14} = 1,4573$, nebenbei entsteht geringe Menge *2-Methyl-4-methen-5-nonen*. — *1-Phenyl-1-methen-2-hexen*, $\text{C}_6\text{H}_5\text{C} : (\text{CH}_2)_2 \cdot \text{CH}_3$, Kp. 246—248°, $D._{15}^{15}$ 0,9384, $n_D^{14} = 1,5422$.

Einw. von Organomagnesiumverb. auf 4,2-Heptanolon: *2-Methyl-2,4-heptandiol*, $(\text{CH}_3)_2\text{C}(\text{OH}) \cdot \text{CH}_2 \cdot \text{CHOH} \cdot (\text{CH}_2)_2 \cdot \text{CH}_3$, durch Einw. von CH_3MgI , Kp._5 98—99°, $D._{11}^{11}$ 0,9127, $n_D^{11} = 1,4405$. — *3-Methyl-3,5-octandiol*, $\text{CH}_3 \cdot \text{CH}(\text{CH}_3) \cdot \text{C}(\text{OH}) \cdot \text{CH}_2 \cdot \text{CHOH} \cdot (\text{CH}_2)_2 \cdot \text{CH}_3$, Kp._5 111—112°, $D._{11}^{11}$ 0,9174, $n_D^{11} = 1,4417$. — *1-Phenyl-1-methyl-1,3-hexandiol*, $\text{C}_6\text{H}_5(\text{CH}_3)\text{C}(\text{OH}) \cdot \text{CH}_2 \cdot \text{CHOH} \cdot (\text{CH}_2)_2 \cdot \text{CH}_3$, Kp._{13} 130—131°, $D._{11}^{11}$ 1,021, $n_D^{11} = 1,5170$. Aus diesen Glykolen wurden durch Dest. erhalten: *2-Methyl-2-hepten-4-ol*, $(\text{CH}_3)_2\text{C} : \text{CH} \cdot \text{CHOH} \cdot (\text{CH}_2)_2 \cdot \text{CH}_3$, Kp._{750} 162—163°, Kp._{17} 61—62°, $D._{16}^{16}$ 0,8462, $n_D^{16} = 1,4425$, Geruch mentholartig; durch Oxydation mit KMnO_4 entsteht Aceton; *Allophanat* aus Bzl., $F. 171^\circ$. — *3-Methyl-3-octen-5-ol*, $\text{CH}_3 \cdot \text{CH}_2(\text{CH}_3)\text{C} : \text{CH} \cdot \text{CHOH} \cdot (\text{CH}_2)_2 \cdot \text{CH}_3$, Kp._{750} 180—182°, Geruch wie *Allophanat*, $D._{13}^{13}$ 0,8530, $n_D^{13} = 1,4515$. (Ann. de Chimie [10] 2. 282—318. 1924.) HABERLAND.

Percival Walter Clutterbuck, γ -Oxystearinsäure. Die γ -Oxystearinsäure, $\text{C}_{18}\text{H}_{34}\text{O}_3$, ist eine krystallisierte Verb., die bei gewöhnlicher Temp. beständig ist. Sie wird aus dem Lacton gewonnen, das nach der Methode von SHUKOV u. SCHESNKO (vgl. Journ. Russ. Phys.-Chem. Ges. 40. 830; C. 1908. II. 1414) dargestellt werden kann durch Erhitzen von Stearolacton mit überschüssigem Alkali in verd. Lsg. auf dem Wasserbad während $\frac{1}{2}$ Stde. Nach dem Erkalten Füllen mit HCl Di. Trennung vom Lacton erfolgt durch Extraktion mit h. PAe., worin das Lacton

über nicht die γ -Oxysäure, die bei 89° schmilzt. Bei der Oxydation mit Chromsäure gehen sowohl die Säure wie das Lacton dieselbe γ -Ketostearinsäure vom F. 70° . γ -Oxystearinsäure verliert beim Erhitzen auf 100° (10 Min.) 1 Mol. H_2O u. geht das Lacton vom F. 52 – 53° zurück. Zum Vergleich mit dem Verh. der γ -Buttersäure u. ihrem Lacton wurde der Reaktionsmechanismus der gegenwärtigen B. von Säure u. Lacton bei der γ -Oxystearinsäure untersucht u. festgestellt, daß unter gewöhnlichen Bedingungen das Lacton keine Neigung zeigt, in die Säure überzugehen oder umgekehrt. In alkoh. Lsg. während 6 Stdn. bei 40° keine Veränderung. Der Übergang vom Lacton in das Na-Salz der γ -Oxysäure ist bimolekular, der umgekehrte Vorgang unimolekular. Die Rkk. sind prakt. vollständig nach jeder Richtung. γ -Oxystearinsäure ist viel beständiger als γ -Oxystearinsäure. (Journ. Chem. Soc. London **125**. 2330–33. 1924. Manchester, Univ.) HORST. L. J. Simon und V. Hasenfratz, Über *l*-Arabonsäurelacton und einige seiner Derivate. Wird 1 Teil des Lactons mit 3 Teilen CH_3OH bis zur eben erfolgten Sättigung erwärmt, so krystallisiert der *l*-Arabonsäuremethylester aus; F. 148° , $[\alpha]_D^{20} = +10^\circ$ in W. Zugabe von wenig HCl beschleunigt die Veresterung; beim Erhitzen auf 110° in CH_3OH abgespalten u. das Lacton zurückgebildet. — *l*-Arabonsäureäthylester, B. analog vorigem, F. $126,5^\circ$ (Block Maquenne), sehr schwach rechtsdrehend. — Triacetylderiv. des *l*-Arabonsäurelactons, aus dem Lacton + Acetylchlorid + ZnCl_2 ; aus Ä. F. 67° (Krystalle erst nach langem Stehen), $[\alpha]_D^{20} = +2^\circ$ in Bzl., leicht verseifbar zum Salz oder Ester der Arabonsäure. — Acetylieren des Äthyl- oder Äthylesters führt zu Tetraacetylderiv. mit F. $129,5$ – 131° bezw. $[\alpha]_D^{20} = -34,1^\circ$ bezw. $-26,7^\circ$ in Essigsäure. Einw. von Benzoylchlorid auf das Lacton in Pyridin gibt Dibenzoyl- oder Tribenzoylderiv. des Lactons mit F. 120 u. 120° , $[\alpha]_D^{20} = -37,65^\circ$ u. $+24^\circ$ in Aceton, letzteres in Bzl. $[\alpha]_D^{20} = +22^\circ$. — Das aus dem Arabonsäurelacton zu erhaltende *l*-Ribonsäurelacton hat F. -86° , $[\alpha]_D^{15} = -18^\circ$; es läßt sich durch Lösen in CH_3OH nicht in den Lacton der *l*-Ribonsäure überführen. (C. r. d. l'Acad. des sciences **179**. 68–69. 1924.)

HABERLAND.

L. J. Simon und A. J. A. Guillaumin, Über einige Derivate der Tetraacetylschleimsäure. Die Säure läßt sich bei schnellem Arbeiten aus sd. W. umkrystallisieren, es tritt hierbei nur geringe Hydrolyse ein, indem sich Essigsäure u. das in der Lacton der Schleimsäure bildet. Durch h. Alkali findet vollständige Hydrolyse statt. Mit Helianthin als Indicator läßt die Säure sich bei gewöhnlicher Temperatur titrieren; mit KOH wird so das K-Salz erhalten, durchsichtige Tafeln mit Krystallwasser; Ba- u. NH_4 -Salz sind analog darstellbar; das Hydroxylamin wird aus methylalkoh. Lsg. als Nadeln erhalten; mit Metallsalzen gibt das Salz nur mit HgNO_3 einen Nd., der keiner definierten Zus. entspricht. Aus sd. W. krystallisiert Tetraacetylschleimsäure mit 2 Mol. CH_3OH ; wird die methylalkoh. Lsg. mit wenig HCl versetzt, so entsteht der Dimethylester der Schleimsäure. Ester der Tetraacetylschleimsäure entstehen aus den entsprechenden Schleimsäureestern durch Acetylieren mittels Acetanhydrid in Ggw. von ZnCl_2 . Methyl- oder Ethylester der Tetraacetylschleimsäure, Prismen, F. 117° , Kp_1 ca. 250° , wird durch Alkali vollständig verseift. — Chlorid der Tetraacetylschleimsäure aus der trockenen Säure mit SOCl_2 ; wird durch $\frac{1}{2}$ -std. Kochen mit W. nicht verändert, durch Alkali vollständige Hydrolyse, durch Einw. von sd. Alkoholen B. der Ester. (C. r. d. l'Acad. des sciences **179**. 1324–26. 1924.)

HABERLAND.

William Küster und Felix Schoder, Über das Entstehen von Sorbose bei der Oxidation des Formaldehyds. Nachdem SCHMITZ (Ber. Dtsch. Chem. Ges. **46**. 1913. II. 946) die β -Acrose aus Glycerinaldehyd als Sorbose erwiesen hat, hat Vff. deren V. jetzt auch in der bei der Kondensation von CH_2O entstehenden Sorbose nachgewiesen. Zur Herst. dieser wurden außer den schon bekannten Kon-

densationsmitteln, die ganz befriedigende Resultate, vorteilhaft bei Rührer- und Reaktionsgemische, ergaben, auch Phosphate mit Rücksicht auf ihre Bedeutung für Pflanzenorganismus versucht. Sek. K- u. Na-Phosphat in Lsgg., deren Alkaligehalt dem sonst verwendeten entsprach, führten zu so gut wie gar keiner Bildung von Zucker, ihr Zusatz hemmte sogar die B. durch $\text{Pb}(\text{OH})_2$ fast völlig, indem fast nur Paraformaldehyd gebildet wurde. Günstiger war die Verwendung von Phosphaten (Paste durch Versetzen von 25%ig. H_3PO_4 mit etwas mehr CaCO_3 zur Neutralisation gegen Lackmus erforderlich) mit wenig CaCO_3 , MgO_2 und $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7$. Perborat führten wesentlich nur zur B. von Ameisensäure. Die erhaltenen Pentosen gaben die Neubergsche Ketosenrk. mit Resorcin, daneben die Phloroglucin- und die Pentosen (weit weniger stark), ferner die Diphenylaminrk. der Fructose und besonders die bei $<70^\circ$ hergestellten, die Rk. von PLAISANCE (Journ. Biol. Chem. 207; C. 1917. II. 776) auf Keto-hexosen, bei Erwärmen mit HCl deutlichen Furfuralgeruch u. Abscheidung von Huminsubstanz. Aus dem mit $\text{C}_6\text{H}_5\cdot\text{NH}\cdot\text{NH}_2$ u. Essigsäure erhaltenen Osazongemisch wurde nach langwieriger Behandlung mit verschiedenen Lösungsmitteln Sorbosazon, gelbe Nadeln (aus viel sd. W.), F. 160–61° isoliert u. mit dem von aus Vogelbeersaft (Vers. mit Grete Nickel) gewonnene Sorbose identifiziert. Für die Ggw. von 2-Ketopentose in der Formose wurde ein Beweis dadurch gefunden, daß die Oxydation mit HNO_3 eine Trioxylglutarsäure neben Trioxylbuttersäure u. Oxalsäure lieferte. Br greift Formose bei 15–18° ganz wenig, bei 27–28° lebhafter an. Die Trioxylglutarsäure wurde in Diskontrollen kleinsten Blätter u. Nadeln (aus A.) gewonnen vom F. 130°, der aber zu niedrig sein dürfte. (Ztschr. f. physiol. Ch. 141. 110–31. 1924. Stuttgart, Techn. Hochschule S.)

C. S. Hudson und F. P. Phelps, Beziehungen zwischen Drehung und Struktur in der Zuckergruppe. V. Die Chlor- und Bromacetyl-derivate der Arabinose. I. Nomenklatur der α - und β -Formen in der Zuckergruppe. Einige Derivate von 1,6-Bromacetylglucose, Gentiobiose und Maltose. (IV. vgl. Journ. Americ. Chem. Soc. 46. 979; C. 1924. II. 312.) Die von CHAVANNE (C. r. d. l'Acad. des sciences 134. 661 [1902]) angegebenen Drehungswerte der Halogenacetyl-arabinosen (I) sind ein falsches Vorzeichen. Die von Vffn. nach CHAVANNE hergestellten I-Formen zeigten folgende Drehungswerte:

β -Chloracetyl-d-arabinose	–244	–72 000	–41 900	} A_{Cl}
β -Chloracetyl-l-arabinose	+244	+72 000	+41 900	
β -Bromacetyl-d-arabinose	–288	–97 600	–67 500	
β -Bromacetyl-l-arabinose	+288	+97 600	+67 500	

(A = Drehung des C-Atoms 1; B = Drehung der Kette von C_2 – C_5)

$$B_{\text{l-Arabinose}} = +30100, B_{\text{d-Arabinose}} = -30100$$

Der A_{Cl} -Wert stimmt gut mit dem aus der Drehung der Chloracetylmalte Chloracetylglucose berechneten überein. Dagegen liegt der A_{Br} -Wert numer. höher als für die andern Bromacetylzucker. Auch andere Deriv. der Arabinose zeigen bezgl. des opt. Verh. Anomalien. So ist die $[M]_D$ -Differenz vom α - u. β -Formen von β -Triacetyl-l-arabinose (= 33400) beträchtlich kleiner als gewöhnlich (36200 bis 45000). β -Triacetylglucose zeigt aber mit derjenigen der Pentacetate der Mannose (32200) u. des 1. u. 2. Glucosepentacetats (32700) gute Übereinstimmung. Ferner ist die beobachtete Drehung des β -Triacetylmethyl-l-arabinosids (+182°) beträchtlich kleiner als die berechnete (+197°). Die nahen ster. Beziehungen der l-Arabinose zur d-Galaktose machen es wahrscheinlich, daß diese Anomalien auf einer Verschiedenheit der Ringstruktur beruhen. Die Umwandlung von Bromacetyl-l-arabinose (I) in Tetracetyl-l-arabinose (II) nach KOENIGS u. KNOB ist auch hier mit einer Waldenschen Umkehrung am C-Atom 1 verbunden, da $[M]_D$ von I (+97600) größer, $[M]_D$ von II (+13400) kleiner ist als B (+30100) für den acetylierten Arabinosewert.

Nomenklatur der α - u. β -Formen in der Zuckergruppe. Während die übrigen Halogenacylzucker stets als α -Formen erkannt wurden, sind die entsprechenden Derivv. der Arabinose als β -Formen bezeichnet worden. Dieser abweichenden Bezeichnung entspricht indessen keine strukturelle Ausnahmestellung der Arabinose. Sie ist lediglich begründet in der von E. FISCHER eingeführten Nomenklatur der Zucker, wonach der d-Galaktose stereisch die l-Arabinose verknüpft ist, nicht aber die d-Arabinose, u. der von HUDSON begründeten Nomenklatur der α - u. β -Formen der Zucker. Daher entspricht der α -d-Galaktose mit $[\alpha]_D = +25,900$ die β -l-Arabinose mit $[M]_D = +26,200$ usw. — Vff. wenden sich gegen die Verss. von SVANBERG u. JOSEPHSON sowie von KUHN, die Nomenklatur der α - u. β -Formen der Zucker u. ihrer Derivv. auf reaktionskinet. Basis aufstellen.

Die berechneten Drehungen von Fischer u. Armstrongs Dibromacetylglucose (1,6-Dibrom-2,3,5-triacetyl- α -glucose), ihrem β -Methylglucosid (6-Brom-2,3,5-triacetyl- β -methylglucosid) und dem α -Tetraacetat (6-Brom-1,2,3,5-tetraacetyl- α -glucose). Der in Teil I angegebene Wert von $[\alpha]_D$ für 1,6-Dibromtriacytylglucose ist falsch. Statt $+169^\circ$ setzen $+186^\circ$. Ein ganz ähnlicher Wert ergibt sich aus der Drehung der 6-Brom-1,2,3,5-tetraacetyl- β -glucose mit $[\alpha]_D = 12,1^\circ$ (in $C_2H_2Cl_4$). Aus

$$[M]_D = B'_{\text{Glucose}} - A_{\text{Ac}} = +4970 \text{ u. } A_{\text{Ac}} = +19100$$

für die Drehung der Restkette (basal chain) dieser Verb. $B'_{\text{Glucose}} = +24100$. Es leitet sich für die Drehung der 1,6-Dibromacetylglucose folgender Wert ab:

$$[\alpha]_D = \frac{B'_{\text{Glucose}} + A_{\text{Br}}}{\text{Mol-Gew.}} = \frac{24100 + 59300}{432} = +193^\circ.$$

Dieser Wert ist zuverlässiger als der andere ($+186^\circ$), da alle dazu nötigen Bestimmungen in Chlf. oder in $C_2H_2Cl_4$ ausgeführt worden sind. — Die von BRIGL (Ztschr. physiol. Ch. **116**. 13; C. **1922**. I. 14) erwähnte 6-Brom-1,2,3,5-tetraacetyl- α -glucose

demnach haben: $[\alpha]_D = \frac{B'_{\text{Glucose}} + A_{\text{Ac}}}{411} = +105^\circ$ u. das 6-Brom-2,3,5-triacetyl- β -methylglucosid von FISCHER, HELFERICH u. OSTMANN (Ber. Dtsch. Chem. Ges. **3**. 873; C. **1920**. III. 148):

$$[\alpha]_D = \frac{B_{\text{Glucose}} - A_{\text{Me}}}{383} = \frac{24100 - 26900}{383} = -7^\circ.$$

In einer Anmerkung weisen Vff. auf die bereits früher betonte Wichtigkeit der Bestimmung eines geeigneten Lösungsm. bei derartigen Bestst. hin. Mit den theoretischen Drehungen stimmen am besten die in Chlf. oder in $C_2H_2Cl_4$ gefundenen Drehungen überein, weswegen Vff. empfehlen, bei schwer zugänglichen Verbb. die Drehungen stets in einem dieser Lösungsmm. anzugeben. — Vff. geben eine Zusammenstellung der berechneten (1. Zahl) u. — soweit bekannt — beobachteten (2. Zahl) Drehungswerte einiger Derivv. der Maltose u. Gentiobiose: α -Acetylmaltose $+114^\circ$, α -Chloracetylmaltose $+154^\circ$; $+159^\circ$. α -Bromacetylmaltose $+175^\circ$, α -Jodacetylmaltose $+199^\circ$, α -Nitroacetylmaltose $+147^\circ$; $+149^\circ$, α -Acetylmethylmaltosid $+55^\circ$; $+54^\circ$. — α -Fluoracetylgentiobiose $+40^\circ$, α -Chloracetylgentiobiose $+82^\circ$, α -Bromacetylgentiobiose $+108^\circ$; $+112^\circ$, α -Jodacetylgentiobiose $+136^\circ$, α -Nitroacetylgentiobiose $+70^\circ$, β -Heptacetylmethylgentiobiosid -17° ;

in einer Nachschrift verwerthen Vff. noch die kürzlich von D. H. BRAUNS (Amer. Chem. Soc. **46**. 1484; C. **1924**. II. 1175) gemessenen Drehungen von α -Fluoracetyl- u. β -Jodacetyl-l-arabinose. Aus diesen Werten folgt $A_F = 8300$, $A_J = 100700$, von denen ersterer normal ist, der letzte dagegen den entsprechenden Werten für Jodacetylglucose um 15100 Einheiten übertrifft. Dieser Unterschied spricht

gleichfalls zugunsten der obigen Annahme, daß die l-Arabinose in ihren I. eine verschiedenartige Ringstruktur aufweisen kann. (Journ. Americ. Chem. 46. 2591—2604. 1924. Washington, Bureau of Standards.) O.

Hubert John Patridge Venn, *Über die Ausbeute an β -Glucosan bei der Vakuumdestillation der Cellulose*. Die Ausbeute von β -Glucosan bei der Dest. der Cellulose ist nicht nur von den Dest.-Bedingungen, sondern auch von der Behandlung des Materials in hohem Maße abhängig. Bei Anwendung von nur mechan. gereinigten amerikan. u. ägypt. Baumwollarten zeigte es sich, daß anorgan. Verunreinigungen sehr schädlich sind. In den meisten Fällen ergab aus diesen Rohprodd. kein Lävoglucosan. Entfernt man die wasserl. Bestandteile so steigt die Ausbeute auf 28%, durch Behandlung mit 1,5%ig. NaOH, dann mit 1%ig. HCl u. gründliches Auswaschen sogar bis auf 38%. Fette u. Wachse scheinen keinen Einfluß auf die Dest.-Ergebnisse zu haben. Durch Wiederholung der Dest. Behandlung ist keine Verbesserung der Ausbeute an Lävoglucosan zu erzielen. Gegenteil geht nach einer 2. Behandlung mit NaOH bei ägypt. Baumwolle die Ausbeute an Lävoglucosan beträchtlich zurück, steigt aber nach dem Abwaschen wieder auf den ursprünglichen Wert. Durch dieses Verh. unterscheidet sich ägypt. Baumwolle scharf von der amerikan., die bei der gleichen Behandlung merklichen Schwankungen in der Ausbeute an Lävoglucosan erkennen läßt. Der Säuregehalt des wss. Dest. ist immer am niedrigsten, wenn die Ausbeute an Lävoglucosan am höchsten ist, was gegen die Ansicht von IRVINE u. OLDHAM (Proc. Chem. Soc. London 119. 1744; C. 1922. I. 678) über den Ursprung dieses Anhydrosuckers spricht. — Bei Verwendung von Hydrocellulose übersteigen die Ausbeuten 40%. Die Destst. wurden in Portionen von 5 g ausgeführt, die vorher bei 3 mm u. 120° 4 Stdn. getrocknet worden waren. Als Heizquelle diente ein elektr. Ofen. Bei einer Ofentemp. von 355° war die Dest. in 40 Min. beendet. Die Ausbeute an β -Glucosan wurde in der Weise bestimmt, daß das dunkelbraune Dest. in Acetonlsg. u. in Ggw. von NaOH mit Benzoylchlorid behandelt wurde. Nach einmaligem Umlösen des Tribenzoylderiv. aus Eg. zeigte es den F. 197° u. war also nahezu völlig rein. Da reines Lävoglucosan bei der gleichen Behandlung 81—83% der theoret. Menge an Tribenzoylverb. liefert, so ist die auf diesen Verhältnissen ermittelte Ausbeute an Lävoglucosan bestimmt zu niedrig. Es dürften sich in den günstigsten Fällen bis zu 50% Lävoglucosan bilden. (Cellulosechemie 5. 1924. Beilage zu Papierfabr. 22. 1924.) OLE.

W. Vieweg, *Über die Aufnahme von Natriumhydroxyd aus Laugen bei der Cellulose*. (Vgl. S. 41.) Durch Einw. von wss. NaOH auf Watte entsteht bei einer Laugenkonz. von 16—35 Vol.-% Verb. $(C_6H_{10}O_5)_2NaOH$, bei einer Konz. über 40 Vol.-% entsteht Verb. $(C_6H_{10}O_5)_2 \cdot 2NaOH$ (Kurven im Original). Bei Ermittlung der verbrauchten NaOH ist es notwendig, die aus der Watte abgepreßte Lauge mit der überstehenden Lauge gut zu vermischen, da andernfalls unrichtige Werte erhalten werden; die Verss. werden, um den Einfluß des als Säure wirkenden Lauges auszuschalten, am besten in Eisengefäßen ausgeführt. (Ztschr. f. angew. Chem. 1908—10. 1924. Pirna.) HABERLAND.

E. Heuser, *Über Alkalicellulose*. Bei den Unterss. über Existenz oder Nichtexistenz einer Alkalicellulose, $(C_6H_{10}O_5)_2NaOH$, ist bei der Anwendung der Lavesoneschen Methode (Einlegen der Cellulose in NaOH, Auswaschen des braunen genommenen Prod. mit A.) zu beachten, daß überschüssiges NaOH mit Anionenauszug ausgewaschen, sondern im Gegenteil noch auf der Faser niedergeschlagen wird. Mit wss. A. wird dagegen überschüssiges NaOH ausgewaschen, jedoch darf der W.-Gehalt nicht so groß sein, daß die Alkalicellulose zers. wird; die Gladstiesche Methode ist also nur bedingt anwendbar. Die indirekte Methode (Best. d. verbrauchten NaOH durch Titration, vgl. vorst. Ref.) führt auch je nach den Versuchs-

lungen zu verschiedenen Ergebnissen. Vf. fand gemeinsam mit **Niethammer**, wenn 4 g fein gepulverter Baumwolle mit 50 ccm NaOH gut durchfeuchtet sind, die NaOH-Aufnahme der von **VIEWEG** (vorst. Ref.) angegebenen Menge nach. Vf. weist ebenfalls darauf hin, daß das Auspressen der Cellulose nach Behandlung mit NaOH unbedingt erforderlich ist. Gemeinsam mit **Bartunek** f. die NaOH-Aufnahme durch Cellulose nochmals für Laugen von 10–50% geprüft, unter Innehaltung besonderer Vorsichtsmaßregeln; da über die früher gestellten Grenzen hinaus eine NaOH-Aufnahme stattfand, muß geschlossen werden, daß die Alkalicellulose selbst noch NaOH adsorbiert. Diese Adsorption beim Arbeiten in der Wärme fast ganz vermieden. Bei 80° u. 45%ig. Lauge ger bei gewöhnlicher Temp. gefundene NaOH-Wert (17,4%) auf 12,36% (theoret. 12,34%) zurück. Diese Arbeitsweise ist jedoch nur bei hochkonz. Laugen anwendbar, da bei verd. Laugen Alkalicellulose in der Wärme leicht zers. wird. Verb. $(C_6H_{10}O_5)_2NaOH$ entsprechende Prodd. wurden mit *KOH* u. *LiOH* erhalten. Mit *CsOH* entstand eine Verb. $(C_6H_{10}O_5)_3CsOH$. (Ztschr. f. angew. Ch. **37**. 13. 1924. Seehof b. Berlin.)

HABERLAND.

Karrer, Über *Reserv cellulose und Cellulose*. Zusammenfassender Vortrag über *Lichenin* u. *Lichenase* unter besonderer Berücksichtigung der Ergebnisse eigener Vers. (vgl. Helv. chim. Acta **7**. 916; C. **1924**. II. 2487.) (Ztschr. f. angew. Ch. **37**. 7. 1924. Zürich.)

HABERLAND.

Martin Schenck und **Fritz v. Graevenitz**, Zur Darstellung der Tetramethylguanidine. *N,N,N',N''-Tetramethylguanidin*, $CH_3N:C(NHCH_3) \cdot N(CH_3)_2$. Die Darst. von **SCHENCK** (Arch. der Pharm. **249**. 463; C. **1911**. II. 1216) wurde in der von **U. GRAF** (Ber. Dtsch. Chem. Ges. **56**. 1326; C. **1923**. III. 548) angezeigten Anwendung von $HgCl_2$ modifiziert. Ausbeute an reinem Aurat vom F. 115–117° 44% der Theorie. — *N,N,N',N''-Tetramethylguanidin*, $HN:C[N(CH_3)_2]_2$. **SCHENCK**, Ztschr. f. physiol. Ch. **77**. 370; C. **1912**. I. 1819.) Die Verb. wurde auch auf zwei anderen Wegen gewonnen: 1. Aus *N,N,S-Trimethyl-ps-thioharnstoff* $(CH_3)_2NH$ in Ggw. von $HgCl_2$. Ausbeute an fast reinem Aurat (F. 138–140° rein 142–144°) 26,5% der Theorie. — 2. Aus CNJ u. stark überschüssigem H_2S ohne Lösungsm. Ausbeute an fast reinem Aurat (F. 137–138°) 34% der Theorie. — *a. Dimethylsulfoharnstoff*, $S:C(NH_2) \cdot N(CH_3)_2$, nach **WALLACH** aus Dimethylcyanamid mit alkoh. NH_3 u. H_2S , zeigte, aus A. krystallisiert, F. 162–163°, nachmaliger Krystallisation aus h. W. 164°. — *N,N,S-Trimethyl-ps-thioharnstoff*, aus dem vorigen in h. W. mit $(CH_3)_2SO_4$ in der Wärme, wurde nicht isoliert. (Ztschr. f. physiol. Ch. **141**. 132–45. 1924. Leipzig, Univ.)

SPIEGEL.

Charles Montague Bere und **Samuel Smiles**, Derivate von Anilindisulfoxyd. **MILES** u. **GIBSON**, Journ. Chem. Soc. London **125**. 176; C. **1924**. I. 2694.) Weitere Klärung der Frage, ob den aromat. Disulfoxyden die symmetr. Form SO_2R oder die unsymmetr. Struktur $R \cdot SO_2 \cdot SR$ zukommt, stellen Vf. *Acetanilid-p-sulfinensäure* u. aus dieser mit verd. HJ in Ggw. von H_2SO_4 *Acetanilid-disulfoxyd*, $Ac \cdot HN \cdot C_6H_4 \cdot SO_2 \cdot S \cdot C_6H_4 \cdot NH \cdot Ac$ (I), dar. Die zunächst farblose Subst. wird bei Belichtung gelb, ohne den F. 235° zu ändern oder zers. zu gehen. Im Dunkeln wird die Farbe abgeschwächt u. tritt nach dem Umkrystallisieren aus Eg. wieder erneut auf. Das Vorliegen zweier isomerer Formen von (I), welches phototrop. Verh. spricht, macht die Annahme wahrscheinlich, daß ein molekularer Wechsel zwischen s. u. a. Form stattfindet. Diese Verb. ist identisch mit der von **HINSBERG** (vgl. Ber. Dtsch. Chem. Ges. **42**. 1278; C. **1909**. II. 1278) beschriebenen β -Verb. des Acetanilid-p-disulfoxyds. Die Konst. von (I) wurde bewiesen durch Red. zu *Acetanilid-p-disulfid*, $Ac \cdot HN \cdot C_6H_4 \cdot S \cdot S \cdot C_6H_4 \cdot NH \cdot Ac$, u. durch die Rk. mit Acetanilid-p-mercaptan, welche zu *Acetanilid-p-sulfin-* (II) führt. Das Disulfid lag in beiden Fällen in der β -Form vor.

(F. 182°). Die Überführung der β - in die α -Form gelang nicht. So konnte das α -Disulfoxyd über die Sulfide nach der Methode von HINSBERG nicht gestellt werden. Die Isolierung der α -Verb. von (I) blieb den Vff. versagt. Weitere phototrop. Erscheinungen wurden im Anschluß an diese Untersuchungen festgestellt. Die *m*-Stellung der Acetylaminogruppe ist für die Phototropie abschwächend; so zeigen die *m*-Acetylaminoditolyl-2,2'-disulfoxyd u. Salicylsäure-5-disulfoxyd in welchem die Hydroxylgruppen in *p*-Stellung zur Disulfoxydgruppe sitzen.


Versuchsteil: *Acetanilid-p-sulfinsäure*, $C_6H_5O_3NS$, *Acetanilid-p-sulfonylchlorid*, $C_6H_5O_2NS_2Cl$, wird mit verd. alkal. Lsg. von Na_2SO_3 geschüttelt u. die Sulfinsäure durch Red. mit H_2SO_3 ausgefällt; farblose Nadeln aus h. W. vom F. 180° (Zers.). — *Acetanilid-p-disulfoxyd*, $C_{16}H_{16}O_4N_2S_2$ (I), aus der Sulfinsäure in wss. Lsg. mit Red. durch HJ u. überschüssiger H_2SO_3 ($\frac{1}{2}$ Stde. Wasserbad). Farblose Nadeln aus h. W. vom F. 219° (Zers.); nach Verlust von festgehaltener Eg. F. 235°. — Durch Erhitzen mit HJ u. H_2SO_3 in konz. Eg.-Lsg. bei 100° (2 Stdn.) Red. zum β -*Acetanilid-p-disulfid*, $C_{16}H_{16}O_2N_2S_2$ (II), vom F. 183°. — Werden gleichmolekulare Mengen von (I) mit *Acetanilid-p-mercaptan* in A. 1 Stde. auf dem Wasserbad erhitzt, so entsteht (II) u. die Sulfinsäure. — *Anilin-p-disulfoxyd*, $C_{12}H_{12}O_2N_2S_2$, aus (I) in konz. HCl durch Kochen ($\frac{1}{4}$ Stde.); aus verd. A. gelbe Nadeln vom F. 175° (Zers.). — *4,4'-Diacetylaminoditolyl-2,2'-disulfoxyd*, $C_{18}H_{20}O_4N_2S_2$, aus 4-Acetylaminotoluol-2-sulfinsäure durch wenig HJ u. überschüssige H_2SO_3 (Wasserbad, 2 Stdn.); aus verd. A. farblose Prismen F. 180° (Zers.). — Red. mit HJ zum entsprechenden Disulfid vom F. 224°. — Aus 5-Sulfinsäure *Salicylsäure-5-disulfoxyd*, $C_{14}H_{10}O_5S_2$, Nadeln aus Aceton F. 206—208° (Zers.). — *Benzanilid-p-sulfonylchlorid*, $NH \cdot C_6H_4 \cdot C_6H_4 \cdot SO_2Cl$, aus *Benzanilid* in konz. H_2SO_4 (1 Stde. bei 60°), dann auf Eis gießen. Aus Aceton u. W. F. 190°. — *Benzanilid-p-sulfinsäure*, $C_{13}H_{11}O_3NS$, aus voriger Verb. durch Schütteln mit wss. Lsg. von Na_2SO_3 ; farblose Nadeln aus Aceten vom F. 206°, unl. in wss. Lsg. — *Benzanilid-p-disulfoxyd*, $C_{24}H_{22}O_2NS_2$, konnte durch Umkrystallisieren (unl. in flüchtigen Lösungsmitteln, l. in solchen mit hohem Kp.) nicht rein gewonnen werden; Zers. bei 220°. Durch Belichtung schwache Gelbfärbung. (Journ. Chem. Soc. London 125. 2359—63. 1924. London, Kings Coll.)

A. Haller, Ed. Bauer und P. Ramart, *Synthesen mittels Natriumamid* X. *Mono-, di-, triallylacetophenone, Allylalkylacetophenone und Allyl-i-butyronen*. (Vgl. Ann. de Chimie [10] 1. 275; C. 1924. II. 471.) Die Allylacetophenone erhalten durch stufenweises Einführen der Allylradikale erhalten, die Alkylallylacetophenone u. Allyl-i-butyronen durch Einw. von Allylhaloid auf die Na-Verbb. — *Monoallylacetophenon*, $C_6H_5CO \cdot CH_2 \cdot (CH_2 \cdot CH : CH_2)$ nach BAEYER u. PERKIN (Ber. Chem. Ges. 16. 2132) aus dem Na-Salz des Benzoylessigsäureäthylesters u. Allylbromid mit anschließender 12-stündiger Verseifung der Verb. mit W. im Autoklav bei 210°, Kp.₂₀ 128—130°. — *Diallylacetophenon*, $C_{14}H_{16}O$, aus der Monoallylverb. mit Allyljodid oder -bromid u. $NaNH_2$, Kp.₁₈ 148—150°. — *Triallylacetophenon*, $C_{17}H_{20}O$, Darst. analog, Kp.₁₈ 168—170°. — Bei der Darst. der beiden letzten entsteht nebenbei stets Benzoesäure. — *Allylmethylacetophenon*, $C_{12}H_{14}O$, aus Na-Verb. des Propiophenons u. Allyljodid in Bzn., Kp.₁₆ 130—132°. — *Allyl-äthylacetophenon*, $C_{13}H_{16}O$, aus der Na-Verb. des n-Butyrophenons, Kp.₁₅ 138—140°. — *Oxim*, $C_{13}H_{17}ON$, Kp.₁₅ 198°. — Aus *Allyldimethylacetophenon*, Kp.₁₈ 134—136°, entsteht durch Red. mit Na in alkoh. Lsg. *Phenyl-1-dimethyl-2,2-penten-4-ol-1*, $C_{15}H_{22}O$, Kp.₁₃ 133—134°. — *Phenylurethan*, $C_6H_5 \cdot CH(OCO \cdot NHC_6H_5) \cdot C \cdot (CH_3)_2C_3H_5$, weisse Nadeln F. 105—106°. — *Phenyl-1-dimethyl-2,2-pentanol-1*, durch Red. des vorigen Pentenols, Kp.₁₆ 141—142°, Phenylurethan, F. 86°. — *Allylmethyläthylacetophenon*, $C_{14}H_{18}O$, Darst. aus Methyläthylacetophenon u. Allyljodid + $NaNH_2$, Natriumamid

aus Allyläthylacetophenon u. CH_3J , Kp.₁₆ 140—142°. — *Allyldiäthylacetophenon*, $\text{C}_{16}\text{H}_{18}\text{O}$, aus der Diäthyl-Verb. u. Allyljodid, Kp.₁₄ 155—157°. — *Diallylmethylacetophenon*, $\text{C}_{15}\text{H}_{18}\text{O}$, Kp.₁₄ 155—156°. — *Diallyläthylacetophenon*, $\text{C}_{16}\text{H}_{20}\text{O}$, Kp.₁₄ 160—162°. — *Allylmethylbenzylacetophenon*, $\text{C}_{19}\text{H}_{20}\text{O}$, Kp.₁₇ 205—208°, aus *Methylbenzylacetophenon* (dargestellt aus Benzylchlorid u. der Na-Verb. des Äthylphenylacetophenon, Kp.₁₅ 187—188°). — *Allyläthylbenzylacetophenon*, Kp.₂₀ 212—214°. — *Monoallylbutyron*, $\text{C}_{18}\text{H}_{18}\text{O}$, aus i-Butyron u. Allyljodid + NaNH_2 , Kp.₁₄ 67,5—68,5°. — *Diallyl-i-butyron*, $\text{C}_{18}\text{H}_{22}\text{O} = (\text{CH}_3)_2\cdot\text{C}_3\text{H}_5\cdot\text{C}\cdot\text{CO}\cdot\text{C}\cdot\text{C}_3\text{H}_5(\text{CH}_3)_2$, Kp.₁₃ 105—107°. — Anhang eine Tabelle der Mol.-Refr. der genannten Verbb. (Ann. de Chimie 269—81. 1924.)

TRÉNEL.

William Henry Perkin jun. und Richard Arthur Beater Tapley, Die Oxydation von Acetomesitylen mit Permanganat. In vorliegender Arbeit geben die Autoren einen systemat. Überblick über die Oxydation von Acetomesitylen (I) mit besonderer Berücksichtigung der Eigenschaften der Phthalonsäuren u. ihrer Derivv. (MURDOCH u. PERKIN, Journ. Chem. Soc. London 123. 2094; C. 1923. III. 1516). Die Oxydation von (I) mit alkal. KMnO_4 wurde nach beendeter Rk. u. Filtration im Wasserbad eingeengt u. nach dem Zusatz von HCl u. konz. NH_3 mit CaCl_2 versetzt u. von Ca-Oxalat u. anderen Salzen h. abfiltriert. Die zurückbleibenden Ca-Salze, die verschiedene Ca-Salze enthielten, wurden mehrfach zur fraktionierten Fällung gebracht. Die erste Fraktion enthielt farblose Schuppen des Calciumsalzes von Mesitylgyoxysäure (II), die zweite eine Mischung von (II) mit dem Calciumsalz von Dimethylterephthalonsäure (III), die dritte bestand aus (III), u. die vierte und fünfte Fraktionen waren Mischungen von (III) mit dem Ca-Salz von Dimethylglyoxalsäure (IV) u. NH_4Cl . In der Mutterlauge hiervon waren noch beträchtliche Mengen von (IV), alle Methylcarboxyphthalonsäuren (V u. Va) u. andere mehr. Derivate.



Die 1. Fraktion wurde durch mäßig konz. HCl u. gelindes Kochen aus

dem Ca-Salz die freie Säure $C_{11}H_{12}O_3$ (II) abgeschieden; aus Bzl. gelbe V vom F. 117—118°. Durch 4-std. Kochen mit überschüssigem Na-Amalgam erhalten *Trimethylmandelsäure*, $C_{11}H_{14}O_3$. Aus W. Würfel vom F. 152—154°. Oxydation von (II) mit $KMnO_4$ führt zu (III) als Hauptprod. — Aus der 3. Fraktion wird nach Abtrennung von (II) die freie Säure, $C_{11}H_{10}O_5$ (III) wonnen, die aus h. W. in gelben Prismen krystallisiert vom F. 220°. — *Dimethylester*, $C_{13}H_{15}O_5$, aus $CH_3 \cdot OH$ in Prismen, aus PAe. in Nadeln vom F. 85°; aus (III) durch Kochen mit Thionylchlorid (1 Stde.) oder CH_3OH u. H_2SO_4 . Auf dem Wasserbad in konz. H_2SO_4 erhitzt, zers. sich (III) unter Entw. v zu *2,6-Dimethylterephthalsäure* (VII), F. 297—298° aus A. — *Phenylhydrazon* (III), $C_{17}H_{16}O_4N_2$, aus A. rotbraune Krystalle vom F. 213° (Zers.). — Die Oxydation der verd. wss. neutralisierten Lsg. mit 1% $KMnO_4$ unter Durchleiten von O_2 ergibt die *2,6-Dimethylterephthalsäure*, $C_{10}H_{10}O_4$, aus A. Nadeln vom F. 296—297°. — *2,6-Dimethyl-4-carboxymandelsäure*, $C_{11}H_{12}O_5$, H_2O (IX), aus h. W. Nadeln, v H_2O bei 115°, wird weich bei 230° u. schm. bei 243—244°. Darst. durch Red. von (III) mit Na-Amalgam bei 15° (24 Stdn.). — *2,6-Dimethyl-4-carboxyphenyllessigsäure*, $C_{11}H_{12}O_4$ (X), aus 50%ig. Eg. flache Prismen vom F. 285°, ll. in CH_3OH , wl. i A. Darst. durch Red. von (III) mit überschüssigem 3%ig. Na-Amalgam in verd. Na_2CO_3 (mehrere Stdn. kochen). — *Dimethylester*, $C_{13}H_{16}O_4$, aus PAe. dicke farblose Prismen vom F. 78°, ll. in Ä. u. Bzl. Darst. aus (X) durch Kochen mit überschüssig Thionylchlorid (1 Stde.). — *2,6-Dimethyl-4-carboxybenzaldehyd*, $C_{10}H_{10}O_3$ (XII). A. farblose Nadeln vom F. 211—212°. (III) wird in h. W. gel. mit Anilin chin. Nach $\frac{1}{2}$ Stde. scheidet sich das *Anilinsalz der Dimethylaniloterephthalsäure*, $C_{23}H_{22}O_4N_2$ (XI), aus, das aus A. den F. 168° zeigt (Rhomben). Aus der Mutterlauge von (XI) scheidet sich nach dem Erhitzen auf dem Wasserbad *2,6-Dimethyl-4-carboxyanilobenzaldehyd*, $C_{16}H_{15}O_2N$ (XII), aus CH_3OH gelbe Nadeln vom F. 186°, ll. in A. Krystallisiert dimorph in Nadeln oder Blättchen je nach Lösungsm. Die Hydrolyse von (XII) zu (XIII) wurde durch Kochen mit wässr. konz. HCl ausgeführt (1 Stdn.), wodurch die gelben Krystalle in farblose übergingen; aus A. F. 211—212°. — *Phenylhydrazon*, $C_{16}H_{16}O_2N_2$, aus CH_3OH gelbe Nadeln vom F. 228°.

Aus den Mutterlauen vom Ca-Salz der (III) u. (II) wird durch Einengen mit verd. Druck u. Zusatz von HCl nach einigen fraktionierten Krystallisationen *3-Methylphthalonsäure*, $C_{11}H_{10}O_5$ (IV), abgeschieden, wasserfrei F. 178°. Die freie saure Säure, $C_{11}H_{12}O_6$, schm. bei 86—87°. — *Dimethylester*, $C_{13}H_{14}O_5$, aus (IV) in Nadeln vom F. 76—79°. — Mit konz. H_2SO_4 auf dem Wasserbad geht (IV) in *4,6-Dimethylphthalsäureanhydrid* vom F. 115° u. nach dessen Hydrolyse in *3-Methylphthalsäure* vom F. 185—186° über. — Wird IV mit 2 Moll. Anilin n. 24 Stdn. auf dem Wasserbad erhitzt, so scheiden sich farblose Krystalle ab, das *Anilid des 4,6-Dimethyl-2-carboxyanilobenzaldehyds*, $C_{22}H_{20}ON_2$ (XIV), aus (IV) in Nadeln vom F. 213°. — Durch Erhitzen von (XIV) mit mäßig konz. HCl auf dem Wasserbad (mehrere Stdn.) entstand nicht die Aldehydsäure, sondern das *Anilid des 4,6-Dimethyl-2-carboxybenzaldehyds*, $C_{16}H_{15}O_2N$ (XV), aus CH_3OH farblose rhomb. Blättchen vom F. 174°. — *Methylcarboxyphthalonsäure*, $C_{11}H_8O_7$ (V, V'), aus A. aus den Restmutterlauen extrahiert u. durch mehrfache Fraktionierung ill. in A. An der Luft Übergang von kryst. Zustand in eine Paste. F. 218° (Zers.). — Reduktion mit Na-Amalgam auf dem Wasserbad reduziert geht (V) in *Methyldicarboxymandelsäure*, $C_{11}H_{10}O_7$, über; aus W. Blättchen vom F. 228°. (Journ. Chem. Soc. Lond. 1924. 2428—37. 1924. Oxford.)

Wilson Baker und Arthur Lapworth, *Reduktionsprodukte der Arylidencyansäuren*. Die Arylidencyansäuren lassen sich im Gegensatz zu den entsprechenden Alkyldensäuren mit Na-Amalgam zu den zugehörigen gesätt. ungesätt.

eren: $R \cdot CH : C(CN) \cdot CO_2H + 2H \rightarrow R \cdot CH_2 \cdot CH(CN) \cdot CO_2H$. Auf diese wurden reduziert: *Benzyliden-*, *Anisyliden-*, *Salicyliden-*, *Piperonyliden-*, *O-benzyliden-* u. *2,4-Dioxybenzylidencyanessigsäure*. Durch Verseifen der Cyan- bilden sich leicht die entsprechenden Malonsäuren, durch Erhitzen mit Pulver die zugehörigen Nitrile. Bei der Bromierung von Benzylecyanessigsäure in Bzl. trat B. von β -Phenyl- α -brompropionitril ein unter Abspaltung von HBr.

Versuchsteil. *Benzylecyanessigsäure*, $(C_{10}H_9O_2N)$, β -Phenyl- α -cyanacrylsäure da W. suspendiert u. nach u. nach mit Na-Amalgam versetzt bei einer Temp. Aus Bzl. F. 101—102°. Beim Erhitzen mit Cu-Pulver B. von β -Phenyl-*nitril*. Behandlung mit konz. H_2SO_4 u. nachträgliches Gießen auf Eis liefert *malonsäureamid* $CH_2 \cdot C_6H_5 \cdot CH \cdot (CO \cdot NH_2) \cdot CO_2H$, Blättchen aus W. vom F. — α -Cyan- β -anisylpropionsäure, $CH_3 \cdot O \cdot C_6H_4 \cdot CH_2 \cdot CH(CN) \cdot CO_2H$, aus Lg. farblose Nadeln vom F. 82,5°. — α -Cyan- β -salicylpropionsäure, $H_2 \cdot CH_2 \cdot CH(CN) \cdot COOH$, aus Ä. u. Bzl. farblose Nadeln vom F. 138°, ll. in meisten O-haltigen Lösungsm., unl. in Bzl. u. Lg. — α -Cyan- β -piperonylpropionsäure, aus Ä. F. 142°. — α -Cyan- β -(3-oxyphenyl)-propionsäure, $C_{10}H_9O_3N$, ll. farblose Nadeln vom F. 105—106°, ll. in W. u. Ä., unl. in Lg. — α -Cyan- β -(2-oxyphenyl)-propionsäure, $C_{10}H_9O_3N$, krystallisiert schwer u. konnte nicht isoliert werden; F. 135—140°. — β -Phenyl- α -brompropionitril, C_9H_8NBr , durch Bromierung von Benzylecyanessigsäure; gelbes Öl, Kp.₁₀ 137—138°, D.₁₇ 1,438, das durch NaOH hydrolysiert wird. — β -Phenyl- α -brompropionamid, $C_9H_{10}ONBr$, aus voriger Verb. durch Lösen in 95% H_2SO_4 , Erwärmen auf 25° während 2 u. darauffolgendes Gießen in W. Aus Bzl. oder h. W. farblose Blättchen vom F. 128,5°. (Journ. Chem. Soc. London 125. 2333—38. 1924. Manchester, HORST.


C. Courtot und A. Dondelinger, α -Halogenverbindungen des Indans. (Vgl. l'Acad. des sciences 178. 493; C. 1924. I. 1785.) Einleiten von HBr in ein Gefäß, welches sich von 0° auf —18° abgekühltes Inden u. Vakuumdest. des von überschüssiger HBr befreiten Reaktionsprod. gab bei Kp.₁₄ 217° Diinden u. bei Kp.₁₄ 101° nach mehrmaligem Fraktionieren ein farbloses, stark lichtbrechendes, leichtflüchtiges Öl, das der Analyse nach ein Gemisch von Inden u. Indenbromhydrat war. Bei Dest. des mit KJ erhaltenen Reaktionsprod. wurde reichlich HJ entwichen u. unter Aufschäumen entstand ein bräunlich-schwarzes Harz. Mit HF geht man Parainden (tetrameres Inden) über. Daß in den mit HBr u. HJ erhaltenen Inden die Säuren an die Indendoppelbindung getreten waren, ergab sich daraus,

daß bei Einw. von 2 Mol. o-Toluidin auf diese Rohprodd. o-Tolyldanyllamin (I) erhalten wurde. — Nach den experimentellen Befunden ergibt sich, daß die Beständigkeit der Indenhalogenwasserstoffderiv. abnimmt in der Reihenfolge

HBr > HJ. Ist in dem aus der HJ-Verb. erhaltenen sek. Amin I das ungesättigte H-Atom ebenfalls lose gebunden, wie in o-Toluidin-Deriv., so muß bei Einw. von CH_3MgJ außer H der NH-Gruppe auch von der H_2 -Gruppe ein H reagieren; es ergab sich jedoch, daß nur H der NH-Gruppe reagierte. Hieraus ist zu schließen, daß bei Ersatz des J durch die NH-Gruppe die Beweglichkeit des erwähnten H-Atoms vermindert worden ist. (r. d. l'Acad. des sciences 179. 1168—71. 1924.) HABERLAND.


N. Goswami, Direkte Hydrierung und Dehydrierung des Acenaphthens. Ein Gemisch von überschüssigem H_2 u. Acenaphthendämpfen über auf 150° reduziertes Ni geleitet, so erhält man ein Gemisch von Tetrahydro- u. Acenaphthen; ersteres hat Kp. 240°, letzteres Kp. 235°. — Wird der Vers.

see
errata
V. 1, 1003
P. 3628



in Abwesenheit von H_2 bei 300° ausgeführt, so wird Acenaphthen dehydriert *Acenaphthylen*; gelbe Krystalle, F. 92° , Kp. 270° ; Pikrat orangefarbene Kryst. F. 202° . (C. r. d. l'Acad. des sciences **179**. 1269—70. 1924.) HABERLAND

Lucy Higginbotham, Arthur Lapworth und Charles Simpson, *Die Wirkung zwischen Äthylidenmalonsäurediäthylester und Phenylanilinoacetonitril*. CLARKE u. LAPWORTH, Journ. Chem. Soc. London **91**. 694; C. **1907**. II. 64.) Rk. zwischen *Phenylanilinoacetonitril* (I) u. *Äthylidenmalonsäurediäthylester* (II) Ggw. von Alkali führt zu einem gelben Rk.-Prod., dem die ungefähre Zusamm. Verb. (III), deren B. von den Vff. erwartet worden war, zukam, u. die bei weitem Erhitzen mit Alkali neben Cyanid u. Anilin α -Benzoyläthylmalonsäure (VI) als Das Hauptprod. der Rk. bestand jedoch meist direkt aus *4-Methyl-1,5-diphenyl-5-cyan-2-ketopyrrolidin-3-carbonsäureäthylester* (VIII). Mit starkem Alkali spaltet dieser Ester HCN u. Anilin ab u. bildet die Ketosäure (VI). Durch verd. Alkali wird (VIII) in die freie Säure u. weiterhin in *4-Methyl-1,5-diphenyl-5-cyan-2-ketopyrrolidin* (X) übergeführt. Mit starken Alkalien entsteht aus (X) die β -Benzoylbuttersäure (VII), durch H_2SO_4 das Amid der *4-Methyl-1,5-diphenyl-2-keto-5-carbonsäure* (XI). Die Verss., (III), bzw. das N-Methylderiv. von (III) darzustellen verliefen ergebnislos. α -(α -Benzoyläthyl)-malonsäure u. Benzoylbuttersäure werden aus Phenylbromäthylketon u. K-Äthylmalonat dargestellt u. so auf synthet. Wege die Verb. (VIII) u. (X) gewonnen.



Versuchsteil. Eine gekühlte Lsg. von *Phenylanilinoacetonitril* u. *Äthylidenmalonsäurediäthylester* in A. wird tropfenweise mit KOH versetzt. Das abgeschilte gelbe Pulver schmolz bei $108\text{--}111^\circ$, unl. in Ä. u. PAe. Durch Erhitzen (2 Std.) mit konz. alkoh. KOH entwickelt sich NH_3 u. bildet sich KCN. Die zurückbleibende ölige Säure war α -Benzoyläthylmalonsäure. Durch Erhitzen mit wss. Acetone verd. Eg. wird aus dem gelben Kondensationsprod. *4-Methyl-1,5-diphenyl-5-cyan-2-ketopyrrolidin-3-carbonsäureäthylester*, $C_{21}H_{20}O_3N_2$ (VIII), farblose Prismen aus Ä. F. 99° , erhalten. — *4-Methyl-1,5-diphenyl-5-cyan-2-ketopyrrolidin-3-carbonsäure*, $C_{19}H_{16}O_3N_2$, wurde aus dem harzigen Rückstand der ersten Kondensation gewonnen oder aus (VIII) mit verd. KOH, F. 65° (weich 40°). — *4-Methyl-1,5-diphenyl-5-cyan-2-ketopyrrolidin*, $C_{18}H_{16}ON_2$ (X), aus der Carbonsäure durch Kochen mit HCl-Nadeln vom F. 111° aus A. — *4-Methyl-1,5-diphenyl-2-keto-5-carbonsäureamid*, $C_{18}H_{18}O_3N_2$, aus A. F. $193\text{--}194^\circ$. — α -Benzoyläthylmalonsäure, $C_{18}H_{18}O_5$ (V. a. (I) u. (II) in A. mit 50% wss. KOH bei 17° (2 Stdn.). Hierauf 2 Stdn. mit überschüssigem KOH am Rückflußkühler kochen. Das braune ölige Rk.-Prod. wird durch Behandlung mit Ä. u. Chlf. fest. F. $164\text{--}165^\circ$, ll. in Ä. u. Ä. — β -Benzoylbuttersäure, $C_{11}H_{12}O_3$, aus h. W. F. $59\text{--}60^\circ$, entsteht aus voriger Säure durch Erhitzen bei 160° . — Semicarbazon, $C_{12}H_{15}O_3N_3$, Blättchen, aus A. F. $177\text{--}178^\circ$. — *Phenyl- α -bromäthylketon*, C_9H_9OBr , aus Äthylphenylketon u. Br, gelbes Öl. — Die Kondensation des Bromketons mit K-Äthylmalonat (Wasserbad, 6 Stdn.) wie die Ester der α -Benzoyläthylmalonsäure erhalten u. zur freien Säure verseift. Die Einw. von Alkali auf *Phenyl-N-methylanilinoacetonitril* liefert eine neutrale Ester in gelblichen Krystallen (aus Ä.) vom F. $126\text{--}128^\circ$. Die Zus. entspricht der Formel $C_{15}H_{15}O_2N$; ihre Konst. konnte nicht geklärt werden. (Journ. Chem. Soc. London **125**. 2339—44. 1924. Manchester, Univ.) Host.

see errata v. 96
P. 3204

O. L. Brady, S. W. Hewetson und L. Klein, *Die Reaktionen der unsymmetrischen Trinitrotoluole*. Vff. fanden, daß die Rk., welche bei Einw. von Na_2SO_3 auf Polynitrobenzolverb. statth. u. erstmalig von LAUBENHEIMER (Ber. Dtsch. Chem. 15. 597 [1882]) studiert wurde, ganz allgemein bei Verb. mit beweglicher Nitrogruppe eintritt, u. zwar bei den *a*. Trinitrotoluolen bei Zimmertemp. So gibt Trinitrotoluol die 2,4-Dinitrotoluol-3-sulfonsäure (Na-Salz). Die Na-Sulfonate krystallisierte Verb., ll. in W. u. A., aber unl. in Ä. u. Bzl. Mit Methylamin u. sie die Dinitromethyltoluidine, durch welche die Stellung der Sulfongruppe anm. werden kann. Die Hydrolyse der Sulfongruppe ließ sich nicht erreichen. Acetat wirkt auf *a*. Trinitrotoluole als mildes Alkali, indem Dinitrokresole geb. werden. 2,3,6-Trinitrotoluol zeigt abnorme Rkk. — Ausgehend von 2,3,4-Trinitrotoluolen wurde von den Vff. die Synthese von Methylnitrocarbazolen an-geht, die jedoch im letzten Abschnitt durch die große Stabilität der Methyl-nitrobenzthiazole scheiterte. Außerdem wurden die Rkk. der *a*. Trinitro-toluole mit einer größeren Zahl von Aminen untersucht.



Versuchsteil. Na-Salz der 4,6-Dinitrotoluol-3-sulfonsäure, $\text{C}_7\text{H}_5\text{O}_7\text{N}_2\text{SNa}$, aus 4-Trinitrotoluol durch Schütteln mit der gesätt. Lsg. von Na_2SO_3 bei gewöhnlicher Temp. (24 Stdn.). Aus h. A. weiße Nadeln, durch Ä. gefällt. — Na-Salz der 5-Trinitrotoluol-4-sulfonsäure, lange gelbe Krystalle. — Na-Salz der 3,5-Dinitro-toluol-2-sulfonsäure, kleine weiße Nadeln. — 2,3,4-Trinitrotoluol mit der wss. Lsg. Na_2SO_3 zur Trockne gedampft auf dem Wasserbad, mit A. extrahiert u. mit Ä. fällt: Na-Salz der 2,4-Dinitrotoluol-3-sulfonsäure. — Aus 3,4,6-Trinitrotoluol durch Einw. von Na-Acetat 4,6-Dinitro-*m*-kresol gewonnen, für welches Vff. 73—74° angeben (BORSCHÉ 63—65°). — Beim Kochen in alkoh. Lsg. wurden 2,3,4-Trinitrotoluol mit *m*-Toluidin 3,3'-Dimethyl-2,6-dinitrodiphenylamin, $\text{C}_{14}\text{H}_{13}\text{O}_4\text{N}_3$, F. 110°, mit β -Naphthylamin 3-Methyl-2,6-dinitrophenyl- β -naphthylamin, $\text{C}_{17}\text{H}_{15}\text{O}_4\text{N}_3$, F. 166°. — Aus 3,4,6-Trinitrotoluol wurden erhalten mit *m*-Toluidin Dimethyl-4,6-dinitrodiphenylamin, $\text{C}_{14}\text{H}_{13}\text{O}_4\text{N}_3$ (I), F. 135°, mit *o*-Toluidin Dimethyl-4,6-dinitrodiphenylamin, $\text{C}_{14}\text{H}_{13}\text{O}_4\text{N}_3$, F. 99°, mit α -u. β -Naphthylamin Methyl-4,6-dinitrophenyl- α -(β)-naphthylamin, $\text{C}_{17}\text{H}_{15}\text{O}_4\text{N}_3$, F. 182 u. F. 211°. — Trinitrotoluol gibt mit *o*-Toluidin 2,2'-Dimethyl-4,6-dinitrodiphenylamin, $\text{C}_{14}\text{H}_{13}\text{O}_4\text{N}_3$, F. 109°. — 3,3'-Dimethyl-2,4,6,2',4',6'-hexanitrodiphenylamin, $\text{C}_{14}\text{H}_9\text{O}_{12}\text{N}_7$, kleine Blättchen aus verd. A. vom F. 60°; Darst. aus (I) durch portionsweises Erhitzen in überschüssiger HNO_3 (1,5), Ausbeute nur 20%. — 3(5?)-Methyl-2-amino-4,6-dinitrodiphenylamin, $\text{C}_{13}\text{H}_{13}\text{O}_2\text{N}_3$ (II), goldgelbe Schuppen aus A. vom F. 139°; Darst. aus 3-Methyl-2,6-dinitrodiphenylamin durch partielle Red. mit $(\text{NH}_4)_2\text{S}$ in verd. Lsg. (Wasserbad, 1 Stde.). — 4(6?)-Methyl-7-nitro-1-phenyl-1,2,3-benzotriazol, $\text{C}_{10}\text{H}_7\text{O}_4\text{N}_4$ (III), braungelbe Nadeln aus A. vom F. 147° aus (II) gel. in HCl (1:1) u. (0°) mit konz. Lsg. von NaNO_2 ($\frac{1}{2}$ Stde.). Beim Erhitzen von (III) mit H_2O trat neben teilweiser Verkohl. nur unveränderte Sublimation ein. (Vgl. Chem. Soc. London 125. 2400—2404. 1924. London, Univ.) HORST.

George Barger und Frederick John Eaton, *Blaue Adsorptionsverbindungen*. (Vgl. IV. (III. vgl. BARGER u. STARLING, Journ. Chem. Soc. London 107. 1915. II. 229.)) Vff. hatten früher gezeigt, daß die konjugierte Doppelbindung in vielen Fällen für die blauen Additionsverb. mit Jod verantwortlich zu machen ist. Um den Einfluß dieser Atomgruppierung weiter zu studieren, untersuchten nun die Vff. Deriv. von 1,3-Diketohydrinen wie 2-Benzyliden-



1,3-indandion u. die entsprechenden *o*-Oxybenzylidenderiv., die unerwarteterweise aber keine gefärbten Additionsverb. bildeten. Hingegen zeigte die Na-Verb. *Carbäthoxydiketohydrindens* in wss. Lsg. Blaufärbung, nicht aber die freie Säure. Dieser Fall, daß ähnlich gebaute Verb. so verschiedenes Verh. zeigen, deutet darauf hin, daß die konjugierte Bindung nicht allein zur Erklärung der Erscheinung hinreicht. Solcher Unterschied besteht auch zwischen *o*-Oxychalkon (Blaufärbung) u. seinem Benzoylderiv. (keine Addition).

Da bei den α - u. γ -Pyronen beobachtet war, daß ein Brückensauerstoffatom die J-Addition bewirkt, wurden nun die *Phthalide* einer Unters. unterzogen. *Äthylphthalid* gibt in alkoh. Lsg. einen grünblauen, wenig charakterist. Nd.; *Benzylphthalid* gibt recht stabile kolloidale blaue Lsgg. selbst bei großer Verdünnung. Bei erhöhtem Mol.-Gew. wie bei Äthylidendiphthalid bleibt die Substanz farblos. Der wesentliche Einfluß auf die Additions-B. scheint physikal. Natur zu sein. Nur die Benzylidenverb. liefern der Jodstärke ähnliche Prodd. Restvalenzen dürften maßgebend sein, wie BERGMANN u. LUDEWIG (vgl. Ber. Dtsch. Chem. Ges. 57. 755; C. 1924. I. 2094) an krystallisierten blauen Additionsverb. von Cycloacetalen mit Brückensauerstoffatom beobachtet haben, das diese Forscher analog in der Stärke als verursachend annehmen. — 4-Methyl-7-oxy-cumarin u. Acetylderiv. addieren kein J, wohl aber die Benzoylverb. Es wurden unter anderem das *Carbäthoxyderiv.*, $C_{13}H_{12}O_5$, F. 99°, *Phenylacetylderiv.*, $C_{18}H_{14}O_4$, F. 102°, *Cinnamoylderiv.*, $C_{19}H_{14}O_4$, F. 154°, β -Naphthoylderiv., $C_{21}H_{14}O_4$, F. 179–180°, *o*-Chlorbenzoylderiv., $C_{17}H_{11}O_4Cl$, F. 155–156°, *m*-Nitrobenzoylderiv., $C_{17}H_{11}O_4N$, F. 210–211°, *p*-Nitrobenzoylderiv., F. 143°, *Phenylcarbidodderiv.*, $C_{17}H_{13}O_4N$, F. 155–156°. Die stärksten Färbung des Benzoylderiv. kommen am nächsten das *o*-Chlor-, *m*-Nitrobenzoylderiv., dann das β -Naphthoylderiv. Die erwartete Erhöhung der Adsorptionsfähigkeit durch Einführung negativer Gruppen wie Cl u. NO_2 trat nicht ein. Die Adsorptionsfähigkeit scheint mit der Fähigkeit, beim Eingießen in alkoh. Lsgg. in W. Sole zu bilden, im Zusammenhang zu stehen.

Der Einfluß der $[H^+]$ auf die Adsorption war in einigen untersuchten Fällen in weiten Grenzen wenig maßgebend für die Geschwindigkeit des Erscheinens der blauen Farbe u. ihre Intensität. Im Fall des *Indenoflavons* war bei $pH = 1$ die Farbe der Additionsverb. fleischfarbengelb, bei $pH = 8,4$ violett, bei $pH = 11$ rein blau. — Wie Jodstärke nicht gebildet wird in Abwesenheit von Jodien, so zeigt sich auch der Einfluß dieser Ionen in starkem Maße bei *Benzoyl- β -methylumbelliferon*. Um den Einfluß anderer Ionenkonz. zu studieren, wurde $1/1000$ -n. alkoh. J-Lsg. (frisch bereitet) mit der alkoh. Lsg. der organ. Substanz dann mit der 0,2-molaren Lsg. folgender Salzionen gemischt: Jodid, Chlorsilber, Bromid, Nitrat, Sulfat, Acetat, Citrat, Thiocyanat. Bei Zusatz von Jodid erstie die blaue Farbe sofort, überhaupt nicht beim letzten Glied der Reihe, dem Natriumcyanat. Ein Vergleich mit ähnlichen Erscheinungen, die bei Thallosalzen u. Lanthanacetaten beobachtet wurden, lenkt die Aufmerksamkeit auf die Größe des Mol.-Gew., mehr denn auf konstitutive Betrachtungen. — Am *Cumarin*, *Acetylcumarin* u. *Benzoyl- β -methylumbelliferon* wurde die Verteilung des Jods zwischen Lsg. u. Adsorptionsverb. geprüft u. besonders im Falle des Cumarins Wert gefunden, die einer konstanten Zus. der Adsorptionsverb. entsprechen u. für diesen charakterist. sind. (Journ. Chem. Soc. London 125. 2407–14. 1924. Edinb. Univ.)

A. Wohl und A. Prill, Über *Arecolon* und *N*-Methyl- ω -amino- β -pipridin. Zunächst versuchten Vff., das Δ^3 -Tetrahydropyridin- β -methylketon durch Kondensation von *Amidopropionacetal*, $NH_2 \cdot CH_2 \cdot CH_2 \cdot CH(OC_2H_5)_2$, mit *Vinylmethylketon*, $CH_2=CH \cdot COCH_3$, darzustellen. Die Anlagerung des Acetals an das ungesättigte Keton verläuft aber nicht einheitlich. Die primär durch äquimolekulare Addition


hende sekundäre Base lagert ihrerseits ein 2. Mol. Vinylmethylketon an u. Gemisch der beiden Reaktionsprodd. ließ sich nicht trennen. Das benzoyletierte Acetal reagierte nicht mit Vinylmethylketon. Vff. gingen daher vom *N-Methyl-arecadinolaldehyddiäthylacetal* (vgl. WOHL u. JOHNSON, Ber. Dtsch. Chem. Ges. 714 [1907]) aus, dessen Darst. sie zu verbessern suchten. Jedoch erhielten im günstigsten Falle immer nur $\frac{1}{3}$ sek. neben $\frac{2}{3}$ tert. Base. Die Methylierung von Aminoacetals mit Dimethylsulfat, die Red. des Kondensationsprod. aus dem Acetat u. CH_2O u. schließlich die Umsetzung von β -Chlorpropionacetal mit Formamidnatrium lieferten keine besseren Ergebnisse. — *Methylaminopropionacetal* lagert sich glatt an Vinylmethylketon an u. das Additionsprod. läßt sich ohne Schwierigkeit in das *N-Methyl- Δ^3 -tetrahydropyridin- β -methylketon* = *Arecolon* (I) überführen. — *N-Methyl- ω -amino- β -pipecolin* (II) wurde durch Red. des *Oxims* des *arecadinolaldehyds* gewonnen.



Versuche. *Formalaminopropionacetal*, $[\text{CH}_2=\text{N}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}(\text{OC}_2\text{H}_5)_2]_n$, *Formalaminopropionacetal* u. 35%ig. CH_2O -Lsg.; schweres, wasserklares Öl, im Hochvakuum nicht unzersetzt destillierbar, ll. in Ä., A., Bzl., Lg., wl. in w., leichter in A. Die Anlagerung von Acetessigester führt zu einem schweren gelben Öl, im Hochvakuum nicht destillierbar, das bei der Spaltung keine faßbaren Kondensationsprodd. gibt. Die in der Literatur angegebenen Vorschriften zur Darstellung von *Vinylmethylketon* haben sich nicht bewährt. Vff. arbeiten wie folgt: *Aceton* u. 100 g 35% CH_2O -Lsg. bleiben mit 4 cem n-NaOH 3—4 Stdn. bei 0° temp. stehen. Gleich nach dem Verschwinden der CH_2O -Rk. (mit Anilin) wird mit 4 cem n-HCl neutralisiert, Aceton bei 80—85° abdestilliert u. der Rückstand, das Ketobutanol, nach Zusatz von 2—4 g ZnCl_2 aus dem Ölbad destilliert. Das Vinylmethylketon wird aus dem Destillat mit K_2CO_3 ausgesalzen, mit H_2O getrocknet u. destilliert. Kp. 80° unter teilweiser Selbstkondensation. Ausbeute 25—35% der Theorie. — Destilliert man Ketobutanol ohne ZnCl_2 im Vakuum bis 110° ab, so hinterbleibt ein gelber, dickflüssiger Rückstand, wahrscheinlich $\text{CO}(\text{CH}_2\cdot\text{CH}_2\text{OH})_2$ oder $\text{CH}_3\cdot\text{COCH}(\text{CH}_2\text{OH})_2$, auch im Hochvakuum nicht unzersetzt destillierbar. Gibt mit Acetylchlorid ein *Diacetat*, aus viel W. Nadeln vom F. 85°. Es gelang nicht, daraus ein Ketoderiv. zu erhalten, auch Verseifung, Oxydation- u. Red.-Verss. haben noch keine Entschlüsse über seine Konst. ergeben. — Verb. $\text{C}_{12}\text{H}_{25}\text{O}_3\text{N} = \text{CH}_3\cdot\text{CO}\cdot\text{CH}_2\cdot\text{CH}_2\cdot\text{CH}_2\cdot\text{CH}_2\cdot\text{CH}(\text{OC}_2\text{H}_5)_2$ aus Vinylmethylketon u. *N-Methyl- β -aminopropionacetal* Ä. unter Kühlung mit Kältemischung (2 Stdn.), hellgelbe, ölige Fl., im Hochvakuum nicht unzersetzt destillierbar, wl. in W., sonst ll. — *Arecolon*, $\text{C}_8\text{H}_{13}\text{ON}$, farblos, vorst. Verb. mit rauch. HCl (Kältemischung), hellgelbe, leichtbewegliche Kristalle, Kp. 80—82°, von schwach pyridinartigem Geruch, durchweg sll., reagiert mit HCl, red. in der Kälte saure KMnO_4 -Lsg. Färbt sich allmählich dunkelbraun. Chlorhydrat, aus Essigester oder Amylalkohol, dann aus absol. A. lange Nadeln vom F. 204°, sll. in W. — Bromhydrat, Nadeln vom F. 223°. — *Semicarbazol*, $\text{C}_8\text{H}_{16}\text{ON}_4$, aus 50%ig. A. F. 219° (Zers.), ll. in Ä. u. absol. A. Chlorhydrat, aus 95% A., F. 233°. — *Oxim* des *arecadinolaldehyds*, $\text{C}_7\text{H}_{14}\text{ON}_2$, aus 50% A., F. 130°. — Daraus mit Na-Amalgam + verd. H_2SO_4 *N-Methyl- β -pipecolin*, $\text{C}_7\text{H}_{16}\text{N}$ (II), schwer bewegliches Öl vom Kp. 116—118°, von piperidinartigem Geruch. Durchweg sll. Zieht aus der Luft CO_2 an. Keine kristallisierten Salze. — *Benzoylderiv.*, gelbes Öl. Chlorhydrat,

$C_{14}H_{20}ON_2 \cdot HCl$, aus Aceton Nadeln, F. 162° , ll. in W. u. verd. A. — Das Crystallhydrat u. Bromhydrat der Acetylverb. sind außerordentlich hygroskop. (LIEBIG, Ann. **440**. 139—49. 1924. Danzig, Techn. Hochschule.)

William Henry Perkin jun. und **William Greenwell Sedgwick**, *Tetrahydroacridine, Octahydroacridine und ihre Derivate*. (Vgl. PERKIN u. PLANT, Journ. Chem. Soc. London **125**. 1503; C. **1924**. II. 1347 u. Journ. Chem. Soc. London **1923**. I. 1623.) Aus Cyclohexylidenanthranilsäure (I) bildet sich durch Spaltung von W. bei 220° Tetrahydroacridon (II). Die Anlagerung von 4 Atomen an dem einen der Bzl.-Kerne hat eine größere Basizität zur Folge. II in H_2SO_4 gel. liefert beim Behandeln mit konz. HNO_3 2 Mononitroderivate: 1-Nitrotetrahydroacridon (III) vom F. 227° u. 3-Nitrotetrahydroacridon (IV) vom F. 227° . Die Struktur von III beweist die Synthese aus 3-Nitroanthranilsäure u. Cyclohexanon, von IV die analoge Synthese aus 5-Nitroanthranilsäure. Außerdem wurde das 2- u. 4-Isomere der Nitrotetrahydroacridone dargestellt. Durch Reduktion werden die entsprechenden Aminotetrahydroacridone erhalten. Dekahydroacridon wurde durch Erhitzen von Hexahydroanthranilsäure mit Cyclohexanon erhalten. Es ist eine starke Base. Der Vers., durch elektrolyt. Red. zum vollständig hydrierten Acridin zu kommen, führte zu einer unaufgeklärten Verb. $C_{13}H_{21}ON$ vom F. 82° . — Tetrahydroacridin (V) wird am besten durch Kondensation von Isatin mit Cyclohexanon in alkal. Lsg. erhalten. Die Tetrahydroacridin-meso-carbonsäure (VI) (Ausbeute) spaltet quantitativ CO_2 ab u. geht in V über (vgl. BORSCHKE u. M. SIEPER, Ber. Dtsch. Chem. Ges. **41**. 2206; C. **1908**. II. 331). Durch Einwirkung von HNO_3 in H_2SO_4 -saurer Lsg. wurde 4(?)-Nitrotetrahydroacridin erhalten. Die Struktur konnte wegen der Unmöglichkeit zur Aminoverb. zu reduzieren, nicht bestimmt werden. Eine Anlagerung von $\cdot OH$ oder $\cdot NO_2$ an die Doppelbindung von V wird in keinem Fall zu beobachten. Der Vers., V zum Hexahydroacridin (VII) zu reduzieren, blieb erfolglos, da stets die Doppelbindung in V angegriffen wird u. Dekahydroacridin (VIII) entsteht. Hierbei wird VIII in 2 isomeren Formen A u. B gebildet, die mit Hilfe der Pikrate bzw. Acetylverb. getrennt werden können. In ähnlicher noch näher zu untersuchender Fall, wo 2 a. C-Atome isomere



gen müssen, liegt auch beim Hexahydrocarbazol vor u. bei dem Red.-Prod. Tetrahydroacridincarbonensäure mit Na-Amalgam, der Octahydroacridincarbonensäure (IX). Die weitere Red. von VIII zu Tesserakaidekahydroacridin war ohne Erfolg.


Versuchsteil. Tetrahydroacridon, $C_{13}H_{13}ON$ (II), aus Anthranilsäure u. Cyclohexanol, grauweiße krystalline M., aus A., F. 357°. — Nitrat, aus A. Blättchen. — Hydrochlorid, aus A. farblose Nadeln. — Aus 1-Methylcyclohexan-3-on u. Anthranilsäure durch Erhitzen (2 Stdn.) bei 120° entsteht zunächst 3-Methylcyclohexylanthranilsäure, $C_{14}H_{17}O_2N$, Blättchen aus Bzl. vom F. 140°. — Erhitzen auf 220° liefert Methyl-(6- oder 8-)tetrahydroacridon, $C_{14}H_{15}ON$, aus A. Nadeln vom F. 170°. — Löst man II in konz. H_2SO_4 , kühlt auf -15° u. fügt gepulvertes KNO_3 in kleinen Anteilen hinzu (Temp. stets -10°), gießt dann das Prod. auf Eis u. filtriert, wenn getrocknet mit A., so erhält man 3-Nitrotetrahydroacridon, $C_{13}H_{11}O_2N_2$ (III), in gelbe Prismen vom F. 336° (Zers.). Aus dem alkoh. Filtrat beim Abkühlen orangegelbe Nadeln des 1-Nitrotetrahydroacridons (IV) vom F. 170°. — Zur Synthese von (IV) wurde 5-Nitroanthranilsäure u. Cyclohexanon in A. bei 120° erhitzt, wodurch beim Abkühlen 5-Nitrocyclohexylidenanthranilsäure, $C_{13}H_{14}O_4N_2$, entsteht, aus A. rote Nadeln vom F. 271°. Beim weiteren Erhitzen auf 220° wird (IV) gebildet, aus alkoh. HCl umkrystallisiert, F. 336°. — Die Synthese von (IV) wird analog durchgeführt aus der 3-Nitroanthranilsäure, unter Beachtung, daß die Temp. nur bis 180° gesteigert werden darf. — 4-Nitrocyclohexylidenanthranilsäure, $C_{13}H_{14}O_4N_2$, aus 4-Nitroanthranilsäure (Nadeln, F. 264°) u. Cyclohexanon bei 140° (2 Stdn.), gelbe Nadeln aus A., F. 269° (Zers.). — 2-Nitrotetrahydroacridon, $C_{13}H_{12}O_3N_2$, aus voriger Verb. durch weiteres Erhitzen auf 220°; gelbe Nadeln aus alkoh. HCl, F. 332°. — 6-Nitrocyclohexylidenanthranilsäure, $C_{13}H_{14}O_4N_2$, aus 6-Nitroanthranilsäure u. Cyclohexanon bei 120° (2 Stdn.), aus A. Krystalle vom F. 214° (Zers.). — Weiteres Erhitzen (1 Stde.) bis 210° wird 1-Nitrotetrahydroacridon, $C_{13}H_{12}O_3N_2$, in wl. Krystallen erhalten, aus Bzl. u. alkoh. HCl, F. 270°. — 3-Aminotetrahydroacridon, $C_{13}H_{14}ON_2$, durch Red. von (IV) mit Zn u. alkoh. HCl, Nadeln aus A., F. 322°. — Hydrochlorid, Blättchen vom F. 190°. — Acetylderiv., $C_{15}H_{16}O_2N_2$, Prismen vom F. 344°. — 1-Aminotetrahydroacridon, $C_{13}H_{14}ON_2$, Prismen aus A. vom F. 255°. — 2-Aminotetrahydroacridon, durch Red. in alkoh. Lsg. mit $SnCl_2$, Nadeln aus A., F. 320°. — Acetylderiv., $C_{15}H_{16}O_2N_2$, Blättchen vom F. 336°. — Hexahydroanthranilsäure wird mit Cyclohexanon 2 Stdn. bei 130° erhitzt, weitere 2 Stdn. bei 260°. Mit h. W. extrahiert u. A. krystallisiert Dekahydroacridon, $C_{13}H_{19}ON$, in Blättchen oder Prismen vom F. 180°. Elektrolyt. Red. führte zu einer Verb. $C_{13}H_{21}ON$ vom Kp.₁₀ 190°, aus Ä., F. 11–180°.

Tetrahydroacridin, $C_{13}H_{13}N$, aus PAe., F. 53°; Darst. aus VI durch Dest. bei 150° (Kp.₁₀ 150°). — Sulfat, Nadeln aus A., F. 220°. — Nitrat, gelbe Blättchen, aus A., F. 160°. — Pikrat, F. 208° (Zers.). — Jodmethylat, Nadeln aus Ä. u. A., F. 202°. — 5-(meso)-Chlortetrahydroacridin, $C_{13}H_{12}NCl$, aus II mit PCl_5 , farblose Nadeln aus A., F. 226°. — 4(?)-Nitrotetrahydroacridin, $C_{13}H_{12}O_2N_2$, braune Nadeln vom F. 110°. — 4(?)-Aminotetrahydroacridin, $C_{13}H_{14}N_2$, durch Red. voriger mit $SnCl_2$ in h. A., aus Ä. Nadeln vom F. 160°. — Hydrochlorid, orangegelbe Nadeln, F. 242°. — Nitrat, rote Prismen, F. 236° (Zers.). — Acetylderiv., $C_{15}H_{16}O_2N_2$, Prismen vom F. 204°. — 4(?)-Aminooctahydroacridin, $C_{15}H_{20}ON_2$, durch Red. von Nitrotetrahydroacridin mit Sn u. HCl (12 Stdn.). Ausbeute sehr gering. — farblose Nadeln vom F. 195°; Hydrochlorid, F. 235°. — Die Red. von Tetrahydroacridin mit Sn u. HCl führt zu einem isomeren Basengemisch, A u. B, aus dem Octahydroacridin A u. B, $C_{13}H_{17}N$ (VIII), rein abscheiden läßt, indem man es über die Sulfate oder die Pikrate geht u. trennt. Die Base A, $C_{13}H_{17}N$,

schm. bei 81–82°, Blättchen aus PAe.; B schm. aus Lg. bei 72°. — Durch Erhitzen von II mit Na-Amalgam (Rühren, 6 Stdn., 80°) wird fast ausschließlich die A-Form von VIII erhalten, F. 82°. Pikrat, F. 195°. Jodmethylat, gelbe Prismen aus A., F. 212°. Acetylderiv., $C_{15}H_{19}ON$, Blättchen aus PAe., F. 86°. — VIII mit Dimethylsulfat in alkal. Lsg. bei 50° behandelt liefert 10-Methyloctahydroacridin (A), $C_{14}H_{17}$, Öl vom Kp. 140°. — Pikrat, Prismen vom F. 160°. — 4(?)-Nitrooctahydroacridin, $C_{13}H_{16}O_2N_2$, aus VIII über das Acetylderiv. durch Nitrierung mit KNO_3 in H₂SO₄-saurer Lsg., rote Nadeln, F. 104°, aus dem Hydrochlorid (Blättchen aus A., F. 104°) mit NH_3 . — Octahydroacridin A (VIII), aus der Mutterlauge der isomeren B₂ als Sulfat, Blättchen aus PAe., F. 72°. Aus dem Pikrat (F. 175°) Abscheidung in NH_3 . — Jodmethylat von VIIIa gelbe Prismen, F. 217°. — Acetylderiv., $C_{15}H_{19}O$, Prismen aus A., F. 136°. — Octahydroacridinmesocarbonsäure A, $C_{14}H_{17}O_2N$ (II), Mischung mit dem Isomeren B erhalten aus VI durch Red. mit Na-Amalgam zunächst in der Kälte, dann 3 Stdn. bei 85° im CO_2 -Strom. Fraktionierte Krysalisation aus A. liefert die mehr l. A-Form in farblosen Nadeln vom F. 180°. — Das isomere B-Form aus der Mutterlauge von A bildet Blättchen vom F. 221°. Bei 260° Zers. (CO_2 -Abspaltung) zu VIII B. (Journ. Chem. Soc. London 125, 2437–5, 1924. Oxford, DYSON PERRINS Lab.)

Wilfred Herbert Linnell und William Henry Perkin jun., Derivate von Acridon und Tetrahydrocarbazol. (Vgl. vorst. Ref.) Im Verlauf der synthet. Untersuchungen in der Strychnin- u. Brucinreihe (vgl. CLEMO, PERKIN JR. u. ROBINSON, Journ. Chem. Soc. London 125, 1751; C. 1924. II, 2520) war die Abspaltung des Essigsäurerestes aus der Gruppe $>N \cdot CH_2 \cdot CO_2H$ beobachtet. Um diesen Vorgang näher aufzuklären, versuchten Vff. die Darst. von Anhydro-9-aminodihydroacridin-10-essigsäure (I), eine Isomere der Anhydrodihydroacridin-9-aminooessigsäure (II) vgl. CLEMO usw., l. c.). Durch Kondensation von Phenylglycin-o-carbonsäure mit o-Chlornitrobenzol in Ggw. von Cu als Katalysator wurde nicht, wie zunächst erwartet, die 6-Carboxy-2'-nitrodiphenylamin-N-essigsäure (III) erhalten, sondern unter Abspaltung des Essigsäurerestes die 2'-Nitrodiphenylamin-6-carbonsäure. Wird letztere Säure mit Bromessigester behandelt, so wird der einfache Ester von III erhalten, der aber bei der Verseifung die Nitrodiphenylamin-carbonsäure zurückliefert. Die Ursache der leichten Beweglichkeit der Essigsäuregruppe in der Nachbarschaft der NO_2 - u. CO_2H -Gruppen zur Gruppe $>N \cdot CH_2 \cdot CO_2H$ vermutet wurde, durch die in den Nitroester von III mit $SnCl_2$ zu 6-Carboxy-2'-aminodiphenylamin-N-essigsäureester (IV), der bei der Verseifung aber wiederum die Essigsäure abgespalte. Um den Monoester von III in 9-Nitroacridin-10-essigester (V) überzuführen scheiterten zahlreiche Verss. mit wasserentziehenden Mitteln. Infolge der wieder eintretenden Abspaltung bildete sich hierbei 9-Nitroacridon (VI). Die Verss. von IV durch H_2SO_4 die Anhydroderivate VIII u. IX zu erhalten, waren ebenfalls ohne Erfolg u. führten nur zu 9-Aminoacridon (VII). Die Einw. von Hitze auf IV unter vermindertem Druck führte unter Abspaltung von Glykolsäure zu Anhydro-2'-aminodiphenylamin-6-carbonsäure (X). Die Red. des Nitrosoderivs. von X mit Zn-Au u. Essigsäure in Ggw. von Cyclohexanon ergibt quantitativ ein Tetrahydrocarbazol-deriv. der Zus. XI oder XII, wobei sich Vff. für erstere Konst. entschieden. Die Verseifung mit alkoh. Kali zur 2'-Amino-9-phenyl-1,2,3,4-tetrahydrocarbazol-6-carbonsäure (XIII) führt, die bei Behandlung mit H_2SO_4 den Acridonring zu schließen. — Wird Nitrosodiphenylamin mit Zn-Staub u. Eg. reduziert in Ggw. von Cyclohexanon, so entsteht 9-Phenyltetrahydrocarbazol (F. 86°). Mit HNO_3 ringt hieraus 9-Phenyl-5-nitrotetrahydrocarbazol (XV) u. hauptsächlich 9-Phenyl-11-nitro-10-oxyhexahydrocarbazol (XVI) gebildet. Durch Erhitzen von XVI mit alkoh. Öl tritt Zers. ein unter B. von o-Anilinobenzoylvaleriansäure (XVII).

Versuchsteil. Phenylglycin-o-carbonsäure, o-Chlornitrobenzol, KOH u. Cu



wurden erhitzt (110° fl.) bis 160° (2 Stdn.). Nach einer weiteren Stde. wird 6-Diphenylamin-6-carbonsäure, aus A., F. 216°, erhalten. — 6-Carboxy-2'-nitro-2'-aminodiphenylamin-N-essigsäureäthylester, $C_{17}H_{16}O_6N_2$, aus PAe. längliche gelbe Prismen vom F. 121°. — 6-Carboxy-2'-acetylaminodiphenylamin-N-essigsäureäthylester, $C_{19}H_{20}O_6N_2$, aus PAe. oder verd. Eg. farblose Nadeln vom F. 121°. Die Darst. des reinen Amino-6-carboxy-2'-aminodiphenylamin durch Hydrolyse des Acetylderiv. war ohne Erfolg. — Anhydro-2'-amino-6-carboxy-2'-aminodiphenylamin-6-carbonsäure, $C_{19}H_{16}ON_2$ (XI), aus Anhydro-2'-aminodiphenylamin-6-carbonsäure durch Erhitzen auf 250° (10 Min.), wodurch zunächst das Acetylderiv. erhalten wird, dessen Nitroverb. mit Cyclohexanon u. Zn-Staub erhitzt auf 65—70°, 1 Stde.) die Säure XI in langen Prismen vom F. 204°


(aus 60%ig. Eg.) liefert. — 2'-Amino-9-phenyltetrahydrocarbazol-8-carbon. $C_{19}H_{18}O_2N_2$, aus verd. A., F. 168°. — 9-Phenyltetrahydrocarbazol, $C_{18}H_{17}N$, aus H OH farblose Prismen vom F. 86°. — Durch Einw. von HNO_3 auf vorige Ve. Eg. bei 40° (3 Stdn.) entsteht 9-Phenyl-11-nitro-10-oxyhexahydrocarbazol, $C_{18}H_{15}N_2O_2$ (XVI), farblose Nadeln aus verd. Eg., F. 145°. — Aus der Eg.-Mutterlaug von XVI wurde nach mehrfacher Krystallisation aus $CH_3 \cdot OH$ 9-Phenyl-5(?)-nitro-10-hydrocarbazol, $C_{18}H_{16}O_2N_2$ (XV), in gelben Blättchen vom F. 120° erhalten. — o-Anilinobenzoylvaleriansäure, $C_{18}H_{19}O_3N$ (XVII), durch Erhitzen (15 Min.) von mit alkoh. KOH; aus verd. A. farblose Nadeln vom F. 92°. (Journ. Chem. Soc. London 125. 2451—60. 1924. Oxford, DYSON PERRINS Lab.) HOIR.

Léon Piaux, Spontane Oxydation der 1-Methyl- und 1,3-Dimethylharnsäure in alkalischer Lösung. (Vgl. S. 229.) 0,06 Mol 1-Methyl- (I), 1,3-Dimethylharnsäure (II) u. Harnsäure (III) + 0,30 Mol KOH + 300 ccm W. wurden mittels O_2 behält. Pro Mol Säure wurden 1,8—1,9 Atome O aufgenommen. Die Geschwindigkeit der Oxydation war $III > I > II$. Wird der alkal. Lsg. ein Katalysator zugesetzt (Mn(OH)₂, 1 Mn pro Mol Säure), so werden I u. III bedeutend schneller als II oxydiert; die Oxydationsgeschwindigkeit von II wird jedoch nicht beeinflusst; I u. III verbrauchen hierbei 1,05 O, II 1,7 O. — Als Oxydationsprodukt wurde bei I ohne Katalysator nach Zugabe von CH_3COOH u. A. erhalten: das K-Salz der 3-Methyloxonats, mit Katalysator (3 Mol Alkali pro Mol Säure) in 3-Methylallantoin isoliert. — Im Gegensatz hierzu findet bei II (mit oder ohne Katalysator) bei der Oxydation weitgehende Spaltung statt: es wurden isomere Oxalylharnstoff, oxalsaures K u. Methylamin. (C. r. d. l'Acad. des sciences 17. 1326—29. 1924.) HABERLAND.

John Graymore, Der lösende Einfluß von Trialkyltrimethylentriamine auf Harnsäure. Vf. untersucht die Löslichkeitseigenschaften cycl. Triamine des Typs $(CH_2 \cdot NR)_3$ u. ihrer Salze mit Harnsäure. Trimethyl- u. Triäthyltrimethylentriamine wurden dargestellt u. zeigten beide starke Löslichkeitswrkg. auf Harnsäure in wässriger Lösung. Die Harnsäureverb. des Trimethyltrimethylentriamins hat eine Löslichkeit von 1:11, die entsprechende Äthylverb. von 1:9. Mit Br bilden sich krytallisierte Additionsprodd. sowohl von den cycl. Aminen, wie von den Harnsäurederivaten. (Journ. Chem. Soc. London 125. 2283—84. 1924. Nottingham, Univ.) HOIR.





P. Karrer, O. Schnider und **A. P. Smirnov**, Polysaccharide. XXIX. 2. Kenntnis des Chitins II und Konfiguration des Glucosamins. (XXVIII. vgl. I. c. chim. Acta 7. 928; C. 1924. II. 2460 u. I. vgl. Helv. chim. Acta 5. 832; C. 9. I. 604.) Wenn der Elementarkörper des Chitins ein acetyliertes Anhydrid aus 2 Mol. Glucosamin darstellt, so müßte dieser Elementarkörper auf Grund der früheren Ergebnisse die Konst. I. haben. Ein solches Gebilde wäre als die hydratisierte Form des Fructosazins aufzufassen. Es wurde daher untersucht, ob sich Fructosazin bei der Zn-Staub-Dest. ebenso verhält wie Chitin. Das ist nicht der Fall. Irregularitäten entstehen dabei nur in ganz geringer Menge. Aus dem Basengemisch konnte nur ein oxydativen Abbau lediglich Pyrazin-2,5-dicarbonsäure isoliert werden. Das Elementarmolekel des Chitins muß also aus mehr wie 2 Glucosaminresten aufgebaut sein. Die Zn-Staub-Dest. des Chitosans verläuft weniger gut wie die des Chitins, es entstehen aber, soweit festgestellt werden konnte, die gleichen Prodd. wie dieses. Um die aus der quantitativen Abspaltung des N aus Chitosan mittels HNO_2 gezogenen Schlußfolgerungen weiterhin zu stützen, wurde das Glucoseanilid, das ja ebenfalls zum Typus der Aldehydammoniake gezählt werden kann, auf sein Verh. gegen HNO_2 untersucht. Auch hier wurde in Abwesenheit freier Mineralsäure der Chitosanrest quantitativ abgelöst u. als Diazoamidobenzol abgeschieden. Bzgl. der Konfiguration des Glucosamins stimmen Vf. der Ansicht von LEVENE bei, was es das der Mannose entsprechende Aminoderiv. ist, auf Grund folgender Beobachtungen:

g: die Aminosäuren der Proteine besitzen am α -C-Atom alle die gleiche Konfiguration u. zwar auf Grund ihrer Beziehungen zu den entsprechenden Oxy- die minus- oder l-Konfiguration. Glucosaminsäure liefert bei der Red. α -amino-n-capronsäure, die auch als Baustein natürlicher Proteine nachgewiesen. Daraus folgt auch für Glucosaminsäure u. damit für Glucosamin die l-Kon- figuration am C-Atom 2.




Die Dest. des *Fructosazins* mit Zn Staub wurde in Portionen zu 10 g mit 200 g Subst. in einer Röhre von 105 cm Länge u. 24 qmm Querschnitt bei sehr hoher Rotglut ausgeführt. Das Destillat von 30 Destst. wurde in Ä. gel. u. teilweise mit 1%ig. H_2SO_4 ausgeschüttelt, bis diese nicht mehr neutralisiert. Verbrauch ca. 250 ccm. Der Rückstand der äth. Lsg. wurde fraktioniert. Die dem Chitopyrrol entsprechende Fraktion vom Kp. 150–156° (1,1 g) hat einen doppelt so großen N-Gehalt (17,7%) wie die aus Chitin erhaltene. Bei Oxydation mit wss. KMnO_4 bei 100° lieferte sie *Pyrazin-2,5-dicarbonssäure*, $\text{C}_4\text{H}_2\text{N}_2$, Prismen, die sich von 250° an verfärben u. bei 265° unter teilweiser Sublimieren. Werden die Krystalle mit FeSO_4 -Lsg. übergossen, so entsteht ein violett-schwarzer Nd., während ihre sehr verd. wss. Lsg. mit demselben Reagens gelblichen, voluminösen Nd. u. eine schmutzige violette Lsg. gibt. Die gleiche Lsg. wurde auch aus den Fraktionen von den Kpp. 156–169 u. 169–187° gewonnen. Aus der schwefelsauren Lsg. des Destillats konnte ein Pikrat, aus Ä. glänzende Prismen vom F. 145° isoliert werden, dessen Analysen auf *Dipiperazindipikrat* stimmen, dessen Einheitlichkeit aber zweifelhaft ist, da bei der Darst. abweichende Werte gefunden wurden. Bei der Oxydation mit KMnO_4 lieferten die daraus in Freiheit gesetzten Basen wiederum 2,5-Piperazinsäure. Sie sind also augenscheinlich 2,5-Dialkylpiperazine. Daneben wurde die Base durch den Geruch nachgewiesen, α -Picolinsäure konnte dagegen nicht gefunden werden. (Helv. chim. Acta 7. 1039–45. 1924. Zürich, Univ.) OHLE.

B. Levi und M. Faldino, Über die Reaktion der Diazoverbindungen mit den aromatischen Aminen. Um eine Skala der Kupplungsfähigkeit für die Diazogruppen kupplungsfähiger Stoffe zu gewinnen, wurde die Kupplung der Diazosulfanilsäure mit *Phenyl- α -naphthylamin* (I), *Phenyl- β -naphthylamin* (II), *2-Naphthylamin* (III), *β , β -Dinaphthylamin* (IV) u. *α , β -Dinaphthylamin* (V) in wässriger (a) u. salzsaurer (b) Lsg. untersucht. Mit I entsteht in beiden Fällen Verb. VI, da bei Red. mit Hydrosulfit das 1-Phenyl-1-4-naphthylendiamin vom F. 136–137 (vgl. WACKER, LIEBIGS Ann. 243. 306 [1888]) resultiert. — Ebenso liefert II in beiden Fällen die Verb. VII, wie die B. des α , β -Naphthophenazins vom F. 150 (vgl. WITT, Ber. Dtsch. Chem. Ges. 20. 1184) daraus u. von 2-Phenyl-1-naphthylendiamin vom F. 136–137 (vgl. ZINCKE u. LOWSON, Ber. Dtsch. Chem. Ges. 20. 1170) bei der Red. beweist. — Bei III liefern a u. b die Verb. VIII, die bei Red. mit Hydrosulfit reduziert zu 1-Naphthyl-1,4-naphthylendiamin (vgl. WACKER, l. c., Ber. Dtsch. Chem. Ges. 29. 859; C. 1916. I. 1069). Die letztgenannte Base hat keinen







bestimmten F., ihr *Acetyl*deriv. hat F. 219°. — IV kuppelt in *a* nicht, in *b* und



thyl-1,2-naphthylendiamin vom F. 242—243° (vgl. MATTHES, Ber. Dtsch. Chem. 23. 1333). — V gibt in *b* die Verb. X., in *a* aber XI. X ist gegen Erwärme verd. Säuren beständig u. gibt durch Red. das bisher nicht beschriebene 1-thyl-1,4-naphthylendiamin, XI dagegen hierbei das ebenfalls noch nicht beschriebene 2-Naphthyl-1,2-naphthylendiamin, mit verd. Säuren erwärmt das α, β -Dinaphthyl-1,2-naphthylendiamin, C₂₀H₁₆N₂, harzig, ohne scharfen F. *Acetyl*deriv. F. 180°. — 2-Naphthyl-1,2-naphthylendiamin, Nadeln (aus A.), F. 195° mit st. Rotfärbung. Gibt mit Phenanthrenchinon das Dinaphthylphenantrazoniumhydrat C₃₄H₂₈N₂·OH, dessen Nitrat (XII) aus der essigsäuren Lsg. nach Zusatz von HNO₃ sich langsam ausscheidet. *Acetyl*deriv. des Diamins, F. 291°. (Gazz. ital. 54. 818—26. 1924. Milano, R. Politemico.) SPIEGEL





Giacomo Panizzon-Favre, Untersuchungen über die Synthese des 2-Nitro-1-naphthochinons. Es wurde zunächst die Behandlung von Diacetyl- u. Dibenzyldiacetyl-1,4-dioxynaphthalin mit HNO₃ versucht. Die Acetylverb. lieferte nur α -Naphthochinon, die Benzoylverb. in essigsaurer Lsg. Phthalsäure u. Benzoesäure. a wurde in Anlehnung an eine Darst. von Nitrohydrochinon durch CONTARDI (I Lomb., Scienze e Lettere, Milano 1922) die Darst. aus 1,4-Bromnaphthylamin versucht, das in 3-Nitro-4-brom-1-naphthylamin verwandelt, dann diaziiert u. in Zers. der Diazoverb. in Nitro-1,4-dioxynaphthalin verwandelt werden sollte. Die Nitrierung des Bromnaphthylamins ließ sich indessen nicht bewirken. Eine weitere Möglichkeit schien das 2-Nitro-4-amino-1-oxynaphthalin zu bieten, das nach LEONARDI (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 8. 564) durch partielle Red. des 2,4-Dinitronaphthols (NH₄)HS entstehen soll. Hierbei wurde aber nur ein Gemisch einer kleinen Menge Reduktionsprod. mit viel unveränderter Dinitroverb. erhalten. *p*-Acetylamonaphthol gab bei Behandlung mit HNO₃ in Eg. statt des erhofften Nitroderivats 2,2'-Di-1,4-naphthochinon (vgl. WITT u. DEDICHEN, Ber. Dtsch. Chem. Ges. 3. 2664; C. 97. I. 290). Im Anschlusse an die Unterss. von ELBS (Journ. f. prakt. Ch. [2] 48. 179 [1893]) über Umwandlung von o-Nitrophenol unternehmen ersuchen an 2-Nitro- α -naphthol zeigten, daß dieses weder durch H₂CrO₄ noch durch H₂O₂ Persulfat oxydiert wird. — Durch Verseifung des Diacetyl-*p*-nitronaphthylendiamins (vgl. KLEEMANN, Ber. Dtsch. Chem. Ges. 19. 334) suchte Vf. dann das entsprechende Nitrodiamin zu gewinnen, das über die Tetrazoverb. die gesuchte Verb. hätte liefern sollen. Es gelang aber nur durch 95%ig. H₂SO₄ bei 70° ein C₂H₅O abzuspalten. Die erhaltene Monoacetylverb. hat Konst. I. Bei Ersatz des freien NH₂ durch Br über die Diazoverb. entsteht ein Bromnitroacetylnaphthylamin, das ebenso wie das durch Verseifung daraus erhältliche Bromnitronaphthylamin von den bekannten entsprechenden Verbb. mit Br in *m*-Stellung zum NO₂ verschieden ist, also Konst. II. haben muß. Das aus I. mit Fe u. Essigsäure erhältliche Reduktionsprodukt ist von dem bekannten 1-Acetyl-2,4-triaminonaphthalin (vgl. D. R. P. 151 768; C. 90. II. 274) verschieden, reagiert mit Phenanthrenchinon unter B. eines Kondensationsprod. (III.), ebenso mit β -Naphthochinon, hat also Konst. IV.; es läßt sich nicht in ein sehr beständiges Triacetylderiv. überführen. Das aus I. erhaltene 4-oxo-3-nitro-1-naphthylamin (entsprechend II.) konnte in Diazonitronaphthol übergeführt werden, aber bei der Zers. dieser Verb. entsteht unter Ersatz des NO₂ durch OH 2-Oxy- α -naphthochinon (vgl. DIEHL u. MERZ, Ber. Dtsch. Chem. Ges. 11. 314).

Es. zur vollständigen Verseifung von I. mit NaOH u. mit 30%ig. H_2SO_4 unter m. Druck führten nur zu B. von 1-Acetyl-amino-3-nitro-4-naphthol.



0 unter Abgabe des H_2O orangerot, F. 273° , unl. in W., A., Essigsäure. — *m*-3-nitro-1-acetylnaphthylamin, $\text{C}_{12}\text{H}_9\text{O}_3\text{N}_2\text{Br}$ (II.), kanariengelb, krystallin. (aus W.), F. 223° . — 4-Brom-3-nitro-1-naphthylamin, $\text{C}_{10}\text{H}_7\text{O}_2\text{N}_2\text{Br}$, rote Krystalle (aus W.), F. 132° . — 4-Chlor-3-nitro-1-acetylnaphthylamin, $\text{C}_{12}\text{H}_9\text{O}_3\text{N}_2\text{Cl}$, hellgelbe Krystalle (aus h. verd. A.), F. 223° . — 4-Chlor-3-nitro-1-naphthylamin, lebhaft rote Krystalle, F. 156° . — 1-Acetylamin-3,4-o-naphthylendiamin (IV.). Nadeln (aus W.), schmelzt unter Oxydation allmählich dunkelgrün, l. in A. u. Essigsäure, unl. in W., Ä. u. Chlf. — Triacetyl-1,3,4-triaminonaphthalin, $\text{C}_{16}\text{H}_{17}\text{O}_3\text{N}_3$, gelbliches Pulver, F. 301° , unl. in den gewöhnlichen Lösungsmitteln. — Acetylamin-3,4-bisphenanthrazin, $\text{C}_{26}\text{H}_{17}\text{ON}_3$ (III.), leicht gelbliche M., kein F. bis 325° . — Acetylamin-3-nitro-4-naphthol, $\text{C}_{12}\text{H}_{10}\text{O}_4\text{N}_2$, aus 3-Nitro-1-acetyl-p-naphthylendiamin durch Erhitzen mit 2,5%ig. NaOH-Lsg., gelbe Krystalle (aus A.), F. 238° (Zers.). (Gazz. chim. ital. 54. 826—44. 1924. Lausann, Univ.) SPIEGEL.

C. Shah, Kondensation von aromatischen Aminen mit Chloroform oder Tetra-
ohlenstoff in Gegenwart von feinverteiltem Kupfer. Vf. untersuchte systemat.
nw. von Cu-Pulver bei der Kondensation von Anilin, p- u. m-Toluidin, p-Amino-
n, p-Anisidin mit CCl_4 , Anilin u. Diphenylamin mit CHCl_3 bzw. CHBr_3 . Aus
i u. CCl_4 entsteht Diphenyl-p-aminobenzamidin, in 45% Ausbeute u. daneben
u 10–12% der entsprechenden Orthoverb. Die Konst. des Diphenyl-o-amino-
benzamidins, $\text{C}_6\text{H}_5\text{N}:\text{C}(\text{NHC}_6\text{H}_5)\text{C}_6\text{H}_4\cdot\text{NH}_2$ (o) (I), wird bewiesen a) durch seine leichte
Umwandlung mittels HNO_2 in ein 1:2:3-Phentriazinderiv. (II); b) durch Hydrolyse bzw. Überführung in Anthranil-
säure u. in KÖRNER'S 2-Methyl-3-phenyl-4-chinazolon. (Vgl.
Journ. f. prakt. Ch. [II] **36**. 155 [1887]); c) durch die
se aus o-Nitrobenzanilid. — Die Identität des Chinazolonderiv. wurde durch
se aus o-Aminobenzanilid bewiesen.



us p-Toluidin u. CCl_4 entsteht *Di-p-tolyl-amino-p-methylbenzamidin*, $\text{C}_7\text{H}_7\text{N} : (\text{C}_7\text{H}_7)\text{C}_6\text{H}_3(\text{NH}_2)(\text{CH}_3)$ (VII). Die gleiche Rk. tritt mit p-Anisidin ein; mit n-Phenol u. m-Toluidin wurden keine definierten Prodd. erhalten. — Aus p-Toluidin u. CHBr_3 bildet sich *Paraleukanilin* u. *Pararosanolhydrochlorid*, ein Beweis, daß die Kondensation zwischen dem C-Atom des CHBr_3 u. den C-Atomen des Aromats erfolgt. — *Diphenylamin* u. CHCl_3 ergeben *Triphenylparaleukanilin*.

ergaben nur Triphenylparaleukanilin, das mit Chloranil zu *Triphenylpara-*
seilin oxydiert wurde. Acridin entstand nicht (vgl. FISCHER u. KÖRNER, Ber.
 Chem. Ges. **17**. 101 [1884]). In einem Anhang weist Vf. nach, daß *o*-Amino-
nilid in 2 isomeren Formen existiert. Die α -Form schmilzt bei 117–118°,
 undet sich in wenigen Min. bei 120° in eine feste Masse, die bei 131° von
 schm. Aus CHCl_3 krystallisiert hauptsächlich die β -Form, aus vorsichtig
 gähltm Bzn. die α -Form in glitzernden, durchsichtigen Nadeln; beide Formen
 dieselbe Acetylverb., F. 177–178°. — Vf. erörtert dann eingehend die
 der Isomerie der vorher erwähnten verschiedenen gefärbten Di- u. Monohydro-
 de u. -sulfate der Benzamidine, kann sie aber nicht aufklären. (Journ. of the
 Inst. of Science **7**. 205–23. 1924. Indian Inst. of Sc. Bangalor.) TRÉNEL.


Julius Schmidt, *Aus der Alkaloidchemie der Neuzeit*. Überblick über die
 resen der Angosturaalkaloide *Cusparin* u. *Galipin*, des *Psicains*, über die
 von Bromcyan auf *Ocykodeinon* u. *Dihydrooxykodeinon*, sowie über die Einw.
 led.-Mitteln auf *Bromkodeinon*. (Süddtsch. Apoth.-Ztg. **64**. 484. 1924. Stutt-
 DIETZE.

Wolfgang Langenbeck, *Über die Isomerie zwischen Pilocarpin und i-Pilo-*
 1. Die Annahme von PINNER (Ber. Dtsch. Chem. Ges. **38**. 1510; C. **1905**.
 18), daß sich *Pilocarpin* u. *i-Pilocarpin* (I.) durch die Haftstelle der Seiten-
 am Imidazolring unterscheiden, wird dadurch widerlegt, daß die beiden *Jod-*
late verschieden sind. Das *i-Pilocarpinjodmethylat* krystallisiert u. hat den
 1°. Das bisher unbekannte *Pilocarpinjodmethylat*, dargestellt mittels CH_3J bei
 ist sirupös. — *Pilocarpinmethylchloroplatinat*, $\text{C}_{24}\text{H}_{38}\text{O}_4\text{N}_4\text{C}_6\text{Pt}$, aus angesäuertem
 orangefarbige Blättchen vom F. 223–224°. — *i-Pilocarpinmethylchloroplatinat*,
 2–225°. Mischung beider hat den F. 210°. — Zum Beweise, daß die Isomerie
 beiden Alkaloide im Bau der Seitenkette begründet ist, wurden sie der Oxy-
 durch Ozon unter möglichst milden Bedingungen unterworfen. 1%ig. Ozon
 sich in Chlf.-Lsg. bei 0° quantitativ an die $\text{C}=\text{C}$ -Bindung im Imidazolring
 Durch Zerlegung der Ozonide mit W. erhält man aus den beiden Alkaloiden
 verschiedene Prodd., das *Homopilopsäuremethylamid*, $\text{C}_9\text{H}_{15}\text{O}_3\text{N}$ (II.), aus A. glän-
 I. $\text{CH} \begin{array}{c} \diagup \text{CH} \cdot \text{CH}_2 \cdot \text{C} \begin{array}{c} \diagup \text{N} \cdot \text{CH}_3 \\ \diagdown \text{HC} = \text{N} \end{array} \end{array}$ $\text{C}_2\text{H}_5 \cdot \text{CH} \begin{array}{c} \diagup \text{CH} \cdot \text{CH}_2 \cdot \text{CO} \cdot \text{NH} \cdot \text{CH}_3 \\ \diagdown \text{CO} \end{array}$
 CO I. CH₂ HC=N >CH CO II. CH₂

Nadeln, F. 104° u. $\text{Kp}_{0.5}$ vom 215° (Badtemp.) an; $[\alpha]^{15}_{633} = +103,7^\circ$,
 $[\alpha]^{15}_{546} = +127,7^\circ$, $[\alpha]^{15}_{546} = +147,0^\circ$, $[\alpha]^{15}_{436} = +252,9^\circ$ ($\text{C}_2\text{H}_5\text{Cl}_4$; c = 3,47), ll.
 sigester u. Chlf., wl. in W. u. Ä., u. das *Homo-i-pilopsäuremethylamid*,
 $\text{C}_9\text{H}_{15}\text{O}_3\text{N}$ (II.), Öl, das bei 0,5 mm von 210° (Bad) übergeht u. erst dann nach
 em Stehen krystallin. wird. Aus A. mit W. Öl, das beim Impfen u. Reiben
 llisiert. Prismen, F. 53°, leichter l. als das Isomere. $[\alpha]^{15}_{633} = +74,5^\circ$,
 $[\alpha]^{15}_{546} = +93,9^\circ$, $[\alpha]^{15}_{546} = +104,9^\circ$, $[\alpha]^{15}_{436} = +173,5^\circ$ ($\text{C}_2\text{H}_5\text{Cl}_4$; c = 3,19).
 Amide spalten sich mit 2-n. HCl bei 100° in 1 Stde. u. B. von *Methylamin*
Homopilopsäure bezw. *Homo-i-pilopsäure*, beides mit Essigester extrahierbare Öle,
 ch nicht weiter untersucht wurden. Sd. Alkalien spalten gleichfalls CH_3NH_2
 Ber. Dtsch. Chem. Ges. **57**. 2072–76. 1924. Karlsruhe, Techn. Hochsch.) OHLE.

Buzicka, C. F. Seidel und Fr. Liebl, *Synthetische Versuche in der Chinin-*
 IV. Über die Gewinnung *phosphatischer Chinatoxine und monocyclischer China-*
und -carbinole. (III. vgl. Helv. chim. Acta **4**. 486; C. **1921**. III. 661.) Nach
 rüher beschriebenen Verf. wurde nur *Chininsäureester* mit dem *Lactam* der
capronsäure kondensiert, jedoch erreichte die Ausbeute an dem Prod. I nur
 er Theorie. Daher wurden statt des Lactams das ϵ -Benzoylaminocapronsäure-
 , ferner die entsprechenden *Aminosäureester* u. *Benzoylaminosäureester* an-

gewandt. Die Ausbeuten an Kondensationsprod. sind am größten, wenn das Amsäurederiv. möglichst neutralen Charakter hat, also bei Verwendung der benzoylierten Lactame. Durch diese Modifikationen werden die aliph. Chinatoxine ziemlich leicht zugänglich. Die daraus gewonnenen monocycl. Chinaketone sind recht beständig u. nicht krystallisierbar. Die entsprechenden Carbinole sind ebenfalls auf eines amorph.



Versuche. Bei der katalyt. Hydrierung des *N*-Methyl- α -pyridons in Et_2O auf Pt-Schwarz bei 70–80° sinkt die Aktivität des Katalysators nach einigen Std. auf unter $\frac{1}{10}$ der anfänglichen. Durch Schütteln mit Luft läßt sich nach dem von WILLSTÄTTER u. WALDSCHMIDT-LEITZ die Aktivität des Pt wieder auf das ursprüngliche Niveau heben, so daß es leicht gelingt, mit sehr kleinen Mengen große Portionen des Pyridons in einem Ansatz zu reduzieren. — γ -Chinolyl- α -methylpyrrolidyl]-keton, $\text{C}_{15}\text{H}_{15}\text{ON}_2$. Die früher gegebene Vorschrift zu seiner Herstellung wird wie folgt abgeändert: 20 g des Dibromhydrats des Bromketons **II** werden in 100 ccm A. bei -10° mit einer Lsg. von 2,95 g Na in 75 ccm A. portionsweise versetzt, wobei rasche Lsg., NaBr mit 1 l Ä. gefällt, filtriert u. bei -10° mit 100 ccm Äth. HCl versetzt; Nd. nach 24-std. Aufbewahren bei 0° abgesaugt. Ausbeute 2 g F. 120–130. Beim Auflösen in h. A. bleibt der Körper vom F. 300° zurück auf dem filtrierten Lsg. krystallisiert zuerst das früher beschriebene Chlorhydrat vom F. 185°. Aus der Mutterlauge mit Ä. nach einigen Zwischenfraktionen ein weiteres Chlorhydrat vom F. 100°. — γ -Chinolyl [α -*N*-äthylpyrrolidyl]-keton, $\text{C}_{16}\text{H}_{18}\text{ON}_2$. Es konnte kein krystallisierendes Chlorhydrat isoliert werden. Dipikrolonat, $\text{C}_{36}\text{H}_{34}\text{ON}_2$.


., F. 170—172° (Zers.). Red. des Ketons mit Al-Gries u. alkoh. Na ergab ein
 hes Prod. — γ -Chinolyl- $[\delta$ -benzoyläthylaminobutyl]-keton, $C_{23}H_{24}O_2N_2$ (III).
 12-std. Schütteln von Cinchoninsäureäthylester u. δ -Benzoyläthylamino-
 ensäureäthylester mit Na-Äthylat in Bzl., dann 24 Stdn. auf 65° entsteht in
 e Ausbeute von 58% der Ketoester IV, gelbbraunes, zähes Öl, das mit alkoh.
 C Rotfärbung gibt. Mit 20%ig. HCl (15 Stdn. bei 100°) geht er in III über,
 fast glasige, gelbe M. vom Kp. (Hochvakuum) 260°. Pikrat, $C_{20}H_{27}O_9N_5$, aus
 90—91°. — γ -[*p*-Methoxychinolyl]- $[\alpha$ -*N*-methylpyrrolidyl]-keton (V), aus dem
 Chlorhydrat des Bromketons Va mit alkoh. NaOH. Amorph, auch das Chlor-
 hydrat. Monopikrolonat, $C_{26}H_{26}O_7N_6$, hellgelbe Krystallmasse, aus A., F. 155—157°.
 Pikrolonat, $C_{36}H_{38}O_{12}N_{10}$, aus A. gelbes Pulver vom F. 155° (Zers.). — Dibrom-
 hydrat des γ -Chinolyl- $[\epsilon$ -amino- α -brompentyl]-keton, $C_{15}H_{19}ON_2Br_3$, aus γ -Chinolyl-
 amino- n -pentyl]-keton in HBr-Lsg. mit Br. Aus A. Pulver vom F. 185°. —
 des γ -Chinolyl- $[\alpha$ -piperidyl]-keton, dessen Isolierung nur in Form des Dipikrats
 u. Phenylhydrazons, $C_{33}H_{28}C_{14}N_{10}$, gelang, aus A. schmutzig gelbes Pulver vom
 1—180° (Zers.). — Ketoester VI aus Cinchoninsäureäthylester u. ϵ -Benzoyl-
 irapronsäureäthylester in Bzl. mit Na-Äthylat. Zähe, bräunlichgelbe M. Aus-
 17% der Theorie. Pikrat, $C_{31}H_{29}O_{11}N_5$, aus A., F. 153—154° Zers.). — Die
 nsation von Cinchoninsäureäthylester mit ϵ -Aminocaprinsäureäthylester liefert
 l., ein in Ä. l. u. ein in Chlf. l., beide zusammen in einer Ausbeute von
 1% der Theorie, von denen das l. ein Pikrolonat vom F. 187° (Zers.), das 2.
 krolonat vom F. 130—160° gibt. Bei der Verseifung beider mit 20%ig. HCl
 0° entstand das Dichlorhydrat des γ -Chinolyl- $[\epsilon$ -aminopentyl]-ketons, aus A.,
 C. — Aus Chininsäureäthylester u. ϵ -Aminocaprinsäurelactam wurde das Kon-
 s onspod. I, amorph, erhalten, das mittels w. HCl in γ -[*p*-Methoxychinolyl]-
 aminopentyl]-keton (Ia), gelbbraunes Öl, umgewandelt wird. Dipikrolonat,
 $C_{12}H_{12}N_{10}$, aus A. gelbes Pulver vom F. 229—230°. — Aus Cinchoninsäureäthyl-
 r. ϵ -Benzoylmethylaminocaprinsäureäthylester wurde Verb. VII gewonnen,
 elbe, amorphe M., die in A. mit $FeCl_3$ intensive Rotfärbung gibt. Ausbeute
 er Theorie. Pikrolonat, aus A. gelbes Pulver vom F. 110° (Zers.). Pikrat,
 $C_{11}H_{11}N_5$, aus A. gelbes Pulver vom F. 105° (Zers.). VII liefert bei der Ver-
 u mit 20%ig. HCl bei 140° γ -Chinolyl- $[\epsilon$ -methylaminopentyl]-keton, bei milder
 ung mit 10%ig. HCl bei 100° (10 Stdn.) das nicht krystallisierende γ -Chino-
 benzoylmethylaminopentyl]-keton, $C_{23}H_{24}O_2N_2$, im Hochvakuum bei ca. 250° un-
 ., zähe, gelbe M. — Dibromhydrat des γ -Chinolyl- $[\epsilon$ -methylamino- α -brompentyl]-
 $C_{16}H_{21}ON_2Br_3$, aus der zweitvorst. Verb. durch Bromierung in HBr-Lsg.,
 Pulver, F. 136°. — Daraus mittels $NaOC_2H_5$ γ -Chinolyl- $[\alpha$ -*N*-methylpiperidyl]-
 VIII, Öl, Chlorhydrat, F. 159—160°, Monopikrolonat, $C_{26}H_{26}O_6N_6$, aus A.
 ge Nadelchen vom F. 188—189°, Dipikrat, $C_{28}H_{26}O_{15}N_8$, aus A. gelbes Pulver
 145°. VIII gibt in A. mit $FeCl_3$ braunrote Lsg. — Aus VIII durch vor-
 t. Red. in alkoh. Lsg. mit Al-Grieß u. NaOH unter Kühlung mit W. γ -Chino-
 7-methylpiperidyl]-carbinol, $C_{16}H_{20}ON_2$, aus Ä. Pulver, F. 113—114°. Bei
 en Erhitzen im Glühröhrchen verkohlt es nicht im Gegensatz zum ent-
 enden Keton, sondern es dest. ein fast farbloses, zähes Öl. Mit $FeCl_3$ in A.
 gefärbten Nd. Dipikrat, $C_{28}H_{26}O_{15}N_8$, aus A. gelbes Pulver, F. 110° (Zers.).
 lonat, $C_{36}H_{36}O_{11}N_{10}$, aus A. gelbes Pulver, F. 179—180° (Zers.). — Red. von
 t Al-Amalgam in Ä. führt zu mehreren amorphen Prodd. Der Ä. enthält
 ringe Substanzmengen. Mit sd. A. wird dem Al die Hauptmenge der
 nsprodd. entzogen, die in Chlf. ll. sind, aber durch Aceton weiter getrennt
 können. Die in Aceton unl. Fraktion (ca. $\frac{2}{3}$ der Gesamtmenge) besteht
 heinlich aus dem Pinakon von VIII, $C_{32}H_{38}O_2N_4$, amorph. Dipikrat,
 $C_{16}N_{10}$, F. ca. 150° (Gasentw.), Zers. schon beim gelinden Erwärmen mit A.

— Aus Chininsäureäthylester u. ε -Benzoylmethylaminocaprinsäureäthylester der Ketoester IX bereitet, hellgelbes, zähes Öl, gibt starke FeCl_3 -Rk. u. ein Pikrat. Daraus mit sd. konz. HCl γ -[*p*-Methoxychinoly]-[ε -methylaminopentyl]-Dipikrat, $\text{C}_{29}\text{H}_{28}\text{O}_{16}\text{N}_8$, aus A. gelbes Pulver vom F. 145° (Zers.). — β -[β' -*N*-methyl α' -piperidonyl]-keton, aus Nicotinsäureäthylester u. *N*-Methyl- α -piperidonyl- β -[δ -Methylaminovaleriansäurelactam) mit NaOC_2H_5 in sd. PAe. (24 Stdn.). Helles Öl. Monopikrolonat, $\text{C}_{22}\text{H}_{22}\text{O}_7\text{N}_6$, aus A. hellgelbes Pulver vom F. 204 — 205° (Zers.). — Daraus durch mehrstd. Kochen mit konz. HCl β -Pyridyl- δ' -methylaminobutyryl-keton, gelbes Öl. Dipikrolonat, $\text{C}_{31}\text{H}_{32}\text{O}_{11}\text{N}_{10}$, aus A. gelbes Pulver vom F. 135° (Zers.). Dichlorhydrat, Pulver, unl. in A. — γ -[α -Phenylchinoly]- β -[*N*-methylaminobutyryl]-keton (X), aus α -Phenyleinchoninsäureäthylester u. *N*-Methyl- α -piperidonyl-Pulver vom F. 135° . Gibt mit FeCl_3 in A. Violettanfärbung. Monopikrat, $\text{C}_{29}\text{H}_{28}\text{O}_{16}\text{N}_8$, aus A. gelbes Pulver vom F. 174° . — Daraus mit sd. konz. HCl γ -[α -Phenylchinoly]-[δ -methylaminobutyryl]-keton, gelbbraunes Öl. Dichlorhydrat, $\text{C}_{21}\text{H}_{24}\text{N}_4\text{O}_8$, aus A. Pulver vom F. 110 — 120° .

Bei der Unters. der baktericiden Wrkg. einiger dieser Verb. ergab sich folgendes: Die Dichlorhydrate von Ib, VI, β -Pyridyl- u. γ -[α -Phenylchinoly]-[δ -methylaminobutyryl]-keton, ferner von $\text{C}_9\text{H}_6\text{N}\cdot\text{CO}\cdot(\text{CH}_2)_4\cdot\text{NH}\cdot\text{CH}_3$ (XI), $\text{C}_9\text{H}_5\text{N}\cdot\text{CO}\cdot(\text{CH}_2)_4\cdot\text{NH}\cdot\text{CH}_3$ (XII) u. $\text{C}_9\text{H}_6\text{N}\cdot\text{CO}\cdot(\text{CH}_2)_4\cdot\text{NH}_2$ (XIII) zeigen antipyrätische Panosomen u. Spirochäten in Nagana- u. Rekurrensmäusen keine nennenswerte baktericide Wrkg., gegenüber Colpidien nicht ganz die Hälfte der Toxizität des Chinins. Gegenüber Paramazien entfalten die Dichlorhydrate von VI, XI u. $\text{C}_9\text{H}_6\text{N}\cdot\text{CO}\cdot(\text{CH}_2)_4\cdot\text{NH}\cdot\text{C}_2\text{H}_5$ nur einen kleinen Bruchteil der Chininwirksamkeit, Ib u. XII gegen nahezu die gleiche Toxizität wie Chinin, während die antipyrät. Wrkg. gering ist. Das Chlorhydrat des γ -Chinoly-[α -*N*-methylpyrrolidyl]-ketons entfaltet gegenüber Paramazien etwa nur $\frac{1}{4}$ der Chininwirksamkeit. (Helv. chim. Acta 1925—1926, 8, 1012. Zürich, Techn. Hochschule.)


J. Gadamer, H. Dieterle, Anna Stichel, M. Theissen und K. Winterfeld.
Zur Kenntnis der Chelidoniumalkaloide. 3. Mitteilung. **K. Winterfeld.**
Bromchelidonin und die Oxydation des Chelidonins mit Mercuriacetat. (Vgl. Ber. der Pharm. 262, 249; C. 1924. II. 2586.) A. Bromchelidonin. Die auf Grund der Widerstandsfähigkeit des Bromchelidonins bei der Oxydation mit Mercuriacetat in essigsaurer Lsg. gehegte Vermutung, daß sich diese Base beim Hofmannschen Abbau n. verhalten werde, erfüllte sich nicht. Es zeigte sich, daß die Oxydation durch den zu ihrer Lsg. erforderlichen großen Überschuß von Eg. verhindert wird, wodurch das Gleichgewicht $(\text{CH}_3\text{CO})_2\text{Hg} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{HgO} + 2\text{CH}_3\text{COOH}$ nach links verschoben wird. Arbeitet man in alkoh. Lsg., so gelingt die Oxydation glatt. Da das Br im Bromchelidonin sehr fest haftet u. sich diese Base beim Abbau dem Chelidonin ganz analog verhält, kann das Br nicht in dem N-alkyl-Ringe stehen, sondern muß am Phenanthrenskelett haften. Das bei der Oxydation mit Mercuriacetat entstehende Didehydrobromchelidonin spaltet dagegen bei Erhitzen mit Zn u. H_2SO_4 zum größten Teil das Br ab. Durch die Einführung der Doppelbindung — höchstwahrscheinlich zwischen den C-Atomen 11 u. 12 — hat so das Br seine ursprüngliche Haftfestigkeit eingebüßt. Vff. nehmen daher an, daß die unmittelbare Nachbarschaft der Doppelbindung, also am C-Atom 7 steht. — Bromchelidonin liefert bei der Acetylierung in der Kälte eine rechtsdrehende Acetylverb., in der Siedehitze das opt.-inakt. *N*-Acetylanhydrobromchelidonin. Isomeres Methylat des Methylanhydrobromchelidonins (I) war gegen Lauge selbst bei heftigem Kochen beständig wie das entsprechende Deriv. des Chelidonins. Beim Abbau nach EMDE mit Na-Amalgam wird das Br teilweise entfernt. Die Trennung der beiden N-freien Abbauprodukte, sowie die völlige Entfernung des Br durch wiederholte Red. mit Na-Amalgam gelang nicht.

1. Der oxydative Abbau des Chelidonins mit Mercuriacetat. Da Oxydation des *Chelidonins* mit Mercuriacetat infolge gleichzeitig stattfindender Veresterung zum großen Teil verhindert wird, wurde das *Acetylchelidonin* für die Verss. verwendet. Man erhält dann unter Abspaltung der Acetylgruppe so das rechtsdrehende *Dehydrochelidonin*. Das as. C-Atom 9 bleibt also bei der Oxydation erhalten. Da *Dehydrochelidonin* bei der Red. mit Zn u. H_2SO_4 zu *Chelidonin* regeneriert, kann bei der Oxydation eine tiefgreifende Änderung der Struktur nicht eingetreten sein. Der Angriff des Oxydationsmittels kann also an Ring IV einsetzen, u. zwar an 2 Stellen; 1. am N-Atom u. dem ihm benachbarten C-Atom 12; 2. an den C-Atomen 11 u. 12. Im ersten Falle würde zunächst eine quaternäre Base II entstehen, die sich leicht in die Carbinolbase III überführen und dann H_2O abspalten kann zu IV, welche letztere auch im 2. Falle gebildet werden müßte. Beide Möglichkeiten führen also zu dem gleichen Ergebnis. Die 3. Möglichkeit, Oxydation am N-Atom u. C-Atom 13 kann wohl zu einer Carbinol-, nicht aber zu einer Anhydrobase führen, kommt also nicht in Betracht. — Das *Didehydrochelidonin* liefert nun aber wie *Chelerythrin* u. *Kotarnin* ein farbloses Cyanid, aus dessen k. alkoh. Lsg. AgNO_3 nur langsam AgCN ausfällt u. HCl erst in der Wärme HCN abspaltet. Mit CH_3J entstehen augenblicklich 2 Prodd., die über die Goldsalze, ein krystallisiertes u. ein amorphes, untersucht wurden. Die Zus. des ersten läßt auf eine Addition von CH_3J schließen. Das auffällige Verh. des *Dehydrochelidonins* ist vielleicht dem des *Dehydrochelinins* an die Seite zu stellen, das mit CH_3J neben echtem Jodmethylat ein am C methyliertes Prod. liefert. Die Analogie der N-haltigen Ringsysteme (nebenst. Formeln) legt diesen Vergleich nahe. Das reaktionsfähige H-Atom müßte in *Dehydrochelidonin* demnach am C-Atom 11 stehen. —



Das *Dehydrochelidonin* spaltet in sd. verd. A. leicht H_2O ab. — *Didehydroanhydrochelidonin* = *Dihydropseudochelerythrin*, durch Mercuriacetat zum *Pseudochelerythrin* oxydiert wird, in ihren Salzen eine quaternäre Ammoniumbase, die schon durch schwache Alkalien in eine farblose Carbinolbase übergeführt wird, augenscheinlich im Sinne der Formeln V u. VI. — *Pseudochelerythrin* besitzt eine außerordentlich große Fähigkeit, mit Alkoholen zu Äthern zusammenzukommen, die so weit geht, daß bei Abwesenheit von Alkoholen 2 Moleküle der Base selbst unter Ätherbildung miteinander reagieren. — Das *Pseudochelerythrin* verhält sich als ident. mit dem natürlich vorkommenden *Sanguinarin*, daher kommt es, daß in seinen Salzen die Formel $\text{C}_{20}\text{H}_{14}\text{O}_4\text{N}\cdot\text{X}$, nicht $\text{C}_{20}\text{H}_{16}\text{O}_4\text{N}\cdot\text{X}$, zu. Es enthält keine OCH_3 -Gruppe, im Gegensatz zu den Literaturangaben. Die abweichenden Befunde beruhen darauf, daß das aus der Pflanze isolierte Alkaloid ein Gemisch, bezw. ein gemischter Äther mit *Chelerythrin*, ist. Versuche. Die Verff. von HENTSCHE (Arch. der Pharm. 226. 643 [1888]) und WINTGEN (Arch. der Pharm. 239. 443 [1901]) eignen sich nicht zur Darstellung von Mengen von *Bromchelidonin*. Am zweckmäßigsten erwies sich folgendes: 2,5 g *Chelidonin* in 10%ig. H_2SO_4 wurden mit etwas mehr als der berechneten Menge Br-W. ziemlich rasch unter Umschütteln versetzt, das gelb ausfallende Perbromid durch Zn-Staub zerlegt, mit etwas A. bis zur völligen Lsg. erwärmt, filtriert, alkalisch gemacht, mit A. ausgeschüttelt, aus Chlf. u. der 3-fachen Menge A. extrahiert. Ausbeute 1,7 g *Monobromchelidonin*, $\text{C}_{20}\text{H}_{18}\text{O}_5\text{NBr}$, lange Nadeln vom Schmp. -231° , $[\alpha]_D^{15} = +135^\circ 4'$ (Chlf., c = 1,868). — *O-Acetylbromchelidonin*, $\text{C}_{22}\text{H}_{20}\text{O}_5\text{N}$, aus *Bromchelidonin* mit k. Acetanhydrid oder aus *O-Acetylchelidonin* mit H_2SO_4 mit Br-W., Bindung des Br-Überschusses durch Zn u. Ausschütteln mit Chlf. ergibt ein sehr unreines Prod. Aus CH_3OH Nadelchen vom Schmp. $150-152^\circ$, $[\alpha]_D = +131^\circ 4'$ (Chlf.). Wird durch w. 2-n. alkoh. KOH leicht

u. vollständig verseift. — *N*-Acetyl*bromchelidonin*, $C_{22}H_{18}O_5NBr$, aus Bromchelidonin mit sd. Acetanhydrid in Ggw. von Na-Acetat. Aus A. warzenförmige Krystall vom F. $170-172^\circ$, fast unl. in W.; opt.-inakt. Das gleiche Prod. entsteht O-Acetylchelidonin bei derselben Behandlung. Die Acetylgruppe wird von alkoh. KOH bei 100° in 4—5 Stdn. noch nicht abgespalten, ebensowenig durch Wasserdampfdest. in Ggw. von H_3PO_4 oder durch Kochen mit MgO. Es wird weder von $POCl_3$ bei 100° , noch von PCl_5 in Chlf. bei Zimmertemp. angegriffen. Auch bei Red.-Verss. mit Na-Amalgam oder mit amalgamiertem Zn nach CLEMENSEN blieb es unverändert. Es ist sehr schwer vollständig verbrennbar. Bei der Verbrennung auf nassem Wege nach FRITSCH wurden richtige Analysenzahlen erhalten. Durch 10-tägiges Kochen mit 12,5%ig. wss. alkoh. HCl wird die Acetylgruppe abgespalten. Das erhaltene *Anhydrobromchelidonin* scheidet sich aus Ä. gelatinös ab. Ist eine starke (sekundäre) Base. *Chlorhydrat* firnisartig. Die Base gibt mit CH_3J in Aceton ein krystallisiertes *Jodmethylat*. Das daraus gewonnene *Methylanhydrobromchelidonin* wurde wiederum in Acetonlsg. in sein kristallisiertes *Jodmethylat* verwandelt, das von h. konz. NaOH nicht gespalten wird. Das aus dem Jodmethylat bereitete leichter l. *Acetat* zerfiel durch Einw. von Na-Amalgam in Trimethylamin u. in ein Gemisch von 2 N-freien Verbb. $C_{19}H_{14}O_4$ u. $C_{19}H_{14}O_4$ vom F. $127-131^\circ$, das sich jedoch nicht weiter trennen ließ.



B. Oxydation des Acetylchelidonins und seine Überführung in Pseudochelerythrin. *Acetylchelidonin* wurde aus Chelidonin durch 148

von k. Acetanhydrid dargestellt. Bei der Oxydation desselben mit Mercuri-
et in verd. Essigsäure (14 Tage bei Zimmertemp.) erhält man unter Abspaltung
r. cetylgruppe als Hauptprod. *Didehydrochelidonin*, farblose firnisartige M., *Brom-*
idat, $C_{20}H_{17}O_5NHBr$, aus A. derbe, gelbe Nadeln, $[\alpha]_D = +412,4^\circ$ (95%ig. A.;
= 0,999). Daneben wurden geringe Mengen roter Nadeln gefunden, die sich als
t. akt. erwiesen. — *Didehydrochelidonincyamid*, $C_{20}H_{15}O_5N_2$, aus 96%ig. A. kleine,
lose Krystalle vom F. 194–196°, $[\alpha]_D = +153,3^\circ$ (96%ig. A.; $c = 0,7342$)
1,2° (Chlf.; $c = 0,8933$). — *Goldsalz des Methylididehydrochelidonin*, $C_{20}H_{17}O_5N$.
11·AuCl₃, aus A. rotbraune Krystallbüschel vom F. 176° (Zers.). — *Anhydrodi-*
hydrochelidonin = *Dihydropseudochelerythrin*, $C_{20}H_{15}O_4N$, aus Didehydrochelidonin
d. verd. A. Kryställchen vom F. 187–188°, wl. in A. Besitzt kaum bas.
schaften, läßt sich aus verd. HCl mit Chlf. ausschütteln. — *Pseudochelerythrin*,
Oxydation der vorst. Verb. mit Mercuriacetat in schwach essigsaurer Lsg.
gelinder Erwärmung. Aus Ä., F. 239–242° (Zers.). — *Pseudochelerythrin-*
idat, $C_{21}H_{14}O_4N_2$, aus Chlf. mit A. farblose Kryställchen vom F. 237,5–238°, be-
steine bas. Eigenschaften, unl. in W., wl. in A. Mit AgNO₃ nur in der Hitze
eige Abscheidung von AgCN. Wird von k. verd. Mineralsäuren nicht verd.
— *Pseudochelerythrinchlorhydrat*, $C_{20}H_{13}O_4N \cdot HCl \cdot 3H_2O$, aus konz. HCl lange
at, blut- bis kupferrote Nadelchen, ll. in W. u. A.


Oxydation des Monobromchelidonins mit Mercuriacetat. *Monobrom-*
chelidonin liefert bei der Oxydation mit Mercuriacetat in sd. A. *Didehydrobrom-*
chelidonin, ohne daß Eintritt von Hg in die Base erfolgt. *Bromhydrat*, dunkel ge-
b. amorphe M., goldgelb l. in A. $[\alpha]_D = +307,8^\circ$ (A.). — *Didehydrobrom-*
chelidonincyamid, $C_{21}H_{17}O_5N_2Br$, aus 96%ig. A. Krystalle vom F. 178–183°; $[\alpha]_D =$
5° (A.; $c = 1,0827$). Verhält sich gegen Säuren u. AgNO₃ wie die Br-freie
— *Anhydrodidehydrobromchelidonin* = *Dihydrobrompseudochelerythrin*, $C_{20}H_{14}O_4$.
aus vorst. Verb. mit sd. verd. A., aus Chlf. mit A. krystallin. Nd. vom F. 206
70° (Zers.). Ist gegen HCl indifferent; opt.-inakt. Bei der Oxydation mit
riacetat in sd. alkoh. Lsg. entsteht daraus *Brompseudochelerythrin*, das jedoch
wenig wie sein *Cyanid* krystallisiert erhalten werden konnte. Das letztere
sicht in seinem Verh. ganz dem Pseudochelerythrinicyamid.

I. Anna Stichel, Über das Chelerythrin und Sanguinarin. Es gelang, die In-
tenität des als Sanguinarin beschriebenen Alkaloids von Chelidonium majus
zuweisen u. dasselbe in seine 2 Bestandteile, *Chelerythrin* u. *Pseudochelerythrin*,
zulegen. Vff. gebrauchen nunmehr den Namen Sanguinarin nur für das reine,
chelerythrin freie Alkaloid synonym mit Pseudochelerythrin. Sanguinarin hat
nach die Zus. $C_{20}H_{14}O_4N \cdot X$ (X ist ein Anion). Die von KARRER als Carbonyl-
bedeuteten Umsetzungen des Chelerythrins u. Sanguinarins beruhen auf dem
Übergang dieser Alkaloide in Carbinol- oder vielleicht auch Aldehydbasen
dem Berberin. — Die durch Einw. von *Magnesiumhalogenalkylen* auf diese
eide entstehenden Verb., von KARRER *Chelalbine* genannt, sind lediglich
Chelerythrine, bezw. *Alkyldihydrosanguinarine*. Sie sind gegen Oxy-
mittel beständiger als die Muttersubstanzen. Mercuriacetat wirkt auf sie
oxydierend, sondern mercurierend. Da speziell Verb. mit tertiär gebundenem
stoff leicht organ. Hg-Derivv. liefern, nehmen Vff. für die Chelalbine
VII an. KMnO₄ oder Dichromat in h. saurer Lsg. führen in schlechter
te zu *Alkylchelerythrin*. Die Oxydation geht jedoch dabei leicht weiter
Aufsprengung des Ringsystems. Am besten gelingt die Oxydation in verd.
HCl mit HAuCl₄. — Bei der Zn-Staubdest. liefern Chelerythrin u. Sangui-
die gleiche Verb. $C_{18}H_{17}N$, wahrscheinlich VIII. Die schwach bas. Eigen-
an dieses Körpers erinnern an das Methylindol bezw. Dihydromethylindol.
ersuche. Das Ausgangsmaterial, ein Gemisch von Chelerythrin u. San-

guinarin, wurde aus den eingedickten Mutterlaugen, die bei der techn. Darstellung von Chelidonin anfallen, über die Pseudocyanide gewonnen. Zur Reinigung wurden diese in Chlf. + A. mit rauchender HCl gespalten u. nochmals in die Pseudocyanide zurückverwandelt. Die Trennung dieses Gemisches in Chelerythrin u. Sanguinarinecyanid durch fraktionierte Krystallisation ist äußerst mühsam u. nur zu reinem Chelerythrin, während das Sanguinarinecyanid nur bis zu 1% OCH₃-Gehalt von 4% gereinigt werden konnte. Das aus diesem Präparat gewonnene rohe Sanguinarin konnte mit *d*-Weinsäure weiter zerlegt werden. Zur Krystallisation des Chelerythrinbitartrats in derben gelben Nadeln, die aber bei geringen Gehalt an Chelerythrin von einem voluminösen Brei blutroter Nadelchen des leichter l. Sanguinarinbitartrats eingehüllt sind. Man löst u. vorsichtiges Erwärmen diesen roten Brei, filtriert von den gelben Nadeln u. wäscht holt dieses Verf., bis das Prod. methoxylfrei ist. Aus A.-freiem Ä. umgelöst, erhält man reines Sanguinarin den F. 242—243°, wenn es vorher ca. 5 Min. auf 225—230° gehalten worden ist. Bei schnellem Erhitzen steigt der F. bis auf 266°. In A.-haltigen Lösungsmmm. umgelöst zeigt es den F. 195—197° (Alkoholat). Die Krystalle des reinen Sanguinarins sind nicht blutrot, sondern kupferrot. Die wss. Lsg. des Chlorids hat die Farbe einer Dichromatlg. — Die Einw. von Alkylmagnesiumhalogeniden auf freies Chelerythrin führt nur in sehr schlechter Ausbeute zu den Dihydrochelerythrinen. Gute Resultate erhält man dagegen mit Chelerythrinchlorid. Die Alkylchelalbine fallen bei der Zers. des Rk.-Gemisches mit HCl aus u. krystallisieren aus Chlf. mit A. in Würfeln oder Nadeln, ll. in Eg. u. Essigester. — *Isobutyrylchelalbin* = *Methyl-dihydrochelerythrin*, C₂₁H₁₈O₄NCH₃, F. 206°. Ist gegen BAYLIS-Reagens beständig. — *Äthylchelalbin*, aus einem Gemisch von Chelerythrin-Sanguinarinchlorid, F. 209°. — *Phenylchelalbin*, C₂₁H₁₈O₄N·C₆H₅, F. 236°. Erscheint dann gelb l. in Eg. *Goldsalz*, C₂₁H₁₈O₄N·C₆H₅·HCl·HAuCl₄. Wendet man einen Überschuß von HAuCl₄ an, so erhält man das *Goldsalz des Phenylchelerythrins*, C₂₁H₁₈O₄N·C₆H₅·HAuCl₄, vom F. 220—224°. — Die *Zinkstarubdest.* des Chelerythrin-Sanguinarin-Gemisches wurde in einem mit Bimssteinzink gefüllten Rohr bei 100° im Rotglut ausgeführt. Für jede Dest. wurden nur 1—2 g verwendet. Dauer 2 St. Es setzt sich eine krystallin. gelbe M. ab, die mit HCl extrahiert, mit NH₃ versetzt u. ausgeäthert wurde. Aus A. umgelöst, hatte die Base C₁₈H₁₇N den F. 136°. In Lsgg. in Ä. u. A. fluorescieren blau. Unl. in W. Mit konz. H₂SO₄ schmutzgrün. Chlorid wl. gelbliche, derbe Nadeln. *Goldsalz*, C₁₈H₁₇N·HAuCl₄, derbe Krystalle vom F. 196°. Ein anderes einmal umgelöstes Präparat vom F. 194° hatte die Z. (C₁₈H₁₇N)₂HCl·HAuCl₄. Pikrat, gelbe Nadeln vom F. 235°. (Arch. der Pharm. 2. 452—500. 1924. Marburg, Univ.)

Shoji Osada, Versuche zur Umwandlung von Alkaloiden der Aporphinreihe in Alkaloide der Chelidoninreihe. (Vgl. vorst. Ref.) Die von GADAMER u. seinen Mitarbeitern vorgeschlagene Formel I für Chelidonin rückt die Alkaloide dieser Gruppe in nahe Beziehung zu den Alkaloiden der Aporphingruppe vom Typ II, insbesondere deshalb, weil die B. von gleichsubstituierten Vertetern beider Reihen aus denselben Ausgangsmaterialien, substituierter Phenylacetaldehyd u. substituiertes Phenylamin möglich erscheint, mit dem Unterschied, daß im 1. Falle noch 1 Mol. Formaldehyd in die Rk. eintritt. Derartige Synthesen werden in der Pflanzenchemie benommen u. durch das Schema auf folgender Seite veranschaulicht.

Diese Zusammenhänge legten den Vers. nahe, Aporphinalkaloide in solche vom Typ des Chelidonins umzuwandeln u. zwar durch Aufspaltung des N-enthaltenden Ringes u. Kondensation des entstehenden substituierten Phenanthryl-äthylamins mit Formaldehyd. Die Ringspaltung wird nun zwar leicht durch Säurewirkung bewirkt, Ggw. von NaOH bewirkt, jedoch hatten bereits GADAMER u. KNOCH (Arch. Pharm. 259. 147; C. 1921. III. 1027) gezeigt, daß es sehr schwierig ist, die



C_2H_5 gewonnenen Urethane zu den sekundären Aminen abzubauen, ohne die Phenoläthergruppen dabei in Mitleidenschaft gezogen werden. Um zu spaltbaren Verbb. zu gelangen, wurde die Ringsprengung von Bulbocapnin u. Corydinmethyläther mit SOCl_2 , COCl_2 u. PCl_5 versucht, jedoch ohne Erfolg. Mit Benzolsulfochlorid wurden zwar gut definierte Prodd. erhalten, doch ließ die Abspaltung der Benzolsulfogruppe nicht ohne völlige Zerstörung desamins ausstellen, obgleich *Benzolsulfoethylphenyläthylamin*, $\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_2\cdot\text{CH}_2\cdot\text{N}(\text{CH}_3)\cdot\text{C}_2\text{H}_5$, von 35%ig. HCl bei $130-140^\circ$, von 25%ig. HCl bei $145-155^\circ$ glatt abgespalten wird. Auch die mit $\text{Cl}\cdot\text{CO}_2\text{CH}_2\cdot\text{C}_6\text{H}_5$ dargestellten Urethane ließen sich mit Säuren nicht zu den entsprechenden Aminen abbauen. Dagegen gelingt es Schritt mit alkoh. KOH u. zwar am besten bei dem Benzylurethan bei $125-135^\circ$, bei dem Äthylurethan bei $150-160^\circ$. Die Ausbeuten an Amin sind in allen Fällen schlecht, noch schlechter aber bei der Benzolsulfoverb. — Die Kuppelung so gewonnenen Amine mit CH_2O nach PICTET führte zu keinem greifbaren Resultat. Aus Phenyläthylamin u. CH_2O wurden nach dem Verf. von TROUSSEAU (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 44. 2034; C. 1911. II. 967) statt 50% nur 10% N-Methylphenyläthylamin erhalten, aus N-Methylphenyläthylamin überhaupt kein N-Methyltetrahydroisochinolin, sondern nur geringe Mengen eines anderen Körpers in unverändertem Ausgangsmaterial.

Versuche. *Carbäthoxybulbocapninmethyläther*, $\text{C}_{20}\text{H}_{20}\text{O}_4\text{N}\cdot\text{CO}_2\cdot\text{C}_2\text{H}_5$, wurde durch Methylierung von Bulbocapnin, am besten mit CH_3I , in statu nascendi, u. nachfolgende Behandlung mit $\text{Cl}\cdot\text{CO}_2\text{C}_2\text{H}_5$. II. Durch Reaktion von $\text{Cl}\cdot\text{CO}_2\text{C}_2\text{H}_5$ auf Bulbocapnin, wobei in quantitativer Ausbeute das opt. aktive *Carbäthoxybulbocapnin*, nicht der am Phenol-OH substituierte Kohlensäureester, entstand. F. 153° . Seine Lsgg. fluorescieren blau. Daraus mit $(\text{CH}_3)_2\text{SO}_4$ u. wss. Alkali, der Methyläther vom F. $94-95^\circ$. — *Benzolsulfobulbocapninmethyläther*, $\text{C}_{26}\text{H}_{25}\text{O}_6\text{NS}$, aus 96%ig. A. feine Nadeln vom F. $125-126^\circ$. — *Carbäthoxybulbocapninmethyläther*, $\text{C}_{23}\text{H}_{27}\text{O}_6\text{N}$, aus Bzl. mit PAe., dann aus A. Nadeln vom F. 192° . Das durch Hydrolyse mit 2-n. alkoh. KOH gewonnene Amin $\text{C}_{20}\text{H}_{21}\text{O}_4\text{N}$ als Chlorhydrat isoliert, aus CH_3OH mit Ä. Nadeln vom F. $190-192^\circ$, II. A. Chlf., W., unl. in Ä., Bzl., k. verd. HCl . — *Carbäthoxycorydin*, $\text{C}_{21}\text{H}_{22}\text{O}_4\text{N}$, aus 96%ig. A., Nadeln vom F. 117° , opt. inakt. — *Carbäthoxycorydinmethyläther*, $\text{C}_{24}\text{H}_{26}\text{O}_6\text{N}$, aus PAe. feine Krystalle vom F. 95° , zl. in Chlf., A., Bzl., unl. in Ä., unl. in W. Die Lsgg. fluorescieren blau. — *Corydinmethyläther*,

$C_{21}H_{25}O_4N$, hellgelber, dicker Sirup. — Das Verseifungsprod. der Carbäthoxyverb. lieferte ein *Chlorhydrat*, $C_{21}H_{25}O_4N \cdot HCl$, aus CH_3OH mit Ä. monokline Krystalle vom F. 205—206°, ll. in W., Chlf., A., wl. in verd. HCl, fast unl. in Ä. u. PAe. — *Benzolsulfocorydin*, $C_{26}H_{27}O_6NS$, aus 26% ig. A. kleine, glänzende Blättchen vom F. 161°. — *Benzolsulfocorydinmethyläther*, $C_{27}H_{29}O_6NS$, aus Bzl. tafelförmige Krystalle vom F. 132—133°, ll. in Chlf., A., wl. in Ä., W. — *Carbbenzoxycorydin*, amorph, durchweg ll. — *Carbbenzoxycorydinmethyläther*, Sirup. — *Benzylidenphenyläthylamin*, $C_{15}H_{15}N$, aus Benzaldehyd u. Phenyläthylamin unter Wärmeentw. i. Temp. stieg auf 55°. W. u. unverändertes Ausgangsmaterial im Vakuum bei 0° entfernt. Aus Bzl., dann aus 96% ig. A. Krystalle, F. 36°, ll. in Ä., Chlf., Bzl., wl. in W. — *Benzylidenmethylphenyläthylammoniumjodid*, $C_{16}H_{18}NJ$, aus vorstehender Verb. mit CH_3J in trockenem Ä. Blättchen vom F. 145—147°. — *Goldsalz*, $C_{16}H_{17}AuCl_4$, glänzende Blättchen vom F. 151°. — *N-Methylphenyläthylamin*, $C_9H_{13}N$, aus vorstehender Verb. durch Hydrolyse mit konz. HCl. *Chlorhydrat*, Krystalle vom F. 150—152°, *Quecksilberdoppelsalz*, F. 172°. Die Ausbeute ist nach diesem Verfahren unbefriedigend. — Bei der Kondensation mit Methylal u. folgender Red. mit konz. HCl wurde ein Prod. erhalten, dessen *Chlorhydrat* den F. 185° zeigte, *Quecksilberdoppelsalz*, F. 154—157°, *Goldsalz*, F. 120—121°, das also nicht ident. ist mit N-Methyltetrahydroisochinolin. (Arch. der Pharm. **262**. 501—17. 1924. Marburg i. H.)

Ch. Dhéré, A. Schneider und Th. van der Bom, Über die Fluoreszenz einiger Metallverbindungen des Hämatoporphyrins. (Vgl. C. r. d. l'Acad. des sciences **9**. 351; C. **1924**. II. 1594.) *Zn-Salz des Hämatoporphyrins* dargestellt aus ammoniakal. Lsg. + $Zn(OH)_2$, mit Essigsäure gefällt, nach Trocknen in absol. A. gel., zeigt starke orangegelbe Fluoreszenz eine Lsg. 1 : 50000 hatte (45 Sek. Exposition) ein Fluoreszenzspektrum zwischen 636—579 $\mu\mu$ mit einer Bande bei 636—616 $\mu\mu$ einer zweiten bei 583—579 $\mu\mu$; bei 90 Sek. Exposition waren die analogen Werte 637—576, 637—616, 587—576; bei 3 Min.: 644—572, 644—615, 592—572; bei 6 Min.: 645—572, 645—615, 593—572; bei 12 Min.: 648—569, 648—614 u. 594—569 $\mu\mu$. Die erste Bande der letzten vier Spektren zeigt bei ca. 626—621 $\mu\mu$ ein deutliches Minimum. — *Sn-Verb.* Dargestellt aus essigsaurer Lsg. + $SnCl_2$, mit W. verd. Lsg. wird mit Chlf. ausgeschüttelt, Rückstand der Chlf.-Lsg. in A. gel., Lsg. in A. resciert orangegelb; Fluoreszenzspektrum einer Lsg. 1 : 20000 bei 45 Sek. Exposition zwischen 636—576, eine Bande bei 635—627 $\mu\mu$; bei 90 Sek. 637—576, 1. Bande 635—627, 2. Bande von 583 ab; bei 3 Min.: 642—573, 1. Bande 636—627, schwach bei 627—620, 2. Bande 585—576; bei 6 Min.: 649—568, 1. Bande bei 644—620 schwache bei 620—614, 2. Bande 587—574; bei 12 Min.: 654—567; 1. Bande 648—613, 2. Bande 590—572 $\mu\mu$ bei den beiden letzten Spektren war ein sehr deutliches Maximum um 603 $\mu\mu$ feststellbar. — *Pb-Verb.*, dargestellt nach MILLON (Biochemical Journ. **12**. 318; C. **1919**. I. 856), fluoresciert in alkoh. Lsg. orangegelb. — *Cd-Verb.* fluoresciert orange. (C. r. d. l'Acad. des sciences **179**. 1356 58. 1924.)

HABERLAND.

R. O. Herzog, Über Konstitution von Proteinkörpern. Die Ansicht, zuletzt von ABDERHALDEN (S. 89 u. Naturwissenschaften **12**. 716; C. **1924**. II. 1926) jetzt allgemein angenommen ist, daß „Eiweiß eine Zusammenfassung von untereinander mittels Nevalenzen assoziierten Komplexen ist“, ist bereits von Vf. u. anderen vorher ausgesprochen worden. (Ztschr. f. physiol. Ch. **141**. 158—60. 1924.)

SPIEGEL.

Max Lüdtke, Proteinstudien. IV. Über die hydrolytische Spaltung von 2,4-Diaminoketopiperazinen und Dipeptiden. (Vgl. HERZOG u. KOBEL, Ztschr. f. physiol. Ch. **134**. 296; C. **1924**. II. 50.) Nachdem BRILL (LIEBIGS Ann. **434**. 204; C. **192**. I. 1546) durch Röntgenunters. ein Anhydrid aus Glycin u. Alanin in dem kristallisierten Anteil der Seide wahrscheinlich gemacht hat, sollte jetzt quantitativ festgestellt werden.

lt werden, wie schnell u. bis zu welchem Grade 2,5-Diketopiperazine bei Hydrolyse durch Säuren u. Alkalien gespalten werden. Untersucht wurden *Glycinanhydrid*, *Glycylalaninanhydrid*, *Phenylalanylglycinanhydrid* u. die entsprechenden Peptide, meist bei 37°, in einigen Fällen bei Siedetemp. Der Grad der Hydrolyse wurde durch Messung der freigewordenen NH_2 -Gruppen nach SÖRENSEN oder VAN SLYKE bestimmt. Beide Methoden geben in reinem W. übereinstimmende Werte, ebenso bei Spaltung in alkal. Lsg.; bei Spaltung in saurer Lsg. treten dabei teilweise erhebliche Differenzen auf. Vf. bevorzugt deshalb das Verf. von VAN SLYKE. Aus dem tabellar. Auszug der Versuchsergebnisse zeigt sich, daß in jedem Falle, selbst in Monaten, vollständige Umsetzung zu Aminosäuren eintrat. Es kommt vielmehr ein Stillstand der Spaltung zustande, gleichgültig, welche Konz. des Spaltmittels oder welche Temp. angewandt wurde. Die Aufspaltung der Diketopiperazine war vollständig (Ausbleiben der Rk. mit Pikrinsäure u. Na_2CO_3 -Lösung). Der Stillstand tritt also bei der Rk. Dipeptid $\rightarrow$ Aminosäure ein. Neutralisierungsreaktionen haben keinen merklichen Einfluß, sauer oder alkal. wirkende einen solchen, wie ihn ihre Rk. erwarten läßt. In alkal. Lsg. erfolgt allgemein die Aufspaltung der Diketopiperazinen u. Dipeptiden schneller als in saurer. Hydrolysiert man Anhydride bei Kochtemp. u. analysiert dann sowohl unmittelbar nach schnellem Abkühlen als auch nach 24 Stdn., so findet sich bei der zweiten Best. ein Rückgang der NH_2 -Gruppen bis zu 4%. Auch wenn man Aminosäuren in Säuren oder Alkalien löst, zieht sich nach mehrtägigem Stehen unter Wärme ein geringer Teil der NH_2 -Gruppen dem Nachweis. Dies steht in Beziehung zu den Mitteilungen von ZELINSKI u. SSADIKOW (Biochem. Ztschr. **141**. 97; C. **1924**. I. 164. Vgl. dazu auch ERHALDEN u. SCHWAB, Ztschr. f. physiol. Ch. **136**. 219; C. **1924**. II. 2459). Der Verlauf der Spaltungskurven läßt erkennen, daß der Umsatz bis zu ca. 50% des gesamten theoret. möglichen B. von NH_2 -Gruppen erheblich schneller verläuft als der weitere. Dies wird so gedeutet, daß die Aufspaltung des Diketopiperazins in Aminosäuren teilweise verläuft, diejenige zum Dipeptid schneller als die von Dipeptid zu Aminosäuren. Bei der gewöhnlichen Art der Eiweißhydrolyse wird ein erheblicher Teil der vorgebildeter Diketopiperazine bis zu ihrer Isolierung aufgespalten sein, wenn primär nicht in einer Form vorhanden sind, die widerstandsfähiger ist als die in der Verb. (Ztschr. f. physiol. Ch. **141**. 100—104. 1924. Dahlem, Kaiser WILHELM-Inst. f. Faserstoffchem.)

SPIEGEL.


David M. Greenberg und **Carl L. A. Schmidt**, *Studien über die Bildung und Umwandlung von Verbindungen des Caseins mit Alkali*. I.—III. Mitt. I. Die Überführungszahlen von Alkalicaseinatlösungen. Vf. untersuchen die elektrolyt. Abwanderung des Caseins aus seinen Lsgg. in Alkali u. bestimmen die Überführungszahlen dieser Lsgg.; als Träger des elektr. Stromes nehmen Vf. Alkalikationen u. Anionen an. Der Betrag des abgeschiedenen Caseins ist genau der Strommenge proportional, die durch die Lsg. hindurchgegangen ist; das Faradaysche Gesetz gilt also auch in diesem Falle. Da die Ionisierungseigenschaften der verschiedenen Funktionen des pH sind, wurde der pH während der Unters. durch unverschiebbare Elektroden konstant gehalten, Kathode aus Pb mit einer PbO_2 -Schicht, Anode aus Pt. Die benutzte Zelle ist der von WASHBURN (Journ. Americ. Chem. Soc. **31**. 322; C. **1909**. I. 1735) benutzten ähnlich. — Casein wurde durch Best. des Gesamtgehaltes eines Teiles der Lsg. bestimmt u. von dem erhaltenen Werte der in Lsg. befindliche Alkali subtrahiert. Letzteres wurde mit $\frac{1}{20}$ -n. Trichloroessigsäure titriert, wobei das Casein selber als Indicator fungierte, da es beim elektr. Punkt ausfällt. Diese Methode ist bei allen Proteinen, die bei ihrem elektr. Punkt unl. sind, anwendbar. — Das elektrochem. Äquivalent Q schwankt mit dem Alkaligehalt der Caseinlsgg. Es besteht die Beziehung: $Q \cdot B = K$ (Q in Faraday, $B = \text{cem } \frac{1}{10}$ -n. Alkali per g Casein). Die Konstante K ergibt sich




zu 9,6 für NaOH. Die Überföhrungszahlen werden bestimmt bei den Lsgg. Caseins (erste Zahl Caseinanion, zweite Alkalikation) in: NaOH 0,45, 0,55; KOH 0,36, 0,65; RbOH 0,355, 0,645; CsOH 0,334, 0,666. Q ist demnach dem mit Casein verbundenen Alkalibetrag umgekehrt proportional, da in den benutzten Lsgg. das Gesamtalkali als an Casein gebunden betrachtet werden kann. — Der Verlust an Casein ist nur beim K-Caseinat an der Anode doppelt so groß wie an der Kathode (vgl. ROBERTSON, HAAS, Journ. Physical Chem. 15. 521. 22. 520; C. 1911. II. 1921. III. 1092), bei den anderen Alkalicaseinaten ist das Verhältnis anders. Beim rac. Casein ist die Beweglichkeit des Ions ungefähr 20% geringer als beim gewöhnlichen Casein. Die Überföhrungszahl der Lsgg. in NaOH ist 0,390, in KOH 0,318 (rac. Caseinanion). — Das Äquivalentgewicht des Caseins wird zu 15 berechnet in guter Übereinstimmung mit dem von COHN u. HENDRY (vgl. Journ. Gen. Physiol. 5. 521; C. 1923. III. 1491) gemessenen Werte 2100.

II. Die Leitfähigkeiten von Alkalicaseinatlösungen. Die Leitfähigkeiten der Alkalicaseinatlsgg. wurden nach der Methode von KOHLRAUSCH bestimmt für Na-Caseinat u. Cs-Caseinat u. für die KOH- u. NaOH-Lsg. des rac. Caseins. Vff. beschreiben eine graph. Methode der Extrapolation, die eine gerade Linie ergibt. Die erhaltenen Ergebnisse stehen in Übereinstimmung mit denen aus den Bestst. der Überföhrungszahlen. Die Änderung der Leitfähigkeit mit der Temp. folgt einer geradlinigen Beziehung. Die Beweglichkeit des Caseinions beträgt bei 25° 35, bei 30° 47 u. bei 35° 65 mhos, die des rac. Ions bei 30° 47 mhos. Vff. bringen diese verhältnismäßig hohen Werte in Beziehung zur Theorie der kolloidalen Elektrolyte von MC BAIN (vgl. Journ. Americ. Chem. Soc. 42. 426; C. 1920. III. 533). — Nach OSTWALDS Formel wird die Wertigkeit des Caseins als Säure zu 3 berechnet, im Gegensatz zu COHN u. HENDRY (vgl. Journ. Gen. Physiol. 5. 521; C. 1923. III. 1491), die das Minimalmolekulargewicht des Caseins zu 13000 berechnen, was bei dem Äquivalentgewicht 2100 die Wertigkeit 6 folgen würde. Vff. lassen es jedoch unentschieden, ob die Formel von OSTWALD auf die Caseinlsgg. angewandt werden kann.

III. Das elektrochemische Verhalten des racemischen Caseins. Vff. besprechen die Erscheinung der Racemisation des Caseins. Das elektrochem. Verh. des rac. Caseins stimmt nicht mit den Folgerungen aus der Theorie von ROBERTSON überein. Die Analysenwerte der Stickstoffgruppen werden mit denen des Caseins verglichen. Aus diesen Werten u. dem elektrochem. Äquivalent schließen Vff., daß das rac. Casein nicht als Abbauprod. des Caseins betrachtet werden kann, ausgenommen die Veränderung durch Hydrolyse der Amidgruppen. (Journ. Gen. Physiol. 7. 287—301. 303—16. 317—26. 1924. Univ. of Calif., Berkeley.) ZANDE

Treat B. Johnson und P. G. Daschavsky, Untersuchungen über Proteine VIII. Die zerstörende Destillation des Seidenfibroins. Die früheren Ergebnisse (vgl. Journ. Americ. Chem. Soc. 41. 1147; C. 1919. III. 795) wurden eingehender verfolgt. In dem roten Öl (ca. 43%) wurden Phenol, p-Kresol, Indol u. Chinolin nachgewiesen, ferner durch qualitative Proben Ggw. von Pyrrolideriv., in den Gemischen neben NH_3 , CO_2 u. nur qualitativ nachgewiesenen aliphat. Aminen Essigsäure u. Propionsäure. Die B. von Phenol u. p-Kresol erklärt sich leicht durch Spaltung des Tyrosins. Das Auftreten von Indol u. Chinolin dürfte wohl durch pyrogetische Kondensationsrkk. zu erklären sein. Für die B. des zweiten wird versuchsweise





de Erklärung gegeben: Phenylalanin könnte in der Diacipiperazinform (I.)
 ten, diese unter den Druck- u. Temperaturbedingungen der Vakuumdest.
 B. von β -Phenylpropionamid (II.) gespalten werden, das unter Verlust von
 das Nitril (III.) gäbe u. sich weiterhin in das für Ringschluß geeignete Zimt-
 nitril (IV) verwandelte. Verknüpfung des N der CN-Gruppe mit dem o-C
 erns u. Wanderung des hier verdrängten H an das CN-C würde dann zum
 lin (V.) führen. Die B. von aliph. Aminen u. Fettsäuren ist durch n.
 coxylierung bezw. Desaminierung der entsprechenden Aminosäuren zu er-
 r. (Journ. Biol. Chem. **62**. 197—207. 1924. New Haven, YALE Univ.) SPIEGEL.
Tobuzo Fujii, *Untersuchungen über physikalisch-chemische Eigenschaften des*
phospholipins. II. Der Einfluß des Vorhandenseins von Eiweiß auf die physikalisch-
chemischen Eigenschaften des Lecithins. Untersucht wird die Überführbarkeit von
 in aus wss. Lsg. in Ä. Eine solche ist bei reiner Lecithinlsg. so gut wie
 vorhanden, bei Ggw. von Albumin aber in mit dessen Menge steigendem
 E. Wie Albumin wirken auch andere hydrationsfähige Stoffe, Salze u. Säuren,
 aber Alkalien. Salze fördern aber die Wrkg. von Albumin nicht, sondern
 en sie eher, wahrscheinlich durch B. einer Verb. Der isoelekt. Punkt von
 in wurde zu $p_H = 2,7$ gefunden. Bei Ggw. von Albumin wird die Rk., bei
 noch Übergang von Lecithin in den Ä. stattfindet, nach der alk. Seite ver-
 en. — Bei diesen Verss. benutzte Vf. Pufferlsgg. aus *Glycerinsäure* u. ihrem
 sz. Für die Darst. dieser Säure wurde die Methode von MULDER etwas
 iziert, hauptsächlich durch Beseitigung von in dem Oxydationsgemisch nach
 pfen noch vorhandenen Spuren HNO_3 mittels Sn-Pulvers. (Journ. Bio-
 chemistry **3**. 393—406. 1924. Tokyo, Imp. Univ.) SPIEGEL.

yoichi Koganei, *Über aus dem Kephalin erhaltene Fettsäuren. Verbindungen*
1-Aminoäthylalkohol mit gesättigten und ungesättigten Fettsäuren. Vf. hat
 i. Biochemistry **2**. 499) beobachtet, daß die bei der Hydrolyse von Kephalin
 anen, nach dem Verf. von MOTTRAM (Journ. of Physiol. **40**. 122; C. 1910.
 18) gereinigten Fettsäuren an Menge sehr schwanken u. ebenso wie ihre
 stets eine kleine Menge N enthielten. Es ist bereits bekannt, daß der N
 cephalins in Form von Oxyäthylamin vorliegt (vgl. RENALL, Biochem. Ztschr.
 13; C. 1913. II. 1592). Es zeigte sich nun, daß auch reine Fettsäuren bei
 dieses Amins aus ihren Pb-Salzen nur schwer gefällt werden u. dann N-haltig
 laß aus ihnen u. dem Amin Verbb. entstehen, l. sowohl in Ä., als auch in
 e auch bei Behandlung mit alkoh. HCl nur schwer dissoziiert werden, be-
 die Ölsäureverb. (Journ. Biochemistry **3**. 15—26. 1923. Tokyo, Imp.

SPIEGEL.
uo Eto, *Beiträge zur Kenntnis des Gliadins*. Gliadin ist bei 30° am besten
 em Verhältnis) l. in A. von 60—70 Vol.-%, bei $10-11^\circ$ am besten in
 HCl u. $\frac{1}{40}$ -n. NaOH. Sein isoelekt. Punkt ist bei $p_H = \text{ca. } 6,6$. Aus
 malz dargestelltes Ferment wirkt sehr ähnlich dem Pepsin unter Vermehrung
 amino-N (VAN SLYKE), aber ohne Freiwerden von NH_3 . Dieses wird dagegen
 blicher Menge abgespalten bei Erwärmen in verd. A. (64%) mit 0,8% HCl
 , wobei nur geringe Vermehrung des Amino-N eintritt. Das durch 48-std.
 ydrolyse erhaltene Pulver ist in 70%ig. A. u. $\frac{1}{320}$ -n. HCl wesentlich weniger,
 a. NaOH leichter l. als das Ausgangsmaterial. Es bildet im Gegensatz zu
 keine Präzipitine, hat aber wegen noch vorhandener geringer Menge von

unverändertem Gliadin noch schwache Präzipitationsrk. auf hochwertiges Gliadinimmunserum. (Journ. Biochemistry 3. 373—92. 1924. Tokyo, Kaiserl. Univ.) SPIEGEL

Alfonso Cruto, *Über die chemische Konstitution des Insulins*. (Rassegna C. Terap. e Scienze aff. 23. 196—99. 1924. — C. 1924. II. 2849.) SPIEGEL

E. Biochemie.

E₁. Enzymchemie.

P. Karrer und **M. Staub**, *Über Gentiobiase*. Gentiobiase wird stets zusammen mit *Lichenase* u. *Cellobiase* gefunden. In Auszügen aus keimendem Spinat, keimendem Hafer, Malz u. aus Schnecken wurde der Gehalt an Gentiobiase fast dem Gehalt an Cellobiase entsprechend gefunden. Hierdurch scheint die Auffassung eine Stütze zu finden, daß das auf die an sich seltene Gentiobiose wirkende Enzym ein Teil des Enzyms der Lichenase ist u. am Abbau der Reservecellulose beteiligt ist. Eine Entscheidung dieser Frage kann nur erhalten werden, wenn für die beiden Enzyme genaue Meßmethoden ausgearbeitet sind. — Gentiobiase aus Schnecken wirkt am besten bei $p_H = 5,2$. Aus Gentiobiose wird quantitativ Maltose gebildet. — Das Reduktionsvermögen gegen Fehlingsche Lsg. (bestimmt nach BERTRAND) wurde bei 10, 20, 30, 40 mg Gentiobiose entsprechend 11,4, 22,5, 33,1, 43,2 mg Cu ermittelt. (Biochem. Ztschr. 152. 207—10. 1924. Zürich, Univ.) A. R. F. HESS

Antonino Clementi und **Giulia Cantamessa**, *Die die enzymatische Desamidierung des Asparagins regulierenden Gesetze*. (Vgl. CLEMENTI, Atti R. Accad. dei Lincei, Roma [5] 31. I. 488; C. 1923. III. 637.) Bzgl. des Einflusses der Konzentration der Asparaginase ergab sich folgendes: Bei schwachen Konzentrationen ist wie im Falle der idealen Katalysatoren das Gesetz der direkten Proportionalität von Fermentkonz. u. Menge des gespaltenen Substrats verwirklicht; bei stärkerer Fermentkonz. steigt die Geschwindigkeit der Desamidierung über die nach jenem Gesetze berechnete Menge hinaus, bei Erhöhung der Konz. über eine gewisse Grenze vermindert sich die Desamidierung wieder u. nähert sich derjenigen bei geringerer Konz. — Einfluß der Asparaginkonz. Auch hier gilt das Proportionalitätsgesetz nur bis zu gewissen Grenzen der Konz. u. tritt bei stärkerer Erhöhung der Konz. eine Verminderung der Geschwindigkeitskonstante ein. — Einfluß der Wirkungskonz. der Asparaginase. Wird die Geschwindigkeitskonstante nach der üblichen Formel berechnet, so ergeben sich im allgemeinen mit längerer Dauer der Reaktion wachsende Werte, während in einigen Fällen die Berechnung nach der für den Verlauf von Adsorptionserscheinungen charakteristischen Exponentialformel konstante Werte liefert. — Einfluß der Spaltprodd. Gemäß der Theorie der chem. Gleichgewichte in ihrer Anwendung auf Enzymrkk. hemmen Asparaginsäure u. NH_4 die Tätigkeit der Asparaginase, jene stärker als dieses. — Die enzymat. Desamidierung des Asparagins verläuft sonach nur ausnahmsweise gemäß der Theorie der katalytischen Rkk. erster Ordnung u. scheint durch Adsorptionserscheinungen beeinflusst zu werden. (Gazz. chim. ital. 54. 781—818. 1924. Roma, R. Univ.) SPIEGEL


Hardolph Wasteneys und **Henry Borsook**, *Die enzymatische Synthese von Eiweiß. I. Die synthetisierende Wirkung des Pepsins*. In einer ca. 40%igen Lsg. der pept. Verdauungsprodd. von Eieralbumin brachte Pepsin bei $p_H = 4$ in die Fällung zuwege, für die aus histor. Gründen der Name *Plastein* beibehalten wird. Bzgl. Komplexität soll sie von der Ordnung der nativen Eiweißkörper sein. 1. Für die Farbe der Biuretrk., Fällbarkeit durch Trichloressigsäure, Verdaulichkeit (relativ) Pepsin in verd. Lsg. Aus dem Verdauungsprod. der Gelatine konnte mit Pepsin kein synthet. Prod. gewonnen werden, auch nicht bei Ggw. von Tyrosin oder Tryptophan oder den synthetisierbaren Spaltprodd. des Eieralbumins. — Die For

werden theoret. bzgl. des Massenwirkungsgesetzes erörtert. (Journ. Biol. 62. 15—29. 1924. Toronto [Canada], Univ.) SPIEGEL.

Ludwig Pincussen, Fermente und Licht. VI. Über Beeinflussung von Fermentwirkungen durch Jodsalze unter Bestrahlung. (V. vgl. Biochem. Ztschr. 144. 372; 24. I. 2158.) Aus KJ-Lsg. wird unter dem Einfluß ultravioletter Strahlen J freigesetzt, u. zwar bei saurer Rk. ($p_H = 4,53$) mehr als bei neutraler ($p_H = 6,81$), und bei alkal. Rk. ($p_H = 8,30$) kein J frei wird. Der Grad der Jodabspaltung nimmt ab mit der Konz. der KJ-Lsg. Er kann durch Sensibilisatoren (Dichloräceten-2,7-disulfosaures Natrium oder Eosin bläulich) gesteigert werden. In dieser Sensibilisatoren konnte auch durch das (sonst unwirksame) Licht einer Lampe Jod freigemacht werden. — *Malzamylase* wird durch das so gebildete J (besonders bei saurer Rk.) gehemmt, während *Taka-* u. *Speichelamylase* eine ausgesprochene Förderung ihrer Wrkg. erfahren. *Pankreasamylase* wird nur dann geschädigt, wenn die B. von J in Ggw. der Sensibilisatoren erfolgt. — NaJ, RbJ (J wirken ebenso wie KJ. (Biochem. Ztschr. 152. 406—15. 1924.) A. R. F. HESSE.

Ludwig Pincussen, Fermente und Licht. VII. N. Klissiunis, Über Beeinflussung von Fermentwirkungen durch Jodsalze unter Bestrahlung. II. (I. vgl. vorst.) *Pankreastrepsin* wird durch Bestrahlung mit ultravioletter Licht stark geschädigt. Die Schädigung wird bei Zugabe von Jodsalz erheblich verringert. Es wird von belichteter oder unbelichteter Jodsalzlsg. zu unbelichtetem Trypsin ist die Einw. auf die Wrkg. des Fermentes. — Der bei Belichtung in Ggw. von J erhaltenen Wert für die Trypsinwrkg. steht zwischen den beiden Werten für durch Licht geschädigtes u. für unbelichtetes Trypsin. (Biochem. Ztschr. 152. 19. 1924. Berlin, Urban-Krankenh.) A. R. F. HESSE.

Otto Warburg, Über Eisen, den sauerstoffübertragenden Bestandteil des Atmungskreislaufs. In atmenden Zellen wird ein Kreislauf nach nebenstehendem Bild angenommen. In dem Kreislauf reagiert der molekulare O_2 mit Fe^{II} , wobei eine höhere Oxydationsstufe des Fe entsteht, die dann unter Rückbildung von Fe^{II} mit der organ. Substanz reagiert; Rkk. in der Richtung des gestrichelten Pfeiles kommen nie vor. Hiernach sind also organ. Substanzen in der Zelle (wie außerhalb der Zelle) nicht



„Katalysator“, d. h. sie können nicht ohne Vermittlung einer anderen Substanz wirken. Die Reaktionsfähigkeit des Fe in der Zelle wird hiernach durch den Quotienten: (Sauerstoffverbrauch):(Eisengehalt $\times$ Zeit) gemessen (O_2 in cmm, Fe in mg, Zeit in Std.). Es wird gezeigt, daß die in der Zelle vorhandenen Fe-Mengen mit dem O_2 -Verbrauch im Sinne dieser Annahme zu erklären. Mn oder Cu üben eine so geringe Reaktionsfähigkeit, daß ihre Teilnahme an den Oxydationsvorgängen zur Zeit nicht begründbar erscheint. Die Lebensnotwendigkeit des Fe, seine große Reaktionsfähigkeit u. die spezif. vergiftende Wrkg. von HCN sprechen zugunsten der Auffassung des Vf. Als beweisend werden folgende Verss. angeführt. Fe, welches in Seeigeleiern vorhanden ist oder welches diesen zugesetzt wird, zeigt die gleiche Reaktionsfähigkeit: 1 mg überträgt je Stde. 7000 cmm O_2 . — Ein abgeleitetes Hämin wirkt auf Aminosäuren als Oxydationskatalysator. Dieselbe Substanz kann man mit durch Verkohlen anderer N-haltiger Substanzen in Ggw. von Fe erhalten. Fe wirkt auf Kohle hervorgerufen, wobei bei einem Fe-Gehalt von einigen Proz. Fe je g Kohle ein Maximum der katalyt. Wirksamkeit erhalten wird. Durch

HCN wird die Wrkg. solcher Kohlen herabgesetzt. — Die katalyt. Wrkg. Kohlen beruht nicht auf Adsorptionsvorgängen, sondern auf chem. Wrkg. — dem System Fructose-Phosphat-Eisen (vgl. WARBURG u. YABUSOE, Biochem. Ztschr. **146**. 380; C. 1924. II. 312) findet beim Durchleiten O₂ Verbrauch von O₂ entsprechend dem Kreislaufschema; HCN hemmt spezifisch. Gegenüber den widersprechenden Angaben von MEYERHOF (PFLÜGERS Arch. d. Physiol. **199**. 1923. III. 1089) bezw. MATHEWS u. WALKER (Journ. Biol. Chem. **6**. 21 [1923]) wurde gefunden, daß Cystein im System Cystein-Linolensäure nach völliger Entfernung der Metallspuren (SAKUMA, Biochem. Ztschr. **142**. 68; C. 1924. I. 2) nicht mit O₂ reagiert, daß aber bei Zusatz schon ganz geringer Fe-Mengen (eigentlich $\frac{1}{100000}$ mg), die analyt. nicht mehr nachweisbar sind, ein ziemlicher O₂-Verbrauch stattfindet. Durch die Bindung an die SH-Gruppe scheint das Fe eine besondere große Reaktionsfähigkeit zu bekommen. Die Wrkg. des Fe ist in den 3 beschriebenen Modellen spezif. auf Aminosäuren, Fructose bezw. Linolensäure gerichtet, es scheint also die Bindung des Fe für die Spezifität der Wrkg. wesentlich zu sein (Biochem. Ztschr. **152**. 479 — 94. 1924. Berlin-Dahlem, Kaiser WILHELM-INSTITUT f. Biol.) A. R. F. HESL.

Elemér Forrai, *Untersuchungen über Phosphatasen menschlicher Geschlechtsorgane*. Menschliche Carcinome vermochten Glycerinphosphorsäure u. auch Saccharasemonophosphorsäure enzymat. zu zerlegen, bei einem Uterusmyom u. 2 Sarkomen war derartige Wrkg. nicht nachzuweisen. Die Glycerophosphatase kann möglicherweise eine Rolle bei der Kachexie spielen. Ausschwemmung des Enzyms u. in der allgemeinen Verbreitung im krebserkrankten Organismus erscheinen fraglich, da Unterschiede im diesbezüglichen Verh. des Serums von Krebskranken u. Gesunden gefunden wurden. (Ztschr. f. d. ges. exp. Medizin **43**. 647—55. 1924. Budapest, PÁZMÁNY PÉTER-Univ.) SPIEGEL.

W. Loele, *Untersuchungen über die Naphthol-Peroxydase des Blutes*. Blutjod mit Lsg. von α -Naphthol u. H₂O₂ dunkelviolette Färbung, an Intensität von Intensität des Blutes u. des Naphthols abhängig. Die verschiedenen Blutarten reagieren bei ganz verschiedenen Konz. von H₂O₂, Hundeblood bei geringster, dann folgen Harn, Rind, Pferd, Maus, zuletzt Meerschweinchen, Mensch u. Kaninchen. Stark reagiert Schwein, Karpfen, Schleie, Gans, Huhn, fast gar nicht der Aal. Zers. aller die Reaktionsfähigkeit des Blutes, Erwärmen beschleunigt die Rk., Kochen zerstört sie auf. Ohne Einfluß sind Phenole u. Sulfhydrylverb. Laugen, Cholin, Nicotin, cycl. Amidoverb. sind von Einfluß, Salze verstärken. Formaldehyd verändert die Rk. 96% A. zerstört die Peroxydasen. Durch Fütterung von Meerschweinchen mit Pb(NO₃)₂ wurde Auftreten von Naphtholperoxydase in unreifen, noch kernhaltigen roten Blutkörperchen erreicht. In n. Lymphocyten wurde sie nie gefunden (VIRCHOWS Arch. f. Anat. u. Phys. **250**. 677—84. Dresden, Landesstelle für Gesundheitspf.; Ber. ges. Physiol. **28**. 302—3. 1924. Ref. JACOBY.) SPIEGEL.

Erhard Glaser und Lazar Wittner, *Über die blutzuckerherabsetzende Wirkung von Pflanzenextrakten und Oxydasen sowie den Nachweis von Fermenten im Inulin*. Nach dem Verf. von COLLIP oder nach den Methoden der Insulingewinnung (ohne Säureextraktion) bekommt man aus Champignons u. Rüben blutzuckerherabsetzende Extrakte. — Auch Peroxydasen aus Meerrettich, Tyrosinase aus Champignons, Katalasen aus Schafleber setzen, wenn rein genug gewonnene Inulin-Blutzucker stark herab. Tyrosin oder Caseosan wirken nicht so. — Im Inulin lassen sich Peroxydasen u. Aldehydasen nachweisen. Diese Fermente beeinflussen sich gegenseitig in ihrer Wrkg. Da sie auch in Leber, Muskulatur u. Pankreas gefunden sind, läßt sich so die Hemmung der Wrkg. der Diastase auf Stärke durch katalyt. Wrkg. gegenüber Protoplasmagiften, Ermüdungsstoffen u. Bakterien bei lebhafterem Verbrennungsprozeß verstehen. — Insulin wie diese Fermente werden

irksam durch Kochen, Mineralsäuren oder Trypsinverdauung. (Biochem. Ztschr. 1. 279—95. 1924. Wien.)

MÜLLER.

E₂. Pflanzenchemie.

Suguru Miyake, *Chemische Studien über Maispollen*. II. Kohlenwasserstoffe organische Basen. (I. vgl. Journ. Biochemistry 2. 27; C. 1924. I. 1211.) Die Kohlenhydrate der untersuchten Pollen bestanden aus Stärke, Dextrin, Saccharose, Glucose, Fructose u. einer in Glucose u. Xylose spaltbaren Hemicellulose. Ggw. freier Pentose ist sehr zweifelhaft. Von Basen wurden Adenin u. Cholin nachgewiesen. (Journ. Biochemistry 3. 169—76. 1924. Sapporo, Hokkaido Imp. Univ.)

SPIEGEL.

Albert Charles Chibnall und Laurence S. Nolan, *Ein Eiweißkörper aus den Zea mays-Blättern*. (Vgl. CHIBNALL, Journ. Biol. Chem. 61. 303; C. 1924. II. 2589.) Der Verf. zur Darst. der Eiweißstoffe war das kürzlich beim Spinat (l. c.) verhandelt. Nach Spaltung mit 20%ig. HCl zeigten das Cytoplasma- u. das Vacuolen-eiweiß vom Gesamt-N in % Amid-N 5,62 (9,97), Humin-N 2,85 (2,11), bas. N 25,20 (2,75). Das Cytoplasmaweiß ist, bei seinem isoelektr. Punkt gefällt ($p_H = \text{ca. } 4,0$ bis 4,6), fast völlig unl. in W. u. Salzsgg., wird durch Kochen koaguliert u. durch Erhitzen A. denaturiert, dann wl. in verd. Alkali. Sonst ist es in geringem Übermaß von Alkali ll. zu intensiv gelber, in dicker Schicht opaker Lsg., weniger ll. in Säuren fast farblos, aber opak. Unter Umständen zeigt es sowohl in saurer, als auch in alkal. Lsg. Tendenz zur Gelbfärbung. In saurer Lsg. ist es gegen Ggw. von Salzen außerordentlich empfindlich, in alkal. Lsg. auch noch sehr. Die Analyse von VAN SLYKE ergab vom Gesamt-N des Hydrolysats Amid-N 5,51, Humin-N 2,85, Säure 1,22, in Kalk 1,46, in Amylalkohol 0,04, Cystin-N 0,84, Arginin-N 15,32, Histidin-N 3,09, Lysin-N 9,97, Amino-N des Filtrats 58,56%. — Von diesem Eiweiß werden 3,23% der Trockenbestandteile des Blattes mit 8,61% des Gesamt-N gewonnen, doch läßt sich aus einigen Beobachtungen schließen, daß damit nicht der gesamte Gehalt an diesem Eiweißkörper erschöpft ist. (Journ. Biol. Chem. 62. 173 bis 178. 1924.)

SPIEGEL.

Albert Charles Chibnall und Laurence S. Nolan, *Ein Eiweißkörper aus den Blättern von Zea mays*. (Vgl. vorst. Ref.) Nach der gleichen Methode wie aus Spinat wurde aus den Maisblättern ein Eiweiß gewonnen, das nicht frei von Kohlenhydraten erhalten werden konnte, aber den entsprechenden Eiweißverbb. aus Spinat sehr ähnlich ist, daß Vff. es als zur gleichen Klasse gehörig u. das Kohlenhydrat nur als Verunreinigung auffassen. Analyse nach VAN SLYKE ergab vom Gesamt-N des Hydrolysats Amid-N 7,44, Humin-N in Säure 1,91, in Kalk 2,47, in Amylalkohol 0,19, Cystin-N 0,77, Arginin-N 14,69, Histidin-N 4,70, Lysin-N 8,78, Amino-N 55,81, Nichtamino-N 2,04%. Der isoelektr. Punkt liegt auch hier bei ca. 4,6. (Journ. Biol. Chem. 62. 179—81. 1924. New Haven, Connecticut Agr. Expt. Stat.)

SPIEGEL.

D. Breese Jones, C. E. F. Gersdorff und O. Moeller, *Der Tryptophan- und Cystingehalt verschiedener Eiweißkörper*. Cystin wurde nach FOLIN u. LOONEY bestimmt. (Journ. Biol. Chem. 51. 421; C. 1922. IV. 349), Tryptophan nach MAY u. ROSE bestimmt. (Journ. Biol. Chem. 54. 213; C. 1923. I. 770) bestimmt. Die Ergebnisse der Untersuchungen zahlreichen Präparaten sind in Tabellen wiedergegeben. Bei den in A. 1. untersuchten Eiweißstoffen (Prolaminen), die im allgemeinen wenig Tryptophan u. ziemlich viel Cystin enthalten, finden sich erhebliche Differenzen. Jenes fehlt bei Zein u. den Prolaminen von Hafer, Sorghum u. „teosinte“ ganz, der Cystingehalt übersteigt bei Haferprolamin den der meisten anderen Pflanzeneiweißstoffe. Gleiches gilt für den Tryptophangehalt von dem Albumin der Weizenkleie (vgl. GERSDORFF u. JONES, Journ. Biol. Chem. 58. 117; C. 1924. II. 349), deren Globulin auch er-

hebelich hohen Gehalt daran hat. Beide, namentlich das Albumin, stehen auch Cystingehalte hoch. Differenzen bei den Globulinen verschiedener Nüsse stehen im Einklang mit Versuchsergebnissen über deren Nährwert, wie auch die Wertschätzung des Eiweißes von Ölfrüchten durch hohen Tryptophangehalt gerechtfertigt wird. Bei verschiedenen Bohnen zeigten sich die α -Globuline reich an Tryptophan u. Cystin als die β -Globuline. Im β -Globulin der Georgiasamth. fehlt Tryptophan ganz. (Journ. Biol. Chem. 62. 183—95. 1924. Washington, U. S. Dep. of Agric.) SPIEGEL

F. Wrede, Zur Kenntnis des Pyocyanins, des blauen Farbstoffs aus *Bacillus pyocyaneus*. Der *Bacillus pyocyaneus* läßt sich am leichtesten auf alkal. Nährboden, $p_H = 7,4$, züchten. Die nach dem Schütteln mit Luft tiefblaue Nährflüssigkeit wird mit $CHCl_3$ ausgeschüttelt u. der Farbstoff aus der filtrierten Lsg. mit CO_2 gel. Pikrinsäure gefällt. Das nach kurzer Zeit ausgefallene *Pyocyanin* (Pikrat) durch Umkrystallisieren aus h. A. rein erhalten werden. Durch Zerlegen des Pikrats in üblicher Weise wird eine Lsg. des salzsauren Pyocyanins erhalten, aus der die prachtvoll krystallisierenden Chloroaurate u. Chloroplatinate erhalten werden. Die Analysen derselben sprechen für die Formel $C_{13}H_{12}N_2O$ oder ein Vielfaches derselben für Pyocyanin. Aus der $CHCl_3$ -Lsg. der freien Base konnte durch Zusatz von PAe. das *Pyocyanin* selbst krystallisiert abgeschieden werden. Die durch blauen Nadeln desselben sind längere Zeit unzers. haltbar. Das Mol.-Gew. wurde durch Gefrierpunktsbest. in Eg. zu etwa 424 gefunden, was der Formel $C_{26}H_{24}N_4O_4$ entspricht. Durch Red. des Farbstoffes entsteht eine farblose Verb., die durch Schütteln mit Luft wieder blau wird. Als gut wirkende Red.-Mittel erwiesen sich Glucose u. auch $Na_2S_2O_4$ in alkal. Lsg. Beim Stehen mit Alkalilsg. schlägt die blaue Farbe des Pyocyanins in ein sattes Weinrot um, woraus sich der Farbstoff mit $CHCl_3$ nicht mehr extrahieren läßt. Wird die alkal. Lsg. mit CH_3COOH angesäuert, so wird sie gelb. Bei genügender Konz. krystallisiert eine gelbe Substanz in feinen Nadeln aus; die mit Ä. oder $CHCl_3$ leicht extrahiert werden können. Dieses Spaltprod., *Hemipyocyanin* genannt, hat die Formel $C_{13}H_{12}N_2O$. Es konnte nur gut krystallisierende Monobenzoyl- u. Monoacetylderiv. des *Hemipyocyanins* erhalten werden. Letzteres läßt sich wie seine Muttersubstanz zu einer ungefärbten Verb. reduzieren u. nachher wieder oxydieren. (Dtsch. med. Wchschr. 50. 6. 1924. bis 1650. 1924. Greifswald, Univ.) FRANK

H. Hérissay, Über die Anwesenheit eines durch Emulsin spaltbaren Glucosids in *Baillonia spicata* H. Bn. und über die Spaltprodukte dieses Glucosids. Im November u. Dezember gesammelte Zweige von *Baillonia spicata* H. Bn. wurden mit sd. A. extrahiert, der Rückstand der alkoh. Lsg. mit Wasser genommen u. die wss. Lsg. mit Essigester ausgeschüttelt; die Esterlsg. wurde eingedampft u. der Rückstand in W. gel. u. mit Emulsin versetzt. Es bildete sich nach einiger Zeit eine trübe Lsg., die Glucose enthielt, u. ein brauner, zäher Rückstand aus dem Vf. als zweites Spaltprod. eine vorläufig als *Baillonigenol* bezeichnete Verb. isolierte; prismat. Nadeln, F. 185—186°, wl. in W., swl. in Ä., l. in E. Eg., aus letzterem durch W. fällbar, $[\alpha]_D^{20} = -36, 37^\circ$ in Ä., die Drehung schlägt bei Zugabe von NaOH nach rechts um; Na_2CO_3 u. $NaHCO_3$ werden nicht zers. durch Verb. ist l. in NaOH mit gelber Farbe, beim Ansäuern wird aus dieser Lsg. eine Säure gefällt mit F. 131°, das *Baillonigenol* ist demnach als Lacton aufzufassen. Das ursprüngliche Glucosid bezeichnet Vf. als *Bailloniosid*. (C. r. d. l'Académie des sciences 179. 1419—20. 1924.) HABERLAND

H. Hérissay und **R. Sibassié**, Biochemische Untersuchungen über die Natur und die Menge der in einigen Hülsenfrüchten enthaltenen durch Invertin und Enslin hydrolysierbaren Prinzipien. (Bull. Soc. Chim. Biol. 6. 759—69; Journ. Pharm. Chim. [7] 30. 345—56. 1924. — C. 1924. I. 1938.) SPIEGEL

N. Trimurti, *Ein Alkaloid aus den Blättern von Anona squamosa*. Blätter u. Stängel des gewöhnlichen Zimtapfels werden medicin. u. als Insektenvertilgungsmittel gebraucht, die Wurzel als drast. Abführmittel. Die ersten beiden enthalten Alkaloide, keine Glucoside. Aus den Blättern wird das Alkaloid am besten mit Wasser in Ggw. von $\text{Ca}(\text{OH})_2$ bei 80° ausgezogen, nach Behandlung mit Bleiessig u. Filtrieren mittels H_2S als *Pt-Doppelsalz* gefällt, gelbe rhomb. Krystalle (aus h. W.). Hieraus gewonnene Chlorhydrat bildet farblose Nadeln, die daraus mittels H_2O gewonnene Base ein weißes Pulver, ll. in A. Das Pt-Salz hatte, direkt dargestellt, das Äquivalent 44, aus dem Chlorhydrat gewonnen, 88. (Journ. of the Indian Inst. of Science 7. 232—34. 1924. Bangalore, Indian Inst. of Science.) SP.

K. Venkataraman, *Mitteilungen über Bixin*. Die Extraktion des Rohprod. nach dem Verf. von HEIDUSCHKA u. PANZER mit Aceton soll so geleitet werden, daß das in den Extraktor gelangende Lösungsm. Zimmertemp. hat (bei höherer Temp. geht Bixin verloren). Nachdem das Harz so entfernt ist, wird das Bixin mit h. Chlf. ausgezogen u. nach Entfernung des Lösungsm. aus h. Chlf. oder Essigsäure umkrystallisiert; der letzte ist wenig geeignet, da sein Lösungsvermögen in h. Chlf. u. Kälte wenig differiert. Die Elementaranalyse gestattet keine Entscheidung zwischen den Formeln $\text{C}_{25}\text{H}_{30}\text{O}_4$ u. $\text{C}_{24}\text{H}_{28}\text{O}_4$, die OCH_3 -Best. ergab für beide etwas niedrige Resultate. Vers., den Grad der Ungesättigtheit nach dem Verf. von N. N. N. (Journ. Russ. Phys.-Chem. Ges. 40. 700; C. 1908. II. 2039) zu ermitteln, führten zu einem Ergebnis, da kein Gleichgewicht zwischen Katalysator, H_2 u. Lösungsm. bei Einführung des Bixins erhalten werden konnte. Benzoylierung u. Acetylierung gelang nicht. Kochen mit 5%ig. Na_2CO_3 -Lsg. führte zu Spaltung in CH_4O u. *Norbixin*, was die Auffassung von HERZIG u. FALTIS bzgl. der Esternatur des Bixins bestätigt. Oxydation mit wechselnden Mengen KMnO_4 in h. alkal. Lsg. führte nicht zu definierten Prodd., $\text{K}_3\text{Fe}(\text{CN})_6$ gab in geringer Menge eine farblose Verb. vom Schmp. -95° . (Journ. of the Indian Inst. of Science 7. 225—31. 1924.) SPIEGEL.

E₃. Pflanzenphysiologie. Bakteriologie.

W. Wächter, *Pflanzliche Hormone*. Übersicht. (Schweiz. Apoth.-Ztg. 62. 33. 1924. München.) WOLFF.

P. Freundler, *Über die Bedingungen zur Stabilisation des Jods bei L. flexilis*. (Vgl. C. r. d. l'Acad. des sciences 178. 1625; C. 1924. II. 680.) Der ursprüngliche J-Gehalt in *Laminaria flexilis* kann bestimmt werden, indem die Pflanze mit Meerwasser, dem $\text{Ca}(\text{HSO}_3)_2$ zugesetzt wird, behandelt werden, oder durch längeres Erhitzen in zugeschmolzenem Rohr auf 110° oder durch rasches Erhitzen bei 105° . Bleibt die zu analysierende Probe einen Monat lang in Behandlung mit Meerwasser, dem 2% NaF zugesetzt wurden, so erhält man ebenfalls die Analyse den ursprünglichen J-Gehalt. Vf. schließt hieraus, daß nicht die Wrkkg. die Zunahme von J bedingen, sondern daß Zu- oder Abnahme des J mit dem Zustande des Protoplasmas zusammenhängt. Durch Hydrolyse des Protoplasmas (in der Natur durch Fermente, künstlich durch NaF) wird der J-Gehalt erhöht. (C. r. d. l'Acad. des sciences 179. 1421—22. 1924.) HABERLAND.

P. A. Maige, *Entwicklung der stärkebildenden Eigenschaften der Plastiden in Reservestärkequellen*. (Vgl. S. 241). Beobachtungen an Bohnenembryonen führten zu dem Schluß, daß die stärkebildenden Zellen zwei verschiedenartige Stärkekörperchen enthalten; die eine Art besitzt von Anfang an die Fähigkeit zur B. von Stärke, die zweite entwickelt diese Fähigkeit erst im Laufe der Entw. des Keimlings u. zwar dann, wenn die ersten Plastiden schon die Hydrolyse der Stärke zu beginnen. Bei Kartoffelknollen lassen sich dieselben Beobachtungen machen. Bei weißen Lupinen dagegen läßt sich eine zweite Art von Plastiden feststellen. Die gebildete Stärke verschwindet hier beim Reifen und Trocknen,

um erst wieder bei der Keimung neu aufzutreten. (C. r. d. l'Acad. des sciences 179. 1426—28. 1924.)

HABERLAN

L. W. Durrell, *Anregung der Sporenkeimung durch CO₂*. Die Sporen von *Basisporium gallarum* keimen im W.-Tropfen schlecht oder gar nicht, wohl aber in Ggw. von Pflanzengewebe ohne direkte Berührung damit. Dies konnte auch von CO₂ durch das Gewebe zurückgeführt werden, denn es blieb aus, wenn in den Raum genügende Mengen Ba(OH)₂-Lsg. gebracht wurden, die sich dabei stark trübten. Ferner zeigte sich die gleiche Wrkg., wenn zu der Kammer, in der sich die Sporen befanden, Luft, die über zerschnittenes Pflanzengewebe geleitet war, oder Luft mit 1—5% CO₂ geführt wurde. (Science 60. 499. 1924. Ames [Iowa], Iowa Agricultural Experiment Station.)

SPIEGEL

Richard Schnücke, *Der Phosphorstoffwechsel einiger Pilze, mit besonderer Berücksichtigung von Aspergillus niger*. Die Unterss. beziehen sich auf *Aspergillus niger*, *Penicillium W. II* (vgl. WÖTTJE, Zentralblatt f. Bakter. u. Parasitenk. 114. 97; C. 1918. I. 880), *Oidium lactis* u. *Dematium pullulans*. Beim *Aspergillus* ist die Phosphorsäureaufnahme im Beginn der Entw. besonders lebhaft, daheider %-Gehalt des jugendlichen Mycel an P besonders hoch. Jene u. die Verarbeitung der aufgenommenen H₃PO₄ steigen absol. bis zu einem Maximum, bleiben eine Zeit auf diesem Stande, dann setzen (um so intensiver, je schneller die Entw. auf Grund der äußeren Verhältnisse abläuft) Abbauvorgänge ein, wieder zu absoluter Aufnahme von H₃PO₄ infolge Ausscheidung von anorgan. H₃PO₄ führend, so daß der %-Gehalt schließlich auf sehr niedrige Werte sinkt. Die Höhe der absoluten Aufnahme u. des %-Gehaltes hängen auch zum Teil von äußeren Umständen ab, bleiben beispielsweise bei durch große Oberfläche gesteigerter Luftzufuhr in Ggw. von (NH₄)₂SO₄, wo besonders große Produktion von Trockensubstanz stattfindet, die absol. u. relativen Gehalte an H₃PO₄ gering. Variation der gegebenen H₃PO₄-Mengen ändert den relativen P-Gehalt nicht, wohl aber in Zusammenhang mit der starken Beeinflussung der Trockensubstanzaufnahme die absol. H₃PO₄-Aufnahme. Die gleiche Erscheinung fand sich bei Änderung der N-Gabe, nur bei stark einseitiger Darbietung von Nitrat-N stieg neben dem absol. auch der relative P-Gehalt erheblich. Zur B. von Sporen wird die bereits in das Innere der Zellen aufgenommene H₃PO₄ verwendet, die hier in diesem Augenblick an den Ort des Verbrauchs angeschlossen ist. Der dazu nicht verbrauchte P unterliegt in besonders hohem Maße der Ausscheidung. — Im Gegensatz zu diesen Verhältnissen ließ sich bei den anderen untersuchten Pilzen keine Ausscheidung von H₃PO₄ auch bei älteren Mycelien nachweisen, findet vielmehr bis zum Schluß Steigen des absol. P-Gehalts oder Unverändertbleiben desselben statt; bei *Oidium* u. *Penicillium* gilt dies auch für den relativen Gehalt, der bei *Dematium* infolge weiterer starker Zunahme der Trockensubstanz trotz absol. Steigens sinkt. — N verhält sich in allen Fällen dem P analog, ist aber in geringerem Grade der Ausscheidung unterworfen, so daß das Verhältnis P : N nicht konstant ist. (Biochem. Ztschr. 153. 372—423. 1924. Jena, Universität.)

SPIEGEL

W. J. Crozier, *Über biologische Oxydation als Funktion der Temperatur*. V. berechnet die krit. therm. Inkremente für respirator. Prozesse (O₂-Verbrauch, O₂-Produktion) in verschiedenen Pflanzen u. Tieren u. findet zwei, möglicherweise drei charakterist. Typen: $\mu = 11500$ u. 16100 (bezw. 16700); den ersten Wert hat allgemein über 15° , den zweiten unter 15° . — Für die bakterielle Reduktion von Methylblau (Entziehung von H aus Bernsteinsäure) ist $\mu = 16700$. Dieser Prozess ist bei konstanter Temp. eine Funktion der Hydroxylionenkonz. Die Red. verläuft nach dem Schema:

Bernsteinsäure + Methylblau $\rightleftharpoons$ Fumarsäure + Leukomethylblau.

Dieses System hat eine gewisse Analogie mit dem Reduktionssystem im frihe-

- kel u. in anderen Geweben. — Für die gefundenen krit. Inkremente werden
 1. REYERHOF, Ztschr. f. Physiol. Ch. **85**. 412; C. **1913**. II. 592.) zu erwähnen ist.
 2. J. Gen. Physiol. **7**. 189—216. 1924. New Brunswick, Rutgers Univ.) ZANDER.
Shigeru Komatsu und **Motaro Ishimasa**, *Über die biochemische Untersuchung*
des Reifens der Kakifrukt. V. (IV. vgl. KOMATSU u. UEDA, Journ. Biochemistry
 1924. I. 782.) 1. *Das Reifen und Wachstum der adstringierenden Kaki-*
frucht. Die früheren Feststellungen von KOMATSU u. UEDA (Journ. Biochemistry
 1924. I. 782) beziehen sich auf die süße Varietät. Bei der adstringie-
 renden wurde ebenfalls während des Wachsens der Frucht Zunahme der Zucker
 mit Abnahme der Polysaccharide einschließlich Cellulose festgestellt. Saccharose
 nimmt anfangs zu, dann ab, zeigt bei Eintritt der Reife (ebenso wie der Gehalt an
 Ascorbinsäure) eine plötzliche Abnahme zugunsten der reduzierenden Zucker. Das Verhältnis
 von Glucose nähert sich dabei dem des Invertzuckers. Der Gehalt an N-haltigen
 Stoffen nimmt hier zu, bei der süßen Varietät ab. Bei abgepflückten Früchten
 verläuft der Gang etwas anders als am Baume. — 2. *Der Ursprung des reduzierenden*
Zuckers in der Frucht. Es werden weitere Unterss. zur Stütze der Ansicht an-
 gestellt, daß die reduzierenden Zucker aus Saccharose entstehen. (Journ. Bio-
 chemistry **3**. 261—72. 1924. Kyoto Imp. Univ.) SPIEGEL.
- Th. Bokorny**, *Einige Ausblicke auf den Ernährungsschemismus der Pflanzen,*
insbesondere Pilze und Hefe. Es werden tabellar. Übersichten über den Einfluß chem.
 Stoffe auf die B. von Eiweiß u. Kohlenhydrat in der Pflanze gegeben. (Allg.
 Bot. u. Hopfenztg. **64**. 1069—72. 1924.) A. R. F. HESSE.
- Karl Boresch**, *Zur Analyse der frühlreibenden Wirkung des Warmbades*. An
 Stielen von Kapuzinerkresse wird gezeigt, daß bei vereinter Wrkg. von höherer
 u. geringer O₂-Konz. die freie nicht flüchtige Gesamtsäure ansehnlich zu-
 nimmt, nicht aber bei einzelner Anwendung nur eines von diesen beiden Faktoren.
 (Monatsh. Chem. **153**. 313—34. 1924. Tetschen-Liebwerd, Dtsch. Techn. Hochsch.) Sp.
- E. Gutstein**, *Das Ektoplasma der Bakterien*. I. Mitteilung. *Über eine all-*
gemeine Methode zur Darstellung des Ektoplasmas der grampositiven Bakterien. Die
 Kulturenausstriche werden einige Min. in verd. Tanninlg. bei gewöhnlicher Temp.
 behandelt. Läßt man dann einen bas. Farbstoff einwirken, so färbt sich nur das
 Ektoplasma. Von Farbstoffen zeigten sich sehr geeignet Methylenblau (an anderer
 Stelle vom Vf. als weniger gut bezeichnet), Neumethylenblau GG, Azur II, Thionin,
 Brillant-, Brillant-, u. Jodgrün, Safranin, Pyronin, Neutralrot, Fuchsin, Gentiana-
 violett u. Methylviolettfarbstoffe, weniger gut Rhodulinviolett, Neutralviolett extra.
 (Zentralblatt f. Bakter. u. Parasitenk. I. Abt. **93**. 393—402. 1. Tafel. 1924. Berlin,
 SPIEGEL.
- Friedr. H. Lorentz**, *Der Säurezusatz zu Gonokokkennährböden*. (Im Anschluß
 zu seinen Mitteilungen über „Die Bedeutung der Reaktion für Gonokokkennährböden“).
 (Zentralblatt f. Bakter. u. Parasitenk. I. Abt. **62**. 61; C. **1924**. II.
 1924. V. hat bereits 1919 gefunden, daß Zusatz angepaßter Mengen Milchsäure
 zu bekannten Nährböden wesentlich besseres Wachstum der Gonokokken er-
 zeugt. Ähnliche Ergebnisse erhielt er mit Citronensäure, u. auch Harnsäure u.
 den vorgenannten teilweise sehr nahe verwandte Säuren wirkten günstig,
 ungünstig aber Essigsäure. Eine Gegenüberstellung von anorgan. u. organ.
 Säuren scheint dem Vf. nicht angebracht. Die Unterss. müssen an großem Material
 von Gonokokkenstämmen ausgeführt werden. Nachprüfungen mit dem Milchsäure-
 boden sind bisher meist günstig ausgefallen. (Zentralblatt f. Bakter. u. Para-
 sitenk. I. Abt. **93**. 467—69. 1924. Hamburg, Hyg. Staatsinst.) SPIEGEL.
- Gildemeister** und **Kurt Herzberg**, *Zur Theorie der Bakteriophagen*
(Phage-Lysine). VI. Mitteilung über das d'Herellesche Phänomen. (V. vgl. Klin.
 Wochenschr. **II**. 1.

Wehschr. 3. 186; C. 1924. I. 1550.) An dem spontan Lysin bildenden Stamm Coli 88 wurden Einfluß von Nährboden, Temp. u. Zeit auf die B. der Lysine untersucht. Diese fand sich konstant auch unter einfachsten Ernährungsverhältnissen. Aber auch in gutem Nährboden fand sie sich nie bei 8,75—9°; es sind dann a. Passagezüchtungen trotz hoher Bakterienvermehrung stets bakteriophagenfrei, a. gemäß dem Virulenzsteigerungsvers. von D'HERELLE. Bringt man aber so züchtete bakteriophagenfreie Kulturen wieder in Temp. von 37°, so bilden sich im Laufe von 30—45 Min., je nach Konz. der Bakterien, Bakteriophagen. Da dies durchaus typ. Bakteriophagen im bakteriophagensterilen Raum entstanden sein können sie keine Parasiten sein. Damit ist bewiesen, daß es bei einzelligen Lebewesen eine Übertragung krankhafter Zustände durch unbelebte Materie gibt. In B. der Lysine in den vorher lysinfreien Kulturen ist bei gleicher [H⁺] nicht proportional der Anzahl vorhandener toter Bakterien, was gegen B. der Bakteriophagen durch autolyt. Vorgänge spricht. Auch die spontane B. von Lysin ist ein Zeichen höchster Aktivität der lebenden Zelle, kein Zerfallsvorgang. Sie wird in einer Linie regiert von der Temp., nur sekundär von der Entwicklungsgeschwindigkeit der Bakterien. Für den untersuchten Stamm liegt das Optimum beider bei 30° (Zentralblatt f. Bakter. u. Parasitenk. I. Abt. 93. 402—20. 1924. Reichsgesundheitsamt.) SPIEGEL

Paul Hauduroy, *Die sekundären Kulturen beim d'Herelleschen Phänomen*. a. sieht oft, wenn man Bakteriophagen, z. B. gegen Shigabacillen, hergestellt und in klare Fl. filtriert hat, nach einiger Zeit im Filtrat Trübung auftreten. Dies bedingt nicht auf Verunreinigung, sondern auf Auftreten von Lebewesen, die verschiedene Aussehen haben, sich vermehren u. in ähnliche Formen oder in typ. Ausgangsformen übergehen können. (C. r. soc. de biologie 91. 1209—10. 1924. Faubert.) SPIEGEL

K. Bernhauer, *Zum Problem der Säurebildung durch Aspergillus niger*. (vorläufige Mitteilung.) Mit Rücksicht auf die Veröffentlichungen von FALCK u. K. U. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 57. 920; C. 1924. II. 316) u. WEHMER (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 57. 1659; C. 1924. II. 2669) teilt Vf. Ergebnisse eigener Unterss. mit. Die B. von Gluconsäure in Kulturen des Aspergillus auf Rohrzucker hat er gleichfalls festgestellt. Die Identifizierung der Säure erfolgte in Form des Ca-Salzes, des Phenylhydrazids u. durch Oxydation zu Zuckersäure. Als Temp.-Optimum für die Gluconsäure fand Vf. bei seinem Stamm I 30°. Die Ansicht, daß sie ein Zwischenprod. bei B. der Citronensäure darstellt, konnte noch nicht sicher bewiesen werden. Während Stamm I unter bestimmten Bedingungen fast ausschließlich Gluconsäure bildete, ergab ein Stamm II unter gleichen Bedingungen ausschließlich Citronensäure, unter bestimmten anderen Bedingungen aber wieder fast ausschließlich Gluconsäure, wenn auch in geringerer Menge u. erheblich langsamer als I, der unter noch anderen Bedingungen wieder ausschließlich Oxalursäure lieferte, das Vermögen hierzu durch Umzüchtung auf Citronensäure aber fast gänzlich verlor. Danach besteht wohl die Möglichkeit, daß sich vielleicht die einzelnen „Rassen“ des Asperg. niger durch bestimmte Züchtungsbedingungen ineinander überführen ließen. (Biochem. Ztschr. 153. 517—21. 1924. Prag, I. Univ.) SPIEGEL

Wright A. Gardner, *Die Zersetzung des Salicylaldehyds durch Bodenorganismen* (Vgl. SCHREINER u. SKINNER, Journ. Franklin Inst. 128. 329; C. 1916. I. 20.) Bei einer größeren Zahl von Bodenorganismen fanden Vff. zwar in einigen Fällen (wo wahrscheinlich noch organ. Substanzen des Bodens als Nährstoff dienen) geringes Wachstum mit Salicylaldehyd, niemals aber Zerlegung desselben. (Science 60. 503. 1924. Auburn [Alabama], Alabama Polyt. Inst.) SPIEGEL

Seigo Kondo, *Der Verwendungsstoffwechsel säurefester Bakterien*. 3. Mitteilung: *Nahrungsbedürfnisse des Hühnertuberkelbacillus; sein Wachstum beim Aufbau einfachen chemischen Verbindungen*. (II. vgl. BRAUN, STAMATELAKIS, KONDO, GOLDSCHMIDT, Biochem. Ztschr. **146**. 573; C. **1924**. II. 682.) Es werden nun die Warmblüterbacillen untersucht, zunächst der *Hühnertuberkelbacillus* (auch *Stamm Geflügeltuberkelbacillus*). Auch dieser vermag in künstlichen Nährlsgg. N-Verbb. die N-haltigen Verunreinigungen der Brutschrankluft als N-Quelle zu ersetzen, aber ebenso wenig wie Kaltblüterbacillen die C-haltigen Verbindungen dieser Luft als C-Quelle (Verss. mit **R. Goldschmidt**). Von organ. N der Fettreihe wurde nur *Essigsäure* regelmäßig u. gut als C-Quelle ausgenutzt, die einatomigen Alkohole u. Mannit nicht, *Glycerin* unregelmäßig u. in wenigen Fällen nur langsam, Glucose, Lävulose u. Arabinose nicht. Als N-Quellen NH_3 , Nitrat, Aminosäuren (bei Ggw. einer anderen C-Quelle), *Harnsäure* (dessen) verwertbar, nicht aber Harnstoff (diese Verss. müssen aber noch mit geeigneter Brutschrankluft nachgeprüft werden). (Biochem. Ztschr. **153**. 302—12. Frankfurt a. M., Städt. Hyg. Univ.-Inst.)

SPIEGEL.

Julia T. Parker, *Die Abscheidung eines Exotoxins bei bestimmten Rassen von Staphylococcus aureus*. Sterile Berkefeldfiltrate der Bouillonkulturen bestimmter Rassen von *Staphylococcus aureus* haben eine elektiv giftige Wrkg. für Kaninchen: ein weißes Zentrum mit breitem blaurotem Hof, der in den nächsten Tagen wie nekrot., wird mit umgebendem roten Hof. Am 5. Tage erscheinen in der Zone braune Stippen; am 20. Tage wird das ganze Feld dunkelbraun, 4 Wochen später entsteht ein Geschwür. Das Gift ist thermolabil, es wird bei Erhitzen auf 55° zerstört. Bei intrakutaner Injektion an Kaninchen wird die Antitoxin angeregt. Das Gift schien ein l. Toxin zu sein. (Journ. Exp. Med. **40**. 761—72. 1924. New York, Columbia Univ.)

WOLFF.

Albert Berthelot und **E. Ossart**, *Einfluß der gallenhaltigen Medien auf die chemische Zusammensetzung des Bacillus subtilis*. Dem Einfluß der Züchtung in Medien von Galle auf *Bac. subtilis* wurde als Vorarbeit für Unterss. bzgl. des *Tuberkelbacillus* (vgl. Bull. Soc. Chim. Biol. **6**. 677; C. **1924**. II. 2668) nachgegangen. Das Ergebnis, daß jene Art der Züchtung sich besonders durch Erniedrigung des Glucosegehaltes in den Bakterienleibern bemerkbar macht. (Bull. Soc. Chim. Biol. **6**. 770—72. 1924. Inst. Pasteur.)

SPIEGEL.

A. Costantino, *Die alkoholische Gärung in Beziehung zu der vitalen Aktivität von Saccharomyceten*. In Ggw. von Toluol u. bei schneller Entfernung der Endprodukte des Zuckerzerfalls verläuft die alkoh. Gärung in Hefezellen schneller als bei Abwesenheit von O_2 , also bei größerer Vitalität. Der Gärverlauf, an dem von CO_2 gemessen, ist in beiden Fällen der gleiche. Innerhalb gewisser Grenzen besteht eine direkte Beziehung zwischen Partialdruck des O_2 u. seinem Einfluß auf die Gärung, bei höherer Steigerung von jenem (auf ca. 1 atm.) nicht mehr. Bei der folgenden Versuchsanordnung ist die Einw. des Toluols auf die Hefe weniger deutlich als in geschlossenen System mit geringer Luftzirkulation u. Zurückhaltung der gasförmigen Prodd. Die Zymasewrkg. zeigt maximale CO_2 -Produktion nach 1. Viertelstunde. — Der Energiewechsel der Hefezellen besteht aus 2 Vorstufen; der erste, in Ggw. von freiem O_2 verlaufend, betrifft Verbb., die nichts als Zuckersubstanzen zu tun haben, der zweite stellt eine innere Verbrennung der Zuckersubstanzen dar. (Arch. ital. de biol. **73**. 1—10. Pisa, Univ.; Ber. ges. Physiol. **28**. 1924. Ref. HIRSCH.)

SPIEGEL.

Arthur A. Noyes und **Howard W. Estill**, *Wirkung von Insulin auf die Milchsäuregärung*. Insulin steigert die Milchsäuregärung von Traubenzucker durch *Bacillus bulgaricus* oder *acidophilus* um 20—25%. Die Ursache ist noch nicht festgestellt worden. (Vermehrtes Wachstum oder Coenzymwrkg.) Möglicher-

weise kann man so eine Wertbestimmungsmethode des Insulins, eine Eichung o. Tiervers. auffinden. (Proc. National Acad. Sc. Washington **10**. 415—18. 1914. California Inst. of Technol.)

A. Fernbach, *Die neuen Fortschritte unserer Kenntnis von der alkoholischen Gärung*. Zusammenfassender Vortrag. (Bull. Soc. Chim. Biol. **6**. 873—96. 1924.)

MÜLLEN

E₆. Tierphysiologie.

Robert Meyer-Bisch und Walter Lampe, *Über das Übertreten intravenös injizierter kolloidaler Farbstoffe in die Brustganglymphe des Hundes*. Vers. d. Trypanblau u. Trypanrot zeigten, daß die durch die Lymphwege ins Blut zurückströmenden Farbstoffmengen die Konz. des Farbstoffes im Blute in keiner Weise beeinflussen können. (Ztschr. f. d. ges. exp. Medizin **43**. 761—63. 1924. Göttin. Univ.)

SPIEGEL

Edward A. Doisy und J. O. Ralls, Edgar Allen und C. G. Johnston, *Die Extraktion und einige Eigenschaften eines Ovarienhormons*. Es zeigte sich, daß eine frische Follikelfl. (vom Schwein) die typ. Wrkg. von Ovarienpräparaten hat, daß die wirksame Substanz in alkoh. Extrakt u. aus dessen Rückstand in wss. Suspension übergeht, dieser aber durch Ä. entzogen wird. Die daraufhin ausgearbeitete Methode zur Gewinnung des Hormons ähnelt einer bereits von E. HERRMANN (Monatsschr. f. Geburtsh. u. Gynäkol. **41**. 1. [1915] angegeben, die aber auch zum Isolat als Ausgangsmaterial benutzt (vgl. FRÄNKEL u. HONDA, Biochem. Ztschr. **141**. 379; C. 1924. I. 2438). Im Gegensatz zu HERRMANN u. FRÄNKEL finden wir indessen, daß das reine Hormon kein Cholesterin enthält, da so gut wie vollständige Entfernung dieser Verb. durch Digitonin die Wirksamkeit nicht merklich ändert. Die Herst. erfolgt im allgemeinen, wie folgt: Der frische Liquor wird mit 2 Voll. 95%ig. A. versetzt, die koagulierten Eiweißstoffe werden abfiltriert u. im Soxhletapp. mit 95%ig. A. extrahiert, Filtrat u. Extrakt zusammen durch Vakuumströmung oder im w. Luftstrom zur Trockne gebracht; der Rückstand wird mit wenig W. aufgenommen u. soviel A. zugegeben, daß für je 100 ccm Follikelfl. 15 ccm Filtrat resultieren, zum Sieden erhitzt u. mit 2 Voll. Aceton versetzt. Nach Erkalten wird die entstandene Fällung abfiltriert, noch wiederholt mit der gleichen Menge A. ausgekocht, worauf die Lsg. jedesmal wieder mit Aceton in obiger Weise geklärt wird. Die vereinigten Filtrate werden zur Trockne gebracht, der Rückstand 5—7mal mit kleinen Mengen sd. 95%ig. A., der vor der Filtration jedesmal durch Eis gekühlt wird, ausgelaugt, die alkoh. Filtrate wieder zur Trockne gebracht u. in trockenem Ä. aufgenommen, die äth. Lsg. zentrifugiert u. von der Ausscheidung befreit. Der aus dieser Lsg. erhaltene Rückstand wird für die Anwendung zu Injektionen in Mazola (gereinigtem Maisöl) gel., das aber gewisse Übelstände verursacht. — Das Hormon bildet, von Cholesterin befreit, mit W. kolloide Lsgg., ist l. in Ä., Chlf., PAe. (Kp. 40—60°), 95%ig. A. u. Aceton, thermostabil, gegen milde Behandlung mit Säuren oder Alkalien widerstandsfähig, auch durch Digestion mit Pankreasbrei nicht gespalten. (Journ. Biol. Chem. **61**. 711—27. 1924. St. Louis, WASHINGTON u. St. Louis Univ. Columbia, Univ. of Missouri.)

SPIEGEL

Leon Asher, *Beiträge zur Physiologie der Drüsen*. Nr. 69. **Junsuke Masio**, *Fortgesetzte Untersuchungen über die Abhängigkeit der Phagocytose von inneren Sekretoren*. (Nr. 68 vgl. ASHER u. KOBAYASHI, Biochem. Ztschr. **151**. 491; C. 1924. II. 2677.) Die Unters. von FURUYA (Biochem. Ztschr. **147**. 410; C. 1924. II. 04) wurde einer Nachprüfung unter ausschließlicher Benutzung von Exsudatleukocyten n. Tiere unterzogen. Deren phagocytäres Vermögen fand sich in Berührung mit n. Serum ziemlich konstant, woraus geschlossen wird, daß die benutzte Versuchsmethodik von HAMBURGER u. RADSMÄ eine richtige Wiedergabe der Verhältnisse ermöglicht. Sowohl nach Exstirpation der Schilddrüsen als auch nach derjenigen

Milz zeigte sich die Konst. des Blutplasmas so verändert, daß n. Leukocyten-
erhöhung damit tiefe Herabsetzung des phagocytären Vermögens aufweisen.
Schilddrüsenexstirpation zeigte dabei die stärkere Wrkg., die auch durch gleich-
zeitige Entfernung der Milz nicht mehr verstärkt werden konnte. (Biochem. Ztschr.
302—8. 1924. Bern, Univ.)

SPIEGEL.

A. Clementi, *Untersuchungen über den Mechanismus der Sekretionsanregung in
Vellaschen Fistel durch Einführung von Krystalloidlösungen in ihr Lumen*. Stark
hyperton. wss. Lsgg. von Salzen (NaCl , MgSO_4 , MgCl_2 , Na_2SO_4) u. Harnstoff regen
bei direkter Berührung mit der Darmschleimhaut deren Sekretion unter Beteiligung
ihrer Elemente energ. an, während isoton. Lsgg. der gleichen Stoffe unwirksam
sind. Geringgradig hyperton. Lsgg. werden nach wenig Min. aus der Fistel ent-
nommen, dann folgt Sekretion einer Saftmenge, die bei gleichem Vol. u. gleicher Konz.
reizlsg. nahezu konstant ist, mit der chem. Natur der angewandten Substanz
unverändert (bei KCl u. Harnstoff keine Absonderung), bei der gleichen Substanz mit
Erhöhung ihrer Konz. steigt. In der safttreibenden Wrkg. steht K dem Na, Ca
u. Mg u. Ba nach. Subcutane Einspritzung von *Morphin* selbst in kleinsten
Mengen bringt die durch Salzlsgg. hervorgerufene Sekretion zum Stillstand (Sym-
ptomenlinderung), *Atropin* hemmt, *Pilocarpin* fördert sie wenig. (Arch. internat. de
physiol. 23. 1—48. Rom, Univ.; Ber. ges. Physiol. 28. 252. 1924. Ref. SCHEUNERT.) SP.

Johannes Kerb und **Elisabeth Kerb-Etzdorf**, *Zur Kenntnis der Glucosane.
Beitrag zu der früheren Mitteilung*. (Vgl. Biochem. Ztschr. 144. 60; C. 1924. I.
1558.) Richtigstellung von Irrtümern in der Arbeit von GRAFE u. von SCHRÖDER
(Ztschr. f. klin. Med. 144. 156; C. 1924. II. 496). α -Glucosan u. Karamose
sind polymere Prodd. Bei der Blutzuckerbest. zeigen die polymeren α -Glucosane
unterschiedliches Verh. (Biochem. Ztschr. 151. 435—37. 1924.) WOLFF.

Johannes Kerb, *Das physiologische Verhalten der Glucosane. I. Über einige
Eigenschaften mit Tetraglucosan*. (Vgl. Biochem. Ztschr. 144. 60; C. 1924. I. 1558 u.
Ref.) Intravenös verabfolgtes Tetraglucosan wird so schnell von den Ge-
fäßen aufgenommen, daß es schon nach wenigen Min. nicht mehr im Blute nach-
zuweisen ist. Nach Insulininjektion konnten Zuckeranhydridformen im Blute nicht
nachgewiesen werden, vielleicht weil diese hypothet. Körper ebenso schnell resor-
biert werden wie das Tetraglucosan. Tetraglucosan ist nach den bisherigen Verss.
nicht als Kohlenhydratanzubau anzusprechen. Es wird offenbar sehr langsam in ein verbrenn-
bares Kohlenhydrat verwandelt. (Ztschr. f. d. ges. exp. Medizin 43. 402—6. 1924.
München, Univ.)

WOLFF.

Georges La Barre, *Über die Modifikationen des Gehaltes des Blutes an Calcium und
Natrium nach dem akuten anaphylaktischen Shock beim Meerschweinchen*. In
Folgerung früherer Befunde wird unter Anwendung des genaueren Verf. von
LA BARRE (vgl. HIRTH u. KLOTZ, C. r. soc. de biologie 88. 1153. 89. 49; C. 1923.
II. 17. 1924. I. 367) das Sinken des Gehaltes an Ca u. Na im Blutplasma bestätigt.
(C. r. soc. de biologie 91. 1293—94. 1924. Straßburg, Clin. méd. B.) SPIEGEL.

Léon Blum, **Maurice Delaville** und **van Caulaert**, *Beziehungen zwischen der
Acidose und dem Zustande des Calciums im Plasma*. Bei verminderter Alkalireserve
ist der Gehalt an ultrafiltrierbarem Ca unabhängig von der Ursache dieser Acidose stets ein vermehrter Anteil von
ultrafiltrierbarem Ca gefunden. Der Grad dieser Vermehrung steht nicht im Ver-
hältnis zur Intensität der Acidose, eher zu ihrer Dauer. (C. r. soc. de biologie 91.
1924.)

SPIEGEL.

Léon Blum, **Maurice Delaville** und **van Caulaert**, *Wirkung der Kohlensäure
auf das ultrafiltrierbare Calcium im Plasma*. Durchleiten von CO_2 durch
das Blut erhöht den Gehalt an ultrafiltrierbarem Ca. Danach kann das Ansteigen
des CO_2 wenigstens eine der Ursachen der bei Acidose (vgl. vorst. Ref.) u. bei

anaphylakt. Zuständen beobachteten Vermehrung dieser Ca-Form sein. (C. r. de biologie **91**. 1292. 1924. Straßburg, Clin. méd. B.) SPIEGEL

E. Grafe und K. Sorgenfrei, *Über das Verhalten des wahren Blutzuckers bei Gesunden und Kranken. (Untersuchungen mit einer neuen Methode.)* Es wird die durch Vergärung des Zuckers mit Hefe gebildete CO₂ auf Grund des von ihm im Barcroftschcn Blutmanometer erzeugten Druckes bestimmt. Als Testobjekt wurden jedesmal eine bekannte Menge chem. reinen Traubenzuckers vergoren u. der durch erzielte Manometerausschlag unter Berücksichtigung der Gefäßgröße der Berechnung der Blutwerte zugrunde gelegt werden. Als 2. Kontrolle diente eine Aufschwemmung der Hefe selbst, um so mehr als vorbehandelte Hefe einen O₂-Verbrauch („big factor“) hat. Als 3. Kontrolle dient der Thermobarograph. Wichtig ist die Anwendung von gut u. gleichmäßig vergärender Hefe. — Vergleichende Untersuchungen nach dieser u. der Benedictschen Methode ergaben, daß bei Nichtdiabetikern die Werte nach beiden sich innerhalb ihrer Fehlergrenzen decken, im Durchschnitt nach der neuen Methode ein wenig (ca. 4%) niedriger sind. Bei Diabetikern fanden sich manchmal größere Differenzen, bis zu 40% weniger nach der Gärmethode, um so häufiger, je schwerer die Erkrankung war. Durch Injektion von *Insulin*, eineinhalb auch durch vergorenes Caramel, wurde diese Differenz schon nach 1—2 Stdn. teilweise oder ganz beseitigt. Daraus ist zu schließen, daß patholog. Intermetabol. prodd. des Kohlenhydratstoffwechsels unter Wrkg. des Insulins in der Zelle durch Oxydation oder auf andere Weise zum Verschwinden gebracht werden. (Dtsch. Arch. f. klin. Med. **145**. 294—309. 1924. Rostock, Med. Poliklin.) SPIEGEL

Henry J. John, *Traubenzuckertoleranz und ihr Wert für die Diagnose.* II. (I. vgl. Journ. Metabol. Res. **4**. 121; C. **1924**. II. 1480.) Die Ergebnisse der Traubenzuckerbelastung von weiteren 100 Fällen entsprechen den früheren. Man soll eine Belastungsprobe machen bei n. Blutzucker u. gelegentlicher Glykosurie bei Blutzuckergehalt von 130—160 mg-% im Nüchternblut (manche dieser Werte erweisen sich als nicht diabet.). bei Fettleibigkeit, bei familiärer Belastung, bei Diabetes u. natürlich bei abnorm hohem Blutzucker. — Besonders verdächtig ist ein Blutzuckergehalt von über 120 mg-% noch 3 u. mehr Stdn. nach der Mahlzeit. — Wenn man nüchtern u. 3 Stdn. nach Eingabe von 100 g Traubenzucker den Blutzucker bestimmt, kann man mit Sicherheit feststellen, ob Diabetes vorliegt. (Journ. Metabol. Res. **4**. 255—314. 1924. Cleveland.) MÜLLER

Lois Lockard Mackay und Eaton M. Mackay, *Vermehrte Harnstoffkonzentration im Blut extrarenalen Ursprungs.* Bei Kaninchen steigt durch Hungereinstellung Entziehung von W. oder nach Diurese durch intravenöse Zuckerinfusion u. Furose die Konz. des Harnstoffs im Blut allmählich stark an. Meist ist der Anstieg der Harnstoffausscheidung im Harn geringer als die Zunahme im Blut. — Diese ist durch Steigerung des Zellerfalls in den Geweben hervorgerufen. — Bei Tieren, die längere Zeit ohne W. u. Nahrung gehalten wurden, kann Zufuhr von W. die physiol. Salzlg. Krämpfe hervorrufen. (Amer. Journ. Physiol. **70**. 394—411. 1924. San Francisco.) MÜLLER

Victor John Harding, Kathleen Drew Allin und H. B. van Wyck, *Der Einfluß von Natriumchlorid auf den Harnsäurespiegel des Blutes.* Werden bei Eiweiß- oder Kohlenhydratnahrung 15 g NaCl zugefügt, so sinkt der Harnsäuregehalt des Blutes unter gleichzeitiger Zunahme von NaCl, Abnahme der Serum- und eiweißkörper darin u. totaler Retention von W. u. NaCl. Vff. schreiben die Abnahme der Harnsäure einer stärkeren Wässerung des Blutes u. dadurch vermehrte Ausscheidung von jener zu. Bei konstantem NaCl-Gehalt fanden sich zwischen Eiweiß- u. Kohlenhydratkost bzgl. des Standes der Blutharnsäure nur geringe Unterschiede. (Journ. Biol. Chem. **62**. 61—73. 1924. Toronto [Canada], Univ. Toronto Gen. Hosp.) SPIEGEL

Gaetano Viale, *Änderungen der Blutkatalasen im Hochgebirge*. Es wurde im Gebirge eine Zunahme des Katalasegehaltes im menschlichen Blut gefunden, mit einer Erhöhung der Zahl der roten Blutkörperchen parallel geht. (Atti R. Acc. dei Lincei, Roma [5] **33**. II. 290—93. 1924. Turin.) OHLE.

Isidor Greenwald, *Einige chemische Veränderungen im Blute von Hunden nach Thyreoparathyreoidektomie*. (Vgl. Journ. Biol. Chem. **61**. 33; C. 1924. II. 2858.) Der merklicher Unterschied in der titrierbaren Alkalinität. Der Abfall des Calcium bestätigt. Tetanie entwickelte sich, sobald der Gehalt an jenem auf 7 mg in 100 ccm gefallen war, häufig aber bei noch wesentlich höherem Gehalte. Der Zucker wurde wenigstens bis nach Entw. der Tetanie innerhalb der method. Grenzen unverändert gefunden. Die Veränderungen im Nucleotid-N waren unregelmäßig. Der Gehalt an „säurelöslichem“ P wurde zwar wieder erhöht, aber bei weitem nicht so stark wie in früheren Verss. (vgl. Journ. Biol. Chem. **14**. 363; C. 1913. II. 164). Erheblich war hingegen die Verminderung der Ausscheidung von P im Harn ohne ausgleichende Vermehrung im Kot. Es muß also eine Speicherung in den Geweben stattfinden. (Journ. Biol. Chem. **61**. 649—57. N. Y., Roosevelt Hosp.) SPIEGEL.

Kaname Kuwashima, *Untersuchungen über einige Faktoren bei der Blutgerinnung*. Die Ergebnisse der sehr ausführlichen Unterss. werden folgendermaßen zusammengefaßt: 1. *S* teilt die besondere Wrkg. von Ca bei der Aktivierung von Prothrombins zu Thrombin. — 2. Ca wirkt außerdem beschleunigend auf die Gerinnung dadurch, daß es die B. von Fibrin aus Fibrinogen durch Thrombin fördert. — 3. Thrombin ist unterhalb Körpertemp. beständig, bei dieser am wirksamsten. — 4. Die Identität der thromboplast. Substanz des Gewebes mit Kephalin bestätigt. — 5. Kephalin behält seinen thromboplast. Charakter bei Erhitzen auf Temp. unterhalb 120°, verliert aber bei höheren Temp. teilweise seine Wirksamkeit. — 6. Hydrogenierung beeinflusst diese Wirksamkeit nicht, Behandlung mit Salzsäure oder Formalin vermindert sie. — 7. Durch vollständige Verseifung verliert Kephalin seine thromboplast. Wirksamkeit. Solche fehlt sowohl der Glycerinphosphorsäure wie dem Aminoäthylalkohol. Salze der Stearin- u. Ölsäure u. anders ein Gemisch von Stearinsäure u. Aminoäthylalkohol beschleunigen aber die Gerinnung des Fibrinogens. — 8. Cholesterin ist ohne Einfluß auf die Gerinnung, Salzsäure verzögert sie mit oder ohne Ggw. von Kephalin. — 9. Albumin hat in verschiedenen Konzz. u. mit oder ohne Ggw. von Kephalin eine verwickelte, noch zu untersuchende Wrkg. auf die Gerinnungszeit. — 10. Behandlung von Thromboplastin mit Trypsin führt zu Gerinnung, wobei die Schnelligkeit bis zu einem gewissen Punkte mit der Trypsinkonz. wächst, darüber hinaus aber hemmt weiterer Zusatz von Trypsin, vielleicht infolge hydrolyt. Wrkg. auf das Fibrinogen. — Kephalin hat auf die Gerinnung des Fibrinogens durch Thrombin keinen Einfluß, ein großer Überschuß von jenem vermindert aber die Gerinnungsgeschwindigkeit. (Journ. Biochemistry **3**. 91—147. 1923. Tokyo, Imp. Univ.) SPIEGEL.

E. Hekma, *Die Blutgerinnung als Agglutinationsvorgang*. Vf. faßt die Fibrinbildung als eine, unter dem Scheinbild eines Krystallisationsvorganges verlaufende, Agglutination + Agglutination von Fibrinogenamikronen auf (vgl. Chem. Weekblad **1925**; C. 1924. II. 1107). Das Thrombin ist nicht als (Fibrin-)Ferment, sondern als Agglutinin zu betrachten. Fibrinogen + Agglutinin = Fibrin. (Vereeniging van Geneeskundigen te Amsterdam 1923. 1—42. Sep.) GROSFELD.

David I. Macht, *Einfluß von Menotoxin auf die Blutgerinnung*. (Vgl. MACHT, Journ. Pharm. and Exp. Therapeutics **22**. 413; C. 1924. I. 2440.) Menstrualserum verzögert die Gerinnung von Hunde- u. Menschenblut. Oxycholesterin und Cholsäure verlängern die Gerinnungszeit. Für die Gerinnungsverzögerung durch Menstrualblutserum ist das Menotoxin verantwortlich zu machen.

(Journ. Pharm. and Exp. Therapeutics **24**. 213—20. 1924. Baltimore, John Hopkins Univ.)

Ryuki Ueki, *Versuche mit gummiarabicumhaltigen Blutersatzflüssigkeiten.* Überlebenden Katzenherzen zeigte sich eine elektroosmot. gereinigte Gummiarabicumlsg. einer gleichartigen Lsg. mit ungereinigtem Gummi als Speisungslsg. überlegen. Katzen bleiben in der Regel am Leben, wenn man ihnen 50% ihres Blutes entzieht u. durch Tyrodelslg. ersetzt. Benutzt man zum Blutersatz eine Gummiarabicumlsg., so kann man den Tieren bis 70% Blut entziehen. Nach einer Infusion von Tyrodelslg. verschwindet die eingebrachte Fl. in 1½ Stdn. aus den Gefäßen; eine Gummilsg. verschwindet dagegen in 24 Stdn. noch nicht vollständig. Nach Infusion von Tyrodelslg. sinkt der Blutdruck bereits nach wenigen Min., nach Infusion von Gummilsg. bleibt er konstant. (Arch. f. exp. Pathol. u. Pharmacol. **104**. 239—49. 1924. Berlin, Kaiser Wilhelm-Inst. f. Arbeitsphysiol.)

A. Ch. Hollande, *Die Färbung der Leukocytengranula des menschlichen Blutes durch Oxybenzidin.* Vf. hält seine Ergebnisse u. Schlüsse (vgl. C. r. d. l'Acad. des sciences **178**. 1215; C. **1924**. II. 355) gegenüber negativen Befunden von FIESSINGER u. JAMIN aufrecht. Will man mit Benzidinlsg. ohne H₂O₂ die Färbung erzielen, so muß jene (in A.) gut gealtert u. sehr braun sein. (C. r. soc. de biologie **1**. 1203—5. 1924.)

Marc Romieu, *Mikrochemische Versuche über die Granulationen der eosinophilen Leukocyten des Menschen.* Mittels des Nitromolybdänreagens von MACALIM konnte P in den Granulationen nachgewiesen werden, offenbar in organ. Bindung, denn es ist ziemlich lange „Demaskierung“ erforderlich, aber doch kürzere als in das Auftreten der Färbung im Kern. Vf. glaubt daher eher an Ggw. eines P-haltigen Eiweißes nach Art des Vitellins als an diejenige eines Nucleoalbumins. Eiweiß wurde mittels der Xanthoprotein- u. der Millonschen Rk. nachgewiesen, dagegen gelang Nachweis von Fe weder mit (NH₄)HS noch nach der Berlinerblumethode noch mit Hämatoxylin. P ließ sich auch in Charcotschen Krystallen nachweisen. In den eosinophilen Körnungen scheint er erheblich reichlicher vorhanden als in den Erythrocytenstromaten. (C. r. d. l'Acad. des sciences **179**. 579—1. 1924.)

Jean Oliver und Leonard Barnard, *Der Einfluß der Wertigkeit von Kationen und Anionen auf negativ und positiv geladene rote Blutkörperchen.* Blutkörperchen vom Kaninchen wurden durch isoton. Zuckerlsgg. weitgehend von Elektrolyten befreit u. zu den Verss. in ebensolchen Lsgg. zuspensiert. Ihre elektr. Ladung wurde in der kataphoret. Zelle von MICHAELIS gemessen. Die Suspensionen der positiv geladenen Körperchen wurden durch Hinzufügen von HCl hergestellt. Die Wertigkeit des Kations bestimmt den Grad der Einw. auf negativ geladene Körperchen, die Wertigkeit des Anions die Einw. auf positiv geladene Körperchen. Zur Unters. gelangten die Kationen von NaCl, NiCl₂ u. AlCl₃ u. die Anionen von NaCl, Na₂SO₄ u. Na₃PO₄. Anomalien sind zum Teil den Schwankungen der Ionenkonz. zuzuschreiben, die ihrerseits von der Hydrolyse der Salze abhängig ist. Letztere Einflüsse, die Vff. an CaCl₂, CaNO₃, CaCrO₄ u. Ca-Acetat als auch an CuCl₂ u. CeCl₃ untersuchen, machen es vorläufig unmöglich, quantitative Beziehungen zwischen den Aktivitäten verschiedener Salze allein auf Grund der Wertigkeit ihrer Ionen hin aufzustellen. (Journ. Gen. Physiol. **7**. 225—33. 1924. San Francisco, Med. School, Stanford Univ.)

Shinjiro Kikuchi, *Einfluß verschiedener Substanzen auf die Vitalität der roten Blutkörperchen.* Um die Vitalität der Blutkörperchen zu ermitteln, transfundiert Vf. das Blut auf Kaninchen u. bestimmt die Zeit, während der sie noch im Kreislauf des Empfängers nachgewiesen werden können. Die Körperchen von Meerschweinchen, Pferd, Schwein, Ratte, Katze, Hammel u. Huhn verschwinden bei

30 Min., die des Rindes dagegen erst nach 38—73 Min. Ringersche u. Lockesche wirken nicht besser konservierend als isoton. NaCl-Lsg. Gelatine, zu $\frac{1}{8}$ — $\frac{1}{4}\%$ dieser Lsg. gel., schützt nicht vor der mechan. Schädigung des Wachsens. von fein suspendiertem Cholesterin in der Lsg. beeinflusst die Vitalität nicht. Ausschuß von O_2 aus der Blutsuspension durch Sättigung mit anderen (H_2 , CO_2 , CO , NO , H_2S) scheint sie zu schädigen, wobei CO , NO u. H_2S wirken. Hypoton. NaCl-Lsg. (0,65%) hat keinen nachteiligen Einfluß. Lsg. von $pH = 7,8$ ist günstiger, von 5,2 ungünstiger als solche von 7,1, während der Alkalität des n. Blutes. Farbstoffe, wie Gentanaviolett u. Säuren, schädigen die Vitalität deutlich. (Journ. Biochemistry 3. 325—72. 1924. Imp. Univ.)

SPIEGEL.

Yunichi Umezawa, *Der Einfluß von Salzlösung auf die roten Blutkörperchen*. Versuchsergebnisse machen es wahrscheinlich, daß die Schrumpfung, welche Körperchen in Lsgg. von Salzen wie $K_4Fe(CN)_6$ u. NaCl bei gewissen Konz. durch ein elektroendosmot. Phänomen bedingt ist. Ist ein anderer Elektrolyt in genügender Menge in der Lsg., so verschwindet die Schrumpfung, der Nichtelektrolyten (Saccharose) nicht. (Journ. Biochemistry 3. 461—69. 1924. Imp. Univ.)

SPIEGEL.

Takaji Shionoya, *Über den Einfluß des Salzes und des Globulins auf das Agglutinationsphänomen*. I. Einfluß des Salzes auf Bakterienagglutination, u. II. Einfluß des Salzes auf Hämagglutination decken sich im wesentlichen mit dem Inhalt einer früheren Mitteilung (Lancet 203. 905; C. 1923. III. 399.). — III. Einfluß des Globulins als hemmender Faktor gegenüber Agglutination u. Hämolyse. Vf. fand nach Injektion von Adrenalin oder Pilocarpin im Serum nichtsyphilit. Personen eine Rk., die der Wa-Rk. ähnelt, bedingt durch Zunahme des Globulinanteils im Blutserum. Die Hemmung der Agglutination steht in inniger Beziehung zum Verhältnis von Globulin u. Albumin, Vermehrung von jenem hemmt die Fällung des Gemisches von Bakterien u. Agglutinin, deren Verb. dadurch nicht ganz gehindert, aber offenbar verändert wird. (Journ. Biochemistry 3. 423—55. 1924. Tokyo, Kaiserl. Univ.) SP.

Wilhelm Starlinger, *Über Wesen und Bedeutung des Vorganges der reversiblen Hämolyse. Vorläufige Mitteilung*. Beobachtungen an der durch Salze bedingten Umkehr der Hypotoniehämolyse. (Wien. klin. Wchschr. 37. 1208—9. 1924. Univ.)

FRANK.

Yasutaro Tadokoro, *Über die Dispersität und die Oberflächenspannung des Blutes*. Die Dispersität wurde durch Vergleich der ultravioletten Absorptionskurven ermittelt. Dabei zeigten sich zwischen den Seren verschiedener Tierarten erhebliche Unterschiede in Form u. Umfang der Absorptionskurven. Bei weiblichen fand sich eine unregelmäßige Änderung unmittelbar u. 1 Woche nach Aufbruch der Menstruation. In der Oberflächenspannung zeigten sich keine Unterschiede zwischen den einzelnen Tierarten, aber bei jeder verschiedene Typen, beim Mann gleichmäßig bei Mann u. Weib, bei diesem mit unregelmäßiger Änderung in der Menstruation u. unmittelbar nach dieser. (Journ. Biochemistry 3. 203. 1924. Sapporo [Japan], Hokkaido Univ.)

SPIEGEL.

Bečka und A. Šimánek, *Studium der Eiweißkoagulation in Tropfen*. VI. Mitteilung. Über den Einfluß der Stickstoffverbindungen auf die Fällung. (V. vgl. C. 1924. II. 1107.) In W. I. L. ŠUK u. ZLÁMAL, Biochem. Ztschr. 148. 529; C. 1924. II. 1107.) In W. I. L. mit einer NH_2 -Gruppe im Mol. üben auf die chem. Eiweißfällung einen charakterist. Einfluß aus; untersucht wurden Harnstoff, Glykokoll, Tyrosin, Asparagin, Wittepepton. In 1%ig. Lsg. von Pferdeserum hemmen Aminosäuren stark die Fällung durch $CuSO_4$, während Harnstoff sie fördert. Rindereiweiß wird bei Fällung von NH_2 -Verbb. durch Cu^{++} , Zn^{++} , Fe^{++} stärker gefällt. Mittels Tannin kann Rindereiweiß der NH_2 -N noch in Konz. $\frac{1}{10000}$ -m. nachgewiesen werden. Änderung

des Eiweiß- u. NaCl-Gehaltes beeinträchtigt nicht die Wrkg. der NH_2 -Gruppe. (Biochem. Ztschr. 149. 150—57. 1924. Brünn, Tierärztl. Hochsch.) WOLFF.

T. Shirosaki, *Über die präzipitierende Wirkung des Rinderserums*. Eine Angabe von JAUMAIN (C. r. soc. de biologie 88. 1213 [1923]), daß akt. Rinderseum mit n. Meerschweinchenserum Fällung gibt, wird bestätigt. Die Rk. bleibt bei Verwendung von inaktiviertem Rinderseum aus u. ist häufig, aber nicht immer, geschwächt, wenn das Meerschweinchenserum inaktiviert wurde. Auch gegen Menschenseum ließ sich fällende Wrkg. des Rinderserums feststellen, aber mit erheblichen individuellen Unterschieden, die darauf hinweisen, daß dafür eine erhöhte Labilität der Bluteiweißkörper verantwortlich ist, wie sie z. B. besonders unter dem Einflusse von Tuberkulose auftritt. (Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exp. Therapien 41. 480—86. 1924. Heidelberg, Inst. f. exp. Krebsforsch.) SPIEGEL.

Anna Dean Dulaney und **James Harvey Jennett**, *Eine Untersuchung der Sera von gegen Globuline aus menschlichen Seren immunisierten Kaninchen*. Die Sera so immunisierter Tiere vermochten einige Tage (bis zu 26 bzw. 33 Tage nach der letzten Globulininjektion), auf 56° erhitzt, die Komplementwrkg. zu hemmen. Diese Wrkg. fand sich nie bei frischen unerhitzten Seren der betreffenden Kaninchen, wohl aber nach Beseitigung ihres natürlichen Komplements durch Filtration oder Adsorption. Die Natur der hier nachgewiesenen „antihämol. Substanz“ konnte nicht aufgeklärt werden. Es handelt sich nicht um wahres Antikomplement, sondern um eine Fällung des Immunserums mit Meerschweinchenkomplement, hämolyt. Amboceptor oder Hammelblutkörperchen. — Ferner wurden in dem Immunseum präzipitierende, hämolysierende u. agglutinierende Antikörper für Menschenblut nachgewiesen; auch Komplementbindung zeigte sich, ist aber vielleicht nur eine Folge der Präzipitation. (Journ. Immunology 9. 427—41. 1924. Univ. of Missouri.) SPIEGEL.

H. F. Höst, *Der Harnzucker und seine Beziehung zum Blutzucker*. Im Gegensatz zu dem Harn zugesetztem Traubenzucker vergäht das im n. Harn vorhandene Kohlenhydrat innerhalb 48 Stdn. bei 37° vollständig. Das Optimum der pH-Werte zwischen 5,3 u. 6,8. — Dieses n. Harnkohlenhydrat steht zum Blutzuckergehalt in gar keiner Beziehung. Es ist vermehrt in stark konz. Harnen u. nach reichlichem Genuß von Brot. Die Reduktionsproben sind dann deutlich positiv. Eine krankhafte Zuckerausscheidung aus dem Blut in den Harn erfolgt nur, wenn die Enzyme des Blutzuckers die renale Ausscheidungsschwelle überschritten hat. — Es ist äußerst zweifelhaft, ob Traubenzucker selbst im n. Harn vorkommt. (Journ. Metabol. Res. 4. 315—414. 1924. Kristiania.) MÜLLER.

Oskar Adler, *Zur Kenntnis der Pentosurie*. In einem Falle von Pentosurie mußte die vorhandene Pentose als *l-Ribose* angesprochen werden. Nur das Verhalten des Phenyllosazons stimmte nicht dazu, da die anfängliche Rechtsdrehung nicht ab-, sondern zunahm. Diese Anomalie kann aber vielleicht durch den Einfluß noch vorhandener Beimengungen erklärt werden. (Dtsch. Arch. f. klin. Med. 45. 326—32. 1924. Karlsbad.) SPIEGEL.

G. v. Pannewitz, *Untersuchungen der H-Ionenkonzentration des Blases im Dienste der Säure-Alkaliausscheidungsprobe zur funktionellen Nierendiagnostik*. Um störende Einflüsse bei der Belastungsprobe nach REHN auszuschalten, sollen die Einw. auf die $[\text{H}^+]$ des Harns untersucht werden. Das Ansteigen von pH-Werten während der Mahlzeiten wird bestätigt, Sinken findet nur nach sauren Speisen u. Hafer statt. Niedrige Werte finden sich bei Achlorhydrie des Magensaftes. Im Schlaf tritt saurer Harn abgesondert, eben nach Injektion von *Morphin*, *Scopolamin* u. *Ipa-*
verin. Alkaliurie findet sich nach *Kaffeein* u. *Digitalis*, ferner bei Nervösen in Folge psych. Erregung u. bei Hysterie kurz vor Anfällen; sie wird in den letzten Ele-

- Chloräthylrausch ausgeschaltet. (Ztschr. f. urol. Chirurg. **15**. 227—45. Freie Univ.; Ber. ges. Physiol. **28**. 274—75. 1924. Ref. BLOCH.) SPIEGEL.
- Frederick M. Allen** und **Albert H. Ebeling**, *Experimentelle Diabetesstudien. Acidose. 5. Ketosis bei Hunden mit Eckscher Fistel*. Das Auftreten von Ketonen bei hungernden Hunden u. nach Phlorhizin wird durch Anlegung einer Leberfistel nicht deutlich verändert. — Die Annahme, daß die Ketonkörper in der Leber gebildet werden, ist abzulehnen. (Journ. Metabol. Res. **4**. 423—30. 1924. New York.) MÜLLER.
- Erwin Becher**, *Über das Vorkommen aromatischer Gruppen in enteweißtem Blut, Körperflüssigkeiten und Geweben, nachgewiesen am Ausfall der Xanthoproteinreaktion*. Im Blut, Körperfl. u. Geweben lassen sich nach Enteweißung aromatische Gruppen mit Hilfe der Xanthoproteinrk. nachweisen. Von den die Rk. gebenden Gruppen lassen sich 2 Gruppen unterscheiden, eine Ä.-unl., N-haltige Fraktion (Aminosäure, höhere Eiweißspaltprodd.) u. eine nach Hydrolyse Ä.-l., N-haltige Fraktion (Phenole, Kresole, aromat. Oxyssäuren). Bei Niereninsuffizienz sind im Blut, Körperfl. u. Geweben beide Fraktionen vermehrt, besonders die nach Hydrolyse Ä.-l. Körper, im Liquor dagegen nicht oder nicht nennenswert. Bei Herz- u. Infektionskrankheiten kann die Xanthoproteinrk. stärker als n. sein. Im Leichenblut können starke Erhöhungen der aromat. Gruppen beobachtet werden, wobei die Ä.-l. Fraktion dann ebenso wie bei Leberkrankheiten vermehrt ist. (Münch. med. Wchschr. **71**. 1677—78. 1924. Halle, Univ.) FRANK.
- Fules Amar**, *Gang der vitalen Gerinnung*. Läßt man die Gerinnung von Milch durch C. r. d. l'Acad. des sciences **178**. 522. 1628; C. **1924**. I. 1806. II. 689) durch zunehmende Mengen des Gerinnungsmittels (Citronensäure) bewirken, so ist der Gerinnungsgrad nur ein teilweiser, das Gewicht der Gerinnung proportional der Menge des Gerinnungsmittels, vermehrt sich aber mit der Zeit, wobei sich wieder Parallelismus mit der Verminderung der Oberflächenspannung zeigt. Bei geringen Mengen geht das Kolloid nur langsam u. isoliert vor sich. (C. r. d. l'Acad. des sciences **1917—19**. 1924.) SPIEGEL.
- Fules Amar**, *Die Phänomene der Gerinnung und das Leben*. Zusammenfassung von mehreren Mitteilungen (vgl. C. r. d. l'Acad. des sciences **178**. 1317. 1628; **1916**; C. **1924**. II. 51. 689. 1483 u. vorst. Ref.) bereits veröffentlichten Ansichten über Gerinnungsphänomene. (Rev. gén. des colloides **2**. 294—301. 329—35. 1924.) SPIEGEL.
- L. V. Bock** und **H. Field jr.**, *Das Kohlendioxidgleichgewicht in alveolarer Luft und arteriellem Blut*. (Vgl. BOCK, FIELD u. ADAIR, Journ. Biol. Chem. **59**. 353; **1924**. II. 1477.) Die Verss. ergeben, daß die wirkliche Zus. der Luft in den Lungen sehr nahe wiedergegeben wird durch diejenige von nach HALDANE u. HENRIE direkt am Ende der Ausatmung entnommenen Proben u. daß ihre CO₂-Sättigung derjenigen des Arterienblutes sehr nahe kommt, außer bei Personen mit Nieren- oder Herzschädigungen. (Journ. Biol. Chem. **62**. 269—74. 1924. Boston, Massachusetts Gen. Hosp.) SPIEGEL.
- L. Rubner**, *50 Jahre Ernährungswissenschaft*. Kurzer Forschungsbericht. (M. med. Wchschr. **50**. 1699. 1924. Berlin.) SPIEGEL.
- A. Policard**, **R. Noël** und **D. Pillet**, *Histochemische Untersuchung der Veraschungen des Aschengehaltes des Lebergewebes infolge verschiedener Ernährungsbedingungen*. Beim Veraschen von Leberschnitten von auf verschiedene Art ernährten Mäusen beobachtet man Unterschiede in der Menge der Asche u. der Löslichkeit der Veraschung. Besonders charakterist. ist, daß bei reiner Zuckernahrung die Asche in der subhepat. Zone viel reichlicher vorhanden ist als in der Pfortalen; in der ersten gelingt die Veraschung leicht, in der zweiten nur schwer. Histochem. Angaben ergänzen diese Befunde. (C. r. soc. de biologie **91**. 11—20. 1924. Lyon, Fac. de méd.) SPIEGEL.

L. Randoin, J. Alquier, Asselin und Charles, *Die stickstoffhaltigen Stoffe Getreideabfällen. Vergleichende Untersuchung ihres biologischen Wertes als Faktor von Ernährung, Wachstum und Fruchtbarkeit*. Es wurden 4 Handelsmarken an die zur Viehfütterung geeigneten Nebenprodd. der Müllerei von Handelsgetreide analysiert: a) Kleie, b) schwarzes Kleienmehl, c) Grützenkleie u. d) „bâtards.“ Bei a und vier Prodd. wurden ca. 15% N-haltige Verbb. gefunden. Ausgewachsene Meerschweinchen lebten bei ausschließlicher Ernährung mit a) 8 Tage, mit b) 15 Tage, mit c) 20 Tage, junge Ratten lebten 27, 39, 102 u. 158 Tage. Wurden a—d mit Stärke, milchsaurem Kalk, Cellulose, sowie Butter (Vitamin A) u. Citronensaft (Vitamin C) versetzt, so wurden bei Meerschweinchen folgende Ergebnisse erhalten: mit a) weder Ernährung noch Wachstum, kurze Lebensdauer; mit b) ähnlich wie a), jedoch längere Lebensdauer; mit d) Ernährung, Wachstum etwas geringer als n.; mit c) Ernährung u. fast n. Wachstum. — Wird a) mit Zucker, Butter, NaCl u. CaCl₂ vermischt zur Ernährung junger Ratten angewandt, so werden n. Ernährungs- u. Vermehrungsverhältnisse geschaffen, die jungen Ratten leben aber nur 2—3 Tage. Zugabe von Gelatine (Lysin) zu a) verlängert die Lebensdauer bei Meerschweinchen u. vermehrt das Wachstum der Ratte am Anfang bewirkt aber längere Sterilität der Weibchen. Zusatz von Casein statt Gelatine führt — auch bzgl. Vermehrung u. Gedeihen der Jungen — zu vollständig n. Bedingungen. (C. r. d. l'Acad. des sciences **179**. 1342—45. 1924.) HABERLAND

Ernest Tso, *Der Wert von Eidotter für die Ergänzung kalkarmer Kostformen*. Die Verss. an weißen Ratten zeigten, daß Eidotter in der Fähigkeit, die Assimilation von Ca zu fördern, dem Lebertran sehr nahe kommt. (Proc. of the Soc. exp. biol. and med. **21**. 410—11. Peking; Peking Union med. coll.; Ber. exp. Physiol. **23**. 241. 1924. Ref. WIELAND.) SPIEGEL

Arthur H. Smith und Theodore S. Moise, *Ernährung und Gewebewachstum II. Die Regeneration von Lebergewebe bei Ernährung mit unzureichenden Kostformen und im Hunger*. Die relative Giftigkeit von Chlf. bei subcutaner Einspritzung ist größer bei Ratten, die eine Gelatinenahrung bekamen, geringer bei solchen, die hungerten u. am geringsten bei solchen, die eine Gliadinnahrung bekamen. Die Regeneration der Leberzellen bei Ratten nach Chlf.-Vergiftung erfolgt bei der Gliadinnahrung ebenso rasch wie bei einer Caseinnahrung, dagegen erheblich länger bei Fütterung einer Gelatinenahrung u. im Hunger. (Journ. Exp. Med. **40**. 209—18. 1924. New Haven, Yale Univ.) ARD

J. C. Drummond, *Einige moderne Bestrebungen der Vitaminforschung*. Bei gegenwärtigen Stande unseres Wissens können wir eine Substanz als Vitamin betrachten, wenn sie für das Leben u. das Wohlbefinden eines Organismus erforderlich ist, u. der Organismus nicht die Fähigkeit besitzt, die Substanz synthetisch zu bilden. Von den einfacheren Organismen scheinen die Diatomeen entgegen anderen Behauptungen nicht auf Vitamine angewiesen zu sein. Das „Bios“, welches das Hefenwachstum fördert, ist vielleicht mit Unrecht als ein Vitamin im engeren Sinne betrachtet worden. Einige von den Bakterien scheinen gewisse Reizstoffe, die den Vitaminen an die Seite zu stellen sind, nicht entbehren zu können. Protozoen können anscheinend ohne Vitamine gedeihen, dagegen braucht schon Drosophila das Vitamin B, während sie A u. C entbehren kann. Kaulquappen u. Fische benötigen Vitamin B unbedingt, Fische benötigen schon Vitamin A u. B, während sie Vitamin C entbehren können.

Das Vitamin A u. das antirachit. Vitamin, dem die Bezeichnung D gegeben wird, können beide am besten aus dem unverseifbaren Rückstand durch Extraktion mit PAe. oder Ä. gewonnen werden, wenn die Verseifung mit alkoh. Alkalien unter Verhütung von Oxydation vorgenommen wird. Aus dem unverseifbaren Rückstand von Lebertran kann so nach Entfernung des Cholestearins ein

Öl gewonnen werden, welches die Vitamine A u. D enthält. Dieses wirk-
Öl besteht im wesentlichen aus ungesätt. Alkoholen u. kann durch fraktio-
Dest. im Vakuum zerlegt werden. Die Vitamine sind widerstandsfähig
Acetylieren, Benzoylieren u. anscheinend auch gegen Red., während Oxy-
ihre Wirksamkeit zerstört. Jedenfalls enthalten die wirksamen Fraktionen
hließlich C, H u. O. Sie stellen chem. definierte Einheiten dar u. sind nicht
Stoffe wie die Enzyme.

Das Vitamin B ist wahrscheinlich in Form eines Pikrates von SEIDELL dar-
stellt worden. Dieser Vf. glaubt, daß der wirksame Stoff ein Pyrimidin sei.
Vitamin C ist zwar noch nicht dargestellt worden, jedoch hat ZILVA aus
ensaft durch Gärung u. verschiedene Fällungen eine in kleinsten Mengen
amste Fraktion gewonnen. (Chemistry and Ind. 43. 908—11. 1924.) ARON.

Emil Abderhalden, *Über Vitamine*. Im wesentlichen zusammenfassender Vor-
(Ztschr. f. angew. Ch. 37. 665—67. 1924. Halle a. S.) ARON.

Arthur D. Holmes, *Über die Vitaminwirksamkeit von Lebertran*. VII. *Die*
in A-Wirksamkeit von Rotaugenleberöl. (VI. Ind. and Engin. Chem. 16. 295;
24. II. 1599.) Um festzustellen, ob die Gewohnheit der Fischer Rotaugen-
mit Stockfischlebern zu mischen, auf die Wirksamkeit des Lebertrans einen
uß hat, erhielten Vitamin A frei ernährte Ratten Zulagen von reinem Rot-
lebertran. 0,8 mg rohen Rotaugenlebertrans täglich verabreicht, decken den
cf junger Ratten an Vitamin A vollauf. (Ind. and Engin. Chem. 16. 379—81.
2

ARON.

Agnes Fay Morgan und Lillias D. Francis, *Biologische Nahrungsmittelunter-*
ungen. VII. *Der Vitamin A- und B-Gehalt von frischem und getrocknetem Kürbis*.
gl. Amer. Journ. Physiol. 68. 397; C. 1924. II. 1702.) Der Vitamin B-Gehalt
ischen Kürbis entspricht $\frac{1}{4}$, der Vitamin B-Gehalt des getrockneten Kürbis
s $\frac{1}{6}$ der Wirksamkeit trockener Bierhefe. Durch Trocknen bei niedriger
unter einem starken Luftstrom leidet der Vitamin B-Gehalt des Kürbis nur
. Getrockneter Kürbis enthält reichlich Vitamin A, entsprechend etwa einem
es Vitamin A-Gehalts im Lebertran. (Amer. Journ. Physiol. 69. 67—77. 1924.
ley, California-Univ.)

ARON.

Agnes Fay Morgan, *Biologische Nahrungsmitteluntersuchungen*. VIII. *Vitamin A*
im Rettig. (VII. vgl. vorst. Ref.) Rettig enthält sehr wenig oder gar kein
in A, dagegen ziemlich reichlich Vitamin B. (Amer. Journ. Physiol. 69. 634
7. 1924. Berkeley, California-Univ.)

ARON.

Adna M. Honeywell und H. Steenbock, *Die Synthese von Vitamin C durch*
ung. Vitamin C entsteht in großen Mengen beim Keimen der *Gerste*, meist
ach 24—96 Stdn., zumal bei O₂-Abschluß. — Die B. des Vitamin erfolgt auch
ikelheit, braucht aber O₂-Ggw. Es scheint, daß auch die vor Entstehung des
ains sich bildenden Prodd. Meerschweinchen gegen Auftreten der Avitaminose-
einungen schützen können. (Amer. Journ. Physiol. 70. 322—32. 1924.
don.)

MÜLLER.

. B. Williams, *Ultraviolett Licht und das antineuritische Vitamin*. Gegen-
verschiedenen Angaben, nach denen Nährstoffe durch Ultraviolettbestrahlung
hit. werden sollen, berichtet Vf., daß bei Bestrahlung von wss. Hefeextrakt
23 mm tiefer Schicht während weniger Stdn. mit der Quarzquecksilberlampe
ineuritis. Faktor vollständig zerstört wurde. (Science 60. 499. 1924. Roselle
)

SPIEGEL.

ezsonoff, *Über die Farbreaktionen der fettlöslichen Faktoren*. (Vgl. Bio-
cal Journ. 18. 384; C. 1924. II. 1817.) Das für den Nachweis des anti-
t. Faktors C angegebene Reagens aus reiner Phosphormolybdänwolframsäure
ach mit dem fettl. Faktor A eine Blaufärbung (in der wss. Schicht), dagegen

mit dem antirachit. Faktor bei Anwendung der benzol. Lsg. des zu prüfenden Fettes Orangefärbung der Bzl.-Schicht. Die Rk., die in frischem Lebertran gefehlt haben kann, ist stärker nach Erhitzen u. Einw. der Luft. (C. r. d. l'Acad. des sciences **179**. 572—74. 1924.)

G. W. Cavanaugh, R. A. Dutcher und J. S. Hall, *Antiskorbutische Wirksamkeit von Vollmilchpulver*. Frisch bereitetes Vollmilchpulver hergestellt durch Konz. u. Pasteurisation der Milch in einem geschlossenen mit Glas ausgelegten Behälter u. Trocknen unter Abschluß von Luft nach dem MERRELL-SOULE-Verfahren, an Meerschweinchen geprüft, die gleiche antiskorbut. Wrkg. wie die frische Milch, aus der die Trockenmilch hergestellt war. Eine nachweisliche Zerstörung des Vitamin C findet also durch diesen Trocknungsprozeß nicht statt. (Ind. Engin. Chem. **16**. 1070—73. 1924. Pennsylvania, State College.)

Alexander Palladin, *Beiträge zur Biochemie der Avitaminosen*. 1. *Kohlenhydratstoffwechsel bei experimentellem Skorbut*. Bei Verabreichung von Nahrung (Hafer u. gekochtes W.), der das Vitamin C fehlt, an Meerschweinchen, trat Hyperglykämie auf. Diese erreichte in der zweiten Skorbutwoche ihr Maximum. Während dieser Zeit waren äußere Krankheitssymptome nicht zu bemerken, das Gewicht der Versuchstiere war unverändert. Erst beim Zurückgehen der Hyperglykämie u. allmählichem Übergang in Hypoglykämie traten Skorbutsymptome auf, bis das Tier an Skorbut einging. — Die Hyperglykämie beim Skorbut hatte keine Glykolyse zur Folge. — Parallel mit dem Steigen u. Fallen des Blutzuckergehaltes geht ein Zu- u. Abnahme des nach WOHLGEMUTH bestimmten Amylasegehaltes von $D^{389/1h} = 3$ auf $D^{389/1h} = 500$ auf $D^{389/1h} = 4$ (kurz vor dem Tode). — Beim Skorbut erschwindet das Glykogen aus der Leber; am Ende des Skorbuts war das Glykogen überhaupt nicht mehr nachweisbar. (Biochem. Ztschr. **152**. 228—45. 1924. Charkow Mediz. Inst.)

L. C. Dunn, *Wirkung trockener Aufbewahrung auf die antirachitische Wirksamkeit von Lebertran*. Roher im Dunklen 6 Monate lang aufbewahrter Lebertran hatte bei Hühnern geprüft volle antirachit. Wrkg. Wurde dagegen der Lebertran in einer Mischung mit Stärke im Verhältnis 15:85 gemischt trocken aber sonst in gleicher Weise aufbewahrt, so nahm die antirachit. Wrkg. stark ab. Eine Abnahme des Gehaltes an Vitamin A findet unter gleichen Bedingungen nicht statt. (Science **59**. 485. 1924. Stores, Connecticut, Landw. Vers.-Stat.)

Wilhelm Stepp und Jonas S. Friedenwald, *Zur Frage der experimentellen Erzeugung von Schichtstar bei jungen Ratten durch Vitaminmangel der Nahrung*. Entgegen den Angaben von ECKSTEIN u. v. SZILY (Klin. Wchschr. **3**. 15; C. 124 I. 683) konnte mit der von ihnen benutzten Kost (Nr. 3143 von MC COLLMER, SIMMONDS, SHIPLEY u. PARK) niemals Katarakt hervorgerufen werden. (Klin. Wchschr. **3**. 2325—27. 1924. Baltimore, JOHNS HOPKINS Univ.)

Anna Kudrjawzewa, *Über den Einfluß der Polyneuritis auf den Kreatinergehalt in den Muskeln*. (Vgl. PALLADIN u. KUDRJAWZEWA, Ztschr. f. physiol. Ch. **36**. 45; C. 1924. II. 705.) Der Kreatinergehalt in den Brustmuskeln n. ernährter Tauben beträgt im Durchschnitt 0,447%, ungefähr wie bei anderen Vögeln. Polyneuritis ruft, ähnlich wie Avitaminosen bei anderen Tieren, eine Störung des Kreatinoffenwechsels hervor, die sich in Erhöhung des Gehaltes im Muskel äußert. (Ztschr. f. physiol. Ch. **141**. 105—9. Charkow, Med. Inst.)

Curt Oehme, *Der Wasser-Salzbestand des Menschen in Beziehung zum Sauerstoff-Basenhaushalt*. II. *Physiologisches Ionengleichgewicht und Mineralstoffwechsel*. (Zusammen mit Hermann Paal.) (I. vgl. Arch. f. exp. Pathol. u. Pharmacol. **102**. 40; C. 1924. II. 491.) Bei zwei in ihrem Ionengehalt verschiedenen, in Natrium-Cl- u. Fettgehalt jedoch gleichen, analysierten Kostarten werden die Ionenkonzentrationen u. Wasserbewegungen nach Zulage von HCl, NaCl, NaHCO₃, KCl, KHCO₃ u. NaCl

wert. Bei der eiweiß-, Na-, Ca-reicheren Kost („*DI*“) gehen durch NaHCO_3 a. P. verloren, durch Zulage von NaCl werden beide angesetzt. Das Um-
kehrte ist bei der eiweißärmeren, Kohlenhydrat-, K-, Mg-reicheren Kost („*DI*“) Fall. Cl wird durch NaHCO_3 bei *DI* überschüssig ausgeschieden, bei *DI* tiert. Auch bei HCl- u. NaCl -Zufuhr verrät *DI* größere Neigung zu Cl-
ation. Die bzgl. Cl u. W. bei beiden Kostarten austreibende Wrkg. der-
e wird (bei *DI*) durch MgCl_2 umgekehrt. Die bei beiden Kostarten er-
nde Entwässerung durch Säure beruht auf deren Eingriff in das Kationen-
valentverhältnis, wie überhaupt für die Wasserbewegungen Verschiebungen im
iol. Ionengleichgewicht weit mehr maßgebend sind als die Reaktionslage des
wechsels an sich. Auf einem analogen Eingriff beruht wahrscheinlich auch
scheinbare Verschiebung des Stoffwechsels nach der alkal. Seite durch KCl.
erverknappung (ohne Durst) bei der molenreichen Kost *DI* führt zu Cl-Anstieg
lut ohne Veränderung des relativen Plasmavol. u. des Serumeiweißgehaltes.
r diesen Umständen bewirkt HCl in isoton. Salzlsg. eine starke Cl-Abgabe.
der Körper W. u. Kationen durch Säureperioden verloren, so führt NaHCO_3 ,
nd bei negativ werdender Cl-Bilanz, zu besonders starker Wasserretention, Be-
nungen, wie sie beim Diabetes mellitus oft verwirklicht sind. Die Wrkg. zu-
fuhrter Salze hängt völlig von dem Äquivalentverhältnis der gleichzeitig in der
ung eingenommenen Ionen ab u. kann sich bei verschiedenen Kostarten um-
n. Bzgl. des Bedarfs an einzelnen Mineralstoffen kann nur von einem be-
ehen Minimum, das erst durch ein bestimmtes Ionenmischungsverhältnis der
o fixiert wird, gesprochen werden. (Arch. f. exp. Pathol. u. Pharmak. 104.
-47. 1924. Bonn, Univ.)

WOLFF.

Douglas R. Drury, Studien über die Gesamtgalle. VII. Bedingungen, die den
umgehalt der Galle beeinflussen. (VI. vgl. MC MASTER, Journ. Exp. Med. 40.
1924. II. 2770.) Bei Verss. an Fistelhunden zeigte sich, daß der Ca-Gehalt
Galle unter physiol. Bedingungen, die keine großen Schwankungen der Sekret-
e hervorrufen, ausgesprochen konstant ist. Demnach schwankt die 24-std.
enge in direkter Abhängigkeit von der Gallenmenge. Wird die Gallenmenge
vermindert, z. B. durch Hungern, so steigt der Ca-Gehalt deutlich an, doch
bis zu völligem Ausgleich. Wenn die Gallenmenge nach Nahrungszufuhr
über den Durchschnitt ansteigt, wird der Ca-Gehalt nicht wie der an Gallen-
stoff entsprechend vermindert, sondern neigt dazu, konstant u. n. zu bleiben.
elen große Gallenmengen abgeschieden, so wird also auch viel Ca abgegeben,
h nicht infolge der vermehrten Zufuhr, denn weder die Verfütterung von
henmehl, noch die intravenöse oder orale Zufuhr großer Mengen von Ca-
n ändert irgendwie die Ca-Ausscheidung mit der Galle. Die n. Gallenblase
niert kein Ca in die Galle, hält aber dieses, sowie CO_2 aus dem Sekret zurück.
e, weiße Galle“ ist ein spezif. Sekret der Gallenmenge, sie enthält wie alle
migen Sekrete des Körpers wenig Ca. Die Konz. ist hier nur wenig größer
a Blutplasma u. steht in deutlichem Gegensatz zu dem Ca-Gehalt der echten
des hungernden Tieres. Erklärlicherweise muß der größere Teil des Gallen-Ca
von der Ductuswand, sondern von der Leber sezerniert werden. (Journ.
Med. 40. 797—815. 1924. ROCKEFELLER-Inst.)

WOLFF.

E. B. Hart, H. Steenbock und C. A. Elvehjem, Der Einfluß von Ernäh-
rfaktoren auf die Calciumassimilation. V. Die Wirkung des Lichtes auf das
lm- und Phosphorgleichgewicht bei erwachsenen milchenden Tieren. (IV. vgl.
A. STEENBOCK u. HOPPERT, Journ. Biol. Chem. 58. 43; C. 1924. I. 2525.)
violettetes Licht kann die Speicherung von Ca u. P u. das Gleichgewicht beider
utstrom erwachsener Tiere ähnlich beeinflussen, wie dies für wachsende Tiere
nt ist. Bei 2 milchenden u. 1 trockenen Ziegen, die durch eine bzgl. des anti-

rachit. Faktors mangelhafte Nahrung zu deutlich negativen Ca-Bilanzen gebracht waren, bewirkte Bestrahlung mit einer Quarzquecksilberlampe 20 Min. täglich die Umkehr zu deutlich positiver Bilanz unter gleichzeitiger Vermehrung des anorganischen P im Blute. Bei ähnlicher Höhe der Ca- u. P-Zufuhr u. in Ggw. kleiner Mengen des antirachit. Faktors wird die Ca-Bilanz bei milchenden Tieren im Vergleich zum trockenen schnell negativ. (Journ. Biol. Chem. 62. 117—31. 1924. Madison, Univ. of Wisconsin.) SPIEGEL

E. H. Brunquist, E. J. Schneller, A. S. Loevenhart, J. S. Hess
L. Mc Gary, *Die Wirkungen der Anoxämie auf den Stickstoffstoffwechsel.* Junge Schweine wurden in Atmosphären von niedrigem O₂-Gehalt belassen. Dabei traten Änderungen im Säurebasengleichgewicht des Blutes auf, die elektrometr. verfolgt wurden. Die gleichzeitigen Unterss. des Harnes ergaben als Wrkgg. der Anoxämie bei den Tieren, die Acidosis zeigten: Vermehrte Ausscheidung von Gesamt-N, von Harnstoff (weniger stark), Ammoniak (einmal bei Alkalose vermindert), Kreatinorgan. Säuren. Die Ausscheidung von Kreatinin war nicht deutlich oder gleichsinnig beeinflusst. (Journ. Biol. Chem. 62. 93—115. 1924. Madison, Univ. of Wisconsin.) SPIEGEL

Roberto Ando, *Untersuchungen über die Natur des Umwandlungsprozesses von Kreatin in Kreatinin im Organismus.* Im Preßsaft von Ochsenherzen, kein nachgebildetes Kreatinin, nur Kreatin enthaltend, wird innerhalb einiger Tage bei 37°C ein Teil von diesem in Kreatinin verwandelt. Bakterielle Ursachen konnten ausgeschlossen werden. Die Umwandlung erfolgt aber auch in gekochten Extrakten u. sogar in reinen wss. Lsgg., um so schneller u. vollständiger, je saurer das Medium ist. Sie ist also möglicherweise kein fermentativer, sondern ein rein chem. Vorgang, dessen Gleichgewichtslage ausschließlich von Temp. u. Acidität des Mediums herrscht wird. (Ann. di clin. med. 12. 188—98. 1922. Palermo, Univ.; Ber. es. Physiol. 23. 244. 1924. Ref. LAQUER.) SPIEGEL

Daniel A. Mc Ginty, Howard B. Lewis und Carl S. Marvel, *Aminosäuresynthese im Tierorganismus. Die Verwertbarkeit einiger Capronsäurederivate für die Synthese von Lysin.* Während Lysin den Mangel des Gliadins für das Wachstum weißer Ratten auszugleichen vermag (vgl. OSBORNE, MENDEL, FERRY u. WELSHMAN, Journ. Biol. Chem. 17. 325; C. 1914. I. 1842) — daß dies auch bei Vererbung von d,l-Lysin der Fall ist, wird durch besondere Verss. erwiesen —, daß dies bei Zugabe von α -Oxycapronsäure, ϵ -Oxycapronsäure, ϵ -Aminocapronsäure oder α -Oxy- ϵ -aminocapronsäure an Stelle des Lysins nicht der Fall. Es wird daraus geschlossen, daß keine dieser Verbb. im Organismus in Lysin verwandelt wird, daß also auch nicht Umwandlung von α -Oxysäuren in α -Aminosäuren stattfindet. (Journ. Biol. Chem. 62. 75—92. 1924. Ann. Arbor, Univ. of Michigan. Urb. Univ. of Illinois.) SPIEGEL

Mototaro Nakayama, *Über den normalen Wert der Zuckerausscheidungsschle.* Bei 52 Nichtdiabetikern schwankte der Schwellenwert zwischen 0,08 u. 0,09%, meist lag er hier zwischen 0,13 u. 0,19%. Bei Diabetikern sind die Grenzen charakteristisch auffallend anders, werden aber häufiger die höheren Werte beobachtet. Die Assimilationsfähigkeit des Nichtdiabetikers für Kohlenhydrate ist bei Personen mit niedrigem Schwellenwert im allgemeinen höher als bei denen mit höherem, aber bleibt bei jenen die alimentäre Blutzuckersteigerung relativ gering. Das Geschlecht scheint ohne Einfluß auf die Höhe des Schwellenwertes, bei älteren Leuten scheint er etwas erhöht. (Journ. Biochemistry 3. 407—22. 1924. Tokyo, Kaiserl. Univ. Sp.)

Robert Meyer-Bisch und Franz Günther, *Untersuchungen über den Mineralstoffwechsel bei Zuckerkranken.* II. Mitteilung. *Über Störungen des intermedären Calcium- und Chlorstoffwechsels.* (I. vgl. MEYER-BISCH u. THYSEN, Biocem. Ztschr. 135. 308; C. 1923. III. 691.) Zufuhr von 100 g Lävulose per os verursacht

Fällen von Diabetes vorübergehende Zunahme, in 4 Fällen (darunter 3 von Diabetes) Abnahme, in 2 Fällen keine Änderung des *Ca-Gehaltes im Blute*, während Dextrose stets ohne Wrkg. darauf blieb. Der Einfluß der Lävulose, der normalen fehlt, zeigte sich unabhängig von Bestehen einer Acidose. Störungen des N- u. NaCl-Stoffwechsel zeigten sich in vielen Fällen von schwerem u. mittlerem Diabetes, ohne daß Coma bestand oder drohte. Sie äußerten sich bzgl. *W.* in Hypochlorämie u. Hypochlorurie, bzgl. *W.* in Eindickung des Blutes (nach Abnahme des Gehaltes an Hämoglobin u. Serumeiweiß). Diese Störungen gingen ohne weiteren Eingriff, lediglich durch Regelung der Diät zurück, traten aber im weiteren Verlaufe sehr häufig als Zeichen neuerlicher Verschlechterung der Toleranz auf. — In einem Falle von Coma konnte trotz Infusion von Natriumchlorid u. NaCl in großen Mengen die Konz. des Harns an NaCl auf $> 0,2\%$ sinken. (Biochem. Ztschr. 152. 286—301. 1924. Göttingen, Univ.) SPIEGEL.

Naomi Kageura, Über den Einfluß der Eiweiß-Fettdiät auf den Kohlenhydratstoffwechsel. IV. u. V. Mitteilung. (I.—III. vgl. Journ. Biochemistry 1. 333 ff.; 2. 1. 795.) Nach 20-std. Fasten zeigte der Glykogengehalt der Leber bei kohlenhydratreich u. kohlenhydratarm ernährten Hunden fast gleiche Werte, $0,42 \pm 0,2\%$ im ersten, $0,46—0,67\%$ im zweiten Falle. Bei Durchblutungsverss. ergab die Leber kohlenhydratreich ernährter Tiere sehr auffallenden Glykogenansatz ($0—0,2\%$), die von nur mit Eiweiß u. Fett gefütterten unbedeutenden ($17—67\%$). Dieser Herabsetzung der Glykogenbildung ist wohl sicher ein ätiolog. Moment die Beeinträchtigung der Zuckerassimilation durch Eiweißfettkost zu erblicken. Die Lebern kohlenhydratreich- u. kohlenhydratarm genährter Hunde wurden teils von ebenso, teils von entgegengesetzt genährten durchblutet. Dabei ergab sich, daß die Stärke der Glykogenaufstapelung wesentlich von der Ernährung der Leber liefernden, nicht nennenswert von derjenigen des blutliefernden Tieres abhängt. Die mangelhafte B. von Glykogen in der Leber bei Eiweiß-Fettdiät muß wesentlich auf der herabgesetzten Funktion der Leber selbst, nicht auf der mangelhaften Beschaffenheit des Blutes beruhen. (Journ. Biochemistry 3. 205—9. 1924. Tokyo, Kaiserl. Univ.)

SPIEGEL.


Theodor Brugsch und Hans Horsters, Studien über intermediären Kohlenhydratumsatz und Insulin. Über die Zwischenzucker in Leber und Muskulatur. VI. Die enteiweißten Preßsaft von Kaninchenlebern u. Muskeln, die zuvor n. oder kohlenhydratreich genährt u. mit Insulin behandelt waren, wurden vor u. nach Analyse der Zucker durch Red. u. polarimetr., der anorgan. P u. die Milchsäure bestimmt. — Bei n. genährten Tieren ergab sich: Abnahme des Polarisationswertes, Zunahme der Red. Es liegt ein Zwischenzucker vor, der zum kleinen Teil aus Diphosphorsäure, zum größeren aus nach Aufspaltung größtenteils links- u. rechtsdrehenden Zucker gebenden Polysacchariden besteht. Sie finden sich besonders bei Glucosespeicherung durch Insulin u. mehr in der Muskulatur als in der Leber. — Die unter Insulin gespeicherte Glucose findet sich in der Leber also als Glykogen, sondern als solche Zwischenzucker. Die Wrkg. von Insulin ist aktiv gleich der n. Umwandlung von Glucose in Glykogen. (Biochem. Ztschr. 153—155. 1924. Berlin.)

MÜLLER.

Theodor Brugsch, Hans Horsters und Giichi Shinoda, Studien über intermediären Kohlenhydratumsatz an der Leber bei gleichzeitiger Verfolgung des Gaswechsels (Norm, Hunger, Insulinwirkung, pankreoprive Leber). VII. (VI. vgl. vorst.) Die n. Meerschweinchenleber hat postmortal in Aufschwemmung einen Respirationsquotienten von 1,0, d. h. Kohlenhydrat oder Milchsäure wird verbrannt. Nach Insulinzusatz senkt den Quotienten. Nach mehrtägigem Hungern sinkt der Quotient auf $0,3—0,7$. Insulin in vivo erniedrigt den Quotienten, in vitro nicht. Der Sauerstoffverbrauch der Leberzellen steigt nach 3-tägigem Hunger. Insulin kann dieses

Anwachsen, wenn in vivo gegeben, steigern. — Vff. halten das Sinken des respirator. Quotienten u. das Steigen des O₂-Verbrauchs unter Insulin für die Folge einer Verdrängung von Zucker aus Fett. — Bei der Hundeleber ist der respirator. Quotient 0,5—0,7 nach Pankreasexstirpation 0,7—0,8. Im zweiten Fall ist der O₂-Verbrauch auffallend klein. (Biochem. Ztschr. 151. 318—34. 1924. Berlin.) MÜLLENBACH

Hans v. Euler und Karl Myrbäck, Zur Kenntnis des biochemischen Kohlenhydratabbaues. Einleitende Mitt. I. Phosphatumsatz in Muskel und Hefe. Bearbeitet von **Signe Karlsson**. Die früheren Verss. über die Beteiligung der Zymase beim Glykogenabbau im Muskel u. bei der Gärung (vgl. Ztschr. f. physiol. Chem. 139. 15; C. 1924. II. 2056) werden fortgesetzt. Aus Lactacidogen (= Zymophosphat) des Rattenmuskels wird in W. P₂O₅ abgespalten, während in NaF-Lsg. jedoch Synthese erfolgt, deren Geschwindigkeit durch Glykogen vergrößert wird. Die Spaltung von zugesetztem Zymophosphat wird durch NaF gehemmt. Es findet aus frischer Hefe in W. Abspaltung von P₂O₅ statt u. in NaF-Lsg. Synthese (am besten bei 0,2% NaF). Diese Synthese wird weder durch Glykogen noch durch Glucose oder Fructose verstärkt. CaCl₂ hat auf diese Synthese keine Wirkung. — Bei Trockenhefe hat man die gleichen Erscheinungen, nur wird vergärrter Zucker auch ohne Fluorid rasch verestert. Die gebildete Menge Zymophosphat ist von der anwesenden Menge P₂O₅ unabhängig. Hierfür suchen Vff. den Grund in den energet. Verhältnissen, unter der Voraussetzung, daß die B. des esters unterliegenden Stoffes mit der B. von Milchsäure wie von A. CO₂ verknüpft ist. Die aus HARDENS Gärungsschema nicht hervorgehenden energet. Beziehungen lassen sich vielleicht durch folgende Gleichungen ausdrücken:



welche von den Vff. ausdrücklich als Arbeitshypothesen betrachtet werden. Unter der Annahme, daß von den beiden Teilmoll. mit je 3 C-Atomen eines energiereichen das andere energieärmer als das halbe Glucosemol. ist, wird es ersichtlich, daß für je ein gebildetes Mol. CO₂ u. C₂H₅OH eine PO₄-Gruppe verestert wird. — Die in Leber vorhandene Co-Zymase wird erst durch Kochen, wohl weil ein Hemmkörper außer Tätigkeit gesetzt wird, wirksam; dieser Hemmkörper ist bei 10 min. halbst. Erhitzen auf 40° noch voll wirksam, wird aber beim Erhitzen auf 60° schnell zerstört. Größere Mengen Leber hemmen die Gärung. Der Hemmkörper vermag nicht durch Kollodiummembran zu dialysieren. (Svensk. kem. Tidskr. 36. 295—306. 1924. Stockholm, Univ.) A. R. F. HESS.

Leopold R. Cerecedo und Carl P. Sherwin, Vergleich des Stoffwechsels gewisser aromatischer Säuren. VII. Das Verhalten von *p*-Chlor-, *p*-Brom- und *p*-Aminosäuren bei Hund, Kaninchen und Menschen. (Vgl. Journ. Biol. Chem. 58. 15; C. 1924. I. 931. Vgl. auch SHIPLE, MULDOON u. SHERWIN, Journ. Biol. Chem. 60. 59; C. 1924. II. 1002.) Es wurden jetzt *p*-Chlorphenylessigsäure, *p*-Bromphenylessigsäure u. *p*-Aminophenylessigsäure an Menschen, Hunde u. Kaninchen verfüttert. Wie bei *o*-Chlorphenylessigsäure (vgl. Journ. Biol. Chem. 58. 215; C. 1924. I. 931) werden auch die *p*-Halogenderivv. von Mensch u. Hund durch Kombination mit Glykokoll zu den entsprechenden Phenacetursäuren entgiftet, beim Menschen bildet sich in kleiner Menge auch ein Additionsprod. der *p*-Chlorphenacetursäure mit Hartstoff. Das Kaninchen scheidet die *p*-Halogenphenylessigsäuren unverändert aus. Das Aminoderiv. wird von Mensch u. Kaninchen acetyliert, vom Hunde dagegen mit Glykokoll kombiniert. *p*-Acetylaminophenylessigsäure wurde vom Hunde nicht weiter verändert. — *p*-Chlorphenacetursäure (vgl. FRIEDMANN u. MAASE, Biochem. Ztschr. 27. 97; C. 1910. II. 1072), F. 165°. — *p*-Bromphenacetylchlorid, aus der Säure durch PCl₅ oder besser mit SOCl₂, gelbe Fl., Kp. 118°, l. in A., Ä. u. l. — *p*-Bromphenacetursäure, Blättchen, F. 160—161°, ll. in h. W., Essigester u. Benzol.

Ag-Salz, l. in h. W. *Äthylester*, F. 106°. — *p-Bromphenacetursäurenitril*, Prismen (h. W.), F. 137°, l. in h. W., A. u. Essigester, unl. in Ä., Bzl. u. PAe. — *Phenacetursäure*, aus Phenacetursäure mit 4 Teilen konz. HNO_3 u. 6 Teilen H_2SO_4 bei 0°, Krystalle (aus h. W.), F. 169—170°. — *p-Aminophenacetursäure*, m. 200°. — *p-Acetylaminophenylelessigsäure*, F. 167°. (Journ. Biol. Chem. 62. 730. 1924. New York, FORDHAM Univ.)

SPIEGEL.

Else Reuter und Walther Schmitt, *Untersuchungen über den Einfluß hoher Eiweißgaben auf den Körper. (Zugleich ein Beitrag zur Frage der „dynamischen Hyperthermie“.* Nach hohen Gaben von Eiweiß (Plasmon), das gut resorbiert u. (N-Gleichgewicht) fand sich im Blute deutliche Senkung von Hämoglobin erythrocyten ohne entsprechendes Sinken des Refraktionswertes (vorübergehende Anämie?), keine wesentliche Änderung von NaCl, Zucker, Leukocytenzahl, Ertrag des Harnstoffs. Während der mit Steigerung der Temp. verbundenen Exkretionsperiode wurde der Harn stark alkal. unter starkem Rückgang der NH_3 -Ausscheidung. Vermehrung des Bilirubins im Blute (Leberschädigung) war nicht nachweisbar. (Ztschr. f. Kinderheilk. 38. 339—50. Würzburg, Univ.; Ber. ges. Physiol. 28. 3. 1924. Ref. GYÖRGY.)

SPIEGEL.

I. Kortschagin, *Der Pigmentumsatz im lebenden Organismus. I. Mitteilung. Veränderung des Chlorophylls unter der Einwirkung des Magensaftes.* Unter Einwirkung des Magensaftes verliert Chlorophyll, isoliert oder in Blättern, in vivo u. in vitro sein Mg u. geht, so weit sich auf Grund der spektroskop. Unters. urteilen läßt, in *Phäophytin* über. B. von *Phäophorbiden* ist dabei unter Verwendung von isoliertem Chlorophyll nicht wahrzunehmen; bei Einw. des Magensaftes auf Chlorophyll in Blättern kann sie in unbedeutendem Maße erfolgen, wofür dann Ggw. von entsprechenden Fermenten (*Chlorophyllase*) im Blattgewebe verantwortlich gemacht wird. (Biochem. Ztschr. 153. 510—16. 1924. Moskau, Veterinärinst.) SPIEGEL.

V. Birk, *Über den Stoffwechsel des Kindes im Fieber.* Stoffwechselverss. an künstlich genährten Säuglingen bei Masern, Windpocken u. bei der Impfung. Es wurden deutliche Verschiebungen im Stoffwechsel festgestellt werden, ohne daß Befunde für die einzelnen Krankheiten typ. sein müssen. Die Veränderungen sind aber nicht an das Vorhandensein des Fiebers gebunden, sie sind schon vor Temp.-Erhöhung nachweisbar. Man darf deshalb nicht von einem Fieberstoffwechsel sprechen, sondern richtiger von einem Stoffwechsel bei Infektionen. (Münch. Med. Wchschr. 71. 1745—46. 1924. Tübingen, Univ.)

FRANK.

Anna Tonkich, *Zur Physiologie des Pankreas.* Nach Abtrennung des Magens aus Duodenum mit oder ohne Nervenbeschädigung läßt sich die spontane Sekretion beobachten. Deren starkes Sinken nach *Atropin* subcutan u. nach Vagusdurchschneidung am Halse zeigt ihre nervöse Herkunft an. Die anfängliche Pankreassekretion beim Essen beruht auf einem durch den Vagus vermittelten Reflex aus der Mundhöhle aus. Pankreas u. Magendrüsen reagieren eigenartig u. unabhängig voneinander auf verschiedene Reizungen der Rezeptoren der Mundhöhle: Mund die Magendrüsen stärker auf die Reizung mit Fleisch als mit Milch u. reagieren, sind Fett u. Milch energischere Reize für das Pankreas als Fleisch. Die Wrkg. des neutralen Fettes als solchem auf das Pankreas muß man den troph. u. den troph. Einfluß unterscheiden, von denen der zweite zweifellos, der am stärksten in Betracht kommt. *Atropin* hemmt die troph. Wrkg. des Fettes auf das Pankreas. Es ruft beim Einführen in das Duodenum die Ausscheidung von Pankreassaft mit hohem N-Gehalt hervor; nach vorangegangener Atropinisierung sinkt der N-Gehalt stark. Bei Einführung in das vom Magen abgetrennte Duodenum wird eine saure Sekretion von Pankreassaft mit kleinem N-Gehalt hervor. Ölsaures Pankreassaft von verschiedener Herkunft bewirkt Absonderung von Pankreassaft mit hohem N-Gehalt. Die Reflexbahn des hemmenden Reflexes auf die Magen-

drüsen bei Einführen von Fett ins Duodenum geht durch die Pyloruswunde. Reizung des Vagus am Hals 5—8 Tage nach seiner Durchschneidung ruft Entzündung und Reizung des Pankreassaft mit hohem N-Gehalt hervor. (PFLÜGERS Archiv für Physiol. 206. 525—53. 1924, Leningrad, Med. Inst.) WOLF

K. K. Chen, Walter Meek und H. C. Bradley, *Untersuchungen über Autolyse*. XII. *Experimentelle Atrophie des Muskelgewebes*. (XI. vgl. HERTZMAN u. BRADLEY, Journ. Biol. Chem. 61. 275; C. 1924. II. 2348.) Die Atrophie von Kaninchenmuskeln wurde durch Durchschneidung der Femoral- u. Sciaticusnerven herbeigeführt. Der atrophierte Muskel zeigt keine deutliche Zunahme des Gehaltes an N. Nach dem Tode liefert er bei 10tägiger Autolyse mehr freie Aminosäuren als der n. Muskel. Dieser Unterschied, der nach 9 Wochen ebenso groß ist wie nach 1 oder 2 Wochen, wird auf Änderungen in der M. der Zellproteine bezogen, indem die unverwertbaren Strukturformen in verdauliche übergehen. Der atroph. Muskel selbst enthält nicht mehr freie Aminosäuren als der n., aber nach Ausweis der Rk. auf Tyrosinpeptide etwas mehr von primären Spaltprodd. Es wird in der Autolyse ein Gleichgewicht zwischen den unverdaulichen Zellproteinen u. denen, die durch Zusatz von Säure verdaulich werden, angenommen. Der atroph. Muskel scheint bei der Autolyse etwas weniger P zu verlieren, was aber nur bei Ggw. von Bindegewebe deutlich hervortritt. Der p_H -Wert des atroph. Muskels post mortem ist wie beim n., er hat aber etwas weniger Pufferwert. In den Fasern des atroph. Muskels, die geschrumpft u. kleiner als in der Norm sind, finden sich relativ mehr Kerne u. mindestens relativ mehr Fett- u. Bindegewebe. (Journ. Biol. Chem. 61. 807—27. 1924. Madison, Univ. of Wisconsin.) SPIEGEL

A. B. Hertzman und H. C. Bradley, *Untersuchungen über Autolyse*. II. *Die Kinetik des autolytischen Mechanismus*. (XII. vgl. vorst. Ref.) Es ergab sich aus den bisherigen Unterss., daß die Autolyse sich in 2 Stadien vollzieht, in der die ursprünglichen Zelleiweißstoffe zunächst durch Wrkg. primärer Proteasen in saurem Medium zu kleineren Bruchstücken aufgespalten werden, die dann erst allmählich durch erepsinartige Zellenzyme in Aminosäuren übergehen. Es wird gezeigt, daß das erste Stadium bei der Autolyse vollständig verläuft, sofern die primäre Protease zerstört oder gehemmt wird, die zweite dagegen unvollständig bleibt, indem sich ein Gleichgewicht zwischen Aminosäuren u. Polypeptiden einstellt. Für die Wrkg. von Erepsin wurde die Gleichgewichtskonstante 0,56 gefunden, das Gleichgewicht ist im übrigen innerhalb weiter Grenzen von der $[H^+]$ abhängig. — Die Protease besteht während des Lebens u. bei n. $[H^+]$ der Zelle wahrscheinlich in Bindung an die Zellproteine, die bei deren natürlichen Basensalzen beständig ist, bei den Säureproteinen aber, die entstehen, sobald sich Säure im Gemisch bilden, unbeständig ist, so daß nun Spaltung erfolgt. Werden fremde Eiweißstoffe in Leberbrei zugesetzt, so verbinden sie sich mit einem Anteil der Protease, der so der Rk. entzogen wird. Daher wird durch Zusatz von bas. Eiweiß die Spaltung im Verhältnis zu dessen Menge verzögert, besonders durch Eiweiß, dessen isoelektr. Punkt wesentlich nach der sauren Seite liegt, das daher in Form von Basensalzen bleibt, wenn das Lebereiweiß schon weitgehend in Säuresalze verwandelt ist (vgl. Journ. Biol. Chem. 61. 275; C. 1924. II. 2348). Die Verhältnisse der Bindung bzw. Lockerung der Protease werden mit der 3- bzw. 5-Wertigkeit des N in den Basen u. Säuresalzen des Eiweißes in Verb. gebracht. Das Erepsin wird durch die natürlichen Eiweißstoffe nicht gebunden, für seine Wrkg. ist saure Rk. nicht erforderlich. (Journ. Biol. Chem. 62. 231—43. 1924. Madison, Univ. of Wisconsin.) SPIEGEL

H. Behrendt, *Über das Zustandekommen der aktuellen Magenacidität beim natürlich ernährten Säugling*. In vitro kann die Lipolyse durch Wrkg. der Lipase in der Frauenmilch zu einer starken Erniedrigung des p_H -Wertes führen. Auch im Magen junger, nur mit Frauenmilch ernährter Säuglinge beeinflusst die

der Lipolyse entstehenden Fettsäuren die $[H^+]$ beherrschend. Die hier im Vergleich zum Reagensglasvers. erheblichere Wrkg. der Milchlipase wird durch den Saponifikationsprozeß erklärt. Gelabte Milch wird auch beim Stehen viel saurer als ungelabte, parallel der größeren Menge abgespaltener Fettsäuren. Diese Aktivierung ist mit dem Labvorgang dürfte etwa durch dieselben physikal.-chem. Vorgänge bedingt sein wie die Schüttelaktivierung. (Jahrb. f. Kinderheilk. 106. 115—19. Leipzig, Univ.; Ber. ges. Physiol. 28. 249. 1924. Ref. BEHRENDT.) SPIEGEL.

Olaf Bergeim, *Darmchemie. II. Darmreduktionen als Maß der Darmfäulnis nach eigenen Beobachtungen über den Einfluß der Nahrung*. Unterss. mittels der in der Journ. Biol. Chem. 62. 115—19. 1924. (Vgl. S. 736) beschriebenen Methode bei Beachtung der Verhältnisse in den verschiedenen Darmabschnitten zeigten, daß die Reduktion fast vollständig im Dickdarm vor sich geht, also eng mit den hier vorherrschenden Fäulnisprozessen verknüpft ist. H_2S ist bei dieser Reduktion beteiligt. Der Einfluß der verschiedenen Bestandteile der Nahrung wurde untersucht. Fleisch- u. Eiereiweiß zeigten bei der Ratte zu hohen Reduktionswerten (durch Kochen des Fleisches vermindert), Casein zu niedrigen, Pflanzeneiweiß zu mittleren. Von Kohlenhydraten zeigten Stärke, Saccharose, Glucose, Fructose u. Maltose nur zu geringer Verminderung der Reduktionswerte, Dextrin u. Lactose, die zu der charakterist. Umlagerung der Darmflora in acidur. Typus führten, zu deutlicher. Fett übte geringe Wirkung aus. Milch ergab für sich sehr niedrige Werte u. führte als Beigabe zu anderer Nahrung zu Erniedrigung. Auch Früchte u. grüne Gemüse ergaben allein oder im Gemisch niedrige Werte. Einige Antiseptica ergaben keine dauernde Erniedrigung, andere eine deutliche Erhöhung, (Journ. Biol. Chem. 62. 49—60. 1924. Chicago, Univ. of Illinois.) SPIEGEL.

Lans Mautner, *Über die pharmakologische Beeinflussung der Leber*. Über ein Referat über die neueren Forschungen mit dem Ergebnis, daß die Leber nicht nur eine über angenommene ganz isolierte Stellung für chem. Umsetzungen hat, der auch im Stoffab- u. -aufbau ebenso wie der von Glykogen vielmehr auch in anderen Beziehungen erfolgreich am Aufbau teilnehmen kann. Anscheinend nur der Leber kommt das Abfangen des Überflusses lebenswichtiger Substanzen aus der Blutbahn u. ihre Speicherung zu. Der Mechanismus der Leberfunktion steht anscheinend immer unter Kontrolle des autonomen Nervensystems, bzgl. Zucker, Eiweiß, Harnsäure u. W. veranlaßt das sympathische bzw. Adrenalin eine Ausschüttung aus der Leber, z. T. durch chem. Änderungen, die das autonome Nervensystem an Blut- u. Gallenwegen vermittelt. Es zeigen sich weiter gewisse Beziehungen zwischen der Funktion der Leber u. des Zentralnervensystems. (Klin. Wchschr. 3. 2321—25. 2369—72. 1924.)

SPIEGEL.

Louis Kahlenberg, *Über den Durchgang von Borsäure durch die Haut infolge einer Lsg.* (Vgl. Journ. Physical Chem. 10. 141; C. 1906. I. 1772.) Von zahlreichen Versuchen, die tote menschliche Haut zu durchdringen vermögen, zeigte sich nur die Borsäure fähig dies auch bei lebender Haut zu tun, wenn Umschläge von Borsäurelsg. appliziert oder die Füße in solche Lsg. getaucht wurden. Vf. meint, daß die Borsäure von der Haut locker gebunden u. aus dieser Bindung durch den Kontakt mit Wasser wieder frei gemacht wird. Schon 5 Min. nach Eintauchen des Fußes in Borsäurelsg. war H_3BO_3 im Harn nachzuweisen. — Nachdem früher erkannt war, daß die chem. Natur der Membran für den Durchgang von Substanzen bestimmend ist, schließt Vf. an, daß tote u. lebende Haut chem. verschieden sind, ebenso lebende Haut von toter Haut. — Wurden dem Bade HCl oder H_2SO_4 zugesetzt, wurde der Harn alkal., bei Anwendung von Citronensäure behält er seine normale Acidität. Der Reiz der starken Säuren scheint eine Rk. des Körpers zu veranlassen, von Alkali hervorgerufen. (Journ. Biol. Chem. 62. 149—56. 1924. Madison, Univ. of Wisconsin.) SPIEGEL.

Heinz Kalk und **Werner Dissé**, *Über den Einfluß der Fette auf die Magsekretion*. Mit frischen Fetten, gemeinsam mit A.-Probefrühstück gegeben, war eine einheitliche Beeinflussung der Magenacidität nicht festzustellen, mit reinem Fett stärkere Erhöhung der Acidität, meist mit Verkürzung von Entleerungszeit und Sekretionsdauer. 30 g frisches Fett (Sesamöl), nüchtern $\frac{1}{2}$ Stde. vor dem Probefrühstück gegeben, machten geringe Herabsetzung der Acidität, Verkürzung der Entleerungs- u. Sekretionsdauer, früheres u. stärkeres Auftreten des Duodenalrückflusses. — (Arch. f. Verdauungskrankh. **33**. 117—32. Frankfurt a. M., Univ. Ber. ges. Physiol. **28**. 248—49. 1924. Ref. KRZYWANEK.) SPIEGEL

E. Sluiter, *Die Zersetzung des Zuckers in der Lunge*. Der nach Durchströmung der Lunge in der Durchströmungsfl. fehlende Zucker ist nicht durch Glykolyse des Blutes selbst verschwunden. Ohne Präparation der Lunge verschwindet der Zucker nicht oder höchstens in viel geringerem Maße aus der Durchströmungsfl., wobei der Säuregrad nicht vermehrt ist. In gleichem Zeitraum bildet sich eine größere Menge Milchsäure in Blut, das schon der Durchströmung gedient hat als in Blut, das bei 38° konserviert wurde. (Archives néerland. d. Physiol. de l'homme et des animaux **9**. 461—79. 1924. Amsterdam, Univ.) WOLF

I. Snapper, A. Grünbaum und **S. Sturkop**, *Über die Zerlegung und die Oxydation von Benzylalkohol und Benzylestern im menschlichen Organismus*. Im Gegensatz zu den experimentellen Befunden von MACHT hat man klin. durch peroralen Zufuhr von Benzylverb. bei Krankheiten, die mit Spasmus des glatten Muskelgewebes zusammenhängen, nur wenig Erfolg gesehen. Dies dürfte mit der bekannten Oxydation der Benzylverb. zu spasmolyt. unwirksamer Benzoesäure in Verbindung knüpft sein, falls diese schnell u. einigermaßen vollständig erfolgt. Versuche mit Benzylalkohol sowie mit dessen Estern mit Essigsäure, Zimtsäure, Hydrozimtsäure, Benzoesäure u. Valeriansäure u. mit Spasmyl (GEHE) zeigten nun, daß innerhalb der ersten 12 Stdn. nach Darreichung 80—90% der theoret. möglichen Menge Benzoesäure in Form von Hippursäure ausgeschieden wurden, fast ebenso schnell u. in ebenso großer Menge wie nach entsprechender Menge von Na-Benzat (Nederl. Tijdschr. Geneeskunde **68**. II. 3125—33. 1924. Amsterdam, Bijl. bij de Geneesk. Gasthuis.) SPIEGEL

Douglas Creese Harrison, *Die katalytische Wirkung von Spuren Eisen auf die Oxydation von Cystein und Glutathion*. An Präparaten, die unter Benuß von Quarzgefäßen möglichst Fe-frei hergestellt waren, wurden die Angaben von WARBURG u. SAKUMA (PFLÜGERS Arch. d. Physiol. **200**. 203; C. **1923**. III. 290) im wesentlichen bestätigt. Die Geschwindigkeit der atmosphär. Oxydation wurde stark vermindert u. wurde auf Zusatz von Fe-Ionen in Mengen von $\frac{1}{10000}$ mg erheblich erhöht. Auch Fe in Form von Hämatin vermag die Oxydation zu katalysieren. Sowohl die Oxydationskurven mit den reinen Präparaten als auch diejenige mit ungereinigten in Ggw. von Cyanid verlaufen linear. Für die Auffassung, daß die Hemmung durch Cyanid auf B. von Komplexen mit dem katalysierenden Fe beruht, werden weitere Gründe angeführt. (Biochemical Journ. **18**. 1009—22. 1924. Cambridge, Biochem. Lab.) SPIEGEL

Sergius S. Siengalewicz, *Die Wirkung von Neosalvarsan und Carbonmonoxyd auf den Chlorigidplexus und die Hirnhäute*. CO u. Neosalvarsan zeigen bei Kaninchen am Chlorigidplexus in mancher Beziehung analoge Vergiftungsbilder. Akute CO-Vergiftung schädigt den Plexus u. macht ihn für Trypanblau durchlässig. Kute Neosalvarsanvergiftung schädigt den Plexus noch deutlicher als CO u. macht ihn ebenfalls für Trypanblau durchlässig. CO ruft Permeabilität des Plexus, der Hirnhäute u. der Blutgefäße hervor, Neosalvarsan nur solche des Plexus. (Journ. Farm. and Exp. Therapeutics **24**. 289—99. 1924. Wilna, Univ.) WOLF

Sergius S. Siengalewicz und A. J. Clark, *Zum Durchtritt von Trypanblau aus Blutstrom in die Körperflüssigkeiten*. Peptonshock ruft bei Hunden keinen Durchtritt von Trypanblau in die Hirnsubstanz hervor, jedoch in zwei Fällen eine schnelle Beschleunigung des Übertritts von Trypanblau in die Fl. der Peritonealhöhle. (Journ. Pharm. and Exp. Therapeutics **24**. 301—4. 1924. London, Univ. WOLFF.

E. Schulmann und L. L. Justin-Besançon, *Untersuchungen über Methylenblau im Blut, über seine Ausscheidung durch die Niere und seine Reduktion*. Nach Injektion von Methylenblau erfolgt rasches Steigen u. Wiederabsinken des Farbniveaus im Blut, nach peroraler Zufuhr viel langsamer. Bei dauernder Zufuhr (tägl. 0,25 g) findet Retention im Organismus u. im Blut statt. Die Ausscheidung erfolgt nach der Ambardschen Formel eine gewisse Übereinstimmung mit den Konstanten für Harnstoff bei Gesunden u. einigen Nierenkranken, aber ohne Schwellenwert. Im Blut kreist Methylenblau in reduzierter Form, in den Nieren wird es teilweise wieder oxydiert. (Arch. des maladies des reins et des organes génito-urinaires **1**. 586—600. 1923; Ber. ges. Physiol. **28**. 274. 1924. Ref. SIEBECK.) SPIEGEL.

Jans Hummel, *Über die Wechselbeziehungen zwischen Kalkbildung und Säureverhältnis in ihrer Bedeutung für die Rachitis- und Spasmophilieforschung*. Vortr. über theoret. Erörterungen. (Klin. Wchschr. **3**. 2384—86. 1924. Frankfurt a. M., WOLFF.

Emil Abderhalden und Ernst Wertheimer, *Studien über den Einfluß der Ernährung auf Zellfunktionen*. Sauer ernährte Kaninchen können aus Benzoesäure in 24 Stunden Fällen etwa 4—5-mal so viel Hippursäure synthetisieren als bas. ernährte. Weder eine verschiedene Resorption der Benzoesäure noch eine sekundäre Bildung der gebildeten Hippursäure kommt zur Erklärung dieser verschiedenen Leistungsfähigkeit bei den verschiedenen ernährten Tieren in Frage; sondern es handelt sich durch die saure bzw. bas. Ernährung am Ort der Synthese Bedingungen, unter denen, die im ersten Fall für diese optimal, im zweiten dagegen minimal sind. (Pflügers Arch. d. Physiol. **206**. 460—66. 1924. Halle. Univ.) WOLFF.

M. Rabinowitch, *Über die Wirkung des Thyroxins*. (Vgl. BOOTHBY u. FORD (Amer. Journ. Physiol. **66**. 93; C. 1924. I. 1407.) Vf. suchte die Natur der Leistungsperiode in der Wärmeerzeugungskurve nach Behandlung mit Thyroxin zu erklären. Aus seinen Verss. u. den Angaben der Vorgänger angestellte Bestimmungen lassen aber nur erkennen, daß der Stoffwechsel unmittelbar nach Anwendung des Mittels durch gleichzeitige Neben- oder Sekundärreakt. so kompliziert wird, daß ein spezif. Geschwindigkeitskoeffizient der Rk. auf Grund der experimentellen Methodik kaum errechnet werden kann. (Journ. Biol. Chem. **62**. 245—58. 1924. Montreal [Canada], Montreal Gen. Hosp.) SPIEGEL.

Rudolf Höber, *Physikalische Chemie und Medizin*. Kurze Darlegung der Bedeutung, welche die physikal. Chemie für die Physiologie in den letzten 50 Jahren gewonnen hat. (Dtsch. med. Wchschr. **50**. 1700—1. 1924. Kiel.) SPIEGEL.

Jans Horst Meyer, *50 Jahre experimentelle Pharmakologie*. Kurzer Forschungsbericht. (Dtsch. med. Wchschr. **50**. 1701—3. 1924. Wien.) SPIEGEL.

Carl Bachem, *Sammelreferat aus dem Gebiete der Pharmakologie (Juli bis Dezember 1924)*. (Zentralblatt f. inn. Med. **45**. 1017—26. 1033—51. 1924. Bonn.) WOLFF.

H. Hoersch, *Zur Magnesiumwirkung*. $MgSO_4$ hat auf alle Teile des Nervensystems eine lähmende Wrkg. Es setzt Bewegungen, Erregungen u. Erregbarkeit ab oder hemmt sie vollständig. Die subcutane Anwendung wird bei spast. Konstriktion, wenn andere Mittel versagen oder peroral zu reichende Abführmittel gegeben werden sollen, besonders empfohlen. Auch bei Asthma bronchiale u. bei starker Schweißsekretion wird durch $MgSO_4$ oft eine günstige Wrkg. erzielt.

Die subcutane Verwendung in kleinen Dosen hat sich als völlig ungefährlich erwiesen. (Münch. med. Wehschr. **71**. 1679—80. 1924. Erlangen, Univ.) FRANK.

L. Sabbatani, *Pharmakologische Untersuchungen über das Eisen*. VI. Kolloidales Ferrosulfid, dargestellt in Gegenwart von Zucker. (V. vgl. Atti R. Accad. dei Lincei, Roma [5] **33**. 122; C. 1924. II. 857.) Die kolloidale FeS-Lsg. wird folgendermaßen bereitet: 200 g Rohrzucker werden mit W. zu 300 ccm gelöst. 46 ccm dieses Sirups werden mit einer Lsg. von 0,28 g frisch umkrystallisiertem FeSO_4 in 4 ccm gekochtem W. versetzt. Weitere 46 ccm des Sirups werden mit 4 ccm 2-n. Na_2S , die mit H_2S gesätt. worden ist, gemischt u. zu der FeSO_4 -Lsg. gegeben. Die Lsgg. sind tief schwarz, in dünner Schicht durchscheinend. Die Teilchen ruhen eben noch u. Mkr. sichtbar u. befinden sich in langsamer Brownscher Bewegung. Die Teilchen wachsen schnell u. nach einigen Stdn. flockt des FeS aus. Während sich aber das FeS-Gelatine-Sol sehr schnell oxydiert, sind die FeS-Zucker-Sirupe chem. sehr beständig. Diesen Unterschieden entspricht auch das pharmakolog. Verh. Bei subcutaner Injektion von FeS-Zucker-Sirup, bleiben die schwarzen Flocken viel länger bestehen (bis zu 250 Stdn.) als bei den Gelatine-Solen. Bei intravenöser Injektion wird das FeS sofort u. zwar ausschließlich in Leber u. Milz gebunden. Ferner erweisen sich die FeS-Zucker-Sirupe als viel weniger toxisch als die FeS-Gelatine-Lsgg. Dieser Unterschied wird nicht durch die Ggw. von Rohrzucker bedingt, sondern durch den physikal. Zustand des FeS. Versuchsreihe an Meerschweinchen u. Kaninchen. (Atti R. Accad. dei Lincei, Roma [5] **33**. II. 231 bis 228. 1924. Padua, Univ.) OHL.

Gottfried Kühn, *Untersuchungen über Alkohol*. 2. Über den Alkoholgehalt des menschlichen Blutes im nüchternen Zustand, nach Kohlenhydratzufuhr und nach Gabe geringer Alkoholgengen. (1. vgl. Arch. f. exp. Pathol. u. Pharmak. **103**. 282 C. 1924. II. 2684.) (Arch. f. exp. Pathol. u. Pharmak. **103**. 295—312. 1924. Jena, Univ.) WOLK.

see errata p. 3063
C. Endoh, *Über das Verhalten des Tribromäthylalkohols im Tierkörper*. Nach Verabreichung von Trichloräthylalkohol an Kaninchen oder Hunde konnte im Harn dieser Tiere die bisher (vgl. MARALDI, Boll. Chim. Farm. **42**. 81; C. 1923. I. 781) nur vermutete, aber nicht isolierte Urobromalsäure, $\text{C}_8\text{H}_{11}\text{O}_7\text{Br}_3$, gewinnen. Nadeln (aus Ä.), F. 145,5° (Zers., unkor.), $[\alpha]_D^{23} = -79,09^\circ$ (in W., $c = 0,54$ g/100 g), äußerst hygroskop., in wss. Lsg. stark sauer, reduziert Fehlingsche Lsg., gibt Carbylamin- u. nach Spaltung Naphthoresorcinrk. (Biochem. Ztschr. **152**. 27 bis 280. 1924. Berlin, Tierärztl. Hochschule.) SPIEG.

Theodor Brugsch und Irger, *Über die Ausscheidung des Eisens durch die Galle nach Toluylendiaminvergiftung. Ein Beitrag zur Physiologie und Pathologie der Galle*. II. Mitteilung. (I. vgl. Ztschr. f. d. ges. exp. Medizin **38**. 362; C. 1924. I. 1825.) Durch Toluylendiamin wird die Fe ausscheidende Wrkg. der Leber so schwer geschädigt, daß die Ausscheidung trotz erheblich gesteigerten Blutzealls (ca. 30—40% der akt. Hämoglobinmenge) auf 20—40% des n. Wertes sinkt. Ziel weniger leidet die Ausscheidung von *Bilirubin*, die sogar gegenüber der Norrgesteigert ist, aber in Berücksichtigung des mit der Toluylendiaminvergiftung verbundenen Ikterus als relativ zu gering angesehen werden muß. (Ztschr. f. d. ges. exp. Medizin **43**. 710—15. 1924. Berlin, Charité.) SPIEG.

N. L. Tainter und P. J. Hanzlik, *Der Vorgang der Ödementstehung nach p-Phenylendiamin*. Das auffallende experimentelle, systemat. hervorgerufene Ödem von Kopf u. Nacken durch p-Phenylendiamin an Kaninchen beruht auf einer Vergrößerung der vaskulären (capillären) Durchlässigkeit mit Übertritt des Gewebsplasmas einschließlich Fibrinogen unter B. eines gelösten Koagulums in der Gewebe der betreffenden Körperregionen (vermutlich ist der Vorgang bei Kzen der gleiche). Das zeigt sich im Wechsel der Zus. des Blutes, nämlich am relevanten

niedrig von Hämoglobin u. den gesamten festen Bestandteilen, an der verminderten Menge Blut mit unverändertem Gehalt an Gesamteiweiß u. Fibrinogen im Plasma; dem elektiven Verschwinden von Farbstoffen (Kolloiden) in die Ödemgegenden. Wie durch kleine u. am Beginn durch große Dosen von p-Phenylendiamin verminderte Zirkulation erleichtert die Entw. des Ödems, das in 1—1½ Stdn. nach Einveratmung des Mittels auftritt. Das Ödem entwickelt sich unabhängig von Kolloidmangel, lokaler Acidose, Oxydationsprodd. von p-Phenylendiamin, peripheren Entzündungen u. Ganglien der autonomen Nerven, vom Gehirn, den sensor. Störungen, der Nierenfunktion u. morpholog. Veränderungen. Der Entstehung des Ödems wird vorgebeugt oder sie wird gehemmt durch Herabsetzung der Zirkulation, wobei Blutdrucksenkung auf mindestens 75 mm Hg herab nicht ausreicht, während zur regulären Ödementstehung mindestens 85 mm notwendig sind. (Journ. Pharmacol. and Exp. Therapeutics **24**. 179—211. 1924. San Francisco, STANFORD UNIV.)

J. Duzár und G. Fritz, *Hyperventilationsalkalose und Adrenalinwirkung*. Bei rascher Hyperventilation eintretenden Alkalose der Katze nimmt die Adrenalinempfindlichkeit bzgl. Höhe u. Dauer der Blutdruckkurve zu. Verminderte Blutdruckkurve kann also nicht auf gesteigerte Zerstörung des Adrenalins infolge Alkalose zurückgeführt werden. Bei Unterventilation zeigt jene Kurve bei der Alkalose verminderten u. schwankenden Verlauf. Während Hyperventilation nehmen im Plasma CO₂-Gehalt u. [H⁺] ab. (Klin. Wchschr. **3**. 2338—41. 1924. Budapest, K. UZSÁK-PÉTER-UNIV.)

WOLFF.

J. Douglas, *Hemmender Einfluß des Adrenalins auf die Absorption des Cobaltchlorids durch die Haut*. Vf. hat in Verss. mit verschiedenen Giften den hemmenden Einfluß des Adrenalins auf die Absorption durch die Capillaren gezeigt. Die Verss. mit Chlangengiften am Meerschweinchen sind besonders beweisend. (C. r. soc. de pharmacol. **91**. 1223—24. 1924. Lyon, Lab. von Prof. DOYON.)

WOLFF.

Raymond L. Stehle, Wesley Bourne und Ezra Lozinsky, *Über die pharmakologische Wirkung von Äthylendioxyd*. Äthylendioxyd ist als Anästheticum ungeeignet. Tiere sterben bei Einatmung von > 6%ig. Konz. u. > 6 Min. unfehlbar. Hunde sterben nach Einatmung oder intravenöser Injektion Erbrechen, Diarrhöe u. leichte Anurie; Tod je nach Gabe in einigen Min. bis Stdn. Tödliche Dosis bei 0,5 ccm Äthylendioxyd pro kg. (Arch. f. exp. Pathol. u. Pharmak. **104**. 82—86. 1924. Philadelphia, MC GILL-UNIV.)

WOLFF.

Hideo Inoue, *Über die Wirkung der Pharmaka auf Ring- und Längsmuskulatur des ausgeschnittenen Kaninchendünndarmes bei ein und demselben Präparate*. II. (Acta scholae med. univ. imp. Kioto **5**. 175; C. **1924**. I. 1965.) Im allgemeinen kommt die Wrkg. erregender Mittel stärker an der Ringmuskulatur (I), lähmender oder hemmender Mittel stärker an der Längsmuskulatur (II) zum Ausdruck. Chinin u. Santonin wirken auf II stets lähmend, auf I gleichfalls, erst nach vorübergehender Erregung. Antifebrin hemmt die Pendelbewegungen, vermindert den Muskeltonus, bei II in stärkerem Grade. Hemmung durch Adrenalin ist auch bei II stärker; nach vorheriger Erregung des Darmes durch Cocain wird diese durch Adrenalin bei II völlig aufgehoben, bei I dagegen eher verstärkt. Cocain erregt Bewegung u. Tonus des Dünndarmes bei schwacher Dosis, lähmt sie bei starker. Aconitin erhöht den Tonus von I, vermindert den von II. Nicotin wirkt bald erregend, bald hemmend, stets gleichartig auf I u. II. Atropin erst hemmend, später erregend. (Acta scholae med. univ. imp. Kioto **5**. 339—52. 1923. Kyoto, Univ.; Ber. ges. Physiol. **28**. 251—52. 1924. Ref. H. H. HENDERSON.)

WOLFF.

V. J. Crozier und H. Federighi, *Unterdrückung der heliotropischen Kreisbewegungen von Limax durch Strychnin*. Durch Strychnin werden die heliotrop.

Kreisdrehungen der Schnecke (*Limax maximus*) unterdrückt. Die Einw. auf Nervenzentrum entspricht der charakterist. Strychninwrkg. Die kriechende Bewegung des Fußes wird nicht wesentlich beeinflusst; eine Einw. des Strychnins auf die Augen kann nicht endgültig ausgeschlossen werden. Zur Unters. gelangten ferner Campher, Nicotin, Phenol u. Pikrotoxin. (Journ. Gen. Physiol. 7. 221—224. 1924. New Brunswick, Rutgers Univ. u. Washington, Carnegie-Inst.) ZANDER.

Ch. Laubry und **L. Deglaude**, *Die physiologische Wirkung des Ouabains auf die Leitfähigkeit innerhalb des Herzens*. Neben dem Einfluß auf die Erregbarkeit des Herzens spielt auch derjenige auf dessen elektr. Leitfähigkeit bei der Wirkung des Ouabains eine Rolle. Er wurde am Froschherzen in situ elektrokardiographisch verfolgt. (C. r. soc. de biologie 91. 1236—39. 1924.) SPIEGEL.

Takeyoshi Nagayama und **Toshiteru Yokota**, *Untersuchungen über Phlorrhizinglykosurie*. I. *Phlorrhizinglykosurie und Nierenaktivität*. Die harnabscheidende Tätigkeit der Niere, ausgedrückt durch das Verhältnis des Harnstoffs im Urin pro Stde. zu demjenigen in 100 ccm Blut, zeigte bei Kaninchen nach Phlorrhizin, welches im Durchschnitt 1,30% Zucker im Harn auftrat, keine wesentliche Änderung. (Journ. Biochemistry 3. 83—90. 1923. Tokyo, JIKAI-KWAI Med. school.) SPIEGEL.

G. Macciotta, *Einwirkung von Adrenalin, Hypophysin und Thyreoidin auf die Reaktion des kindlichen Blutes*. Adrenalin subcutan u. Thyreoidin per os oder subcutan bewirkten Abnahme der Alkalinität um 30—50%, Hypophysenextrakt (Hinterlappensekret) extrakt stärker als Extrakt der ganzen Drüse) subcutan Steigerung. In allen Fällen erfolgte nach einigen Stdn. Rückkehr zu den Ausgangswerten. (Pediatrics 3. 712—20. Sassari, Univ.; Ber. ges. Physiol. 28. 264. 1924. Ref. BEHRENDT.) SPIEGEL.

J. A. Collazo und **Minko Dobreff**, *Die Beeinflussung der äußeren Sekretion des Pankreas durch Insulin nebst einer Bemerkung über die Wirkung desselben auf die Harnausscheidung. Vorläufige Mitteilung*. Intravenöse Insulininjektionen in die freigelegte Vena femoralis von Hunden bei Ä.-Narkose bewirkten Steigerung der äußeren Pankreassekretion. Diese trat schon nach wenigen Minuten ein. Während Insulin auf die Magensaftbildung hemmend wirkt, fördert es die Pankreassekretion, ebenso auch die Gallensekretion. (Münch. med. Wchsr. 71. 1678. 1924. Bli. Univ.) FRAU.

Hanns Baur und **Richard Kuhn**, *Kurze Mitteilungen über Insulin*. Während des hypoglykäm. Stadiums verlaufen Milchsäure u. p_H des Blutes bei Hunden so, daß in den ersten 3 Stdn. beide um 30—300% ansteigen bei gleichzeitigem Anstieg des Blutzuckers u. geringen Allgemeinsymptomen (I. Phase). Nach 5—7 Stunden folgt Abfall von Milchsäure u. p_H bei tiefbleibendem Zuckerwert (II. Phase). Osmolalität des Serums sinkt von 13,5 auf 7—9 mg-% (Ziegen). Jetzt beginnt die Kohlenhydratverarmung des Körpers bis zum Erschöpfungstod. Bei den ersten Zeichen der Erschöpfung treten die Krämpfe ein mit vorübergehendem Anstieg von Milchsäure u. p_H . — Beim gefütterten Tier fehlt die zweite Phase. Die Milchsäure steigt dann stetig leicht an. — Die Höhe des respirator. Quotienten wird durch die Änderungen der p_H in Blut u. Geweben stark beeinflusst. Man sollte aus diesen Verh. des respirator. Quotienten bei der Wrkg. des Insulins keine weitgehenden Schlüsse auf den Kohlenhydratstoffwechsel ziehen. (Klin. Wchsr. 3. 2248—50. 1924. München.) MÜLLER.

J. H. Burn und **H. H. Dale**, *Über den Ort und die Natur der Insulinwirkung*. Insulinzusatz zur Durchströmungsfl. des isolierten Säugetierherzens beschleunigt das Verschwinden des Zuckers. Die CO_2 -B. nimmt dabei nicht entsprechend zu, es ist also keine dauernd vermehrte Zuckerverbrennung vorhanden. — Bei Durchströmung dekapiierter Katzen ohne Eingeweide unter ständigem Zusatz von Traubenzucker bewirkt Insulin die bekannte Senkung des Blutzuckers. Verhindert man sie durch Steigerung der Zuckerzufuhr, so steigt der Zuckerverbrauch und

in weit über die Norm. Im Beginn der Wrkg. des Insulins steigt dabei der Verbrauch, doch nie entsprechend dem Zuckerverlust. Der respirator. Quotient ist etwa 1,0. Eine direkte Umwandlung von Zucker in Fett oder Milchsäure ausgeschlossen. — Ohne Eingeweide oder am isolierten Herzen besteht kein Unterschied in der Funktion der Muskulatur von n. Katzen oder in der Insulinabnahme von diabet. Katzen nach Pankreasexstirpation. — Die anfängliche Erhöhung des O_2 -Verbrauchs u. eine solche des respirator. Quotienten dürfte durch gleiche Zunahme der Kohlenhydratverbrennung unter Sparung von Fett u. Weiß zu erklären sein. (Journ. of Physiol. **59**. 164—92. 1924. London.) MÜLLER.

F. B. S. Haldane, H. D. Kay und W. Smith, *Die Wirkung von Insulin auf Blutmenge*. Bei n. Kaninchen steigt nach Insulin die Blutmenge sofort stark. Darauf muß man achten, wenn man den Gehalt von Stoffen im Blut vor u. nach Insulin vergleicht, zumal wenn jene nicht gleichmäßig in Plasma u. roten Zellen vorhanden sind. — Der osmot. Druck des Serums wird durch Insulinwirkung nicht verändert. (Journ. of Physiol. **59**. 193—99. 1924. Cambridge.) MÜLLER.

C. Maxwell, N. R. Blatherwick und W. D. Sansum, *Die Resorption von Insulin vom Darmkanal aus*. Wenn man das übliche Insulinpräparat in alkohol. Lösung Kaninchen in den Magen einführt, ist es ohne Wrkg. Die geringe Abnahme des Blutzuckers ist eine Folge der Zufuhr vom A. — Dagegen kann man mit einer bestimmten Fraktion aus Pankreasextrakten Hypoglykämie u. Krämpfe erzielen: und dies in mindestens 96%ig. saurem A. l. Stoffe, die bei schwach alkal. Rk. fällen werden. (Amer. Journ. Physiol. **70**. 351—57. 1924. St. Barbara.) MÜLLER.

V. Villa, *Über die Wirkungsweise des Insulins. Insulin und Blutmenge; Insulin und Diabetes Insipidus*. Beim n. Menschen u. beim Diabetiker nimmt nach 40—50 Einheiten die Blutmenge um etwa 10% ab. — In einem Fall von Diabetes insipidus sank die Harnmenge von 11,8 auf etwa 2,5 l pro Tag, D. stieg von 10 auf 1010, das Körpergewicht blieb fast unverändert. Die Blutmenge nahm nach Insulintage um 7% zu, nach 4 Wochen Behandlung durch Insulin um 11%. — Insulin beeinflusst alle chem.-physik. Vorgänge im Organismus. (Wechschr. **3**. 1949—51. 1924. Pavia.) MÜLLER.

Frederick M. Allen, *Versuche mit Insulin*. (Vgl. Journ. Med. Res. **4**. 223; Journ. Med. **124**. II. 2859.) An zahlreichen Krankengeschichten von schweren Diabetes mellitus wird gezeigt, daß die Insulinmenge, die erforderlich ist, um Glykosurie zu halten, nicht nur von der vorhandenen Zuckermenge, sondern auch von der gesamten Calorienzufuhr u. vom Körpergewicht abhängt. Vf. läßt unentschieden, ob Insulin auf die Umsetzung aller Nahrungsstoffe einwirkt, oder ob Körpergewicht u. Nahrungszusatzgröße der Nichtkohlenhydrate den Umsatz von Kohlenhydrat beeinflussen. (Proc. of the assoc. of Americ. physic. **38**. 394—410. 1923; Ber. ges. Physiol. **19**. 9—10. 1924. Ref. LESSER.) SPIEGEL.

Sybrandy, *Aceton und Insulin*. Insulin vermindert die Acetonurie, doch besteht kein strenger Parallelismus zwischen Insulin u. Acetonmenge. — Solange Acetonurie vorhanden, ist keine große Gefahr, daß durch Insulin Krämpfe hervorgerufen werden. (Nederl. Tijdschr. Geneeskunde **68**. II. 2570—75. 1924. Nymwegen.) MÜLLER.

Erich Putter, *Tierexperimentelle Untersuchungen über die Insulinwirkung. Über die Abhängigkeit der hypoglykämischen Krämpfe vom Blutzuckerspiegel*. Der Ausbruch der Insulinkrämpfe ist weitgehend unabhängig vom Blutzuckerspiegel. Nur bei beobachteten Kaninchen hatten 40—50 mg/% u. 9% weniger als 40 mg/%. Bei 7 Tieren (von über 500) war der Blutzucker 35—40 mg/%, ohne daß Krämpfe traten. — Bei der Auswertung des Insulins muß unbedingt die Senkung des Blutzuckers als Maßstab genommen werden, nicht allein der Krampf. (Klin. Wechschr. **29**. 49—42. 1924. Berlin.) MÜLLER.

A. Bornstein und Kurt Holm, *Über den respiratorischen Stoffwechsel, Insulin-Applikation und Zuckerzufuhr. — Untersuchungen am gesunden und diabetischen Menschen und am pankreas-diabetischen Hunde.* Wenn auch eine geringe Zunahme der Kohlenhydratverbrennung nach *Insulin* nicht immer sicher auszuschließen kommt, sie doch nicht als Ursache der Hypoglykämie in Betracht. (Vers. an n. Menschen, Diabetiker, pankreasdiabet. Hunden.) — Weder der zeitliche Verlauf noch die Stärke der Kohlenhydratverbrennung nach Gaben von 100 g Traubenzucker wird beim n. Menschen durch *Insulin* verändert, obwohl die alimen. Hyperglykämie abnimmt. Diabetiker, denen die Fähigkeit, nach Traubenzuckerzufuhr Kohlenhydrate zu verbrennen, völlig fehlt, bekommen durch *Insulin* diese Fähigkeit wieder. Dasselbe gilt für pankreasdiabet. Hunde u. zwar sowohl für Traubenzucker wie *Lävulose*. — Das CO₂-Bindungsvermögen des Blutes wird durch *Insulin* nicht beeinflusst. (Ztschr. f. d. ges. exp. Medizin **43**. 376—90. 1924. Hamburg.)

A. Bornstein, W. Griesbach und Kurt Holm, *Zur Theorie der Insulinwirkung und des Pankreasdiabetes.* Respirationsverss. am Pankreashund u. an n. Menschen bei Körperarbeit zeigen, daß durch *Insulin* der respirator. Quotient nicht ansteigt, während der Blutzucker abfällt. Sie sprechen dafür, daß *Insulin* die Umwandlung: Glykogen $\rightleftharpoons$ Traubenzucker beeinflusst u. so die Deponierung von Kohlenhydrat fördert. — Beim Pankreashund hört die Verbrennung von Kohlenhydrat erst auf, sobald Glykogenmangel des Körpers vorhanden ist. Das bestätigt Verss. an einem n. Hungerhund, der 2 g pro kg Traubenzucker erhielt. Nach 9—12 tägigem Hunger wird der Zucker nicht mehr verbraucht, sondern nur deponiert. — Der Glykogenmangel ist im Diabetes die Ursache des Fehlens der Kohlenhydratverbrennung. (Ztschr. f. d. ges. exp. Medizin **43**. 391—401. 1924. Hamburg.)

Christen Lundsgaard und Svend Aage Holboell, *Wirkung von Insulin auf Muskelgewebe auf Traubenzucker, in vitro.* *Insulin*, selbst frei von jeder Red. u. opt. Drehung, war bei 37° ohne Einfluß auf Lsgg. von Traubenzucker mit spez. Drehung 52,5° u. auf Blutdialysat durch Kolloidum mit Traubenzucker verteilbar. Red. u. Drehung entsprechen einander. — Wenn aber zu Traubenzuckerlsg. *Insulin* Muskelgewebe getan u. bei 37° geschüttelt wurde, fand sich im Dialysat eine geringere opt. Drehung als Red. Die Red. blieb unverändert. (Ohne Indikatoren waren sie gleich geblieben.) Die spezif. Drehung war immer größer als 22,5°. Nach 2—3 Stdn. war die Differenz am größten; dann wird das Muskelgewebe unwirksam. Die Umwandlung war bei 0,9%ig. Traubenzuckerlsg. viel größer als bei stärkeren Konz. — Bei 20° fehlt u. bei *Insulin*mengen unter 10 Einheiten der Prozeß mindert sich die Umwandlung. — Der Prozeß ist reversibel. — Magensaft beeinflusst ihn nicht. (C. r. soc. de biologie **91**. 1108—10. 1924. Kopenhagen.)

Aaron Bodansky, *Einfluß der Dosierung und der vorhergegangenen Ernährung auf die Blutzuckerkurven nach intravenöser Insulinzufuhr beim Schaf.* (Vgl. Journ. Physiol. **69**. 498; C. **1924**. II. 1955.) Krämpfe treten beim Schaf schon auf, auch wenn der Blutzucker nur 0,03% beträgt. Die Zeit, während der der Blutzucker auf dem niedrigsten Wert bleibt, wächst mit der Größe der *Insulin*-dosis. Nach kleiner Gabe (5 Einheiten für 100 Pfd.) steigt beim thyreopriven Schaf der Blutzucker erst nach längerer Zeit wieder an (beim n. Tier sofort). Der Einfluß der Schilddrüse auf die Glykogenolyse fehlt. Nach mehr als 1 Stde. Hungern vor der Injektion war beim n. Schaf die Blutzuckerkurve gleich derjenigen beim thyreopriven Schaf, das gefüttert wurde. (Proc. of the soc. f. exp. biol. and med. **21**. 416—17. Ithaca, CORNELL Univ. med. coll.; Ber. ges. Pathol. **27**. 331. 1924. Ref. LESSER.)

H. Simonnet, *Die Rolle der Leber im hypoglykämisierenden Wirkungsmechanismus des Insulins beim normalen Tiere.* (Vgl. Bull. Soc. Chim. Biol. **6**. 44; C. **192** II.

Verschiedentlich variierte Tierverss. führen zu dem Schlusse, daß die Leber für die Wrkg. des Insulins keine akt. Rolle spielt. Wird Insulin ihr direkt zugeführt, so wird dessen Wrkg. weder gehemmt noch verstärkt. Sie wirkt auch mit Insulin behandelten Tiere weiter als Zuckerspender für den allgemeinen Verlauf, u. nach ihrer Entfernung macht sich die Herabsetzung des Blutzuckers Insulin noch stärker geltend, offenbar, weil dann die Glykogenreserve fehlt. (Soc. Chim. Biol. 6. 742—58. 1924. Coll. de France.) SPIEGEL.

A. Houssay, J. T. Lewis und E. A. Molinelli, *Rolle der Adrenalinsekretion während durch Insulin hervorgerufener Hypoglykämie*. (Vgl. HOUSSAY und MOLINELLI, C. r. soc. de biologie 91. 27; C. 1924. II. 1008.) Das Nebennierenblut wird von einem Hunde direkt durch Venenanastomose in die Venen eines anderen Hundefüßchens übergeleitet. Der Blutzuckergehalt stieg dadurch nicht an, wohl aber wenn der Spender Insulin injiziert war. Andererseits fehlte die Hyperglykämie, wenn außerdem die Insulinhypoglykämie durch Traubenzuckerzufuhr verhindert wurde, u. wenn vor Insulininjektion beim Spender der linke Splanchnicusnerv vollständig entfernt war. — Während der Insulinhypoglykämie sondern also die Nebennieren infolge Splanchnicusreiz stärker als sonst ab. (C. r. soc. de biologie 91. 1013—14. 1924. Buenos Aires.) MÜLLER.

A. Houssay, J. T. Lewis und E. A. Molinelli, *Die physiologische Rolle des Adrenalins bei der durch Morphin hervorgerufenen Hyperglykämie*. (Vgl. vorst. Ref.) Bei gleicher Anordnung der Verss. zeigte sich, daß die Nebennieren während der Morphinvergiftung unter dem Einfluß der Splanchnici vermehrt Adrenalin absondern, u. daß sich so die Hyperglykämie in einer Reihe der Fälle erklären läßt. (C. r. soc. de biologie 91. 1013—14. 1924. Buenos Aires.) MÜLLER.

A. Houssay und R. R. Busso, *Empfindlichkeit der Tiere ohne Schilddrüse für Insulin*. (Vgl. vorst. Ref.) Bei Kaninchen u. Ratten beeinflußt Schilddrüsenentfernung deutlich die Empfindlichkeit gegenüber Insulin, etwas weniger bei Meerschweinchen, noch weniger beim Hund. Im allgemeinen sinkt der Blutzucker etwas tiefer als n. u. steigt langsamer wieder an. (C. r. soc. de biologie 91. 1013—14. 1924. Buenos Aires.) MÜLLER.

A. Houssay und E. A. Molinelli, *Adrenalinsekretion durch Piquüre oder chemische Reizung des Bulbus*. (Vgl. vorst. Ref.) Durch Venenanastomose zwischen Bulbus u. Angularis zweier Hunde wurde festgestellt, daß an der Entstehung der Hyperglykämie durch Piquüre oder Bulbusreizung die Nebennieren beteiligt sind. (C. r. soc. de biologie 91. 1045—49. 1924. Buenos Aires.) MÜLLER.

A. Houssay und E. A. Molinelli, *Reflektorische Adrenalinsekretion*. (Vgl. vorst. Ref.) Auf gleiche Weise wurde festgestellt, daß durch sensible reflektorische Reizung u. durch sehr starken Vagusreiz die Adrenalinabsonderung beim Hund vermehrt wird, obwohl schwächerer Vagusreiz sie herabsetzt. (C. r. soc. de biologie 91. 1056—58. 1924.) MÜLLER.

Roberto Sammartino, *Studien über Insulin*. II. *Die Wirkung des Insulins auf die Gärungsmassen*. (I. vgl. Atti R. Accad. dei Lincei, Roma [5] 32. II. 94; C. 1924. I. 1008.) Insulinpräparate verschiedener Herkunft hatten auf die Vergärung von Rohrzucker oder Glucose mittels Bierhefe oder Zymaselsgg. (aus Bierhefe hergestellt) keinen merklichen Einfluß. (Atti R. Accad. dei Lincei, Roma [5] 33. II. 111—16. 1924. Univ.) OHLE.

Abelin und Kenzuke Miyazaki, *Über den Einfluß der parenteralen Milch auf den Ruheumsatz und auf die spezifisch dynamische Fleischwirkung*. Injektionen blieben bei Ratten ohne wesentliche Wrkg. auf den Ruheumsatz, wenn indessen die spezif. dynam. Wrkg. zugeführter Fleischmengen. Injektionen von Casein hatten diese Wrkg. nicht, erhöhten auch nicht die Empfindlichkeit für Schilddrüsenstoffe. (Klin. Wchschr. 3. 2373—77. Bern, Univ.) SPIEGEL.

Susumu Maki, *Untersuchungen über das Hautsekret von Triton taeniatus* (kleine Wassermolch). Das Hautsekret von Triton taeniatus wurde durch elektr. Reizung gewonnen. Es wirkte nicht auf Bakterien, Hefezellen oder die Keimung von Bohnen. Die Konz. von 1:600 war für Rinderblutkörperchen noch hämolytisch. Die Wrkg. ist viel schwächer als die von Triton cristatus. Am isolierten Herzen verursachte das Sekret Verlangsamung der Kontraktionen, Peristaltik, Gruppenbildung u. Stillstand, der bald diastol., bald systol. eintrat. Am Froschgefäßpräparat zeigte sich geringe Gefäßverengung. Der Blutdruck war vorübergehend gesteigert und sank bei tödlicher Vergiftung rasch ab. Die glatte wie die quergestreifte Muskulatur wurde gelähmt. Schleimhäute werden stark gereizt. Das Sekret wirkt bei Einführung in die Blutbahn sehr giftig. Kaltblüter erwiesen sich als widerstandsfähiger gegen die Einw. des Sekrets als Warmblüter. Die tödliche Dosis für Kaninchen ist ca. 1,3 mg/kg, die für Frösche ist 20—100fach größer, für Triton taeniatus selbst 1000—5000 mal so groß. Das Sekret verursacht Lähmungserscheinungen u. schädigt vor allem die Atmung. Die Eiweißk. waren positiv. *Adrenalin* konnte weder chem. noch biol. mit Sicherheit nachgewiesen werden. Der wirksame Bestandteil des Sekrets wird durch Erhitzen leicht zerstört; Trochimen im Vakuum schwächt bereits stark ab. Durch Tierkohle wird das Sekret vollständig entgiftet. Es schließt sich in seiner lokalen u. resorptiven Wrkg. vielen anderen Tiergiften von Schlangen, Kröten, Fröschen, Fischen an. (Arch. f. exp. Path. u. Pharmak. 104. 100—114. 1924. Würzburg, Pharmakol. Inst.) WOLFF.

Mario Zanolli, *Die Orchitase Sero* in ihren Anwendungen. Nach Vf. wirkt das Präparat, das leicht assimiliert wird u. zur Herst. des Gleichgewichtes zwischen den innersekretor. Drüsen dient, besonders bei den Formen von Hodeninsuffizienz ferner bei Magendyspepsie nervöser Art, bei Tabes dorsalis (? Der Ref.) u. bei anderen Krankheitserscheinungen, in denen sich eine allgemeine Verlangsamung der organ. Funktionen äußert. Auch bei hohen Gaben u. langdauernder Anwendung wurden keinerlei Störungen beobachtet. (L'Avvenire Sanitario 18. Nr. 4; Rassegna Clin. Terap. e Scienze aff. 23. 216—20. 1924. Milano.) SPIEGEL.

Vito Massarotti, *Die „Orchitase“ Sero* bei Behandlung der sexuellen Impotenz beim Manne. Vf. berichtet über gute Erfolge mit diesem Hormonpräparat bei vorangehender Behandlung mit Arseniaten, Glycerophosphaten, Bioplastin usw. bei psych. Impotenz. (Rassegna Clin. Terap. e Scienze aff. 23. 200—2. 1924. Milano.) Ist. G. B. PALLETTA.) SPIEGEL.

Placido Finizia, *Lienase „Sero“* bei Summfieberkachexie. Es wird bei günstige Wrkg. berichtet. Das Präparat scheint anregend auf die funktionell blutbildenden Organe zu wirken. (L'Avvenire Sanitario 18. Nr. 11; Rassegna Clin. Terap. e Scienze aff. 23. 203—6. 1924. Zaponeta [Foggia], Ambulanza anti-malarica.) SPIEGEL.

Carlo Galdini, *Opothérapie und „Hypophysase Sero“*. Dieser Hypophysenextrakt wurde vom Vf. intraglutaeal oder peroral verwendet u. wird für alle sicher oder zweifelhaften Fälle gestörter Hypophysenfunktion um so mehr empfohlen als keine tox. Erscheinungen bei seiner Anwendung auftraten. (L'Avvenire Sanitario 18. Nr. 6—7; Rassegna Clin. Terap. e Scienze aff. 23. 207—11. 1924.) SPIEGEL.

Aram Pasargiklian, *Hypotenin Sero* bei Behandlung der arteriellen Blutdruckhöhung. Das Präparat ist ein Gemisch von NaJ, NaNO₃, NaNO₂, NaIO₃, Lobelin u. Citral. Es bewirkt bei erhöhtem Blutdruck allmählich merkliches Sinken desselben, welche Wrkg. auch noch recht lange nach Aussetzen der Behandlung anhält, ohne daß bei Überwachung des Kranken u. Berücksichtigung der individuellen Empfänglichkeit Beschwerden auftreten. (L'Avvenire Sanitario 18. N 31; Rassegna Clin. Terap. e Scienze aff. 23. 212—15. 1924. Milano.) SPIEGEL.

Fr. Uhlmann, Über Coramin. (*Pyridin- β -carbonsäurediäthylamid*.) Eine neue merkwürdig wirkende Substanz. (Vgl. FAUST, Schweiz. med. Wehschr. 54. 229; 1924. II. 2186.) Den *Pyridinmonocarbonsäuren* kommt schwache sedative bzw. tr. Wrkg. zu, beim Kaltblüter vorwiegend Lähmungserscheinungen. Das gleiche findet sich, etwas verstärkt, bei den *Alkylestern*. Die *Amide* zeigen leichte tr. Wrkg. bei geringer Giftigkeit u. fast ohne Änderung von Atmung u. Kreislauf. Bei den *Monoalkylamiden* ist die Giftigkeit etwas erhöht, sie wirken in großen Dosen noch narkot., setzen beim Kaninchen den mittleren Blutdruck herab u. wirken stärker die glatte Muskulatur, auf die Atmung haben auch sie kaum Einfluß. Die *Dialkylamide* sind zum Teil stark wirkende Stoffe, wobei der Einfluß bei verschiedenen Alkyle sehr verschieden ist. *Pyridin- β -carbonsäurediäthylamid* (Coramin) ragt unter ihnen durch eine Wrkg. hervor, die mit der des Camphers am wenigsten ist. Analog, wenn auch bedeutend schwächer, wirkt das entsprechende *Diäthylamid*, während *Dimethyl-* u. *Dipropylamid*, in dieser Richtung fast unwirksam, den *Monoalkylamiden* näher stehen, *Di-*i*-butylamid* eine Mittelstellung einnimmt. Die *Alkylamide* zeigen die Wrkg. des Coramins nur andeutungsweise, *Diäthylpropylamid* sehr wenig, *Äthylpropyl-* u. *Äthylbutylamid* teilweise schon mehr gesteigerter Giftigkeit. Die *Pyridin- α -carbonsäurealkylamide* wirken ganz analog, sind aber schwächer. Überführung in quaternäre Basen kehrt die Grundeigenschaften, besonders die Wrkg. auf den Blutdruck, um. Hydrierung schwächt die Wrkg. ab. Die tr. Wrkg. des Coramins steht diejenige des *Nicotins* in gewisser Beziehung zu, die geringere Giftigkeit bei jenem erklärt sich vielleicht durch das Fehlen des geschlossenen Pyrrolidinkerns. Von sonst untersuchten Pyridinderivv. war *Pyridin- β -methylketon* in größeren Gaben leicht narkot., pulsbeschleunigend u. blutdrucksenkend, *Diäthylaminomethylpyridylketon* leicht blutdrucksteigernd, ohne Wrkg. auf das Herz, beim Kaninchen von leicht erregender Wrkg., *Nicotylharnstoff* ganz unwirksam. — Die eingehend wiedergegebene pharmakolog. Unters. des Coramins zeigt, daß dieses mit Campher viele Wrkgg. gemeinsam hat u. ihn in mancher Hinsicht erheblich übertrifft, besonders in Wrkg. auf Blutdruck u. Atmung, erregende Wrkg. auf das Herz u. Antagonismus gegen Morphin. Die zentrale Erregung ergreift auch das Großhirn, sowohl die motor. als auch die psych. Sphäre. Nach dem beim Menschen erwarteten klin. Erfolge sind durch THANNHAUSER u. ZIL (Schweiz. med. Wehschr. 54. 229; C. 1924. II. 2187) bestätigt worden. Man ferner angezeigt erscheinen bei drohenden Lähmungen des Atemzentrums, Propinopsatz gegen Morphin usw. (Ztschr. f. d. ges. exp. Medizin 43. 556—83. 1924. Basel, Ges. f. Chem. Ind.)

SPIEGEL.

H. Austin, G. E. Cullen, H. C. Gram und H. W. Robinson, Die Veränderung von Blutelektrolyten bei Ätheracidose. (Vgl. AUSTIN, Journ. Biol. Chem. 61. 337; C. 1924. II. 2594.) GRAM, Journ. Biol. Chem. 61. 337; C. 1924. II. 2594.) besteht, lassen zunächst nur geringe Abnahme von Base u. mäßige Vermehrung von Cl' neben deutlichem Abfall des HCO_3' erkennen, wobei die algebraische Summe der Änderungen von HCO_3' u. Cl' der Veränderung im Basengehalt äquivalent ist. Zieht man aber die Differenz der an Eiweiß gebundenen Base bei der Berechnung in Betracht, so ergibt sich, daß einerseits Auftreten von einem nicht identifizierten Anion oder mehreren solchen, andererseits, wenn auch quantitativ von geringerer Bedeutung, eine Entziehung von Base aus dem Blute statt sein muß. Die dem unbekannten Anion entsprechende Säure (vielleicht Milchsäure) dürfte in Geweben gebildet werden. Die verhältnismäßige Abnahme von Leitfähigkeit u. Gefrierpunktsdepression lassen eine schnelle Abnahme des gesamten osmot. Druckes des Blutes voraussetzen, wahrscheinlich eine Abnahme der Ausscheidungsorgane, besonders der Niere. (Journ. Biol. Chem. 61. 337—350. 1924. Philadelphia, Univ. of Pennsylvania.)

SPIEGEL.

Erich David, *Über den Einfluß der Narkose auf die Funktion der überlebenden Froschniere*. Die Verdünnungsarbeit der isolierten Froschniere (Cl, K, Ca, Glucose u. deren Konzentrationsarbeit (NH₄, K, Ca) kann durch Zusatz von Narcoticis (Phenylurethan, carbaminsaures Isobutyl) zur Durchströmungsf. weitgehend bis vollständig u. reversibel aufgehoben werden. (PFLÜGERS Arch. d. Physiol. **206**. 492—99. 1924. Kiel, Physiol. Inst.) WOLF

Maurice Nicloux und **Alexandre Yovanovitch**, *Über die Verteilung von Chloroform in den verschiedenen Geweben und besonders in den verschiedenen Teilen des zentralen und peripheren Nervensystemes im Verlaufe der Anästhesie*. Mitteil. des modifizierten Verf. von NICLOUX (vgl. S. 734) wurde die Verteilung des Chloroforms nach Inhalation bei Hunden verfolgt. Es ergab sich, daß sowohl das zentrale als auch das periphere Nervensystem bedeutende Mengen binden. Die größten Mengen (abgesehen vom Nierenfett) wurden in den Nerven gefunden, sowohl am beginnenden, als auch bei ausgesprochener Betäubung u. beim Tode. (C. r. des seances de biologie **91**. 1285—87. 1924. Straßburg, Fac. de méd.) SPIEGEL

R. Debénédicti, *Ein einfaches Mittel zur Herbeiführung einer Anästhesie von langer Dauer bei kleinen Laboratoriumstieren*. Verwendung von Diäthylaminsäureester der Barbitursäuren (Sonnifen LA ROCHE). Bei weißen Ratten von 130—150 g. hält man vollständige Anästhesie für 4—5 Stdn. durch subcutane Injektion von 0,043 ccm der für intramuskuläre Injektionen bestimmten Sonnifenlsg. pro 100 g. Körpergewicht. Die Dosis liegt ziemlich nahe der tox. (0,06 ccm), so daß genaue Dosierung erforderlich ist. (C. r. soc. de biologie **91**. 1222—23. 1924. Lyon, Acad. milit. DESGENETTES.) SPIEGEL

E. Marx, *Wirkung der Anästhetica auf die Hornhaut*. Kurvenmäßige Ergebnisse der Wrkg. von Cocain, Holocain, Stovain u. Butyn. (Archives néerland. d. Physiol. de l'homme et des animaux **9**. 539—57. 1924. Leiden, Univ.) WOLF

Jean Régnier, *Einfluß der Wasserstoffionenkonzentration von Cocain und seiner hydratlösungen auf die Anästhesie der Cornea*. (Bull. Sciences Pharmacol **31**. 511 bis 519. 1924. — C. **1924**. II. 1604.) HABERLAND

Caesar Hirsch, *Tutokain als Oberflächenanästhetikum*. Bericht über durchwegs günstige Erfahrungen mit Tutokain in der laryngolog. Praxis. (Dtsch. med. Wchschr. **50**. 1540—41. 1924. Stuttgart, Marienhospital.) FRANK

Emil Bürgi, *Über Indonal, eine Cannabis indica enthaltende Hypnotikakombination*. Durch Kombination von Extractum cannabis indicæ mit verschiedenen gebräuchlichen Schlafmitteln, wie Veronal, konnte Vf. eine Vertiefung der schlafmachenden Wrkg. derselben erzielen. Die erforderliche schlafmachende Dosis des Medikamentes konnte niedriger gehalten werden, die wertvollen Eigenschaften der Cannabis kamen ohne unangenehme Nebenerscheinungen voll zur Wrkg. Die Präparate werden unter dem Namen Indonal (Herst. FRESSENIUS, Frankfurt a. M.) vertrieben. (Dtsch. med. Wchschr. **50**. 1529—30. 1924. Bern, Univ.) FRANK

Heinrich Wertheimer, *Bidetal, ein neues Scheidenspülmittel*. Bidetal, eine Mischung aus NaHCO₃, Borax, A. u. Seifenspiritus (Herst. FRITZ PEZOLD & SOHN) wird als schonendes Scheidenspülmittel empfohlen. (Wien. med. Wchschr. **74**. 2641—42. 1924.) FRANK

W. Lahm, *Vagintus, ein neues Mittel zur Fluorbehandlung*. Vagintus, ein solidoles Al-Präparat in saurer Form (Herst. Firma MAX ELB) bewährte sich in Pulverform bei der Behandlung von Fluor verschiedenen Ursprungs. (Münch. med. Wchschr. **71**. 1751—53. 1924. Dresden, Staatl. Frauenklin.) FRANK

J. Meßner, *Ist Natrium santonicum ein Anthelmintikum?* Als Wurmmittel kommen nur Santonin = Santoninsäureanhydrid u. Santoninsäure, sowie Natrium santonicum in Betracht, aber nicht Acidum santonicum = Santonsäure, bzw. Natrium santonicum = Natriumsantonat, die als Ersatz für Santonin nicht brauchbar

- icht wurmtreibend, sind. (Pharm. Zentralhalle 65. 710—13. 1924. Darm-
DIETZE.
- Pröscholdt**, *Die Sklerostomiasis der Fohlen und Versuche zur Bekämpfung*
ben unter Zuhilfenahme von Aricyl. Neben allgemeinen hygien. Maßnahmen
intravenöse Gaben von Aricyl, einer organ. As-Verb. (Herst. BAYER) bei von
stomiasis (Wurmsäuche) befallenen Fohlen auffallend rasche Besserung
Ernährung u. im Allgemeinbefinden sowie starken Abgang von Würmern u.
nderung der Eier bewirkt. (Dtsch. tierärztl. Wehschr. 32. 778—83. 1924. Land-
haftskammer f. Pommern.) FRANK.
- Ritz Mras und Regina Kohane**, *Zur Dosierungsfrage der Wismutpräparate*.
an Hand der durch Sedimentunters. leicht festzustellenden Bi-Nephrose für
eihe von Bi-Präparaten die günstigsten Dosierungen aufzufinden, bei denen
Schädigungen trotz größter Wrkg. auftreten. (Wien. klin. Wehschr. 37. 1285
86. 1924. Wien-Klosterneuburg, Heilanst.) FRANK.
- ans Krösl**, *Versuche und Erfahrungen mit Stovarsol und Spirocid*. *Stovarsol*
Spocid sind in ihrer Wrkg. gleich, stehen dem Salvarsan nahe, erreichen es
nicht. (Wien. klin. Wehschr. 37. 1209—13. 1924. Innsbruck, Univ.) FRANK.
- ans Kaiser**, *Ein Beitrag zur Kenntnis der Salvarsandermatitis*. Bericht über
Beobachtungen. Die im Verlaufe kombinierter antiluet. Kuren auftretenden
matiden sind tox. Natur, ihre Ursache ist das im Salvarsan enthaltene As.
ünstiger Einfluß der Dermatitis auf den Verlauf der Lues erscheint nicht
dfrei bewiesen. (Wien. med. Wehschr. 74. 2795—2802. 1924. Wien, Allgem.
en.) FRANK.
- aniel Alpern**, *Die Abhängigkeit der kontraktilen Reaktion der peripheren*
ia von der H-Ionenkonzentration in der durchströmenden Flüssigkeit. Ringer-
sg. mit pH 5,2—5,6 inaktiviert Adrenalin bzgl. seiner verengernden Wrkg. auf
fäße des isolierten Kaninchenohres. Bei pH 6,6—6,8 ist diese Wrkg. nicht
ch abgeschwächt. Die auf die Einw. von saurer Nährlsg. u. Adrenalin
ele Gefäßwaschung mit n. Nährfl. ruft einen Gefäßspasmus sowie eine stark
prochene rhythm. Gefäßtätigkeit hervor. Ringer-Lockelsg. mit pH 7,8—8,1
ilisiert das Adrenalin in seinen verschiedenen Konz. Die Adrenalin-
schung u. -sensibilisierung ist durch die Einw. der veränderten $[H^+]$ auf die
wand bedingt. Die an isolierten Flügeln avitaminöser Tauben beobachtete
setzung der GefäßBrk. läßt sich vorläufig mit der Gewebsacidosis allein nicht
n. (PFLÜGERS Arch. d. Physiol. 205. 578—89. 1924. Charkow, Staatl. med.
WOLFF.
- argess Gordon und Guy Wells**, *Die Wirkung von Amylnitrit, Aderlaß und*
hrin auf den Blutdruck und die Herzgröße der Katze. Nach Einatmen von
trit nimmt der Herzumfang parallel der Blutdrucksenkung ab, nach Epinephrin
nös) parallel der Blutdrucksteigerung zu, nach Aderlaß von 40 ccm bei
Körpergewicht sanken Blutdruck u. Herzgröße. (Arch. of internal med. 33.
l. Boston, HARVARD Med. school; Ber. ges. Physiol. 28. 270. 1924. Ref.
ERZ.) SPIEGEL.
- Hepner und J. Červenka**, *Blutzucker und Blutdruck nach Adrenalingaben*
Die Vermehrung des Blutzuckers auch nach peroraler Darreichung von
lin wird beim Hunde u. beim Menschen nachgewiesen; die Verhältnisse
heiden sich von denen bei subcutaner oder intramuskulärer Anwendung nur
es Maximums u. der Dauer der Hyperglykämie. Der Blutdruck steigt nicht
h. Kleine perorale Gaben erniedrigen sowohl Blutzucker wie Blutdruck.
ion findet wahrscheinlich schon durch die Schleimhaut von Mundhöhle u.
l statt. (Biol. listy 10. 129—37. Prag, Tschech. Univ.; Ber. ges. Physiol. 28.
24. Ref. BABÁK.) SPIEGEL.

E. Deicke und **W. Hülse**, *Adrenalinversuche bei Hypertonien*. Fälle reiner essentieller Hypertonie reagierten auf intravenöse Gaben von 0,005 Adrenalin in gleicher Weise wie Gesunde, dagegen zeigten Fälle von nephrotischem Hochdruck erhöhte Adrenalinempfindlichkeit. Für deren Beurteilung ist das Verhalten des arteriellen Blutdrucks nur im Verein mit Beobachtung des Venendrucks verwertbar. Auch bei negativer Rk. (Senkung) von jenem sind die Fälle als positive im Sinne erhöhter Adrenalinempfindlichkeit anzusehen, wenn eine starke Steigerung des Venendrucks damit einhergeht. Dieses Verh. wird erklärt durch gleichzeitige Überempfindlichkeit der Lungengefäße für Adrenalin, wodurch es rückwärts zur Stauung im Venensystem, vorwärts zu mangelhafter Blutfüllung des Arteriensystems kommt. (Dtsch. Arch. f. klin. Med. **145**. 360—72. 1924. Halle, Univ.) SPIEGEL.

Kenmatsu Shimidzu, *Versuche über die Steigerung der Adrenalinempfindlichkeit sympathischer innervierter Organe nach der Abtrennung von den zugehörigen Ganglien*. (Vgl. Arch. f. exp. Pathol. u. Pharmak. **103**. 52; C. **1924**. II. 1826.) Die Zunahme der Adrenalinempfindlichkeit, die innerhalb einiger Tage nach der Entfernung der Ganglien zu dem betreffenden Organ gehörenden sympath. Ganglions oder nach der Durchtrennung der postganglionären sympath. Fasern sich ausbildet, wird an der Iris, den Ohrgefäßen u. dem Dünndarm von Kaninchen quantitativ ausgemessen. Die Zunahme ist am stärksten an der Iris (auf das 16—40fache), sie ist regelmäßig aber schwächer an den Ohrgefäßen (auf das 2—8fache) u. am Dünndarm (auf das 2—4fache) zu beobachten. Die Adrenalinüberempfindlichkeit der vom Ganglion abgetrennten Blutgefäße könnte für die Entstehung arteriosklerot. Prozesse von großer Bedeutung sein. (Arch. f. exp. Pathol. u. Pharmak. **104**. 254—64. 1924. Freiburg i. B., Pharmakol. Inst.) WOLL.

A. Braun, *Vergleichende pharmakologische Untersuchungen von Clavipurin und anderen Mutterkornpräparaten*. Bei den Mutterkornpräparaten ist der Alkaloidgehalt maßgeblich für die Wrkg. Von den im Handel befindlichen Präparaten Gynergen u. Clavipurin haben beide den gleichen Gehalt an Alkaloiden (1% Ergotamin). Sie zeigen sich in pharmakolog. Wrkg. auf Uterus u. Blutdruck gleich. Die gangränisierenden Wrkg. ist nach Verss. am Hahnenkamm das Clavipurin weniger tox. als Gynergen. Ob dies auch für die Praxis am Menschen zutrifft, ist nicht ohne weiteres vorauszusehen. Die nach dem deutschen Arzneibuch hergestellten Mutterkornpräparate zeigten nur geringe, hauptsächlich auf protropinogenen Aminen beruhende Wrkg. Die vom Vf. geprüften derartigen Präparate zeigten hielten gar kein wirksames Alkaloid. Rationeller als die Vorschriften des deutsh. u. engl. Arzneibuches erscheinen die des amerikan. u. franz., welche von vornherein unter Säurezusatz extrahieren lassen. (Münch. med. Wehschr. **71**. 1641—42. 1924. Leipzig, Univ.) FRÄU.

A. M. Wedd, *Bemerkungen über die Wirkung gewisser Mittel auf Vorhofsfibrillation in der Klinik*. Digitalis verlängert durch unmittelbare Wrkg. auf den Herzmuskel die Leitungszeit u. refraktäre Phase, verlangsamt dadurch die Frequenz des Flatterns, wirkt durch ihre Vagusreizung umgekehrt. Atropin verlangsamt in der Regel die Frequenz durch Herabsetzung des Vagustonus, kann sie durch Überwiegen der direkten Wrkg. auf den Acceleraus aber auch steigern. Chinidin senkt sie durch unmittelbare Wrkg. auf den Muskel wie Digitalis, kann in Kombination damit verstärkende Wrkg. zeigen. Derartige Kombination wird empfohlen. (Heart **11**. 87—95. 1924. Edinburgh, MERCY Hosp.; Ber. ges. Physiol. **28**. 271. 1924. Ref. EDENS.) SPIEGEL.

Konrad Schübel und **Philipp Stöhr jun.**, *Ein Beitrag zur Pharmakologie transplanteder Amphibienherzen*. Amphibienlarven (Bombinator pachypus) und ein zweites Herz von derselben Species eingepflanzt. So wurden Tiere miteinander unabhängig schlagenden Herzen erhalten. Unter dem Einfluß allgemeiner Zellgifte, wie A., Chlf., Ä., Chlorhydrat, Urethan werden beide Herzen

sibel gelähmt. Muskel- u. Nervengifte, wie *K*- u. *Ba*-Salze, sowie *Strophanthin* in beide nach längerer Zeit. Eine Sonderstellung nimmt *Pilzmuskarin* ein. Während das Wirtsherz durch Muskarin regelmäßig allmählich zum Stillstand kommt, wird das transplantierte nicht beeinflusst. Der Muskarinstillstand des Wirtsherzes wird durch *Atropin* prompt aufgehoben. (Arch. f. exp. Pathol. u. Pharmak. 87—99. 1924. Würzburg, Univ.)

WOLFF.

Ernst Simonson und Kurt Engel, *Weitere Untersuchungen über zentral bedingte Nachkontrakturen der Skelettmuskeln und ihre periphere Beeinflussung*. (Vgl. *HER* u. SIMONSON, PFLÜGERS Arch. d. Physiol. 203. 221; C. 1924. II. 498.) *Physostigmin* erzeugt, zentral wirkend, am Froschgastrocnemius ton. Nachkontrakturen von gleichem Charakter u. gleicher Intensität wie *Cocain* (l. c.). Die *Cocain*-Kontraktur des Gastrocnemius bleibt bei Durchströmung der Hinterbeine mit *Ringerlsg.* unverändert; sie wird bei Durchströmung mit *Acetylcholin* sowohl Kontraktur erzeugenden wie bei unterschwelligen Konzz. nicht beeinflusst. Die Konz. wie die *Physostigmin*-Nachkontraktur werden peripher durch *Physostigmin* beseitigt, durch *Cocain* peripher abgeschwächt. Durchströmung mit *Ca*-freier *Ringerlsg.*, besonders bei vermehrtem *K*-Gehalt, verstärkt die *Cocain*-Nachkontraktur. Durchströmung mit *K*-freier *Ringerlsg.* läßt die *Cocain*-Nachkontraktur einfließen. Durchströmung mit *K*-freier *Ringerlsg.* am unvergifteten Tier bewirkt bisweilen ein Manifestwerden einer zentral bedingten Nachkontraktur. Die *Acetylcholin*-Kontraktur wird bei Durchströmung mit *K*-freier *Ringerlsg.* gehemmt, Durchströmung mit *Ca*-freier *Ringerlsg.* aber nicht verstärkt. (PFLÜGERS Arch. d. Physiol. 206. 373—88. 1924. Greifswald, Univ.)

WOLFF.

W. E. Engelhardt, *Über das Presojod*. Vf. berichtet über erfolgreiche Anwendung des Presojods (Preglscher Jodlsg.) in einem Falle von Pleuraempyem, Grippe u. bei eiternden Wunden. Bei einem Falle von puerperaler Sepsis bewirkte 2-malige Injektion von 20 cem den letalen Ausgang nicht hindern, bei einem Falle von kryptogenet. Sepsis wurde die Fieberkurve zwar gesenkt, das klin. Bild aber zunächst nicht verändert. (Ztschr. für mediz. Chemie 2. 38. 1924.)

SPIEGEL.

Ernst Pachner, *Aktoprotin bei tuberkulösen Lymphomen*. *Aktoprotin*, eine Eiweißlsg. von chem. reinem Casein (Herst. SANABO, Wien) eignete sich zur paracutanen Eiweißbehandlung von Lungentuberkulosen 1. u. 2. Stadiums. Anwendung 10—20 ccm. (Wien. med. Wchschr. 74. 2640—41. 1924. Wien.)

FRANK.

W. Meyer, *Unsere Erfahrungen mit Hypophen Gehe*. Das Hypophysenpräparat *Hypophen* (Herst. GEHE) bewährte sich als wehentreibendes Mittel. Anwendung subcutan oder intramuskulär. (Münch. med. Wchschr. 71. 1798—99. 1924. Nürnberg, Städt. Wöchnerinnenheim.)

FRANK.

W. Schmidt, *Zwei Fälle von Kieselfluorcalciumvergiftung mit günstigem Ausgange*. Bericht über 2 Vergiftungsfälle durch Verwechslung von NaHCO_3 mit *Kieselfluorcalcium*, welches zur Schwabenvertilgung dienen sollte. Die Patienten konnten durch künstliche Erbrechen u. Abführung des Giftes gerettet werden. (Dtsch. med. Wchschr. 50. 1651. 1924. Danzig, Städt. Krankenhaus.)

FRANK.

W. Lorens, *Über Bariumvergiftung*. Bericht über 2 Vergiftungsfälle infolge Verwechslung von BaSO_4 mit BaCO_3 . In sämtlichen Organen des an der Vergiftung gestorbenen Mannes konnte *Ba* nachgewiesen werden, im Harn der Frau, die die Vergiftung überstand, war noch am 5. Tage nach dem gifthaltigen Harn *Ba* im Harn nachweisbar. Bei einem gleichzeitig vorgekommenen Vergiftungsfalle mit *As* waren sowohl die klin. Erscheinungen wie auch der anatom. Befund dem bei der *Ba*-Vergiftung beobachteten völlig gleich. (Wien. klin. Wchschr. 10—12. 1924. Innsbruck, Univ.)

FRANK.

G. Joachimoglu und F. Paneth, *Über vermeintliche ökonomische und gewerbliche Vergiftungen mit Zinnwasserstoff*. Vf. wenden sich gegen die Ansicht ZELLNERS (vgl. Chem.-Ztg. 48. 205; C. 1924. I. 2796), daß Vergiftungen durch Speisen, zu deren Transport verzinnte Gefäße benutzt worden sind, als As₃-Vergiftungen anzusprechen sind. Es ist unwahrscheinlich, daß As zu AsH₃ reduziert worden ist, der Knoblauchgeruch des letzteren hätte den erkrankten Personen auffallen müssen. Die sehr geringen Mengen etwa gebildeten AsH₃ können keine Krankheitserscheinungen hervorgerufen haben, zudem fehlten die charakteristischen Symptome einer As-Vergiftung, z. B. Hämoglobinurie. Auch die Ansicht VAUBEL (Münch. med. Wehschr. 71. 1097; C. 1924. II. 1958), wonach obige Vergiftungserscheinungen auf Zinnwasserstoff zurückzuführen sind, erscheint den Vf. als nicht zutreffend. SnH₄ ist nur durch komplizierte Methoden u. in äußerst geringen Mengen herstellbar, er besitzt keine lokal reizende Wrkg., auch keine auf das Blut. Die von VAUBEL erwähnten Verätzungen der Mundhöhle u. der oberen Luftwege sind auf die Wrkg. der Lötwasserdämpfe zurückzuführen. Beim Hantieren mit Lötwasser entsteht niemals SnH₄. (Münch. med. Wehschr. 71. 1647—48. 1924. Berlin, Univ.) FRANZ

W. Vaubel, *Über vermeintliche ökonomische und gewerbliche Vergiftungen mit Zinnwasserstoff*. Gegen die Ausführungen von JOACHIMOGLU u. PANETH (vgl. vorst. Ref.) führt Vf. folgendes an: Die B. von Zinnwasserstoff ist möglich bei reinen Rkkn., wo naszierender H₂ auf Sn-Lsgg. wirkt, wie durch Erzeugung von charakteristischen Sn-Spiegeln u. Darst. der Sn-Ag-Verbb. festgestellt ist. SnH₄ reizt heftig im Magen, Husten, etwa gleichzeitig vorhandene HCl-Dämpfe können für sich allein nicht so heftig wirken. Sn-Verbb. können je nach ihrer Art u. dem Orte der Applikation sehr giftig wirken. Bei der Darst. des Lötwassers ist es die HCl, die neben dem SnH₄ zur Wrkg. kommt. Bei der Einw. organ. Säuren in Konserven auf schmelzbare verzinnte Dosen entstehen unstreitig riechende u. schmeckende Sn-Verbb., die nicht wohl SnH₄ enthalten können, der aber in den kleinen Mengen schwer nachweisbar ist u. der, da er nicht sehr flüchtig ist, längere Zeit in den Konserven gel. bleiben kann. Die verhältnismäßig geringen Vergiftungserscheinungen durch Konserven, die unter Umständen auf SnH₄ zurückzuführen sind, können durch Tierverss. schwer festgestellt werden, sondern nur durch Verss. an Menschen. (Münch. med. Wehschr. 71. 1648. 1924. Darmstadt.) FRANZ

Yonosuke Fujimaki, *Über die Wirkung von Cyankali und Kupfer* auf das isolierte Froschherz*. Die individuelle Empfindlichkeit des isolierten Froschherzens gegen KCN schwankt in ziemlich weiten Grenzen. Die schwächsten Konz. erlangsamen die Tätigkeit des Herzens u. zwar durch Erregung der vagalen Endp. Die mittlere beschleunigen unter gleichzeitigem Anstieg der Hubhöhen, wohl in Erscheinung einer Erregung, da es nicht gelang, eine antagonist. Wrkg. gegen Chlf. der Chloralhydrat nachzuweisen. Hohe Konz. lähmen das Herz. CuCl₂ wirkt auf sämtliche Funktionen des Herzens allgemein lähmend. In erster Linie werden die nervösen Gebilde des Oberherzens von der Schädigung betroffen. (Arch. f. exp. Pathol. u. Pharmak. 104. 73—81. 1924. Heidelberg, Pharmakol. Inst.) WOLFF

Wilhelm Wankel, *Epithelkörperchen und Guanidinvergiftung*. Die Guanidinvergiftung steht in nächster Beziehung zur Tetanie. Parathyreoidinextrakt übt keinen Einfluß auf die mit Dimethylguanidin vergifteten Tiere aus, was mit der Wirkungslosigkeit von Epithelkörperchensubstanz bzw. Parathyreoidin bei Tetanie parathyreopriva in Übereinstimmung steht. Die Exstirpation von nur 1 Epithelkörperchen bei Katzen übt keinen sicheren Einfluß auf die Guanidinvergiftung aus, bei Entfernung aller 4 Epithelkörperchen tritt dagegen schärfste Überempfindlichkeit ein, die Tiere gingen unter schwersten Erscheinungen in kürzester Zeit zugrunde. Die Überempfindlichkeit wurde nicht durch die Operation oder Narkose, auch

ist durch die Herausnahme der mit entfernten Schilddrüse hervorgerufen, aus-
 laggebend für die charakterist. Überempfindlichkeit für Guanidine ist die Ent-
 fernung der Epithelkörperchen. (Dtsch. tierärztl. Wchschr. 32. 729—32. 1924.
 Wiesbaden, Städt. Krankenh.)

FRANK.

S. de Boer, *Die Wirkung von Strychnin auf das Rückenmark*. Verss. am
 Frosch. Das vollständige Bild der Strychninvergiftung kommt zustande, ohne daß
 sich die motor. Vorderhornzellen vergiftet sind. Wenn bei einer leichten
 Strychninvergiftung nach einem Reize der Strychnintetanus auftritt, stellt sich nach
 kurzer Wiederholung dieses Reizes der n. reflektor. koordinierte Effekt ein. Nach
 einer Ruhepause tritt dann wieder der nicht koordinierte Strychnintetanus auf.
 Bei starker Strychninvergiftung trat diese Ermüdungserscheinung niemals ein,
 bei leichter Strychninvergiftung ergab Reizung der Haut homolateral einen
 Streckeffekt u. an dem heterolateralen Hinterfuß einen Beugeeffekt. Strychnin ver-
 giftet nicht ausschließlich die Ganglienzellen. (Arch. f. exp. Pathol. u. Pharmak.
 10. 265—71. 1924. Amsterdam, Univ.)

WOLFF.

E. A. Ruddiman und C. F. Lanwermyer, *Giftigkeit von Chinin-Aspirin-*
Mischungen. Mischungen von Aspirin mit Chininsulfat oder Chinindisulfat ver-
 ändern ihr Aussehen innerhalb 6 Monaten nicht sehr; eine Mischung von Aspirin
 mit Chininbase verändert sich in dieser Zeit erheblich stärker. Aspirin scheint
 die Giftigkeit des Chinins ein wenig zu vergrößern. Alte Mischungen von Chinin
 und Aspirin, die sich in eine braunrote M. umgewandelt haben, waren nicht giftiger
 als eine frische Mischung. — Die Verss. sind noch nicht genügend, da sie mit
 Froschen (Fröschen) angestellt wurden. (Journ. Amer. Pharm. Assoc. 13. 1009
 1924.)

DIETZE.

A. Fröhlich und A. Solé, *Der Einfluß von Säuren und Alkalien auf die*
Wirkung einiger Krampfgifte. An Ratten wird die Strychninwrkg. durch Milch-
 säureinjektionen geschwächt. NaClO_4 verursacht Reflexübererregbarkeit; diese Wrkg.
 wird durch Säure geschwächt, durch Na_2CO_3 wieder hergestellt. Die der Wrkg.
 von NaClO_4 sehr ähnliche NaCNS -Wrkg. wird durch Na_2CO_3 verstärkt, die *Chloral-*
hydrat-Wrkg. durch Na_2CO_3 geschwächt. Am Frosch schwächt bzw. behebt Säure-
 die Wrkg. überschwelliger Krampfgift Dosen von Strychninnitrat, *Thebain-*
et, *Pikrotoxin*; diese Wrkg. ist durch Alkali wieder zu beseitigen. Alkali
 verstärkt die Wrkg. überschwelliger Dosen von Krampfgiftalkaloidsalzen, während
 bei der Wrkg. chem. anders konfigurierter Krampfgifte (Pikrotoxin) ohne Einfluß
 von Alkali macht unterschwellige Dosen der Krampfgiftsalze überschwellig.
 Die Wrkg. verhalten sich hierin analog den Krampfgiftalkaloiden. (Arch. f. exp.
 Pathol. u. Pharmak. 104. 32—55. 1924. Wien, Univ.)

WOLFF.

Bernard E. Read, *Die Giftigkeit von Chaulmoograöl (Oleum hydnocarp)*. Die
 Wirkung des Chaulmoograöls zeigt sich bei Verss. an Hunden zuerst in Anorexie,
 Erbrechen u. Erbrechen. Der Charakter der Brechwrkg. ist vermutlich der eines
 Reizmittels wie auch der eines zentralen Erregungsmittels. Die zentrale
 Wirkung ist ausgesprochener u. tritt ohne Rücksicht auf den Zufuhrweg ein. Sicher
 besteht eine zentrale Kumulation, die dann nach mehreren therapeut. Dosen Er-
 brechen u. Anorexie hervorruft. Die Brech- u. die anderen tox. Wirkg. des Öls
 sind auch nach Äthylhydnocarpat auf. Unter Berücksichtigung ihrer Löslichkeit
 ist Hydnocarpsäure als Glycerid, Äthylester oder Salz wahrscheinlich der wirk-
 same Bestandteil von Chaulmoograpräparaten. Tox. Dosen der Hydnocarpate ver-
 ursachen Hämolyse, Nierenreizung mit Hämoglobinurie u. Fettinfiltration der Leber.
 Bei subcutaner u. intravenöser Injektion tritt lokale Reizung auf, die oft zu Gewebs-
 nekrose führt. Intravenös einem Hunde zugeführtes Hydnocarpat ruft einen deut-
 lichen Anstieg des Lymphstromes hervor. Die mittlere letale Dosis für Kaninchen
 beträgt 5 ccm/kg oral, von Äthylhydnocarpat intravenös 0,5 ccm/kg. Tödliche Dosen

des Öls verursachen bei Kaninchen eine Überempfindlichkeit mit Senkung des Blutcalciumspiegels u. ungeordneten Bewegungen, die dann von strychninartigen Konvulsionen abgelöst werden; Tod durch Atemstillstand. Der lokale Lungeneffekt ist weniger wichtig als der akt. zentrale mit Erregung u. nachfolgender Lähmung verbunden mit Blindheit u. Taubheit u. Verlust der Herrschaft über die motor. Nerven. Nach intravenöser Injektion von Äthylhydnocarpat tritt oft Temperaturanstieg auf, vor dem Tode Temperaturabfall. Zufuhr therapeut. Dosen der Hydnocarpatate an Hunde unterstützt das Wohlbefinden, ersichtlich an den Allgemeinerscheinungen u. am Körpergewicht, verursacht aber bei Kaninchen unter reiner Haferdiät starke tox. Wrkgg. mit Anorexie, Albuminurie, Gewichtsverlust u. unter Umständen Tod. (Journ. Pharm. and Exp. Therapeutics 24. 221—58. 1924. Peking Union Med. Coll.) WOLFF

F. Pharmazie. Desinfektion.

Alan H. Ware, *Pflanzenfarbstoffe und Chromogene in Beziehung zur Pharmakognosie*. (Vgl. Pharmaceutical Journ. 113. 257; C. 1924. II. 2597.) Es werden weitere Mitteilungen u. Prüfungen auf Anthoxanthine, Anthocyanine, Tannine, über die Anwendungsverf. gebracht. (Pharmaceutical Journ. 113. 530—32. 1924. Exeter, Univers. College.) DIETZ

Menta Mrázek-Fiala, *Insektentropenpflanzen*. Angaben über Kultur u. Verarbeitung von *Chrysanthemum cinerariifolium*. Sie sind übertragbar auf *C. Marshallii*, das leichter zu kultivieren ist, aber weniger aromatisch. Blüten liefern. (Mitteilung. d. Komitees z. staatl. Förder. d. Kult. v. Arzneipflanzen in Österreich. Nr. 56. 1—3. 1924. Sep.) SPIEGEL

Joseph S. Hepburn und Robert H. Stroh, *Ein Beitrag zur Chemie des Alkatan*. In Costa-Rica sind 3 Pflanzenarten als „Alcotán“ bekannt: *Piper acuminatissimum*, *Piper medium* u. *Baccharis trinervis*. Bei den Engländern wird die erste Pflanze, *Piper acuminatissimum*, Alkatan genannt; die Tinktur der getrockneten Blätter wird mit Erfolg gegen Diabetes mellitus angewendet. Die Alkatanblätter enthalten (%): 5,25 W., 94,75 Trockengehalt, 7,82 rohes Protein, 4,5 Ä.-Extrakt, 23,24 Rohfaser, 6,49 reduzierende Zucker als Dextrose, 43,02 andere N-freie Stoffe, 9,68 Gesamtasche, 7,29 unl. u. 2,39 wasserl. Asche. Alkaloide sind nicht vorhanden, wohl aber ein Oleoresin u. ein Saponin. Bestimmte Schlüsse auf Ggw. oder Bwesenheit von wachstumsbefördernden Vitaminen können nicht gezogen werden. (Amer. Journ. Pharm. 96. 804—9. 1924. Philadelphia, HAHNEMANN Med. Coll.) DIETZ

Lorenzo Banti, *Über ein Extraktions- und Reinigungsverfahren von Insulin*. Extraktion von Rinder- oder Pferdepankreas mit A., Konz. bei niedriger Temp. Eiweißfällung mit A. oder $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$. Insulinausfällung mit 92—95% ig. A. u. A. zu gleichen Teilen. — Dieses rohe Prod. kann schon beim Menschen ohne Nebenwirkungen gebraucht werden. — Weitere Reinigung mit Pikrinsäure oder Berylsäure. (Arch. Farmacologia speriment. 38. 176—77. Argentinien.) MÜLLE

Ludwig Kroeber, *Drogen und Fluidextrakte unter dem Gesichtswinkel des Normungsgedankens*. Vf. bringt seine Wünsche bzgl. der an Drogen u. Fluidextrakte zu stellenden Forderungen zum Ausdruck. (Pharm. Ztg. 69. 1213—14. 1924. München-Schwabing.) DIETZ

H. Schlee und W. Thiessenhusen, *Physikalisch-chemische Studien an mikroskopischen Silberpräparaten*. Außer der Konz. der Ag-Ionen (vgl. Biochem. Ztschr. 151. 27; C. 1924. II. 2352) wurde an den dort genannten Ag-Präparaten u. Protargol auch die elektr. Leitfähigkeit u. Anzahl u. Größe der kolloidalen Teilchen in den Lsgg. ermittelt. Die gleichen Bestst. u. diejenige des Bodenkörpers wurden ferner an 17 Monate altem Protargol, sowie an 9—10½ Monate alten Lsgg. der anderen

parate angestellt, um die „Alterungserscheinungen“ (vgl. PAUL, Ztschr. f. angew. Ch. 36. 347; C. 1923. IV. 994) festzustellen. In gleicher Weise wurden nach dem Verf. von BREDIG hergestellte, von Schutzstoffen freie Ag-Hydrosolen untersucht. Die spezif. Leitfähigkeit hat in wss. Lsgg. der verschiedenen Präparate gleichen Konz. annähernd gleichen Wert, der mit zunehmender Konz. annähernd proportional dem Ag-Gehalte steigt. Unter Berücksichtigung der elektrometrischen Konzentration des Ag-Ions läßt sich durch Best. der Leitfähigkeit die Ggw. der Elektrolyten, die keine Ag-Ionen abspalten, u. in gewissen Grenzen ihre Menge ermitteln. — Die Zahl der kolloiden Teilchen ist im allgemeinen proportional dem Ag-Gehalte an Ag, in 1 cem der 1%ig. Lsgg. schwankend von 1×10^9 bis 76×10^9 . Die Teilchengröße bewegt sich bei den meisten Präparaten zwischen 21 u. 27 $\mu\mu$, aufserordentlich groß, 59 $\mu\mu$, war sie bei *Solargyl*. — Bei den gealterten Lsgg. war stets ein körniger Niederschlag abgeschieden, dessen Menge mit dem Gehalte der Lsgg. an Präparat um u. mit der Verringerung des Ag-Gehaltes der Lsg. einherging. Die $[Ag^+]$ ist im allgemeinen abgenommen, nur in konz. Lsgg. von *Dispargen* u. *Solargyl*, sowie in allen Verdünnungen von *Kollargol* erheblich zugenommen; die elektr. Leitfähigkeit mehr oder weniger stark zugenommen, die Anzahl der kolloiden Teilchen abgenommen; die Teilchengröße war nahezu gleich geblieben bei *Kollargol*, *Dispargin* u. *Dispargen*, etwas vermehrt bei *Jodkollargol*, *Protargol* u. *Solargyl*. Die Best. der $[Ag^+]$ gibt somit Anhaltspunkte zum Nachweis der Alterungserscheinungen eines Ag-Präparates. — Bei den Hydrosolen nach BREDIG zeigte sich, daß die beim elektr. Zerstäuben in Lsg. gegangene Ag-Menge mit der Zerstäubungszeit vermehrt, aber nicht immer proportional. Gleiches gilt für die $[Ag^+]$ (nur in verd. NaOH-Lsg. hergestellten Solen mit wachsender Zerstäubungszeit und tendierend abnehmend), für die spezif. Leitfähigkeit u. die Teilchenzahl; die Teilchengröße war in fast allen mit reinem W. hergestellten Solen um 20 $\mu\mu$ herum, in alkal. Medium gewonnenen 29–40 $\mu\mu$; wegen der verhältnismäßig hohen Ag-Konz. durchschnittlich $1-10^{-1}$ mg-Ion in 1 l, wird vermutet, daß Ag beim Zerstäuben nicht als Metall, sondern in Form von Ag-Verbb. kolloid in Lsg. geht. Die Hydrosolen sind nur kurze Zeit haltbar, flocken bei Aufbewahrung mehr oder weniger stark aus, worauf auch die in der Luft vorhandene CO_2 Einfl. zu üben scheint. (Ztschr. f. angew. Ch. 37. 837–45. 855–60. München, Univ.) SPIEGEL.

K. Seiler, Ist es dem Apotheker möglich, Originalaspirin und Pyramidon von Fälschungen zu unterscheiden? *Aspirin*. Ein F. unter 135° konnte bei den untersuchten Originalaspirinen festgestellt werden, doch ist dieser F. nicht beweisend für die Echtheit; auch Acetylsalicylsäure hatte diesen oder nur wenig darunter liegenden F. Das mkr. Bild zeigt entscheidende Merkmale. Aspirin besteht aus wohl ausgebildeten körperlchen, derben, glasklaren Kristallen mit abgeschliffenen Ecken; Bruchstücke nur vereinzelt vorhanden. Charakterist. sind Krystallaggregate. — *Pyramidon*. Originalprod. zeigt sehr schön ausgebildete Krystallaggregate; einzelne Krystalle sind seltener, Bruchstücke fehlen ganz. Billigere „Reparationsware“ dagegen dürfte vom Dimethylamidoantipyrin des Handels kaum zu unterscheiden sein. (Schweiz. Apoth.-Ztg. 62. 741–46. Bern.)

DIETZE.

F. Mentzel, Neue Arzneimittel, Spezialitäten und Vorschriften. Antidiarrhöetika. — Extr. Condurango, — Chinae, Tannin. albumin., Bolus alba, gegen Durchfall. — *Bimulzin*, Brand- u. Wundsalbe mit Bism. tribromphenyl. — *Bronchialtabletten*, Rad. Alth., Ol. Anisi, Menthol u. Zucker; Hustenmittel. — *Citrominztropfen*, Acid. citr., Formaldehyd, Ol. Menth., — Citri, Rachenschutztabletten. — *Chin-Tabletten*, Extr. Condurango, — Chinae, Bism. subnit., -subgall., Tannin. albumin., kein Opium; gegen Durchfall. — *Creme Aida*, Bism. subnit., — Kal. chloric., -carbon.; gegen Sommersprossen. — *Merzain*, Ampullen

mit Novocain u. Suprarenin Höchst. — *Rheumulzin*, Rheumatismussalbe, A. salic., Menthol, Ol. Tereb. — *Schnupfenschutz*, Acid. amidobenz.-äthyl., Ment Ac. bor. in wasserl. Salbe. — *Ugalumin-Tabletten* zu Wurmkurten, Phenolphthal., Chinosol, Alumin. acet. bas., Rad. Liquirit. (Sämtliche Spezialitäten von MERZ & Co., Frankfurt a. M.)

Caedoverm (Efeka-Neopharm. A. G., Hannover), Tabletten u. Zäpfchen gegen Würmer. — *Dermolent*, Unterlage für Salben, die in die Tiefe wirken sollen. — *Ergobel* (Efeka-Neopharm. A. G., Hannover), Tabletten gegen Prostrata- u. Blasen-erkrankungen. — *Ovarian* (Laboschin), ein mit Milzeisen versetztes Ovarienpräparat. — *Phillogen* (Sicco), Chlorophyll mit einem Mineralsalze u. Fe-Verbb. enthaltenen Nährextrakt. — *Sodisan-Tee-Tabletten* (Lab. GALEN, Berlin W 30), Pflanzen-teile, ei-Sodbrennen. — *Stilla-Ampullen* (Ap. Dr. GROSS-FLIGELY, Wien IX), Alypin, Aomorphin, Atoxyl, Cocain, Collargol, Heroin, Pantopon usw. — *Transpirintabletten* (Ap. A. Löw, Wien III), Trimethylglykokollacetylosalhydrochlorid, bei Gripp u. Migräne.

Anästan-Syngala, Anästhesin-Ersatz, p-Aminobenzoessäureäthylester. — *Al-nopin* (Pharmazeutika A.-G., Wien-Graz), Latschenkiefer- u. andere äth. Öle. — *Sambulin*, Creme gegen Sonnenbrand u. Insektenstiche, aus Flor. Sambuc u. Glycerinhoniggelee. — *Sagukol*, salbenförmige A.-Seife. — *Siroop Acard*, 10 Sir., 5 Chloralhydrat, 0,1 Extr. Cann. ind., 0,05 Extr. Hyoseyam., 100 Sir. Auran-*Tabloids tonic compound* (Burroughs, Wellcome & Co., London), 0,12 g Irr. pyrophosphoric., 0,06 g Chinin. bisulf., 0,00006 g Strychn. sulf. — *Taxol* (LEGR. D. Paris), Abfuhrmittel. — *Tribérane*, 20 Teile Fol. Senn., 10 Teile Rad. Liquit. 10 Teile Sulfur praec., 70 Teile Sacch., 0,02 g Vanillin, Abfuhrpulver. — *Tridigcin* (DALLOZ), gleiche Teile Pepsin, Diastase, Pankreatin, mit Zucker granuliert. — *Tritonin*, Na-Glycerophosphat, Kola, Kokablätter, Zucker, granuliert. — *Unquenet antihaemorrhoidale*, 0,25 g Stovain, 50 g Adrenalinhydrochlorid (1:1000), 0,3 g Extr. Bellad., 0,75 g Orthoform, 25 g Ungt. Lanolin. — *Valeral Puy*, 0,11 g NBr 0,14 g Na-Valerianat in Kapseln u. in Fl. — *Valeronal Genevri*, Fl. aus Extr. Valer. fl. u. Veronal. — *Vanadarsine Guillaumin*, V-Arsenat in Ampullen. — *Vanadine du Dr. CHEVRIER*, ein nicht giftiges N-Tetraoxydsalz. — *Végétaline Davis*, Phenolphthalein u. Pflanzenteile, Abfuhrtabletten. — *Vin Bravais*, Extr. Col. fl. 10 Extr. Coc. fl. 5, je 0,5 g Coffein, Theobromin, Na-Benzoat, Vanillin u. in xerens. ad 1000. — *Vin de Lavaix*, je 10 Extr. Chin., Extr. Carnis, Ca-Biphosphat 30 Glycerin, 100 Sir. simpl. u. Vin. rubr. ad 1000. — *Vin de Robiquet*, Cnarindenbestandteile u. Fe-Pyrophosphat. — *Vin du Dr. Legendre*, in 11:2 g Ca-Glycerophosphat, je 5 g Extr. Colae fl. u. Coc. fl. — *Viscalbin* (ROUSSEL, Frib.) aus Viscum album bereitet.

Chenopodiol (G. POHL & J. LEHMANN, Berlin NW. 87). Goloduratkapseln mit Ol. Chenopodii. — *Diapul* (HELL, Troppau), Diachylonstreupuder. — *Iscu* (W. KIESSLING, Dresden-A.), Wurm-schokolade mit Santoperonin. — *Ovonvin* Germ. STUMPF & SÖHNE, (Wien), Lecithinpräparat aus Eidotter. — 309, synthet. Harnstoff aus saurem m-Aminobenzoyl-m-amino-p-methylbenzoyl-l-naphthylano 5-6-8-sulfosaurem Na, unl. in A., l. in H₂O. — *Rheoferrat* (DEGEN & KUTH, Den) Rhabarber-Eisenverb. u. geschmacksverbessernde Stoffe, mildes Laxans.

Ceemalt (PFEFFERMANN & Co., Berlin NW 26), Kalk-Malzextraktpräparat. — *Chromonal*, Kakaoabfall (Schalen), Maisgriß, Lecithineiweiß, Talkum, Zucker. Spuren Cr (1 mg K₂CrO₄ in 1 g). — *Menstruationspillen Stohal*, aus teilweise ver-kohltem Torf. (Pharm. Zentralhalle 65. 597. 661—62. 683—84. 714—17. 1924). 118

—, *Spezialitäten und Geheimmittel*. *Buccosan* (Laboschin A.-G.), stark diuretisch wirkende u. SiO₂ enthaltende Drogen, mit Na-Benzoat u. (CH₂)₆N₄ getränkt. — *Buccotropin* (Laboschin A.-G.), Buccobitter gegen Nieren- u. Blasenleiden.

kt, Na-Salicylat, $(\text{CH}_2)_6\text{N}_4$, Na-Benzoeat, Bromcampher, Papaverin u. äth. Öle
 abletten, bei entzündlichen Vorgängen im Urogenitalapp. — *Cholagogatabletten*
 (CKERT, MICHALOWSKY & BAYER A.-G., Berlin-Neukölln), organ. Hg-Salze,
 phyllin, Gewürze, in 3 Stärken, gegen Gallensteinerkrankungen. — *Derma-*
o (HUGO ROSENBERG, Freiberg i. Br.), haltbares Eiweiß-Emulsionsgemisch zur
 iherapie perkutan. — *Eudralin* (Saccharinfabrik A.-G.), Adrenalin + Folicain
 idobenzoyldiäthylaminoäthenol), in 1 u. 5%ig. Lsg. in Ampullen u. in Tab-
 t. — *Gingivadentol* (Fränk. Handelsgesellsch. m. b. H., Würzburg), Emulsio
 yae oleosa cum Thymol, zur Massage des Zahnfleischs. — *Novacetofom Kalle*
 E & Co. A.-G., Biebrich), Liquor Al. acetici in fester Form; auch als Bolus-
 r 1,5 u. 2,5% u. als Salbe (2%ig) im Handel. — *Olyptol* (Laboschin A.-G.),
 cin, Eucalyptol, Ol. Tereb. rect. u. Olivar., bei Ischias, Rheumatismus usw.
 inspritzungen. — *Orgaferrin-Ovarian* (Laboschin A.-G.), Milzeisen u. Be-
 uile der Ovarien, bei Anämie, Chlorose usw. — *Petmuhr-Hämorrhoidensalbe*
ipfchen, (Petmuhr-Vertrieb, M.-Gladbach) sollen in den ältesten Fällen
 n. — *Staphimun* (GROMBACHER & Co., Offenburg i. Baden), zur perkutanen
 eldung der Furunkulose. — *Teramanitol* (C. F. WEBER A.-G., Leipzig-Plagwitz),
 ektions- u. Viehwaschmittel. — *Vitalipon* (VITALIPON, Freiburg i. Br.), Lipoid-
 ain für die Parenteraltherapie, gegen Avitaminosen, Zuckerkrankheit usw. in
 nillen. (Apoth.-Ztg. **39**. 1456—57. 1924.)

DIETZE.

-, Pharmazentische und andere Spezialitäten. *Biox Ultra* (MAX ELB, Dresden),
 aureinigungsmittel mit O_2 . — *Cordical* (SIMON, Berlin), Fol. Digit. pulv. 0,025 g u.
 lact. 0,2 g in Tabletten. — *Daroliko-Bad* (Dr. OSK. LECHER, Kottbus), Fichten-
 extrakt mit äth. Ölen u. organ. Verbb. — *Dermosot-Stroschein*, Salicylsäure, deren
 t Terpene u. lipoidl. S, Rheumatismussalbe. — *Indigosol* (Badische, Lever-
 n u. Hoechst), fast farbloses Färbemittel für techn. Zwecke. — *Neroferrin*
 eworke, Meschede), Fe-haltiges Kräftigungsmittel. — *Nerosap*, gegen Kopf-
 s. — *Neros Rheumaöl*. — *Nerothymin*, gegen Asthma usw. — *Oxydan* (ERW.
 Plötzensee), Fichtennadel- O_2 -Bad. — *Puksana-Wurmkur*, Ol. Chenopodii u.
 i. — *Weinbrand-Naturel* (Gebr. ADLER-SCHOTT, Frankfurt a. M.), zuckerfrei,
 iedizin. Zwecke. (Pharm. Ztg. **69**. 1095—96. 1924.)

DIETZE.

-, *Neue Heilmittel. Die blaue Spritze* (von Dr. MÜHLEBEIN in Reichen-Baden),
 ritlich mit Methylenblau gefärbte Lsg., sonstige Zus. nicht bekannt, soll gegen
 rheit, Gallenblasenentzündung, Epilepsie, Asthma, Magengeschwüre, Gicht usw.
 lf. — *Württembergisches Juraschieferöl* aus Schieferton, in dem eine Posidonia-
 rkommt; 50% gesätt. u. 50% ungesätt. KW-stoffe mit ca. 0,5% Pyridinbasen,
 0 Phenolkörpern u. 3,5% S, in W. nicht l., Ersatz für Ichthyol gegen Psoriasis
 w — *Thiamon* (Alpine Chem. A.-G.), genügt den Anforderungen des D. A. B.
 amon. sulfoichthyol., l. in W. — *Zitrodoron Kola* (Desitin-A.-G., Berlin-Tempel-
 f), Verb. der Pyrazolonderiv. mit Citronensäure, als schmerzstillendes Mittel.
 tsch. Apoth.-Ztg. **64**. 522—23. 532—33. 1924.)

DIETZE.

-. *Cany*, *Analyse der Pomade von Helmerich*. Die gegen Psoriasis benutzte
 nde, nach Vorschrift des französ. Arzneibuchs hergestellt, soll in 100 g 16,66 g S,
 8 K_2CO_3 , 8,33 g W. u. 66,66 g Fette enthalten. Die Best. von S, Fett u. K_2CO_3 ,
 f eine Vorschrift gegeben wird, läßt die richtige Zus. kontrollieren. (Journ.
 an. et Chim. [7] **30**. 358—60. 1924. Paris, Fac. de Pharm.)

SPIEGEL.

rnst Schifftan, *Kosmetische Creams, Pomaden und Schminken*. Allgemeine
 eicht über die für gute Erzeugnisse notwendigen techn. Maßnahmen. (Seifen-
 d.-Ztg. **51**. 879—880. 1924. Charlottenburg.)

HELLER.

Kulikow, *Desinfektion mit Blausäure*. Im großen Maßstabe (Desinfektion
 hrer Eisenbahnwagen) durchgeführte Verss. zeigten, daß die tödliche Konz.
 a HCN für Läuse 1—2 mg/l beträgt. Ein Schädling von Kleidungsstücken,

Anobium paniceum, stirbt bei 0,5 mg HCN/l aus. Die Mottenlarven sterben Laboratoriumsverss. bei der Konz. von 0,5 mg HCN/l Luft, in der Praxis bei ca. 5 mg. Leder, Pelze usw. sind gegen HCN unempfindlich. Die insektentötende Wrkg. HCN nimmt mit steigender Temp. (0—40°) rasch zu, was wahrscheinlich auf erhöhten Atmungstätigkeit der Insekten beruht. HCN wird an Ort u. Stelle NaCN durch H_2SO_4 entwickelt. (Transact. Inst. Pure Chem. Reagents 1924. Nr. 19—33. [Russ.] Sep.)

BIKERMAN

J. Frère, *Eine neue Form des aktiven Chlors, Aktivin, ein Bleichungs-Desinfektionsmittel aus Nebenprodukten der Saccharinfabrikation*. Vf. behandelt chem. u. physiolog. Eigenschaften der Na-Verb. des *p*-Toluolsulfochloramids (*Chloramin T*), seine Darst., seine bleichende u. desinfizierende Wrkg., seine Verwendung zum Lösen von Stärke, die Verwendung des *p*-Toluolsulfonylamidcalciums als Mittel zum Vernichten von Unkraut u. das Desinfektionsmittel Na-Salz der Dichloramidobenzoesäure [BEYER]. (Rev. des produits chim. 27. 721—24. 1924.) JUN

Pierre Breteau, *Die Sterilisation in der Hitze verändert die physiologischen Eigenschaften gewisser Arzneimittel*. Viele Arzneimittel, wie Morphin, Cocain, Novocain-Adrenalin, verändern ihre physiolog. Wirksamkeit beim Sterilisieren in der Lsgg. in der Wärme. Man kann, nach Vf., unter Verwendung von reinem Wasser, dem man 1—3% Benzoessäure zusetzt, unter Beobachtung der beschriebenen Technik (Ampullen sind mit HCl gewaschen, bei 150° trocken sterilisiert, das Befüllen erfolgt in N, vor Luftzutritt geschützt; auf 1000 ccm Lsg. setzt man 20 bis 30 Tropfen Na-Bisulfatlsg. usw.) ohne Erhitzen sterile Lsgg. erhalten, bei denen die physiolog. Eigenschaften der Alkaloide unverändert geblieben sind, so daß auch mit geringeren Alkaloidmengen auskommt. Die Lsgg. verlieren ihre Wrkg. nicht beim Altern. (Journ. Pharm. et Chim. [7] 30. 297—303. 1924.) DIETZ

Baikichi Arima, Kitahama, Osaka, Japan, *Herstellung eines Tuberkuloseimmun- und heilserums*. Das in lebenden Tuberkelbacillenleibern enthaltene gesamte Fett u. die Lipidstoffe werden vollständig mit Hilfe von Saponin u. Lipase entfernt, und die Bacillen selbst abzutöten oder deren Eiweißgehalt zu schädigen. — Z. B. werden schwach virulente Tuberkelbacillen 6 Wochen bis 4 Monate in einem von Albumin freien, schwach sauren oder neutralen fl. Kulturmedium, enthaltend Na-Phosphat, K-Phosphat, Mg-Citrat, glutaminsaures Na u. Glycerin oder Glucose, sowie neutrale Saponin, gezüchtet. Durch Zusatz von reinem Agar zu der Fl. läßt sich auch ein festes Kulturmedium erzeugen. Es werden so nahezu fett- u. lipoidfreie Bacillen gewonnen, die nach Entnahme aus dem Kulturmedium mit einer 0,05—5%igen Lipase lsg. versetzt u. unter zeitweisem Schütteln 48 Stdn. bei ca. 35° stehen gelassen werden; hierbei erfolgt eine Zers. des in Saponin unl. Fettes. Die so erhaltenen nicht mehr säure- u. A.-festen Bacillen werden schließlich mit physiolog. NaCl-Lsg. durchwaschen u. zentrifugiert. Die Emulsionen sollen im Gegensatz zu den fetthaltigen u. Lipode enthaltenden Tuberkulinpräparaten eine vollständigere Immunität u. eine schnellere Heilung der tuberkulösen Patienten bewirken. (E. P. 207596 vom 3/8 1922, ausg. 27/12. 1923.)

SCHOTTLÄNDT

Jinshichi Kato, Kyoto, Japan, *Herstellung eines Mittels gegen Hämorrhoiden*. Chem. reines metall. Mg wird zu einem feinen Pulver vermahlen u. durch ein feines Haarsieb durchgeseiht. Das feine Pulver wird mit wenig Glycerin angeriebt, das Gemisch durch Kühlung mit W. dauernd unterhalb 30° gehalten u. unter gründlichem Rühren desselben mit Hilfe von 2 Pt-Drahtelektroden ein elektr. Strom von 2 Amp., 40 Volt hindurchgeleitet, wobei eine kolloidale Mg-Lsg. entsteht. An Stelle von Glycerin kann man auch Olivenöl oder fl. Paraffin verwenden. Die kolloidale Mg-Lsg. wird unter Kühlung in einer H_2 - oder N_2 -Atmosphäre aufbewahrt, wobei durch Zerss. u. B. von unreinem, C u. andere Verunreinigungen enthaltendem Mg-

ermieden wird. Zum Gebrauch werden einige Tropfen der Lsg. in die Mitte hämorrhoidalknotens injiziert. (E. P. 202743 vom 26/5. 1922, ausg. 20/9.

SCHOTTLÄNDER.

ucien Joseph Eugène Étienne Momy, Algier, *Kosmetisches Mittel*, bestehend aus gleichen Teilen NH_3 u. Rosenwasser, denen Spuren eines Farbstoffes, Eosin, zugesetzt sein können. — Das Prod. dient zum Härten u. Polieren der Nägel u. beseitigt die die Nägel überwuchernden Hautteile. (F. P. 559616 vom 12. 1922, ausg. 19/9. 1923. Tunis. Prior. 7/11. 1922.)

SCHOTTLÄNDER.

Louis Bonte und Jeanne Bonte, Lille, Frankreich, *Herstellung eines flüssigen desinfizierenden insekticiden Mittels*. Pflanzen der Gattung rutacea u. sinaruba, z. B. quassia amara u. quassia sinaruba werden zerkleinert u. in der Kälte mit 70% alkoh. Na_2CO_3 erschöpfend extrahiert, der Auszug abgepreßt, mit gelbem Alaun geklärt u. 24 Stdn. stehen gelassen, hierauf bis auf $\frac{1}{3}$ seines Vol. im Vakuum eingedampft, nach dem Erkalten filtriert u. mit wss. A. verd. Die Lösung bedarf mit einem Riechstoff versetzte, das bittere Prinzip der genannten Pflanzen enthaltende Fl. findet zur Abtötung von Parasiten u. schädlichen Insekten, z. B. Menschen, Tieren u. Pflanzen Verwendung. Man trägt sie mit Pinsel, Bürste oder Verstäuber auf die zu behandelnden Teile auf. (F. P. 555926 vom 19/8. 1922, ausg. 9/7. 1923.)

SCHOTTLÄNDER.

Bohlyt Aktiengesellschaft, Berlin, *Herstellung von Desinfektionsmitteln*. Die pflanzliche Gerbextrakte werden mit Halogenen oder diese entwickelnden Salzen u. hierauf gegebenenfalls mit Oxydationsmitteln behandelt. — Z. B. gibt Gerbextrakt bei der Einw. von Cl_2 einen gelben Nd., der nach Entfernung der Fäulnisgerüche stark desinfizierende Wrkg. aufweist, die sich durch Nachbehandeln mit Oxydationsmitteln wie HClO_3 , noch steigern läßt. Zweckmäßig wird die Chlorierung so geleitet, daß der Cl-Gehalt des Prod. mindestens 10% beträgt. Die Prodd. erhält man durch Halogenieren von Quebrachoextrakt. Lsgg. der Prodd. zeigen in einer Verd. von $\frac{1}{100}$ oder $\frac{1}{1000}$ die gleiche desinfizierende Wrkg. wie Phenol, die jedoch bei den Cl-Derivv. noch länger anhält. Die geruchlosen Prodd. eignen sich als Beizmittel für Getreide, sowie zur Konservierung von Holz u. pflanzlichen oder tier. Fasern. Ferner können sie mit Salben oder Ölen vermischt oder Verbandstoffen zugesetzt werden. Im Gemisch mit Ton oder anderen Stoffen dienen sie als Wundstreupulver. (E. P. 205827 vom 22/10. 1923, ausg. 12/12. 1923. Prior. 21/10. 1922.)

SCHOTTLÄNDER.

h. Tengler, Tägerwilien, Schweiz, *Desinfektionsmittel*, bestehend aus einem Gemisch von CaO , BaO , PbO , Bleiweiß, MgCO_3 o. dgl., dem Terpentinöl, Eukalyptus-, Salbei- oder Thymianöl, Storax-, Peru- oder Tolubalsam, Phenol, Kreosol oder ein anderes Desinficiens beigemischt ist. (Schwz. P. 105361 vom 9/7. 1923, ausg. 6/7. 1924.)

KÜHLING.

G. Analyse. Laboratorium.

1. Knoop, *Die modernen Temperaturmeßgeräte*. Vf. beschreibt die verschiedenen Pyrometergruppen (Anwendungsbereich, Vor- u. Nachteile, Meßfehler, Verwendungszweck u. Fehlerquellen). (Metall u. Erz 21. 270—72. 1924.) OEHLER.
2. Feußner, *Die modernen Temperaturmeßgeräte*. Es erfolgt Richtigestellung von KNOOPS (vorst. Ref.) gemachter Ausführungen (Widerstandspyrometer, thermoelektr. Pyrometer, opt. Pyrometer der A. E. G.). (Metall u. Erz 21. 553—54. 1924.)

OEHLER.

1. Knoop, *Die modernen Temperaturmeßgeräte*. Vf. nimmt zu den von OEHLER (vorst. Ref.) betreffs Widerstandspyrometer, thermoelektr. Pyrometer u. opt. Pyrometer der A. E. G. gemachten Einwendungen Stellung u. erhält seine Be-

hauptungen bzgl. ihres integrierenden Bestandteils aufrecht. Hierzu äußert FEUSZNER nochmals. (Metall u. Erz 21. 554. 1924.)

A. Schlicht, *Ein Sicherheitsheber*. Der Heber ist dadurch ausgezeichnet, sein Ausflußschenkel von einem verschiebbaren unten geschlossenen, an geeigneter Höhe mit einem Abfluß versehenen Rohre (Hebermantel) umgeben ist. Er läßt sich entweder durch Druck auf die Fl. im Vorratsgefäße oder durch Ansaugen des Abflußrohres des Hebermantels gefüllt werden. (Apoth.-Ztg. 39. 1301. 1924.)

F. Lüdy, *Destillieren ohne „laufendes“ Kühlwasser*. Man stellt, etwas entfernt von dem als Kühlwasserbehälter ein Gefäß auf, das unten eine Öffnung hat, z. B. ein Irrigator, u. leitet von dieser Öffnung her das W. auf den Kühler u. von dort durch einen Schlauch von oben her wieder in den Behälter zurück. Beim Füllen des W. ist dafür zu sorgen, daß keine Luftblasen zurückbleiben. Es empfiehlt sich, event. durch Einlegen von Eisstücken in den Behälter die Kühlung zu vermehren. (Pharm. Zentralhalle 65. 605. 1924.)

W. Twerzyn, *Vereinfachte Methode zur Bestimmung der Dampfdichte*. Wägung. Man bestimmt das Gewicht des Gefäßes mit Luft, mit H_2 u. mit CO_2 u. trägt diese Gewichte auf die Abszisse auf, die DD. oder die Mol.-Gew. auf der Ordinate, legt durch die drei erhaltenen Punkte eine Gerade, bestimmt das Gewicht des Gefäßes mit dem unbekannten Gas u. sucht auf der Geraden die diesem Gas entsprechende Ordinate aus: sie gibt die D. bzw. das Mol.-Gew. des Gases an. (Neftjanoe i slancevoe Chozjajstvo 7. 521—22. 1924. Grosnyi.)

Otto Rothe, *Neue Laboratoriumsmanometer*. Vf. benutzt ein Gasgefäß mit konstantem Quecksilberniveau (durch ein Abflußrohr mit kommunizierendem Gefäß konstant gehalten), in das Barometer u. Manometer nebeneinander eintauchen. Daß nur die Differenz zweier benachbarter Menisken abzulesen ist. Bequem arbeitet man mit einem offenen Manometer, das symmetr. von einem Barometer umgeben ist. Letzteres wird durch eine Schraube so eingestellt, daß das Hg in den beiden offenen Schenkeln auf gleicher Höhe steht: alsdann ist nur die Neigungsdifferenz in den beiden anderen, nebeneinander befindlichen Schenkeln abzulesen. Man kann auch neben ein gewöhnliches Heberbarometer mit Zahntrieb ein enggeformtes Manometer (als Spiegelbild) anbringen, dessen offener Schenkel annähernd meterlänge hat: die Menisken in den beiden offenen Schenkeln werden auf gleiche Höhe gebracht u. die Differenz der beiden anderen, eng nebeneinander angeordneten Niveaus abgelesen. (O Brazil Technico 1. 146—49. Bello Horizonte. 92. Sep.)

Max Singer, *Selbsterstellung eines Thermoregulators*. Die Konstruktion des einfachen elektr. Thermoregulators ergibt sich aus der Skizze im Original. (Gen. Ztg. 48. 925. 1924. Wien.)

W. Manchot, *Verfahren zur Bestimmung der Löslichkeit von Gasen in Flüssigkeiten*. Die Best. der Löslichkeit von Gasen in Salzslgg. erfolgt wie bei OSTWALD durch Absorptionsmessung, doch meidet der vom Vf. beschriebene App. die Unbequemlichkeiten des Ostwaldschen App., denn in jenem läßt sich die Nullstellung unmittelbar ablesen, u. in dem ganzen App. herrscht die gleiche Dampfspannung. Der App. besteht aus einer Gasbürette, die oben einen Dreihahn hat u. auf konstante Temp., der Absorptionstemp., gehalten wird, als therm. dient Hg. Das Niveauröhr hängt an einem Drahtseil, das über ein Rad u. eine Trommel läuft. Mittels eines Präzisionszahnrades ist genaue Einstellung möglich u. das Niveauröhr wird in jeder Stellung von selbst arretiert. Das Scätkgefäß hat die Form einer weithalsigen Pulverflasche u. wird durch einen Spindel mit 2 Bohrungen verschlossen, durch deren eine ein oben u. unten durch angebrachtes verschließbares kugelförmiges Gefäß, dessen Inhalt zwischen den Hähnen beimessen ist, u. das vollständig mit der zu untersuchenden Fl. gefüllt ist, gesteckt ist. Ober-

s. Zweihahngefäß mit einer durch die 2. Bohrung gesteckten Gabel in Verbindung, deren 2. Zinken das mit Gas gefüllte Schüttelgefäß mit der Bürette verbindet. Zur Erreichung des konstanten Dampfdrucks werden vor Einstellung der Gase einige ccm der zu untersuchenden Fl. in das Schüttelgefäß gegeben, das sich in einem Thermostaten befindet. Alle zu benutzenden Kautschukstücke sind vorher zu paraffinieren. Verwendung von Metallröhren aus Pb, Ag u. Cu wird nicht empfohlen. Die Berechnung der Löslichkeit ist einfach. (Ztschr. f. anorg. Chem. 141. 38—44. 1924. München, Techn. Hochsch.) JOSEPHY.

3. Schoorl, *Bemerkungen zu Blombergs „Methode zur Kontrolle von Titrier-
keiten“*. Vf. empfiehlt als Mischmittel nicht K_2SO_4 , sondern Na_2SO_4 (ver-
totes Glaubersalz) als besonders feines Pulver. Von $KHSO_4$ wird ebenfalls
genutzt, statt dessen besser Oxalsäure $C_2H_2O_4 \cdot 2H_2O$ als Titrsubstanz. Von
alk.-Amputen wird abgeraten. (Pharm. Tijdschrift voor Nederlandsch Indie 1.
3. 1924. Utrecht, Univ.)

Elemente und anorganische Verbindungen.

Wilfred W. Scott, *Die volumetrische Bestimmung von Fluor.* Vf. gibt Methoden an: Best. des CaO u. umrechnen auf F (A), Best. des F nach der Ätzmethode (B) u. Best. in Alkalifluoriden (C). A. 1 g der fein gepulverten Substanz wird mit 50 ccm verd. Essigsäure (1 Teil Eg. + 10 Teile W.) unter Erhitzen u. öfterem Umrühren 10–20 Minuten lang ausgezogen. Rückstand auf einem Filter sammeln u. auf 100 ccm Fl. auswaschen. Trocknen, Filter veraschen u. Asche mit Rückstand mischen. Diese Vorbereitung ist nur bei Ggw. von Phosphaten u. Sulfaten nötig. In einem Silbertiegel schmelzt man 5 g Na_2CO_3 mit 10 g KOH, mischt den Rückstand der Essigsäurebehandlung mit 0,5–1 g Sand u. fein SiO_2 , gibt die Mischung auf das Schmelzgut u. erhitzt noch eine Zeitlang unter Bedecken $\frac{3}{4}$ –1 Stde. Mit 200 ccm h. W. in ein 500 ccm-Becherglas geben u. nach Zusatz von 10 ccm H_2O_2 5 Minuten kochen, abfiltrieren u. mit Wasser auswaschen. Rückstand dient zur Weiterbehandlung, das Filtrat wird nach der Methode (B) weiterverarbeitet. Lösen in 200 ccm W. + 20 ccm HCl, neutralisieren mit NH_3 , aufkochen, h. filtrieren u. CaO fällen mit 0,25-n. Na-Oxalatlg.

1) Krystallisation des Ca-Oxalat aufkochen, Nd. abfiltrieren, in einer Mischung
 0 ccm W. + 10 ccm H_2SO_4 lösen u. h. mit 0,25-n. $KMnO_4$ -Lsg. titrieren.
 2) 0,25-n. $KMnO_4$ = 0,005 g Ca u. 0,00474 g F. — B. Alkal. Filtrat von A
 3) eden erhitzen u. F mit 0,25-n. Ca-Acetatlg. ausfällen (5–10 ccm Überschuß).
 4) C. schwach ansäuern u. noch 5 Minuten erhitzen. Lsg. + Nd. in 500 ccm
 5) D. ben überfüllen, auf 18° abkühlen u. auffüllen. Nach dem Absitzen Fl.
 6) E. titrieren u. in aliquotem Teil überschüssigen CaO mit 0,25-n. Na-Oxalatlg. aus-
 7) F. u. wie oben bestimmen. Wenn a = angewandte ccm 0,25-n. Ca-Acetat,
 8) G. m 0,25-n. $KMnO_4$ u. x = Faktor zur Umrechnung des in Arbeit ge-
 9) H. nenen Teils auf die ganze Lsg., so ist $a - xb$ = ccm Ca-Acetat gebunden
 10) I. F. Differenz $\cdot 0,005$ = Ca gebunden an F, oder $\cdot 0,006$ = äquivalente
 11) J. g F. — C. 0,5–1 g Alkalifluorid gel. in 100 ccm h. W., F durch Zusatz von
 12) K. essig-saurer Lsg. 0,25-n. Ca-Acetatlg. fällen, mit Essigsäure ansäuern, Nd. + Lsg.
 13) L. 2) ccm auffüllen, filtrieren u. in aliquotem Teil wie oben den ungebundenen
 14) M. bestimmen. (Ind. and Engin. Chem. 16. 703–7. 1924. Golden [Col.]) GRIMME

H. de Boer, *Der Nachweis von Ortho-, Pyro- und Methaphosphat neben* *auch bei Anwesenheit von Natriumfluorid*. Zuerst wird mit Luteokobalt- auf Metaphosphat geprüft: Milchig-kolloide Trübung. Bei viel Pyrophosphat gleichzeitig krystallin. Fällung ein; trotzdem bleibt bei Ggw. von Metaphosphat hende Fl. trübe. Geringere Mengen Pyrophosphat werden mit $\text{CuSO}_4 +$ ure oder $\text{ZnSO}_4 +$ Essigsäure, von schwach alkal. Lsg. ausgehend, nach-

gewiesen. Nähere Einzelheiten im Original. Bei Abwesenheit von Methaphosphat prüft man nötigenfalls nach Konz. der Lsg. mit Luteokobaltchlorid (Impfen!) Pyrophosphat. Orthophosphat mit AgNO_3 oder empfindlicher mit Molybdänlsg. Ggw. von Fluoriden wird erst auf Metaphosphat geprüft; wenn positiv u. C von Pyrophosphat unsicher, werden die Phosphate mit AgNO_3 von den Fluoriden getrennt und dann mit ZnSO_4 oder CuSO_4 + Essigsäure Pyrophosphate gewiesen, bei Abwesenheit von Metaphosphat Prüfung auf Pyrophosphat mit Luteokobaltchlorid (Impfen!), Orthophosphat wieder mit AgNO_3 oder Molybdänlsg. $\text{Th}(\text{NO}_3)_4$. (Chem. Weekblad 21. 561—66. 1924. Eindhoven, Lab. d. N. V. Philips Gloeilampenfabrieken.)

GROSZFEI

Michael Bálint, *Eine jodometrische Mikrobestimmung des Natriums*. Vf. untersucht die Löslichkeit des Natriumantimonats in verschiedenen konz. A.; 50%ig eignet sich besser als Waschfl. als 30%ig. A.; die durch letzteren verursachten Verluste werden zu 1—3% berechnet. Daß bei den bisherigen Analysenmethoden mit 30%ig. A. auch gute Resultate erhalten wurden, liegt daran, daß der hier entstehende Verlust durch die Mitfällung von K durch 20%ig. Fällungsallh kompensiert wird. Der K-Überschuß beträgt im Mittel 3%. Ca^{++} wird zum großen Teil, Mg^{++} in Spuren mitgefällt; sie dürfen also bei der Best. nicht anwesend sein. K^+ u. NH_4^+ stören bei geringen Konz. kaum; die Verminderung des ausgefällten Antimonats bei höheren Konz. dieser Ionen kommt für biolog. Analysen jedoch nicht in Frage. Ist die Veraschung der organ. Substanz ohne Säurezusatz erfolgt, kann Na aus dem wss. Extrakt ohne weiteres bestimmt werden, da Ca u. Mg als Carbonate gebunden sind. Mit unveraschem Serum gibt die Methode unzuverlässige Werte. — Herst. des Reagens: 1000 ccm dest. W. werden in einem Jensen-Kolben bei Siedetemp. mit 20 g Kaliumpyrostibiats versetzt u. 4—6 Min. (etwas länger!) im Sieden erhalten. Nach schneller Kühlung durch k. W. werden 30 ccm 2-n. KOH puriss. zugesetzt u. durch ein aschefreies Filter in eine paraffinierte Flasche gegossen. Nach 24 Std. ist das Reagens gebrauchsfertig. Die Lsg. ist ziemlich haltbar. — Analyse: 1 ccm Natriumlsg. wird mit 5 ccm Reagens in eine „gehärteten“ Zentrifugierglase versetzt u. so lange mit einem Glasstabe geschüttelt, bis ein reichlicher Nd. entstanden ist (1—2 Min.). Nachdem man tropfenweise unter beständigem Rühren 2 ccm 80 vol.-%ig. A. zugesetzt hat, bleiben die (isot.) ca. 1 Std. stehen u. werden dann abzentrifugiert. Nach Abheben der Fl. wäscht man den Nd. dreimal mit je 2 ccm 50 vol.-%ig. A. aus, fügt 2 ccm konz. HCl (chlorfrei) u. 2 ccm 2%ig. KJ-Lsg. hinzu, verreibt den Nd. bis zur Lsg. u. titriert das ausgeschiedene Jod. (Biochem. Ztschr. 150. 424—43. 1924. Berlin, Charité.)

R. Mellet und Ed. Junker, *Volumetrische Bestimmung des Calciums in inorganischen Stoffen, welche Phosphorsäure, Magnesium, Eisen und Aluminium enthalten*. Man l. eine 0,1—0,2 g Ca entsprechende Mengen Substanz in HCl, verd. auf 100 bis 200 ccm erhitzt bis zum beginnenden Kochen, setzt NH_3 zu bis zum starken Geruch, dann übersättigt man mit Essigsäure (25%) bis zu stark saurem Guch. Die durch NH_3 gefällten Phosphate lösen sich; es bleibt ein geringer gelatöser Nd. von SiO_2 zurück, der ohne Einfluß ist. Man erhitzt nochmals bis fast zum Kochen u. setzt eine kochende Lsg. von Ammoniumoxalat (5%) zu, soviel, daß die gesamten metall. Ionen in Oxalate übergeführt werden. Die Fällung des Ca ist vollständig, wenn nicht so viel Reagens zugesetzt wird, daß nicht nur Mg, sondern auch Fe u. Al in Oxalate verwandelt wurden. Ca-Oxalat setzt sich bald ab, die Fl. soll sich schnell klären. Nach einigen Std. filtriert man durch ein gravimetrisches Filter von 7 cm Durchmesser, ohne zu versuchen, auf das Filter den gesamten Nd. zu bringen, dann nimmt man, ohne zu waschen, das Filter vorsichtig vom Trichter, bringt es in das Fällungsgefäß, gibt 50 ccm W. u. HCl zu, um das Ca-Oxalat in der Wärme zu lösen.

Man behandelt diese zweite Lsg. genau wie das erste Mal, setzt aber nur geringen Überschuß sd. Ammoniumoxalatlg. zu (20 cem genügen). Nach 10 Min. Stdn. filtriert man durch ein gravimetr. Filter von 9 cm Durchmesser, wäscht mit W. den Nd. samt Filter, zuerst 3mal durch Dekantieren, dann auf dem Filter 5mal, bis das W. nach Ansäuern mit HNO_3 , nur noch Opalescenz mit AgNO_3 zeigt. Nimmt das Filter vom Trichter in das Fällungsbecherglas, setzt 100 cem W. 5 cem H_2SO_4 zu, erhitzt bis zur Lsg. des Ca-Oxalats u. titriert die Oxalsäure mit 0,1-n. KMnO_4 -Lsg. Die Filterreste von der 1. Fällung stören nicht. Wenn die 1. Lsg. genau $\frac{1}{5}$ -n., so geben die verbrauchten cem-Zahlen direkt die Zahl mg CaCO_3 an. — Wenn die zu untersuchende Substanz nur sehr wenig Mg u. nur von Fe u. Al enthält, genügt auch eine einmalige Fällung des Oxalats. (Zeits. Apoth.-Ztg. 62. 629—32. 647—49. 1924. Lausanne, Univ.) DIETZE.

3. Prüfung von Bariumsulfat auf einen Gehalt von Bariumcarbonat und löslichen Bariumverbindungen. Vorschrift des Reichsgesundheitsamtes. Ca. 5 g des untersuchenden BaSO_4 werden in Kolben oder Becherglas mit ca. 50 cem 10%ig. Salzsäure angeschüttelt, wobei auf CO_2 -Entw. zu achten ist, wodurch das Prod. vollständig u. für gedachten Zweck unbrauchbar ist. Im Regelfalle läßt man nach Aufkochen kurze Zeit absetzen, gießt die Fl. durch Papierfilter ab, schüttelt meist trübe Filtrat mit einer kleinen Messerspitze Tierkohle u. filtriert durch neues, glattes Filter, bis völlig klar. 25 cem davon versetzt man mit einigen Tropfen verd. H_2SO_4 ; tritt innerhalb $\frac{1}{2}$ Stde. Trübung ein, so ist das BaSO_4 zu verwerfen, da es 0,1% oder mehr BaCO_3 oder l. Ba-Verbb. enthält. (Apoth.-Ztg. 39. 566. 1924.)

DIETZE.

4. Prof. Lindemann, Die Bestimmung des Chroms und Vanadiums in Legierungen. Die Methode beruht auf folgenden Grundlagen: Cr^{III} wird in verd. H_2SO_4 mit Persulfat u. Permanganat zu Cr^{VI} oxidiert, Chrom- u. Vanadinsäure mit Sn^{II} reduziert u. schließlich das Vanadyl mit Permanganat zu Vanadinsäure oxidiert. HCl , HNO_3 u. Cl sind nicht vorhanden u. daher wichtige Fehlerquellen beseitigt. Der Gebrauch von Persulfat u. Permanganat vermeidet die B. großer Mengen MnO_2 bei der Oxydation. 1 g Späne werden mit 15 cem einer Lsg., die 1 g AgNO_3 + 250 cem konz. H_2SO_4 + 750 cem W. hergestellt worden ist, so erhitzt bis die Entw. von H_2 aufgehört hat, dann werden bei Schnelldrehen 3 cem, bei anderen Stählen 2 cem HNO_3 (1,2) tropfenweise zugegeben u. 10 Min. gekocht. Bleibt ein dunkler Rückstand ungelöst zurück, so wird er abfiltriert, mit wenig Na_2CO_3 + KNO_3 geschmolzen u. auf Cr u. V geprüft. Die Lsg. wird verdampft bis Ferrisulfatkrystalle anfangen sich auszuschcheiden u. dann die Verdampfung bei niedriger Temp. bis zur B. von SO_3 -Dämpfen fortgesetzt. 10 W. u. 2 g $(\text{NH}_4)_2\text{S}_2\text{O}_8$ bei Schnelldreh- u. korrosionsbeständigen Stählen zugegeben, bei anderen Stählen werden dann zugegeben, 2 Min. gekocht u. wenn die rötliche Farbe von Permanganat sichtbar wird, tropfenweise eine etwa 1%ige Permanganatlsg. bis zur schwachen Rotfärbung zugesetzt. Das Persulfat nach Zusetzen weiterer 25 cem W. durch Kochen zerstört, ebenso der überschüssige Permanganat. Nach dem Abkühlen wird der entstandene Rückstand abfiltriert u. mehrere Male mit k. 1%ig. H_2SO_4 aus gewaschen, bis das Filtrat etwa 150—200 cem beträgt. Dann wird schnell mit n.-15 oder n.-18 Lsg. zuletzt unter Zugabe einer frisch hergestellten 2%ig. Kaliumpermanganat-Lsg. als Indicator titriert, wobei ein Überschuß an FeSO_4 mittels n.-173 $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ -Lsg. (1 cem = 0,01% Cr) zurücktitriert werden muß, so daß nach 30 Sek. keine blaugrüne Färbung erscheint. Dann wird mit einer FeSO_4 -Lsg. weiter titriert bis die rötliche Färbung 3 Min. bestehen bleibt; der überschüssige wird mit einer As_2O_3 -Lsg. zurückgenommen. Vf. gibt dann einige Angaben über die benötigten Titerlsgg. Die Wiederoxydation von Fe^{II} zu Fe^{III}

nach der Red. des Cr u. V ist wichtig, da ja sonst die folgende V-Titration fa-
 werden würde, wogegen ein kleiner Überschuß von Cr^{VI} nach der Wiederoxyda-
 ohne Einfluß ist. Cr u. V elektrometr. direkt zu bestimmen ist unmöglich,
 bevor alles Cr^{VI} reduziert ist, etwas V^{IV} vorhanden ist u. das Gleichgewicht
 sehr langsam sich wieder herstellt. (Metal Ind. [London] 25. 431. 1924.) W.

Carlos F. Hickethier und Ernesto E. J. Bachmann, *Analytische Untersuchungen von Zinküberzügen*. Es handelt sich um einen Zinküberzug auf Eisenkamm. Ätzt man einen Querschnitt mit Jod, so kann man zwischen dem u. dem in der Wärme aufgetragenen Zn mehrere Legierungen als Zwischenstufen erkennen. Enthält das verwendete Zn mehr als 3% Fe oder 1,5% Pb, so hält der Überzug nicht. Bei sherardisiertem Fe kann man mindestens 4 Lagen unterscheiden, von denen die Fe-reichen zu Oxydation neigen, so daß das Fe bloßgelegt wird. Galvan. niedergeschlagenes Zn ist unreiner u. weniger haltbar als in der Wärme aufgetragenes. Die Vff. prüfen den Überzug nach WALKER mit einer alkalischen, mit Phenolphthalein versetzten Lsg. von Ferricyanid in Agar-Agar: wenn der Überzug fehlt oder porös ist, tritt Rotfärbung u. B. von Turnbolls Blau auf. Um die Stärke des Überzugs zu prüfen, wird das Objekt mehrmals 1 Min. in neuverdünnte 36%ige CuSO_4 -Lsg. getaucht, die mit den Zn einen leicht abfallenden, mit der Zeit einen haltbaren Cu-Überzug gibt. Gut verzinkte Eisenwaren müssen dreimal in diese Eintauchen aushalten. Fehlstellen lassen sich an der H_2 -Entw. in starker, h. N. Lsg. erkennen. Die Dicke des Zn-Überzugs mißt man exakt durch Lösen in 1%ig. H_2SO_4 mit 0,2% Zusatz von As_2O_3 . Von Bedeutung ist der Nachweis, ob der Überzug chlorfrei ist, d. h. ob HCl u. NH_4Cl vom Reinigen der Fe-Oberfläche entfernt sind. (Anales Asociación Química Argentina 12. 13—19. 1924. Sep.) W. A. R.

Ferdinando Gazzoni, *Über einen Versuch der quantitativen Bestimmung des Thorium X*. Ein im Gleichgewicht mit ThX befindliches Radiothoriumpräparat wird mit NH_3 oder H_2O_2 gefällt; ThX bleibt in beiden Fällen in der Lsg.; wenn H_2O_2 als Fällungsmittel verwendet wird, bleibt auch der aktive Nd. des ThX in der Lsg. Eine einmalige Fällung genügt, um 50% des ThX zu entfernen, 4- bis 5-malige Fällung gestattet bis zu 90% ThX zu isolieren. Ein Teil von ThX wird mit dem Nd. niedergerissen. (C. r. d. l'Acad. des sciences 179. 963—65. 1924.)

F. Tödt, *Die elektrolytische Abscheidung unedler Radioelemente*. Die von v. BAEYER, O. HAHN u. MEITNER (Physikal. Ztschr. 15. 649. 16. 6. C. 191 I. 457. 1915. I. 472) und MEITNER (Physikal. Ztschr. 12. 1094; C. 1912. I. 32) angewandten Methoden zur elektrochem. Abscheidung der unedlen radioaktiven Elemente a) Ra u. seiner Isotope ThX u. AcX , b) Th u. der Isotope UX , u. AT u. c) Ac u. des Isotops MsTh_2 an dünnen Drähten wurden mit ThX , UX u. MsTh_2 systemat. untersucht. Die bei a) übliche Elektrolyse einer schwach alkalischen sauren Lsg. unter Einleiten von CO_2 ist dann schwierig, wenn außer der als Trägersubstanz notwendigen Ba noch ein großer Ca-Überschuß vorhanden ist. Es hat sich in diesem Falle als prakt. erwiesen, das ThX mit einer Spur Ba als Chromat auszufällen u. das ThX aus der salzsauren Lsg. des Nd. kathod. zu elektrolysieren. Beim Th zeigte sich, daß starke Säurekonz. ($1/5$ — $1/10$ n. HCl) die aus der kolloiden Natur des Th(OH)_4 sich ergebende störende Ausflockung verhindert u. gute Schichtbildung ermöglicht. Bei c) erhält man gute Ausbeute, wenn man auf 3 ccm Fl. $1/2$ mg FeCl_3 , 1 mg BaCl_2 u. 5—10 mg HCl zusetzt. Bei Anwesenheit eines kathod. gut fällbaren Stoffes wie BaCl_2 geht auch das Eisen mit, damit auch das MsTh_2 als gute Kathodenschicht mit; man braucht also nicht wie früher üblich, das Eisen vorher abzutrennen. (Ztschr. f. physik. Ch. 113. 3. 313—335. 1924. Kaiser WILHELM-Inst. f. Chemie, Berlin-Dahlem.) PHILIP.

C. C. D., *Die Bestimmung von Wismut in Kupferniederschlägen*. Da die üblichen Methoden zur Best. bei Ggw. von Verunreinigungen, wie sie gerade in Kupferniederschlägen der Praxis vorkommen, nicht mehr einwandfrei sind, hat Vf. eine besondere Verf. ausgearbeitet. Die Probe wird getrocknet, zu einem feinen Pulver zerrieben u. 10 g in 25 cem HNO_3 u. 25 cem W. in der Wärme gelöst. Man läßt sie langsam zur Trockene verdampfen, löst die grünen Krystalle mit einigen Tropfen konz. H_2SO_4 , gibt 10 cem konz. H_2SO_4 , 200 cem W. u. 30 cem Alkohol zu. Nach einigen Stdn. wird der Nd., SiO_2 u. PbSO_4 , abfiltriert u. säurefrei gewaschen. Hierauf wird mit NH_3 deutlich alkal. gemacht u. mit 40 cem einer 10%ig. Lsg. Am_2CO_3 gekocht bis Bi mit Fe u. etwas Cu ausgefallen ist. Es ist besser zu stark zu kochen als zu wenig, da sonst ev. Bi noch in Lsg. sein könnte. Die Lsg. wird h. filtriert u. mit h. W. ausgewaschen. Danach wird der Nd. mit w. verd. HNO_3 vom Filter gelöst. In die gelbe Fl. wird H_2S eingeleitet, der Nd. abfiltriert, gewaschen u. mit 20 cem rauchender HNO_3 gekocht bis die S-Teilchen eine reine gelbe Farbe angenommen haben, die dann filtriert werden. Überschüssiges NH_3 wird mit 100 cem einer 20%ig. Am_2CO_3 -Lsg. werden zugegeben u. dann gekocht. Der grüne Nd. von Wismut u. Kupfercarbonat wird abfiltriert, gewaschen, in h. verd. H_2SO_4 gelöst u. schließlich 25 cem einer 10%ig. KJ-Lsg. zugegeben. Die Lsg. wird abfiltriert u. auf ein bekanntes Vol. aufgefüllt u. colorimetr. mit einer ebenfalls mit H_2O u. KJ behandelten Normallsg. verglichen. (Metal Ind. [London] **25**. 417 bis 421 1924.)

WILKE.

H. Pied, *Fällung des Tantals und Niobs durch Cupferron und ihre Trennung von Eisen*. Es werden die nach dem Aufschluß mit Pyrosulfat durch Fällung mit Oxalsäure Säuren in Oxalsäure gelöst, das Fe aus der filtrierten Lsg. mit $(\text{NH}_4)_2\text{S}$ bei Kälte gefällt. Dabei bleiben die Erdsäuren in Lsg. Die filtrierte Lsg. wird mit H_2SO_4 angesäuert, der H_2S verjagt u. unter starkem Schütteln mit Cupferron versetzt. Es fällt Nb_2O_5 , Ta_2O_5 zusammen mit TiO_2 quantitativ. Diese werden auf dem Filtrieren mit stark verd. H_2SO_4 gewaschen. (C. r. d. l'Acad. des sciences **179**. 897—99. 1924.)

ENSZLIN.

A. Miethe und H. Stammreich, *Quantitativer Nachweis kleiner Edelmetallmengen in Quecksilber*. Das Verf. beruht darauf, daß das die Edelmetalle Gold u. Silber enthaltende Hg zunächst bis auf 2% eingengt wird. Das zurückbleibende Rückstandsgut wird in einem kleinen Destillationsapp. bis auf etwa 1 g eingengt. Der Rückstand wird in einem flachen, unglasierten Porzellantiegel mit konz. HNO_3 überzogen; er löst sich schnell auf u. es hinterbleibt das Au als ein Gefüge poröser Feinkristalloide. Die überstehende Fl. wird abdekantiert, mehrmals mit W. nachgewaschen, das Au mit Borax überschüttet u. geglüht. Die Massenbest. der entstehenden Kugel geschieht u. Mkr. mit Fadenmikrometer. Au läßt sich zuverlässig bis zu 0,0002 mg nachweisen. Der Fehler der Massenbest. beträgt bei Kugeln von 0,1 mg — 0,1 mg ungefähr $\pm 1\%$ der Masse. — Die Best. des Ag folgt als Rückfall. Die Hg u. Ag enthaltende Lsg. wird mit N_2H_4 , H_2SO_4 reduziert, der Rückstand mit H_2O gewaschen, getrocknet u. das Hg durch vorsichtiges Erhitzen vertrieben. Das zurückbleibende Ag wird vorsichtig zu einer Kugel zusammen geschmolzen u. ebenso bestimmt wie Au. Fehler bis 0,02 mg ist außer Acht zu lassen. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. **140**. 368—70. 1924. Berlin, Techn. Hochschule.)

GOTTFRIED.

J. Orzel, *Über die Bestimmung der Temperaturen der Wasserabgabe von Silicaten*. Um die Temp. zu messen, bei welcher ein Silicat einem darüber geleiteten Luft- N_2 -Strom so viel W. abgibt, daß sich in kalten Apparateilen ein W.-Beschlag bildet, kann man das Silicat in ein evakuiertes Gefäß einführen u. die Temp. messen, bei welcher eine plötzliche Druckzunahme eintritt. Trägt man die Erigungstemp. auf die Abscisse, den Druck auf die Ordinate, so erhält man eine Kurve. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. **140**. 368—70. 1924. Berlin, Techn. Hochschule.)

zuerst steil steigende (Abgabe des hygroskop. W.), dann nach dem Gay-Lussacschen Gesetze anwachsende u. bei Zersetzungstemp. wieder steil ansteigende Kurve. In Falle des Ripidolits aus Androta (Madagaskar) liegt diese letzte Temp. bei 500—510°. Die Methode ist nur verwendbar, wenn das Mineral keine anderen gasförmigen Zersetzungsprodd. liefert. (C. r. d. l'Acad. des sciences **179**. 1056—59. 1924.) BRUNNEN.

P. Tschirwinski, *Über die Bestimmung des spezifischen Gewichts von Gesteinen durch Berechnung auf Grund ihrer quantitativen chemischen Zusammensetzung.* Die nach der mikroskop. Methode erhaltene Menge der Mineralien wird mit der D. multipliziert u. aus den erhaltenen Werten die D. der Gesteine berechnet. Die so bestimmten DD. stimmen mit den durch Rechnung erhaltenen überein. (Bull. Soc. franc. Minéral. **47**. 136—41. 1924.) ENSZLIN.

P. Tschirwinski, *Über die Anwendung der Methode chemischer, durch Diffusion in einem kolloiden Medium verzögerter Reaktionen auf die Mineralogie.* Besprechung von älteren Arbeiten u. Anwendungsmöglichkeiten auf die Mineralogie. (Bull. Soc. franc. Minéral. **47**. 133—35. 1924.) ENSZLIN.

Organische Substanzen.

H. Dam, *Jodzahlbestimmungen an Cholesterin.* Nach HÜBL erhält man bei der üblichen Reaktionszeit von 24 Stdn. u. mindestens 150% Halogenüberschuß einigermaßen konstante Jodzahlen in der Nähe von 80, während die bei Verwendung von Halogenüberschüssen in der Nähe der gewöhnlichen Minimalgrenze von 5%, erhaltenen Jodzahlen der theoret. Zahl (65,6) näher liegen. Eine Verkürzung oder Verlängerung der Reaktionszeit um 1 Std. verrückt die Jodzahl nur um etwa eine Einheit, wenn der Halogenüberschuß nicht sehr groß ist. Nach WALLER erhält man nach den üblichen 24 Stdn. Jodzahlen, die nur etwa die Hälfte der theoret. betragen u. mit Zeit u. Halogenmenge nicht unbeträchtlich wachsen. Nach WINKLER ergeben sich nach der üblichen 1 Stde. Zahlen, die mit dem Halogenüberschuß außerordentlich stark wachsen; die Jodzahl ändert sich nur wenig mit der Zeit, wenn der Halogenüberschuß klein ist, bei großen Halogenüberschüssen dagegen stark; dieses Verf. scheint somit zur Unters. cholesterinreicher Stoffe am wenigsten geeignet zu sein. Im Gegensatz zu diesen Verff. ergeben HANUŠ u. WINKLER's Verf., sowie die *Pyridinsulfatdibromidmethode* bei angemessenen Halogenüberschüssen auffallend naheliegende Werte, welche die theoret. Zahl nur wenig übertreffen. Beim Verf. nach HANUŠ ist ein relativ großer Halogenüberschuß (etwa 200%) erforderlich, um bei der gewöhnlichen Reaktionszeit von 15 Min. eine von der Halogenmenge beinahe unabhängige Jodzahl zu erhalten. Bei Halogenüberschüssen in der Nähe der gewöhnlichen Minimalgrenze wächst die Jodzahl am meisten in den ersten 10 Min., u. die Zunahme ist nach 30 Min. beinahe Null. Der Einfluß der Reaktionszeit ist nach 15 Min. jedoch nur klein. Das Verf. von WINKLER wird dagegen viel weniger von dem Halogenüberschuß beeinflusst; es liefert in 1 Std. Jodzahlen, die von dem Halogenüberschuß beinahe unabhängig sind, wovon derselbe nur > 60% beträgt. In der Nähe dieser Minimalgrenze variiert die Jodzahl nur wenig mit der Reaktionszeit. Das Pyridinsulfatdibromidverf. erfordert den geringsten Halogenüberschuß, um bei 5 Min. von dem Halogenüberschuß beinahe unabhängige Jodzahlen zu ergeben. Die Zeitabhängigkeit ist bei kleinen Halogenüberschüssen nur gering. Da die hier erhaltenen Jodzahlen nur wenige Einheiten über dem theoret. Wert liegen, scheint dieses Verf. zur Unters. cholesterinreicher Stoffe besonders geeignet zu sein. (Biochem. Ztschr. **152**. 101—3. 1924. Kopenhagen, Univ.) WOLFF.

G. Reif, *Die analytische Prüfung der synthetischen, aus Acetylen hergestellten Essigsäure.* Die in Betracht kommenden Verunreinigungen zerfallen in organ. Verbb., Hg u. andere als Katalysatoren verwendete Metalle u. Säuren. Prüfung ist

an. Verb. am besten durch Entfärbung 0,1% ig. KMnO_4 -Lsg. Crotonaldehyd u. Crotonsäure werden so erkannt. Zwei chem. reine Proben des Handels waren frei von gesundheitsschädlichen Stoffen. Eine Rohsäure enthielt beträchtliche Mengen an Verunreinigungen (Crotonaldehyd, Crotonsäure, HCOH , HCOOH , Acetaldehyd, C_2OH , keine Oxalsäure), u. Metalle (besonders Fe u. Mn). Zwei techn. reine Säuren enthielten geringe Mengen genannter Verunreinigungen. As wurde in keinem Falle nachgewiesen. Bei der Prüfung auf CH_3OH in formaldehydreicher Essigsäure wurde das den Nachweis störende HCOH durch $\text{NaOH} + \text{H}_2$ beseitigt. Untersuchungsverf. zur Best. von Hg, Fe, Mn u. V. Die für Hg essig u. Gärungsessig kennzeichnenden Rkk., auch die FARNSTEINERsche Probe Acetylmethylcarbinol, verliefen negativ. (Ztschr. f. Unters. Nahrungs- u. Genussmittel **48**. 277—93. 1924. Berlin, Reichsgesundheitsamt.) GROSZFELD.

E. Schulek, Über die Berlinerblaureaktion. Zum Nachweis von HCN ist die Ausführung der Berlinerblauk. nach KOLTHOFF (Ztschr. f. anal. Ch. **57**. 3) am zuverlässigsten. Man versetzt die Fl. (100 ccm) nach Zugabe von wenig FeSO_4 -Lsg. mit 10 Tropfen einer Lsg. von 8 g $\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$ u. 8 g NaHCO_3 in 100 ccm W., versetzt durch u. säuert nach $\frac{1}{2}$ Stde. mit H_2SO_4 an; die Rk. wird nach 1— $1\frac{1}{2}$ Stdn. geteilt. Wenn es sich um den sicheren Nachweis von HCN in Salzen oder Salzeisen, besonders in NH_4 -Salzen handelt, muß man die Lsg. derselben zuvor mit H_2SO_4 dest. u. dann HCN im Destillate nachweisen. (Pharm. Zentralhalle **65**. 9—94. 1924. Budapest, Univ.) DIETZE.

Bestandteile von Pflanzen und Tieren.

Anna Goldfederová, Nachweis des Glykogens in Organen. Modifikation der Bangschen Methode unter Anwendung der Bangschen Mikromethode zur Best. des Zuckers. Es ist besonders wichtig, die Analyse sofort nach Entnahme des Organes auszuführen u. nach der Zerstörung desselben mit 60% ig. Lauge immer 1 l. W. u. 2 Voll. 96% ig. A. zuzugeben. (Biol. listy **10**. 168—71. Brünn, Univ.; e ges. Physiol. **28**. 177. 1924. Ref. BABÁK.) SPIEGEL.

J. E. de Jongh und J. Planelles, Eine quantitative Mikrobestimmung von Glykogen in Lösung. Bei Ausschütteln einer mit dem gleichen Vol. A. (1 ccm) versetzten wss. Glykogenlsg. (1 ccm) mit Ä. im Überschuß (5 ccm) scheidet sich Glykogen in der wss. Phase als Trübung aus. Die Trübung ist proportional Glykogenkonz. Empfindlichkeit viermal so groß als mit A. allein, etwa 1:120000. Gleich mit reinen wss. Glykogenlsgg. Bei Blut erhält man ein farbloses, eiweißes Filtrat ohne Glykogenverlust durch gleiches Vol. 25% ig. Trichloressigsäure. (Ned. Tijdschr. Geneeskunde **68**. II. 2713—16; Biochem. Ztschr. **154**. 167—70. 1924. Amsterdam, Univ.) GROSZFELD.

M. Samec, Stöchiometrie der Amylopektine. Das Kartoffelamylopektin (Erythro-Phosphorsäureester) ist eine zweibas. Säure, welche im Gegensatz zu den Amylopektinen aus Samen bei der elektrodialyt. Reinigung die Kationen verliert u. freie Säure liefert. Nennenswert elektrol. dissoziiert ist die Amylophosphorsäure nur in der ersten Stufe, doch bindet sie bis zur elektrometr. festgestellten Äquivalenz nahezu das Doppelte jener Basenmenge, welche den freien H-Ionen entspricht. Manche Amylopektine (*Marantha* u. a.) zeigen eine höhere Säuerung, dem Phosphorgehalte entspricht. Der Grund hierfür konnte in einem nennenswerten Gehalt an S erkannt werden. Durch Vergleich des P-Gehaltes u. der ermittelten Größe der in der Lsg. vorhandenen Teilchen wurde die Zus. der Amylopektine ermittelt. (Festschrift Prof. LOZANIĆ, Belgrad **1922**. 5 Seiten. Laibach, Univ. Sep. vom Vf.) SAMEC.

Haroldolph Wasteneys und Henry Borsook, Ein Verfahren zur fraktionierenden Analyse der Produkte unvollständiger Eiweißspaltung. Vff. teilen die Bestand-

teile eines durch Enzymspaltung von Eiweiß gewonnenen Gemisches ein in Protei Metaprotein, Proteose, Peptone, Subpeptone u. Aminosäuren. Von diesen wird d Metaprotein in einer besonderen Portion gefällt, indem man deren p_H auf 6 bringt. Die Differenz zwischen N-Gehalt des Filtrates u. demjenigen der ursprünglich Lsg. gibt den Metaprotein-N, der, vom N des Trichloressigsäurend. abgezogen, d wahren Protein-N ergibt. Im Filtrate des durch Trichloressigsäure erzeugten N werden die Proteosen durch Sättigen mit $(NH_4)_2SO_4$ bei 33° gefällt, im Filtrat hier die Peptone durch Gerbsäure bei 20° , die Subpeptone nach Einstellung der Rk. in d letzten Filtrat auf $p_H = 5$ durch Fällung mit dem 9fachen Vol. 95%ig. A. u. dem auch nach Zusatz von alkoh. $ZnCl_2$ -Lsg. gel. gebliebenen Anteile ergibt sich der Rest-N, wahrscheinlich zu Aminosäuren u. einfacheren Peptiden gehörig. Bei des Amino-N mit Hilfe von HNO_3 nach VAN SLYKE gelingt hier infolge Ggw. v. Gerbsäure nicht. Für die einzelnen Trennungen sind verschiedene Einzelheiten zu beachten. (Journ. Biol. Chem. 62. 1—14. 1924. Toronto [Canada], Univ.)

E. Wollman und Frau Wollman, Anwendung des *Bacterium coli* bei Nachweis von Tryptophan. Anwendung auf den Fall des Tuberkelbacillus. (Vgl. V. LABERNADIE u. OSTROWSKI, Ann. Inst. Pasteur 38. 115; C. 1924. I. 1984.) a die B. von Indol in Kulturen nur eintritt, wenn die Eiweißstoffe des Nährmediums Tryptophan enthalten, kann die Rk. auch zum Nachweis dieser Aminosäure dienen. Die zu untersuchenden Eiweißstoffe werden durch Trypsinverdauung oder Säurehydrolyse gespalten, dann (im zweiten Falle nach Neutralisation) mit *coli* beimpft u. nach 24—28 Stdn. Bebrütung mit p-Dimethylaminobenzaldehyd auf Indol geprüft. Die Rk. ist empfindlicher als alle anderen, gestattet noch n Nachweis des Tryptophans in 1:500000 u. mehr verd. Lsgg. Seine Ggw. wurde so in auf synthet. Nährboden gezüchteten Tuberkelbacillen nachgewiesen. (El. Soc. Chim. Biol. 6. 869—72. 1924.) SPIEGEL

C. A. Sagastume und C. E. Spegazzini, Nachprüfung einer biochemischen Methode zum Nachweis und zur Bestimmung von Vitaminen. Ein als besonders genau gerühmtes Verf. von GANASSINI, auf Verwendung von Hefe beruhend, über den Vff. widerspruchsvolle Resultate, besonders mehrfach negative bei als vitaminhaltig bekanntem Material. (Anales de la Asociación química Argentina 12. 151—6. 1924. Sep. La Plata, Fac. de Quim. y Farm.) SPIEGEL

Heinrich Davidsohn, Vitaminstudien. (Die wasserlöslichen wachstumsfördernden Faktoren. I. Die quantitative Messung des bakterienwachstumsfördernden Faktors.) Für den bakterienwachstumsfördernden Faktor werden mehrere Methoden zur Messung seiner Wirksamkeit untersucht. Als geeignetster Bacillus wurde der *Colibacillus* gewählt, meist wurde ein gleicher Colistamm verwendet. Geprüft wurden das Plattenzählverf., die Zählkammerzählung, ein volumetr. Verf. u. die opt. Wertung der durch das Wachstum verursachten Trübung der Nährlsg. („Trübungsmessung“). Die letztere Methode erwies sich von den direkten Meßmethoden als die brauchbarste. Eine indirekte Best. der Wachstumsförderung aus dem (ad der Säuerung u. Gärung erwies sich wenigstens für *Coli* als nicht geeignet. Zur Messung der Wachstumsbeschleunigung diente die Best. derjenigen Menge, die in 4 Stdn. bei 37° die Aufschwemmung einer bestimmten Menge Colibakterien gegenüber der Kontrolle zu verdoppeln vermag („Verdoppelungswert“). Bezieht man den Verdoppelungswert auf das Vol. des vitaminhaltigen Ausgangsmaterials, so gelangt man zum „Volumenwert“, bezieht man ihn auf die Trockensubstanz, so gelangt man zum „Trockensubstanzwert“. Von diesen Werten ausgehend kann man durch einfache Rechnung einen zahlenmäßigen Ausdruck für die relative Wirksamkeit der Säfte hinsichtlich der Bakterienwachstumsbeschleunigung ableiten. Die Ergebnisse derartiger Messungen für eine Reihe von Fruchtsäften u. Gemüsesäften werden mitgeteilt. Die bakterienwachstumsfördernde Substanz wird (reich

hitzen im Wasserbade u. auch durch 2 Stdn. langes Erhitzen unter Druck im Autoklaven bei 130° sowie durch Altern nicht geschädigt. Erhitzen bei alkal. Rk. Trocknung schwächt die Wirksamkeit dagegen stark. Die wirksame Substanz durch ein bakterien dichtes Membranfilter filtrierbar u. anscheinend an Kaolin leicht adsorbierbar. Die bakterienwachstumsfördernde Substanz ist mit den Wachstum der Hefe u. höherer Organismen fördernden Faktoren in eine gemeinsame Gruppe von Vitaminen einzuordnen. (Biochem. Ztschr. 150. 304—36. 1944. Hygien. Inst. Univ. Berlin.) ARON.

P. Rona und A. Lasnitzki, *Eine Methode zur Bestimmung der Lipase in Körperflüssigkeiten und im Gewebe*. In Anlehnung an die Methode von WARBURG MINAMI (Biochem. Ztschr. 142. 317. 334 [1924]) zur Unters. der glykolyt. Eigenschaften von Geweben wird eine Methode zur Best. der Lipase mit Tributyrin als Substrat ausgearbeitet. Das zu untersuchende Ferment (Serum oder Gewebeschnitt) in Glasnadel in Ringerlsg. befindet sich in einem kleinen Trog von etwa 10 ccm Inhalt, der einen Helm trägt, welcher mit einem Barcroftmanometer (mit Brodiescher Feder) verbunden ist u. auf dem drehbar eine kleine Retorte zur Aufnahme der Tributyrinlsg. angeschliffen ist. Beim Zusammengeben von Tributyrin u. Ferment wird aus der (viel NaHCO_3 enthaltenden) Ringerlsg. durch die entstehende Buttersäure CO_2 in Freiheit gesetzt, dessen Menge an der Druckerhöhung des Manometers bei gleichbleibendem Vol. gemessen wird. Die angewandten Lsgg. sind: Ringerlsg. 100 ccm 9‰ig. NaCl + 2 ccm 1,2‰ig. KCl + 2 ccm 1,76‰ig. CaCl_2 (kryst.) + 2 ccm 1,26‰ig. NaHCO_3 -Lsg.; Tributyrinemulsion wurde erhalten durch Ausschütteln von 0,5 ccm Tributyrin mit 4,5 ccm Ringerlsg. Man sättigt die Lsg. mit einem Gemisch von 5 Vol.-% CO_2 + 95 Vol.-% N, vereinigt die Tributyrinemulsion mit dem Ferment u. ermittelt die Druckerhöhung in einer bestimmten Zeit. Unter Berücksichtigung einer Gefäßkonstante berechnet man die gebildeten Mikromol Buttersäure. Näheres im Original. — Unter den angegebenen Bedingungen verläuft die Tributyrinspaltung bei Meerschweinchenserum (bis zur Verd. 1 : 1000 u. bis zu 140 Min. Versuchsdauer) linear. Die Zeiten gleichen Umsatzes verhalten sich mit großer Annäherung umgekehrt wie die Fermentkonz. Das pH ändert sich während des Vers. nicht erheblich. (Biochem. Ztschr. 152. 504—22. 1924. Berlin, Univ.) A. R. F. HESSE.

D. G. Cohen Tervaert, *Bestimmung des Kohlenoxydgehaltes im Blute*. Eine 200 ccm fassende Literflasche ist durch einen Gummistopfen mit 3 Bohrungen verschlossen, durch die Glasröhren mit Gummischläuchen u. Quetschhähnen gehen, u. wird mit der Wasserstrahlpumpe evakuiert. Durch die eine Glasröhre bringt man das zu untersuchende Blut (z. B. 10 ccm) hinein, dann nach Spülen mit der $1\frac{1}{2}$ fachen Menge Wasser für je 10 ccm Blut 4 ccm gesätt. $[\text{K}_3\text{Fe}(\text{CN})_6]$ -Lsg. Nach kräftigem Schütteln wird die Flasche 30 Min. in W. von 40° unter zeitweisigem Schütteln gehalten, dann Luft eingelassen u. durch Schütteln mit dem vorhandenen Gas gemischt. Das Gasgemenge wird schließlich durch eine Saugpumpe unter Verdrängung durch Wasser u. Waschen mit starker Lauge u. konz. H_2SO_4 durch ein im Ölbad von 150° C gehängtes U-Rohr mit J_2O_5 gesaugt, das durch das CO freigemachte J in 10‰ig. KJ -Lsg. aufgefangen u. titriert. (Koninkl. Akad. van Wetensch. Amsterdam, afd. en Natk. Afd. 33. 759—61. 1924. Utrecht, Rijksuniv.) SPIEGEL.

Z. Ernst und J. Förster, *Über die Bestimmung des Blutbilirubins*. Besondere Bedeutung hat die Best. von Bilirubinwerten um 0,5 mg herum. Diese kann aber nach dem Verf. von HIJMAN VAN DEN BERGH nicht genau ausgeführt werden. Die Verf. fanden, daß sie durch colorimetr. Best. auf Grund der Eigenfarbe des Bilirubins gut gelingt, wenn man das Serum (zweckmäßig nicht weniger als 2 ccm) in der doppelten Menge Aceton fällt u. das klare Filtrat benutzt. Die Eichung

des Colorimeters erfolgt mit $K_2Cr_2O_7$ -Lsgg. (Klin. Wehschr. 3. 2386—88. 1922 Budapest, PÁZMÁNY PÉTER-Univ.) SPIEGEL.

John C. Whitehorn, *Eine Methode zur Bestimmung des Lipoidphosphors im Blut und Plasma*. Das Verf. von BELL u. DOISY (Journ. Biol. Chem. 44. 55; 1921. II. 60) gab bei sauren K-Phosphatlsgg. bekannten Gehaltes keine befriedigenden Ergebnisse. Die Ergebnisse bei der Modifikation von RANGLES u. KNUDS (Journ. Biol. Chem. 53. 53; C. 1922. IV. 739) waren in der Regel zufriedenstellend, zuweilen aber auch unrichtig, meist nach der negativen Seite, was auf örtliche Überhitzung beim Aufschluß u. dadurch bedingten Verlust an H_3PO_4 zurückgeführt wird, während positive Abweichungen durch Verlust an H_2SO_4 bei zu starker Digestion u. dadurch geringere Acidität bei der schließlichen Lsg. bedingt sein können u. die annähernd richtigen Ergebnisse vielleicht nur einer Kompensation beider Fehler zu verdanken sind. Vf. verwendet deshalb beim Aufschluß sowohl H_2SO_4 , daß sie das halbkuglige Ende des Reagensglases füllt u. beseitigt die am Schluß der Digestion verbleibenden Spuren von HNO_3 durch SO_2 durch Erhitzen der Aufschlußlsg. mit 2 cem 20%ig. Na_2SO_3 -Lsg. Bei der nach diesem Verfahren resultierenden stark sauren Lsg. entwickelt sich mit saurem Molybdat, Na_2SO_3 , Hydrochinon in 10 Min. im sd. Wasserbade eine klare blaue Färbung, deren Intensität nach Erkalten der Menge H_3PO_4 proportional ist, innerhalb ca. 24 Std. langsam zunimmt u. in Wochen nicht ganz ausbleicht. Bei Verd. nimmt die Intensität der Farbe im Verhältnis zu der zugefügten Menge W. ab. (Journ. Biol. Chem. 62. 133—38. 1924. Waverly [Mass.], MC LEAN Hosp.) SPIEGEL.

Georg Haas und E. F. Schlesinger, *Über den quantitativen Nachweis von freiem Phenol und Kresol in kleinen Blutmengen und seine prognostische Bedeutung bei Vergiftungsfällen*. Die auf der Anwendung des Phenolreagens von FOLIN-DENIS beruhende Methoden sind wegen der Unspezifität dieses Reagens zum getrennten Nachweis von freiem u. gebundenem Phenol ungeeignet. Der quantitative Nachweis des freien Phenols im entweißten Blut- oder Serumfiltrat scheitert an der Adsorption eines großen Teiles desselben durch das Eiweißpräcipitat. Entgegen den Angaben BAUMANN'S (Ztschr. f. physiol. Ch. 2. 335 [1878]) tritt eine Spaltung des gebundenen Phenols beim längeren Kochen nach Zusatz von Essigsäure nicht ein. Das freie Phenol kann aus kleinen Blutmengen in schwach essigsaurer Lösung getrennt vom gebundenen Phenol abdest. u. kolorimetr. mit Hilfe der Milla-Weißschen Rk. quantitativ bestimmt werden. So konnte in Verss. an phenol vergifteten Hunden gezeigt werden, daß mit Einsetzen der ersten Vergiftungserscheinungen freies Phenol im Blute auftritt, dagegen nicht bei nicht-tox. Dose. Es ist so der Beweis des Kausalzusammenhangs zwischen Kreisläufen von freiem Phenol im Blute u. Vergiftungserscheinungen erbracht. (Arch. f. exp. Pathol. Pharmak. 104. 56—72. 1924. Gießen, Univ.) WOLFF.

Maurice Nicloux, *Mikrobestimmung des Chloroforms im Blute und in den Geweben*. Modifikation des früher (Bull. Soc. Chim. Paris [3] 35. 321; C. 1906. 362) beschriebenen Verf. für kleine Mengen von $< 1-2$ mg. (C. r. soc. de biologie 91. 1282—84. 1924. Straßburg, Fac. de méd.) SPIEGEL.

J. F. Mc Clendon, *Die Bestimmung der Wasserstoffzahl des Harns mit 4-Nitro-6-aminoguanajacol*. (Vgl. Journ. Biol. Chem. 59. 437; C. 1924. II. 694.) 4-Nitro-6-aminoguanajacol zeigt bei $pH = 0-4,5$ gelbe, von 4,5—8 Orangefarbe von steigender Intensität, eignet sich gut zu colorimetr. Best. der aktuellen Acidität des Harns. (Proc. of the soc. f. exp. biol. and med. 21. 348. Minneapolis, Univ. of Minnesota Ber. ges. Physiol. 28. 276. 1924. Ref. SCHMITZ.) SPIEGEL.

Guy E. Youngburg, George W. Pucher und Harold A. Day, *Analytische Methoden und Beobachtungen über den organischen Phosphor des Harns*. Nach Besprechung der vorhandenen Methoden entscheiden Vff. sich für diejenige von BE-

DOISY (Journ. Biol. Chem. **44**. 55; C. **1921**. II. 60) nach Fällung der anorgan. Phosphate mit Mg-Mischung. Dem Aufschließungsgemisch von H_2SO_4 u. HNO_3 wird noch CuSO_4 zugefügt, wodurch das Verf. beschleunigt u. infolgedessen auch Verlust an P durch Verflüchtigung vermindert wird. — Mit diesem Verf. angestellte Unterss. ergaben bei n. Menschen erhebliche zeitliche Schwankungen des geschiedenen organ. P. Auch die Ausscheidung pro kg Körpergewicht in 24 Stdn. ist nicht konstant. Sie schwankte bei den untersuchten 12 Personen zwischen 0,9 u. 0,187 mg bei einem Durchschnitt von 0,131 mg. Das Harnvol. ist darauf geringem Einfluß. (Journ. Biol. Chem. **62**. 31—44. 1924. Buffalo, Univ. of Buffalo Med. School; Buffalo Gen. Hosp.)

SPIEGEL.

Heinrich Citron, *Über Harnzuckerbestimmung*. Beschreibung u. Abbildung des App. zur Harnzuckerbest., im wesentlichen aus einer Art Gärungssaccharometer mit eingehengtem Aräometer bestehend. (Herst. RICHARD KALLMEYER, Berlin.) Der Zucker Gehalt kann an der Spindel des *Dextrometer* genannten App. nach 4 Stdn. auf $\frac{1}{10}\%$ genau abgelesen werden. (Dtsch. med. Wchschr. **50**. 1606—07. 1924. Berlin, Kaiser WILHELM-Inst. f. experim. Therapie.)

FRANK.

K. Seiler, *Einiges über quantitative Zuckerbestimmungsmethoden unter Verwendung von Reagenstabletten*. Geprüft wurde zunächst die von ZÜLZER modifizierte Titationsmethode von GERARD-WILLIAMSON, unter Anwendung der Reagenstabletten von BORROUGHS-WELCOME & Cie., London. Das Verf. beruht auf falschen Voraussetzungen über die notwendige Menge CuSO_4 , so daß entweder die Dosierung der Tabletten geändert werden muß, oder die Berechnung bei Verwendung ca. 10% Glucoselsg. nach der Beziehung: „1 Cu-Tablette entspricht 4,58 mg Glucose“ unzulänglich ist. — Das Mercksche Zuckerbest.-Verf. gibt gute Resultate bei Verwendung einer Anzahl von Tablettenpaaren zu einer Titration. Die Notwendigkeit der Filtration, sowie das Hinzufügen einer bestimmten Mengen Glucose zu stark reduzierender Lsgg. stellt einen Übelstand dar. Die Art der techn. Herst. der Tabletten, die die Gründlichkeit der Ausarbeitung des Merckschen Verf., vereinigt mit dem einfachen Titrationsprinzip von ZÜLZER, müßte ein für prakt. Zwecke fast jedes Verf. zur Best. des Zuckers ergeben. (Schweiz. Apoth.-Ztg. **62**. 635—37. 1924. Bern.)

DIETZE.

Opitz und Brehme, *Ein Urobilinometer. Bemerkung zu der Arbeit von Tützer u. Adler*. Vff. wenden sich gegen die Angabe von TÜTZER u. ADLER (Klin. Wchschr. **3**. 1318; C. **1924**. II. 1966), daß sie die Brauchbarkeit der Adlerschen Methode zur Best. von Urobilin anerkannt hätten. Sie haben vielmehr (Klin. Wchschr. **2**. 1269; C. **1923**. IV. 522) gegen die Methodik Bedenken geäußert u. in ausführlichen Veröffentlichung (Ztschr. f. d. ges. exp. Medizin **41**. 681; C. **1924**. I. 17) eingehender begründet. (Klin. Wchschr. **3**. 2101. 1924.)

SPIEGEL.

A. Adler, *Erwiderung auf die vorstehende Bemerkung von Opitz und Brehme*. Die Bedenken von OPITZ u. BREHME werden erörtert. Unterss. zur Aufklärung der Differenzen sind noch nicht abgeschlossen. (Klin. Wchschr. **3**. 2101—2. 1924.)

P. N. van Eck, *Quantitative Bestimmung von Blut in Faeces*. Die mit BaCl_2 + H_2O_2 entstehende Blaufärbung war nicht haltbar in: Aceton, Essigäther, Amylalkohol, Bzl., Chlf., Glycerin, CCl_4 , Toluol, konz. Lsg. von Dextrose, Milchzucker, Arabinose, Maltose, wohl in Lsg. von Saccharose, Glucose, Oxal- u. Weinsäure u. Mannit. Letztere sind jedoch aus prakt. Gründen zur colorimetr. Best. ungeeignet. Salze, besonders Chloride, Sulfate, Nitrate, weniger Phosphate u. organ. Säuren, stören. Folgendes Verf. liefert einigermaßen quantitative Ergebnisse: 1 g. Faeces mit 5 cem Eg. kneten, abgießen, zweimal mit 5 cem Eg. nachbehandeln, ausdrücken. Der Auszug + 10 cem W. wird fast neutralisiert, dreimal mit 10 m Ä. ausgeschüttelt, verdampft, Rückstand mit 1 cem Benzidin-Eg. verrühren, 10 Tropfen H_2O_2 zusetzen, stehen lassen bis blaue Farbe in weinrote übergegangen,

25 ccm Spiritus + 50 ccm 5%ig. NaOH zusetzen, mit Färbung von bekannt Blutlg. vergleichen. (Pharm. Weekblad 61. 1318—25. 1924. Utrecht, Centraal Lab.)

GROSZFELD.

Th. Hausmann, *Zur Frage der Extraktion des Urobilins aus den Fäzes*. V empfiehlt die Extraktion des Kotes mit verd. HCl u. 2%ig. CuSO_4 -Lsg. I. Extrakt wird mit CHCl_3 extrahiert, das CHCl_3 verdunsten gelassen u. der Rückstand in A. gel. Die urobilinfarbene, das Urobilinspektrum zeigende Lsg. enthält das reine Urobilin ohne andere Beimengungen. Unter anderem gehen keine anderen Pyrrolstoffe (Indol) in die Lsg. über. (Münch. med. Wchschr. 71. 1678—1924. Moskau, Univ.)

FRANK

Hugo Kämmerer, *Über das durch Darmbakterien gebildete Porphyrin und die Bedeutung der Porphyrinprobe für die Beurteilung der Darmfäulnis*. (Unter Mitwirkung von **Hans Götz**, **Josef Mühlbauer** und **Eugen Lederer**.) Nach Zusatz von etwas menschlicher Stuhlaufschwemmung zu alkal. Blutbouillon entsteht sehr häufig nach 2—6 Tagen ein Porphyrin. Optimale Rk. für diese bei saurer Lsg. ausbleibende B. ist $\text{pH} = \text{ca. } 7,0-7,3$. Das wirksame Agens läßt sich in Blutbouillon u. auch in gewöhnlicher Nährbouillon anscheinend fast unbegrenzt kultivieren u. verträgt Siedetemp. während einiger Min. Es können danach nur sporadische Bakterien in Betracht kommen, hauptsächlich obligat anaerobe von Art *B. putrificus*, die aber noch synerget. Mitwrkg. von Hilfsbakterien brauchen. Mikroflora von n. Herbivoren- u. n. menschlichen Säuglingsstühlen bildet aus Blut kein Porphyrin. Die Stärke seiner B. geht nicht parallel mit der Stärke der B. von Indikanstuhllindol- H_2S oder Stuhl- NH_3 , die auch nicht durch die obligatanaerobe Eiweißspalter erfolgt. Sie kann zur Beurteilung der Darmfäulnisvorgänge verwendet werden. Galle hemmt die B. des Porphyrins sehr stark, wobei die Säure der Taurocholsäure u. Glykocholsäure wirksam sind, Zucker ebenfalls, offenbar wegen des dann eintretenden Übergewichtes der Gärungserreger im Bakterienmischg. Rohr- u. Milchezucker hemmen stärker als Traubenzucker. — Mit der näher beschriebenen Darmfäulnisprobe läßt sich auch die Einw. von Darmantiseptics u. anderen Chemikalien auf die Darmfäulnis untersuchen. (Dtsch. Arch. klin. Med. 145. 257—84. 1924. München, 2. Med. Klin.)

SPIEGEL

Olaf Bergeim, *Darmchemie. I. Die Bestimmung der Reduktionen im Darm*. Es wird den Versuchstieren (weißen Ratten) Eisenoxydhydrat, in der Nahrung gleichmäßig verteilt, zugeführt. Nach gewünschter Zeit wird Kot gesammelt, 0 g davon mit verd. HCl auf dem Wasserbade so lange erwärmt, wie zur Lsg. des verwendeten Fe-Präparates erforderlich ist (nötigenfalls unter Zusatz von Tierkohle). Gleiche Mengen des nach Abkühlen erhaltenen Filtrats werden in 2 Meßzylinder von je 25 ccm gebracht, das eine mit KMnO_4 -Lsg. bis zu 1 Min. bestehender Rötung versetzt, dann beide mit gleichen Mengen KCNS-Lsg., auf gleiches Volumen aufgefüllt u. im Colorimeter verglichen. Man findet so die Menge von reduziertem Fe^{III} u. damit einen quantitativen Wert für die reduzierenden Vorgänge im Darm. (Journ. Biol. Chem. 62. 45—48. 1924. Chicago, Univ. of Illinois.)

SPIEGEL

Henry Briggs, *Ein Apparat zur Erleichterung der Anwendung einer Sauerstoff-kohlenstoffdioxidmischung bei der Behandlung der Kohlenoxydvergiftung*. Beschreibung u. Abb. eines tragbaren App. für die Zuführung des Gemisches von O_2 mit ca. 5% CO_2 , das HENDERSON u. HAGGARD für Bekämpfung der CO-Vergiftung empfohlen haben u. dessen Überlegenheit über reinen O_2 Vf. bestätigt. (Proc. Roy. Soc. Edinburgh 44. 202—5. 1924.)

SPIEGEL

F. Verzář, **B. Vášárhelyi** und **V. Szányi**, *Die Verwendung des Kompensationsmanometers zur klinischen Laboratoriumsdiagnostik*. Mit einem Barcroftschens Differentialmanometer, an dem eine 0,3 ccm-Pipette angebracht ist, kann man O_2 -Gesättigung u. CO_2 -Gehalt des Capillarbluts (aus der Fingerbeere) relativ leicht

bestimmen. — Der App. kann auch zur *Harnstoffbest.* in Blut u. Harn, u. zur Wertbest. von Organpräparaten (Steigerung des O_2 -Verbrauchs von zerschnittenem Froschherz) benutzt werden. (Klin. Wehschr. 3. 1955—59. 1924. Debreczen.) MÜLLER.

Hans Pollitzer und **Ernst Stolz**, *Über eine Novasurolprobe zum Nachweis des Abflusses der Leber auf den Wasserhaushalt.* Der n. genährte menschliche Organismus, in dem alle den W.-Haushalt bestimmenden Faktoren intakt sind, verfügt über ein Quantum von überschüssigem W. (+ NaCl), das im Laufe von 24 Stdn. zum Ausgleich von Einww. der Außenwelt jederzeit verfügbar ist u. auf diuret. Reize abgegeben werden kann, ohne daß ein Nachschub von außen durch Durst eingeleitet werden muß. Der Spiegelstand dieses von Vff. als „Residualwasser“ bezeichneten W. ist ceteris paribus für die Konst. des Individuums charakterist. Er kann bestimmt werden durch die Gewichtsabnahme, die nach intramuskulärer Injektion von 2 cem 10%ig. Novasurolsg. in 24 Stdn. erfolgt, bei n. Menschen bis 500—600 g, gelegentlich auch bis 1000 g; bei den verschiedenen Ikterusformen, Gallenstauung bei Cholelithiasis u. den sie begleitenden entzündlichen Prozessen steigt der Wert auf 1000—3500 g, was Vff. auf einen funktionell-entzündlichen Reizzustand der Pickschen Sperrvorr. der Lebervenen zurückführen. Ähnliches gilt sich vielleicht bei latenter „Hilustuberkulose“, wo auch ein abnormer Hochstand des Residualwassers beobachtet wurde. (Klin. Wehschr. 3. 2 Seiten. 1924. Wien, Univ.; Sep.)

SPIEGEL.

Carl Voegtlin, J. M. Johnson und **Helen A. Dyer**, *Quantitative Bestimmung der reduzierenden Kraft von normalem und Krebsgewebe.* Mittels Oxydations- u. Reduktionsindikatoren kann die reduzierende Kraft von Geweben u. Körperfl. bestimmt werden. Man bestimmt hierzu die Reduktionszeit äquimolekularer Mengen verschiedener reduzierender Farbstoffe unter standardisierten anaeroben Bedingungen. Diese Reduktionszeit steigt angenähert logarithm. mit einem arithmet. Anstieg der Farbstoffkonz. Unter solchen Bedingungen fällt die Reduktionszeit der verschiedenen Indikatoren mit einem Anstieg des elektr. Potentials der Indikatoren überein, wenn die Indikatoren derart biol. bestimmt werden, so ordnen sie sich ebenso wie bei rein physikal. Elektrodenmessungen, d. h. *Indigodisulfonat*, *Indigotetrasulfonat*, *Methylenblau*, *Indophenol-1-naphthol-2-sulfonsäure*, *Indophenol-2,6-Bromphenol*, *Indophenol-m-Bromphenol*. Der letztgenannte Indicator ist, soweit bekannt, der empfindlichste zur Erkennung der reduzierenden Kraft von Geweben u. biol. Fl. Alle untersuchten Gewebsarten mit Ausnahme des nekrot. Teiles von Carcinomen haben eine reduzierende Kraft, die mit der Art des Gewebes wechselt; Niere, Leber u. Milz haben die stärkste reduzierende Kraft, Blutplasma u. Serum keine, soweit sie mit dieser Methode bestimmt werden kann, ebenso der nekrot. Teil von Carcinomgewebe, während der lebende Teil des Tumors wenigstens so schnell wie das Gewebe reduzierend einwirkt. (Journ. Pharm. and Exp. Therapeutics 24. 305—334. 1924. U. S. Publ. Health Serv.)

WOLFF.

Otto Rehm, *Kolloidreaktionen in den Körperflüssigkeiten (Blut, Liquor, Harn).* In Blut, Liquor cerebrospinalis u. Blutserum zeigen nach Ausschüttelung Schaumbildung als Eigenschaft der ihnen zugehörigen Kolloide. Das häufig auf der Oberfläche entstehende Häutchen enthält gehäuft die in den Körperfl. enthaltenen Elemente. Der feinmaschige Schaum, dessen Entstehung durch die Anwesenheit von Eiweiß in der Schüttelfl. begünstigt wird, fördert die B. u. Stärke eines Häutchens. Hochgestellter Harn sowie Beimengung von Blut u. Eiweiß begünstigen die Schaumbildung. Das ausgeschüttelte, unter der Grenzfläche befindliche Blutserum der Paralytiker weist mit großer Konstanz positive Pandysche Rk. (1 Teil d. carbolic. crist. in 15 Teilen W. gel. + 1 Tropfen der zu untersuchenden Fl.) auf positive Kochprobe auf. Häufig zeigten diese Rk. Fälle von Lues latens, selten solche von Dementia praecox u. von Arteriosklerose. Funktionelle Erkrankungen,

wie man.-melanchol. Irresein haben negative Schüttelrkk. Die Rk. bei den l. Erkrankungen ist auf Prodd. des luet. Prozesses zurückzuführen, die bei Arteriosklerose vielleicht auf die den Gefäßgeschwüren entstammenden Eiweißkörper (Münch. med. Wchschr. **71**. 1793—95. 1924. Bremen-Ellen, St. Jürgen-Asyl.) FRAN

E. Manoïlow, *Weitere Erfahrungen über meine chemische Blutreaktion zur Geschlechtsbestimmung bei Menschen, Tieren und durch Chlorophyll bei Pflanzen.* I. scheidung einer Reihe von Methoden n. Verss., um mittels chem. Rkk. männlich von weiblichem Blute zu unterscheiden. Die Verf. beruhen auf der Annahme spezif. männlicher bzw. weiblicher Hormone im Blut. Näheres vgl. Origin. (Münch. med. Wchschr. **71**. 1784—89. 1924. Petersburg.) FRANK

E. Rothlin, *Zur Methodik des pharmakologischen Nachweises von Belladonnaalkaloiden.* Am Kaninchen wird im Blutdruckvers. der Vagus durch Elektroreiz gereizt, der Blutdruckabfall bestimmt, dann nach Atropinisierung oder Injektion von Belladonnapräparaten der Vers. wiederholt u. die Zeit bis zur Beendigung der Vaguslähmung bestimmt. *Bellafolin Sandoz* erwies sich in diesen Verss. als doppelt so wirksam wie *Atropinsulfat*. (PFLÜGERS Arch. d. Physiol. **206**. 614—28. 1924. Basel, Chem. Fabr. vorm. SANDOZ.) WOLFF

Emile Luce, *Bemerkung über die Analyse von Bismutum subnitricum.* Vorgesprochen wird folgendes Verf.: 1. Man bestimmt H_2O , indem man 5 g Wismutsubnitrat im Trockenschrank 6 Stdn. auf 110° erwärmt; 2. das Oxyd durch Calcinieren von 1 g anhydr. Salz; 3. die HNO_3 , indem man 0,5 g anhydr. Salz in einen kleinen kon. Kolben mit 10 cem möglichst carbonatfreier n. NaOH u. 10 cem dest. W. am Rückflußkühler $\frac{1}{2}$ Stde. zum gelinden Sieden erhitzt; dann filtriert man, wäscht, bis W. neutral gegen Phthalein, titriert den NaOH-Überschuß in Gg. von Phthalein mit n cem n. H_2SO_4 (oder $\frac{1}{2}$ -n. H_2SO_4) u. drückt das Resultat auf N_2O_5 in % aus $(10 - n) \times 0,054 \times 200$. (Journ. Pharm. et Chim. [7] **30**. 310—1924.) DIETZE

Hoffmann, *Ein Vorschlag zur Änderung der Nomenklatur des Deutschen Arzneibuchs.* Zur Verhütung von Verwechslungen von Seiten der Ärzte sind Namensänderungen nötig, wodurch folgenschwere Irrtümer, z. B. zwischen Kaliumchloratum = Kaliumchlorid = KCl u. Kaliumchlorat = Kalium chloricum = $KClO_3$ ausgeschlossen werden sollen. Vf. schlägt vor: als „Namen im D. A. B.“ Kalium chloridum KCl, Kalium sulfatum K_2SO_4 , Kalium nitratum KNO_3 , Kalium nitritum KNO_2 usw., als abgekürzte Namen auf Standgefäßen Kal. chlorid., K. sulfat., Kal. nitrat., Kal. nitrit. u. als „Deutsche Namen“ Kaliumchlorid, -sulfat, -nitrat, -nitrit usw. zu wählen. In einer Liste werden etwa 143 weitere Vorschläge zur Änderung der Namen gemacht. (Apoth.-Ztg. **39**. 1428—30. 1924. Goldbeck (Schles.) DIETZE

Edward E. Swanson, *Die Auswertung von Hypophysenextrakt nach der o. toxischen Methode und Beschreibung eines Apparates zur Regelung der Temperatur.* Es wird ein App. beschrieben, der mehrere Verss. an isolierten Uterusstreifen gleichzeitig unter genauer Einhaltung konstanter Temp., die für die Ausschüttung von großer Bedeutung ist, auszuführen erlaubt. Empfohlen wird Lsg. aus 3 g NaCl, 0,42 g KCl, 0,24 g $CaCl_2$, 0,5 g $NaHCO_3$, 0,5 g Dextrose, 0,005 g $MgCl_2$, etc. von höchster Reinheit, auf 1 l dest. W. Als Vergleichssubstanz ist Histamin wegen kürzerer Latenzzeit u. qualitativ etwas abweichender Kurve nicht ideal, aber besser als KCl, am besten getrocknetes, gelegentlich gegen Histamin ausgewertetes Hintlappenpulver. (Journ. of laborat. and clin. med. **9**. 334—45. Indianapolis, Lilly res. lab.; Ber. ges. Physiol. **27**. 235. 1924. Ref. FROMHERZ.) SPIEGEL

Naamlouze Vennootschap Philips' Gloeilampenfabrieken, Eindhoven, Holland, *Thermometer.* Bei Glas- oder Flüssigkeitsthermometern ist die Kugel-

ebenfalls ein Teil der Capillarröhre aus einer Chromeisenlegierung, der Rest aus Glas gefertigt. Die Zus. der Legierung ist so gewählt, daß ihr Ausdehnungskoeffizient gleich dem des Glases ist. (E. P. 222 112 vom 8/9. 1924, Auszug veröff. 21. 1924. Prior. 20/9. 1923.)

KÜHLING.

Richard von Dallwitz-Wegner, Neckargemünd, *Bestimmung der Viscosität von Flüssigkeiten unter ununterbrochener und voneinander verschiedenartiger Zuströmung der Flüssigkeit zu bzw. aus der Meßbüchse*, 1. dad. gek., daß der hierbei zur Meßbüchse sich einstellende Druck ermittelt u. als Maß für die Viscosität der Fl. benutzt wird. — 2. Vorr. zur Ausführung des Verf. gemäß Anspruch 1, bestehend aus einer mit Wärmemesser versehenen Meßbüchse, die sich in einem Wärmeregler ausgestatteten Flüssigkeitsbad befindet u. verschieden große Einstromöffnungen für die Versuchsfl. aufweist, dad. gek., daß in der Meßbüchse ein Standrohr angeordnet ist, an dessen Skala der Stand der in ersterem herrschend dem in der Meßbüchse herrschenden Druck emporsteigenden Versuchsfl. bzw. deren Viscosität abgelesen werden kann. — Eine Registriervorr. zeichnet den Druck- u. Temperaturverlauf automat. auf. (D. R. P. 405 090 Kl. 42i vom 24/1. 1924, ausg. 27/10. 1924.)

KÜHLING.

Hugo Drotschmann, Zürich, *Optisches Pyrometer mit im Abstand voneinander angeordneten Schaugläsern*, deren eines an einem Beobachtungsrohr sitzt, welches in einen Hohlraum verschiebbar ist, der eine die einfallenden Strahlen absorbierende Substanz enthält, 1. dad. gek., daß durch ein das Beobachtungsrohr übergreifendes Füllrohr welches seitliche Durchtrittsöffnungen für die Absorptionsfl. aufweist u. durch ein das Schauglas tragenden Stopfen verschlossen ist, ein Luftraum gebildet ist, welcher größer ist als der Verdrängungsraum des in der M. beweglichen Beobachtungsrohres. — 2. dad. gek., daß der Stopfen bis zu den seitlichen Öffnungen des Füllrohres in den Messer hineinragt u. eine Entlüftungsnut besitzt. — Die Erzeugung eines strahlenden Glühkörpers geschieht in bekannter Weise u. die Lichtstrahlen werden bis zum vollständig schwarzen Bilde verdunkelt. Dann ist die mittlere Temp. auf einer Skala abzulesen. (D. R. P. 404 807 Kl. 42i vom 11/3. 1924, ausg. 23/10. 1924.)

KÜHLING.

Reiniger, Gebbert & Schall A.-G., Erlangen, *Quantitative Analyse mittels des Röntgen- oder ähnliche Strahlen von der zu untersuchenden Substanz erzeugten Absorptionsspektrums*, dad. gek., daß an dem zweckmäßig unter Vermeidung von Störungen höherer Ordnung an der Untersuchungsstelle der Absorptionsbanden erzeugten Absorptionsspektrum das Verhältnis der Strahlenintensität auf den beiden Seiten der dem zu bestimmenden Element entsprechenden Absorptionsbandenkante durch Messung ermittelt u. daraus u. aus der Best. des Gewichtes u. der durchstrahlten Oberfläche des Probekörpers der Gewichtsanteil des fraglichen Elementes berechnet wird. — Bei der benutzten Vorr. sind die Strahlenempfänger oder Strahlenmeßgeräte für die von dem zur Erzeugung des Röntgenstrahlenapparates dienenden Krystall zerlegten u. durch den zu untersuchenden Stoff geleiteten Strahlen um den Krystall in gleichem Abstand angeordnet u. drehbar. (D. R. P. 404 808 Kl. 42i vom 15/4. 1923, ausg. 21/10. 1924.)

KÜHLING.

Peter Wulff, Dessau, *Hilfsmittel für colorimetrische Bestimmungen gelöster organischer Verbindungen oder Ionen*, bestehend aus Indicatoren oder Reagentien in dünnen Schichten lichtdurchlässiger Gele, welche die Fähigkeit haben, auf zu quellen u. für wss. Lsgg. durchlässig zu sein. — Gegenüber den bekannten Indicatorpapieren werden klarere u. reinere Farbtöne erzielt, das Auslaufen der zu untersuchenden Lsg. fällt fort u. es können Aufschwemmungen u. trübe Flüssigkeiten untersucht werden. (D. R. P. 405 091 Kl. 42i vom 23/10. 1923, ausg. 27/10. 1924.)

KÜHLING.

Edmund Graefe, Dresden, *Calorimeter mit von dem Kühlmittel umspülten, den Verbrennungsgasen von oben nach unten durchströmten Abkühlungskammer*, dad. gek., daß in den übereinander angeordneten u. von den Verbrennungsgasen nacheinander von unten nach oben durchflossenen Kühlkammern durch gelockert mit nach unten eingedrücktem Deckel versehene Zwischenwände die Verbrennungsgase von oben nach unten so geführt werden, daß nur die kältesten Gase abziehen u. der nächsten Kühlkammer zuströmen können. — Die Hintereinanderschaltung der Kühlzellen ermöglicht die Verringerung der Kühlfläche. (D. R. P. 403887 Kl. 42i vom 6/3. 1924, ausg. 9/10. 1924.) KÜHLIN

Adolf Dosch, Charlottenburg, *Einrichtung zur Bestimmung des spezifischen Gewichtes von Gasen und zur Analyse von Gasgemischen* nach Patent 387404, 1. dad. gek., daß sich 2 oder mehrere der zum Ansaugen des Gases dienenden Ausflußrohre in einer gemeinsamen Kammer vereinigen. — 2. dad. gek., daß die gemeinsame Kammer, in welche die Ausflußrohre münden, senkrecht verschiebbar um eine Umdrehungsachse angeordnet ist, damit sich die gemeinsame Ausströmöffnung in einer veränderlicher Tourenzahl der Umdrehungsachse in eine solche Entfernung von dieser einstellt, daß bei gleichbleibender D. der gemessenen Gase der in der Schleudervorr. erzielte Gasdruck u. dadurch das Meßergebnis auch bei veränderlicher Tourenzahl unverändert bleibt. — Die bei der Vorr. gemäß dem Hauptpatent bestehende Notwendigkeit, die Öffnungen der Ausflußrohre für verschiedene Gasarten in genau gleicher Form auszuführen u. die Entfernung der Rohroffnungen von der Umdrehungsachse auf genau gleiches Maß einzustellen, wird vermieden. (D. R. P. 405886 Kl. 42i vom 28/9. 1923, ausg. 12/11. 1924. Zus. zu D. R. P. 387404 C. 1924. I. 949.) KÜHLIN

Mono G. m. b. H., Hamburg, *Einrichtung zur Gasanalyse unter Bewegung der Absorptionsflüssigkeit im Kreislauf durch den Apparat*, dad. gek., daß in diesen Vorr. eingeschaltet ist, durch die die Absorptionsfl. regeneriert wird, wobei der Flüssigkeitsfluß erforderlichenfalls geregelt werden kann. — In der eingeschalteten Vorr. wird durch Absorption von CO_2 entstandenes Alkalicarbonat mittels $\text{Ca}(\text{Cl})_2$ in Ätzkalkali zurückverwandelt. (D. R. P. 405887 Kl. 42i vom 16/10. 1923, ausg. 11/11. 1924.) KÜHLIN

Otto Wendler, Köln a. Rh., *Gasabsorptionsgefäß, dessen oberer als Absorptionsraum dienender Teil nach unten sich trichterartig verengt* u. hier von dem als Absorptionsraum für die Absorptionsfl. dienenden unteren Teil des Gefäßes umgeben ist, dad. gek., daß der Boden des Gefäßes unterhalb des nicht bis an ihn heranreichenden Trichterhalses in diesen bis in die Nähe des unteren Endes des Gaszuführungsrohres hineingestülpt u. in seinem obersten Teil entweder konvex oder konkav ausgebildet ist. — Es wird eine Zerteilung des zu absorbierenden Gases in kleine Bläschen erzielt. (D. R. P. 404316 Kl. 42i vom 19/5. 1923, ausg. 11/10. 1924.) KÜHLIN

Willi Kunze, Bremen, *Nachweis und quantitative Analyse von Gasen aus der Tonhöhe eines oder mehrerer mit dem zu bestimmenden Medium gefüllter und elektrisch zu Schallschwingungen erregter Resonatoren*, 1. dad. gek., daß die Schwingungen sich durch akust. Rückkopplung mittels der Resonatoren selbständig aufrechterhalten. — 2. Vorr. zur Ausübung des Verf. gemäß Anspruch 1, gek. durch die Kombination eines Mikrophon-Telephon-Summerkreises u. eines mit dem zu analysierenden Gase gefüllten Resonators, dessen Eigenton dem Summerkreise aufgegeben wird. — Die Tonhöhensteigerung gibt das Maß ab für den Prozentgehalt des Gases in der Luft beigemischten Gases. (D. R. P. 404809 Kl. 42i vom 8/5. 1923, ausg. 21/10. 1924.) KÜHLIN

H. Angewandte Chemie.

I. Allgemeine chemische Technologie.

Josef PirkI, *Bedeutung und Aussichten der Luftvorwärmung für die Dampferzeugung*. Betriebstechn. Ausführungen an Hand zahlreicher Abbildungen u. Schaubildern. Die Vorwärmung der Verbrennungsluft bei Kesseln heutiger Art u. Güte erlaubt eine Ersparnis an Brennstoff von 10—20% u. eine wesentliche Steigerung der Dampfleistung ohne Schädigung der Wirtschaftlichkeit. (Ztschr. Zuckerind. d. čechoslovak. Rep. **49**. 73—78. 81—85. 1924. Prag-Smichow.) RHLE.

—, *Thompson-Säurepumpe*. Die Brown Rheostat & Supply Company, 9 West Park avenue, Chicago, Ill., bringt eine neue Säurepumpe zum Abfüllen von Säuren aus Ballons in Flaschen in den Handel. Sie enthält keine Glasteile, die brechen können. (Metal Ind. [New York] **22**. 459. 1924.) WILKE.

S. G. Ure, *Brechen und Mahlen*. I. Teil. Es werden zunächst die zum Vorhergehen benutzten Zerkleinerungsmaschinen an Hand zahlreicher Abbildungen nach ihrer Einrichtung u. Wirksamkeit besprochen. (Chemistry and Ind. **43**. 1144—52. 1924.) RHLE.

Hugh Griffiths, *Die Technologie des Krystallisierens. Neuere Entwicklungen der mechanischen Verfahren*. Zusammenfassende Erörterung bei Gelegenheit eines Vortrages. Vf. bespricht die Eigenschaften krystallisierender Lsgg., die Zwecke, die beim Krystallisieren verfolgt werden, das wachsende Verlangen nach gleichmässiger Größe u. App. zur Erzielung von Krystallen von beliebiger u. von gleichmässiger Größe. (Chem. Trade Journ. **75**. 486—88. 1924.) RÜHLE.

Tadeusz Kuczynski, Lwow, Polen, *Trennung von Emulsionen und zur Vermeidung der Bildung beständiger Emulsionen*, 1. dad. gek., daß die Emulsionen oder zur Emulsionsbildung neigenden Stoffe mit kleinen Mengen von bei der trockenen Destillation von bituminösen Körpern sich bildenden Stoffen versetzt werden, z. B. mit phenolhaltigen Teeren oder über 150° sd. Teerbestandteilen, wie Phenolen, Kresolen, Xylenolen, Polyphenolen bezw. Anilin u. dessen Homologen oder Gemischen dieser Körper. — 2. dad. gek., daß die Phenole oder Amine nach ihrer teilweisen oder vollständigen Sulfonierung, Nitrierung oder Halogenisierung zur Anwendung gelangen. (D. R. P. **406818** Kl. 12d vom 29/3. 1923, ausg. 29/11. 1924. Poln. Prior. 1922. u. 21/11. 1922.) KAUSCH.

Karl Wård und Albert Wård, Stockholm, *Trennschleuder mit Tellereinsätzen*. In einem feststehenden mit Fl. angefüllten Gehäuse, dad. gek., daß die Zuführungsteile für das zu trennende Gut in der Mitte der Ringflächen der Teller münden, wo die getrennte Fl. nach innen durch das mittlere Rohr abgeleitet u. der schwerere Teil durch die Füllflüssigkeit nach außen in das Gehäuse abgeschleudert wird. — Die Wrkg. der Schleuder wird wesentlich verbessert. (D. R. P. **401360** vom 25/6. 1920, ausg. 10/9. 1924. Schwed. Prior. 28/4. 1917.) OELKER.

Ferdinand Krämer, Neukölln, *Trennung von Flüssigkeitsgemischen*, deren Festbestandteile bei verschiedenen Tempp. siedend u. bei welchem durch das Flüssigkeitsgemisch das entsprechende Dampfgemisch hindurchgeleitet wird, 1. dad. gek., daß Flüssigkeitsgemisch u. Dampfgemisch periodisch unter Druck gesetzt werden, wodurch eine Kondensierung des Dampfgemisches eintritt u. darauf bei nachfolgender Entspannung vom Druck eine Wiederverdampfung. — 2. dad. gek., daß das Dampfgemisch durch das Flüssigkeitsgemisch unter wiederholter Drucksetzung u. nachfolgender Entspannung hindurchgeleitet wird. — 3. Vorrr., gek., daß Kreiselsräder oder Strahlapp., durch die das Flüssigkeitsgemisch u. das Dampfgemisch angesaugt u. durch Ausschleudern in einem Stauraum verdichtet werden.

— 5. Verf. zur Absorption von Gasen durch Fl., dad. gek., daß die zu absorbierenden Gase unter wiederholter Druckerhöhung u. nachfolgender Entspannung durch die Fl. hindurchgeleitet werden. (D. R. P. 406912 Kl. 12a vom 23/12. 1924, ausg. 5/12. 1924.) KAUSCH

C. A. Brackelsberg, Hemer i. W., *Gasentwicklungsapparat* nach D. R. P. 404712 dad. gek., daß die Absperrung der reagierenden Fl. durch eine im oberen Rande des Gefäßes eingeschliffene Glocke, die in die Reaktionsfl. des Gefäßes eintaucht, bewirkt wird. (D. R. P. 405310 Kl. 12g vom 12/12. 1923, ausg. 3/11. 1924, aus D. R. P. 404637; C 1925. I. 145.) KAUSCH

Fred Ernest Kling und **Luther Burdick Weidlein**, Youngstown, O., U. S. A., *Filteranordnung für die Trockenreinigung von Gasen*, welche leichter als Luft, 1. dad. gek., daß die Filter, durch welche das Gas dringen muß, sehr recht übereinanderliegende Kammern abdecken, so daß beim natürlichen Hochsteigen der Gase die schwereren der festen Bestandteile der Schwerkraft gehorchend niedersinken, ohne das nächste Filter zu berühren. — 2. dad. gek., daß jedes höher gelegene Filter eine größere Filterfläche besitzt als das nächst untere. — 3. dad. gek., daß die tiefer liegenden Filter mit Dächern überdeckt sind, so daß die in den Räumen über den Filtern niedersinkenden Teilchen in Seitenkanäle übergeführt werden u. die Filter nicht verschmutzen. (D. R. P. 406959 Kl. 12e vom 3/4. 1921, ausg. 10/12. 1924. A. Prior. 13/1. 1921.) KAUSCH

Elektrische Gasreinigungs-G. m. b. H., Charlottenburg, und **H. Rohman**, Saarbrücken, *Elektrische Gasreinigung*, dad. gek., daß die Aufladung der Staubteilchen mittels ursprünglich zweisinnig ionisierter Gase erfolgt, aus denen durch entsprechende Anordnung elektr. Felder die eine Ionenart vorher entfernt wird. (D. R. P. 407162 Kl. 12e vom 4/3. 1922, ausg. 9/12. 1924.) KAUSCH

Bruno Müller, Neukölln, *Verstärkung der Abluftströmung in Trockenräumen*, dad. gek., daß im oberen Raum des Trockenraumes mit Hilfe eines Abzugrohrs, in dessen eines Ende von außen Frischluft eintritt, welche nach Erwärmung durch die umgebende Trockenluft das Abzugrohr am anderen Ende wieder verläßt, ein kräftiger Zug erzeugt wird, der auf die aus dem Trockenraum in das Abzugrohr eintretende Abluft fördernd wirkt. — Es wird eine rasche u. kräftige Durchlüftung u. Wasserdampfableitung ohne Zuhilfenahme einer besonderen Kraftquelle erreicht, wodurch die Leistungsfähigkeit der Trockenvorr. wesentlich erhöht wird. (D. R. P. 394572 Kl. 82a vom 31/12. 1921, ausg. 29/11. 1924.) OELKE

Deutsche Patent-Wärmeschutz-Akt.-Ges., Wickede-Asseln, *Aufbereitung und Trocknung von schlammigen Rohstoffen für Wärmeschutzmittel in Drehtelleröfen*, dad. gek., daß die vorgetrockneten Schlämme dem Drehteller zugeführt u. in bekannter Weise mittels verstellbarer Schaufeln u. Schieber behandelt u. abgeführt werden, wobei die Heizgase nach Verlassen des Drehtellers durch das regelbare Fuchslabyrinth des Hauptfuchses oder unmittelbar von der Feuerung teilweise oder ganz durch einen zum Hauptfuchs führenden regelbaren Nebenfuchs zum Vertrockner abgeführt werden. — Es wird hierdurch eine dem Rohstoff u. der fortschreitenden Aufbereitung u. Trocknung in allen Teilen sich anpassende Beheizung erzielt. (D. R. P. 404902 Kl. 82a vom 25/6. 1921, ausg. 23/10. 1924.) OELKE

Büttner-Werke A.-G. Uerdingen, *Trockentrommel mit längslaufenden, nur an ihrer freien Längskante aufgebogenen Hebeblechen*, dad. gek., daß die Hebebleche mit schmalen, in kurzen Abständen aufeinander folgenden Querschlitzen versehen sind, durch die ein Teil des Trockengutes bei Drehung der Trommel hindurchfällt, so daß außer den bekannten Längsschleiern auch dünne Querschleier gebildet werden, die von den Heizgasen durchströmt werden. — Es wird eine bessere Ausnutzung der Trockengase erreicht. (D. R. P. 405830 Kl. 82a vom 30/10. 1924, ausg. 14/11. 1924.) OELKE

H. L. P. Tival und F. A. Descombes, Le Pecq, Frankreich, *Trocknen und flüssigen*. Feste u. fl. Stoffe werden zum Gefrieren gebracht, pulverisiert u. in einer Vakuumkammer, in der niedere Temp. herrscht, gebracht, u. sodann in dünner Schicht auf einem elektrisierten, endlosen Band in eine zweite auf niederer Temp. haltene Vakuumkammer eingeführt. (E. P. 222154 vom 22/9. 1924, Auszug veröff. 1. 1924. Prior. 22/9. 1923.) KAUSCH.

G. D. Fitzpatrick, Birmingham, *Trocknen poröser Stoffe*. Gelatinierende Ndd. oder kolloidale Gele werden mittels eines Öles oder dessen Dampfes in der Wärme verflüssigt. (E. P. 222279 vom 17/8. 1923, ausg. 23/10. 1924.) KAUSCH.

Hans Heppeler-Verner, Rastatt, Baden, *Wiedergewinnung der mit Beschwerungsstoffen versehenen Trennflüssigkeit aus durch sie geschiedenen Bestandteilen von Gemischen, wie Verbrennungsrückständen*, dad. gek., daß nach Abspülung der Bestandteile durch reichlich W. die erhaltene dünne Trübe einer Schleuderwrkg., etwa in einer Zentrifuge, ausgesetzt u. dadurch in an Beschwerungsstoff arme u. in an Beschwerungsstoff reiche, also schwere, wieder verwendbare Fl. getrennt wird. (D. R. P. 406199 Kl. 1a vom 9/11. 1923, ausg. 21/11. 1924.) OELKER.

Badische Anilin- & Soda-Fabrik (Erfinder: **Martin Müller-Cunradi**), Ludwigshafen a. Rh., *Fraktionierte Destillation von verflüssigten Gasgemischen*. Weitere Ausbildung des Verf. des Hauptpat. 405308, dad. gek., daß ein Teil des abdestillierten Gasabzuges u. in das noch unzerlegte, verflüssigte Gasgemisch wieder eingeleitet wird. (D. R. P. 406199 Kl. 12a vom 26/11. 1922, ausg. 20/11. 1924. Zus. 405308; C. 1925. I. 146.) KAUSCH.

Thyssen & Co., Akt.-Ges., Abt. Maschinenfabrik, Mülheim, Ruhr, *Rieselvorrichtung für Kühler, besonders Salzlaugenkühler nach Art der Kaminkühler*, mit wechselnd eingebauten Rieselböden oder Rieselstäben, dad. gek., daß über diesen an sich angeordnete, an endlosen Zugmitteln befestigte Schaber derart angeordnet sind, daß sie sowohl die oberen Rieselflächen, als auch deren Überfallkanten bearbeitet u. von den Salzanätzen befreit werden. (D. R. P. 406817 Kl. 12c vom 2/8. 1922, ausg. 4/12. 1924.) KAUSCH.

Badische Anilin- & Soda-Fabrik (Erfinder: **Alwin Mittasch und Josef W. K. K. K.**), Ludwigshafen a. Rh., *Ausführung von Oberflächenreaktionen*, insbesondere Katalysen, 1. dad. gek., daß man Massen benutzt, die durch Überführung von katalytisch wirksamen Substanzen, insbesondere Humuskohle, in Metallhumate, zweckmäßig mit nachträglicher Erhitzung, hergestellt werden. — 2. dad. gek., daß die Metallhumate vor, bei oder nach dem Erhitzen in gleicher Weise behandelt werden, wie dies bei der Herst. aktiver Kohlen aus C-haltigen Substanzen geschieht. (D. R. P. 406817 Kl. 12g vom 22/4. 1923, ausg. 3/12. 1924.) KAUSCH.

J. N. A. Sauer, Amsterdam, *Absorptionsmittel für Flüssigkeiten und Gase*. Man verwendet ein Erdalkalisalz am besten bei 80°. Der z. B. auf diese Weise erhaltene Ndd. von CaCO_3 wird mit einer Schicht von $\text{Ca}_2\text{H}_3(\text{PO}_4)_2$ durch Behandeln mit H_3PO_4 abgewaschen. Um beim Trocknen der Prodd. ein Zusammenballen zu verhindern, setzt man Tannin, Stärke, Leim, Soda oder Zucker hinzu. (E. P. 222423 vom 26/3. 1924, ausg. 23/10. 1924.) KAUSCH.

Badische Anilin- & Soda-Fabrik, Ludwigshafen a. Rh. (Erfinder: **Kurt Erdmann**, Ludwigshafen a. Rh.), *Entfernung von Metallcarbonylen aus Gasen*, dad. gek., daß man diese mit poröser Kohle behandelt, die mit Chromsäure- oder Kupfer- bezw. Bichromatlg. getränkt ist. — Die so gereinigten Gase sind völlig frei von Eisencarbonyl u. für katalyt. Zwecke, insbesondere für die Darst. von Ammoniak aus CO u. NH_3 oder von sauerstoffhaltigen organ. Verbb. aus CO u. H_2 , verwendbar. (D. R. P. 407085 Kl. 26d vom 25/11. 1923, ausg. 4/12. 1924.) OELKER.

III. Elektrotechnik.

Electric Water Sterilizer & Ozone Company, Scottsdale, Pennsylvania, übert. von: **Harry Buxton Hartman**, Scottsdale, *Ozonapparat*. In dem Apparat finden sich rohrförmige Elektroden, von denen die eine am Ende ihrer aktiven Oberfläche gegenüber der wirksamen Fläche der anderen Elektrode wesentlich zurücktritt. (A. P. 1512285 vom 2/3. 1923, ausg. 21/10. 1924.) KAUSCH

Siemens-Schuckertwerke G. m. b. H., Siemensstadt (Erfinder: **Albert Vau** Berlin-Grunewald), *Herstellung von Isolatoren*, bei denen das Isoliermittel mit elektrischen Metallteilen der Beschläge durch Gießen verbunden wird, 1. dad. gek., daß die Beschläge (Schlingen, Bügel, Klöppel, Kappen u. dgl.) zum Befestigen der Isolatoren vor dem Eingießen des Isoliermittels mit einer elast. M. bedeckt werden. — 2. dad. gek., daß als elast. M. Asbestpappe oder Asbest in breiiger Form verwendet wird, der dann getrocknet wird. — Als Isoliermittel kann Basalt, Glas o. dgl. verwendet werden. (D. R. P. 404484 Kl. 21 c vom 14/10. 1922, ausg. 18/10. 1924.) KÜHLING

Bureau d'Organisation Économique, Soc. an., Paris, *Herstellung einer undichten isolierenden Verbindung mittels Acetocellulose oder eines Phenolformaldehydkondensationsproduktes*, insbesondere zur Einführung von Elektroden in die Mullgefäße von Quecksilberdampfgleichrichtern, dad. gek., daß die sehr fl. Bindemittel unmittelbar auf die zu vereinigenden Flächen in einer Schicht von 2—4 mm aufgebracht werden, ohne in irgend einen Zwischenbehälter eingeschlossen zu sein, sodann diese Bindeschicht durch Erhitzung, ohne den Pseudokp. zu erreichen, in einer ersten teilweisen, nicht umkehrbaren Wandlung unterworfen wird, wodurch sie eine dem Kautschuk ähnliche Elastizität erhält, worauf schließlich die beiden Flächen fest gegeneinander gedrückt werden u. die Bindemittel durch erneute Erwärmung eine zweite nicht umkehrbare, völlige Wandlung erleiden, welche sie in den festen Zustand überführt. (D. R. P. 405135 Kl. 21 g vom 9/4. 1921, ausg. 29/10. 1924.) KÜHLING

Western Electric Company, Incorporated, New York, übert. von: **Carl Hocker**, East Orange, New Jersey, *Plastische Masse*. Man erhitzt gesätt. oder ungesätt. Fettsäuren, Harzsäuren oder deren Gemische mit mehrwertigen Alkoholen, Glycerin oder die Ester dieser Säuren mit mehrwertigen Alkoholen, bis eine feste Masse M. zurückbleibt; das Erhitzen kann bis zu einer geringen Verkohlung der Masse fortgesetzt werden, den Massen können Füllstoffe zugesetzt werden; das Prod. wird dann unter Druck geformt; es dient als elektr. Isoliermittel. (A. P. 1512024 vom 17/12. 1919, ausg. 21/10. 1919.) FRANK

Koholyt Akt.-Ges., Berlin, *Elektroden*. Die Haltbarkeit von Kohle- und Graphitelektroden wird durch Tränken der Elektroden mit Alkaliseifen erhöht. Das Tränken geschieht durch Eintauchen der Elektroden in die Seifenlsg. unter Vakuum u. allmähliche Steigerung des Druckes bis zu etwa 100 Atm. Die Elektroden können auch mit fetten Ölen getränkt u. diese innerhalb der Poren verseift werden, wodurch, daß die Elektroden Kathoden bei der Elektrolyse wss. Lsgg. beliebiger Alkalisalze, bzw. als Kathoden oder Anoden bei der Elektrolyse wss. Lsgg. von NaOH verwendet werden. (E. P. 221634 vom 22/8. 1923, ausg. 9/10. 1924.) ÜBER

Bergmann-Elektricitäts-Werke, Akt.-Ges., Berlin, *Graphitanode für Wasserdampfapparate, insbesondere Großgleichrichter*, 1. dad. gek., daß der Graphitkathode an dem einen Ende verdickt u. mittels dieser Verdickung in eine Metallfassung eingesetzt ist, die mit dem Stromzuführungsleiter in Verb. steht u. das verdickte Ende des Graphitkörpers fest umschließt. — 2. dad. gek., daß die Fassung aus mehreren Teilen besteht, die durch Verschraubung miteinander verbunden werden können. — Zuführungsleiter u. Fassungsteile bestehen zweckmäßig aus Fe. (D. R. P. 404644 Kl. 21 g vom 9/5. 1922, ausg. 23/10. 1924.) KÜHLING

Siemens & Halske Aktiengesellschaft, Siemensstadt, übert. von: **Martin Esenfeld**, Berlin-Charlottenburg, *Mangansuperoxydanoden*. Körnige Stoffe, wie Zement, Gips, Ton, Sand u. dgl., werden mit $\text{Mn}(\text{NO}_3)_2$ gesätt. u. das $\text{Mn}(\text{NO}_3)_2$ durch Erhitzen auf Temp. über 100° in MnO_2 verwandelt, wobei zugleich der Erzeuger abbindet; oder es werden fertige porige Platten, z. B. von Infusorienerde oder $\text{Mn}(\text{NO}_3)_2$ oder einem Gemisch von gepulvertem Manganerz u. $\text{Mn}(\text{NO}_3)_2$ befeuchtet u. erhitzt. Die Leitfähigkeit der Elektrode wird verbessert, wenn sie in Elektrolyt mit einem Überzug von PbO_2 versehen wird. Zur Stromzuleitung dient ein gezahntes Stück Kohle oder Graphit, welches von seitlichen Ausbuchtungen der Elektrode zum Teil umgriffen wird, während ein Fortsatz des mittleren Teils der Elektrode zum Teil umgeben wird. An den oberen Teilen der Zuleitung sind paraffinierte Kohlestücke befestigt, welche metall. Teile vor aufsteigendem Elektrolyten schützen. (**A. PP. 1510172 u. 1510173** vom 14/9. 1923, ausg. 10/10. 1924.)

KÜHLING.

Patent-Treuhand-Gesellschaft für elektrische Glühlampen m. b. H. (Erfinder: **Richard Jacoby**), Berlin, *Herstellung von aus langen Krystallen bestehenden röhrenlinienförmigen Wolframleuchtkörpern für elektrische Glühlampen*, bei welcher ein Draht durch eine Zone hoher Temp. hindurchgeführt wird, 1. dad. gek., daß der Draht unmittelbar anschließend an die Umwandlung in die Langkrystallstruktur während dieser Umwandlung in die Schraubenform gewunden wird. — 2. Einrichtung zur Ausführung des Verf. nach Anspruch 1, dad. gek., daß unmittelbar vor der Hochglühstrecke der zum Aufwickeln des h. Langkrystalldrahtes dienende Dorn vorgesehen ist. — Dieser Dorn kann zugleich einen Kontakt der Hochglühstrecke bilden. (**D. R. P. 404966** Kl. 21f vom 18/5. 1923, ausg. 25/10. 1924.)

KÜHLING.

Charles Jean Victor Féry, Paris, *Galvanisches Element mit positiver Elektrode aus poröser Kohle u. Luftdepolarisation*, dad. gek., daß die positive Elektrode durch einen röhrenförmigen senkrechten Körper aus gut leitender Kohle gebildet wird, der an beiden Enden offen ist u. Holzkohle in Pulverform oder sehr kleinen Stücken enthält, die durch eine am röhrenförmigen Körper befestigte, für Fl. u. G. durchlässige poröse Scheidewand (Leinwand, Porzellan o. dgl.) festgehalten ist. — Die depolarisierende Wrkg. der Holzkohle kommt in sehr vollkommenem Maße zur Geltung. (**D. R. P. 406036** Kl. 21b vom 20/1. 1923, ausg. 13/11. 1924. Prior. 27/12. 1922.)

KÜHLING.

Max Zeiler, Berlin-Treptow, *Trockenelement mit pastenförmigen Elektrolyt*, dad. gek., daß der pastenförmige Elektrolyt in den Zinkzylinder des Elements innerhalb der Kohle u. gegen diese isoliert auf einer Unterlage untergebracht ist, in deren Hilfe der Elektrolyt in den Ringraum zwischen der Kohle u. dem Zinkzylinder aufwärts gedrückt werden kann. — Das Element ist in jeder Lage verwendungsfähig. (**D. R. P. 403060** Kl. 21b vom 28/4. 1921, ausg. 9/10. 1924.) Kü.

John Ferreol Monnot, Mill Hill, England, übert. von: **Leopold Grafenberg**, Lindenthal, *Alkalische Sammler*. Lsgg., welche ein komplexes Cadmiumsalz, $\text{Cd}(\text{NH}_4)_2(\text{SO}_4)_2$ neben dem komplexen Ammoniumsalz eines anderen Metalls, $\text{Ni}(\text{NH}_4)_2(\text{SO}_4)_2$ enthalten, werden mit Eisen-, Nickel- o. dgl. -kathoden elektrolysiert, der an der Kathode abgeschiedene Metallschwamm von Zeit zu Zeit abgetrennt u. zusammen mit gegebenenfalls entstandenem $\text{Cd}(\text{OH})_2$ gewaschen, getrocknet u. als Füllmittel für die negativen Elektroden alkal. Batterien verwendet. (**D. R. P. 1509138** vom 21/5. 1923, ausg. 23/9. 1924.)

KÜHLING.

J. V. Philips' Gloeilampenfabrieken (Erfinder: **Gilles Holst** und **Ekko Verhuis**), Eindhoven, Holland, *Entladungsrohr mit Edelgasfüllung*, dad. gek., daß zur Reinigung der wasserstofffreien Edelgasfüllung eine kleine Menge P₂O₅ zugegeben ist. Die Einführung des P₂O₅ erfolgt z. B. durch Sublimation von rotem P.

(D. R. P. 404288 Kl. 21 g vom 29/12. 1920, ausg. 14/10. 1924. Holl. Prior. 1920.) KÜHLIG

Soc. an. Le Carbone, Levallois-Perret, *Herstellung von Graphitpfeßlingen*, die Gelatine als Bindemittel beigemischt ist, insbesondere von Graphitbürsten für Maschinen, dad. gek., daß man das Gemisch aus Graphit u. gel. Gelatine, nach ihm ein die Gelatine unl. machender Stoff, wie Trioxymethylen oder Formaldehyd zugesetzt worden ist, einem Wärmeprozess unterwirft, der unter der Einw. der die Gelatine zu einer hornartigen M. umbildet. — Z. B. werden 30 Teile Graphit u. 30 Teile Gelatinesg. u. 0,6 Teile Trioxymethylen verwendet. (D. R. P. 404288 Kl. 21 d vom 9/4. 1922, ausg. 17/10. 1924. F. Prior. 7/4. 1921.) KÜHLIG

V. Anorganische Industrie.

W. Althammer, *Über den Zusammenhang der graphischen Darstellung von Salzlösungen im Dreieck und im Quadrat*. Erwiderung an JÄNECKE (vgl. K. 120 272—73; C. 1924. II. 2546.) (Kali 18. 318—19. 1924.) ENSZINGER

A. J. Crowley, *Ein neues Schwefelunternehmen in Nevada*. (Engin. Min. Journ.-Press. 118. 774—76. 1924.) GOTTFRIED

Rupp, *Großtechnische Reaktionen in Wort und Bild*. Zusammenfassende Beschreibung über die Verff. zur Darst. von NH_3 u. HNO_3 aus Luft u. W., sowie Beschreibung der Anlagen in Oppau u. im Leunawerk. Angaben über die Produktion ausbeuten u. über die Zahl der in den Werken beschäftigten Chemiker u. Arbeiter. (Apoth.-Ztg. 39. 1475—76. 1924. Breslau.) DIEZEL

Rheinische Stahlwerke, Duisburg-Meiderich, *Verhütung von Explosionen bei der Sauerstoffgewinnung*, 1. dad. gek., daß die angesaugte Luft auf ihrem Wege durch die Kolonnen von schädlichen Gasen durch aktive Kohle oder glühende Asbestspiralen befreit wird. — Vorr., gek. durch die Anordnung zweier Kessel zur Aufnahme der aktiven Kohle, von denen abwechselnd der eine jeweils der Luftreinigung dient, während in dem anderen die aktive Kohle regeneriert wird. (D. R. P. 418 121 vom 15/5. 1923, ausg. 29/11. 1924.) KAUFMANN

Manufactures de Produits Chimiques du Nord Établissements Kuhlmann, Paris, *Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung von Schwefelsäureanhydrid* mittels einer Kontaktschicht, bei dem als katalyt. M. mit einer Lsg. von Vd-Salzen in einem Verhältnis von 50—55 kg Vd_2O_5 auf den cbm der M. getränkte Körner eines neutralen porösen Körpers (Bimsstein, Kieselgur o. dgl.) von 2—5 mm Korngröße Verwendung findet, 1. dad. gek., daß die Körner in verschiedenen Schichten verteilt werden, die nacheinander von den Gasen durchstrichen werden. — 2. dad. gek., daß der Katalysator geringe Mengen metallischer Oxyde (des Fe, Wo, Mo u. dgl.) zugesetzt werden. — 3. dad. gek., daß ein Teil der Mischung aus SO_2 u. Luft vor dem Durchtritt durch die M. des Katalysators leicht angefeuchtet wird. — 4. dad. gek., daß die Rk. in der Weise eingeleitet wird, daß die Gase überdies durch einen Pt-Katalysator geleitet werden. — 6. Vorr., gek. durch eine zylindr. Kammer mit einem Ringraum für das Aufsteigen der zu behandelnden Gase ergebenden Füllstoffe innerhalb dessen auf einzelnen Rosten die verschiedenen Schichten des Katalysators angeordnet sind. (D. R. P. 406864 Kl. 12i vom 29/11. 1923, ausg. 9/12. 1924.) KAUFMANN

Metallbank und Metallurgische Gesellschaft Akt.-Ges. (Erfinder: **Ed. Klencke**) Frankfurt a. M. *Konzentration von Schwefelsäure auf höhere Grad*, dad. möglichst 66° Bé, gek. durch die bekannte Benutzung der Abhitze der S_2 -Leistung zur Konz. der Säure u. die unmittelbare Verarbeitung der die Konzentration lassenden Gase auf H_2SO_4 in einem Fabrikationsgang nach dem Verfahren. (D. R. P. 398318 (C. 1924. II. 1384) (D. R. P. 406913 Kl. 12i vom 12/5. 1923 aus 1/12. 1924.) KAUFMANN

Paul Wentworth Webster, Pelham Manor und **Vern Knox Boynton**, New York, V. St. A., *Behandlung von Flüssigkeiten*. Durch Fl., wie Schlammsäure oder H₂O u. dgl., wird ein auf eine über den Kp. der Fl. liegende Temp. erhitztes G. unter feiner Verteilung durch eine poröse M. hindurch bei einer unter dem Kp. der Fl. liegenden Temp. geleitet. (D. R. P. 406865 Kl. 12i vom 30/10. 1920, 8/12. 1924. A. Prior. 20/11. 1919.) KAUSCH.

Rhenania Verein Chemischer Fabriken A.-G., Aachen, und **Fritz Projahn**, Aachen, Rhld., *Entfernung von Quecksilber und Arsen und Gewinnung von Quecksilber aus quecksilberhaltiger Schwefelsäure*, dad. gek., daß man den durch die Einw. von H₂S auf die zu reinigende Säure erhaltenen, HgS sowie elementaren Schwefel gegebenenfalls As₂S₃ enthaltenden Nd. mit Hilfe geeigneter Lösungsm. von dem HgS u. beigemengtem As₂O₃ befreit, worauf man den verbleibenden Rückstand mit geeigneten Zuschlägen, wie Ca(OH)₂ oder Fe₂O₃ der Dest. unterwirft. — Als Lösungsm. kann eine Lsg. von Ca(SH)₂ benutzt, diese nach dem Auslaugen angetrocknet u. der entwickelte H₂S zur Behandlung weiterer Mengen quecksilberhaltiger Säure verwendet werden. (D. R. P. 404928 Kl. 40a vom 4/2. 1923, 24/10. 1924.) KÜHLING.

Synthetic Ammonia & Nitrates, Ltd., Billingham, übert. von: **W. H. Knisley**, Syracuse, V. St. A., *Ammoniaksynthese*. Der Katalysator ist um eine Anzahl Röhren herum angeordnet, durch welche die eingeführten Gase strömen, bevor sie im Gegenstrom durch den Katalysator geleitet werden. Gegebenenfalls können diese Wärmeaustauschvorr. vorhanden sein, in denen die Gasmischung vor dem Eintritt in den Katalysatorraum den Gasen entgegengeleitet wird, welche vom Katalysator kommen. (E. P. 221229 vom 1/9. 1924, Auszug veröff. 29/10. 1924, 1/9. 1923.) KÜHLING.

Synthetic Ammonia & Nitrates, Ltd., Stockton-on-Tees, England, übert. von: **W. H. Knisley**, New York, *Bereitung der Gasmischung für die Ammoniaksynthese*. Wasser wird mit Dampf gemischt, das Gemisch in bekannter Weise katalyt. umgesetzt, das G. bei 10 at gepreßt, bei 0° mit W., dann mit ammoniakal. Kupferlsg., gegebenenfalls mit Natronlauge gewaschen, hierauf durch fl. NH₃ geleitet u. zum Katalysatorraum für die NH₃-Synthese geleitet. (E. P. 222137 vom 19/9. 1924, Auszug veröff. 19/10. 1924. Prior. 19/9. 1923.) KÜHLING.

Norsk Hydro-Elektrisk Kvaelfstoftaktieselskab, Kristiania, *Ammoniaksynthese*. Innerhalb des Druckbehälters angeordnete, zylindr. Katalysatorbehälter besteht aus einer größeren Anzahl übereinandergeschichteter u. durch Bolzen zusammengehaltener Ringe, welche entweder aus porigem Stoff bestehen oder gelocht sind, durch die das Gasegemisch durch die von den Ringen gebildete Wand austreten zu lassen. Die Erwärmung geschieht entweder durch einen im Innern des Katalysatorraums angeordneten Heizwiderstand oder dadurch, daß außerhalb des Katalysatorraums ein Teil der Gasmischung durch Luft unter elektr. Zündung verbrannt wird. (E. P. 221137 vom 2/9. 1924, Auszug veröff. 19/11. 1924. Prior. 28/9. 1923.) KÜHLING.

Louis Cauquil, Frankreich, *Ammoniaksynthese*. In die Katalysatoren taucht ein Rohr mit einer Fl., oder einem Metall bzw. einer Legierung, welche bei der Reaktionstemp. fl. sind, gefülltes Rohr, das mit einem zweiten Rohr verbunden ist, welches mit der gleichen Fl. gefüllt ist u. über den Katalysatorraum hinausragt. Die Gasmischung wird durch ein Schlangenrohr zugeführt, welches sich innerhalb eines Kühlfl. enthaltenden Behälters befindet, der außerdem einen in krechender Richtung beweglichen Überlauf enthält, durch dessen Bewegung die Temperatur der Kühlfl. gehoben oder gesenkt u. damit die Menge des verflüssigten Gases in einem angeschlossenen Behälter aus dem Kreislauf der Gase ausgegrenzt werden kann. NH₃ vermehrt oder vermindert wird. Dieser Überlauf wird durch ein Seil eine Rolle gelegtes Seil u. ein an diesem Seil befestigtes Gewicht im

Gleichgewicht erhalten. Die Rolle wird gedreht u. zugleich der Überlauf gehoben oder gesenkt durch ein Hebelwerk, welches unter dem Einfluß der oben erwähnten mit fl. oder f. Metall gefüllten Rohre steht. Das Hebelwerk betätigt außerdem eine elektr. Schaltvorr., welche die Umlaufgeschwindigkeit der Gasmischung regelt. Erhitzt sich der Katalysator zu stark, so sinkt die Kühlf., der Gehalt der Gasmischung an NH_3 bleibt verhältnismäßig hoch u. die Umlaufgeschwindigkeit geringer, so daß Abkühlung des Katalysators bewirkt wird u. umgekehrt. (N. P. 573761 vom 23/11. 1923, ausg. 30/6. 1924.) KÜHLG.

Soc. an. L'Air Liquide Soc. anon. pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Georges Claude, Paris, *Ammoniaksynthese*. Die Verb. von N_2 u. H_2 erfolgt bei Drucken von 400—2000 at (sogenanntem Hyperdruck), Temp. von 500—700°C, welche zunächst durch äußere Wärmezufuhr bewirkt, später bei der exothermen verlaufenden Rk. selbst erzeugt wird (die hierbei entwickelte Wärmemenge genügt, steigert die erforderliche erheblich, der Überschuß wird durch Kühlw. abgeleitet zur Dampferzeugung benutzt) u. unter Verwendung von mehreren (2—3) Katalysatoren, denen das Gasgemisch nacheinander zugeführt wird. Das entstandene Ammoniak wird nach jedem Durchgang durch ein Katalysatorgefäß mittels k. W. verdichtet u. durch ein Hahnrohr abgezogen. Zuführung frischer Gasmischung u. Kreislauf der Gase wie bei dem *Haberverf.* erfolgt nicht, nach dem Überleiten über den letzten Katalysator entweicht der nicht verbundene, gegebenenfalls an einer Vorrichtung gereicherte Gasrest ins Freie. (N. P. 38206 vom 4/5. 1920, ausg. 5/11. 1923.) KÜHLG.

Norsk Hydro-Elektrisk Kvaestofaktieselskab, Kristiania, *Katalysator für die Ammoniaksynthese*. Lsgg. von 1 Mol. eines Eisensalzes u. 0,75—0,9 Mol. einer komplexen Eisencyanalkaliverb. werden vereinigt u. die Ndd., gegebenenfalls nach Abgießen der fl. zur Trockne verdampft. Während $\text{Fe}(\text{CN})_3\text{K}_4$ als Katalysator bei 360° u. 90 at eine Ausbeute von 10 Mol.-% NH_3 liefert, gibt der nach Abgießen des Katalysators unter gleichen Bedingungen 15½—16 Mol.-%. (N. P. 38465 vom 2/12. 1922, ausg. 3/12. 1923.) KÜHLG.

Badische Anilin- & Soda-Fabrik, Ludwigshafen a. Rh. (Erfinder: Hermann Rassow, Heidelberg), *Gewinnung von Chlorammonium beim Ammoniakverfahren*, dad. gek., daß man die Bicarbonaterzeugung in Ggw. von NH_4Cl oder NaNO_3 , zweckmäßig in einer der umzusetzenden Menge NaCl mindestens äquivalenten Menge vornimmt u. nach der Bicarbonatabscheidung in bekannter Weise das NH_4Cl gewinnt, worauf die Restlauge im Kreislauf weiterverarbeitet werden kann. — Es wird ohne vorherige Abscheidung von NaCl u. ohne Tiefkühlung prakt. reines NH_4Cl gewonnen. (D. R. P. 406201 Kl. 12k vom 15/4. 1923, ausg. 14/11. 1924.) KÜHLG.

F. Ewan, Glasgow, *Alkaliamide*. Man läßt fl. wasserfreies NH_3 , das mit Alkalicyanid oder dgl. gelöst enthält auf ein Alkalimetall in Ggw. eines Katalysators einwirken. (E. P. 222718 vom 8/12. 1923, ausg. 30/10. 1924.) KAUCH.

G. Polysius Eisengießerei und Maschinenfabrik, Dessau, *Vorrichtung zum Trocknen von Glaubersalz o. dgl.* nach D. R. P. 398048, 1. gek. durch ein aus einem Salzzuführungsrohr umgebenden Schutzmantel, der derart von einem geeigneten und entsprechend vorgewärmten Wärmeschutzmittel durchflossen wird, daß die Temp. des zugeführten Salzes konstant bleibt. — 2. dad. gek., daß das aus dem Schutzmantel ausfließende Mittel in ständigem Kreislauf durch eine geeignete Fördereinrichtung wieder in den Schutzmantel zurückbewegt wird. (D. R. P. 466121 Kl. 121 vom 27/9. 1923, ausg. 29/11. 1924. Zus. zu D. R. P. 398048; C1923/11. 1843.) KAUCH.

„Hermania“ Akt.-Ges. (Erfinder: Max Pückert und Ernst Schäfer), Schönebeck, Elbe, *Herstellung von hochprozentigem Schwefelnatrium*, dad. gek., daß die Schmelze, sobald dieselbe eine Konz. von 60% erreicht hat oder auch früher, in

Vakuumentrommel weiter konz. u. daß das hierbei gewonnene Prod. brikettiert (D. R. P. 407073 Kl. 12i vom 27/2. 1924, ausg. 5/12. 1924.) KAUSCH.

Bruno Waeser, Berlin, *Zersetzung von Schwefelcalcium oder -barium*, dad. daß man h., O₂-freie, in einem Hilfsgenerator vorgereinigte Rauch- oder Reinigungsabgase benutzt u. evtl. aus H₂S u. CaS hergestellte Ca(SH)₂-Lauge (oder Lsg.) vorlegt. (D. R. P. 406863 Kl. 12i vom 23/6. 1923, ausg. 29/11. 1924. K.

J. N. A. Sauer, Amsterdam, *Calciumsalze*. Unl. Ca-Salze mit adsorbierenden Eigenschaften zur Behandlung von Fl. wie Zuckerlsgg. oder Ölen, Gasen u. Säuren erhält man durch Einwirkenlassen einer Säure auf CaO oder Ca(OH)₂ in Gegenwart eines Alkalihydroxyds oder -salzes. Hiermit regeneriert man durch eine Lsg. das Alkalisalz. (E. P. 222159 vom 26/3. 1923, ausg. 23/10. 1924.) KAUSCH.

Rhenania Verein Chemischer Fabriken A.-G., Aachen und **B. C. Stuer**, Aachen, *Darstellung von Bariumhydroxyd*, 1. dad. gek., daß eine Lsg. von BaS mit H₂O behandelt wird. — 2. dad. gek., daß eine Lsg. von BaS in wss. NH₃ eingeht u. gegebenenfalls weiter mit gasförmigem NH₃ behandelt wird. — 3. dad. gek., daß BaS-haltiges Ba(OH)₂ aus ammoniakal. W. umkrystallisiert wird. — 4. dad. gek., daß das NH₃ durch Erhitzen der Ba(SH)₂-Lsg. wiedergewonnen u. neuem zur Fällung von Ba(OH)₂ verwendet wird (D. R. P. 406962 Kl. 12m vom 24/4. 1923, ausg. 3/12. 1924.) KAUSCH.

A. Nihoul, Paris, *Magnesiumsalze*. MgCO₃, Dolomit oder calcinierter Dolomit in W. oder einer anderen Fl. suspendiert u. mit CO₂ in Ggw. von CaSO₄ oder einem anderen Salz behandelt. Die erhaltene Lsg. wird filtriert, um das CaSO₄ abzuscheiden, dann gekocht zwecks Überführung des MgH₂(CO₃)₂ in MgSO₄, nochmals filtriert, eingedampft u. das MgSO₄ (rein) zum Auskrystallisieren gebracht. (E. P. 222110 vom 8/9. 1924, Auszug veröff. 12/11. 1924. Prior. 19/9. 1921.) KAUSCH.

Salzbergwerk Neu-Staßfurt, Neu-Staßfurt, *Gewinnung von Bromiden aus Erdsulfiden*, Erdalkalisulfiden u. Alkalisulfat, 1. dad. gek., daß man in die ges. Lsg. von Erdalkalisulfid, vorzugsweise des BaS Br in dünnem Strahl zweckmäßig bei 60° über 63° unter stetem Rühren eintreten läßt, worauf die Lsg. nach Abtrennen des ausgeschiedenen S in bekannter Weise mit Alkalisulfat umgesetzt wird. — 2. dad. gek., daß man Alkalisulfat vor Abtrennung des S beigibt u. dann gebildete Erdalkalisulfat u. S gemeinsam abtrennt. — 3. dad. gek., daß man S in einem in W. l. Bromid oder in einem organ. Lösungsm. gel., zu dem Alkalisulfid hinzusetzt. (D. R. P. 406861 Kl. 12i vom 12/7. 1923, ausg. 29/11. 1924.) KAUSCH.

George E. Kingsley, Chicago, *Bleilösungen*. Bleierz wird pulverisiert, in verd. Salzsäure gelöst u. die Temp. der Rk. kontrolliert. (Can. P. 238665 vom 1/12. 1922, ausg. 18/3. 1924.) KAUSCH.

J. Nathanson, Harzburg, *Bleicarbonat*. Chlor enthaltende Pb-Verbb. werden in Ggw. von W. behandelt u. CO₂ eingeleitet. (E. P. 222821 vom 19/2. 1922, Auszug veröff. 26/11. 1924. Prior. 3/10. 1923.) KAUSCH.

Deutsche Gasglühlicht-Auer-Ges., Berlin, übert. von: **Chemische Werke Auer-Ges. Kommanditges.**, Berlin, *Zirkonsalze*. Man zersetzt Zr-Erze mit H₂SO₄, löst das erhaltene Prod. in möglichst wenig W. u. versetzt die Lsg. mit HCl (Säure (HCl, H₂SO₄) um ZrSO₄ zu fällen oder hydrolysiert sie, wobei ein bas. Zr-Ox. der Zus. ZrO₂ : S = 1 : 1,4 entsteht, das in ZrO₂ : SO₃ = 1 : 0,75 übergeführt werden kann. (E. P. 222486 vom 24/9. 1924, Auszug veröff. 19/11. 1924. Prior. 1/12. 1923.) KAUSCH.

VI. Glas; Keramik; Zement; Baustoffe.

1. *Herstellung von künstlichem Schleifmaterial*. Einige Einzelheiten u. eine

eingehendere Schilderung der Herst. des *Carborundum* in der Carborundum Niagara Falls, worüber bis jetzt sehr wenig veröffentlicht worden ist. Koks, Salz u. Sägemehl werden automat. gewogen, gemischt u. im elektr. Widerstandofen hohen Temp. ausgesetzt, wobei sich Siliciumcarbid bildet. Die Carborundumkrystallmasse wird vom amorphen Krystall getrennt, gereinigt u. in 21 verschiedene Kornklassen gesiebt, die das Rohmaterial für viele Schleifinstrumente sind. Der Bau u. die Wirkungsweise der Öfen werden beschrieben. Vier Öfen bilden eine Einheit, von der immer ein Ofen in Betrieb ist. 36 Stdn. ist ein Ofen in Betrieb, 36—48 Stdn. kühlt er ab, wird entleert u. wieder betriebsfertig gemacht u. nach 72 Stdn. wieder in Betrieb gesetzt. Die durchschnittlich benötigte Kraft beträgt 3 Kilowattstunden pro lb. Carborundum. Bei besonderen App. besorgt das Carborundum selbst die Zerkleinerung der Rkm. Dann folgt Säurebehandlung, Wasserwaschung, Trocknen u. magnet. Separierung. (Chem. Metallurg. Engineering **31**. 501—3. 1924.) WILK.

Arvid Odencrants, *Über optisches Glas, seine Untersuchung und seine Herstellung*. Kurze Übersicht über den Fabrikationsgang und die Betriebskontroll bei der Herstellung opt. Gläser. (Svensk. Farm. Tidskr. **36**. 248—67. 1924. Stockholm.) GÜNTHER.

Henry Le Chatelier, *Über die Allotropie des Glases*. (Vgl. C. r. d. l'Acad. des sciences **179**. 517; C. 1924. II. 2785.) Neuere Messungen der Zähigkeit des Glases (vgl. ENGLISH, Journ. Soc. of Glass technology **8**. 205 [1924]) bestätigen das Vorhandensein einer allotrop. Umwandlung zwischen 750 u. 950° je nach der Glaszusammensetzung. Die von ENGLISH gefundenen Punkte liegen nämlich (Abszisse = Temp., Ordinate = $\log \log \eta$) auf zwei für jede Glasart charakterisierten Geraden, deren Schnittpunkte die Temp. der Umwandlungspunkte angeben. Freilich sind die von ENGLISH gebildeten Winkel von 180° nicht weit entfernt. So ist in der Formel $\log \log \eta = -Mt + P$ für ein Glas von der Zus. $\text{Na}_2\text{O} \cdot 3\text{SiO}_2$ unterhalb des Umwandlungspunktes (700°) $1,25 \cdot 10^{-3}$, oberhalb desselben $0,91 \cdot 10^{-3}$; die Werte von P sind 1,70 bzw. 1,45. Für das Glas von der Zus. $0,7 \text{ Na}_2\text{O} \cdot 0,3 \text{ MgO} \cdot \text{SiO}_2$ liegt der Umwandlungspunkt bei 900°; M ist 1,08 bzw. $0,73 \cdot 10^{-3}$, P 1,65 bzw. 1,35. Die Umwandlungstemp. des Glases $0,2 \text{ Al}_2\text{O}_3 \cdot 1 \text{ Na}_2\text{O} \cdot 3,6 \text{ SiO}_2$ ist 950°, M 1,11 bzw. $0,61 \cdot 10^{-3}$, P 1,66 bzw. 1,19. (C. r. d. l'Acad. des sciences **179**. 714—2. 1924.) BIKERMANN.

F. C. Harris, *Einfluß hoher Temperaturen und längerer Zeiträume auf photoelastischen Konstanten des Glases*. Vf. setzt die Verss. von FILON (Proc. Royal Soc. London Serie A. **89**. [1914.]) über Einfluß von Temperatursteigerung auf die bei mechan. Druckbeanspruchung von Glas auftretenden opt. Effekte fort. Mit Ausnahme einer von 5 untersuchten Glassorten zeigt der opt. Druckkoeffizient ein Anwachsen mit steigender Temp.; das entgegengesetzt sich verhaltende Glas ist ein an PbO reiches Flintglas. An 12 Glassorten wird ferner die nach längeren Zeiträumen eintretende Veränderung des opt. Druckkoeffizienten festgestellt (bis zu 20 Jahre); in allen untersuchten Fällen steigt er mit der Zeit an (bis zu 36% in einem Falle). (Proc. Royal Soc. London Serie A. **106**. 718—23. 1924.) BIKERMANN.

K. H. Reichau, *Beiträge zur besseren Kenntnis des Hochspannungssporzellans*. Die erste u. fundamental wichtigste Forderung an ein Hochspannungssporzellan ist, daß es sich im Charakter möglichst dem echten Porzellan nähert. Ferner muß das Hochspannungssporzellan von genügend hoher dielektr. Festigkeit sein u. gegen Beanspruchungen auf Zug-, Druck- u. Schlagbiegefestigkeit möglichst widerstandsfähig sein. (Keram. Rdsch. **32**. 531—38. 1924.) WECHER.

Hermann Harkort, *Neue Forschungsergebnisse auf dem Gebiete des Steins*. Es werden die Arbeiten von KOHL (Ber. d. Dtsch. Ker. Ges. **1922**. 303) hinsichtlich der effektiven Best. der Ausdehnungskoeffizienten sämtlicher in Frage kommenden

Komponenten versucht für die Praxis auszuwerten. (Keram. Rdsch. **32**. 539—41.

WECKE.

E. Steinhoff, *Untersuchungen über Silicasteine*. Unter Beifügung von Tabellen, von u. Abbildungen legt Vf. bzgl. dreier Typen von Silicasteinen den Einfluß der mehr oder weniger vollständigen Umwandlungen nach dem Brennen auf die Festigkeit im Ofen dar. (Stahl u. Eisen **44**. 1277—83. 1924.) OEHLER.

Hermann Nitschmann, Berlin, *Schleudern von flüssigen, staubförmigen oder feinen Stoffen zur Herstellung von Überzügen*, dad. gek., daß das Schleudergut in einem Strahl mit eigener Geschwindigkeit gegen die Arbeitsfläche geschleudert u. dabei mit einem diese Geschwindigkeit noch erhöhenden Druck- oder Hochdruckstrahl, insbesondere einem Dampfstrahl zusammengeführt wird. — Das Gut wird in möglichst lockerer Beschaffenheit u. möglichst gleichmäßiger Verteilung durch den Strahl auf die Arbeitsfläche übertragen u. die Festigkeit des Überzugs erhöht. (D. R. P. **406141** Kl. 75c vom 20/2. 1918, ausg. 20/11. 1924.) OEL.

Christian Heuer, Köln-Braunsfeld, *Einrichtung zur Erzeugung von Salzglasur auf gasgefeuerten Brennöfen* nach Pat. 382814, 1. dad. gek., daß der Luftzuführungskanal des Gasbrenners mit einer besonderen Feuerstelle im Ofen verbunden ist. — 2. dad. gek., daß die Feuerstelle außer dem Kanal noch mit einer Unterwindleitung unterhalb des Ofens verbunden ist. — 3. dad. gek., daß die Schlitzte durch Schieber geschlossen werden können. — Gegenüber der Einrichtung gemäß dem Hauptanspruch werden wesentliche Vorteile, z. B. durch Fortfall des besonderen Ventilators u. die Windzufuhr erzielt. (D. R. P. **404679** Kl. 80b vom 23/10. 1923, ausg. 27/10. 1924. Zus. zu D. R. P. **382814**; C. 1924 I. 1581.) KÜHLING.

Carl Schnuerle, Frankfurt a. M., *Überzugs- oder Schleifmasse*, gek. durch ein Gemisch aus Schleifmitteln bekannter Art, wie Schmirgel, natürlicher oder künstlicher Korund usw., als Mischungs- oder Bindemittel Celluloseester enthalten. — Die Überzüge werden auf Holz vorzüglich u. nehmen durch Abschleifen mit Metallmetall. Glanz erzielt. Als Schleifmittel sind die MM. zum Schärfen von Messern u. Werkzeugen geeignet. (D. R. P. **405052** Kl. 80b vom 5/11. 1922, ausg. 27/10. 1924.) KÜHLING.

J. Cox, London, *Verbundglas*. Glasplatten werden mit einer etwas Nelkenöl enthaltenden wss. Lsg. eines Pflanzengummis bestrichen, eine Platte aus unentflammbarem, durchscheinendem Stoff wie Azetylcellulose, welche mit $C_2H_2Cl_4$ u. Salzsäure behandelt worden ist, aufgelegt u. beide Platten unter Erwärmen auf 40° leicht zusammengepreßt. Das Erzeugnis kann noch mit einer aus $CaCO_3$, Leinöl u. einem Farbstoff bestehenden Mischung behandelt werden. (D. R. P. **221552** vom 8/6. 1923, ausg. 9/10. 1924.) KÜHLING.

Kavir Pierre Carlier, Belgien, *Gewelltes Glas*. Die Glasschmelze gelangt auf einer Gleitfläche zwischen 2 Paar gewellte Walzen u. dann über eine gleichgewellte weitere Gleitfläche auf eine gewellte horizontale Platte, auf der sie vollständig erstarrt noch dem Druck einer Presse ausgesetzt werden kann, so daß die Druckfläche wellenförmige Vorsprünge aufweist, welche denen der Platte entsprechen. (F. P. **574424** vom 13/12. 1923, ausg. 11/7. 1924. Blg. Prior. 7/7. 1923.) KÜHLING.

Elektro-Osmose Akt.-Ges. (Graf Schwerin Gesellschaft), Berlin, *Reinigung von Ton- und kaolinhaltigen Substanzen auf kolloidchemischem Wege*. (D. R. P. **221552** Kl. 80b vom 13/11. 1921, ausg. 28/10. 1924. Schwz. Prior. 18/11. 1920. — Pat. 23. IV. 790.) KÜHLING.

Joseph Cullerier, Paris, *Erhöhung der Lichtdurchlässigkeit von Marmor, Alabaster u. dgl.*, dad. gek., daß der Stein mit Glycerin getränkt wird. — Die Erzeugnisse lassen die Färbungen, Zeichnungen u. dgl. des Steines sichtbar werden, Ver-

gilben tritt nicht ein. (D. R. P. 404680 Kl. 80b vom 25/5. 1923, ausg. 20/12. 1924. F. Prior. 8/8. 1922.) KÜHLIN

Mikael Vogel-Jørgensen, Dänemark, *Herstellung von Zement*. Bei dem Verfahren gemäß dem Hauptpatent werden während der Überführung der Stückchen in den Brennofen pulverförmige Anteile abgesondert, mit frischer angeteigter Rohmischung gemischt u. einer als Trockenraum dienenden Verlängerung des Drehrohrofens zugeführt, während die vom Pulver befreiten Stückchen der Glühzone dieses Ofens unmittelbar zugeführt werden. Zu groß geratene Stückchen werden gemahlen u. das Erzeugnis sowie der aus den Abgasen des Glühofens gewonnene Staub u. d. Zusatz von frischer Mischung von neuem geformt. (F. P. 26347 vom 12/5. 1923, ausg. 6/11. 1923. Zus. zu F. P. 543992; C. 1923. II. 321.) KÜHLIN

René Décolland, Frankreich, *Ungeschmolzene Bauxitzemente*. Mischungen aus sehr fein gepulvertem eisenfreiem oder -haltigem Bauxit u. reinem CaCO_3 oder CaO werden in langen Drehrohröfen bei Temp. gebrannt, bei denen die M. nicht schmelzen u. es wird die Glühzone über das übliche Maß dadurch verlängert, daß Brennstoffe verwendet werden, welche viel Gas entwickeln, oder es werden den Brenngasen inerte Gase oder Dämpfe, z. B. Wasserdampf, beigemischt u. im Drehrohröfen durch eine Sauganlage ständig im Umlauf erhalten. Um den F. der Brennstoffasche zu erhöhen, wird dem Brennstoff während des Pulverns CaO oder ein anderer Stoff zugesetzt, der entstehendes SiO_2 , Al_2O_3 o. dgl. in höherer Sauerstufe Verbb. verwandelt. (F. P. 573517 vom 14/2. 1923, ausg. 25/6. 1924.) KÜHLIN

Johan Axel Eriksson, Stockholm, *Herstellung von Mischzement*, 1. dad. gek., daß gewöhnlicher Portlandzement mit einer verhältnismäßig kleinen Menge (wenigstens 25% oder weniger) einer innigen, fein verteilten Mischung von gebranntem Alaunschiefer (Schieferasche) u. CaO (sogenanntem Schieferkalk) zusammengemischt wird. — 2. dad. gek., daß gebrannter Alaunschiefer u. gelöschter CaO in Kugelmøhlen o. dgl. zusammengemahlen werden zu einer Feinheit, die ungefähr derjenigen des Portlandzementes entspricht, u. daß die erhaltene Mischung mit Portlandzement zu einer Gesamtmischung vereinigt wird. — Die Erzeugnisse besitzen eine höhere Festigkeit u. größeres Abbindevermögen als reiner Portlandzement u. sind billiger als dieser. (D. R. P. 404574 Kl. 80b vom 13/10. 1920, ausg. 20/12. 1924. Schwed. Prior. 15/10. 1919.) KÜHLIN

Hans Kühl, Berlin-Lichterfelde, *Herstellung von Leichtbrandzement*. Die gemäß dem Hauptpatent erhältlichen Erzeugnisse unterscheiden sich vom Portlandzement durch geringere D. u. in der Farbe. Dem Portlandzement auch in dieser Hinsicht gleichende Erzeugnisse werden erhalten, wenn den kalk- u. tonhaltigen Rohstoffen deren Kalkgehalt zwischen dem Kalkgehalt der Romanzemente u. dem kalkreichen Portlandzement liegt, beträchtliche, z. B. mehr als 10% betragende Mengen an Flußspat u. gegebenenfalls noch einige % anderer Schmelzmittel, wie Fe_2O_3 , CO_2 , Mn_2O_4 , PbO , MgO oder Alkalicarbonat oder Gemische dieser Stoffe zugesetzt werden u. die M. bei Temp. gebrannt wird, welche die zur Austreibung der CO_2 erforderliche Temp. nur wenig übersteigen. Reicht die Menge gewisser Bestandteile der Rohm., besonders des Fe_2O_3 u. MgO , zur B. eines leicht schmelzbaren Eutektikums heraus, so sind diesem Zweck entsprechende Mengen der genannten Stoffe hinzuzufügen. (D. R. PP. 404575 Kl. 80b vom 2/2. 1924, ausg. 20/10. 1924 u. 405234 Kl. 80b vom 22/9. 1923, ausg. 28/10. 1924. Zuss. zu D. R. P. 399446; C. 1924. II. 1622.) KÜHLIN

H. S. Spackman, Egypt Mills P. O., V. St. A., *Aluminiumreiche Zemente*. Mischungen, welche verhältnismäßig viel Al_2O_3 u. verhältnismäßig wenig CaO enthalten, z. B. Mischungen gleicher Teile Bauxit u. CaO werden im Drehrohröfen vollständig geschmolzen. Die Menge an CaO darf nicht mehr als 1 Mol. auf ein Mol. der vorhandenen sauren Bestandteile betragen. (E. P. 222151 vom 1/9. 1924, Auszug veröff. 19/11. 1924. Prior. 22/9. 1923.) KÜHLIN

Johan Axel Eriksson, Stockholm, *Herstellung eines porösen Baustoffes aus Landzement*. (D. R. P. 404677 Kl. 80b vom 17/3. 1923, ausg. 20/10. 1924. — 924. II. 530.) KÜHLING.

Chemische Fabrik Grünau Landshoff & Meyer Akt.-Ges., Grünau, Mark, *Veresserung von Zement und Zementmörtel*, dad. gek., daß man demselben Abbauprodukt der Eiweißstoffe (Albuminoide eingeschlossen) vor oder während der Verfertigung zumischt. — Die Zug- u. Druckfestigkeit u. die Wasserdichtigkeit der Mörtel nach dem Verf. hergestellten Zementmörtel ist wesentlich größer als die der ohne Zusatz von Eiweißabbauprodukt hergestellten Mörtel. (D. R. P. 405844 Kl. 80b vom 11/2. 1923, ausg. 8/11. 1924.) KÜHLING.

J. R. Garrow, G. O. Case und Novocretes, Ltd., London, *Faserzement*. (Fasern, Holzmehl, Torf, Kork o. dgl. werden mit einer mittels Alkali oder Erdsalze „basisch gemachten“ Lsg. eines Metallsalzes getränkt u. dann mit Zement beschichtet, dem noch etwas CaO oder Ca(OH)₂ zugesetzt werden kann u. der sich bei der Umsetzungs- u. Verfestigung innerhalb der Poren der erwähnten Füllstoffe mit diesen sehr fest vereinigt. Als Metallsalz wird z. B. FeCl₃ benutzt, zum „Bismachen“ dient Na- oder K(OH), K₂CO₃ oder KHCO₃ bei Verwendung von Zement aus Bauxit auch Fe(OH)₃. (E. P. 220677 vom 21/3. 1923, ausg. 18/9. 1924.) KÜHLING.

Musag Gesellschaft für den Bau von Müll- und Schlackenverwertungsgesellschaften Akt.-Ges., Berlin, *Verwertung von Haus- und gewerblichem Müll, Verwertungsrückständen oder ähnlichen Abfällen*, durch Niederschmelzen dieser Stoffe mit Zusatz von Brennstoff u. CaO, 1. dad. gek., daß der Kalkzusatz in so erheblichen Mengen gewählt wird, daß die sich ergebende M., die beim Ausfließen aus dem Ofen in bekannter Weise durch Luft, W. oder Dampf in ein feinkörniges Pulver zu überführen ist, unmittelbar nach Feinmahlung als hochhydraul. Bindemittel nutzbar gemacht werden kann. — 2. dad. gek., daß das feinkörnige Produkt in einem Mengenverhältnis mit Portlandzementklinker u. Gips gemischt u. das Gemisch auf Zementfeinheit zu sog. *Hochofenzement* gemahlen wird. — Dem in bekannter Weise gewonnenen Hochofenzement ist das Erzeugnis gleichwertig. (E. P. 406191 Kl. 80b vom 1/11. 1922, ausg. 14/11. 1924.) KÜHLING.

V. Wikkula, Helsingfors, *Porige Massen*. Gemahlenes Eis oder Schnee wird mit einem rasch abbindenden hydraul. Stoff wie Zement, Mörtel oder Gips, gegebenenfalls unter Zusatz von W. u. Füllmitteln gemischt, die Mischung geformt u. in einem w. Raum gehärtet. (E. P. 221742 vom 17/3. 1924, ausg. 9/10. 1924. Prior. 1924.) KÜHLING.

I. B. Wiggin's Sons Co., New Jersey, V. St. A., *Bindemittel*. Wasserfreies Pulver mit beschränkter Mengen von W. enthaltendem CaSO₄ gemischt u. diese Mischung mit Zement, MgO, MgCl₂ oder Sorelzement verrührt. Das Verf. dient zur Verkürzung der Abbindezeit. (E. P. 221853 vom 12/6. 1923, ausg. 16/10. 1924.) KÜHLING.

Refractories Process Corporation, übert. von: **C. J. Crawford**, New York, *Verfestigung von Gegenständen*. Mischungen von natürlichem oder künstlichem Tridymit mit Kaolin, Bauxit o. dgl. werden bei einer dem Kegel 12 entsprechenden Temperatur gebrannt. Der künstliche Tridymit wird erhalten durch Glühen von Quarz, Mühlsteingries usw., wobei in den Gasraum des Ofens ein Katalysator, wie SO₂, COCl₂, NaCl, MoO₄H₂, ein Borat, Natriumwolframat o. dgl. eingeführt wird. Die Gashülle soll zunächst reduzierenden, gegen Ende der Umwandlung oxidierenden Charakter haben. (E. P. 220603 vom 9/7. 1924, Auszug veröff. 8/10. 1924. Prior. 14/8. 1923.) KÜHLING.

P. Laurie, Edinburgh, *Erhalten von Steinen*. Der gemäß dem Hauptpatent bekannten Lsg. eines Kieselsäureesters wird eine geringe Menge einer Säure,

besonders H_2SO_4 zugesetzt. (E. P. 221342 vom 29/8. 1923, ausg. 2/10. 1924.)
 Zus. zu E. P. 203042; C. 1924. I. 441.) KÜHLIG

W. H. Clegg und **G. Whittaker**, Huddersfield, England, *Kunststeine*. Mischung von Sand, Schwefel u. Ton oder Eisenschlacke, denen zur Erhöhung der Festigkeit der Erzeugnisse auch Metalle, Asbest u. dgl. zugesetzt werden können, wird unter häufigem Rühren wenigstens 6 Stdn. lang auf 400° erhitzt u. dann in Metall- oder Büchsenmetallformen gegossen. Zwecks B. wasserfester Erzeugnisse wird die Formlinge in noch w. Zustände mit Mischungen von Wachs oder Cerebinth-Petroleum oder Terpentin getränkt, zwecks B. marmorartiger Steine rührt man verschiedenefarbige Mischungen kurz vor dem Formen zusammen. (E. P. 221857 vom 16/6. 1923, ausg. 16/10. 1924.) KÜHLIG

Hans Zomak, Berlin, *Mörtel zum Ausfügen von Steineisenplatten*, dadurch, daß dem Fugenmörtel ein sich nach dem Wassergehalt des Mörtels richtiger Prozentsatz ZnO oder PbO zugesetzt ist. — Das Durchschießen der Fugen in die Putzdecke wird verhindert. (D. R. P. 404616 Kl. 80b vom 11/4. 1924, u. 20/10. 1924.) KÜHLIG

Max Gensbaur, Kladno, Böhmen, *Nutzbarmachung kalkiger oder toniger Halbbrennabgänge*, insbesondere von Kohlen, Schiefer u. dgl. durch Brennen, dadurch, daß die ganze große Halde nach Art eines Meilers mit Zwischenlagen von Brennstoff aufgeschüttet u. zum Durchbrennen gebracht wird. — Das Erzeugnis so als Mörtelbildner verwendet werden. (D. R. P. 405051 Kl. 80b vom 23/1. 1923, u. 23/10. 1924.) KÜHLIG

Rekord-Zement-Industrie G. m. b. H., Frankfurt a. M., und **Oskar Tietze**, Oerlinghausen, Lippe, *Herstellung von hydraulischen Bindemitteln* aus Aschen, Patent 377098, dadurch, daß sulfathaltige Aschen, insbesondere Braunkohlenscheidenasche in rohem oder gebranntem Zustande, je nach der zu erzielenden Wrkg. hinsichtlich des Quellens oder Schwindens, mit einer ausreichenden Menge einer Baubasis Strontium- oder Bleiverb. u. den erforderlichen Erregungsstoffen, wie CaO oder Portlandzement, versetzt werden. — Die sulfathaltigen Aschen waren bisher als Treiberscheinungen wegen zur Verarbeitung auf Mörtelbildner ungeeignet. (D. R. P. 405235 Kl. 80b vom 11/3. 1922, ausg. 28/10. 1924. Zus. zu D. R. P. 377098; C. 1923. IV. 198; früherer Zus. D. R. P. 378195; C. 1923. IV. 408.) KÜHLIG

Lester Kirschbraun, Chicago, *Herstellung eines Bodenbelages*. (D. R. P. 415098 Kl. 39b vom 2/6. 1921, ausg. 6/9. 1924. — C. 1924. I. 134.) FR. Z.

Siegfried Schloß, Straußberg, *Herstellung ammonitenartig erhärtender Massen*, dadurch, daß Saprophyten (Meer- u. Seepflanzenschwebeflora) nach ihrer Gewinnung aus Meeren oder Seen innig vermahlen u. unter allmählicher Entwässerung in oder ohne Pressung erstarren gelassen werden. — Die Erzeugnisse sind sehr hart, braun, gegen Luft, W., Säuren u. dgl. beständig u. sehr hart. (D. R. P. 409098 Kl. 80b vom 18/3. 1924, ausg. 9/10. 1924.) KÜHLIG

Buffalo Refractory Corporation, Buffalo, V. St. A., *Herstellung feuerfester Körper*. (D. R. P. 405236 Kl. 80b vom 28/10. 1922, ausg. 28/10. 1924. — C. 1923. I. 94.) KÜHLIG

Dimitrie Somnea, Oradia Mare, und **George Somnea**, Braila, Rumänien, *Herstellung von Platten als Schieferersatz* für Schreibtäfel u. dgl., 1. dadurch, daß aus beliebiger geeigneter M. gebildete Platten mit einer Mischung aus Zement und feinem Stahlpulver oder irgendeinem fein vermahlenden harten Stoff u. einem anhaftungsfähigen Stoff überzogen u. dann gepreßt werden. — 2. dadurch, daß die gepreßten getrockneten Platten noch mit einer Farbe bestrichen werden, welche einen leicht löslichen öligen Stoff enthält, der die Fähigkeit besitzt, den Farbstoff zu fixieren, von wo er teilweise Natrium- oder Kaliumsilicat. (D. R. P. 406394 Kl. 80b vom 4/4. 1924, ausg. 18/11. 1924. Rum. Prior. 2/1. 1924.) KÜHLIG

VII. Agrikulturchemie; Düngemittel; Boden.

F. E. Allison, *Die Nitrifikation von Phosphornitrid*. P_3N_5 wurde dargestellt aus NH_3 u. P_2S_5 u. enthielt 93,3% reines Material, freien Phosphor u. etwas PNS u. NO . — Die Verss. wurden mit je 100 g Susquehanna-Lehmboden ausgeführt mit Zusatz von 0,5 g $CaCO_3$ u. 21% dest. W., das häufig ersetzt wurde. Die N-Best. erfolgten nach der Phenoldisulfosäure-Methode. Die Verss. mit P_3N_5 — mit $(NH_4)_2SO_4$ zum Vergleich — ergeben, daß der N des P_3N_5 nicht leicht in NO_3 verwandelt wird u. daß P_3N_5 sehr wahrscheinlich kein brauchbarer Stickstoffdünger ist. (Journ. Agricult. Research **28**. 1117—18. 1924.)

TRÉNEL.

F. E. Allison, *Der Einfluß von Cyanamid und verwandten Verbindungen auf die Menge der Mikroorganismen im Boden*. Je 500 g eines Susquehanna-Lehmbodens mit verhältnismäßig hoher Fruchtbarkeit, feucht gesiebt u. unter Vermeidung des Sonnenlichts getrocknet, wurden mit 5 g gefällttem $CaCO_3$ u. verschiedenen stickstoffhaltigen Düngern versetzt; der Feuchtigkeitsgehalt war etwa 21%. Nach 4 Tagen wurden die ersten Proben auf Lipmann u. Browns künstlichen Nähr-Agarplatten gezüchtet u. nach 7 Tagen auf jeder Platte die Menge der Bakterien bestimmt. — Cyanamid erzeugt ungewöhnlich starkes Wachstum der Bodenbakterien; hohe Gaben (2%) töten jedoch die Bakterien. Dieselbe günstige Wrkg. hat auch $CaCN_2$. Es war Vf. unmöglich, festzustellen, welcher von beiden Bestandteilen des Stickstoffs den größeren Einfluß auf die Bodenbakterien hat, Kalk oder Cyanamid. — Harnstoff u. $(NH_4)_2SO_4$ waren von geringem Einfluß. Dicyandiamid, Ammoniumharnstoffsulfat, Guanidinnitrat, Diguandinitrat ergaben negative Resultate. (Journ. Agricult. Research **28**. 1159—66. 1924.)

TRÉNEL.

F. E. Allison, E. B. Vliet, J. J. Skinner und F. R. Reid, *Gewächshausversuche mit Luftstickstoff-Düngemitteln und verwandten Verbindungen*. Die Verss. geschieden sich auf Weizen, Bohnen u. Erbsen unter Verwendung von armen, sandigem Lehm u. Lehm aus Norfolk u. Chester. Die Gaben an verschiedenen Stickstoff-Düngemitteln entsprachen den in der Landwirtschaft üblichen Mengen. Alle Töpfe, mit 10 Pfd. Boden gefüllt, erhielten mit Ausnahme der Kontrollverss. 80 Pfd. P_2O_5 als Phosphorsäure u. 40 Pfd. K_2O als K_2SO_4 auf den Boden. (4046 qm). Nach 5 bzw. 8 Wochen wurden die Pflanzen geerntet u. getrocknet gewogen. Die Verss., die zu beschränkt waren, um allgemeine Schlüsse zu ziehen, geben Anhaltspunkte zur Beurteilung des relativen Düngewerts bzw. der Wirksamkeit der untersuchten Düngemittel. Keinen Unterschied zeigten $NaNO_3$, $(NH_4)_2SO_4$, Harnstoff, NH_4NO_3 , $Ca(NO_3)_2$ u. Ammoniumsuperphosphat. Cyanamid u. Ammoniumharnstoff ergaben wechselvolle Resultate. Dicyandiamid beeinträchtigte das Wachstum, indem die Halmspitzen verbrannt wurden. Der Schaden war noch größer bei Bohnen, deren Blätter durch die kleinste Gabe gelb wurden. Die großen Gaben zeigten die Pflanzen sehr schwachen Wuchs u. die unteren Blätter fielen ab. Wie gewöhnlich war die Giftwirkung auf den leichteren Böden stärker. (Journ. Agricult. Research. **28**. 971—76. 1924.)

TRÉNEL.

Th. J. de Vries, *Meine Erfahrungen über Kalidüngung auf schwerem Boden*. (Ernährung der Pflanze **20**. 169—70. 1924. Friedland a. d. Leine.)

BERJU.

3. Blanck und F. Alten, *Versuche mit Jauchedrill bei Hafer und über den Einfluß der Jauche auf die Mineralbestandteile des Bodens*. Im Vergleich zu den vorhergehenden Verss. (Journ. f. Landw. **69**. 215; C. **1922**. I. 2. Aufl. 1922) Vff., daß die mit dem Jauchedrill zugeführte Jauche nur eine geringe Wirkung hervorgebracht hatte, u. diese Wrkg. nicht der des $NaNO_3$ u. $(NH_4)_2SO_4$ zuzuschreiben gekommen war. Unterss. über die lösende Wrkg. der Jauche auf die Mineralbestandteile des Bodens zeigten, daß der Harn ein starkes Lösungsvermögen gegen-

über der P_2O_5 u. des K_2O des Bodens hat, u. daß der Gärungszustand des H. hierauf ohne Einfluß ist. (Journ. f. Landw. **72**. 129—38. 1924. Göttingen.) B.

K. Kvapil und **A. Nêmec**, *Über die Beziehung zwischen „absoluter Luftkapazität“ und Aciditätsgrad von Waldböden*. Die absolute Luftkapazität (= Vol. nach Sättigung des Bodens mtt W. noch Luft enthaltenden Poren) ist bei im grünen Beständen niedriger als bei anderen, sie nimmt ab, wenn die Bodenacidität ansteigt. Bei reinen Coniferenbeständen ist die Kapazität höher; bei Laub ist die Kapazität im Durchschnitt höher als bei Nadelwald, die Bodenacidität hält sich umgekehrt. Bei Mischbeständen ist das Verhältnis Capazität zu Acidität weniger markant. (C. r. d. l'Acad. des sciences **179**. 1283—84, 1924.) HABER

P. L. Gainey und **H. W. Batchelor**, *Einfluß der Wasserstoffionenkonzentration auf das Wachstum und die Stickstoffbindung durch Azotobakterkulturen*. Auf Dextroseagar gewonnene Reinkulturen von Azotobacter wurden in Nährlsgg., welche in 1 Liter 0,2 g NaH_2PO_4 , 0,2 g $MgSO_4$, 0,5 g $NaCl$, 2 Tropfen einer 10% ig. $FeCl_3$ -Lsgg. u. 20 g Dextrose oder Mannit enthielten u. durch Zusatz von $NaOH$ oder HCl auf bestimmte Rkk. gebracht worden waren, weiter gezüchtet, u. die Veränderungen der $[H^+]$ u. die Entw. der Azotobakterkulturen beobachtet, sowie die N-Fixierung analyt. festgestellt. Kräftiges Wachstum der Kulturen u. N-Bindung wurden bei pH 6,1—6,5 beobachtet. Wie früher bei den Bodenunterss. war die untere Grenze für die Azotobakterentw. pH 5,9—6,0. (Journ. Agricult. Research **24**. 759—61. 1923. Kansas, Agric. Exp.-Stat.) BERJ.

J. S. Mc Hargue, *Wirkung verschiedener Konzentrationen des Mangans auf das Wachstum der Pflanzen in sauren und neutralen Böden und die Unentbehrlichkeit des Mangans als Pflanzennährstoff*. In sauren Böden, welche weniger als 0,1% Mn enthielten, von dem nur ein kleiner Anteil im W. l. war, verminderte $MnSO_4$ -Gaben die Erträge, bei gleichzeitigen $CaCO_3$ -Gaben wurden jedoch die Erträge durch Mn-Gaben erhalten. Durch Gefäßverss. wurde die Unentbehrlichkeit des Mn als Wachstumsfaktor sicher festgestellt. Gegenteilige Versuchsergebnisse anderer Forscher rühren nach Ansicht des Vf. wahrscheinlich von Verunreinigungen der angewendeten Nährsalze, besonders der Salze des P, Fe u. Ca her, welche so gering sie auch sein mögen, doch von bedeutendem Einfluß sind, da die Pflanzen nur äußerst geringe Mn-Mengen für ihren Aufbau bedürfen. Durch Mn-Mangel wird die Produktion der Trockensubstanz der Pflanzen beeinflusst. Die etiolierte Beschaffenheit junger u. zarter Blätter u. Knospen bei sicher festgestellter Abwesenheit von Mn bei Vegetationsverss. deutet an, daß dem Mn eine Funktion bei den photosynthetischen Prozessen u. der Chlorophyllb. zukommt. (Journ. Agricul. Research **24**. 781—94. 1923. Kentucky, Agric. Exper.-Stat.) BERJ.

G. R. B. Elliott, *Wirkung organischer Zersetzungsprodukte in Böden mit geringem Gehalt an pflanzlichen Stoffen auf Zement-Drainziegel*. Die in Nordamerika aus Zement hergestellten Drainziegel enthalten große Mengen im W. l. freier Alkalien, die einem fortdauernden Auslaugungsprozeß unterworfen sind. Weitere, noch umfangreichere Schädigungen der Drainröhren werden bewirkt durch die fortschreitende Zunahme der Acidität der Moorwässer während der wärmeren Jahreszeit infolge Zers. der organ. Substanz der Moore. Unter dem Einfluß dieser sauren WW. wird auch die Kernsubstanz der Röhren stark angegriffen. Es bilden sich hierbei kolloidartige Substanzen, welche in CO_2 -haltigem W. ll. sind. Innerhalb kurzer Zeit wurden Substanzverluste von ungefähr 30% in einzelnen Fällen festgestellt. Auch in Moorböden mit hohem CaO -Gehalt wurden schon nach kurzem Gebrauch starke Deformationen an den Drainiegeln beobachtet. Diese Schädigungen zeigten sich nicht bei Verwendung der Zementröhren in gewöhnlichen Ackerböden. Vf. empfiehlt zur Herst. von Drainröhren, welche in Moorböden verwendet werden sollen, möglichst alkalifreies Material zu verwenden u. dieses sehr fein zu zer-

hlen, weil hierdurch eine vollkommenere Hydratisierung erzielt wird. Ferner werden Zusätze solcher Stoffe empfohlen, welche die chem. Umsetzungsfähigkeit des Zements herabsetzen u. glasartige Überzüge bilden, durch welche das Eindringen des Sumpfw. in die Drainröhren erschwert wird. (Journ. Agricult. Research 471—500. 1923. Minnesota, Agric. Exp.-Stat.)

BERJU.

E. Blanck und F. Alten, *Zur Wirkung des Zeotokols (Doleritmehls) auf die Pflanzenproduktion*. Bei Verss. mit Zeotokol, einem fein gemahlenden grobkörnigen Salz, welchem von REUTER bodenverbessernde Eigenschaften u. demzufolge eine direkt ertragsteigernde Wrkg. zugeschrieben wird, wurden keine die Prod. von Pflanzenmassen steigernde Wrkgg. beobachtet. (Journ. f. Landw. 72. 145—52. 1924. Göttingen.)

BERJU.

E. Blanck und F. Alten, *Ein Vegetationsversuch mit „Asahi Promoloid“*. Bei (Fä)ßverss. an Sojabohnen mit „Asahi Promoloid“, einem künstlich hergestellten W. l. SiO₂-haltigem Mg-Präparat, das kein eigentliches Düngemittel darstellt, sondern aber eine katalyt. ertragssteigernde Wrkg. auf Grund japan. Unterss. zugeschrieben wird, wurde ein Rückgang der Gesamternte mit der Gabe dieses Mittels aber ein Mehrertrag an Körnern festgestellt, dem aber im Falle der kleinsten Promoloidgabe keine Bedeutung zukommt. Die Ergebnisse dieser Unterss. können nicht mit Sicherheit auf die Verhältnisse der landwirtschaftlichen Praxis übertragen werden. (Journ. f. Landw. 72. 139—43. 1924. Göttingen.)

BERJU.

E. Rabaté, *Wirkung verdünnter Schwefelsäure auf Getreidefelder*. (Vgl. *Chimie Industrielle* 1924. Mai-Sonderheft 670; C. 1924. II. 1848.) Die Unterss. des Vfs. haben ergeben, daß durch Besprengung von 1 ha Land mit 1000 l verd. H₂SO₄ (ca. 10% H₂SO₄ von 65 Bé) der Boden fruchtbarer wird, daß Unkräuter u. Parasiten (Pilze, Schnecken etc.) vernichtet werden, u. daß der Ernteertrag wesentlich erhöht wird. Die Wrkg. ist um so besser, je jünger u. saftreicher die Pflanzen der Besprengung sind; eine Schädigung der Kulturpflanzen tritt nicht ein. Trockene, warme, bewegte u. klare Luft begünstigt die Wrkg. (C. r. d. l'Acad. des sciences 179. 1285—87. 1924.)

HABERLAND.

H. S. Reed und A. R. C. Haas, *Wachstum und Zusammensetzung der Orangebäume in Sand- und Bodenkulturen*. Vergleichende Unterss. über die Entw. u. Zus. in reinem Sande aufgezogener Orangebäume, welche nur mit anorgan. Nährsbgg. gedüngt wurden, mit der Entw. u. Zus. von in natürlichen Böden wachsenden u. gelegentlich mit den gleichen Nährstoffen gedüngten Bäumen zeigten nur eine etwas feinere Verteilung der Wurzeln in dem natürlichen Boden. Auch die Zus. der Pflanzenaschen war in beiden Fällen nicht wesentlich verschieden. (Journ. Agricult. Research 24. 801—14. 1923.)

BERJU.

H. S. Reed und A. R. C. Haas, *Der Pseudoantagonismus von Natrium und Calcium in verdünnten Lösungen*. In Ca-freien Nährsbgg. wachsende Citronenbäume zeigen bald Schädigungen ihres Wurzelsystems, welche durch Gelatinieren der Oberflächenschichten sichtbar werden u. zum Absterben der Pflanzen führen. Die Erkrankung nicht zu weit fortgeschritten, so werden nach Zuführung von Seitenwurzeln gebildet, die das Absterben der noch lebenden Wurzeln hindern. Von OSTERHOUT (Journ. Gen. Physiol. 3. 415; C. 1921. III. 174) beobachtete Antagonismus zwischen Na u. Ca zeigte sich in den angewandten sehr verd. Lsgg. nicht. (Journ. Agricult. Research 24. 753—58. 1923. Univ. of California.)

BERJU.

E. W. Schmidt, *Eine biologische Methode zum Nachweis der Regenwirkung auf Pflanzenschutzmittel*. Zur Feststellung der Wrkg. von Regen auf Pflanzenschutzmittel wurde auf Glasplatten, die mit dem Mittel bespritzt wurden, nach dem Anpflanzen vor u. nach einer künstlichen Beregnung die Entwicklung von Botrytis beobachtet. Bei kolloidalen Cu-Spritzmitteln ergab sich eine klare Beziehung

zwischen dem Ausfall der Cu-Rk. mit Ferrocyankalium u. dem Ergebnis der Hemmungsversuche. (Ztschr. f. angew. Ch. **37**. 981—82. 1924. Hannover.) JTC

Harry R. Fulton und **John J. Bowman**, *Vorläufiges Ergebnis der Behandlung von Früchten der Citrus-Arten als Vorbeugungsmittel gegen die Laeschimmelfäulnis*. Kaliforn. Orangen wurden 10 Min. mit Sporen von *Penicillium digitatum* u. *P. italicum* geimpft, die chem. Lsg. mit einem Zerstäuber, W. bei 100° C. Kontrollproben, aufgetragen, getrocknet, mit einer Nadel bis etwa zur halben Tiefe der Schale punktiert u. in feuchtes Papier eingewickelt. Jeden 3. Tag wurde der Fortschritt der Schimmelfäule untersucht. Von verschiedenen Agenzien erwies sich eine 5—10%ige Lsg. von Borax am geeignetsten, Orangen u. Citronen vor der Laeschimmelfäule zu schützen. Dieselbe Lsg. schränkte bei Orangen u. Weintrauben die Stengelendfäule bemerkenswert ein. (Journ. Agricult. Research **28**. 961—68. 1924.) TRÉNE

D. B. Swingle, **H. E. Morris** und **Edmund Burke**, *Beschädigung der Blätter durch arsenhaltige Verstäubungsmittel*. Die chem. Zus. kennzeichnende Bezeichnung der As-Präparate entspricht nicht immer deren wirklichen Zus. As_2O_3 u. die Pariser Grüne waren am gleichmäßigsten zusammengesetzt. Die schädliche Wrkg. des As_2O_3 ist nicht so groß als gewöhnlich angenommen wurde, besonders wenn es gleich nach seiner Vermischung mit W. verwendet wird. Von den As-Verbb. sind *Kakodylsäure* u. *Na-* u. *Ka-Kakodylate* am schädlichsten. Seiner Zusatz zu den l. As-Verbb. vermindert die schädliche Wrkg. derselben, desgleichen in erhöhtem Maße bei Suspensionen von Pariser Grün. Dagegen wird infolge der Erhöhung der Löslichkeit der swl. As-Verbb. durch Seife, die schädliche Wrkg. verstärkt, in gleichem Sinne wirkt auch CaS_2 bei den swl. As-Verbb. $Zn_3(AsO_4)_2$ wiederholt angewandt kann schwere Verbrennungsschäden verursachen. Der Zusatz von FeS wird diese Gefahr nicht vermindert. Verschiedene Präparate deren Hauptbestandteile aus $PbHASO_4$ oder $Pb_3(AsO_4)_2$ bestehen, sind bzgl. der schädigenden Wrkgg. oft sehr voneinander verschieden. Einige *Monohydrobleiarsenite* wirken ebenso sicher wie die *Anhydroleiarseniate*. (Journ. Agricult. Research **24**. 501—37. 1923. Montana, Agric. Exp. Stat.) BERL.

G. Villedieu, *Über die Einwirkung von Kupfersulfatlösungen auf Mehltau*. Die Ansicht, daß die tox. Wrkg. sehr verd. $CuSO_4$ -Lsg. auf die Sporen des Mehltaus der Weinrebe (*Plasmopara viticola*) eine Wrkg. des gel. $CuSO_4$ ist, läßt sich nicht aufrecht erhalten. In sehr verd. $CuSO_4$ -Lsgg. ist das Salz als bas. Cu-Verb. $CuSO_4 \cdot 3Cu(OH)_2$ enthalten. Lsgg. von 1:10000 bis 20000 $CuSO_4$ lassen sich wiederholtem Filtrieren einen Teil ihres Cu auf dem Filter zurück. Lsgg. mit 1:100000 $CuSO_4$, die mit NH_3 -freiem dest. W. hergestellt worden waren, gaben nach mehrmaligem Filtrieren durch ein doppeltes Filter ein Filtrat, in dem Cu nicht mehr nachweisbar war; der Rückstand auf dem Filter war l. in Essigsäure. Enthält eine sehr verd. $CuSO_4$ -Lsg. $\frac{1}{5}$ oder $\frac{1}{10}$ der $CuSO_4$ -Menge an NH_3 , genügt diese geringe Menge, um das Cu-Salz in unl. bas. Sulfat überzuführen. Lsgg. unl. bas. Sulfate haben, wie Verss. mit Gonidien von *Phytophthora infestans* zeigen, dieselbe keimtötende Wrkg. wie die vermeintlichen $CuSO_4$ -Lsgg. (C. d. l'Acad. des sciences **179**. 1345—48. 1924.) HABERLA

J. C. de Ruyter de Wildt und **E. Brouwer**, *Untersuchung über eine teilweise Ersetzung von Heu durch andere Futtermittel*. Die Ersetzung von zwei Dritteln Heugabe durch feine Weizenkleie (tarwegrint), Maismehl, Erbsen- u. Hafersohle hatte bei Fütterungsverss. an Kühen bei gemischter Nahrung weder auf das Körpergewicht noch auf den Ertrag noch die Zus. der Milch wesentlichen Einfluß. Vereeniging tot exploitatie eener proefzuivel boerderij te Hoorn **1923**. 55-87. Sep.) GROSZFEI.

Everett A. Carleton, *Ein Vergleich der Calciumacetatmethode zur Feststellung des Kalkbedürfnisses nach Jones mit der Wasserstoffionenkonzentration einiger Böden in Quebec*. Die Jonesche Methode ergibt bei den betreffenden Böden CaO-Bedürfnis für neutrale u. schwach alkal. Böden bis zu $p_{II} = \text{ca. } 7,6$. Böden mit hohem CaO-Bedarf waren gewöhnlich schwach sauer, mit niedrigem in der Regel schwach alkal. (Soil science 16. 79—90. 1923; Ber. ges. Physiol. 28. 239. 1924. H. DÖRRIES.) SPIEGEL.

E. Blanck und F. Alten, *Ein Beitrag zur Frage nach der Vorbehandlung der Böden mit Ammoniak für die Atterbergsche Schlämmanalyse*. ATTERBERG versuchte, die Suspendierbarkeit der feinen Tonteile verhindernde Wrkg. der II. Salze u. besonders in eisenschüssigen Böden häufig vorkommenden $\text{Fe}(\text{OH})_3$ u. $\text{Al}(\text{OH})_3$ durch zu beseitigen, daß er diese Böden vor dem Schlämmen auf dem Wasserbade mit 2,5%ig. NH_3 behandelte. Nach den Unterss. der Vff. mit roterdeartigen Vsteböden Ägyptens kann dieses Verf. nicht ohne weiteres für alle Böden empfohlen werden, da die 2½%ig. NH_3 -Lsg. unter Umständen tief eingreifende Effekte ausübt, die bei den vorliegenden Unterss. zu einer beträchtlichen Lösung der SiO_2 geführt haben u. das gesamte Schlämmergebnis damit illusorisch machen. (Journ. f. Landw. 72. 153—62. 1924. Göttingen.) BERJUL.

M. S. Anderson, *Die „Befeuchtungswärme“ der Bodenkolloide*. Vf. diskutiert die Möglichkeit, den Kolloidgehalt der Böden aus der „Befeuchtungswärme“ zu bestimmen. — Er bedient sich nach PATRICK u. GRIMM eines Calorimeters, in das ein Kupfertrichter die gemahlene, durch ein 50er-Netz gesiebte, 18 Stdn. bei 110° getrocknete u. auf 25° gebrachte Bodenprobe eingefüllt wird. Nach 5 Min. wird die Temp. abgelesen; größte Abweichung bei Doppelbest. etwa 0,5 cal. — Die Befeuchtungswärme der Kolloide verschiedener Böden schwankt in weiten Grenzen. In einigen Fällen ist sie vergleichbar mit dem Wärmewert von Stärke u. künstlichen anorgan. Gelen. Der Kolloidgehalt des Bodens kann nicht durch die Befeuchtungswärme allein abgeleitet werden. Ein brauchbarer Näherungswert ist durch die Formel gegeben:

$$\text{Kolloidgehalt} = \frac{\text{Befeuchtungswärme des Bodens}}{\text{Befeuchtungswärme der Kolloide}} \times 100.$$

Diese Methode ist ungenau, 1. weil es schwer ist, aus der Menge der Bodenkolloide eine gleichartige Probe zu isolieren, 2. weil die Kolloide durch den Extraktionsprozeß verändert werden. (Journ. Agricult. Research 28. 927—35. 1924.) TRÉNEL.

Louis Adelantado, Barcelona, *Herstellung von Phosphatdüngemitteln* nach Pat. 400410, dad. gek., daß ein kleiner Überschuß an freier Säure über die zur Erzeugung der nicht phosphat. Anteile des Rohphosphats erforderliche Menge hinzugefügt wird. — Die Menge des erhältlichen zitratl. Phosphats ist erheblich größer als beim Arbeiten gemäß dem Hauptpatent. (D. R. P. 406098 Kl. 16 vom 22/6. 1924. ausg. 14/11. 1924. Zus. zu D. R. P. 400410; C. 1924. II. 1849.) KÜHLING.

Albert Louis Kreiss, Jacksonville, V. St. A., *Phosphatdüngemittel*. (Kurzes Patent nach A. P. 1413168, vgl. C. 1922. IV. 138.) Nachzutragen ist: Als Vorr. zur Durchführung des Aufschlußverf. für Rohphosphate dient ein schwach geneigt u. ordneter Drehrohfen, dessen Innenraum an dem der Heizanlage benachbarten Ende durch ein Futter aus feuerfestem Stoff verengt ist. Der nicht verengte Teil des Ofens ist mit einer schwachen Lsg. eines Alkalisalzes gefüllt. Während der Erzeugung des Ofens werden dieser Salzlsg. im stetigen Betriebe das aufzuschließende Phosphat u. neue Mengen Salzlsg. zugeführt; das Phosphat sättigt sich mit der Salzlsg. wird bei der Drehung des Ofens unter Mitwrkg. von zu diesem Zweck vorgesehenen Längsrippen wiederholt nach den höchsten Teilen des Ofens geführt, wo stark erhitzt u. fällt in diesem Zustand in die Lsg. zurück, wobei es allmäh-

lich in kleinste Teilchen zerfällt, die im verengten Teil in unmittelbarer Berührung mit der Heizflamme völlig aufgeschlossen werden. (N. P. 38061 vom 12/8. 1922, ausg. 15/10. 1923. A. Prior. 13/9. 1921.) KÜHLIN.

Elias Wirth-Frey, Aarau, Schweiz, *Herstellung eines Düngemittels*, 1. dad. gek., daß eingedickte Sulfitablauge mit den Rückständen verbrannter, vergaster landw. dest. Sulfitablauge gemischt wird. — 2. dad. gek., daß die Mischung so zusammen- gesetzt ist, daß ein streufähiges Prod. erhalten wird. — 3. dad. gek., daß die Dicklauge in noch fl. Zustand mit den Rückständen gemischt u. das Gemisch, wenn nötig, nachgetrocknet wird. — Es können auch Phosphorverb., gegebenermaßen unter Druckerhitzung, zugefügt werden. (D. R. P. 406099 Kl. 16 vom 30/12. 1922, ausg. 14/11. 1924.) KÜHLIN.

F. Quade, Zehlendorf, *Überführung des Ammoniumnitrates in einen gut streufähigen Mischdünger*, dad. gek., daß es mit etwa äquivalenten Mengen Alkaliphosphat, vornehmlich KH_2PO_4 , gemischt wird. — Das Mischen erfolgt bei sehr geringer Wassermengen. (D. R. P. 404622 Kl. 16 vom 21/7. 1922, ausg. 21/10. 1924.) KÜHLIN.

Badische Anilin- & Soda-Fabrik, Ludwigshafen a. Rh., (Erfinder: **Hermann Rasso**, Heidelberg), *Herstellung eines Mischdüngers*, dad. gek., daß NH_4O , NaCl u. gegebenenfalls NH_4Cl mit W. bei höherer Temp. zusammengebracht werden. — Gemische der Umsetzungsprodd. durch Kühlung zur Abscheidung gebracht werden. — Das Erzeugnis besteht prakt. vollständig aus NaNO_3 u. NH_4Cl . (D. R. P. 408088 Kl. 16 vom 5/6. 1923, ausg. 30/10. 1924.) KÜHLIN.

Stockholms Superfosfat Fabriks Aktiebolaget, Stockholm, *Körnung von Kalkstickstoff* in gedrehten Zylindern o. dgl., 1. dad. gek., daß die Dicke der Schicht des mit Fl. vorbehandelten Kalkstickstoffs im Zylinder dem Feuchtigkeitsgehalt der gewünschten Korngröße angepaßt wird, z. B. in der Art, daß, wenn es sich um die Erzeugung kleiner Körner handelt, die Schichtdicke verhältnismäßig klein, bei verhältnismäßig kleinem Feuchtigkeitsgehalt des Kalkstickstoffes gehalten wird, u. wenn große Körner erzeugt werden sollen, die Schichtdicke verhältnismäßig groß, klein bei verhältnismäßig großem Feuchtigkeitsgehalt des Kalkstickstoffes gehalten wird. — 2. Vorr. zur Ausübung des Verf., dad. gek., daß die eine oder beiden Endflächen des Behandlungszyinders mit genau einstellbaren Regelungseinrichtungen versehen sind, z. B. einstellbaren gegebenenfalls ringförmigen Schirmen o. dgl., welche in oder an den Endflächen des Zylinders, gegebenenfalls spiralförmig von der Peripherie bis zur Mitte angeordnet sind. (D. R. P. 405247 Kl. 16 vom 9/10. 1922, ausg. 28/10. 1924. Schwed. Prior. 22/6. 1921.) KÜHLIN.

Edouard Krebs, Kristiania, *Phosphorsäure und Kalium enthaltendes Düngemittel*. Rohphosphat wird mit Sulfitablauge, gegebenenfalls unmittelbar nach ihrem Austritt aus dem Kocher, gemischt, die Mischung zur Trockene verdampft u. bei der Verbrennung der organ. Bestandteile unter Luftzutritt gegläht. (N. P. 36401 vom 18/9. 1922, ausg. 24/12. 1923.) KÜHLIN.

Gaston Aurélien Bernard Bayonne, Frankreich, Haute-Garonne, *Verfahren zur Vernichtung der Larven des Springwurmwicklers des Weinstocks im Frühjahr*. Zwischen den holzigen Teilen des Weinstocks, in denen die eingesponnenen Rapsen des Springwurmwicklers, *Tortrix pilleriana* oder *Oenophthira pilleriana*, überwintern, u. den Knospen, die den im Frühjahr aus dem Cocon schlüpfenden Tieren als Nahrung dienen, wird eine Falle angebracht, die sie am Weiterkriechen hindert. Die Falle besteht aus einem Firnis, enthaltend mit Fett verdicktes Mineralöl, Carnaubawachs u. ein inertes Füllmittel wie Talk. Zur Beschleunigung des Abtötens können noch giftige Stoffe, wie As-Salze, zugesetzt werden. (F. P. 57344 vom 15/11. 1923, ausg. 12/7. 1924.) SCHOTTLÄNDER.

„Erda“ Akt.-Ges., Göttingen, *Untersuchung der Bodenbeschaffenheit auf Grund der Verteilung der elektrischen Leitfähigkeit im Boden*, 1. dad. gek., daß die durch natürlichen Erdströme hervorgebrachten Schwankungen des natürlichen magnet. Feldes an mehreren geeignet verteilten Punkten mittels Magnetometer gemessen miteinander verglichen werden. — 2. dad. gek., daß in dem zu untersuchenden Gebiet den natürlichen Erdströmen künstlich erzeugte Stromstöße überlagert werden. — Es lassen sich wasserführende Spalten oder Schichten, Gänge oder Lager von Erzen, Ölblasen, Salzlager o. dgl. auffinden. (D. R. P. 406299 Kl. 21 g 20/11. 1920, ausg. 17/11. 1924.) KÜHLING.

III. Metallurgie; Metallographie; Metallverarbeitung.

J. Traube, *Über Flotation und Adsorption. Erwiderung an Herrn W. Schäfer*. Enthält entgegen Verss. von SCHÄFER (Metall u. Erz 21. 401; C. 1924. II. 2238) die Behauptung der Parallelität von Flotations- u. Adsorptionsvermögen aufrecht und beschreibt Verss. mit Ölsäure von O. Bartsch, die dies beweisen. Außerdem eine mögliche Erklärung der Fehlerquellen bei SCHÄFER gegeben. (Metall u. Erz 21. 520—22. 1924.) ENSZLIN.

S. J. Truscott, *Dielektrische Mineraltrennung*. Besprechung der Prinzipien und der Flotation. Vf. bringt eine dielektr. Methode der Mineraltrennung in Vorschlag, bei welcher das fein gemahlene Mineral, welches aus einem Gemisch von hochwertigem Erze (Oxydes oder Sulfides) mit der Gangart besteht, in einer Suspension suspendiert wird, deren DE. zwischen der DE. des Sulfides und der DE. der Gangart liegt. In dieser Fl. wird durch zwei drahtförmig ausgespannte Elektroden ein elektr. Feld von 200 Volt mit 150 periodigem Wechselstrom erzeugt. Das hochwertige Mineral mit hoher DE. haftet dann an den Elektroden bei Stromdurchgang, während die Gangart mit niedriger DE. zu Boden fällt. Wird die Spannung erhöht, so brechen, dann sinkt auch das Mineral zu Boden. Am besten verwendet man zur Trennung der Erze von ihrer Gangart ein Gemisch von Kerosen (Raffiniertes Leuchtpetroleum) mit Nitrobenzol. Dieser Prozeß beruht weder auf einer elektrostat. Mineraltrennung noch auf einer Kataphorese. (Nature 114. 793—94. 1924.) BECKER.

V. Tafel und E. Greulich, *Über die Vorgänge bei der Röstung von Chalkopyrit*. B. von CuSO_4 beim Erhitzen des Chalkopyrits in einem Porzellanschiffchen auf Strom im Quarzrohr beginnt bei 350° , erreicht ihr Maximum bei 550° (60% Cu). Bei weiterer Steigerung tritt Zers. zu bas. Sulfat ein, das sich bei 650° in CuO u. SO_3 verwandelt. FeSO_4 entsteht schon bei 300° , erreicht sein Maximum (12% des Fe) bei 400° , bei höherer Temp. tritt der Zerfall ein, der bei 650° beendet ist. $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$ ist zwischen 400° u. 650° immer vorhanden. — CuSO_4 , FeSO_4 u. $\text{Fe}(\text{SO}_4)_3$ wurden im wss. Auszug bestimmt. Bas. Sulfate des Cu u. Fe wurden in 1% HCl durch 1stdg. Behandeln auf dem Wasserbad gelöst. Unl. nach den bekannten Methoden aufgeschlossen u. analysiert. (Metall u. Erz 21. 517—20. 1924.) ENSZLIN.

Robert D. Ferron, *Gebläserösten, eine Verbesserung des alten Pateraverfahrens in Bolivia*. Vf. beschreibt die Verbesserung des Pateraverf. zur Gewinnung von Kupfer durch Verwendung der Holt-Dern-Röster. Das Cyanidverf. ist wegen der hohen Verhältnisse nicht anwendbar. (Engin. Mining Journ.-Press 119. 853—54. 1924.) JUNG.

Maurice Derclaye, *Zahl, Form, Durchmesser und Lage der Windformen der Hochofenöffnungen*. III. Entwurf — entsprechend Mathesius — der Hochofendiagramme, der alle möglichen normalen Vorgänge zu überblicken. (II. vgl. Rev. de Metallurgie 21. 396; C. 1924. II. 1849.) Nach Anwendung der Theorie von MATHESIUS vergleicht Vf. das Ergebnis seiner verschiedenen Betrachtungen u. kommt zum Schluß, daß man hoffen kann mit einem Hochofen von bestimmten Dimensionen auszukommen. (VII. 1. 1924.)

Profil 225 t Thomasroheisen herzustellen, vorausgesetzt, daß ein doppelter Kollektor für die Heißluft u. 6 Windformen von 200 mm beim Schmelzen der Minette 30% ig. Ausbringen angewandt werden. Unter besonders günstigen Umständen ein solcher Ofen fähig, täglich 275 t herzustellen. (Rev. de Métallurgie 21. 450 461. 1923.) WILKE

E. Lavandier und M. Gangler, *Der Einfluß der Reinigungsart auf den W. des Hochofengases*. Die Reinigung auf nassem Wege erniedrigt die Gastemp. verursacht eine beträchtliche Verminderung der fühlbaren Wärme. Trotz des Verlustes — so zeigen die theoret. Betrachtungen — ist das therm. Potential des gekühlten Gases höher als von dem, das nichts von seiner fühlbaren Wärme verloren hat. Das Gaskühlen scheidet das im Gas enthaltene W. ab u. je intensiver diese Trocknung ist, um so höher steigt die Verbrennungstemp. (Rev. de Métallurgie 21. 501—11. 1924.) WILKE

Friedr. Riedel, *Ein neues Verfahren zur Herstellung von Rohren aus Hochofenschlacke*. Das Verf. von DRESLER, Mauersteine aus gemahlener Hochofenschlacke unter Zusatz von Schlackensand so herzustellen, daß Formlinge auf einer Maschine vorgepreßt u. diese dann in besonderer Kammer mit CO₂-haltigen Gasen gehärtet werden, wird ähnlich auf die Herst. von Rohren angewendet. Um die Rohre undurchlässig für W. zu machen, wurden sie wie Zementrohre innen mit Zementanstrich versehen. (Stahl u. Eisen 44. 1173—74. 1924.) NEUFELD

Richard Grün, *Einfluß des Mangangehalts auf die hydraulischen Eigenschaften von Hochofenschlacken*. Untersucht wird, in welchem Maße MnO nachteilig auf das Erhärtungsvermögen von Hochofenschlacken einwirkt. Zuführung von Mn verschlechtert die Hydraulizität einer Schlacke, Entziehung wirkt günstiger. In Mikrolichtbildern wird die Erscheinungsform des Mn in den Hochofenschlacken gezeigt. — Die für die B. von Hochofenschlacke in Betracht kommenden Silicate u. Aluminate werden hergestellt u. im Mn-freien u. Mn-haltigen Zustande verglichen. Sie werden durch Mn in ihrem hydraul. Härungsvermögen geschädigt. Bei Krystallisation scheidet sich Mn in den Silicaten schwach, in den Aluminaten stärker ab. In den Granulaten der Schlacken u. der synthet. Schmelzen bleibt Mn unter Gelbfärbung gelöst. (Stahl u. Eisen 44. 1405—9. 1924.) NEUFELD

R. C. Gosreau, *Bindemittel für feuerfeste Materialien*. Vf. berichtet unter Hinzufügung ausführlicher Tabellen über die Ergebnisse prakt. Feststellungen bei Heranziehung von Materialien mit ausreichendem Bindungsvermögen beim Putzen, Ausbessern u. Füttern elektr. Schmelzöfen. (Chem. Metallurg. Engineering 31. 696—98. 1924.) OEHLE

David Douglas Mac Guffie, *Die Wirtschaftlichkeit des elektrischen Stahlofens*. Vom 3 t-Héroult-Ofen werden die Hauptpunkte der Einrichtung, der Herst. u. Prodd., die Erhaltung usw. besprochen. Bei einer Produktion von 30 t je Woche zu 6 Tagen belaufen sich die Kosten für den Ofen unter den näher bezeichneten Bedingungen auf 9 £ 10 s ein t. (Metal Ind. [London] 25. 501—2. 1924.) WILKE

Edwin L. Willson, *Graueisen mittels Elektroofens*. Auf Grund von Verss. über die Herst. von grauem Eisen aus Schrott bespricht Vf. die Aussichten bestimmter Methoden des bas. u. sauren Prozesses. (Metal Ind. [London] 25. 504. 1924.) WILKE

Franz Weber, *Zur Physik des technischen Eisens*. Bericht über die physikal. Eigenschaften des Fe u. seiner C-Legierungen. Modifikationen des Fe u. Fe₃C. Ausführliche Literaturangabe. (Naturwissenschaften 12. 1106—14. 1924. Düsseldorf.) BECKER-ROSI

E. Diepschlag und H. Consbruch, *Über die Entstehungsbedingungen und die Verwendungsmöglichkeit des Eisencarbonyls*. Eisencarbonyl Fe(CO)₅, F. — 10°, Kp.₇₄₉ 102,8°, spezif. Gew. bei 18°: 1,4664, zerfällt bei 140° in Fe u. CO. Für einen Hochofen kommt es also nicht in Betracht, jedoch könnte man es zur Gewinnung

reinem Fe (entsprechend Nickelcarbonyl) verwerten. Verss., die bei 60° u. 7 mm Druck ausgeführt wurden, führten zu keinem Erfolge, da das $\text{Fe}(\text{CO})_5$ fl. geschieden wird u. das betreffende Fe sofort mit einer Haut umgibt, die die weitere Rk. verhindert. — Aus den von den Vf. ausgeführten Verss. geht hervor, daß der Partialdruck des Bodenkörpers mit steigendem Druck langsam abnimmt, sich einem konstanten Werte nähert, daß ferner mit steigendem Druck die Konz. von $\text{Fe}(\text{CO})_5$ im Gleichgewichtssystem zunimmt. Solche Verss., $\text{Fe}(\text{CO})_5$ bei höherem Druck herzustellen, sind im Gange. Im ganzen sind aber die Aussichten, $\text{Fe}(\text{CO})_5$ zu verwerten, weit geringer als die des $\text{Ni}(\text{CO})_4$. (Stahl u. Eisen **44**. 1250. Breslau.)

LÜDER.

Theodore Swann, *Ferrophosphor aus dem elektrischen Ofen*. (Vgl. S. 161.) Ferrophosphor wird neuerdings vielfach in der Stahlindustrie angewendet, da P-haltige Stähle bei tieferer Temp. gewalzt werden können als gewöhnlicher Stahl. Im Martin-Ofen kann man Ferrophosphor bis zu einem Gehalt von 20% P herstellen, im elektrischen Ofen ein solches bis 26% P, das hauptsächlich die Verb. Fe_3P_2 , daneben auch FeP enthält. Die Rohmaterialien sind Phosphorit, Koks, Sand u. Fe-Schrott, die im elektr. Ofen zusammengeschmolzen werden. Zum Schluß gibt Vf. zwei Analysen von Ferrophosphor mit 18 u. 24% P. (Iron Age **114**. 1469—70. 1924. Birmingham)

LÜDER.

J. A. Bolton, *Gefügebausecheidung im grauen Roheisen*. Vf. gibt einen allgemeinen Überblick über die Zusammenhänge zwischen dem Gefüge u. den mechanischen Eigenschaften von Gußeisen. Maßgebend ist die Ausscheidung der Graphitflocken; so werden die einzelnen Strukturelemente, besonders Perlit, an Hand von Gefügebildern besprochen u. einige Beispiele aus der Praxis behandelt. (Foundry **52**. 628; C. **1924**. II. 1850.) (Iron Age **114**. 685—89. 1924. Bolton [O.])

LÜDER.

F. L. Joseph, *Der Schwefelgehalt des Kokes und die Kosten des Eisens*. (Metal Ind. [London] **25**. 357—58. 1924. London.)

LÜDER.

Richard Moldenke, *Gußeisenröhren-Fabrikation im Süden*. Vf. gibt die Beschreibung mehrerer Verff. zur Herst. gußeiserner Röhren nebst einigen statistischen Angaben über die Gesamtproduktion Amerikas. (Iron Age **114**. 697—98; Mining and Metallurgy **5**. 472—74. 1924. New York.)

LÜDER.

Anson Hayes, W. J. Diederichs und H. E. Flanders, *Die Graphitierung von Gußeisen*. (Metal Ind. [London] **25**. 479—80. 1924. — C. **1924**. II. 2553.)

E. J. Lowry, *Der Einfluß der Kokille aufs Gußeisen*. Die Verss. zeigen, daß der C-Gehalt, mit Ausnahme von Mn, durch die Abkühlung beeinflusst wird. Es ist interessant festzustellen, daß die ungleichmäßige C-Verteilung bei dem höher silizierten Fe nicht so ausgeprägt ist, wie bei den niedrig silizierten. Weiter ist festgestellt, daß der Si-Gehalt in der Nähe der Kokille geringer als in etwas größerer Entfernung, während bei Sandguß die Verteilung des C mehr oder weniger von der Gußtemp. beeinflusst wird. Der S-Gehalt ist in der Nähe der Kokillen bei niedrig siliziertem Fe geringer, seltsamerweise machen die Blöcke mit mittlerer Gußtemp. eine Ausnahme. Während beim Sandguß die C-Verteilung gleichmäßig bleibt, sind die der Kokille benachbarten Teile P-arm. Nur bei niedrigem S-Gehalt bleibt in allen Fällen gleichmäßig verteilt. (Metal Ind. [London] **25**. 455—56. 1924.)

WILKE.

A. H. Palmer, *Schwefel als Härtungsmittel*. S wird im allgemeinen als schädlicher Bestandteil im Gußeisen angesehen; Vf. vertritt jedoch die Ansicht, daß auch unter Umständen eine nützliche, sogar notwendige Beimengung sein kann. An Hand von Schlußbildern u. Analysen wird nachgewiesen, daß der S als härtender Bestandteil wertvoll sein kann. (Foundry **52**. 894—96. 1924. Cleveland [O.])

LÜ.

George F. Comstock, *Aluminium und Titan als Desoxydationsmittel*. untersucht die Wrkg. von Al u. Ti als Desoxydationsmittel für Elektrostahtsaurer Zustellungsmasse. Ti gab Stähle mit besseren Festigkeitseigenschaften Al, was auf die Art der Schlackeneinschlüsse u. besonders die Anordnung sulfidischen Verunreinigungen zurückzuführen ist. In den mit Ti behandelten Stählen ist das Gefüge gleichmäßiger u. feiner. Der Arbeit sind Tabellen u. Mikrophotographien beigelegt. (Iron Age **114**. 1477—79. 1924. Niagara Falls [N. Y.])

Wilhelm Oertel und **F. Pölguter**, *Beitrag zur Kenntnis des Einflusses von Kobalt und Vanadin auf die Eigenschaften von Schnellarbeitsstahl*. Die Schnellarbeitsfähigkeit mit W u. mit Mo legierter Schnellarbeitsstähle wird durch Zusatz von V u. V verbessert. Der Einfluß von Co ist weit geringer als der von V. Bei gegenwärtigen hohen Preise von Co scheint daher seine Verwendung als Zusatz zu Schnellarbeitsstahl nicht lohnend. Durch geringes Anlassen gehärteter Schnellarbeitsstahles wurde in einigen Fällen die Schnittleistung erheblich gesteigert. In der Erörterung betonte FRANZ RAPATZ, daß die vielfach beobachtete Zähigkeitssteigerung durch Anlassen von Schnellstahl auf ca. 600° noch nicht eindeutig erklärt wurde. — Abgebildet werden der Härtebereich u. Kleingefüge von Mo- u. eines W-Schnellstahles, weitere Tabellen sind speziellerer Natur. (Stahl u. Eisen **44**. 1165—69. 1924.) NEUFEL

Georg Hannack, *Über Magnetstahl unter besonderer Berücksichtigung der Beziehungen zwischen Kohlenstoff und den magnetischen Eigenschaften*. Vf. untersucht W- u. Cr-Stähle auf ihre Verwendbarkeit als Magnete. W-Stähle haben durchschnittlich eine höhere magnet. Leistungsfähigkeit (= Produkt aus Remanenz u. Koerzitivkraft) als Cr-Stähle). Mit zunehmendem Cr-Gehalt geht die Leistungsfähigkeit obendrein zurück. — Die Hauptrolle spielt bei W- wie auch bei Cr-Stählen der C-Gehalt. Die Leistungsfähigkeit steigt mit dem C-Gehalt. Wird dieser zu hoch, läßt sich das betreffende Stück schwerer härten, so daß man beim W-Stahl mit 0,65% C etwa an der Grenze des prakt. Brauchbaren angekommen ist. — Die DAEVESHschen Vorschläge bezüglich der Auswertung möglichst vieler Beobachtungswerte lassen sich auch bei der Unters. der Magnetstähle anwenden. (Stahl u. Eisen **44**. 1237—43. 1924. Köln.) LÜDE

K. Harnecker, *Beitrag zur Frage des Damaszenerstahls*. Ein dem echten Damaszener Muster entsprechendes Gefüge wird durch Schmieden übereutektoiden grobkristallinen Stahles bei Temp. unterhalb der ES-Linie erzielt. Je reichlichere Glühung u. dem Grade des Durchschmiedens lassen sich mehr oder weniger vortretende Zerstörungen der primären Netz- u. Nadelstruktur erreichen. Dadurch tritt an die Stelle einer früheren Zementitnadel unter Beibehaltung ihrer Abgrenzungen makroskop. Umrisse ein Haufwerk kugeligen Zementits, dessen Erhaltung für die Ausbildung des Damastmusters erforderlich ist. Die Ätzung läßt den Zementit auf der Klinge hellweiß hervortreten. Die dunkel geätzten Stellen des Damastmusters entsprechen den ursprünglichen Perlitkörnern u. behalten, bei behinderter Diffusion, deren Zus. bei. Als Ausgangswerkstoff kann Gußstahl u. Zementstahl dienen. (Stahl u. Eisen **44**. 1409—11. 1924.) NEUFEL

T. Pecsalski und **A. Launert**, *Zementationsgeschwindigkeit des Kupfers in Abhängigkeit von der Temperatur*. (Vgl. C. r. d. l'Acad. des sciences **178**. 1962—64. C. **1924**. II. 1073.) Durch Erhitzen von Cu-Stäbchen mit KCl im elektr. Feld wurde ein Optimum der Geschwindigkeit der Zementation bei 850° festgestellt. Oberhalb dieser Temp. nähert sich die Geschwindigkeit dem Wert 0, den sie beim F. des Cu erreichen würde. Ebenso nähern sich die anderen Eigenschaften (Leitfähigkeit, D. usw.) wieder denen des reinen Cu. Das gleiche Verh. bewiesen BaCl₂ u. CaCl₂. (C. r. d. l'Acad. des sciences **179**. 887—90. 1924.) ENSZLI

—, *Erfahrungen mit Aluminium in der chemischen Industrie*. Nachtrag zu den Ergebnissen der Rundfrage. (Vgl. Chem.-Ztg. 48. 90; C. 1924. I. 2201.) (Chem.-Z. 48. 921. 1924.) JUNG.

Max Jakob, *Die Wärmeleitfähigkeit technischer Metalle und Legierungen*. V. Ztschr. f. Metallkunde 16. 353; C. 1924. II. 2610.) Anschließend folgt eine Besprechung von A. FOCH. (Chaleur et Ind. 5. 557—63. 1924. Berlin.) LÜDER.

K. Hallmann, *Aludur*. Die Aludurlegierungen sind vergütbare Al-Legierungen mit einem Mindestgehalt von 99% Al. Härtbare Aludurlegierungen können geringe Zusätze von Mg, Si, Cu, Zn enthalten. Die Vergütung kann bestehen aus 1. Härtebehandlung, 2. Abschrecken, 3. Wärmehärten. In letzterem Fall werden die Legierungen bei etwa 160° warm bearbeitet. Die günstigste Härtetemp. u. Dauer sind für jede Legierung charakter. Größen. Die Aludurlegierungen zeigen große Härte, Zähigkeit, gute Bearbeitbarkeit, Dehnbarkeit u. ein hohes elektr. Leitvermögen. Sie werden ebenso korrodiert wie reines Al. Aludur läßt sich polieren, vernickeln u. elektr. schweißen. (Ztschr. f. Metallkunde 16. 433—35. 1924. München.) BE.-R.

O. Reuleaux, *Scleronlegierungen*. Scleronlegierungen sind Al-Legierungen mit Zusätzen von Cu, Ni, Zn, Mn, Si u. manchmal Li. Die Zusätze sollen sich zusammen innerhalb der Grenzen von 5—15% bewegen. F. ist von der Zus. abhängig u. darf nicht unter 600° liegen. Durch Wärmebehandlung tritt eine Vergrößerung der Legierungen ein, doch dürfen diese nachher nicht über 200° erhitzt werden. Die Gütezahlen sind in einer Tabelle angegeben. (Ztschr. f. Metallkunde 16. 436—37. 1924. Frankfurt a. M.) BECKER-ROSE.

O. Bauer und O. Vollenbruck, *Die Härte der Kupfer-Zinnlegierungen*. Vff. bestimmen die Kugeldruckhärte von 29 Cu-Sn-Legierungen verschiedener Zus. Die größte Härte besitzt Cu₄Sn, wo ein sehr spitzes Maximum erreicht wird. Cu₃Sn fällt ebenfalls aus der Härtekurve heraus, erreicht jedoch kein Maximum. Cu₅Sn₅ markiert einen Wendepunkt der Kurve. Innerhalb der Mischkristallgrenzen des Cu-Zn-Zustandsdiagramms ist der Härteanstieg mit zunehmendem Cu- bzw. Sn-Gehalt gering. Erst beim Auftreten der Verbb. wird die Kurve steiler. Eine Vergrößerung der Härte nach dem Abschrecken der Bronzen tritt nur bei bestimmten Zus. ein. (Ztschr. f. Metallkunde 16. 426—29. 1924. Berlin-Dahlem.) BECKER-R.

R. Perrin, *Das Eindringen der Bronze in Eisen bei hohen Temperaturen*. Die Bronze enthielt 14% Sn, 85% Cu, 0,5% Pb u. Spuren Fe; als Fe wurde C-Stahl mit 0,25% C, 0,3—0,5 Mn oder 0,4—0,6% C, 0,3—0,6% Mn oder 0,7—1,2% C, 0,3—0,7% Mn, alle Arten maximal 0,04 P u. 0,04 S, Nickelstahl (12,22 u. 36%) u. Perlitstahl (2,5—2,8% Ni, 0,7% Cr u. 40% Ni u. 10% Cr) benutzt. Die qualitativen Ergebnisse zeigen, daß bei 1000° eine Zementation stattfindet. Die Ggw. bedeutender Zementation bewirkt ein tiefes Eindringen der Bronze. Bei C-Stählen u. den perlit. Stählen ist die Zementation gering u. ungleichmäßig. Dabei ist der Zusammenhang zwischen Bronze u. Stahl allgemein ein guter u. fester. Beim Bronzieren der Stahlstücke muß man also die Ni-reichen Stähle vermeiden, da diese ein schnelles Eindringen der Bronze gestatten u. damit die Festigkeit des Stückes mindern. (Rev. de Métallurgie 21. 531—38. 1924.) WILKE.

L. W. Müller, *Die Zinkverluste beim Messingschmelzen und ihre Zurückführung*. Vff. regt an, den Kaminkanälen in den Messingschmelzwerken eine Reinigungsänderung zu erteilen, um infolge der dadurch erzielten Stauung das beim Messingschmelzen unvermeidlicherweise gebildete ZnO zur Ablagerung zu zwingen, andernfalls mit den Rauchgasen den Kamin verläßt. (Metall u. Erz 21. 552—53. Chem.-Ztg. 48. 943—44. 1924.) OEHLER.

Edgar C. Bain, *Die Anwendung der Krystallanalyse durch Röntgenstrahlen in der Metallurgie*. Vff. gibt eine zusammenfassende Übersicht über die Möglichkeit, Metallograph. folgende für die Metallographie wichtigen Fragen zu erörtern:

Allotropie, feste Lsgg., Rekristallisation, Korngröße, Auftreten neuer Bestandteile. Einfluß der Kaltbearbeitung, weiterer Ausblick. (Ind. and Engin. Chem. **16**. 692 698. 1924. Dunkirk [N. Y.], Atlas Steel Corp.)

BECKER

Gerber, *Moderne Härteanlagen*. Besprochen werden die Theorie der Härten, die Einrichtungen primitiver Härten im gewöhnlichen Schmiedefeuer u. im einseitig geschlossenen Gasrohr. Die Härten bei Anwendung in Sonderöfen u. in der Konstruktion von W. RUPPMANN u. zwar in Öfen mit offenem Glühraum u. in Muffelöfen sowie in Rekuperativöfen mit angebauten Kleingeneratoren oder mit reiner Gasfeuerung von einer Zentralanlage wird an Hand von 2 Abb. beschrieben. Geschildert werden die Einsatzhärtung in C-reicher Packung in Kästen aus Blei oder Gußeisen; ferner die Bleibadhärtung u. die immer mehr sich einbürgert Salzbadhärtung; weiter das Anlassen, die Hilfsmittel in der Härterei u. die Anlage der Härterei. (Zentralbl. d. Hütten- u. Walzw. **28**. 118—20. 1924.)

NEUFELD

Maurice Lebrun, *Theoretische Betrachtungen über das Schweißen mit dem Lichtbogen*. Vf. bespricht das Schweißen im allgemeinen u. gibt dann die Merkmale der Elektroden an. (Rev. de Métallurgie **21**. 484—95. 1924.)

WILKINSON

E. A. Hanff, *Multipelsystem des elektrischen Schmelzens*. Das Multipelschmelzsystem, das von SWINDELL & BROTHERS, Pittsburgh, vervollkommen wurde, wird beschrieben u. die Vorteile gegen andere Systeme (Verminderung der Arbeitskosten pro t, der Elektrodenabnutzung usw.) aufgezählt. (Iron Age **114**. 999—1003. 1924.)

WILLIAM SWINDELL & BROTHERS, Pittsburgh.)

WILKINSON

F. C. Edwards, *Die Bedeutung gleichmäßigen Abkühlens in Gußstücken*. Vf. bespricht 2 sehr interessante Beispiele, bei denen durch falsches Abkühlen fehlerhafte Stücke entstanden sind. (Metal Ind. [London] **25**. 525—27. 1924.)

Horace C. Knerr, *Aluminiumlegierungsgußstücke aus Blechabfällen*. Die bei einer sehr kleinen Gießerei ausgearbeiteten Methoden werden beschrieben. Unter Bedingungen von gesunden Sandgußstücken aus Al-Legierungen konnten results bei Anwendung von nur Al-Blechen u. sonstiges auf der Fabrik vorhandenes Material erreicht werden. Das gegossene Metall enthielt 7—8,5% Cu u. 1,7% max. ansonstige Verunreinigungen; die Zugfestigkeit betrug 12,66 kg/qcm. Durch genaue pyrometr. Kontrolle u. Vermeidung langen u. Überhitzens des Metalles wurde das Ergebnis erreicht. (Metal Ind. [London] **25**. 470—72. 1924.)

WILKINSON

T. F. Jennings, *Cupolofengußstücke*. Das Gießen von Cu in Sand wird als besonders schwierig angesehen, weil Cu wie die meisten elementaren Metalle Gase während des Schmelzprozesses absorbiert u. beim Erstarren wieder ausscheidet. Vf. hat es fertiggebracht aus Cupolöfen, die viele zum Schmelzen von Cu geeignet in Betracht ziehen, Gußstücke von beträchtlichem Gewicht herzustellen. Es wird ein Nr. 3, Whiting Cupolofen, benutzt u. wie beim Fe-Schmelzen hergerichtet. Besondere Sorgfalt muß darauf verwandt werden, daß Cu vor dem S des Kokses geschützt wird. CaCl₂ wurde als Flußmittel u. 15% ig. Phosphorkupfer als Desoxidationsmittel zugesetzt. Die Gießtemp. betrug 1065°. Sollen die Cu-Gußstücke säurefest hergestellt werden, so werden 2—4% einer Legierung aus 16% Cr, 1% P u. der Rest Cu zugesetzt. Die Gußstücke waren nicht vorgesehen für hohe elektr. Leitfähigkeit. Auch Messing kann man im Cupolofen erschmelzen, nur muß man das vorher erhitzte Zn kurz vorm Guß zugeben. (Metal Ind. [New York] **22**. 444—45. 1924. Foundry **52**. 927—28. 1924. Garfield, Utah.)

WILKINSON

Harry Buddington Maxwell, *Schwarznickelplattieren*. Die vom Bureau of Standard empfohlene Lsg.: Nickel- u. Ammoniumsulfat 226 g, ZnSO₄ 28,3 g, NaNS 56,6 g u. 4,5 l W. bei Anwendung von 0,5—0,6 V ergab nicht immer befriedigende Resultate. Es wird folgende Lsg. empfohlen: 226 g NiCl₂, 28,3 ZnCl₂, 56 g NaCNS u. 4,5 l W. bei 0,7 Volt. Dieser Elektrolyt muß auf NaCNS, NiCl u. ZnCl₂ kontrolliert werden. — Das NaCNS wird mit konz. HNO₃ in Na₂SO₄ verwandelt.

als BaSO_4 , Ni wird mit Dimethylglyoxim u. Zn als $\text{Zn}_2\text{P}_2\text{O}_7$ bestimmt. (Metal [New York] 22. 449. 1924.) WILKE.

E. Maass und E. Liebreich, *Zur Frage der Korrosion von Metallen*. Übersicht über die für Korrosionserscheinungen an Metallen wichtigen Gesichtspunkte. (Zhr. f. angew. Ch. 37. 897—99. 1924.) NEUFELD.

Ulick R. Evans, *Die Beziehung zwischen Anlaufen und Korrosion*. (Vgl. Journ. Chem. Ind. 43. T. 127; C. 1924. II. 2087.) Vf. gibt zunächst einen kurzen Überblick über seine früheren Arbeiten auf dem Gebiet der Korrosion u. beschreibt eine neue Verss. über die Einw. von SO_2 auf Fe u. Zn u. von H_2S auf Cu. Ein Gang behandelt mathemat. die Geschwindigkeit des Anlaufens u. der atmosphär. Korrosion unter besonderer Berücksichtigung der Verss. von VERNON (Trans.aday Soc. 19. 839; C. 1924. II. 2203). — Fe u. Zn werden von trockenem SO_2 angegriffen, doch genügen schon geringe Mengen von Wasserdampf, um einen starken Angriff zu ermöglichen. Die Oberfläche des korrodierten Fe ist mit glänzenden Kreisen bedeckt, die in der Mitte einen dunklen Fleck, an dem eine Vertiefung aufweisen. Es wird angenommen, daß die Mitte dieser Stellen anod. angegriffen, die glänzende Umgebung kathod. geschützt war. Auch in einem homogenem Material können sich Potentialdifferenzen infolge verschiedener Feuchtigkeit ausbilden, wie mit 2 Cu-Elektroden in H_2S experimentell nachgewiesen werden konnte. — Trockenes Cu nimmt in H_2S -Atmosphäre glänzende Anlauffarben an, deren Verfolgung bis zum Grün vierter Ordnung gelang. Sehr geringe Mengen Wasserdampf katalysieren die Einw. des H_2S . Augenscheinlich wird hier in situ Sulfid gebildet, das in mechan. festem u. opt. Kontakt mit dem Cu steht. Beobachtet sich jedoch eine Schicht W., wenn auch nur sehr dünn, auf dem Cu, so wird die Korrosion ein unter B. von nicht anhaftendem schwarzem oder braunem Niederschlag. Tropfen von H_2S -W. rufen ähnliche Zonenphänomene hervor, wie oben beschrieben. — Alle Erscheinungen nach liegt also hier auch elektrolyt. Korrosion vor. (Trans. Amer. Electr. Soc. 46. 26 S. 1924. Cambridge [England]. Sep.) HERT.

Metals Production Ltd., London, *Erhitzung von Eisenverbindungen enthaltenden Erzen*, um die Fe-Verbb. zum Zwecke nachfolgender magnetischer Scheidung der Oberfläche paramagnet. zu machen, dad. gek., daß die Erhitzung des zerstückelten Erzes in einer Atm. von überhitztem Wasserdampf bei einer Temp. von 300—500° u. während einer Zeitspanne von etwa 20 Min. erfolgt. — Das Verfahren der bekannten Röstung bei geeigneter Temp. den Vorzug der feinen Erbarkeit, die für den Erfolg von wesentlicher Bedeutung ist. (D. R. P. 406668 vom 2/10. 1920, ausg. 26/11. 1924. E. Prior. 28/8. 1920.) OELKER.

my Biernbaum, Goslar a. Harz, *Abrösten oder Behandeln schwefelhaltiger Erze*, insbesondere Zinkblende oder anderer Erze u. dgl., bei denen vorzeitige Erhitzung oder zu frühes Ausbrennen eines Brennstoffes unerwünscht ist, auf dem Verfahren von Dwightapp., dad. gek., daß im Anfang des Verf. die Luftmenge in abnehmender Weise gedrosselt wird. — Im Gegensatz zu bekannten Verff. wird die Erhitzung einer zweiten Dwightvorr. überflüssig bzw. die Leistungsfähigkeit der Vorr. erhöht. (D. R. P. 404110 Kl. 40a vom 29/8. 1922, ausg. 11/10. 1924.) KÜHLING.

Ferdinand Dietzsch, Chile, *Aufarbeiten von Erzen*. Die gepulverten Erze, teilweise Cu, Au, Ag u. Schwefel enthaltende, sollen oxydierend u. chlorierend, bei Ggw. von Oxydationsmitteln wie MnO_4K oder MnO_2 u. Chloriden, wie FeCl_3 geröstet oder mit an NaCl u. SO_2 gesättigten Lsgg. behandelt u. dann mit Lsgg. von Cyanalkalien oder Thiosulfat, gegebenenfalls unter Zusatz von NH_3 zunächst mit W. u. dann mit Cyanid- oder Thiosulfatlsgg. ausgelaugt werden. — Die u. silberführenden Kupfererzen führt dieses Verf. zu einer wesentlichen

Ersparnis an Cyaniden. (F. P. 574178 vom 7/11. 1923, ausg. 7/7. 1924. E. P. 13/8. 1923.) KÜHLIN

Lucien Paul Basset, Frankreich, *Gewinnung von Metallen, besonders Eisen und kohlenstoffhaltigem Eisen*. Zerkleinerte Mischungen von Erz, der zur Reduktion des Erzes erforderlichen Menge Kohle u. gegebenenfalls einem Flußmittel werden in Drehrohröfen geglüht mittels einer durch Verbrennen von zerstäubter Kohle oder KW-stoffe mit so viel zweckmäßig überhitzter Luft erzeugter Flamme, daß im wesentlichen CO u. höchstens geringe Mengen von CO₂ entstehen. Die Temp. wird so gehalten, daß die entstehenden Erzeugnisse, Metall u. Schlacke, nicht schmelzen. Die M. wird dann unter Luftabschluß in einen zweiten Ofen übergeführt, in welchem das Metall ausgeschmolzen wird. Hierzu wird zweckmäßig ein Flußmittel verwendet, der mit Flammen gleicher Art beheizt wird u. dessen Gewölb mit Brenner usw. aus Kohle oder besser Carborundum bestehen. Der Luftabschluß bei der Überführung in den zweiten Ofen kann vermieden werden, wenn die Überführung unter Zusatz kalkhaltiger Flußmittel erfolgt, welche verglasende oder sintende Schlacken bilden, die das reduzierte Metall überziehen. (F. P. 573680 vom 1/12. 1923, ausg. 27/6. 1924.) KÜHLIN

P. Farup, Vettakollen, Norwegen, *Gewinnen von in Eisenerzen enthaltenen Chrom-, Mangan-, Molybdän-, Vanadin- und Wolframverbindungen*. Die feineren kleinerten Erze werden unter Zusatz alkal. Flußmittel reduzierend geschmolzen u. die Schmelze mit k. oder w. W., gegebenenfalls unter Druck ausgelaugt, wobei Chrom-, Mangan- usw. gel. werden. (N. P. 37965 vom 24/7. 1916, ausg. 10/12. 1923.) KÜHLIN

Albert Hiorth, Kristiania, *Verkohlen von Brennstoffen unter gleichzeitiger Reduktion von Erzen*. Die gepulverten oder gekörnten Brennstoffe u. Erze werden getrennt oder gemischt in einen generatorartigen Ofen eingeführt, der mit Öffnungen versehen ist, durch welche das entstandene Metall vor Erreichung der heißen Zone des Ofens stetig oder zeitweilig abgezogen wird. (N. P. 38648 vom 1/12. 1916, ausg. 24/12. 1923.) KÜHLIN

Franz Burgers, Gelsenkirchen, *Verhütten von Erzen aller Art in Hochschachtöfen unter Vorwärmung der zugeführten Gase*, dad. gek., daß kriegsnotwendige Reduktionsgase, wie Koksofengas, CH₄ oder andere KW-stoffe, in den Ofen in der Reduktionszone eingeführt werden. — Z. B. wird gemäß dem Verf. der Hochschachtöfen zu Eisenschwamm reduziert, wodurch die Arbeit erheblich erleichtert wird. Erzeugung gesteigert u. der Koksverbrauch verringert wird. (D. R. P. 403981 vom 16/10. 1921, ausg. 20/10. 1924.) KÜHLIN

Miami Metals Company, Chicago, *Regenerativofen mit umkehrbarer Flammenführung und Verfahren zum Betrieb desselben*, 1. gek. durch Einschnürung des Gasluftgemisches bei der Brennermündung mit nachfolgender Wiedererweiterung — 2. dad. gek., daß die Zuströmung zur Einschnürstelle u. die Abströmung zur Erweiterung Herde allmählich verläuft. — 3. dad. gek., daß die Einschnürung mit Hilfe von Einstellmitteln (Schiebern, Klappen u. dgl.) veränderlich entweder von oben oder von beiden Seiten her oder von oben u. von beiden Seiten her durchzuführen ist. — Die Einschnürung bewirkt innigste Durchmischung von Gas u. Luft u. in der mit der nachfolgenden Erweiterung hohe Geschwindigkeit bei geringem Druckverlust aufwand. (D. R. P. 404081 Kl. 18b vom 21/9. 1922, ausg. 13/10. 1924. A. P. 26/9. 1921.) KÜHLIN

Guillaume Justine Kroll, Luxemburg, *Entschwefeln von Eisen und anderen Metallen*. Die zu entschwefelnden Metalle werden in geschmolzenem Zustande, gegebenenfalls wiederholt, mit Gemischen von bas. Alkali- oder Erdalkaliverb., z. B. Na₂CO₃ u. reduzierend wirkenden Stoffen, wie den Carbiden oder Cyanamiden des C oder Mg oder Si behandelt. Der Schwefelgehalt wird ohne Änderung des Gehalts an

Si wesentlich, z. B. um 70% verringert. (F. P. 573866 vom 28/11. 1923, 2/7. 1924.) KÜHLING.

Walter Prosser Heskett, Kokohuia, Neuseeland, *Metallpulver*. In einem beheizten Tiegel wird zunächst Ferromangan geschmolzen, dann Al u. nachdem dieses geschmolzen Sb eingetragen, die Schmelze kräftig gerührt u. unter Luftabfluß erkalten gelassen, wobei sie zu Pulver zerfällt. (N. P. 38080 vom 13/12. 1923, ausg. 15/10. 1923.) KÜHLING.

F. Thuaud und Soc. an. Electrométallurgique de Mont-Richer, Paris, *Erzeugungen*, welche neben Fe 0,02—0,05% C, 0,04—0,07% Mn, 3,5—4,2% Si, 0,0—3% Ni u. 0,5—1% Ti enthalten, werden durch Bereitung von möglichst reinem Eisen elektr. Ofen u. Zusatz von Si, Ni, Ti u. gegebenenfalls Mn gewonnen. Die aus der Legierung hergestellten Bleche werden durch Glühen in Ggw. von magnet. Eisenoxyd entkohlt. In ähnlicher Weise werden auch *Eisenlegierungen* mit 0,1 bis 0,2% C, 0,15—0,3% Mn, 1,5—3% Si u. 0,03—0,04% Schwefel u. P gewonnen. (D. R. P. 222088 vom 31/7. 1924, Auszug veröff. 12/11. 1924. Prior. 22/9. 1923.) KÜHLING.

Zenzes G. m. b. H., Berlin-Westend, *Erzeugung eines sehr heißen und schwefelreichen Rinneneisens* aus Schrott zum Verblasen im Kleinkonverter u. zur Herst. von Grauguß, dad. gek., daß der Ofencharge zusammenhängende Gemengestücke aus Ferrosilicium, Eisen- oder Metallspänen u. natürlichem Graphit zugesetzt werden, um entschwefelnde Wrkg. durch Mn, CaF₂ o. dgl. erhöht werden kann. — Der Graphit dient als Bindemittel. (D. R. P. 404000 Kl. 18b vom 9/12. 1921, ausg. 1/1. 1924.) KÜHLING.

Heinrich Koppers, Essen-Ruhr, *Destillation von Zink*, 1. dad. gek., daß vor der eigentlichen Inbetriebnahme der Öfen zur Zinkdest. jeweilig in den Destillationsräumen eine Kohlendest. unter derartigen Druckverhältnissen vorgenommen wird, welche in die Poren u. Fugen der feuerfesten Steine des Destillationsraumes eindringt u. sich dort mit den von der anderen Seite kommenden Feuergasen austauschenden KW-stoffe eine Zers. unter Kohlenstoffabscheidung erleiden, die eine Reinigung der Poren u. Fugen bewirkt. — 2. dad. gek., daß die in den feuerfesten Räumen zur Ablagerung gelangte, jeweilig wieder von den Feuergasen angegriffene Kohlenstoffschicht dadurch ständig erneuert wird, daß in regelmäßigem Wechsel mit der Zinkdest. eine Kohlendest. vorgenommen wird. — Die Kohlenstoffschicht wird während der Zinkdest. Außenluft u. Feuergase ab. (D. R. P. 404111 Kl. 40a vom 4/8. 1922, ausg. 13/10. 1924.) KÜHLING.

Fritz Hansgirtl, Graz, *Elektrolytische Aufarbeitung zinkhaltiger Materialien*, dad. Auslaugung des zinkischen Materials nach Pat. 373989, dad. gek., daß die Auslaugung des zink. Materials im Stromapp. in den tieferen Partien des Stromapp. in bestimmter Weise erfolgt, daß durch Einstellung des App. nur die ungel. Verunreinigungen im Stromapp. schwimmend verbleiben, so daß gleichzeitig eine Trennung des Ausgelaugten vom Unausgelaugten erfolgt. (D. R. P. 405980 Kl. 40c vom 29/6. 1922, ausg. 10/11. 1924. Zus. zu D. R. P. 373989; C. 1923. IV. 109.) KÜHLING.

Filip Tharaldsen, Norwegen, *Umwandlung von Zinkstaub in flüssiges Zink*. Zinkstaub wird in so innige Berührung mit fl. Zn gebracht, daß beide sich vollständig durchdringen. Zu diesem Zweck verwendet man z. B. eine sich drehende Trommel, deren Innenseite mit einer größeren Anzahl schalenförmiger Vorsprünge versehen ist. In diese wird der umzuwandelnde Zinkstaub u. bereits fl. Zn gegeben. Bei der Drehung der Trommel erfolgt innerhalb der Schalen die Vermischung des Zinkstaubes mit dem fl. Metall u. außerdem fließt dieses von den inneren Schalen auf u. durch den am Boden liegenden Zinkstaub. (F. P. 573799 vom 24/11. 1923, ausg. 30/6. 1924. N. Prior. 28/11. 1922.) KÜHLING.

Guillaume Marino, Belgien, *Gewinnung von Zinn aus Weißblech und Emailen*. Verkleinerten Rohstoffe werden in auf 70—90° erhaltene konz. HCl getaucht,

welche mit 1—10% eines oder mehrerer oxydierend wirkender Salze, wie Al chromat, -bichromat, -manganat oder -permanganat, zweckmäßig auch einige MnO₂ vermischt ist. Unter der Einw. des naszierenden Cl₂ löst sich das ges. Sn innerhalb kurzer Zeit, während Fe u. Cu ungel. bleiben. Das Sn wird aus d. Lsg. mittels Zn oder elektrolyt. gefällt. (F. P. 574395 vom 12/12. 1923, ausg. 1/9. 1924.) KÜHLIN.

Manfred Semper, Altona-Bahrenfeld, *Scheidung von silberhaltigen Goldlegierungen* in Granalienform ohne Inquartation durch Königswasser, dad. gek., daß das Königswasser auf aus einer Legierung mit beliebigem Silbergehalt bestehende mehr oder weniger regelmäßig gefaltete Rollkörper unter mit Reibung verbundenen Umwälzung dieser Rollkörper, z. B. in einer aus säurefestem Stoff bestehenden an sich bekannten Kugelmühle, Rohrmühle, Harkenschlämme o. dgl., zur Ly. gebracht wird. — Das Verf. gestattet die quantitative Trennung der Metalle auch bei größerem Silbergehalt. (D. R. P. 406320 Kl. 40b vom 29/12. 1922, ausg. 17/11. 1924.) KÜHLIN.

Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft, Berlin (Erfinder: **Walter Friedrich** Berlin-Niederschöneweide), *Bleilegierung für Kabelmäntel*, dad. gek., daß der Zweck Erhöhung seiner Festigkeits- u. Härtewerte ein Zusatz von 0,2—1% Cu zugefügt ist. — Gegenüber reinem Pb sind die Festigkeits- u. Härtewerte u. 9 bis 100% gesteigert. (D. R. P. 405148 Kl. 40b vom 15/6. 1923, ausg. 2/10. 1924.) KÜHLIN.

Compagnie Française pour l'Exploitation des Procédés Thomson-Houston Frankreich, *Legierungen*. Gleichmäßiges Mischen von geschmolzenem Al u. Fe. Nickelstahl oder Chromnickelstahl wird ohne Entfernung der Schlacke erzielt, indem das geschmolzene Al zu dem Eisen- oder Stahlbad oder das geschmolzene Fe zu dem fl. Stahl so zu dem Al-Bad gegossen u. die Mischung dann gerührt wird, bis die Metalle unmittelbar miteinander u. nicht mit der auf dem Bade schwimmenden Schlacke in Berührung kommen. (F. P. 27625 vom 6/4. 1923, ausg. 4/8. 1924.) A. Prior. 7/4. 1922. Zus. zu F. P. 540810; C. 1923. II. 32.) KÜHLIN.

Soc. an. de Commentry Fourchambault et Decazeville, Paris, *Legierung für Formen für Gläser*, bestehend aus Ni u. Cr als Hauptbestandteilen, W, Mo, u. Fe u. gegebenenfalls V, Ti u. Co. (E. P. 222066 vom 23/6. 1924, ausg. 1/10. 1924. Prior. 29/10. 1923.) KÜHLIN.

René Paquet, Frankreich, *Metallbehandlung*. Metallstücke oder -gegenstände deren Eigenschaften durch Einverleiben anderer Metalle oder von Metalloiden beeinflusst werden sollen, werden mit feinpulverigen Mischungen von Kohle u. d. einzuführenden Stoffen in elementarer oder in Form von Salzen o. dgl. bedeckt, die Massen dann langsam auf hohe, aber unterhalb des F. des zu behandelnden Metalls bleibende Temp. erhitzt. (F. P. 573925 vom 25/1. 1923, ausg. 2/7. 1924.) KÜHLIN.

Theodor Baumgartner, Horw, Schweiz, *Entrosten und Reinigen von Metallgegenständen, Erweichen von Schlacken*. Ein fl. Brennstoff wird mittels Präkammer einem Brenner zugeführt, zerstäubt u. entzündet, wobei eine ausgebreitete Flamme entsteht, welche die Reinigung bewirkt. (Schwz. P. 105443 vom 4/8. 1923, ausg. 1/9. 1924.) KÜHLIN.

Percy Albert Ernest Armstrong, Londonville, V. St. A., *Rostfreie Metallgegenstände*, welche sich vor den nur aus Spezialstählen hergestellten durch Billigkeit auszeichnen, werden erhalten, wenn eine Schicht Spezialstahl um eine Seeleroseisen oder gewöhnlichem Stahl herumgegossen u. die M. gewalzt oder in anderer Weise mechan. bearbeitet wird oder wenn in entsprechender Weise eine Schicht von Eisen oder gewöhnlichem Stahl einseitig mit einer Schicht von Spezialstahl bekleidet wird. Zu diesem Zweck wird z. B. ein dünnwandiges Rohr aus gewöhnlichem Stahl in eine Gußform eingeführt, gleichzeitig in u. um das Rohr fl. gewöhn-

u. Spezialstahl gegossen u. nach dem Erkalten gewalzt o. dgl. Für Röhren ein Kern von Sand vorgesehen, unmittelbar über diesen oder etwas entfernt um ein oder zwei dünnwandige Stahlrohre angeordnet u. der oder die Zwischenräume mit Spezial- oder gewöhnlichem Stahl oder beiden ausgegossen. (Schwz. P. 152 vom 6/1. 1923, ausg. 1/7. 1924.)

KÜHLING.

Schnellwerkzeug Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Briesen, Mark, *Verbinden zweier Metalle miteinander*. Um Schnellaufstahl o. dgl. mit Fe o. dgl. zu schweißen, werden die zu verbindenden Teile unter Einfügung eines oder mehrerer Desoxydationsmittel, von denen das höher schmelzende auch bei der Schweißung noch nicht verdampft oder verbrennt, so hoch erhitzt, daß an dem einen Ende Bläschenbildung eintritt. Diese Bläschen verdrängen das Desoxydationsmittel u. führen dann die Verb. mit dem teigig gewordenen zweiten Metall herbei. Das höher schmelzende Desoxydationsmittel ist besonders Cu geeignet, als weiteres Desoxydationsmittel des Fe. des Cu wirkendes Desoxydationsmittel kann Borax benutzt werden. (Z. P. 105974 vom 15/10. 1923, ausg. 1/8. 1924.)

KÜHLING.

Valther Burstyn, Berlin-Wilmersdorf, *Gebläseburner*, bei welchem in bestimmter Weise gegenseitige Verbrennung eines brennbaren Gases u. eines oxydierenden Gases erfolgt, dad. gek., daß die zwei aus getrennten Öffnungen ins Freie austretenden Gasstrahlen angenähert gleiche kinet. Energie besitzen u. in einem zweckmäßig etwa 90° betragenden Winkel aufeinanderprallen u. sich gleichmäßig mischen u. verbrennen, wobei die Form der Gasdüsen u. die Austrittsöffnungen der Gase so gewählt werden, daß eine zungenförmige dünne Flamme entsteht. — Letztere eignet sich zum Schneiden u. Schweißen besser als die mit bisherigen Brennern erzeugte spitze Flamme. (D. R. P. 402400 Kl. 4g vom 15/9. 1923, ausg. 15/9. 1924.)

OELKER.

Marcel Fourment, Frankreich, *Gießen von Metallen*. Um die durch unregelmäßiges Abkühlen verursachte Entstehung von Hohlräumen u. ähnlichen Fehlern zu vermeiden, werden die Metall-, Sand- o. dgl. Formen mit einem einen größeren oder geringeren Teil ihrer Oberfläche umgebenden Solenoid ausgerüstet, durch welches Wechselstrom von hoher Wechselzahl geleitet wird. Dieser bewirkt die Erzeugung von Induktionsströmen in der Gußmasse, durch welche diese auf der gewünschten oder einer anderen geeigneten Temp. erhalten u. zugleich gerührt wird. Die zwischen dem Solenoid u. der Metallform liegenden Flächen bestehen aus dielektr. feuerfestem Stoff. Eine Ausführungsform sieht die Verwendung der Längsachse drehbarer Formen vor. (F. P. 573977 vom 23/11. 1923, ausg. 24.)

KÜHLING.

Paul Verbeek, Dresden, *Herstellung von Formen und Form zum Gießen von Metallen aus Messing und anderen Metallen* unter Verwendung von Magnesium. Dad. gek., daß die Formen u. gegebenenfalls die sonstigen beim Gießen benötigten Teile ein- oder mehrteilig aus Stücken von Magnesiumsilicat, insbesondere aus Speckstein, herausgearbeitet u. dann zur Erzielung von Härte u. Widerstandskraft gegläht werden. — Die Formen halten im Dauerbetrieb die hohe Betriebstemp. von Messing, Bronze u. dgl. u. den großen Druck aus, den die Metalle ausüben, u. besitzen eine glatte Innenfläche, so daß die Gußstücke keiner großen Nacharbeit unterzogen werden müssen. (D. R. P. 405836 Kl. 31c vom 17/11. 1923, ausg. 10/11. 1924.)

KÜHLING.

Stefano Vanoli, Freiburg i. Br., *Schleifen, Polieren, Putzen von Metallen, Glas, Stein, Schildpatt, Perlmutter, Steinen usw.*, 1. dad. gek., daß man Fluorsalze allein oder in Mischung mit anderen l. u. unl. Verbb. u. zweckmäßig in einer Kombination verschiedener Fluorverbb. anwendet. — 2. dad. gek., daß mineral. Fluorverbb. fein gemahlen oder geschlemmt allein oder in Mischung mit anderen Salzen

verwendet werden. — Glatte Flächen werden bei Anwendung der Mittel glänzend. (D. R. P. 405111 Kl. 80b vom 11/3. 1924, ausg. 27/10. 1924.) KÜHLIG.

Roger Pierre Vincent, Frankreich, *Lötmittel für Aluminiumbronze*, besteht aus einer Mischung von Glycerin mit gepulvertem HgCl_2 , K_2CO_3 , Borax u. Salzsäure. Mit dieser Mischung werden die Lötstellen bestreut u. diese dann vollständig Gebläse erhitzt. Gelötet werden Stücke von Aluminiumbronze unter sich, sowie mit Cu, Messing o. dgl. (F. P. 574392 vom 12/12. 1923, ausg. 10/7. 1924.) KÜHLIG.

Theo Brück, Singen, und **Jakob Sigg**, Schaffhausen, *Löten von Aluminium*. Eine aus 1 Teil Zn u. $1\frac{1}{2}$ Teilen Sn bestehende Legierung wird mittels Lötkei dünn auf die gesäuberte Lötstelle aufgetragen, u. es wird dann mit reinem Sn gelötet. (Schwz. P. 104608 vom 23/5. 1923, ausg. 1/7. 1924.) KÜHLIG.

Karl Binggeli, Bern, *Löten von Aluminium*. Die gesäuberte Lötstelle wird mit einer dünnen Stearinschicht überzogen u. mittels des verzinnten Lötkei eine aus 4 Teilen Sn, 5 Teilen Pb, 14 Teilen Zn u. 3,5 Teilen Cd bestehende Legierung ohne Mitverwendung von NH_4Cl o. dgl. eingeschmolzen (Schwz. P. 108 vom 25/6. 1923, ausg. 1/8. 1924.) KÜHLIG.

Gerald Petrie und **Petrie & McNaught Limited**, England, *Verzinken von Metallen*. Die zu verzinkenden Metalldrähte, -bänder o. dgl. werden nacheinander durch ein alkal., saures u. ein h. W. enthaltendes Bad, dann durch mehrere Richtungen geführt, in welchen sie mit einem Putzmittel abgerieben u. von Öl wieder befreit werden; hierauf werden sie elektr. erhitzt u. in diesem Zustand durch eine mit Zinkstaub gefüllte Trommel geleitet. Die Trommel wird in Drehung oder oscillator. Bewegung versetzt u. so stark erhitzt, daß der Zinkstaub die gleiche Temp. besitzt wie der durchgeführte Metallgegenstand. Schließlich wird der Metallgegenstand durch ein Quecksilberbad geleitet. (F. P. 574273 vom 10/12. 1923, ausg. 9/7. 1924. E. Priorr. 15/1. u. 30/4. 1923.) KÜHLIG.

Vulkanit-Werke A.-G., Neuwied a. Rh., *Herstellung von Email*, 1. gek. u. 2. die Verwendung von Bims, Bimstuff, Traß oder Gemischen davon als Rohstoffe für Emaillen für die Emaillierung von Gegenständen aus Metall u. dgl. — 2. dadurch, daß man in den üblichen, Feldspat, Quarz u. Soda enthaltenden Emailmischungen alle 3 oder nur 2 oder nur einen dieser Stoffe durch die Roten gemäß Anspruch 1 ersetzt. — Es können sowohl Grund- wie Deckemaille hergestellt werden. (D. R. P. 404 442 Kl. 48c vom 10/7. 1923, ausg. 1/10. 1924.) KÜHLIG.

Erik Liebreich, Charlottenburg, *Verfahren, leicht korrodierbare Metalle vor Korrosion zu schützen*, dad. gek., daß man sie mit Überzügen von solchen Metall- bzw. Legierungen, mit Ausnahme von Cr, überzieht, die elektrochem. aktiv u. passiv sein können, wobei der passive Zustand jedoch der gewöhnliche sein muß. Geeignete Metalle sind V, Ni, W u. Mo. (D. R. P. 398 035 Kl. 48b vom 21/10. 1924, ausg. 21/10. 1924.) KÜHLIG.

X. Farben; Färberei; Druckerei.

Hans Wagner, *Fortschritte der Farben- und Lackindustrie. Ein Überblick über die Patente und Neuerungen der letzten Jahre*. Angabe über Körperfarben, Apparatur, Mineral- u. Teerfarben. (Farben-Ztg. 30. 564—68. 1924. Stuttgart S. 1924.)

Fritz Mayer, *Über die Beziehungen zwischen chemischer Konstitution und Echtheit der Farbstoffe*. Es wird erörtert, welche Veränderungen die wichtigsten Farbstoffgruppen durch Licht, Oxydation oder Säuren in ihrem Aufbau erleiden können. Klare Gesetze über den Zusammenhang zwischen chem. Konst. u. Echtheit haben wir noch nicht. (Melliands Textilber. 5. 801—3. 1924. anfangs a. M.)

Stück.

ammar, Welche Forderungen kann man an eine echte Farbe stellen? Eine Farbe soll den Behandlungen, welche vorgesehen sind, widerstehen können. Farbe braucht nicht länger zu halten, als die gefärbte Ware. Gleichheit einer Probe sollte nur gefordert werden, wenn es wirklich nötig ist. (Melliandsber. 5. 803—4. 1924.) SÜVERN.

egfried Kosche, Das Bleichen von indanthrenfarbigem Hemdenzephir. Angaben Entschlichten mit Diastafor, Halb- u. Fertigbleichen. (Ztschr. f. ges. Textilind. 4—55. 1924.) SÜVERN.

adwig Lichtenstein, Über die Echtheitsansprüche im Zeugdruck. Anwendung Eigenschaften der im Zeugdruck hauptsächlich verwendeten Farbstoffe werden bedert. Die Angaben der Fachliteratur sind berücksichtigt. (Melliandsber. 5. 735—36. 812—14. 1924.) SÜVERN.

alle & Co. A.-G., Biolase, ein neues Diastasepräparat zum Entschlichten von en, zur Herstellung von Schlichtmassen, Appreturen, Verdickungen usw. Angaben über Eigenschaften u. Verwendungsarten der Biolase, ihre Verwendung Entschlichten, zur Herst. von Appretur- u. Schlichtmassen, über Unterbrechung astat. Wrkg. u. über gleichzeitiges Färben u. Appretieren. (Melliandsber. 5. 815—16. 1924. Biebrich a. Rh.) SÜVERN.

runo Walther, Aus der chemisch-technischen Praxis. Dieselbe Farbmühle für mehrere Farbstoffe nacheinander benutzt werden, wenn folgende Reihenfolge eingehalten wird: Weiß, Gelb, Rot, Violett, Blau, Grün, Schwarz u. umgekehrt. — Ultramarin als Waschblau kann durch ll. Anilinfarben ersetzt werden. Es ist auf ihren bas. bzw. sauren Charakter zu achten. (Seifensieder-Ztg. 9. 1924.) HELLER.

ans Wolff, Über die Bildung von Zinksulfat in Lithoponeanstrichen. Die B. SO_4 im Anstrich schwankt sehr, erfolgt aber immer in so geringer Menge, Störungen des Films nicht auf sie zurückzuführen sind. Auswaschen des erfolgt erst, wenn der Film sehr stark durch W. zerstört ist. Lsg. des war nicht die Ursache, sondern Folge der Zerstörung des Films. Die vernünftig rasche Zerstörung von Lithoponeanstrichen ist in gewissen Fällen auf chem. Vorgänge zurückzuführen. (Farbe u. Lack 1924. 494.) SÜVERN.

rian de Vries, Altes und Neues aus der Buntfarbenindustrie. Angaben r-Farben. (Farbe u. Lack 1924. 477. 490.) SÜVERN.

Eibner, Über Kalkfarben. Die histor. Entw. des Begriffs Kalkfarben wird rhen u. Angaben über die Farben der Wandmalerei in verschiedenen Zeitaltern werden gemacht. Als Kalkfarben sind solche trockne Farben zu bezeichnen, nicht nur chem. kalk-, licht- u. wetterecht sind, sondern auch mit dem gel. gleich gut abbinden. (Farbe u. Lack 1924. 488—89. 501—2. 513—14. 6 n.) SÜVERN.

Mayer, Über die Verwendung von Tetralinabkömmlingen als Farbstoffen. Die Kupplungsfähigkeit des 2- u. 1-Tetralols bleibt wesentlich hinter d Naphthole zurück. Die Farbstoffe selbst bieten gegenüber den im Handel üblichen Naphtholfarbstoffen keine Vorteile. (Festschrift zum 100jährigen en des physikalischen Vereins Frankfurt a. M. 1924. 5 Seiten. Sep.) SÜVERN.

ErI Volz, Indigoide und Anthrachinonküpenfarbstoffe. Angaben über die sten Indigo-, Thioindigo-, Indanthren-, Helindon-, Ciba-, Algal- u. Hydron- te u. ihre Anwendungsweisen. (Ztschr. f. ges. Textilind. 27. 552—53. 1924.) SÜVERN.

Steiber, Über die Atmosphärien. Die Einw. von O_2 , W., CO_2 , SO_2 , HCl auf Anstriche wird besprochen. (Farbe u. Lack 1924. 514—15.) SÜVERN.

Würth, Die mikroskopische Untersuchung von Malereien nach Raehlmann. e kurz vor dem Kriege erschienenen Buche „Über die Farbstoffe der Malerei

in den verschiedenen Kunstepochen auf Grund von mkr. Unterss.“ hat RAEHL beschrieben, wie sich die verschiedenen Pigmente in der mkr. Unters. erkennen lassen. Er weist ferner darauf hin, zu welchen Zeiten u. in welchen Fällen angewendet wurden. Die einzelnen Pigmente werden besprochen. Aus der Unters. lassen sich zum Teil ganz zuverlässige Rückschlüsse auf die Entstehungszeit der Malerei ziehen. (Farbe u. Lack 1924. 466. 479. 493. 1924.) SÜV.

A. Hübl, *Nachprüfung des als Lumina-Filter bezeichneten Tageslichtfilters Brillenglasform*. Nachprüfung der von H. WEISZ (S. 168) empfohlenen Tageslichtbrille (Luminabrille). Das Blauglas der Brille verwandelt das Licht einer Halblampe in rein weißes Licht mit einem unvermeidlichen Helligkeitsverlust von 85%. Alle Anfärbungen erscheinen durch die Luminabrille so wie bei rein weißem Licht. Die Luminabrille ermöglicht, sich vom Tageslicht unabhängig zu malen. Es wird vielleicht sogar vorteilhafter sein, mit der Brille abzumustern, statt Tageslicht, weil dessen wechselnde Farbe einen merklichen Einfluß auf emulsionartige Färbungen ausübt. (Farben-Ztg. 30. 628—29. 1924. Wien.) SÜV.

Alexander Lauterbach, *Beitrag zur Kontrolle der Hydrosulfitküpen*. Die Bestimmung des Hydrosulfits erfolgt durch Titration mit wenig überschüssiger Methylenblau-Lsg., die mit TiCl_3 zurücktitriert wird. Das Indigweiß wird mit ZnSO_4 -Lsg. gefällt. Der Gang der Best. ist genau geschildert. Zur Best. der Laugenkonz. in Liposomen entfernt man Carbonate u. Sulfit durch BaCl_2 u. oxydiert den Farbstoff durch KMnO_4 . Die Abhängigkeit der Red., des Lösungsvorgangs u. des eigentlichen Färbens von der Temp., der Hydrosulfit-, Laugen- u. Farbstoffkonz. wird besprochen. (Merkur Textilber. 5. 752. 817—20. 1924.) SÜV.

Ammiel Folger Decker, Pelham, New York, V. St. A., *Druckdecke*, bei welcher die äußeren Gewebelagen durch eine Zwischenmasseschicht aus Kork u. dgl. verbunden sind, wobei auf einer Seite der Gewebelagen ein farbabgebender Überzug angebracht ist, 1. dad. gek., daß wenigstens eine der äußeren Gewebelagen aus Wolle besteht. — 2. dad. gek., daß 2 Masseschichten zwischen den äußeren Gewebelagen vorhanden sind, wovon die eine Schicht aus Gummi u. die andere aus Kork oder beide Schichten aus Gummi oder Kork bestehen, u. die beiden Schichten durch eine Mittellage aus Woll- oder Baumwollgewebe getrennt sind. — Erfindung einer Druckdecke von höchster Nachgiebigkeit u. sehr empfindlicher Oberfläche, die einen sehr klaren u. sauberen Druck ergibt. (D.R.P. 406097 I. 1. vom 30/1. 1924, ausg. 15/11. 1924.) OEL.

Eugène Sivigny und **Jean Baptiste Martinelli**, Pantin, Frankreich, *Verfahren für Holz, Gips, Zement o. dgl.*, welche den Unterlagen steinartiges Aussehen geben soll, bestehend aus Blei- oder Zinkweiß, Lithopon, Gips, gemahlenem Sand, einem bunten Farbstoff, einer Mischung von Leinöl, Lack u. Terpentinöl u. gegebenenfalls Wasserglas, Blanc fixe, W. oder mehreren dieser Stoffe. (Schwz. P. 10594 vom 10/2. 1923, ausg. 1/8. 1924.) KÜHN.

Fritz Zürcher, Bern, *Wetterfeste Leuchtfarbe*. 40 Teile CaS , 40 Teile CO , 13 Teile Schwefel, 2 Teile K_2SO_4 , je 1 Teil Na_2SO_4 , Li_2CO_3 u. CuO sowie Teile ZnO durch Jodlsg. gebläute Stärke werden gemischt u. eine Stde. bei 1000° geglättet. 9 Teile dieses Erzeugnisses werden mit 1 Teil einer Mischung von 2,8 Teilen op. 10 Teilen BaSO_4 u. 10 Teilen $\text{Co}_3(\text{AsO}_4)_2$ gemengt u. die Mischung mit der gleichen Menge 2% Schwefel enthaltendem gekochten Lein- oder Holzöl auf der Farbhüh verrieben. Die Farbe darf nicht auf bleihaltigen Grund aufgestrichen werden. (Schwz. P. 105830 vom 18/5. 1923, ausg. 1/7. 1924.) KÜHN.

Erich Tiede und **Friedrich Richter**, Berlin, *Herstellung von Sulfidphosphoren*. 1. dad. gek., daß Sulfate, Sulfitte oder Oxyde unter Zusatz von Schwermetallverbindungen gegebenfalls auch von Verbb., die als Schmelzmittel wirken, der reduzierenden

r. eines mit CS₂ beladenen Stickstoff- oder Edelgasstromes bei hohen Temp. gesetzt werden. — Die Erzeugnisse sind einheitlicher als die nach bekannten erhaltenen Sulfidphosphore, weil jede Oxydation ausgeschlossen ist. (D. R. P. 491 Kl. 22f vom 12/8. 1921, ausg. 17/10. 1924.)

KÜHLING.

XIV. Zucker; Kohlenhydrate; Stärke.

Paul Beyersdorfer und Georg Jaeckel, *Bemerkungen zu den „Staubexplosionen“* Herrn Berthold Block, Charlottenburg. Vf. wenden sich gegen die Kritik des (Ztschr. Ver. Dtsch. Zuckerind. 1924. 37; C. 1924. I. 2642) an ihren, deren Ergebnisse mit den daraus gezogenen Schlußfolgerungen aufrecht an werden (nachf. Ref.). (Ztschr. Ver. Dtsch. Zuckerind. 1924. 628—45. Reichenbach, O. L. u. Berlin.)

RÜHLE.

Berthold Block, *Erwiderung auf die vorstehenden Ausführungen.* (Vgl. vorst. nachf. Ref.) (Ztschr. Ver. Dtsch. Zuckerind. 1924. 645—52. Charlotten-

RÜHLE.

Beyersdorfer und G. Jaeckel, *Schlußwort zur Erwiderung des Herrn Block.* (Vgl. vorst. Ref.) Ohne auf Einzelheiten weiter einzugehen, fassen f. dahin zusammen, daß Zuckerstaubexplosionen sowohl eine therm. wie eine stat. Ursache haben können. In neuzeitlichen Mühlen, in denen nicht fahrgearbeitet wird, kann keine therm. Staubexplosion vorkommen, sondern nur die elektr. (Ztschr. Ver. Dtsch. Zuckerind. 1924. 652—55. Reichenbach, O. L. u. Berlin.)

RÜHLE.

(Gilbert, *Die Frage der Überwachung des Reifens der Zuckerrübe.* (Vgl. Bull. Chimistes de Suer. et Dist. 41. 295; C. 1924. II. 551.) Es ist bereits seit eine Verspätung in der B. von Zucker durch die Rübe festgestellt worden, verschiedene Ursachen je nach der Örtlichkeit u. der Rübensorte zu haben u. sich im allgemeinen in einem Ausfall an Erntegewicht im September sich macht, seltener im Zuckergehalte der Rübe. Unter den möglichen Ursachen hierfür weist Vf. besonders auf die Selektion der Samen hin, durch die die Pflanze geändert wurde zugunsten einer intensiveren chem. Arbeit in der Erzeugung von Zucker auf Kosten des gesamten Erntegewichtes. Vf. empfiehlt, Erhebung dieser Frage eine Umfrage anzustellen u. gibt Anweisung, wie diese erfolgreich zu gestalten wäre. (Bull. Assoc. Chimistes de Suer. et Dist. 41—7. 1924.)

RÜHLE.

Linsbauer, *Die neue kontinuierliche Diffusion nach Rak.* Techn. Bericht der Entw. der kontinuierlichen Diffusion u. des neuen Verf. nach RAK. (Zukrovarnické 42. 477; Ztschr. f. Zuckerind. d. tschechoslov. Rep. 49. 89—92. Reichenbach, O. L. u. Berlin.)

RÜHLE.

Sylmans, *Erschöpfbarkeit von Melasse.* Die prakt. Erschöpfbarkeit muß aber, ziemlich nahe kommen. Bezüglich letzterer verhält sich Melasse durchaus die Löslichkeit der Saccharose angeht, wie eine reine Saccharose-Invertzuckerlösung. Rechnung zu halten ist in der Fabrik mit der zu erreichenden Konz., der erreichenden Temp. beim Abzentrifugieren u. der Glucosemenge, nicht aber mit den übrigen Nichtzuckern. (Archief Suikerind. Nederland. Indie 1924. 413—35. Reichenbach, O. L. u. Berlin.)

GROSZFELD.

Schott und Ph. van Harreveld, *Die Verwendung von Melasse als Heizmittel.* Durch Verbrennung der Melasse sind 2800 cal/kg, mithin 12½% aller zur Erzeugung erforderlichen Wärme gewinnbar. Die Verheizung erfolgt entweder im Gemisch mit den ausgepreßten Rohrrückständen (Ampas) oder in besonderen Öfen, wobei Pottasche als Nebenprod. gewonnen wird. (Archief Suikerind. Nederland. Indie 1924. 449—63. 1924. Paseroean.)

GROSZFELD.

—, *Zusammensetzung der Rückstandmelassen.* Es wäre sehr belangreich, v bei der Berechnung der Analysen der Melassen, die Mineralsalze getrennt von organ. Salzen, die als Melassebildner vorherrschen, dargestellt u. wenn auch verschiedenen organ. Stoffe möglichst getrennt voneinander angegeben würden, etwa wie in der nachfolgenden Analyse einer Rübenzuckermelasse (%): Sacch. 48,50, reduzierender Zucker als Glucose 0,12, KNO₃ 0,692, KCl 1,012, K₂SO₄ 1, NH₃ 0,148, organ. Alkalisalze 4,161 u. CaO-Salze 0,459, N-haltige Stoffe 1, N-freie Stoffe 10,739, W. 26,35. (Bull. Assoc. Chimistes de Sucr. et Dist. 41, bis 508. 1924.) RÜB.

Carl Brendel, *Bericht über die russische Zuckerkampagne 1923—1924.* Zusammenfassende Erörterung. Die Zuckerindustrie nähert sich in techn. Hinsicht den Verhältnissen der Vorkriegszeit. Ein Mangel ist noch die sehr geringe Rüben-ernte; die Güte der Rüben dagegen ist einwandfrei, von einer Entartung ist keine Rede sein. Die besprochene Kampagne verlief günstig, trockener Herbst, zuckerreiche Rübe. (Ztschr. Ver. Dtsch. Zuckerind. 1924. 820—46. 1924.) RÜB.

C. W. Ladd, *Rohrzucker und andere Zucker.* Vf. bespricht die üblichen Zucker, nämlich die Monosaccharide (Dextrose, Lävulose, Arabinose, Galactose), Disaccharide (Saccharose, Lactose, Maltose) u. die Trisaccharide (Raffinose), ihre Herkunft, Eigenschaften u. Besonderheiten. (Sugar 26. 539—40. 1924.) RÜB.

T. Chrzaszcz, *Die Bestimmung der Stärke nach der Malzmethode.* Auf Grund früherer Unterss. des Vfs. (Biochem. Ztschr. 150. 60; C. 1924. II. 1803) ist die Best. der Stärke wie folgt auszuführen: Die Substanz ist fein zu vermahlen, und die Kochtemp. niedrig gehalten werden kann; grob gemahlene Stoffe müssen bei 3—4 at Druck erhitzt werden. Die Substanz wird in 2 Portionen von je 10 g in 250 ccm-Kölbchen mit je 100 ccm W. 10 Minuten im sd. Salzbad (bei 106°) verkleistert, mit 2 ccm 1/10-n. H₂SO₄ oder durch Puffergemisch auf pH = 5 eingeleitet u. 1/2 Stde. im Autoklaven erhitzt, was nur bei feingemahlenen Stoffen ohne Nachausreich. Nach Abkühlen wird bei 65—70° mit 30 ccm 10%ig. Malzauszug ver- zuckert, bis Fl. u. Bodensatz mit J hellgelb sind (30—60 Min.). Nach Anfüllen auf 250 werden 200 ccm Filtrat + 10 ccm HCl (1,125) in sd. W. 1—1 1/2 Stdn. geschüttelt mit NaOH neutralisiert, auf 500 ccm aufgefüllt u. Zucker bestimmt. Blinder Versuch mit Malzauszug ist abzuziehen. (Ztschr. f. Unters. Nahrsg.- u. Genußmittel 4. 301 bis 311. 1924. Posen, Univ.) GROSZT.

Ferdinand Kryž, *Über Härteschwankungen der Zuckerrübe, festgestellt mittels einer neuen Härteprüfungsmethode.* Das Verf. besteht darin, einen 100 g schweren mit einer 100 mm langen Spitze versehenen Stahlkörper 1 m tief frei auf die Rübe hinabfallen zu lassen u. die Länge des nicht in die Rübe eingedrungenen eilenden der Spitze zu messen. Da sich verholzte Rüben nur schwer schneiden u. ausage lassen, ist die Best. der Härte der Zuckerrüben auch prakt. belangreich, namtl. auch bei der Prüfung von Zuchtrüben. (Ztschr. f. Zuckerind. d. čechoslovak. Rep. 49. 93—96.) RÜB.

Tödt, *Praktische Versuche mit einer neuen Alkalitätsbestimmung von Zuckerlösungen.* Es wird empfohlen, an Stelle der Titration der Alkalität die H-Ionenkonz. zu bestimmen durch Verwendung von verschiedenen Indicatorpapieren, von denen jedes einer Spanne in der Alkalität entspricht. Besonders geeignet benutz wurden Thymolphthalein, Thymolblau u. Kresolrot. Ersteres bleibt unter 0,06% CaO farblos, beginnt bei dieser Grenze blau zu werden u. erreicht die größte Blaufärbung bei etwa 0,12% CaO. Thymolblau ist unter 0,01% CaO gelb u. entwickelt Blaufärbung von 0,01—0,025%. Naphtholphthalein ist unter 0,01% farblos wird bei dieser Grenze grün u. ist bei 0,025% stark grün. Es lassen sich hiernach Alkalitätsunterschiede von 0,003% unschwer genügend genau schätzen. Das Verf.

äußerst einfach, man braucht nur das Papier in den Saft zu halten u. die
 ung zu beobachten. (Dtsch. Zuckerind. 49. 1377. 1924.) RÜHLE.

Emile Saillard, *Bestimmung der Raffinose in den Zuckern. Gehalt der Rüben-
 an Raffinose.* Die Clergetsche Formel u. Arbeitsweise nimmt nicht Bezug
 Gemische aus Saccharose u. Raffinose. Vf. hat Formeln hierfür abgeleitet,
 an er von reinen Lsgg. von Saccharose u. Raffinose ausging. Saccharoselsgg.
 es ranzös. Normalgewichtes, nach CLERGET invertiert, geben bei 20° eine Links-
 ung von 34°; Raffinoselsgg. von 8—10 g in 100 cem geben in gleicher Weise
 eladelt nach der Inversion, die direkte Polarisation der Lsg. = 100 gesetzt,
 n Rechtsdrehung von im Mittel + 51,56. Bezeichnet man mit S den Gehalt an
 ararose, mit y den Gehalt an Raffinose, mit A die direkte, mit B die Polari-
 ti nach der Inversion u. mit C die Summe $A + B$ (B linksdrehend) so ist
 $S + y, B = -0,34 S + 0,5156 y$ u.

$$1. \text{ Saccharose} = S = \frac{C - 0,4844 A}{0,8556} \text{ u.}$$

$$2. \text{ Raffinosehydrat} = R = \frac{A - S}{1,57}.$$

andelszwecke wird in Frankreich der Zucker der Melasse nach CLERGET nach
 rformel

$$3. S = \frac{(A + B) \times 100}{144 - \frac{1}{3} t} \quad (t = \text{Temp.})$$

samt. Ganz allgemein zeigt sich nun, daß die direkte Polarisation A erheblich
 ör ist als der nach Formel 3 berechnete Gehalt an Saccharose; der Unter-
 hl ist aber nicht konstant; er beträgt z. B. für 1911/12 (trockene Jahre) im
 t 0,53, 1923/24 im Mittel 1,44. Als Ursachen hierfür kommen der Gehalt
 melassen an N u. an Raffinose in Frage. (Moniteur scient. [5] 14. 201—2.
 RÜHLE.

Rudolf Ofner, *Modifikation der qualitativen Prüfung des Rohzuckers auf Invert-
 gehalt mit Soldainischem Reagens.* Die Abänderung gestattet die gleichzeitige
 ung einer Reihe von Rohzuckerproben. Man löst 2 g Rohzucker in 10 cem,
 wa 50° erwärmter Soldainischer Lsg. (in Reagensgläsern 1,8 zu 18 cm), stellt
 e sd. CaCl_2 -Bad (200 g CaCl_2 in 500 g W., Kp. etwa 106°), kocht 5 Minuten,
 dann die Reagensgläser heraus, spült sie ab u. läßt sie etwa $\frac{1}{2}$ Stde. ruhig
 h. Hat sich dann kein roter Nd. von Cu_2O gebildet, so ist der Zucker frei
 avertzucker. Nach der bisher üblichen Vorschrift kocht man 10 g Rohzucker
 0 cem Soldainischer Lsg. 5 Minuten auf dem Drahtnetze. Diese Ausführung
 k. ist umständlicher als die oben angegebene u. weniger genau als diese.
 r. f. Zuckerind. d. čechoslovak. Rep. 49. 87—88. 1924. Prag-Karlin.) RÜHLE.

A. H. van den Hout, P. A. Neeteson und A. L. van Scherpenberg, *Die
 zuckerbestimmung in Saccharose enthaltenden Flüssigkeiten nach der titrimetrischen
 tionsmethode.* Folgende Faktoren sind bei der Best. von Einfluß: Saccharose
 ert Fehlingsche Lsg., besonders bei geringerer Konz. Die Konz. der Cu-Lsg.
 a Bedeutung. Glasgeräte absorbieren Säure u. können dadurch Unterschiede
 rufen. Beim Lösen von Saccharose in gewöhnlichem dest. W. ist die $[\text{H}^+]$
 g B, daß ein Teil invertiert wird. Von geringem Einfluß ist die Erhitzungszeit
 eaktionsfl., ebenso die Temp. beim Kochen (entgegen Angaben von BRUHNS).
 e Kühlungszeit ist von großem Einfluß, ebenfalls die Menge KJ. Änderung
 atzfolge der Reagenzien bewirkt Abweichungen, ebenso verschiedene Mengen
 lsg. Erdalkalien sind durch Zusatz von Oxalat unschädlich zu machen.
 e. Weekblad 21. 578—82. 1924. Stampersgat [N.-Br.], Cooperative Suikerfabriek
 lffinderij „Dinteloord“.)

(GROSZFELD.)

XV. Gärungsgewerbe.

Th. Bokorny, *Die Gerbstoffe in der Gärungstechnik*. Kurze zusammenfass. Erörterung insbesondere der Gerbstoffe des Hopfens u. der Giftigkeit der Gerbstoffe für Algen, Bakterien, sowie Schimmel- u. Spaltpilze. (Allg. Brauereiwiss. Rüh. Hopfentztg. **64**. 1135—36. 1924.)

E. Lühder, *Schaugläser zwecks Beobachtung des Maischespiegels an geschloss. Gärbottichen*. Die Schaugläser erfüllen ihren eigentlichen Zweck, für den sie geschaffen worden sind, in keiner Weise, weshalb es sich empfiehlt, auf sie zu verzichten. (Brennereiztg. **41**. 184. 1924.)

R. Baestle, *Über die das Hefewachstum anregende Substanz*. Es wurde untersucht, hierüber näheres festzustellen durch vergleichende Unters. der Einwirkung von Vitaminen, der Aminosäuren u. der Mineralstoffe auf das Hefewachstum. Als Nährböden dienten 1. gewöhnliche Bierwürze als Kontrollfl., 2. dieselbe Würze mit Zusatz eines an Vitamin β möglichst reichen Auszuges, 3. Dieselbe Würze mit Zusatz eines an Aminosäuren möglichst reichen natürlichen Auszuges, 4. Dieselbe Würze unter Zusatz einer Mineralsalzlsg. Zu 2. Zur Herst. der Auszüge diente β -Vitamin diente einmal lebendfrisches Brennereigrünmalz, ein anderes Mal geschälte Reiskörner. Beiderlei Nährböden geben mit dem Reagens von Litm. u. DENIS (sodaalkal. Lsg. von Phosphorwolframsäure) die den Vitaminen entsprechende blaue Färbung; zu 3. 20 g Brennereigrünmalz, das reich an abgebautem Eiweiß war, wurde mit 80 ccm W. u. soviel $\frac{1}{10}$ -n. H_2SO_4 versetzt, um die Alkalität gegen Methylorange zu neutralisieren, u. bei 45° bis 24 Stdn. behandelt. Der günstige Eiweißabbau wurde nach 6 Stdn. erhalten. Spuren Vitamine wurden durch Erhitzen auf 140° beseitigt; zu 4. Es wurde Malzanschwänzwasser verwendet, das reich an Phosphaten war. — Es wurden Würzen von 3 u. 7° Balling verwendet, die jeweils mit gleichen Mengen Hefe versetzt u. bei verschiedenen Bedingungen hinsichtlich Temp. u. Lüftung gehalten wurden. Vor u. nach jeder Gärung wurde bestimmt die aktuelle Acidität nach MICHAELIS (p_H), die Acidität nach der Bemessung mit Formaldehyd (SÖRENSEN) u. der Extraktgehalt (BALLING). Zur Feststellung der Hefevermehrung wurde am Ende der Gärung die Hefenernte gewogen. Die Unterss. lassen folgende Schlüsse zu: Die das Hefewachstum fördernde Substanz kann ein Vitamin, eine Aminosäure oder eine mineral. Verb. sein. Die Wirkung dieser dreierlei Stoffe ist fast gleich. Die Vitamine scheinen nicht unbedingt nötig zu sein; die Hefe kann aber Vitamine selbst bilden, die für ihr Wachstum notwendig sind. Die Vitamine u. die Aminosäuren fördern nicht nur das Wachstum, sondern auch die Gärkraft der Hefe, ohne dabei das Wachstum zu verringern. Bei Litm. u. starker Aussaat scheint bei Ggw. von Vitamin oder Aminosäuren oder von Litm. zugleich die Hefe fähig zu sein, die Dextrine der Würze zu vergären, so daß die scheinbare Vergärung auf 100 steigt. Lüftung steigert die Hefenernte beträchtlich. Bei Lüftung wirken Vitamine u. Aminosäuren besonders auf das Hefewachstum bei kleiner Hefenaussaat u. langdauernder Gärung; bei Lüftung u. starker Hefenaussaat sind dagegen Vitamine u. Aminosäuren von außerordentlicher Einwirkung auf die Gärkraft. Bei kombinierter Vitamin-Aminosäurenwrkg. ist die Hefenernte am höchsten, wenn die Aussaat klein ist; ist dabei die Aussaat stark, so ist die Vergärung am höchsten (100) u. die Hefenbildung auch annähernd am höchsten (Wehschr. f. Brauerei **41**. 251—53. 1924.)

A.-Ch. Hollande und **S. Chadefaux**, unter Mitwirkung von **P. A. Q. Lichstein**, *Bakteriologische Studie über die Gärung der für die Zuckerwarenfabrikation bestimmten Zedratfrüchte von Korsika im Meereswasser*. Beschreibung des auf Korsika für die Bearbeitung der Früchte des Zedratbaumes üblichen Verf., im wesentlichen bestehend, daß die gesäuberten, dann durch Ausbohren vom Inneren befreiten oder

ich transversal durchschnittenen Früchte in großen Fässern mit Meerwasser
blossen werden, das nur einmal, nach ca. 14 Tagen gewechselt wird. Der
ang vollzieht sich im Freien, wo die Temp. am Tage im allgemeinen 13—16°,
ts ca. 10° beträgt. Er führt dazu, daß das Fruchtfleisch quillt u. ganz durch-
ig wird, u. besteht in einer Gärung, die in der 1. Periode mit reichlicher Entw.
CO₂ verbunden ist, in der 2. Periode nach anfänglichem Stillstand wieder
le Entw. zeigt, dann zu Säuerung u. Zäherwerden führt. Sie wird dann durch
z von 15—20 kg NaCl auf ca. 200 l Meerw. stumm gemacht. — Erreger der
g sind eine Hefe u. ein Bacterium, die eingehend untersucht wurden. Die
e gleicht *Saccharomyces ellipsoideus*, unterscheidet sich davon aber in der
elligkeit der Askenbildung, der Form der Asken u. der Zahl der darin vor-
enen Sporen (meist 2, nie > 3), wird deshalb als besondere Art, *Saccharomyces*
medicæ, angesprochen. Das Bacterium, als *Bac. citri medicæ* beschrieben,
rag dieselben Zucker wie die genannte Hefe zu vergären u. ist wie diese frei
roteolyt. Fermenten für Gelatine, erstarrtes Pferdeserum, koaguliertes Eiereiweiß,
e auch Cellulose nicht an. Es ist grampositiv u. ausgezeichnet durch Licht-
ungsvermögen der Oberflächenkolonien auf Bouillongelatine. Mit der Hefe
st ein symbiont. Verhältnis. (Bull. Sciences Pharmacol. 31. 458—71. 527—39.
2) Montpellier, Fac. de Pharm.)

SPIEGEL.

1. Lühder, Die Kontrolle der Gärtemperaturen an geschlossensn Gärbottichen.
erden die Schwierigkeiten u. die Ungenauigkeit der Messung der Gärtemp.
ts feststehender Winkelthermometer oder mittels Stockthermometern besprochen.
irlei Arten Thermometer sind für genaue Messungen an den Gärkesseln nicht
eignet. Empfohlen wird das im Institut für Gärungsgewerbe konstruierte Tauch-
rometer mit Schöpfvorrichtung, das beliebig weit in die gärende Maische ein-
tauchen u. mit einer Probe der Maische wieder herausgehoben werden kann. Das
icht des App. ermöglicht auch seine Verwendung in dickfl. Maischen. Die
r einer zu starken Erwärmung ist bei den geschlossenen Gärbottichen weit
er als den offenen Holzbottichen. (Brennereiztg. 41. 167. 1924.) RÜHLE.

2. Lühder, Über Bau und Konstruktion des modernen Blasendestillierapparates.
(S. 173.) (Ztschr. f. Spiritusindustrie 47. 290—91. 1924.) A. R. F. HESSE.

3. Georg Fries, Über Pech und Technik des Pichens. Vortrag, in dem viele
heiten aus der Praxis gegeben werden, die im Original nachgelesen werden
s. (Wehschr. f. Brauerei 41. 258—61. Ztschr. f. ges. Brauwesen 47. 57—60.

A. R. F. HESSE.

4. Nadson und A. Konokotina, „Fetthefer“-*Endomyces vernalis* Indur., als
quelle der Fette für Nahrungs- und technische Zwecke. Vff. berichten über
t- u. Züchtungsverff. der Fetthefer, auf deren prakt. Bedeutung zuerst LINDNER
ksam machte. Der Fettgehalt des Pilzes erhöht sich gewöhnlich gleich-
förmig mit der B. von Oidien u. sprossenden Zellen u. hängt von der Rasse der
fer ab, hauptsächlich aber von den Kulturbedingungen u. den chem. Bestand-
des Nährsubstrats. Freier Luftzutritt begünstigt die Entw. des Pilzes, durch-
se von Luft durch die Kulturen schädigt die Entw. Auf sterilisierten Nähr-
sten entwickelt sich der Pilz in Reinkultur gut nicht nur bei 15°, sondern
bei 10—12°; bei 27° ist die Entw. bedeutend schlechter u. hört bei 37° ganz
zu den Verss. diene Bierwürze verschiedener Konz. u. Zus. u. Bierwürze
Agar. Bei etwa 40 Züchtungsverss. auf Bierwürze zeigten 10—15tägige
ten meist 15—28% Fett. Die Fetthefern verwenden Glucose, Fructose,
ase, Saccharose, Maltose u. Lactose zur Nahrung, erzeugen aber keine
dgärung, weshalb sie das Nährsubstrat besser ausnutzen, als die gewöhn-
e Hefen; ein geringer Zusatz von Milchsäure zum Substrat erhöht den Fett-
a der Hefe. An Stelle der teuren Bierwürze kann auch mit gleichem Erfolge

Melasse verwendet werden, der man schwefelsaures oder besser phosphorsaures NH_4 zugesetzt hat, desgleichen auch ein Gemisch aus Melasse u. l. Auch auf hydrolysierte Holzmasse wächst der Pilz gut, wenn auch bei w nicht so gut wie auf Bierwürze oder Melasse. Auch auf Kartoffeln läßt sich Pilz gut züchten. — Das aus dem Pilz gewonnene Fett ist fl., gelblich u. s. dem Olivenöl; Hauptbestandteil ist Triolein, daneben freie Fettsäuren. di bei mehrstdg. Trocknen des Fettes bei 100° verflüchtigen (bis zu 30—40% V. (Wechschr. f. Brauerei 41. 249—51. 1924. Petersburg.) RÜH

Karl Hessenmüller, *Haltbare Biere*. Zusammenfassende Erörterung der nahmen, die Gewähr für die Haltbarkeit eines Bieres soweit als möglich p Es sind dies Keller, deren Temp. höchstens auf 4° steigen darf (2° oder v darunter ist normal), gute Isolation u. Ventilation der Keller, Beseitigung allef baren Infektionsquellen u. unter gewissen Voraussetzungen das Pasteurisier Bieres. (Allg. Brauer- u. Hopfenztg. 64. 1121—23. 1924.) RÜH

K. E. F. Schmitz und **K. Brauer**, *Über den Malzwein „Maltokay“ und medizinische Verwendung*. Maltokay ist ein von der Firma WINKELHAUSEN gestellter Malzwein vom Typus des Tokayers, ihm äußerlich, in Geschmack, u Zus. mit der Ausnahme, daß an Stelle des Traubenzuckers hauptsächlich M getreten ist, durchweg ähnlich, zweckmäßig in der Alkoholtherapie zu verwend (Ztschr. f. medizin. Chemie 2. 35—38. 1924. Sep. Berlin, Inst. f. Diagnose u. F Cassel-Berlin, Verein. Chem. Laborat. Dr. UFFELMANN u. Dr. BRAUER.) SP

Paul Hassack, *Die Gärungsessigindustrie in den Vereinigten Staaten*. Zusammenfassende Besprechung der wirtschaftlichen Verhältnisse dieser Industrie u. d bräuchlichen Verff. zur Darst. des Essigs, mit Angaben der Leistungsfähigk Anlagen u. deren Wirtschaftlichkeit, (Dtsch. Essigind. 28. 285—86. 293—94. 3. 1924. Ch. E. Weehawken [N. J.]) RÜH

Antonio Ceriotti, *Herstellung von Weinessig. Seine fabrikatorische Gewinn in der Bundeshauptstadt*. Das Ausgangsmaterial ist A. aus Rohrzucker od s Mais. Die Methoden zur modernen Schnellessigfabrikation werden beschrieb Füllung der App. mit Buchenholzspänen oder kleinen tuchüberzogenen Holztaf oder Kolonnenapp., deren Böden durch Heber miteinander kommunizieren: A mit automat., gleichmäßiger Verteilung. — Mehrere Analysen von in BuenosA hergestellten Essigarten werden gegeben. (Anales Asociación Química Arg 12. 65—79. 1924. Sep. Buenos Aires, Officin. Quím. Municipal.) W. A. R

H. Wüstenfeld, *Nimmt die Essigsäure Anteil an den Bildnerverlusten?* Nicht nur beim Handbetrieb, sondern auch beim selbsttätigen Betriebe gibt man n nur oder vorwiegend A. auf, sondern auch Säure, u. zwar fast stets erbl mehr Säure als A. Es wird nun gefragt, ob mehr Säure durch Überoxydation verloren geht, wenn mehr Säure zugesetzt wird, oder ist dieser Verlust alla die Oxydation des A. beschränkt. Wahrscheinlich trifft keines von beiderall zu. Jedenfalls ist anzunehmen, daß umsomehr Essigsäure zerstört wird, je niedr der Gehalt an A. u. je höher der an Säure ist. Es empfiehlt sich al, Maische mit mehr A. u. weniger Säure anzustellen. (Dtsch. Essigind. 28. 3. 1924.) RÜH

H. Wüstenfeld, *Was versteht man unter Überoxydation und wie kommt esch zustande?* Überoxydation ist die Oxydation der gebildeten Essigsäure in der Essig bildnern; sie kann auf n., durch die physiolog. Eigenschaften der Essigbakteri bedingtem Wege eintreten bei Alkoholmangel; ein Schutz dagegen ist, wer m möglichst hochprozentig arbeitet; starker Essig wird nicht so leicht oder übhau nicht wieder aufgezehrt, der Oxydationsvorgang hört nach dem Verschwind d letzten A. einfach auf. Es gibt aber auch krankhafte Überoxydation als Foe v Fremdinfektionen noch unbekannter Art, die vom Gehalte der Maische an . ga

hängig ist. Die hochprozentige Betriebsweise ist auch hier das beste Vorbeuge-
mittel. (Dtsch. Essigind. 28. 325—26. 1924.) RÜHLE.

Itaiger, *Über Untersuchung von Spiritus, Branntwein und Likören. I.* An-
satz der Verf. zur Best. der D. u. des Gehaltes an A. (Brennereiztg. 41. 184.
1924.) RÜHLE.

J. Reichard, *Ist der Nachweis von Blausäure ein Beweis für die Verfälschung
von Weindestillaten?* Auch Feinbrände aus Weinen u. Weinrückständen können
C-haltig sein, wenn das Ausgangsmaterial Teile der „Blauschönung“, Blutlaugensalz
u. Blautraub, enthält. Man kann also ein Weindestillat wegen nachgewiesener
C nicht mehr als verfälscht bezeichnen. Da HCN den Geschmack ungünstig
beeinflusst u. in manchen Fällen die Verwendung zu Trinkzwecken ausschließt, sind
hier u. Brenner aufzuklären, die Blauschönung im Fahren des Gesetzes vor-
nehmen u. streng nach den Vorschriften den Trub durch Filtrieren restlos zu
entfernen. (Ztschr. f. angew. Ch. 37. 957—59. Speyer. 1924.) JUNG.

Karl Fehrmann, Berlin-Friedenau, *Berieselungskühler für Bierwürze oder ähn-
liche Verwendungszwecke*, dad. gek., daß am Zufluß der h. Würze auf den Kühler im
einen App. eine Abschreckzone angeordnet ist, welche eine gute Trübausschei-
dung bewirkt, bezw. einleitet. — Die Abschreckzone kann durch Abteilen der am
unten gelegenen Kühlflächen oder auch aus einem einzigen Rohr gebildet werden.
(D. R. P. 406361 Kl. 6b vom 27/3. 1923, ausg. 21/11. 1924.) OELKER.

Vilhelm Weckerle, Zuffenhausen, Württbg., *Pasteurisierungapparat für Bier*
u. d., bei dem das Pasteurisierte Gut in Kastenwagen der Behandlungszone zu-
geführt u. aus ihr entfernt wird u. das Heizmittel in die Wagenkästen hinein-
geführt wird, dad. gek., daß die Wagen eine schiefe Ebene hinaufwandern in
der Anordnung, daß von den oberen Wagen Heizmittel (W.) in die unteren
Wagen überlaufen kann. — Es wird eine sehr einfache Bewegung des Pasteurisiert
im Gegenstrom zu dem Heizmittel erreicht. (D. R. P. 405515 Kl. 6d vom
1/12. 1923, ausg. 3/11. 1924.) OELKER.

Leischmann Company, New York, übert. von: F. Hayduck, Berlin, *Hefe*.
(D. R. P. 237960 vom 24/7. 1923, ausg. 19/2. 1924. — C. 1920. II. 197 [D. R. P.
1333.] OELKER.

Leischmann Company, New York, übert. von: Aktieselskabet Dansk
Hefegærs-Industri, Kopenhagen, übert. von: Søren Sak, Kopenhagen, *Herstellung
von Hefe*. (Can. P. 237961 vom 1/8. 1923, ausg. 19/2. 1924. — C. 1922. IV. 1178
[D. R. P. 94210].) OELKER.

Leischmann Company, New York, übert. von: Aktieselskabet Dansk
Hefegærs-Industri, übert. von: Søren Sak, Kopenhagen, *Herstellung von Hefe*.
(D. R. P. 237962 vom 1/8. 1923, ausg. 19/2. 1924. — C. 1922. II. 449 [Schw. P.
919].) OELKER.

Leischmann Company, New York, übert. von: Aktieselskabet Dansk
Hefegærs-Industri, übert. von: Søren Sak, Kopenhagen, *Hefe*. (Can. P. 237963
vom 1/8. 1923, ausg. 19/2. 1924. — C. 1921. II. 366 [E. P. 153667].) OELKER.

Stillers Company Ltd., Edinburgh, und Ejnar Alfred Meyer, Clifton,
England, *Hefepreßapparat*. Man vermischt Preßhefe, um ihre Lebensdauer zu verlängern mit
etwas, wie Kokosbutter o. dgl., u. trocknet das Gemisch bei einer Temp., welche die
Hefe nicht schädigt. (E. P. 204164 vom 17/7. 1922, ausg. 18/10. 1923.) OELKER.

Johannes Jacobus van Hest, Rotterdam, *Herstellung eines verzuckerten Malz-
schrot oder Malzmehl* wird mit 3—5 Tln. W. von 10—20° vermischt,
in einen Digestor gebracht u. 10—16 Stdn. bei dieser Temp. darin belassen. Darauf
wird die über dem Teig sich ansammelnde diastasehaltige Fl. in einen Diastase-
kessel, der Teig selbst dagegen in einen Kochkessel übergeführt u. in diesem auf

50—60° erwärmt. Nach etwa einer halben Stde. erwärmt man die M. weiter 75°, läßt sie bei dieser Temp. wieder $\frac{1}{2}$ Stde. oder länger stehen, erhitzt dann 100° u. kocht $\frac{1}{2}$ Stde. oder länger. Alsdann vermischt man den Teig mit Diastaselsg. in der Weise, daß das Gemenge eine Temp. von 70—75° zeigt u. es so lange auf dieser Temp., bis eine vollständige Verzuckerung erzielt. (Holl. P. 11209 vom 26/6. 1918, ausg. 16/6. 1924.) OELKE.

Florimond Bouttens, Lille, Frankr., *Vorrichtung zum Wenden des keimenden Malzes*. (D. R. P. 403373 Kl. 6a vom 16/10. 1921, ausg. 27/9. 1924.) OELKE.

Adam Pietrasiewicz, Poznan, *Reinigung von Rohspirit*. Man bedient sich der Rektifikation des Spiritus eines Schnellstromanalysators, welcher stehend, geneigt oder wagerecht angeordnet sein kann. Dem Analysator führt man mittels einer Pumpe aus einem besonderen Behälter W. von einer bestimmten Temp. zu, wobei eine Kondensierung der Aldehyde u. Äther ausschließt u. nur eine Kondensierung des Spiritus bei höherem Kp. zuläßt, wobei dieser als Fl. zur Rektifikation zurückkehrt. — Innerhalb des Analysators sind in dem Wasserteil u. Spiritus Scheidewände vorgesehen, welche den Spiritusdampf veranlassen, einen längeren Weg zu nehmen. (D. R. P. 402146 Kl. 6b vom 18/5. 1922, ausg. 12/9. 1924.) OELKE.

Herbert Ramsden, Ottawa, Ontario, Canada, *Alkoholfreies Getränk*, welches aus einem Gemisch von Zuckersirup mit einem Extrakt aus Ingwer, Hopfen, Kräutern von weißem Andorn (*Herba marubii albi*) zusammengesetzt ist. (Can. P. 237893 vom 17/4. 1923, ausg. 19/2. 1924.) OELKE.

XVI. Nahrungsmittel; Genußmittel; Futtermittel.

M. Glaubitz, *Wie sollen Kartoffeln eingesäuert werden?* Kurze Anleitung. (Ztschr. f. Spiritusindustrie 47. 316—17. 1924.) RÜHE.

Bodinus, *Zwei Vitaminpräparate*. *Hevitan* (Sarotti A.-G., Berlin), aus Leinöl gewonnen; hellgelbliches, schwach riechendes Pulver von ausgeprägtem Geschmack, enthält Vitamin B. — *Vitaminose* (Klopferwerk, Dresden-Leubnitz), geht von Getreidekeimling aus, der neben Nährsalz u. Eiweiß viel Fett u. Vitamin A enthält, u. vom vitaminreichsten Gemüse, dem Spinat, der sorgfältig getrocknet in ein feines Pulver übergeführt wird. (Apoth.-Ztg. 39. 1529. 1924. Bielefeld.) RÜHE.

E. A. Back und **R. T. Cotton**, *Einwirkung der Vergasung auf die von Insekten hervorgerufene Erhitzung des Getreides*. Vff. bestätigen die Beobachtung, daß eingelagertes Getreide durch Insekten stark erhitzt wird. So erzeugte 1500 *Carthartus cassiae* Käfer in 1 Pfd. Kleie eine Temp. von 95° F. in einem 240 Pfd. Sack Kichererbsen zeigte eine Temp. von 102—103° F. bei einer Normaltemp. von 58° F. — Die Gründe dieser Erscheinung sind nicht ganz klar. Wahrscheinlich wird durch die Faeces der Insekten eine Fermentation der Samenauflösung gelöst, indem die Faeces die Feuchtigkeit an sich ziehen, vielleicht kommt eine mechan. Reizung durch die Fraßwerkzeuge in Frage. Kaltes Wetter bringt eine Abhilfe; dagegen Vergasung mit CS₂ oder HCN. (Journ. Agricult. Research 27. 1103—16. 1924.) TREIBER.

Alfred A. Kloot, *Linsen gemischt mit gefärbtem Talg*. In Durban (Natal) aus Indien eingeführte Linsen (Dholl) enthielten 6—22% mit einem Eosinfarbstoff gefärbten Talg. Eine Verfälschung ist hier ausgeschlossen, da in gewisse Indienkreisen — in Durban leben viele Indier — ein solcher Zusatz gefordert wird. (Analyst. 49. 514—15. 1924.) RÜHE.

Heinrich Fincke, *Kleine Beiträge zur Untersuchung von Kakaobohne und Kakaoerzeugnissen*. 2. Mitteilung. (1. vgl. Ztschr. f. Unters. Nahrsg.- u. Genußmitt. 48. 128; C. 1924. I. 2841.) Zahlenmäßige Angaben über 100-Bohnengehalt im 100-Bohnenraum, D., mittlere Bohnenlänge, Rundlichkeitswert, Gleichmäßigkeit des Säuregrad des Kernfettes, Gehalt an Schalen, Keimen, Kernen, W., Fett u. Eiweiß.

edener Bohnensorten. Angaben über Reinigung der Kakaobohnen. (Ztschr. f. Ns. Nahrsgs.- u. Genußmittel **48**. 293—306. 1924. Köln, Gebr. STOLLWERCK, GROSZFELD.)

B. Bleyer und O. Kallmann, *Beiträge zur Kenntnis einiger bisher weniger erter Inhaltsstoffe der Milch (Kuhmilch)*. I. Die vorgenommenen Unterss., die h Anlehnung an eine große, gut eingerichtete Molkerei günstige Bedingungen o, betreffen den *Rest-N* der Milch, ihren in W. l. *Farbstoff* u. bisher wenig d nicht bearbeitete *Mineralstoffe*. Hier wird zunächst über die N-Bestandteile e Art ihrer Best. berichtet. Aus den zahlreichen unter Mitwrkg. von **Stephan i** (vgl. Diss. München 1923) ausgeführten Unterss. seien die Ergebnisse der von als besonders charakterist. hervorgehobenen Unters. mit Milch einer Kuh in ierer Lactationsperiode, die besonders gesammelt u. verarbeitet wurde, wieder en. Die Fällung des Eiweißes erfolgte nach dem Schererschen Verf. Es n Vollmilch D. 1,0311, Säuregrad (HENKEL-SOXHLET) 6,3, Fett 2,95%; Mager- i daraus D. 1,0336, Säuregrad 7,2, Fett 0,1%; daraus hergestellte Labungs- oe D. 1,0267, Säuregrad 8,8; aus der Magermilch hergestellte Sauermolke .0276, Säuregrad 26,8. Der Gehalt in mg in 100 cem bei Vollmilch, Labmolke uermolke an Gesamt-N, Eiweiß-N, Rest-N (Gesamt-N im Filtrat), Rest-N nach ES u. MINOT, Albumosen-N, Phosphorwolframsäure-N (Pepton-N), Purinbasen-N, asäure, Kreatinin (präformiert), Kreatin, Aminosäure-N, Harnstoff-N, NH₃-N rormiert) wird tabellar. mitgeteilt. Nach den Ergebnissen ist es unwahrscheinlich, in der Milch neben Casein u. hitzefällbarem Protein (Albumin + Globulin, en Existenz unwahrscheinlich ist) noch irgendwie nennenswerte Mengen anderer ißkörper vorhanden sind. Außer den oben angeführten N-Verbb. kommen onstante Bestandteile noch *Rhodanide* u. ein *N-haltiger Farbstoff* in Betracht. hem. Ztschr. **153**. 459—86. 1924. Weihenstephan, Landwirtschaftl. Hochsch. ehen, Zweigstelle der chem. Fabriken MERCK, BOEHRINGER, KNOLL [Lactana- SPIEGEL.]

Elizabeth Gates und Wyly M. Billing, *Abänderung von Kuhmilch als Kinder- ung*. Kuhmilch ist wegen des dreimal so hohen Caseingehaltes für Kinder herer verdaulich als Frauenmilch; der Zuckergehalt ist bei Kuhmilch niedriger. eosten Resultate bei der Abänderung der Kuhmilch zur Verwendung als Kinder- ung sind durch Zusatz von Lactose (2,27 g), NaCl (0,01 g), NaHCO₃ (0,033 g), a PO₄ (0,0065 g), KHCO₃ (0,005 g) auf je 113,4 g Kuhmilch, die nach Bedarf zu nmen ist, zu erwarten, während man die sonst gebräuchlichen Ca-Salze ganz eißt. (Journ. Amer. Pharm. Assoc. **13**. 1015—20. 1924. Cincinnati, Merrell DIETZE.)

Ludwig Kroeber, *Milch und Milchprodukte*. Die hohe Bedeutung der Milch- haft für Deutschland, besonders im Algäu, wird betont. Die Gewinnung von lprodd., Butter, Käse, Milchezucker, Milcheiweiß, Triferrin, Tamalbin usw. in Lactanawerken, Dietmannsried bei Kempten, wird eingehend geschildert. m. Zentralhalle **65**. 675—78. 697—99. 1924. München-Schwabing.) DIETZE.

L. von Slyke, *Die Chemie des Caseins*. Vf. erörtert die chem. Eigenschaften s Caseins, seine Gewinnung u. teilt einen Laboratoriumsverf. mit zur Darst. n Caseins, nach welchem im wesentlichen *Magermilch* unter starkem Rühren am mit HCl-Essigsäure gefällt, das Casein in einer Centrifuge bis zum Trüb- i gewaschen wird. Zur Entfernung kolloidaler Ca- u. Mg-Phosphate wird das a durch Rühren in wss. Suspension gebracht, nach Zusatz von NaOH in ualer Lsg. (pH 7) zentrifugiert, in sehr stark verd. Lsg. gefällt, in Suspension sigsäure elektrolysiert, zentrifugiert u. mit h. 70—80%ig. A., absol. Ä., PAe. e Bzl. oder Toluol behandelt. (Kunststoffe **14**. 166—67. 1924.) JUNG.

B. Lichtenberger, *Die wärme- und maschinentechnische Betriebskontrolle der Molkereien. Ein Arbeitsfeld für die Wärmewirtschaftsstellen?* Vf. hält eine wärme- u. maschinentechn. Betriebskontrolle des Molkereigewerbes für notwendig u. empfiehlt deshalb den Molkereien den Anschluß an eine Wärmewirtschaftsstelle der Kreisrevisionsvereine u. Ausbildung von Molkerei-Ingenieuren. (Die Wärme 47. 551-552. 1924.) NEIDHART.

C. Ainsworth Mitchell, *Der Stearinsäuregehalt von Butterfett*. Nach neueren Erfahrungen des Vfs. schwankt der Gehalt daran von prakt. Null bis wenigstens 22%. Wegen des verwendeten Verf. vgl. HOLLAND, REED u. BUCKLEY jr. (Journ. Agricult. Research. 6. 101; C. 1916. II. 350). (Analyst 49. 515-16. 1924.) RÜHM.

Frank Knowles und **John C. Urquhart**, *Vorläufige Bemerkungen über die Zusammensetzung des Fettes der Ziegenbutter*. Nach Erörterung der Begriffsbildung für „Milch“ u. „Butter“, die schärfer gefaßt werden sollten, gibt Vf. die Ergebnisse seiner Unterss. an. 9 Proben reinen Ziegenbutterfettes gaben für die Reichert-Wollnysche Zahl 24,47-27,77; Polenskesche Zahl 4,9-8,70; Kirchnersche Zahl (7 Proben) 16,82-18,96; Refraktionsindex 1,4541-1,4559; Jodzahl 24,73-29,96; D₃₈³⁸ (7 Proben) 0,9169-0,9346. Danach würde ein Gemisch von Kuhbutter u. Ziegenbutter, das als „Butter“ schlechthin verkauft worden wäre, siehe a. 1924. verfälscht angehalten werden. Es ist erforderlich, daß Milch u. Butter von Ziegen auch als Ziegenmilch u. -butter bezeichnet werden. (Analyst. 49. 509-10. 1924.) RÜHM.

B. Pfyl, *Kritische Bemerkungen zu den Mineralstoffwerten der Lebensmittel*. Die gewöhnliche Asche ist im allgemeinen ein Prod. von Rkk. bei höherer Temperatur. Zwischen den vorgebildeten Mineralstoffen sowie zwischen diesen u. den aus P-haltigen, organ. Verbb. entstandenen Mineralsäuren. Sie enthält in der Asche weder sämtliche vorgebildeten Salze des Lebensmittels noch sämtliche nach Oxydation des Lebensmittels im Organismus vorliegenden organ. Salze. Weiblich ist daher nicht die Best. der Gesamtasche, sondern vielmehr einzelner Gruppen, besonders der Alkalität (vgl. PFYL u. SAMTER, Ztschr. f. Unters. Nahrsgs.- u. Genussmittel 46. 241; C. 1924. I. 1874). In den Bergschen Mineralstoffwerten wird H₃PO₄ fehlerhaft als 3 bas. Säure bewertet, während dieselbe hauptsächlich als prim. u. sek. Phosphat im Organismus ausgeschieden wird. Eine gemischte Asche mit Säureüberschuß nach BERG erscheint daher kaum möglich. Ferner ist die Einbeziehung des ursprünglichen NH₃ des Lebensmittels in den Alkalitätswert nicht zu rechtfertigen; schließlich geht es nicht an, das Nitrat-Ion auf NH₃ umzurechnen. Vielmehr ergibt sich als zweckmäßigster Alkalitätswert für ernährungsphysiologische Zwecke: Der nach vollständiger, verlustfreier Verbrennung des Lebensmittels vorliegende in Millival ausgedrückte Überschuß der Kationen K⁺, Na⁺, Ca²⁺, Mg²⁺, Mn²⁺, Fe²⁺, Zn²⁺, Cu²⁺, Al³⁺ über die Anionen HPO₄²⁻, SO₄²⁻, Cl⁻. Außer dieser „physiologischen Alkalität“ ist noch die Alkalität der vorgebildeten Mineralstoffe neben der Summe der starken Mineralsäuren, der Summe der Alkalien u. a. wichtig. (Ztschr. f. Unters. Nahrsgs.- u. Genussmittel 48. 261-71. 1924. Berlin, Reichsgesundheitsamt.) GEOSZFEED.

Alfred Schwicker, *Ausmahlungsgrad und Mangangehalt der Weizen- u. Roggenmehle*. Die weißgebrannte Asche in 5 ccm 10%ig. HNO₃ gel., auf 5 ccm verd. liefert nach Zusatz von 1-2 Tropfen 1/100-n. AgNO₃ u. 0,5 g Kaliumperlyat bei beginnendem Kochen je nach dem Feinheitsgrade des Mehles eine ros- bis rotfarbige Permanganatlsg.; dieselbe ließ sich jodometr. am besten mit 1/100-n. KHSO₅-Lsg. titrieren. Bei Aschengehalten von Weizenmehlen von 0,42-2,40% betrug die so gefundene „Manganzahl“ (M) von 5 g Mehl 1,05-38,2 ccm 1/100-n. KMnO₄, bei Roggenmehl 1,15-6,50 ccm. An weiteren MM. wurden ermittelt: Weizen 13,0-18,0, Weizenkleie 43,0-44,5, Weizenkeime 56,0, Koppstaub 23 bis

- Roggen 9,5, Roggenkleie 22,5—24,0, Gerste 4,0, Hafer 13,2. Bemerkenswert die Parallelität zwischen M. u. Katalasegehalt. (Ztschr. f. Unters. Nahrsg.- u. Genußmittel **48**. 311—12. 1924. Budapest, Kgl. Ungar. Landeschem. Inst.) GROSZFELD.
- J. Großfeld**, *Neue Wege zur Fettbestimmung in Mahlerzeugnissen und Backwaren*. Besprechung der verschiedenen Verf. Empfehlung u. Beschreibung der Best. mit Trichloräthylen nach Vf. (vgl. Ztschr. f. d. ges. Mühlenwesen **1**. 33; **1924**. II. 2801), gegebenenfalls nach Aufschluß mit HCl, wenn verkleisterte Ergebnisse vorliegen (vgl. Rec. trav. chim. Pays-Bas **43**. 457; C. **1924**. II. 558). Mühle **61**. 1108—9. 1140—41. 1924. Recklinghausen; Sep. v. Vf.) GROSZFELD.
- Ray E. Neidig** und **Robert S. Snyder**, *Süßkleeuntersuchungen*. Unterss. über chem. Zus. des in verschiedenen Stadien der Entw. geernteten Süßkleeheues u. Süßkleeensilage sowie Best. des Gehaltes an Essigsäure, Propionsäure u. Milchsäure in letzterer. (Journ. Agricult. Research **24**. 795—99. 1923. Idaho University.) BERJU.
- Ray E. Neidig** und **Robert S. Snyder**, *Sonnenblumenuntersuchungen*. Analyt. Best. der den Futterwert der Sonnenblumen bestimmenden Bestandteile, u. des Gehaltes an flüchtigen u. nichtflüchtigen Säuren der aus ihnen gewonnenen Silagen sowie den Einfluß der Reihenenfernung auf die Zus. der geernteten Pflanzen. Verbalten der Ergebnisse werden in ausführlichen Tabellen zusammengestellt. (Journ. Agricult. Research **24**. 769—80. 1923. Idaho, University.) BERJU.
- Friedrich Auerbach** und **Georg Borries**, *Die Bestimmung der Trockenmasse in Honige*. Ebenso wie im Kunsthonig (vgl. Ztschr. f. Unters. Nahrsg.- u. Genußmittel **47**. 177; C. **1924**. II. 1139) läßt sich auch im echten Honig die Best. der Trockenmasse ausführen. Zwischen der Brechungszahl n echter Honige bei 20° D. ihrer wss. Lsgg. (20 g/100 ccm) besteht die einfache Beziehung: $D. = 0,17 + 0,29993 n$. Doch ist die Berechnung der Trockenmasse aus n oder D. nicht ganz so genau wie bei Kunsthonig. Ztschr. f. Unters. Nahrsg.- u. Genußmittel **48**. 272—7. 1924. Berlin, Reichsgesundheitsamt.) GROSZFELD.
- J. Stracke**, *Die Phloroglucinreaktion von Tee als diagnostisches Erkennungsmerkmal*. Die Rotfärbung der Holzbestandteile von Teeblättern durch rauchende HCl, nach Zusatz von Phloroglucin ließ sich bei keinem Teeersatzmittel beobachten. Wichtig bei dieser Rk. ist die gute Bloßlegung der Holzstellen, bei der allgemeinen Rk. auch die richtige Reihenfolge von erst Phloroglucin dann HCl. (Pharm. Zentralbl. **61**. 1424—6. 1924. Amsterdam.) GROSZFELD.
- A. Bém** und **Alexander Jaschik**, *Zur Frage der chemischen Untersuchung der Natriumhydrocarbonat bezw. Soda versetzten Milch*. Vorl. Mitt. Es wird darauf hingewiesen, daß bei sodahaltiger Milch der aus der D. berechnete Wert für die Trockensubstanz größer ist als der durch direkte Wägung gefundene. Der Unterchied wächst im Verhältnis zum zugesetzten NaHCO₃ (0—5 g Natt CO₃/l entsprechen 0,13% Differenz). Noch stetiger als Trockensubstanz (0—0,51%) aber in geringem Maße nimmt der N-Gehalt bei NaHCO₃-Zusatz ab (0—0,5 g NaHCO₃ enthalten 0—0,108% N-Verlust). (Chem.-Ztg. **48**. 889—90. 1924. Budapest, Chem. Lebensmitteluntersuchungsamt.) GROSZFELD.
- A. Hekma**, *Ein neues Verfahren zur Unterscheidung roher und erhitzter Milch*. Rohmilch von durch Watte filtrierter Milch werden mit 5 ccm Farbstofflg. (0,15% Methylblau, in W. oder besser in physiol. NaCl-Lsg. gel.) im Zentrifugenröhrchen 10 Minuten sich selbst überlassen u. dann 20 Minuten zentrifugiert. Das Sediment wird mikr. auf Färbung geprüft. Bei erhitzter Milch fehlen ungefärbte Zellen; bei Rohmilch u. erhitzter Milch sind gefärbte u. ungefärbte Zellen vorhanden (Zählung!). Bei Erhitzen auf nur 63° war nachher eine mäßige Anzahl schwach gefärbter Zellen wahrzunehmen. Auf diese Weise ist jedoch genaue Nachprüfung, ob Milch 1/2 Stde. auf 63° pasteurisiert wurde, nicht möglich. Das Verf. eignet

sich auch bei Konservierung der Milch mit $K_2Cr_2O_7$ oder $HCOH$, wo die Storch-Rk. versagt. — Verwechslung der Zellen mit Fetttröpfchen oder Schaumhäute (vgl. HEKMA u. BROUWER, Vereeniging tot exploitatie eener proefzuivelboerderij te Hoorn 1922. 25; C. 1924. II. 768) ist zu vermeiden. (Vereeniging tot exploitatie eener proefzuivelboerderij te Hoorn. 1923. 43—54. Sep.) GROSZFELD.

M. Monhaupt, *Fettbestimmung in Butter und Margarine*. Bemerkungen über die Ausführungen von GROSZFELD (Ztschr. f. Unters. Nahrsgs.- u. Genußmittel 420; C. 1924. II. 1754) Zeichnung eines verbesserten App. zur Filtration der Fette unter Luftabschluß. (Ztschr. f. Unters. Nahrsgs.- u. Genußmittel 43. 313—4. Altona.) GROSZFELD.

Josef Lohmann, Lendershausen, Unterfranken, *Dörröfen*. Um den Vorgang bei den bekannten Dörröfen mit einer unteren Öffnung zum Herausnehmen der jeweils untersten Dörrhorde u. einer oberen Öffnung zum Einschieben der jeweils obersten Horde ununterbrochen zu gestalten, wird eine Hubvorrichtung für die Dörrhorden vorgesehen, welche aus an Seilen hängenden u. in den Dörrschacht eingreifenden Haken besteht, die nach Herausnahme der untersten u. Aufschieben der zweituntersten Horde auf den Boden des Dörrschachtes durch Leitschienen seitlich nach außen geschwungen u. außerhalb des Dörrschachtes wieder gelockert werden, um dann unter die nunmehr zweitunterste Horde zu greifen. (D. R. P. 403631 Kl. 82a vom 10/2. 1923, ausg. 2/10. 1924.) OELKE.

Bruno Müller, Neukölln, *Sonnendarre für Früchte usw.*, dad. gek., daß sie aus einem gegen Regen abgeschlossenen, aus den übereinandergestapelten Horden u. einem Dach gebildeten, zweckmäßig geschwärtzten Metallgehäuse ohne innere Beheizung besteht, wobei die Metallrahmen der Horden mit Lüftungslöcher versehen sind u. das Dach eine schornsteinartige Öffnung hat. (D. R. P. 405151 Kl. 82a vom 8/6. 1922, ausg. 24/11. 1924.) OELKE.

H. Everaert, Courtrai, Belgien, und **F. Lescarde**, Paris, *Eierkonservierung*. Die Eier werden in einem Autoklaven mit einem Gemisch von CO_2 u. N_2 bei 100° bei geringem Überdruck behandelt. (E. P. 222487 vom 25/9. 1924, Auszug vom 19/11. 1924. Prior. 25/9. 1924.) KAUSCH.

Studiengesellschaft für Rohstoffchemie, Zehlendorf, Wannseebahn, *Färbungen von Nahrungs- und Genußmitteln*, dad. gek., daß in an sich bekannter Weise mit Alkalien behandelte weicherdeige Braunkohle, sogenannte Schmierkohle, als Farbstoff verwendet wird. — Der zur Herst. der sonst zum Färben von Nahrungs- und Genußmitteln dienenden Zuckercouleur verwendete Zucker bleibt der Volksernährung erhalten. (D. R. P. 406198 Kl. 6b vom 2/3. 1922, ausg. 15/11. 1924.) OELKE.

Charles Samuel Townsend, London, und **Munton & Baker** (Bedford) Ltd., London, *Herstellung eines Nährpräparats*. — Man vermischt zerkleinerten Zwack mit Malzextrakt (etwa 25%), rollt den erhaltenen Teig zu $\frac{1}{8}$ — $\frac{1}{4}$ Zoll dicken Tafeln aus, backt diese, bis sie braun sind (etwa bei 300° F.) u. zerkleinert sie dann zu Körnern von etwa $\frac{1}{10}$ — $\frac{1}{15}$ Zoll Durchmesser. Dem Teig können noch andere Stoffe, wie Zucker, Trockenmilch, Geschmacksstoffe usw. zugegeben werden. (E. P. 203240 vom 20/11. 1922, ausg. 27/9. 1923.) OELKE.

Ladislaus Berczeller, Wien, und **Robert Graham**, Cupar-Fife, Haymarket, Schottl., *Veredelung von Sojabohnen* durch Behandlung mit Wasserdampf, dad. gek., daß die Bohnen in unverändertem gequollenem oder gekeimtem Zustande so lange in Zeit der Einw. von Wasserdampf, vorzugsweise von gesätt. Dampf, ausgesetzt werden, daß sie unter Erhaltung der Beschaffenheit der Eiweißstoffe nur geringe Mengen W. aufnehmen, worauf sie in bekannter Weise getrocknet werden können. — Der widerliche Geschmack u. Geruch der Sojabohnen wird völlig beseitigt.

it. (D. R. P. 406170 Kl. 53k vom 26/1. 1921, ausg. 15/11. 1924. Oe. Prior. 1921.)

OELKER.

Benjamin Krauss, Eßlingen a. N., *Herstellung eines Nähr- und Genußmittels* Kakaoschalen durch Behandlung mit einer Zuckerlsg. u. nachfolgendes Rösten, gek., daß man die auf das feinste pulverisierten Schalen mit einer verd. Lsg. von NaCl u. Zucker trinkt, hierauf etwa 12 Stdn. stehen läßt, die nach dem Erhitzen bei etwa 35° erhaltene M. grobkörnig zerkleinert u. in üblicher Weise weiterverarbeitet. — Es gehen keine der in den Kakaoschalen enthaltenen brauchbaren Stoffe verloren. (D. R. P. 406752 Kl. 53f vom 8/11. 1922, ausg. 27/11. 1924.) OELKER.

International Dry-Milk Company, Minneapolis, V. St. A., *Vorrichtung zur Herstellung von Milchpulver*. (D. R. P. 402977 Kl. 53e vom 17/2. 1921, ausg. 1/12. 1924. — C. 1923. II. 1160.)

OELKER.

Wilhelm Normann, Emmerich a. Rh., *Herstellung von gemischten Glyceriden* höher u. niederer Fettsäuren, dad. gek., daß man ein Fett oder Öl, das wesentlich oder ausschließlich aus Estern höherer Fettsäuren besteht, mit niederen Fettsäuren bei gewöhnlichem oder erhöhtem Druck bei Ausschluß von W. u. gegebenenfalls unter Luftabschluß erhitzt. — Zur Herst. eines butterähnlichen Fettes kann man ein natürliches oder gehärtetes Fett mit Buttersäure oder anderen niederen, sauren oder sauerstoffhaltigen Fettsäuren erhitzt. (D. R. P. 407180 Kl. 12o vom 25/4. 1922, ausg. 9/12. 1924.)

OELKER.

Henry John Gerstenberger, Amerika, *Milchähnliches Nährmittel für Kinder*, besteht aus W., Milcheiweißstoffen, Kohlenhydraten, wie Milchzucker, Salzen, z. B. C. Vitaminen u. einem Fettgemisch zusammengesetzt ist, das etwa die gleiche Verdauungs- u. Jodzahl u. den gleichen F. wie das Fett der menschlichen Milch besitzt. — Das Fettgemisch besteht aus etwa 10% Talgöl, 15% Kokosöl, 20% Kokosfett, 10% Lebertran u. 55—45% Talg. (F. P. 559152 vom 27/11. 1922, ausg. 1/12. 1923.)

OELKER.

Carl Wolf, Schweinsburg a. d. Pleiße, *Behandeln von Grünfutter in Futtersilos*, dad. gek., daß das eingebrachte Grünfutter mittels einer oder mehrerer an einem senkrechten Rahmen angeordneter elektr. Heizspulen erwärmt u. bestrahlt wird, die dicht über der Oberfläche des eingebrachten Grünfutters gehalten werden. — Wird an elektr. Strom gespart. (D. R. P. 405758 Kl. 53g vom 9/7. 1922, ausg. 14/11. 1924.)

OELKER.

Gesellschaft für Lupinen-Industrie m. b. H., Berlin, *Entgiftung und Entkeimung von Lupinen und ähnlichen Samen* durch Auslaugung, dad. gek., daß die Auslaugung in der Weise vorgenommen wird, daß die Lupinen usw. nacheinander in eine Quellfl., d. h. in eine wss. Fl. mit einem die Wasseraufnahme durch die Samen begünstigenden Zusatz, u. in eine entquellende Fl., d. h. in eine wss. Fl. mit einem die Wasseraufnahme beeinträchtigendem Zusatz, gebracht werden. — In der Quellfl. kommen in Betracht: H_3PO_4 , Citronensäure, Harnstoff u. Ammoniaklsg.; als entquellende Lsgg. von KNO_3 , Kaliumsuperphosphat, $NaNO_3$, $CaCl_2$, NaCl, KCl. — Durch die quellenden Fl. werden die Gift- u. Bitterstoffe während dieser mittels der entquellenden Fl. gleichzeitig mit der absorbierten Flüssigkeit aus den Samen entfernt. (D. R. P. 406286 Kl. 53g vom 4/1. 1923, ausg. 17/11. 1924.)

OELKER.

XVII. Fette; Wachse; Seifen; Waschmittel.

Lans Wolff, *Über den Trocknungsprozeß der „trocknenden“ Öle*. Die Oxydation spielt bei der Trocknung bildet nur einen Teil der Vorgänge. Der eigentliche Trocknungsprozeß darf nicht identifiziert werden mit der Oxydation u. der O_2 -Aufnahme. Vielmehr läßt sich zeigen, daß das Festwerden ein kolloidaler Vorgang, der mit der Gelbildung ist, die unter besonderen Umständen höchst charakterist. Alterserscheinung ist.

nungen aufweist. Das Trocknen weist mindestens 3 Phasen auf: 1. Oxydation unter B. kolloidaler Lsg., 2. Gelbbildg. u. 3. weitere Oxydation des fest gewordenen Anstrichs sowie Alterung des Kolloidsystems. Etwa auftretende Molekülzusammenschlüsse, an Molekulargewichtsbestst. gemessen, brauchen nicht auf einer chemischen Beruhen zu beruhen, sondern können Folgen der Aggregation sein. Dies wird durch Molekulargewichtsbestst. nach RAST an Dickölen u. den aus ihnen hergestellten Säuren bewiesen, die einwandfrei monomolekulare Größe ergaben gegenüber höheren Molekulargrößen bei anderen Lösungsmitteln. Die physikal. Eigenschaften u. chem. Reaktionsfähigkeit von Öl- u. Farbfilmen kann daher nicht ohne Weiteres aus der chem. Beschaffenheit der Einzelkomponenten abgeleitet werden, das viel mehr von dem Dispersionsgrad usw. abhängen. Sie sind nicht Folge der chem. Konst. der Komponenten, sondern solche vom Zustand des Systems. Nur technol. Prüfung kann die in dies Gebiet gehörenden techn. Fragen unterscheiden. (Chem.-Ztg. **48**. 897—99. 1924. Berlin.) SÜVEL.

Pavel Slansky, *Über die Katalyse der Leinöloxydation*. I. u. II. Vf. untersuchte den Einfluß verschiedener ölnl. Stoffe auf die Trockengeschwindigkeit von Leinöl. Viele davon (Tabellen im Orig.), z. B. BaSO₄, beschleunigen die Oxydation des Leinöles; andere, z. B. Graphit, verzögern sie. Es kann sich nur um katalytische Oberflächenwrkg. handeln, da die Beschleunigung mit der Feinheit der Stoffe zunimmt. Das von den Stoffen abgesaugte Öl zeigte dieselbe Trockengeschwindigkeit wie das ursprüngliche Versuchöl. Zwischen der heterogenen u. homogenen Katalyse der Leinöloxydation ist kein Unterschied zu machen.

II. *Versuch einer Theorie des Mechanismus der Katalyse der Leinöloxydation*. Aus den Unterss. über die Katalyse der Leinöloxydation geht hervor, daß insbesondere die basenbildenden Metalle u. ihre Salze die Oxydation beschleunigen. Vf. erklärt das damit, daß der bas. Katalysator die Reaktionsfähigkeit der Doppelbindungen des Glyceridmoleküls (Druckfehler im Original) durch Einw. an die saure Carboxylgruppe vergrößert. (Chem. Umschau a. d. Geb. d. Fette, Öle, Wachsen **31**. 277—80. 281—82. 1924. Lobositz, Böhmen.) HELLB.

C. K. Patel, *Die Verwendung gemischter Katalysatoren bei der Hydrierung von Ölen*. Im Verfolg früherer Unterss. des Vfs. (Journ. of the Indian Inst. of Science **5**. 60. 1922; C. **1923**. II. 486) wurde die Hydrierung von raffiniertem Öl unter der Einw. von gemischten Co-Ni-Katalysatoren untersucht. Die Katalysatoren waren auf Kieselgur niedergeschlagen; die aktivsten Katalysatoren wurden erhalten durch Red. der Carbonate bei 270—310°. Der Verlauf der Härtung wurde durch Best. des Brechungsexponenten ermittelt. Die Aktivität des Ni-Katalysators wird durch die Ggw. von Co, ferner von Ag u. Cu herabgesetzt. Der Grad der Verzögerung wächst mit der Menge zugesetzten Metalls. (Journ. of the Indian Inst. of Science **7**. 197—204. 1924. Bangalore, Indian Inst. of Science.) HELLB.

Hans Wolff, *Über die Polymerisation der trocknenden Öle*. Erwiderung auf die Ausführungen von GRÜN u. WITTKA (Ztschr. Dtsch. Öl- u. Fettind. **44** 37. C. **1924**. II. 2374). Die Verdickung ist nicht direkte Folge der Entstehung einer hypothet. Polymerisationsprod., sondern die Folge einer Zustandsänderung desselben. Bei der Bewertung der Mol.-Geww. sind die niedrigeren, nicht die höheren Werte zu betrachten. (Ztschr. Dtsch. Öl- u. Fettind. **44**. 631—32. 1924. Berlin.) HELLB.

Bruno Rewald, *Über die Verwendung dunkler Abfallfette in der Seifenindustrie*. Während die dunklen Abfallfette prakt. nicht zu bleichen sind, gelingt die Färbung immer mit den verseiften Fetten. Die Bleichung geschieht zweckmäßig mit einer Lsgg. von Na- oder K-Hypochlorit, die dem Chlorkalk überlegen sind. (Der Ölarbeiter **6**. 606—7. 1924. Hamburg. Sep.) HELLB.

Heinrich Rose und **Maximilian Keh**, *Zur Sulfurierung des Tranes*. Vorgegeben die Eigenschaften an, die von einem guten Fettungsmittel für Leder

ort werden, u. teilen das folgende Verf. zur Herst. eines solchen mit: Man rührt in einen Kessel mit Rührwerk von etwa 40 l Inhalt 30 kg Tran (VZ. 180, Zahl 130) u. setzt in Anteilen 3 kg chem. reine H₂SO₄ (D. 1,84) zu, wobei durch Umrührung des Kessels mit einer Rührschlange u. fortwährendes Mischen dafür gesorgt wird, daß die Temp. 25° nicht übersteigt. Ein Kennzeichen für richtige Sulfurierung besteht darin, daß ein Tropfen des sulfurierten Tranes im Reagensglas mit Wasser gemischt eine Emulsion bildet. Wenn dieses nicht der Fall ist, so muß das Mischen fortgesetzt oder mehr Säure zugefügt werden. Nach richtiger Sulfurierung werden in Anteilen etwa 5 kg konz. techn. NH₃ unter fortwährendem Mischen zugefügt, wobei die Temp. nicht höher als 24° sein soll. Die Rk. ist beendet, wenn 1 g des Fettes beim Schütteln mit W. im Reagensglas eine milchige Emulsion bildet, die gegen Phenolphthalein sauer, gegen Methylorange alkal. reagiert u. nach Umrühren sich nicht in zwei Schichten teilt. Das auf diese Weise hergestellte Emulsionsmittel kann entweder allein oder mit Vaseline im Verhältnis maximal 1:1 verwendet werden. In dem so hergestellten Erzeugnis befinden sich freie (Oxyfettsäuren u. Seifen), die als gute Emulsionsmittel bekannt sind. Zur Herstellung einer guten Emulsion müssen jedoch zur Sulfurierung mindestens 10% H₂SO₄ verwendet werden. (Collegium 1924. 327—29. Poln. Lederwerke Krakau-u. Vinów.)

LAUFFMANN.

Yoshiyuki Toyama, Untersuchung über die Fettsäuren der Waltrane. I. Mitteilung. Über die Fettsäuren des Buckelwaltranes und des Finnwaltranes. Der vom Verf. untersuchte Buckelwaltran wurde aus dem Speck des Buckelwals gewonnen. Kennzahlen: D.¹⁵ 0,9212; SZ. 1,85; VZ. 187,8; J-Zahl 115,4; Brechungsindex bei 20° 1,4732; Unverseifbares 1,08%. Durch die Pb-Salz-Ä. Methode werden 12,9% freie Fettsäuren mit der J-Zahl 13,4 ermittelt. Den wahren Gehalt nimmt Vf. mit 10% an. 20,5% der Gesamtfettsäuren geben in Ä. unl. Bromide, 7,9% der freien geben in Bzl. l. Bromide. Die in Ä. l. Bromide enthalten Bromide, die den größten Teil in k. PAe. l. sind. Der in PAe. unl. Teil entspricht 8,8% der freien Säuren. Vf. prüft auf die verschiedenen Fettsäuren durch Methylierung. Das Produkt wurde mit der gleichen Menge 2,5%ig. methylalkoh. HCl-Lsg. 10 Stdn. am Rückflußkühler gekocht u. das methylierte Prod. bei 15 mm Druck dest. Die Fraktionen werden abermals dest. Es werden eindeutig festgestellt: *Myristinsäure*, *Palmitinsäure*, *Hexadecylensäure*, welche beim Hydrieren *Palmitinsäure*, beim Hydrieren nach Hazura *Dioxyalmitinsäure* liefert, ferner *Ölsäure* u. Säuren der Reihe C₁₂H₂₈O₂, C₁₃H₃₀O₂ u. C₁₅H₃₂O₂.

Die höher sd. Fettsäuren des Buckelwaltranes werden nach der Li-Salz-Acetonmethode u. die aus den unl. Li-Salzen gewonnenen Fettsäuren nach der Pb-Salz-Methode getrennt. Aus den in A. unl. Pb-Salzen werden unter nochmaliger Anwendung der gleichen Trennungsmethode *Stearinsäure*, *Arachinsäure*, sowie eine Fraktion der Zus. C₂₂H₄₂O₂, F. 32,5—33°, isoliert. Letztere liefert beim Hydrieren *Erucasäure* u. scheint eine bisher unbekannte *Isomere der Erucasäure* zu sein. Bei reiner Erucasäure, F. 33,5—34°, zusammengeschmolzen tritt Erniedrigung des Schmelzpunktes auf 24—26° ein. In den in A. l. Pb-Salzen weist Vf. durch Methylierung, Fraktionierung der Ester u. Verseifung, Bromierung u. erneute Anwendung der genannten Trennungsmethoden abermals die *isomere Erucasäure*, *Arachinsäure* u. benachbarte Homologe nach. In den in Aceton l. Li-Salzen finden sich nach Methylierung, Fraktionierung, Verseifung u. Bromierung die Säuren C₁₈H₃₈O₂, C₁₉H₄₀O₂ der C₂₀-Reihe, C₂₂H₃₄O₂ (*Clupanodonsäure*) u. in beträchtlichen Mengen C₂₄H₄₈O₂. Die Menge der hochungesätt. Säuren mit wenigstens 4 Doppelbindungen beträgt etwa 15%.

Vf. untersucht weiter Finnwaltran, der aus dem Speck des Finnwals gewonnen ist. Kennzahlen: D.¹⁵ 0,9231; SZ. 2,21; VZ. 196,6; J-Zahl 112,9; Brechungs-

index bei 20° 1,4727; Unverseifbares 1,09%. Die Untersuchungsmethoden die gleichen wie bei der Unters. des Buckelwaltrans. Es werden etwa 25% gesätt. Fettsäuren u. 15% hoch ungesätt. Säuren mit mindestens 4 Doppelbindungen gefunden. Die übrigen Fettsäuren gehören vorwiegend der Ölsäurereihe an. (t den gesätt. Säuren weist Vf. neben geringen Mengen der C₁₈-, C₂₀- u. C₂₂-I hauptsächlich *Palmitinsäure* u. *Myristinsäure* nach. Aus der Ölsäurereihe we *Hexadecylensäure* u. *Ölsäure* neben C₂₀H₃₈O₂ u. C₂₂H₄₂O₂ in geringeren Menge funden. Von ungesätt. Fettsäuren werden C₁₈H₃₄O₂, C₁₈H₃₀O₂, C₁₈H₂₈O₂, C₂₀H₃₄O₂ u. C₂₂H₃₄O₂ nachgewiesen. Der Finnwaltran unterscheidet sich o Buckelwaltran durch geringere Menge an gesätt. Fettsäuren u. an Olefinsäuren mehr als 18 C-Atomen. (Chem. Umschau a. d. Geb. d. Fette, Öle, Wachse, Fe

31. 221—27. 238—49. 1924. Tokio, Kaiserl. Anstalt f. chem. Technologie.) KL

H. E. Watson und J. J. Sudborough, *Die Beziehung zwischen Jodzahlen Brechungsindex bei gehärteten Ölen*. II. Teil. (I. vgl. Journ. of the Indian of Science 5. 47; C. 1923. II. 486.) Vff. prüfen die Zusammenhänge zwisch J-Zahlen u. Brechungsindices an Ölen verschiedener Härtingsgrade. Es wdc untersucht: *Stachelmohnöl* (*Argemone mexicana*), *englisches Senföl*, *Erucaöl* (*lu sativa*), *indisches Rübsenöl* (*Brassica campestris*), *Kernöl des anarcadium occide*, *Sojabohnenöl*, *Mohnöl*, *Öl der Mimusops hexandrea*, *Olivenöl*, *Palmöl*, *Robbentr. Lebertran*. Es werden die Kurven: Brechungsindex bei 60° — J-Zahl aufgenom Durch hohe Brechungsindices zeichnen sich Erucaöl, Senföl u. Rübsenöl infolge r Gehaltes an Glyceriden der Erucasäure, sowie das Stachelmohnöl infolge an Gehaltes an Diglyceriden u. Oxysäureglyceriden aus. Die Brechungsindices d völlig gehärteten Öle schwanken zwischen 1,4488 für Senföl u. 1,4456 für Pan Für völlig gehärtetes Olivenöl ergibt sich mit 1,4463 nahezu der gleiche Werw für reines Tristearin 1,4462. Die Kurven laufen teils gerade, teils schwach kve gegen die J-Zahl-Achse. Die meisten Kurven verlaufen annähernd parallel z einander, nur die Robbentrankurve verläuft steil u. schneidet die anderen. ei Robbentran u. Stachelmohnöl beeinflußt im Anfang der Hydrierung das Sise der J-Zahl den Brechungsindex sehr wenig. (Journ. of the Indian Inst. of Scie 7. 81—95. 1924.) K. LINDN.

E. A. Lederer, *Über die Berechnung der Austrocknung von Seifen*. (Ig Ztschr. f. angew. Ch. 37. 750; C. 1924. II. 2711.) Als Ergänzung zu den el theoret. Erwägungen über die *Austrocknung von Fl. enthaltenden Körpern* zeigV an Hand von prakt. Beispielen die Übereinstimmung von Theorie u. Praxis. Di Verss. werden ausgeführt an: *piliierter Seife*, *Kernseife*, *Kernseife aus der ih presse*, *K-Na-Cocosseife* (KOH : NaOH = 1 : 4), *Na-Cocosseife* u. *Kernseifen v verschiedenen Leimgehalten*. Die gewählten Formen waren Kugel, Zylinder u. Wrf verschiedener Dimensionen. Die Abweichungen von Theorie sind gering, joo systemat. Die Austrocknung verläuft erst schneller, sodann langsamer als be rechnet. Als Ursache ergibt sich, daß der Permanationskoeffizient *k* nicht an konstant ist, sondern innerhalb gewisser Grenzen der Temp. ϑ u. der ursprüngl Feuchtigkeit *c*₀ proportional ist. $k = c_0 \vartheta^x$. *x* ist der spezif. Permanatio koeffizient u. hängt nur von der chem. Zus. der Seife u. ihrer mechan. fo behandlung ab. Es wird *x* für Kernseifen 0,00105, für K-Na-Cocosseifen 0,11 u. für Na-Cocosseifen 0,00160. Vf. führt einige Berechnungsbeispiele an u. wile holt Folgerungen aus den Ergebnissen für die Probeentnahme von Seifen. (Sien sieder-Ztg. 51. 779—84. 1924. Hamburg.) K. LINDN.

W. Heim, *Die Regulierung des Fettsäuregehaltes bei Kernseifen*. Zeig di fertig abgesetzte Seife einen höheren als den Mindestgehalt von 60% Fettsäur hydrat, so kann sie durch Zusatz einer Schleiflsg. aus Pottasche u. Salzwasse au den richtigen Gehalt gebracht werden. Auch die Verwendung anderer, fü di

- seifenherst. üblicher Materialien dürfte nicht zu beanstanden sein. (Ztschr. Öl- u. Fettind. **44**. 633—34. 1924.) HELLER.
- J. Meißner**, *Tubenseifen*. Allgemeine prakt. Winke u. einige Darstellungschriften. (Seifensieder-Ztg. **51**. 897. 1924.) HELLER.
- M. O. Steffan**, *Das Trocknen der Riegelseifen*. Die Trocknung auf Horden in Trockenkanälen oder -zellen wird rechnerisch behandelt u. empfohlen. (Seifensieder-Ztg. **51**. 916—17; Ztschr. Dtsch. Öl- u. Fettind. **44**. 657—58. 1924.) HEL.
- A. Leitner**, *Stellen getrocknete, hochprozentige Seifenflocken, vom wirtschaftlichen Standpunkte betrachtet, einen Vorteil dar?* Vf. verneint die Frage. Die geringe Leistungsverbesserung rechtfertigt nicht die höheren Herstellungskosten. (Seifensieder-Ztg. **51**. 896—97. 1924.) HELLER.
- , *Grenzlaugen*. Seifensieder. Einzelheiten über das Ausstechen von Unterzungen. (Seifensieder-Ztg. **51**. 877. 1924.) HELLER.
- Bergell und L. Lascaray**, *Über Wasserverseifung*. Es wird experimentell gezeigt (2 Tabellen im Original), daß in Emulsionen von Fett u. Seife eine Verseifung der Fette durch W. allein möglich ist. Der Verseifungsgrad ist dem Gehalt der Emulsion an Seife einfach proportional. Vf. erklären hiernach das „Zusammenfallen“ der Seife bei Mangel an Lauge damit, daß das W. Neutralfett spaltet u. entstanden Fettsäuren mit der Seife zu fast unl. Additionsverb. zusammenfallen. Auch das Ranzigwerden von Seifen beruht auf der Spaltung von Neutralfett durch das fein verteilte W., wodurch die frei gewordenen Fettsäuren dem Seifen unmitttelbar ausgesetzt sind. (Seifensieder-Ztg. **51**. 895—96. 915—16. 1924. Berlin.) HELLER.
- L. Pomeranz**, *Über alkoholische Verseifung der Fette*. In alkoh. Medium hergestellte Seifen sind den mit Lösungsm. wie Tri u. Tetra versetzten Seifen in Eigenschaften u. Verwendungszwecken analog. (Seifensieder-Ztg. **51**. 925. 1924.) HELLER.
- V. Schaefer**, *Über Sauerstoffwaschmittel und deren Sauerstoffträger*. Vf. verteidigt die Ansicht, daß Waschmittel, welche akt. O. enthalten, bei richtiger Dosierung keine schädliche Einw. auf das Fasergut ausüben. Nicht die chem. Wrkg. bedingt das Schadhaftwerden der Faser, sondern die Zeit, mechan. Abnutzung, Fäulnis usw. Die Haltbarkeit der Sauerstoffwaschmittel hängt von der Reinheit des Sauerstoffes ab. Die Haltbarkeit des meist verwendeten Na-Perborates ab. Ferner ist es möglich, das Perborat durch Wasserglas u. dgl. zu stabilisieren. (Seifensieder-Ztg. **51**. 841—42. 1924. Benrath.) K. LINDNER.
- Kurt Lindner**, *Waschvermögen und Schaumvermögen*. Öl- u. Rußwaschverss. zeigen, daß die Schaumzahl lassen erkennen, daß gute Schaumbildner wie Saponin keine guten Waschmittel sind. Das Schaumbildungsvermögen eines der besten Ölwaschmittel, des Cykloran M, einer fl. Kombination von Oleinkaliseife mit einem höheren Alkohol im Überschuß, ist ausgesprochen gering. (Ztschr. f. ges. Fettind. **27**. 539—40. 1924.) SÜVERN.
- J. Knigge**, „*Savonade*“. Analyse eines Musters der nach D. R. P. 365160 hergestellten „Savonade“. Zus.: 25% W., 59,25% Seife, 15,75% Stoffe (vorwiegend Cyclohexanol). (Ztschr. Dtsch. Öl- u. Fettind. **44**. 617. 1924.) HELLER.
- Lifschütz**, *Beiträge zur Kenntnis des Wollfettes*. VIII. Veränderlichkeit des Wollfettes. (VII. vgl. Ztschr. f. physiol. Ch. **110**. 29; C. **1920**. III. 557.) An Hand von 12 Arten ausgeführte Unterss. führen übereinstimmend zu folgenden Schlüssen: 1. Mit dem Wachstum der Wollhaare nimmt ihr Fettgehalt mit Annäherung an die Spitze ab, mitunter bis um die Hälfte, der Gehalt an freien Fettsäuren u. an Glycerin (Verseifung des Fettes innerhalb der Fasern). Mit der Freilegung der Wollhaare geht starke Oxydation, besonders der freien Cholesterinstoffe

(bis zu den Cholesterinsäuren) einher, die sich durch hohen Gehalt an *Oxycholesterin* in den Spitzenfetten zu erkennen gibt, das in den Wurzelfetten Selbst das sehr widerstandsfähige *Isocholesterin* verschwindet dabei vollständig bis auf Spuren. — Die Veränderlichkeit läßt sich auch beim Lagern von Wachsen nachweisen. Krystallisiert man Wollwachs (vgl. DARMSTAEDTER, D. K. P. 7) aus Amylalkohol um, bis es weder die Rkk. von freiem Cholesterin noch von *Oxycholesterin* zeigt, so treten diese Rkk. nach einigem Lagern wieder auf, besonders an der Oberfläche. (Ztschr. f. physiol. Ch. **141**. 146—52. Hamburg.) SPIEGEL.

M. Naphtali, *Was ist Olein?* Nach Erörterung der von anderen Autoren gegebenen wird folgende Begriffsbest. mitgeteilt: Als Olein sind zu bezeichnen fl. Fettsäuren aus Landtierfetten u. aus festen Pflanzenfetten u. Gemische von solchen, die VZ. zwischen 190 u. 205, JZ. bis 90, F. bis 26° u. D.¹⁵ nicht über 0,920 haben. (Ztschr. Dtsch. Öl- u. Fettind. **44**. 618—620. 1924. Charlottenburg.) HELLMANN.

H. Pomeranz, *Die Bedeutung des äußeren Aussehens der Öle und Fette für die Bewertung.* Auf helle Farbe wird besonderer Wert gelegt, auch dort, wo sich die Qualität ohne Belang ist. (Der Ölmarkt **6**. 607. 1924. Sep.) HELLMANN.

Ad. Grün, *Über die quantitative Trennung der in Fetten vorkommenden gesättigten von den flüssigen Fettsäuren.* (Vgl. GRÜN u. JANKO, Ztschr. Dtsch. Öl- u. Fettind. **41**. 553; C. **1921**. IV. 1239.) Vf. macht darauf aufmerksam, daß die Bromestermethode nur zur Trennung gesätt. u. ungesätt. Fettsäuren u. nicht wasserlöslicher Bromide geeignet ist. (Ztschr. Dtsch. Öl- u. Fettind. **44**. 298; C. **1924**. 1643) kürzlich annehmen, zur Trennung der festen von den fl. Fettsäuren die Bromestermethode soll. Es lassen sich auf diese Weise feste ungesätt. Fettsäuren, wie Isoölsäure aus Gemischen, sowie fl. ungesätt. Säuren aus natürlichen Fetten isolieren. (Ztschr. f. angew. Ch. **37**. 939—40. 1924.) K. LINDNER.

Jacques Sonol, *Wert der Farbreaktionen bei der Ölanalyse.* Verfälschungen von Olivenöl durch Zusatz von Pistazien-, Baumwollsaamen-, Rüb-, Soja-, Mais-, Sonnenblumenöl, so versagen die meisten physikal. u. chem. Untersuchungsmethoden (D., Jodzahl, Refraktometerzahl, Tortellische Zahl), während Farbreaktionen noch positive Ergebnisse liefern. Das Mißtrauen gegen die Farbbrk. ist ungeeignet, da es sich um erklärbare u. scharf definierte Umsetzungen handelt. Die Verfälschung von Ölen wächst mit der Zeit. Das Amagat-Jeansche Oleorefraktometer ist eine gute Dienste zur Unterscheidung von Ölen, bei der Analyse von Gemischen sagt es; mit ABBES Refraktometer erhält man für die obengenannten Öle fast konstante Zahlen; auch das Zeißsche Butyrorefraktometer ist keine Hilfe. Der F. der Säuren aus verschiedenen Ölgemischen ist fast ident., so daß auch diese Methoden für die F. fällt. (Anales Asociación Química Argentina **12**. 80—89. 1924. Buenos Aires, Sep.) W. A. RICH.

B. M. Margosches, W. Hinner und L. Friedmann, *Über die Anwendbarkeit der Schnellmethode zur Bestimmung der Jodzahl fester Öle für feste Fette.* Vf. bestätigt die Brauchbarkeit der Schnellmethode (Ztschr. f. angew. Ch. **37**. 334; C. **1924**. II. 772) an einer Reihe fester Öle bestätigt. Das Verf. läßt sich auch bei festen Fetten anwenden, wenn man die Lsg. nur bis ungefähr 25°, so daß sie klar eingeabkühlt. Es gelingt dann, nach Zusatz von 5-n. alkoh. J-Lsg. u. 200 cem Weingeist Emulsion wie bei den erkalteten Lsgg. fester Öle zu erhalten. Die Anwendbarkeit der „hydrolytischen Jodzahlbest.“ wird an einer Reihe Analysen fester Fette gehärteter Fette gezeigt. (Ztschr. f. angew. Ch. **37**. 982—83. 1924. Brünn, Desch. Techn. Hochsch.) J. G.

M. Jakeš, *Bestimmung des Hexalins und Methylhexalins in Seifen.* endliche Zeichnung von Hexalin (Cyclohexanol) u. Methylhexalin (Hydrierungsprod. des cycl.

esches der drei Kresole), insbesondere des Systems Hexalin-Wasser. Zur Best. die mit H_2SO_4 zersetzte Seife der Wasserdampfdest. unterworfen u. durch Best. des getrockneten Destillates das Vorhandensein von Hexalin (Kp. ca. 160°) z. Methylhexalin (Kp. ca. 165—170°) ermittelt. Das Destillat wird schwach siert u. abermals dest. Nach Ausschütteln mit Xylol wird in diesem acetyliert. und wirken mit Wasserdampf flüchtige Alkohole, Ester u. halogenisierte KW., die durch alkoh. Lauge zerstört werden. (Seifensieder-Ztg. 51. 859—61. 877 79. 1924. Brünn, Böhm.-techn. Hochsch.)
HELLER.

Fermann Teichmann, Rauxel, Westf., *Herstellung von Fetten, Fettsäuren und* 1. dad. gek., daß man cellulose- oder ligninhaltige Stoffe mit mehrwertigen kolen wie *Glycerin* u. *Glykol* u. dessen Derivv. oder Derivv. derselben auf p. von 240—280° bei gewöhnlichem, erhöhtem oder vermindertem Druck erz. u. gegebenenfalls eine Verseifung vornimmt. — 2. dad. gek., daß man die Einw. hochsiedender Teeröle auf Kohle oder Stoffe organ. Struktur, wie l erhaltenen Aufschließungsprodd., sowie die von $CH_3 \cdot COOH$ befreiten Ein- sungsprodd. der hochsiedenden Teeröle auf Stroh u. dgl. dem Verf. nach s. uch 1 unterwirft. — Zur Trennung der auf diese Weise gewonnenen Fette em unveränderten Ausgangsmaterial oder von den unverseifbaren Umwand- sprodd. der Cellulose u. des Lignins behandelt man das Reaktionsgemisch mit ieten Fettlösungsmitteln, wie Aceton u. dgl. (D. R. P. 407181 Kl. 12 o 27/9. 1921, ausg. 9/12. 1924.)
OELKER.

Robert Tern, Berlin, *Desodorieren, Bleichen und Klären von Tranen*, dad. daß man Rohtran im Vacuum einige Std. auf 280—300° erwärmt u. nach Abkühlen im Vacuum auf etwa 130° mit 15—20% Bleicherde behandelt. — leicherde reißt nicht nur die Farbstoffe u. Kolloide an sich, die bei den bisi- n Verff. durch die Vorbleichung ausgeschieden werden, sondern sie absorbiert zeitig diejenigen, welche durch das Erhitzen entstanden u. Träger des brenz- u Geruchs sind. (D. R. P. 406068 Kl. 23a vom 20/11. 1920, ausg. 14/11. 1924.)
OELKER.

Pierre Louis Guilleminot, Chantilly, Frankreich, *Sulfonierung tierischer Fette*. Ref. nach F. P. 553339; C. 1923. IV. 957. Nachzutragen ist folgendes: Man z. B. unter gutem Rühren in *Fischöl* Fe-Feilspäne u. H_2SO_4 65° Bé. ein. Beendigung der Sulfonierung wird die Reaktionsfl. mit dem gleichen Vol. W. st, von dem Fe-Schlamm abdekantiert u. die *Sulfofettsäure* mit Alkali- yd neutralisiert. Die Prodd. finden als Ersatz für ricinussulfoölsäures Alkali d *Gerberei*, *Färberei* u. bei der Herst. von *Seife* techn. Verwendung. (E. P. 3 vom 25/6. 1923, ausg. 22/8. 1923. F. Prior. 26/6. 1922.) SCHOTTLÄNDER.

Franz Brillmayer, Platt (N.-Öst.), *Schwimmseife*. Eine durch Behandlung von Stoffen mit konz. Alkalien oder Säuren gebildete Gallerte wird einem in er Weise hergestellten Seifenleim zugesetzt, worauf durch Aussalzen ein ener Seifenkern gewonnen wird, der nach dem Erhärten u. Trocknen auf V. schwimmt. (Oe. P. 97411 vom 21/7. 1923, ausg. 10/7. 1924.) OELKER.

Walther Ottmann, Hannover, *Herstellung einer preßfähigen, nicht ausblühenden umseife*, gek. dad., daß man den gut ausgeschliffenen, frischen Seifenkern unter Zusatz von etwas W. schm. u. zum Kochen oder doch so hoch erhitzt, eine Dampfblasen die M. gleichmäßig durchsetzen, worauf man die M. in er Weise erkalten läßt. — Eine Einführung von Luft oder spez. leichter in die Seife, wie sie früher bei der Herst. von Schwimmseifen erfolgte, ist erforderlich. (D. R. P. 407257 Kl. 23e vom 22/3. 1924, ausg. 10/12. 1924.)
OELKER.

Theodor Folly, Wien, *Reinigungsmittel*. Einem Seifenkörper, der in bekannter Weise aus Knochenabfällen durch Kochen mit Alkalien u. nachfolgende Filtration hergestellt wird, werden geringe Mengen Ricinus- u. Terpentinöl zugesetzt, welches nochmals aufgeköcht u. der erkalteten M. etwas NH_3 u. evtl. Bzn. zugesetzt wird. (Oe. P. 97778 vom 28/5. 1923, ausg. 10/9. 1924.) OELK.

Eugen Burian, Hlohovec, Tschechoslowakei, *Vorrichtung zur Herstellung von Kerzen*. (D. R. P. 399245 Kl. 23f vom 9/5. 1922, ausg. 16/10. 1924.) OELK.

Naamlooze Vennootschap Koninklijke Stearine Kaarsenfabriek Gouda, Gouda, Holland, *Reinigungsmittel*. Man löst Seife in einem Fettlösungsmittel, z. B. CCl_4 , C_2HCl_3 , hoch sd. KW-stoffe, setzt Verbb., die OH- oder CO-Gruppen enthalten, Kieselgur, Entfärbungskohle usw. zu; das zu reinigende Gut wird mit dieser Mischung getränkt, dann wird W. zugegeben. (E. P. 221182 vom 24/4. 1924, u. zugef. 22/10. 1924. Prior. 30/8. 1923.) FRAI.

XVIII. Faser- und Spinnstoffe; Papier; Cellulose; Kunststoffe.

Reinh. Schulze, *Erste Erfahrungen und Versuche an einer Dr. Ruths-Spinnanlage in einer deutschen Tuchfabrik*. (Schluß von Melliands Textilber. 5. 749—751. C. 1924. II. 2712.) Angaben über den Wirkungsgrad der Kesselanlage nach Versuche ohne u. mit Speicher u. über den weiteren Ausbau des Betriebes zum Heizkraftwerk. (Melliands Textilber. 5. 749—751. 1924. Aachen.) SÜVE.

Karl Micksch, *Metallisierte Gewebe*. Nach Besprechung des Metallisierens mittels Klebstoffs u. auf elektr. Wege wird das Spritzverf. behandelt. (Dtsch. Faserst. u. Spinnpfl. 6. 127—28. 1924.) SÜVE.

Reinhold Pohl, *Fortschritte im Laugier- und Bäumverfahren für Baumwollstückerware*. Beim Behandeln von Stücken mit Lauge, wie sie z. B. für Blauware usw. üblich ist, wird die Verwendung von Kochkesseln als unzweckmäßig, die des Strangjiggers als empfehlenswert bezeichnet. Beim Strangjigger kann man mit 2 Durchgängen eine Wrkg. erzielen, die einer stundenlangen Abkochung mit erhöhtem Dampfdruck gleichkommt. (Melliands Textilber. 5. 807. 1924.) SÜVE.

Badermann, *Die Verwertung von Flachs- und Hanfabfällen*. Angaben über die Verarbeitung in ihre Einzelzellen aufgelöster Hanfabfälle mit Baumwolle u. Flachs zur Wergaufarbeitung. (Dtsch. Faserst. u. Spinnpfl. 6. 126—27. 1924.) SÜVE.

Antonio Sassi, *Analyse einiger argentinischer Wollen. Ihre Charaktereigenschaften und ihre Zusammensetzung. Beitrag zur Aufstellung einer Wollkarte in der argentinischen Republik*. Angaben über die Beschaffenheit von 12 argentin. Wollsorten, die auf der Feinheit der Fasern sich auf 7—8 Typen reduzieren lassen. Die Hygroskopizität steht in enger Beziehung zum Faserdurchmesser u. zum Fettgehalt, die Feinheit der Faser in umgekehrtem Verhältnis zur Ausbeute an wahrer Wolle, in direktem zum Schweiß. Mit der Feinheit steigt auch die Menge der in W. l. Salze. Seiden, die in Argentinien akklimatisierten Rassen als auch die von der einheim. Rasse stammenden Unterrassen befinden sich auf dem Wege schneller Verfeinerung. (Anales de la Asociación química Argentina 12. 167—74. 1924. Oficina Química Nacional de la Capital. Sep.) SPIEGEL.

Friedrich von Höble, *Bayerische Papiergeschichte*. (Forts. zu Papierfabr. 2. 427; C. 1924. II. 2620.) (Papierfabr. 22. Verein der Zellstoff- u. Papier-Chemiker u. Ingenieure 453—56. 496—99. 534—38. 1924.) SÜVE.

G., *Bleichverfahren System Patent Wolf*. 2 Einrichtungen von Typen nachgefordert. Patent sind dargestellt. Es ermöglicht, Zellstoff bei einer Stoffdichte von 18° m sehr gutem Ergebnis zu bleichen. (Wchbl. f. Papierfabr. 55. 2465. 1924.) SÜVE.

- , *Bleichverfahren System Patent Wolf*. (Vgl. vorst. Ref.) Abbildungen der ersten Einrichtungen. (Wehbl. f. Papierfabr. **55**. 3161—62. 1924.) SÜVERN.
- J. Strecker**, *Die Behandlung des Papiers nach der Herstellung*. (Schluß von 70. f. Papierfabr. **55**. 2526; C. **1924**. II. 2713.) Angaben über Sortieren u. Transport. (Wehbl. f. Papierfabr. **55**. 3087—90. 1924. Darmstadt.) SÜVERN.
- Fritz Hoyer**, *Papierhalbstoff aus Abfallholz*. Die Verff. von DENSO (D. R. P. 3674), von BIFFAR, von RINDERKNECHT (D. R. P. 389265; C. **1924**. II. 1143) u. d. d. ENGE werden besprochen. Für die Quetschverff. ist eine gewisse chem. Vorbedingung Grundbedingung, sie muß billig sein u. darf den Stoff nicht verfärben. (Ver. Dtsch. Ing. **68**. 1319—21. 1924. Cöthen i Anh.) SÜVERN.
- E. Belani**, *Modernes Banknotenpapier*. Ein modernes Banknotenpapier soll sehr knitterfest sein (über 1200 Doppelfalzungen), meliert mit Punkten oder Punkten in verschiedenen Farben, wobei als Melierung ausländ., seltene Faserstoffe Verwendung finden sollen, es soll innen metallisiert, mit deutlichem Porträtwasserzeichen seitlich des Notenbildes versehen, von mittelstarker Glätte, absol. lichtecht u. druckfähig sein u. sein Grammgewicht soll 75/qm betragen. (Wehbl. f. Papierfabr. **55**. 3169—72. 1924. Villach.) SÜVERN.
- J. G. Matthews**, *Bemerkungen über die Behandlung von durch Feuer beschädigten Pergamenten*. Urkunden — Pergamente — waren infolge starker Hitze zusammengeklebt u. bauchig geworden wie Biskuit u. sahen verbrannt u. geröstet aus. Durch Behandlung mit w. W. oder gelinder Einw. von Dampf unter Zuhilfenahme einer verd. Glycerinlsg. gelang es, die Urkunden wieder von einander zu trennen u. die Schrift wieder herzustellen. (Analyst. **49**. 516—17. 1924.) RÜHLE.
- E. Belani**, *Die Latex-Hochdruckpappe*. Einzelheiten über die Herst. der Pappe, hauptsächlich als Dichtungsmaterial dient. (Papierfabr. **22**. Verein der Zellstoff-Papier-Chemiker u. Ingenieure 568—70. 1924. Villach.) SÜVERN.
- Villi Schacht**, *Über den De-Vainsprozeß*. (Papierfabr. **22**. Verein der Zellstoff-Papier-Chemiker u. Ingenieure 565—67. 1924. — C. **1925**. I. 182.) SÜVERN.
- Ludolf Sieber**, *Über das wärmetechnische Verhalten des Sulfitzellstoff-Kochens*. Angaben über D. von Zellstoffholz, Gewicht von 1 cbm Holz bei verschiedenem Feuchtigkeitsgehalt, spezif. Wärme des absol. trockenen u. des feuchten Zellstoffholzes, spezif. Wärme der Kochlauge, über die Kennziffern des Kocherfurnmaterials, die Höhe der aus dem Holz in der Praxis erhaltenen Zellstoffmengen, über die Füllungs- u. über die in 1 cbm Kochervolumen enthaltenen Zellstoffmengen. Grundlagen für die Berechnung des theoret. Wärmeverbrauchs entwickelt. (Wehbl. f. Papierfabr. **55**. 2798—2804. 3015—17. 3229—32. 1924. Kramfors.) SÜVERN.
- Schwarz**, *Die Herstellung von Linoleum, Kunstleder, Wachstuch u. dgl.* Zusammenstellung von Verbesserungsvorschlägen an der Hand der Patentliteratur. (Papierfabr. **14**. 161—64. 1924.) JUNG.
- Alph B. Roe**, *Methode zur Prüfung der von ungebleichtem Sulfitzellstoff absorbierten Chlormengen*. Nach Besprechung der Methoden zur Best. der Cl₂, Br₂ u. I₂-Zahl wird eine Methode beschrieben, den Stoff in durchfeuchtetem Zustande mit I₂-Gas zu behandeln u. die absorbierte Gasmenge volumetr. zu messen. Es ist eine brauchbare Schnellmethode. (Papierfabr. **22**. Verein der Zellstoff-Papier-Chemiker u. Ingenieure. 589—93. 1924. Nach Paper Trade Journal **1924**. 5.) SÜVERN.
- Larguerite D. Easton**, New York, *Faserstoffe*. Zur Behandlung von faserigen Stoffen (Wolle, Hanf, Flachs usw.) verwendet man ein Gemisch einer Gallerte von Moos, Wasser, Paraffin u. anderen Stoffen. (Can. P. **238650** vom 28/3. 1924.) KAUSCH.

Textilpatentgesellschaft, Liestal, Schweiz, übert. von; **Farbwerke v. Meister, Lucius & Brüning**, Höchst a. M., *Verfahren um pflanzlichen Faser ein woll- oder leinenähnliches Aussehen zu geben*. Man behandelt die pflanzliche Faser mit HNO_3 oder einer anderen Säure u. dann mit gasförmigem oder fl. Py oder seinen Homologen; man kann auch eine Mischung von Pyridin mit NH_3 anwenden. (E. P. 221516 vom 6/9. 1924, Prior. 8/9. 1923. Auszug veröff. 1924.) FRA.

Carl Bochter, Günzburg, *Bleichen von Leinen, Hanf und Halbleinen* unter Behandlung mit Sulfitlsgg., dad. gek., daß die Faser mit neutralen, sauren oder alkal. Sulfiten nur bis zur völligen Durchtränkung in Berührung bleibt, hierauf Fl. abgepreßt u. die Faser vorteilhaft bei Temp. unter 35° im zusammengepreßten Zustande unter Vermeidung einer Oxydation sich selbst überlassen wird, was eine Einw. von Bleichbädern stattfindet. Den Sulfiten können Hydrosulfiten zugesetzt werden. — Das Bleichen kann mit H_2O_2 oder Persalzen erfolgen. (D. R. P. 405245 Kl. 8i vom 30/4. 1922, ausg. 28/10. 1924.) FRA.

R. W. R. Mac Kenzie, E. H. Robinson, D. Lumsden, Huntingtowerfield u. **M. Fort**, Cromwellpark Cottage, Almondbank, Perthshire, *Reinigen und Bleichen von pflanzlicher Faser*. Man entfernt zuerst die fett-, öl- u. wachsartigen Stoffe durch Kochen mit organ. Lösungsmitteln, behandelt dann bei gewöhnlicher Temp. oder bei Temp., die unterhalb des Kp. liegen, mit Kalk oder Ätzalkalien u. beendigt in üblicher Weise. (E. P. 221296 vom 16/8. 1923, ausg. 2/10. 1924.) FRA.

E. C. Duhamel und Compagnie Générale des Industries Textiles, Roubaix, Nord-Frankreich, *Waschen und Bleichen der Textilfaser*. Wolle, Seide usw. wird mit Pottaschelsg. oder Seife behandelt, während der Behandlung wird das Guggululeum geschleudert u. der Einw. des elektrischen Stromes ausgesetzt. (E. P. 221521 vom 8/9. 1924. Prior. 7/9. 1923, Auszug veröff. 5/11. 1924.) FRA.

Ludwig Schwabe, Hamburg, *Verfahren und Vorrichtung zur fortlaufenden Herstellung von ein- oder beidseitig mit isolierender Deckmasse, wie Asphalt, Teer, Harz, Gummi o. dgl. belegten Dachpappen, Isoliergeweben u. dgl.*, dad. gek., daß die h. dickfl. Isoliermasse in regelbarer Stärke auf ein endloses Metallband aufgetragen u. der von einer Rolle ab- u. mit dem Metallbande fortlaufende Papier- oder Gewebestreifen unter Druck auf die M. geklebt u. mit der angeklebten M. nach Abkühlung durch ein Abtrennmesser von dem endlosen Metallband abgetrennt wird; 2. Vorr. zur Ausführung des Verf. nach Anspr. 1 gek. durch ein über Trommeln geführtes von mehreren Tragwalzen nacheinander unterstütztes endloses Metallband mit darüber angeordnetem Abstreicher, Andrückwalzen u. Abtrennmesser; 2. dad. gek., daß an Stelle der ersten Tragwalze eine feste Platte angeordnet ist, über die das endlose Metallband gleitet. — Man erzielt eine feste Verbindung der Isoliermasse mit der Unterlage. (D. R. P. 406529 I. 8 vom 14/2. 1923, ausg. 25/11. 1924.) FRA.

R. Russell, Beechwood, Heaton Park, Manchester und **H. Broomfield**, az. Groon, Stockport, *Imprägnieren von Asbest*. Man trinkt Asbest mit Kautschukmilch, walzt, koaguliert den Kautschuk, walzt abermals u. formt unter Druck die Kautschukmilch kann man Leim, Casein u. Füllstoffe, wie MgO , MgCO_3 , B_2O_3 , Kieselgur, Ton, gemahlenen Asbest, Kork, Faserstoffe usw. zusetzen. (E. P. 22711 vom 24/5. 1923, ausg. 18/9. 1924.) FRA.

J. Spijker, Amsterdam, *Behandeln von Faser mit Kautschuk*. Die getrocknete Faser wird mit fein zerstäubter Kautschukmilch oder Kautschuklsg., der Schwebstoffe, Farb- u. Füllstoffe zugesetzt sein können, behandelt. Das erhaltene Prod. kann zu Reifen usw. verarbeitet werden. (E. P. 221645 vom 21/9. 1923, ausg. 1/10. 1924.) FRA.

A. O. Tate, New York, V. St. A., *Wasserdichte Gewebe*. Unl. Metallverb. des Zn, Sn werden in dem Gewebe mit Hilfe des elektr. Stromes niedergeschlagen, geknetet u. dann durch Behandeln mit h. Walzen appretiert. (E. P. 221980 vom 9. 1923, ausg. 16/10. 1924.)

FRANZ.

A. G. Harrington, London, *Wasserdichtmachen*. Bestickte Gewebe werden in einer Lsg. von Paraffin getränkt. (E. P. 222292 vom 3/4. 1923, ausg. 23/10. 1924.)

FRANZ.

J. A. Lang-Verte & Cie., Seine-Inférieure, Frankreich, *Undurchlässige Gewebe*. Man verwendet Gewebe, bei denen der Schuß- oder Kettfaden oder beide an Stelle von Baumwolle aus Leinen, Ramie, Jute usw. hergestellt sind; die Gewebe werden mit einer Kautschukschicht, die k. oder h. vulkanisiert werden kann, miteinander verbunden. (F. P. 574992 vom 10/12. 1923, ausg. 22/7. 1924.)

FRANZ.

Leopold Cassella & Co. G. m. b. H. in Frankfurt a. M. (Erfinder: **Ferdinand Fechenheim** bei Frankfurt a. M.), *Herstellung von Effektfäden aus tierischen Fasern*. (D. R. P. 395773, Kl. 8m vom 16/9. 1922, ausg. 22/5. 1924. — C. 1924. II. 2437.)

FRANZ.

Ignaz Kreidl, Wien, *Beschwerden von Seide*. (D. R. P. 405119 Kl. 8m vom 16. 1923, ausg. 27/10. 1924. Oe. Prior. vom 25/10. 1923. — C. 1924. II. 2437.) **Fr. Edmond Chicoineau**, Seine, Frankreich, *Erschweren von Wolle und Seide mit Zinksalzen*. Man bringt die Faser in eine Zinksalzlsg., die schwach angesäuert u. mit Alkalien usw. versetzt sein kann; nach dem Abpressen u. Spülen in einem oder O-haltigem W. bringt man die Faser in ein Bad von Natriumacetat u. nach nochmaligen Spülen in ein Bad von Wasserglas u. spült abermals das Verf. kann so oft wiederholt werden, bis die gewünschte Erschwerung erreicht ist. (F. P. 575084 vom 28/12. 1923, ausg. 23/7. 1924.)

FRANZ.

Jakob K. von Gal, Danburg, Connecticut, *Fluoreszierende Färbungen auf Wolle oder Pelz*. Filz wird zuerst mit einem Farbstoff durchgefärbt u. dann mit einem anderen Farbstoff, am besten als Druckfarbe, nur oberflächlich gefärbt. (A. P. 1509920 vom 2/11. 1922, ausg. 30/9. 1924.)

FRANZ.

John Manning van Heusen, Botton, Massachusetts übert. von: **Raymond Leon**, New York, und **Cleo H. Kidwell**, New Brighton, New York, *Formbare Gewebe aus Baumwolle*. Gewebe oder gewirkte Baumwollgewebe werden mit H₂SO₄ (10–80%) 1 Min. bei gewöhnlicher Temp. behandelt, nach dem Waschen wird das Gewebe noch feucht in eine Form, die das Muster enthält, gebracht, wo es unter Druck in der Wärme unter gleichzeitigem Trocknen mit dem Muster verformt wird; das Gewebe kann nach der Behandlung mit H₂SO₄ u. dem Waschen in Acetat u. hierauf mit Seife getränkt werden; dann wird in der Form getrocknet. (A. P. 1509920 vom 2/11. 1922, ausg. 30/9. 1924.)

FRANZ.

John Minton, Greenwich, V. St. A., *Trockenvorrichtung für Papier- oder Stoffbahnen* mit in einer Vakuumkammer angeordneten Trockenzylindern, so angeordnet, daß die Trockenkammer mit Flüssigkeitsabschlüssen für den Ein- u. Ausstrom versehen ist, deren Fl. die Stoffbahn nicht angreift u. nicht von ihr aufgenommen wird, z. B. Quecksilber. — Es wird hierdurch der Vorteil erreicht, daß nur die erforderliche Heizung des Flüssigkeitsabschlusses in Wegfall kommen kann. (D. R. P. 404666 Kl. 55d vom 30/3. 1920, ausg. 20/10. 1924.)

OELKER.

Reiner Fabrik präparierter Papiere Renker & Cie., Niederau, Kr. Düren, *Herstellung eines positiven Eisenblaupapieres (blaue Linien auf weißem Grunde)*, so, daß man ein mit tier. oder pflanzlichen Kolloiden, mit Ausnahme von Gummi, oder einer Mischung beider vorgestrichenes Rohpapier in üblicher Weise mit gerbend wirkenden Ferrisalzen, wie Ferrioxalat, FeCl₃ u. dgl., gegebenenfalls unter Zusatz anderer lichtempfindlicher Ferrisalze oder Ferridoppel-

salze, behandelt u. nach geschehener Belichtung in ein Bad von rotem oder gelbem Blutlaugensalz bringt u. dann mit W. abspült. — Das lichtempfindlich gewordene Papier ist unbegrenzt haltbar. (D. R. P. 403902 Kl. 57b vom 10/2. 1924, 9/10. 1924.) KÜHL

Preßburger Dachpappen-, Holzcement-, Asphalt- und Isolierplattenfabrik K. C. Menzel und Paul Meyersberg, Bratislava, *Herstellung einer teerfreien, teerfreien Dachpappe*, dad. gek., daß die Pappenimprägnier- oder Aufzugsmasse mit einer solchen Mineralsubstanz bedeckt u. oberflächlich gefüllt wird, welche mit einem daraufgebrachten, wasserlöslichen Aufstrich eine feuerisolierte u. guthaftende Verb. bildet; 2. daß die Dachpappe nach dem Überziehen mit Imprägnieren mit Oxyden oder Carbonaten des Ca oder Mg bestreut wird, die auf mechan. Wege mit der Unterlage in feste Verb. bringt, worauf man mit Lsg. von Wasserglas oder $MgCl_2$ bestreicht. (D. R. P. 405299 Kl. 81 vom 1/12. 1922, ausg. 30/10. 1924.) FRE

Albert Koch, Akt.-Ges., Rottenburg a. N. (Erfinder: **Roland Runkel**, Rottenburg a. N.), *Herstellung von Zellstoff aus Fasertorf*, insbesondere für die Fein- und Druckpapierfabrikation nach Pat. 388344, dad. gek., daß unter Beibehaltung des Wechsellagers in der Phase der Cl-Behandlung Cl in gasförmigem Zustand unterbrochenem Strom in die wss. Aufschlammung des Fasermaterials eingeblasen wird. — Der Aufschließungs- u. Bleichvorgang wird beschleunigt. (D. R. P. 404614 Kl. 55b vom 2/2. 1923, ausg. 3/11. 1924. Zus. zu D. R. P. 313404 Kl. 55b vom 1/11. 1922, 1/11. 1924.) OELER

Zellstofffabrik Waldhof und Franz Siegmund, Mannheim-Waldhof, **Adolf Schneider**, Kelheim a. Donau, *Zellstoffkochverfahren*, bei welchem ein Aufschlußmittel dienende Sulfitlauge außerhalb des Kochers in einem geschlossenen Behälter erhitzt u. dann erst dem mit Holz beschickten Kocher zugeführt wird, dad. gek., daß die Vorerhitzung der Lauge mit Hilfe von überschüssigem Dampf oder Abdampf, gegebenenfalls zusammen mit Frischdampf, in einem als Wärmespeicher ausgebildeten Vorkocher erfolgt, aus dessen Gasraum nach Bedarf Dampf entnommen u. beliebig anderen Kochern zugeführt wird. — Auf diese Weise wird überschüssige oder fehlende Wärme nicht erst auf dem Umweg über einen besonderen Wasserwärmespeicher, sondern unmittelbar über die Fabrikationsflüssigkeit — d. i. die Lauge — nutzbar gemacht, u. zwar in jedem Augenblick, wo der Wärmebedarf eintritt. (D. R. P. 406445 Kl. 55b vom 1/10. 1921, 21/11. 1924.) OELER

Metallhank & Metallurgische Gesellschaft, Akt.-Ges., Frankfurt a. M., *Laugenturm*, insbesondere zur Herstellung von Sulfitlauge, dad. gek., daß der Kalkstein aufnehmende Turm von einem gegen ihn durch Formsteine abgesetzten Mantel aus säurefestem Material umgeben ist, wobei der Turm u. der Mantel zwischen Turm u. Mantel von oben durch Verteiler gesondert berieselbar u. durch Rohrleitungen von unten u. oben oder abwechselbar mit Gas beschickbar ist. Der Turm ist dauerhafter als die bisher für den gleichen Zweck verwendeten Holz- u. Steintürme u. der Kalkgehalt der Lauge kann bei ihm nach Bedarf eingestellt werden. (D. R. P. 406121 Kl. 55b vom 10/11. 1923, 14/11. 1924.) OELER

Paul Knichalik, Magdeburg, *Rückgewinnung des in Sulfitablaugen d. Zellstoffgewinnung enthaltenen freien Schwefeldioxyds* mit Hilfe von Alkalien oder Wasser, dad. gek., daß die aus den Abbläugen entweichenden, das SO_2 enthaltenden Gase dem Kalkwasser- oder Frischwasserstrom in einem Kolonnenturm entgegengeführt werden. — Die SO_2 wird von dem Kalk- oder Frischwasser vollständig niedergeschlagen. (D. R. P. 406172 Kl. 55b vom 14/9. 1923, 20/11. 1924.) OELER

Eastman Kodak Company, übert. von: **Robert W. Cook**, Rochester, New York, V. St. A., *Entfernen von Wasser aus der Nitrocellulosefaser*. Die Nitrocellulosefaser wird nach dem Entfernen der Säure durch Waschen mit Wasser u. dem Abschleudern des W. mit einer Fl. behandelt, die Nitrocellulose löst, in der W. mischbar ist u. soviel W. enthält, daß sie Nitrocellulose nicht löst, aber W. aufnehmen kann, wie Alkohole, Aceton, man verwendet z. B. CH_3OH , in dem 3—25% W. zugesetzt sind. (**A. P. 1510739** vom 26/6. 1923, ausg. 7/10.

3. Siempelkamp & Co., Crefeld, Herstellung mehrerer Blöcke aus Celluloid
Die Blöcke werden aus einer ähnlichen Masse in einer einzigen Form einer Blockpresse, dad. gek., daß die Form eingefüllte u. mit einer Platte bedeckte M. zwischen einem Stempel u. einem Druckstück zu einem prismat. Block geformt u. in eine tiefere Stellung gebracht wird, alsdann nach vorherigem Anheben des Druckstückes in der gleichen Form ein zweiter Block geformt wird usf., bis die Form gefüllt ist, worauf die endgültige Pressung aller Blöcke in der bekannten Weise bewirkt wird. — Durch die Pressung der M. zu einem prismat. Block wird vermieden, daß bei ungleicher Einfüllung der M. die Zwischenplatte sich schief stellt. (D. R. P. 406562 vom 10/4. 1923, ausg. 27/11. 1924.)

Eastman Kodak Company, übert. von: **Richard Baybutt**, Rochester, New York, V. St. A., *Reinigen von Celluloseäthern*. Man wäscht die Celluloseäther mit iner wss. Lsg. von SO_2 , hierdurch werden die letzten Spuren von Alkali entfernt und läßt sich SO_2 wegen seiner Flüchtigkeit schneller u. vollständiger entfernen als H_2SO_4 . (**A. P. 1510735** vom 31/10. 1922, ausg. 7/10. 1924.). FRANZ.

Deutsche Gasglühlicht-Auer-Gesellschaft m. b. H., Berlin, Herrichtung von Kunstseide für textilindustrielle Zwecke, dad. gek., daß Schwermetalloxydhydrate, welche des Zinns, des Zirkons, der Salze der Edelerden usw. durch in organ. Lösungsm. gel. NH_3 in der Faser echt fixiert werden; vor dem Erschweren kann die Kunstseide gefärbt werden. — Bei der Verwendung organ. Lösungsm. werden die Schwerungssalze nicht herausgelöst, der Glanz der Kunstseide leidet nicht. (P. 403990 Kl. 8m vom 9/1. 1920, ausg. 9/10. 1924.) FRANZ.

Adipinsäure-cyclohexylester, aus den Komponenten durch Einleiten von trockenem C. 2-std. Erhitzen, F. 35–36°, Kp., 208–212°, Adipinsäure-o methylecyclohexylester, Kp., 225–226°. Die Ester geben auch bei großen Zusätzen feste Lsgg., sich auszuscheiden; es genügen schon kleine Mengen um die Geschmeidigkeit von Filmen zu erhöhen. (D. R. P. 406013 Kl. 39b vom 14/5. 1921, ausg. 1924.) FRANZ.

David Charles Polden, Surbiton, England, *Caseinmassen*. Fein pulverisiertes wird in alkal., NaOH, KOH, Na_2CO_3 , NaHCO_3 , NH_3 , $(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3$, K_2CO_3 , u., Eg., HCl, oder neutralen Mitteln, NH_4F , NaF, gelöst; unter lebhaftem Rühren auf 26—42° erwärmt; nach dem Neutralisieren des Lösungsm. wird das gefällte Casein erst unter Druck zwischen feuchtem Tuch 6 Stdn. geformt, dann zerbröckelt es in der gewünschten Form 18 Stdn. einem hohen Druck aus, die letzten müssen eine glatte, polierte Oberfläche besitzen, die geformten Gegenstände werden dann 2—10 Tage in einer Lsg. aus 45% W., 45% CH_2O 40% ig. u. 10% Glycerin gehärtet u. dann bei 18° getrocknet. (A. P. 1511003 vom 25/1. 1924. ausg. 7/10. 1924.) FRANZ.

Haller und S. Rosenzweig, Wien, *Kunsthornmassen*. Man setzt zu einer Lsg. von Leim oder Gelatine die Lsg. eines Schwermetall- oder Al-Salzes u. eines Alkalicarbonats, die erhaltene M. wird abgepreßt, gewaschen, getrocknet, gemahlen u. getrocknet, dann wird in der Wärme unter Druck geformt u.

mit CH₂O gehärtet. (E. P. 220957 vom 22/8. 1924; Auszug veröff. 22/10. 1924. Prior. 24/8. 1923.)

Fritz Pollak, Wien, *Steifungsmittel für Faserstoffe, Papier usw., bestehend aus einer wss., erforderlichenfalls mit Borax versetzten Lsg. wasserlöslicher Kohlenwasserstoffsäuren, die aus Harnstoff bzw. Thioharnstoff oder Harnstoffabkömmlinge durch Oxydation mit CH₂O. — Das Prod. dient als Ersatz für Schellack zum Steifen von Hüten, Schirmen, Papier, zum Überziehen von Photographien mit einer wasserunlässigen matten Lackschicht.* (D. R. P. 405516 Kl. 8k vom 7/11. 1919, ausg. 1/11. 1924.)

XIX. Brennstoffe; Teerdestillation; Beleuchtung; Heizung

Wüster, *Neuere Erfahrungen mit dem Rheo-Kohlenwaschverfahren, der Koks- und Schlammveredlung und der Schwimmaufbereitung für Kohle.* Vf. bespricht an Hand von Betriebsbeispielen den Wirkungsgrad von Schwemmsumpf-, Feinkohle- und Flotations-Verf. u. Rheo-Kohlenwäsche. (Arch. f. Wärmewirtsch. 5. 249—50. 1924. Essen.)

Otten und Maercks, *Neuere Erfahrungen mit dem Rheo-Kohlenwaschverfahren, der Koks- und Schlammveredlung und der Schwimmaufbereitung für Kohle.* Entgegenüber der gleichnamigen Abhandlung von WÜSTER (vgl. vorst. Ref.). (Arch. f. Wärmewirtsch. 5. 250. 1924.)

August Roßkothen, *Die Salzburger Kammerofenanlage.* Beschreibung der Anlage, ihres Betriebes u. ihrer wirtschaftlichen Ergebnisse. (Gas- u. Wasservers. 67. 705—8. 1924. Salzburg.)

Pradel, *Die Gewinnung von Wertstoffen aus dem Brennstoff im Kraftbetrieb.* Eine Zusammenstellung der in Frage kommenden Verf. (Verschmelzung des Brennstoffes vor der Verbrennung) nach der Patentliteratur. (Braunkohle 23. 641—4. 1921—75. 1921. Berlin.)

J. D. Davis und Palmer B. Place, *Thermische Reaktionen der Kohle während der Verkokung.* Die bei der Verkokung auftretenden exothermen Vorgänge haben vielfach verschiedene Weise festzulegen versucht. In einem elektr. Ofen wurde eine Kohlenprobe u. in einem nachfolgenden Vers. Koks der gleichen Kohle unter gleichen Bedingungen erhitzt. Die Temp. der Proben wurden fortgesetzt verfolgt. Vergleicht man nun die Temp., welche Kohle u. Koks in gleichen Zeiträumen erreichen, so ergibt sich, daß die Temp. der Kohle, abgesehen von einem kurzen Stück ganz im Anfang, immer mehr hinter den entsprechenden Temp. der Koksprobe zurückbleiben. Diese Differenz erreicht schließlich ein Maximum, welches für die einzelnen Kohlen verschiedene aber bestimmte Größe hat u. bei den meisten untersuchten Proben bei ca. 150° lag. Von da ab nähern sich die entsprechenden Temp. von Kohle u. Koks, bzw. erreichen einzelne Kohlenproben zum gleichen Zeitpunkt eine höhere Temp. als die entsprechenden Koksproben. Die Geschwindigkeit dieser Annäherung betrachten Vf. als Kriterium für die einsetzenden exothermen Vorgänge. — Um diese Werte auch quantitativ festlegen zu können, haben Vf. eine calorimetr. Methode angewandt. Hierbei wird die Kohlenprobe in einen verschlossenen, elektr. heizbaren Gefäß, welches sich in einem Calorimeter befindet, verkocht; die durch Heizung u. therm. Rkk. erzielte Gesamtwärmemenge wird gemessen. Diese u. die bei Erhitzung des leeren Gefäßes unter genau gleichen Bedingungen gemessenen Wärmemengen ergeben als Differenz die durch die exothermen Prozesse entw. Wärmemenge. Klassifiziert man nun die Kohlen nach den Resultaten dieser u. der erstgenannten Methode, so sind die sich ergebenden Reihenfolgen verschieden. Dies hat seinen Grund darin, daß im ersten Fall z. B. die Verdampfungswärme des hygroskop. u. des Zers.-Wassers in Erscheinung tritt. Eine entsprechende Korrektur dieser Werte halten Vf. für abwegig, da üblicherweise die Verteilung des O₂ bei der Verkokung nicht genügend Klarheit herrscht. V.

kommen zu dem Schluß, daß die durch exothermen Prozeß bei der Verkokung erw. Wärmemengen relativ gering sind u. halten die calorimetr. Methode für die Bt. dieser Wärmemengen für die geeignetste. (Fuel 3. 434—39. 1924. Pittsburgh, Beau of Mines.)

BIELENBERG.

Odell, *Die Verschwelung von Lignit in Nordamerika*. Vf. bespricht die Ausnutzung großer Lignitvorkommen in Montana, Nord- u. Süd-Dakota u. Texas. Auf Grund der örtlichen Verhältnisse kommt Versand kaum in Frage. Nach vorheriger Erkennung ist das Material für Kesselfeuerung unter besonderen Bedingungen verw. dbar. Für Hausbrand ist das Material auch in brikettiertem Zustand weniger geeignet. Bessere Ausnutzung gewährleisteten Briketts aus Lignitkoks. Voraussetzung ist eine Verschwelungseinrichtung, die bei billigstem Betrieb größten Outputs gestattet; denn die Verwertung der Schwelgase als Leuchtgas kommt auf Grund der örtlichen Verhältnisse nicht in Frage u. der anfallende Teer ist nicht hochwertig. Verss. im techn. Maßstab sind im Gange. Dabei wird das anfallende Gas zur Verschwelung u. als Kraftlieferant für die Brikettierung verw. det. Der Teer wird auf Bindemittel für die Brikettierung aufgearbeitet. (Braunkohle 23. 613—17. 1924.)

BIELENBERG.

C. H. Lander, *Tieftemperaturverkokung*. Besprechung der Tieftemperaturverkokung, ihrer Prodd. u. der gebräuchlichen Verff. unter besonderer Berücksichtigung des PARKER- u. MAC LAURIN-Prozesses. (Gas Journ. 168. 659—61. 1924.)

BÖRNSTEIN.

Karl Bunte, *Kokserzeugung und Koksverwendung*. Besprechung der verschiedenen, für seine Verwendung wichtigen, physikal. u. chem. Eigenschaften des Koks u. der sie bedingenden Umstände. (Gas- u. Wasserfach 67. 721—24. 1924. Karlsruhe.)

BÖRNSTEIN.

H. Dackweiler, *Unser nationaler Reichtum: Die Kohle*. Vf. gibt einen kurzen Überblick über den Stand der Kohleforschung u. fordert bessere Ausnutzung der Kohle. (Journ. Pharm. de Belgique 6. 893—98. 1924.)

BIELENBERG.

Marie C. Stopes und Richard Vernon Wheeler, *Die Konstitution der Kohle*. Zusammenstellung der in den gleichnamigen Arbeiten (vgl. Fuel 3. 3; C. 1924. II. 10) angeführten Literatur. (Fuel 3. 439—52. 1924. Sheffield Univ.)

BIELENBERG.

H. Winter, *Die mikroskopische Untersuchung der Kohle im auffallenden Licht*. Vf. hat die mikr. Unters. im auffallenden Licht aus der Metallographie auf die Kohlenunters. übertragen. Die dabei erzielten Ergebnisse lassen Schlüsse auf die Entstehung u. Genesis der einzelnen Kohlen zu. Vf. kommt zu der Ansicht, daß die Kohlen kolloidaler Natur sind. Die Entw. geht vom Hydrosol über Hydrogel zum irreversiblen Gel. Weitere Beweise für die Kolloidnatur sieht Vf. in der Abnahme der hygroskop. W. mit zunehmendem Alter der Kohlen u. in der Zähigkeit u. Plastizität der Sapropelite u. des Dopplerits. — Die Beobachtung im auffallenden Licht gestattet wertvolle Einblicke in die Mikrostruktur u. hat den Vorteil bequemer Handhabbarkeit. (Braunkohle 23. 605—13. 1924. Bochum.)

BIELENBERG.

S. Qvarfort, *Beitrag zur Klassifikation der Steinkohle mit besonderer Berücksichtigung ihres Kokungsvermögens*. Beschreibung eines Verff., verschiedene Kohlenproben in einem besonderen Verkokungsapp. nach den physikal. Eigenschaften der erhaltenen Koksproben auf ihre Eignung für die Vergasung zu untersuchen oder zu identifizieren. (Teknisk Tidskrift Kemi 4. 25—30. Ref. BERTELSMANN; Gas- u. Wasserfach 67. 728—30. 1924. Stockholm.)

BÖRNSTEIN.

P. Lebeau und P. Marmasse, *Über die thermische Fraktionierung der gasförmigen Erzeugnisse der Strukturbestandteile bituminöser Kohlen*. (Vgl. LEBEAU, C. r. d. l'Acad. des sciences 177. 319; C. 1923. IV. 682.) Mittels der l. c. angegebenen Methode wurden die vier von STOPES (Proc. Royal Soc. London 90. 1923. B. 470; C. 1920. IV. 197) als a) *Fusain*, b) *Durain*, c) *Clairain* u. d) *Vitrain*

bezeichneten Kohlsorten von Parkgate Seam, sowie b) u. d) einer aus Bour Saint-Hilaire stammenden Kohle untersucht. Kurven über die von 100—1000° entwickelten Gas Mengen im Original. Die maximale Entw. vom H₂ für a), b) u. d) engl. Kohlen findet bei 800° statt, c) der engl. u. b) u. d) der französ. Kohlen hatten bei 700° das Maximum der H₂-Entw. — Für alle Sorten (außer a) war das Maximum der CH₄-B. bei 500°, bei a) bei 600°. — Maximale CO-Entw. für alle Proben bei 700°. Die Zus. der Gase ist bei allen untersuchten Proben ähnlich, die beiden Proben d) hatten höheren CH₄-Gehalt als die anderen; diese beiden Kohlsorten stimmten hinsichtlich der Zus. der aus ihnen entstandenen Gase überein. (C. r. d. l'Acad. des sciences **179**. 1407—6. 1924.) HABERLAND

R. S. Mc Bride, *Leuchtgasbelieferung von Städten durch Kokereien?* Es ist eine Kokerei (BECKER-KOPPERS-Öfen) in Battle Creek (Mich.) beschrieben, deren Gas z. T. für städt. Leuchtgasversorgung verwendet wird. Die Schwankungen im Gasverbrauch werden im wesentlichen dadurch ausgeglichen, daß bei starkem Verbrauch die Koksöfen mit Generatorgas, bei schwachem hingegen mit Kokergas betrieben werden. (Chem. Metallurg. Engineering **31**. 735—36. 1924.) BIELENBERG

D. Stavorinus, *Kohlenoxyd und Gasindustrie*. An Hand statist. Angaben wird nachgewiesen, daß Unfälle durch Gas seltener sind, als vielfach angenommen wird, und daß die Gefahr durch Erhöhung des CO nicht wesentlich steigen wird. Statt den CO-Gehalt im Gas zu vermindern ist es besser für gute Abführung der Verbrennungsgase zu sorgen. (Het Gas **44**. 339—44. 1924. Amsterdam.) GROSZDOL

Charles F. Tooby, *Betriebsergebnisse mit Glover-West Vertikalretorten in Leuchtgaswerken von Foleshill*. (Gas Journ. **168**. 715—19. 1924.) BIELENBERG

Gasinstitut Karlsruhe, *Prüfung eines trockenen Eichkolbens der Gasmeßfabrik Elster & Co., Mainz*. Die Prüfung des App. führte zu befriedigenden Ergebnissen. (Gas- u. Wasserfach **67**. 724—25. 1924.) BÖRNSTEIN

C. F. Carrier, *Beziehungen zwischen thermischen Eigenschaften und Wärmehitzgasen*. Vf. erörtert die Beziehungen zwischen Vol., nutzbarem Heizwert u. Preis bei den üblichen Heizgasen der Technik. (Chem. Metallurg. Engineering **31**. 656—57. 1924. St. Louis, Mo.) BÖRNSTEIN

M. W. Travers, *Eine kritische Studie der veröffentlichten Untersuchungsergebnisse beim Wassergasapparat*. Krit. Besprechung jedes einzelnen Vorganges im Wassergasgenerator. (Gas Journ. **168**. 510—13. 1924.) BÖRNSTEIN

Alfred Faber, *Entzündungstemperaturen einiger Braunkohlengruden*. (Gas u. Wasserfach **67**. 680—82. 1924. — C. 1924. II. 2103.) BIELENBERG

L. Knunjanz, *Eigenschaften des zur Drainage von Erdölbohrungen verwendeten Zements*. Der zur Abdichtung des unterird. W. in Erdölbohrungen bestimmte Zement muß nur langsam erhärten, weil die Erhärtung in der Bohrung, wo hohe Tempp. (bis 65°) herrschen, rascher erfolgt, als bei Prüfung bei Zimmertemp. Er muß bei Erhärtung im unterird. W. keine Ausscheidung an der Oberfläche aufweisen, weil sie den Zusammenhang mit neuen Zementschichten erschwert. Er muß sehr schwer (D. 3,20) sein, um sich mit dem Schlamm in der Bohrung möglichst wenig zu mischen: ein Schlammzusatz zum Zement erniedrigt seine Festigkeit beträchtlich. (Neftjanoe i slancevoe Chozjajstvo **7**. 504—9. 1924.) BIKERMAN

R. H. Brownlee, *Tatsachen und Täuschungen auf dem Gebiete der Oracung Prozesse*. (Chem. Metallurg. Engineering **31**. 737—41. 1924. Pittsburgh.) BIELENBERG

I. Akkerman, *Die erste Gasolinfabrik in Grosnyi*. Bericht über die ersten 10 Tage des Betriebes. Das Gas war Naturgas aus Bohrung 54147, als Absorptionsmittel dienten verschiedene Benzinsorten. Die Absorption erfolgte in Türmen, nach dem Gegenstromprinzip, unter dem Druck von 4 at. Schwere Benzine (D. > 0,75) nehmen mehr Gas auf, als leichtere. Dampfdruck über den ursprünglichen u. über den mit Gas gesätt. Benzenen wurde gemessen u. gefunden, daß die Gefäßfüllung

lintransport 2 at Druck aushalten müssen. (Neftjanoe i slancevoe Chozjajstvo 10—20. 1924.)

BIKERMAN.

B. Tytschinin, *Über die Struktur und einige Eigenschaften von paraffinigen Erdölen und der Masute von Grosnyi. VIII. Schätzung des Verunreinigungsgrades der paraffinlosen Erdöle durch paraffinhaltige Masute* (mit **S. N. Pawlowa**). Vgl. Neftjanoe i slancevoe Chozjajstvo 6. 838; C. 1924. II. 1873.) Die jetzt hergestellten Schmieröle aus dem Emba-Bezirk werden schon bei höherer Temp., als die vor einigen Jahren hergestellten. Als Ursache wurde das Austallisieren des Paraffins erkannt, welches ins prakt. paraffinlose Erdöl des Emba-Bezirks nicht, wie es vermutet wurde, bei nicht fehlerfreier Dest. als Zersetzungsprod. gelangt, vielmehr als Verunreinigung aus den Kesselwagen u. dgl. — Bei der Schätzung des Paraffingehaltes zählen Vff. die im Gesichtsfeld des Mikroskop sichtbaren Krystalle. (Neftjanoe i slancevoe Chozjajstvo 7. 523—30. 1924. Moskau, Alln. Inst. d. W. S. N. C.)

BIKERMAN.

H. J. Macintire, *Wachs- und Schmiermittelerzeugung durch mechanische Abreinigung*. Unter Beifügung von Abbildungen u. Berechnungen werden Trennung v. Paraffin vom Petroleumdestillat u. Schmiermittelhärtung beschrieben u. Auswertung der Anwendung dieses Einheitsprozesses empfohlen. (Chem. Metallurg. Engineering 31. 699—701. 1924.)

OEHLER.

Fritz Frank, *Beobachtungen über die Ursachen der Veränderung der Schmier-Isolieröle im Gebrauch*. Vortrag über neue Versuchsergebnisse insbesondere v. Vfs. u. seiner Mitarbeiter. (Allgem. Öl- u. Fettztg. 21. 701—2. 722. 740. 1924. Wein. Sep.)

HELLER.

G. Spettmann, *Die Erhöhung der Wirtschaftlichkeit durch Verwendung zweckverwechender Schmiermittel*. Vf. erörtert den Wert guter Schmierung, die chem., physikal. u. die mechan. Unters. von Schmierstoffen, Ölprüfmaschinen, sowie Temp.-kraftmessungen im Betriebe. (Die Wärme 47. 491—93. 1924. Hamburg.)

RÜHLE.

Otis P. Hendershot, *Die Wärmeausdehnung von Holz*. Vf. bestimmt die Wärmeausdehnung verschiedener Hölzer, welche bei 120° getrocknet worden waren, in der Wachstumsrichtung u. senkrecht dazu. Es ergab sich eine sehr starke Anisotropie. Weißtanne zeigte z. B. senkrecht zu den Fasern einen Ausdehnungskoeffizienten von $0,636 \cdot 10^{-4}$ pro Grad, parallel zu den Fasern $0,0365 \cdot 10^{-4}$. Bei Eichenholz, Tulpenbaum, Ahorn u. Esche war die Anisotropie kleiner. (Science 68. 456—57. 1924. Syracuse [N. Y.], Univ.)

BECKER-ROSE.

Robert Nowotny, *Verbesserung der Holztränkung durch Anstechverfahren*. Vf. arbeitet die verschiedenen Maschinen zum Anstechen von Hölzern u. berichtet über günstige Ergebnisse in der Praxis mit dem Anstechtränkungsverf., besonders bei Hölzern, die sich auf andere Weise schwer tränken lassen. Die Beeinträchtigung der Holzfestigkeit ist verschwindend. (Ztschr. Ver. Dtsch. Ing. 68. 1273—75. 1924. Wien.)

JUNG.

Wilhelm Bertelsmann, *Über den Einfluß der unverbrennlichen Bestandteile auf die praktische Brauchbarkeit des Leuchtgases*. Vf. prüfte den Einfluß, den der hohe Gehalt an unverbrennlichen Bestandteilen des Leuchtgases (N_2 , CO) auf den bei Beleuchtung u. Heizung erreichbaren Nutzeffekt ausübt. Dafür wurde Leuchtgas mit Wassergas, Rauchgas oder Luft gemischt u. der zur Erreichung gleichen Effekts erforderliche stündliche Aufwand an Gas bzw. an Cal. bestimmt. (Gas- u. Wasserfach 67. 609—12. 1924. Berlin.)

BÖRNSTEIN.

Hermann Gesell, *Die Wirtschaftlichkeit verschiedener Kraftwagen-Betriebsstoffe*. Werden die Vorteile u. Nachteile der Verwendung von Bzl., A., von Gemischen v. Bzl. u. Schweröl, Sauggas u. elektr. Strom besprochen u. es wird dringend auf sofortige Umstellung auf Spiritus-Bzl. empfohlen. (Wchschr. f. Brauerei 41. 32. 1924.)

RÜHLE.

E. O. Rasser, *Ersatzbrennstoffe für Autos*. Hinweis auf einige neue Vorschläge u. Verss. (Allgem. Öl- u. Fettztg. **21**. 763—64. 1924. Buchholz. Sep. HELF.

Hermann Gesell, *Betriebsergebnisse mit Spiritus-Benzol im Lastkraftwagen*. Bei Verwendung von Benzol-Spirit-Gemischen in Lastkraftwagen wurden unter ungünstigen Verhältnissen gute Erfahrungen gemacht u. Ersparnisse von etwa 25% erzielt. (Wchschr. f. Brauerei **41**. 261—62. Ztschr. f. Spiritusindustrie **7**. 315—16. 1924.)

A. R. F. HESS

H. Bähr, *Die Untersuchung von Kohlen und Koks im Hinblick auf die Herstellung einer bewußten Koksseigenschaft*. Die Eignung einer Kohle für die Erzielung eines Kokes bestimmter Qualität ist zu einem erheblichen Teil durch die Untersuchung der Kohle festzustellen. Wichtig sind: Wassergehalt, Aschegehalt u. Prüfung der Asche-Zus., S-gehalt, Dest. Vers., Bitumengehalt u. Backfähigkeit. Neben großenteils bekannten Tatsachen führt Vf. eine eigene Beobachtung an, wonach im zahlenmäßigen Verhältnis Bitumina-Flüchtige Bestandteile eine erhebliche Bedeutung zukommt. Dieses optimale Verhältnis kann man durch Mischung an sich ungeeigneter Kohle mit anderen Kohlen u. Koks klein erzielen. Vf. beschreibt außerdem eine Methode zur Unters. der Backfähigkeit, welche das Arbeiten mit großen Mengen gestattet, so daß die erhaltenen Kokskuchen noch physikal. Prüfungen unterzogen werden können. Weiterhin werden die Einflüsse der Temp. u. der Art der Erhitzung besprochen, sowie die Wrkg. von Zusätzen. (Brennstoffchemie **5**. 365—71. 1924. Bochum.)

BIELENBERG

D. J. W. Kreulen, *Einige Bemerkungen zum Backfähigkeitsproblem der Steinkohlen*. Vf. wendet sich gegen einzelne Punkte der Arbeit von AHRENS (Brennstoffchemie **5**. 268; C. 1924. II. 2306.) Zusatz von Kokspulver als Verdünnungsmittel bei der Verkokungsprobe, Verwendung von zwischen zwei Sieben aufgefangenem Kohlenpulver geben keine einwandfreien Resultate. Das mehrmalige Aufstufen des mit der Kohlenprobe beschickten Porzellengefäßes bewirkt teilweise Lössmischung. — Vf. macht dann noch einige kurze Angaben über die von ihm geplante Backfähigkeitsprobe. Hierbei wird die Kohlenprobe mit Graphit vermischt in einen Porzellanring gepreßt u. in diesem verkokt. (Brennstoffchemie **5**. 381—3. 1924. Rotterdam, Labor. d. Steenkohlen-Handelsvereinigung.)

BIELENBERG

J. D. Davis und **J. F. Byrne**, *Eine adiabatische Methode zur Untersuchung der Selbsterhitzung von Kohle*. Es gibt Umstände, unter denen prakt. alle bituminösen Kohlen Selbsterhitzung zeigen. Die physikal. Bedingungen hierfür sollen untersucht werden. Das geht nur in einer adiab. Apparatur bei genauester Temp.-Kontrolle, die bis auf 0,15° pro Stde. möglich ist. — In einem 4-Liter-Weinheißgefäß voll Transformatorenöl steht das Aufnahmegefäß für 35 g Kohle, das ebenfalls einen Vakuummantel hat. Ein empfindliches Thermoelement hat seine Stellen in der Kohle u. im Öl. Das Ölbad wird gerührt u. elektr. geheizt, wobei durch eine komplizierte Vorr. (Selenzelle u. Relais) der Thermostrom Kohle-Öl durch den Heizstrom alle 5 Sek. einschalten kann, so daß innerhalb 15 Sek. die Temp. wieder auf 0,01° genau einreguliert ist. (Die Vorr. ist inzwischen auf die zehnfache Genauigkeit gebracht worden.) — Das Kohlepulver wird vor dem Verf. bei 140° in inaktivem Gas getrocknet. Die Verss. beginnen meist bei 50 oder 70° mit einem Strom aus inaktivem Gas, bis alles einreguliert ist, was mehrere Stdn. dauert, dann erst wird langsam trockener Sauerstoff hinzugelassen. Die Kohle erhitzt sich im Verlauf einiger Stdn. bis auf ca. 130°. Die Temp. des Bades wird automat. elektr. aufgezeichnet. Bei einer Anfangstemp. von ca. 70° steigt die Temp. in Illinois-Kohle in 7 Stdn. auf 130°, in Lignit u. in Pittsburgh-Kohle in 13 Stdn. auf 140°; beginnt man mit dem Erhitzen letzterer Kohle bei ca. 40°, so beträgt die Temp. nach 50 Stdn. ca. 120°, Torf zeigt nur sehr geringe Selbst-

zung u. einen linearen Temp.-Anstieg, während alle Kohlen parabol. Kurven
 el, so daß bei genügendem Luftzutritt u. schlechter Wärmeableitung alle Kohlen
 eltentzündung zeigen. — Ist Θ die Temp., t die Zeit, so werden die Zeitemp.-

en durch die Formel $\Theta = K \frac{a + t}{b - t}$ gut wiedergeben. Aus den Größen der

el für die von 42° an erhitzte Kohle folgt, daß in Sauerstoff nach 62 Stdn.
 ründung einträte u. unterhalb 26° keine Selbsterhitzung stattfindet; begänne
 a bei 26°, so würde erst nach 140 Stdn. Entzündung eintreten. (Journ. Amer.
 n. Soc. 7. 809—16. 1924. Pittsburgh, Bureau of Mines.) W. A. ROTH.

J. Schoorl, *Der normale Wassergehalt von Steinkohlen und Koks.* Vf. hat
 hiedene Kohlen- u. Koksproben auf ihren Gehalt an hygroskop. W. unters.
 n Beziehung zwischen diesem Gehalt u. der Zus. der Kohlen (Asche, flüchtige
 ile etc.) hat sich nicht ergeben. Bei diesen Unterss. hat Vf. ferner gefunden,
 ß die *Wasserbest.* mittels Trocknung bei 102—105° im Trockenschrank etwas zu
 h Werte ergibt, da bei dieser Temp. bereits okkludierte Gase entweichen. Die
 urch bedingten Differenzen sind jedoch gering. (Ztschr. f. angew. Ch. 37,
 86. 1924. Utrecht, Rijks-Univ.) BIELENBERG.

Swetlow, *Bestimmung des Wassergehaltes im Brennstoff aus Erdöl.* Es
 en folgende Analysemethoden geprüft: 1. von LISSENKO (man läßt eine mit
 eum oder Bzn. verd. Probe sich in einem graduierten Gefäß bei 70° absetzen
 ist das Wasservol. ab), 2. dasselbe mit CuCl₂-Zusatz, 3. Trocknen auf dem
 arbad, 4. Zentrifugieren im graduierten Gefäß u. 5. das Verf. von HOFFMAN-
 USSON (vgl. MARTENS, Das Materialprüfungswesen, 1912, S. 440.) Nur die
 etzten Methoden sind zuverlässig, das Zentrifugieren hat außerdem noch den
 rl der größeren Bequemlichkeit u. Schnelligkeit. Bei Unters. des Masuts
 u man als Zentrifugegläschen ein 60 ccm umfassendes Gefäß u. vermennt darin
 er des zu analysierenden Masuts mit 25 ccm trockenen Bzn. u. 0,3 g CaCl₂;
 dreht 5 Min. lang bei 900 Umdrehungen pro Min. (Neftjanoe i slancevoo
 jstvo 7. 533—37. 1924.) BIKERMAN.

gde und Fritz Recke, *Bestimmung des scheinbaren spezifischen Gewichts*
koks. Vff. haben die von GLOETZER (Brennstoffchemie 3. 245; C. 1923. II.
 vorgeschlagene Methode zur Best. der scheinbaren D. von Koks modifiziert,
 se Methode nach Verss. d. Vff. erhebliche Fehlerquellen aufweist. (Brenn-
 emie 5. 373—74. 1924. Darmstadt, Techn. Hochschule.) BIELENBERG.

Polcich und H. Fritz, *Methode zur Bestimmung der Verdunstungsgeschwindig-*
in Benzin u. dgl. Die von den Vff. ausgearbeitete Methode ist dad. gek.
 er eine bestimmte Bzn.-Menge ein Luftstrom bestimmter Temp. u. Strömungs-
 indigkeit geleitet wird. Die zur Verdunstung benötigte Luftmenge gibt ein
 ir die Verdunstungsgeschwindigkeit. Der normalisierte App. wird von dem
 tofftechn. Studienbüro, Wien III hergestellt. (Brennstoffchemie 5. 371—73.
 4 Wien, Techn. Hochschule.) BIELENBERG.

H. Steinkamp, *Benzin.* Angaben zu techn. Unters. Besonders wichtig ist
 stillationsprobe, nicht die Best. der D. (Het Gas 44. 345—7. 1924.) GROSZE.

WR., *Elektrisch betätigte Anzeigeeinstrumente für Abgasverluste.* Die Kon-
 n u. Arbeitsweise eines selbsttätig anzeigenden Abgasverlustmessers u. sein
 in Feuerungsanlagen von Dampfkesselbetrieben ist beschrieben. Angaben
 eiteren Ausbau des Maßverf. (Papierfabr. 22. 805—6.) SÜVERN.

Levesley, *Graphische Ermittlung des Heizwertes von Generatorgas.* Vf. gibt
 afel zur graph. Ermittlung des Heizwertes von Generatorgas auf Grund
 e Zus. (Fuel. 3. 422—23. 1924. Sheffield.) BIELENBERG.

Dietrich Ringe, Cassel, *Brennstoffvortrockner bei Feuerungsanlagen*, dad. gek., daß der Beschickungstrichter der Feuerung mit einem Hohlmantel versehen ist, der einerseits mit dem Luftmantel, andererseits mit dem Rost der Feuerung verbunden ist. (D. R. P. 403634 Kl. 82a vom 30/8. 1923, ausg. 2/10. 1924.) OELKE

Johann Leopold Ludwig, Wien, *Herstellung eines künstlichen Brennstoffs aus kohlenstoffhaltigen Abfällen jeder Art*. 60—95 Teile der kohlenstoffhaltigen Abfälle (Sägespäne, Torf, Kohlenstaub) werden mit einer wss. Lsg. von FeSO_4 schwach angefeuchtet, in dünnen Schichten getrocknet u. dann in 5—40 Teile geschmolzenen Teer, Gudron, Pech, Erdwachs o. dgl. unter Umrühren eingetragen, worauf die Mischung in bekannter Weise zu Briketten verarbeitet wird. (Oe. P. 97673 vom 8/6. 1923, ausg. 25/8. 1924.) OELKE

Gewerkschaft ver. Constantin der Große, Bochum i. W., *Verfahren zum Aufbauen der Beschickung von Destillationsöfen aus kleineren gestampften oder gepreßten Einheiten*, dad. gek., daß die Einheiten nach Art eines Gitterwerks in den Zwischenräumen übereinander u. nebeneinander geschichtet werden. — Das Verfahren läßt sich z. B. mit Vorteil beim Vergasen von Brennstoffen anwenden. Im Gegensatz zu Generatoren, wo die Vergasungsmittel unter erheblichem Druck gegen eine festgeschichteten Brennstoff geblasen werden müssen, genügt hier ein ganz geringer Überdruck des Vergasungsmittels, um dessen gleichmäßige Verteilung über den gesamten Brennstoff, sowie dessen restlose u. schnelle Vergasung zu sichern. (D. R. P. 373846 Kl. 24e vom 24/5. 1921, ausg. 16/4. 1923 u. 405975 Kl. 24e vom 3/9. 1922, ausg. 11/11. 1924.) OELKE

Gustav Kroupa, Wien, *Vorrichtung zum Schwelen bituminöser Brennstoffe aus bituminöser Schiefer*. Das zu schwelende Gut wird kontinuierlich über im Zickzack übereinanderliegende schräge Flächen eines Ofens geleitet u. dabei einer allmählich steigenden Erhitzung ausgesetzt. Die Schräglflächen sind als kastenartige, stehende Herde mit innerer Gasheizung ausgebildet, durch die jeder Herd auf einen bestimmten konstanten Wärmegrad direkt erhitzt werden kann. (O. P. 97664 vom 26/6. 1922, ausg. 25/8. 1924.) OELKE

Pierre Roussel, Paris, *Anlage zur Meilerverkohlung von Holz* unter Ableitung der flüchtigen Prodd. vom Boden des Meilers aus, dad. gek., daß der Gasabzugskanal mit einem den Meiler zentral durchsetzenden perforierten Rohr in Verbindung steht. — Hierdurch wird der Vorteil erzielt, daß fast alle flüchtigen Bestandteile des Holzes beim Betriebe des Meilers gewonnen werden können. (D. R. P. 402988 Kl. 12r vom 29/10. 1922, ausg. 22/9. 1924. F. Priorr. 4/11. 1921 u. 10/10. 1922.) DE

Fried. Krupp Grusonwerk Akt.-Ges., Magdeburg-Buckau, *Gewinnung von Koks und Kohle aus Feuerungsrückständen*, dad. gek., daß das Rohgut durch Übersieben oder eine andere Separation in Feingut u. Grobgut getrennt, hierauf das Feingut magnetisch u. das Grobgut naßmagnetisch geschieden wird. — Dadurch wird vermieden, daß sowohl die leichte Asche u. Schwimmschlacke als auch die unmagnetische Schiefer mit den noch brauchbaren Stoffen zusammenfallen. (D. R. P. 406767 Kl. 1b vom 5/10. 1920, ausg. 26/11. 1924. Zus. zu D. R. P. 366352; C. 23. II. 427.) OELKE

Badische Anilin- & Soda-Fabrik, Ludwigshafen a. Rh., (Erfinder: **A. Mittasch**, Ludwigshafen a. Rh. und **Aug. Eisenhut**, Heidelberg), *Entwässerung von Teeren*, dad. gek., daß man den wasserhaltigen Teeren II. Neutralsalze, mit Ausnahme des CaCl_2 , in solchen Mengen zusetzt, daß mäßig konz. wss. Lsgg. entstehen können, u. das Ganze zweckmäßig in der Wärme einer mechan. Behandlung durch Rühren u. dgl. unterwirft. — Es wird eine Scheidung in Schichten erreicht, die ohne weiteres getrennt werden können. Das verwendete Salz wird durch Eindampfen der wss. Lsg. wiedergewonnen werden. (D. R. P. 404588 Kl. 12r vom 2/6. 1921, ausg. 25/11. 1924.) OELKE

Allgemeine Gesellschaft für chemische Industrie m. b. H., Berlin-Schöne-Reinigen von Schwerölen und Abscheiden fester Verbindungen aus Teerölen, Anthracen, Montanwachs und ähnlichen Erzeugnissen mittels flüssiger schwefliger Säure, dad. gek., daß die Ausgangsstoffe in mehreren aufeinander folgenden Stufen nat. mit von früheren Extraktionen herrührenden Mutterlaugen, beginnend mit der stärksten mit Extraktstoffen angereicherten u. schließlich mit reiner fl. SO₂ gereinigt werden. — Durch das Verf. werden hoch sd. Mineralöle von den ungesätt. Bestandteilen befreit, es eignet sich ferner zum Gewinnen von Paraffin aus Braunkohlen-Extrakten, von reinem Anthracen aus Rohanthracen, zur Zerlegung des Montanwachses in Anthracen u. Montanharz. (D. R. P. 396793 Kl. 12o vom 22/2. 1922, ausg. 1924.)

FRANZ.

Asphaltwerke vorm. Meister Lucius & Brüning, Höchst a. M. (Erfinder: Gerhart Balke), Härten von Steinkohlenteerpech, dad. gek., daß man Steinkohlenteerpech vorteilhaft unter Verwendung geringer Mengen der üblichen Chlorüberträger bei höherer Temp. so lange chloriert, bis der gewünschte Erweichungspunkt erreicht ist. — Die Prodd. sind harte, homogene asphaltartige MM. mit hohem Glanz und festem Bruch, der Erweichungspunkt, der sonst nicht über 40° liegt, kann auf 10 bis 140° erhöht werden. (D. R. P. 406689 Kl. 22h vom 24/9. 1922, ausg. 1924.)

FRANZ.

Wilhelm Oefverberg, Mainz, Kühlverfahren und -vorrichtung an Gaserzeugungsanlagen. Das Kondensat wird in der Vorlage oder in der Kondensatableitung oder in den Teilen durch W. bis auf eine die NH₃-Verdampfung praktisch ausbleibende Temp. gekühlt oder es wird in Verb. mit einer an sich bekannten Vorrichtung durch Einspritzen von Ammoniakwasser in die Steig- oder Liegeröhre der Vorlage die Wasserkühlung des Kondensats u. Ammoniakwassers mittelst durch Wärmeaustauschwandungen hindurch bewirkt. — Die Kühlvorr. sind aus Kühlwasserrohren durchgezogene Gehäuse ausgebildet, bei denen die Kühlkanäle sich schlingenartig durch den zu kühlenden Raum erstrecken u. dadurch gegen Undichtwerden infolge von Wärmeausdehnungen gesichert sind, sowie eine einfache Reinigung der Gas- und Kondensaträume ermöglichen. (D. R. P. 41222 Kl. 26d vom 6/8. 1921, ausg. 15/9. 1924.)

OELKER.

Berlin-Anhaltische Maschinenbau-Act.-Ges., Berlin, Gewinnung von Ammoniumcarbonat in Gaswerken und Kokereien, dad. gek., daß schwach kohlenstoffhaltige Gase, wie Rauchgase, unter Druck in eine neutrale Lsg. von (NH₄)₂CO₃ geleitet mit einer entsprechenden Menge NH₃ eingeführt werden. — Das Verf. ermöglicht die Herst. eines handelsfähigen Salzes in Gasanstalten u. Kokereien ohne Zusatzanlagen u. ohne Bezug fremder Stoffe. (D. R. P. 404908 Kl. 12k vom 12. 1922, ausg. 23/10. 1924.)

KÜHLING.

Allgemeine Gesellschaft für Kohlentechnik m. b. H., Dortmund, Abscheidung von Ammoniak und Benzolkohlenwasserstoffen aus Kohlendestillationsgasen. Die Abscheidung der NH₃ u. der übrigen stark ätzend wirkenden Bestandteile, wie H₂S, erfolgt bei verhältnismäßig niedrigem Druck u. die der Bzl.-KW-stoffe bei hohem Druck. (E. P. 182803 vom 5/7. 1922, ausg. 30/8. 1922. D. Prior. 7/7.)

OELKER.

Schwefelfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Leverkusen b. Köln a. Rh. (Erfinder: Johann Behrens, Bremen), Gewinnung von Schwefel. Zur kontinuierlichen Abscheidung von S aus H₂S u. O₂ enthaltenden Gasen, werden diese über einen Katalysator geleitet bei einer oberhalb 180° liegenden Temp., bei welcher S aus dem Gas sublimiert. — Es wird zweckmäßig ein Katalysator verwendet, welcher aus poröser Kohle besteht, auf die S niedergeschlagen worden ist. (D. R. P. 407086 Kl. 26d vom 11/1. 1920, ausg. 4/12. 1924.)

OELKER.

Fritz Hug, Klosters, Graubünden, Schweiz, *Acetylenapparat für Wasserzutr* zum Carbid mit Gasentwickler u. Gasbehälter, dad. gek., daß der Gasentwickler sowohl unmittelbar als auch durch einen Wasserverschluß über den Gasbehälter mit der Wasservorlage in der Verbrauchsleitung verbunden ist, so daß das Gas aus dem Gasentwickler unmittelbar in die Verbrauchsleitung abzieht, beim Abstellen des Verbrauchs aber auf dem Umwege über den Gasbehälter in die Verbrauchsleitung gelangt. — Der Wasserzutritt zum Carbid wird beim Abstellen des Verbrauchs möglichst schnell unterbrochen u. das W. vom Carbid rasch zurückgedrückt. (D. R. P. 402315 Kl. 26b vom 8/1. 1924, ausg. 15/9. 1924.) OELKE

Fr. Paul Schmidt, Suhl i. Thür., *Einführung von geklärtem Kalkwasser in Acetylenentwickler* unter Druck, dad. gek., daß das geklärte Kalkwasser dem Gasentwickler durch die Betriebskraft des zuströmenden Frischwassers zusammen mit diesem zugeführt wird. — Hierdurch wird eine besondere Pumpe für das Einbringen des Kalkwassers gespart. (D. R. P. 406109 Kl. 26b vom 8/12. 1923, ausg. 13/11. 1924.) OELKE

Standard Oil Company, Whiting, Indiana, V. St. A., *Verfahren und Anlage zur Druckdestillation von Brennölen* oder anderen KW-stoffen der Paraffinreihe, dad. gek., 1. daß behufs Vermeidung der Dest. der schwer sd. KW-stoffe vor Erreichung der Spaltungstemp. die frisch beschickte Blase einer Gruppe mehrerer Blasen mit dem Anheizen mit den anderen unter sich verbundenen Blasen verbunden wird, in denen die Druckdest. unter Spaltungstemp. (340 bis 450°) u. dem hierfür nötigen Druck (4 at u. darüber) im Gange ist, so daß dieser Druck der nicht kondensierbaren Gase aus den anderen Blasen in der frisch beschickten Blase bereits herrscht, ehe die Spaltungstemp. erreicht wird; 2. daß der Anschluß der frisch beschickten Blase an die anderen Blasen erfolgt, sobald die Temp. die Verdampfungstemp. der W. u. der am leichtesten sd. KW-stoffe (etwa 120°) überschreitet; Destillationsanlage zur Ausübung des Verf. nach Anspr. 1 u. 2 mit einer Batterie von Destillationsapparaten dad. gek., daß jede Blase mit der Gasauslaßleitung ihres Kondensators mittels besonderer, mit Ventil versehenen Verbindungen an eine zweifache Druckausgleichsleitung für das nicht kondensierbare Gas angeschlossen ist, von denen die eine unter Außenluftdruck, die andere unter dem gewünschten Destillationsdruck steht u. durch ihr einziges Reglerventil die Regelung des Gasdruckes in sämtlichen Blasen gestattet. 4. daß jede Blase zwei getrennte, mit Ventilen versehene Verbindungen zwischen dem Destillatauslaß ihres Kondensators u. zwei Destillatsammelleitungen hat, um das minderwertige bei Ende des Destilliervorganges in jeder Blase gewonnene Destillat getrennt von dem hochwertigen sammeln zu können, wobei das einzige in der Sammelleitung für letzteres vorgesehene Ventil den Abfluß aller Blasen in Übereinstimmung mit der Einstellung des Druckregelungsventils der Sammelleitung zu regeln gestattet. (D. R. P. 385763 Kl. 23b vom 1/9. 1921, ausg. 29/11. 1923. A. Prior. 20/4. 1914.) FRAZ

Standard Oil Company, Indiana, *Verfahren zur Druckdestillation schwerer Petroleumöle*, um daraus leichtere Öle zu gewinnen, bei dem die entwickelten Dämpfe in einen durch ein Ventil abgeschlossenen Rückflußfraktionskondensator übergehen, der in freier Verbindung mit der Destillierblase steht, wobei in der Blase u. dem Rückflußkondensator ein Druck von über 4 at aufrecht erhalten wird, dad. gek., 1. daß außer dem beliebig einstellbaren Ventil noch eine durch den Destillationskessel herrschenden Dampfdruck sich automat. betätigende Regelungsvorr. für die Heizung vorgesehen wird. Einrichtung zur Ausführung des Verf. nach Anspr. 1, dad. gek., daß die Regelung des Dampfdruckes in Destillierblase u. Rückflußkondensator durch Drosselung des Dampfauslasses aus dem Rückflußkondensator nach dem endgiltigen Kondensator mittels eines von Hand einstellbaren Nadel-

es erfolgt, das hinter dem am oberen Ende des schrägen Übergangsrohres geschlossenen Rückflußkondensator eingeschaltet ist. — Ferner sind noch Regler, die auf das Steuerorgan der einen mechanischen Schürer der Feuerung anbinden Kraftmaschine u. für die Zuführung der Verbrennungsluft zur Feuerung vorsehen. (D. R. P. 391234 Kl. 23b vom 31/3. 1920, ausg. 29/2. 1924.) FRANZ.

David Charles Brandon, Balikpapan, Nied. O.-Indien, *Dephlegmator*, vorzugsweise für Petroleum unter Verwendung übereinanderliegender, aus Röhrenbündeln bestehender Kühlzylinder, dad. gek., daß die Kühlzylinder durch Platten u. heizbare Räume von einander getrennt sind, wobei die Dämpfe nicht nur in verschiedenen Ströme geteilt werden, sondern auch ihren Weg durch einen Kondensator nehmen müssen. — Durch diese Anordnung wird verhindert, daß das im ersten Teil gebildete Kondensat nach dem zweiten Teil strömt. Es wird also eine Trennung bewirkt, wodurch die Erzeugung von drei oder mehr Fraktionen ermöglicht wird. (D. R. P. 403132 Kl. 23b vom 3/8. 1922, ausg. 25/9. 1924. Holl. Prior. 0.1921.)

OELKER.

Carl Fuchs, Orsova (Rumänien), *Fraktionierte Kondensation von Mineralölen o. dgl. teilweise geschalteten, kolonnenartigen Dephlegmationskühlern*. Das gebildete Kondensat wird auf dem Endteil seines Weges derart geführt, daß es ohne mit den aufsteigenden Dämpfen in Berührung zu kommen der Strahlungswärme derselben ausgesetzt ist. — Vor den bekannten Verff. hat diese Arbeitsweise den Vorzug, daß hochflammige Prodd. ohne mehrfache Wiederholung der Dest. erhalten werden können. (Oe. P. 97690 vom 13/1. 1923, ausg. 25/8. 1924.)

OELKER.

Carl Fuchs, Orsova (Rumänien), *Destillation von Petroleum o. dgl.* Bei der Destillation von Petroleum o. dgl. durch indirekte Wärmeübertragung mittels überhitzten Wasserdampfes läßt man den letzteren mehrere in dem Heizraum angeordnete Heizelemente hindurchströmen, wobei er in bekannter Weise zwischen je zwei Heizelementen durch einen Überhitzer geleitet wird. — Hierdurch wird die Menge des mit dem Frischdampfes auf einen Bruchteil des bisher erforderlichen herabgesetzt. (Oe. P. 97691 vom 13/1. 1923, ausg. 25/8. 1924.)

OELKER.

Joseph Antoine François Marius Seigle, Paris, *Umwandlung von schweren Kohlenwasserstoffen in leichte hochentzündliche Kohlenwasserstoffe*. Die Dämpfe der schweren KW-stoffe werden zwecks Depolymerisation überhitzt, über Katalysatoren u. danach einer fraktionierten Kondensation unterworfen. (Schwz. P. 104104 vom 12/12. 1922, ausg. 1/4. 1924. F. Prior. 22/12. 1921.)

OELKER.

Guard Jena, Biberach, Riß, *Reinigung von Rohmontanwachs*. Das Rohmontanwachs wird mit HNO₃ vorbehandelt u. das entstandene Prod. der Einw. von diekrönd. lösenden Extraktionsmitteln, wie A., Aceton u. dgl. unterworfen, oder mit dem Gesamtprod. der Nitrierung gel., worauf aus der Lsg. die Nitrokörper durch Extr. oder Estern organ. Säuren (Essigäther) ausgefällt werden. (D. R. P. 406813 vom 2/12. 1921, ausg. 27/11. 1924.)

OELKER.

Guard Dyckerhoff, Poggenhagen b. Neustadt a. Rhge., *Wasserfeste Preßlinge aus öligen, pulverigen und faserigen Stoffen*, die als Isolierkörper dienen sollen, dad. gek., daß man als Bindemittel eine wss. Emulsion von wasserunlöslichen organ. Stoffen wie Pech, Asphalt, Erdwachs, Bitumen o. dgl. verwendet. (D. R. P. 404070 vom 2/11. 1917, ausg. 10/10. 1924.)

FRANZ.

Reginald Davies Richards, Marrickville b. Sidney, New-Süd-Wales, *Klärung von gebrauchtem Öl* mittels eines Wasserzusatzes, dad. gek., daß Schmieröl im W. durch die Einw. von Dampfstrahlen eine weitgehendste Reinigung erfährt u. die Ölteilchen dann beim Durchgang durch hintereinandergeschaltete Siebe derart einem Scheuervorgang unterworfen werden, daß selbst die kleinsten Schmutzkörper von der sie umgebenden Ölhaut befreit werden. — Die Durchführung des Verf. dienende Vorr. besteht aus mehreren übereinander angeordneten Sieben. (D. R. P. 404071 vom 2/11. 1917, ausg. 10/10. 1924.)

FRANZ.

angeordneten Scheuer- u. Waschbehältern, die neben flachen Siebflächen je n Gruppe von senkrechten ineinander angeordneten Ringsieben aus Drahtgef. enthalten. (D. R. P. 405396 Kl. 23a vom 2/11. 1922, ausg. 31/10. 1924.) OELK.

Johannes Jacobus Loke, Rijswijk, Holland, *Hochfeuerfeste Masse*. (D. R. P. 404676 Kl. 80b vom 21/4. 1923, ausg. 20/10. 1924. E. Prior. 18/8. 1922 – C. 1924. I. 2619.) KÜHLIN.

Franz Fischer, Mülheim a. d. Ruhr, *Betrieb von Explosions- oder brennungsmotoren mit Spiritus* unter Anwendung eines Kontaktvergaser, dad. k daß ein Teil des Spiritus in an sich bekannter Weise im Kontaktvergaser vor Einführung in den Motorenzylinder umgewandelt wird, während der übrige e als Spiritusdampf oder -nebel dem Zylinder zuströmt. — Der Kontaktvergaser i infolgedessen klein u. billig u. kann auch mit den Auspuffgasen ausreichen b heizt werden. Außerdem wird eine zweite Betriebsstoffquelle überflüssig, dale die Zündung erleichternde Zusatz aus einem Teile des Spiritus selbst erzeugt r (D. R. P. 405994 Kl. 46d vom 29/3. 1923, ausg. 13/11. 1924.) OELK.

Julius Heinrich, Quedlinburg, *Rauchgasuntersuchungsgerät, bei dem d z untersuchenden Rauchgase durch ein Flügelrad in Drehung versetzt werden u d durch auf einen der Umgebung gegenüber erhöhten Druck gebracht werden u b dem die durch Veränderung der D. der Rauchgase bedingte Änderung des Druke durch entsprechende Änderung der Umdrehungsgeschwindigkeit des Flügel d wieder ausgeglichen wird, so daß die Umdrehungszahl des Flügelrades ein fa für die D. der Rauchgase bildet, dad. gek., daß durch das empfindliche Drucka gerät, auf das die durch die Zentrifugalkraft erzeugte Druckerhöhung der Ra ch gase wirkt, bei Druckänderung elektr. Ströme durch Kontakte geschlossen d unterbrochen werden, die in an sich bekannter Weise durch Einw. auf Maer spulen unter Vermittlung von Kuppelungen u. Kegelrädern eine Welle in d einen oder anderen Richtung in Drehung versetzen, u. daß durch die Dreim dieser Welle die Umdrehungszahl dieses Flügelrades automat. so lange verläe wird, bis der eingestellte Druckunterschied wieder vorhanden ist. (D. R. P. 405 Kl. 42l vom 16/11. 1923, ausg. 21/10. 1924.) KÜHLIN.*

Horace N. Packard, Milwaukee, V. St. A., *Ermittelung des Heizwertes b n barer Gase* unter Verwendung von bewegter Luft als Kühlmittel, dad. gek., d die die Verbrennungswärme aufnehmende Luft von der Verbrennungsluft u d Verbrennungsgasen getrennt durch das Calorimeter geführt wird. — 2. Calorime zur Durchführung des Verf. nach Anspruch 1, dad. gek., daß die die Verem nungswärme aufnehmende Luft im Gegenstrom zu den Verbrennungsgasen o c einen den Verbrennungsraum umschließenden Mantel geführt wird. — Im Gen satz zu calorimetr. Bestst., bei denen die Verbrennungswärme durch W. u genommen wird, bedarf es keiner Vorbereitungszeit, gegenüber bekannten, ebe all Luft benutzenden Verf. wird der Vorteil erzielt, daß Menge u. Zustand d d Verbrennungswärme aufnehmenden Luft u. das Mischungsverhältnis von Pri u Verbrennungsgas geändert werden kann. (D. R. P. 405265 Kl. 42i vom 1/12. 1920, ausg. 1/11. 1924.) KÜHLIN.

Hermann Jentzsch, Wilhelmshaven, *Vorrichtung zur Ermittlung der Iplo sivität und des Explosionsdruckes für Treiböle und Brennstoffe*, bestehend aus n in einen Heitziegel oder -ofen einsetzbaren, mit Bohrungen zur Aufnahm d Öles u. zur Einführung von Luft oder O₂ versehenen Klotz o. dgl., dad. gek. d die Zündbohrung abgedeckt u. mit einem Druckanzeiger in Verb. gebracht i — Der Druckanzeiger bewegt sich vor einer Skala. (D. R. P. 404810 Kl. 42l von 7/3. 1924, ausg. 24/10. 1924.) KÜHLIN.

XXIV. Photographie.

John K. Robertson und J. T. Thwaites, *Die Schwärzung eines photographischen Films durch Röntgenstrahlen*. Vff. bestimmen den Wert p der Gleichung $Jt^p = \text{const.}$ J = Intensität der Röntgenstrahlen, t = Expositionszeit des photograph. Films) der Keilmethode, die bisher nur für Wellenlängen des sichtbaren Spektrums verwandt worden war (Journ. Opt. Soc. America VII. 11. 996 [1923]), aber auch, gezeigt wird, im Gebiet der Röntgenstrahlen brauchbar ist. Der Grad der Genauigkeit ist allerdings nicht sehr groß, u. die erhaltenen Werte stimmen unehr mit den nach andern Methoden gefundenen überein. Die Versuchsanordnung ist einfach. Ein Strahl gefilterter Röntgenstrahlen fiel auf einen Eisenkeil von 2 cm Dicke der Grundfläche u. 12,6 cm Länge, der direkt über dem engen Spalt zwischen 2 dicken Pb-Platten lag. Hinter dem Spalt lag ein doppelter Film für Röntgenstrahlen im Papierumschlag. Bei Entw. zeigte der hinter dem Spalt gelegene Teil des Films einen schmalen geschwärtzen Streifen, dessen Länge mit der Intensität oder Expositionsdauer zunahm. p wurde nach der Formel:

$$p = a(h_1 - h_2)/(\log t_1 - \log t_2)$$

berechnet, wobei $h_1 - h_2$ die Änderung in der Streifenlänge war, die der Änderung der Expositionsdauer $t_1 - t_2$ entsprach, wenn die Intensität konstant gehalten wurde. a ist eine Funktion des Keils u. der Wellenlänge, die leicht bestimmt werden kann. Es ergab sich $p = 1,01$ u. $1,04$. Die niederen Werte $p = 0,91$ u. $0,99$ sind entweder durch Versuchsfehler oder durch höheren Betrag an weicher Strahlung verursacht. (Proc. Trans. Roy. Soc. Canada [3] 18. Sekt. III. 99—101. Kingston, Queen's Univ.)

JOSEPHY.

S. E. Sheppard, E. P. Wightman und A. P. H. Trivelli, *Studien über die photographische Empfindlichkeit. V. Wirksamkeit von arseniger Säure und von Oxyarsenmitteln*. (IV. vgl. S. 192.) Frühere Unterss. haben ergeben, daß Na-Arsenit mit AgBr reagiert. Vff. weisen jedoch nach, daß die verwendeten Methoden einen bindenden Schluß zulassen. Eigene Verss. ergeben starke Abhängigkeit von der Alkalität der Lsg. Mit Hilfe einer Leitfähigkeitstitration wird die Existenz von As-Salzen der As(OH)₃ untersucht. Ein Knick in der Kurve zeigt sich nur beim Mono-Na-Salz, der weitere Verlauf deutet auf Komplexbildung hin. Mikrophotographie von mit Na-Arsenit behandelten Platten zeigen, daß das Mono-Na-Salz wirksam ist, dagegen werden die Körner von AgBr in alkal. Lsg. leicht gelöst. Bei entstehenden komplexen Ag-Salzen zers. sich mit oder ohne Hilfe von Entfärbem, durch kolloides Ag wird die Zers. beschleunigt. Es wird eine Erklärung für diese Erscheinungen versucht unter der Annahme, daß die komplexen Ag-Salze an empfindlichen Ag-Keime adsorbiert werden, sich dann zers. u. daß das ausgeschiedene Ag auf den Ag-Keimen abgelagert wird. (Journ. Franklin Inst. 198. 46. 1924.)

KELLERMANN.

Giuseppe Cramer, *Zur Theorie photographischer Vorgänge*. Die meisten Vorgänge in der photograph. Chemie hängen von der Teilchengröße des Halogensilbers u. von der Menge ab. Durch NH₃ lassen sich die Teilchen vergrößern. Vff. erklärt diese Erscheinung durch intermediäre Lsg. des Halogensilbers im NH₃. Reifungserscheinungen zeigen auch HgJ₂ in Ggw. von H₂O. An AgJ-Gelatine läßt sich das Becking-Phänomen beobachten: Eine schwach vorbelichtete Platte ist erheblich empfindlicher für gelbes u. rotes Licht. Bei gewöhnlichen photograph. Negativschichten wird das durch Röntgen- oder Radiumstrahlen erzeugte latente Bild durch ein stärkeres Licht hervorrufen. Vff. erklärt das durch Entstehung zahlreicher kleiner Reaktionszentren im AgBr-Korn. (Ztschr. f. angew. Ch. 37. 571—72. Schweinfurt 1924.)

KELLERMANN.

M. B. Dobson und D. N. Harrison, *Die gleichmäßige Entwicklung photo-*

graphischer Platten. Vff. schlagen zur Plattenentwicklung eine Anordnung vor, bei welcher die Platten an den senkrechten Wänden des Entwicklergefäßes stehen, welchen ein Kolben so bewegt wird, daß der Flüssigkeitsraum zwischen Platte und Kolben in schnell wechselnder Bewegung versetzt wird. Dadurch soll eine gleichmäßige Schwärzung der photograph. Platte erzielt werden. (Nature 114. 752. 1924. Oxford.)

BECKER

C. H. Boehringer Sohn, Niederlingheim a. Rh., *Herstellung von Überzügen für photographische, papiertechnische und ähnliche Zwecke* nach Patent 3836. 1. dad. gek., daß für die zur Herst. der Überzüge verwendeten Lsgg. oder Suspensionen Leim, Gelatine, Albumin, Casein u. dgl. Stoffe verwendet werden, die bereits bei ihrer Herst. Gallensäuren oder deren Salze zugefügt sind. — 2. dad. gek., daß die anzuwendenden Gallensäuren von Nebenbestandteilen u. den sonstigen Inhaltsstoffen der Gallensäuren weitgehend befreit sind. — Die erhältlichen Lsgg. bzw. Emulsionen sind von stets gleichmäßiger Beschaffenheit. (D. R. P. 40429 Kl. 57b vom 22/10. 1922, ausg. 16/10. 1924. Zus. zu D. R. P. 383621; C. 1924. 387.)

KÜHLING

Paul Böhr, Berlin, *Vorbehandlung von Chromatkinofilmen*, 1. dad. gek., daß der Träger der Emulsionen mit einer transparenten Schutzschicht, bestehend aus Lack, Wasserglas oder sonstigen gegen Chromate indifferenten Stoffen, überzogen ist. — 2. dad. gek., daß die Zwischenschicht mit transparenten Farben gefärbt ist. — 3. dad. gek., daß den Chromatlsgg. den Träger konservierende Stoffe, wie Campher oder Glycerin u. Campher, zugesetzt werden. — Es werden Schädigungen der Träger durch die Chromatlsg. vermieden. (D. R. P. 405043 Kl. 57b vom 22. 1923, ausg. 23/10. 1924.)

KÜHLING

Hans Kollien, Berlin, *Hochlichtempfindliche Chromatleimlösung*, dad. gek., daß der Lsg. organ. Stoffe beigegeben sind, die auf Leim gerbend wirken. — Ein geeigneter Zusatz ist Tannin. Die Expositionsdauer der Erzeugnisse beträgt nur 8.—10. Teil derjenigen der bekannten Chromatleimlsgg. (D. R. P. 399339 Kl. 57b vom 22/9. 1923, ausg. 24/10. 1924.)

KÜHLING

Mariano de'Sperati, Turin, *Lichtempfindlicher Film für Photographie u. Kematographie* mit einer Schicht auf der Rückseite des Trägers für die empfindliche Emulsion, 1. dad. gek., daß die hintere Schicht eine fein gekörnte Oberfläche besitzt, welche den Eindruck einer matten Oberfläche hervorruft. — 2. dad. gek., daß man auf die Rückseite des Celluloidträgers eine Schicht ausbreitet, die aus einer Lsg. von Celluloid im Gemisch mit harzartigen oder kolloidalen Stoffen, in einem Lösungsmittel besteht. — Die Filme sind besonders für Teilaufnahmen für farbige Photographie im Dreifarbenverf. geeignet. (D. R. P. 404568 Kl. 57b vom 1/3. 1923, ausg. 20/10. 1924.)

KÜHLING

Joseph Sury, Wyneghem b. Antwerpen, *Photographisches Farbstoffpapier*, 1. dad. gek., daß es in einer kolloidalen Schicht einen zersetzbaren, lichtdunflässigen blauen Farbstoff trägt, der sich unter Gasentw. auflöst. — 2. dad. gek., daß der Farbstoff aus Ultramarin besteht, gemischt mit einer gewissen Menge eines pulverförmigen weißen, gegenüber Säuren inerten Stoffes (BaSO₄, Kaolin usw.). — Bei der Benutzung wird das Papier mit einer Alkalichromatlsg. sensibilisiert, nach dem Druck entwickelt u. mit Säure behandelt. (D. R. P. 405494 Kl. 57b vom 8/5. 1924, ausg. 3/11. 1924. Blg. Prior. 30/5. 1923.)

KÜHLING

Hugo Gabler-Adlersfeld, Wien, *Herstellung von Ölbildern (bzw. Aquarellen) unter Verwendung eines Chromatgelatinebildes*. (D. R. P. 404834 Kl. 57b vom 1/3. 1923, ausg. 21/10. 1924. — C. 1924. II. 792 [E. P. 213577].)

KÜHLING

Chemisches Zentralblatt.

25 Band I.

Nr. 6.

11. Februar.

A. Allgemeine und physikalische Chemie.

I. B. D., George Herbert Bailey. Nachruf auf den am 17. 5. 1852 geborenen, 3/4. 1924 verstorbenen ehemaligen Chefchemiker der British Aluminium Co. (Journ. Chem. Soc. London **125**. 2677—79. 1924.)
HABERLAND.

S. Natrajan, Surendra Nath Dhar. Nachruf auf den 1892 in Indien geborenen, am 9/12. 1923 verstorbenen Lehrer für techn. Chemie am Civil Engineering College in Guindy [Madras]. (Journ. Chem. Soc. London **125**. 2680—81. 1924.)
HABERLAND.

V. N. H. A. L., James Johnston Dobbie. Nachruf auf den 1852 geborenen, 3/4. 1924 verstorbenen ehemaligen Leiter des Regierungslaboratoriums. (Journ. Chem. Soc. London **125**. 2681—90. 1924.)
HABERLAND.

Ernhard Dyer, Otto Hehner. Nachruf auf den 1853 in Marienburg (Nassau) geborenen, am 9/11. 1924 verstorbenen Analytiker. (Journ. Chem. Soc. London **125**. 2690—93. 1924.)
HABERLAND.

H., Dr. Ernst König †. Nachruf auf den am 13. 9. 1869 geborenen, am 1924 gestorbenen Photochemiker u. Leiter des wissenschaftl. Zentrallaboratoriums der Höchster Farbwerke. (Ztschr. f. angew. Ch. **37**. 1030—32. 1924.)
JU.

C. Clayton, Edmund Knowles Muspratt. Nachruf auf den 1833 in Liverpool geborenen u. dort am 1/11. 1923 verstorbenen engl. Industriellen. (Journ. Chem. Soc. London **125**. 2693—98. 1924.)
HABERLAND.

R. Dhar, Die Aktivierung von Atomen und Molekeln und der Mechanismus chemischen Umwandlung. Zusammenfassung der modernen Theorien der Aktivierung von Atomen u. Molekeln u. über den Mechanismus der Aktivierung mit literarischen Angaben. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. **141**. 1—22. 1924.)
JOSEPHY.

Max Born, Die chemische Bindung als dynamisches Problem. Vortrag. Vf. fasst zusammenfassend über die Ergebnisse u. Anschauungen, zu denen man durch die quantentheoret. Deutung der Molekülbildung u. des Molekülbaues seit der Entwicklung der chem. Theorie gelangt ist. Vom Standpunkt der Quantentheorie aus wird eine Deutung der chem. Energie, eine Darst. der Lehre vom chem. Gleichgewicht, der Reaktionsgeschwindigkeit, ein Näherungsverfahren zur Berechnung der Bildungsgeschwindigkeit u. weiter eine elektrostatische Theorie der Krystallgitter hergeleitet. Vom gleichen Standpunkt wird die Ionendeformation (vgl. auch BORN u. HEISENBERG, Ztschr. f. Physik **23**. 388 u. HEISENBERG, Ztschr. f. Physik **26**. 196; C. **1924**. II. 445. 1884) u. die Energie der polaren Molekeln behandelt. (Naturwissenschaften **12**. 1199—1207. 1924. Göttingen.)
JOSEPHY.

R. Briggs und V. Migrdichian, Das Dissoziationsgleichgewicht des carbaminsäureigen Ammoniums. Sorgfältige Messungen der Dissoziationsspannung des reinen $\text{CO}_2\text{-NH}_3$ sowie der Gleichgewichtsdrucke bei Zusatz überschüssigen NH_3 u. CO_2 zwischen 10° u. 45° . Die Beobachtungsergebnisse bestätigen innerhalb der experimentellen Fehlergrenze das Massenwirkungsgesetz. (Journ. Physical Chem. **28**. 1835. 1924. CORNELL-Univ.)
CASSEL.

Nádai, Über die Gleit- und Verzweigungsflächen einiger Gleichgewichtszustände fester Massen und die Nachspannungen bleibend verzerrter Körper. Vf. ermittelt

I. 1.

für eine Anzahl von Gleichgewichtszuständen die Gesetzmäßigkeiten in der Spannungsverteilung u. Gleitflächenbildung bei vollkommen bildsamen Massen, z. B. Paraffin. (Ztschr. f. Physik **30**. 106—38. 1924. Göttingen.) BECKER

J. Saslawski, *Abhängigkeit des Ausdehnungskoeffizienten der Flüssigkeit von der Temperatur und chemischen Struktur*. (Vgl. Ztschr. f. physik. Ch. **109**. C. 1924. II. 422.) Vf. prüft die für den Flüssigkeitsausdehnungskoeffizienten mathemat. gefundene Formel $\beta = 1,365/\sqrt{TT_0} + 2,73 T$ an einer großen Reihe von Fl. zwischen -90 u. $+200^\circ$. Die berechneten Werte stehen den erfahrungsgemäß gefundenen sehr nahe; nur Alkohole zeigen größere gesetzmäßige Abweichungen, die experimentellen Werte sind kleiner. Für die meisten Fl. ist eine einfache Funktion der krit. u. Beobachtungstemp. Charakterist. ist daher für eine Fl. nicht die Größe von β , sondern der Charakter u. die Größe der therm. Ausdehnung vom n. Lauf derselben. Beim Vergleich einer Reihe sich normal ausdehnender Fl. bei beliebiger konstanter Temp. unter sich, zeigt es sich, daß bei jedem relativ größeren Werte β ein relativ kleinerer Wert der krit. Temp. entspricht. Andererseits hat jede ideale u. sich ausdehnende Fl. bei absol. Nullpunkt einen minimalen Wert $\beta = 1,365/3,73 T_0$ u. bei der krit. Temp. einen maximalen Wert, wenn β sich einem unendlich großen Werte nähert, indem die Fl. in Dampf übergeht. Zwischen diesen Grenzwerten müssen sich reelle Werte β für eine beliebige Fl. bei beliebiger möglicher Temp. befinden. (Ztschr. f. physik. Ch. **113**. 1113. 1924. Iwanowo-Wosniessensk, Polytechn. Inst.) ULMAR

E. A. Hafner und **L. v. Kürthy**, *Zur Kenntnis der Aussalzung*. Die Aussalzung von wss. Phenollsgg. wird mit Hilfe der Interferometrie untersucht (vgl. LÖWE, Physikal. Ztschr. **11**. 1047; C. 1911. I. 54). — Für mäßig konz. Lsg. ist die Verschiebung der Interferenzstreifen für ein u. denselben Stoff eine lineare Funktion der Konz.; bei höheren Konz. ist jedoch die Verschiebung geringere als der Konzentrationszunahme entspricht. Von den beiden in Frage kommenden Erklärungen, a) daß die Teilchen bei höheren Konz. (zunehmender Annäherung an die interferometr. weniger wirksam sind, b) daß weniger Teilchen da sind, sich als konzentrationsvariable Autokomplexe gebildet haben, entscheiden sich Vff. für letztere. Dieselben Erscheinungen wurden bei *KCl*, *NaCl* u. *Glucose* beobachtet u. stimmen mit der Annahme einer Polymerisation der Salze in wss. Lsgg. überein. Da es sich beim Aussalzen ebenfalls um eine Verminderung der Teilchenzahl des auszusalzenden Stoffes in der Lsg. handelt, wurden den ersten ähnliche (gegen die c-Achse) gekrümmte Kurven erhalten (c-Achse = Konz., andere Achse = abgelesene Trommelteile). Es gelingt hierbei, den Aussalzungsvorgang zu verfolgen, bevor der Aussalzungspunkt erreicht ist. Die Aussalzung wird als Resultat zweier Wrkgg. aufgefaßt: der Aktivität der aussalzenden Ionen u. der diekt. Verhältnisse. (Arch. f. exp. Pathol. u. Pharmak. **104**. 148—69. 1924. Iser Univ.) ZANDL

A₁. Atomstruktur. Radiochemie. Photochemie.

A. Miethe und **H. Stammreich**, *Der Zerfall des Quecksilberatoms*. Vff. berichten zu der Veröffentlichung von HABER (Naturwissenschaften **12**. 635; C. 1924. II. 111) ausführliche Angaben über die einzelnen im Institut von HABER analysierten Hg-Proben. (Naturwissenschaften **12**. 1211—12. 1924. Berlin, Techn. Hochschule.) BR

Milton Marshall, *Metastabile Zustände im Niederspannungsbogen des Quecksilbers*. In einem mit Hg-Dampf von 0,001—10 mm Druck gefüllten Entladungsröhr aus Pyrexglas werden zwischen einer Kathode aus glühendem W- bezw. Pt-Draht u. einer Ni-Scheibe Wechselstrombogen von 10—80 Perioden u. Bogen mit intermittierenden konstanten Spannungen gebildet u. aus dem Verlauf der Spannungs-kurve die Existenz von Hg-Atomen im metastabilen $2p_1$ - u. $2p_3$ -Zustand

gewiesen. Die bei den Drucken von 0,1—6 mm für die 2p₁- u. 2p₂-Stufe gemessenen Ionisierungsspannungen von 5,0 bzw. $5,8 \pm 0,1$ V. stimmen mit den aus dem Mikroskop. Beobachtungen berechneten überein. Die Lebensdauer der metastabilen Formen bei Drucken über 1 mm beträgt $\frac{1}{22}$ bzw. $\frac{1}{170}$ sec, letzterer Wert bei Ggw. von CO, CO₂, N₂, H₂ oder H₂O-Dampf auf $\frac{1}{400}$ sec. (Astrophys. Journ. **60**. 243—55. 1924. Chicago, Univ.)

KRÜGER.

Ernst Mohr, Über den Aufbau von Diamantkrystallmodellen aus Diamantstoffatommodellen. (Vgl. Journ. f. prakt. Ch. **107**. 391; C. **1924**. II. 580.) Es geht aus ditetraedr. Zellmodellen Diamantkrystallmodelle von hexakistetraedr. Symmetrie auf. Es entsteht ein Oktoedroid mit gekerbten Kanten, die durch das Wachstum wieder ausgeheilt werden können, wodurch Körper von sehr hoher Symmetrie entstehen können. (Abbildungen im Original.) Aus diesem Raumgitter lassen sich die reinen Wachstumsformen des Diamanten ableiten. (Ztschr. f. Kristallogr. **60**. 473—76. 1924.)

ENSZLIN.

Volta P. Barton und Franklin L. Hunt, Molekulardimensionen von Celluloid. Wenn man 1 g Celluloid in 400 g Amylacetat auf u. läßt man einen Tropfen dieser auf einer reinen Wasseroberfläche verdampfen, dann erhält man einen Celluloidfilm von 30 Å Dicke, wie mittels eines Interferometers gemessen werden konnte. Der doppelte Verd. entstehen ebenfalls zusammenhängende, jedoch nicht mehr stabile Filme. Bei dreifacher Verd. entstehen auf der Wasseroberfläche noch stabile Häutchen, welche jedoch bald zerbrechen. Vff. schließen daraus auf eine molekulare Dimension des Celluloids von 10 Å. (Nature **114**. 861. 1924. Washington, Bureau of Standards.)

BECKER.

L. J. Havighurst, E. Mack, jr. und F. C. Blake, Präzisionskrystallmessungen einiger Alkali- und Ammoniumhalogenide. Vff. bestimmen die Gitterkonstanten der sorgfältig gereinigten Alkalihalogenide. Kub. flächenzentriert kristallisieren NH₄J, $a = 7,244$ Å; KCl, 6,280 Å; KBr, 6,578 Å; KJ, 7,052 Å; NaCl, 6,571 Å; RbBr, 6,868 Å; RbJ, 7,325 Å; einfach kub. Gitter bilden NH₄Cl, NaBr, 6,478 Å; NH₄Br, 4,047 Å; CsJ, 4,110 Å. Isomorphe Beimengungen in kleinen Mengen haben noch keinen Einfluß auf die Größe der Gitterkonstanten. (Journ. Amer. Chem. Soc. **46**. 2368—74. 1924. Ohio, Univ.)

BECKER.

Alph W. G. Wyckoff und Herbert E. Merwin, Die Krystallstruktur des Dolomits. Lauephotogramme von Dolomit, CaCO₃·MgCO₃, zeigen, daß dieser eine hexagonale Symmetrie besitzt als der Calcit, woraus geschlossen werden kann, daß Dolomit eine chem. Verb. ist, welche sich von Calcit u. Magnesit unterscheidet. Die Kristallstruktur ist wahrscheinlich C₂h. Die Kantenlänge des Elementarparallelepipedes beträgt 10,2 Å, die Koordinaten der Atomschwerpunkte sind: Ca (000), Mg ($\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$), (000), ($\bar{u}\bar{u}\bar{u}$). Einschließlich der O-Atome sind 4 Parameter zu berechnen, so daß der Strukturfaktor nicht gebildet werden konnte. Reiner Dolomit u. solcher, bei dem 30% der Mg-Atome isomorph durch Fe ersetzt sind, zeigten dieselben Lauephotogramme u. dieselbe Symmetrie. Es sind also in dieser Verb. Mg u. Fe vollständig vertauschbar. (Amer. Journ. Science, SILLIMAN [5] **3**. 447—61. 1924. Physic. Lab.)


BECKER.

L. Heindlhofer, Die Krystallstruktur von Hartstahl. Mittels Mo-Strahlung untersuchte Vff. die Krystallstruktur von Stählen mit 0,80 u. 1,31% C. Es treten bei diesen Interferenzlinien auf wie im C-freien Fe, nur sind sie weniger intensiv verbreitert. Martensit besitzt das raumzentrierte Gitter des α -Fe, nur erscheint die Gitterkonstante um 0,4% verkürzt. Erhitzt man den Stahl 30 Min. hindurch auf 500°, dann verschwindet diese geringfügige Gitterstörung, wobei außerdem die Interferenzlinien schärfer werden, ohne daß indessen die Härte des Stahles merklich abnahm. Durch Vergleich der D. des Martensits mit jener des α -Fe und des Zementits konnte geschlossen werden, daß Martensit eine feste Lsg. von

C in α -Fe ist, wobei die C-Atome die Fe-Atome im Raumgitter ersetzen. In der festen Lsg. ist mit äußerst fein verteiltem Zementit vermengt. Der eine Bestandteil dieses Gemisches, die feste Lsg., scheint selbst bei Zimmertemp. instabil zu sein. Es scheinen beide Komponenten des Gemisches einen Beitrag zur Härte des Stahls zu liefern. Und zwar die feste Lsg. durch ihre Gitterstörung u. der Zementit durch seine äußerst feine Verteilung. (Physical Review [2] **24**. 426—38. 1924. Pennsylvania, Univ.)

Roscoe G. Dickinson und **James B. Friauf**, *Die Krystallstruktur des tetragonalen Bleimonoxyd.* Vf. bestimmen die Krystallstruktur des tetragonalen Bleimonoxyd nach dem Laueverf. u. nach dem Spektrometerverf. Die Kantenlängen des Elementarparallelepipeds sind $a = 3,99$, $c = 5,01$ Å. Der Strukturfaktor ergibt für die Atomschwerpunkte folgende Koordinaten im Raumgitter: 2Pb: $(0, \frac{1}{2}, u)$, $(\frac{1}{2}, 0, \bar{u})$; 2O: (000) , $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0)$; $u = 0,24$. Die O-Atome besetzen also die Eckpunkte der Mitte der Basisfläche der tetragonalen Säule, während die Pb-Atome auf den vertikalen Mittellinien der Prismenflächen einmal in etwa $\frac{1}{4}$ der Höhe, das zweite mal in etwa $\frac{3}{4}$ der Höhe liegen. (Journ. Americ. Chem. Soc. **46**. 2457—38. 1924. Californien, Inst. of Techn.)

A. E. van Arkel, *Krystallbau und physikalische Eigenschaften.* Vf. erhält ähnlich einem früher angegebenen Verf. (Physica **3**. 76; C. 1924. I. 151) die Verbindungen TiN , TiC , ZrN , ZrC , TaN u. TaC durch Abscheidung dieser Verbb. aus der Gasphase auf einem Wolframdraht her. TiC wird z. B. nach der Rk.:



auf dem heißen W-Draht als zusammenhängende krystalline Schicht niedergeschlagen. Wird dem Gasgemisch N_2 zugesetzt, dann werden die Nitride gebildet. TiN , TiC , ZrN , ZrC u. TaC krystallisieren kub. im NaCl-Typus, TaN hexagonal im Wurtzit-typus. Die Kantenlänge a des Elementarparallelepipeds u. das Molekularvolumen MV beträgt

	TiN	TiC	ZrN	ZrC	TaN (hex.)	TaC
a	4,23	4,29	4,59	4,71	3,05, $c:a = 1,62$	4,56
MV	13,3	11,8	13,9	15,0	10,2	14,7

Das Intensitätsverhältnis der einzelnen Linien der Röntgenogramme spricht mehr für neutrale Atome als Gitterpunkte als für Ionen. Die Verbb. zeigen mäßige Leitfähigkeit u. hohen F. — Weiter wurden ZrO_2 , ThO_2 , UO_2 u. SrF_2 untersucht, welche Flußspattypus besitzen.

	ZrO_2	ThO_2	UO_2	SrF_2
a	5,08	5,26	5,48	5,86 Å
MV	19,8	26,5	—	—

Analog den Nitriden wurde ZrS_2 u. $ZrSe_2$ hergestellt. Beide krystallisieren hexagonal. Atomkoordinaten: Zr (000) , 2S: $(\frac{2}{3}, \frac{1}{3}, u)$, $(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \bar{u})$.

	a	$c:a$	MV
ZrS_2	3,68 Å	1,59	41,6
$ZrSe_2$	3,69 „	1,70	46,6

Mit der Änderung der Krystallstruktur von den Nitriden u. Carbiden zuletzten Oxyden, Sulfiden u. Seleniden u. mit der Änderung des Molekularvolumens aus der Krystallstruktur berechnet) geht auch die Änderung der physikal. Eigenschaften im Sinne der Kosselschen Theorie parallel. (Physica **4**. 286—301. 1924. Eindhoven.)

PHILIPS Glühlampenfabr. Sep. v. Vf.)

Nicolas Perrakis, *Über die thermodynamische Deutung der Ionisationspotentiale.* (Vgl. PERRAKIS u. BEDOS, S. 346.) Die zum Abreißen des Elektrons nötige Arbeit ist eV_m (e die Elektronenladung, V_m das Potential der Ionisation); Vf. setzt sie gleich der freien Energie des Ionisationsvorganges: $V_m = (dU - TdS)/e$. Da S die Entropieänderung bei der Elektronenabgabe, eine Konstante ist (vgl. C. d.

d. des sciences 179. 562; C. 1924. II. 2738), so gilt: $V_m = (dU - C_j T)/e$.
d. l'Acad. des sciences 179. 1253—55. 1924.)

BIKERMAN.

Fladys A. Anslow, *Die Ionisierung der Luft durch Elektronen verschiedener Geschwindigkeit*. Glühelatronen werden aus dem Hochvakuum durch eine capillare Öffnung der Anode in eine halbkugelförmige Ionisierungskammer hineingeschossen. Dieser kann der Luftdruck so reguliert werden, daß die freie Weglänge der Ionen eben mit dem Kugelradius zusammenfällt. So kann die Zahl der Ionen u. der von ihnen bei höherem Druck erzeugten positiven Ionen elektromagnetisch gemessen werden. Die Ionisierung der Luft setzt bei 17 V ein, bei der Ionisierungsspannung des N₂ u. steigt dann schnell zu einem Maximum zwischen 150–180 Volt. Die Ionisierungsspannungskurve zeigt ferner Knicke scharfen Anstiege bei 170, 250, 375 u. 500 V, entsprechend der Abspaltung der L-Elektronen u. der K-Elektronen des N u. O. Oberhalb 550 V findet ein steiler Anstieg bis bei 1000 V die Neigung der Kurve gleichmäßig wird. Die Messungen erstreckten sich bis 1500 Volt. Bezeichnet R die Reichweite der Elektronen in cm bei 30 mm Druck, V das beschleunigende Potential, so bestätigt sich die aus der klassischen Theorie abgeleitete Beziehung $V = 16300 \sqrt{R}$. Auf Grund dieses Gesetzes u. des experimentell ermittelten Zusammenhanges zwischen Spannung u. Ionenmenge wird die pro cm Weglänge bei 1 mm Druck erzeugte Ionenmenge berechenbar. Sie hat ein Maximum bei 990 Volt. (Science 60. 432—33. 1924. Göttingen-Universität.)

CASSEL.

C. Lind und D. C. Bardwell, *Die durch Radiumstrahlen in durchsichtigen Mineralien und Edelsteinen hervorgerufene Färbung und Thermophosphoreszenz*. (Vgl. Ann. Franklin Inst. 196. 375. 197. 253; C. 1924. I. 2236. 2872.) Während Diamant nur auf α -Strahlen durch Grünfärbung reagiert, sind andere Mineralien gegen β -Strahlenarten empfindlich. Die meisten phosphoreszieren nur in α -Strahlen, die überhaupt nicht. — Es soll dabei eine Umlagerung von Elektronengruppen in eine metastabile Lage eintreten, ohne daß sich die Anordnung der Atome im Kristall verändert. Dabei ist die Anzahl der umgelagerten Elektronen im Verhältnis zu vorhandenen sehr klein. Die Energie, die zum Hervorbringen einer Färbung erforderlich ist, ist also gering. (Ann. des mines 8. 171—80. 1923; N. Jahrb. Mineral. 1924. II. 162. Ref. W. EITEL.)

ENSZLIN.

L. Rausch v. Traubenberg, *Über Asymmetrien in der Intensitätsverteilung des Kanalstrahlen ausgesandten Lichtes*. Verss. des Vf. ergaben, daß die Asymmetrie des Kanalstrahlungsfeldes zum größten Teil im Verh. der bewegten Intensität zu suchen ist. (Physikal. Ztschr. 25. 606—7. 1924.)

BECKER.

L. Rausch v. Traubenberg, *Über das Verhalten des Leuchtens von Kanalstrahlen bei ihrem Übergang aus einem elektrischen Felde in einen feldfreien Raum*. (Versuchen von B. M. Bloch.) Es wurde ein Kanalstrahl auf dem Wege vom elektrischen Feld—Grenze—feldfreier Raum beobachtet u. festgestellt, daß gleich hinter der Feldgrenze die durch den Starkeffekt bedingte Aufspaltung der Spektrallinien verschwindet u. die unzerlegte Linie wieder auftritt. (Physikal. Ztschr. 25. 607. 1924. Prag.)

BECKER.

Halpern, *Zur Theorie der Röntgenstrahlstreuung*. Mathemat. Ableitung, die Analogien mit den Compton-Debyeschen Streutheorien ergibt. (Ztschr. f. Physik 30. 153—72. 1924. Wien.)

BECKER.

C. Menzies, *Optische Trennung und Ordnungszahl*. In der relativist. Formel zur Trennung der Röntgenstrahlendoublets u. Triplets $d\nu = K(Z - s)^4$ bedeutet die Doubletauflösung, K eine Konstante, Z die Ordnungszahl u. s die Abschirmungskonstante. Es zeigt sich nun eine direkte Proportionalität zwischen s und Z , welche sich auch auf die ionisierten Elemente erstreckt. Diese lineare

Proportionalität kann bei der Deutung der Spektralserien von Bedeutung sein. (Nature **114**. 861. 1924. Leeds, Univ.) BECKE

D. Coster und S. Goudsmit, *Über die Intensität der Röntgenspektrallinien*. (Z. Naturwissenschaften **12**. 724; C. **1924**. II. 2007.) Ausgehend vom Standpunkt der Landéschen Analogie zwischen Röntgentermen u. opt. Dublettermen finden sie, daß sich die für opt. Multipletts aufgestellte Intensitätsregel von BURGER u. DORE (Ztschr. f. Physik **23**. 258; C. **1924**. I. 2862) unmittelbar auf Röntgenterme übertragen zu lassen scheint. Prüfung von Messung u. Theorie liefert für die einzelnen Multipletts qualitativ gute Übereinstimmung. (Naturwissenschaften **13**. 11–12. Haarlem.) JOSEPH

S. Rosseland, *Spektraltheorie und der Ursprung der Nebuliumlinie*. Vf. hält es auf Grund theoret. Erwägungen für möglich, daß die sogenannte Nebuliumlinie mancher Sternenspektren von einem stark ionisierten H oder He bei einem außerordentlich tiefen Druck herrührt. Mit ird. Hilfsmitteln sind diese Bedingungen nicht zu erzielen. (Nature **114**. 859–60. 1924. Mount Wilson Observatory.) BECKE

W. W. Shaver, *Bemerkung über die elektrodenlose Entladung in Phosphor- und Schwefeldämpfen*. Vf. untersucht das Spektralgebiet zwischen 1900 u. 1450 Å. an P u. S mit einem Fluoritspektrographen. Die Anregung erfolgte mittels elektrodenloser Entladung. Als Standard für die Wellenlängenmessungen wurde der Kolnstoffvakuumbogen benutzt. Die Aufnahmen wurden mit Schumannplatten gemacht. Deren Expositionszeit für die Spektren der elektrodenlosen Entladung 12 Min. für das Vakuumbogenspektrum des C 4 Min. währte. Unter dem Einfluß der elektrodenlosen Anregung zeigte sich im P-Dampf anfangs bei Zimmertemp. eine glänzende Ringentladung, doch verschwindet der gelbe P bald, u. das Entladungsgefäß enthält innen einen dünnen roten Beschlag. Darum war es notwendig, das Entladungsgefäß auf ca. 250° zu erhitzen, bevor die Entladung wieder auftrat. Das Spektrum des P ist in dem gemessenen Bereich nicht sehr intensiv. — Die elektrodenlose Entladung rief im S-Dampf bei 115° einen bläulichweißen, leuchtenden Ring hervor. Im Bogenspektrum kam das erste Triplett der scharfen Serien intensiv heraus. In der Nähe jeder Komponenten trat eine 2. Linie auf. (Proc. Trans. Roy. Soc. Canada [3] **18**. Sekt. III. 145–49. 1924. Toronto, Univ.) JOSEPH

D. S. Ainslie, *Veränderungen in der Struktur der roten Lithiumlinie $\lambda = 6708$ Å*. (Vgl. MC LENNAN u. AINSLIE, Proc. Royal Soc. London Serie A. **101**. 342; C. **1923**. I. 287.) Mit einer besonders konstruierten Vakuumbogenlampe als Strahlungsquelle konnte Vf. unter verschiedenen Bedingungen Veränderungen in der Struktur der roten Linie des Li $\lambda = 6708$ Å. bewirken. Metall. Li, LiCl, LiF, Li₂CO₃, Li₂O oder Li-Citrat waren in der positiven Kohle zylindr. eingebettet, welche ihrerseits teilweise in die Fe-Elektrode eingesetzt war, von der sie therm. isoliert war. Die zur Erzeugung der verschiedenen Strukturarten der Linie nötige Stromstärke hing von der angewandten Li-Verb. ab. LiF u. LiCl gaben die besten Resultate. Am Anfang einer Versuchsreihe wurde gewöhnlich bei 4–6 Amp. das einfache Dublett erhalten, bei höherer Stromstärke wurde der Abstand der Komponenten größer, die kürzere, die etwa doppelt so stark war wie die andere, wurde geteilt und das Triplett erhalten. Bei 7 Amp. entstand ein dichtes Quadruplett, das leicht wieder in ein Triplett verwandelt werden konnte, dessen Komponenten verschiedene Intensität hatten. Quantitative Beziehungen zwischen der Struktur der Linie u. der Stromstärke ließen sich nicht aufstellen, da der Dampfdruck in dem Bogenbogen auch eine Rolle spielt. In dem übrigen Spektrum wurden bei Veränderung der Linie $\lambda = 6708$ keine entsprechenden Änderungen wahrgenommen. Im Absorptionsspektrum von metall. Li wurden zwischen 4132 u. 3232 zahlreiche gut markierte Banden gefunden. Beziehungen zur Theorie von NAGAOKA u. SUGIURA (Naturwissenschaften **13**. 11–12. Haarlem.) JOSEPH

3532; C. 1924. I. 2854) ließen sich nicht auffinden. (Trans. Proc. Roy. Soc. Canada [3] 18. Sekt. III. 137—43. 1924. Toronto, Univ.) JOSEPHY.

J. J. C. Ireton, *Das äußerste ultraviolette Spektrum von Germanium und von Antimon*. Das Spektrum des Ge, das bisher nur für $\lambda \geq 2138,7 \text{ \AA}$. bekannt war, wurde in das ultraviolette Gebiet bis zu $\lambda = 319,7 \text{ \AA}$. erweitert, wobei 64 Linien aufgefunden wurden. Das Funkenspektrum des Se wurde um den Bereich $\lambda = 2233,7 \text{ \AA}$. bis $\lambda = 507,0 \text{ \AA}$. erweitert u. darin 45 Linien gefunden. Die Intensitäten, Wellenlängen u. Schwingungszahlen sämtlicher Linien sind in Tabellen gegeben. Die Ausgangsmaterialien waren die reinen Oxyde, die mit fein verpulvertem Al in Stangen gepreßt wurden, welche als Elektroden dienten. Von dem Al wurde ein Vergleichsspektrum erzeugt. (Proc. Trans. Roy. Soc. Canada [3] Sekt. III. 103—9. 1924.) JOSEPHY.


W. F. Meggers, *Regelmäßigkeiten im Bogenspektrum des Niobs*. (Vgl. S. 338.) Vf. gibt die Serien u. Multipletts, sowie den Zeemaneffekt einiger Nb-Linien an. (Journ. Washington Acad. of Sciences 14. 442—46. 1924. Bureau of Standards.) BECKER.
Robert S. Mulliken, *Der Elektronenzustand des CN-Moleküls*. (Vgl. FREUNDLICH u. HOCHHEIM, Ztschr. f. Physik 26. 102; C. 1924. II. 1661.) Vf. bespricht das CN-Spektrum betreffenden letzten Arbeiten. (Nature 114. 858—59. 1924. Harvard-Univ.) BECKER.

Guillaume C. Lardy, *Ultraviolette Absorptionsspektren einiger Ketene und ihrer Derivate*. Verbb., die 2 Chromophore nahe beieinander im Mol. besitzen, wie die Diazoverbb., Ketene, Azide u. i-Cyanate sind schon früher von STAUDINGER (vgl. Ber. d. chim. Acta 5. 87; C. 1922. III. 1002) durch chem. Rkk. verglichen worden. STAUDINGER hat für die Verbb. mit ungesätt. N u. dem Chromophor $\text{—N}\equiv\text{N}$ den Namen „Azene“, u. für die Derivv. von $\text{—C}\equiv\text{O}$ den Namen „Carbonylene“ geprägt. STAUDINGER hat die Unterss. der nämlichen Verbb. mit Hilfe der Absorptionsspektren konnte zu den gleichen Resultaten wie STAUDINGER gelangen. Die Unterschiede der Absorptionsspektren der Gruppen u. untereinander sind solche der Stabilität. Die Spektren der Diazoverbb. u. der Ketene weisen große Analogie auf; beide haben eine sehr starke Absorption im Ultravioletten u. eine zweite an der Grenze des sichtbaren Gebietes. Versuche wurden ausgeführt an *Diphenyldiazomethan* u. *Diphenylketen*. Die stärker absorbierenden Ketene haben somit auch größere chem. Aktivität. Mit der verschiedenen Lage der Absorptionsbande hängt auch die Tatsache zusammen, daß sich die Ketene erst bei höherer Temp. als die Diazoverbb. zers. Die gleiche Analogie besteht zwischen Ketenen u. i-Cyanaten. Letztere haben die den Ketenen entsprechende Bande im Sichtbaren. Im äußersten Ultraviolet zeigen sie starke, aber weniger intensive Absorption als die Ketene, wie die Versuche mit *Diäthylketen* u. *Diphenylketen* einerseits u. *Äthyl-* u. *Phenyl-i-cyanat* andererseits dartun. Die Reaktionsfähigkeit mit Aminen u. Alkoholen ist bei den Cyanaten geringer als bei den Ketenen. Aus der Intensität der Banden geht hervor, als es die chem. Methoden zeigen können, hervor, daß die Stabilität des Diazoverbb. Chromophors $\text{—N}\equiv\text{N}$ größer ist als die der Äthylenbindung der Ketene. Analogie Beziehungen existieren zwischen Diazoverbb. u. Aziden. Die Bande des Aziden Chromophors der Azide ist weniger als bei den Diazoverbb. gegen Rot verschoben; seine Wrkg. ist sehr abgeschwächt. Der Einfluß der Imidgruppe besteht darin, die Bande des $\text{—N}\equiv\text{N}$ gegen Ultraviolett zu verschieben. Aus den Ultraviolet-, wie auch aus den Infrarotspektren kann die Beziehung abgeleitet werden, daß sich die Diazoverbb. zu den Aziden verhalten wie die Ketene zu i-Cyanaten.

Das Absorptionsspektrum der Ketene ist sehr charakterist. u. weist 2 Banden auf: eine sehr starke im Ultraviolett u. eine dem Aceton analoge an der Grenze des sichtbaren Spektrums. Lage u. Stärke sind abhängig von der Substitution in

der Methylengruppe. Die Werte für λ der 1. Bande betragen für *Keten* 324 Å, *Diäthylketen* 3734 Å, *Dipropylketen* 3791 Å, *Diphenylketen* 4009 Å, in derselben Reihe für die 2. Bande $\lambda = < 2000$ Å, 2242 Å, 2190 Å, 2600 Å. Die Verschiebung der 2. Bande nach dem Sichtbaren erscheint als Funktion der Masse des Substituenten, ihrer chem. Natur. Die Verschiebung zwischen Diäthyl- u. Dipropylketen beträgt $\nu = -12 \cdot 10^{12}$. Wenn k den Wert für die Instabilität des einfachen Ketens stellt, so lassen sich für die substituierten Derivv. durch Multiplikation mit den Werten der spezif. Verschiebung die entsprechenden Beträge der Ungesättigtheit der substituierten Ketene berechnen: Keten $1 \cdot k$, Diphenylketen $2,7 \cdot k$, Dipropylketen $3,6 \cdot k$, Diäthylketen $4,9 \cdot k$. Diese Zahlen entsprechen auch der Polymerisationsgeschwindigkeit der verschiedenen Ketene. Die Reaktionsfähigkeit ist abhängig von der Carbonylgruppe u. entspricht der Intensität der 1. Absorptionsbande. Für das Diphenylketen ist sie etwa 20-mal größer als wie für die anderen Derivv. Die Anwesenheit zweier Chromophore in den Ketenen läßt eine 1. Ordnung ($\text{C}=\text{C}$) u. eine solche 2. Ordnung ($\text{C}=\text{O}$) möglich sein. Die Polymerisation entspricht jener 1. Ordnung u. hängt ab von der Ungesättigtheit der Gruppe $\text{C}=\text{C}$ proportional einer größeren Bandenverschiebung. Die Addition von Alkoholen u. Aminen sind Beispiele für die Rkk. 2. Ordnung. Entsprechend der Intensität der Bande der Carbonylgruppe reagiert Diphenylketen sehr rasch mit W. u. A. u. den Basen; dagegen die aliph. Ketene u. Keten selbst viel langsamer.


Da die Dimeren der Ketene mit gewissen synthet. Verbb. isomer sind, die ausgehend von Acetondicarbonsäureester gewonnen wurden, war die Frage, welche Isomerie diesen Prodd. zuerkannt werden muß, zu entscheiden: einfache Desotopie (I u. II) oder Valenzisomerie (III). SCHROETER (vgl. Ber. Dtsch. Chem. Ges. 53. 1917; C. 1920. III. 924) hatte sich für letztere (Polymoleküle) eingesetzt. Zur Klärung untersuchte Vf. die Absorptionsspektren der Dimere der Ketene u. fand:



daß die Ansichten SCHROETERS hiermit nicht in Einklang zu bringen sind. In der Tat haben es mit Derivv. von β -Diketonen zu tun u. besonders im Falle der Aromatiketen bedürften die heutigen Anschauungen weiterer Nachprüfung. — Das Absorptionsspektrum des tetrasubstituierten *Diketocyclobutans* durch Polymerisation erhalten, stellt eine komplexe 1. Bande dar, die den Derivv. mit der Gruppe $\text{C}=\text{O}$ ähnlich ist. Es wurden Messungen ausgeführt an *Tetraäthyl-, Tetrapropyl-, Tetraäthyl-, Dimethyldiphenyldiketocyclobutan* (Tabellen im Original).

Die Intensität der Bande wächst proportional der Masse u. der Natur der Substituenten. Sie ist besonders stark für das Phenylderiv. Diese Bande setzt sich aus mehreren einzelnen zusammen, von denen die erste breit ist, während die beiden anderen sehr schmal sind, was als neue Beobachtung für aliph. Verbind. recht bemerkenswert ist, da für diese bislang schmale Banden nicht bekannt waren. Es unterscheiden sich also Äthylenbindung, aromat. Gruppe u. cycl. β -Diketonen durch eine starke Absorption im äußersten Ultraviolett.

Zum Vergleich mit enolisierbaren β -Diketonen wurde *Acetylaceton* herangezogen, das je nach dem Lösungsm. verschiedene Bande aufweist. In Hexan (92% Ethylform): $\lambda = 2960$ Å, $\epsilon = 12100$, $\nu = 1115 \cdot 10^{12}$; in wss. alkal. Lsg. $\lambda = 3000$ Å, $\epsilon = 14100$, $\nu = 1000 \cdot 10^{12}$. Für das hierher gehörige *Diphenyldiketocyclobutan* besitzt die Ketoform (in Hexan) 2 Banden mit der Schwingungszahl $981 \cdot 10^{12}$ u.



1211·10¹². In Wirklichkeit ist diese Lsg. in Hexan ein Gleichgewicht der beiden tautomeren Formen Diketon u. Enol (nebensteh.). Bisher war

dem. Rkk. der Nachweis der Enolform des Diketons nicht möglich gewesen. Die Formen unterscheiden sich aber durch ihre physikal. Eigenschaften scharf voneinander. Am *Dimethyldiketocyclobutan*, das in äth. Lsg. 2 Banden ($\lambda_1 = 2706 \text{ \AA}$, $\lambda_2 = 2315 \text{ \AA}$) u. in wss. Lsg. eine Bande ($\lambda = 2595 \text{ \AA}$) besitzt, wird gezeigt, daß es nur als Enolform existiert. Dimethyldiketocyclobutan ist vollständig monomeres u. vermutlich in äth. Lsg. dienolisiert. Auf chem. Wege war letzteres bisher nicht erwiesen worden. Die Übereinstimmung der Intensitäten der Banden in äth. u. in wss. Lsg. scheinen zu bestätigen, daß diese Verb. als Diketonverb. besteht. — Im Anschluß an das Diphenyldiketocyclobutan ordnet Vf. auf Grund der Absorptionsspektalanalyse das Dimere des Ketens in die Gruppe der dimerisierbaren β -Diketone. Sein Absorptionsspektrum besteht aus 2 Banden, deren Lage u. Stärke vom Lösungsm. abhängt, kann als Enolbande betrachtet werden. Sie ist entsprechend dem minimalen Prozentgehalt sehr schwach (0,68% Enol in Hexanlsg., 1,2% in äth. Lsg.). Wegen dieser geringen Konz. haben bislang auch chem. Nachweise der Enolform versagt. — Vf. ordnet auf Grund der gefundenen vergleichenden Beziehungen der Absorptionsspektren der Ketons, Dimethylecyclobutans in der Enolform u. des Dimeren von Keten drei tautomere Formen (IV—VI) vor, die einem Gleichgewicht in der Lsg. des Dimers von Ketocyclobutans zwischen der Diketonform u. den Enolformen (in sehr schwacher Konz.) entsprechen. Einzelheiten der spektrometr. Messungen in zahlreichen Tabellen (Journ. de Chim. physique **21**. 281—307. 1924. Zürich, Univ. u. Zentr. Anst. für phys. Chem.).

HORST.

W. Sweitzer, *Lichtzerstreuung in Salzlösungen*. Staubfreie Lsgg. von NaCl, KCl u. Na₂SO₄ wurden hergestellt. Als Ndd. wurden Cd(OH)₂ u. Al(OH)₃ benutzt. An Na₂SO₄-Lsgg. wurden auch Kompressibilitätsmessungen ausgeführt. Für verschiedene Konz. der Salzlsgg. wurden die Lichtzerstreuung u. der Depolarisationsfaktor bestimmt. Die Ergebnisse werden mit den nach der Formel von SMOLUCHOWSKI-EINSTEIN-CABANNES berechneten verglichen. In allen Fällen ist die beobachtete Streuung kleiner als die berechnete trotz Fehlerquellen, die eher zu höheren Werten liefern müßten. (Proc. Trans. Roy. Soc. Canada [3] **18**. Sekt. III. 125—126. 1924.)

JOSEPHY.

H. Martin, *Die Beziehung zwischen der Depolarisation bei der Zerstreuung von Licht und dem Kerreffekt in Flüssigkeiten*. Vf. prüft die Theorie von GANS über die Beziehung zwischen dem Depolarisationsfaktor von zerstreutem Licht u. den Konstanten der elektr. Doppelbrechung an *Bzl.*, *Toluol*, *Xylol*, *Chlorbenzol*, *Benzol*, *Pentan*, *Hexan*, *CHCl₃*, *CCl₄*, *Methylalkohol*, *n-Propylalkohol*, *i-Butylalkohol*, *CS₂*, *A.*, *W.* u. findet gute Übereinstimmung zwischen Theorie u. Experiment. Messungen an Nitrobenz. in einem magnet. Feld von 5000 Gauß ergaben keine Beeinflussung der Depolarisation des zerstreuten Lichtes, was aber im Widerspruch zur Theorie steht. (Journ. Physical. Chem. **28**. 1284—90. 1924. Toronto.)

BECKER.

William P. Headden, *Beeinflussung der Luminescenz von Inglesidcalciten durch Röntgenstrahlung*. Vf. macht die Beobachtung, daß die Empfindlichkeit verschiedener Calcite von verschiedenen Fundorten gegen Sonnenlicht sehr stark von der Vorbehandlung, wie Waschen mit HCl oder HNO₃ oder Vorbelichtung abhängt. Nach dem Waschen in HCl sind die Calcite meistens viel empfindlicher gegen Sonnen-

licht als vorher. (Amer. Journ. Science, SILLIMAN [5] 8. 509—17. 1924. Coll. J. COLLINS [Col.])

Herbert E. Ives, *Photoelektrische Eigenschaften dünner Häute der Alkalimetalle*. Vf. untersucht die Abhängigkeit des photoelektr. Verh. von der Schichtdicke an dünnen Na-, K-, Rb- u. Cs-Häuten, die durch Verdampfen der sorgfältig gereinigten Alkalimetalle im Hochvakuum auf Pt, Au, Ag, Cu, Ni, W, Ta u. C niedergeschlagen wurden, bei Bestrahlung mit parallel u. senkrecht zur Einfallsebene polarisiertem Licht. Der selektive Photoeffekt (enorme Steigerung der Emission für parallel zur Einfallsebene polarisiertes Licht bei hohen Einfallswinkeln) tritt nur in einem gewissen Schichtendickenbereich auf u. ist von der Metallunterlage abhängig; er tritt bei Au u. C u. ist für gelbes Licht weniger ausgesprochen als für blaues Licht. Die spektrale Verteilung der lichtelektr. Empfindlichkeit ist dagegen im allgemeinen von der Unterlage unabhängig. Mit wachsender Schichtdicke geht die photoelektr. Empfindlichkeit u. etwas später der selektive Effekt durch ein Maximum; die langwellige Grenze der Emission rückt zuerst gegen längere Wellen u. nach Überschreiten des Empfindlichkeitsmaximums zurück gegen Violett. Bei sehr dünnen Häuten u. dicken Schichten fehlt der selektive Effekt, u. die Kurven der spektralen Verteilung der Empfindlichkeit haben für beide Polarisationsrichtungen gleiche Gestalt. Die von POHL u. PRINGSHEIM an K u. Rb beobachteten u. von LIEBEMANN für Cs vorausgesagten selektiven Maxima bei 430, 480 u. 550 $\mu\mu$ wurden nicht bestätigt; bei Na u. Rb scheinen Maxima im Ultraviolett zu existieren. Cs u. Rb besitzen Andeutung einer Bandenstruktur der selektiven Emission. (Astrophys. Journ. 60. 209—30. 1924.)

KRÜGE

Herbert E. Ives und **A. L. Johnsrud**, *Der normale und selektive photoelektrische Effekt bei den Alkalimetallen und ihren Legierungen*. Vf. untersucht die photoelektr. Eigenschaften spiegelnder Oberflächen der bei Zimmertemp. fl. Legierungen Na-K, Na-Rb, Na-Cs, K-Cs, Rb-Cs u. von Na, K, Rb, Cs u. K-Rb bei Temp. wenig über dem F. Der selektive Photoeffekt (vgl. vorst. Ref.) ist nur bei Na-K merklich vorhanden, ist also nicht notwendigerweise mit dem Auftreten des Wellenlängenmaximums der Emission verbunden u. scheint eine bestimmte Orientierung der Atome an der Oberfläche vorauszusetzen. Bei Na-Rb, Na-Cs, K-Cs, K-Cs, Rb-Cs treten für parallel zur Einfallsebene polarisiertes Licht Maximalen Empfindlichkeit zwischen 420 u. 480 $\mu\mu$ auf; die Lage der Maxima u. der langwelligen Grenze ν_0 der Emission hängt von der Oberflächenbeschaffenheit des Alkalimetalls ab; die Verschiebung erfolgt im Sinne der Richardsonschen Formel $\nu_{\max} = \frac{2}{3} \nu_0$. Die von anderen Beobachtern für K, Rb, Cs gefundenen selektiven Maxima bei 435, 480 u. 550 $\mu\mu$ sind nicht vorhanden. Cs u. Cs-Legierungen zeigen Maxima auch in der Kurve der spektralen Verteilung des normalen Effekts. (Astrophys. Journ. 60. 231—42. 1924. Amer. Telephone and Telegraph Co. u. Westinghouse Electric Co.)

KRÜGE

A₂. Elektrochemie. Thermochemie.

Friedrich v. Rautenfeld, *Elektrizitätsleitung in Steinsalz und Kalkspat bei hohen Temperaturen*. (Gekürzt.) Die Krystallplatten wurden beiderseits mit katalytisch zerstäubtem Pt überzogen u. in einer Zange aus Marquardtrohren, durch welche die Zuleitungen zu einer Brücke führten, festgeklammert. Benutzt wurde Wechselstrom u. Gleichstrom. Bei NaCl zeigte sich elektrol. Leitfähigkeit. Sie nahm zwischen 500 u. 790° linear zu u. gehorchte einem Gesetze $\sigma = a e^{b/T}$. Ein Unterschied in der Leitfähigkeit in der Würfel-, Rhombendodekaeder- u. Oktaederfläche besteht nicht. Dagegen zeigt Kalkspat eine Abhängigkeit der Leitfähigkeit von der Temp., wie es bei Isolatoren der Fall ist. Die Leitfähigkeit ließ sich hier durch die Beziehung $\sigma = C e^{-v/T}$ darstellen, wobei C eine Konstante u. v eine konstante Wärme

ist. Parallel u. senkrecht zur Hauptachse sowie senkrecht zur Spaltfläche die Leitfähigkeit verschieden. (Physikal. Ztschr. 25. 602—4. 1924. Würz-BECKER.

Scarpa, *Neue Versuche über die Leitfähigkeit und Ionisation der Elektrolyte.* untersucht den Einfluß der Bewegung u. des magnet. Feldes auf Elektrolyte. chim. ital. 54. 860—75. 1924. Turin, Politecn.) ZANDER.

Semenoff, *Über die Berechnung der magnetischen Momente der Atome.* Vf. auf einen bisher unbeachteten Fehler aufmerksam, welcher die Berechnung magnet. Atommomente aus den Verss. von GERLACH und STERN (Ztschr. f. Physik 9. 349; C. 1923. I. 729) bis 100% verfälschen kann. Die Größe des Fehlers ist spaltbreite bei der Versuchsanordnung proportional. (Ztschr. f. Physik 30. 52. 1924. Petersburg, Röntgeninst.) BECKER.

P. T. Tyndall, *Der Barkhauseneffekt.* Ein Stahldraht mit 4,2% Si wird in magnet. Feld gebracht, welches kontinuierlich um 0.13 Gauß in 2 Sek. zunahm. diskontinuierliche Magnetisierung des Stahles wurde gemessen, indem der Draht mit einer dünnen Spule umgeben wurde, welche mit einem Oszillographen verbunden stand. Dieser zeigte Kurven mit einer zufälligen Verteilung in der Größe u. der Größe des Effektes. Die Dauer eines Impulses hing wahrscheinlich von der B. von Wirbelströmen in dem Draht ab. Für einen Draht von 0.5 mm Durchmesser u. 4% Si berechnet sich die Impulsdauer zu 3.10^{-5} Sek. Vf. an, daß jeder Impuls bei der diskontinuierlichen Magnetisierung durch eine schnelle Sättigung eines kleinen Teils des gesamten Materials hervorgerufen ist, die Änderung im magnet. Moment dieses kleinen Anteils zwischen 0,001 und 0,008 E.M.E. beträgt. Die Korngröße spielt bei diesem Effekt keine Rolle. Ergebnis bestätigt die Barkhausensche Theorie, daß magnet. Stoffe diskontinuierlich magnetisiert werden. Physical Review [2] 24. 439—51. 1924. Amer. Phys. Soc. and Electr. Co. and Western Electr. Co.) BECKER.

Hagenbach und W. P. Lüthy, *Versuche zur Bestimmung des Schmelzwertes der Kohle.* Die von Vf. nach demselben Prinzip wie die von FAJANS u. KEWITSCH (Naturwissenschaften 12. 304; C. 1924. II. 293) ausgeführten Versuche führten zu ungefähr demselben Ergebnis. (Naturwissenschaften 12. 1183—86. Basel.) JUNG.

Frank B. Kenrick, C. S. Gilbert und K. L. Wismer, *Das Überhitzen von Flüssigkeiten.* Vf. stellen eine Anzahl von Verss. mit überhitzten Fl. an, indem sie Capillaren mit der betreffenden Fl. füllen u. diese dann in ein Bad werfen, dessen Temp. erheblich über dem Kp. der Fl. liegt. Die Zeit, welche bis zur Explosion der Capillaren vergeht, dient als Maß für die Überhitzungsfähigkeit. Es spielt die Art u. das Material der Capillare eine große Rolle. Weitere Versuche wurden unternommen, indem der Druck über der Fl. in einem geschlossenen System erniedrigt wurde, so daß Temp. von 50 bis 170° über dem Kp. erreicht wurde. Die Zeit, welche nach der Druckentspannung bis zum Aufsteigen von Blasen verging, war ebenfalls ein Maß für die Überhitzung. In frisch gegebenen Capillaren wird die Entstehung der Blasen in den überhitzten Fl. durch die Blasen begünstigt, welche von den Gefäßwänden herzurühren scheinen. Dagegen tritt in Fl. gelöste Gase nach an der Glaswand adsorbierte Gase eine Verhinderung der Bildung der Blasen, welche aus Fl. von der höchsten Temp., bis auf die diese überhitzt werden können, entweichen, ist 2,5 bis 16 $\mu\mu$. Es besteht eine einfache Beziehung zwischen dem Enddruck u. der maximalen Überhitzungstemp. Es wurden folgende Fl.: Ä., A., Methylalkohol, CHCl_3 , Aceton, CS_2 , H_2O , Benzol, Chlorbenzol, Brombenzol, Anilin, m-Xylol u. Lsgg. von Stärke, Ag-, Pt-Sol in W. (Journ. Physical Chem. 28. 1297—1307. 1924.) BECKER.

Frank B. Kenrick, K. L. Wismer und K. S. Wyatt, *Übersättigung von Gasen in Flüssigkeiten*. (Vgl. vorst. Ref.) Vf. stellen übersätt. Lsgg. von O_2 , N_2 u. CO_2 in H_2O her, indem sie das unter 100 at befindliche Gas über der Wasseroberfläche auf 1 at entspannen, ohne daß Gasblasen aus der Fl. oder von den Gefäßwänden aufgestiegen wären. Steigende Temp. begünstigt das Aufheben der Übersättigung. Den gleichen Effekt zeigt kolloidales Pt, indem es die Bildung von Gasblasen begünstigt. Doch verliert es rasch seine Wirksamkeit. Ein langes Erhitzen des Gefäßes, in welchem die übersätt. Fl. sich befindet, begünstigt die Übersättigung. Obwohl CO_2 etwa 30mal löslicher ist als O_2 , ist für beide Gase die Zeit gleich, welche zwischen der Druckverminderung u. dem Aufperlen von Blasen verfließt. (Journ. Physical. Chem. **28**. 1308—15. 1924. Toronto, Univ.) BECKE

K. S. Wyatt, *Übersättigung von Gasen in Flüssigkeiten*. (Vgl. WISMER, Journ. Physical. Chem. **26**. 301; C. **1922**. III. 226.) Stark übersätt. Lsgg. von N_2 wurden hergestellt durch Erwärmen einer wss. Lsg. von Hydrazinsulfid, Ferrialaun u. H_2SO_4 auf 60° in einem vertikalen Glasgefäß, das durch eine Druckmaschine auf 150 at gehalten wurde. Beim Abkühlen auf 20° u. Reduzieren des Druckes auf 100 at zeigte das Aufsteigen von Gasblasen, daß der Gleichgewichtsdruck mindestens 100 at betrug. Dann wurde ein starker Lichtstrahl durch einen schmalen vertikalen Spalt in der Seite der schwarz gefärbten Röhre geführt u. der Druck plötzlich auf 1 at erniedrigt u. mit einer Linse durch den Spalt nur die in der Mitte der Röhre aufsteigenden Gasblasen beobachtet. Die von dem Boden der Röhre aufsteigenden Blasen brauchen einige Sekunden, bis sie in Sicht kommen. (Proc. Trans. Roy. Soc. Canada [3] **18**. Sekt. III. 127. 1924.) JOSEPH

H. A. Mc Taggart, *Eine Eigenschaft sehr kleiner Gasblasen in Wasser*. (Zbl. Philos. Magazine [6] **44**. 386; C. **1922**. III. 1150.) Vf. untersucht die Einw. sehr kleiner Gasblasen in W. auf geringe Spuren von Öl an ihrer Oberfläche mit dem Mikroskop. Die Versuchsanordnung ist sehr einfach. Ein Glastrog mit einem dünnen Glasdeckel ist mit W. gefüllt, das mehr oder weniger von darin gel. Öl befreit ist. Der Trog wird von unten beleuchtet u. von oben mit dem Mikroskop beobachtet. Die Luftblase, deren Größe im W. langsam abnimmt, indem sie im W. absorbiert wird, wird mittels einer Druckpipette durch ein Loch an der Seite in die Fl. gebracht. Die Luftblase steigt auf, bleibt gerade unter dem Deckel, aber nicht in direkter Berührung mit ihm, wenn er sorgfältig gereinigt war, sie behält Kugelgestalt u. bleibt vollständig von Fl. umgeben. Wenn mit der Ese die geringsten Spuren von Öl eingeführt werden, etwa indem die Spitze der Pipette mit einem Stück ölgiger Watte abgewischt wird, so wird das Öl erst sichtbar, wenn der Durchmesser der Luftblase bis auf $\frac{1}{10}$ mm abgenommen hat. In Gele kleiner Kügelchen bewegt es sich auf der Oberfläche, die kleinsten befinden sich in Brownscher Bewegung, sie werden um so näher zusammengebracht, je kleiner die Oberfläche der Luftblase wird; wenn die Kügelchen einander zu nahe kommen, werden die kleinsten in die Fl. zurückgedrängt. Wenn die Luft vollständig absorbiert ist, bleibt ein Schwarm winziger Ölkügelchen zurück, von denen eine Mikrophotographie aufgenommen wurde, ohne daß die Brownsche Bewegung stattfindet. Das Zurückstoßen der Kügelchen kann auf elektr. Abstoßung beruhen. (Proc. Trans. Roy. Soc. Canada [3] **18**. Sekt. III. 129—31. 1924.) JOSEPH

Sidney Walter Saunders, *Die Berechnung der Gleichgewichtskonstanten von Gasreaktionen*. Vorwiegend mathemat. Erörterungen. (Journ. Physical Chem. **8**. 1151—66. 1924. London, Univ.) CASSE

B. Anorganische Chemie.


H. Kautsky und G. Herzberg, *Über das Siloxen und seine Derivate*. Der Inhalt dieser Arbeit ist im wesentlichen schon referiert (vgl. Ber. Dtsch. Chem. **28**.

365; C. 1924. II. 2576). Nachzutragen ist: Bei der Darst. des *Triaminosiloxens* ribromsiloxen u. NH_3 -Gas unter Ä. wird das abgespaltene NH_4Br quantitativ len Blättchen der Si-Verb. eingeschlossen, so daß die Analyse die Zus. $\text{O}(\text{NH}_3)_6\text{Br}_3$ vortäuscht. Bei Verwendung von fl. NH_3 wird jedoch die NH_4Br -Verb. $\text{Si}_6\text{O}_3\text{H}_3(\text{NH}_2)_3$ erhalten. Sie ist leuchtend rot, fluoresciert ebenso, ist et empfindlich gegen Feuchtigkeit u. Luft, fängt an letzterer Feuer u. ver zu SiO_2 . Läßt man unter N langsam Luft Zutreten, so tritt starke rotgelbe lumineszenz auf. — Mit $\text{C}_2\text{H}_5\text{NH}_2$ entstehen braunrote Substanzen, mit $\text{C}_6\text{H}_5\cdot\text{NH}_2$ rotes *Trianilinosiloxen*. — *Hexamethoxydisiloxan* sd. unter 26 mm bei 100° . — Für *Siloxen* wird auch das nebensteh. vereinfachte Formelbild benutzt. — Eine Zusammenstellung der sicher bekannten oder doch qualitativ festgestellten Siloxenderivv. veranschaulicht den Zusammenhang von Konst. u. Lichtabsorption bzw. -emission. (Ztschr. f.



u. allg. Ch. 139. 135—60. Kaiser WILHELM-Inst. f. phys. Chemie u. Elektro-
(n.) LINDENBAUM.

Francesco Giordani, *Kinetik der Zersetzung von Natriumhypochloritlösungen*.
früher gegebenen Gleichungen über den Verlauf der Zers. von *Na-Hypo-*
lsgg. (vgl. Annali Chim. Appl. 1. 26; C. 1920. III. 72) werden vervollständigt
die Nebenrkk., die nach folgenden Gleichungen verlaufen:




den möglicherweise noch eine dritte hinzukommt: $3\text{NaClO}_2 = 2\text{NaClO}_3 + \text{NaCl}$.
z chim. ital. 54. 844—60. 1924. Neapel, Scuola Sup. Politecn.) ZANDER.



G. Gordon, *Ein bewiesenes Vorkommen des Eutektikums $\alpha\text{-CaO}\cdot\text{SiO}_2$* —
(2SiO_2). Eine wahrscheinlich aus Abfällen der Zementindustrie von Kingsport
stammende bräunlichgelbe dichte Masse von der ungefähren Zus. des Eu-
ms. D. 2,86. In HCl ll. Es konnten im Dünnschliff beide Krystallarten
geteilt werden. (Ann. des mines 8. 110f. 1923; N. Jahrb. f. Mineral. 1924. II.
ef. W. EITEL.) ENSZLIN.

Hönigschmid, E. Zintl und F. González, *Über das Atomgewicht des Zirkons*.
as soc. espanola Fis. Quim. 22. 432—62. 1924. — C. 1925. I. 28.) BEHRLE.

Rich Müller und Heinrich Möllering, *Potentiometrische Verfolgung der*
tion von Permanganat durch Ferroion und Jodion. Vff. untersuchen den
chismus der Rkk. von MnO_4' mit Fe'' u. J' durch Aufnahme der Potential-
anskurven. Die Titrationen wurden abwechselnd in schwefel- u. salzsaurer
unter Rühren ausgeführt u. die Abhängigkeit der Pt-Netzelektrode von der
g der zugesetzten Titerfl. bestimmt. 0,1-n. Lsgg. wurden verwandt. Per-
narat u. Ferrosalz a) in schwefelsaurer Lsg. Bei Titration von KMnO_4
 O_4 wird nur die Bruttorkk.:



inen Potentialsprung gekennzeichnet. Das Umschlagspotential $\varepsilon_U = +0,65$ V.
tritt nicht auf. Bei der Titration von FeSO_4 in KMnO_4 tritt offenbar noch
eischenstufe zwischen Mn(VII) u. Mn(II) auf, wahrscheinlich Mn(OH)_4 .
r ist die Reihenfolge der Rkk.:



ch erfolgt auch hier nur ein starker Potentialsprung nach Verlauf der
tk. mit $\varepsilon_U = +0,76$ V. Man läßt am besten die größte Menge der FeSO_4 -
it einem Mal zufließen u. nur den Rest langsam, was leicht nach der
ie des gegengeschalteten Umschlagspotentials geschieht (vgl. MÜLLER, Die
tmetr. Maßanalyse 2. u. 3. Aufl. S. 78). b) In salzsaurer Lsg. Bei der

Titration von KMnO_4 in FeSO_4 wird nach dem Sprung ein niedrigeres Potential erreicht, der Sprung ist also kleiner, weil nach Beendigung der Rk. (1) KMnO_4 aus der HCl frei macht, welches das Potential bestimmt. $\varepsilon_U = 0,67$ V. Zusatz von MnSO_4 oder auch noch von H_3PO_4 ändert den Verlauf der Spannungskurve nicht. Die nachträgliche Oxydation der HCl ist für die chem. Titration eine Fehlerquelle, für die potentiometr. nicht. Bei der Titration von FeSO_4 in KMnO_4 geht die Red. wie in schwefelsaurer Lsg. über MnO_2 , doch tritt ein Sprung wie nur nach Beendigung der Gesamtrk. auf. $\varepsilon_U = +0,66$ V. Aus dem Verlauf der Kurve ist die Oxydation der HCl ersichtlich. Permanganat u. Jodid. in schwefelsaurer Lsg. Bei Titration von KMnO_4 in KJ tritt nach Verlauf der Rk.




ein Sprung auf. $\varepsilon_U = +0,64$ V. Der Sprung ist jedoch kleiner als bei der Rk. mit FeSO_4 , weil kein freies KMnO_4 in der Lsg. bleibt sondern das J_2 zu J_3 oxydiert. Erst nach 4—5-fachem KMnO_4 -Überschuß wird allmählich das Permanganatpotential erreicht. Die Rk.:



ist auf der Kurve nicht gekennzeichnet. Da diese Rk. mit meßbarer Geschwindigkeit verläuft, steigt das Potential nach jedem weiteren KMnO_4 -Zusatz plötzlich an u. fällt dann langsam wieder ab. Bei Abwarten konstanter Potentiale tritt ein Sprung nicht genau nach Gleichung (4) auf, sondern wenn 1% KMnO_4 mehr verbraucht ist, was in Übereinstimmung mit dem Befund von CROTOGINO (Ztsch. f. anorg. u. allg. Ch. **24**. 236 [1900]) aber im Widerspruch zu dem von HENDRIXON (Journ. Americ. Chem. Soc. **43**. 14. 858; C. **1921**. II. 837. IV. 626) u. KOLTFER (Rec. trav. chim. Pays-Bas **39**. 208; C. **1921**. IV. 625) steht. Adsorption von J_2 oder MnO_4' durch festes Jod kommt nicht in Frage, da bei Ggw. von CS_2 derselbe Mehrverbrauch nötig ist. Werden bei Titration von KJ in KMnO_4 konstante Potentiale abgewartet, so treten 2 Sprünge auf, der 1. weniger ausgeprägte nach $2\text{MnO}_4' + \text{J}' + 2\text{H}' = 2\text{MnO}_2 + \text{JO}_3' + \text{H}_2\text{O}$, $\varepsilon_U = +1,05$ V. Die Folge der Rkk. ist dabei:



Jeder neue KJ -Zusatz bewirkt plötzliches Sinken des Potentials, das sich mehr oder weniger schnell dann wieder hebt. B. von JO_4' kommt nicht in Frage. Der 2. Sprung tritt am Ende der beiden Rkk.:



auf, $\varepsilon_U = +0,65$ V. b) In salzsaurer Lsg. Bei der Titration von KMnO_4 in KJ entspricht der erste Sprung dem Ende der Rk. (4), $\varepsilon_U = +0,52$ V., doch sind 1,7% KMnO_4 zuviel verbraucht, wahrscheinlich durch die Oxydation der HCl . Der 2. weniger scharfe Sprung entspricht der Gleichung:



Zwischen den beiden Potentialsprüngen wird demnach J zu HJO oxydiert und mit HCl unter B. von JCl reagiert. Zusatz von KMnO_4 nach dem 2. Sprunge bewirkt starke Potentialunregelmäßigkeiten. Die Spannungskurve der umgekehrten Titration ist fast das Spiegelbild der ersten. Der 1. Sprung entspricht dem Ende der Rk. $2\text{MnO}_4' + 5\text{J}' + 5\text{Cl}' + 16\text{H}' = 2\text{Mn}'' + 5\text{JCl} + 8\text{H}_2\text{O}$, $\varepsilon_U = +0,5$ V. Bis zu diesem Sprung tritt kein freies Jod auf. Der 2. Sprung erfolgt nach Verlauf der Rk. $\text{JCl} + \text{J}' = \text{J}_2 + \text{Cl}'$, $\varepsilon_U = +0,51$ V. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. **141**. 111—18. 1924. Dresden, Techn. Hochsch.)

JOSEPH

J. J. Manley, *Quecksilber und Helium*. Vf. erhielt unter gewissen Bedingungen bei Ggw. einer elektr. Glimmentladung eine Verb. von Hg u. He zu einem *Helid*. Das Helid ist eine stabile Verb., welche erst in der Hitze zerfällt. Seine B. sh

Verkleinerung des ursprünglichen He-Vol. vor sich. Erhitzt man das Gemisch des elementaren He mit dem Helid, dann wird das ursprüngliche He-Vol. wieder erreicht. Das Helid wird leicht durch Holzkohle bei Temp. der fl. Luft adsorbiert. Der Brechungsindex des Gasgemisches nimmt während der Verbindungs- und g kontinuierlich zu. Näheres über Eigenschaften u. Bildungsweise ist nicht gegeben. (Nature **114**. 861. 1924. Oxford, MAGDALEN Coll.) BECKER.

Steigmann, *Vorschlag zur Gewinnung des Goldes aus Meerwasser*. (Vorläufige Mitteilung.) Vf. empfiehlt neben Ag_2Te u. Ag_2Se als bestes Entgoldungsmittel für unedle Metalle verd. Goldlsgg. das kolloidale Schwefelsilber. Ein geschwefelter Chlorid- oder bezw. Gaslichtpapierstreifen vermag unter stufenweise fortschreitender Färbung Au-Lsgg. mit einem Gehalt von etwa 4 mg Au auf 100 l W. vollständig zu entgolden. Diese Fähigkeit ließe sich wohl zur Gewinnung von Au aus Meerwasser mittels mit Ag_2S ausgefüllter Rahmen verwenden. Ag_2S kann auch in der analytischen Chemie als außerordentlich empfindliches Reagens auf Au gebraucht werden. (Ztg. **49**. 7.) BEHRLE.

C. Mineralogische und geologische Chemie.

T. Wherry, *Über die Krystalltracht*. Das Wachstum der Krystalle stellt sich als ein Aneinanderfügen beliebig vieler Wirkungsräume dar, deren Valenzrichtungen senkrecht zu den Flächen orientiert sind. Vf. glaubt, daß die Ätzzur nicht einen Ausdruck des inneren Gitterbaus darstellen, sondern eine niedrigere Symmetrie zeigen, weil das Lösungsm. die Anordnung der Elektronen an den Atomen hervortreten läßt. Beispiele hierzu sind die Ätzfiguren an NaCl u. Fl. (Ann. des mines. **9**. 45—54. 1924; N. Jahrb. f. Mineral. **1924**. II. 149—50. W. EITEL.) ENSZLIN.

Goßner, *Die chemische Konstitution der monoklinen Pyroxene und der Amphibole*. II. Amphibolgruppe. (I. vgl. Ztschr. f. Kristallogr. **60**. 76; C. **1924**. II. 178) Bei den Amphibolen treten deutlich Beziehungen zwischen den Zahlen der Teilkomponenten und der Symmetrie hervor. Die Zahl 6 spielt bei den hexagonalen Krystallen eine Rolle. Die Amphibole sind aus den 3 Komponenten CaSiO_3 ; MgSiO_3 u. Al_2O_3 aufgebaut, wobei für die beiden letzten eine Vertretung durch MgO_2H_2 u. AlO_2H eintreten kann. Anthophyllit $6\text{SiO}_3\text{Mg} [2\text{SiO}_2 \cdot \text{Al}_2]$; Gedrit $6\text{SiO}_3\text{Mg} [\text{SiO}_2 \cdot 2\text{AlO}_2\text{H}]$ Tremolit $[2\text{SiO}_3\text{Ca} \cdot 4\text{SiO}_3\text{Mg}] [2\text{SiO}_2\text{MgO}_2\text{H}_2]$ u. bis grüne Hornblende $[2\text{SiO}_3\text{Ca} \cdot 4\text{SiO}_3\text{Mg}] [\text{SiO}_2 \cdot 2\text{AlO}_2\text{H}]$. Weitere Verbb. der Hornblendegruppe sind: $[2\text{SiO}_3\text{Ca} \cdot 4\text{SiO}_3\text{Mg}] [\text{SiO}_3\text{Mg} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3]$; $[2\text{SiO}_3\text{Ca} \cdot 4\text{SiO}_3\text{Mg}] \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$; $[2\text{SiO}_3\text{Ca} \cdot 4\text{SiO}_3\text{Mg}] [\text{SiO}_3\text{Mg} \cdot 2\text{AlOF}]$. Dabei sind natürlich noch die früher erwähnten gegenseitigen partiellen Vertretungen wirksam. (Ztschr. f. Kristallogr. **61**—78. 1924.) ENSZLIN.

H. Solly, *Ein bleigraues, nadliges Mineral aus Binnental, Schweiz*. Entspr. der Zus. nach dem Rathit $3\text{PbS} \cdot 2\text{As}_2\text{S}_3$, den Winkelverhältnissen nach dem Moysit. Analyse im Original (Mineral. Magazine **18**. 360—62. 1919; N. Jahrb. f. Mineral. **1924**. II. 169. Ref. K. BUSZ.) ENSZLIN.

H. Solly, *Ein neues Mineral von Binnental, Schweiz, isomorph mit Tretchmannit*. Das Mineral, das nur einmal auf einem Sartoritkrystall aufgewachsen gefunden wurde, unterscheidet sich durch seinen schokoladebraunen Strich und seine Verwachsung mit Tretchmannit u. heißt Tretchmannit- α . (Mineral. Magazine **18**. 363—65. 1919; N. Jahrb. f. Mineral. **1924**. II. 170. Ref. K. BUSZ.) ENSZLIN.

T. Wherry, *Bemerkungen über Alunit, Psilomelanit und Titanit*. (Proc. Mineralog. Acad. Sc. Washington **51**. 82—88. 1917; N. Jahrb. f. Mineral. **1924**. II. 171. Ref. W. EITEL.) ENSZLIN.

E. V. Shannon, *Bemerkungen über Anglesit, Anthophyllit, Calcit, Dabazit, Sphäranit, Stilpnomelan, Tetraedrit und Triplit*. Es sind Analysen von Triplit, Dabazit, Gedrit, Sillimanit u. Stilpnomelan angegeben. (Proc. National Acad. Sc. Washington 58. 437—53. 1921; N. Jahrb. f. Mineral. 1924. II. 177—79. Ref. W. EITEL.) ENSZLI

H. S. Washington und **H. E. Merwin**, *Aphthitalit vom Kilauea*. Aphthitalit (Glaserit) bildet in den Spalten eines erstarrten, aber noch heißen Lavastroms hexagonale Täfelchen. Er ist Cu-haltig. $K_2O : Na_2O = 1 : 1,5$. Das Cu dürfte ein W-freies $CuSO_4$ dem Glaserit isomorph beigemischt sein. Der übliche Pb-Gehalt fehlt vollständig, was auf den verhältnismäßig niedrigen K_2O -Gehalt der Kilauea-Natronlaven zurückgeführt werden kann. Glaserit soll als Sulfid im Magma vorhanden gewesen sein u. sich erst an der Luft zu Sulfat oxydiert haben. (Ann. des mines 6. 121—25. 1921; N. Jahrb. f. Mineral. 1924. II. 179—80. Ref. W. EITEL.) ENSZLI

T. L. Walker, *Stalaktitischer Baryt von Madoc Ontario*. Stark $SrSO_4$ -haltiger Baryt. Analyse im Original. D. 4,29. (The Am. Min. 4. 79—30. 1919; N. Jahrb. f. Mineral. 1924. II. 174. Ref. H. FRITZSCHE.) ENSZLI

Alfred Schoep, *Versuche über Becquerelit und über Schoepit; kristallographische Messungen, chemische Analyse und Entwässerung*. (Vgl. Bull. Soc. franç. Minéral. 46. 9; Bull. Soc. Chim. Belgique 33. 88; C. 1924. I. 1167. 2576.) Vf. fand in der Natur gut ausgebildete Krystalle der Mineralien u. bestimmte bei Becquerelit das Achsenverhältnis $a : b : c = 0,5537 : 1 : 0,5938$. Schoepit hat die Zus. $11,27 H_2O$; $79,03 MgO$; $4,56 PbO$; $1,03 TeO_3$; $1,32 Fe_2O_3 + Al_2O_3$; $2,76 MnO$. Das im Becquerelit häufiger stärker vorhandene Pb kann nicht die Ursache der verschiedenen Eigenschaften der Mineralien sein, sondern es handelt sich um dimorphe Stoffe von der Zus. $UO_3 \cdot 2H_2O$. Das Verhalten beim Entwässern ist verschieden. Becquerelit verliert bei 110° $1,60\%$ H_2O verloren u. ist bei 500° vollständig entwässert, während Schoepit bei 110° $7,89\%$ H_2O verliert u. bei 300° bereits sein W. ganz abgibt. (Bull. Soc. franç. Minéral. 47. 147—57. Bull. Soc. Chim. Belgique 33. 578—87. 1924.) ENSZLI

S. G. Gordon, *Der kürzlich beschriebene „Bisbeeit“ vom Grand Canyon*. Bisbeeit. Der von A. F. ROGERS beschriebene Bisbeeit ist das $Cu-Al-Si$ -Silicat Cyanotrichit. (Ann. de mines 8. 93. 1923; N. Jahrb. f. Mineral. 1924. II. 195 ef. W. EITEL.) ENSZLI

E. S. Larsen und **E. V. Shannon**, *Boussingaultit von South Mountain bei Santa Paula, Californien*. Das Mineral bildet sich in den Spalten von Sandsteinen u. Tonen, in denen heiße Dämpfe aufsteigen, in stalaktitischer Form oder als Übergangsform entspricht etwa der Zus. $(NH_4, H)_2SO_4 \cdot MgSO_4 \cdot 6H_2O$ ist monoklin. u. hat die Härte 2. $\alpha = 1,470$; $\beta = 1,472$; $\gamma = 1,479$. (Ann. des mines 5. 127—29. 1920; N. Jahrb. f. Mineral. 1924. II. 194. Ref. W. EITEL.) ENSZLI

A. C. Hawkins und **E. V. Shannon**, *Canbyit, ein neues Mineral*. Canbyit ist ein durchsichtig gold- bis bernsteinbraunes hydrat. Eisensilicat von der Zus. $H_4Fe_2Si_2O_9 \cdot 2H_2O$. $\alpha = 1,562$; $\beta = 1,580$; $\gamma = 1,582$. V. in Brandywine bei Wilmington, Delaware, in einem Gabbro. (Ann. des mines 9. 1—5. 1924; N. Jahrb. f. Mineral. 1924. II. 171. Ref. W. EITEL.) ENSZLI

E. F. Holden, *„Coeruleofibrit“ ist Connellit*. (Vgl. Ann. des mines 7. 80; C. 1924. I. 1761.) Der angebliche Coeruleofibrit ist kein Cu-Chloroarseniat, sondern ein Cu-Chlorosulfat u. mit Connellit identisch. Vf. fand nachträglich einachsige Achsenbilder. Die Lichtbrechung α u. β ist richtig, bei γ muß es $1,756$ statt $1,741$ heißen. (Ann. des mines 9. 55—56. 1924; N. Jahrb. f. Mineral. 1924. II. 72. Ref. W. EITEL.) ENSZLI

T. L. Walker, *Copiapit von Liard Post, B. C.* Schwefel- bis kanariengelbes Pulver der Zus. $MgO \cdot 2(Fe, Al)_2O_3 \cdot 6SO_3 \cdot 22H_2O$. D. 2,087. $\beta = 1,538$; $\gamma = 1,78$ je $\pm 0,003$. Das W. wird erst bei 555° abgegeben, oberhalb dieser Temp. tritt

- ein. (Contrib. to Canad. Min. 1922. Univ. of Toronto Stud. Geol. Ser. 14. 6; N. Jahrb. f. Mineral. 1924. II. 194. Ref. W. EITEL.) ENSZLIN.
- L. L. Walker, *Fibroferrit von Quatsino*, B. C. Farblose dünne rhomb. Nadeln. 1901. Zus. 32,68 Fe_2O_3 ; 0,28 FeO ; 32,48 SO_3 ; 33,20 H_2O ; 1,08 Unl. (Contrib. Canad. Min. 1922. Univ. of Toronto Stud. Geol. Ser. 14. 87—88; N. Jahrb. f. Mineral. 1924. II. 195. Ref. W. EITEL.) ENSZLIN.
- Alfred Schoep, *Über die chemische Zusammensetzung des Fourmarierits*. Vf. analysierte verschiedene Fourmarierite mit wechselndem Pb u. U-Gehalt u. kommt zur Formel $(\text{UO}_2\text{Pb})\text{O} \cdot \text{H}_2\text{O}$. (Bull. Soc. franç. Minéral. 47. 157—62. Belgique 33. 558—62. 1924.) ENSZLIN.
- V. F. Foshag, *Freirinit, eine neue Mineralart*. Freirinit, seither als *Lavendulan* bezeichnet, aber von diesem verschieden, hat seinen Namen nach der Landschaft Beni V. in Blanca Mine, San Juan. Zus. $6(\text{Cu}, \text{Ca})\text{O} \cdot 3\text{Na}_2\text{O} \cdot 2\text{As}_2\text{O}_5 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$, das Verhältnis $\text{Cu} : \text{Ca} = 4 : 1$ ist. Es sind grünlichblaue, opt. einachsige Mikroskop. kleine Blättchen u. Säulchen mit hellblauem Strich. Ll. in HCl. In den mines 9. 30—31. 1924; N. Jahrb. f. Mineral. 1924. II. 170. Ref. W. EITEL.) ENSZLIN.
- K. Koza und S. Saiki, *Entwässerung von Kochit in Wasserdampf bei Atmosphärendruck*. Kochit von Kochimura, Provinz Rikuchu, Japan bildet weiße, körnige Kristalle. Verschiedene Kombinationen von Würfeln u. Oktaedern. Zus. $2\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 3\text{SiO}_2 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$. Schmp. 929°. Das Wasser wird in Luft bei 725—800°, in Wasserdampf bei 775—950° abgetrieben. (Journ. Geol. Soc. Tokyo 29. 148—54. 1922; N. Jahrb. f. Mineral. 1924. II. 1—72. Ref. W. EITEL.) ENSZLIN.
- F. Leitmeier, *Über Pisanit*. Die angegebenen Analysen eines blauen u. eines grünen Pisanits von LADING führen zur Formel $(\text{Cu}, \text{Fe})\text{SO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$. Im blauen Mineral D. 1,950 sind $45\text{CuSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ u. $55\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$, im blaugrünen von der D. 1,941 sind $31\text{CuSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ u. $69\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$. (Mitt. Wiener. Min. Ges. 34. 1916; N. Jahrb. f. Mineral. 1924. II. 191—92. Ref. M. HENGLEIN.) ENSZLIN.
- Alfred Schoep, *Der Sklodowskit, ein neues radioaktives Mineral*. (Bull. Soc. Minéral. Belgique 33. 527—29. 1924. — C. 1924. II. 1906.) BEHRLE.
- Alfred Schoep, *Über den Sklodowskit, ein neues uranhaltiges Mineral; seine Beziehungen mit dem Uranotil*. (Vgl. C. r. d. l'Acad. des sciences 179. 413; C. 1924. II. 1906.) Beide Mineralien haben ähnliche chem. Zus. $\text{RO} \cdot 2\text{UO}_3 \cdot 2\text{SiO}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ u. zwar ist bei Sklodowskit, der in radialfaseriger, kompakter u. dichter Form vorliegt, $\text{R} = \text{Mg}$ u. bei Uranotil $\text{R} = \text{Ca}$. Ersterer ist ll. in HCl. (Bull. Soc. franç. Minéral. 47. 162—72. Bull. Soc. Chim. Belgique 33. 562—70. 1924.) ENSZLIN.
- S. Bastin, *Silberanreicherungen in den San Juan Mountains, Colorado*. (Geol. Surv. Bull. 735 D. 65—129. 1922; N. Jahrb. f. Mineral. 1924. II. 198—99. Ref. H. SCHNEIDERHÖHN.) ENSZLIN.
- S. Bastin, *Primäre gediegene Silbererze bei Wickenburg, Arizona und ihre Bedeutung zur Genesis der Silbererze von Cobalt, Ontario*. (U. S. Geol. Surv. Bull. 735 E. 1—35. 1922; N. Jahrb. f. Mineral. 1924. II. 198—99. Ref. H. SCHNEIDERHÖHN.) ENSZLIN.
- E. Junner, *Die Geologie der Goldvorkommen in Viktoria, Australien*. (Econ. Geol. 16. 79—123. 1921; N. Jahrb. f. Mineral. 1924. II. 197. Ref. H. SCHNEIDERHÖHN.) ENSZLIN.
- A. Gans, C. Krug und E. Heuseler, *Über die Bestimmung des Platins in geologischen und ungeimpften Gesteinen Deutschlands*. Es wurden die platinverdächtigen Gesteine mit allen Vorsichtsmaßnahmen untersucht. Dabei wurde festgestellt, daß in keiner Probe die angegebenen hohen Befunde vorhanden waren. Es wurden in 1 Tonne 0,4—0,6 g pro Tonne gefunden, auch die Konzentrate zeigten keine Anreicherung an Pt. — Die Prüfung der Analysenmethoden fand an einer mit Pt II. 1.

verschiedenster Korngröße geimpften Grauwacke statt. Es ergaben sich immer viel zu niedrige Resultate. Meist wurden 15–25%, oft auch 20–45% des gesetzten Pt zu wenig gefunden. Die Resultate über die Pt-führenden Gesteine sind also noch nicht endgültig. (Mitt. a. d. Lab. d. Preuss. Geol. Landesanst. 1922. [3] 1–19; N. Jahrb. f. Mineral. 1924. II. 201. Ref. SCHNEIDERHÖHN). ENSZLI.

T. L. Walker, *Epsomit-Seen bei Ashcroft B. C.* Das Salz aus den 5 Seen, im Sommer vollständig trocken liegen, ist fast reines Bittersalz (Analysen auch Sole vgl. Original.) (Contrib. to Canad. Min. 1921. Univ. of Toronto Stud. Geol. Ser. 12. 42–44. N. Jahrb. f. Mineral. 1924. II. 194. Ref. W. EITEL.) ENSZLI.

A. Geller, *Über das Verhalten verschiedener Minerale der Salzlager bei hohen Drucken und wechselnden Temperaturen.* Ausführliche Beschreibung der bereits angegebenen Verss. (vgl. S. 35). Es ist nachzutragen: Vf. findet gute Übereinstimmung mit den von BORN für die Festigkeit des NaCl beim absol. Nullpunkt berechneten Werten. *Sylvin*, dessen Fließdruckkurve niedriger liegt als die des NaCl, wurde zwischen –25 u. +270° untersucht. Mischkristalle von NaCl u. KCl zeigten im frischen Zustand Abhängigkeit der Fließdruckkurve von der Zus. im gealterten Zustand verhalten sie sich wie Mischungen von NaCl u. KCl. Außer der Schmelzkurve des *Glaubersalzes*, die bei 5000 kg/qcm einen Knick zeigt, wurde das Stabilitätsgebiet des *Kainits* bis 42000 kg/qcm, das des *Bischofites* bis 30000 kg/qcm verfolgt. Die Schmelzkurve des *Carnallits*, die bis 24000 kg/qcm aufgezeichnet wurde, zeigt 2 Maxima u. einen Knick. Es werden die Anwendungen der erhaltenen Kurven auf die Salzmetamorphose besprochen. Am Schluß befindet sich ein ausführliches Literaturverzeichnis. (Ztschr. f. Krystallogr. 60. 414–2. 1924.) ENSZLI.

K. Hummel, *Die Entstehung der Eisenmanganerze im Zechstein von Spessart und Odenwald.* Vf. nimmt an, daß die Erze durch hydrothermale Vorgänge am Anschluß an tertiären Vulkanismus gebildet sind. Hiergegen spricht sich H. UDLAND aus, worauf Vf. erwidert. (Glückauf 60. 765–68. 1243–45. 1924. Gießen.) BEHR.

K. Hummel, *Eisenmanganerze im Zechsteindolomit am Ostrande des Keweenawaldes.* (Glückauf 60. 1227–30. 1924. Gießen.) BEHR.

Carl Zapffe, *Manganführende Eisenerze des Cuyunadistrikts Minnesota.* (Trans. Amer. Inst. Mining and Metallurg. Eng. 1924. Nr. 1390. 11 Seiten. Braintree [Minn.].) BEHR.

J. H. L. Vogt, *Die physikalische Chemie der Krystallisation und magmatischen Differentiation der Ergußgesteine.* I–VI. Beschreibung der Systeme der Feldspäte (I.), Diopsid-Albit-Anorthit (II.). In einem Abschnitt wird die geringe Lösungsfähigkeit der Fe-Mg-Mineralien in sauren Magmen (III.), in einem weiteren Apatit u. Erze (IV.) behandelt. Eine eingehende Schilderung erfährt das System Magnetit-Olivin. Die Wrkg. allseitig gleichen Drucks auf die FF. der Mineralien sowie auf eutekt. Punkte ist gering, dagegen groß auf die Umwandlungstemp. zweier umkehrbarer Phasen (V.). Den Einfluß der leichtflüchtigen Bestandteile (H₂O, CO₂ usw.) auf die Differentiation des Magmas hält Vf. nicht für so ausschlaggebend, wie NIGGLI (VI.). (Journ. of Geol. 29. 318–50. 426–43. 515–9. 627–49. 30. 611–30. 639–72. 1922 u. 1923; N. Jahrb. f. Mineral. 1924. II. 202 bis 247. Ref. MILCH.) ENSZLI.

J. H. L. Vogt, *Die physikalische Chemie der Krystallisation und der magmatischen Differentiation der Ergußgesteine.* VII u. VIII. (VI. vgl. vorst. Ref.). VII. In sauren Magmen sind sehr leicht flüssig, durch das Entweichen der leichtflüchtigen Bestandteile unter vermindertem Druck werden sie immer zäher, so daß sie oft die Oberfläche nicht mehr erreichen. — Die Größe der Krystalle, sowie die Erstarrungstemp. bei synthet. Verss. hängt von der angewandten Menge ab. Verss. die Temp. des Krystallisationsbeginns festzustellen (VIII.) ergaben Zahlen zwischen

(1. 1500° je nach Art der Zus. Ein granit. Magma würde ungefähr zwischen 1000° kristallisieren, größere Mengen leichtflüchtiger Bestandteile können Temp. bis 800° erniedrigen, der Druck würde nur eine verhältnismäßige Erhöhung bewirken. (Journ. of Geol. **31**. 233—52. 407—19. 1923; N. Jahrb. Mineral. **1924**. II. 207—10. Ref. MILCH.)

ENSZLIN.

h. Brenner, *Über Theralit und Ijolit von Uumpek auf der Halbinsel Kola*. Beschreibung u. Analysen der Gesteine. (Bl. Comm. Géol. de Finlande **52**. 1—30. N. Jahrb. f. Mineral. **1924**. II. 240. Ref. KRÜGER.)

ENSZLIN.

Werenfels, *Forschungen nach Petroleum in der Limagne, Frankreich*. Vgl. die Petroleumverhältnisse in der Limagne noch nicht für genügend durchungen geklärt. (Trans. Amer. Inst. Mining and Metallurg. Eng. **1924**. Nr. 1385. n. Basel, Schweiz.)

BEHRLE.

D. Organische Chemie.

am Krishen Sharma, *Spontane Verbrennung von Äthylen während der Darstellung von Äthylendichlorid*. Beim Einleiten von reinem C_2H_4 in Chlorwasser (ca. 15°) wurde an der Eintrittsstelle des Gases period. Aufflammen beobachtet, fein verteilter C blieb in dem Gefäß suspendiert. (Journ. Chem. Soc. London **125**. 2676. 1924. Lahore [Ind.], Forman Christian Coll.) HABERLAND.

Federic Stanley Kipping und Tom Greasley, *Isomere Benzoylderivate von Vinylacetonamin*. (Vgl. KIPPING, Journ. Chem. Soc. London **123**. 3115; C. **1924**.)

(I) Einw. von C_6H_5COCl (1 Mol) auf 2 Mol Vinylacetonamin führt zum N-Benzoylderiv. (I F. 156°), die Ausbeute ist jedoch nicht theoret.; wird mehr als 1 Mol C_6H_5COCl angewandt, so entsteht ein dickes Öl, aus dem sich ein isomeres Benzoylderiv. (II F. 110°) isolieren läßt. Die Annahme, daß eine der Verb. vielmehr ein O-Benzoylderiv. sein könnte, wurde experimentell widerlegt; beide Verb. liegen n. mit Semicarbazid u. geben beim Erhitzen Benzamid u. Benzonitril. I geht durch Erhitzen mit C_6H_5COCl in II nur in Ggw. von HCl überführen. Vermuten daher, daß I unter Aufspaltung mit HCl sich verbindet u. daß dadurch Abspaltung von HCl eine offenkettige Verb. entsteht, so daß II entsteht. Konst. a) $C_6H_5CONH \cdot C(CH_3)_2 \cdot CH_2 \cdot CO \cdot CH : CH(CH_3)$, oder b) $C(CH_3)_2 : CH \cdot CH_2 \cdot CH(CH_3) \cdot NH \cdot COC_6H_5$ zukommen würde. Für diese Konst. würde der Versuch sprechen, daß II leicht mit Br reagiert u. $KMnO_4$ entfärbt, während I gegen beide Mittel ist. Die Zers. der beiden Benzoylderiv. findet so statt:

$C_{15}H_{19}O_2N = C_6H_5CONH_2 + C_8H_{12}O$ u. $C_{15}H_{19}O_2N = C_6H_5CN + H_2O + C_8H_{12}O$. Die Konst. der N-freien Verb. ist noch aufzuklären.

Versuche. N-Benzoylvinyldiacetonamin, $C_{15}H_{19}O_2N$, zur Darst. muß über das getrocknete u. frisch im Vakuum dest. Vinylacetonamin benutzt werden, sonst geringe Mengen Vinylacetonaminbenzoat, F. 92—93°, entstehen. Das nach Erwärmen auf dem Wasserbad erhaltene Reaktionsprod. wird mit k. Ä. extrahiert; der Rückstand besteht aus I u. Vinyldiacetonaminchlorhydrat, beide trennen sich durch Behandeln mit W.; I aus wss. A. rechteckige Prismen, F. 155—156°, unl. in W. u. PAc., wl. in Ä. u. CCl_4 , ll. in A. u. Aceton; aus Lsg. in konz. HCl durch W. nicht gefällt, sondern erst beim Neutralisieren. Durch 2std. Erhitzen mit konz. HCl findet vollständige Spaltung statt zu Benzoesäure, NH_3 u. flüchtigen Keton; Oxim des N-Benzoylderiv. aus Aceton- CCl_4 F. 183—184°; Oxim des N-Benzoylaminomethylheptenon (?), $C_{15}H_{19}O_2N$, durch mehrstd. Erhitzen von Vinylacetonamin mit mehr als 1 Mol C_6H_5COCl auf dem Wasserbad; das Reaktions-

prod. wird zuerst mit w. W., dann mit k. verd. Alkali digeriert; aus dem öl. unl. Rückstand genannte Verb.; aus Ä.-A. F. 110—111°; aus wss. A. Nadeln; A., Aceton, Bzl., wl. in k. Ä. u. CCl_4 , unl. in PAe.; Verh. gegen konz. HCl vorige; *Semicarbazon* aus A. Prismen, F. ca. 200°. — Beim Erhitzen von I beg. bei 170° eine Fl. zu dest., gegen Ende der Zers. wird etwas NH_3 gebildet. Fraktion 220—250° besteht fast aus reinem *Benzamid*; die Fraktion 170— bleibt fl., aus ihr wird bei Kp. 190° *Benzonitril* isoliert; die Verbb. mit tief. Kp. reduzieren KMnO_4 u. geben K-Salze flüchtiger Fettsäuren, sie enthalten scheinend ein dem Methylheptenon nahestehendes ungesätt. Keton. Verb. II dieselben Zersetzungsprodd. — Einw. von Br auf II in CCl_4 führt zu zähem haltigem Öl. (Journ. Chem. Soc. London 125. 2611—16. 1924. Nottingham, (i) Coll.)

HABERLAN.

P. Bruylants, *Beitrag zum Studium der Einwirkung der Organomagnesiumverbindungen auf die Nitrile. Cyanameisensäureäthylester*. (Bull. Soc. Chim. Belgie 32. 529—31. 1924. — C. 1924. II. 2457.)

BEHRI.

T. S. Patterson und Charles Buchanan, *Untersuchungen über optische Lagerung*. VI. *Die Methyl-n-hexylcarbonyldimethoxysuccinate*. (V. vgl. Journ. Chem. Soc. London 125. 1475; C. 1924. II. 1335.) Einleitend besprechen Vff. die Ergebnisse früherer Arbeiten von HUDSON (Journ. Americ. Chem. Soc. 31. 70. 39. 1909. I. 643. 1917. II. 601) über die Rotation von Zuckern u. die Möglichkeiten hieraus Folgerungen bzgl. des Prinzips der opt. Überlagerung zu ziehen. Unter der Annahme, daß die von HUDSON veröffentlichten Daten richtig sind, konnten Vff. zu dem Schlusse, den auch ihre eigenen Arbeiten mit anderen Verbb. bestätigen, daß das Prinzip der opt. Überlagerung nicht allgemein gültig ist. — Vff. prüften polarimetr. die *l*- u. *d*-sek. Octylester der *l*-, *d*- u. *rac*. Dimethoxybernsteinsäuren. Wenn das Prinzip der opt. Überlagerung gültig ist, so müßte z. B. die *l*-sek. Octylester der *rac*. Dimethoxybernsteinsäure gleich dem Mittel aus [α] der *l*-sek. Octylester der *l*- u. *d*-Dimethoxybernsteinsäure sein; es ergaben sich jedoch unter den verschiedensten Bedingungen (Temp., Wellenlänge, in festen u. gelösten Zustände) sowohl bei den *l*- als auch bei den *d*-Octylestern der drei Säuren Differenzen, die größer waren, als sie innerhalb der experimentellen Fehler zu erwarten waren (Tabellen im Original), so daß auf merkliche Abweichung vom Prinzip der opt. Überlagerung geschlossen werden muß.

Versuche. *l*-sek. Octylester der *d*-Dimethoxybernsteinsäure, Kp. 196°, [α] +47,415° (homogene Substanz); Werte für andere Wellenlängen, Temp. u. in A. Tetrachloräthan u. o-Nitrotoluollsg. vgl. Original. Es ist ein erheblicher Einfluß der Lösungsm. auf die Rotation im Vergleich zur homogenen Substanz bemerkt (auch bei den nachgenannten Verbb.); es wurde z. B. gefunden für die homogene Verb. [α] +48,30°, der entsprechende Wert war ($c = 5$) in A.: +52,6° in o-Nitrotoluol +85°, in $\text{C}_2\text{H}_2\text{Cl}_4$ +40,58°. — *l*-sek. Octylester der *l*-Dimethoxybernsteinsäure, Kp. 190°, [α] -77,50° (homogene Verb.). — *l*-sek. Octylester der *rac*. Dimethoxybernsteinsäure, Kp. 199—201°, [α] -14,17°. — *d*-sek. Octylester der *d*-Dimethoxybernsteinsäure, Kp. 202°, [α] +74,72°. — *d*-sek. Octylester der *l*-Dimethoxybernsteinsäure, Kp. 194°, [α] -46,61°. — *d*-sek. Octylester der *rac*. Dimethoxybernsteinsäure, Kp. 202°, [α] +13,67°. (Journ. Chem. Soc. London 125. 2579—90. 1924. Glasgow, Univ.)

HABERLAN.

J. C. Irvine und G. V. Francis, *Untersuchung von photosynthetischen Zuckern durch die Methylierungsmethode*. (Vgl. IRVINE u. PRYDE, Journ. Chem. Soc. London 125. 1045; C. 1924. II. 621.) Der von BALY (vgl. S. 339) synthetisch hergestellte Zuckersirup wurde in üblicher Weise methyliert u. das Rk.-Prod. analysiert. Die Ergebnisse beweisen, daß Polysaccharide nicht anwesend waren, u. daß der Gehalt an Aldosen höchstens 26,5% beträgt. Nach einer anderen Methode wird


stellt, daß der Hexosegehalt ca. 10% ist, die anderen bei der Methylierung getretenen Substanzen sind Nichtzucker mit Hydroxylgruppen, welche nicht die Methylierungsprodd. liefern. (Ind. and Engin. Chem. 16. 1019—20. Andrews [Schottland].)

GRIMME.


arc Bridel, *Über die fermentative Spaltung des Monotropitins. Darstellung Primverose.* (Vgl. Bull. Soc. Chim. Biol. 6. 679; C. 1924. II. 2666.) Monotropitin *stula lenta* wurde in wss. Lsg. mit Fermentpulver aus *Monotropa hypopitys* dargestellt. Schon nach kaum 2 Min. machte sich der Geruch des Salicylsäuremethyl- geltend. Nach 5 Tagen, als 62,7% reduzierender Zucker (theoret. 69,95%) entstanden waren, wurde dieser isoliert u. in allen Punkten mit der kürzlich (S. 41) aus *Gentiana* erhaltenen *Primverose* identifiziert. (C. r. d. l'Acad. des sciences 191—93. 1924.)

SPIEGEL.

uart Wortley Pennycuik, *Die Mutarotationsverzögerung bei der Rohrzucker- on.* Nach den Ergebnissen der jüngsten Forschungen ist die Rohrzucker- on durch folgendes Schema wiederzugeben:



Die Annahme, daß die Rohrzuckerkonz. genau proportional der Differenz der Konzentrationen $\lambda_t - \lambda_\infty$ ist, wird danach nur dann erfüllt sein, wenn die Rkk. 4, 5, 6, 7 momentan bzw. im Vergleich zu 1 mit sehr großer Geschwindigkeit ablaufen. Daß diese Bedingung für die Rohrzuckerspaltung durch Invertase nicht erfüllt ist, wurde bereits von O'SULLIVAN u. THOMSON (Journ. Chem. Soc. London 1910 [1890]) gezeigt. Es wird nunmehr mathemat. u. experimentell dargelegt, daß auch bei der Hydrolyse mit Säuren, wo k_1 relativ klein ist, die einfache Annahme $k_1 = \frac{1}{t} \cdot \ln \frac{\lambda_0 - \lambda_\infty}{\lambda_t - \lambda_\infty}$ nicht zutrifft. Zur Berechnung der durch die Mutarotation bedingten Abweichung werden die Rkk. 4, 5, 6 u. 7 außer Betracht gelassen, da die Daten zur rechnerischen Behandlung fehlen. $k_4 + k_5$ ist unter den gegebenen Bedingungen stets größer als $k_2 + k_3$, der durch die Fructosemutarotation bedingte Fehler daher sicher kleiner als der von der Glucose herrührende. Folgende Theorie der Rk.:



(A = anfängliche, x = zurzeit t umgesetzte Rohrzuckermenge, y = zurzeit t umgesetzte α -Glucose, in g-Mol./L.) Die Hydrolysegeschwindigkeit ist gegeben

$$\frac{dx}{dt} = k_1 (A - x), \quad (\text{I})$$

Die Geschwindigkeit der B. von α -Glucose durch:

$$\frac{dy}{dt} = k_1 (A - x) - k_2 y + k_3 (x - y). \quad (\text{II})$$

Durch Integration von I. erhält man:

$$\frac{x}{A} = 1 - e^{-k_1 t}, \quad (\text{Ia})$$

Einsetzen von x in II. u. Integration:

$$\frac{y}{A} = \frac{k_3}{k_2 + k_3} (1 - e^{-(k_2 + k_3)t}) - \frac{k_3 - k_1}{k_2 + k_3 - k_1} (e^{-k_1 t} - e^{-(k_2 + k_3)t}) = \left\{ \frac{k_3}{k_2 + k_3} (1 - e^{-k_1 t}) + \frac{k_1 k_3}{(k_2 + k_3)(k_2 + k_3 - k_1)} (e^{-k_1 t} - e^{-(k_2 + k_3)t}) \right\}$$

u. schließlich aus Ia—IIa:

$$\frac{x - y}{A} = \frac{k_2}{k_2 + k_3} (1 - e^{-k_1 t}) - \frac{k_1 \cdot k_2}{(k_2 + k_3)(k_2 + k_3 - k_1)} (e^{-k_1 t} - e^{-(k_2 + k_3)t}).$$

Entsprächen die Konz. von α - u. β -Glucose immer dem Gleichgewichtszustand, so müßte:

$$\frac{y}{A} = \frac{k_3}{k_2 + k_3} (1 - e^{-k_1 t}), \quad \frac{x - y}{A} = \frac{k_2}{k_2 + k_3} (1 - e^{-k_1 t})$$

sein.

$$\frac{k_1 k_2}{(k_2 + k_3)(k_2 + k_3 - k_1)} (e^{-k_1 t} - e^{-(k_2 + k_3)t})$$

ist also ein Maß der durch die Mutarotation bedingten Abweichung. Da $e^{-k_1 t}$ u. $e^{-(k_2 + k_3)t}$ beide = 1, wenn $t = 0$, u. = 0, wenn $t = \infty$, so sind die Anfangs- u. Endwerte des Glucosefehlers = 0. Er muß also ein Maximum aufweisen für das die Bedingung besteht:

$$\frac{d(e^{-k_1 t} - e^{-(k_2 + k_3)t})}{dt} = 0 \quad \text{oder:} \quad \frac{d(e^{-k_1 t})}{dt} = \frac{d(e^{-(k_2 + k_3)t})}{dt}$$

$$k_1 e^{-k_1 t} = -(k_2 + k_3) e^{-(k_2 + k_3)t}.$$

Das Maximum wird also zur Zeit:

$$t_m = \frac{1}{k_2 + k_3 - k_1} \ln \frac{k_2 + k_3}{k_1}$$

erreicht. Die maximale Abweichung A ist also:

$$\frac{k_1 k_2}{(k_2 + k_3)^2} e^{-k_1 t_m} \quad \text{oder:} \quad \frac{k_2}{(k_2 + k_3)} e^{-(k_2 + k_3)t_m}.$$

Für eine 17,1%ig. Rohrzuckerlsg. ($A = 0,5$) in 0,1-n. HCl bei 35° wurden gefunden $k_1 = 0,00373$, u. aus den Messungen von NELSON u. BEEGLE $k_2 = 0,00168$, $k_3 = 0,101$. Setzt man diese Zahlenwerte in IV. ein, so zeigt sich, daß die durch die Glucosemutarotation bedingten Abweichungen tatsächlich meßbar sind. Die maximale Abweichung tritt in Übereinstimmung mit der Theorie nach 16,08 Min. ein, d. h. wenn 5,8% Rohrzucker invertiert sind. Je größer $k_2 + k_3$ gegenüber k_1 wird, desto kleiner wird die maximale Abweichung u. desto früher wird der Punkt durchlaufen. Wenn $k_2 + k_3$ gegenüber k_1 sehr groß wird, konvergiert $e^{-(k_2 + k_3)t}$ gegen 0, kann also vernachlässigt werden. Der mathemat. Ausdruck

für die Abweichung reduziert sich dann auf $\frac{k_1 k_2 \cdot A}{(k_2 + k_3)(k_2 + k_3 - k_1)} e^{-k_1 t}$ d. h. sie erscheint dem noch nicht umgesetzten Rohrzucker proportional. In vorliegenden Falle bedingt die Vernachlässigung von $e^{-(k_2 + k_3)t}$ 25 Min. nach Beginn der Rk. nur einen Fehler von 0,5%, nach 30 Min. 0,033%.

Die polarimetr. Methode. Bezeichnet man die Molekulardrehungen von Rohrzucker, Fructose, α -Glucose u. β -Glucose mit σ , Φ , α u. β , so wird:

$$\frac{\lambda_t}{A} = \sigma e^{-k_1 t} - \Phi (1 - e^{-k_1 t}) + \alpha \frac{k_3}{k_2 + k_3} (1 - e^{-k_1 t}) + \beta \frac{k_2}{k_2 + k_3} (1 - e^{-k_1 t}) - (\alpha - \beta) \frac{k_1 k_2}{(k_2 + k_3)(k_2 + k_3 - k_1)} (e^{-k_1 t} - e^{-(k_2 + k_3)t}),$$

$$= \left(\alpha \frac{k_3}{k_2 + k_3} + \beta \frac{k_2}{k_2 + k_3} - \Phi \right) +$$

$$\left[\left(\sigma + \Phi - \alpha \frac{k_3}{k_2 + k_3} - \beta \frac{k_2}{k_2 + k_3} \right) + (\alpha - \beta) \frac{k_1 k_2}{(k_2 + k_3)(k_2 + k_3 - k_1)} \right] e^{-k_1 t} - \left[(\alpha - \beta) \frac{k_1 k_2}{(k_2 + k_3)(k_2 + k_3 - k_1)} \right] e^{-(k_2 + k_3) t},$$

$$P + (Q + R) e^{-k_1 t} - R e^{-(k_2 + k_3) t},$$

P, Q u. R Konstanten sind.

Daraus folgt:

$$\frac{\lambda_0}{A} = P + Q, \quad \frac{\lambda_\infty}{A} = P, \quad \frac{\lambda_0 - \lambda_\infty}{A} = Q \quad \text{und:}$$

$$\frac{\lambda_\infty}{A} = (Q + R) e^{-k_1 t} - R e^{-(k_2 + k_3) t} \quad \text{bzw.:} \quad = (Q + R) e^{-k_1 t}$$

$e^{-(k_2 + k_3) t}$ sehr klein wird).

Die aus V. berechnete Konstante des Mutarotationsfehlers hat im vorliegenden

den Wert: $R = \frac{(\alpha - \beta) \cdot k_1 k_2}{(k_2 + k_3)(k_2 + k_3 - k_1)} = 0,296$. Bei der graph. Darst.

Reaktionsverlaufes mit t als Abscisse u. $\ln \frac{\lambda_t - \lambda_\infty}{A}$ als Ordinate ersieht man,

die Kurve von $\ln Q$ ($t = 0$) beginnt u. nach von $t = \text{ca. } 20$ Min. an, wenn

$e^{-(k_2 + k_3) t}$ sehr klein wird, in eine gerade Linie übergeht. Verlängert man

die Gerade rückwärts bis zum Schnittpunkt mit der Ordinaten, so findet man

naturgemäß nicht mehr bei $\ln Q$, sondern bei $\ln Q + R$. Die Gleichung

der Geraden ist dann:

$$\ln(Q + R) - \ln \frac{(\lambda_t - \lambda_\infty)}{A} = k_1 t \quad \text{oder:} \quad k_1 = \frac{1}{t} \ln \frac{(Q + R) A}{\lambda_t - \lambda_\infty},$$

wo k_1 die Tangente des Neigungswinkels dieser Geraden bedeutet. Sie läuft

nach der alten Formel $k_1 = \frac{1}{t} \ln \frac{\lambda_0 - \lambda_\infty}{\lambda_t - \lambda_\infty}$ konstruierten Geraden (ohne Be-

rücksichtigung der Mutarotation) parallel. Man findet also für die späteren Etappen

in beiden Fällen den gleichen Wert von k_1 . Bezeichnet man schließlich

die Konstante der durch die Mutarotation der Fructose bedingten Abweichung,

so nimmt die Gleichung folgende Form an:

$$k_1 = \frac{1}{t} \ln \frac{(Q + R + S) A}{\lambda_t - \lambda_\infty} = \frac{1}{t} \ln \frac{\lambda_0 - \lambda_\infty + A(R + S)}{\lambda_t - \lambda_\infty}.$$

Die Größe S berechnet man am besten aus dem Mittelwert von:

$$\ln \frac{\lambda_t - \lambda_\infty \text{ (mit Restdrehung)}}{\lambda_t - \lambda_\infty \text{ (ohne Restdrehung)}} = 0,002,$$

wo $R + S = 0,30$. — Aus Vorstehendem geht hervor, daß bei hydrolyt. Spal-

tungen bei denen mit Mutarotation begabte Spaltstücke entstehen, die durch Extra-

ktion der empirisch ermittelten Kurve auf das Anfangsstadium berechneten Ge-

wichtigkeitskonstanten für diesen Abschnitt meist zu hoch ausfallen u. daß diese

Abweichung nur zum Teil auf Versuchsfehler zurückzuführen sind. (Journ. Chem.

Society London 125. 2049—63. 1924. Adelaide, Univ.)

OHLE.

Lurt Hess, Über die Fähigkeit der Cellulose, im festen und gelösten Zustand

abhängig vom Dispersitätsgrad molekular durchzureagieren. Zusammenfassende

Arbeit über Arbeiten des Vfs., nach denen der Grundkörper der Cellulose

ist u. als solcher auch in kolloidalen Lsgg., unabhängig vom Dispersitäts-

grad, nach Unterss. von anderen Seiten auch in der Faser reagiert. Die durch

Veranschaulichung der Freundlich'schen Permutittheorie für die Cellulose sich ergebenden


Ergebnisse werden angeführt. Sie sind insofern zu modifizieren, als Vf. aus seinen

Ergebnissen über die Schweizerlsg. u. dem Massenwirkungsgesetz den Schluß

zieht, daß eine kinet. Beweglichkeit der $C_6H_{10}O_5$ -Gruppen anzunehmen, diese als Moll. aufzufassen sind. (Naturwissenschaften 12. 1150 — 53. 1924. Berlin.)

SPIEGLER

A. W. Schorger, *Die Konstitution der Cellulose*. Vf. erteilt der Cellulose nachstehende Konst.:



Eine derartig konstituierte Verb. liefert bei der Methylierung u. nachfolgender Hydrolyse nur 2,3,6-Trimethylglucose. Bei ihrer Acetolyse ist die theorett. Ausb. an Cellobioseoctacetat denkbar, seine tatsächliche theorett. B. ist jedoch aus folgenden Gründen nicht zu erwarten: Spaltung bei 1, 2, 4, 5 u. 6 würde zu Cellobiose, bei 7, 8, 1, 3 u. 4 zu der isomeren i-Cellobiose führen, die Aussichten für B. beider Spaltprodd. sind gleich groß. Daß i-Cellobiose bisher nicht isoliert werden konnte, ist auf die leichtere Hydrolyse oder Acetolyse bei 1, 2, 6 u. 5 zurückzuführen. Hydrolyse bei 2 oder 3 würde an beiden Stellen eine CHO-Gruppe entstehen lassen (Hydrocellulose), das gebildete Mol. würde noch ziemlich intakt sein, es wäre jedenfalls leichter hydrolysierbar als n. Cellulose. Hydrolyse bei 2, 3 u. 4 würde zu einer Dextrin mit reduzierenden Eigenschaften führen, während durch Spaltung bei 5 oder 5 u. 6 nichtreduzierende Dextrine entstehen würden. (Ind. and Engin. Chem. 16. 1274—75. 1924. Madison [Wisc.], C. F. BURGESS Lab.)

HABERLAND

Edward de Barry Barnett und **James Wilfred Cook**, *Mitteilung über den Mechanismus der Substitutionsreaktionen in aromatischen Kernen*. Der Substitution im Benzolkern braucht im allgemeinen keine Additionsrk. vorauszugehen, wenigstens es in einigen Fällen wahrscheinlich ist, daß die Substituenten zuerst in eine Seitenkette eintreten u. von da in den Kern wandern. Beispiele hierfür sind die Verb. vom Typ $ArOX$ u. $ArNRX$, in denen X eine mehr oder weniger ausgesprochene Tendenz zur Wanderung in die p-Stellung des Kerns hat; Beispiele hierfür sind die Umlagerungen der Nitramine in Nitroamine u. der Hydroxylamininderivate in Aminophenole. (Rec. trav. chim. Pays-Bas 43. 897—98. 1924. London.)

Leonard Reginald Vyle und **Frederic Stanley Kipping**, *Organische Derivate des Siliciums*. XXXI. *Einwirkung von Quecksilberoxyd auf Diaryldichlorsilane* (XXX. vgl. KIPPING, S. 484.) Einw. von HgO auf eine h. Toluollsg. von *Diphenyldichlorsilican*, $Si(C_6H_5)_2Cl_2$, liefert neben $HgCl_2$, *Phenylquecksilberchlorid*, $Si(C_6H_5)_2O$ u. *Trianhydrotris(diphenyl)silicandiol* ein zähes Öl, das der Zus. nach als *Diphenylsilicon*, $Si(C_6H_5)_2O$, aufzufassen ist; Einw. von alkoh. KOH auf diese den Keim entsprechende Verb. führte fast quantitativ zu *Diphenylsilicandiol*. Die Tatsache, daß das Silicon mit Wasserdampf nicht flüchtig ist, spricht dagegen, daß eine einfache Verb. $Si(C_6H_5)_2O$ vorliegt. Wird die ursprüngliche Toluollsg. im Vakuum destilliert (30 mm), so geht bei 310° etwas *Trianhydrotris(diphenyl)silicandiol* über, während flüchtige Si-Verbb. wurden hierbei nicht erhalten, so daß geschlossen werden muß, daß das Silicon in der ursprünglichen Lsg. nicht enthalten war oder infolge der Wärme sich polymerisiert hatte. Mol.-Gew.-Bestst. des Silicons deuten auf $[Si(C_6H_5)_2O]_3$. — Bei analoger Einw. von HgO auf *Dibenzylidichlorsilican* entan-

trianhydrotrisdimethylsilicandiol u. als Hauptprod. eine der Diphenylverb. analog zusammengesetzte Verb. $[\text{Si}(\text{CH}_3\text{C}_6\text{H}_5)_2\text{O}]_n$, die mit sd. alkoh. KOH vollständig in *trianhydrotrisdimethylsilicandiol* übergeführt wurde. Vakuumdest. der Toluollsg. führte nur zu *trianhydrotrisdimethylsilicandiol*. — Aus den Eigenschaften beider Silicone muß geschlossen werden, daß sie mehr als 4 Si u. 4 O enthalten.

Versuche. Eine Toluollsg. von Diphenyldichlorsilican wird $1\frac{3}{4}$ Stdn. mit 5 Mol. HgO unter Rückfluß gekocht; nach Filtrieren u. Waschen mit Toluol die Lsg. eingedampft; aus dem dickfl. gelben Rückstand werden durch fraktionierte Krystallisation aus A.-Aceton isoliert: *trianhydrotrisdimethylsilicandiol*, 1° (ca. 2°) u. *Phenylquecksilberchlorid*, F. 250°. Der Rückstand wird zwecks Trennung von Diphenyl mit Wasserdampf dest. u. die nicht flüchtige M. in Aceton als *trianhydrotrisdimethylsilicandiol* Verb. $[\text{Si}(\text{C}_6\text{H}_5)_2\text{O}]_n$, ll. in organ. Mitteln außer den niedrigen Alkoholen (Pae., worin wl., beim Erwärmen mit Piperidin + W. oder wss. Aceton + KOH in H₂-Entw., nach dreimaliger Erneuerung des letzteren Mittels jedoch Hydrolyse in K-Salz des *Diphenylsilicandiols*. — Wird *trianhydrotrisdimethylsilicandiol* mit überschüssigem HgO auf 200° erhitzt, so sublimiert *Quecksilberdiphenyl*; diese Verb. entsteht auch, wenn das von Phenylquecksilberchlorid u. *trianhydrotrisdimethylsilicandiol* befreite ölige oben genannte Reaktionsprod. in Toluollsg. mit HgO erhitzt wird, ob die Verb. hierbei aus *trianhydrotrisdimethylsilicandiol* oder aus komplexen Siliconen entsteht, läßt sich nicht entscheiden. — Die Einw. von HgO auf *trianhydrotrisdimethylsilican* in Toluol wird durch 6std. Kochen unter Rückfluß bewirkt. Die Abtrennung von Nebenprodd. werden gebildetes *Dibenzyl* u. *Stilben* mit Wasser entfernt; der Rückstand wird in Aceton gel. u. mit A. fraktioniert gefällt; aus *trianhydrotrisdimethylsilicandiol*, F. 98° u. Verb. $[\text{Si}(\text{CH}_2\text{C}_6\text{H}_5)_2\text{O}]_n$ als ölige M. in A. u. PAe., sonst ll. in organ. Mitteln. Das letztgenannte Silicandiol reagiert mit beim Erhitzen mit HgO. — Die Oxyde von Cd u. Ag reagieren nicht mit *trianhydrotrisdimethylsilican*. (Journ. Chem. Soc. London 125. 2616—22. 1924. Nottingham, Univ. Coll.)

HABERLAND.

Frederick Challenger und John Frederick Wilkinson, *Die Orientierung von triphenylphosphinoxidderivaten*. Das von MICHAELIS u. SODEN (LIEBIGS ANN. 9324 [1885]) durch Nitrierung von *Triphenylphosphin* bzw. seinem Oxyd erhaltene *Trinitrotriphenylphosphinoxid* (F. 242°) ist nicht, wie diese Autoren annehmen ein p-, sondern ein m-Deriv.; das aus der entsprechenden Aminoverb. durch Diazotieren u. Umsetzen mit CuCl erhaltene *Tri-m-chlorphenylphosphinoxid*, $\text{C}_6\text{H}_4\text{Cl}_3\text{P}$, ist ident. mit dem aus POCl_3 + m-Chlorphenylmagnesiumbromid in A. erhaltenen Prod.; aus PAe. Nadeln, F. 135°. — *Tri-p-chlorphenylphosphinoxid*, $\text{C}_6\text{H}_2\text{Cl}_3\text{P}$, analog dargestellt, F. 174°. — Die von MICHAELIS u. SODEN bei der Verb. mit F. 242° noch erhaltene isomere Verb. (F. 66—68°) konnten nicht nachweisen. (Journ. Chem. Soc. London 125. 2675—76. 1924. Manchester.)

HABERLAND.

Louis Desvergues, *Über einige physikalische Eigenschaften von Nitroderivaten*. *Dinitroanisol*: gereinigt durch Umkrystallisieren aus der doppelten Menge N. (D. 1,4), weiße bis schwach gelbliche Prismen, F. 94,58°; in 100 g W. sind 0,155; 0,0136 u. 0,4780 g bei 15, 50 u. 100°. In der Wärme findet durch W. Hydrolyse zu entsprechendem Dinitrophenol statt. Löslichkeit in organ. Mitteln (in 100 g Lösungsm.) bei 15 u. 50°: in Essigester 25,071 u. 78,63 g; in A. 85,662 u. 218,97 g; in 96%ig. A. 1,887 u. 6,446 g; in absol. A. 2,297 u. 8 g; in CH₃OH 3,052 u. 10,577 g; in Bzl. 30,269 u. 123,43 g; in Chlf. 33,998 u. 23 g; in Ä. bei 15° 3,821 u. bei 33° 6,780 g; in Pyridin 73,509 u. 198,98 g; in C₂H₅ (15°) u. 0,889 g (37°); in CCl₄ 0,356 u. 1,196 g; in Toluol 16,626 u. 79,57 g. *2,4,6-Trinitroanisol*, aus HNO₃ strohgelbe Krystalle, F. 67,90—67,93°, Erweichungspunkt 67,1°; Löslichkeit in 100 g W. von 15,50 u. 100°: 0,020, 0,137 u.




0,389 g. Bei der Lsg. findet zum Teil Verseifung zu *i*-Pikrinsäure statt. Löslichkeit von Trinitroanisol in organ. Mitteln (100 g) bei 15 u. 50°: in Essigester 84,4 u. 368,50 g; in Aceton 194,005 u. 813,22 g; in 96%ig. A. 2,306 g u. 17,79 g in absol. A. 2,369 u. 21,36 g; in CH_3OH 5,238 u. 27,65 g, in allen genannten Mitteln bildet sich mehr oder weniger *i*-Pikrinsäure; in Bzl. 94,979 u. 597,90 g; in Chlf. 25,598 u. 334,50 g; in Ä. 4,183 (15°) u. 7,86 g (34°); in CS_2 0,426 u. 1,11 g (36°); in CCl_4 0,511 u. 3,65 g; in Toluol 86,487 u. 421,53 g. — *i*-Pikrat des Pyridins $\text{C}_6\text{H}_2(\text{OH})(\text{NO}_2)_3 + 2\text{C}_5\text{H}_5\text{N}$, bildet sich unter starker Wärmeentw. beim Auflösen von 25 g Trinitroanisol in 25 ccm Pyridin; orangefarbene Krystalle, F. 97–98° (Block Maquenne), ll. in W., unl. in Bzl., beim Erhitzen auf Pt-Blech lebhaftes Verbrennung; wird die Lsg. in KOH mit Phenylhydrazin behandelt, so findet sofortige Rk. statt. — *1,2,4*-Dinitrophenetol aus HNO_3 umkrystallisiert weiße Nadeln, F. 86° (Block Maquenne), im Luftbade F. 84,75–84,78°; Erstarrungspunkt 83,4 u. 83°. Löslichkeit in W. von 15, 50 u. 100°: 0,0030, 0,0175 u. 0,1678 g; in der Wärme besonders bei 100°, Verseifung zu Dinitrophenol. Löslichkeit in organ. Mitteln bei 15 u. 50°: in Essigester 44,303 u. 137,08 g; in Aceton 106,956 u. 296,59 g; in 96%ig. A. 2,069 u. 11,08 g; in absol. A. 2,816 u. 9,94 g; in CH_3OH 4,019 u. 18,4 g; in Bzl. 63,733 u. 209,80 g; in Chlf. 63,886 u. 186,40 g; in Ä. 5,126 (15°) u. 9,1 g (32°); in Pyridin 95,287 u. 253,79 g; in CS_2 1,096 u. 2,32 g (34°); in CCl_4 0,75 u. 14,40 g; in Toluol 43,039 u. 183,21 g. — *1,2,4,6*-Trinitrophenetol aus HNO_3 weiße Nadeln, F. 78,38–78,41°; Erstarrungspunkt 78,6°; Löslichkeit in 100 g W. von 15, 50 u. 100°: 0,013; 0,044 u. 0,354 g; mit w. W. teilweise Verseifung zu *i*-Pikrinsäure. Löslichkeit in organ. Mitteln (100 g) bei 15 u. 50°: in Essigester 36,55 u. 185,17 g; in Aceton 1,203 u. 410,51; in 96%ig. A. 1,203 u. 7,82 g; in absol. A. 1,671 u. 9,32 g; in CH_3OH 3,991 u. 24,00 g; in den genannten Mitteln (außer Aceton) bildet sich ebenfalls *i*-Pikrinsäure; in Bzl. 49,206 u. 297,25 g; in Chlf. 20,79 u. 174,71 g; in Ä. 3,786 g bei 15°, 7,66 g bei 33,5°; in CS_2 bei 15° 0,430 g, bei 33,5° 1,69 g; in CCl_4 0,667 u. 6,43 g; in Toluol 30,798 u. 162,98 g. Werden 25 g Trinitrophenetol in 25 ccm Pyridin gel., so findet nur allmähliche Wärmerestigerung statt, raschere Wärmeentw. durch Eintauchen in sd. Wasserbad; die erhaltenen orangefarbenen Krystalle haben F. 84,5–85,5°; die Best. des Gehalts an Trinitrophenol deutet auf *Verb.* $\text{C}_6\text{H}_2(\text{OH})(\text{NO}_2)_3 + 2\text{C}_5\text{H}_5\text{N}$. (Moniteur scient. [5] 14. 249–277. 1924.)

HABERLAN

John Reginald Harvey Whiston, *Die Darstellung von 4-Chlor-6-nitro-m-anisidin*. 20,4 g *2,5*-Dichloracetanilid in 80 ccm 96%ig. H_2SO_4 werden bei 0° versetzt mit einem Gemisch von 12 g 66%ig. HNO_3 + 60 g 96%ig. H_2SO_4 (Temperatur nicht über 10° steigen lassen), nach 15 Min. wird auf Eis gegossen, Nd. nach 2 Stdn. mit 8%ig. NaOH erwärmt u. durch Zugabe von W. *2,5*-Dichlor-*p*-nitroanilin ausgefällt, gelb, F. 152–153°. — *4*-Chlor-6-nitro-*m*-anisidin, $\text{C}_7\text{H}_7\text{O}_3\text{N}_2\text{Cl}$, aus voriger durch 8std. Kochen mit CH_3OH + NaOH; aus Bzl. hellgelbe Nadeln, F. 156°. (Journ. Soc. Chem. Ind. 43. T. 370. 1924. Woolwich, Artillery Coll.) I.B.

Roland Hall Griffith, *Substituierte vom p-Kresol stammende Carbonate*. *3,3'*-Dinitroditolylcarbonat (HOLLEMAN, Rec. trav. chim. Pays-Bas 36. 271; C. 191 I. 570) läßt sich durch weitere Nitrierung nicht in das s. Tetranitroderiv. überführen. Einw. von Br auf die Dinitroverb. führt zu einem Tetra bromditolylcarbonat, das bei der Hydrolyse in *Dibrom-p-kresol* (I) zerfällt; die Halogenierung erfolgt zunächst unter Verdrängung der NO_2 -Gruppe. Durch Oleum geht Dinitroditolylcarbonat in die Sulfonsäure II über, die durch Hydrolyse hieraus zu erhaltende Nitrokrolsulfonsäure wurde in Form ihrer Salze isoliert. — Einw. von Br auf Ditolylcarbonat führt zu zwei isomeren Dibromcarbonaten, die jedoch schwierig zu trennen sind. — *3,3'*-Dibromditolylcarbonat wird am besten erhalten durch Einw. von COCl_2 auf das Na-Salz des o-Brom-*p*-kresols. Durch Nitrieren des Dibromcarbonats u. Hydro-

es Nitroprod. erhält man zwei Bromnitrokresole, von denen das mit Wasser flüchtige Prod. Konst. **III** hat, das nicht flüchtige Prod. ist 3-Brom-5-nitro-kresol.



Versuche. *Dibrom-p-kresol*, $C_7H_6OBr_2$ (**I**), 5 g Dinitroditolylcarbonat in 130 ccm S. werden bei 100° mit 6 g Br versetzt (in Ggw. von wenig Fe) u 6—8 Stdn. kochen; das nach Aufgießen auf Eis erhaltene Rohprod. wird mit w. Alkali hydrolysiert; aus PAe. hellgelbe Nadeln, F. 135° . — *K-Salz der Nitrokresolsulfonsäure*, C_7H_5NSK (entsprechend **II**), durch $\frac{1}{2}$ -std. Erhitzen von 5 g Dinitrocarbonat mit ca 18%ig. Oleum auf 125 — 130° , Hydrolyse durch Kalkmilch, Überführen des Salzes in das K-Salz; aus verd. A. strohgelbe Nadeln; Dikaliumsalz, aus sd. A. schneeflockige Krystalle, geht beim Kochen mit alkoh. C_3H_5J unter Abscheidung von J wahrscheinlich über in den Äthyläther der Nitrokresolsulfonsäure. — 3,3'-Dinitroditolylcarbonat, $C_{15}H_{12}O_3Br_2$, Darst. bei 40° in alkoh. Lsg.; aus A. Nadeln, F. 119° . — 2,2'-Dibromditolylcarbonat aus Ditolylcarbonat in sd. $CCl_4 + Br_2$; aus A. Nadeln, F. 119° . — Verb. $C_{15}H_{10}O_7N_2Br_2$ durch Nitrieren einer Suspension von 20 g Dibromcarbonat in 125 ccm H_2SO_4 mit 10 g 70%ig. $HNO_3 + 25$ g H_2SO_4 bei 100° ; aus PAe. F. 176° . Durch Hydrolyse mit w. Alkali hieraus ein Öl, Kp.₁₅ 140° ; aus diesem durch Wasserdampfdest. 2-Brom-5-nitro-p-kresol $C_7H_5O_3NBr$, aus PAe. gelbe Krystalle, F. 62° ; Na-Salz aus A. rote, goldglänzende Tafeln. Mit Wasserdampf nicht flüchtige Rückstand, 3-Brom-5-nitro-p-kresol, bildet eine gummiartige, nicht krystallisierende M. (Journ. Chem. Soc. London **125**, 1924. Oxford, DYSON PERRINS Lab.)

HABERLAND.

E. Mange und Otto Ehler, Löslichkeit von Vanillin. Es wurden die Löslichkeiten von Vanillin in bis zu 30%ig. A. bei 4,4, 15,6 u. $23,9^\circ$ wie auch in wss. Glycerin verschiedener Konz. bei 13 u. 25° bestimmt. Die Lsgg. in Glycerin verschiedener Konz., besonders konz. Lsgg., zeigen oft starke Unterkühlung, bevor die Abscheidung eintritt. Konz. Lsgg. von Vanillin in Glycerin scheiden, wie DODGE (Journ. Americ. Chem. Soc. **44**, 1405; C. **1922**, III, 1377) gezeigt hat, Vanillin ab. Diese Verb. wird durch Erwärmen mit W. hydrolysiert. Bei 25° ist zur vollständigen Hydrolyse ein W.-Gehalt von 7% des Gewichtes des Glycerids erforderlich. Sind im Glycerin-Vanillin-A. u. W. Gemisch 7% W. vom Gewicht des Vanillins anwesend, so unterbleibt bei 25° die Glyceridbildung. (Ind. and Engin. Chem. **16**, 1258—60. 1924. St. Louis, Mon. Chem. Works.)

HABERLAND.

Ponizio, Untersuchungen über die Dioxime. XXI. Mitteilung. (XX. vgl. C. **1924**, II, 2143.) Die von GASTALDI u. RIGOLI, Gazz. chim. ital. **54**, 550; C. **1924**, II, 2143.) beschriebenen beiden Oxime des Phenyl-oxyglyoxims, $C_6H_5 \cdot C(OH) \cdot C(OH) \cdot OH$ (von GASTALDI Oxim der Benzoylformhydroxamsäure genannt) sind identisch. Die α -Form ist nur eine gereinigte β -Form; sie hat nach dem Umkrystallisieren aus Ä. ebenfalls F. 191° . Es existiert das p-Tolyloxyglyoxim (von GASTALDI Oxim der p-Methylbenzoylformhydroxamsäure genannt) nur in einer Form. (Gazz. chim. ital. **54**, 887—90. 1924. Univ.)

ZANDER.

Charles Edmund Wood und Mervyn Arthur Comley, Die Rotationsdispersion der normaler Hexahydromandelsäurealkylester. (Vgl. WOOD, SUCH u. SCARF, Journ. Chem. Soc. London **123**, 600; C. **1923**, III, 117.) Um den Einfluß des Ersatzes der H_3 -Gruppe in Milchsäure durch die Cyclohexylgruppe in bezug auf Änderung

der opt. Eigenschaften festzustellen, wurden die *Methyl- bis Nonylester der opt. Hexahydromandelsäuren* untersucht. Die Kurven der Rotationsdispersion verlaufen bei den neuen Estern alle ähnlich, sie zeigen weder Maxima noch Minima; die Dispersion ist n. u. komplex, der Methylester zeigt bei -12° Annäherung an einfache Rotationsdispersion; in dem Maße, wie das Mol.-Gew. der Ester steigt, nähert sich die Dispersion der anomalen (besonders beim Octyl- u. Nonylester). Geht über den Milchsäureestern (I) zeigen die Hexahydromandelsäureester (II) eine etw. größere molekulare Dispersion, die Rotation nimmt mit steigender Temp. ab (Tabellen im Original); der Temp.-Einfluß ist bei II größer als bei I. Die Werte von II zeigen oberhalb des Amylesters Annäherung an einen konstanten Wert [der Octylester weicht etwas ab, ebenso fällt der Butylester aus der Reihe (Kurven im Original)], vom Methyl- bis Nonylester findet allmählich Annäherung der Rotation an 0 statt; beim Übergang von einem Gliede zum nächst höheren ist die Änderung von $[M]_D$ jedoch gering. — Die Dispersion ist bedingt durch die Gruppen, die das a. Zentrum unmittelbar umgeben, Verlängerung der C-Kette, sowie Änderung der Temp. sind von sekundärem Einfluß.

Versuche. *Hexahydromandelsäure*, $C_8H_{14}O_3$, dargestellt durch Verseifen des aus der Aldehydbisulfitverb. + KCN erhaltenen Nitrils mit konz. HCl; das Nitril wird vorteilhaft sogleich nach seiner B. verseift, Ausbeute nur 47%; F. 147° (korr.), ll. in h. W. u. Ä., l. in A. u. Bzl., aus Aceton nicht gut krystallisierend (vgl. dagegen ZELINSKY u. GUTT, Ber. Dtsch. Chem. Ges. **40**, 3051). — *Hexahydromandelsäureamid*, $C_8H_{15}O_2N$, wird zum Teil bei der Hydrolyse des Nitrils erhalten; aus Bzl. F. 164° , aus W. F. $165,2^{\circ}$ (korr.), aus h. A. Schuppen, l. in Acen, wl. in Ä. u. Lg. — *d-Hexahydromandelsäure*: 20 g Hexahydromandelsäure werden mit n. KOH genau neutralisiert u. zu 20 g Säure + 41 g Chinin in 3 l h. W. gegeben; nachdem allmählich zum Kp. erhitzt worden ist, bleibt die Lsg. über Nacht auf Eis stehen, wobei sich lange farblose Nadeln abscheiden; die überstehende Fl. wird erneut zum Kp. erhitzt u. wie vorher behandelt (insgesamt 8 mal wiederholt); das Chininsalz wird aus 4 u. 3 l W. umkrystallisiert; h. wss. Lsg. mit v. d. NH_4OH versetzt, nach Entfernen des Chinins auf 250 ccm verdampft u. ammoniakalisch gemacht, hieraus durch Ansäuern u. Extraktion mit Ä. die freie Säure; aus Ä. monokline Prismen, F. $129,7^{\circ}$ (korr.), $[\alpha]_D^{25} = +13,51^{\circ}$ (0,8570 g in 6,9 ccm absol. Ä.); Chininsalz aus W. Nadeln, F. 45° , $[\alpha]_D^{25} = -123,24^{\circ}$ (0,4366 g in 10,3 ccm absol. Ä.); Ammoniumsalz, $[\alpha]_D^{24} = -7,78^{\circ}$ (0,5 g + 2,0 ccm NH_4OH , D. 0,88, mit V. auf 7,7 ccm aufgefüllt. Na- u. K-Salz drehen ebenfalls entgegengesetzt wie die Säure. — *l-Hexahydromandelsäure*: 27 g Säure mit n. KOH neutralisiert u. zu 27 g Säure + 51,8 g Morphin in 900 ccm sd. W. werden gemischt, u. durch Abkühlen das Morphinsalz isoliert; nach zweimaligem Umkrystallisieren wird es in 900 W. gel., Morphin mit NH_4OH ausgefällt etc. wie bei der d-Säure; aus Ä. hexagonale Krystallbüschel, F. $129,7^{\circ}$, $[\alpha]_D^{23} = -13,62^{\circ}$ (0,5047 g in 6,6 ccm absol. Ä.); Morphinsalz aus W. Nadeln, F. $127,6^{\circ}$ (Zers.), $[\alpha]_D^{25} = -63,73^{\circ}$ (0,6392 g in 11,6 ccm absol. Ä.); Ammoniumsalz, $[\alpha]_D^{24} = +7,51^{\circ}$ (0,50 g Säure + 2 ccm NH_4OH [D. 0,88] auf 7,7 ccm aufgefüllt). — Bei Spaltung mittels Strychnin u. Brucin erhält man die Salze der d-Säure als weniger l. Verbb.; Strychninsalz aus W. sirupig, Brucinsalz anfangs ebenso, ist aus Aceton als zerfließliche federartige Nadeln zu erhalten; die Spaltung gelingt nur unvollständig. — *Methylester der l-Hexahydromandelsäure*, Darst. am besten (wie auch die anderen Ester) aus dem Alkohol + H_2SO_4 , da nach der HCl-Methode anscheinend oft Lactidb. eintritt. Nach zweimaliger Dest. im Vakuum Kp. $108,7^{\circ}$, F. $4,7^{\circ}$, $\alpha_D^{24} = -23,00^{\circ}$; nach der HCl-Methode dargestellter Ester hat Kp. $116,5^{\circ}$, $\alpha_D^{25} = -23,01^{\circ}$, D. $-14,4$, 1,0992, bei $+17,6^{\circ} = 1,0698$, bei $60,3^{\circ}$ 1,0313, bei $85,9^{\circ}$ 1,0081, bei $128,7^{\circ}$ 0,9686; andere Werte, sowie Rotation bei verschiedenen Temp. u. Wellenlängen (auch für die


folgenden Verbb.) vgl. Original. — *Methylester der d-Hexahydromandelsäure*, 10,4—110,9°, $\alpha_D^{25} = +23,11^\circ$. — *Äthylester der l-Hexahydrosäure*, nach dreier Vakuumdest. Nadeln, F. 43,1° (korrr.), Kp.₂₀ 133°, D._{39,4} 1,0160; bei 73,1° 0,9868; bei 138,9° 0,9293; bei 167,3° 0,9048. — *n-Propylester der d-Hexahydrosäure* nach der HCl-Methode dargestellt; nach einmaliger Vakuumdest. $\alpha_D^{23} = +3,6^\circ$, nach fünfmaliger Dest. Kp.₅ 129,5—130°, konstante Rotation: $\alpha_D^{23} = +3,6^\circ$. — *n-Propylester der l-Säure*, nach der HCl-Methode $\alpha_D^{23} = -8,31^\circ$; nach SO₄-Methode nach viermaliger Dest. im Vakuum: Kp.₅ 130°, F. 4,6°, $\alpha_D^{19} = +1,7^\circ$; D.₄ 1,0334, bei 34,9° 1,0038; bei 64,6° 0,9776; bei 103,7° 0,9433; bei 152,2° 0,9015. — *n-Butylester der l-Hexahydrosäure*, Kp.₁₁ 147°, F. -7,7°, D.₄ 1,0213; bei +4,3° 1,0118; bei 38,3° 0,9841; bei 97,4° 0,9357; bei 159,5° 0,8956, $[\alpha]_D^{14} = -7,94^\circ$. — *n-Amylester der d-Hexahydrosäure*, Kp.₁₂ 164,5°, F. -2,5°, $[\alpha]_D^{23} = +4,43^\circ$; D.₄ 1,0135; bei +16,6° 0,9926; bei 51,3° 0,9640; bei 114,6° 0,9133; bei 159,1° 0,8745. — *n-Hexylester der l-Hexahydrosäure*, Kp.₇ 160,5°, F. -5°, D.₄ 1,0091; bei +14,3° 0,9861; bei 57,2° 0,9518; bei 101,3° 0,9136; bei 154,6° 0,8893; bei 154,6° 0,8704; $[\alpha]_D^{20,7} = -4,15^\circ$. — *n-Heptylester der d-Hexahydrosäure*, Kp.₁₂ 182,5°, F. -7,1°, D.₄ 1,0054, 0,9952; bei +12,5° 0,9780; bei 66,8° 0,9433; bei 115,2° 0,8966; bei 165,5° 0,8563; $[\alpha]_D^{23,1} = +3,74^\circ$; wird nach 2-std. in auf 183° teilweise racemisiert. — *n-Octylester der l-Hexahydrosäure*, Kp.₁₂ 184,7°, F. 7,8°, D.₄ 1,0064, 0,9861; bei +7° 0,9738; bei 48,9° 0,9421; bei 111,8° 0,9041; bei 156,9° 0,8584; bei 203,1° 0,8240; $[\alpha]_D^{23} = -3,08^\circ$. — *n-Nonylester der l-Hexahydrosäure*, Kp.₁₆ 193,3—194,5°, Prismen, F. +5,4°, D.₄ 1,0054, 0,9757; bei 14,7° 0,9433; bei 85° 0,9087; bei 121,3° 0,8791; bei 201,5° 0,8192; $[\alpha]_D^{22,5} = +3,04^\circ$; bei 201° Temp. (201°) wird die Rotation bei großen Wellenlängen (wie auch bei anderen Ester) entgegengesetzt. — Die Ester bis zum Amylester riechen äpfelartig. — Chem. Soc. London 125. 2630—46. 1924. Edgbaston, Univ. of Birmingham.)

HABERLAND.

Murayama und K. Otsuka, Über die Bildung von Borneol aus Terpinenol. Einwirkung von Pikrinsäure und Styphninsäure auf Terpinenol. (II. vgl. Murayama, ABE u. YAMAGISHI, Journ. Pharm. Soc. Japan 1924. Nr. 507. 3; 4. II. 1186.) Aus links- u. rechtsdrehenden amerikanischen Terpinenölen wurden Dest. über Na Pinene vom Kp. 158—161° u. den Drehungen -8,00° bezw. +1,00° dargestellt u. durch Erhitzen mit Pikrinsäure in ein l-Pikrat, F. 133°, bezw. dargestellt u. durch Erhitzen mit Styphninsäure in ein i-Pikrat, F. 133°, bezw. übergeführt. Ersteres lieferte mit sd. Alkali l-Borneol, letzteres i-Borneol, Übereinstimmung mit den Befunden früherer Bearbeiter. Aus der Pikratmutter wurde durch Schütteln mit W., Dampfdest. u. Verd. mit A. ein neues, isomeres Pikrat, C₁₀H₁₆, C₆H₂(NO₂)₃(OH), isoliert. Gelbliche Platten aus A., F. 97—99°. Styphninsäure wirkt wie Pikrinsäure, aber die Ausbeuten an Borneol sind sehr gering. (Journ. Pharm. Soc. Japan 1924. Nr. 513. 1—2.)

LINDENBAUM.

John Reginald Harvey Whiston, Darstellung von i-Diphenetidin. Die Verb. wird auf folgendem Wege synthetisiert: m-Nitrophenetol aus m-Nitrophenol in sd. NaOH + p-Toluolsulfonsäureäthylester; nach 6—7-std. Kochen unter Rückfluss wird NaOH zugegeben u. die Verb. mit Wasserdampf abdest., F. 33°. — m-Nitrooxyhydrobenzol, C₁₆H₂₀O₂N₂, aus voriger durch Red. mittels Zn + alkoh. NaOH (Wasserbad); aus PAe. weiße Kristalle, F. 86°. — i-Diphenetidin, C₁₆H₂₀O₂N₂ (nebenst.), aus voriger in 33%ig. HCl; zuerst 15 Min. auf sd. Wasserbad, danach




lang gekocht u. mit h. W. versetzt; beim Alkalisieren sich abscheidende Base wird aus Bzl., danach zweimal aus A. umkristallisiert; F. 109°; gibt bei Tetratieren u. Kuppeln substantive Baumwollfarbstoffe nur mit Säuren vom

Typus der 8-Amino- α -naphthol-5-sulfonsäure. (Journ. Soc. Chem. Ind. **43**. T. bis 370. 1924. Woolwich, Artillery Coll.)

HABERLAND

Sikhibhushan Dutt und **Jocelyn Field Thorpe**, *Ringkettentautomerie*. XI. *Fluoresceine und Rhodamine*. (X. vgl. DICKENS, HORTON u. THORPE, Journ. Soc. London **125**. 1830; C. 1924. II. 2464.) Der Übergang der farblosen Base in das gefärbte Salz bei den *Fluoresceinen* u. *Rhodaminen* wird auf eine Strukturänderung der Lactonform in das chinoide Form zurückgeführt (Ia—b u. IIa—b). Dieser Übergang ist auf dieselbe Ringkettentautomerie zurückzuführen, wie z. B. zwischen einer γ, δ -ungesätt. Säure (III) u. ihrem isomeren γ -Lacton (IV) steht. Folgende Tatsachen können für die Richtigkeit des angenommenen Mechanismus beim Übergang der farblosen in die farbigen genannten Verbb. angeführt werden: wie aus Phthalanhydrid entstehen Fluoresceine u. Rhodamine auch aus *Anhydriden der Bernstein- u. Glutarsäurereihe*. In früheren Mitteilungen ist nachgewiesen worden, daß Substitution an den C-Atomen der Bernstein- u. Glutarsäure die Stabilität der aus diesen Säuren gebildeten Ringkomplexe stark beeinflusst. Bei den Fluoresceinen V u. VI, sowie den Rhodaminen VII u. VIII (die Bernstein- bzw. Glutarsäurederiv. sind), worin $RR_1 = HH, CH_3 \cdot CH_3, C_2H_5 \cdot CH_3, C_2H_5 \cdot C_2H_5$ u. den Cyclohexanring bedeuten kann, müssen sich die Absorptionsspektren deutlich voneinander unterscheiden; wird die Stabilität des Lactonringes in den Bernstein- u. Glutarsäurederiv. durch genannte Gruppen beeinflusst, so muß sich auch sein Einfluß in der neutralen Lsg. der Base dadurch bemerkbar machen, daß die Intensität der Absorptionsspektren in der Reihenfolge der substituierenden Gruppen abnimmt. Die spektr. Unterss. (Tabellen im Original) bestätigen diese Annahme in neutraler Lsg. besteht ein Gleichgewicht zwischen den lactoiden u. chinoiden Formen, das sich bei Änderung des Tetraederwinkels (infolge Substitution) gleichfalls ändert. Die B. der Alkalisalze (2 Mol. NaOH) stabilisiert in Lsg. die farbige (chinoide) Form, überschüssiges Alkali (20 Mol.) bewirkt eine weitere Stabilisierung, wie aus den Absorptionsspektren (Tabellen im Original) hervorgeht. Bei den Iso-



muß, da die COOH-Gruppe durch Mineralsäure, die die Lacton- in die Verb. überführt, nicht beeinflusst wird, das Absorptionsspektrum bei Ggw. wässriger Säure prakt. unverändert bleiben, eine Annahme, die durch das Experiment bestätigt wird (vgl. Tabellen im Original). — Zwecks Feststellung des Einflusses des Bernsteinsäureanhydrids, das mit Resorcin bezw. m-Dimethylaminocyanhydrat reagiert, wurde *Dimethylsuccinylfluorescein* (V; $R = R_1 = CH_3$) mit KOH versetzt; da als Spaltstücke *Resorcin* u. *i-Valeriansäure* erhalten wurden, folgt daraus, daß das der CH_2 -Gruppe benachbarte CO in Rk. getreten war.

Versuche. α, α -*Diäthylbernsteinsäure*, $C_8H_{14}O_4$, 36 g α -Cyan- β, β -diäthylacryloyl-ester in 400 ccm A. + 15 g KCN in 25 ccm W. bleiben 14 Tage stehen; dann wird A. abdest., die Lsg. angesäuert u. das ausfallende Öl durch 10-stünd. Waschen mit HCl (5 Vol.) hydrolysiert; nach Extrahieren mit Ä. wird die äth. Lsg. mit Na_2CO_3 extrahiert u. hieraus die Säure gefällt; Waschen mit PAe., danach Extrahieren mit HCl umkrystallisiert; F. 108°. — Darst. der Fluoresceine nach G. I. POPE (Journ. Chem. Soc. London **123**. 2934; C. 1924. I. 1380); für die Darstellung von Fluoresceinen ist zu empfehlen, die Kondensation nur kurze Zeit bei 180° zu erhitzen zu lassen, bis B. von W. anfängt u. dann 2 Stdn. auf 150–160° zu erhitzen; Reinigung durch Lösen in Na_2CO_3 u. Fällen mit Essigsäure. Dargestellt nach folgender Verbb.: *Succinylfluorescein* (V, $R = R_1 = H$), rötlichbraune, metallglänzende Nadeln, F. 234° (Zers.), konz. alkal. Lsg. rot, verd. Lsg. gelb mit starker grüner Fluorescenz, Lsg. in konz. H_2SO_4 orangefarben; unl. in A., Essigsäure, Ä., unl. in Lg., l. in h. verd. HCl. — *a. Dimethylsuccinylfluorescein* (V, $R = R_1 = CH_3$), braune Nadeln, F. 262–264° (Zers.), Lsg. in Alkali, konz. H_2SO_4 u. in organ. Mitteln wie vorige. — *a. Methyläthylsuccinylfluorescein* ($R, R_1 = CH_3, C_2H_5$), braune Nadelbüschel, F. 252° (Zers.), in konz. H_2SO_4 orange; Löslichkeit u. Lsg. in organ. Mitteln wie vorige. — *a. Diäthylsuccinylfluorescein* (V, $R = R_1 = C_2H_5$), gelbe Nadeln, F. 262° (Zers.), konz. alkal. Lsg. orange, verd. Lsg. gelb, gelblichgrün leuchtend; in konz. H_2SO_4 orangegelb; Löslichkeit wie vorige. — *a. Cyclohexan- succinylfluorescein* (V, $R, R_1 =$ Cyclohexanrest), braune Nadeln, F. 278° (Zers.), Lsg. in konz. H_2SO_4 gelb, in Alkali wie vorige, ebenso Löslichkeit. — *Glutarylfluorescein* (V, $R = R_1 = H$), rötlichbraune Nadeln, F. 235° (Zers.), in konz. Alkali dunkel verd. tiefgelb mit gelblichgrüner Fluorescenz; in konz. H_2SO_4 rot; unl. in A., Essigsäure, Aceton, Ä. u. W., unl. in PAe., l. in h. verd. HCl. — β, β -*Dimethylglutarylfluorescein* (VI, $R = R_1 = CH_3$), bräunlichgelbe Nadeln, F. 240–245° (Zers.), Löslichkeit, Lsg. in Alkali u. H_2SO_4 wie vorige. — β, β -*Methyläthylglutarylfluorescein* (VI, $R, R_1 = CH_3, C_2H_5$), braune Nadeln, F. 278–280° (Zers.); Verh. wie vorige. — β, β -*Diäthylglutarylfluorescein* (VI, $R = R_1 = C_2H_5$), gelblichbraune Nadeln, F. 162–165° (Zers.), konz. alkal. Lsg. rot, verd. gelb wie vorher; Lsg. in konz. H_2SO_4 orangefarben. — β -*Cyclohexan- glutarylfluorescein* (VI, $R, R_1 =$ Cyclohexanrest), gelblichbraune Nadeln, F. 238–242° (Zers.), konz. alkal. Lsg. orange, verd. Lsg. gelblichgelb.

Rhodamine wurden dargestellt nach D. R. P. 51983 (Frdl. **II**. 86 [1891]). Darst. wurde mit W. verrieben, mit verd. NH_4OH extrahiert u. der Rückstand mit HCl gel.; aus den Chlorhydraten wurden mittels NH_4OH die Basen erhalten, die zum Teil erneut in die Chlorhydrate übergeführt wurden. Dargestellt nach folgender Verbb.: *Succinylrhodamin* (VII, $NR_2 = N[CH_3]_2$, $R = R_1 = H$); Chlorhydrat glänzende Nadeln, F. 225–230° (Zers.), in W. bläulichrot mit orangefarbener Fluorescenz; ll. in W., unl. in organ. Mitteln u. verd. HCl. — *a. Dimethylsuccinylrhodamin* (VII, $R = R_1 = CH_3$); Chlorhydrat ebenso gefärbt wie voriges, F. 224–228° (Zers.), Verh. in W. u. gegen Lösungsmittel wie voriges. — *a. Methyläthylsuccinylrhodamin* (VII, $R, R_1 = CH_3, C_2H_5$), Chlorhydrat wie voriges, F. 250° (Zers.). — *a. Cyclohexansuccinylrhodamin*, dunkel rötlichbraune, goldglänzende

Nadeln, F. 110—112° (Zers.), Lsg. in HCl wie voriges Chlorhydrat in W., ll. Aceton, Bzl., wl. in A. u. Lg., ll. in Säuren. — *Glutaryl-rhodamin* (VIII, N[CH₃]₂, R = R₁ = H), rötlichviolett Pulver, F. 190—195° (Zers.), Lsg. in HCl bläuerot, orangebraun fluoreszierend, ll. in Säuren, l. in A., Aceton u. Bz. in Ä., swl. in Lg. — *β,β-Dimethylglutaryl-rhodamin* (VIII, R = R₁ = H), violettrote Nadeln, F. 165—170°, in HCl u. Löslichkeit wie vorige. — *β,β-Methylglutaryl-rhodamin* (VIII, R, R₁ = CH₃, C₂H₅), F. 112—115° (Zers.), Farbe wie vorige. — *β,β-Diäthylglutaryl-rhodamin* (VIII, R = R₁ = C₂H₅), F. 120—125° (Zers.), Farbe u. Verh. wie vorige. — *β-Cyclohexanglutaryl-rhodamin* (VIII, R₁ = Cyclohexanrest), dunkelviolettrote Nadeln, F. 150—153° (Zers.), Verh. wie vorige (Journ. Chem. Soc. London 125. 2524—38. 1924. South Kensington, Imp. Chem. Co. Sc. and Techn.)

HABERLAND.

J. Pascual, *Die Herstellung von i-Benzaldehyd-benzoin*. Man erhält i-Benzaldehyd-benzoin mit annähernd quantitativen Ausbeuten, wenn man Benzylaldehyd mit Br₂ in CCl₄ reagieren läßt u. das entstandene Brombenzylaldehyd in k. Essigsäure mit Ag-Acetat reagieren läßt. Das als Zwischenprod. erhaltene (*β*)-Brombenzylaldehyd-benzoin, C₂₁H₁₇OBr, ist verschieden von der bereits bekannten Verb. C₆H₅·CO·CH(CHBr·C₆H₅)·C₆H₅ (vgl. THIELE u. RUGGLI, LIEBIGS Ann 36. 75; C. 1912. II. 1771), dürfte daher das Br in α-Stellung zum CO haben. Es bildet gelbliche Prismen oder Nadeln, F. 86—87°, sl. in Ä., CCl₄ u. Bzl., wlg. l. in A. u. Bzn. (Annales soc. esp. Fis. Quim. 22. 509—12. 1924. Barcelona, Fac. de Ciencias.)

SPIELMANN.


J. A. Ambler, D. F. J. Lynch und H. L. Haller, *Naphthalinsulfonsäuren*. VI. *Sulfonierung des Naphthalins im Dampfzustande*. (V. vgl. HALLER u. LSCHE, Ind. and Engin. Chem. 16. 273; C. 1924. II. 1835.) 2,7-Naphthalindisulfonsäure wird in 78—85%ig. Ausbeute erhalten, wenn Naphthalindämpfe bei 220—240° in konz. H₂SO₄ in Berührung kommen. Der App. (Abbildung im Original) besteht in der Hauptsache aus einer gußeisernen senkrecht stehenden Röhre, die an ihrer Länge mit Quarzsteinen gefüllt ist, u. durch deren eine untere Öffnung C₁₀H₈-Dämpfe eintreten; die Sulfonierungsprodd. (außer 2,7-Säure auch zwei 2,6-Disulfonsäure u. wenig β-Monosulfonsäure) fließen durch eine zweite Öffnung im Boden ab. Die H₂SO₄ (80—95%ig.) fließt in gleichmäßigem Strome durch die obere Öffnung der Röhre, durch die auch gasförmige Reaktionsprodd. entweichen auf die erhitzten Quarzsteine. Die genannte Ausbeute an 2,7-Disulfonsäure wird erhalten, wenn 3—3,5 Teile H₂SO₄ mit 1 Teil Naphthalin reagieren. Der App. arbeitet kontinuierlich. Das Eisengefäß wird nur wenig angegriffen. (Ind. and Engin. Chem. 16. 1264—66. 1924. Washington, Bureau of Chem.)

HABERLAND.

R. F. Chambers und P. C. Scherer, *Benzylpseudothioharnstoffsalz von Naphthalinsulfonsäuren*. Die genannten Salze wurden, da durch W. leicht Hydrolyse eintritt, in 0,2-n. HCl als Lösungsm. dargestellt. Wegen der Unterschiedlichkeit der FF. eignen sie sich gut zu Identifizierung der Naphthalinsulfonsäuren, ihre Hydrolyse (mittels NaOH) ermöglicht die Reindarst. der Säuren. — *Benzylpseudothioharnstoffsalz der α-Naphthalinmonosulfonsäure*, aus w. 0,2-n. HCl orthorhomb. Nadeln, nach zweimaligem Umkrystallisieren aus 0,2-n. HCl (sd.), F. 136—137°, in A., Aceton, Eg., wl. in h. Bzl. u. Ä.; von 0—100° (steigend um je 10°) verd. gel. in 0,2-n. HCl: 4,4; 5,8; 7,7; 10,1; 13,5; 17,8; 23,5; 30,9; 40,4; 54,0; 70,0 g pro l. — *Salz der β-Naphthalinsulfonsäure*, aus h. 0,2-n. HCl flache, durchsichtige Prismen, F. 188—189°, unl. in k. organ. Mitteln, wl. in der Hitze; Löslichkeit in 0,2-n. HCl von 0—100° (wie vorher): 0,2; 0,3; 0,5; 0,8; 1,2; 2,2; 3,5; 5,1; 8,1; 13,7; 21,6 g pro l. — *Salz der 1,5-Naphthalindisulfonsäure*, aus 0,2-n. HCl als feine mit pyramidalen oder prismat. Endfläche, F. 244—245° (geringe Zers.), unl. in h. k. Aceton, Ä., Bzl. u. Eg., wl. in sd. A. Löslichkeit in 0,2-n. HCl von 0—100°

0,07; 0,16; 0,35; 0,77; 1,7; 3,6; 7,8; 16,8; 35,7; 77,6 g pro l. — Salz der *phthalindisulphonsäure*, aus h. 0,2-n. HCl rundliche Körner, F. 199—200° (Zers.), in h. A. u. Eg., unl. in k. A., h. u. k. Aceton, Ä. u. Bzl.; Löslichkeit in 0,2-n. HCl von 0—100°: 0,7; 1,2; 2,2; 3,9; 6,6; 11,5; 20,0; 34,7; 59,4; 103,5; 177 g pro l. — Salz der *2,6-Naphthalindisulphonsäure* aus sd. 0,2-n. HCl Nadeln, ohne F. bei 200°; l. in h. A. u. Eg., unl. in k. u. h. Aceton, Ä. u. Bzl.; Löslichkeit in 0,2-n. HCl von 0—100°: 0,7; 1,1; 1,6; 2,4; 3,7; 5,7; 8,8; 13,3; 20,4; 47,3 g pro l. — Salz der *1,6-Naphthalindisulphonsäure* wird erst nach längerem Stehen im Eisschrank fest; aus 0,2-n. HCl runde, unregelmäßige Krystalle F. 234—235° (Zers.), wl. in h. A., Bzl. u. Eg., unl. in Aceton u. Ä. (Ind. and Engin. Chem. 16. 1272—73. 1924. Providence, Brown Univ.) HABERLAND.

John Winifred Carnelley und Pavitra Kumar Dutt, *2,5-Iminodihydro-1,2,3-triazol*. II. (I. vgl. DUTT, Journ. Chem. Soc. London 123. 265; C. 1923. I. 21) Die Einw. von p-Toluidin auf *5-Chlor-1,4-diphenyl-1,2,3-triazol* (I) einerseits, Anilin auf *5-Chlor-4-phenyl-1-p-tolyl-1,2,3-triazol* (II) andererseits sollte nach DIMROTH (LIEBIGS Ann. 335. 102 [1904]. 364. 183 [1909]) zu den isomeren *Aminonaphthalen* III bezw. IV führen. Vff. haben bei Nacharbeitung der Verss. in jedem Fall ein Isomerengemisch der Zus. $C_{21}H_{18}N_4$ erhalten, aus dem sie Verb. A (F. 227—228°) u. B (F. 171—172°) isolieren konnten; durch Erhitzen der einzelnen Verbb. entsteht eine Gleichgewichtsmischung von A u. B. DIMROTH (LIEBIGS Ann. 3345 [1910]) hat die tautomere Umlagerung nach untenstehendem Schema einerseits eine Annahme, die jedoch nicht mit dem chem. Verh. übereinstimmt, denn die alkoh. C_2H_5ONa erleiden III u. IV isomere Umlagerung, ohne (wie z. B. Acetessigester) N_2 zu entwickeln. A u. B können nur durch längere Einw. von Acetanhydrid + CH_3COCl acetyliert werden; in salzsaurer Suspension ist HNO_3 ein Wrkg., in Eg.-Lsg. gibt A mit HNO_3 eine Additionsverb., B ein Mononitrosoderiv.; in alkoh. HCl geben beide Verbb. Nitrosamine. Einw. von sd. alkoh. HCl oder Hydrolyse seines Nitrosoderiv. gab A sowie ein Gemisch von Isomeren; B wurde anscheinend nicht gebildet. Die isomere Umlagerung verläuft also in beiden Fällen anders als bei Einw. von Hitze. Die Konst. von A u. B ist vorläufig noch nicht sicher.




Versuche. *5-Oxy-1,4-diphenyl-1,2,3-triazol*, Darst. nach DIMROTH (l. c. 1904), durch Zers. des Na-Salzes; aus A. Nadeln, F. 166° (Zers.). — *5-Oxy-1,4-diphenyl-1,2,3-triazol*, $C_{15}H_{13}ON_3$, aus CH_3OH Nadeln, F. 173—174° (Zers.). — *5-Chlor-1,4-diphenyl-1,2,3-triazol* (I), durch Zugabe von 30 g der erstgenannten zu 30 g PCl_5 in 70—80° w. Bzl. (250 cem) u. Kochen unter Rückfluß bis Entw. beendet; aus CH_3OH F. 137—138°. — *5-Chlor-4-phenyl-1-p-tolyl-1,2,3-triazol*, $C_{15}H_{13}ON_3$ (II), B. analog I; aus CH_3OH Nadeln, F. 124—125°. — Verb. $C_{21}H_{18}N_4$ (A), 15 g I + 15 g p-Toluidin + 20 cem absol. A. durch 16-std. Erhitzen auf 120° (im Rohr), danach 6—8 Stdn. auf 135—145°; nach Wasserdampfdest. bleibender Rückstand wird einige Male aus A. umkrystallisiert; rhomb. II. 1.

Tafeln, F. 227—228°; in A. sind 0,5% l., in mit HCl gesätt. A. 15% l., w. in CH₃OH, Bzl., Acetanhydrid u. k. Eg., unl. in W., Lg. u. k. konz. HCl, in 1 l. d. konz. HCl ist 0,1 g l.; aus der nach dem ersten Umkrystallisieren erhaltenen Mutterlauge wird Verb. B erhalten; wollige Nadeln, F. 171—172°. Sintern bei 169°; ist in vorher genannten Mitteln etwas leichter l. (außer HCl) als Verb. A. Beide Verbb. werden in fast demselben Verhältnis erhalten, wenn II mit A analog behandelt wird (5—6 g A, 0,5 g B). — Verb. C₂₁H₁₃N₄, HNO₂, durch mähliche Zugabe von 2 g NaNO₂ zu 2 g A in 300 ccm Eg.; das nach 24 Std. Stehen durch W. ausgefällte rohe Reaktionsprod. gibt noch schwache Liebermannsche Nitrosork.; aus Eg.-CH₃OH-Gemisch hellgelbe Nadeln, F. 135—140° (Zers.), in Liebermannschem Reagens gelbe Lsg.; wird die alkoh. Lsg. des Rohprod. gekocht, so entsteht eine Verb. unbekannter Konst., dunkelgelbe Prismen, F. 196—198°; in Liebermannschem Reagens gelbe Lsg. gebend. Einw. von k. rauchender HO auf die Verb. mit F. 135—140° gibt, nach Umkrystallisieren aus Eg.-CH₃OH gelbe Nadeln, F. 193—194° (Dinitroverb.?). — Mononitroderiv. der Verb. B aus 1 g in 100 ccm Eg. + 1 g NaNO₂; aus Bzl.-CH₃OH flache gelbe Nadeln, F. 197—198°; mit Liebermannschem Reagens orangefarbene Lsg. Wird Verb. A in mit C gesätt. alkoh. Lsg. mit NaNO₂ behandelt, die Lsg. nach 12-std. Stehen mit W. versetzt, so entsteht ein gelber Nd., der aus CH₃OH umkrystallisiert verschiedene unreine Fraktionen gibt, die sich bei ca. 140° zers. u. Nitrosaminrk. geben. Hydrolyse des Rohprod. führte zu unreiner Verb. A (Isomerengemisch) mit F. 190 bis 217°. — Verb. B analog mit NaNO₂ in alkoh. HCl behandelt, gab ein Gemisch gelber u. farbloser Nadeln, die die Nitrosaminrk. gaben. — Verb. C₂₃H₃₀ON₄, durch Acetylieren von Verb. A; aus CH₃OH rhomb. Prismen, F. 114—115°, ll. in organ. Mitteln, bei längerem Kochen mit alkoh. HCl Verseifung u. B. der Verb. A mit F. 210—217° (Isomerengemisch). Verb. B acetyliert gibt aus CH₃OH monokline Prismen, F. 126—127°, ll. in organ. Mitteln. (Journ. Chem. Soc. London 125, 771 bis 2481. 1924. Leeds, Univ.)

HABERLAN.

Harold King und William Owen Murch, Trypanocide Wirkung und chemische Konstitution. I. Arylamide der p-Aminophenylarsinsäure. Durch Kondensation von p-Aminophenylarsinsäure mit den drei isomeren Nitrobenzoylchloriden wurden o', m'- u. p'-Mononitrobenzoyl-p-aminophenylarsinsäure u. aus denselben entsprechenden Aminoverbb. hergestellt. Die p'-Aminoverb. ließ sich nach einem angewandten Verf. (mittels FeCl₂) nur schwierig darstellen; ein bequemerer Verf. ergab sich durch Überführung der p-Aminobenzoesäure in p-Carbäthoxyaminobenzoesäure u. Kondensation des Chlorids dieser Säure mit p-Aminophenylarsinsäure zu p'-Carbäthoxyaminobenzoyl-p-aminophenylarsinsäure, aus der die freie p'-Aminobenzoylverb. leicht erhalten werden kann. Als Dosis tolerata bei Mäusen (in mg pro g Maus) wurde gefunden: p-Benzoylaminophenylarsinsäure 0,05, o'-Nitroverb. 1,0; m'-NO₂ 0,6; p'-NO₂ 0,3; o'-NH₂ 0,5; m'-NH₂ 0,6; p'-NH₂ 0,175; bezüglich der trypanociden Wrkg. (Trypanosoma equiperdum) ergab sich, daß die Nitroverbb. wirkungslos waren, die Aminoderivv. verursachten nur zeitweises Verschwinden der Trypanosomen bei Injektion folgender Mengen o'-NH₂ 0,4; m'-NH₂ 0,18 u. p'-NH₂ 0,09. Durch Diazotieren geht o'-Aminobenzoyl-p-aminophenylarsinsäure sofort in 1,2,3-Benzotriazon-3-phenyl-p-arsinsäure (I) über, in der Verb., die selbst bei der maximalen Dosis tolerata (0,025) vollkommen wirkungslos ist. — Wird die m'- u. o'-Aminobenzoyl-p-aminophenylarsinsäure erneut mit den Nitrobenzoylchloriden kondensiert, so entstehen o'', m''- u. p''-Mononitrobenzoyl-m'-(bzw. o'-)aminobenzoyl-p-aminophenylarsinsäuren, aus denen durch Reduktion entsprechenden Aminoderivv. erhalten werden. Diese Verbb. zeichnen sich durch geringe Löslichkeit ihrer mineralsauren u. Alkalisalze aus. Dosis tolerata für o''-NO₂-m',p-Verb. 0,3; m''-NO₂-m',p 0,1; p''-NO₂-m',p 0,04; o''-NH₂-m',p-Verb. 1,4

$\text{N}_2\text{-m}'\text{p}$ 0,1; $\text{p}''\text{-NH}_2\text{-m}'\text{p}$ 0,25; $\text{o}''\text{-NO}_2\text{-o}'\text{p}$ 0,4; $\text{m}''\text{-NO}_2\text{-o}'\text{p}$ 0,1, ebenso $\text{p}''\text{-NO}_2\text{, N}_2\text{, u. m}''\text{-NH}_2$; $\text{p}''\text{-NH}_2\text{-o}'\text{p}$ 0,05. Gegen Trypanosomen war zeitweise (14 Tage) nur $\text{p}''\text{-Aminobenzoyl-m}'\text{-aminobenzoyl-p-aminophenylarsinsäure}$ (Dosis 0,175). Dem Vorbilde des Germanins sollten die Aminoderivv. mittels COCl_2 in die entsprechenden s. Harnstoffabkömmlinge übergeführt werden. $\text{p-Aminophenylarsinsäure}$ lieferte hierbei s. *Diphenylcarbamid-p,p'-diarsinsäure*; die p-Aminoverbb. der künftigen Derivv. gaben kein oder nur sehr wenig Carbamid, die Ausbeuten an o-Aminoverbb. waren besser, die m-Derivv. lieferten Carbamide in 60 bis 80% Ausbeute; diese Carbamide haben kolloidale Eigenschaften, die Lsgg. der Salze erstarren schon nach kurzer Zeit gelartig; eine trypanocide Wrkg. zeigt sich bei ihnen nicht. — Bei der Red. der Nitroarsinsäuren mittels FeCl_2 zu den Amino-Verbb. haben Vff. beobachtet, daß die Ausbeute an $\text{NH}_2\text{-Deriv.}$ abhängig ist von der Reihenfolge, in der Alkali u. FeCl_2 zugegeben werden. Wird z. B. $\text{m}'\text{-Nitrobenzoyl-p-aminophenylarsinsäure}$ in Alkali mit FeCl_2 u. Alkali gleichzeitig versetzt, erhält man 40% Aminoverb., wird jedoch zuerst alles FeCl_2 , u. danach Alkali zugesetzt, so steigt die Ausbeute auf 80%.




Versuche. *Benzoyl-p-aminophenylarsinsäure*, $\text{C}_{13}\text{H}_{12}\text{O}_4\text{NAs}$, aus $\text{p-aminophenylarsinsäurem Na}$ (25 g des wasserhaltigen Salzes) in 250 ccm W. 150 ccm NaOH u. 2 Mol. $\text{C}_6\text{H}_5\text{COCl}$ (unter gutem Rühren bei 0°); nach Ansäuern mit 2-n. NH_4OH gel., Lsg. mit MgCl_2 versetzt, aus ausfallendem Mg-Salz die *Äthylester*; aus Eg. oder Ameisensäure Prismen; Ammoniumsalz, $\text{C}_{13}\text{H}_{11}\text{O}_4\text{NAsNH}_4$, (Nadeln. — $\text{p}'\text{-Nitrobenzoyl-p-aminophenylarsinsäure}$, $\text{C}_{13}\text{H}_{11}\text{O}_6\text{N}_2\text{As}$, B. analog p-N ; das Chlorid der Nitrosäure wird in Bzl.-Lsg. zugefügt; aus sd. Ameisensäure Nadelbüschel, wl. in sd. Eg.; Na- u. $\text{NH}_4\text{-Salz}$ sind wl., krystallisieren in Ä. — $\text{m}'\text{-Nitrobenzoyl-p-aminophenylarsinsäure}$, $\text{C}_{13}\text{H}_{11}\text{O}_6\text{N}_2\text{As}$, aus sd. Eg. oder Ä. lange Nadeln; Na- u. $\text{NH}_4\text{-Salz}$ Nadeln. — $\text{o}'\text{-Nitrobenzoyl-p-aminophenylarsinsäure}$, $\text{C}_{13}\text{H}_{11}\text{O}_6\text{N}_2\text{As}$, wird von o-Nitrobenzoesäure befreit, indem das Reaktionsgemisch mit Ä. ausgeschüttelt wird; aus sd. W. Nadeln, aus k. A. Tafeln. — $\text{p-Carbothoxyaminobenzoesäure}$, $\text{C}_{10}\text{H}_{11}\text{O}_4\text{N}$, durch Schütteln der Aminosäure in NaOH mit $\text{p-Nitrobenzoesäureester}$ bei 0° ; F. 208—209° (korr.), aus sd. A. (1 Teil l. in 5 Teilen Ä.). — $\text{p-Carbothoxyaminobenzoylchlorid}$ aus voriger + 5 Vol. CH_3COCl + PCl_5 , Nadeln, l. in 10 Teilen Ä. — $\text{p-Carbothoxyaminobenzoesäuremethylester}$, $\text{C}_{11}\text{H}_{13}\text{O}_4\text{N}$, aus vorigem durch Behandeln mit CH_3OH , halbmondförmige Tafeln, F. 162° (korr.); *Äthylester*, Nadelrosetten, F. 131—132° (korr.); *n-Butylester* aus Ä., F. 89—90° (korr.). — *n-Butylester der p-Nitrobenzoesäure* aus wenig A. (Nadeln, F. 35—36°, ll. in organ. Mitteln. — $\text{p}'\text{-Aminobenzoyl-p-aminophenylarsinsäure}$, $\text{C}_{13}\text{H}_{13}\text{O}_4\text{N}_2\text{As}$, aus der Nitroverb. (14,6 g in 43 ccm 2-n. NaOH + 80 ccm Ä. durch 4malige Zugabe von je 7 g $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_4$ (Temp. unter 2°); ausfallendes Gemisch von Aminosäure u. unveränderter Nitroverb. wird in 0,5-n. NH_4OH gel. u. filtrieren mit konz. HCl neutralisiert (Kongopapier); ausfallende Säuren mit 40%ig. H_2SO_4 digeriert, unl. Rückstand wird weiter mit kleinen Mengen H_2SO_4 behandelt, bis nichts Diazotierbares zurückbleibt; die Filtrate werden eingießen in W. hydrolysiert; der Nd. wird mit 6%ig. Essigsäure sulfatfrei erhalten; die Säure wird auch erhalten durch Hydrolyse ihres Carbothoxyderiv. in sd. NaOH ; weißes Pulver, l. in verd. NH_4OH , Lsg. farblos (aus Nitroverb.). Die Säure gibt schwach gelbliche Lsg. in NH_4OH ; ll. in 90%ig. HCOOH , rd. HCOOH Blättchen, wl. in sd. 25%ig. HCOOH u. Essigsäure; schwach löslich in wss. Lsg. durch Zugabe konz. Säure fallen die krystallin. Salze aus: Dihydrat, $\text{C}_{13}\text{H}_{13}\text{O}_4\text{N}_2\text{As}$, HCl , Bromhydrat u. Nitrat sofort, Phosphat, Sulfat u.

Perchlorat allmählich; Monoammoniumsalz, $C_{13}H_{12}O_4N_2AsNH_4$, hexagonale Tafeln beim Diazotieren in salzsaurer Lsg. fällt aus mäßig konz. Lsg. das Diazocarbonylchlorid als hellgelbe Nadeln aus, die Diazolsg. kuppelt mit alkal. β -Naphthol carmoisinroter l. Azoverb. — *p'*-Carbäthoxyaminobenzoyl-*p*-aminophenylarsinsäure, $C_{16}H_{17}O_6N_2As$, aus sd. 90%ig. Ameisensäure (worin wl.) Nadeln. — *m'*-Aminobenzoyl-*p*-aminophenylarsinsäure, $C_{13}H_{13}O_4N_2As$, die Red. der entsprechenden Azoverb. mittels $Na_2S_2O_4$ gibt schlechte Ausbeute, da nebenbei zum Teil Sulfon entstehen; die Nitroverb. wird am besten in alkal. Lsg. mit $FeCl_2$ red. (b) Nadeln, ll. in verd. Säuren. — *o'*-Aminobenzoyl-*p*-aminophenylarsinsäure, $C_{13}H_{13}O_4N_2As$, aus der Nitroverb. mittels $FeCl_2$ in alkal. Lsg.; entstandenes $Fe(OH)_3$ wird mit 0,4-n. NaOH behandelt, Filtrate u. Reaktionslsg. neutralisiert (Kongopapier), N. mit HNO_2 -freier HNO_3 auf 50° erwärmt u. Filtrat mit gesätt. Na-Acetatlg. versetzt, hieraus Blättchen; bildet mit HCl u. H_2SO_4 wl. krystallin. Salze; aus Lsg. in HNO_3 krystallisiert das Nitrat in Prismen. — 1,2,3-Benzotriazon-3-phenyl-*p*-arsinsäure, $C_{13}H_{10}O_4N_3As$ (I), durch Diazotieren der vorigen in HNO_3 entsteht zunächst das Nitrat, das bei Zugabe von $NaNO_2$ allmählich gel. wird; es fallen kleine krystallin. Blättchen von I aus; unl. in verd. Säuren; aus sd. 90%ig. Ameisensäure halbmondförmige Tafeln. — *p''*-Nitrobenzoyl-*m'*-aminobenzoyl-*p*-aminophenylarsinsäure, Ammoniumsalz, $C_{20}H_{19}O_7N_4As$, aus 0,2-n. NH_4OH Tafeln. — *m''*-Nitrobenzoyl-*m'*-aminobenzoyl-*p*-aminophenylarsinsäure, $C_{20}H_{16}O_7N_3As$, aus sd. 85%ig. Ameisensäure (100 Teile), Tafeln; NH_4 -Salz ll. in W. — *o''*-Nitrobenzoyl-*m'*-aminobenzoyl-*p*-aminophenylarsinsäure, $C_{20}H_{16}O_7N_3As$; aus 85%ig. Ameisensäure Tafeln; in $1\frac{1}{2}H_2O$ oder Nadeln mit $2H_2O$; wl. in Eg.; NH_4 -Salz mkr. Nadeln, wl. in W. — *p''*-Aminobenzoyl-*m'*-aminobenzoyl-*p*-aminophenylarsinsäure, $C_{20}H_{18}O_5N_3As$, durch Red. der Nitroverb. mittels $Fe(OH)_2$ u. NaOH bei -5°, mikrokrystallin. weißes Pulver durch Diazotieren u. Kuppeln mit β -Naphthol entsteht tiefrote Lsg.; Chlorhydrat, Sulfat u. Nitrat sind krystallin., swl. in W., werden leicht hydrolysiert. — *m''*-Nitrobenzoyl-*m'*-aminobenzoyl-*p*-aminophenylarsinsäure, $C_{20}H_{18}O_5N_3As$, aus salpetersaurer Lsg. bei 50° mit Na-Acetat gefällt Blättchen; Sulfat Blättchen, Chlorhydrat Nadeln, Nitrat Nadelbüschel, alle sind wl.; durch Diazotieren in salpetersaurer Lsg. u. Kuppeln mit β -Naphthol entsteht tiefrote Lsg.; NH_4 -Salz Nadeln, zwl. in W. — *o''*-Aminobenzoyl-*m'*-aminobenzoyl-*p*-aminophenylarsinsäure, $C_{20}H_{18}O_5N_3As$, aus Lsg. in verd. Säure durch Na-Acetat gefällt Nadeln, unl. in 3-n. Säuren, in stärkeren l.; Sulfat, Nitrat u. Chlorhydrat Nadeln; geht beim Diazotieren wahrscheinlich über in 1,2,3-Benzotriazon-3-*m'*-benzoyl-*p*-aminophenylarsinsäure; wird nach dem Diazotieren sofort mit β -Naphthol gekuppelt, so tritt schwache Rk. ein. — *p''*-Nitrobenzoyl-*o'*-aminobenzoyl-*p*-aminophenylarsinsäure, $C_{20}H_{16}O_7N_3As$, aus sd. 90%ig. Ameisensäure Nadeln. — *m''*-Nitrobenzoyl-*o'*-aminobenzoyl-*p*-aminophenylarsinsäure, $C_{20}H_{16}O_7N_3As$, aus 90%ig. Ameisensäure rhomb. Blättchen, wl. in Essigsäure, unl. in NH_4OH hinterläßt nach dem Verdunsten eine gelartige M., aus der nach längerem Stehen das NH_4 -Salz als Nadeln krystallisiert. — *o''*-Nitrobenzoyl-*o'*-aminobenzoyl-*p*-aminophenylarsinsäure, $C_{20}H_{16}O_7N_3As$, aus w. 90%ig. Ameisensäure Nadeln in W. — *p''*-Aminobenzoyl-*o'*-aminobenzoyl-*p*-aminophenylarsinsäure, $C_{20}H_{18}O_5N_3As$, aus Lsg. in 2-n. HNO_3 bei 50° mit Na-Acetat gefällt anfangs gelb, bald danach Nadeln; Diazolsg. gelb, mit β -Naphthol gekuppelt blutrote Lsg.; Chlorhydrat Nadeln, Nitrat ölig, bisweilen kurze Stäbchen; Chlorhydrat Nadeln. — *m''*-Nitrobenzoyl-*o'*-aminobenzoyl-*p*-aminophenylarsinsäure, $C_{20}H_{18}O_5N_3As$, bildet durch Diazotieren u. Kuppeln mit β -Naphthol sherryrote Lsg.; Nitrat u. Chlorhydrat Nadeln, Sulfat halbmondförmige Blättchen; alle sind wl. in den entsprechenden Säuren. — *o''*-Aminobenzoyl-*o'*-aminobenzoyl-*p*-aminophenylarsinsäure, $C_{20}H_{18}O_5N_3As$, Blättchen; diazotierte Lsg. kuppelt nicht immer mit β -Naphthol, Nitrat u. Chlorhydrat aus den w. 3-n. Säuren Nadelrosetten; Sulfat aus 2-n. Lsg.

en. — s. Diphenylcarbamid-4,4'-diarsinsäure, $C_{13}H_{14}O_7N_3As$, 4,3 g p-Aminoarsinsäure in 10 ccm 2-n. NaOH + 100 ccm halbesätt. Na-Acetatlg. werden mit je 20 ccm 12,5%ig. $COCl_2$ -Lsg. in Toluol versetzt u. geschüttelt; nach Toluol durch Ä. entfernt, wss. Schicht kongosauer gemacht; Nd. nach n mit 0,5-n. HCl aus 90%ig. HCOOH mkr. Nadeln. — s. Carbamid der m'-aminobenzoyl-m'-aminobenzoyl-p-aminophenylarsinsäure, $(C_{20}H_{17}O_5N_3As)_2CO$, aus alkal. Lsg. durch Säure gefällt gelatinöse M.; Dosis tolerata pro g Maus — s. Carbamid der m'-Aminobenzoyl-o'-aminobenzoyl-p-aminophenylarsinsäure, $(C_{20}H_{17}O_5N_3As)_2CO$, Darst. mittels 8 Mol. $COCl_2$; vakuumtrocken voluminöses, weißes Pulver; ammoniakal. Lsg. wird bei Zugabe von Säure noch bevor Lsg. neutral ist, gelartig; bei Neutralität oder schwacher Acidität scheidet die Lsg. flockig ab; Dosis tolerata 0,025 mg pro g Maus; NH_4 -Salz gelatinös. — s. Carbamid der o'-Aminobenzoyl-m'-aminobenzoyl-p-aminophenylarsinsäure, amorphes Pulver mit kolloidalen Eigenschaften. — s. Carbamid der o'-Aminobenzoyl-o' aminobenzoyl-p-aminophenylarsinsäure aus ammoniakal. Lsg. gefällt gelatinös. Alle getrockneten Arsinsäuren wurden in 0,2-n. NH_4OH gel. u. in die Li-, Mg-, Ca- u. Ba-Lsg. übergeführt; Eigenschaften vgl. Tabelle im Original. Die Salze lassen sich zur Charakterisierung der Säuren verwenden. (Journ. Chem. Soc. London **125**, 1924. Hampstead, Nat. Inst. for Med. Res.) HABERLAND.


FE. Verkade, Einwirkung von Borsäure auf die Wasserlöslichkeit und Leitfähigkeit von γ -Pyroncarbonsäuren; einige Angaben über Mekonsäure, Komonsäure und Chelidonsäure. Mekonsäure (KAHLBAUM), $C_4H_4O_7$, $3H_2O$, aus w. W. umkrystallisiert als farbloses Präparat, eine bräunliche Farbe rührt von Spuren Fe her. Durch Umwandlung in Komonsäure. Bei 100—105° verliert sie Krystallwasser u. bleibt beim weiteren Erhitzen auf 120° unverändert. Sie verhält sich beim Titrieren wie ein zweibas. Säure. In 100 ccm W. von 25° lösen sich 0,84 g, in 100 ccm 0,5 molarer Bor-Lsg. 1 g wasserfreier Säure. Beide Lsgg. gelbgrün. Mekon- u. Chelidonsäure verhalten sich zu den stärksten organ. Säuren. Ihre Leitfähigkeit ähnelt der der H_2SO_4 . Komonsäure, $C_6H_4O_5$. Beim Titrieren mit Thymolphthalein als Indicator reagiert sie zweibasisch. Ist in W. farblos ebenso l. wie in wss. Borsäure. Sie ist eine organ. Säure. K nimmt mit zunehmender Verd. stark ab. — Chelidonsäure, $C_8H_4O_5$, Darst. mit Verbesserungen nach CLAISEN (Ber. Dtsch. Chem. Ges. **24**, [1891], bzw. WILLSTÄTTER u. PUMMERER (Ber. Dtsch. Chem. Ges. **37**, [1904]; **38**, 1463 [1905]) aus Acetondioxalester u. konz. HCl. Das Rohprodukt, nach Entfärben mit Tierkohle aus W. farblose Krystalle. Besonders leicht löslich in w. W. Bei 105° Verlust von Krystallwasser. Gegen Thymolphthalein zweibasisch. Die Löslichkeit in 0,5 molarer Borsäure-Lsg. ist höher als in w. W. Es wird die Leitfähigkeit in wss. Lsg. u. in 0,5 molarer Borsäure-Lsg. angegeben.



Chelidonsäure wird auf Grund der Synthese von CLAISEN die Formel I. beschrieben. Diese Struktur wird noch bestätigt durch die Spaltung in 1 Mol. Oxalsäure u. 2 Mol. Oxalsäure beim Kochen mit Baryt u. durch die Umwandlung der Chelidonsäure in 4-Oxypyridin-2,6-dicarbonensäure. Für Mekonsäure werden 2 Formeln aufgestellt entsprechend der Keto u. Enolform (II., III.), die in wss. Lsg. wahrscheinlich miteinander im Gleichgewicht stehen. Die seinerzeit von BORSCHKE (Ber. Dtsch. Chem. Ges. **49**, 2538; C. **1917**, I. 83) aufgestellte Formel $HOOC \cdot C(OH)_2 \cdot CH_2 \cdot CO \cdot$

$\text{CH(OH)·C(OH)}_2\text{·COOH}$ wird schon von THOMS u. PIETRULLA u. auch vom VIOFFA verworfen. Mekon- u. Chelidonsäure bilden mit Borsäure Komplexverb., was nach der Herzschenschen Regel daraus geschlossen wird, daß beide Säuren in 0,5 molarer Borsäure stärker l. sind als in W. Komensäure bildet wahrscheinlich keine Borkomplexverb. Die Borkomplexverb. der Chelidonsäure muß wahrscheinlich als eine Oxoniumverbindung aufgefaßt werden. Die Leitfähigkeit von H_2SO_4 in 0,5 molarer Borsäure entspricht einer von BÖESEKEN u. VERKADE gefundenen empir. Regel. Nach derselben wird auch aus der Erniedrigung der Leitfähigkeit wss. Mekon- u. Chelidonlsgg. auf Zusatz von Borsäure geschlossen, daß in stärker konz. Lsgg. Borkomplexverb. auftreten. Bisher hatte man bei B. von Komplexverb. organ. Säuren mit Borsäure immer eine Zunahme der Leitfähigkeit gefunden. (Rec. trav. chim. Pays-Bas 43. 879—93. 1924. Rotterdam, Univ.)

William Küster, *Über den Bilirubindimethylester*. XV. *Über Gallenfarbstoffe*. Nach Versuchen von **R. Haas** und **H. Maurer**. (XIV. vgl. Ber. Dtsch. Chem. Ges. 56. 55; C. 1923. I. 668.) Bei der Darst. des Bilirubins aus Gallensteinen wird ein Teil erst nach Herausnahme des Choleprasins mit h. Eg. gewonnen. Für die Vermutung, daß dieser Anteil vorher mit dem globinartigen Choleprasin eine kovalente Additionsverb. gebildet hat, ergab sich eine Bestätigung in der Feststellung, daß Bilirubin mit etwa 2 Mol. Glykokoll u. Alanin u. etwa 1 Mol. Histidin kovalente Additionsprodd. bildet, die jedoch keine konstante Zus. besitzen. Die Anlagen der Prodd. zeigen eine geringe Beständigkeit (sie werden beim Kochen der wss. Lösung beim Stehen der Chloroformlsg. zerlegt) u. lassen sich bei nachheriger Behandlung mit Diazomethan in Chlf.-Lsg. in den Dimethylester des Bilirubins überführen. Dieser entsteht jedoch auch bei Einw. von CH_3N_2 auf Bilirubin in Chlf. A. d. konz. Chlf.-Lsg. scheidet sich der Dimethylester mit PAe. in zwei Formen ab, welche sich mit CH_3OH trennen ließen, I in orangerote Rhomboeder von 210—205°, II in rote Nadeln von 168—169°. II gibt in alkoh. Lsg. mit FeCl_3 schwarze grüne Färbung, in Chlf. mit AlCl_3 eine starke Rotfärbung, I mit FeCl_3 eine schwache Grünfärbung, mit AlCl_3 keine Rotfärbung. I ist offenbar die Enol-, II die Ketoform. Chlf.-Lsg. scheint die B. der Enolform zu begünstigen. Das Auftreten der beiden Modifikationen bildet eine Erklärung für früher (Ztschr. f. physiol. Chem. 86; C. 1917. I. 999) beobachtete Unterschiede in der Zus. der Ag-Verb. des Bilirubins u. stünde im Einklang mit der Angabe eines Furankomplexes im Bilirubin entsprechend nachstehenden Formeln:



Die alkoh. Lsgg. des Bilirubinesters färben sich beim Aufbewahren grün, was möglicherweise der Kondensation zu einer Verb. vom Hämintypus entspricht. *Bilirubinglykokoll*, $\text{C}_{33}\text{H}_{36}\text{O}_6\text{N}_4 \cdot 2\text{CH}_2(\text{NH}_2)\text{COOH}$, orange gefärbte Rhomboeder in Chlf., Aceton u. Ä., etwas ll. in A., l. in Soda. — *Bilirubinalanin*, $\text{C}_{33}\text{H}_{36}\text{N}_4 \cdot 2\text{CH}_2\text{CH}(\text{NH}_2)\text{COOH}$, etwas tiefer gefärbt wie die Glykokollverb. *Bilirubin-Histidin*, $\text{C}_{33}\text{H}_{36}\text{O}_6\text{N}_4 \cdot \text{C}_6\text{H}_9\text{O}_2\text{N}_3$, Tafeln. — *Dimethylbilirubin-Glykokoll*, $\text{C}_{33}\text{H}_{34}\text{O}_6\text{N}_4 \cdot 2\text{CH}_2(\text{NH}_2)\text{COOH}$, Prismen aus h. A., F. 125—130°, l. in A., Aceton, Chlf., E. in Ä., unl. in Alkalien. — *Bilirubindimethylester*, $\text{C}_{33}\text{H}_{34}\text{O}_6\text{N}_4(\text{CH}_3)_2$, durch Zerlegung der vorst. Doppelverb. beim Stehen in Chlf.-Lsg. oder bei der Einw. von Diazomethan auf Bilirubin in Chlf. Das nach letzterem Verf. entstehende Gemisch der beiden Modifikationen trennt man durch absol. Methylalkohol von 55°, wobei die Ketoform II in Lsg. geht, während die Enolform I zum Teil ungel. zu Boden fällt.

II wird durch Konz. der Lsg. abgeschieden u. ebenso wie I aus Chlf. + umkrystallisiert. I bildet orangerote Rhomboeder, die bei 165—167° sintern, 21—205°, wl. in A. u. Aceton, l. in Chlf., Pyridin u. Eg. mit roter Farbe. In Hitze färbt sich die Lsg. in Eg. rasch grün. Aus Chlf. u. A. werden Additions- mit 3 Mol. Lösungsm. erhalten. II beiderseits abgestumpfte zu dicken Drusen reuigte prismat. Nadelchen. Sintern bei 144°, F. 168—169°. Mol.-Gew. nach 624 u. 599. (Ztschr. f. physiol. Ch. **141**. 40—54. 1924. Stuttgart, Techn. Ges.)

GUGGENHEIM.

Iax Bergmann, *Über neuere Proteinchemie*. Zusammenfassende Übersicht die Fortschritte der Kenntnis vom Bau des Eiweißes mit krit. Würdigung der u. Betonung der Wichtigkeit, auf experimentellem Wege die verschiedenen Bildungselemente der Proteinbausteine u. die assoziierenden u. polymerisierenden Atomgruppen genau zu erforschen. (Naturwissenschaften **12**. 1155—61. 1924. Dresden.)

SPIEGEL.

E. Biochemie.

E₁. Enzymchemie.

Koji Miyake und Mitsuji Ito, *Über die Tötungstemperatur von reiner Kojidase in wäßriger Lösung und die Wiederherstellung ihrer Wirkung nach Erhitzen*. In der vorangehenden Arbeit (Journ. Biochemistry **2**. 255 [1923]) war gezeigt worden, daß Kojiextrakt bei kurzem Erhitzen auf Temp. unter 140° nicht zerstört wird. Selbst ganz kurzes Erhitzen auf 140° verursacht irreversible Zerstörung. Gleiche tritt ein bei Erhitzen der wss. Lsg. während 1 Stde. auf 100°, bzw. 30 Min. auf 115 oder 5 Min. auf 130°. Die durch das Erhitzen auf nicht 140° Temp. verursachte Schädigung geht zum Teil beim Aufbewahren der Lsg. wieder zurück. Die Größe der Reaktivierung hängt von der Dauer des Aufwärmens ab; es wird jedoch nie die ursprüngliche Wrkg. zurückerhalten. Das inaktiv unwirksam gewordene Enzym erhält jedoch auch durch sehr langes Aufbewahren seine Wirksamkeit nicht zurück.

Mit durch Alkoholfällung gereinigter Kojidiasenase wurden jetzt die gleichen Tötungstemp. gefunden. Auch die Wiederherstellung der Wrkg. verläuft wie bei dem gereinigten Extrakt. — Die Wiederherstellung der Wirksamkeit wird nicht durch B. von neuem Enzym vorgetäuscht. (Journ. Biochemistry **3**. 177—94. 1924. Sapporo (Japan), Univ.)

A. R. F. HESSE.

L. B. Harvey, *Enzyme der Thermalalgen*. In *Phormidium laminosum*, einer 65—73° in h. Quellen von Yellowstone National Park wachsenden Alge, wurde Katalase, geringe Mengen Oxydase, eine kräftige Peroxydase u. wahrscheinlich eine Oxydoreduktase gefunden. (Science **60**. 481—82. 1924. Univ. of Wisconsin.)

A. R. F. HESSE.

Andrew Hunter und James A. Dauphinee, *Quantitative Untersuchungen über die Verteilung von Arginase in Fischen und anderen Tieren*. Der Arginasegehalt der Fischlebern ist für die betreffende Familie charakteristisch. Den größten Gehalt an Arginase hat die Leber von *Squalus sucklii*. — Säugetierlebern enthalten viel, die von Vögeln enthalten keine Arginase. — Bei Fischen wurde das Enzym ferner in Herz u. Niere, bei Säugetieren nicht im Herz u. wenig in der Niere, bei Vögeln in der Niere gefunden. In anderen Organen wurde das Enzym nicht gefunden. (Proc. Royal Soc. London [Serie B] **97**. 227—42. 1924. Toronto, Ont.)

A. R. F. HESSE.

M. Nelson und C. Theodore Sottery, *Einfluß von Glucose und Fructose auf die Hydrolyse der Saccharose durch Honigsaccharase*. (Vgl. Journ. Biol. Chem. **93**; C. 1924. II. 2056.) Mutarotierte Glucose fördert in geringen Konz. u.

hemmt in höheren Konz. — Die hemmende oder fördernde Wrkg. von α -Glucose ist geringer als die von β -Glucose oder den mutarotierten Formen. — Die Wrkg. der verschiedenen Formen von Fructose ist untereinander wenig verschieden. — Die Wrkg. der Glucose. — Die früher (l. c.) beschriebene Form der Kurve für die Hydrolyse einer 10%ig. Saccharoselslg. wird durch Ggw. von Glucose so beeinflusst, daß der charakterist. anfängliche Anstieg verschwindet. Hier scheint eine Beziehung zwischen den Konz. an Saccharose u. Glucose zu bestehen. (Journ. Biol. Chem. 62. 139—47. 1924. New York, Columbia-Univ.) A. R. F. HEINZ.

Brocq-Rousseu und G. Roussel, *Gibt es im Serum oxydierende Diastasen?* In gut gewonnenem, hämoglobinfreiem Serum von Pferden, Maultieren, Eseln, Rindern, Hammeln, Schweinen, Hunden, Kaninchen u. Meerschweinchen konnten niemals Oxydasen oder Peroxydasen nachgewiesen werden. (C. r. soc. de biologie 91. 1300—1. 1924.) SPIEGEL.

E₃. Pflanzenphysiologie. Bakteriologie.

Mary E. Reid, *Quantitative Beziehungen von Kohlenhydraten zu Stickstoff bei bestimmend für die Wachstumsreaktion von Tomatenstecklingen.* Reichliche N-Zufuhr bei genügender Kohlenhydratmenge begünstigt die Entw. der Sprosse, beschränkte N-Zufuhr bei reichlichem Kohlenhydrat das Wurzelwachstum. Licht begünstigt die Synthese von N-Verbb. u. das Sproßwachstum. Im übrigen zeigen die Stecklinge das Bestreben, sich dem Verh. der Mutterpflanze anzupassen. (Botan. z. 77. 404—18. Yonkers, BOYCE THOMPSON Inst. f. plant res.; Ber. ges. Physiol. 8. 64—65. 1924. Ref. WALTER.) SPIEGEL.

R. B. Dustman, *Die Wirkung des sauren Kaliumphthalats auf das Anwachstum von Tomatenpflanzen.* Die Verss. wurden dadurch veranlaßt, daß als Phthalat für Puffergemische dienen soll. Bei $p_H = 5$ wirkten Konz. von 1000 μ m u. darüber in W.- u. Sandkulturen tödlich, solche von 500 ppm u. darunter nicht wachstumshemmend. In Erdkulturen kann dagegen das Phthalat wachstumsfördernd wirken. *Gerstenpflanzen* scheinen noch etwas empfindlicher zu sein als Tomaten. (Botan. gaz. 77. 419—31. Hull, Botan. lab.; Ber. ges. Physiol. 28. 36 bis 67. 1924. Ref. WALTER.) SPIEGEL.

Sophia H. Eckerson, *Proteinsynthese durch Pflanzen. I. Nitratreduktion.* Als sehr geeignete Versuchspflanzen erwiesen sich Tomaten. Stärkereiche Pflanzen geben in nitratfreier Nährlsg. keine Rkk. auf Nitrat, Nitrit, NH_3 oder Aminosäuren. Bei Nitratgabe sind nach 24 Stdn. überall Nitrate nachweisbar, zuweilen in der Sproßspitze Spuren Nitrit. In 36 Stdn. zeigte sich letzteres an verschiedenen Stellen, dann stets auch NH_3 , das nach 48 Stdn. auf Kosten von jenem zugenommen hatte. Der Stärkegehalt nahm dabei deutlich ab. Nach 3—5 Tagen war wie Nitrit u. NH_3 vorhanden, dagegen die Aminosäuren (Asparaginsäure, Asparagin, Alanin, Leucin, Histidin) vermehrt. Überall, wo Red. stattfand, waren die Zellen schwach alkal. Preßsäfte der Tomaten ($p_H = 7,6$) besaßen deutliches Reduktionsvermögen gegenüber Nitraten im Dunklen wie im Licht u. auch nach Abkochen. (Botan. gaz. 77. 377—90. Yonkers, BOYCE THOMPSON Inst. f. plant res.; Ber. ges. Physiol. 28. 65. 1924. Ref. WALTER.) SPIEGEL.

E. G. Pringsheim, *Über Plasmolyse durch Schwermetallsalze.* Durch Suturen von Zn, Ni, Co, Fe, Mn u. Cu läßt sich ebenso wie mit dem von Al Plasmolyse an Pflanzenzellen hervorrufen. An geeigneten Objekten kann man unschwer die plasmolyt. Grenzkonz. bestimmen, häufig auch nach nicht zu langer Einw. die Zellen in W. wieder deplasmolisieren. In den plasmolysierten Zellen kann die Plasmastromung längere Zeit erhalten bleiben (Beweis für Fortleben). Die Giftwrkg. der Schwermetallsalze ist danach als eine Zeitrk. aufzufassen, die erst nach kürzer oder längerer Zeit Erstarren u. Tod des Protoplasmas herbeiführt. (Beih. z. Bot.

- nt bl. **41**. 1—14. Prag, Dtsch. Univ.; Ber. ges. Physiol. **28**. 67—68. 1924. Ref. (IER.)
- Walter Seiffert**, *Kritisches Sammelreferat über das d'Herellesche Phänomen*.
 werden besonders die Arbeiten von TWORT, D'HERELLE, GILDEMEISTER, OTTO,
 N. LEE u. MUNTER, BORDET u. CIUCA, DÖRR usw. besprochen. Vf. stellt folgende
 Hypothese auf: Im Laufe des bakteriellen Stoffwechsels entstehen Zwischen-
 stoffe, die die am Abbau der höheren Eiweißkörper beteiligten intrabakteriellen
 Fermente zu aktivieren vermögen. Diese als Aktivatoren fungierenden Zwischen-
 stoffe werden unter n. Bedingungen selbst schnell weiter abgebaut, so daß die
 Aktivierung sich nicht übermäßig auswirken kann. Wird aber ihr Abbau durch
 eine Stoffwechselstörung einmal verzögert, so häufen sie sich in immer
 größerer Menge an, die Fermente werden stärker u. stärker aktiviert, die Zers. der
 Nährstoffe überwiegt bei weitem ihre Aufnahme u., sobald alle Nährstoffe ver-
 nutzt sind, wird (analog der Autolyse der Hefe) das Bakterieneiweiß selbst auf-
 gelöst (endogene Autolyse). Dabei wird der angesammelte Aktivator („Autolysator“)
 r kann in neue, an sich völlig n. Bakterien eindringen u. auch hier wieder
 Fermente im Übermaß aktivieren; der beschleunigte Abbau der Nährstoffe führt
 r. zu einer Vermehrung des Aktivators, um so reichlicher, je energischer die
 Nährstoffzufuhr erfolgt, d. h. je angeregter die allgemeinen Zellfunktionen ab-
 laufen, sobald jedoch die aktivierten Fermente alle aufgenommenen Nährstoffe zers.
 e. verwenden sie sich wieder gegen die Bakterien selbst (exogene Autolyse, eigent-
 liche d'Herellesche Phänomen). — Für die Verss. therapeut. Verwendung von
 an ist der Gehalt der Kulturen an Toxinen u. Endotoxinen zu berücksichtigen.
 Zeitschr. med. Wchschr. **50**. 191—92. 223—24. 1924. Freiburg i. B.) SPIEGEL.
- Supniewski**, *Untersuchungen über den Stoffwechsel der Kohlenstoffverbindungen*
Bacillus pyocyaneus. (Vgl. C. r. soc. de biologie **90**. 1111. Biochem. Ztschr.
12; C. **1924**. II. 483. 682.) Unterss. mit $(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3$, einbas. Fettsäuren, Alde-
 hyden, Ketonen, Alkoholen, einbas. Oxysäuren, mehrbas. Alkoholen u. Kohlen-
 stoffen zeigen, daß der Pyocyaneus den C aus den aliphatischen Verbb. sehr leicht
 assimilieren kann, indem er sie bis zu den einfacheren Verbb. spaltet. Auf die Er-
 gebnisse von GORIS u. LIOT (vgl. C. r. d. l'Acad. des sciences **176**. 191; C. **1923**.
1) wird zur Ergänzung der eigenen hingewiesen. (Biochem. Ztschr. **154**.
 1924.) SPIEGEL.
- Supniewski**, *Untersuchungen über den Stoffwechsel der Stickstoffverbindungen*
Kulturen von Bacillus pyocyaneus. (Vgl. vorst. Ref.) Verss. mit Nitrat, Harn-
 stoff, Glykokoll, Asparagin, $\text{NH}_4\text{-CNS}$ als N-Quellen. Der Pyocyaneus assimiliert
 am leichtesten aus NH_4 -Gruppen. Alle anderen N-Verbb. müssen erst durch
 Autolyse der Amino- u. Amidoverbb. oder durch Red. der Nitrate u. Nitrite in
 Ammoniumform verwandelt werden. (Biochem. Ztschr. **154**. 98—103. 1924. Warschau,
 Serumforsch.) SPIEGEL.
- Lemoigne**, *Bildung von β -Oxybuttersäure und von sauren Phosphaten durch*
Autolyse. Bei Autolyse eines in Ackerböden u. anderen natürlichen Medien
 verbreiteten, dem B. megatherium nahe verwandten, daher als Bac. M. be-
 zeichneten Mikroben ist vom Vf. die B. von β -Oxybuttersäure festgestellt worden.
 (C. r. d. l'Acad. des sciences **178**. 1093; C. **1924**. I. 2713.) Die weitere Unters-
 suchung zeigt, daß die Menge dieser nur $\frac{3}{4}$ oder $\frac{2}{3}$ der gesamten, dabei auftretenden
 Säure zu erklären vermag. Von dem Rest ist ein Teil ($\frac{3}{10}$ der Gesamtacidität)
 als B. saurer Phosphate bedingt. (C. r. soc. de biologie **91**. 1329—30. 1924.
 Pasteur.) SPIEGEL.
- Hayduck**, *Berichtigung zu der Mitteilung A. Lebedew's: „Über den Mecha-*
anismus der alkoholischen Gärung.“ Vf. betont, daß er die in der Mitteilung von
 Lebedew (Ztschr. f. physiol. Ch. **132**. 275; C. **1924**. I. 2610) an den Arbeiten von

HARDEN u. NEUBERG geübte Kritik nicht teilt. (Ztschr. f. physiol. Ch. 136. 1924. Berlin, Inst. f. Gärungsgewerbe.)

A. Lebedew, Notiz über die „Berichtigung“ von Herrn Hayduck zu m. Arbeit: „Über den Mechanismus der alkoholischen Gärung III“. Vf. hält früheren Angaben gegenüber HAYDUCK (vorst. Ref.) aufrecht. (Ztschr. f. physiol. Ch. 141. 61—62. 1924. Moskau, Univ.)

L. v. Liebermann, Entstehung eines die Reaktionen des Formaldehyds gebel Körpers bei der sauren Gärung des Krautes. Nach Säuerung des Krautes d. Einstampfen unter Zusatz von NaCl u. etwas Brot fand sich sowohl im filtr. Saft direkt als auch im Dest. davon ein Körper, der die charakterist. Rkk. d. CH₂O gibt, am leichtesten nachweisbar mit dem Verf. von FILLINGER (Ztschr. Unters. Nahrsgs.- u. Genußmittel 16. 226; C. 1908. II. 1127). (Biochem. Ztschr. 154. 176. 1924. Budapest, Univ.)

E₄. Tierchemie.

J. Pascual, Die Analyse von Gasen bei Darmcystenpneumatoze. Drei Analysen von Cysten beim Schwein ergaben Ggw. von CO₂ (0,6—5,6%), O₂ (0—10,4%), H₂ (78,9—89%). Nur einmal wurde H₂ (14,6%) gefunden. (Anales soc. espanola de Quim 22. 506—8. 1924. Barcelona, Fac. de Ciencias.)

M. Doyon und J. Vial, Antikoagulierende Substanzen im Gewebe. In verschiedenen Organen konnten von den Vff. blutantikoagulierende Stoffe nachgewiesen werden. — Die getrockneten u. gepulverten Organe wurden mit Salzwasser behandelt. Filtrieren, Füllen mit Aceton. Das Präcipitat getrocknet im Vakuum darauf 2 Stdn. mit sd. CH₃OH behandelt u. 30 Min. mit einer 1%ig. Lsg. von Alkohol geschüttelt. 2. Fällung mit Aceton. Waschen mit A. u. Ä. Trocknen u. Lösl. in dest. W., darauf Eindunsten auf dem Wasserbad. — Amorphe, farblose bis bräunliche Körper. Lsgg. opalisierend. Ausbeute 3—5% frischen Materials. Diese Körper konnten von den Vff. in aktive Nucleinsäuren umgewandelt werden. Durch gemigte Fäulnis Verringerung der Ausbeute, dagegen Anreicherung der Prodd. an Nucleinsäuren. Nach Meinung der Vff. werden nach der beschriebenen Methode gereinigte Nucleinsäuren in Form ihrer Na-Salze erhalten, die ein sehr bequemes Mittel zur Erzeugung der Ungerinnbarkeit des Blutes in vitro darstellen. (C. r. d. soc. de biologie 9. 1000—1002. 1924.)

O. Schumm, Die Farbstoffumwandlung in faulendem Fleische. Kurze Mitteilung. 1. Bei spontaner Fäulnis von Pferdefleisch wurde das Erscheinen eines hämochromogenartigen Stoffes nachgewiesen, der sich spektralanalyt. dem „hämochromogen“ aus Koproporphyrin u. dem aus NENCKIS Hämatoporphyrin so ähnlich verhält, daß er danach sehr wohl größtenteils aus einem dieser beiden bestehen könnte, jedenfalls vom Hämochromogen aus Blutfarbstoff stark verschieden. 2. Aus großen Durchschnittsproben desselben, der spontanen Fäulnis überlassenen Fleisches, wenn die Selbstzers. bei Zimmertemp. erfolgte, erfolgte reichliche Bildung eines spektr. Porphyrins. Porphyrin übereinstimmenden, in Chlf. lösliche Porphyrins, bei ca. 35—38° daneben reichliche B. eines Porphyrins, das sich, soweit feststellbar, dem Koproporphyrin sehr ähnlich verhielt. — 3. Im Essigsäure-Ä. Auszug des bei 35—38° zers. Fleisches fand sich ein hämatinartiger Farbstoff; er ergab mit Pyridin u. Hydrazinhydrat ein Hämochromogen, spektralanalyt. sehr nahe übereinstimmend mit demjenigen aus Koproporphyrin, aber stark verschieden von demjenigen aus echten Hämatin. (Ztschr. f. physiol. Ch. 141. 153—57. 1924. Hanau, Eppendorf, Allg. Krankenh.)

Marcel François und Henri Piéron, Ist der Retinapurpur die einzige chemische Substanz der Retina in Kegeln und Stäbchen? Gewisse Abweichungen in den Empfindlichkeitsgrenzen von Kegeln u. Stäbchen erwecken Zweifel, (d.

chem. Substanz in beiden wirklich dieselbe ist. Zur Entscheidung derselben ist die Unters. der Retina von Eidechsen geeignet, die nur Kegel enthält. Es zeigt sich, daß aus der Retina von *Lacerta viridis* durch Lsg. von gallensaurem Natrium Sehpurpur l. ist, kein Pigment ausgezogen wird. (C. r. soc. de biologie 1923—75. 1924.)

SPIEGEL.

Belfanti, Über das Hämoleukolysin des Pankreas und dessen Bezug zum Fourné-Fourneauschen Lysocithin. Vf. knüpft an die Unterss. von FRIEDEMANN (Arch. f. Hyg. 69. 105; C. 1909. I. 1769) an. Bei Extraktion des Insulins in W. fällt sich aus dem Pankreas eine wachsartige, in W. unl., in 95%ig. A. l. Substanz Y“ von Phosphatidcharakter gewinnen, die nur mäßiges hämolyt. Vermögen, aber ausgesprochene Giftigkeit besitzt. Aus der sauren Lsg. in 95%ig. A. fällt u. häufig einen Nd. von kräftig alkal. Rk., sl. in W. (nach Stehen schwieriger), u. in A., aber nicht in Ä., Aceton u. Chlf., bei Zusatz eines Überschusses an Natriumcarbonat offenbar NaOH oder Na₂CO₃ heißen. D. Ref.) gerinnt diese Substanz zu gallertiger, gallertartiger M. Chem. Analysen zeigen unter sich noch erhebliche schw. Werte, aber jedenfalls viel höheren Gehalt an P u. N als in der Substanz Y. Deren Giftigkeit haftet wesentlich dem bei Fällung mit Ä. gel. gebliebenen Teil an. Die dadurch gefällte Substanz, als „Hämoleukolysin“ bezeichnet, zerstört sofort die roten Blutkörperchen aller untersuchten Tierarten vollständig (die Kerne der Hühnerblutkörperchen bleiben intakt), ebenso die Leukocyten (bei Zurücklassung eines Gerinnsels), nicht aber Lymphocyten. Diese Substanz, als Muttersubstanz des Hämolytins betrachtet, findet sich sicher, obwohl häufiger als im Pankreas, auch in den Speicheldrüsen. Vf. vergleicht sie mit dem Lysocithin von DELEZENNE u. FOURNEAU (Bull. Soc. Chim. de France [4] 1911; C. 1914. II. 52), das er mit gleichen Eigenschaften aus verschiedenen Giften u. Bienengift herstellen konnte, u. findet beide in Eigenschaften v. g. gleichartig; das geringere hämolyt. Vermögen des Hämoleukolysins dürfte dadurch erklären, daß es noch nicht in gleicher Reinheit gewonnen wurde. (Biochem. Ztschr. 154. 148—66. 1924. Mailand, Serotherapie. Inst.)

SPIEGEL.

E₅. Tierphysiologie.

Robert E. Mark, Zur Frage der biologischen Sauerstoffübertragung durch Sulfhydrylgruppen. Im Gegensatz zu SZENT-GYÖRGYI (Biochem. Ztschr. 146. 254; C. 1914. II. 615), der übrigens selbst später (Biochem. Ztschr. 149. 188; C. 1924. II. 74) die ursprünglichen Befunde nicht bestätigt fand, hat Vf. festgestellt, daß die Sulfhydrylsäure durch Thioglykolsäure im Luftstrom bei 40° nicht verändert wird, ihr Verhalten aber die im Luftstrom schon bei niedriger Temp. erfolgende Abspaltung von Sauerstoff aus der zweiten in geringen Grade zu katalysieren scheint. (Biochem. Ztschr. 153—48. 1924. Wien, Univ.)

SPIEGEL.

Gollwitzer-Meier und **Chr. Kroetz**, Über den Blutchemismus im Schlaf. Die chem. Unterss. lassen erkennen, daß während des Schlafes ein Einstromen einer Cl u. Phosphat reichen, an Eiweiß armen Fl. aus dem Gewebe in das Blut stattfindet u. zu Blutverdünnung mit relativer Hypalbuminose, Hyperchlorämie u. Hypophosphatämie führt. Der Einstrom von Anionen u. Kationen erfolgt in äquivalenten Mengen, entsprechend der Verringerung des Eiweißgehaltes erfährt aber die Anionenmenge des Serums eine geringe Abnahme. HCO₃-, K- u. Ca-Spiegel bleiben unbeeinflusst. Vf. nehmen eine zentrogene Änderung der Erregbarkeit des Zentrums an, die zu CO₂-Stauung nicht nur im Blute, sondern auch im Gewebe u. Ursache der Verdrängung von Cl u. P in das Blut ist. (Biochem. Ztschr. 152—89. 1924. Greifswald, Univ.)

SPIEGEL.

Knoop und **H. Jost**, Einfluß einiger aliphatischer Substanzen auf Milch- und Zuckerspiegel des Blutes. Der Milchsäurespiegel des n. Hundeblutes

schwankt zwischen 10 u. 30 mg pro 100 ccm. Nach Injektion oder Verfütterung von $\text{CH}_3\cdot\text{CHOH}\cdot\text{CH}_2\cdot\text{CO}_2\cdot\text{Na}$ schwanken die Werte innerhalb derselben Grenzen. Auch der Zuckerspiegel bleibt innerhalb der physiol. Schwankungen. *Propionsäure* gibt ein ähnliches Bild. Die nach Eingabe dieser beiden Säuren im Harn ausgeschiedene Milchsäure ist wahrscheinlich auf eine Nierenreizung zurückzuführen. Ein unmittelbarer Abbau der Säuren zu Milchsäure in der Leber, d. h. α -Oxydation liegt jedoch nicht vor. Nach Verfütterung von *Acetaldehyd* zeigt im Blut eine deutliche Zunahme des Milchsäure- u. des Glucosegehaltes. Auch in der künstlich durchströmten glykogenfreien Leber bewirkt CH_3CHO eine gesteigerte Bildung von Milchsäure. Die Ausscheidung der Milchsäure durch den Harn wird durch *Acetaldehyd* nicht vermehrt. Möglicherweise wird der CH_3CHO im Organismus durch einen synthet. Prozeß in Milchsäure verwandelt. Es konnte jedoch kein Zwischenprod. einer derartigen Synthese aufgefunden werden. Speziell war Acetolacton $\text{CH}_3\text{—CO—CHOH—CH}_3$ als p-Nitrophenylosazon im Durchströmungsblut nachweisbar. Verfütterung von 4 g Aldol an einen kleinen Hund ließen den Zuckerspiegel u. Milchsäurebildung unverändert. (Ztschr. f. physiol. Ch. **141**, 55—1924. Freiburg i. Br., Univ.)

GUGGENHEIM

E. Becher und **S. Janssen**, *Berichtigung zu der Arbeit „Über Harnstoffdüngeversuche“*. In einige Versuchstabellen der früheren Veröffentlichung (Arch. f. exp. Pathol. u. Pharmak. **98**, 148; C. **1923**, III, 1178) haben sich störende Druckfehler eingeschlichen. Diese Tabellen werden deshalb in berichtigter Form wiedergegeben. (Arch. f. exp. Pathol. u. Pharmak. **104**, 250—53, 1924.)

SPIEGEL

A. Grigaut und **R. Yovanovitch**, *Das Lipoidgleichgewicht des Blutserums*. Bei verschiedenen Krankheitszuständen zeigen Cholesterin- u. Lecithingehalt des Blutes stets sehr wenig schwankende Werte u. ist demgemäß auch das Verhältnis Cholesterin: Lecithin nur geringen Änderungen unterworfen. Dagegen erfährt das Verhältnis der Neutralfette zu den Lipoiden sehr erhebliche Änderungen. Der Quotient Lipide: Gesamtfett erhöht sich bei Hypolipoidhämie u. senkt sich markedly bei hochgradiger Lipoidhämie. (C. r. soc. de biologie **91**, 1310—13, 1924. Paris, Lab. von CHAUFFARD.)

SPIEGEL

N. Takenomata, *Über nichtspezifische Komplementbindungserscheinungen nach ihrer Abhängigkeit von der Kolloidlabilität des Blutserums*. Sowohl n. als auch Immunsera können im Verein mit einer ganzen Anzahl von Substanzen, für die die zusammenfassende Bezeichnung „Pseudoantigene“ gewählt wird, unspezif. Komplementbindung bewirken. Zu diesen Substanzen gehören Bakterienkulturen u. Aufschwemmungen, Bouillon, Pepton, Kobragift, Suspensionen von Inulin usw., ebenso auch bakterielle Toxine, so daß bei Komplementbindungsverss. mit antitox. Serumpräparaten große Vorsicht geboten ist. Diese Art Komplementbindungsrk. nimmt bei fortschreitendem Erwärmen des Serums ab, ist in der Regel mit akt. Serum am stärksten u. nach Erwärmen auf 62° meist ganz verschwunden (bei spezif. bindenden Seren dann vielfach noch hinreichend stark). Sie wird auch durch Abkühlen auf 0° mehr oder weniger abgeschwächt oder ganz aufgehoben. Sie ist demnach von dem Labilitätszustand des Serums abhängig, u. es bestehen demgemäß mehr oder weniger große individuelle Schwankungen der unspezif. Reaktionsfähigkeit zwischen den einzelnen Seren. Von menschlichen Seren reagieren die labilen (bei Gravidität usw.) erheblich stärker als normale. Von Bakterienaufschwemmungen haben namentlich diejenigen von Coli- u. *Prodigiosus* bacillen starke Reaktionsfähigkeit. Da die spezif. Komplementbindung mit echten Antigenen bei 0° mehr oder wenig stark erhalten bleibt, scheint die Bindung in der Kälte mit höherer Wahrscheinlichkeit für jene zu sprechen; ob diese Art der Prüfung durchwegs brauchbar ist, muß aber noch durch weitere Unterss. entschieden werden. Auch bei Verwendung von Toxinen u. Antitoxinen als Pseudoantigene zeigten sich g.

duelle Schwankungen. Unspezif. reagierende Diphtheriesera zeigten zugleich Eignung zu unspezif. Wa.-Rk. mit entsprechenden Organextrakten. — Nach Trennung der Eiweißfraktionen mittels der HCl-Methode fand sich die Fähigkeit unspezif. Rk. mit Pseudoantigenen meist überwiegend in der Albuminfraktion, es lagen die Bedingungen in dem Verhältnis zwischen Albumin-Pseudoglobulin und Globulin nicht immer regelmäßig, im Gegensatze zum Verh. der unspezif. Rk. in Kaninchenserum. Auch neigten häufig Sera, die mit Pseudoantigenen bei Wärme stärker reagierten, mit Organextrakten in der Kälte intensiver zu unspezif. Wa.-Rk. (Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Therapie I. **41**. 508—38. Heidelberg, Inst. f. exp. Krebsforsch.) SPIEGEL.

Alexander Palladin und W. Bjeljaewa, *Zur Frage der Aminogenese in der grauen und weißen Gehirnschicht im Hungerzustande*. II. *Versuche am Kaninchen*. (I. vgl. PALLADIN u. ZUWERKALOW, Ztschr. f. physiol. Ch. **139**. 57; C. **1924**. 195.) Wie bei den Hunden (l. c.) ist in der grauen Hirnschicht der Kaninchen der Koeffizient der Aminogenese im Hungerzustand herabgesetzt, in der weißen Schicht. Sowohl die graue wie die weiße Substanz werden im Hungerzustand reichlicher. (Ztschr. f. physiol. Ch. **141**. 33—39. 1924. Charkow, Forschungs-GUGGENHEIM.)

Takeo Inouye, *Experimentelle Tetanie und Diät*. Bei Hunden, denen die Schilddrüsen entfernt wurden, verhindert Lactose u. Galaktose in der Nahrung das Auftreten von Tetanie. Je mehr Casein gegeben wurde, um so höher mußte die Lactosezusatz sein. Parenterale Zufuhr der beiden Zucker war ohne Wrkg. — Die schützende Wrkg. muß sich also im Darm abspielen. Es ist aber kaum eine einfache Verschiebung der Rk. nach der saueren Seite. — Wenn die Hunde mit Kohlenhydraten unter sonst gleichen Umständen gefüttert wurden, bekamen sie nach wenigen Tagen Tetanie. (Amer. Journ. Physiol. **70**. 524—37. New York.) MÜLLER.

Graham Lusk, *Die spezifisch-dynamische Wirkung der einzelnen Nährstoffe*. Beschreibung eines sich sehr schnell einstellenden Biocalorimeters mit Respirationszählrohr, wobei der Energieumsatz einmal indirekt aus den Respirationszahlen, dann einmal im Calorimeter bestimmt wird. Es läßt sich damit prüfen, ob die übliche Ernährungsweise unter den gewählten Bedingungen zu Recht besteht oder ob im intermediären Stoffwechsel weitere Umsetzungen stattfanden, die keinen direkten Einfluß vom Gaswechsel auf Mengen u. Art des im Körper während der kurzen Versuchszeit verbrannten Materials gestatten. Bei Fett u. Kohlenhydrat gehen die bekannten Umwandlungen ohne erhebliche Wärmetönung einher, die bedeutende Wärmeerzeugung muß also durch Erhöhung des Grundumsatzes bedingt sein. Die Bewegung nicht oxydierbarer Zuckermoll. im Diabetes u. die Ablagerung von Glykogen hat keinen Einfluß auf die Wärmeerzeugung. Bei Darreichung von Fructose war am Hunde die Wärmeerzeugung größer als nach Glucose, worin Lusk den Ausdruck dafür sieht, daß jene erst in halbe Zuckermoll. (Methylglyoxal?) umgewandelt werden muß, ehe sie in Glucose u. Glykogen übergeht. Dabei sind vornehmlich leicht oxydierbare Zwischenprodd. in vermehrter Menge vorhanden, die dann auch mehr gewissermaßen herunterbrennt. Bei großem Kohlenhydratüberschuß werden diese Zwischenprodd. nicht entsprechend stärker vermehrt, sondern erfolgt Umwandlung in Fett unter geringem Energieverlust, also nicht merkbarer weiterer Wärmeerzeugung. Milchsäure tritt für Zucker ein (keine direkte Wärmebildung nach Zuckerzufuhr), Essigsäure u. A. steigen aber den Umsatz noch weiter. Die CO₂-Kapazität des Blutes ist auch bei hohen Zuckerkonz. nicht vermindert, Säuren treten also nicht intermediär auf, CO₂ selbst hemmt die Wärmebildung nicht, HCl nur wenig. Zu Leistung äußerer Arbeit wird der Zucker herangezogen, ohne daß ein Teil seiner Energie als spezif.-dynam.

Wärme verloren geht. — Nach Fettzufuhr steigt die Wärmebildung bis zu einem Maximum (30%) in der 6. Stde., wo auch die Lipämie am höchsten ist, in der 12. Stde. ist dann der Grundumsatz wieder erreicht. Von gleichzeitig gereichtem Zucker u. Fett wird jener zuerst verbrannt. Wird die Glucose 4 Stdn. später als Fett gegeben, so summieren sich die Wrkkg. beider, der R. Q. (bei Zucker annähernd = 1, bei Fett geringer) liegt in der Mitte. Ebenso summieren sich die Wrkkg. von Zucker u. Essigsäure. Aus Zucker gebildetes Fett wird dagegen nur neben dem miteingeführten Zucker verbrannt. Für den Grundumsatz treten Zucker u. Fett in isodynamen Mengen in Wrkg. Die Größe der Ausscheidung von Acetonkörpern ist bei Diabetes kein Maß für die Umsatzgröße.

Bei Umsatz von Eiweiß kommt die Wärmesteigerung ebenso für körperfremdes wie für körpereigenes zustande. Sie geht proportional der zers. Menge zu, kommt nur bei hoher Umgebungstemp. zum Ausdruck (RUBNER). Etwa die Hälfte des Energieinhaltes erscheint beim Hunde, bis $\frac{3}{4}$ beim Menschen als Extrawärme. Aus Fleisch stammender C kann als Glykogen oder Fett gespeichert werden, wobei keine neue Extrawärme gebildet wird. Für Leistung äußerer Arbeit kann Eiweiß nur nach Abzug des auf die spezif.-dynam. Wrkg. entfallenden Energieanteils zur Verfügung angezogen werden. Alanin verhält sich wie Eiweiß, Glutaminsäure, Bernsteinsäure, Asparaginsäure, Leucin u. Tyrosin zeigen keine spezif.-dynam. Wrkg. Glykogen steigert dagegen den Umsatz so, daß sein ganzer Energieinhalt als Extrawärme erscheinen kann, auch wenn im Phlorrhizintier sein ganzer C als Extrazucker, sein N als Harnstoff nach außen abgegeben wird; die Extrawärme muß also durch Reizung der intermediären Stoffwechselprodd. zustandekommen. Zusatz von NaF ändert nichts, es handelt sich also nicht um Säurewrkg. Glykolsäure (auch als Na-Salz) ist fast wirkungslos. Glykokoll mit Zucker allein oder auf der Höhe der Wärmesteigerung durch Fett addiert sich in seiner Wärmebildung, spart keinen Zucker, ebenso Alanin. Die spezif.-dynam. Wrkg. der Eiweißstoffe besteht sowohl in spezif.-chem. Reizung ohne festen Zusammenhang mit der Oxydation des Reizung bewirkenden Materials. — Der Ruhegrundumsatz kann also bei Aufnahme von Nahrung auf folgende voneinander unabhängige Arten gesteigert werden: 1. Durch chem. Reizung von Zwischenprodd., die aus Aminosäuren von Alanin u. Alanins u. Glykokolls stammen. — 2. Durch Zucker, wenn das Angebot über den normalen, „selbstregulierten“ liegt. — 3. Durch Überangebot von Fett. (Medicin 1924, 311—54. 1922; Ber. ges. Physiol. 28. 84—86. 1924. Ref. THOMAS.) SPIEGEL.

L. Spolverrini, Über den Einfluß von Kohlenhydraten auf die Absorption von Fetten. Aus Schrifttum u. eigenen Verss. wird der Nachweis geliefert, daß Beibehaltung von Kohlenhydraten (Zucker) die Absorption von Nahrungsfett sehr begünstigt (Arch. Farmacologia speriment. 38. 90—96. 97—104. 1924. Pavia.) GRIMM.

M. Javillier, P. Baude und S. Levy-Lajeunesse, Versuche zur Identifizierung des Faktors A. Der Faktor A und das Phytol. Der vielfach auftretende Parallelismus zwischen Gehalt an Vitamin A u. dem an Chlorophyll in Pflanzenteilen genähert, die Wrkg. von Chlorophyll u. Bestandteilen desselben bei Avitaminose zu prüfen. Alkoh. u. Acetonextrakte von Brennesselblättern zeigten bei A-freier ernährten Tieren gute Wrkg., die auch im Unverseifbaren nach Verseifung noch erhalten war. Phytol aus den gleichen Blättern, das die von WILLSTÄTTER angegebenen Konstanten zeigte, erwies sich dagegen wirkungslos, während ein karotinhaltiges eine deutliche Wrkg. besaß. (C. r. d. l'Acad. des sciences 79. 998—1000. 1924.) SPIEGEL.

Luigi Zagni, Über die Wirkung der Vitamine auf die automatische Kuratung der Muskelermüdung. Veränderungen in Muskeltonus, Reizfähigkeit, Arbeitsleistung usw. bei Fröschen nach in den Rückenlymphsack injizierten oder als Suspensionshilfsmittel den isolierten Muskel benutzten, mit h. physiol. NaCl-Lsg. hergestellten Kleinfischen.

werden als Vitaminwrkg. beschrieben. (Boll. d. soc. med.-chirurg. di Modena 4. 123—34. 1923. Bologna, Univ.; Ber. ges. Physiol. 28. 70—71. 1924. Ref. (R.))

SPIEGEL.

(W. Barlow, *Entfernung der Nebennieren und ihre Beziehung zum Stoffwechsel*. Der Gesamtumsatz von Katzen, calorimetr. gemessen, nimmt nach Entfernung einer Nebenniere anfangs ab, auch wenn man pro kg Gewicht berechnet. Ist nach etwa 4 Wochen wieder an. In 25% der Fälle kommt er dann im Laufe von Monaten auf einen konstanten Stand, der 14% unter dem n. liegt. In anderen Fällen stellte er sich wieder auf die Norm ein. — Nach den ersten 4 Stdn. wird der Blutzuckerstand annähernd n. — Nach doppelseitiger Entfernung der Nebennieren fällt der O₂-Verbrauch sofort steil ab, erholt sich im Laufe von 6 Stdn. und sinkt dann bis zum Tode kontinuierlich zu sinken. Der Blutzucker ist bis zur 8. Tag über der Norm u. sinkt dann ab bis zum Tode. (Amer. Journ. Physiol. 44—63. Missouri.)

MÜLLER.

(Ligi Ferrannini, *Beitrag zum Studium der hypophysären Symptome. Hypophysärer Infantilisismus und Diabetes insipidus. Der Wasser- und Chloridstoffwechsel*. Im Falle, der als hypophysärer Infantilisismus angesprochen wird, ergab die Untersuchung des W- u. Salzstoffwechsels stark entwickelten echten Diabetes insipidus, der übergehend auf Präparate aus Hypophysenhinterlappen gut reagierte. Der Kohlenhydratstoffwechsel war normal. (Arch. di patol. e clin. med. 3. 113—53. Bologna, Univ.; Ber. ges. Physiol. 28. 74. 1924. Ref. LAQUER.)

SPIEGEL.

(J. F. Mc Clendon, J. C. Hathaway und Lester Netz, *Jodstoffwechsel*. III. (Lendon u. Hathaway, Proc. of the soc. f. exp. biol. and med. 21. 129; 1924. II. 1109.) Tabellar. Zusammenstellung des J-Gehaltes der wichtigsten Nahrungsmittel aus kropffreien u. kropffreien Gegenden. (Proc. of the soc. f. exp. biol. and med. 21. 347. Minneapolis, Univ. of Minnesota; Ber. ges. Physiol. 28. 1924. Ref. E. OPPENHEIMER.)

SPIEGEL.

(A. Roncato, *Die Ausscheidung des Kreatinins in Beziehung zum Lebensalter und zur tonischen Muskelfunktion*. Bei Gesunden steigt unter gemischter Arbeit bei mittlerer Arbeit die Kreatininausscheidung bis zum 20. Jahre an, nimmt dann allmählich u. gleichmäßig ab. Bei Kranken mit tetan. u. hyster. Krämpfen ist die Abgabe höher als bei Gesunden, so lange die Krämpfe aufraten, nach Aufhebung fast die Hälfte reduziert. Bei Hemiplegikern war sie nur in den ersten 24 Stdn. nach dem Insult in geringem Grade gesteigert trotz Fortdauer der Kontraktionen. Diese Ergebnisse sprechen sowohl gegen die Ansicht von FOLIN als auch diejenige von PEKELHARING über die physiol. Ursachen der B. von Kreatinin. (Riv. di scienze biol. 5. 308—27. Padova, Univ.; Ber. ges. Physiol. 28. 75. 1924. Ref. S. SIMITZ.)

SPIEGEL.

(E. Kraus, *Funktionswert der Schilddrüse und Kropfproblem*. Vortrag. (Wien. Monatsschr. 38. 9—13. Berlin.)

FRANK.

(E. Bock, *Zum Problem der Gallenfarbstoffbildung und des Ikterus*. Krit. Überlegungen über das Problem an Hand der Literatur. Weder für die Ansicht, daß Leberzellen allein die B. von Gallenfarbstoff zuschreibt, noch für die Ansicht, daß diese B. ausschließlich im reticuloendothelialen App. sucht, sind endgültige Beweise erbracht. Vf. ist der Meinung, daß Gallenfarbstoffbildung u. Ausscheidung scharf auseinander zu halten seien. (Klin. Wchschr. 3. 587—92. 638—41. Leipzig, Univ.)

SPIEGEL.

(L. Moncorps, *Studien zur Genese des normalen Oberhautpigments*. Von pigmentführender Haut stammende, mit Quarzsand verriebene Gefrierschnitte zeigten das colorische Verh. gegenüber verd. FeCl₃-Lsg. bei *p*-Oxyphenyl-*l*-Tyrosin, dem n. Stoffwechselzwischenprod. des Tyrosins, sowie bei den Tyrosin-Verbindungen. Homoprotocatechusäure u. Dioxyphe-*n*ylbrenztraubensäure in

charakterist. Weise zu verändern. Dies wird einem fermentativen Prozeß (*Brcatechinase*) zugeschrieben. Es tritt nicht ein mit mesodermalen Organen noch gekochter Haut. Histolog. ließ sich in den Melanoblasten der Epidermis ne leichter Braunfärbung des Protoplasmas Verstärkung u. Vermehrung der Pigmentteilchen feststellen. Unter Berücksichtigung von Unterss. von BLOCH, MEIROWITZ, THANNHAUSER u. ROTHMANN wird aus den Befunden geschlossen, daß als Pigmentmuttersubstanz aus dem Abbau des Tyrosins stammende Brenzcatechinderiv. zunehmen sind u. daß die Pigmentzelle selbst das zur B. des Pigments nöt. Brenzcatechinderiv. aus gewissen Spaltprodd. des intermediären Eiweißstoffwechsels wahrscheinlich unter Mitwrg. eines spezif. Ferments, zu bilden vermag. (Arch. Dermat. u. Syphilis **148**. 2—14. 1924. München, Univ.) SPIEGEL

N. A. Dobrovolskaja-Zavadskaja, *Der Einfluß der Radiumstrahlung auf peripheren Nerven*. Verss. an Hunden u. Kaninchen ergaben mehr oder minder schwere Nervensymptome mit unfiltrierten Strahlen schon bei sehr schwachen Dosen, mit ungenügend filtrierten bei starken, mit gut filtrierten in therapeutischen Dosen nicht. Wo nicht alsbald Symptome auftraten, wurden auch keine Symptome beobachtet. Eine erhebliche Rolle spielt, besonders bei schwachen Filtration, die Entfernung zwischen Strahlenquelle u. Nerv. Wo Symptome auftreten, sind es zunächst Störungen der Empfindlichkeit, später erst (nach 3 Wochen) Lähmung. Bei verwischten Formen kann sich diese lediglich als Peripherie äußern, in diesem Stadium auch von Reflexsteigerung begleitet sein. Die typischen Veränderungen gehen nicht immer mit den motor. Störungen parallel u. können unabhängig davon ausheilen. Völlige Wiederherst. der Motilität wurde bei Hunden (Verss. bis zur Dauer von 11 Monaten) nicht beobachtet. Anatom. behielten die Nerven ihre Kontinuität auch durch eine Zone von nekrotisiertem Gewebe bei, durch, Transversalschnitte lassen u. Mk. die Reste der Myelinscheiden u. Zyklische Achsen erkennen, doch zeigen solche Nerven nur schwache Tendenz zur Regeneration. (C. r. soc. de biologie **91**. 1322—24. 1924. Paris, Inst. du radium.) SPIEGEL

Ernst P. Pick, *Pharmakologisches Experiment und Klinik*. Antrittsvorlesung über die Bedeutung der experimentellen Pharmakologie für die Heilkunde. (Ibid. klin. Wchschr. **38**. 1—5. Wien.) FRANK

A. Blanchetière, *Beobachtung über die anomale Wirkung einer Einnahme von Kaliumchlorid*. Bei einer Frau mit Stupor, deren Blut besonders K-arm war, trat nach Eingabe von 5 g KCl eine starke Erhöhung des Blut-K ein, die, auf die ganze Blutmenge berechnet, in einem Falle noch die zugeführte Menge erhöhte überstieg, so daß eine Ausschwemmung aus dem Gewebe stattgefunden haben mußte. Der Überschuß des K fand sich völlig in den Blutkörperchen lokalisiert. (C. r. soc. de biologie **91**. 1308—9. 1924. Paris, Asile Sainte-Anne.) SPIEGEL

Toshiro Kaneko, *Über die chemische Beeinflussung des Augendruckes unter Magnesium*. Die von RÖMER beobachtete Senkung des intraokularen Druckes durch Einbringen von metall. Mg in die vordere Augenkammer wird bestritten. Dabei steigt die [OH⁻] des Kammerwassers, was aber nicht die Ursache der Drucksenkung sein kann, da eine solche Steigerung an sich den Druck erhöht. Unter MgCl₂ läßt sich bei Injektion in das Auge die Senkung nicht hervorbringen. St. tritt aber ein, wenn der Mg-Gehalt des Kammerwassers im hinteren Teil des Auges, beim Hunde n. 2 mg in 100 ccm, durch Einlegen von Mg in die vordere Kammer oder durch subcutane Injektion von MgCl₂ auf 3—4 mg steigt u. ist unter Narkosewrkg. auf Nervenendigungen oder auf die zwischen Blut u. intraokularem Fl. eingeschalteten Membranen zu deuten. (Biochem. Ztschr. **154**. 67—76. 1924. Kaiser WILHELM-Inst. f. Arbeitsphysiol.) SPIEGEL

Cl. Veltmann, *Phlorrhizinversuche mit Acetaldehyd und Äthylenglykol*. Verss. nach Acetaldehyd noch nach Äthylenglykol konnte bei Phlorrhizinhunden keine

g von Glucose nachgewiesen werden. (Beitr. z. Physiologie 2. 295—300.

SPIEGEL.

W. Seuffert und I. Hinz, *Verwertung des Acetamids beim Menschen*. Nach
 der Zufuhr von Acetamid stieg mit wachsender Gabe die Menge flüchtiger
 im Harn nicht nur absol., sondern auch relativ. Man kann annehmen,
 die Größe der Ausscheidung unveränderten Acetamids von der Größe der ge-
 gebenen Dosis abhängt, aber auch, daß eine etwa im Verdauungskanal stattfindende
 Spaltung des Amids in seine Komponenten mit der Größe der Gaben in Beziehung
 steht. Ziemlich weitgehende Spaltung des Acetamids konnte bei 24-std. Stehen
 im n. HCl im Brutschranke nachgewiesen werden. (Beitr. z. Physiologie 2.
 10. 14. 1924.)

SPIEGEL.

Leonard Vickers und E. K. Marshall jr., *Durchlässigkeit der Harnblase
 für Harnstoff und Kochsalz*. Lsgg. von 0,05 mol. Harnstoff in 0,3—0,7 mol. NaCl
 werden an Harnstoff u. NaCl, wenn sie in der Harnblase von Kaninchen etwa
 3 Std. bleiben. Auch der 3 Std. in der Blase bleibende Harn zeigt Änderungen
 in der Konz. von Harnstoff u. NaCl, ohne daß das Blasenepithel geschädigt ist.
 (Journ. Physiol. 70. 607—12. 1924. JOHNS HOPKINS Univ.)

MÜLLER.

G. Hoskins und Edgar S. Hunter, *Die Wirkungen von Adrenalin auf die
 Verdauung im Darmsegmenten gegenüber Sauerstoff*. Bei isolierten Stücken vom
 dünnem Darm wurde beobachtet, daß sie auf O₂-Blasen mit Zuckungen intensiver
 reagieren, wenn 1:100 Millionen Adrenalin hinzugesetzt wird. Schwächere Lsgg.
 ohne Wrkg., stärkere setzen die Empfindlichkeit herab. (Amer. Journ. Physiol.
 3—18. 1924. Ohio-State, Univ.)

MÜLLER.

Thierfelder und E. Klenk, *Weitere Untersuchungen über das Verhalten
 aromatischer Verbindungen im Tierkörper*. Nach subcutaner Darreichung von
 Methylphenylcarbinol an Kaninchen wurden im Harn ausgeschieden: 1,23 g Hippur-
 säure, 0,1 g Mandelsäure, 1,2 g methylphenylcarbinolglucuronsaures K vom $[\alpha]_D^{20} = -117,3^\circ$,
 dieselben Substanzen wie nach Darreichung von Acetophenon u. Äthylbenzol.
 Oxidation mit KMnO₄ fanden sich im 6tägigen Harn 3,634 g Benzoesäure
 als im n. Harn, was ca. 60% des verabreichten Carbinols entspricht; ca. 20%
 sind in Form der gepaarten Glucuronsäure vorhanden. Nach Injektion von
 Methylphenylketon, C₆H₅·CO·CH₂·CH₂·CH(CH₃)₂ u. n-Hexylphenylketon, C₆H₅·CO·
 CH₂·CH₂·CH₂·CH₂·CH₂·CH₃ bestätigt sich die früher (Ztschr. f. physiol. Ch. 130. 380; C. 1924. I.
 1924. I. 1498), indem die Verb. in Benzoesäure umgewandelt werden. Nach
 peritonäaler Darreichung von 1,88 g Hexylphenyläthylketon, C₆H₅·CH₂·CH₂·CH₂·
 CH₂·CH₂·CH₃ ließ sich im Harn Benzoesäure bzw. Hippursäure, jedoch keine oder
 nur Spuren von Phenyllessigsäure oder Phenacetursäure feststellen. Eine Red. zu
 Alkohol findet nicht statt, wie aus der Abwesenheit von gepaarten Glucuron-
 iden geschlossen werden muß. n-Propyl- u. n-Amylbenzol werden zu Benzoe-
 säure, n-Butyl- u. n-Hexylbenzol zu Phenyllessigsäure oxydiert. Der Harn ist nur
 n-Butylbenzol linksdrehend, was auf die Anwesenheit einer gepaarten Glucuron-
 iden deutet. Die Resorption erfolgt von der Bauchhöhle aus viel reichlicher, als
 aus subcutanen Gewebe. Die Ausscheidungsform des i-Propylbenzols wurde noch
 nicht festgestellt.

Hexylphenyläthylketon. Darst. nach SENDERENS (Ann. Chim. et Phys. [8] 28.
 1913. I. 1498), aus 15 g Phenylpropionsäure u. 39 g Heptylsäure mit MnO₂
 als Katalysator bei 440—450°. Als Nebenprod. entsteht Dihexylketon, das durch
 Destillation entfernt wird. Ausbeute an Roh-Keton 35 g u. reinem 7 g Kp.₃₀ 178—181°,
 295—298°. D.₄²⁰ 0,9388, Semicarbazon ölig. (Ztschr. f. physiol. Ch. 141.
 1924. Tübingen, Univ.)

GUGGENHEIM.

Thierfelder und E. Klenk, *Zur Kenntnis des Verhaltens des Acetophenons und
 seiner Derivate im Tierkörper*. (Vgl. vorst. Ref.) Der aus früheren Verss. (vgl. THIERFELDER
 II. 1.

u. DAIBER, Ztschr. f. physiol. Ch. **130**. 380; C. **1924**. I. 70) gezogene Schluß, daß 40% des subcutan eingeführten Acetophenons im Organismus vollständig abgegeben werden, ist auf eine ungenügende Resorption zurückzuführen. Nach intraperitonealer Injektion von 2 g Acetophenon ließ sich im Harn nach Oxydation mit KMnO_4 eine Zunahme des Benzoessäuregehaltes feststellen, welcher 90% des verabfolgten Acetophenons entsprach. Der Benzolkern des Acetophenons scheint daher nicht angegriffen zu werden. 48,8% des injizierten u. 53,2% des resorbierten Acetophenons finden sich als gepaarte Glucuronsäure. — Nach intraperitonealer Injektion von 2 g Bzl. konnten aus dem Harn 0,094 g Muconsäure vom F. 298—300° = 3,1% der berechneten Menge isoliert werden, also erheblich mehr als von anderen Forschern (vgl. z. B. NEUMAERKER, Ztschr. f. physiol. Ch. **126**. 203; C. **1923**. I. 170). Diese unterschiedlichen Feststellungen erklären die Vff. durch den Umstand, daß das Bzl. durch das Peritoneum schneller resorbiert wird als aus dem subcutanen Bindegewebe, weshalb das Umwandlungsprod. Muconsäure in höherer Konz. entsteht u. durch die Nieren ausgeschieden wird bevor es einer weiteren Umwandlung unterliegt. (Ztschr. f. physiol. Ch. **141**. 29—32, 1924. Tübingen Univ.)

GUGGENHEIM

J. G. Edwards und E. K. Marshall jr., *Mikroskopische Beobachtungen an lebenden Niere nach Einspritzung von Phenolsulfonphthalein*. Mittels Wasserimmersion an der in situ bleibenden Niere bei Fröschen u. Ratten gemachte Beobachtungen nach intravenöser Injektion von Phenolsulfonphthalein ergaben starke Speicherung des Farbstoffs in den Zellen der proximalen gewundenen Harnkanäle. Beim Frosch sieht man den Farbstoff auch in den Lumina, aber nicht in den Zellen der distalen gewundenen Kanäle. — Diese mikroskop. Studien stimmen mit chem. Beobachtungen, bei denen der in Nierenrinde u. -mark enthaltene Farbstoff (Phenolrot) extrahiert war, u. weisen darauf hin, daß die proximalen gewundenen Harnkanälchen körperfremde Stoffe, wie Farbstoffe, aktiv secernieren, während körpereigene, wie Harnstoff, nur beim Frosch, aber nicht beim Warmblüter in bestimmten Nierenabschnitten gespeichert u. aktiv secerniert werden (vgl. MARSHALL jr. u. CRANE, Amer. Journ. Physiol. **70**. 465). (Amer. Journ. Physiol. **70**. 489—95. 1924. Johns Hopkins Med. School.)

MÜLLER

B. Gutowski, *Die Sekretion des Magensaftes unter dem Einfluß direkt in die Blutzirkulation eingeführten Histamins*. Die schnelle intravenöse Injektion von Histamin läßt in kurzdauernden Verss. zwar nur minimale Magensekretion erkennen. Läßt man es aber während längerer Zeit einfließen, so ist entgegen der bisherigen Ansicht der Effekt kaum geringer als nach subcutaner Injektion. Die Menge des abgeschiedenen Magensaftes steht in umgekehrtem Verhältnis zum Eindringen des Histamins in den Kreislauf. Für die Pankreassekretion liegen die Verhältnisse umgekehrt. Hier bedingt schnelle intravenöse Injektion des Histamins reichliche Abscheidung, langsame intravenöse oder subcutane dagegen nur unbedeutende.

SPIEGEL

B. Gutowski, *Der Mechanismus der Einwirkung von Histamin auf die Sekretion des Magensaftes*. (Vgl. vorst. Ref.) Subcutan eingeführtes Histamin wird hauptsächlich auf dem Wege der Blutbahn resorbiert, kann sich im Blute ziemlich unverändert halten. Seine Wrkg. auf die Magensaftsekretion steht in direktem Verhältnis zu seiner Ggw. im Blute. Fraglich ist noch, ob es dabei als schmerzhaft auf die sekretor. Elemente des Magens wirkt oder indirekt, indem es irgend eine Substanz in anderen Organen freimacht. Schließlich könnte auch lediglich die Veränderung der capillaren Gefäße ursächlich in Betracht kommen. (C. r. soc. de biologie **91**. 1349—50. 1924. Warschau, Univ.)

SPIEGEL

Masakazu Nakamura, *Über den Einfluß von Drogen auf die Absorption des Darmes*. NaF , KCN , A , Orexin u. Cocain vermindern die Absorption von W.

Glucose, Aminosäuren u. Fettsäuren, *Atropin* selektiv diejenige von Aminosäuren. CO_2 u. Gentianaextrakt fördern die Absorption aller genannten Substanzen, *Atropin*, *Cantharidin*, *Senföl*, *Absynthin*, *Columbin* u. *Coffein* in kleineren Mengen. Diejenige von Glucose, während sie die Absorption der anderen Stoffe hemmen; größeren Mengen sind sie auch der Absorption von Aminosäuren förderlich. (Tôhoku Journ. of exp. med. 5. 29—46. Sendai, Tôhoku Univ.; Ber. ges. Physiol. 3. 1. 1924. Ref. WACHHOLDER.)

SPIEGEL.

Alfred Perutz und Konrad Merdler, *Beiträge zur experimentellen Pharmakologie des männlichen Genitales*. IX. *Physiologische und pharmakologische Untersuchungen am Samenstrang in situ*. (Vgl. PERUTZ, Arch. f. Dermat. u. Syphilis 145. 1924. I. 2180.) Mit einer Methodik, die sich an diejenige von KURDINOWSKI anlehnt, wurde folgendes festgestellt: Am unbeeinflussten Tier zeigt das deferens in situ keine Spontanbewegungen. Bei beginnender Erstickung tritt Kontraktion, Steigerung von Tonus u. Rhythmik; da am überlebenden Samenstrang Luftabschluß zu Lähmung führt, ist jene Erscheinung auf einen zentralen Ursprung zurückzuführen. *Adrenalin* bewirkt starke Tonussteigerung, *Pilocarpin* u. *Physostigmin* schwache bei starker Anregung der Rhythmik. *Ergotin*, *Pituitrin* u. *Chinin* wirkungslos, *Yohimbin*, in großen Dosen starke zentrale Erregung hervorgerufen, erzeugt in mittleren nach größerer Latenz staffelförmigen Tonusanstieg bei Anregung der Rhythmik. *Papaverin* wirkt lähmend auf die Samenstrangmuskulatur, daß danach auch die Erregung bei beginnender Erstickung ausblieb. (Arch. f. Dermat. u. Syphilis 148. 104—12. 1924. Wien, Univ.)

SPIEGEL.

Fritz Veiel, *Teerkrebs beim Menschen*. Bei einem Manne, der wegen eines nur wieder auftretenden Ekzems seit 23 Jahren häufig mit *Fichtenteer* gepinselt wurde, trat ein typ. Plattenepithelkrebs auf. Sonst sind in der Heilanstalt trotz der jahrzehnten geübten, vielfach lange u. intensiv angewandten Behandlung mit *Fichtenteer* niemals Fälle von darauf zurückzuführendem Hautkrebs beobachtet worden. *Fichtenteer* ist vielleicht in dieser Beziehung ungefährlicher als *Steinölteer*. Vielleicht trägt dazu auch bei, daß in der Anstalt nur der in 2 Teilen mit 1 Teil des Teers verwendet wird. (Arch. f. Dermat. u. Syphilis 148. 1924. 45. Cannstatt, Veielsche Heilanst. f. Hautkranke.)

SPIEGEL.

H. Dohrn, *Heutiger Stand der Insulinforschung*. Zusammenfassendes Referat. (Monatssch. d. Gegenwart 65. 546—52. 1924. Charlottenburg.)

FRANK.

G. Ganassini, *Was ist das Insulin?* In selbsthergestelltem Insulin fand Vf. sehr große Mengen P, nach Verseifung mit KOH in der stark angesäuerten Lösung die Florencesche Rk. auf Cholin u. im Rückstande freie H_3PO_4 , so daß er das Insulin ein dem Jecorin nahestehendes *Phosphatid* annimmt. In den betreffenden Insulinlsgg. ließ sich auch freies Cholin nachweisen, dessen Wrkg. sich zum Teil mit den Insulinwrkgg. deckt. In den bekannten käuflichen Präparaten ließen sich die oben erwähnten Befunde u. Rkk. nicht oder nur ganz schwach nachweisen, woraus Vf. schließt, daß sie viel zu wenig Insulin enthalten. (Boll. d. soc. di chir. di Pavia 36. 105—11. Milano, Ist. biochim. ital.; Ber. ges. Physiol. 3. 1. 1924. Ref. LAQUER.)

SPIEGEL.

F. Ascoli, S. Silvestri und S. Marino, *Die Darstellung des Insulins und seine Wirkung*. Selbsthergestelltes Insulin wurde bei 8 Patienten mit gutem Erfolg angewendet. Die überall beobachteten Unterschiede der Insulinempfindlichkeit von Menschen u. Kaninchen werden bestätigt. (Problemi d. nutriz. 1. 34—38. Roma, 1924; Ber. ges. Physiol. 28. 78. 1924. Ref. LAQUER.)

SPIEGEL.

J. R. Macleod und M. D. Orr, *Beobachtungen über die physiologische Auswirkung des Insulins*. Verschiedene Auswertungsmethoden werden angeführt, nötige Angaben angegeben u. die Ergebnisse verglichen. (Journ. of laborat. and clin.

med. 9. 591—608. Toronto, Univ.; Ber. ges. Physiol. 28. 76—77. 1924. R. LESSER.) SPIEGEL.

A. D. Hirschfelder und H. C. Maxwell, *Wirkung von Insulin bei experimenteller Vergiftung mit Alkohol und Aceton*. Insulin ist ohne Einfluß auf den Ablauf d. Vergiftung von Kaninchen mit A. oder Aceton. Da die Intensität der Wrkg. d. Konz. im Blut etwa proportional ist, dürfte *Insulin* die Verbrennung von A. Aceton nicht beschleunigen. Insulin scheint daher mehr auf die ersten als späteren Phasen der Verbrennung von Fetten u. Kohlenhydraten im Körper einzuwirken. (Amer. Journ. Physiol. 70. 520—23. 1924. Minnesota.) MÜLLER.

Hanns Baur, *Zur Kenntnis des Insulins und seiner Wirkungen*. IV. **Richard Kuhn, Hanns Baur und Rudolf Heckscher**, *Der Einfluß des Insulins auf den Milchsäuregehalt und die Wasserstoffzahl des Blutes*. (III. vgl. Münch. med. Wchsch. 71. 541; C. 1924. II. 710.) Der Insulintod ist ein Tod aus Mangel an Kohlenhydratreserven. Bei Ziegen treten Insulinkrämpfe erst nach 12—14 Stdn. ein. Man kann den Verlauf der Wrkg. daher gut verfolgen. Bei nüchternen Tieren beginnt $\frac{1}{2}$ Stde. nach der Injektion immer die Abnahme des Blutzuckers u. ein Anstieg der Blutmilchsäure, also Acidose. Das Maximum von Milchsäure u. Acidität (elektrometr. gemessen) ist nach 3—5 Stdn. erreicht bei leichten hypoglykäm. Symptomen. Es folgt als zweites Stadium bei Tiefstand des Blutzuckers Abfall der Blutmilchsäure, zunehmende Alkalose bei schwersten hypoglykäm. Symptomen. Sobald Krämpfe mit Acidose einsetzen, folgt ihnen vorübergehende Besserung des Befindens. — Milchsäure u. p_H des Blutes geben besseren Einblick in die Wrkg. des Insulins als der Blutzucker. — Im ersten Stadium nimmt die anoxybiot. B. in der Milchsäure bei gesteigerter Kohlenhydratverbrennung u. bei sinkendem Blutzucker stark zu, mehr noch als die Milchsäureverbrennung. — Beim gefütterten Tier fällt der Milchsäureabfall des zweiten Stadiums. — Die Änderungen des respirator. Quotienten werden nicht allein durch Änderungen im Gesamtstoffwechsel hervorgerufen, sondern auch wesentlich durch die Änderungen in der Rk. des Blases beeinflusst. So sinkt der Quotient stark beim Übergang von Acidose in Alkalose durch Retention von CO_2 in Blut u. Geweben. Er steigt im Anfang der Wg. des Insulins durch Austreibung von CO_2 . Man soll daher nicht ohne Einschränkung Schlüsse auf Umstellungen im Stoffwechsel ziehen, wenn p_H des Blutes sich gleichzeitig nennenswert ändert. (Ztschr. f. physiol. Ch. 141. 68—99. 1924. München.) Ü.

Virgilio Duccesch, *Insulin und Glykolyse*. Insulin beeinflusst die Glykolyse in vitro durch leicht alkal. Phosphatlg. mit oder ohne H_2O_2 nicht, obwohl es sonst dabei nicht zerstört wird, ebensowenig die Gärung mit lebender Hefe, scheint er diejenige durch Toluolhefe leicht u. recht inkonstant zu beschleunigen. (Bol. d. soc. med.-chirurg. di Pavia 36. 215—29. Pavia, Univ.; Ber. ges. Physiol. 28. 78. 1924. Ref. LAQUER.) SPIEGEL.

A. B. Anderson, *Die Beeinflussung der Mortalität nach Insulinhypoglykämie bei Mäusen durch Phlorrhizin*. Von vorher mit Phlorrhizin behandelten Mäusen erholte sich nach gleich großen, Koma auslösenden Dosen Insulin eine größere Anzahl wieder (8:15) als von nicht vorbehandelten (1:14). Diese „antagont.“ Wrkg. führt Vf. darauf zurück, daß Phlorrhizin einen Glucosekomplex im Blute erzeuge, dessen B. durch Insulin beschleunigt werde. (Australian Journ. of exp. Biol. and med. science 1. 1—3. Adelaide, Univ.; Ber. ges. Physiol. 28. 78. 1924. Ref. LESSER.) SPIEGEL.

M. Eisler und L. Porthheim, *Über insulinartige Stoffe und deren Wirkung auf den Kohlenhydratstoffwechsel*. (Vorläufige Mitteilung.) Der Inhalt deckt sich im wesentlichen mit dem einer anderen Mitteilung (Biochem. Ztschr. 148. 566; C. 1924. II. 1110). „Nd.“ u. „alkoh. Rückstand“ vermindern, intravenös injiziert, den Blutzucker von Kaninchen in 2—3 Stdn. um 20—45%. Der „Nd.“ fördert im Gegen-

zu Gesamtextrakt u. „alkoh. Rückstand“ die Diastase wrkg. Längere Extraktion
 welche mit 1—2% HCl enthaltendem A. führen zu unwirksamen Präparaten.
 d. Akad. d. Wiss., Wien, mathemat.-naturwissensch. Kl. 1924. 80—81; Ber.
 Physiol. 28. 80. 1924. Ref. LESSER.)

SPIEGEL.

A. D. Hirschfelder, *Studien über Erscheinungen an Gefäßen und Capillaren
 über vermeintliche Axonreflexe bei der Entwicklung des Ödems der Senfölbinder-
 entzündung, zusammen mit den Wirkungen gefäßerweiternder Mittel, von Lokal-
 anästhetica und vitalen Farbstoffen.* Die Fl. des Senföloödems der Conjunctive hat
 4. Wenn man das Augenlid ausschneidet, so schwillt es nicht an, weder in
 Serum, noch in Kaninchenserum, noch in isoton. NaCl-Lsg. Es liegt also keine
 Änderung der Kolloide vor. — Da das Ödem abnimmt durch Verengerung der
 Gefäße (Suprarenin intravenös, Abbinden der Carotis, lokale Gefäßverengerung)
 nimmt durch Gefäßerweiterung, vorausgesetzt, daß der Blutdruck nicht allzu
 gesunken ist, da weiter durch Trypanblauinjektion eine Schädigung des
 Endothels sichtbar gemacht werden kann, selbst wenn die Entstehung des
 Ödems verhindert war, so liegt Endothelschädigung vor. — Cocain, Alypin oder
 hindern nicht regelmäßig die B. des Senföloödems trotz intensiver Anästhesie
 ersten Fall. Sie scheinen nicht durch Aufhebung von Axonreflexen, sondern
 durch lokale Gefäßverengerung zu wirken. Saligenin, „Procain“ u. „Butyn“ sind
 unwirksam trotz Lokalanästhesie. (Amer. Journ. Physiol. 70. 507—19. 1924.
 Wisota.)

MÜLLER.

A. Sternberg, *Über eine Witmutschädigung der Haut.* Bericht über verschiedene
 Schädigungen bei Bi-Kuren. Sie waren harmlos u. gingen spontan, zum Teil
 bei Fortsetzung der Behandlung, zurück. (Arch. f. Dermat. u. Syphilis 148.
 31. 1924. Frankfurt a. M., Univ.)

SPIEGEL.

Carl Schumacher und K. W. Spatz, *Unsere Erfahrungen über Bismuto-Yatren.*
 intravenös-intramuskuläre Behandlung der Lues mit Bismuto-Yatren (vgl.
 MENTZEL, Pharm. Zentralhalle 65. 449; C. 1924. II. 1711) erwies sich als an-
 wendend gefahrlos, bequem u. sehr wirksam, auch bei Lues I u. II, für sich allein,
 in Kombination mit Salvarsan. (Münch. med. Wchschr. 71. 1819—20. 1924,
 München, Univ.)

FRANK.

Ernst Bernheim, *Über das neue Quecksilberpräparat Salyrgan als Diuretikum.*
 Salyrgan (vgl. MENTZEL, Pharm. Zentralhalle 65. 209; C. 1924. II. 82) steht in
 der diuret. Wrkg. dem Novasurol nicht nach, ohne aber wie letzteres Neben-
 wirkg. des Hg zu zeigen. (Therapie d. Gegenwart 65. 538—39. 1924. Berlin,
 Stahospital.)

FRANK.

Erfurth, *Die Anwendung von Introcid (jodierte Ceriumverbindung) in der Frauen-
 eide und bei septischen Erkrankungen.* Bericht über günstige Erfolge. (Therapie
 Gegenwart 65. 539—41. 1924. Cottbus.)

FRANK.

F. Nagel, *Lokales embolisches Bismogenol-Exanthem. Beitrag zum gleich-
 namigen Aufsatz von Freudenthal.* Vf. hat die von FREUDENTHAL beschriebene
 Erscheinung bei ausgedehnter Anwendung von Bismogenol nur einmal beobachtet.
 Arch. f. Dermat. u. Syphilis 148. 42—43. 1924. Halle a. S.)

SPIEGEL.

Richard Volk und Robert Bujan, *Die Behandlung des Lupus vulgaris mit
 Ektebin.* Bei lokaler Einreibung mit Ektebin wurden teilweise Ergebnisse erreicht,
 bisher kaum mit einer anderen spezif. Therapie. (Arch. f. Dermat. u. Syphilis
 148. 43—51. 1924. Wien, Lupusheilstätte.)

SPIEGEL.

F. Remenovsky und W. Löwenfeld, *Erfahrungen über neue Hauttuberkuline.*
 Tuberculin nach Moro und Dermotubin nach Löwenstein. Beide Präparate sind für die
 Hauttrk. hervorragend geeignet u. auch therapeut. bei Hauttuberkulose
 aus wirksam, dabei einfach anwendbar u. relativ gefahrlos. (Arch. f. Dermat.
 Syphilis 148. 113—29. 1924. Wien, Allg. Poliklin.)

SPIEGEL.

F. Pharmazie. Desinfektion.

Kunze, *Zur Darstellung des Ferrum oxydat saccharat. liquid.* Bei der Darstellung von $\text{Fe}(\text{OH})_3$ zu Eisenzucker sollte nach SCHNABEL die Fällung in stärker verd. Lsg. vorgenommen werden, um einen möglichst fein verteilten Nd. zu erhalten; dafür aber auf das Auswaschen zu verzichten, weil dadurch die Löslichkeit herabgemindert wird. Nach Vf. ist die Konz. der Fällungs-Fl. u. auch die Dauer des Auswaschens ohne Einfluß auf die spätere Löslichkeit des $\text{Fe}(\text{OH})_3$. — Zur Darstellung von *Sirup. Ferri peptonati* ist Liq. Ferr. dialysat nicht nötig; es genügt $\text{FeCl}_3 + \text{Na}_2\text{CO}_3$ zu verwenden. — Es wird eine Vorschrift zu grünbleibenden, leicht l. Blandsch-Pillen gegeben. (Pharm. Nachrichten 1. 192 [1924].) (Apoth.-Ztg. 39. 1570. 1924. Leipzig.)

DIETZ

Eric Winberg, *Darstellung eines Eisenpräparates mit hohem Eisengehalt. Liquor Oxidi ferrici saccharati neutralis.* Man erwärmt den Cl-frei gewaschenen Nd. aus 500 Teilen FeCl_3 -Lsg. u. 500 Teilen Na_2CO_3 in Porzellan- oder emaillierter Fe-Schale mit 150 Teilen Zucker, 20 Teilen Glycerin u. 35 Teilen K-Na-Tartrat, bis in W. klar l., kühlt ab u. setzt 70 Teile A., 3 Teile Essentia aromatica (s. 95 Teilen alkoh. 5%ig. Vanillinlsg. u. 5 Teilen äth. Portugalöl), u. soviel W. l., daß man 1000 Teile erhält. Bei Liquor ohne A. setzt man 0,7% Na-Benzoeat zu *Oxidum ferricum saccharatum* (10% Fe). Den gewaschenen Nd. aus 1000 Teilen FeCl_3 u. 1000 Teilen Na_2CO_3 löst man, wie oben, mit 400 Teilen Zucker u. 40 Teilen K-Tartrat, bis klar l. in W., u. dampft ein, trocknet u. verreibt zu Pulver, das man mit soviel Zucker verd., daß 1000 Teile erhalten werden. (Farm. Rev. 3. 578. 1924.) (Apoth.-Ztg. 39. 1616. 1924.)

DIETZ

Ludwig Kroeber, *Studienergebnisse einer Reihe von Fluidextrakten aus heilsamen Arzneipflanzen.* (Vgl. S. 407.) *Extractum Herniariae glabrae fluidum.* (Brütkrautfluidextrakt). Verdrängungsfl. 3 Teile A., 7 Teile W., D.¹⁹ 1,076, Extrakt 23,1%, Asche 2,33% (hauptsächlich K_2CO_3). Setzt stark ab, dunkelrotbraun, eruch aromat., an Amine erinnernd, Geschmack aromat., Cumarin ähnlich, bitter-salzig, später scharf kratzend. Mit W. klar mischbar, beim Schütteln reichlicher Schaum. Mit A. hellkaffeebrauner Nd., l. in verd. HCl, unl. in NaOH. Mit FeCl_3 schmutziggelbbraungrüner Nd. Mit Gerbsäure, MAYERS Reagens u. Lugollsg. keine Rkk. zunächst, später Trübungen u. Ndd. Mit Fehlingscher Lsg. Red. — Die Droge enthält 0,2% Herniarin (Methylester des Umbelliferons), Spuren Paronylin (Alkaloid), Gerbstoff, 0,5% äth. Öl, 3% neutrales u. 0,4% saures Saponin. Bei Erfassung des sauren Saponins empfiehlt sich Alkalisierung bei Abkochung: Decoct. Herniar. 20 : 200 g, Natr. carb. sicc 0,1 g. (Pharm. Zentralhalle 65. 606—7. 1924.)

Arthur Roos, *Perkolieren von Opium und Strophanthussamen.* Man mischt das Opiumpulver mit der 2—3-fachen Gewichtsmenge Menstruum, läßt einige Stunden stehen u. perkoliert mit dem zurückgebliebenen Menstruum nach. Die extraktreiche Fl. tropft sehr langsam ab. Man nimmt zur Beobachtung der Extraktion ein gläsernes Perkulationsgefäß. In den Abfluß packt man etwas Glaswolle u. darüber ziemlich groben Sand. — Ähnlich verfährt man bei Strophanthussamen, den nach den Angaben der internationalen Pharmakopöe-Kommission, nicht vorher entfetten soll. Man erhöht die vorherige Macerationsdauer auf 2—3 Tage. (Farm. Rev. 23. 551. 1924.) (Apoth.-Ztg. 39. 1617. 1924.)

DIETZ

A. Pitini, *Pharmakognostische Untersuchungen über Withania somnifera L.* Botan. u. pharmakognost. Beschreibung der Droge. Die getrocknete ganze Pflanze lieferte beim Ausziehen mit W. 16% Extrakt, welches im Hundeververs. (3 g je kg Tier) schwach einschläfernd wirkte. (Arch. Farmacologia speriment. 38. 151—3. 1924. Palermo.)

GRIMM

1. Pitini, Einwirkung von Brom auf einige Pflanzendrogen. Die Angaben des Ermittlers, daß glucosidhaltige Drogen nach der Behandlung mit Halogen ihre Wirksamkeit verlieren, während alkaloidhaltige in der Toxizität steigen, konnten experimentell bewiesen werden. Die Glucoside werden dabei durch Hydrolyse abgebaut. (Arch. Farmacologia speriment. **38**. 164—68. 1924. Palermo.) GRIMME.

—, *Neue Arzneimittel.* Soneryl, n-Butyläthylbarbitursäure vom F. 123°, in Tabletten zu 0,1 g, Schlafmittel. (Pharm. Ztg. **69**. 1292. 1924.) DIETZE.

—, *Spezialitäten und Geheimmittel.* Alucol (Dr. A. WANDER, Osthofen in Rheinlanden), kolloidales $\text{Al}(\text{OH})_3$, in Tabletten zu 0,5 g bei Hyperacidität des Magens. — Antipertussin (PHARMAGANS, Oberursel), bisher Antipertussin. — Cristolax (Dr. A. WANDER, Osthofen), Extr. Malti sicc. u. Paraffin. puriss., Laxodigestivum. — Hordulana (Apoth. K. BECKE, Hordel i. Westf.), Vuzin, Trypaflavin, Menthol, Acetylosalicyl u. Pillenm. — Krepura (FRIEDR. SAUER, Gotha), aus Rindfleisch abgepresster Saft mit 2% NaCl u. 10% A. — Kreavit (FRIEDR. SAUER, Gotha), Saft mit Pepsin-HCl verdauter Fleischsaft, nach dem Neutralisieren durch Hitze destilliert. — Pentacephin (Apoth. ART. UNGER, Breslau II), Tabletten aus 0,4 g Acetylosalicyl, 0,25 g Phenacetin, 0,06 g Coffein, 0,002 g Eucodal u. 0,1 g Guarana, gegen Migräne u. Grippe. — Sputosol (Dtsch. Schutz- u. Heilungsmittel-Ges., Berlin NW. 6), grau-weißes Pulver unbekannter Zus., in Wasser u. W. gelöst, zur Entkeimung von Sputum. — Stannosan (Chem.-ph. A.-G., Bad Homburg), metall. Sn in besonders akt. Form, neben geringen Mengen eines Bindemittels, gegen Furunkulose. (Apoth.-Ztg. **39**. 1572. 1924.) DIETZE.

Harry Oustayan, übert. von: **Ardash Hachikian**, New York, V. St. A., *Herstellung eines Räucher- und Inhaliermittels gegen Blutkrankheiten.* Man mischt reines Hg, tier. Fett, Butter, Mandelöl, weißes Wachs, rotes HgS, KMnO_4 , gemahlene Mandeln, gemahlene Granatapfelschalen, Hennawurzel u. gemahlene Sarsaparilla zu Pulver u. formt die M., gegebenenfalls unter Zusatz von Gummi arabicum als Bindemittel zu Pastillen oder Tabletten. — Das Mittel dient entweder zum Räuchern von kranken Körperteilen oder zur Inhalation, wobei die Pastillen auf glühender Holzkohle verbrannt werden, oder man setzt es Tabak zu u. verarbeitet diesen zu Zigaretten. Der beim Rauchen entwickelte Dampf wird inhaliert u. wirkt auf die Schleimhäute der Mund- u. Rachenhöhle. Bei Verwendung als Inhaliermittel kann das Bindemittel fortgelassen werden. (A. P. **1499249** vom 27/6. 1921, ausg. 14/6. 1924.) SCHOTTLÄNDER.

Henry J. Brown, Cleveland, Ohio, *Arzneimittel gegen Nicotinvergiftungen*, bestehend aus MgO_2 u. Tannin als Aktivator. — Das Mittel wird entweder als Pulver genommen oder mit Zucker u. Cocosbutter zu Tabletten geformt oder mit Glycerin zur Verabreichung verbessert. (A. P. **1499240** vom 10/2. 1921, ausg. 13/11. 1923.) SCHOTTLÄNDER.

Isaac F. Harris, Tuckahoe, New York, V. St. A., *Verfahren zur Gewinnung von Vitaminen aus Hefe und beständiger Lösungen dieses Vitamins.* Frische Bierhefe wird mit $\frac{3}{4}$ — $1\frac{1}{2}$ % ig. wss. $\text{CH}_3\text{CO}_2\text{H}$ zum Sieden erhitzt, wobei die lebenden Hefezellen sofort abgetötet u. die Eiweißstoffe koaguliert werden. Man filtriert von den unl. Bestandteilen ab u. dampft das Filtrat bei niedriger Temp. im Vakuum zur Trockne ein. Die halb feste, gummiartige M. wird mit 50—60% ig. A. extrahiert, die alkoh.-wss. Vitaminlösung filtriert u. erneut bei niedriger Temp. im Vakuum eingedampft. Der mit 90% ig. A. extrahierte Rückstand wird abfiltriert u. mit absol. wasserfreiem Aceton oder absol. Ä. entwässert. Man trocknet im Vakuum bei niedriger Temp. u. erhält so das Vitamin als hellgelblichbraunes, stark hygroskop. Pulver von fleischextraktähnlichem Geruch u. Geschmack. Das in k. W. zll., in h. W. unl. Pulver, in absol. A. unl. Prod. enthält 12—15% Asche, gibt Aminosäurerückstand.

aber keine Rk. auf Biuret. Phosphorwolframsäure fällt aus der wss., hell dunkelbraun gefärbten Lsg. des Vitamins nichts aus, $\text{Ba}(\text{OH})_2$, AgNO_3 , HgCl_2 u. Pb -Acetat fallen aus der Lsg. das Vitamin teilweise. — Das Prod. findet in Form von wss. Lsgg., die durch Zusatz von organ. Konservierungsmitteln, vorzugsweise 18%ig. A., haltbar gemacht sind, therapeut. Verwendung. (A. P. 1483815 vom 26/12. 1919, ausg. 1/12. 1924 u. 1474029 vom 26/12. 1919, ausg. 13/11. 1923.) SCHOTTLÄNDL.

Florence Myra Cohan, Oakland, California, V. St. A., *Kosmetisches Mittel*, bestehend aus einem Gemisch von Harz, Bienenwachs u. Nelkenöl einerseits, u. Kaliumwasser, Terpertinöl, H_2O_2 , Ruhrkrautinktur u. etwas Lavendelöl andererseits. — Das Mittel dient zum Entfernen von Haaren an menschlicher Haut. Zum Gebrauch wird das schwach erwärmte Harz-Wachs-Nelkenölgemisch auf die zu enthaarenden Stellen aufgetragen u. nach dem Erkalten vorsichtig wieder abgezogen, wobei die Haare entfernt werden. Hierauf wird die oberflächlich enthaarte Stelle mit dem Bestandteil des Mittels bestrichen, der in die Haut eindringt u. durch Einwirkung die Haarwurzeln das weitere Wachstum der Haare verhindert. (A. P. 1474111 vom 31/1. 1917, ausg. 20/11. 1923.) SCHOTTLÄNDL.

Key Kamiya und Tsuruichi H. Wakino, Los Angeles, California, V. St. A., *Mittel gegen Pyorrhoe*, bestehend aus dem frischen Preßsaft der wilden Angelikawurzel (aegopodium oder Ziegenwurz) unter Zusatz von A., Wintergrünöl u. Pfefferminzöl. — Das Mittel wird unmittelbar auf das erkrankte Zahnfleisch in die äußeren Teile der Wurzeln der angegriffenen Zähne aufgebracht. In manchen Fällen kann es auch mit Hilfe einer kleinen Spritze in das die Zähne umgebende Fleisch injiziert werden. (A. P. 1510785 vom 1/8. 1921, ausg. 7/10. 1924.) SCHOTTLÄNDL.

E. R. Squibb and Sons, New York, übert. von: **Paul Miller Giesy**, Fairfield, New Jersey, V. St. A., *Zahnreinigungsmittel*, bestehend aus ca. 100 Teilen $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7$, $10\text{H}_2\text{O}$ u. 85 Teilen NaCl . — Die einzelnen Bestandteile werden innig gemengt u. in Pulverform, als Tabletten oder in Körnerform verwandt. Man erhält z. B. eine Tablette in 10000 Teilen W., so daß eine 1%ig. Lsg. von $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7$ in physiol. NaCl -Lsg. entsteht. Das Prod. findet vorzugsweise zu Spüllungen der Mundhöhle Verwendung, wobei es gleichzeitig antisept. u. mucinlösend wirkt. Man kann es auch mit anderen Zahnreinigungsmitteln zusammen benutzen. (A. P. 1482741 vom 18/8. 1922, ausg. 5/2. 1924.) SCHOTTLÄNDL.

Henry N. Creger, San Francisco, California, V. St. A., *Zahnpaste*. Man emulgiert Tragantgummi, Glycerin u. gepulverte Seife miteinander, gibt zu dem abgekühlten Lsg. etwas krystallin. Menthol, Wintergrünöl, Anisöl, Eucalyptusöl u. Pfefferminzöl. Das Gemisch wird innig mit fein gepulvertem Myrrhenharz u. Tragantgummi (dem Harz aus der Rinde von Eucalyptus rostrata), reinem CaCO_3 u. Na_2CO_3 sowie etwas Saccharin vermischt u. schließlich einige Tropfen einer wss. Zn-Lsg. dazugegeben. Nach mehrstd. Stehen wird die Paste in Tuben gefüllt. Das Myrrhenharz, der Rotgummi u. das ZnCl_2 haben adstringierende, antisept. u. styptische Wrkg. (A. P. 1488097 vom 9/3. 1922, ausg. 25/3. 1924.) SCHOTTLÄNDL.

William H. Allen, Detroit, Michigan, V. St. A., *Herstellung eines Streupulvers*. Fein gepulvertes Mg-Hydrosilicat (Talk) wird mit einer Lsg. von bas. Chromsäure $\text{Cr}_2(\text{SO}_4)_3 \cdot \text{Cr}(\text{OH})_3$ innig durchfeuchtet u. das Gemisch getrocknet. — Der Chromsäuregehalt des trockenen Prod. soll ca. 5% betragen. Das Mittel wird auf die mechanisch gereizte Haut aufgepudert u. dient zur Verhinderung des Wundreibens der feuchten Haut durch Kleidungsstücke. (A. P. 1482906 vom 28/7. 1922, ausg. 12/7. 1924.) SCHOTTLÄNDL.

G. Analyse. Laboratorium.

J. D. Garrard, *Das Verfahren zur Darstellung staubfreier Flüssigkeiten durch Destillation*. Die Arbeit ist auf die Darst. von staubfreiem W. durch Destillation

ohne Sieden beschränkt. Ein intensiver Strahl des elektr. Lichtbogens in den beiden Glasgefäßen gesammelt u. Beobachtungen im Winkel von 90° zur Richtung des Strahls ergaben, daß weder die Temp. der Dest. noch die Differenz der Temp. beider Gefäße merklichen Einfluß auf die Anzahl der Staubküchen im Destillat ausübten. Die geeignetste Methode zur Reinigung der Dest. vor dem Vers. war Behandlung mit konz. HNO_3 u. Vertreiben der Dämpfe. Verschiedenen Glassorten ließen sich quantitative Messungen der Lichtabsorption in staubfreiem W. ausführen, in weichem Natronglas, Pyrex- u. Jenaerglas ergaben sich fast ident. Werte, in Bleiglas 20—40% höhere. Die Herst. von staubfreiem W. gelang nicht, wenn das Aufnahmegefäß ein Stück Kupfer, Kautschuk oder etwas Quecksilber enthielt. Durch Schütteln des Gefäßes wird staubfrei. W. wieder durch Stäubchen verunreinigt, die auch durch 20fache Dest. nicht vermindert werden. (Proc. Trans. Roy. Soc. Canada [3] 18. Sekt. III. 126—27.)

JOSEPHY.

Brühns, Über die „Fixanal“-Röhren. (Zentralblatt f. Zuckerind. 33. 12—14. 1924. II. 370.)

JOSEPHY.

Kurt Thormann, *Neue und zweckmäßigere Ausführungen von Porzellangeräten für das chemische Laboratorium*. Folgende Neuerungen in Porzellengeräten der Firma Porzellanfabrik PH. ROSENTHAL & Co., A.-G., Marktredwitz werden benannt: Goochtiegel mit poröser Bodenplatte (auch Staatliche Porzellan-Manufaktur, Meißen); Krystallisierschale mit nach oben verjüngtem Rand, der das Klettern der ausschcheidenden Stoffe beim Krystallisieren u. Ein- u. Abdampfen verhindert; Wägeschälchen, das zugleich als Wägeschälchen benutzbar ist; Wägeschiffchen, glatt oder dunkelglasiert, das mit unglasiertem Boden fest auf der Wagschale aufliegt und bei allen Gefäßen der genannten Firma steht die Ausgußöffnung im richtigen Verhältnis zum Rauminhalt. (Chem.-Ztg. 49. 20—21. 1924. Leipzig.) **JUNG.**

JUNG.

usvold, *Eine genaue Pipette zur Untersuchung konzentrierter Salzlösungen.* Zur Messung konz. Salzlsgg. benutzt man eine *Pipette* (Abbildung im Original), die mit einem Saugtrichter u. schrägem Hohlhahn, unten mit einem Schliff zum Ansetzen einer Schutzkappe, die ebenfalls mit einem Hahn versehen ist. Die Verwendung kann auch zur Analyse von konz. Säuren benutzt werden. Lieferant: H. GÖCKEL, Berlin NW, Luisenstr. 24. (Chem.-Ztg. **49**, 21. 1924. Bergen.) Ju.

-, Laboratoriumsdrehöfen. Beschreibung der Laboratoriumsdrehöfen der Firma ILYSIUS, Dessau. (Chem.-Ztg. 49. 19. 1924.) JUNG.

JUNG.

Scarpa, *Einige Apparate für physikalisch-chemische Laboratorien*. Vf. beschreibt App. für die Best. der Diffusionskoeffizienten in Fll., für die Messung der Gleichspannung von Fll. u. der Dissoziationsspannungen u. der Abnahme der Spannungen von Lsgg. (Gazz. chim. ital. **54**, 876—87, 1924, Turin. Politecnico.)

ZANDER.

A. Henglein, *Kryoskopische Molekulargewichtsbestimmung mittels Dampfdruckthermometer*. Vgl. leitet für die Anwendung des *Dampfdruckthermometers* (vgl. Ztschr. f. Elektrochem. **29**, 354; C. **1923**, IV, 697) zur Best. des *Mol.-Gew.*

Formel: $M = \frac{g \cdot 1000 \cdot E}{b \cdot k (\log p_1 - \log p_2)}$ ab; g = Gramm gel. Stoff, E = molekulare
 f. Punktserniedrigung bezogen auf 1 Mol pro 1000 g Lösungsm., b = Gramm
 Lösungsm., p_1 = Dampfdruck beim Gefrierpunkt des reinen Lösungsm., p_2 =
 Dampfdruck beim Gefrierpunkt der Lsg. — Größere Empfindlichkeit als das CS₂-
 Thermometer besitzt bei Temp. unterhalb Zimmertemp. ein Thermometer mit
 Lösung. Die Best. der Dampfdrucke des Ä. fügen sich in die Messungen von
 RYDER u. SMITH (Journ. Americ. Chem. Soc. **44**. 2450; C. **1923**. I. 1213) gut ein.
 In einer Tabelle zusammengestellten gefundenen Mol.-Geww. weichen von

theoret. Wert durchschnittlich um 3,5% ab. Auch bei wesentlich tieferen Temperaturen lassen sich Differenzen ermitteln, wobei gilt: $\log p_1 - \log p_2 = k(A_1 - A_2)$. (Ztschr. f. angew. Ch. **37**. 1022—23. 1924. Danzig.) JUN

O. Scarpa, Über die Messung der Dichte von porösen oder pulverigen Körpern. Die vom Vf. beschriebene Methode, die mit großer Genauigkeit u. schneller als die bisher üblichen Methoden arbeitet, beruht im Prinzip darauf, daß die in den Zwischenräumen der porigen oder pulverigen Körper enthaltene Luft durch Absaugen im Vakuumexsikkator ausgetrieben wird. (Annali Chim. Appl. **14**. 360—37. 1924. Turin, Politecn.) ZANDE

Paul Günther und Gertrud Wilcke, Über eine röntgenspektroskopische Methode zur quantitativen chemischen Analyse. (Vgl. GÜNTHER, Ztschr. f. angew. Ch. **17**. 355; C. **1924**. II. 505.) Vf. nehmen nach dem üblichen spektralanalyt. Verf. das Röntgenspektrum zweier Substanzen mit nahestehender Ordnungszahl, wie Fe u. Co auf, um aus der Schwärzung der Spektrallinien das relative Mengenverhältnis der beiden Elemente zu bestimmen. Die Schwärzungsmessung der Spektrallinien wird durch Abzählen der Ag-Körner unter einem Raster vorgenommen. Es wird daher eine gewisse Unterbelichtung der Röntgenfilme notwendig, um das Restat der Kornzählung nicht durch Zusammenpacken von mehreren Körnern zu einem nicht auflösbaren Klumpen zu verfälschen. Dieser Umstand hat andererseits ein Vorteil, daß man mit kleinen Energien u. Belichtungszeiten auskommt. Aus den so aufgenommenen Photometerkurven ergab sich eine Analysengenauigkeit von 1 bis 3,5%. (LIEBIGS Ann. **440**. 203—12. 1924. Berlin, Univ.) BECKI.

E. Rupp, Normalkali- oder Normalnatronlauge? NaOH ist $\frac{1}{5}$ billiger als KOH u. läßt sich in wss. Lsg. leichter CO₂-frei darstellen. Man bereitet in abgeschlossener Flasche eine Lsg. von NaOH in gleicher Gewichtsmenge W., läßt bis zur Klärung absetzen u. verd. den klaren, CO₂-freien Abguß entsprechend ca. 65 ccm zu 1 l ca. n.-Lauge, bzw. ca. 7 ccm zu 1 l ca. $\frac{1}{10}$ -n.-Lauge. — CO₂-freie KOH-Lsg. läßt sich nicht derart bereiten. — Für das D. A. B. 6 wird vorgeschlagen: „Alkalilauge, Normal- (oder „Normallauge“). Sie enthält 56,14 g KOH oder 40 g NaOH im Liter“. — Die überhohe Konz. der Dimethylaminoazobenzollsg. ist auf 0,2%, noch besser auf 0,1% zu erniedrigen. An Stelle dieses Indicators ist Methylorange in 0,02% ig. wss. Lsg. vorzuziehen. (Apoth.-Ztg. **39**. 1615—16. 1924. Breslau.) DIETZ.

H. Ter Meulen, Die Bestimmung des Sauerstoffs in den organischen Verbindungen. II. Mitteilung. (I. vgl. Rec. trav. chim. Pays-Bas **41**. 509; C. **1922**. IV. 574.) Im Gegensatz zu seiner früheren Ansicht führt Vf. aus, daß das von ihm angegebene Verf. zur Best. des O in organ. Verbb. auch in Ggw. von S, Halogen oder Nwendbar ist; es bedarf nur einer kleinen Variation der Apparatur, die gegen die frühere Beschreibung noch etwas vereinfacht ist. (Rec. trav. chim. Pays-Bas **43**. 899—904. 1924. Delft, Techn. Hochsch.) ZANDE

Elemente und anorganische Verbindungen.

K. Klinke, Versuch einer maßanalytischen Bestimmung des SO₄-Ions in kleinen Mengen. Das Verf. von ANDREWS (Amer. Chem. Journ. **2**. 567) muß verlassen, wenn zwischen Neutralisation der mit essigsaurer BaCrO₄-Lsg. versetzten Lsg. u. Filtration längere Zeit verstreicht, ferner bei kleinen u. kleinsten Mengen S₄, weil der bei Neutralisation entstandene Bodenkörper aus BaSO₄ u. BaCrO₄ nicht absol. unl. ist, daher nach dem Massenwirkungsgesetz Ba²⁺, SO₄²⁻ u. CrO₄²⁻-Ionen in die überstehende Lsg. entsendet, die sich mit den hier befindlichen freien CrO₄²⁻-Ionen wieder in ein Gleichgewicht umsetzen u. dadurch das stabile Gleichgewicht des Bodenkörpers verändern. Schließlich muß indessen die Umsetzung des Bodenkörpers über den ionisierten Teil, wenn alle einwirkenden Kräfte sich ins Gleich-

gang mit. Die Trennung *Ge—As—Mo* gründet sich auf die Dest. des GeCl_4 in salzsaurer Lsg. unter Durchleiten von Cl u. daran anschließende Dest. des AsCl_3 aus stark salzsaurer Lsg. in Ggw. von SO_2 . GeO_2 , das durch Lösen des Erzes in HNO_3 u. Einengen zur Abscheidung gelangt, ist stark mit As_2O_3 verunreinigt. Die Red. zu regulin. *Ge* wird quantitativ, wenn man der Cyanalkohol-schmelze Holzkohlenpulver zusetzt. Bei der Red. mit *Mg* erfolgte Detonation. (Chem.-Ztg. 48. 961—63. 1924. Tsumeb, Südwestafrika.)

Bestandteile von Pflanzen und Tieren.

Edward Oscar North und **George D. Beal**, *Darstellung, Eigenschaften und Anwendung der Kiesel-12-wolframsäure*. II. Die Verwendung der Säure zur colorimetrischen Bestimmung von Alkaloiden. (I. vgl. S. 353.) Wss. Lsgg. von Kieselwolframsäure erzeugen in einer Lsg. von *Malachitgrün* in HCl einen Umschlag von Grün in Orange. Bei Verwendung des *Malachitgrüns* als Indicator kann man Alkaloid-Salze mit Normallsgg. von Kieselwolframsäure titrieren, wobei die Zugabe von NH_4OH nicht stört. Die Titration kann im ersten H_2SO_4 -Auszug erfolgen. Um die Verdunstung des Lösungsm. als Fehlerquelle zu vermeiden, bringt man die Flasche u. Inhalt auf das Gewicht zu Anfang des Macerisierens. Die Anwendbarkeit des Verf. wird an einer Reihe von Beispielen gezeigt. (Journ. Amer. Pharm. Assoc. 13. 1001—8. 1924.)

Otto Fürth und **Anton Fischer**, *Über die Ermittlung des Tyrosingehaltes in Proteinen*. III. (II. vgl. FÜRTH, Biochem. Ztschr. 146. 259; C. 1924. II. 37.) **THOMAS** (Ann. Inst. Pasteur 36. 253; C. 1922. II. 1242) hat die Verwendung der *Millonschen Rk.* zu colorimetr. Zwecken dadurch verbessert, daß er die Rk., u. die bei Erwärmen eintretende B. von Ndd. zu vermeiden, im Laufe einiger Stunden bei Zimmertemp. vor sich gehen läßt. Verss. an reinen Tyrosinlsgg. zeigten, daß auch unter bestimmten Bedingungen tatsächlich die Möglichkeit einer für physiol. Zwecke hinreichend genauen Best. besteht. Bei Eiweißhydrolysaten ist die Beseitigung störender Beimengungen erforderlich. Sie erfolgt am besten durch Ausfällung des schwefelsauren Lsg. mit Phosphorwolframsäure, Beseitigung des Überschusses von P mit Chininsulfatlsg. u. des Chininüberschusses mit NaOH , wonach das letzte Itr. neutralisiert wird. — In so gereinigtem Hydrolysat kann man auch das Tyrosin durch additionsvermögen (vgl. FÜRTH u. FLEISCHMANN, Biochem. Ztschr. 127. 137; C. 1923. II. 1044) ermitteln. Bei den Hydrolysaten einer Reihe von Eiweißkörpern (*Casin*, *Fibroin*, *Fibrin*, *Hämoglobin*, *Edestin*) stimmten die Ergebnisse des zweiten Erprobens mit denen der Milloncolorimetrie überein, diejenigen anderer (*Keratin*, *Sumalbumin* u. -globulin, *Ovalbumin*, *Pseudomucin*) zeigten aber auch nach der angegebenen Vorbehandlung noch andere Br. bindende Bestandteile unbekannter Art, die auch mit PAe. bei saurer oder alkal. Rk. nicht extrahierbar u. mit W. nicht flüchtig sind. Da das neue Verf. gestattet, freies Tyrosin neben in Proteinen gebundenem zu bestimmen, wurde am *Casin* u. *Fibrin* die Abspaltung von Tyrosin durch Trypsin u. durch alkal. Hydrolyse verfolgt mit dem Ergebnis, daß je nach der vollkommenen, an Freiwerden formeltitrierbarer NH_2 -Gruppen kenntlichen Disintegration des Eiweißmol. erheblich voraneilt in Bestätigung der Ansicht, daß Tyrosin im Eiweiß eine sozusagen „periphere“ Stellung einnimmt. — Als % (basierend auf Tyrosin) wurde nach dem jetzigen Verf. durch Milloncolorimetrie (bezw. durch additionsverf.) ermittelt für *Casin* 6,6—6,8 (6,8—6,9), *Fibrin* 4,4—4,8 (4,9), *Hämoglobin* 2,8 (2,5—2,7), *Edestin* 4,3 (4,9), *Fibroin* 10—11 (9,4—10). (Biochem. Ztschr. 154. 1—23. 1924. Wien. Univ.)

Andrew Hunter und **James A. Dauphinee**, *Eine colorimetrische Annäherungsmethode zur Bestimmung von Harnstoff mit einer Anwendung zum Aufsuchen und zur quantitativen Bestimmung von Arginase*. (Vgl. HUNTER u. MORRELL, Proc. 'an

Canada [III] 16. V. 75; C. 1923. III. 1235.) Das aus Harnstoff durch gebildete $(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3$ verschiebt das p_{H} der mit Phosphatpuffer versetzten alkal. Seite. Vff. haben nun ermittelt, welches End- p_{H} (bei Anfangs- $p_{\text{H}} = 6,8$) einer bestimmten Menge Harnstoff (bezw. $(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3$) entspricht; die ermittelten Zahlen wurden in eine Figur eingetragen, aus der nun umgekehrt aus dem gemessenen p_{H} ($\pm 0,05$) die Mengen Harnstoff abgelesen werden können. Das wird colorimetr. durch Vergleich mit eingestellten u. elektrometr. gemessenen H_2O -NaOH-Gemischen bestimmt. Es können so bei Änderung des p_{H} von 6,8 Mengen bis zu 7,5 mg Harnstoff in 5 cem Lsg. bestimmt werden. — Die Best. von Harnstoff in *Urin* geschieht folgendermaßen: 1 cem des vierfachen Urins wird mit 4 cem Puffer $p_{\text{H}} = 6,8$ (50 cem $\frac{1}{5}$ -mol. $\text{KH}_2\text{PO}_4 + 23,65$ cem NaOH auf 160 cem aufgefüllt) u. 6 Tropfen Phenolrotlsg. gemischt, das colorimetr. geprüft u. wenn nötig mit 1—2 Tropfen KOH oder HCl auf $p_{\text{H}} = 6,8$ gebracht. Nach Zugabe von 10 Tropfen Ureaselsg. (10 g Jackbohnen + 100 cem $\frac{1}{10}$ -mol. Glycerin, mit NaOH auf $p_{\text{H}} = 6,8$ gebracht) läßt man 30 Min. bei Zimmertemperatur stehen, bestimmt das entstandene p_{H} u. erhält aus der Kurve (nach Multiplikation mit 20 wegen der Verd.) den Gehalt des Harnes an Harnstoff. Die Berechnungen vom wirklichen Harnstoffgehalt sind sehr gering, wenn das Urin nicht alkalischer als $p_{\text{H}} 7,4$ ist.

Arginase. Die Spaltung von Arginin in Ornithin u. Harnstoff wird so bestimmt, daß der gebildete Harnstoff in der oben beschriebenen Weise mit Urease $(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3$ bestimmt wird. Als Arginaselsg. diente ein Auszug aus Rattenleber (10 g/100 g Glycerin). Zur Best. werden 5 cem Argininlsg. (4,203 g Arginin in 100 cem $\frac{3}{50}$ -mol. Phosphatpuffer $p_{\text{H}} = 7,5$) mit Enzymlsg. + W. (zusammen 6 cem) in 100 cem Toluol 24 Std. bei 20° gehalten. Die Rk. wird durch Zugabe von 100 cem 20%ig. HCl u. Aufkochen unterbrochen. 5 cem der filtrierten Lsg. wird auf $p_{\text{H}} = 6,8$ gebracht u. wie oben beschrieben der Harnstoff in $(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3$ bestimmt. An einer Kurve wird gezeigt, daß die gebildete Menge Harnstoff der Arginase proportional ist. — Die Arginase wirkt entgegen früheren Angaben (l. c.) am besten bei $p_{\text{H}} = 9,8$. (Proc. Royal Soc. London Serie B 97. 1924. Toronto, Univ.)

A. R. F. HESSE.

W. Seuffert und E. Mohr, *Die Anwendung der Sulfosalicylsäure-Methode zur Bestimmung der Pepsinwirkung.* Es wird gezeigt, daß die Methode zahlreiche Kontrollen erfordert, dadurch kompliziert wird. (Beitr. z. Physiologie 2. 1924.)

SPIEGEL.

Erhard Lebermann, *Über eine einfache klinische Mikromethode der Natriumbestimmung im Blutserum.* (Biochem. Ztschr. 152. 345—54. 1924. — C. 1925.

BEHRLE.

Loas, *Der Nachweis der Milchsäure im Magensaft nach Fletcher und Hopkins.* Wird die Uffelmanssche Rk. nur bei hohen Milchsäuregehalten wirklich charakteristisch ist u. durch Bestandteile des Probefrühstücks (z. B. Tee) gestört wird, so ist die Probe von FLETCHER u. HOPKINS (Journ. of Physiol. 35. 247; C. 1907. I. 1907.) gut auf Magensaft u. dessen Ä.-Extrakt anwendbar. Sie ist noch in Konz. 0,1% positiv. (Arch. f. Verdauungskrankh. 33. 146—48; Ber. ges. Physiol. 28. 1924. Ref. SCHMITZ.)

SPIEGEL.

Frech, *Zur Methodik der quantitativen Harnsäurebestimmung im Urin.* (Vgl. SCHWENKE, S. 418.) Die Angaben von SCHWENKE, daß die mit RUHEMANN'S Uriconservierten Werte für Harnsäure sehr differieren, werden bestätigt. 30 g Harn genügen zur Fällung aus 100 cem. Der Harn braucht nicht körperwarm u. ungefiltert zu sein. Ausgeschiedene Urate bringt man durch leichtes Erhitzen auf 45 — 50° in Lsg. In den Fällen, in denen nur wenig Material zur Verfügung steht, oder in besonders eiligen Fällen konz. man den Harn zunächst

durch Eindampfen, versetzt mit einer gesätt. NH_4Cl -Lsg., worauf das $\text{NH}_4\text{-Ur}$ in besonders konstruierten Röhren (von GOEDECKE & Co., Berlin N.) durch Zentrifugieren abgeschieden u. durch Titrieren mit $\frac{1}{100}$ - KMnO_4 -Lsg. in bekannter Weise bestimmt wird. Eiweiß ist vorher durch Kochen abzuscheiden. (Pharm. Ztg. 9. 1324—25. 1924. Berlin NW. 6.)

DIETZ

G. Etienne und M. Verain, Mitteilung über ein neues Ureometer. Der Apparat für die Best. mittels NaBrO dienend u. nach bekanntem Prinzip gebaut, zeichnet sich dadurch aus, daß die zur Auffangung des entwickelten Gases dienende Glocke sowohl kleine Mengen Harnstoff (z. B. im Blut) wie auch große (im Harn) genau zu bestimmen gestattet. Sie besteht wesentlich aus einem in $\frac{1}{20}$ ccm geteilten Capillarrohr von 3 ccm Inhalt, die sich fortsetzt in ein in $\frac{1}{10}$ ccm geteiltes Rohr von 5 cm Durchmesser u. 14 ccm Inhalt. Als Entwickler dient ein Röhrehen von 10 cm Höhe u. 5 cm Weite mit Kautschukstopfen, durch den ein Glasrohr mit Verb. mit dem zu einer seitlichen Tubulatur der Glocke führenden Kautschukschläuch geht. (C. r. soc. de biologie 91. 1337—38. 1924. NANCY.) SPIEGEL

H. W. Knipping, Über die Bestimmung der Kohlensäurespannung in der Alveolarluft. Das Wärmeleitungsvermögen der Gase O , N , CO_2 , W -Dampf verhält sich zueinander wie 101 : 100 : 59 : 130 : 700. Das früher (Ztschr. f. physiol. Ch. 137. 287; 1924. II. 1229) beschriebene Verf., das Kontrollbest. überflüssig macht, eignet sich besonders für klin. Zwecke, z. B. zur fortlaufenden Registrierung des Einflusses der Magenacidität u. der diabet. Acidosis auf den CO_2 -Gehalt der Alveolarluft. Dem Analysenapp. ist ein CaCl_2 - oder P_2O_5 -Rohr vorgeschaltet. Der App. wird an einen Akkumulator von 6 V. angeschlossen, durch einen Vorwiderstand, eine geeignete Stromstärke eingestellt u. zur Best. des Nullpunktes und durchgesaugt. Die zu analysierenden Gasgemische werden dann durchgesaugt und durchgedrückt u. nach Einschalten des Stromes die infolge der verschiedenen Wärmeleitung des Gasgemisches schwankenden Stromstärken galvanometr. abgelesen. Wegen der geringen Differenz der Wärmeleitungsfähigkeit von O u. N kann der O -Gehalt der Alveolarluft zwischen 10 u. 30% schwanken ohne daß die CO_2 -Anzeige beeinflusst wird. Die Meßgenauigkeit ist 0,1% CO_2 . Die Schwankungen der Nüchternwerte bei n. Menschen betragen nicht über 0,2 Vol. % CO_2 . Das System ist gleichzeitig zur Best. des H -Gehaltes von Luft- H -Gemischen u. dadurch zur Best. des Lungenvolumens brauchbar. (Ztschr. f. physiol. Ch. 141. 110—11. 1924.) GUGGENHEIM

H. W. Knipping, Beitrag zur Acetylenmarkose. Auch für die Narkose mit einem explosiblen Gasgemisch — Acetylen + O , N_2O + Äther — läßt sich die früher (s. vorst. Ref.) beschriebene App. benützen, wenn alle Teile desselben, welche mit dem Gasgemisch in Berührung kommen, aus vernickeltem Fe bestehen u. Cu , das bei Gegenwart von W -Dampf explosives Cu Acetylen bildet, vermieden wird. (Ztschr. f. physiol. Ch. 141. 11—12. 1924. Hamburg, Krankenhaus Eppendorf.) GUGGENHEIM

Carlo Barinetti, Die Calorimetrie in der Klinik. Übersichtsreferat mit Angabe der App. u. Rechnungsmethoden. (Arch. di patol. e clin. med. 3. 195—211. Pavia, Univ.; Ber. ges. Physiol. 28. 82. 1924. Ref. LAQUER.) SPIEGEL

E. Rizzatti, Formaldehydgelifizierung und Refraktometrie des Leichenserums (Vgl. Arch. Farmacologia speriment. 38. 1; C. 1924. II. 1966.) Weitere Unterss. ergeben, daß die Rkk. von GATÉ u. PAPACOSTAS bei Leichenserum oftmals auftreten, wenn sie auch vorher beim Serum des lebenden Individuums negativ ausfallen. Gesetzmäßigkeit zwischen dem Eintreten der Gelifizierung u. der n_D des Serums bestehen nicht, sie ist jedoch beeinflusst von der Konz., dem Grade der Hämolyse, der Lsg. u. der Proteine. Man kann aber keinerlei Schlüsse ziehen auf die Todesursache bzw.

Zeit. Zusatz von Salzen erhöht die Gelifizierbarkeit des Serum bei Leichen
 1. Lebenden. (Arch. Pharmacologia experim. **38**. 154—63. 1924. Parma.) GRI.
 7. **Radsimowska**, Eine Ansatzelektrode zur p_H -Bestimmung in festen Nähr-
 (Biochem. Ztschr. **154**. 49—51. 1924. Kiew, Med. Inst.) SPIEGEL.

H. Angewandte Chemie.

I. Allgemeine chemische Technologie.

Ginabat, Oberflächenkondensatoren. I. u. II. Mitt. I. Die jetzigen Kondensatoren. II. Der neue Kondensator. In den jetzigen Kondensatoren mit horizontalen Rohrbündeln sind die Rohre so angeordnet, daß das kondensierende Gas den Scheitelpunkt des darunter liegenden Rohres fällt; infolgedessen werden die unteren Rohre mit immer dicker werdenden Flüssigkeitsschichten umgeben u. die Fallgeschwindigkeit des herabfallenden W. wird vermindert. Vf. hat in seinem neuen Kondensator die Rohre so angeordnet, daß das herabfallende W. tangential zum darunterliegenden Rohr auftritt; dadurch wird nur ein Viertel der Rohroberfläche mit fließendem Kondenswasser benetzt, drei Viertel der Rohroberfläche bleibt trocken; die Fallgeschwindigkeit des W. wird in viel geringerem Maße vermindert. Es ergibt sich rechnermäßig eine um etwa 25% größere Wärmeübertragungszahl. Eingehende Versuche bestätigen die Theorie. (Die Wärme **47**. 1924. 588—92. 601—4. 1924.) NEIDHARDT.

Finel, Grundsätzliches zum Bau von Salzlösern. Zur Best. der wirtschaftlichen Größenverhältnisse einer Salzlöse-Apparatur ist es notwendig, durch Versuche die Löslichkeitsverhältnisse des Salzes bei verschiedenen Temp. u. verschiedenen Konz. festzustellen. Solche Vorvers. hat Vf. für NaCl u. KCl durchgeführt u. die Ergebnisse in Schaubildern zusammengestellt. (Apparatebau **36**. 1924. 271—73. 1924. Breslau.) NEIDHARDT.

J. Obermiller und **Martha Goertz**, Neue Absorptions- und Trocknungsmethoden für quantitative Bestimmungen und ein für sie geeigneter Erhitzungsapparat für die Verwendung für die exakte Trocknung von Textilfasern. Beschreibung von neuartigen Absorptions- u. Trockentürmchen aus Glas von einem Fassungsraum von 100 u. 30 ccm zu obigen Zwecken. (Ztschr. f. angew. Ch. **36**. 429—32. 1924.) BEHRLE.

J. Obermiller, Die technisch durchführbare Einstellung eines beliebigen Luftfeuchtigkeitsgrades einschließlich der Hochtrocknung der Luft und der Kohlenabsorption. (Vgl. Ztschr. f. physik. Ch. **109**. 145; C. **1924**. II. 579.) Vortrag über die Einstellung eines beliebigen Luftfeuchtigkeitsgrades. Vf. gibt eine systematische Darstellung der Einstellung von Stoffen, die teils angefeuchtet teils trocken zur Einstellung von Gasen sind. Zur Absorption der CO_2 mittels NaOH ist der Heumannsche Gaslösungsapp. geeignet. Als gut wirkendes Trocknungs- u. Absorptionssystem empfehlen sich folgende Zusammenstellung: NaOH 1,280—1,350 im Neumannapp., $CaCl_2$ in der Vorstufe, $CaCl_2$ entwässert, halb erschöpft, NaOH fest, $CaCl_2$ entwässert, P_2O_5 . Als Trocknungsmittel sind die $CaCl_2$ -Türme nach DENNSTEDT geeignet; das P_2O_5 wird am besten in vom Vf. früher angegebene Türmchen verwendet. (Ztschr. f. angew. Ch. **37**. 904—6. 1924.) JUNG.

J. Obermiller und **Martha Goertz**, Die exakte Trocknung der Textilfasern nach wissenschaftlichen und technischen Zwecken. Vf. trocknete Textilfasern in dem früher beschriebenen App. (vorvorst. Ref.) mit nach seinem Verf. (vorst. Ref.) sorgfältigst gereinigter Luft nicht über 100°. Eine Vergilbung von Baumwolle, Kunstseide, besonders Wolle war auch nach bester Entfettung u. Reinigung unverkennbar. Bei trocknender Wolle ging die Farbe bei 95—100° in ein dunkleres Gelblichgrün

über. Selbst bei gewöhnlicher Temp. fand ein Farbumschlag statt. Beim Erhitzen ist mit einer geringen Gewichtszunahme, vermutlich bedingt durch Oxydation zu rechnen; durch Verlust flüchtiger Stoffe wird zeitweise eine Abnahme oder Stillstand des Gewichts vorgetäuscht, die absol. Trocknung mit hochgetrockneter Luft ist bei jeder Temp. durchzuführen; die Temp. ist nur von Einw. auf die Trocknungsschwindigkeit. Verss. mit Luft von bestimmt eingestelltem Feuchtigkeitsgrad gaben, daß Wechsel im Feuchtigkeitsgehalt der Luft von nicht zu unterschätzender Einw. auf die Trocknung an freier Luft ist. Besonders geeignet ist ein 3–5 d. Trocknen nach dem beschriebenen Verf. bei 85–90°. Bei *Cellulose* hat Vf. eine bis zum Endgewicht gleichmäßig fortschreitende Gewichtsabnahme gefunden. Ein exaktes Trocknen im Vakuumexsiccator über P_2O_5 ist nur bei geringen Mengen in dünnster Schicht möglich. (Ztschr. f. angew. Ch. **37**. 940–45. 1924. M.-Gladbach.) JUN

E. Kolbe, *Kälteerzeugung durch Abdampf. Ein Sonderkapitel des Kraftz-betriebes*. Vf. empfiehlt zur Kälteerzeugung, wenn Abdampf zur Verfügung steht, das Absorptionsverf. in der Kältemaschine „Abdamos“ der Firma C. SENSING-BRENNER G m. b. H. Düsseldorf. Er gibt die Bedingungen an, unter welchen diese Maschine wirtschaftlicher arbeitet als eine Kompressionsmaschine. (Ztschr. f. Sauerst.- u. Stickst.-Ind. **16**. 81–84. 1924.) NEIDHART

Deutsche Maschinenfabrik A. G., Duisburg, *Vorrichtung zum elektrischen Ausscheiden der in Gasen und Dämpfen enthaltenen festen und flüssigen Bestandteile*. mit kegel- oder keilförmigen Elektroden, von denen die eine die andere umschließt. 1. dad. gek., daß zwecks Schaffung eines hinsichtlich des Querschnittes von verschiedener Gestalt der Elektroden abhängigen Gaskanals zwischen beiden Elektroden mindestens die äußere undurchlässig ist, während die Kegel- oder Keilfläche der inneren durchlässig sein kann. — 2. dad. gek., daß die zueinandergehörigen Elektroden in axialer Richtung gegeneinander verstellbar angeordnet sind. (D. R. P. 407161 Kl. 2 vom 16/10. 1920, ausg. 13/12. 1924.) KAUSC

Walter Lachmann, Dresden, *Verfahren und Vorrichtung zum Zerlegen von Gas- oder Dampfgemischen*, z. B. Luft durch Adsorption oder chemische Bindung. Verf. 1. dad. gek., daß man nach Sättigung der bindenden Stoffe (aktive Metalle, Salze, etc.) zunächst ein dem am leichtesten zu bindenden Bestandteil entsprechendes Gas (Dampf) im von den weniger leicht zu bindenden Bestandteilen vollständig befreiten weitgehend befreiten Zustand (Hilfsgas) durch die porösen Stoffe behufs Austreibung der weniger fest gebundenen Gasgemischteile hindurchleitet (Maximalprozeß) und dann erst die fester gebundenen Gemischteile in an sich bekannter Weise durch Druckverminderung oder durch Erhitzen gewinnt (Entgasungsprozeß). — Vorr. dad. gek., daß sie aus einem Ring von Reaktionskammern mit für alle übereinstimmenden Gasführungs- u. zugleich Schaltungseinrichtung besteht, von welchen Kammern jede als eine Bindungskammer oder als eine Entgasungskammer oder als eine Bindungsanfangskammer rückwärts vorgeschaltet u. in sie mündende Kammer (Maximalkammer) geschaltet werden kann. — 8 weitere Patentansprüche kennzeichnen Ausführungsformen des Verf. u. der Vorr. (D. R. P. 407179 Kl. 2 vom 16/11. 1923, ausg. 17/12. 1924.) KAUSC

L'Air Liquide (Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Georges Claude), Paris, *Trennung von Gasgemischen*. Ein Teil des zu zerlegenden wird stark abgekühlt, sehr hoch komprimiert, die erhaltene Flüssigkeit einem Gasanteil der auf einem zwischen dem sehr hohen u. dem Trenndruck liegenden Druck unter Leistung äußerer Arbeit entspannen gelassen. (F. P. 57468 vom 10/3. 1923, ausg. 17/7. 1924.) KAUSC

Jorges Léon Émile Patart, Frankreich, *Entfernung von Kohlenoxyd aus gasförmigen. H₂ u. CO enthaltende Gasgemische werden mehr oder weniger abgekühlt u. abgekühlt durch eine Rektifikationssäule im Gegenstrom zu herabfließendem fl. N₂ geführt.* (F. P. 575178 vom 2/1. 1924, ausg. 25/7. 1924.) KAUSCH.

Air Liquide, Soc. Anon. pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés de Séparation des Gaz, Paris, *Trennung von Gasgemischen durch Verflüssigung.* Man entfernt aus Leuchtgas o. dgl. durch partielle Verflüssigung u. Rektifikation, indem das Gas aufwärts in einem Temperatúraustauscher durch die Zone, in dem H₂ verflüssigt wird u. auf der Zone, in der eine beträchtliche Verflüssigung stattfindet, zirkulieren läßt. (E. P. 223489 vom 8/3. 1924, Auszug veröff. 1924. Prior. 20/11. 1923.) KAUSCH.

Abriel Reinaud, Marseille, *Trockenvorrichtung mit dauernd hindurchgeleitetem, trockenem Luftstrom*, bestehend aus mehreren zur Aufnahme der zu trocknenden Gegenständen dienenden Abteilungen, zwischen denen senkrechte Luftschächte mit Ventilen zur Erzeugung von Querströmen vorgesehen sind, dad. gek., daß in den Abteilungen Hauptluftführungen schräge Leitflächen angebracht sind, die eine gerichtete Luftströmung durch die Trockenabteilungen u. in den dazwischen befindlichen senkrechten Luftschächten erzeugen. — Der zum Trocknen benutzte Raum wird durch alle Teile des Trockenraumes gleichmäßig hindurchgeführt. (F. P. 407067 Kl. 82a vom 31/1. 1922, ausg. 9/12. 1924. F. Prior. 24/12. 1921.) OELKER.

Karl Kieß, Niederbreisig a. Rh., *Trockendarre mit wahlweise von verschiedenen Zellen gespeister Heizgasleitung*, dad. gek., daß die an den Trockenraum angeordneten Heizquellen durch je einen Schieber vom Trockenraum absperrbar sind, daß beim Öffnen dieser Schieber u. Schließen der Verbindungsrohre zur Heizgasleitung die Heizquellen feuerlos als Frischluftleitungen zum Trockenraum benutzt werden können. — Die Anlage eignet sich besonders für die keram. oder chem. Industrie, weil diese stets mehrere Heizquellen, z. B. die Brennöfen, zur Verfügung haben u. um deren Abhitze noch verwerten zu können. (D. R. P. 394300 Kl. 82a vom 1/1. 1923, ausg. 9/12. 1924.) OELKER.

L. Oil Processes Limited England, *Katalysatoren.* Man red. ein Gemisch aus mehreren Metalloxyden u. einer organ. Metallverb. in der Weise, daß man es mit einer teilweise Red. mit Hilfe eines kohlehaltigen Mittels unter Erhitzen behandelt, dann das Reduktionsprod. zerkleinert, wieder mit einem Reduktionsmittel u. auf höhere Temp. als zuerst erhitzt. (F. P. 575599 vom 8/1. 1924, ausg. 24. E. Prior. 26/4. 1923.) KAUSCH.

II. Gewerbehygiene; Rettungswesen.

Herhard Pfeil, *Die gewerbliche Kohlenoxydvergiftung.* Vortrag über Entstehung, Diagnose, Therapie u. Prophylaxe der CO-Vergiftung. Die Organisation von Sicherheitsmaßnahmen im NH₃-Werk Merseburg wird eingehend geschildert. In vielen Seiten betonte Gefährlichkeit auch leichter CO-Vergiftungen trifft auf eingehenden Beobachtungen nicht zu, alle Vergiftungsfälle sind ohne wesentliche Folgeerscheinungen u. fast ohne Beeinträchtigung der Erwerbsfähigkeit der Betroffenen verlaufen. (Ztschr. f. Desinfekt. u. Gesundheitswesen 16. 155—57. 1924. Leipzig, Leuna-Werke.) FRANK.

Fischer, *Entstehen bei der Bleilötarbeit „Bleidämpfe“ in gesundheitsschädlicher Menge?* Bei der Bleilötarbeit unter Benutzung der Knallgasflamme wird Pb in feinsten bis feinsten Verteilung an die Luft abgegeben in Form von PbO, jedoch so, daß eine Aufnahme in gesundheitsschädlicher Menge durch die Atemwege nicht in Betracht kommt. Die kleinen Spuren spielen für die Verschmutzung der Arbeitstische nur eine untergeordnete Rolle, die Hauptgefahr besteht in der

Beschmutzung der Hände durch Pb u. PbO bei den sonstigen Arbeiten. Bleilöter ist demnach keiner anderen Pb-Gefahr ausgesetzt wie Schriftgießergleichen. Das einzige sicher wirkende Mittel ist die Beobachtung persönlicher Reinlichkeit nach Maßgabe des Bleilötermerkblattes. (Arch. f. Hyg. 94. 342—1924. Stuttgart.)

Lucie Barthel, *Krebsuntersuchungen auf aromatische Amine und Phenole*. FRAN

Nachweis von aromat. Aminen, Phenolen u. Aminophenolen in menschlichen Kriegen, veranlaßt durch das gehäufte Auftreten von Krebsen bei Anilinarbeit, gelang nicht. (Klin. Wchschr. 3. 2388. 1924. Breslau.)

Ernst Behrle, *Vergiftungen bei der Herstellung von Tetraäthylblei, das als Zusatz zu Motorbrennstoffen verwendet wird*. Tetraäthylblei wird in Nordamerika als Zusatz zu Gasolin für Explosionsmotoren verwendet, um das Klopfen zu verhindern u. Maschinen höherer Kompression verwenden zu können. In einer Versuchsfabrik zu dessen Herst. ereigneten sich mehrere Vergiftungsfälle, die an einem Orte zum Verbot des mit $(C_2H_5)_4Pb$ versetzten Gasolins (Äthylgasolin) führten. (Ztschr. f. angew. Ch. 37. 1023—24. 1924. Berlin-Wilmersdorf.)

G. Spettmann, *Die Arbeitsweise moderner Entstaubungsanlagen*. Vf. beschreibt an Hand einer Abbildung einen einfachen Zentrifugal-Sand- u. -Staubabscheider, der vor allem der Bedingung genügt, daß die abgeschiedenen Staubteilchen aus dem Luftstrom entfernt werden u. durch ihn nicht wieder aufgewirbelt werden. Er wird eine sehr vollkommene Staubabscheidung erreicht. (DINGLERS Polytechn. Journ. 339. 212—13. 1924. Hamburg.)

IV. Wasser; Abwasser.

Johannes Neide, *Neue Gesichtspunkte über Speisewasserreinigung*. Da krystallin fester Kesselstein die Wärmeübertragung weniger stört als amorpher, poröser Kesselstein, verhindert werden, daß CO_2 -Salze, Humusbestandteile oder Schlamm in den Kesselstein gelangen. Wichtig ist die Entfernung von Gasen, besonders O_2 , aus dem Speisewasser. H_2SO_4 -Salze bilden eine feste Schicht, die die Wärmeübertragung ebenfalls nennenswert behindert u. beim Reinigen in Scherben abspringt. (Chem.-Ztg. 48. 924; Braunkohle 23. 675—76. 1924. Bremen.)

W. Ekhard, *Die Enteisung des Wassers*. Sie erfolgt in der Hauptsache in der Folge Oxydationswrgk. durch Luftzutritt u. Abscheidung des als doppelkohlensaures FeO in Lsg. vorhandenen Fe als hydrat. Fe_2O_3 . Hierauf gründen sich die mechan. Enteisungsverfahren, die Vf. beschreibt, hauptsächlich. Es sind die Verfahren von DUNBAR u. von PIEFKE; der Enteisungsapp. von ARNOLD u. SCHIRN u. die Bastardpumpe von DESENISS u. JACOBI. Bei den chem. Verff. handelt es sich um Fällungserscheinungen; nach STECKEL erfolgt die Fällung mit gebranntem Kalk besser soll die Fällung mit $FeCl_3$ u. CaO sein (auf 1 cbm W. 10 g $FeCl_3$ u. 5 bis 100 g CaO), der Nd. bewirkt zugleich eine gute mechan. Klärung u. schlägt Bakterien nieder. An die Fällung muß sich eine Feinfiltration mittels eines Leinwandfilters von KRÖHNKE schließen. (Dtsch. Essigind. 28. 303—4. 1924.)

P. Grélot, *Die Verunreinigung von Flüssen durch Abwässer aus Hochöfen*. Vf. kommt auf Grund seiner Unterss. zu dem Schluß, daß die Abwässer der Hochofen keine Stoffe enthalten, die auf Fische giftig wirken könnten. Nach geeigneter Filtration kann mit solchen Abwässern durchsetztes Flußwasser für die Wasserversorgung der Städte unbedenklich benutzt werden. (Bull. Sciences Pharm. 31. 520—27. 589—96. 1924. Nancy, Fac. de Pharm.)

Lucien Cavel, *Beitrag zum Studium der aktivierten Schlämme*. Die reinigende Wrgk. von aktiviertem Schlamm wird schon durch äußerst geringe Mengen pflanzlicher Säuren im Abwasser gelähmt. Dabei wird nicht nur die Zerlegung von NH_3 gehemmt, sondern auch die adsorbierende Fähigkeit des Schlammes geschädigt.

en sogar von ihm bereits gebundene Kolloide zur dispersen Phase zurück-
 en. Diese schädliche Wrkg. sauren Abwassers zeigte sich in den Verss.
 e bei $p_H = 5$. (C. r. d. l'Acad. des sciences **179**. 1095—98. 1924.) SPIEGEL.
 'a., *Die wichtigsten färbereitechnischen Untersuchungsmethoden für Rohwasser*.
 en über Best. von NH_3 , HNO_2 , HNO_3 , $NaCl$, Mn , Fe , Ca , Mg , H_2SO_4 , Car-
 a. Sulfat- u. Gesamthärte. (Ztschr. f. ges. Textilind. **28**. 537—38. 1924.) SÜV.

Josef Sichert, Laka pri Zsumu, (Jugoslavien), *Verhütung von Kesselsteinbildung*.
 n Kesselspeisewasser werden wasserlösliche Harze, insbesondere Gummiharze,
 ribanum (Weihrauch), zugesetzt, u. zwar im Gewichtsverhältnis von 1 : 50000.
 rz. **P. 103891** vom 9/3. 1923, ausg. 16/5. 1924. Oe. Prior. 14/9. 1922.) OELKER.
 ermutit Akt.-Ges., Berlin, *Herstellung von Wasserreinigungsmitteln*, die gemäß
 8145 kolloidale SiO_2 auf poröse Materialien niedergeschlagen enthalten, dad.
 , daß die gerüstbildenden Metalloxyde durch gleichzeitige Wechselwirkung ge-
 hr Metallsalze mit Alkalisilicaten gefällt werden, worauf der Nd. gesammelt
 eetrocknet wird. — Die so erhaltenen Reinigungsmittel geben im Gegensatz zu
 gemäß dem Hauptpat. erhaltenen, keine oder nur Spuren von SiO_2 an das W.
 . **D. R. P. 405172** Kl. 85b vom 2/10. 1919, ausg. 1/11. 1924. **Zus. zu D. R. P.**
4; C. 1920. II. 523.) OELKER.

luns Reisert & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien, Köln-Braunsfeld,
Herstellung eines Mittels zur Enthärtung, Entmanganung und Enteisenung von Wasser
zur Durchführung anderer durch Basenaustausch bedingter Reaktionen, 1. dad.
 , daß die Ndd. aus Alkalisilicatlg. u. Metallsalzglg. mit Alkalialuminatlg. be-
 d. werden, wobei das Auswaschen der Ndd. unterbleiben kann, worauf die
 uelten Ndd. abgepreßt, getrocknet u. hydratisiert werden. — 2. dad. gek.,
 c. aus Alkalisilicatlg. u. Metallsalzglg. erzeugten Ndd. vor dem Abpressen
 riken nacheinander mit 1. Al-Salzen u. mit Alkali behandelt werden, wobei
 Auswaschen unterbleiben kann. (**D. R. P. 407290** Kl. 12g vom 29/3. 1919,
 10/12. 1924.) KAUSCH.

ermutit Company, New York, übert. von: Thomas R. Duggan, New York,
Regenerierung basenaustauschender Silicate. Das zum Weichmachen von W. ver-
 e Silicat wird dadurch regeneriert, daß man durch eine Schicht dieses ver-
 en Prod. eine Salzglg. von oben nach unten fließen läßt, worauf man einen
 er Salzglg. gegebenenfalls nach Abscheidung der aufgenommenen Ver-
 igungen (Ca- oder Mg-Salze) von neuem in dem Verf. verwendet. (**A. P.**
9 vom 15/10. 1918, ausg. 7/10. 1924.) KAUSCH.

on Gartzweiler, Berlin-Friedenau, *Vorrichtung zur Regelung eines Gas-*
stromes, insbesondere eines Kohlensäure- oder Chlorgasstromes zur Reinigung von
Gas, bei welcher in die Gaszuleitung ein Druckregler u. ein Einstellventil ein-
gebaut sind, dad. gek., daß das durch eine Membran beeinflusste Drosselventil
 ickreglers verstellbar eingerichtet ist. — Das Drosselventil kann dabei mit
 instellventil durch bekannte Mittel, z. B. durch einen Zahntrieb verbunden
 die Betätigung des letzteren kann durch eine bekannte Schwimmer- oder
 rtialdruckvorrichtung erfolgen. — Es wird ermöglicht, durch entsprechende
 ung des Einstellventils dem W. bei wechselnden Wassermengen eine diesen
 onale Menge Gas zuzuführen. (**D. R. P. 406730** Kl. 85a vom 23/7. 1921.
 12. 1924.) OELKER.

Charles van Overstraeten, England, *Reinigung und Aufarbeitung der Woll-*
abwässer. Die Abwässer werden mit $CaCl_2$ behandelt, filtriert u. die festen
 eilebenden Stoffe mit sd. Aceton extrahiert. (**F. P. 576171** von 22/1. 1924,
 12/8. 1924. Belg. Prior. 23/5. 1923.) KAUSCH.

V. Anorganische Industrie.

Bruno Waeser, *Fortschritte der anorganischen Großindustrie 1921—1923*. Stoff und seine Verbindungen. (Chem.-Ztg. 48. 821—22. 825—28. 841—42. 846—861—62. 866—68. 883—84. 890—93. 905—9. 913—15. 934—37. 954—55. 1924.)

O. Scarpa, *Einige Beobachtungen über die Fabrikation der Salpetersäure mittels der Synthese des Stickstoffdioxids*. Vf. gibt ein Schema für die elektrochem. Herst. von NO_2 aus N u. O u. Kondensation des gewonnenen Prod. durch Abkühlen zu N_2O_4 , das ohne großen Aufwand in konz. HNO_3 übergeführt werden kann. Einfluß der prozentualen Zus. der Ausgangsgase an N u. O auf die Ausbeute untersucht. Vf. empfiehlt für die Calciumcyanamidfabriken, den O, der bei der Herst. von N aus Luft bisher meist nicht verwendet wurde, ebenfalls nach dem angegebenen Verf. zur Salpetersäurefabrikation mittels O-reicher Luft zu verarbeiten. (Annali Chim. Appl. 14. 368—78. 1924. Turin, Politecn.) ZANDE

Charles Benner, *Die Graphitindustrie in Madagaskar*. Graphite von Madagaskar zeichnen sich durch hohen C-Gehalt u. geringen Gehalt an Fe u. Si aus und eignen sich besonders für die Herst. von Schmelzriegeln. (Bull. Soc. ind. d'Alsace-Lorraine 90. 655—62. 1924.) SÜVER

—, *Die fabrikmäßige Darstellung von Silbernitrat*. Beschreibung der Fabrikation von AgNO_3 u. Zusammenstellung der Herstellungskosten. (Chem.-Ztg. 49. 5.) KAUSCH

Gaëtan Pierre Capot und **Robert Louis Capot**, Frankreich, *Extraktion von Schwefel aus solchen enthaltenden Stoffen*. Man verdampft den S enthaltenden Stoff u. verd. die entstehenden Dämpfe durch ein inertes k. Gas. (F. P. 574573 vom 14/12. 1923, ausg. 16/7. 1924.) KAUSCH

W. A. Bone, St. Albans, und **G. I. Finch**, London, *Gewinnen von Ammoniak aus Gasen*. Die Gase werden durch wss. Lsgg. von H_3PO_4 oder $(\text{NH}_4)_2\text{HPO}_4$ von solcher Stärke geleitet, daß sich Krystalle von $(\text{NH}_4)_2\text{HPO}_4$ abscheiden. Dieses Salz kann durch Erhitzen in NH_3 u. $(\text{NH}_4)_2\text{HPO}_4$ zerlegt werden. Man erhitze zweckmäßig durch Überleiten von überhitztem Dampf, wobei die Temp. des erhitzten Dampfes so gewählt wird, daß sich in der Vorlage eine konz. Lsgg. von NH_3 bildet. (E. P. 222587 vom 7/7. 1923, ausg. 30/10. 1924.) KÜHLH.

Charles Urfer, Genf, *Katalysator für die Ammoniaksynthese*. (D. R. P. 403661 Kl. 12k vom 6/6. 1923, ausg. 3/12. 1924. Schwz. Prior. 12/6. 1922. — C. 2334 IV. 642 [E. P. 199032].) KÜHLH.

Deutsche Celluloid-Fabrik, Eilenburg, *Wiedergewinnung von Salpetersäure aus HNO_3 enthaltenden Abwässern oder Gemischen mit dünneren Schwefelsäuren*, dadurch, daß die HNO_3 der Abwässer durch Pyrite zu NO red. u. letzterer in bekannter Weise in HNO_3 übergeführt wird. (Hierzu vgl. auch E. P. 217546; C. 1924. II. 31.) (D. R. P. 407482 Kl. 12i vom 16/6. 1923, ausg. 15/12. 1924.) KAUSCH

Société Anonyme d'Eclairage et d'Applications Électriques, Frankreich, *Krypton und Xenon aus flüssigem, aus der Luft stammendem Sauerstoff*. Man zerlegt durch die Wirkung des elektr. Stroms das fl. O_2 u. zwar in der fl. u. gasförmigen Phase einer gleichzeitigen Fraktionierung. (F. P. 575024 vom 26/12. 1923, ausg. 23/7. 1924.) KAUSCH

Carl Rademacher & Co. chem. Fabrik, Prag-Karolinenthal, *Gewinnung und Regenerierung von Entfärbungskohle* mit spezif. Adsorptionsvermögen für rote Farbstoffe durch Erhitzen von organ. Stoffen aller Art wie Holzabfälle, Torf, Knochense, Treber, tier. Abfälle usw. mit Chloriden des Zn u. der Alkalien, alkal. oder Erden, dad. gek., daß ein Gemisch von starker ZnCl_2 -Lauge u. dem gleichen oder annähernd gleichen Raunteile von handelsüblicher starker CaCl_2 -Lösung verwendet wird, welche letztere ganz oder auch zum Teile durch äquivalente Mengen der Chloride der genannten anderen Körper ersetzt werden kann, bzw. daß ersetzte Entfärbungskohle irgend einer Herkunft der Einw. der beschriebenen Chloride

- ungen in der Hitze unterworfen wird. (D. R. P. 407368 Kl. 12i vom 8/5. 1924, ausg. 13/12. 1924. Tschechoslow. Prior. 19/3. 1923.) KAUSCH.
- Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning** (Erfinder: **Otto Ernst** und **Nicodemus**), Höchst a. M., *Herstellung hochaktiver Kohle*. (D. R. P. 407406 vom 23/7. 1923, ausg. 13/12. 1924. — C. 1924. II. 526.) KAUSCH.
- Algemeene Norit Maatschappij**, Holland, *Aktive Kohle*. Kohlenstoffhaltige Stoffe werden in mehr oder weniger fein zerteiltem oder gekörntem Zustande einer Verkohlung im Schwebestande in einem gasförmigen Medium ausgesetzt. (F. P. 575371 vom 29/10. 1923, ausg. 29/7. 1924. E. Prior. 9/8. 1923.) KAUSCH.
- André Louis Octave Fauchon-Villeplée**, Frankreich, *Aktive Kohle*. In einer Kohle wird Holzkohle, Lederkohle, Tierkohle o. dgl. verkohlt u. die erhaltene Kohle mit angesäuertem W. o. dgl. behandelt. (F. P. 575557 vom 24/3. 1924, ausg. 1/8. 1924.) KAUSCH.
- Carlo Zorzi**, Italien, *Sicherheitsvorrichtung für die Behandlung von Wasserstoff*. In Gasgemischen enthaltenden Gasgemischen bei erhöhtem Druck und Temperaturen. Die Reaktionsbehälter für das Gas (H_2) sind innen mit einem Futter aus einer porzellanartigen oder glasigen Schicht versehen u. sind von einer Schutzhülle umgeben, deren Raum frei läßt, gegen den die Stöße einer eventuellen Explosion prallen. (F. P. 574960 vom 26/12. 1923, ausg. 22/7. 1924.) KAUSCH.
- Mathieson Alkali Works, Inc.**, V. St. A., *Alkalihypochlorite*. Man stellt $HClO$ von $HClO$ u. HCl her, setzt ein schwaches Alkali ($CaCO_3$ oder $NaHCO_3$) mit $HClO$ nicht reagiert, trennt die $HClO$ mit einem Lösungsm. für diese HCl_3 , Äthylenchlorid, CCl_4 , Tetrachloräthan), worauf man auf diese Säure ein Alkali (KOH , $NaOH$) einwirken läßt. (F. P. 574988 vom 7/12. 1923, ausg. 7/12. 1924.) KAUSCH.
- Chemischen-Gesellschaft für Anilin-Fabrikation**, Berlin-Treptow, *Alkalisulfat*. Man läßt in einem Drehofen SO_2 , Luft oder Sauerstoff u. Wasserdampf im Gegenstrom zu $NaCl$ strömen. (F. P. 575190 vom 2/1. 1924, ausg. 25/7. 1924. D. Prior. 11/12. 1923.) KAUSCH.
- Ernst Jung**, Deutschland, *Kalialze*. Man verwendet die beim Lösen, Klären u. Fraktionieren abstrahlende Wärme aus den Lösungen der Rohsalze zum Ansaugen der Luft in einen Kühlturm. (F. P. 576386 vom 26/1. 1924, ausg. 20/8. 1924. For. 2/3. 1923.) KAUSCH.
- Société Chimique de la Grande-Paroisse**, Azote et Produits Chimiques, Frankreich, *Behandlung von Natursalzen (Pottasche und Soda)*. Die Salze werden in wässriger ges. Lsg. desselben Salzes gewaschen. (F. P. 575675 vom 29/3. 1923, ausg. 4/8. 1924.) KAUSCH.
- Thott & Gen.**, Jena, *Herstellung von Natriumdekaborat*, dad. gek., daß das Natrocalcit durch wss. H_3BO_3 -Lsg. in $Na_2O \cdot 5B_2O_3 \cdot 10H_2O$ u. Calciumborat überführt wird u. das letztere durch CO_2 in im Verf. verwendbare H_3BO_3 überführt wird. (D. R. P. 407475 Kl. 12i vom 15/2. 1921, ausg. 13/12. 1924.) KAUSCH.
- Maxime Antoine Minot**, Frankreich, *Krystallisiertes Bariumchlorid*. Man läßt $BaCl_2$ in Suspension enthaltende Lsg. HCl einwirken u. filtriert das ausgefallene $BaCl_2$ ab, worauf man es mit einer ges. $BaCl_2$ -Lsg. behandelt. (F. P. 576741 vom 2/3. 1923, ausg. 18/8. 1924. (Zus. zu F. P. 561734; C. 1924. I. 509.) KAUSCH.
- Carl Jahl und J. Michael & Co**, Berlin, *Bariumsalze*. Man läßt auf eine mit H_2S gesättigte gesättigte BaS -Lsg. ein Alkalisalz (Chlorid, Nitrat) einw., kühlt die Lsg. dann zwecks Auskrystallisieren des $BaCl_2$ ab u. dampft die Mutterlauge zur Ausscheidung eines Komplexsalzes ein. Das zuerst abgeschiedene $BaCl_2$ u. das Komplexsalz werden mit einer gesätt. Lsg. von $BaCl_2$ in $BaCl_2$ -Krystalle überführt. Die Waschfl. werden wieder zu der BaS -Lsg. der nächsten Operation

zugesetzt. Das BaCl_2 wird zu einer mit H_2S gesättigten BaS -Lsg. hinzugefügt, bevor NaCl zugesetzt wird. Es krystallisiert dann reines BaCl_2 beim Abkühlen aus. (E. P. 223800 vom 27/2. 1924, ausg. 20/11. 1924.) KAUSCH

Constantin Asseev, Belgien, *Chemisch reine Aluminiumsalze*. Die Al_2O_3 -haltigen Mineralien werden mit H_2SO_4 behandelt u. die dadurch erhaltenen Röstlaugen werden mit HCl gesättigt. Es scheidet sich krystallwasserhaltiges $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ ab, das weiter auf reines $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ u. Al_2O_3 verarbeitet wird. (F. P. 574983 vom 30/11. 1923, ausg. 22/7. 1924.) KAUSCH

Paul Vérola, Frankreich, *Titan- und Zinkoxyd*. Man behandelt Titanerz mit H_2SO_4 in Ggw. eines die Dampftension dieser Säure herabsetzenden Salzes (NaCl), löst das erhaltene Prod. in mit HCl versetztem W., fügt Na_2S hinzu u. filtriert die Lsg. Zinkblende wird mit HCl behandelt, die Lsg. filtriert u. Zn durch Na_2SO_3 gefällt u. calciniert. (F. P. 574663 vom 9/3. 1923, ausg. 17/12. 1924.) KAUSCH

Soc. d'Étude des Agglomérés, Paris, *Zirkoniumverbindungen*. Ein, gegebenenfalls bei 1200° calciniertes Zr-Erz wird mit einem Gemisch von NaOH u. Na_2O erhitzt, alsdann die M. auf eine glatte Fläche auffließen gelassen u. mit sd. W. zwecks Entfernung von Na_2SiO_3 behandelt. Das sich nicht lösende Silicat wird mit SO_2 -haltigem W. ausgewaschen; das Natriumzirkonat wird mit HCl aus den Rückstände herausgelöst; man erhält eine Lsg. von ZrOCl_2 . Der Rückstand, der nur noch ZrO_2 u. unverändertes Erz enthält, wird mit H_2SO_4 behandelt, um $\text{Zr}(\text{SO}_4)_2$ zu gewinnen. Die Lsg. des ZrOCl_2 wird mit Na_2S zwecks Fällung des Zr u. des Fe behandelt u. dann mit H_2SO_4 $\text{Zr}(\text{SO}_4)_2$ gebildet. Letzteres wird durch Glühen in ZrO_2 übergeführt. (E. P. 223572 vom 15/10. 1924, Auszug veröff. 17/12. 1924. Prior. 17/10. 1923.) KAUSCH

VI. Glas; Keramik; Zement; Baustoffe.

Fritz Schulz, *Die Bedeutung der Fluorverbindungen in Emails*. Angestellte Versuchsreihen ergaben, daß sich für die Praxis zum Zwecke der Trübung am besten die Versätze mit gleichzeitigen Bor- u. Fluorgehalt eignen. (Keram. Rdsch. 2. 621—62. 1924. Freital.) WECK

Werner Esch, *Zur Fluorfrage in der Emailindustrie*. Widerspruch gegen die Richtigstellungen VIELHABERS zu früheren Darlegungen des Vfs. (Keram. Rdsch. 2. 481; C. 1924. II. 2360) u. Richtigstellung zu dem Aufsatz von SCHULZ (s. vst. Ref.) (Keram. Rdsch. 32. 650—51. 1924. Hamburg.) WECK

P. Thor, *Pressen und Brennen von Trockenpreßziegeln*. Beschreibung des Vfs. bei dem besonders die Regulierung des Feuchtigkeitsgehaltes von Bedeutung ist. (Tonind.-Ztg. 48. 969—70. 1924. Bremen.) WECK

Richard Seydel, *Zur Ziegeltrockenfrage. Warum ist eine Trockenanlage neben dem Ofen einer solchen über dem Ofen vorzuziehen*. Aufzählung von elf Gründen für die Berechtigung der ebenerdigen Trockenanlagen. (Tonind.-Ztg. 48. 955—56. 1924.) WECK

Pierre de Groote, *Die Rekuperation in keramischen Ofenanlagen*. Anregung zum Einbau von Rekuperatoren in keram. Ofenanlagen zur besseren Ausnutzung der Abgaswärme nach dem Beispiel der von FAUGERON in Montereau erprobten Anlage. (Céramique 27. 321—24. 1924.) WECK

Albert Hauenschild, *Der Verbrennungsprozeß im Schachtofen bei eingepreßtem Brennstoff*. Dieser Prozeß wird durch eine Vergasung des C eingeleitet, das gleichzeitig mit dem dem Rohmehl entweichenden CO_2 zu CO reduziert, das, allmählich durch die Poren des Preßlings entweichend, an dessen Oberfläche verbrennt. Wird mehr als die dem CO_2 äquivalente Menge C eingepreßt, so treten Reduktionserscheinungen auf; diese treten auch dann auf, wenn der eingepreßte Brennstoff zu großstäubig

ir Erzielung eines raschen Ofenganges muß der Klinker möglichst porös
nt werden. (Zement 13. 495—99. 1924. Ulm.) WECKE.

Seydel, *Die Länge der Vorwärmzone und der Rauchglockenstand im Ring-*
Die Länge der Vorwärmzone wie auch die Anzahl u. der Stand der ge-
nen Glocken richten sich in erster Linie nach dem beabsichtigten Feuerfort-
ri u. danach, ob im Ofen geschmaucht wird oder nicht. (Tonind.-Ztg. 48.
85. 1924.) WECKE.

to Dormann, *Drehofen oder Drehrostofen*. Erwiderung an SCHOTT (Zement 13.
1924. II. 1972). Die Behauptungen SCHOTTS nähern sich im allgemeinen
fassung des Vf. (Zement 13. 499. 1924.) WECKE.

to Dormann, *Die Abhitzeverwertung am Drehofen*. Wenn die Verbrennungs-
indigkeit des Brennstoffes im Drehofen genügend erhöht wird — d. h. unter
ridung zu hoher Temp. in der Sinterzone — erübrigt es sich, die Abwärme
e außerhalb des Ofens liegende Einrichtungen nutzbar zu machen, deren Auf-
e sich nie reibungslos mit denen des Ofens vereinigen lassen. (Zement 13.
9. 1924. Stettin.) WECKE.

Grewe, *Über Brennöfen in der Kachelindustrie*. Abhandlung über die an
nfen u. Feuerungen für Kachelzeug zu stellenden Ansprüche. Im besonderen
der Rechteckofen besprochen, der, durch eine Mittelwand geteilt, in der
fi auf der Feuerungsseite als Glasurbrennraum u. in dem Teil am Abzugskanal
rühofen zu benutzen ist. (Keram. Rdsch. 32. 633—34. 1924.) WECKE.

alter Pohl, *Neues über Tunnelöfen in der feinkeramischen Industrie*. Zu-
nfassender Vortrag über die Entw. des Tunnelofens u. seine Betriebsweise
esonderer Berücksichtigung der Gasfeuerung. (Keram. Rdsch. 32. 624—26.
Tonind.-Ztg. 48. 971—73. 1924.) WECKE.

Lengersdorff, *Neues über Tunnelöfen in der feinkeramischen Industrie*.
stellungen zu den Ausführungen POHLS (s. vorst. Ref.) (Keram. Rdsch. 32.
7. 1924.) WECKE.

ngo Kühl, *Deutsche Mineralrohstoffe in der deutschen Glasindustrie*. Die
hsten im Gebiet des Deutschen Reiches vorkommenden Gesteine für die
industrie: Basalte, Bimsstein, Buntsandstein, Kieselgur, Granit, Feldspat, Feuer-
tone, Lava, Pegmatit, Quarz u. Phonolith werden kurz charakterisiert, unter
vis auf ihr V. angeführt. (Sprechsaal 57. 622—24. 1924. Berlin.) WECKE.

Vogel, *Beobachtungen über das Mischen von Gemengen in Glasfabriken*. Verss.
verschiedenen Sätzen, die nach verschiedener Art gemischt wurden, zeigen,
allgemeinen die Mischung von Hand sehr schlecht ausfällt; besonders ver-
de Kalk in Stückform eine gute Mischung. Die Maschinenmischung zeigte
essere Ergebnisse. (Sprechsaal 57. 624—26. 1924.) WECKE.

Barth, *Ist die Schmelzung eines reinweißen Glases in der Wanne möglich?*
ist nach, daß die Schmelzung reinweißen Glases in der Wanne ebenso gut
ist, wie im Hafenofer; der Erfolg hängt hauptsächlich von der Ver-
tag möglichst reiner eisenfreier Rohmaterialien ab. Doch müssen Wannen —
fenofen heiß geben u. sachgemäß bedient werden. (Keram. Rdsch. 32.
4. 1924. Hannover.) WECKE.

von Reiboldt, *Staubiges Glas und seine Entstehung*. Glas, das wie mit
al verunreinigt aussieht, auch gipsiges Glas genannt, ist auf verschiedene
edmäßigkeiten u. Unachtsamkeiten während der Schmelze zurückzuführen.
eissaal 57. 645—46. 1924. Coburg.) WECKE.

ustav Keppeler, *Überblick über die Haltbarkeit der Alkali-Kalk-Gläser*. Mit-
u einer Übersicht, die es ermöglicht, die Alkali-Kalk-Gläser mit einer gewissen
igkeit auf Grund ihrer Zus. in die hydrolyt. Klassen von MYLIUS einzureihen.
a 2 Tafeln. (Sprechsaal 57. 617—22. 1924. Hannover.) WECKE.

Gustav Keppeler, *Notiz zur Haltbarkeit von Bleigläsern*. Viele der praktisch erschmolzenen Bleigläser sind mit einiger Genauigkeit als Gemische der beiden Grenzgläser: PbOSiO_2 u. $\text{R}_2\text{O}_6\text{SiO}_2$ zu betrachten; die wechselnde doch meist reichende Resistenz spricht dafür, daß sie bei der von der Technik vollzogenen natürlichen Auswahl nicht allein ausschlaggebend sein konnte. (Sprechsaal 573—74. 1924. Hannover.)

H. Thiene, *Bemerkungen zu dem Artikel „Das Resistaglas als Werkstoff chemische Laboratoriumsgeräte“*. Bei der Herst. von Gläsern wie Resistaglas, usw. ist der Hauptwert auf die Erniedrigung des Ausdehnungskoeffizienten gesetzt worden, u. zwar geschah das auf Kosten der Widerstandsfähigkeit gegen Alkalien. (Sprechsaal 57. 627. 1924. Jena.)

M. Jacobi, *Der Einfluß von Alkalien, Säuren und Salzen auf die Plastizität von Kaolinen*. Alkali erhöht die Plastizität bis zu einem gewissen Grade, Ton u. Humus erhöhen sie durch Erhöhung des Kolloidgehaltes der Gesamtmasse. $\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$, H_3 u. NaCl vermindern die Plastizität wie auch die Trockenschwindungsfestigkeit. (Keram. Rdsch. 32. 634—36. 1924. Charlottenburg.)

R. Rieke, *Die Veränderungen des Porzellans während des Brennprozesses*. Von 2 verschiedenen Hartporzellanmassen wurden beim Brennen zuerst alle 100 Min. dann alle 50 Min. Proben entnommen u. an ihnen folgende Feststellungen gemacht: Brennfarbe, Glühverlust, Brennschwindung, Wasseraufnahmevermögen, Porosität, Mikrostruktur u. Oxydationsstufe des vorhandenen Fe. (Keram. Rdsch. 32. 679—80. 1924. Charlottenburg.)

Kurt Wetzel, *Über den Einfluß verschiedener Zusätze auf die physikalischen Eigenschaften des Porzellans*. Nach den Unterss. des Vf. sind die Eigenschaften der feinstmittelhaltigen Massen denen anderer Massen, die durch ihre Zusätze höhere Brenntemp. zulassen, fast durchweg unterlegen. TiO_2 - u. ZrO_2 -Zusätze wirkten nicht günstig, dagegen Al_2O_3 , wenn Schmelztemp. u. therm. Widerstandskraft gesteigert werden sollen; noch günstiger zeigte sich ein geringer ZnO -Zusatz. (Keram. Rdsch. 32. 653—54. 1924. Krefeld-Linn.)

Brunow, *Verrauchte Ware im Porzellanofen bei Wechsel der Brennstoffe*. Zur Vermeidung dieses Übelstandes ist die Eigenart der Brennstoffe hinsichtlich des Umstandes zu berücksichtigen, ob es sich um eine lang- oder kurzflammigeführende oder magere Kohle handelt; Heizwert u. Aschegehalt geben hier wichtige Fingerzeige. (Sprechsaal 57. 601—2. 1924. Saalfeld.)

Hans Hirsch, *Bindeton*. Beispiele von fetten, stark magerungsfähigen, feinsten u. Schilderung ihrer Eigenschaften, die dem praktischen Wert dieser Tonart die sichersten zahlenmäßig festzulegen gestatten. Aufweichbarkeit, Dehnung, Zugfestigkeit, Druckerweichung, kolloidaler Aufbau. (Tonind.-Ztg. 48. 115—124. 1924.)

—, *Über ein neues Vorkommen von rotem Engobeton im Spessart*. Bericht über die Untersuchungsergebnisse dieses Materials, in dem ein gut bildsamer Tonart mit Beschaffenheit mit nur geringen gröberen Einlagen vorliegt. (Keram. Rdsch. 32. 733—34. 1924.)

Heinecke, *Zur Frage der terra sigillata*. Entgegnung zu einer Kritik Stöckert über die Arbeit des Vf. „Altes u. Neues über die Technik der Terra sigillata“ (Vgl. Gewerbefleiß 102. 101; C. 1923. IV. 401.) (Keram. Rdsch. 32. 730. 1924.)

Stefan Reiner, I. *Über den Basenaustausch kristallisierter Zeolithe gegen neutrale Salzlösungen*. II. *Einfluß der Röntgenstrahlen auf den Basenaustausch kristallisierter Zeolithe*. Unters. der Umsetzung verschiedener Chabasit- u. Alkalichloridlsgg.; die Verss. bestätigen den Befund ZOCHS über den Einfluß von Temp. u. Konz. auf das Endgleichgewicht. Desmin, in dem Ca etwa zur Hälfte durch K ersetzt war, wurde mit AgNO_3 -Lsg. umgesetzt; die gewonnenen Krystalle

gl einen ausgeprägten Knickpunkt, der einem Molverhältnis $\text{CaO} : (\text{K}_2\text{O} + \text{Ag}_2\text{O})$: 2 etwa entspricht. Unter dem Einfluß von Röntgenstrahlen treten in Desmin Ionen auf, mit deren Lsgg. sonst kein Austausch stattfindet; bei Zimmertemp. das Endgleichgewicht bereits nach 30 Minuten erreicht. (Zement 13. 525—27. 1924. Horrem.)

WECKE.

Otto Gassner, *Mitteilungen über die französischen Tonerdezemente*. II. Erörterungen über Rohstoff-Frage, die *Bauxite*, die zu klassifizieren sind in rote u. graue u. graue u. rote SiO_2 -reiche Bauxite. (Zement 13. 591—94. 1924.) WECKE.

H. Burchartz und V. Rodt, *Einfluß von Zucker auf das Abbinden und Erhärten von Zement*. (Vgl. Zement 13. 11; C. 1924. I. 1852.) Weitere Unterss. der Einw. von Zucker. Die Alkalität des Lagerwassers der Probekörper wird bei zuckerhaltigen Zementen wesentlich u. dem Zuckergehalt proportional erhöht; die hiermit im Zusammenhang auftretende Raumzunahme der Körper deutet auf Quellungserscheinungen. Die Wrkg. der Zuckerarten hat das Gepräge eines stark wirkenden negativen Katalysators, der die kolloidale Erhärtung in den Vordergrund rückt. (Zement 13. 106—11. 1924. Berlin-Dahlem.)

WECKE.

W. Petry, *Notwendigkeit und Zweckmäßigkeit der Verwendung hochwertiger Zemente mit besonderer Berücksichtigung des Schmelzzementes*. Schmelzzement kommt wegen des hohen Preises für normale Bauten nicht in Frage. Für deutsche hochwertige Zemente sind die Gehlerschen Vorschläge zu berücksichtigen. Vf. schildert aus der Anwendung hochwertigen Zements sich ergebenden Vorteile. (Zement 13. 95—98. 1924.)

WECKE.

Ernst Natho — Paul Hänsel — Adolf Spengel, *Schmelzzement und hochwertiger Portlandzement*. Diskussion über die Auswertung dieser Zemente u. über Verwertung von Al-Nitrid-Abfällen zur Herst. von Schmelzzement. (Tonind.-Ztg. 3. 1085—87. 1924.)

WECKE.

Adolf Spengel, *Gütevermindernde Portland-Zementlagerung. Klinkermahlung an der Baustelle*. In trocknen Säcken gelagerter Zement verliert innerhalb 2 Jahren an seiner ursprünglichen Festigkeit. Klinker kann billiger verladen werden als Zement; u. a. ist es wirtschaftlich, den Klinker an der Verbrauchsstelle, z. B. Kanalanlagen zu vermahlen. (Tonind.-Ztg. 48. 1157—58. 1924.)

WECKE.

F. Hart, *Wird Portland-Zement-Klinker durch Mahlen in Körner verschiedener Zusammensetzung zerlegt?* Unterss. an mit den Sieben 900, 2000, 5000 u. 10000 Maschen/qcm gewonnenen 5 Fraktionen eines Zements zeigten entgegen den Erwartungen NACKENS eine gute befriedigende Übereinstimmung. Mit steigender Kornfeinheit nimmt der Gehalt an Gips u. Glühverlust zu. (Zement 13. 605—6. 1924. Karlshorst.)

WECKE.

Haegermann, *Über den gegenwärtigen Stand der hochwertigen Portlandzemente in Deutschland*. Wiedergabe der an 14 deutschen hochwertigen Zementen gefundenen Prüfungsergebnisse, durch die erwiesen wird, daß die deutsche Zementindustrie sich in kurzer Zeit auf die Herst. dieser Zemente umstellen konnte. — Mitteilung über Unterss. an dem hochwertigen Zement „Bauxitland“; dieser hat mit Portlandzement oder Schmelzzement nichts zu tun. (Zement 13. 555—57. 1924. Karlshorst.)

WECKE.

Haegermann, *Deutsche und österreichische hochwertige Portlandzemente*. Vergleichende Prüfungen ergaben, daß die deutschen hochwertigen Portlandzemente mit österreichischen vollkommen gleichwertig sind. (Zement 13. 574—75. 1924.) WE.

Hans Kühn, *Was ist Alit?* Widerlegung der Ansicht DYCKERHOFFS, das Alit in Portlandzementklinkern sei Bicalciumsilicat (S. 152). Die Feststellung, daß die Konstanten des Bicalciumsilicates denen des Alits nahe kommen, genügt nicht als Beweis. (Zement 13. 512—13. 1924. Berlin-Lichterfelde.)

WECKE.

R. Nacken und **W. Dyckerhoff**, *Über den Verlauf der Mineralbildung im Erhitzen von Gemengen aus Kalk, Kieselsäure und Tonerde*. Krit. Betrachtung der Ausführungen KÜHLs (s. vorst. Ref.). Eine Erforschung des Klinkers mit ausschließlich chem. Methoden ist nicht möglich. (Zement 13. 626—27. 649—51. 1924. Frankfurt a. M.) WECH.

Oskar Schmidt, *Was ist Alit?* Die Ansicht DYCKERHOFFs (S. 152) ist haltbar. Alit kann nicht als *Dicalciumsilicat* bestehen. Nach des Vf. Ansicht Alit eine Doppelverb. von *Tricalciumsilicat* u. einem *Calciumaluminat*. (Zement 13. 543—44. 1924. Stuttgart.) WECH.

Oskar Schmidt, *Romanzement*. Geschichtliches, Brennen, Mahlen, Eigenschaften. (Tonind.-Ztg. 48. 967—69. 1924.) WECH.

Ernst Natho, *Kohlenaschenzemente*. Kritik einer Arbeit von LUFTSCHEIDT (Tonind.-Ztg. 48. 485; C. 1924. II. 528). (Tonind.-Ztg. 48. 1059—61. 1924.) WECH.

E. Gerold, *Über Zementkitten an Porzellanisolatoren*. Die Wärmeausdehnung von Zementkitten. Elastische Eigenschaften dieser. Ihre Quellung durch Wasseraufnahme u. ihre Schwindung. Die Ursache der zur Zerstörung von Isolatoren führenden Volumenvermehrung der Zementkitten. Der *Permanit-Zement* der Porzellanfabrik PH. ROSENTHAL u. Co., ein Portlandzement, dem zur Herabsetzung der Wärmeausdehnungskoeffizienten ein Magerungsmittel zugesetzt wird so, daß der Ausdehnungskoeffizient des Kittes gleich dem des Porzellans ist; ferner ist der Schmelzkörper eingeschmolzen. Die Bewährung dieses Fabrikats ist noch zu erwarten. (Keram. Rdsch. 32. 675—78. 1924. Zement 13. 558—59. 571—73. Hamburg, Thür.) WECH.

H. Kreüger und **Axel Eriksson**, *Untersuchung über das Verhältnis zwischen der Druckfestigkeit von Zement bei normengemäßer Prüfung und der Druckfestigkeit von Beton*. Zur Beantwortung der Frage, ob es angebracht ist ein oder mehrere Zementsorten herauszubringen, die qualitativ besser sind als der derzeitige Normzement, wurden Verss. darüber angestellt, in welchem Maße die Druckfestigkeit bei mit verschiedenen Zementsorten hergestelltem Beton sich bei verschiedenen Zementqualitäten ändert. Festgestellt wurde, daß die Betonfestigkeit proportional ist zur Zementfestigkeit zur Potenz 0,9 erhoben. Hieraus ergibt sich ohne weiteres der Vorteil einer höheren Zementklasse. (Zement 13. 589—91. 606—08. 625—26. 646—49. 1924. Stockholm.) WECH.

W. Soherr, *Feuerfeste Baustoffe für Feuerungen und Koksöfen*. Das Dreioxydsystem $\text{CaO} - \text{SiO}_2 - \text{Al}_2\text{O}_3$ gibt Aufschluß über das Wesen der meisten ff. Baustoffe. Bei den Silicasteinen läßt der Dünnschliff die einzelnen Umwandlungsformen von SiO_2 , Quarz, Tridymit u. Cristoballit u. dadurch die Güte des Steines erkennen. Bei den tongebundenen Steinen hängt der F. in hohem Maße von chem. Zus. ab. Es werden Anhaltspunkte für die Prüfung der Baustoffe gegeben. (Glückauf 60. 1055—63. 1924.) WECH.

Otto Gassner, *Chlorkalkkammern aus Beton*. Unterss. der Einw. von Calciumchlorid auf Beton ergaben: Kein Beton aus handelsüblichem Zement kann auf die Dauer dem CaCl_2 widerstehen; der Chemismus der Zerstörung dürfte in der B. des Friedelschen Salzes, $3\text{CaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{CaCl}_2 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$ bestehen, ihr Mechanismus im Treiben der Krystallisationsdruck dieses Salzes u. in Entziehung von CaO . Optimale Widerstandsfähigkeit sind gegeben durch Dichtigkeit, Wassererhärtung, Erzeugnis Traßzugabe (bei Wassererhärtung), reichliche CO_2 -Aufnahme vor Beginn der Einw. (Zement 13. 632—34. 652—54. 684—89. 1924.) WECH.

Paul Hannover, *Der Moler und seine Anwendungen*. Die Eigenschaften des Molers u. seine Verwendung zur Herst. von Kalksand-, porösen- u. Lochtafeln sowie als Zuschlag zu hydraul. Mörtel. (Chimie et Industrie 12. 807—15. 1924. Kopenhagen.) WECH.

h. Schnell, *Zur Bewertung und Verwendung des Trasses*. Vf. hält das chem. Härteverf., durch das die Erhärtungsfähigkeit des Trasses, seine Widerstandsfähigkeit gegen chem. Einflüsse u. sein Dichtungsvermögen voll erfaßt wird, im Zusammenhang mit der Best. der 28-Tagesfestigkeit mörteltechnisch für vollkommen einend. (Tonind.-Ztg. **48**. 1057—58. 1072—73. 1103—4. 1924. München.) **WE.**

Deyerlein, *Hochfeuerfeste Körper aus Zirkonoxyd*. Bericht über die beiden Verf. zur Herst. von ff. Körpern aus ZrO_2 . (Tonind.-Ztg. **48**. 1036. 1924.)

WECKE.

Freytmuth, *Über die Herstellung künstlicher Zähne*. Zusammenfassender Bericht über den Werdegang dieser an Hand von 18 Bildern. (Keram. Rdsch. **32**. 10. 1924. Radeberg-Dresden.)

WECKE.

elix Linke, *Zu den Anfragen über Temperaturmessungen in der Glasindustrie der Keramik*. Ergänzungen zu früheren Ausführungen des Vf. (Keram. Rdsch. **32**. 408; C. **1924**. II. 1972). (Keram. Rdsch. **32**. 732—33. 1924.) **WECKE.**

Steger, *Untersuchungen zur Erkenntnis der Ursachen übermäßigen Kapselung*. Gute Kapselmasse soll weder Quarz noch Cristoballit in freier Form enthalten. Die zu deren Lsg. eingeführten Stoffe dürfen nicht die Zähigkeit der Grundmasse der Kapseln herabsetzen. Bei Verwendung von quarzhaltigen Massen ohne Zumischung von Rohkaolin sind Tone mit sehr feinem Sand auszuwählen, wo es die Wirtschaftlichkeit gestattet, ist der freie Quarz durch andere Stoffe zu ersetzen. (Keram. Rdsch. **32**. 651—53. 1924.)

WECKE.

ans Kohl, *Untersuchungsmethoden zur keramischen Bewertung von Feldspaten und Legmatiten*. Die chemische Gesamtanalyse. Die rationelle Analyse. (Sprechz. **17**. 349—51. 1924. Meiningen.)

WECKE.

phons Schoblik, *Die mikroskopische Erkennung von Schwefeleinwirkungen in eingutglasuren*. Die Beobachtung verzerter Blasen im Dünnschliff läßt auf den Einfluß schließen. Blasen müssen auch stets vorhanden sein, wenn nicht die Glasur schon vollständig eingetrocknet ist oder die Einw. erst ganz gegen Ende des Brandes stattgefunden hat. Die Stärke der S-Einw. bei krätzigen Glasuren ist an der Größe der Gitterbildung u. an der Menge der Ausscheidungen u. Gasbläschen zu erkennen. (Keram. Rdsch. **32**. 663—64. 1924.)

WECKE.

les Dautrebande, *Über die chemische Zusammensetzung, die Eigenschaften von Zementen und deren Untersuchung*. Über die verschiedenen Raumbeständigkeitsbestimmungen, die die Festigkeit bestimmenden Faktoren u. die Best. der anderen mechanischen Eigenschaften. (Rev. chimie ind. **33**. 158—60. 188—90. 1924.) **WECKE.**

bert Heiser, *Die Bestimmung des Gehaltes an Eisenoxyd in Kalksteinen, Tonen, Rohmehlen und Zementen*. Die Substanz wird in konz. H_2SO_4 aufgeschlossen, danach W., wieder H_2SO_4 u. Zn zugesetzt, der Kolben mit dem Gockelschen Aufsatz verschlossen, der im Gegensatz zum Bunsenventil gegen den Druckausgleich gestattet. Nach der Reduktion werden die Zn-Reste durch Filtrieren durch Glaswolle entfernt; der Aufnahmekolben ist zuvor mit CO_2 gesättigt oder mit $NaHCO_3$ versehen. Filtriert wird mit K_2MnO_4 -Lsg. (Zement **13**. 4. 1924.)

WECKE.

org Hofbauer, *Ein Apparat zur Bestimmung der Wärmeleitfähigkeit von Baustoffen*. Beschreibung des vom Vf. konstruierten App., der eine Modifikation der von **CHRISTIANSEN** gegebenen Anordnung zur Ermittlung der Wärmeleitfähigkeit leitender fester u. fl. Körper darstellt. Das Verf. besteht im wesentlichen darin, einen möglichst gleichmäßigen stationären Wärmestrom durch eine Vermeidungsplatte u. die Prüfplatte hindurchzuschicken. (Mitteil. Staatl. Techn. Ver. **13**. 64—69. 1924. Wien.)

WECKE.

J. Langbein, Hamburg, *Schutz- und Schmucküberzüge für Kunststeine Kaltglasuren*. Die Unterlagen werden mit der Lsg. eines synthet. Harzes, vorzugsweise eines Phenolformaldehydharzes, bestrichen u. auf diese Schicht Brei aus Farb-, Woll- oder Glaspulver aufgestäubt oder -gesprüht. Zwecks Herst. glänzender Überzüge wird der Lsg. des synthet. Harzes Casein u. Lack, zwecks Erzeugung matter Flächen natürliches Harz, Leinöl, Paraffinöl o. dgl. zugefügt. Um gold aufzubringen, läßt man die Kunstharzschicht trocknen, befestigt das Blatt mittels einer Lsg. desselben Harzes u. erhitzt. (E. P. 223461 vom 29/1. 1924, ausg. 13/11. 1924.) KÜHLIG

General Electric Co., London, und **Patent Treuhand-Ges. für Elektroglühlampen**, Berlin, *Glas- und Emailsätze*, bestehend aus 1 Teil PbO, 0,45–0,5 Teilen B₂O₃, 0,0–0,2 Teilen SiO₂, 0,04–0,2 Teilen Al₂O₃, 0,04–0,07 Teilen Na₂O, 0,01–0,02 Teilen K₂O, 0,0–0,01 Teilen As₂O₃ u. 0,0–0,04 Teilen Co₂O₃, wobei eines anderen färbenden oder trübenden Mittels. Die Mischungen schmelzen bei 360 u. 400°. Sie dienen zum Einschmelzen von Glühlampenteilen, zum Verkleben von Metall, Glas, Porzellan u. dgl. Zwecks Emaillierung werden die zu überziehenden Stoffe hoch erhitzt u. in die gepulverte M. getaucht. (E. P. 223837 vom 6/12. 1924, ausg. 17/12. 1924. Prior. 24/1. 1924.) KÜHLIG

Friedrich Kleinmann, Deutschland, *Zerlegung tonerdehaltiger Stoffe*. Ton u. o. dgl. werden in feuchtem Zustande möglichst fein zerteilt u. dann mit Ätzalkali bei etwa 135° behandelt. (F. P. 575790 vom 12/1. 1924, ausg. 6/8. 1924. D. r. P. 575790 vom 13/1. 1923.) KAUFMANN

Oscar Nickel, Mülheim, Ruhr, und **Reinhold Markwitz**, Duisburg, *Herstellung von Zementen*. (D. R. P. 407039 Kl. 80b vom 28/1. 1922, ausg. 3/12. 1924. — C. 1923. IV. 408.) KÜHLIG

Kaiser-Wilhelm-Institut für Eisenforschung, Düsseldorf, und **W. Hessel**, Essen, Ruhr, *Herstellung von Steinzeugen aus Kesselschlacken, Müllschlacken, Aschen*. (D. R. P. 407154 Kl. 80b vom 26/6. 1923, ausg. 6/12. 1924. — C. 1923. II. 1845.) KÜHLIG

R. Caccia, Windhoek, Südwest-Afrika, *Bindemittel*. Zu aus CaO u. Salzen bestehenden Bindemitteln wird eine kleine Menge verd. H₂SO₄, welche die Zusammensetzung der Menge an CaO gestattet, sowie Teer gegeben, der die Hygroskopizität der M. verringert. (E. P. 222923 vom 3/7. 1923, ausg. 6/11. 1924.) KÜHLIG

Soc. d'Étude des Agglomérés, Paris, *Feuerfeste Massen aus zirkonhaltigen Erzen*. Die Erze werden im elektr. Ofen auf sehr hohe Temp. erhitzt, mit H₂SO₄ enthaltendem W. behandelt, gemahlen, unter Zusatz von Dextrin oder Leim u. H₃BO₃, H₃PO₄ oder einem geeigneten Salz geformt, getrocknet u. gebrannt. (E. P. 223573 vom 15/10. 1924, Auszug veröff. 17/12. 1924. Prior. 17/10. 1923. K. 1923. 1710.) KÜHLIG

Charles E. Kraus, Brooklyn, New York, *Plastische Masse*. Bentonit- oder ähnliche Stoffe werden mit C-haltigen Stoffen u. Kieselgur oder dgl. vermischt so hoch erhitzt, daß die C-haltigen Stoffe, wie Sägemehl, verkohlet. Man erhält eine poröse M., die als Wärmeisoliermittel dient. (A. P. 1509478 vom 21/1. 1924, ausg. 23/9. 1924.) FRIZ

VII. Agrikulturchemie; Düngemittel; Boden.

Julius Stoklasa, *Über den Ursprung des Salpeters in Chile*. Erwiderung auf von FEILITZEN u. EGNÉR (Chem.-Ztg. 48. 325; C. 1924. II. 532). Neuere Untersuchungen mit *Peukara*, *Strupel* u. *Vrbenký*, über die Radioaktivität der Luft am Beispiel u. ihr Zusammenhang mit der Vegetation beweisen, daß die Radioaktivität ein einflußreicher Faktor für den N-Haushalt in der Ackerkrume ist. *J* ist für die Zuckerrübe ein wichtiges biogenes Element. (Chem.-Ztg. 48. 949–50. 1924. J. 1924. 949.)

T. Auten, *Organischer Phosphor der Bodenarten*. Die Verss. des Vfs. über die Natur des in Böden vorhandenen organ. P sprechen zugunsten chem. Bindung, nicht bloßer Adsorption. Da Nucleine, Lecithin u. Phytin im Boden verhältnismäßig rasch hydrolysiert werden, dürfte der organ. P kaum in größerer Menge im Boden dieser Verbb. vorhanden sein, ebensowenig in Pyrimidinnucleotiden. Die Verbb. solchen Verbb. hydrolyt. abgespaltene Phosphorsäure bildet vielmehr ein Calciumsalz eines amphoterer humusartigen Komplexes, wobei Vf. die B. der Humus-Verbb. an Pflanzen über Oxymethylfurfural aus Cellulose zu erklären sucht. Je älter diese Pflanzen werden, desto unzugänglicher für die Pflanzen wird der in ihnen enthaltene P. (Soil science 16. 281—94. 1923. Jowa Agric. exp. stat.; Ber. ges. bot. u. zool. 28. 68. 1924. Ref. WALTER.) SPIEGEL.

Leoncini und F. A. Rogai, *Untersuchungen über die Einwirkung von Ammoniumsulfat auf die Mineralisierung des Stickstoffs einiger Proteinkörper im Erdboden*. Die Verss. wurden mit Eiweiß u. Trockenblut als N-Quelle in Ton-, bzw. Sandböden ausgeführt. $MnSO_4$ wirkte in keinem Falle fördernd auf die N-Mineralisierung, aber auch nicht hindernd. (Staz. sperim. agrar. ital. 57. 282—95. 1924. Pisa.) GRIMME.

Carole Cerasoli, *Kupfersulfat im Hinblick auf die Landwirtschaft*. Bericht über die Verwendung von $CuSO_4$ als Pflanzenschutzmittel. (Giorn. di Chim. ind. appl. 6. 536—37. 1924. Arpino.) GRIMME.

Riehm, *Zur Frage der Getreidebeizung*. Da Amerika nicht über die zur Beizung von Weizen gegen Stinkbrand notwendigen Mengen Kupfercarbonat verfügt, u. diese Frage daher von Interesse für die deutsche Industrie ist, erörtert Vf. die Anforderungen, die an das Prod. gestellt wurden u. die bei der Einführung zu beachtenden Gesichtspunkte. Vf. bespricht die bisher mit Trockenbeizen gemachten Erfahrungen. (Ztzchr. f. angew. Ch. 38. 5—6. Berlin-Dahlem.) JUNG.

Aktien-Gesellschaft für Stickstoffdünger, Köln a. Rh., *Darstellung streukundiger und lagerbeständigen Kalkstickstoffs*. (D. R. P. 406852 Kl. 16 vom 13/9. 1921, ausg. 28/11. 1924. — C. 1922. II. 324.) KÜHLING.

Josef Plattner, Brückl (Kärnten), und **Bosnische Elektrizitäts-Aktiengesellschaft**, Wien, *Herstellung eines Pflanzenschutzmittels*, dad. gek., daß eine wässrige Lsg. mit der theoret. berechneten oder größeren Menge besonders fein verpulvert in W. aufgeschlämmten $CaCO_3$ zu *Kupferoxychlorid*, etwa von der Zus. $2CuH_2 \cdot CuCl_2$, umgesetzt wird. — Das Mittel wird entweder in wss. Suspension gesprüht oder als staubfeines, grünes Pulver, mit oder ohne Zusatz von S u. anderen Verdünnungsmitteln, wie Kaolin, Talk, Gips, $CaCO_3$, trocken verstäubt. (D. R. P. 93940 vom 28/1. 1921, ausg. 10/8. 1923.) SCHOTTLÄNDER.

I. du Pont de Nemours & Company, übert. von: **Max Engelmann**, Wilmington, Delaware, V. St. A., *Saatgutbeizen*, bestehend aus wss. Lsgg. von *mercurierten Säureamiden*, *mercurierten Säureimiden* oder *mercurierten Aminosäuren*, gleichmäßig unter Zusatz bas. Stoffe, wie Ätzalkalien oder Alkalicarbonaten. — *mercurierte* Hg-Verbb. sind z. B. *Hg-Acetamid*, *Hg-Oleylamid*, *Hg-Benzamid* der allg. Formel: $(R \cdot CO \cdot NH)_2Hg$, ferner *Succinimid-Hg* u. *Phthalimid-Hg* der Zus. $(O \cdot C \cdot NH)_2Hg$, oder *Mercuriaminoessigsäure* u. *Mercuriaminobuttersäure* der Zus. $(O \cdot C \cdot NH \cdot CO_2H)_2$. Man taucht z. B. das Saatgut in eine wss. 2%ig. *Hg-Acetamid*-Lsg., in der noch 0,1% NaOH zugesetzt sind, während 1—3 Stdn. bei 15° u. schüttelt, worauf das Saatgut zur gleichmäßigen Durchfeuchtung sorgfältig durch. (A. P. 1485021 vom 11/1. 1921, ausg. 26/2. 1924.) SCHOTTLÄNDER.

Royal Norton Chapman, St. Paul, Minnesota, V. St. A., *Räuchermittel*, bestehend aus gleichen Teilen *Trichlornitromethan* (*Chlorpikrin*) u. *Tetrachlorkohlenstoff*.

— Das die stark tox. Wrkg. des $\text{C}(\text{Cl})_3\text{NO}_2$ u. die leicht flüchtigen Eigensch. des CCl_4 aufweisende Mittel findet insbesondere zur Bekämpfung des *schwarzen Kornwurms*, *Calendra granaria*, Verwendung. (A. P. 1502174 vom 15/12. 1922, ausg. 22/7. 1924.)

SCHOTTLÄND.

Robert W. Prittie, Toronto, Ontario, Canada; *Rattenvertilgungsmittel*. Ein Gemisch aus P, CS_2 , W., Mehl, Glucose, Glycerin, Brechweinstein, Anis-Caramel wird zu einer Paste verarbeitet. — Anisöl u. Caramel dienen als Rattenvertilgungsmittel. Die Latwerge wirkt schnell tödlich auf die Ratten u. mumifiziert die Cadaver, so daß sich keine üblen Gerüche entwickeln können. Infolge des Brechweinsteingehaltes der Paste werden Hunde u. Katzen, die zufällig von ihr gefressen werden, nicht vergiftet, da das Mittel von ihnen sofort ausgebrochen wird. (A. P. 1502174 vom 30/12. 1920, ausg. 2/9. 1924.)

SCHOTTLÄND.

Samuel Wilson, Brooklyn, New York, V. St. A., *Fungicides und insektizide Mittel*, bestehend aus Nicotinsulfat, $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ u. Saponin, gegebenenfalls unter Zusatz von Pariser Grün oder CuSO_4 , einerseits, u. NaHCO_3 , Harzseife u. Nicotinsulfat andererseits. — An Stelle von Harzseife kann auch Fischölseife verwendet werden. Man löst die beiden Bestandteile für sich in W. u. vermischt die Lsgg. unmittelbar vor dem Gebrauch u. in der Nähe der mit dem Mittel zu behandelnden Pflanzenteile. Beim Aufbringen des Gemisches auf die Pflanzen entsteht ein gut haftender Schaum, der starke insektizide u. fungicide Wrkg. ausübt. (A. P. 1501427 vom 21/9. 1922, ausg. 15/7. 1924.)

SCHOTTLÄND.

J. Schnarr & Co., Orlando, Florida, übert. von: **Henry E. Kalusovsk**, Washington, Columbia, *Fungicides und insektizides Mittel*. Man löst Cu-Ole in einem Gemisch aus Ölsäure, Harzöl, Kresol u. Paraffinöl, gibt zu dem Gemisch eine wss. Karayagummilsg. u. wss. NaOH. — Es wird so eine beständige, auch mit ihr bespritzten Pflanzenteilen gut haftende Emulsion erhalten. (A. P. 148011 vom 14/4. 1921, ausg. 15/1. 1924.)

SCHOTTLÄND.

James A. Ullman, White Plains, New York, V. St. A., *Insektenvertilgungsmittel*. Man vermischt eine weiche K-Seife aus Cocosnußöl mit Pyridin u. V. Das gallertartige Prod. liefert mit W. verd. feine Dispersionen, die als Spritz- u. Waschmittel Verwendung finden. Zur Verbesserung des Geruchs kann man die Gallerte Nitrobenzol zusetzen. Ein Zusatz von W. ist dann nicht erforderlich. (A. P. 1507637 vom 25/3. 1922, ausg. 9/9. 1924.)

SCHOTTLÄND.

VIII. Metallurgie; Metallographie; Metallverarbeitung.

Harry Hyman, *Alte Schriftsteller über Metallurgie* II.—IV. Mitt. II. Bb. III. *Sturtevant* IV. *Dudley*. (I. vgl. S. 429.) **ALBARO ALONZO BARBA** von der berühmten Potosi Grube in Bolivia hat im Jahre 1640 zu Madrid das Buch „El arte de los Metales“ veröffentlicht, in dem er als erster eingehend alle in Bolivien zur Ag-Gewinnung angewandten Verff. beschrieb. Trotzdem das Buch geheim gehalten wurde erschien 1669 eine engl. Übersetzung. — **SIMON STURTEVANT** veröffentlichte ein Buch betitelt: „Metallica or The Treatise of Metallica. Bifurcating comprehending the Doctrine of diverse new Metallical Inventions, but especially how to neale, melt, and worke all kind of mettles, oares, Irons and Steeles with the coale, Pit-coale, Earth-coale and Brush-fewel. 1612.“ Es ist eine Besprechung der Erfindungen u. in Frage- u. Antwortspiel geschrieben. Es ist das erste Buch über die Benutzung von Kohle zur Fe-Herst. — In **DUDLEY** Buch: „Dud Dudley Metallum Martis: or Iron made with Pitcoale, Sea scole, etc.: and with the use of Fuell to Melt and Fine Imperfect Metals, and Refine perfect Metals.“ London 1665 wird die erste prakt. Beschreibung der Fe-Herst. mittels Kohle gegeben. **DUDLEY** wurde 1599 in der Nähe von Birmingham als der 4. Sohn von **EDWARD LORD DUDLEY** geboren u. trat mit 20 Jahren in des Vaters Eisenwerken ein.

richtete dann mit wechselndem Erfolg in den verschiedenen Gegenden Eng-
land mit Kohle gefeuerte Öfen. 1684 starb er. (Metal Ind [London] 25. 449.
184. 1924.)

WILKE.

Carl R. Davis, J. L. Willey und S. E. T. Ewing, *Neuere Entwicklungen im
Schmelzen und Aufbereiten von Witwatersrandserzen*. (Trans. Amer. Inst. Mining
Metallurg. Eng. 1924. Nr. 1386. 22 Seiten. Johannesburg, Transvaal.) BEHRLE.

M. Chance, *Herstellung von hochwertigem Hochofenkoks*. (Mining and Metallurgy
4—45. 1924. — C. 1924. II. 1038.)

WILKE.

Bogitch, *Schwefelung und Entschwefelung von Metallen durch basische
Salzen und Flußmittel*. (Rev. de Métallurgie 21. 682—85. 1924. — C. 1924. II.
1019.)

WILKE.

Marks, *Gußeisen mit hoher Zugfestigkeit*. Eine kurze Zusammenstellung der
Eigenschaften des Halbstahtes u. des Perlitgußeisens in England. (Metal Ind [London]
7—78. 1924.)

WILKE.

Zschokke, *Vom Damaszener Stahl und den Damaszener Klingen*. (Über-
setzung von Louis Descroix.) Die techn. Eigenschaften des alten Stahtes wurden
vergl. u. mit den entsprechenden Produkten der modernen Waffenindustrie ver-
glichen, wobei sich herausstellte, daß die modernen Erzeugnisse den alten über-
legen sind. Dabei betont Vf., daß er nur eine beschränkte Zahl Stähle zur Ver-
fügung hatte, die ausnahmsweise stark P-haltig waren, und es durchaus möglich
ist, daß bedeutend bessere Erzeugnisse existieren; um so mehr als die von SCHWARTZ
analysierten indischen Erzeugnisse sich durch seltene Reinheit auszeichnen. Wegen
der zahlreichen interessanten Einzelheiten muß aufs Original verwiesen werden.
(Métallurgie 21. 639—69. 1924.)

WILKE.

H. Bassett, *Ambrac Metall*. Die ungefähre Zus. ist 75% Cu, 20% Ni u.
5% Zn dient zum Desoxydieren, erhöht die Bearbeitbarkeit der Legierung u. ihren
Oxidationswiderstand. Es ist heutzutage in allen möglichen Formen verarbeitet
worden. Im folgenden einige physikal. Eigenschaften des Ambrac Metalles:
Dichte: 3,5 kg/qcm Zugfestigkeit, 1,7 kg/qcm Streckgrenze, Dehnung in 5,1 cm
Zugst. 0,30. Dieselben Werte sind für leicht gewalztes Material: 4,2 kg/qcm,
Dichte, 0,20 u. für stark gewalztes: 5,9 kg/qcm Festigkeit. Beim Salzwasser-
versuch erwies sich das Metall als sehr gut, ebenfalls ist es hoch-
oxidationsbeständig gegen H₂SO₄. Auch sonstige Medien greifen Ambrac-Metall
nicht an, so daß es für viele Zwecke geeignet ist, um so mehr als die Ver-
arbeitung keine Schwierigkeit macht. (Mining and Metallurgy 5. 440—41. 1924.) Wi.
L. Leone, *Die Herstellung von Manganbronzegußstücken*. III. u. IV. Mitt. III. Ein
Ruderrahmen. IV. Kegelförmige Kappen für Marinepropeller. I. (II. vgl. S. 436.)
Erbildung der Schwierigkeiten bei der Herst. von besonderen Gußstücken. (Metal
Ind [London] 25. 497—98. 541—43. 1924.)

WILKE.

Sauerwald, W. Schultze und G. Jackwirth, *Zur Kritik der metallogra-
phischen Heißätzung*. Vff. zeigen, daß ein Glühen von Metallschliffen im Vakuum
die Korngrenzen deutlich hervortreten läßt. Aus diesem Grund braucht bei der
Heißätzung durch geschmolzene Salze oder Gase das Auftreten einer sichtbaren
Schicht nicht durch eine chem. Rk. bedingt zu sein, sondern es können schon
Oxidationserscheinungen allein die Ursachen davon sein. Verss. an Stählen
zeigten, daß die Struktur von bei höherer Temp. beständigen Phasen durch die
Heißätzung nur dann zu ermitteln ist, wenn eutektoide Konz. vorliegen. Da-
her kann die Korngrenzenstruktur von härtbaren Legierungen bei höherer
Temp. nach dem Abschrecken bestimmt werden. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 140.
1924.)

BECKER.

Sauerwald und G. Jackwirth, *Über die Natur des martensitischen Gefüge-
zustandes*. (Vgl. vorst. Ref.) Mit Hilfe der Schlißglühung u. Heißätzung mit neutralen

Salzen u. darauffolgender Abschreckung stellen die Vff. fest, daß die mit normaler Ätzung hervorgerufene Martensitstruktur stets nach dem ursprünglichen γ -Korn orientiert ist. Ferner treten auf dem nicht weiter behandelten Schliff Gleitlinien u. Verwerfungserscheinungen auf, welche ebenfalls nach dem ursprünglichen γ -Korn geordnet sind. Vff. schließen daraus, daß die Summierung von submikroskopischen Kräftepaaren beim Auftreten des fein verteilten Systems „Martensit“ in Betracht erfolgt, deren Orientierung durch das ursprüngliche γ -Korn gegeben ist. Es muß daher die mechan. Bedingungen dieses fein verteilten Systems bereits weitgehend als Ursache für die Nadelstruktur des martensit. Gefüges angesehen werden. Wahrscheinlich übersteigt die hierbei ausgelöste Kraftwirkg. die Größenordnung makroskop. Kräftepaare, wie dies von den Vff. durch Abschreckungsverss. u. Ätznach Deformation an reinem Fe u. Cu festgestellt wurde. Da bei Fe im Gegs. zu Cu im Innern von deformierten Stücken Gleitebenen durch normale Ätzung nicht sichtbar gemacht werden können, ist die Möglichkeit gegeben, daß die Gebiete des verschiedenen Spannungszustandes im Martensit mit Gebieten von Konzentrationsunterschieden ident. sein könnte. Jedoch sind zu einer allgemeinen Annahme von Konzentrationsverschiedenheiten in den Martensitnadeln noch experimentelle Beweise nötig. Verwerfungserscheinungen sind keine besondere Eigenschaft von Fe-C-Legierungen. Sie treten auch bei Fe-Ni-Legierungen, u. w. auch schon bei langsamer Abkühlung auf. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 143, 3 bis 398. 1924. Breslau, Techn. Hochsch.) BECKER

Georg Kutscher, *Das Metallspritzverfahren und seine Verwendung in der Industrie*. In zahlreichen Abbildungen werden neuere Anwendungsgebiete des Metallspritzverf. nach SCHOOP gezeigt. (Apparatebau 36. 261—63. 273—77. 1924. Spandau.) NOLTE

A. R. Page, *Das Verbinden eiserner Metalle mittels Nichteisenlegierungen*. 3 Methoden sind im Gebrauch: Hartlöten mit üblichem Gebläse u. mittels Elektrotauchen, Hydreschweißen u. Weichlöten. Nur die beiden ersten Arten sind untersucht worden. Das Hartlöten durch Eintauchen gab festere Bindung als mittels Gebläse, u. dieses war wiederum besser als Hydreschweißen. Die Verbitung beim Löten scheint ein einfaches Zusammenhaften zu sein, denn es konnte eine oberflächliche Legierung zwischen dem Stahl u. dem Lot festgestellt werden. Im Gegensatz hierzu konnte beim Hydreschweißen eine einwandfreie Legierung zwischen Fe u. Fe nachgewiesen werden. Es gibt keine zufriedenstellende Methode, die die schlechten Wrkgg. des Lötens von Stahlstücken aufhebt. Es müßte ein Legierungsmittel gefunden werden, das einen beträchtlich niederen F. als die übliche 50 : 50 (Zinn-Flussmittel) hat, so daß die Lötung bei 600° ausgeführt werden könnte u. die Nachteile dementsprechend nicht darunter leiden. Zu dem Lot müßte ein entsprechendes Flußmittel, da Borax wegen des hohen F. nicht in Betracht kommt, gefunden werden, was bisher mißlungen ist. — Anschließend Aussprache. (Metall Ind. [London] 25. 522—24. 547—50. 1924.) WIESE

R. J. Anderson und M. E. Boyd, *Die Rettung von Aluminiumlegierungen aus Gußstücken durch Löten und Schweißen*. Allgemeine Besprechung der Techniken des Lötens u. Schweißens von Al-Legierungen, u. die Grenzen jeder Methode. (Metall Ind. [London] 25. 571—74. 1924.) WIESE

Hans Heimann, *Studien über die Einwirkung der Metalloxyde auf die Verarbeitbarkeit von Grundemails auf Stahlblech*. Bericht über Verss. mit verschiedenen Vorsätzen u. Bekanntgabe einer Grundmischung mit CoO—NiO, die alle Anforderungen an brauchbares Grundemail genügt. (Keram. Rdsch. 32. 67—70. 1924. Ahlen i. W.) WIESE

W. E. Hughes, *Untersuchungen über galvanische Metallabscheidung*. IV. *Aufbau und Funktion der Anoden*. 1. *Ihre Funktionen und ihre Auflösung*. (III. vgl. Metall Ind. [London] 25, 26 bis 30. 1924. II. 2553.) Nach allgemeinen Bemerkungen über Anoden werden in

ionen als Elektrizitätsleiter, Kontrollmittel für das Arbeiten der Lsg. u. als für das Metall in der Lsg. besprochen. Ob sich eine Anode gut oder nicht in Elektrolyten auflöst, hängt von einigen Faktoren ab, einige von ihnen betreffen, ob sie ihre ursprüngliche Gestalt mehr oder weniger behält. Die wichtigsten sind: 1. Die Zus. der Anode. 2. Ihre Struktur. 3. Ihre Gestalt. 4. Die Art der Lsg. 5. Die angewandte Stromdichte. 6. Die Bedingungen auf der Oberfläche. Über die Zus. der Anoden läßt sich sagen, daß verschiedene Metalle, z. B. Cu, Ag, Zn so rein wie möglich angewandt werden müssen. In der Regel geben Anoden aus reinem Metall keine gute Wirksamkeit, besonders die Metalle, die leicht passiv werden. In diesem Falle, z. B. beim Nickel, ist besondere Obacht bei der Wahl des oder der anderen Legierungszusätze zu geben. Die Struktur beeinflußt die Löslichkeit der Anode, aber bei dem augenblicklichen Stand der Kenntnisse läßt sich nicht voraussagen, ob die Anode aus elektrolyt., gewalztem oder gegossenem Metall in dem besonderen Fall besser ist. Es werden dann kurz die Gestalt der Anoden („QUOIT“-Anoden), die Zus. der Lsg. u. die Wrkg. der Elektrolyten besprochen. Einige Betrachtungen über den Mechanismus der Auflösung beschließen die Ausführung. (Metal Ind. [London] 25. 491—93. 496. 519. 543—46. 567—68. 1924.)

WILKE.

Maschinenbau-Anstalt Humboldt, Köln-Kalk, *Flotationsverfahren*, gek. durch Verwendung von auf mechan. Wege, wie z. B. in Kolloidmühlen o. dgl. in den normalen Zustand versetzten Flotationsmitteln. — Es wird eine beliebig lange Zeit bleibende kolloidale Zerteilung der Zusatzmittel erzielt. Der Verbrauch an Flotationsmitteln wird verringert. (D. R. P. 406524 Kl. 1a vom 5/12. 1922, ausg. 1/11. 1924.)

OELKER.

Eorg Spackeler, Clausthal und **Karl Glinz**, Berlin-Dahlem, *Aufbereitung von Erzen mittels Vakuum und Druck*. Die Erze oder Mineralgemenge werden in einem unter Vakuum oder Druck oder abwechselnd unter Vakuum u. Druck zu einem feinen Raum so zerkleinert oder für die Zerkleinerung mit anderen Aufbereitungsmaschinen so vorbereitet, daß die B. der Bruchflächen bei der Zerkleinerung nicht wahllos, sondern auf den natürlichen Begrenzungsflächen der Mineralien erfolgt u. ein Prod. erhalten wird, dessen Körner möglichst nur noch aus einem Mineral bestehen, also möglichst aufgeschlossen sind. Der Vorgang wird mit Rüttel- u. Stoßbewegungen zur Beförderung der Maßnahmen verbunden. (D. R. P. 393233 Kl. 1a vom 28/7. 1922, ausg. 4/12. 1924.)

OELKER.

Siemens & Halske Akt.-Ges., Siemensstadt (Erfinder: **Fritz Gabriel**, Berlin-Tiergarten), *Vorrichtung zur Bestimmung der Innentemperatur von technischen Öfen*, eine Wandung der der hohen Temperatur auszusetzende temperaturempfindliche Vorrichtung ist angeordnet u. gegen mechan. u. therm. Schädigungen geschützt ist, dadurch, daß in dem in die Ofenwand einzusetzenden aus einem Material ungefähr von der gleichen Wärmeleitfähigkeit wie die Ofenwandung bestehenden Klotz ein Thermoelement fest eingebaut u. an dessen rückwärtigen Ende eine Kühlvorr. für die Klemmen angeordnet ist, die auch die Anschlußklemmen für die Meßgeräteleitungen umschließt. — Die Vorr. ist für Martin-, Hoch-, elektr. Glasschmelz-, Kokereiöfen, Erhitzöfen u. dgl. geeignet. (D. R. P. 405149 Kl. 42i vom 11/10. 1922, ausg. 1/11. 1924.)

KÜHLING.

Erre Henri Gaston Durville, Frankreich, *Legierungen*. Den üblichen, aus 10% Cu, 10—25% Ni u. 5—30% Zn bestehenden Legierungen wird 0,5—5% Ag zugefügt. Die Erzeugnisse besitzen hohe Kornfeinheit, so daß sie eine sehr schönen Oberflächenglanz annehmen, u. widerstehen atmosphärischer Einwirkung. (F. P. 570040 von 1/12. 1923, ausg. 4/7. 1924.)

KÜHLING.

Allgemeines Deutsches Metallwerk G. m. b. H., Berlin-Oberschönewitz, *Kupfer-Zink-Legierung*, bestehend aus 48 Teilen Cu, 10 Teilen Ni, 3 Teilen Fe, 2 Teilen Al u. 35 Teilen Zn. — Die Legierung besitzt ein sehr feines Korn, ist sehr dicht u. gegen chem. Einflüsse sehr beständig. (D. R. P. 406143 Kl. 40b vom 22/9. 1921, ausg. 27/11. 1924.) KÜHLH.

W. Borchers, Aachen, und **R. W. Stimson**, New York, *Herstellung und Reinigen von Legierungen*. Innige Mischungen von gemahlenden Stoffen, welche Mo oder U, bezw. mehrere dieser Metalle enthalten, von Alkali- oder Erdoxyden oder -carbonaten, W. u. gegebenenfalls Bindemitteln werden getrocknet, oxydierend geröstet. Die Menge des verwendeten Alkalioxyds o. dgl. soll so gering sein, daß ein basisches Erzeugnis entsteht, d. h. mehr als ausreichen, um alle während des Röstens entstehenden sauren Oxyde zu neutralisieren. Der Feuchtigkeitsgehalt des Erzeugnisses liegt unter 1600°. Sie werden entweder mittels reduzierender, vorzugsweise Si enthaltender Mittel, z. B. Ferrochromsilicium oder Eisennickelsilicium, gegebenenfalls unter Zusatz von Flußmitteln in die entsprechenden Legierungen verwandelt, oder zur Reinigung von Fe neben Cr, Mo oder U bezw. mehrere dieser Metalle, u. gegebenenfalls noch andere Metalle enthaltender Legierungen verwendet. Im letzterem Fall werden die Legierungen geschmolzen u. das Reinigungsmittel u. erforderlichenfalls ein Flußmittel unter andauerndem Erhitzen zugegeben. (E. P. 223617 vom 24/4. 1923 u. 223622 vom 27/4. 1923, ausg. 20/11. 1924.) KÜHN.

A. C. Hyde, London, und **W. L. Turner**, Caldy, *Legierungen*. Mischungen von Fe₂O₃ u. einem Manganoxyd werden aluminotherm. reduziert oder es wird zunächst das Manganoxyd aluminotherm. reduziert, das Erzeugnis mit Fe₂O₃ gemischt u. die Mischung aluminotherm. behandelt. Die Erzeugnisse sind praktisch rein. (E. P. 223626 vom 21/6. 1923, ausg. 20/11. 1924.) KÜHLH.

R. Grah, Sheffield, *Herstellung von Chromüberzügen auf elektrolytischem Wege*. Als Elektrolyt dient eine wässrige Lsg., welche neben CrO₃ enthält HCl oder CH₃COOH u. kleine Mengen von H₃BO₃, Weinsäure, Citronensäure, H₂SO₄ oder ein geeignetes Salz. Die Spannung soll 2–4 V, die Stromstärke 2–5 Amp. je Liter die Temp. etwa 18° betragen. (E. P. 223611 vom 14/9. 1923, ausg. 20/11. 1924.) KÜHN.

Pierre Alexandre Govaerts, Auderghem, und **Polydore Matthieu**, Maesbeke, Cureghem, Belgien, *Niederschlagen von Kupfer-, Silber- oder Bleilegierungen durch Elektrolyse, namentlich auf Eisen oder Aluminium*. (D. R. P. 406350 Kl. 40b vom 22/11. 1922, ausg. 21/11. 1924. Bgl. Prior. 19/12. 1921. — C. 1923. IV. 143.) KÜHN.

Felten & Guilleaume Carlswerk Act.-Ges., Köln-Mülheim, *Hochsauerländer Bekleidung von metallenen Gefäßwandungen aus Kautschuk u. Graphit*, dadurch, daß der Graphitgehalt nach der Oberfläche zu allmählich oder stufenweise ansteigt. (D. R. P. 407543 Kl. 12f vom 13/2. 1924, ausg. 17/12. 1924.) KAUSCH.

IX. Organische Präparate.

—, *Die fabrikmäßige Herstellung von Jodoform*. Darstellung der Jodoform durch Elektrolyse u. Umsetzung des J mit Pottasche u. A. (Chem.-Zt 4 18–19.) JUG.

Carlo Maimeri, *Über die Herstellung von Äthylalkohol und Diäthylsulfid aus Äthylen*. Die hauptsächlichsten Verff. werden an Beispielen beschrieben u. nach ihrer Rentabilität bewertet. Sie kränken alle an zu hohem Verbrauch an O₂ u. H₂SO₄. Letzterer läßt sich nach Verss. des Vf. verringern, wenn man unter Druck arbeitet. Als C₂H₄-Quelle kommen vor allem Koksofengas u. Petroleumgas in Frage. (Giorn. di Chim. ind. ed appl. 6. 533–34. 1924. Mailand.) GRIME.

Ottorino Angelucci, *Eine interessante Reaktion der Fructose*. Vf. schlägt vor, aus Dahlienknollen Formaldehyd herzustellen. Ihr Zucker, das Inulin, zerfällt bei

Oxydation. mit Cr-Mischung leicht in folgender Richtung: Inulin—Fructose—aldehyd. (Giorn. di Chim. ind. ed appl. **6**. 538. 1924. Rom.) GRIMME.

F. G. Hobart, *Chemie in einer Gasmaskenfabrik*. Es wird eine Krieganlage zur Darst. von Benzylalkohol (als Lösungsm. für Celluloseacetat) im großen durch Chlorieren von Toluol u. Verseifen des erhaltenen Benzylchlorids beschrieben. Nebenbei entsteht Benzaldehyd wurde teilweise als solcher verwendet, in der Hauptmenge durch Luftoxydation in Benzoesäure verwandelt, die ihrerseits wieder teilweise zuerst des Cocainersatzes „Benzamin“ benutzt wurde. Über das in der Überschrift genannte Thema enthält diese Veröffentlichung, ein Auszug aus einem Vortrag, eigentlich nichts, außer daß in dem Chlorierungsraum durch Bedeckung des Bodens mit einer 3—4 Zoll hohen Schicht von Kleinkoks die B. von Pfützen werden, zugleich aber stark zerstörende Wrkg. auf das Schuhwerk durch die katalysierte Wrkg. der scharfen Koksstücke u. des Benzylchlorids hervorgerufen werden. (Pharmaceutical Journ. **113**. 635—36. 1924.)

SPIEGEL.

—, *Die Fabrikation von Benzylalkohol*. Vf. beschreibt die bei der Royal Ordnance Factory in South Farmborough seit 1915 ausgearbeiteten Verff. zur Darst. von Benzylchlorid durch Chlorierung von Toluol u. die Hydrolyse zu Benzylalkohol. Nebenprodd. werden Benzaldehyd u. Benzoesäure gewonnen. (Chem. Trade Journ. **75**. 733—34.)

ZANDER.

J. I. du Pont de Nemours & Company, übert. von: **Harry Essex** und **L. Ward**, Wilmington, Delaware, V. St. A., *Herstellung von Allylchlorid*. Man leitet 1,2-Dichlorpropan in Dampfform über CaCl₂, das auf 300—350° erhitzt wird. Die katalyt. Rk. erfolgt nach der Gleichung:



Das aus dem Reaktionsrohr austretende Dampfgemisch wird durch fraktionierte Kondensation bei 50° vom unveränderten CH₃·CHCl·CH₂Cl befreit, das von neuem über den Katalysator geleitet wird, u. alsdann das Allylchlorid konzentriert u. gegebenenfalls von HCl u. anderen Verunreinigungen befreit. Bei dem Verfahren werden wesentlich höhere Ausbeuten, ca. 66% der theoret. möglichen, an Allylchlorid erhalten als nach den bisher bekannten, unter Verwendung von Alkalimetallen, oder deren Hydroxyden, wie K, Na, Mg, Ca oder Al, bezw. NaOH, Ca(OH)₂, Ba(OH)₂, Mg(OH)₂, arbeitenden Verff. (A. P. **1477047** vom 11. 12. 1923.)

SCHOTTLÄNDER.

Johan Pieter Wibaut, Amsterdam, Holland, *Herstellung von Alkylhalogeniden*. Man leitet gasförmiges Äthylen, Propylen oder ein höheres Olefin oder ein oder mehrere dieser KW-stoffe enthaltende Gasgemische zusammen mit gasförmiger HCl oder HBr über Verb. eines Metalls der 5. Gruppe des period. Systems bei einer Temp. unterhalb 250°. — Als Katalysatoren eignen sich besonders BiCl₃ u. BiBr₃, Oxyde u. Hydroxyde des Bi u. Sb, Bi(NO₃)₃, Sb-Halogenide, Oxyhalogenide von V, Bi, Halogenide u. Oxyhalogenide des V, VOCl₂, VCl₃, V(OH)₃, Chloride von Ta, wie NbCl₃, NbCl₅, TaCl₅. Man verwendet den Katalysator zweckmäßig auf inerten Trägern wie Asbest, Kieselgur, poröser Kohle oder Bimsstein. Alkylhalogenhaltige Gasgemische lassen sich Leuchtgas, Koksofengas, Ölgas oder durch Cracken von Petroleum erhaltene Gasgemische verwenden. Man leitet ein Gemisch aus Leuchtgas u. HCl bei einer Temp. unterhalb 250° über, wobei das Äthylen mit sehr guter Ausbeute in C₂H₅Cl übergeführt wird. Man erhält man aus C₂H₄ u. HBr C₂H₅Br, während Propylen u. HCl bezw. Propylchlorid bzw. i-Propylbromid liefern. Zur Trennung der Alkylhalogenide von überschüssiger HCl oder HBr entfernt man die Säure durch Waschen mit W. Man gewinnt die Alkylhalogenide durch Abkühlen, Waschen mit geeigneten Lösungsm. oder Absorption durch poröse Stoffe, wie aktivierte Kohle. (E. P. **209722**)

vom 19/12. 1923, ausg. 5/3. 1924. Holl. Prior. 12/1. 1923. **F. P. 574800** vom 20/12. 1923, ausg. 18/7. 1924. Holl. Prior. 12/1. 1923.) **SCHOTTLÄND.**

Foord von Bichowsky, San Francisco, California, V. St. A., *Herstellung von Glykolmonochlorhydrin*. Man erhitzt Ameisensäure- β -chloräthylester mit etwas (enthaltenen) Alkoholen kurze Zeit zum Sieden u. fraktioniert das Reaktionsprodukt. Hierbei geht zunächst Ameisensäurealkylester, dann der überschüssige A. u. zw. bei 125—128° nahezu reines Glykolmonochlorhydrin über. Bei Verwendung CH_3OH verläuft die Rk. im Sinne der Gleichung:



Zur Herst. des Ameisensäure- β -chloräthylesters, farblose, bewegliche in Wasser zwl. Fl., D.¹⁶ 1,17, Kp.₇₆₀ 94°, wird Ameisensäurediglykolester, $\text{HCO}\cdot\text{O}\cdot(\text{CH}_2\cdot\text{O}\cdot\text{OCH})_2$ bei ca. 100° mit trockenem HCl-Gas gesätt., die Fl. mit eiskaltem Wasser gewaschen, mit CaCl_2 getrocknet u. dest. Das übergehende Destillat enthält Ameisensäure- β -chloräthylester. Das Verf. liefert wesentlich höhere Ausbeute an Glykolmonochlorhydrin als das bekannte, vom Glykol selbst ausgehende Verfahren. (**A. P. 1488571** vom 20/8. 1918, ausg. 1/4. 1924.) **SCHOTTLÄND.**

E. I. du Pont de Nemours & Company, übert. von: **Harry Essex** in **Alger L. Ward**, Wilmington, Delaware, V. St. A., *Synthetische Herstellung von Glycerin*. Man lagert an Allylhalogenide unterhalogenige Säure an u. verseift die entstandenen Dihalogenhydrine mit wss. Na_2CO_3 . — Für den glatten Verlauf des Verf. ist es wesentlich, daß die aus den Hypohalogeniten in Freiheit gesetzte unterhalogenige Säure sich sofort an das Allylhalogenid anlagern kann. Hierzu ist das Allylhalogenid im Überschuß unter starkem Rühren in die wss. Lsg. des Epohalogenits eingetragen u. alsdann langsam eine Säure, ein Säureanhydrid oder ein saures Salz zu dem Gemisch gegeben. Das in Lsg. verbleibende Gemisch der isomeren Dihalogenhydrine der Glycerins wird nach Zusatz von Na_2CO_3 erhitzt u. liefert in einer Ausbeute von ca. 95% der Theorie Glycerin. Beispiele sind angegeben für die Herst. des Glycerins aus Allylchlorid, NaOCl u. CO_2 u. Verseifung des Glycerindichlorhydrins $\text{Cl}\cdot\text{CH}_2\cdot\text{CH}(\text{Cl})\cdot\text{CH}_2\text{OH}$ mit sd. wss. Na_2CO_3 -Lsg. (**A. P. 1477113** vom 27/9. 1919, ausg. 11/12. 1923.) **SCHOTTLÄND.**

Alco Deo Company, Wallington, New Jersey, übert. von: **Alfred Hoffmann** in **Kew Gardens**, New York, V. St. A., *Herstellung von Mesityloxyd*. Man eiträgt Diacetonalkohol mit wss. HCl allmählich zum Sieden, dest. bis zur beginnenden Trübung der Fl. u. kondensiert das Mesityloxyd. Man kann den Diacetonalkohol auch zunächst mit Cl_2 oder wss. HOCl ohne äußere Wärmezufuhr behandeln u. dann erst das Reaktionsprod. dest. (**A. P. 1474035** vom 23/3. 1922, ausg. 1/1. 1923.) **SCHOTTLÄND.**

The Shawinigan Laboratories, Limited, Montreal, Quebec, übert. von: **Frederick W. Skirrow** und **Otto W. Herzberg**, Shawinigan Falls, Quebec, Canada, *Herstellung von Vinylestern*. Man läßt Acetylen in Ggw. von HgSO_4 als Katalysator auf eine Carbonsäure bei 40—100° einwirken, neutralisiert die bei der Rk. ausgespaltene Mineralsäure, gibt frischen Katalysator hinzu, steigert die Temp. auf 100—170° u. dest. den gebildeten Vinylester ab. (**Can. P. 237841** vom 27/10. 1921, ausg. 12/2. 1924.) **SCHOTTLÄND.**

The Roessler & Hasslacher Chemical Company, New York, übert. von: **Gilbert E. Seil**, Oakmont, Pennsylvania, V. St. A., *Herstellung von α -Oxyaceton* säuren durch Verseifung der entsprechenden Säurenitrile. Man behandelt die Säurenitrile, zweckmäßig in Ggw. von Chloriden oder Fluoriden des Natriums oder NH_4 oder Ca als Katalysatoren, mit Schwefelsäuredihydrat H_2SO_4 , $2\text{H}_2\text{O}$ bei erhöhter Temp. — Z.B. wird α -Oxy-i-buttersäurenitril (Acetonecyanhydrin) mit H_2O , $2\text{H}_2\text{O}$, erhältlich aus SO_3 u. 3 Mol. H_2O oder aus 2 Mol. W. u. 1 Mol. Monohydrat u. etwas NH_4Cl versetzt, zu dem Gemisch ein indifferentes Verdünnungsmittel wie

gegeben u. das Ganze 5 Stdn. unter Rückfluß erhitzt. Man erhält so wasser-
 α -Oxy-i-buttersäure neben $\text{NH}_4\cdot\text{HSO}_4$ u. unverändertem NH_4Cl , die durch
 tktion der Säure mit CCl_4 in üblicher Weise getrennt werden. Durch das
 wird die bei der Verwendung von wss. Mineralsäuren, wie HCl , leicht ein-
 de Zers. der Nitrile in HCN u. Aldehyd bezw. Keton vermieden. (A. P.
 7374 vom 15/10. 1921, ausg. 8/1. 1924.)

SCHOTTLÄNDER.

arleton Ellis, Montclair, New Jersey, V. St. A., Herstellung von Alkyl- und
 yriden hochmolekularer Fettsäuren. Man erhitzt hochmolekulare Fettsäuren mit
 stens 12 C-Atomen, wie Ölsäure, Stearinsäure, Palmitinsäure, Behensäure,
 äure mit prim. aromat. Aminen, bezw. mit Säureamiden; wie Acetamid oder
 rstoff, auf Tempp. von 170—210°. — Die entstehenden Prodd. enthalten in
 egel neben den entsprechenden N-substituierten Amidn der Fettsäuren noch
 atsprechende freie Fettsäure, die sich entweder durch Behandeln mit verd.
 en u. Auswaschen mit W. unter gleichzeitiger bedeutender Erniedrigung der
 tfernen läßt oder durch Veresterung mit Alkoholen u. Mineralsäuren als Ester
 n werden kann. Die aus den ungesätt. Fettsäuren u. Aminen oder Amidn
 icken Prodd. mit hoher SZ. lassen sich wesentlich leichter hydrieren als die
 ehenden freien Fettsäuren selbst. Analoges Verh. zeigen die Mischprodd.
 mid u. Ester bei der Hydrierung. Beispiele sind angegeben für die Herst.
 Ölsäureanilid u. dessen Hydrierungsprod. (hierzu vgl. auch ELLIS u. RABINO-
 Journ. Ind. and Engin. Chem. 8. 1105; C. 1918. I. 610), — von Stearinsäure-
 aus den Komponenten bei 170—180°, SZ. 91,5; geht bei der Veresterung
 H_3OH u. HCl in ein den Methylester u. das Anilid der Stearinsäure ent-
 des Mischprod. über, SZ. 3,7, F. 67°, — von: Ölsäure-p-oxyphenylamid, aus
 ure u. p-Aminophenol bei 180—200° erhalten, schwarze, wachsartige M., F. 77°,
 d. meisten organ. Lösungsmm. mit dunkelbrauner, in alkoh. KOH mit dunkel-
 Farbe l., — von Ölsäure-o-toluidid, aus o-Toluidin u. der Säure bei 180—200°,
 ; geht beim Behandeln mit 10%ig. KOH u. Auswaschen des K-Oleats mit
 Lsg. u. W. in ein krystallin. Prod., SZ. 2,7, über, — von Ölsäurexylylidid, aus
 Xylidin u. der Säure bei 180—195°, nach Entfernung der freien Säure
 us Öl, aus der alkoh. Lsg. fällt $\frac{1}{10}$ -n. KOH einen festen Nd. SZ. 3,5, — von:
 e- β -naphthylamid aus der Säure u. β -Naphthylamin bei 180—200°, nach
 r Entfernung der freien Säure wie oben, am Licht sich dunkelfärbende Kry-
 SZ. 1,5, — von: Ölsäureureid, aus Harnstoff u. der Säure bei 200°, Krystalle
 7; — Ölsäure u. Acetamid geben beim Erhitzen auf 160—180° eine schwarze
 i. 150. Auch aromat. Diamine, wie p-Phenylendiamin oder Benzidin geben
 en hochmolekularen Fettsäuren entsprechende Säureamide, von denen die
 nderivv. einen äußerst hohen F. aufweisen. Durch die Hydrierung der un-
 ä Fettsäurereste enthaltenden Verbb., die entweder in Ggw. eines Ni-Kataly-
 unter gewöhnlichem oder hohem Druck bei 150—200°, bezw. in Ggw. eines
 er Pd-Katalysators bei niedrigerer Temp., gegebenenfalls unter Verwendung
 Lösungsmm., erfolgen kann, wird der F. wesentlich erhöht. Soweit die Prodd.
 freie NH_2 -Gruppen im aromat. Kern enthalten, lassen sie sich diazotieren u.
 e beim Kuppeln mit geeigneten Komponenten in Ölen u. KW-stoffen l. Azo-
 e. Die hochschm. Prodd. finden zur Herst. von Stiefel- u. Fußbodenwachsen
 i von Polituren Verwendung. (A. P. 1475477 vom 9/8. 1918, ausg. 27/11.

SCHOTTLÄNDER.

adische Anilin- & Soda-Fabrik, Ludwigshafen a. Rh. (Erfinder: Alwin
 ch, Ludwigshafen und Wilhelm Michael, Oppau), Gewinnung von Alkali-
 aus Cyanwasserstoff enthaltenden Gasgemischen, dad. gek., daß man die durch
 ung der Gasgemische in Natronlauge, zweckmäßig von hoher Konz., erhaltene
 gegebenenfalls nach Abtrennung der ausgefallenen Soda, zur weiteren Aus-

fällung von Soda mit gasförmigem NH_3 versetzt. — Der abgeschiedenen Soda haftendes Cyanid wird durch Waschen mit Ammoniakw. gewonnen. Bei ammoniakreichen Gasgemischen ist ein besonderer Zusatz von NH_3 nicht nötig. (D. P. 406362 Kl. 12k vom 10/3. 1923, ausg. 18/11. 1924.) KÜHLIN

Deutsche Gold- & Silber-Scheideanstalt vorm. Roessler, Deutschland, *Herstellung von Blausäure* aus gasförmigen Stickstoff- u. Kohlenstoffverb., wie NH_3 u. CO , unter Verwendung von Stoffen von großer Oberflächenentw. als Katalysatoren. Geeignet sind Aktivkohle u. auf Stoffen von großer Oberflächenentw., auch Aktivkatalysatoren niedergeschlagene Metalle oder Metalloxyde, besonders nicht oder schwer reduzierbare Metalloxyde u. deren Verb. mit anderen Metalloxyden. Die Aktivkohle kann auch selbst auf anderen Trägern von großer Oberflächenentw. niedergeschlagen werden, auch können mehrere der genannten Katalysatoren gemeinschaftlich benutzt werden. Besonders günstige Ergebnisse werden beim Arbeiten unter Druck erzielt, vorausgesetzt, daß die Erzeugnisse nach dem Austritt aus dem Druckgefäß rasch abgekühlt werden; Verseifung der Blausäure durch das mitentstandene Wasser erfolgt innerhalb des Druckgefäßes nicht. (F. P. 574055 vom 1/12. 1923, ausg. 4/7. 1924. D. Priorr. 2/12. 1922, 1. u. 15/1. 1923. — Teilreferat nach E. P. 2033 vgl. C. 1924. I. 1592.) KÜHLIN

Georg Bredig und **Egon Elöd**, Deutschland, *Synthese von Blausäure aus Cyaniden*. Als Katalysatoren bei der Synthese von Blausäure aus flüchtigen Stickstoff- u. Kohlenstoffverb., wie NH_3 u. CO , werden Verb. der seltenen Erden, besonders des Ce, Verb. des Ti, Mo, U oder V, Silicide u. Carbide, besonders Siliciumcarbid, sowie Gemische dieser Verb. benutzt. Vielfach ist es zweckmäßig, die Katalysatoren auf Trägern, z. B. Tonzylindern, niederzuschlagen, als Träger können aber auch einige der genannten Katalysatoren selbst benutzt werden, die Carbide oder Silicide, was den Vorteil bietet, daß diese Träger zugleich als Heizwiderstände dienen können. Der Zersetzung des NH_3 wird durch Verwendung überschüssigen CO oder Anwendung von H_2 oder N_2 als Schutzgas oder beide Mittel, z. B. durch Benutzung von Wassergas, sowie durch Vermeidung zu hoher Tempp. entgegengewirkt. Zweckmäßig wird bei 500–600° gearbeitet. (F. P. 57422 vom 6/12. 1923, ausg. 8/7. 1924. D. Priorr. 7/12. 1922, 13/2. u. 6/6. 1923.) KÜHLIN

Gesellschaft für Kohlentechnik m. b. H. (Erfinder: **W. Glud**), Dortmund, *Eing., Umwandlung von Rhodaniden in Cyanide* durch Behandlung mit reduzierenden Gasen, dad. gek., daß man die hierbei im Gemisch mit Cyaniden entstehenden Sulfide durch Behandlung mit blausäurehaltigen, aber schwefelwasserstofffreien Gasen in Cyanide überführt. — Als reduzierende Gase können H_2 oder H_2 enthaltende Mischungen verwendet werden, die aber von SO_2 , H_2S , CO_2 u. dgl. frei sein müssen. (D. R. P. 404959 Kl. 12k vom 16/11. 1922, ausg. 25/10. 1924.) KÜHLIN

Ludwig Rosenstein, San Francisco, California, V. St. A., *Herstellung von Alkalimetallxanthogenaten*. Man löst Alkalihydroxyde in W., setzt zu der h. ges. A., kühlt das Gemisch auf ca. 20° ab, gibt CS_2 hinzu u. trocknet den ausgeschiedenen Nd. — Zweckmäßig wird mit dem CS_2 ein indifferentes Verdünnungsmittel, wie PAe., Bzl. oder CCl_4 gleichzeitig zugegeben, um das Rühren des alkoh.-wss. Alkali-hydroxyd- CS_2 -Gemisches u. die Abscheidung der Xanthogenate zu erleichtern. Einzelheiten für die Herst. von Na- u. K-Xanthogenat sind angegeben. (A. P. 15078 vom 3/12. 1923, ausg. 2/9. 1924.) SCHOTTLÄNDER

E. I. du Pont de Nemours & Company, übert. von: **Arthur P. Tanberg**, Wilmington, Delaware, und **Herbert Winkel**, Scranton, Pennsylvania, V. St. A., *Tetrasubstituierte Harnstoffe*. Man behandelt in geeigneten organ. Lösungsm., wie Bzl., CCl_4 , Xylol, Solventnaphtha, gel. Alkylarylamine mit Phosgen. — Zweckmäßig gelangt 1 Mol. COCl_2 auf 4 Mol. des sek. Amins zur Einw., wobei 2 Mol. des Amins zur Bindung des freiwerdenden HCl verbraucht werden. Das Verf. bietet

eil, das die bisher erforderliche gesonderte Herst. des disubstituierten Harnchlorids u. dessen weitere Umsetzung mit sek. Amin entbehrlich wird. Ein Beispiel für die Herst. von *s. Dimethyldiphenylharnstoff*, $C_6H_5(CH_3) \cdot N \cdot CO \cdot N \cdot (CH_3) \cdot$ aus $COCl_2$ u. Monomethylanilin in benzol. Lsg. bei 70° ist angegeben. (A. P. 1087 vom 11/9. 1918, ausg. 11/12. 1923.)

SCHOTTLÄNDER.

The Barrett Company, New Jersey, übert. von: **Frank. A. Canon**, Crafton, Pennsylvania, V. St. A., *Herstellung von aromatischen Sulfosäuren*. Man leitet ein Gemisch aus dampfförmigen aromat. KW-stoffen u. indifferenten, W. absorbierenden, H_2SO_4 nicht reagierenden Gasen bei erhöhter Temp. durch H_2SO_4 . — Zweckmäßig fließt hierbei die h. H_2SO_4 einen mit Ringen oder Füllkörpern beschickten Reaktionssturm herunter, während das Gas-KW-stoffgemisch im Gegenstrom vom Boden des Gefäßes heraufgeführt wird. Die Sulfosäure sammelt sich hierbei frei von W. an, während das bei der Rk. entstandene u. das in der H_2SO_4 vorhandene W. von den Gasen absorbiert wird u. dampfförmig ins Freie entweicht. Das Verhältnis von Gas zu aromat. KW-stoff soll hierbei 30:1 betragen. Beispiele für die Sulfonierung von Bzl. mit H_2SO_4 , D. 1,84, bei 180° unter Verwendung von Converterabgasen zu *Benzolmono-* u. *Benzoldisulfosäure* sind angegeben. Das Verfahren gestattet besonders die nutzbringende Verwendung der in den Abgasen enthaltenen katalyt. Oxydation aromat. KW-stoffe enthaltenen, unverändert gebliebenen Stoffe, die bisher verloren gegeben wurden oder in weniger wirtschaftlicher Weise wiedergewonnen werden mußten. (A. P. 1503937 vom 13/12. 1921, ausg. 1924.)

SCHOTTLÄNDER.

British Dyestuffs Corporation Limited, London, **William Henry Perkin** und **George Roger Clemo**, Oxford, *Herstellung von p-Toluolsulfo- β -chloräthylester und Verwendung zur Chloräthylierung von Phenolen, Alkoholen und Aminen*. Man kocht *p-Toluolsulfochlorid* mit Äthylenchlorhydrin ca. $2\frac{1}{2}$ Stdn., dest. unter vermindertem Druck das überschüssige $Cl \cdot CH_2 \cdot CH_2 \cdot OH$ ab, gibt zu dem zurückbleibenden etwas verd. NaOH, extrahiert mit Bzl., trocknet die benzol. Lsg. mit K_2CO_3 , wäscht das Bzl. ab u. fraktioniert im Vakuum. Der reine *p-Toluolsulfo- β -chloräthylester* $(CH_3 \cdot C_6H_4 \cdot SO_2 \cdot O \cdot CH_2 \cdot CH_2 \cdot Cl)$, $Kp_{21} 210^\circ$, farbloser, zäher Sirup von schwachem, unangenehmem Geruch, D. höher als W., in diesem unl., spaltet bei der Einwirkung von Phenolen, Alkoholen oder Aminen leicht den Chloräthylrest unter Rückbildung von *p-Toluolsulfosäure* ab. Zur Herst. von *β -Chloräthyläthern der Aminophenole* wird die NH_2 -Gruppe durch Acylierung geschützt werden. *o-Acetaminophenyl- β -chloräthyläther* wird aus *o-Acetylaminophenol* u. *p-Toluolsulfochloräthylester* in Ggw. von verd. NaOH, *p-Acetaminophenyl- β -chloräthyläther* in ähnlicher Weise aus dem *Diacetyl-p-aminophenol* unter gleichzeitiger Verseifung des O-Acetylrestes gewonnen (hierzu vgl. auch CLEMO u. PERKIN jun., Journ. Chem. Soc. London 121. C. 1922. III. 1090.) (E. P. 193618 vom 19/1. 1922, ausg. 22/3. 1923.)

SCHOTTLÄNDER.

Charles J. Thatcher, New York, V. St. A., *p-Aminophenolsulfat*. Reines *Nitro-p-aminophenol* wird mit 78%ig. H_2SO_4 vermischt u. allmählich in einen mit Diaphragma getrennten elektrol. App. einfließen gelassen, dessen Kathoden aus Kohlen, die Anoden aus Pb-Platten bestehen. Die Anodenfl. besteht aus 50—55%ig. H_2SO_4 . Die Red. erfolgt bei 70 — 80° an der Kathode bei einer Stromdichte von 3 Amp. pro qdm Kathodenoberfläche u. 4 Volt. Nach Beendigung der Red. wird die h. Fl. sofort in einen elektrol. Zelle abgelassen u. langsam auf 20° oder darunter abgekühlt. Hierbei ausgeschiedenen Krystalle von rohem *p-Aminophenolsulfat* werden von Wasserlauge abgesaugt. Hierauf wird in W. gel. u. allmählich unter Rühren mit Natriumhydroxid bis zur kongoneutralen Rk. zugegeben. Zwecks Verhinderung von Oxydation wird während des Neutralisierens Na_2SO_3 oder $NaHSO_3$ in kleinen Mengen zugegeben. Aus der erwärmten Fl. wird das ausgeschiedene $CaSO_4$ sofort entfernt u. das Filtrat unter Zusatz von Na_2SO_3 oder $NaHSO_3$ im Vakuum bis zur beginnenden

Krystallisation eingedampft, h. mit Tierkohle versetzt, auf 35° abgekühlt, filtriert, langsam erkalten gelassen. Die ausgeschiedenen Krystalle werden durch Abschleudern von der Mutterlauge befreit u. getrocknet. (A. P. 1501472 vom 4. 1920, ausg. 15/7. 1924.)

SCHOTTLÄNDER.

Verona Chemical Co., North Newark, New Jersey, übert. von: **Jacob H. Bell**, Belleville, New Jersey, V. St. A., *Verfahren zum Trennen von m- und p-Kresol*. Ein Gemisch aus m- u. p-Kresol wird mit NaNO₂ in Ggw. von H₂SO₄ u. Toluol bei Temp. von ca. 0° behandelt, worauf man das ausgeschiedene Nitroso-m-Kresol von der Mutterlauge abtrennt. — Z. B. wird zu einer Mischung aus 60%ig. Es-Toluol u. Kresolgemisch, enthaltend 57% m- u. 43% p-Kresol, langsam u. ununterbrochenem starken Rühren eine konz. NaNO₂-Lsg. zuzufießen gelassen, wobei die Temp. auf ca. 0° gehalten wird. Das Gemisch wird nach Zugabe des gesättigten NaNO₂ noch kurze Zeit gerührt. Das unl. ausgeschiedene Nitroso-m-Kresol wird abfiltriert, erst zur Entfernung der H₂SO₄ mit W., dann zur Beseitigung der veränderten gebliebenen p-Kresol-Toluollsg. mit frischem Toluol gewaschen u. getrocknet, wobei es als hellgelbes, mikrokrySTALLIN. Pulver erhalten wird. (A. P. 1502849 vom 11/3. 1922, ausg. 29/7. 1924.)

SCHOTTLÄNDER.

Ralph H. Mc Kee, New York, V. St. A., *Sublimation von Benzoesäure*. Benzoesäure wird in Ggw. eines neutralen Gases, vorzugsweise Luft, unterhalb ihrer Verkohlungstemp. erhitzt u. alsdann mit dem Luftstrom in einen Sublimierapp. geleitet, dessen Wandungen zum Teil aus durchlässigem Baumwollstoff bestehen. Die neutralen Gase werden bei einer Temp., die mindestens so niedrig sein muß, als diejenige, bei der sie den Sublimierraum verlassen, in die Heizkammer zurückgeführt. Die Sublimation der Benzoesäure erfolgt bereits bei 160—175°. Es wird so die Verkohlung u. Zers. der Säure vermieden. Die teilweise durchlässigen Wandungen des Sublimierapp. ermöglichen den Austritt der in roher Benzoesäure häufig enthaltenen Feuchtigkeit nach außen. (A. P. 1489707 vom 29/3. 1922, ausg. 8/7. 1924.)

SCHOTTLÄNDER.

Frank H. Beall, Baltimore, und **Donald Byal Bradner**, Edgewood, Maryland, V. St. A., *Herstellung von o-Nitrobenzoesäure*. o-Nitrotoluol wird in einem Rückflußkühler versehenen Gefäß auf ca. 165° erhitzt u. 20—90%ig. HNO₃ zuzuführen, erhitzten o-Nitrotoluol langsam zuzufießen gelassen, bis die ganze Fl. gleichmäßig gelblich gefärbt ist. Man trennt die o-Nitrobenzoesäure von dem unoxydierten Nitrotoluol u. selbst die Reaktionsprodd. ab, vermischt letztere mit frischem o-Nitrotoluol u. behandelt es wie oben mit HNO₃. Die Ausbeute an reiner o-Nitrobenzoesäure beträgt etwa 90%. (A. P. 1488730 vom 17/3. 1922, ausg. 1/4. 1924.)

SCHOTTLÄNDER.

Swan-Myers Co., Indianapolis, Indiana, übert. von: **Ernest A. Wilkins**, Richmond, Indiana, V. St. A., *Herstellung von o-benzyloxybenzoesäurem Calcium*. Man erhitzt entweder O-Benzylsalicylsäure (hierzu vgl. A. P. 1491779; C. 1924. II. 2) mit CaCO₃ in wss. Medium bis zur Beendigung der CO₂-Entw. oder setzt ein wss. Na-Salzlsg. der Säure mit einer wss. CaCl₂-Lsg. um. — Das Ca-Salz der O-Benzylsalicylsäure, weißes krystallin. Pulver, in ca. 90 Teilen W. von 20° l. (durch Zusatz von NH₃ wird die Löslichkeit nicht wesentlich gesteigert), findet therapeutische Verwendung. (A. P. 1481779 vom 18/4. 1921, ausg. 22/1. 1924.)



SCHOTTLÄNDER.

The Chemical Foundation, Inc., Delaware, übert. von: **Otto Gerngros** u. **Hermann Kast**, Berlin-Charlottenburg, *Herstellung von für die Bildung von Salzen der Acetylsalicylsäure geeigneten Mischungen*. Trockene Acetylsalicylsäure u. geeignete wasserfreie Metallverbb., wie Oxyde, Hydroxyde, Carbonate, Dicarbonsäure-Silicate, Chloride, Sulfate, Sulfite, Nitrate, Nitrite, Phosphate, Borate der Alkalien, Erdalkalimetalle, der seltenen Erden, des Mg, Zn, Hg oder Ag, ausgenommen NO₂, KOH, K₂CO₃, CaCl₂ u. Krystallsoda, werden innig miteinander vermischt. Gegebenenfalls werden indifferente Stoffe, wie Talk, Stärke, Milhzucker, etc.,

CO₂ oder Gelatine, zugegeben u. die Mischungen zu Tabletten, Pastillen oder ositorien gepreßt u. geformt. In trockenem Zustande sind die Prodd. beständig; ierührung mit W., wss. A., oder Vermischen mit diesen, mit Milch, Kaffee, oder Suppen, bilden sie die entsprechenden Metallsalze der Acetylsalicylsäure den innerlich u. äußerlich therapeut. Verwendung. (A. P. 1486373 vom 17/1. 1924, 11/5. 1924.)

SCHOTTLÄNDER.

Donald H. Bradner und Mary L. Sherrill, Baltimore, Maryland, V. St. A., ellung von Pfefferersatzstoffen. Man behandelt *Guajacol* mit *Methylolaminen* llgemeinen Formel: R·CO·NH·CH₂OH (R = Alkylrest mit 6—11 C-Atomen) w. wasserentziehender Mittel, wie H₂SO₄ oder ZnCl₂. — Die Rk. verläuft nach Gleichungen:



atter Weise. Z. B. wird *Undecenoylmethylolamid*, C₁₀H₁₉·CO·NH·CH₂OH, r Einw. von 40%ig. CH₂O-Lsg. auf *Undecenoylamid*, C₁₀H₁₉·CO·NH₂, das rseits durch Behandeln von *Undecylensäure* mit PCl₅ u. des Säurechlorids mit NH₃ gewonnen wird, erhalten, u. *Guajacol* in absol. A. gel. u. unter Kühlung H₂SO₄ zu dem Gemisch gegeben. Nach mehrtägigem Stehen bei 15° wird is gegossen u. das 4-Oxy-3-methoxybenzylundecenoylamid, C₆H₃(OH)¹·(O·CH₃)³· NH·CO·C₁₀H₁₉)¹, aus der wss.-alkoh. Lsg. mit CHCl₃ extrahiert, der Auszug erd. Na₂CO₃-Lsg. gewaschen u. das CHCl₃ abdest. Die neue Arbeitsweise ver it die umständliche Herst. von Vanillylamin, C₆H₃(OH)¹·(OCH₃)²·(CH₂·NH₂)⁴, isher zur Herst. dieser Pfefferersatzstoffe mit den aliph. Carbonsäurechloriden etzt werden mußte. (A. P. 1503631 vom 7/5. 1923, ausg. 5/8. 1924.)

SCHO. he Abbott Laboratories, Chicago, Illinois, übert. von: Ernest H. Volwiler, go, und Roger Adams, Urbana, Illinois, V. St. A., Herstellung von *p*-Amino- säurealkaminestern der allgemeinen Formel: C₆H₄(NH₂)⁴·(CO₂[CH₂]_x·N[R¹][R²]), r X = 2 oder mehr, R¹ = Alkylrest höher als C₂H₅ u. R² = Allylrest. Die r der Ester erfolgt in der üblichen Weise entweder durch Einw. der ent enden sek. aliph. Amine auf die *o*-Halogenalkylester der *p*-Nitro- oder nobenzoesäure u. gegebenenfalls Red. der NO₂-Gruppe oder durch Kondensation omat. Säurechloride mit den fertigen Alkylallylaminalkoholen. — Z. B. wird -Nitrobenzoesäure-*γ*-brompropylester mit *n*-Butylallylamin, durch Einw. von yl bromid auf Monoallylamin erhalten, Kp.₇₄₆ 132—133°, 3 Stdn. auf 60° er u. der entstandene *p*-Nitrobenzoesäure-*γ*-*n*-butylallylaminopropylester mit HCl zu dem *p*-Aminobenzoesäure-*γ*-*n*-butylallylaminopropylester, Monochlor- : aus Aceton-Krystalle, F. 147°, reduziert. Der in analoger Weise aus nobenzoesäure-*β*-bromäthylester u. *n*-Butylallylamin erhältliche *p*-Aminobenzoe- -*n*-butylallylaminöthylester bildet ein krystallin. Monochlorhydrat, F. 184°. — -Aminobenzoesäure-*γ*-*n*-propylallylaminopropyl- u. der *p*-Aminobenzoesäure- -propylallylaminopropylester bilden viscose, ölige, nur schwierig krystallisierende ydrate. — Erhitzt man *p*-Nitrobenzoylchlorid mit in Bzl. gel. *i*-Amylallyl- äthylalkohol, durch Einw. von Äthylenoxyd auf *i*-Amylallylamin bei 60° er- , Kp.₅₅ 132—133°, u. reduziert dann mit Sn u. HCl, so entsteht der *p*-Amino- säure-*β*-*i*-amylallylaminöthylester, Dichlorhydrat aus A. Krystalle, F. 194—195°. eien, entweder fl. oder niedrig schm., in W. unl., in Ä., Bzl., Aceton u. A. r, sowie ihre Salze besitzen stark anästhesierende Wrkg., analog dem Cocain. 1476934 vom 13/2. 1922, ausg. 11/12. 1923.)

SCHOTTLÄNDER.

he Dow Chemical Company, übert. von: William A. van Winkle, Midland, an, V. St. A., Herstellung von *p*-Aminobenzoesäurediäthylaminöthylester. Man Nitrobenzoesäurediäthylaminöthylester in mit H₂SO₄ angesäuertem W., gibt

etwas SnCl_2 als Katalysator hinzu u. reduziert bei gewöhnlicher Temp. mit des elektr. Stroms in einem mit Diaphragma versehenen App. mit Pb-Anode, Ni-Kathoden bei einer Stromstärke von 3—5 Volt. — Das Verf. verläuft wesentlich glatter u. einfacher als die übliche Red. des Nitroesters auf chem. Wege. (A. P. 1501635 vom 31/3. 1920, ausg. 15/7. 1924.) SCHOTTLÄNDER.

National Aniline & Chemical Company, Inc., Manhattan, New York, übert. von: **Ray Washington Hess**, Buffalo, New York, und **John Casper Sier**, Brooklyn, New York, V. St. A., Herstellung von *N*-Alkyl- und *N*-Aralkylcarbazol. Carbazol wird in Ggw. W. entziehender oder kondensierender Mittel, wie Alkalien, mit alkylierenden oder aralkylierenden Mitteln behandelt, zweckmäßig unter Zusatz indifferenten organ. Verdünnungsmittel, wie Toluol, Solventnaphthalin, Petroleum oder Monochlorbenzol. — Das Ätzalkali, vorzugsweise NaOH, wird in gepulverter oder feinkörniger Form verwendet. Ein Beispiel für die Herstellung von *N*-Äthylcarbazol, Krystalle aus A., F. 69,9°, durch Einw. von Diäthylsulfat auf Carbazol in Ggw. von NaOH u. Toluol bei 85° ist angegeben. Das Verf. hat den Vorteil, daß die besondere Herst. von Carbazolkalium entbehrlich ist, da die Alkylierung oder Aralkylierung wesentlich schneller u. glatter verläuft als nach den bisher üblichen Methoden. (E. P. 192376 vom 12/1. 1923, ausg. 28/3. 1924.) A. Prior. 25/1. 1922.) SCHOTTLÄNDER.

L. B. Holliday & Company, Limited, Huddersfield, und **Gilbert Thomas Morgan**, Birmingham, Herstellung von Aminonaphthotriazolen, darin bestehend aus man 5- bzw. 8-Nitro-2-aminonaphthalin mit p-Diazotoluol zu den entsprechenden o-Aminomonoazofarbstoffen kuppelt, diese durch Oxydation mit CrO_3 in das 5- bzw. 8-Nitronaphthotriazol überführt u. letztere in üblicher Weise zu den Aminonaphthotriazolen reduziert (hierzu vgl. auch MORGAN u. CHAZAN, Journ. Soc. Chem. Ind. 41. T. 1; C. 1922. I. 1107; MORGAN u. GILMOUR, Journ. Soc. Chem. Ind. 41. T. 1; C. 1922. III. 916.) (E. P. 191797 vom 12/10. 1921, ausg. 15/2. 1923.) SCHOTTLÄNDER.

Calco Chemical Company, Boundbrook, New Jersey, V. St. A., übert. von: **Moses L. Crossley**, Somerville, New Jersey, Herstellung von 6,8-Dimethyl-2-phenylchinolin-4-carbonsäure und deren Äthylester. Man kondensiert in üblicher Weise 2,4-Dimethyl-1-aminobenzol mit Benzaldehyd u. Brenztraubensäure in alkoh. Lsg. bei erhöhter Temp. — Die 6,8-Dimethyl-2-phenylchinolin-4-carbonsäure aus Benzaldehyd, gelbe Krystalle, F. 231—232°, l. in A., Ä., Bzl. u. CCl_4 , bildet mit Säuren u. Alkalien Salze. Sie findet therapeut. Verwendung. — Der durch Veresterung der Säure in Ggw. von H_2SO_4 erhaltliche Äthylester, aus CH_3OH farblose Krystalle, F. 90 bis 92°, l. in A., Ä. u. Bzl., geschmacklos, mit Säuren Salze bildend, ist ebenfalls therapeut. wertvoll. (A. PP. 1501274 u. 1501275 vom 29/12. 1920, ausg. 15/1. 1924.) SCHOTTLÄNDER.

The Eli Lilly & Company, übert. von: **Horace A. Shonle** und **Asher Moore**, Indianapolis, Indiana, V. St. A., Hydrojodide der 2-Phenylchinolin-4-carbonsäure und ihrer Alkyl-, Alkenyl- oder Aralkylester der 2-Phenylchinolin-4-carbonsäure werden in wässr. Lsg. oder in alkoh. Lsg. mit HJ behandelt. — Die bei Abwesenheit von Lösungsmitteln erhältlichen Hydrojodide sind gelb gefärbt, enthalten Krystallwasser, schmelzen niedriger als die in alkoh. Lsg. erhältlichen, meist wasserfreien, meist gelb gefärbten Prodd. Hydrojodid des 1-Phenylchinolin-4-carbonsäureäthylesters wasserfrei aus A. orangefarbene, nadelförmige Krystalle, F. 167—169°, mit Krystallwasser dunkelgelbe Krystalle, F. 119—120°. — 1-Phenylchinolin-4-carbonsäurepropylesterjodid aus A. gelbe Nadeln, F. 109—111°, verliert nach 48-std. Trocknen im Vacuum exsiccator das Krystallwasser, nimmt dunkelorange Färbung an u. schm. bei 151—153°. Das wasserfreie Prod. nimmt leicht wieder W. aus der Luft auf u. färbt sich hell. — Hydrojodid des 2-Phenylchinolin-4-carbonsäure-n-butylesters aus A. dunkelgelbe, bei 94—96° schm. Nadeln, wasserfrei dunkelorange, F. 151—153°.

Phenylchinolin-4-carbonsäure-i-butylesterjodhydrat, orangegelbe Nadeln aus A., 1—105° (lufttrocken), wasserfrei dunkelorange, F. 173—174°. — *2-Phenylchinolin-4-carbonsäureallylesterjodhydrat* aus A. orangegelbe Nadeln, F. 92—94°, wasserfrei dunkelorange gefärbt, F. 123—125°. — *Hydriodid des 2-Phenylchinolin-4-carbonsäurebenzylester*, wasserfrei metall. glänzende, purpurrote Krystalle, F. 125—127°. — Zur Herst. des *Propyl-*, *n-Butyl-* u. *i-Butylesters* der *2-Phenylchinolin-4-carbonsäure* wird entweder die freie Säure mit dem betreffenden wasserfreien Alkohol u. gasförmiger HCl oder das Chlorid mit dem Alkohol behandelt. Die Ester aus A. farblose Prismen, *Propylester*, F. 63—64°, *n-Butylester*, F. 56—57°, *i-Butylester*, F. 39—40°, sind in h. A. u. Aceton ll., in W. nahezu unl. (A. P. 1501875 vom 18/7. 1921, ausg. 22/7. 1924.)

SCHOTTLÄNDER.

Ernest Adams und John Raven Johnson, Urbana, Illinois, V. St. A., *Herstellung von den Arsensäurerest enthaltenden Verbindungen der heterocyclischen Reihe*. Kondensiert *Aminoarylsarsinsäuren* oder deren Derivv. in alkoh. Lsg. oder in wässr. Lsg. in Gegenwart von 1 Mol. eines aliphat. oder aromat. Aldehyds u. 1 Mol. *Brenztraubensäure* durch 3std. Erhitzen am Rückflußkühler u. krystallisiert die gegebenenfalls ausgeschiedenen Lsgg. abgeschiedenen Reaktionsprodd. aus den gewöhnlichen Lösungsm. um. — Vermutlich entstehen hierbei *Arsinsäuren* der *Chinolin-4-carbonsäure* bzw. die entsprechenden Derivv. des *1-Phenyl-4,5-diketopyrrolidins*. z. B. aus *p-Aminophenylarsinsäure*, *Benzaldehyd* u. *Brenztraubensäure* (*2-Phenyl-4,5-diketopyrrolidin-6-arsinsäure*?) aus A. cremfarbiges krystallin., sich bei 180° dunkelgelb u. bei 186—187° unter Zers. schm. Pulver, in 2 Mol. NaOH mit neutraler, in 3 Mol. mit schwach alkal. Rk. l., aus der Lsg. in 2 Mol. NaOH fällt CuSO₄ als gelbes Salz, AgNO₃, Pb(NO₃)₂, HgNO₃, Hg(NO₃)₂ u. Cd(NO₃)₂ fallen gelbe, Fe(NO₃)₃ rötlichbraune Ndd. — *Verb.* aus *Isaldehyd*, *p-Aminophenylarsinsäure* u. *Brenztraubensäure* gelbe, sich bei 159° dunkelfärbende, bei 164—165° unter Zers. schm. Krystalle. — *Verb.* aus *o-Methoxybenzaldehyd*, *Arsanilsäure* u. *Brenztraubensäure* gelbe, sich bei 165° dunkelfärbende u. bei 173—176° unter Zers. schm. Krystalle. — *Verb.* aus *p-Chlorbenzaldehyd*, *Arsanilsäure* u. *Brenztraubensäure* gelbe, sich bei 160° dunkelfärbende, bei 163—135° unter Zers. schm. Krystalle. — *Verb.* aus *p-Brombenzaldehyd*, *Arsanilsäure* u. *Brenztraubensäure*, cremfarbig, sich bei 150—155° zers. Krystalle. — *Verb.* aus *Piperonal*, *Arsanilsäure* u. *Brenztraubensäure* gelbe, sich bei 170—175° dunkelfärbende, bei 176—178° unter Zers. schm. Krystalle. — *Verb.* aus *o-Nitrobenzaldehyd*, *Arsanilsäure* u. *Brenztraubensäure* tiefgelbe, bei 176—180° sich zers. Krystalle. — *Verb.* aus *Zimtaldehyd*, *Arsanilsäure* u. *Brenztraubensäure* braunes, unterhalb 250° nicht schm. Pulver, das bei 220—240° ganz allmählich unter Entw. von CO₂ zers. — *Verb.* aus dem Reaktionsprod. von *Chloracetanilid*, C₆H₅NH·CO·CH₂·Cl, auf das Na-Salz der *p-Aminophenylarsinigen Säure*, C₆H₄(NH₂)⁴·(AsH·[OH])¹, *Benzaldehyd* u. *Brenztraubensäure* gelbe, bei 170° sich dunkelfärbende, bei 173—175° unter Zers. schm. Krystalle. — *Verb.* aus *o-Aminophenylarsinsäure*, *Benzaldehyd* u. *Brenztraubensäure* bei 245° sich dunkelfärbende, bei 253—254° unter Zers. schm. Krystalle. In wässr. Lsg. die Verbb. swl., in Alkalien ll., mit 1 Mol. Alkali entstehen schwach sauer reagierende Lsgg. Die wss. Lsgg. der Alkalisalze haben starke trypanocide Wrkg. in therapeut. Verwendung. (A. P. 1501894 vom 27/12. 1921, ausg. 22/7. 1924.)

SCHOTTLÄNDER.

Abbott Laboratories, übert. von: **Ernest H. Volwiler**, Chicago, Illinois, *Herstellung von Doppelverbindungen aus Dialkylbarbitursäuren und 1-Phenyl-4-ethyl-4-dimethylamino-5-pyrazolon*. Ein Mol. einer Dialkylbarbitursäure, deren Alkylrest höher als C₂H₅ sein muß, u. 2 Mol. des Pyrazolonderiv. werden in kleinen Mengen A. oder Aceton gel. u. zum Sieden erhitzt. Nachdem der überschüssige Teil des Lösungsm. verdampft ist, wird die Temp. auf 100—108° gesteigert,

wobei das Gemisch sich dunkelgelb färbt u. vollständig zusammenschm. Abkühlen scheidet sich die Doppelverb. als hellgelbe krystallin. M. ab. — Spiele sind angegeben für die Herst. der *Doppelverb.* aus 2 Mol. 1-Phenyl-2,3-dimethyl-4-dimethylamino-5-pyrazolon u. 1 Mol. Di-n-butylbarbitursäure, F. 94,5—96° — bezw. 1 Mol. Äthyl-n-butylbarbitursäure, F. 88—90°, — bezw. 1 Mol. Äthyl-sec-butylbarbitursäure, F. 84—86°, — bezw. 1 Mol. Äthyl-i-amylbarbitursäure, F. 90°. Die Doppelverb. sind in den meisten organ. Lösungsm. ll., meist unl. u. ll. in h. W. Beim Erhitzen mit wss. Mineralsäuren erfolgt Zers. in die Komponenten. Die Prodd. haben stark analget. u. hypnot. Wrkgg., die diejenige Gemischen der Komponenten bei geringerer Toxizität wesentlich übertrifft. Äthyl-sec-butylbarbitursäure, Krystalle, F. 158°, wird durch Kondensation mit Harnstoff zu Äthyl-sec-butylmalonsäurediäthylester, Kp.₄₈ 133°, in Ggw. von NaCl, — Äthyl-i-amylbarbitursäure, Krystalle, F. 145—146°, in analoger Weise zu Äthyl-i-amylmalonsäurediäthylester, Kp.₇₅₀ 260°, erhalten. (A. P. 1478463 vom 12/12. 1922, ausg. 25/12. 1923.) SCHOTTLÄNDER

Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Leverkusen bei Köln i. Rh. übert. von: **Walter Kropp** und **Ludwig Taub**, Elberfeld, *Herstellung einer Verbindung aus Phenyläthylbarbitursäure und 1-Phenyl-2,3-dimethyl-4-dimethylamino-5-pyrazolon*. Man läßt die Komponenten in geeigneten Lösungsm. aufeinander einwirken oder schm. sie zusammen. — Ein Beispiel für das Arbeiten in Äthylalkohol ist angegeben. Die Verb., aus Bzl. Nadeln, F. 132°, l. in A., hat stark analget. u. hypnot. Wrkg. Die durchschnittliche Einzeldosis beträgt ca. 0,5 g. (A. P. 153446 vom 15/10. 1923, ausg. 16/9. 1924.) SCHOTTLÄNDER

Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Leverkusen bei Köln i. Rh. übert. von: **Ludwig Taub**, **Ludwig Schütz** und **Kurt Meisenburg**, Elberfeld, *Herstellung der Crotylallylbarbitursäure*. Man kondensiert Crotylallylmalonsäurediäthylester mit Harnstoff in Ggw. von NaOC₂H₅. Die Crotylallylbarbitursäure bildet in W. Nadeln, F. 125—126°, l. in A.; Na-Salz krystallin. in W. ll. Pulver ist ein wirksames *Hypnoticum*. Die durchschnittliche Dosis beträgt 0,25—0,5 g. (A. P. 141111 vom 27/8. 1923, ausg. 14/10. 1924.) SCHOTTLÄNDER

A. Boake Roberts & Co. Limited, London, und **Oswald Silberrad**, Rushurst Hill, Essex, England, *Chlorieren organischer Verbindungen*. Man benutzt die zu chlorierende Verb. mit einem Gemisch aus Sulfurylchlorid, Aluminiumchlorid u. Schwefelchlorür. — Z. B. wird p-Dichlorbenzol mit AlCl₃ vermischt u. in reichem Strahl eine Mischung von SO₂Cl₂ u. S₂Cl₂ dazu fließen gelassen. Hierauf wird einige Stdn. unter Rückfluß auf 100° erhitzt, W. u. Bzl. zu dem Reaktionsgemisch dazugegeben u. bis zur vollständigen Lsg. weiter erwärmt. Beim Abkühlen krystallisiert aus der Lsg. als Hauptprod. Tetrachlorbenzol aus, das abfiltriert wird. Bei der Dest. der Mutterlauge lassen sich weitere Mengen des Tetrachlorbenzols neben geringen Mengen Tri- u. Hexachlorbenzol abscheiden. In analoger Weise lassen sich andere aromatische Verb., wie Anthrachinon, Indanthren, Naphthalin u. dessen Deriv., chlorieren. — An Stelle von fertigem S₂Cl₂, lassen sich auch H₂S oder Sulfide des Fe, Al, Sb, P, verwenden. Das Verf. eignet sich besonders zur Chlorierung nach den üblichen Methoden nur schwierig chlorierbarer Stoffe. Selbst das reaktionsträge Tetrachlorbenzol läßt sich so leicht in Hexachlorbenzol überführen. (E. P. 193200 vom 16/12. 1921, ausg. 15/3. 1923.) SCHOTTLÄNDER

X. Farben; Färberei; Druckerei.

J. B. Speakman, *Das Verhalten von Wolle als amphoter Kolloid: Ein Beitrag zur Theorie des Färbens*. Berücksichtigt man bei der Zeichnung von Kurven die Aufnahme verschiedener Säuren durch Wolle die verschiedenen [H⁺], so ergibt sich, daß die Aufnahme von Säuren durch Wolle eine chem. Verb. ist. Es

mehr als wahrscheinlich, daß das Färben von Wolle u. Seide mit sauren u. Farbstoffen auf chem. Kräften u. Änderungen beruht u. nicht, wie v. GEORGE annimmt (Monatshefte f. Chemie 1911. 655. 1075) auf Adsorption. (Journ. Soc. Dyers Colourists 40. 408—11. 1924.)

SÜVERN.

J. Cross und P. E. King, *Beizen von Wolle mit einigen Chromverbindungen*. Bei geringer Mengen Cr auf Wolle wird empfohlen, die Probe unter Zusatz von H_2O_2 zu veraschen, die Lsg. des Rückstands nach Zugabe von $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ zu versetzen, überschüssiges Ferroammoniumsulfat zuzusetzen u. den Überschuß mit FeSO_4 zurückzutitrieren. Die bei Verwendung von Chromosolbeize, Metachrombeize, Dichromat u. Essigsäure in verschiedenen Zeiten von der Faser aufgenommenen Mengen sind angegeben. (Journ. Soc. Dyers Colourists 40. 357—59. 1924.)

SÜVERN.

R. Koechlin, *Neue Art der Reserve*. Man versetzt die gewöhnlichen Reserven mit einer mechan. wirkenden Reserve wie SnO_2 , BaSO_4 usw., in manchen Fällen noch Terpentin u. Wachs. Die Weißreserve kann einfach aus ZnO u. Albumin bestehen. Man druckt, dämpft u. pflatscht auf der Rückseite die gewünschte Farbe auf einer Walze auf, die so tief graviert ist, daß die Farbe vollständig durch das Gewebe hindurchgeht. Dann dämpft man u. seift. (Bull. Soc. ind. Mulhouse 90. 642—6. 1924.)

SÜVERN.

Camille Rebert und Louis Lantz, *Farbige Reserven und Conversionen unter Schwarz*. Zur Erzielung farbiger Reserven u. Conversionen unter Anilin-schwarz hat PLUZANSKI auf Reserven ein mit Immedialfarben versetztes Schwarz gedruckt. Um unter p-Phenylendiaminbister von HENRI SCHMID wasch- u. seif- fähige Färbungen zu erzielen, erwiesen sich Indigo-, Thioindigo- u. Indanthren-farbstoffe als geeignet. Die Reserve muß außer dem zur Verhinderung der Bister-färbung nötigen Alkali überschüssiges Ätzalkali u. ein Reduktionsmittel zur Fixierung des Farbstoffs enthalten. Zusatz von Glycerin erhöht die Ausnutzung des Farbstoffs. Verschiedene Vorschriften werden gegeben. (Bull. Soc. ind. Mulhouse 90. 643—40. 1924.)

SÜVERN.

Société de la manufacture Emile Zundel und Camille Rebert, *Envalage auf Bistergrund*. Ein schönes Rot auf Chrysoidinbistergrund hat man bisher nicht erzielt. Es wird erzielt, wenn man das mit p-Nitranilinrot gefärbte Gewebe mit einem Chromierungsfarbstoff übersetzt, der sich mit Chlorat-Blutlaugensalz oder Natriumsulfatformaldehyd ätzen läßt u. durch ein rasches Durchnehmen durch den Dampfplatt fixiert wird. Ein solcher Farbstoff ist das Chromalblau G von J. R. GEIGY, dessen Vorschrift für Ausführung des Verf. (Bull. Soc. ind. Mulhouse 90. 642—43. 1924.)

SÜVERN.

Henry Dosne, Bericht zu der Arbeit der Société de la manufacture Emile Zundel und Camille Rebert über Envalage auf Bistergrund. (Vgl. vorst. Ref.) Der Übersetzen von p-Nitranilinrot mit Chromalblau G erhaltene Bister verändert sich am Licht u. verschießt nach Rot. Ein echter Bister läßt sich durch Färben mit Indigo erzielen. Die Verwendung von Indigosol ist beschrieben. Ein Seibätzen dient Rongalit CL u. ZnO , für Rotätze eine alkal. Reserve mit Natrium oder eine oxydierende mit Chloratblutlaugensalz. (Bull. Soc. ind. Mulhouse 90. 645—5. 1924.)

SÜVERN.

J. Hooley, *Neue Entwicklungen in Anthrachinonküpenfarbstoffen*. Es wird ein bestrebbendes Ziel hingestellt, l. Anthrachinonküpenfarbstoffe herzustellen, die in genügender Beständigkeit sich in W. ohne Zuhilfenahme von Lösungsmitteln auflösen. Affinität zur Faser haben u. sich aus der Küpe leicht wieder ohne Beeinträchtigung der Echtheit in den Farbstoff zurückverwandeln lassen. Für das Färben müssen sie sich ohne Alkalien lösen. Als erster l. Farbstoff kam das Jadegrün der Scottish Dyes Ltd. auf den Markt, welches jetzt als Soledon

Jadegrün erscheint. Angaben über Anwendung u. Eigenschaften des Farbstoffes. (Chem. Age 22. 4—5.)

Henry Mayer, Über die Stempelfarben. Anforderungen, die an Metallschneidwerkzeuge für Kautschukstempelfarben zu stellen sind, nebst prakt. Hinweisen u. zahlreiche Abbildungen. (Seifensieder-Ztg. 52. 11—12. 33—35.)

A. Junk, Verfahren und Apparat zur Prüfung der Dichtigkeit von Anstrichen. Zur Prüfung der Dichtigkeit von Anstrichen auf Metall verbindet man den Apparat leitend mit einem Pol einer Batterie u. streicht mit einem an den anderen Pol angeschlossenen Metallpinsel über den Anstrich. Den an undichten Stellen durchgehenden Strom macht man durch ein Dosentelephon kenntlich. Der Apparat wird von der Firma K. GALLE, Berlin SO, Kottbuserstr. 8, geliefert. (Ztschr. angew. Ch. 38. 8—9.)

Silver Springs Bleaching & Dyeing Co. Ltd. und A. J. Hall, Comp. Cheshire, Färben von Celluloseacetat. Man färbt mit 2,4-Dinitrodiphenylamin, das keine SO₃H-Gruppe enthalten, aus wss. Lsg. oder Suspension bei etw. 100°C. unter Zusatz von Türkischrotöl, Seife, NH₃ usw. Als 2,4-Dinitrodiphenylamin kann man die OH-, NH₂-, N-Methyl-, NH-Acyl-, CO₂H-Derivv. benutzen. (E. P. 222001 vom 27/11. 1923, ausg. 16/10. 1924.)

Standard Silk Dyeing Co., Paterson, New Jersey, übert. von: J. E. Standard, New Jersey, V. St. A., Färben von Seide. Man färbt Seide oder Gemisch aus Seide mit anderen Fasern, wie Baumwolle, im Stück, im Bastseifenbade oder in der W. u. behandelt dann in besonderen Bädern mit Tannin u. Brechweinstein. Man färbt z. B. Seide mit einem diazotierbaren substantiven Farbstoff in einem Seifenbad, säuert mit Essigsäure an u. behandelt darauf mit Tannin u. Brechweinstein, diazotiert u. entwickelt mit Soda, hierauf wird im kochenden Seifenbade gewaschen u. abgesäuert; die Färbungen sind echt gegen warme, aber nicht gegen kochende Seifenslg. (E. P. 222520 vom 3/4. 1923, Auszug veröff. 26/11. 1924. Prior. 1/12. 1922.)

Hans Theodor William Jörgensen und Oscar Otto Nørregaard, Copenhagen, Herstellung einer matten Ölfarbe. (D. R. P. 406688 Kl. 22g vom 31. 12. 1923, ausg. 25/11. 1924. — C. 1925. I. 305.)

Etienne Sardou, Fernand Boule, Segond Mordaci und Emilien Comen, Marseille, Frankreich, Herstellung von Druckflächen. Das auf eine Bleiplatte geprüßte Muster wird mit einer dünnen gleichmäßigen Schicht von Natriumsilber überzogen, dann bringt man eine Schicht von unvulkanisiertem Kautschuk auf einem Papier auf der Rückseite auf, preßt den Kautschuk auf u. vulkanisiert. Nach dem Vulkanisieren wird die Kautschukschicht von der Form abgezogen u. auf Druckwalzen befestigt. (A. P. 1509112 vom 14/9. 1922, ausg. 23/9. 1924.)

E. Tioka, Veseli an der March, Wasserfester Anstrich, bestehend aus einer Mischung von W., Alaun, Leinöl u. fertiger Seife oder mittels NaOH verseiftes Palmöl oder Talg. (E. P. 223153 vom 14/4. 1924, ausg. 6/11. 1924.)

A. A. Govan, Edinburg, Masse zur Herstellung von Schutzüberzügen, bestehend aus der Lsg. eines bituminösen Stoffes u. glimmerhaltigem Eisenerz. (E. P. 234000 vom 6/3. 1924, ausg. 13/11. 1924.)

XI. Harze; Lacke; Firnis.

W. M. Myers, Fossiler Kaurikopal Neu-Seelands. Eine kurze Beschreibung der Gewinnung u. Verwendung dieses wichtigen Handelsartikels. (Chem. Metallurgy Engineering 31. 663—64. 1924. New Brunswick Station, Bureau of Mines.)

W. M. Myers, Einige Bemerkungen über Kopalharz. Vf. beschreibt unter and.

ng der Herkunftsländer Gewinnungsmethoden, Verwendung sowie Handelswert
chiedener Kopalharze. (Chem. Metallurg. Engineering **31**. 702. 1924.) OEHLER.

georges Kimpflin, *Die französische Industrie von synthetischem Harz*. Sammel-
rt über die Herst. von synthet. Harz u. seine Verwendung in der Technik.
soc. encour. industrie nationale **123**. 657—71. 1924.) GRIMME.

Ludwig Hecht, *Normung in der Industrie der Lacke und Anstrichfarben*.
über WÜRTH (Farben-Ztg. **29**. 1311; C. **1924**. II. 1028) wird auf die
ierigkeiten der Lacknormierung hingewiesen u. geraten, die Normung zurück-
len. (Farben-Ztg. **30**. 507—8. 1924.) SÜVERN.

t. E. Conde, *Nitrocellulosehaltige Firnislacke, neue amerikanische Gaben*. Es
rzt sich um transparente Lsgg. von Nitrocellulose u. verschiedenen Gummi-
n, die mit aktiven oder inaktiven Lösungsmm. gemischt sind. Art der
sgsmm. u. Verwendungsmöglichkeiten der Lacke werden besprochen. (Rev.
roduits chim. **27**. 794—95. 1924. Nach Canadian Chemistry and Metallurgy
2 219—21.) SÜVERN.

L. Würth, *Hauchbildung bei Schwarzlacken*. Zur Vermeidung von Hauch-
ig bei Stearinpechlacken muß das Verh. des Stearinpechs gegen die mit-
ndeten Lösungsmm. berücksichtigt werden. (Farben Ztg. **30**. 626. 1924.) SÜ.

-, *Einfache Prüfung von Farben und Lacken. Entwurf eines Betriebsblattes des*
71. Der Ausschuß für wirtschaftliche Fertigung gibt in dem Blatte nach Be-
fklärungen Vorschläge für die Prüfung auf Streichfähigkeit, Ausgiebigkeit,
en- u. Deckfähigkeit, für die Prüfung der Härte u. für Farbenvergleiche.
en-Ztg. **30**. 624—25. 1924.) SÜVERN.

ine Waste Products, Inc., New York, übert. von: Frank E. Greenwood,
y Rochelle, New York, *Gewinnung von Harz*. Coniferenholz oder andere harz-
ten Stoffe werden zur Neutralisierung der sauren Anteile mit wss. NH₃ be-
hlt, nach dem Trennen vom Holz u. Abkühlen wird die ammoniak. Fl. mit
e flüchtigen Lösungsm., Terpentinöl, Gasolin, PAe., extrahiert, nach dem
en der Schichten wird das Lösungsm. abdestilliert; auf die gleiche Weise
man Rohharz reinigen. (A. P. **1511461** vom 25/8. 1920, ausg. 14/10. 1924.) Fz.

éza Austerweil, Boulogne b. Paris, *Gewinnung von Kolophonium und*
tinöl aus Nadelhölzern, insbesondere deren Wurzelstöcken (Stubben), mit
gen Lösungsmm., dad. gek., daß in dem zerkleinerten Ausgangsmaterial vor
extraktion durch Windsichtung oder durch Tauchen in eine Fl. die harzarmen
ndteile von den harzreichen Bestandteilen getrennt werden. — Nur die harz-
n Teile werden extrahiert, der Extraktionsrückstand kann zusammen mit dem
chiedenen leichten Mahlgut auf Papier verarbeitet werden. Der schwere
t des Mahlgutes gibt bei der Extraktion 9,1% Harz u. 2,25% Terpentinöl.
P. **405322** Kl. 22h vom 22/3. 1923, ausg. 31/10. 1924.) FRANZ.

arleton Ellis, Montclair, New Jersey, übert. von: Trevor S. Huxham,
field, New Jersey, V. St. A., *Harzartige Kondensationsprodukte aus Ketonen*
ldehyden. Man behandelt aliph. Ketone, wie Aceton, Methyläthylketon, Di-
eton in Ggw. von alkal. KOH oder NaOH mit Formaldehyd, Paraformaldehyd,
dehyd, Paraldehyd oder Furfural ohne äußere Wärmezufuhr. — Es entstehen
ist nach dem Ansäuern in Aceton, A., Toluol u. Monochlorbenzol l., schmelz-
harzartige Kondensationsprodd., die bei längerem Erhitzen auf Temp. über
nl. u. unschmelzbar werden. Gegebenenfalls muß zur Härtung eine Weiter-
nsation der l. Harze mit neuen Mengen CH₂O u. alkoh. Alkali erfolgen. Die
dienen in üblicher Weise zur Herst. von Lacken u. plast. MM. Beispiele
e Kondensation von Aceton mit CH₂O bzw. Paraformaldehyd in Ggw. von

alkoh. NaOH sind angegeben. (A. P. 1482929 vom 10/9. 1921, ausg. 5/1924.) SCHOTTLÄND.

Carleton Ellis, Montclair, New Jersey, V. St. A., *Herstellung von Kondensationsprodukten aus Aceton und Formaldehyd*. Man behandelt Aceton mit Formaldehyd in Ggw. geringer Mengen sehr verd. bas. Katalysatoren, zweckmäßig Ac. Carbonaten, bezw. einem Gemisch aus Na_2HPO_4 u. wenig NaOH. — Je nach Einwirkungsdauer u. den innegehaltenen Temp. erhält man Kondensationsprodukte, die in W. l. Sirupe, in A. l. viscose, rohkautschukartige MM., in A. l. feste oder unl. u. unschmelzbare plast. MM. bilden. Das Verf. führt zu wasserlöslichen, durchsichtigen oder trüben weißen bis elfenbeinfarbenen Prodd., die, je nach physikal. Beschaffenheit, zur Herst. von Lacken, Firnissen, Imprägnier- u. Klebmitteln, wärmeisolierenden Gegenständen oder als Ersatz für Bernstein u. Cellulose zwecks Gewinnung von Gebrauchsgegenständen aller Art, dienen können. Die bekannte Kondensation in Ggw. von starken Alkalien lieferte lediglich dunkle oder bräunlich gefärbte harzige MM. von hoher Brüchigkeit. (A. P. 1502944 vom 3/4. 1922, ausg. 29/7. 1924.) SCHOTTLÄND.

Badische Anilin- & Soda-Fabrik, Ludwigshafen a. Rh., (Erfinder: **H. H. Ramstetter**, Ludwigshafen, und **Hans Krzikalla**, Mannheim), *Herstellung von Kunststoffen, Filmen, Lacken u. dgl.*, dad. gek., daß man dem durch Kondensation von Harnstoff bezw. Harnstoffderiv. mit CH_2O gewonnenen Kondensationsprodukten zweckmäßig in einem organ. Lösungsm., einen oder mehrere nicht oder schwer flüchtige, insbesondere organ. Stoffe, die imstande sind, mit dem Kondensationsprodukt feste Lsgg. zu bilden, hinzufügt. — Man setzt den Lsgg. z. B. Cellulose, natürliche u. künstliche Harze, Weichmachungsmittel, wie Campher oder Campherersatzmittel zu; die hierbei entstehenden fl. oder festen Lsgg. oder homogenen Gemische dienen zur Herst. von Lacken, Klebmitteln, Kunstseide, Filmen, Imprägniermassen usw. (D. R. P. 404024 Kl. 39b vom 10/10. 1922, ausg. 16/10. 1924.) FR./Z.

Chemische Fabrik Schwalbach Akt.-Ges., Wiesbaden, *Herstellung von Celluloselacken*, insbesondere zum Verlacken von Flaschen dad. gek., daß dem Lack ein Gemisch von Al-Pulver u. Glimmerpulver zugesetzt wird. (D. R. P. 404024 Kl. 22h vom 24/6. 1923, ausg. 23/10. 1924.) FR./Z.

Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Leverkusen b. Köln (Erfinder: **Leo Rosenthal**, Vohwinkel). *Lacke*, nach D. R. P. 383699, dad. gek., daß Äthylenchlorhydrin ganz oder teilweise durch Monochlorhydrin ersetzt wird. Ein Gemisch von 60 Teilen W. u. 40 Teilen Monochlorhydrin löst Acetylcellulose mit einem geringeren Gehalt als 50% Essigsäure, während Acetylcellulose in mehr als 50% Essigsäure kaum angegriffen werden, man kann auch Gemisch v. Monochlorhydrin mit Äthylenchlorhydrin u. W. anwenden; die Lsgg. können zur Herst. von Farben für den Rotationsdruck dienen. (D. R. P. 406426 K 22 vom 30/1. 1923, ausg. 18/11. 1924. Zus. zu D. R. P. 383699. C. 1924. I. 252.) FR./Z.

Badische Anilin- & Soda-Fabrik, Ludwigshafen a. Rh., *Herstellung von Lacken* mittels Ester der durch Hydrierung von Ketonöl erhältlichen Alkohole, bezw. des durch Esterifizierung des durch Hydrieren des Ketonöls erhaltenen Gemisches, darin bestehend, daß man hierbei Gemische dieser Verbb. zusammen mit höherem Lösungsm. verwendet. — Man benutzt als höheres Lösungsm., z. B. Cyclohexanon, Cyclohexanolacetat, Methylhexanon, Äthylenchlorhydrin usw. (D. R. P. 406426 Kl. 22h vom 14/4. 1923, ausg. 1/12. 1924.) FR./Z.

Paul Haguenauer, Seine, Frankreich, *Emaillack*. Man vermischt lösliches harzartiges Harz mit 15—17% hellem Harzöl, erwärmt auf 280°, versetzt mit 1% Zinkstaub u. gibt allmählich die berechnete Menge Glycerin zur Veresterung zu, erwärmt kurze Zeit auf 300° u. hält dann noch einige Zeit auf 280°; der erhaltene Lack ist

neutral, so daß eine Verdickung des Lackes auf Zusatz von Zn- oder Pb-
 g-
 nten nicht eintritt. (F. P. 574582 vom 17/12. 1923, ausg. 16/7. 1924.) Fr.
 onrad Beyer, Berlin, *Herstellung von Kollodiumlacken*. Man setzt den
 oliumlsgg. Formamid zu, man erhält ohne Zusatz von Ölen elastische Überzüge.
 98031 vom 5/5. 1923, ausg. 25/9. 1924. D. Prior. 7/9. 1922.) FRANZ.

XII. Kautschuk; Guttapercha; Balata.

de Vries und N. Beumee-Nieuwland, *Koagulationserscheinungen bei Hevea*
 II. *Untersuchungen mit B-Flüssigkeit. Fortnahme der Koagulationsfähigkeit*
 Erhitzen; Koaleszierung durch Impfen mit frischem Latex oder mit Extrakten.
 Archief Rubbercultuur Nederland-Indie 8. 233; C. 1924. II. 2371.) Durch
 en unter Zusatz bestimmter Stoffe verliert Hevea-Latex die Fähigkeit nach
 Zusatz ein zusammenhängendes Koagulum zu liefern. In dem entstehenden
 N. oder Brei kann durch Impfen mit frischem Latex oder bestimmten
 ten oder auf andere Weise (Zusatz von A, Säureüberschuß usw.) Zusammen-
 erzeugt werden. Eine solche, nicht zusammenhängende Kautschukfällung
 nach BARROWCLIFF (vgl. Journ. Soc. Chem. Ind. 37. 49; C. 1919. II. 854)
) wie folgt bereitet: Zu 900 ccm sd. W. 100 ccm Latex zusetzen, umschütteln,
 langsam zum Sieden erhitzen, 3 Min. kochen, langsam auf dem w. Draht-
 abkühlen lassen; 100 ccm davon mit 2 ccm Essigsäure ($2\frac{1}{2}\%$) stehen lassen.
 is den vorliegenden Ergebnissen ist hervorzuheben, daß Latex 1 : 9 bei 65°
 higkeit ein Koagulum zu liefern, allmählich verliert, noch mehr bei höherer
 Bei 40—45° ist nach Impfung die Koaleszenzgeschwindigkeit $1\frac{1}{2}$ —2 mal so
 als bei 30°. Bei 65° gibt Essigsäure bereits allein (ohne Impfung) Koaleszenz.
 ten Koagulationsgebiet erreicht die Koaleszenzgeschwindigkeit bei zunehmen-
 säuregrad einen Höchstwert bei 0,01-n. Essigsäure oder 0,005-n. HCl. Eben
 zeiten fl. Gebiet erreicht man einen Säuregrad, der die Koaleszenz vernichtet;
 zeiten Koagulationsgebiet entsteht durch die Säure allein Zusammenhang. Von
 chied auf die Geschwindigkeit der Zusammenhangsbildung beim Impfen ist
 die Impffl. vor oder nach der Säure zugefügt wird; nur im ersten Falle ist
 Katalysator gleichmäßig über die Kautschukkügelchen verteilt, im zweiten Falle
 r bereits mit dem Kautschuk vorher vollständig ausgeflockt u. daher weniger
 k. Aus dem Essigsäurekoagulum läßt sich mit W. der Katalysator nicht
 zen. Ein Impfextrakt erhält man aber leicht durch Ausziehen des Alkohol-
 gums mit W. Dieser Auszug verliert durch Säuren, NH_3 , Erhitzen, nicht
 durch Spuren von HCN, KCN, Chlf., Thymol, Glycerin die Impffähigkeit. Auch
 uszüge aus Heveasamenkernen besaßen impfende Fähigkeit. Weitere Einzel-
 im Original. — Kautschuk aus B.-Fl. war in seinen Eigenschaften von
 tchuk aus 1 : 9 verd. Latex nicht wesentlich verschieden. (Archief Rubber-
 u. Nederland-Indie 8. 726—82. 783—98. 1924. Buitenzorg.) GROSZFELD.
 Bobilioff, *Untersuchungen über die bei Hevea Brasiliensis vorkommenden*
 ionsenzyme. Gefunden wurden Peroxydase, Oxydase, Katalase u. Tyrosinase,
 stes Enzym ist die Peroxydase, in den Früchten finden sich auch große
 von Tyrosinase. Die Enzyme sind nicht in den Milchsaftegefäßen lokalisiert,
 en in den Früchten. Aus Latex, Früchten, Rinde u. Blättern wurden in üblicher
 feste Enzympräparate dargestellt. Durch Einw. der Temp. ist im Latex der
 eine Scheidung der Enzyme durchführbar. Die Schwarzfärbung durch
 ase wird bei 70°, die Orangebraunfärbung durch Peroxydase bei 80—85°
 Wrkg. gesetzt. Für die Verfärbung des Latex aus Rinde ist hauptsächlich
 ase die Ursache, durch Verdünnen mit W. lassen sich die Färbungen
 her veranschaulichen. Die optimale Wrkg. der Enzyme hängt nicht nur von
 ab, sondern auch von den Stoffen, die die Rk. bedingen. So liegt das
 I. 1.

Optimum beim Citratpuffer bei $p_H = 4,65-4,95$, beim Boraxpuffer bei $p_H =$ bis 8,28. Gegen Alkalien sind sonst die Enzyme sehr empfindlich, vertragsaure Rk. gut (außer Tyrosinase). Bei Citratpufferlsgg. hört die Enzymwrk bei p_H 1,03 auf. Auf Zerstörung der Tyrosinase durch Essigsäure ist auf Vorherrschen der Peroxydase in gewöhnlichem Latex zurückzuführen. Durch u. Mg-Salze, besonders durch erstere, wird die Enzymwrkg. außerordentlich schleunigt. Bei Latex aus stark gezapften Bäumen nimmt der Enzymgehalt als O_2 übertragende Verb., wie sie zur Wrkg. der Peroxydase nötig ist, anorgan. Peroxyde, im besonderen im Latex vorkommende *Flavonderiv.* fest. Eine lose Bindung von O_2 an den Latex (ähnlich wie beim Blute) wurde nicht gefunden, dagegen kann man bei künstlichem Eingreifen (Einleiten von Lu u. Einw. der Katalase u. H_2O_2) eine so schwache Absorption von O_2 beobachten, diese bei den enzymat. Vorgängen keine Bedeutung haben kann. (Archief Bot. cultuur Nederland-Indie 8. 817—43. 844—45. 1924. Buitenzorg.) GROSZEF

Rudolf Ditmar, *Behältnisse und Verfrachtungsmittel von Latex*. Blechbehälter sind für den Versand von Latex ungeeignet; Fässer ebenso, weil Holz von Latex angegriffen wird u. bei dem Klimawechsel zu stark arbeitet. Vf. schlägt Gaskanballons vor mit Patentverschlüssen, die in Europa für H_2SO_4 verwendet werden können. Für den Transport im Großen in Schiffen eignen sich am besten Lacktanks, die zwecks gründlicher Reinigung bestei gbar sein müssen. (Chem.-Ztg. 48. 91—5—6. GRAZ.) JN

John B. Tuttle, *Wässrige Lösungen von koaguliertem Kautschuk, Balata u. Guttapercha*. Gegen den Prioritätsanspruch ALEXANDERS (Chem.-Ztg. 47. 91—C. 1924. I. 1450) wendet Vf. ein, daß es sich bei dem Verf. von ALEXANDER um die Herst. wirklicher Lsgg. unter Anwendung höherer Temp. handelt, während dem Verf. PRATTS bei niedrigen Temp. gearbeitet wird, um Depolymerisation zu vermeiden, u. Dispersionen erzeugt werden. — In der Erwiderung weist PRATTS ALEXANDER darauf hin, daß in der engl. u. amerikan. Patentschrift die Lsgg. ausdrücklich als kolloidale Lsgg. gekennzeichnet sind. (Chem.-Ztg. 48. 91—1924.) JN

C. W. H. Howson, *Gutta-Percha, ihre Bearbeitung und allgemeinen Eigenschaften*. Zusammenfassende Darst. des V., der Gewinnung, Aufbereitung, u. des Zus. von Gutta-Percha u. Balata. Der echte Gutta-Perchabaum kommt vornehmlich auf Borneo, dem größeren Teile von Sumatra u. auf der Halbinsel Malakka vor. Gummis, die dem echten Guttapercha ähnlich sind, insbesondere Balata, sind auch gefunden in Venezuela, Brasilien, Barbados, Costa Rica, Westindien u. auf den Färöer. Für Handelszwecke wird das Rohmaterial auf wenigstens vier Bestandteile, nämlich Harz, Schmutz, W., untersucht. Die Gutta ist der eigentlich wertvolle Bestandteil u. unterscheidet sich ganz wesentlich von den harzigen Stoffen, die mehr zu den Nebenbestandteilen u. nicht von Vorteil sind, wenn sie vorherrschen. Die Gutta ist im Gegensatz zu dem Harze unl. in k. PAe. Im allgemeinen ist Balata reiner als Harz als die besseren Sorten echte Guttapercha. Die Zus. roher u. gereinigter Sorten wird tabellar. mitgeteilt. (India Rubber Journ. 68. 999—1004. 1924.) JN

W. Carver, *Die Bearbeitung von Kautschuk zur Herstellung von Sohlen*. Vf. erörtert an Hand eigener Erfahrungen u. der Erfahrungen PINCHINGS die Aufbereitung des Kautschuks, angefangen von der Behandlung des Latex bis zur Fertigstellung, zur Herst. der Sohle bereiten Kautschuk (fine pale crepe). Zur Herstellung erstklassiger Sohlen darf nur ein ganz reiner Kautschuk von gleichmäßiger Beschaffenheit (even textured) verwendet werden. (India Rubber Journ. 68. 91—1924.) RILEY

V. C. Butironi, *Die Bestimmung von Schwefel in Mischungen von rohem u. vulkanisiertem Kautschuk*. KOH wird im Silbertiegel zum Schmelzen gebracht.

Schmelze gibt man 0,2—0,5 g der fein gespaltenen Probe u. rührt mit dickem Erdraht gut durch. Zur Oxydation des Schwefels trägt man unter ständigerhaltung des Schmelzflusses ca. 5 g KNO₃ in kleinen Portionen ein u. glüht bis Weißwerden. Nach dem Erkalten Schmelze in W. lösen, mit HCl-Lsg. schwach uern u. H₂SO₄ mit BaCl₂ fällen. (Giorn. di Chim. ind. ed appl. 6. 535—36. GRIMME.

Roar Limited, London, *Vorrichtung zur Gewinnung von Kautschuk aus Milch* (D. R. P. 398732 Kl. 39a vom 20/11. 1921, ausg. 18/7. 1924. E. Prior 2. 1920 u. 14/10. 1921. — C. 1922. IV. 255.) FRANZ.

General Rubber Company, New York, *Vorrichtung zur Herstellung eines Kenmittels für Kautschukmilch*, bei der eine Verbrennungskammer, eine Mischkammer, sowie ein Exhaustor zum Hindurchziehen der Gase durch die Mischkammer versehen sind, dad. gek., daß die Mischkammer überall einen gleichmäßigen Durchgangsquerschnitt hat u. der Lufteinlaß sowie der Gemischauslaß an den Enden der Kammer in gleicher Flucht liegen. — Es wird ein ungehinderter Durchgang der Verbrennungsgase durch die Mischkammer u. eine gute Mischung der Gase mit Luft erreicht. (D. R. P. 401801 Kl. 39a vom 14/3. 1922, ausg. 9/9. 1924. E. Prior. vom 7/12. 1921.) FRANZ.

P. Schidrowitz und M. S. Stutchbury, London, *Trocknen von vulkanisiertem Kautschukmilchsaft*. Vulkanisierter Kautschukmilchsaft wird in einem gasförmigen Kenmittel zerstäubt, hierbei kann ein Teil oder das gesamte Wasser entfernt werden. Das trockne Prod., das seine Plastizität noch einige Zeit behält kann getrocknet werden. Man kann es auf Mischwalzen mit Füll- u. Farbstoffen vermischen, man kann diese Stoffe aber auch dem vulkanisierten Kautschukmilchsaft vor dem Trocknen zusetzen. (E. P. 220341 vom 21/2. 1923, ausg. 11/9. 1924.) FRANZ.

General Rubber Company, V. St. A., *Verfahren und Vorrichtung zum Trocknen von koagulierbaren Flüssigkeiten, insbesondere von Kautschukmilch*. Eine drehbar angeordnete, heizbare Trommel taucht in ein mit Kautschukmilch gefülltes Gefäß, die Höhe der Fl. in dem Gefäß wird konstant gehalten, die auf der Trommel gebildete Kautschukschicht wird von einer Walze abgenommen, sobald die auf der Trommel befindliche Kautschukschicht die gewünschte Stärke erreicht hat, wird die Schicht gegen eine andere ausgetauscht. (F. P. 575390 vom 29/11. 1923, ausg. 1/12. 1924. A. Prior. 18/7. 1924.) FRANZ.

Hans Odenwald, Hannover-Limmer, *Trocknen von gewaschenem Rohgummi* durch Erhitzen, dad. gek., daß der Rohgummi einige Male durch ein Mischwalzwerk mit an oder geriffelten Walzen bei enggestellten Walzen geführt u. von seiner Feuchtigkeit an der Oberfläche befreit u. sodann auf einem zweiten geheizten Walzwerk oder mehreren so lange bearbeitet wird, bis die Feuchtigkeit auch aus dem Inneren des Felles herausgepreßt u. verdampft ist. — Der Gummi wird schnell getrocknet, man spart an Zeit, Raum u. Dampf. (D. R. P. 406561 vom 4/4. 1923, ausg. 21/11. 1924.) FRANZ.

Naugatuck Chemical Co., Naugatuck, Connecticut, übert. von: **S. M. Cadwell**, New York, *Verhüten des Alterns von Kautschuk, Guttapercha, Balata usw.* Man mischt Kautschuk mit etwa 5—10% des Kondensationsprod. aus Acetaldehyd u. Anilin; das Prod. aus 1½ Mol. Acetaldehyd u. 1 Mol. Anilin in saurer Lsg. verzögert die Oxydation des Kautschuks, ohne die Vulkanisationsgeschwindigkeit zu beeinflussen; das Prod. aus Acetaldehyd u. Anilin in wss. Lsg. verzögert die Vulkanisation u. beschleunigt die Vulkanisation; man kann den Kautschuk auch mit dem Kondensationsprod. bestreichen oder man erzeugt es auf dem Kautschuk, indem man den Kautschuk nacheinander den Dämpfen von Anilin u.

Acetaldehyd aussetzt. (E. P. 220320 vom 7/8. 1924, Auszug veröff. 8/10. 1924, Prior. 8/8. 1923.) FRAZ.

Naugatuck Chemical Co., Naugatuck, Connecticut, übert. von: **S. M. Cadys**, New York, *Verhüten des Alterns von Kautschuk, Guttapercha und Balata*. Man behandelt Kautschuk mit O-absorbierenden Stoffen, wie Kondensationsprodd. von Aminen oder NH₃ u. Aldehyden, Phenylhydrazin, Nitroso-2-naphthol, p-Aminophenolhydrochlorid, n-Butylnitril, Jodbenzol, Dichlorhydrochinon usw. (E. P. 220320 vom 7/8. 1924, Auszug veröff. 8/10. 1924, Prior. 8/8. 1923.) FRAZ.

Chauncey Chester Loomis, Yonkers, und **Horace Eugene Stump**, Brooklyn, New York, V. St. A., *Herstellung von Kautschukgegenständen aus Kautschukmilch*. Die durch teilweise Koagulation von Kautschukmilch erhaltene viscose Masse wird geformt oder auf Gewebe usw. aufgebracht; die Koagulation des Kautschuks wird dann bei der weiteren Verarbeitung vollendet. Man versetzt die Kautschukmilch z. B. mit löslichen Salzen der Erdalkali- oder Schwermetalle oder der wertigen Metalle, hierbei werden die Proteine in die Gele übergeführt u. agglomeriert oder man versetzt die Kautschukmilch mit einem der genannten Salze, Cl₂, Tannin usw. u. dann bei niedriger Temp. unter Rühren mit Säuren, wie Essigsäure, Ameisensäure. Man vermischt z. B. Kautschukmilch mit Zn-Acetat oder Al₂O₃ u. dann mit Essigsäure. Die erhaltene Paste wird dann aufgestrichen oder in Formen gebracht u. dann durch Pressen oder Verdampfen getrocknet, wobei vllt. Koagulation eintritt. Der Kautschukmilch kann man Schutzkolloide, wie Casein, Seifen, Saponin, Tannin, Agar-Agar, Füllstoffe, Vulkanisiermittel usw. zusetzen. (E. P. 223263 vom 15/5. 1923, ausg. 13/11. 1924.) FRAZ.

Chauncey Chester Loomis, Yonkers, und **Horace Eugene Stump**, Brooklyn, New York, V. St. A., *Herstellung von Kautschukgegenständen aus Kautschukmilch*. Die Kautschukmilch wird erst vulkanisiert u. dann teilweise koaguliert, die viscose Paste wird dann geformt oder aufgestrichen, getrocknet u. vulkanisiert. Die teilweise Koagulation kann durch Zusatz von CH₂O, Tannin, Metallsalzen u. durch folgendem Zusatz von Säuren bewirkt werden. Vor dem Koagulieren kann man der vulkanisierten Kautschukmilch Schutzkolloide, wie Leim, Eiweiß, Casein, Seifen, Tannin usw., Füll- u. Farbstoffe zusetzen. (E. P. 223264 vom 15/5. 1923, ausg. 13/11. 1924.) FRAZ.

The Naugatuck Chemical Company, Connecticut, übert. von: **Sidney M. Law**, well, Leonia, New Jersey, *Vulkanisieren von Kautschuk*. Als Vulkanisationsbeschleuniger verwendet man Verbb. von der Formel: C·(C·X)S(C·X)·C, wobei X Thiolbenzoesäureanhydrid, zweckmäßig in Ggw. von ZnO u. eines Amins. (E. P. 1510652 vom 1/4. 1922, ausg. 7/10. 1924.) FRAZ.

The Goodyear Tire & Rubber Company, übert. von: **Ellwood B. Seal**, Akron, Ohio, *Vulkanisieren von Kautschuk*. Man läßt einen fl. oder gasförmigen oder Lsgg. von Beschleunigern von aktiver Kohle adsorbieren u. vermischt sie mit Kautschuk. (A. P. 1511984 vom 5/1. 1923, ausg. 14/10. 1924.) FRAZ.

Robel & Fiedler Ges., Leipzig, *Konservieren von vulkanisierten Kautschukgegenständen*. Man behandelt den Kautschuk mit Stoffen, die Oxydation von Schwefel verhindern, z. B. Mischungen von Glycerin mit Benzaldehyd, oder Lsgg. von Zucker u. Phenylhydrazin; man vermischt diese Stoffe mit Lsgg. von Kautschuk u. reibt die Mischung in die Risse des Kautschuks. (E. P. 221788 vom 26/8. 1924, Prior. 13/9. 1923, Auszug veröff. 5/11. 1924.) FRAZ.

H. H. Duke, Rockdale, Sydney, Australien, *Vulkanisieren von Kautschuk*. Man vulkanisiert in geschlossenem Kessel in H₂S-Gas unter Druck. (E. P. 221992 vom 5/11. 1923, ausg. 16/10. 1924.) FRAZ.

H. O. Chute, New York, V. St. A., *Vulkanisieren von Kautschuk*. Als Vulkanisationsbeschleuniger verwendet man die Einwirkungsprodd. von Aldehyden.

CHO, Benzaldehyd, Furfuraldehyd auf Thioharnstoffe; man erhitzt z. B. eine wss. Lösung von Thioharnstoff mit Aldehydammoniak. (E. P. 222103 vom 2/9. 1924, Auszug veröff. 12/11. 1924. Prior. 18/9. 1923.) FRANZ.

T. Goldschmidt Akt.-Ges., Essen, *Kautschukmassen*. Als Füllmittel u. Vulkanisationsbeschleuniger verwendet man das durch Verdampfen u. Oxydieren von PbO u. Niederschlagen der gebildeten Dämpfe nach E. P. 189132; C. 1923. 29, erhältlich fein verteilte Bleioxyd. (E. P. 220318 vom 7/8. 1924, Auszug veröff. 8/10. 1924. Prior. vom 9/8. 1923.) FRANZ.

American Rubber Co., Boston, Massachusetts, übert. von: E. Hopkinson u. M. C. Tague, New York, V. St. A., *Kautschukmassen*. Man setzt der Kautschukmischung Stoffe zu, die ihre Viscosität, Bindekraft, Plastizität u. Oberflächenspannung beeinflussen; die MM. werden nach dem Zusatz von Füllstoffen u. Vulkanisiermitteln geformt, getrocknet u. vulkanisiert. Beim Vermischen von Kautschukmilch mit einer wss. Emulsion von Mineralöl u. Stroh, Heu usw. erhält man eine M. für Fußbodenbelag u. Wandbekleidung. Eine korkähnliche M. erhält man durch Verarbeiten von Kautschukmilch mit einem Kautschuklösungsm., Seifenlsg., Sägemehl u. feinem Feuerstein, Ton oder anderen mineral. Füllmitteln u. Wasserglas erhält man eine für Fußbodenbelag u. Wandbekleidung geeignete M. Erhitzt man die Mischung ohne vorheriges Trocknen auf erhöhte Temp., so erhält man poröse Kautschukmassen. Einen glänzende Überzüge liefernden Lack erhält man durch Verarbeiten einer Kautschuklsg. mit Schwefel, ZnO, Tetramethylthiouramdisulfid u. einem Farbstoff. (E. P. 220591 vom 10/12. 1923, Auszug veröff. 8/10. 1924. Prior. vom 1/12. 1923.) FRANZ.

Revere Rubber Co., Providence, Rhode Island, übert. von: J. Mc Gavack, New York, Long Island, V. St. A., *Kautschukmassen*. Man erhitzt Kautschuk mit Phenol, Aldehyd u. einem Halogen u. formt. Man löst z. B. 15 kg Kautschuk in 100 kg CCl₄ u. leitet Cl₂ ein, bis der Kautschuk die doppelte Menge seines Gewichtes aufgenommen hat, hierzu gibt man eine Mischung von 30 kg Phenol u. 10 kg einer 40%ig. Lsg. von CH₂O u. erwärmt unter Rückfluß; die M. wird dann mit kochendem W. gegossen, gewaschen, pulverisiert u. heiß unter hohem Druck geformt. Man kann das Gemisch von Phenol u. CH₂O der Kautschuklsg. vor dem Vulkanisieren zusetzen oder das pulverisierte Phenolformaldehydkondensationsprod. mit pulverisierten Chlorkautschuk vermischen; der Kautschuklsg. kann man Latex, Füllstoffe, wie Sägemehl, Casein, Fe₂O₃, Asbest, Glimmer usw. zusetzen. Die M. wird zur Herst. von elektr. Isolatoren, Akkumulatorenkästen, Messergriffen, usw. verwendet. (E. P. 223873 vom 14/8. 1924, Auszug veröff. 17/12. 1924. Prior. 22/10. 1923.) FRANZ.

Ernest Hopkinson, New York, V. St. A., *Kautschukmassen*. Man vermischt Kautschukmilch mit den Vulkanisierungsmitteln u. Füllstoffen während der Koagulation, wäscht das W. während des Mischens u. vulkanisiert; Füllstoffe, die W. abzuscheiden, werden vorher mit W. versetzt. (Can. P. 238457 vom 27/3. 1923, ausg. 1/11. 1924.) FRANZ.

Christe Joannides, Konstantinopel, Türkei, *Kautschuk für Gebißplatten*. Man verwendet zweierlei Kautschuk von verschiedenem Vulkanisationsgrade, die Färbung u. Korngröße kann verschieden sein, anstatt der Körner kann man auch Pulver verwenden, um eine Aderung in dem Endprod. zu erhalten. Dem fertigen Gießmasse kann ein Vulkanisationsbeschleuniger zugesetzt werden. (Schwz. P. 106220 vom 11/6. 1923, ausg. 1/8. 1924.) FRANZ.

Rubber Regenerating Company, Indiana, übert. von: Joseph H. Russell, Hartford, Connecticut, V. St. A., *Regenerieren von Kautschuk*. Man erhitzt Abfälle von vulkanisiertem Kautschuk, die keine Faserstoffe enthalten oder von diesen befreit sind, mit einem Keton, das quellend auf Kautschuk wirkt, wie Aceton,

Acetonöl u. einem schwefelbindenden Stoff, NaOH, Na₂CO₃, NH₃ in einem geschlossenen Kessel 7—15 Stdn. auf 165°. (A. P. 1510706 vom 27/10. 1920, esp. 7/10. 1924.) FRANZ

W. Wild, Lostock Hall, Lancashire, *Verwertung von Kautschukabfall*. pulverisierte Abfälle von vulkanisiertem Kautschuk werden mit Bleiglätte, Schwefel u. einem Beschleuniger in Formen unter Druck erhitzt. (E. P. 222016 vom 19/10. 1924, ausg. 16/10. 1924.) FRANZ

XIII. Ätherische Öle; Riechstoffe.

Tibor v. Keresztes, *Riechstoffe und Parfüms*. Geschichtliche Übersichten (Chem. Rundschau f. Mitteleuropa u. Balkan 1. 6—8. 1924.) A. R. F. HESS

Lüdecke, *Was ist unter Terpentinware zu verstehen?* Vortrag, in dem vorgeschlagen wird, nur solche Creme als „Terpentinware“ zu bezeichnen, die ausschließlicher Verwendung von Balsam-Terpentinöl hergestellt wurde. Dagegen sollen für Verschnittware die Bezeichnungen „Mit Terpentinöl“ u. „Unter Verwendung von Terpentinöl“ frei sein. (Seifensieder-Ztg. 51. 949—50. 967-68. 1924.) HELLMANN

Hermann Vollmann, *Was ist Terpentinöl?* (Vgl. WOLFF, Farben-Ztg. 30. 1941; TRILLICH, Farben-Ztg. 29. 2041; GAMMAY, Farben-Ztg. 29. 2042; C. 1924. II. 2616.) Die Begriffsbest. des Deutschen Schutzvereins der Lack- u. Farbenindustrie wird abgelehnt. Dem reinen Terpentinöl ist eine besondere Bezeichnung zu geben, etwa Balsamterpentinöl, die nur für das reine, durch Wasserdampf aus dem harzigen Ausfluss lebender Nadelhölzer ohne wesentlichen Überdruck hergestellte äther. Öl verwendet werden darf. (Farben-Ztg. 30. 181—82. 1924.) STÜBE

Heinrich Trillich, *Was ist Terpentinöl?* (Vgl. GAMMAY, Farben-Ztg. 29. 2042; C. 1924. II. 2616.) Nach ihren Herstellungsweisen werden folgende Produkte unterschieden: Balsame, Terpentine, Terpentinöle, Dampfkieöle, Kienöle, Terpentinharze, Terpentin-Harzöle, Terpentin-Harzschmelzen, beraubte Terpentinöle. Die Unterscheidung auf Grund der Destillationsweise gibt sicheren Aufschluß über die Verwendungseigenschaften u. -möglichkeiten. (Farben-Ztg. 30. 238—39. 1924.) MÜNCHEN. STÜBE

Hans Wolff, *Über Terpentinöle und die Bezeichnung von Terpentinölen*. Aus seinem Material zieht Vf. den Schluß, daß die verschiedenen Terpentinöle, wenn man genommen das Balsamöl, innerhalb jeder Gruppe so große Unterschiede zeigen, daß die an u. für sich schon wenig spezif. Gruppenunterschiede dagegen völlig zurücktreten. Die Bewertung der Öle kann daher nicht nach der Herkunft, sondern nur nach dem Raffinationsgrad u. den äußeren Eigenschaften wie Geruch, Farblosigkeit u. geringere oder größere Verharzung vorgenommen werden. Der Entwurf des Schutzvereins hätte bei seiner Annahme den Vorteil, daß deutlich die Fälle gekennzeichnet wären, in denen man heute reines Balsamöl erwarten kann u. die, in denen man hierzu nicht berechtigt ist. Es wäre ferner der Name Terpentinöl ausgeschlossen für alle Prodd., die nicht zu der Gruppe der Terpentinöle gehören oder die überhaupt andere Stoffe als diese enthalten. Wo sich der Name Terpentinöl findet, wüßte man, daß nur ein vegetabil. Öl vorliegt, ein Öl, das ein Terpentinöl ist. (Farben-Ztg. 30. 397—98. 1924. Berlin.) STÜBE

Hans Wolff, *Was ist Terpentinöl?* Erwiderung an KATINSZKY (S. 2). (Farben-Ztg. 30. 569. 1924. Berlin.) STÜBE

André Dubosc, *Die Lage des Terpentins und des Kienöls (Essence de Styracine)*. Verschiedene Verfahren zur Extraktion des Pinens durch direkte Behandlung der Hölzern. Die Lage der Industrie in den verschiedenen Ländern wird besprochen. Die Terpentinölgewinnung aus Harz u. die Kienölgewinnung durch Dampfdestillation durch Lösungsm., Alkalien u. Extrahieren mit geschmolzenem Harz oder Holze

beschrieben u. Kostenberechnungen der einzelnen Verff. werden aufgestellt. die verschiedenen Verff. zur Dest. des Holzes u. die dabei gewonnenen Prodd. (a) geschildert. (Rev. des produits chim. 27. 649—52. 1924.) SÜVERN.

Rojdestwensky, *Chenopodiumöl*. Ausführliche Angaben über Kultur der e in Niederländ. Indien, Dest. der Früchte, Ertrag an Öl, Eigenschaften des- sels, Ersatz desselben durch CCl_4 . Bei selbstgewonnenem Öl: Ascaridol- sationsverf.) 72—88%, (NELSONS Verf.) 62—96,6%, D.¹⁵ 0,9793—0,9949 (ein- 0051), $[\alpha]_D = +0^\circ 14'$ bis $-0^\circ 7'$, $n_D^{20} = 1,4754$ — $1,4770$, Löslichkeit in . A. bei $27,5$ — $30^\circ = 1 : (1,5$ — $2)$, SZ. 0,9, EZ. 6,5. — Das ind. Öl steht merikan. an Wirksamkeit nicht nach. (Pharm. Weekblad 61. 1341—65.

GROSZFELD.

Massera, *Ätherisches Öl von Santolina Chamaecyparissus L. aus der Cyrenaica*. Pflanzenmasse lieferten bei Dest. mit Wasserdampf 20 g ($\equiv 0,133\%$) eines hen angenehm riechenden Öles, welches deutlich Aldehydrk. aber keine rk. gibt. D.₁₅ 0,9275, $\alpha_D^{20} = -5^\circ 50'$, $n_D^{20} = 1,4632$, SZ. 5,64, EZ. 114,40, g nach dem Acetylieren 164,40, woraus sich unter Annahme von $\text{C}_{10}\text{H}_{18}\text{O}$ ein r von 51,56% Gesamtalkohol, von $\text{C}_{10}\text{H}_{20}\text{O}$ von 52,53% berechnet. (Riv. It. e ssenze e profumi 6. 136—37. 1924.) GRIMME.

Lewinsohn, *Technische Herstellung von Rhodinol*. In einem mit Rührwerk enen Autoklaven von 200 l Inhalt erhitzt man 120 kg Bourbon-Geraniumöl, k KOH u. 25 kg A. (96%) 2 Stdn. lang auf 100° . Abkühlen lassen u. A. atails abdest. Dunkelroten Rückstand zweimal mit W. waschen, dann mit H_2SO_4 , schließlich mit NaHCO_3 -Lsg. Trocknen mit Na_2SO_4 u. im Vakuum ieren. Bei 115 — 120° u. 12 mm Druck geht Rohrhodinol über. Zur Reinigung n durch Erhitzen mit Essigsäureanhydrid in Rhodinylacetat über, welches tktifizierung verseift wird u. dann in guter Ausbeute Rhodinol Kp. 113 — 115° i) liefert. (Riv. It. delle essenze e profumi 6. 134—35. 1924.) GRIMME.

Doluis, *Die Wichtigkeit der Terpentinessenz für die Riechstoffindustrie*. (172.) Angaben über Terpinolen, Terpinen, Terpinhydrat, Terpeneol u. seine aus Terpinhydrat u. aus Terpentinessenz, die Terpineneole u. über Cineol. (chimie ind. 33. 247—50. 1924.) SÜVERN.

Victor Boulez, *Methoden zur Untersuchung von Citronellöl*. Vf. hält seine le (Bull. Soc. Chim. Paris 2. 915; C. 1912. II. 1948) den anderen Methoden lDMEISTER, Äther. Öle 1913. 2. 239) für überlegen. (La Parfumerie e 17. 237—38. 1924.) A. R. F. HESSE.

Rousson's Forschungsinstitut G. m. b. H., Hamburg, *Herstellung von wässrigen ationen ätherischer Öle oder anderer in Wasser unlöslicher organischer Substanzen*. P. 405397 Kl. 23a vom 2/12. 1921, ausg. 31/10. 1924. — C. 1922. IV. 1140. on's Parent Co., Ltd.) OELKER.

Now-Metall- und Chemische Fabriken G. m. b. H., Berlin, (Erfinder: Hans c, Berlin), *Darstellung eines Riechstoffs und Lösungsmittels* zur Verwendung m Gebiete der Riechstoffverwertung. dad. gek., daß man *Salicylsäure* direkt selölen, d. h. dem Gemisch aliph. Alkohole dieses Namens, welches bei der alkoholgewinnung abfällt, zur Veresterung bringt. — Es entstehen Prodd., neben den allgemein von der Seifenparfümerie benutzten Amylethern auch ie kostbaren Butyl- u. Propylester enthalten u. einen wesentlich blumigeren ieren Tröflegeruch zeigen als z. B. der reine Salicylamylester. (D. R. P. 5 Kl. 23a vom 2/9. 1922, ausg. 17/11. 1924.) OELKER.

XVII. Fette; Wachse; Seifen; Waschmittel.

E. Fierz-David, *Die Ranzigkeit der Fette*. Vortrag, in dem Vf. auf Grund

eigener Arbeiten zu folgender Anschauung über die Ranzigkeit der Fette kommen. Ranzigkeit wird einerseits hervorgerufen durch Luft, Licht u. W., wodurch ungesätt. Fettsäuren in Aldehyde u. Säuren gespalten werden. Die unter diesen Bedingungen unverändert bleibenden gesätt. Fettsäuren werden durch Schimmelpilze zu den entsprechenden Methylalkylketonen oxydiert. Ester oder andere Verbindungen können nicht nachgewiesen werden, auch nicht in den Riechstoffen der Fette. Prakt. werden beide Bedingungen meist gemeinsam wirksam sein, es ist aber in jedem Fall zu unters., ob Ölsäureranzigkeit oder Ketonranzigkeit bzw. beide vorliegen. (Ztschr. f. angew. Ch. **38**. 6—8.) HELIG

Bruno Hassel, *Bemerkenswertes aus der Extraktionspraxis und verwandten Gebieten*. Die Extraktion ist der Ölgewinnung durch Pressen überlegen. Triäthyläthylen wird empfohlen, nicht jedoch für stark schleim- bzw. eiweißhaltige Extraktionsgut. Mit Triäthyläthyl extrahierte Öle sind schwerer als mit Bzn. oder Benzol extrahierte zu raffinieren. (Seifensieder-Ztg. **52**. 6—7. 26—27. Plau i. Mecklbg.) HELIG

Hugo Kühl, *Die Bedeutung der Kolloidchemie für die Seifenindustrie*. Die Kolloide sind das reinigende Prinzip der Seifen. Kolloider Schwefel in Seifenbleicht. Kolloider Ton verhindert die Entbindung von Ammoniak aus Salzwassermitteln. Die kolloide Natur der Seifen ermöglicht, organ. Lösungsmittel anzuwaschmitteln. Die kolloide Natur der Seifen ermöglicht, organ. Lösungsmittel anzuwaschmitteln. Die kolloide Natur der Seifen ermöglicht, organ. Lösungsmittel anzuwaschmitteln. (Seifensieder-Ztg. **51**. 937—38. 1924. Berlin.) HELIG

H. Loebell, *Über echte und unechte Seifen*. Vf. versteht unter echten Seifen ausschließlich solche, die aus fettsaurem Alkali nebst dem sich normalerweise bei dem Siedeprozess ergebenden W., Farb- u. Geruchskorrektur bestehen. (Spezialseifen u. Bleichwaspulver sind hierbei nicht berücksichtigt.) In diesem Sinne sind unechte Seifen alle Seifenpulver u. die gefüllten Seifen. Insbesondere letztere sollten vom Markt verschwinden. Jedes Seifenstück sollte durch Angabe von Nettogewicht u. Fettgehalt gekennzeichnet werden. (Seifensieder-Ztg. **52**. 23—25. Berlin.) HELIG

C. Bergell, *Verwaschen sich gekühlte Seifen rascher als in Formen langsam erstarrte?* Verss. des Vf. ergaben, daß lediglich der Fettansatz der Seifen maßgebend für deren Löslichkeit ist. Kühlpressenseife ist härter im Griff als Feinseife gleicher Zus. u. gestattet daher die Verwendung größerer Mengen von Wasser, wodurch leichtere Abnutzung bedingt wird. (Seifensieder-Ztg. **51**. 938—39. 1924. Lab. Dr. C. STIEPEL.) HELIG

G. Knigge, *Die Fabrikation des Glycerins*. Beschreibung der Reinigung des Glycerins, der Autoklavenspaltung, Twitchell- u. Fermentenspaltung. (Allgem. u. Fett-Ztg. **21**. 760—62. 1924. Berlin-Lichterfelde. Sep.) HELIG

G. Knigge, *Glycerin, seine Anwendung und seine Ersatzstoffe*. Die vielfältige Anwendung des Glycerins u. seiner Ersatzmittel wird geschildert u. eine Anzahl Rezepte mitgeteilt. (Allgem. Öl- u. Fett-Ztg. **21**. 800—802. 1924. Berlin-Lichterfelde. Sep.) HELIG

—, *Einiges über Glyceringewinnung aus Unterlagen*. Beim Aussalzen emulgiert Vf. Anwendung von Harz oder Fettsäuren, um alles in der Unterlage noch vorhandene Alkali zu gewinnen. Techn. Einzelheiten erläutern diesen Vorschlag. (Seifensieder-Ztg. **51**. 959—60. 1924.) HELIG

A. Leitner, *Pechseife*. Pechseife dient als Industrieseife zur Beseitigung starker Verschmutzungen u. verdankt ihre Farbe einem Zusatz von Brauer-Farbstoff. Ansatz u. Arbeitsweise sind beschrieben. (Seifensieder-Ztg. **52**. 4.) HELIG

T. H. Gray und **J. H. Gill**, *Textilseifen*. Allgemeine Angaben über Eigenschaften der Seifen, von Seifenpräparaten u. die Anforderungen, die an die Produkte gestellt sind. (Journ. Soc. Dyers Colourists **40**. 356—57. 1924.) SÜVIN

G. Bruhns, *Wasserbestimmung in Margarine usw.* Zur Vermeidung des Verspritzens von Fett bei der Best. von W. in Margarine, wird in den Al-Bechergläsern

heibe mit 3 Füßen als Einsatz gestellt. Der Einsatz erwärmt sich schnell, B sich daran kein W. verdichtet. (Chem.-Ztg. **48**. 944. 1924.) JUNG.

Albert Granichstädter und **Emil Sittig**, Wien, *Gleichzeitiges Hydrieren und Erweichen von Ölen und Fetten*. Das Verf. des Hauptpat. wird in der Weise aus-
geführt, daß den Ölen u. Fetten gleichzeitig mit dem dort beschriebenen Katalysator
verteilte, von Katalysatorgiften befreite künstliche Kohle animal. oder vegetabil.
pulverförmig (Eponit u. dgl.) in einem Mengenverhältnis von 2—5% des Öles oder Fettes
eingesetzt wird. (Oe. P. **97780** vom 29/4. 1921, ausg. 10/9. 1924. **Zus. zu Oe. P.**
81; C. 1922. II. 403.) OELKER.

Chemische Industrie München G. m. b. H., München, *Herstellung einer neuen
Seife durch Zusatz von gespaltenen Eiweißstoffen zu einer Grundseife*. Ab-
getrennte Gerüsteiweißkörper werden mit überschüssigem Alkali bis zum wesentlichen
Verschwinden von NH₃ verkocht, worauf behufs Umsetzung der überschüssigen Lauge
Metallsalz zugesetzt u. die so verdickte M. einer Grundseife beigebrückt wird.
(P. **97683** vom 15/9. 1921, ausg. 25/8. 1924.) OELKER.

XVIII. Faser- und Spinnstoffe; Papier; Cellulose; Kunststoffe.

Guillaume Bigourdan, *Louis-Marie-Hilaire Bernigaud, Graf de Chardonnet*
(angeb.). Kurzer Lebenslauf des Erfinders der Kunstseide. (C. r. d. l'Acad. des
sciences **179**. 1463—66. 1924.) ZANDER.

Edmund Knecht, *Ein neues Mittel zum Verbessern der Baumwollfaser*. Gegen-
über BEIL (Ztschr. f. angew. Ch. **37**. 689; C. **1924. II.** 1989) wird auf ältere Ver-
fahren hingewiesen, aus denen es bekannt war, Baumwolle mit HNO₃ zu
behandeln u. in denen bereits auf die dabei eintretenden Veränderungen im
Aufbau der Baumwolle hingewiesen ist. (Journ. Soc. Dyers Colourists **40**. 359.
SÜVERN.

Howard Priestman, *Textilfasern*. Wolle. Nach statist. Angaben über die
Wollindustrie werden als Ursachen von Fehlern in den fertigen Stoffen Alkali-
schaden vom Waschen u. Pilzwucherungen besprochen. (Journ. Soc. Dyers
Colourists **40**. 373—76. 1924.) SÜVERN.

Arthur B. Parsons, *Der Markt in Fuller-Erde*. Übersicht über Zus. u. Ver-
wendung der in England u. Amerika geförderten Bleicherden, von denen die Ver-
einigten Staaten etwa 90% verbrauchen. (Engin. Mining Journ.-Press **118**. 771—73.
HELLER.

H. Hillringhaus, *Entgegnung auf einen Vortrag von Dr. Raabe: Die Kunst-
seide mit besonderer Berücksichtigung der Acetatseide*. (Vgl. Färber-Zeitung **1924**.
S. 1—14.) Die Festigkeit der Kunstseide hängt nicht von der Dicke des Fadens
sondern auch nicht von dem eigentlichen Spinnen, sondern liegt nur an dem Tauch-
verfahren. Die Schwierigkeiten in der Herst. gleichmäßig färbbarer Kunst-
seide bestehen noch. An Celanese-(Acetatseide-)zwirn konnte keine höhere Festig-
keit festgestellt werden als bei Bembergseide, die Acetatseide war auch in Griff u.
in der Hand nicht besser, als nach dem Streckspinnverf. hergestellte Kupferseide.
(Journ. Soc. Dyers Colourists **40**. 373—76. 1924.) SÜVERN.

Ranz Gerl, Haje a. d. Iser und **A. Drechsel**, Halbstadt, Böhmen, *Erzeugung
von mercerisierähnlichen Effekten auf Baumwollgeweben* unter Behandlung auf
einmal bei hohem hydraul. Druck u. erhöhter Temp., dad. gek., daß die ge-
trocknete Ware zunächst in trockenem Zustande einem Vorkalandern bei hohem
hydraul. Druck (80000 bis 120000 kg) u. hoher Temp. (etwa 150°) unterworfen

wird, worauf in an sich bekannter Weise eine Appretur mit aufgeschlossener Stärke unter Zusatz eines verseiften Pflanzenöles u. ein zweites Kalandern bei höchstem hydraul. Druck (120 000 bis 150 000 kg) u. der gleichen Temp. stattfindet. — Man erzielt einen vollkommenen Schluß des Gewebes u. einen hohen, weichen Glanz. (**D. R. P. 405 518** Kl. 8k vom 15/7. 1923, ausg. 1/11. 1924.) FRAN.

Société pour l'Application Industrielle des Brevets Peuffaillit, Frankreich, *Rösten oder Entleimen von Flachs oder anderen Textilpflanzen*. Man laugt Pflanzen mit einer Fl., die zum Teil aus schon zu gleichem Zwecke verwendeter Lauge u. zum Teil aus einem Gemisch von W. u. KW-stoffen besteht, aus. (**575 900** vom 16/1. 1924, ausg. 7/8. 1924.) KAUSCH.

C. G. Haubold A.-G., Chemnitz i. Sa., *Vorrichtung zum Aufspeichern und Abführen von naß, z. B. mit Chlorflüssigkeit, Säure o. dgl. zu behandelnden Geweben in Strangform*, die von einem fortlaufend im Halbkreis durch den Flüssigkeitsstrom wandernden endlosen Lattenrost abgelagert werden, dad. gek., daß eine Tafel dreieckig u. abnehmbar zwischen einem im Mittelpunkt des Halbkreises gelagerten Körper u. dem Lattenrost befestigt ist, den Anfang der Ware in wagerechter Stellung aufnimmt, mit dem Lattenrost wandert u. am Wendepunkt nach Drehung um 30° oben auf dem Warenanfang liegt, für das Abführen der Ware aus dem Trog abgenommen u. wieder in Anfangsstellung für neue Warenaufnahme gebracht wird. (**D. R. P. 403 855** Kl. 8a vom 15/8. 1922, ausg. 9/10. 1924.) FRAN.

Edmond Chicoineau, Seine, Frankreich, *Erschweren von Wolle und Seiden mit Antimonsalzen*. Man trinkt die Faser mit Lsgg. von Sb-Salzen, die schwach angesäuert u. mit Salzen der Alkalien usw. versetzt sein kann, nach dem Abpressen der Fl. spült man mit reinem oder O-haltigem W. u. bringt die Faser dann in ein Bad von Natriumphosphat, nach nochmaligem Spülen bringt man die Faser in ein Wasserglasbad u. spült wieder; das Verf. kann so oft wiederholt werden, bis die gewünschte Erschwerung erreicht ist. (**F. P. 575 085** vom 28/12. 1923, ausg. 23/7. 1924.) FRAN.

Chozo Nakai, Japan, *Seidebehandlung*. Man kocht die Seidecoons in W., erregt eine geringe Menge Amylase u. gegebenenfalls Pepsin u. oder Lactose zugeben, bis die Seide gelöst worden ist. (**F. P. 570 854** vom 17/9. 1923, ausg. 8/5. 1924. Jap. Prior. 3/11. 1923.) KAUSCH.

Auguste M. L. Sorre, Frankreich, *Bleichen aller submarinen Pflanzen und Gewinnung von reiner Cellulose daraus, sowie Jod und Brom*. Man unterwirft die Pflanzen der Einw. eines Stromes von O₂ oder Cl₂ (Hypochlorit). (**F. P. 575 660** vom 27/3. 1923, ausg. 4/8. 1924.) KAUSCH.

Albert Koch, Akt.-Ges., Rottenburg a. N. (Erfinder: **Roland Runkel**, Rottenburg a. N.), *Aufschließung, Bleichung und Veredelung von Pflanzenfasern jeder Art und Gewinnung eines reinen weißen Zellstoffs, insbesondere für die Papier- und Textilindustrie*, dad. gek., daß ohne Vorbehandlung oder nach einer Aufbereitung der Fasern plötzliche Hitze oder Kälte aufgelockerte rohe Pflanzenfasern oder auch Holz in Rührten in verd. NaOH in der Kälte unter kontinuierlichem Einleiten von Cl₂ u. period. sich wiederholendem Zusatz von Natronlauge, festem NaOH, Na₂CO₃ u. dgl. vollständig von den Inkrusten u. Ligninsubstanzen, sowie von Verunreinigungen befreit werden. (**D. R. P. 407 334** Kl. 55b vom 29/6. 1923, ausg. 10/12. 1924.) OBERH.

Henry Silbermann, Berlin-Lichterfelde, *Gewinnung von reinen Cellulosefasern aus cellulosehaltigen durch inkrustierende Begleitstoffe verunreinigten Materialien wie Zellstoff und pflanzlichen Faserstoffen*, unter Zusammenwirkung von Salzen, schwachen Säuren u. Oxydationsmitteln, 1. dad. gek., daß die vollständige Entfernung der inkrustierenden Stoffe dad. bewerkstelligt wird, daß das Material mit sehr schwachen Säuren u. oxydierenden Agenzien bei einer Temp. von wenigstens 100° vorzugsweise unter Druck behandelt wird. — 2. dad. gek., daß Salze schwacher

kolloidal wirkender Säuren verwendet werden. — 4. dad. gek., daß als oxy-
ele Agenzien Persilicate u. Percarbonate Verwendung finden. — 6. dad. gek.,
Behandlung unter Zusatz von Sauerstoffüberträgern erfolgt. (D. R. P. 407500
vom 8/1. 1921, ausg. 16/12. 1924. Schwz. Priorr. 6/1. u. 10/6. 1919.) KAU.
toine Regnouf de Vains, Frankreich, Gewinnung von Alkali aus den Wasche-
der Ligno- und Pectocellulosen. Die Laugen werden mit H_3PO_4 oder $CaH_4(PO_4)_2$
elt. Der gebildete organ. Nd. wird abgeschieden u. die Lsg. kaustifiziert.
hält eine Lsg. von NaOH u. $Ca_2H_2(PO_4)_2$. (F. P. 575504 vom 15/3. 1923,
/8. 1924.) KAUSCH.

ik Hägglund, Abo, Finnland, Nutzbarmachung der bei der Natronzellstoff-
tion entfallenden Schwarzlauge, dad. gek., daß die im Kreislauf benutzte Auf-
ungslauge auf hoher Natriumacetatkonzentration gehalten wird unter Sicherung
günschten Konzentrationsgrades durch Ausstoßung eines Teils der von organ.
iz größtenteils befreiten Schwarzlauge u. Ersatz durch frisches Alkali. —
gek., daß die von organ. Substanz wesentliche freie, aus dem Betrieb aus-
ne Natriumacetatlösung auf Aceton verarbeitet wird. — Diese Verarbeitung
uf dem Wege der Trockendestillation durchgeführt werden. (D. R. P. 400661
vom 19/7. 1922, ausg. 9/12. 1924.) OELKER.

rien Pinel, Rouen, Frankreich, Rasches Waschen von Spulen künstlicher
Die Spulen werden abwechselnd einer Reihe kurzdauernder Waschungen
elusschwingvorgänge unterworfen. (Oe. P. 97797 von 4/4. 1923, ausg. 10/9.
F. Prior. 16/6. 1922.) KAUSCH.

lter James Stevenson, England, Kunstseide aus Acetylcellulose. Man löst
ellulose in Aceton od. dgl. u. verspinnt die Lsg. alsdann in einem Na_2SO_4
anden Fällbade. (F. P. 574626 vom 2/3. 1923, ausg. 16/7. 1924.) KAUSCH.
nry Dreyfus, England, Kunstfäden. Die aus Celluloseestern oder -äthern
ellten Fäden werden auf dem Wege ihrer Herst. mit einer Appretur aus
emulsion von Ölen, Fetten, Wachsen u. dgl. versehen. (F. P. 575753 vom
24. 1924, ausg. 6/8. 1924. E. Prior. 26/1. 1923.) KAUSCH.

ilhelm Schmitz, Berlin, Herstellung von linoleumartigem Boden- oder Wand-
ad. gek., daß die Unterlage von Filz, Papier, Pappe u. dgl. mit oder ohne
überzug in zwei oder mehreren Schichten durch Isolier- u. Klebmasse zu-
gepreßt, die Oberfläche dieser Unterlage mit einem ölhaltigen Harz oder
kleister vorgestrichen ist u. ein dickbreiiger Belag oder ölfeuchtes Gemenge,
ad z. B. aus Holz- oder Pflanzenmehl, Korkmehl, Papierfasern, Sand oder
en Materialien unter Zusatz von ZnO mit Leinöl, Leinölfirnis aufgetragen
Durch die mittlere Isolierschicht wird die Unterlage gegen Feuchtigkeit
et. Die M. wird nach dem Erhärten poliert, gewachst oder geölt. (D. R. P.
6 Kl. 8h vom 4/6. 1922, ausg. 12/12. 1924.) FRANZ.

Paisseau und B. Warcollier, Courbevoie, Künstliche Perlen
ermutter. Klebende MM., wie Gelatine, Celluloid-, Celluloseacetat- oder
ogenat- oder Harzlg. von geeigneter Konz. werden mit äußerst feinen
ten oder Gasblasen beladen. Als Krystalle sind Fettsäuren oder Harnsäure
z. Gegebenenfalls können die in der M. verteilten Krystalle unter solchen
ngen gel. werden, daß sich entsprechende Hohlräume bilden. (E. P. 222881
0. 1924. Auszug veröff. 3/12. 1924. Prior. 4/10. 1923.) KÜHLING.

Brennstoffe; Teerdestillation; Beleuchtung; Heizung.

lo Mazzetti, Vorläufige Untersuchungen über die elektroosmotische Ent-
ng des Teers. Der vom Vf. benutzte App. besteht aus einem äußeren Be-
n dem sich dest. W. u. eine Kupferkathode befindet, während der Teer
porösen Innengefäß, welches auch die positive Elektrode enthält, befindet.

Die günstigsten Versuchsbedingungen waren bei 275 V., 0,06 Ampere u. 45°. Der Wassergehalt des angewandten Teers (vorher 8,7%) sank in diesem Falle in 12 Stdn. auf 1%; der Leichtölverlust betrug in diesem Falle 0,3%. Bei wasserhaltigerem Teer (15,16%) gleicher Grad der Entwässerung, nur größerer Verlust an Leichtöl, 1,1%. (Annali Chim. Appl. 14. 379—81. 1924. Rom, Univ.) ZANER.

Kausch, 40 Jahre Benzolgewinnung aus Koksofengas. (Wasser u. Gas 293—98. 1924.) BEHN.

G. Weißenberger, Vergleichende Versuche zur Erdgaswaschung. Für techn. Maßstäbe an einer Erdgasbohrung in Boryslaw durchgeführten Vers. b. die Apparat im wesentlichen aus zwei 5 m hohen, zweckentsprechend gerichteten Absorptionstürmen System BRÉGEAT (vgl. D. R. P. 368529; C. 191. 835), deren einer mit Brégeatschem Absorptionsmittel, der andere mit raffiniertem Spindelöl (spezif. Gewicht D.₁₅ 0,890; Viscosität = 4,5 E/20°, bzw. Gasöl (D.₁₅ Viscosität = 1,8 E/20°) galiz. Ursprungs gespeist werden. Beim Waschen mit BRÉGEAT (vgl. Schw. P. 84063 u. 88987; C. 1921. IV. 1303) wurden aus dem Reingas 82—85 g Bzn. vom Kp. 30—165°, von welchem 92% bis 140° übergegangen; dies entspricht ca. 100% Ausbeute. Die vergleichenden Vers. ergaben beim Absorptionsmittel BRÉGEAT gegenüber dem Spindelöl eine um 64% höhere Gasolinausbeute, ein leichteres Prod. (D. 0,705 gegen 0,710, vom letzteren 80% bis 140° übergehend) u. ein reineres Bzn., obwohl der Zufluß an Spindelöl, wie beim Gasöl, weit größer genommen werden mußte, als beim Brégeat. Ebenso zeigt dasselbe gegenüber dem Gasöl eine um 42% erhöhte Ausbeute an leichterem u. reinerem Bzn. (Sp. G. 0,706 gegen 0,718, von letzterem 80% bis 140° übergehend). Es bildet ferner insbesondere das Spindelöl durch Wasseraufnahme aus dem Erdgas leicht Emulsionen, welche die Dest. erschweren. — Genauere Resultate in Tabellenform vervollständigen den Bericht. (Petroleum 20. 181. 1924. Univ. Wien.) HERZENBERG.

M. G. Levi und C. Padovani, Studien und Untersuchungen über die italienischen Brennstoffe. I. Analysen und Tieftemperaturdestillation von italienischen Ligniten und Torfen. Vf. geben die Analysen einer Reihe von italien. Ligniten u. Torfen u. die Zuss. der Tieftemperaturdestillationsprodd. (Annali Chim. Appl. 14. 31—32. 1924. Bologna, Scuola sup. di Chim. Ind.) ZANER.

W. Domnick, Möglichkeiten der Öl- und Koksgewinnung aus Torf. Vf. berichtet über Erfahrungen bei der Brikettierung u. Verkokung des Torfes, die bei dem Betrieb einer Torfverkokungsfabrik in Holstein gesammelt wurden. An Hand einer Wärmebilanz wird gezeigt, daß die Entwässerung des Rohtorfes von 90% auf 50% wirtschaftlich nur durch Freilufttrocknung erfolgen kann; erst von einem Wassergehalt von 50% ab kann die künstliche Trocknung beginnen. Da der Torf sich bei der Trocknung verdichtet, erweist es sich als günstig, dem Torf die gewünschte Form zu geben u. dann in großen Kanaltrocknern zu trocknen. Die Brikettierung erfolgt am besten in Hochleistungsstrangpressen mit einem Schnitthub von 250—300 mm. — Je nach dem Verkokungsverf. schwankt die Koksabgabe zwischen 20—40%. Die Ausbeute an Ölen bewegt sich zwischen 2—12% u. hängt nach Vf. fast ausschließlich von der Durchführung u. der Temp. des Prozesses ab. An Schmelzwasser fallen 40—50% des Torfgewichtes an; es enthält Methylkohlenstoff (0,1—0,15%), Essigsäure (0,75—1%) u. NH₃ (0,1—0,3%) in so verd. Lsg., daß eine Aufarbeitung wirtschaftlich kaum möglich ist. Der Torfkoks ist nach Vf. weicher u. voller als Hüttenkoks u. Holzkohle u. eignet sich für alle hüttenmänn. Zwecke. Insbesondere wurden bei der Eisenschmelze im Kupolofen gute Ergebnisse erzielt. Für die Torfverkokung eignen sich kontinuierlich betriebene Schachtöfen ebenso wie als Öfen mit intermittierendem Betrieb. Vf. benutzt zwecks besserer Wärmeausnutzung einen von ihm konstruierten, kontinuierlich arbeitenden Vielzellofen.

ch dem Ringofenprinzip gebaut ist. Dieser arbeitet in den Zonen bis 175° (Austreibungszonen) mit direkter u. indirekter Beheizung u. in den Zonen über 175° mit indirekter Beheizung. Als Heizgas dient das bei der Verkokung sich erhaltende Torfgas, welches ebenso wie die Frischluft durch die Abwärme der Ofen auf 500° vorgewärmt wird. Die Öldämpfe werden in Destillationstürmen abgetrennt u. wieder gefüllt. (Petroleum 20. 1891—95. 1924. Altona.) HERZENBERG.

W. Albrecht, *Fortschritte und Änderungen auf dem Gebiete des Erdöls*. Fortsetzung zu dem Aufsatz FRANKENSTEINS (Ztschr. f. angew. Ch. 37. 357; C. 1924. I. 780). Auch bei dem alten Raffinationsverf. wurde H₂SO₄ wiedergewonnen, u. die Abwässer wurden in Seifenfabriken verarbeitet u. der Säureasphalt kam als Asphaltpflaster in den Handel. (Ztschr. f. angew. Ch. 37. 1023. 1924. Braila.) **J. Zuber**, *Einiges über Herrn Pyhääläs Ölhypothese*. Zu den Anschauungen über die Entstehung des Erdöls (vgl. Petroleum 19. 495; C. 1924. I. 839), speziell über die kaukas. Lagerstätten, wird bemerkt, daß die Bakuer Lager zum Pliozän gehören u. daß der Zusammenhang zwischen vulkan. Erscheinungen u. dem Erdölvorkommen im Kaukasus Revier nicht vorhanden ist. (Petroleum 20. 1093—94. 1924. Lwów)

HERZENBERG.

Vald Pyhälä, *Zu den Bemerkungen Dr. St. Zubers über meine Ansichten über die Entstehung des Erdöls*. Die Bemerkungen ZUBERS (vorst. Ref.) werden zurückgewiesen. (Petroleum 20. 1975—76. 1924.)

HERZENBERG.

Dinard Schulz und **Hynek Chorkovciv**, *Über die Variationen in der Zusammensetzung des Rohöls innerhalb des Egbeller Erdöllagers*. Das Egbeller Rohöl ist vollkommen paraffin- u. benzinfrei u. hat einen Siedebeginn von über 200°. Das spezif. Gewicht des entwässerten Rohöls aus 24 verschiedenen Bohrlöchern variiert zwischen 0,914 u. 0,937. Eine Beziehung zwischen der Tiefe des Ölhorizonts u. dem spezif. Gewicht scheint nicht zu bestehen; doch können in der Vertikalausdehnung des Ölfeldes 3 Zonen unterschieden werden, innerhalb welcher das spezif. Gewichte der Rohöle nur wenig differieren. Größere Unterschiede zeigt die Löslichkeit der Rohöle, die bei 3 Bohrlöchern zwischen 9,1 u. 19,7 E/20° schwankt. Die Elementaranalyse des leichtesten u. schwersten Rohöls ergab nur geringe Unterschiede: bis 250°: 1,3 bzw. 1,1%, von 250—300°: 22,2 bzw. 20%, Rückstand über 300°: 6,3 bzw. 7,8%, dessen Sp. G. 0,9242, bzw. 0,9498 betragen. — Ein Überblick über das Ölfeld erläutert den Bericht. (Petroleum 20. 1839—41. 1924.)

HERZENBERG.

Wischin, *Das Blümmner Crackverfahren*. Beschreibung des Verf. in seinen Anlagen (vgl. Brennstoffchemie 3. 323; C. 1923. II. 204). Als Arbeitstemp. sind über 450° angegeben, als Arbeitsdruck 40 at; die Erhitzungsdauer beträgt 10 min. Die Füllung des Autoklaven besteht aus einer Bleischmelze. (Petroleum 20. 189—51. 1924. München.)

HERZENBERG.

Gold Singer, *Neue Mittel zur Vereinfachung und Verbilligung von Erdöl-Anlagen*. Scharfe Kritik der Abhandlung von KAHN (S. 322) vom techn. u. chem.-techn. Standpunkt aus. An der „Pumpe ohne Schädigung des Öls“ wird die Möglichkeit einer guten Abdichtung bezweifelt u. bemängelt, da es nicht nur die Öldämpfe, sondern auch die gesamten Wasserdämpfe der Anlage zu bewältigen hätte, somit sehr große Dimensionen haben müßte u. sehr teuer wäre. Es wird ferner bezweifelt, daß mit dem „Vakuumförderapparat“ ein besseres Vakuum als im barometr. Kondensator zu erzielen sei. Schließlich wird die nach diesem Verf. nicht zu vermeidende B. von sehr schwer u. nur zu hohen Kosten zu trennenden Öl-Wasser-Emulsionen hingewiesen, sowie auf die bedeutenden Verluste an mit dem Auspuffdampf mitgerissenen Öldämpfen. (Petroleum 20. 1843—45. 1924. Wien.)

HERZENBERG.

Leon Burek, *Rohölemulsion-Abscheider „Metan“*. Der App. beruht auf dem bekannten Prinzip der Emulsionstrennung durch Verminderung der Oberflächenspannung infolge erhöhter Temp. Um Benzinverluste durch Verdampfung zu vermeiden sowie ein Sieden des abgeschiedenen W. bei Temp. über 100°, wodurch eine Trennung erschwerende Zirkulation des W. eintreten würde, wird in abgeschlossenen Kesseln gearbeitet, so daß bei der Arbeitstemp. von 120–140° Überdruck von 2–6 at entsteht. Die Methode arbeitet kontinuierlich; der App. besteht aus 2 senkrechten, mit genau regulierbaren Reduktionsventilen versehenen Kesseln, von denen der eine als Vorwärmer für die Emulsion dient, während der zweite die eigentliche Trennung innerhalb 2–4 Stdn. durchführt. Die Erwärmung erfolgt mittels indirekten Dampfes, der in einer Schlange dem Vorwärmer zugeführt wird, an welchem auch das entwässerte Rohöl seine Abwärme abgibt. Die App.-leistung einer Anlage beträgt ca. 35 000 l Rohöl. — Abbildungen des App. und der Gesamtanlage, sowie eine tabellar. Zusammenstellung von Leistungsergebnissen liegen bei. (Petroleum 20. 1887–91. 1924. Lemberg.) HERZENBERG

M. Rakusin, *Zur Frage über die Adsorption der festen Paraffine des Rohöls* (Vgl. S. 321.) Vf. hält, im Gegensatz zu GURWITSCH, die Ergebnisse seiner Vers. sowie derjenigen von BURSTIN (Petroleum 19. 119; C. 1923. IV. 897), welche die Adsorbierbarkeit kryst. Weichparaffine durch Floridin beweisen, für teilweise unerkklärlich, da vom kolloidchem. Standpunkt aus die festen Paraffine als Krysalle nicht adsorbierbar sein sollten. Diese Fälle fallen in das Gebiet der wenig geklärten, reversiblen Adsorptionen, während die Adsorption organ. Kolloide stets irreversibel ist. Die Vers. von GURWITSCH (Petroleum 20. 903; C. 1923. II. 1538), welcher bei Grosnyer Rohöl, das 9% Paraffin enthielt, eine nur geringe Adsorption feststellen konnte, glaubt Vf. dadurch erklären zu können, daß diese Konz. bereits dem Adsorptionsminimum entspricht. Bei weiteren Vers. von GURWITSCH mit 0,26% Lsgg. von kryst. Paraffinen aus Ozokerit in Bzn. litt die Konz. für zu gering, um genaue Paraffinbest. ausführen zu können. (Petroleum 20. 1957–58. 1924. Moskau.) HERZENBERG

E. A. Ewans, *Der Wert eines Schmiermittels*. Es wird darauf hingewiesen, daß für den Wert eines Schmieröles neben der Viscosität die „Verteerungszahl“ u. die „Kohlungszahl“ von besonderer Bedeutung sind. Letztere insbesondere werden der schädlichen Folgen einer übermäßigen Absonderung von C im Explosionsraum u. in den Kolbenring-Nuten, sowie im Luftkompressor eines Dieselmotors, wodurch ein Verkleben der Ventile, Absplittern der Federn, sowie erhöhte Temp. im Kompressor hervorgerufen werden. Die „Kohlungszahl“ wird durch zweitägige Oxidation des Öles mittels h. Luft bei der Arbeitstemp. im Explosionsraum des Motors erhalten. Doch kann die Kohlungszahl als Qualitätsmesser nur für eine Reihe von Ölen benutzt werden, da bei Schmierölen verschiedener Herkunft keineswegs die Kohlungszahl des Öles mit abnehmender Kohlungszahl steigt, was durch Versuchsergebnisse belegt wird. Dies ist offenbar auf das verschiedene Verh. der die Erdöle bildenden komplizierten KW-Stoffe bei der Zers. zurückzuführen. (Chem.-Ztg. 48. 83–84. 1924.) HERZENBERG

G. Hofer und H. v. Wartenberg, *Die Ermittlung von Sauerstoff im Leuchtgas*. Vf. beschreibt ein calorimetr. Verf. zur Best. von O₂ im Leuchtgas, das durch die Oxydation von Hydrosulfit beruht, dessen Verbrauch durch Blaufärbung mit Indigocarmin festgestellt wird. Es wird die Gasmenge gemessen, die beim Verbrennen der Gasperlen durch die mit Indigocarminlsg. versetzte Hydrosulfitlsg. eine durch färbende Gelatinefolie festgelegte Färbung hervorruft. (Ztschr. f. angew. Ch. 38. 1–2. 1924. Danzig, Techn. Hochsch.) JUNG

Minerals Separation Ltd., London, Mischen fein verteilter Kohle mit

Mittel für die Briktbereitung (kurzes Ref. nach F. P. 546201, s. C. 1924. II. 0. wobei die in W. in der Schwebe gehaltene Kohle mit einem verflüssigten Mittel unter Luftzufuhr gerührt wird, um sie mit dem Bindemittel zu über- 1a, dad. gek., daß ein aus einem verflüssigten Gemisch von Pech u. Naphthalin e Phenanthren bestehendes Bindemittel verwendet wird. (D. R. P. 407239 0b vom 25/5. 1922, ausg. 10/12. 1924. E. Prior. 24/8. 1921.) OELKER.

Robert Charles Hazard, Frankreich, Schwefelwasserstoff aus Gasgemischen. 1a läßt die H₂S u. CO₂ enthaltenden Gasgemische von NaOH-Laugen (20° Bé.) ab- 1ren u. behandelt sie mit Ca(OH)₂ in einer der gebildeten Na₂CO₃ in der Lauge t rechnenden Menge. (F. P. 576028 vom 21/1. 1924, ausg. 9/8. 1924.) KA.

Gebrüder Brüner G. m. b. H., Wien, Verbrennung von Generatorgas. Der rator wird unter so hohem Druck betrieben, daß das erzeugte Gas infolge r hohen Ausströmungsgeschwindigkeit die zu seiner vollständigen Verbrennung 1erliche Luft selbst ansaugt. — Die so erzeugte Gas-Luftmischung ist sowohl 1mittelbarer Verbrennung in luftdicht geschlossenen Räumen mit anschließender t armachung der gebildeten Heizflamme als auch zum Betriebe von Kraft- 1inen verwendbar. (Oe. P. 98166 vom 3/7. 1923, ausg. 10/10. 1924.) OELKER.

Frank Tinker, Birmingham, Herstellung von Petroleum. (D. R. P. 405685 3b vom 20/7. 1922, ausg. 6/11. 1924. E. Prior. 29/7. 1921. — C. 1923. II. OELKER.

Gilon James Trumble, Los Angeles, Calif., Behandlung von Kohlenwasser- 1. Feste KW-stoffe werden in einer geschlossenen Retorte mit überhitztem f geblasen, wobei in der Retorte ein Überdruck aufrecht erhalten wird. In o erzeugten h. Koks führt man dann weitere Mengen des festen KW-stoffs t eines fl. KW-stoffs ein, die dadurch gespalten (gekrackt) werden, kondensiert haltenen Dämpfe u. zerlegt sie in ihre Bestandteile. (Can. P. 237773 vom 23, ausg. 12/2. 1924.) OELKER.

George Emil Stahl, Jersey City, New Jersey, V. St. A., übert. von: Friedrich 1athies, Lauerbach b. Erbach, Odenwald, Holzschutzanstriche. Zu dem Ref. 1D. R. P. 382417; C. 1923. IV. 992 ist nachzutragen, daß die desinfizierend 1den Stoffe u. das Mineralöl, das frei von Harzen sein muß u. das Aus- 1en des FeSO₄ bezw. der Salicylsäure aus dem mit den Lsgg. dieser Stoffe 1henen Holz verhindern soll, tief in die Holzporen eindringen, ohne letztere vstopfen. Ein Schrumpfen oder Morschwerden des behandelten Holzes wird e verhindert. (A. P. 1511742 vom 6/12. 1921, ausg. 14/10. 1924.) SCHOTTL.

XX. Schieß- und Sprengstoffe; Zündwaren.

Alfred Stettbacher, Richard (Escalot) Nachruf auf den Vf. des Sammel- 1 „Die Explosivstoffe“, den Herausgeber „der Zeitschrift für das gesamte Schieß- 1ngstoffwesen“ u. Begründer der Zeitschrift „Kunststoffe“. (Chem.-Ztg. 48. 1924. Zürich.) JUNG.

Audibert, Über eine notwendige Bedingung für die Sicherheit des Sprengens r entzündbaren Umgebung. (Vgl. C. r. d. l'Acad. des sciences 178. 1167. C. 1924. II. 141. 1303.) Eine notwendige Bedingung für die Sicherheit von 1ngen in einer entzündbaren Umgebung ist, daß die gasförmigen Zersetzungs- 1 des Explosivstoffes keinen Ausgang finden, außerhalb der Masse nieder- 1gen, bevor nicht die Verbrennung der reduzierenden Bestandteile vollendet r. d. l'Acad. des sciences 179. 825—27. 1924.) JOSEPHY.

Burlet, Bestimmung der theoretischen Kraft und des Covolumens der Explosiv- 1 Die theoret. Kraft der Explosivstoffe (f) kann aus der Gleichung $p/\Delta = p$ (p der maximale Druck der Explosion, Δ die Ladung der Bombe, α das

Covolum der bei der Explosion entstandenen Gase) oder aus der Gleichung $f = p_0 V_0 T / 273$, V_0 das Vol. der entstandenen Gase bei 0°, T die Temp. der Explosion) berechnet werden. Die Ermittlung des Druckes p aus der Deformation der Bombe ist aber oft falsch, weil verschieden schnell anwachsende u. abnehmende Drucke verschiedene Zerstörungen verursachen. Die Abkühlung der Explosion durch die Wand der Bombe kann auch einen 15%ig. Fehler in die Druckangaben einbringen. Wenn aber diese Korrekturen gemacht sind, so erscheinen die Daten beider Gleichungen verschieden; für Ballistit z. B. um 22%. Vf. vermutet Fehlerquelle in den Werten für die spezif. Wärme der Gase von MALLARD u. LE CHATELIER, die man bei Ausrechnung der T gebraucht hat. (C. r. d. l'Acad. des sciences **179**. 968—70. 1924.)

BIKERNY

Henry Le Chatelier, *Bemerkungen zur Mitteilung von E. Burlot*. (Vgl. 3. Ref.) Die Angaben von MALLARD u. LE CHATELIER (Mémorial des Poudres **353**. 466 [1884—1889]) können fehlerhaft sein, weil bei ihrer Ausrechnung die Unabhängigkeit der spezif. Wärmen vom Druck vorausgesetzt wurde, die mit hohen Temp. zu recht besteht. Die Bestätigung durch Explosionsverss. ist sehr überzeugend, weil bei älteren Messungen die beiden von BURLOT angeführten Fehlerquellen nicht beobachtet wurden. (C. r. d. l'Acad. des sciences **179**. 97—1924.)

BIKERNY

De Wendelsche Berg- und Hüttenwerke, Hayingen, Lothr., *Sprengmittel bei dem als Sauerstoffträger flüssige Luft oder flüssiger Sauerstoff dient*. Bei dem Sprengmittel nach Pat. 401358 wird das Calciumsilicid teilweise oder ganz durch andere Silicide, wie Eisensilicid, ersetzt. Ferner wird zur Erhöhung der Explosivität ein KW-stoff oder ein mit einem reinen Kohlenstoffträger vermischter KVs zugesetzt. — Es wird eine bessere Sprengwrkg. erzielt. (D. R. P. **405964** vom 7/7. 1916, ausg. 10/11. 1924. **Zus. zu D. R. P. 401358**; C. 1924. II. 2511.)

E. I. du Pont de Nemours & Company, Wilmington, übert. von: **Leon Bryan**, Wilmington, Del., V. St. A., *Ammoniumnitrat-Sprengstoff*, welcher aus NH_4NO_3 u. mehr als 10% eines rauchlosen Pulvers besteht. Beispielsweise wird eine Mischung aus 10—40% rauchlosem Pulver, 35—80% NH_4NO_3 , 1—10% Glycerin u. 3—15% NaCl o. dgl. empfohlen. (A. P. **1509393** vom 25/4. 1922, ausg. 23/9. 1924.)

OELER

William M. Dehn, Seattle, Washington, *Sprengstoff*, welcher dadurch erhalten wird, daß man mit NH_4NO_3 imprägnierte Pflanzenfaserstoffe, wie Holzmehl, feinsten Verteilung mit Alkalimetallnitraten innig vermischt. (A. P. **150993** vom 16/9. 1922, ausg. 30/9. 1924.)

OELER

Trojan Powder Company, New York, übert. von: **Walter O. Snodgrass**, Allentown, Pa., V. St. A., *Sprengstoff*, welcher aus Nitrostärke, einem Oxydationsmittel, z. B. NH_4NO_3 , einem Stabilisierungsmittel, wie Harnstoff u. einem Lösungsmittel für das letztere besteht. (A. P. **1510348** vom 14/12. 1920, ausg. 30/9. 1924.)

Fredrich Olsen, Dover, New Jersey, *Sprengstoff*, welcher aus Ammoniumperchlorat, Trinitrotoluol, einem rauchlosen Pulver, wie Cordit, u. einem nicht explosiven verbrennlichem Stoff (Holzmehl o. dgl.), Salpeter u. MgO_2 zusammengesetzt ist. (A. P. **1510555** vom 16/4. 1921, ausg. 7/10. 1924.)

OELER

Nobel's Explosives Company Ltd., Stevenston, Ayrshire, Schottland, *Herstellung von Nitrocellulose enthaltenden Spreng- und Schießmitteln*. Den Sprengstoffen werden zwecks Stabilisierung Urethane zugesetzt, welche am N-Atom zwei oder drei Gruppen gebunden enthalten, von denen eine eine Benzyl- oder substituierte Methylgruppe ist. (Holl. P. **8497** vom 14/6. 1919, ausg. 15/3. 1923. E. Prior 14. 1918.)

OELER

XXI. Leder; Gerbstoffe.

Lo Priore, *Experimentelle Angaben über die Gärung der Kastanie auf dem* fen. Kastanien lagern vor dem Schalen oftmals lange auf dem Haufen, wobei ung eintritt. Hierbei treten Verluste an l. Bestandteilen ein. Während Schalen o unvergorenen Kastanien 9,20% Gerbstoff, 4,15% l. Nichtgerbstoff u. 64,59% i, enthielten, ergab die Unterss. nach der Gärung 7,87% Gerbstoff, 3,49% l tgerbstoff u. 72,38% Unl. (Bollet. Industria delle Pelli 2. 145—47. 1924.) GRI.

Hugo Kühl, *Die Bedeutung der Kolloide für den Gerbprozeß*. Erörterung der oidrkk. bei den verschiedenen Gerbarten. Bei der primitivsten Art der Fett ung, bei welcher das Fell mit dem Gehirn des Tieres eingerieben wurde, spielt Eiweiß die Rolle eines Emulsators. (Ledertechn. Rdsch. 16. 137—39. 1924. in.) GERNGROSS.

V. Kubelka, B. Köhler und F. Berka, *Die Haut als Adsorbens*. III. Über Adsorption von Eisen- und Aluminiumchlorid durch Hautpulver. (I. u. II. vgl. Collegium 1918. 324. 357.) Vff. untersuchten die Frage, ob bei den zwischen Hautpulver alzlsgg. (FeCl_3 u. AlCl_3) sich abspielenden Rkk. die Adsorption als einleitender or eine Rolle spielt oder nicht. Es wurden folgende wesentlichste Ergebnisse lten: Die durch Hautpulver verursachten Konzentrationsänderungen der Ionen e u. Al^{+++} sowie Cl' verlaufen so schnell, daß praktisch das Gleichgewicht schon ehalb der ersten 10 Minuten eingestellt ist, derart, daß bei weiterem Schütteln i zu 2 Stdn.) keinerlei Konzentrationsänderungen mehr eintreten. Das Verhältnis e adsorbierten Ionen ist nach 10 Minuten von der Zeit (bis 2 Stdn.) ganz unabhängig. e von Hautpulver aufgenommene Salz enthält mehr Cl' als n. FeCl_3 bzw. AlCl_3 , das Hautpulver entnimmt der Lsg. mehr Säure, als der Zus. des n. Chlorides rricht. Der Einfluß der Konz. der Lsgg. auf die aufgenommenen Ionen ist bei e, u. AlCl_3 verschieden. Bei AlCl_3 wird die Sättigung bei Adsorption des Cl' einner viel höheren Konz. erreicht, als bei FeCl_3 . Ferner wird das Al^{+++} schwächer sbiert, als das Fe^{+++} . Es handelt sich bei den Ionenpaaren Fe^{+++} u. Cl' sowie Al^{+++} u. Cl' um einen Fall der sogenannten Sättigung der Oberfläche des orbens. Bei den Konz. der Verss. wurde eine negative Adsorption nicht achtet; doch scheint bei AlCl_3 -Lsgg. bei hohen Konz. die Adsorption des l negativ zu werden, während die Adsorption von Cl' positiv bleibt. Die Zus. e von Hautpulver aufgenommenen Anteils des gel. Salzes hängt auch von der e. ab u. ist bei FeCl_3 u. AlCl_3 verschieden. Bei FeCl_3 wird bei niedrigsten e. z. sehr viel Cl' u. nur wenig Fe^{+++} aufgenommen, mit steigender Konz. nähert e die Zus. des adsorbierten Anteils immer mehr der des n. Salzes u. bei weiterer onentrationssteigerung wird wieder im Verhältnis zum Fe^{+++} mehr Cl' aufgenommen. e AlCl_3 steigt die Acidität des aufgenommenen Anteils regelmäßig mit steigender e, d. h. es wird im Verhältnis zum Al^{+++} immer mehr Cl' aufgenommen u. es ahrscheinlich, daß bei sehr hohen Konz. des AlCl_3 vom Hautpulver nur Cl' onommen wird. (Collegium 1924. 306—23. Böhm. Techn. Hochsch. Brünn.) LAU.

Arthur W. Thomas und Margaret W. Kelly, *Gerbsäuregerbung*. Vff. fanden quantitativen Unterss. über die gerbende Wrkg. von Gallusgerbsäure als einer ation der Konz. letzterer, daß Gallusgerbsäure wie die pflanzlichen Gerbstoff eige des Handels wirkt. Der Gerbgrad als eine Funktion von p_H zeigt, daß e Wrkg. mit derjenigen der Handelsgerbstoffe auf der sauren Seite von p_H 7—8 einstimmt. Auf der alkal. Seite davon ist jedoch keine Gerbwrg. vorhanden. e gebundene Gerbstoff des mit Gallusgerbsäure erhaltenen Leders wird mit hol leichter ausgezogen als der Gerbstoff gewisser mit pflanzlichen Gerbstoffen ehter Leder. (Journ. Ind. and Engin. Chem. 16. 800—802. 1924. Columbia, d.)

LAUFFMANN.

Johannes Paeßler, *Über festen Mimosenrindenauszug*. Vf. behandelt die die Löslichkeitsverhältnisse u. sonstigen Eigenschaften der in Südafrika hergestellten festen Mimosenrindenauszüge u. kommt zu dem Ergebnis, daß der feste Mimosenrindenauszug ein Gerbstoffauszug von hohem Gerbstoffgehalt u. von günstigen Eigenschaften ist, dessen Verwendung Vorteile bietet u. zwar besonders in der Färbung an Stelle des nicht behandelten Quebrachoauszuges, ferner zum Verstärken von Sätzen u. Versenkrühen u. anteilig zum Stellen der stärksten Lössen von Farbgängen. (Ledertechn. Rdsch. 16. 113—15. 1924. Freiberg i. Sa., Deutsche Versuchsanstalt für Lederind.) LAUFFMAN.

—, *Pulverförmige Gerbstoffextrakte*. Es werden die Vorteile u. die Herstellungsverf., besonders die neuen Eintrocknungsverf., der pulverförmigen Gerbstoffextrakte behandelt. (Ledertechn. Rdsch. 16. 117—19. 126—27. 1924.) LAUFFMAN.

W. R. Atkin und **P. Chambard**, *Offizielle Methode zur Untersuchung von haarungskalken*. Zur Wertbest. sind folgende Bestst. auszuführen: Kaustische Alkalität ($\text{Ca}(\text{OH})_2$, NaOH , CaS , Na_2S), NH_3 , Schwefel, Gesamt-N, Aminogruppe, der Grad ihrer Hydrolyse, Schwellungsvermögen u. Temp. (Bollet. Industria e Commercio. Pelli 2. 183—90. 1924.) GRIMM.

—, *Nitrosomethylurethan als Reagens auf Pyrocatechingerbstoffe*. Vf. kommt bei Nachprüfung der von VOGEL u. SCHÜLLER (Collegium 1923. 319; C. 191. 1728) angegebenen Prüfungsverf. für Gerbstoffe mit Nitrosomethylurethan zu dem Vergleich zur Rk. mit HCOH u. HCl zu folgenden Ergebnissen: Die Rk. mit Nitrosomethylurethan ist kein geeignetes Reagens zur Unterscheidung von Pyrocatechin u. Pyrogallolgerbstoffen, da die B. eines Nd. in verschiedenem Maße vor sich geht ohne für die beiden Hauptgruppen oder einzelne Gruppenvertreter kennzeichnend zu sein u. da bei längerem Kochen auch einige Gerbstoffe der Pyrogallolreihe mit dem Nitrosomethylurethan derart reagieren, daß sie die typ. Rk. mit Eisensulfat nicht mehr geben. Die Behandlung mit HCOH u. HCl ist als Gruppenreagens obwohl es als solches nicht ganz vollkommen ist) derjenigen mit Nitrosomethylurethan bei weitem vorzuziehen. (Collegium 1924. 323—27. Waalwijk [Holn. Reichsversuchsanstalt für Lederindustrie.) LAUFFMAN.

Winifred Nellie Nicholson und **Donald Rhind**, *Die quantitative Bestimmung des Grades der Hydrolyse von Gallotannin durch Tannase*. Die bei Einwirkung von Tannase auf Gallotannin oder Methylgallat entstehende Gallussäure bestimmt FREUDENBERG u. VOLBRECHT (Ztschr. f. physiol. Ch. 116. 277; C. 1922. 128) durch Titration. Dieses Verf. hat sich als unzuverlässig erwiesen, dagegen hat sich das colorimetr. Verf. zur Best. kleiner Mengen Gallussäure von MITCHELL (Analyst 48. 2; C. 1923. II. 862) in geringer, dem vorliegenden Zwecke angelegentlich Abänderung brauchbar gezeigt. Die Ausführung des Verf. u. die Handhabung der Einrichtung des dazu verwendeten Colorimeters wird beschrieben. Die Untersuchungen über den Grad der Hydrolyse wurden wie folgt vorgenommen: Probegläser wurden mit je 10 ccm der Gallotanninlsg. (etwa 3 g im Liter) versetzt; dazu gab man 10 ccm Mycelauszug (Schütteln von 1 g Mycelpulver mit 50 ccm W. während 3 Stunden, 21 Stdn. Stehenlassen u. Filtrieren) u. überschichtete mit Bzl. Dann wurde das Probegläser dicht verkorkt u. in einem Brutschranke bei 25° aufbewahrt. Nach Verlauf von je 24 Stdn. wurde je eines der Proberöhrchen auf Gallotannin untersucht. Das unveränderte Gallotannin wurde mit 4,5 ccm 1%ig. Lsg. von Chinidinchlorhydrat gefällt u. der Nd. durch Zugabe von 0,5 ccm 16%ig. NaCl -Lsg. suspendiert. 1 ccm dieses Gemisches gab man in das eine Neßlersche Rohr des Colorimeters u. 1 ccm der Vergleichslsg. von Gallussäure mit 1 ccm 0,5% NaCl -Lsg. in das andere. Beide Röhren erhielten dann noch je 2 ccm des Mitchell-Reagenses, wurden auf 100 ccm aufgefüllt, gemischt u. in üblicher Weise auf Farbstärken verglichen. (Analyst 49. 505—9. 1924.) RÜBE.

Sres Nordenflycht, Bustos y Cia., c/o Sres Magnere, Santiago de Chile, *Mittel zum Enthaaren von Fellen und Häuten*, bestehend aus Na_2S_2 u. einer Überführung des letzteren in Na_2S unzureichenden Menge freien NaOH . — Gibt z. B. zu einer Lsg. von NaOH in W. bei 80° allmählich soviel feinen S, daß eine konz. Lsg. von Na_2S_5 entsteht. Nachdem das Aufschäumen beendet ist, wird gepulvertes NaOH , in etwas größerer Menge als zur Überführung von Na_2S_5 in Na_2S_2 erforderlich ist, hinzugeben. Nach Beendigung der sehr heftigen, mit Aufschäumen u. Entw. von Dämpfen eintretenden Rk. wird die M. in geeignete Behälter gegossen. Sie erstarrt zu einem festen, rötlich schokoladefarbenen graugelblichen, ca. 65—70% Na_2S_2 , 2—3% $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ u. Na_2SO_3 , 25—35% W., Spuren von FeS u. andere Verunreinigungen enthaltenden Prod., das ohne Zusatz von CaO zur Enthaarung Verwendung finden kann. (E. P. 191431 vom 14/12. 1921, ausg. 8/2. 1923.)

SCHOTTLÄNDER.

Alfred Ehrenreich, Frankreich, *Verfahren zum Entfernen der stacheligen Oberfläche von Haifischhäuten vor dem Gerben*. Man behandelt die gründlich entfalteten Häute von Haifischen, Stachelrochen usw. mit einem Gemisch von chem. Na, von CaCl_2 u. MgCl_2 freiem NaCl in gesätt. wss. Lsg. u. HCl 18°Bé . Die stachelige Oberschicht läßt sich dann leicht entfernen. Gleichzeitig erhält man die Häute in sterilisiertem u. gepickeltem Zustande (hierzu vgl. auch ROGERS u. Oceanic Co., Inc., A. P. 1395773; C. 1923. II. 207.) (F. P. 574455 vom 7/12. 1923, ausg. 11/7. 1924.)

SCHOTTLÄNDER.

Alfred Ehrenreich und Kristian Bendixen, Frankreich, *Verfahren zum Gegerben von Fischhäuten und Häuten anderer Seetiere*. Die geweichten u. gegebenenfalls in ein Milchsäure oder $\text{CH}_3\text{CO}_2\text{H}$ u. gegebenenfalls NaHSO_4 , oder Oropon, enthaltendes Bad gebracht u. bei ca. 30° während $3\frac{1}{2}$ Stdn. in Wasser gewalkt. Hierauf läßt man abtropfen u. bringt die Häute in eine vegetabil. oder mineral. Lsg., z. B. Quebracho, Sumach oder Kastanienholzextrakt, oder eine mineral. Lsg., wie Cr-Salze, walkt einige Minuten, läßt die Häute dann im Gerbbad liegen, walkt wiederum 1 Stde. u. wiederholt die Maßnahme im Verlauf von 24 bis 36 Stdn. mehrmals, worauf die Häute vollständig gegerbt sind. Im Cr-Bad ist die Gerbung bereits nach 16—24 Stdn. beendet. (F. P. 575398 vom 6/12. 1923, ausg. 7/12. 1924.)

SCHOTTLÄNDER.

Die Sunbeam Chemical Company, übert. von: **Wolf Kritchevsky**, Chicago, Ill., V. St. A., *Färben und Polieren von Leder*. Man verwendet ein Gemisch aus Farbstoff, Carnaubawachs u. einem Lösungsm. für den Farbstoff u. das Carnaubawachs, z. B. 4 Teile Farbstoff, 4—5 Teile Carnaubawachs, 4—5 Teile Petroleumöl u. 86—88 Teile A. (Can. P. 237471 vom 23/4. 1923, ausg. 29/1. 1924.)

FRANZ.

Wilhelm Brauns G. m. b. H., Quedlinburg, *Färben von Leder*, dad. gek., daß man das Leder mit einer Lsg. von Tanninlacken in verd. Säuren u. A. oder anderen wässrigen, mischbaren organ. Fll., gegebenenfalls unter Zusatz von l. Metallsalzen u. Farbstoffen behandelt. — Die B. des Tanninlackes erfolgt erst nach dem Verwaschen der Lösungsm., die Färbungen stäuben nicht ab. (D. R. P. 406618 Kl. 8m vom 14/4. 1923, ausg. 25/11. 1924.)

FRANZ.

Kaj Herman Nielsen, Kopenhagen, Dänemark, *Imprägnierungsmittel für Leder*, bestehend aus einem Gemisch von gleichen Teilen Harz u. konsistemem Lösungsm. (Dän. P. 33218 vom 8/9. 1923, ausg. 19/5. 1924.)

FRANZ.

XXII. Leim; Gelatine; Klebmittel usw.

Th. Mann & Voß, Hamburg, *Herstellung eines nichtfaulenden Casein-Kaltleims*. Man kocht Casein mit Ca(OH)_2 u. solchen Alkalisalzen, die sowohl mit dem Ca(OH)_2 unlöslich bleiben, als auch gleichzeitig die Caseinlsg. vor dem Faulen schützen,

wobei das $\text{Ca}(\text{OH})_2$ in stöchiometrischem Überschuß gegenüber den Alkali angewendet wird, dad. gek., daß zum Zwecke der Unlöslichmachung des getrockneten Kaltleims dem Gemische noch Schwefelpulver zugesetzt wird. (D. 406401 Kl. 22i vom 10/9. 1921, ausg. 18/11. 1924.) OELK

Hugo Kühl, Berlin, *Herstellung von Kaltleimen*, dad. gek., daß man in Kolloide enthaltenden Mischungen, insbesondere caseinhaltigen, anorgan. K mit Ausnahme von Si-Verbb., erzeugt. — Der so hergestellte Kaltleim ist nicht wie die nach den bisher üblichen Verff. hergestellten, sofort verwendet werden. (D. R. P. 407126 Kl. 22i vom 6/7. 1923, ausg. 9/12. 1924.) OELK

Edouard Servat, Toulouse, Frankreich, *Kittender Leim für Leder alle* Rohe Balata in Blattform wird mit CS_2 vermischt u. bis zur vollständigen L. der Sonne stehen gelassen, hierauf die Lsg. filtriert. Man erhält einen hell gefärbten Leim. (F. P. 549338 vom 25/3. 1922, ausg. 7/2. 1923.) SCHOTTLA

Adolphe Pansky, Frankreich, *Gewinnung von Gelatine aus Knochen*. Knochen werden mit alkal. Lsgg. ausgelaugt, neutral gewaschen, gedämpft im Umlauf befindlichen W. von etwa 60° unter Evakuieren ausgezogen. (573814 vom 24/11. 1923, ausg. 30/6. 1924.) KÜHL

Frederick Alfred Edward Jenkins, Sidney, Neu Süd-Wales, Australien, *Elastische Membran für Sprechvorrichtungen*. Man verwendet ein Gemisch 1—2 Teilen *Gelatine* u. 3—2 Teilen *Glycerin*. (A. P. 1511166 vom 27/3. 1923, ausg. 7/10. 1924.) FEN

Wolff & Co., Walsrode, **Emil Czapek** und **Richard Weingand**, Braunschweig, *Erzeugung von unlöslichen Niederschlägen in Folien, bezw. Gebilden aus Cellulose, Nitrocellulose, Gelatine u. dgl.* Man spannt die zu imprägnierende Folie so in ein Gefäß, daß sie dieses in zwei Räume teilt, in diese Räume gießt man eine Lsgg., die beim Zusammentreffen in der Folie einen Nd. erzeugen, z. B. AgNO_3 ; das Verf. kann durch Anwendung eines Potentialgefälles beschleunigt werden. (Oe. P. 97694 vom 6/6. 1923, ausg. 25/8. 1924. D. Prior. 16/6. 1922.) R.

Kazimierz Smoleński, Warschau, *Gewinnung von Klebstoff aus Rübenschnitzabfällen*. (D. R. P. 406539 Kl. 22i vom 14/3. 1920, ausg. 22/11. 1924. — C. 1914. 1144.) OELK

Hugo Kühl, Berlin, *Herstellung eines Klebmittels*, 1. dad. gek., daß die in Lupinenentbitterung durch Abkochungen mit W. abfallenden Brühen bis zur Sirupdicke eingedampft werden. — 2. dad. gek., daß man der eingedickten Brül 5% anorgan. Kolloide zusetzt. (D. R. P. 407084 Kl. 22i vom 6/7. 1923, ausg. 5/12. 1924.) OELK

Société Anonyme des Rizeries françaises, Le Havre, Frankreich, *Gewinnung eines schwer in Gärung übergehenden Kleisters*, Kleb- u. Appreturmittels o. d. stickstoffhaltige Stoffe enthaltendem Stärkemehl, dad. gek., daß man das Mehl mittels eines Gasstromes, der einen geringen Prozentsatz (beispielsweise 0,1–0,2%) von Cl- oder Br-Protoxyd enthält, in der Kälte behandelt. — Der Grad der Konservierung derartiger Kleister ist demjenigen des unter Verwendung von Ktostärke hergestellten Kleisters gleich oder sogar überlegen. (D. R. P. 461814 Kl. 22i vom 20/2. 1923, ausg. 21/11. 1924.) OELK

Frederick W. Farrell, Brookfield, Massachusetts, V. St. A., *Klebpflaste* M erwärmt etwa 120 Tle. Asphalt, 26 Tle. Leinöl u. 10 Tle. Schwefel auf 185° ; asphalt. haltene Prod., das als *Klebmittel* benutzt werden kann, wird auf Papierstreifen aufgetragen, nach dem Erkalten kann man das Papier aufrollen. Zum Gebrauch wird es erwärmt. (A. P. 1510472 vom 19/1. 1917, ausg. 7/10. 1924.) FEN

Chemisches Zentralblatt.

925 Band I.

Nr. 7.

18. Februar.

A. Allgemeine und physikalische Chemie.

Edmund O. von Lippmann, *J. Ruska's neue Untersuchungen über die Anfänge Arabischen Alchemie*. Referat über die Unterss. des genannten Orientalisten die Anfänge der arab. alchemist. Literatur. (Chem.-Ztg. **49**. 2. 27—28.) JUNG.

Ernest Martin, *Chemische Verwandtschaft*. Vf. stellt eine Theorie der Valenz. Die Affinität äußert sich in zwei einander entgegengesetzten Kräften u. die ist das Resultat der Annäherung der Atomzentren unter der Wrkg. beiderziehungskräfte. Stärke u. Richtung der Affinität hängen von den Atomen u. den experimentellen Bedingungen ab. Aus der Theorie wird die allgemeine eition von Säuren u. Basen, die Erklärung der Einw. von W. auf bas. Oxyde säureanhydride u. die Katalysatorwrkg. abgeleitet. (Moniteur scient. [5.] **14**. 33. 1924.)

JUNG.

A. Smits, *Das Zusammengesetztsein des einfachen Stoffes, nachgewiesen durch intensive Trocknung*. Wie die zusammen mit BAKER (vgl. Chem. Weekblad **20**. C. **1923**. III. 720 u. Journ. Chem. Soc. London **123**. 1223; C. **1923**. III. 1334) durchgeführten Verss. gezeigt haben, bestehen Fl. u. feste Stoffe (SO_3) aus Gemischen aus eher u. polymerer Moleküle, letztere nach intensiver Trocknung nachweisbar in Best. von Kp., Mol.-Gew. u. Dampfspannung. W. wirkt katalyt. zersetzend, bisweilen, z. B. bei Bzl., so langsam, daß beim raschen Erhitzen eines Gemisches von intensiv getrocknetem Bzl. u. W., das W. eher sd. als das Bzl. Völlige Zersetzung von $(\text{C}_6\text{H}_6)_n$ in C_6H_6 tritt erst nach 1 Monat ein (Kp. 81 statt 80°) Beziehung der Erscheinungen für die *Theorie der Allotropie*. (Chem. Weekblad **21**. 4-600. 1924.)

GROSZFELD.

Hanns Jelinek, *Eine Beziehung zwischen dem Molekulargewicht und der Dichte konzentrierter Säuren in Baumé-Graden*. Die D. von konz. HCl , HNO_3 u. H_2SO_4 gleich dem Mol-Gew. vermindert um 13, bzw. 23, bzw. 33. Der Fehler beträgt $\pm 1^\circ \text{Be}$. Bei HCl lassen sich Zwischenwerte durch lineare Interpolation gewinnen, bei HNO_3 u. H_2SO_4 nicht. (Chem.-Ztg. **49**. 42.)

JUNG.

S. S. Bhatnagar, Mata Prasad und D. M. Mukerji, *Die Oberflächenspannung von Natrium- und Kalium-Amalgamen an der Grenzfläche Amalgam-Benzol*. Vff. messen die Oberflächenspannungen von Na- u. K-Amalgamen verschiedener Konz. um festzustellen, ob erstere mit letzteren sich kontinuierlich verändern u. damit das Amalgam eine Lsg. des Alkalimetalls im Hg kennzeichnen oder ob ein diskontinuierlicher Übergang vorliegt, welcher für das Vorhandensein bestimmter Na-Hg- bzw. K-Hg-Amalgamen sprechen würde. Herst. der Amalgame erfolgt durch elektrolyt. Abscheidung der Alkalimetalle aus Lsgg. ihrer Carbonate an Hg-Kathoden; die Menge des abgeschiedenen Metalls wird durch entsprechende Bemessung der Elektrolytendauer bestimmt. Nach sorgfältiger Reinigung u. Trocknung der Präparate werden die Oberflächenspannungen der Amalgame mittels der Tropfmethode gemessen; die zur Umwertung dieser Messungen benötigten Werte für die DD. der Amalgame werden ebenfalls bestimmt, ebenso die Konz. der Amalgame an den Alkalimetallen mittels Titration derselben mit W. u. Titration der entstandenen Lauge. Es werden die Oberflächenspannungen von 11 Na-Amalgamen zwischen 0,033 u. 0,312 Gew.-% Na u. 7 K-Amalgamen zwischen 0,056 u. 0,182 Gew.-% K bestimmt: die erhaltenen

VII. 1.

Kurven ergeben ausgeprägte Diskontinuitäten für die Abhängigkeit der Oberflächenspannungen von der Konz. der Amalgame. Dies spricht für das Vorhandensein verschiedener Alkali-Hg-Verbb. auch in diesen stark verdünnten Amalgamen, im Befund, der mit dem aus Messungen der elektr. Leitfähigkeit der Amalgame ergebenden in Einklang steht. (Quarterly Journ. Indian Chem.-Soc. **1**. 81—89. 1924.) Benares, Hindu Univ.)

FRANKENBURGE

H. Colin und **A. Chaudun**, Über die Hydrolysenkonstante des Zuckers. Sie haben 5—40%ig. Zuckerlsgg. bei 25° mit 0,1-n. H_2SO_4 hydrolysiert. Die Geschwindigkeit der Hydrolyse wächst schneller als die Konz. des Zuckers. Bei angewandten Säure war der Wert $(k_{40} - k_5)/k_5 = 0,32$; da **MORAN** u. **LEITCH** (Journ. Chem. Soc. London **121**. 1613; C. **1923**. I. 188) bei Benutzung von 0,1-n. HBr, CCl_3COOH , $C_2O_4H_2$, $HCOOH$ u. CH_3COOH angestellt, die entsprechenden Zahlen waren: 0,55; 0,46; 0,47; 0,33; 0,20; 0,17; 0,00. Das Anwachsen der Hydrolysegeschwindigkeit des Zuckers mit der Konz. hängt demnach von dem benutzten Katalysator ab; je weniger dissoziiert die Säure ist, um so kleiner ist der Wert $(k_{40} - k_5)/k_5$. (C. r. d. l'Acad. des sciences **179**. 1607—9. 1924.) HAMBURG

P. Job, Elektrometrische Untersuchung der Hydrolyse. Es wurde (vgl. C. r. d. l'Acad. des sciences **179**. 49; C. **1924**. II. 1660) das Potential einer H-Elektrode in einer Acetatlg. nach Zusatz einer bestimmten Menge HCl gemessen. Als Zwischen-elektrolyt dienten Na_2SO_4 , K_2SO_4 oder KCl-Lsgg.; eine Korrektur auf die Konzentration der Flüssigkeitskette wurde nicht angebracht. Ist A die Bruttokonz. des Acetats, B die der HCl, so gilt $B = [H^+] \cdot \left(1 + \frac{A \cdot [H^+]}{K + [H^+]}\right)$, wenn K die Dissoziationskonstante der Essigsäure bedeutet. Für K folgt aus Vfs. Verss. (bei 16°) $3,5 \cdot 10^{-5}$, was den bisher angenommenen um 100% übersteigenden Wert. Für NH_3 wurde ähnlich $K = 2,8 \cdot 10^{-5}$ gefunden. (C. r. d. l'Acad. des sciences **179**. 1317—19. 1924.) PARIS

N. Zelinsky, Zur Frage nach dem Mechanismus der Hydrogenisations- und Dehydrogenisationskatalyse. Die Erscheinung der irreversiblen Katalyse (vgl. **ZELINSKY** u. **PAWLOW**, Ber. Dtsch. Chem. Ges. **57**. 1066; C. **1924**. II. 838) hat noch keine gewisse Begründung für die Annahme geschaffen, daß die bisher nicht aufgefundenen Zwischenkörper bei Hydrierung der arom. KW-stoffe u. bei Dehydrierung der Perhydride unter Einfluß von Pd u. Pt in Gestalt nicht völlig hydrierter Proben gebildet werden dürften. Sie können aber gerade wegen des irreversiblen Charakters der Rk. nicht abgefangen werden, da sie im Augenblick ihrer Entstehung schon der Umwandlung unterliegen. Dieser Mechanismus sollte auch allen analogen Fällen zugrunde gelegt werden, bei denen Ni als Katalysator wirkt. Auch bei fermentativen Prozessen u. bei Oxydations-Red.-Rkk. im tier. Stoffwechsel wie bei jenen Vorgängen, direkte Entnahme von H-Atomen aus einem der Moleküle, Anlagerung derselben an die anderen Moll. möglich. — Ein ungesätt. KW-stoff wie Cyclohexen könnte seiner chem. Natur nach ein labiles System vorstellen oder sich bei Berührung mit einem bestimmten Katalysator unbeständig werden. Die hohe Thermostabilität des Cyclohexens spricht für die zweite Annahme. — Als katalytischer Faktor kann auch von O_2 u. H_2 befreites Pd dienen, das wie das übliche Pd-Schwarz bei 90° die irreversible Katalyse von Cyclohexen vollständig zu Cyclohexan u. Bzl. bewirkte. — Auch mit fl. Cyclohexen (im Einschlußrohr bei 110° bis 120°) trat diese Umwandlung vollständig ein. Sie erfolgt auch, allerdings bedeutend langsamer, bei gewöhnlicher Temp. — Betrachtet man das der Einw. von H_2 ausgesetzte Bzl. als ein System, in dem gewisse geringe Mengen Di- u. Tetrahydrobenzol schon im Gleichgewicht vorhanden sind, so besteht die Rolle des Pd-Schwarzes u. analog wirkender Katalysatoren darin, daß sie bei der irreversiblen

lyse des Cyclohexens u. Cyclohexadiens eine Beschleunigung des Reaktionsanges hervorrufen, so daß das Gleichgewicht $C_6H_6 + 3H_2 \rightleftharpoons C_6H_{12}$ nach rechts verschoben wird. Bei Temp. über 150° beginnt die Rk. in der entgegengesetzten Richtung zu verlaufen. Daß hierzu schon geringe Änderung der Temp. reicht, macht wahrscheinlich, daß die Wärmetönung des Hydrogenisations- u. Hydrogenisationsprozesses gering ist, die Verbrennungswärmen von 3 Molen Cyclohexen also annähernd gleich denen von 2 Molen Cyclohexan u. 1 Mol Bzl. In der Tat beträgt der Unterschied auch weniger als 1%. (Ber. Dtsch. Chem. 58. 185—87. Moskau, I. Univ.)

SPIEGEL.

A₁. Atomstruktur. Radiochemie. Photochemie.

N. K. Adam und **J. W. W. Dyer**, *Die Molekularstruktur dünner Häutchen*. VI. (vgl. Proc. Royal Soc. London Serie A. 103. 687; C. 1923. III. 1294.) Vff. untersuchen nach den bisherigen Methoden 5 prim. Alkohole (*Dodecyl-, Tetradecyl-, Hexadecyl-, Octadecyl-, Ikosylalkohol*). Die Querschnittsfläche der Ketten dieser Alkohole ist dieselbe als die bei den Säuren gemessene (innerhalb $2\frac{1}{2}\%$); die Methyl-Gruppe hat eine Querschnittsfläche $= 21,6 (\text{\AA})^2$. Die *Acetate des Hexadecyl-, Octadecyl- u. Ikosylalkohols* sind bei der B. dünner Häutchen so angeordnet, daß die Methyl-Gruppen der Einzelmoll. $23 (\text{\AA})^2$ an Fläche einnehmen, sie bilden ausgedehnte Häutchen der gleichen Art wie andere Ester. Die Methyläther des *Oktadecyl- u. Hexadecylalkohols* bilden keine stabilen Häutchen, da die Methylgruppe die Verankerung der polaren Gruppe an W. zu zerstören scheint. Mehrfach ungesättigte Säuren wie die *Leinölsäure* ($C_{17}H_{33}COOH$) u. die *Clupanodonsäure* ($C_{21}H_{33} \cdot COOH$) (mit 11. 5 Doppelbindungen in der Kette) verhalten sich wie die Ölsäure (mit 1 Doppelbindung); *Arachinsäure*, deren Äthyl- u. Methyl ester sowie ihr Nitril verhalten sich normal. Die Übergänge zwischen den beiden „allotropen“ kondensierten Häutchenformen werden eingehend von *Ikosylharnstoff* ($C_{20}H_{41} \cdot NH \cdot CO \cdot NH_2$) untersucht. *Hexadecyl- u. Octadecylacetamid* bilden feste, aus eng aneinandergepackten Häutchen bestehende Häutchen bei tiefen Temp.; diese schmelzen bei einer bestimmten Temp. zu fl. Häutchen. Molekülquerschnitt $= 24,2 (\text{\AA})^2$. Dieses Schmelzen scheint auf zurückzuführen sein, daß die Moll. neben ihrer bisherigen translator. noch rotator. u. Schwingungsenergien aufnehmen. Kohlenwasserstoffketten von mehr als 11 C *Carnaubasäure* $= C_{23}H_{47}COOH$, *Montansäure* $= C_{27}H_{55}COOH$, *Gossypinsäure* $= C_{29}H_{59} \cdot COOH$ u. die *Säuren* $C_{31}H_{63} \cdot COOH$ u. $C_{33}H_{67} \cdot COOH$ sowie die *Alkohole u. Methyl ester der Gossypinsäure u. der Säuren mit 32 bzw. 34 C-Atomen* zeigen eine Tendenz zum „Herausrängen“ der Moll. aus den Grenzflächenhäutchen. *Erythrittetrapalmitat* besitzt 4 um einen gemeinsamen Mittelpunkt angeordnete Häutchen, die normalerweise zu den 4 Ecken eines Tetraeders gerichtet sind; im Oberflächenhäutchen stellen sich alle diese Ketten zu einander parallel senkrecht zur Grenzfläche. Äußerer Druck bringt diese Ketten bis zur engsten Packung einander näher. (Proc. Royal Soc. London Serie A. 106. 694—709. 1924.) FRANKENBURGER.

O. Herzog und **H. W. Gonell**, *Über den Feinbau der Kunstseide*. Alle Kunstseiden, mit Ausnahme der Acetatseide, geben im Röntgenlichte das Diagramm eines kristallinen Körpers. Die Vermessung der Röntgendiagramme von Kunstseiden (I) erweist ihre weitgehende Übereinstimmung mit den entsprechenden Diagrammen der mercerisierten Zellulose. Deren kristalline Substanz ist demnach in Kunstseiden enthalten. Die auf verschiedene Weise gewonnenen Fasern von Kunstseiden unterscheiden sich voneinander durch die Art der Ausrichtung nach der Faserachse u. durch verschiedene Teilchengrößen. (Kolloid-Ztschr. 35. 201—2. 1924. Berlin Dahlem, Kais. Wilh. Inst.)

THIESSEN.

Herbert Daacke, *Mathematisch-statistische Untersuchungen über die Substanz*. Durch Anwendung der cycl. Fehlertheorie auf eine Anzahl von Ver-

suchsergebnisse, welche die Unterschreitung des Elementarquantums betreffen kommt Vf. zu dem Schluß, daß die Annahme, die Ladungswerte von Kugeln mit kleinen Durchmesser seien ganzzahlige Submultipla des Wertes 4,77, größt Wahrscheinlichkeit besitzt als jede andere Annahme. (Physikal. Ztschr. 25. 624—1924. Hamburg.)

W. Schottky, *Diffusionstheorie der positiven Säule*. (Vgl. Naturwissenschaften 12. 599. Physikal. Ztschr. 25. 342; C. 1924. II. 1316. 1887.) Mathemat. Entw. Theorie. (Physikal. Ztschr. 25. 635—40. 1924. Rostock.)

Meghnad Saha und Nalinikanta Sur, *Über eine experimentelle Prüfung der thermischen Ionisierung von Elementen*. Vf. untersuchen die therm. Ionisierung verschiedener Metaldämpfe. Die Verss. werden derart ausgeführt, daß das untersuchende Metall in einem kleinen, elektr. geheizten Ofen auf eine bestimmte Temp. erhitzt wird, für welche der dazugehörige Dampfdruck des betreffenden Metalls bekannt ist; der so erzeugte Dampf tritt in einen größeren, ebenfalls elektr. geheizten Ofen ein, dessen Temp. höher als die des VerdampfungsOfens liegt; dies ermöglicht die Variierung des Druckes. Innerhalb dieses Ofens ist axial ein Eisendraht gespannt; zwischen ihm u. den Ofenwänden liegt das elektr. Feld ($\approx 1,34$ Volt/cm) welches dazu dient, die allenfalls bei therm. Ionisierung entstehenden Ionen u. Elektronen abzusaugen. Die ganze App. ist gekühlt u. in evakuierte Metallgefäße eingebaut. Die Verss. zeigen, daß die Dämpfe von *Hg*, *Cd* u. *Zn* bei Temp. bis zu 1250° noch gar keine Ionisierung aufweisen. *Mg*-Dampf scheint bei 1300° in nennenswertem Maße, *Ca*-Dampf desgleichen bei 1150° ionisiert zu sein; *Na*-Dampf zeigt bereits bei 900° eine erhebliche Ionisierung. Diese Ergebnisse stehen im Einklang mit der Abstufung der Ionisierungspotentiale der erwähnten Elemente. (Quarterly Journ. Indian. Chem.-Soc. 1. 9—18. 1924. Allahabad Univ.)

Adolf Smekal, *Zur Quantentheorie der radioaktiven Zerfallsvorgänge*. II. Vf. weist darauf hin, daß auch die neue Anschauung von L. MEITNER über die Natur der γ -Strahlen beim Atomzerfall (Ztschr. f. Physik 26. 169; C. 1924. II. 1770) auf seiner quantentheoret. Deutung der Zerfallsvorgänge (Ztschr. f. Physik 10. 265. 265; C. 1923. III. 341. 1924. II. 2119) im Einklang steht. (Ztschr. f. Physik 23. 142—45. 1924. Wien, Univers.)

C. D. Ellis, *Die hohen Energiegruppen in dem magnetischen Spektrum des Radium C β -Strahlen*. Vf. bestimmt in Fortsetzung der Arbeit von ELLIS u. SKINNER (Proc. Royal Soc. London, Serie A 105. 165; C. 1924. I. 2564) nunmehr auch das ganze von RUTHERFORD u. ROBINSON (Philos. Magazine [6] 26. 7. C. 1913. II. 1850) untersucht β -Strahlspektrum des RaC noch einmal. Die Energien der β -Strahlen dieses aus 58 Linien bestehenden Spektrums liegen zwischen $0,147 \cdot 10^6$ u. $2,539 \cdot 10^6$ Volt. 25 Linien können als aus den K-, L-, M- u. N-Niveaus ausgelöste Photoelektronen von 11 γ -Strahllinien gedeutet werden, deren Wellenlängen 45,3; 37,5; 32,0; 29,0; 20,23; 13,15; 10,95; 9,91; 8,67; 6,95 u. $5,57 \cdot 10^{-12}$ m sind. Trotz der hohen Energien der γ -Strahlen fand man keine Anzeichen dafür, daß etwa Elektronen aus noch unbekannten Niveaus oder aus dem Kern selbst ausgelöst werden. Entsprechend der Arbeit von ELLIS u. SKINNER (Proc. Royal Soc. London, Serie A 105. 185; C. 1924. I. 2564) wird auch aus den gefundenen γ -Strahlenenergien ein Niveauschema für den RaC-Kern aufgestellt. (Proc. Cambridge Philos. Soc. 22. 369—78. 1924. Trinity Coll.)

J. A. Gray, *Effektive Wellenlänge der γ -Strahlen*. An Hand der Arbeiten von ELLIS u. SKINNER (Proc. Royal Soc. London Serie A 105. 185; C. 1924. I. 234) stellt Vf. fest, daß sekundäre β -Strahlen, welche in leichten Elementen durch γ -Strahlen des RaC ausgelöst werden u. welche Rückstoßelektronen sind, deren Energie nach der Streutheorie zu berechnen ist, eine effektive Wellenlänge besitzen, die γ -Strahlen bedingen, welche kleiner ist, als bisher angenommen wurde. Man kann

aus schließen, daß keine der bisher entwickelten Theorien der γ -Strahlstreuung die Eigenschaften der gestreuten γ -Strahlen richtig wieder zu geben vermag. Die Zahl der Atome des Elements, welche ein oder mehrere Typen monochromatischer Strahlung aussenden ist nur ein kleiner Teil der gesamten Zahl der zerfallenden Atome. Der größte Teil der emittierten γ -Strahlenenergie muß von einer kontinuierlichen Strahlung herrühren. Beim Zerfall des RaD emittiert jedes 5. Atom einen γ -Strahl. Die Kenntnis der Wellenlängen u. Intensitäten des γ -Spektrums reicht nicht vollständig zur Deutung dieser Folgerungen. (Nature **115**. 13. Kingston, Vir.)

BECKER.

Jean Thibaud, Über die γ -Strahlung sehr hoher Energie der aktiven Körper der Thorium-Reihe. (Vgl. S. 335.) Analog den früheren Unterss. über die photochemische Wirksamkeit der γ -Strahlung des Ra auf verschiedene Elemente (vgl. C. r. Acad. des sciences **178**. 1706; **179**. 165; C. **1924**. II. 2633) studiert Vf. die Strahlungen eines Gemisches von Mesothorium 2, ThB u. ThC". Er schließt den Grund der magnet. Analyse der durch diese γ -Strahlung an U, Pb, Pt, W, an. Ag ausgelösten β -Strahlen auf die Energie der γ -Strahlung zurück, da sich die Einsteinsche Beziehung für den lichtelektr. Effekt für den, durch direkte Messungen bestimmten (weicheeren) Teil der Strahlen als bestätigt zeigt. Die Verhältnisse aus den K-Niveaus ausgelösten β -Strahlen lassen auf die Existenz von β -Strahlen von 580,7, 908,2 u. 962,7 Kilovolt schließen. Vf. diskutiert die Art der Ausnutzung dieser γ -Strahlen auf die verschiedenen aktiven Glieder des strahlenden Gemisches. (C. r. d. l'Acad. des Sciences **179**. 1052—54. 1924.) FRANKENBURGER.

Lewis Simons, Die Röntgenstrahlenemission von Elektronen von Metallfilmen mit besonderer Berücksichtigung des Gebietes der Absorptionsgrenze. (Vgl. Philos. Magazine [6] **48**. 250; C. **1924**. II. 1771.) Es ergibt sich aus experimentellen u. theoret. Erwägungen, daß die kinet. Energie der Elektronenemission einer Substanz, die mit Röntgenstrahlen bestrahlt wird, $(\frac{1}{2}mv^2)_{K,L,M} = h\nu - h\nu_{K,L,M}$, wenn ν die Energie des einfallenden Strahles u. $h\nu_{K,L,M}$ die Energie der K, L oder M-Absorptionsgrenze der Substanz ist. Da die K-Grenze die größte Energie besitzt, folgt daraus, daß die sekundären K- β -Strahlen die kleinste Energie besitzen. Es ergibt sich dabei die Schwierigkeit bei der quantitativen Erklärung eines leichten Anstiegs der Ionisation bei der Absorption, wenn ν den Betrag ν_K übersteigt. Vf. bestimmt nach einer direkten Methode die Gesamtzahl der β -Strahlen, welche in Ag- u. Au-Folien als Sekundärstrahler emittiert werden, wenn die Wellenlänge des einfallenden primären Strahls im Gebiet der K-Absorptionsgrenze des Sekundärstrahlers variiert. Unter Zuhilfenahme von früheren Beobachtungen u. Messungen von BARKLA u. DALLAS (Philos. Magazine [6] **47**. 1; C. **1924**. I. 19) kommt Vf. zu dem Resultat, daß keinerlei selektiver Anstieg der Energie zu beobachten ist, wenn die anregende Fluoreszenzstrahlung die K-Serie überschreitet. Der experimentellen Durchführung der Verss. war die Trennung der sekundären β -Strahlen von den viel weicheeren δ -Strahlen notwendig. Die letzteren können von Thermoionen, Rückstoßelektronen u. Stoßelektronen herrühren. Ihre Energie ist kleiner als 3,5 Volt u. ist unabhängig von der Wellenlänge der primären Fluoreszenzstrahlung u. von der Substanz, in welcher sie ausgelöst werden. Sie werden wahrscheinlich bei ihrer Entstehung in der Oberfläche des Sekundärstrahlers von den sekundären Röntgenstrahlen beeinflusst. (Proc. Physical Soc. London **37**. 58—71. 1922 London, Univ.)

BECKER.

I. Levi, Über die charakteristischen Röntgenstrahlen der leichten Elemente. Vf. bestimmt die krit. K- u. L-Absorptionsgrenzen der Elemente Li, Be, B u. C, die M-Absorptionsgrenze der Elemente F, Na, Si u. V, die L- u. M-Absorptionsgrenzen von Cl, Se, Ti u. Ni u. die M-Absorptionsgrenzen von Cr, Mn u. Co. Bzgl. der experimentellen Einzelheiten muß auf das Original verwiesen werden. Das

Minimumpotential, das zur Anregung der charakterist. Röntgenstrahlung nötig wurde gefunden u. die Wellenlänge der Strahlung aus der Quantenbeziehung rechnet, dabei ergab sich in Å: K-Serie: Li 263, Be 116, B 85, C 42, O 24, L-Serien: Li 1473, Be 685, B 500, C 352, F 195, Na 304, Si 87, Cl 55, Sc 23, Ti 21, V 21, Ni 16; M-Serie: Cl 507, Sc 295, Ti 148, Cr 203, Mn 184, Co 134, Ni 35, 120, 161 u. 232. Diese Werte u. die anderer Beobachter wurden zur Prüfung der Moseleyschen Kurven ($\sqrt{\nu}/R = f(n)$, $R = \text{Rydbergsche Konstante}$, $n = \text{Ordnungszahl}$) für die Elemente mit niedriger Ordnungszahl benutzt, aus denen ergibt, daß einige Werte der L-Serien für die Elemente von Ne bis Ni auf L_1 - u. einige auf der $L_{2,3}$ -Linie liegen. In den M-Serien entsprechen die Werte zwischen Fe u. Zn einer Strahlung vom M- oder N-Ring. Das Zahlenmaterial im Original tabellar. zusammengestellt. (Proc. Trans. Roy. Soc. Canada [3] 18. Okt. III. 159—76. 1924. Toronto, Univ.) JOSEPH.

H. Deslandres, *Eine gemeinsame Eigenschaft von sowohl der Entstehung als dem Bau nach weitgehend verschiedenen Spektren. Dominierender Einfluß des Heliumkernes.* Vf. verweist auf seine bisherigen Feststellungen (vgl. C. r. d. l'Acad. des sciences **179**. 5; C. **1924**. II. 2449) bezüglich des Auftretens einer Grundfrequenz ($= 1062,5$) bzw. ihrer ganzzahligen Vielfachen in den intensivsten Banden- u. Linien zahlreicher Spektren verschiedener Verb. Zur Deutung dieser für sonst grundlegend verschiedenen Banden- u. Linienspektren gemeinsam geltenden Beziehung nimmt Vf. an, daß sie sich auf eine, den Kernen der emittierenden Atome gemeinsame Eigenschaft zurückführen läßt. Die den Atomkern umkreisenden Elektronen wirken bei quantenhaften Zustandsänderungen auf ersteren zurück, veranlassen ihn zur Emission von Frequenzen, deren Größen durch die Art und den Aufbau des Atomes bestimmt sind. Zur weiteren Stütze seiner Ansicht führt Vf. die Anzahl (27) der am He, He⁺, B, C⁺, N⁺, O⁺, F⁺, Si⁺, P⁺, S⁺, Cl, Cl⁺ u. a. gemessenen Frequenzen von MILLIKAN u. BOWER, sowie LYMAN im Ultraviolett gemessenen Frequenzen an, die sich innerhalb der Genauigkeitsgrenzen der Messungen ebenfalls als ganzzahlige Vielfache der Grundzahl 1062,5 darstellen lassen. Am häufigsten tritt die Beziehung für die Spektren ionisierter Elemente, deren Ordnungszahl durch die Beziehung bar ist, zu; dies spricht für einen im obigen Sinn sich auswirkenden Einfluß in den betreffenden Atomkernen eingebauten He-Kernes. Als weitere, die Beziehung genügende Bandenspektren führt Vf. die des Si, sowie die (als Reststrahlung auftretenden) des SiO₂ u. des Glimmers an. Aufklärungen verspricht sich Vf. von einem Studium der Emission des He-Kernes, d. h. der α -Teilchen. (C. r. l'Acad. des sciences **179**. 1006—11. 1924.) FRANKENBURGER.

J. C. McLennan und **G. M. Shrum**, *Das sekundäre Spektrum von Wasserstoff bei sehr tiefen Temperaturen.* Vff. untersuchen das sekundäre Spektrum des H₂ bei gewöhnlicher Temp., bei -180° u. -252° . Starke Intensitätsänderung der Linien nur bei Betrachtung des ganzen Temperaturintervalls vorhanden, von gewöhnlicher Temp. bis -180° ist der Unterschied der Intensitäten nicht sehr groß, wird durch direkten Vergleich entsprechender Linien auf den einzelnen Platten gezeigt. Dabei waren alle übrigen Bedingungen möglichst konstant gehalten, damit die Intensität nur von der Temp. abhängen sollte. Die Intensitätsabnahme bei den tiefen Temp. war bei den einzelnen Gruppen verschieden. Die Ergebnisse werden theoret. gedeutet. (Proc. Trans. Roy. Soc. Canada [3] **18**. Okt. III. 177—86. 1924. Toronto, Univ.) JOSEPH.

E. P. Metcalf und **B. Venkatesachar**, *Der Ursprung der Satelliten der Quecksilberlinien.* Vff. suchen die Frage zu unterscheiden, ob die Satelliten einer Spektrallinie von den Isotopen des betreffenden Elements herrühren oder nicht. Ist das der Fall, dann müßten 1. die Intensitäten der einzelnen Isotopenlinien in demselben Verhältnis zu einander stehen wie die Konz. der Isotopen. 2. Die Strahlung von

der einer langen Reihe sollte durch die gleiche Breite korrespondierender Linien bezeichnet sein. — Die Betrachtung der Hg-Linien 5461, 5769, 5791 und 5791 5791 ergab, daß Punkt 1. schwer zu prüfen ist, und daß Punkt 2. teilweise richtig ist. (Nature 115. 15—16. Mysore, Univ.) BECKER.

Eduard Zintl und August Rauch, Anmerkung zu unserer Mitteilung: „Zur Theorie der konstitutiven Färbung“. (Vgl. Ber. Dtsch. Chem. Ges. 57. 1739; C. 1924. 1572.) Ergänzung der angeführten Literatur über die Theorien der konstitutiven Färbung durch den Hinweis auf die Arbeiten von BILTZ (vgl. Ztschr. f. anorg. u. phys. Ch. 127. 169; C. 1923. III. 716), der die Ursache der Färbung im Vorhandensein nicht voll ausgenützter oder schwacher Elektrovalenzkräfte erblickt. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58. 234. München, Bay. Akad. d. Wissensch.) HORST.

P. Freundler und Y. Laurent, Über die photochemischen Eigenschaften des Jodjodurs. Im Anschluß an Unterss. über den Sn- u. J-Gehalt des Meerwassers u. verschiedener Algenarten (Laminaria) studieren Vff. die Eigenschaften des SnJ₂. Sie zeigen fest, daß diese Verb., falls sie durch Umsetzung zwischen SnCl₂ u. KJ gebildet wird, bei Überschuß des ersteren als roter, bei Überschuß des letzteren als gelber Körper ausfällt. Bei Belichtung in der Sonne wird diese gelbe Substanz im Dunkeln bildet sich die gelbe Farbe zurück. Bei Ggw. von O₂ u. gleichzeitiger Belichtung verschwindet das SnJ₂ allmählich unter Entw. von J₂. Auf Wasserbad erhitzt bildet sich aus dem gelben der rote Körper, der sehr langsam im diffusen Licht sich wieder in den gelben zurückverwandelt. Anders liegen die Verhältnisse für ein aus SnCl₂ u. NaJ gebildetes SnJ₂: hier verursacht ein Überschuß von SnCl₂ eine gelbe, ein solcher von NaJ eine rote Färbung des Nd., bei Wärme ist hier die gelbe Form die stabile. Luftsauerstoff wirkt auf dieses, und NaJ gefälltes SnJ₂ nicht ein. Vff. weisen auf entsprechende Erscheinungen in anderen untersuchten Algen hin. (C. r. d. l'Acad. des sciences 179. 1049—51.)

FRANKENBURGER.

Bawa Kartar Singh, Untersuchungen über Phototropismus in Lösungen. II. Die optische Aktivität als Hilfsmittel beim Studium der Phototropie. Vf. studiert die am *phthyl-aminocampher* auftretenden phototrop. Erscheinungen in ihren Einzelheiten. Die im Dunkeln bereitete farblose Lsg. dieser Substanz in Chlf. färbt sich unter Sonnenlicht unter dem Einfluß der kurzwelligen Strahlung in wenigen Min. rot; die Färbung geht im Dunkeln in einigen Stdn. wieder zurück. Vf. stellt fest, daß gleichzeitig mit der Verfärbung das opt. Drehungsvermögen der Lsg. bedeutend ansteigt: bei 30° steigt der für die Hg-Linie 5461 gemessene $[\alpha]$ von 0° auf 186,6° an. Bei Zugabe einer Spur von Na-Äthylat zu der Lsg. unterbleiben sowohl die Verfärbung als die Zunahme der opt. Aktivität. Wird der *phthylaminocampher* in anderen Lösungsm. gelöst (Aceton, CH₃OH, A., Ä., A. Äthylacetat), so zeigen diese Lsgg. nur eine langsam verlaufende, im Dunkeln zurückgehende Verfärbung nach Gelb. Verss. mit FeCl₃ erweisen, daß nur in der Chlf.-Lsg. teilweise die Enolform der Verb. vorhanden ist (Rotfärbung), in den andern erwähnten Lösungsm. lediglich die Ketoform. Zugabe des Na-Äthylats bewirkt völlige Umwandlung in die Enolform. Es scheint somit für das Auftreten des Phototropismus das Vorhandensein eines Gemisches von Keto + Enolform nötig zu sein; die Färbung ist vermutlich auf die B. einer chinhydronartigen Anlagerungsverb., C₈H₁₄ · (CO) · CH · NH · C₁₀H₇ · C₈H₁₄(COH) · C · NH · C₁₀H₇, zurückzuführen. (Quarterly Journ. Indian Chem. Soc. 1. 45—50. 1924. Orissa, Govt. Press, Ravenshaw Coll.)

FRANKENBURGER.

A₂. Elektrochemie. Thermochemie.

E. Denina, Einführung in eine allgemeine Theorie der elektromotorischen Kräfte. Zunächst wird das Problem der verschiedenen Art elektr. Leitung u. Überführung

behandelt. Jeder Stoff enthält polymere Molekeln, Ionen von verschiedenem Zeichen, verschiedener M. u. Beweglichkeit, die untereinander u. mit neutralen Molekeln reagieren können, u. zwar in erster Annäherung nach dem Massenwirkungsgesetz. Das Leitvermögen ist für alle Leiter $= \sum \text{Zahl} \times \text{Ladung} \times \text{Beweglichkeit der Ionen}$. Das Gesetz von der elektrolyt. Dissoziation gilt auch für die Elektronen. Es existieren auch negative Metallionen, positive Metalloide u. neutrale Atome. Jede solche „Monade“ kommt in jeder Phase in einer Konzentration vor, die unterhalb der Sättigung liegt; jede Phase ist auf Grund vieler Gleichgewichte, die nebeneinander hergehen, sehr komplex zusammengesetzt. Man gelangt so zu der Smitsschen neuen Theorie der Allotropie. Daß mehrere Ionen-, Atom- u. Molekelarten nur in minimaler Menge vorhanden sind, stört nicht in allgemein anerkannten Gleichgewichten nicht. — Manche Gleichgewichte, namentlich die, in welche die Konz. der freien Ionen eingeht, sind gegen geringe Zusatzstoffe außerordentlich empfindlich. Die „Stabilität“ einer Verb. hängt von dem Verhältnis zwischen der Konz. seiner freien Atome u. deren Sättigungskonz. ab. Auch ein Zusatz die Zahl der Elektronen, so kann er leicht katalyt. wirken. Namentlich die Oxydations- u. Reduktionsrkk. hängen von der Zahl der Elektronen ab. Es kommt also auf die „Elektronenspannung“ (d. h. die Konz. der freien Elektronen) an, wofür Beispiele gegeben werden. Die Potentialdifferenz zwischen Lsg. u. Elektrode hängt von der Elektronenspannung der Lsg. am Berührungspunkt ab. Die Elektronentheorie gestattet auch die *Elektrostenolyse* zu erklären. — Die Korpuskel mit verschiedener Ladung sind im Ruhezustand in der Phase gleichmäßig verteilt, sobald aber unsymmetr. Kräfte einwirken, wechselt das Potential von Punkt zu Punkt, u. eine EK. tritt auf. Die gleichmäßige Verteilung kann auch durch Oberflächenkräfte gestört werden. Sobald die „Monaden“ in Bewegung gebracht werden, treten „dynam.“ EKK. auf. Magnet. Felder, strahlende Energie beeinflussen erständlicherweise die EKK. sehr stark. Vgl. klassifiziert die EKK. eingehend. (Z. chim. ital. **54**. 750—65. 1924. Turin, Politecnico.) W. A. ROT.

Per K. Frölich, *Der amphotere Charakter der Gelatine und seine Beziehungen zu gewissen elektrochemischen Vorgängen*. Es wird der Einfluß von Gelatinezusätzen auf elektrochem. Vorgänge unter besonderer Berücksichtigung des amphoteren Charakters der Gelatine gemäß den Ergebnissen der neueren Gelatineforschung behandelt. Die Gelatine, deren isoelekt. Punkt bei $p_H = 4,7$ liegt, wandert unter dem Einfluß eines Potentialgefälles entsprechend der Acidität der Lsg. entweder zur Kathode oder Anode u. bildet hier eine Schicht, die bei elektrochem. Vorgängen auf verschiedene Weise die Polarisation, die Zersetzungsspannung u. Überspannung, ferner auch die *Struktur von abgeschiedenem Metall* beeinflussen kann. Es werden Bemerkungen für die bisher in der Literatur vorliegenden Vers.-Ergebnisse u. für einige Beobachtungen gegeben, eingehend wird die Abscheidung von Cu, ferner von Zn u. Ni bei Ggw. von Gelatine besprochen. (Trans. Amer. Electr. Soc. **46**. 16 Seiten. 1924. Cambridge [Mass.] Sep.) WILHELM.

J. Heyrovský, *Über die Elektrolyse mit der Quecksilber-Tropfkathode*. Vgl. beschreibt die von ihm benützte Hg-Tropfkathode (vgl. Trans. Faraday Soc. **19**. 692. 785; C. **1924**. II. 437. 1776) u. betont die Gültigkeit der klass. Beziehungen für die Beziehungen zwischen dem an ihr auftretenden Polarisationspotential u. der Konz. der an ihr sich abscheidenden Kationen; ferner weist er auf ihre Eignetheit zur Feststellung kleinster Spuren metall. Ionen in Lsgg. (z. B. 4 · 10⁻⁷ Mol/Liter von Pb⁺⁺) hin. (C. r. d. l'Acad. des sciences **179**. 1044—46. 1924. Feb.)

R. Fricke, *Zur Beeinflussung von Flüssigkeitspotentialen durch an den Flüssigkeitsgrenzen verwandte feinporige Materialien*. Nach Verss. von C. Rohman u. P. Klempt. (Vgl. FRICKE u. ROHMANN, S. 471.) Es wurden Ketten von l. elektro-schriebener Art mit der Veränderung gemessen, daß die elektrolyt. Stromschle-

an Grenzen mit Stöpseln aus Hartfilterpapier versehen wurden. Die zeitliche Konstanz der EK. blieb aus; sie nahm stundenlang ab oder zu, meistens sich der reinen Flüssigkeitsgrenzen gefundenen Größe nähernd. Die EK. der Ketten $\text{Hg}_2\text{Cl}_2 \mid \text{KCl gesätt.} \mid \text{A} \mid \text{B} \mid \text{KCl gesätt.} \mid \text{Hg}_2\text{Cl}_2 \mid \text{Hg}$, worin A bzw. B LiCl, NaCl, KCl, NaOH bzw. HCl waren, ist, wenn zwischen A u. B ein mit Filterpapier verschlossener Heber eingeschaltet ist, tiefer, als wenn $\text{A} \mid \text{B}$ eine reine Flüssigkeitsgrenze darstellt. Der Unterschied ist im Falle neutraler Salze größer, im Falle der Laugen oder Säuren (um $10 \cdot 10^{-3}$ V unter ungünstigen Bedingungen). (Ztschr. f. Elektrochem. **30**. 577—80. 1924. Münster i. W., Univ.) BIKERMAN.

3. Fricke, Über die Aktivitäten der Hydroxylionen in konzentrierten Laugen. (Grund von Elektroden- und Flüssigkeitspotentialen. Mit Verss. von C. Rohmann. Vorst. Ref.) In der Arbeit von FRICKE u. ROHMANN (S. 471) sind die Potentiale an Flüssigkeitsgrenzen x -n. NaOH/0,1-n. NaOH bestimmt worden. Mit ihrer Hilfe kann die Ausrechnung der „Aktivitäten“ der konzentrierten Laugen vorgenommen werden; wendet man die Nernstsche Formel unter Annahme an, daß die Ionenbeweglichkeiten auch in 15-n. Lauge konstant bleiben, so erhält man rapide wachsende „Aktivitäten“: 0,94 in der 1-n. Lauge, 48,7 in der 7,5-n. Lauge. — Einen zweiten Weg zur Berechnung dieser „Aktivitäten“ eröffnen die von FRICKE u. AHRNDTS (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. **134**. 223. 1924. I. 2870) gemessenen EKK. der Kette $-\text{Hg} \mid \text{HgO} \mid x\text{-n. NaOH} \mid \text{KCl gesätt.} \mid 0,1\text{-n. KCl} \mid \text{Hg}_2\text{Cl}_2 \mid \text{Hg}_+$. Die unbekannte EK. der Grenzen $a + b$ wurde mittels Ketten $\text{Hg} \mid \text{Hg}_2\text{Cl}_2 \mid 0,1\text{-n. KCl} \mid 0,05\text{-n. HCOONa} \mid 0,1\text{-n. NaOH} \mid 0,1\text{-n. KCl gesätt.} \mid x\text{-n. NaOH} \mid x/2\text{-n. HCOONa} \mid 0,05\text{-n. HCOONa} \mid 0,1\text{-n. KCl} \mid \text{Hg}$ ermittelt. Es ergibt sich für das Potential ϵ_h der HgO-Elektrode gegen Wasserstoffelektrode bei 30° folgende Reihe:

0,41	0,79	1,31	2,2	7,7	13,8	17,8
-0,132	+0,1145	+0,1035	+0,0915	+0,016	-0,0715	-0,122 V,

die „Aktivitäten“ der Natronlauge wieder enorme Werte (4210 in der 17,8-n. Lauge) liefert. Von derselben Größenordnung sind auch die ϵ_h u. somit die „Aktivitäten“, wenn man die Kette $-\text{Hg} \mid \text{HgO} \mid x\text{-n. NaOH} \mid 0,1\text{-n. KCl} \mid \text{Hg}_2\text{Cl}_2 \mid \text{Hg}$ um aus ϵ_h die „Aktivitäten“ der Alkalilauge berechnen zu können, braucht als Löslichkeitsprod. des Quecksilberoxydes; es wurde zu $2 \cdot 10^{-23}$ u. von der Konz. unabhängig angenommen. — Eine dritte Möglichkeit, die „Alkalitäten“ OH' in konz. Lsgg. zu bestimmen, liegt in früher gemessenen EKK. der Ketten $\text{H}_2 \mid x\text{-n. NaOH} \mid \text{KCl gesätt.} \mid 0,1\text{-n. KCl} \mid \text{Hg}_2\text{Cl}_2 \mid \text{Hg}_+$ vor. Die EK. der

an $a + b$ wird nach obigem abgezogen, so daß man das Potential der Wasserstoffelektrode erhält; nun wird die Konstanz des Ionenprod. des W. bei allen Konz. gemessen u. somit die OH' -Aktivität gefunden. Auch hier erscheinen Werte, die von 10 bei 16,17-n. NaOH. — Da die Messungen der Flüssigkeitsketten die gemeinsame Grundlage aller drei Methoden bilden, so könnte ein Fehler in jenen alle Ergebnisse in gleicher Weise beeinflussen. Aber man findet sehr hohe „Aktivitäten“ bei Konzentrationsketten, auch wenn man die Flüssigkeitspotentiale ganz vernachlässigt. — KOH weist noch höhere „Aktivitäten“ als NaOH auf; die Aktivität verschwindet, wenn man statt Konz. pro l Molenbrüche vergleicht. — Erklärung für die Höhe der „Aktivitäten“: das vorhandene W. genügt nicht, die Ionen mit Hydrathüllen zu versehen, so daß die Aktivität „nackter“ Ionen auftritt. (Ztschr. f. Elektrochem. **30**. 580—87. 1924.) BIKERMAN.

4. von Halban, Über die Natur der nichtdissoziierten Säuren. Polemik gegen die Theorie (Ztschr. f. Elektrochem. **30**. 194; C. **1924**. II. 2221). Die Gültigkeit des

Beerschen Gesetzes für starke Elektrolyte ist kein Beweis dafür, daß die elekt. Dissoziation ein opt. indifferenten Vorgang sei, weil starke Elektrolyte vollständig dissoziiert sind. Die Absorption von schwachen Elektrolyten ist konzentrationsabhängig, weil sie bei Verdünnung eine Dissoziation erleiden; die Annahme HANTZSCHS, daß diese Konzentrationsabhängigkeit durch Verschiebung des Gleichgewichtes Pseudosäure $\rightleftharpoons$ echte Säure zustande kommt, führt zum Schluß, daß elekt. Dissoziation auch schwacher Elektrolyte opt. belanglos sei, weil — wenn man der echten Säureform eine merkliche Konz. zuschreibt — auch ihr Zerfall die Ionen die Absorption beeinflussen sollte. In der Tat konnten HALBAN u. E. (Ztschr. f. physik. Ch. **112**. 359; C. **1924**. II. 2637) an dem Beispiel der Pikrin zeigen, daß die Konz. der „echten“ Säureform (d. h. mit dem Absorptionsvermögen der Salze) so gering ist, daß ihre — nach ARRHENIUS berechnete — Dissoziationskonstante weit größer wäre, als aller neutralen Salze. (Ztschr. f. Elektrochem. **601**—4. 1924. Frankfurt a. M.)

BIKERM.

D. W. Dye und **L. Hartshorn**, *Die dielektrischen Eigenschaften von Glimmer*. Vff. bestimmen nach zwei verschiedenen Methoden DE. von verschiedenen Glimmersorten. Im Mittel ergab sich für sämtliche K-Glimmer DE. = 7,0, für sämtliche Mg-Glimmer DE. = 6,0. Einschlüsse im Glimmer haben keinen großen Einfluß auf die Werte. (Proc. Physical Soc. London **37**. 42—57. 1924. National Physical Lab.)

BECK.

Walther Gerlach, *Neue Untersuchungen über magnetische Atommomenten und Richtungsquantelung*. (Vgl. GERLACH und CILLIERS, Ztschr. f. Physik **26**. 14; **1924**. II. 1663). Nach der früher beschriebenen Methode werden Ag, Cu, Al, Sn, Pb, Sb, Bi, Fe u. Ni untersucht. Ag besitzt ein Atommoment von $M = 106$ Gauß cm pro Mol. Cu, Au zeigen ein ähnliches Verh. wie Ag, d. h. eine erhebliche Aufspaltung im Magnetfeld. Ti besitzt nur eine geringe Aufspaltung, Sb, Bi u. Fe keine Aufspaltung. Bei Ni ist der Atomstrahl in mehrere Teilstrahlen gespalten. Hier ist der erste Nachweis eines Multipletts durch Atomstrahlenergie erbracht. (Physikal. Ztschr. **25**. 618—20. 1924. Frankfurt a. M.)

BECK.

Matthew A. Parker und **Henry P. Armes**, *Der Einfluß eines Magnetfeldes auf gewisse chemische Reaktionen*. Die Feldstärke des von einem Elektromagneten erzeugten Magnetfeldes betrug im Maximum 5500 Gauß. Zu jedem Versuch wurde daher in einem kleinen Reagensglas in fester Lage nur 1 cm Fl. verwandt, während außerhalb des Feldes wurden mit Reagensgläsern derselben Größe bei derselben Temp. Vergleichsverss. angestellt. Die Red. von $FeCl_3$ in salzsaurer Lsg. durch Zn u. Mg scheint unter dem Einfluß des Magnetfeldes verzögert zu werden, doch wurden in diesem Falle keine übereinstimmenden Resultate erhalten. Die Verlangsamung beruht wahrscheinlich auf der B. eines magnet. Nd. auf dem Metall. Bei Fe u. Al red. $FeCl_3$ in HCl im Magnetfeld schneller. Wenn nicht gerührt wird die Red. von $KMnO_4$ in H_2SO_4 durch metall. Fe im Magnetfeld beschleunigt. Durch Rühren der Lsgg. während der Red. werden die Unterschiede im Feld außerhalb desselben vermindert. Die Wrkg. des Magnetfeldes ist um so stärker je größer die Feldstärke. (Proc. Trans. Roy. Soc. Canada [3] **18**. Sekt. III. 23—24. 1924. Winnipeg, Univ. of Manitoba.)

JOSELY.

W. Mandell und **J. West**, *Der Temperaturgradient in Gasen bei verschiedenen Drucken*. Vff. bestimmen mittels Thermoelementen das Temperaturgefälle von CO_2 u. H_2 zwischen 72° und 138° bei 0,0035 mm bis 1,38 mm Druck in verschiedenen Entfernungen von den h. Gefäßwänden. Die Ergebnisse sind in Tabellen u. Graphen wiedergegeben. (Proc. Physical Soc. London **37**. 20—41. 1924. Aberystwyth Univ.)

BECK.

J. W. Terwen, *Selektive Verbrennung in Kohlenoxyd-Wasserstoffgemischen*. Vff. bespricht an Hand von 40 Arbeiten der älteren Literatur bis zur Gegenwart die

der Verbrennung von CO u. H_2 -Gemischen auftretenden Erscheinungen, wenn Verbrennung in u. ohne Gegenwart von festen Katalysatoren stattfindet u. gibt zusammenfassende Übersicht. (Chem. Weekblad **22**. 2—9.) BECKER.

A. Boutaric und **G. Corbet**, Über die kritische Lösungstemperatur ternärer Gemische. Ein Gemisch von zwei organ. Fl., A u. B , von der Zus. $nB + (1 - n)A$ mit wachsenden Mengen W . erwärmt u. dadurch die Temp. der vollständigen Lösbarkeit (δ) bestimmt. Dann führt man dieselbe Versuchsreihe mit einem Gemisch, dessen n eine andere Größe hat, aus. Somit erhält man eine Kurve für die Änderung der δ mit n . Solche Kurven wurden für die Paare *Anilin-Phenol*, *Benzoessäure-Phenol*, *Salicylsäure-Phenol*, *Benzoessäure-Anilin*, *Salicylsäure-Anilin* u. *Benzoessäure-Salicylsäure* bestimmt. Nur im letzten Falle läuft die Kurve geradlinig u. der krit. Lösungspunkt des Gemisches $W. +$ Benzoessäure zum krit. Lösungspunkt des Gemisches $W. +$ Salicylsäure ($86,2^\circ$), während die meisten übrigen Gemische ein Minimum für δ bei einem mittleren n aufweisen. — Nach derselben Methode wurden δ - n -Kurven für Gemische des Phenols mit verschiedenen W - A -Gemischen ermittelt; die verwendeten Alkohole waren CH_3OH , A . u. n - C_3H_7OH . Die erste Kurve ist gegen die n -Achse konvex, die dritte konkav, die zweite geradlinig. (C. R. Acad. des sciences **179**. 1319—22. 1924.)

W. Herz, Über die Gültigkeitsgrenzen von Gasgleichungen. I. Vf. vergleicht die Bernoulli'sche Formel $p(v - v_1) = RT(1 - p/p_c)$, v das Vol. des Gases, v_1 das Molvolumen bei gleicher M . Fl., p_c der krit. Druck, mit vorliegenden Versuchsdaten. Die Formel stimmt bis ca. $0,8$ — $0,9$ der krit. Temp. aufwärts. (Ztschr. f. Elektrochem. **30**. 104—7. 1924. Breslau, Univ.)

W. H. Bunnett und **H. H. Hedestrand**, Über den Einfluß dünner Oberflächenschichten auf die Verdampfung von Wasser. Vf. bestimmt das Verhältnis der Verdampfungsgeschwindigkeiten von reinem W . u. W ., welches mit dünnen Oberflächenschichten bedeckt ist u. einigen Lsgg., indem er einen Luftstrom von konstanter Geschwindigkeit einmal über reines W ., das zweitemal über die zu prüfenden Fl. streichen läßt. Das in einer bestimmten Zeit verdampfte W . in Trockentürmen auffängt u. wiegt. Oberflächenschichten von *Palmitinsäure* u. *Ölsäure* in Dicken von 1 bis 2 Moleküldurchmesser zeigen keinerlei Änderung in der Verdampfungsgeschwindigkeit des W . Dasselbe Ergebnis zeigen Lsgg. von *Saponin* (0 — 2°). Lsgg. u. *KBr*-Lsgg. zeigen eine Erniedrigung der Verdampfungsgeschwindigkeit, die bei beiden in gleichem Sinne proportional dem Dampfdruck ist. Da KCl die Oberflächenspannung des W . erhöht, *KBr* diese erniedrigt, ist die Verdampfungsgeschwindigkeit dieser Lsgg. von der Oberflächenspannung unabhängig. Jedenfalls ist die B. von Oberflächenschichten, wenn überhaupt, die Verdampfung des W . in einem äußerst geringen Maß zu erniedrigen. (Journ. Physical Chem. **28**. 1452. 1924. London, Univ.)

F. King und **S. P. Smedley**, Verdampfung von Flüssigkeitsgemischen. Vff. geben zur Kennzeichnung eines konstant siedenden Flüssigkeitsgemisches die Verss. vor: 1. Aufnahme der Dampfdruckkurve nach der Methode von **u. MENZIES** (Journ. Americ. Chem. Soc. **32**. 1412 [1910]), welche mit einigen vff. vorgenommenen Abänderungen eine rasche Best. ermöglicht. Beim konstanten Kp. besitzt der Dampfdruck ein Maximum. 2. Best. der Brechungsindizes einer Reihe von Gemischen. Zu dem Gemisch, von welchem eine Messung gemacht wurde, wird eine gewisse Menge des einen Bestandteils zugesetzt, dann wird das Gemisch durch einige Sekunden verdampfen gelassen u. abermals der Brechungsindex bestimmt. Man erhält so zwei sich beim konstanten Kp. überschneidende Kurven. 3. Best. der Zus. des Gemisches, nachdem eine Anzahl von Luftblasen durch das Gemisch geleitet wurden. Der konstante Kp. ist dann vorhanden, wenn die Zus. der Gasphase sich nicht mehr ändert. — Diese Methoden wurden an CCl_4 - A -Gemischen

von verschiedener Zus. ausprobiert u. nach allen drei Methoden übereinstimmende Resultate erhalten. D. ist bei 20° für dieses System angegeben. (Journ. Phys. Chem. **28**. 1265—72. 1924. Williamstown, Mass.)

Sasibhushan Mali und **Jnanendrachandra Ghosh**, *Über den Dampfdruck und die chemische Konstante des Formaldehyds*. Vff. messen die Dampfdrucke reinen gasförmigen Formaldehyds u. berechnen hieraus unter Anwendung der Nernstschen Näherungsformel für die Beziehung zwischen Dampfdruck, dampfungswärme u. Konstanten der Formel für die spezif. Wärme die chem. Konstante des HCHO. Das gasförmige HCHO ist nur zwischen —91° u. —34,5° die Messungen verwendbar, da bei Temp. unterhalb dieses Intervalls der Dampfdruck zu klein ist, oberhalb desselben Polymerisation des als Bodenkörper auftretenden fl. HCHO zu Paraformaldehyd erfolgt. Herst. des reinen fl. HCHO erfolgt durch Erhitzen von Kahlbaumschen Paraformaldehyd im Vakuum; in der Luft durch fl. Luft von außen gekühlten Aceton-Thermostaten erfolgen die Messungen mittels einer manometr. Nullmethode. Aufheizung erfolgt mittels eines elektrisch beheizten Rührers, die Best. des Drucks mit einem, zur Vermeidung von Polymerisation auf —30° gehaltenen Hg-Manometers, Messung der Temp. mittels eines Chromel-Konstantan Thermoelements. Die Messungen ergeben für die Verdampfungswärme des HCHO beim absoluten Nullpunkt 6500 cal, für die chem. Konstante des HCHO 3,3 u. das 2. Glied ϵ der Formel für die spezif. Wärme des HCHO 0,03 (Quarterly Journ. Indian Chem.-Soc. **1**. 37—43. 1924. Dacca Univ.)

A₃. Kolloidchemie. Capillarchemie.

The Svedberg, *Einige neue Fortschritte auf dem Gebiete der Kolloide*. Allgemeine Übersicht über neuere Ergebnisse der Methoden zur Herst. u. Reinigung von Solen u. der Anschauungen über die Brownsche Bewegung, Größe u. Struktur der Teilchen u. die Mizellar-Theorie. (Chem. Rev. **1**. 249—75. 1924.) v. HAN.

J. Duclaux, *Kolloide Substanzen und kolloider Zustand*. Allgemeine Betrachtungen über die modernen Anschauungen der Kolloidchemie u. ihre histor. Entwicklung. Analogien u. Unterschiede zwischen Mizellen u. Molekülen. (Rev. gén. des Colloïdes **2**. 257—60. 1924.) v. HAN.

Einar Hammarsten, *Zur Frage über den osmotischen Druck der hochkonzentrierten Elektrolyte*. (Vgl. H. HAMMARSTEN. Biochem. Ztschr. **147**. 481; C. **1924**. II. 663.) Beschreibung der Wiederholung eines Vers. von LOEB (Protein and the theory of colloidal behavior, 1922) über den osmot. Druck von Eiweißchloriden. (Bion. Ztschr. **151**. 177—80. 1924. Stockholm, Karolin. Inst.) HEJ.

K. Takehara, *Über Elektrolytreaktionen bei Gegenwart von Gelatine und über Liesegangstrukturen*. Liesegangsche Ringe wurden erzeugt durch Überschichten von salzhaltigen Gelatinegallerten mit Salzlgg., die die in der Gelatine enthaltenen Salze fällten. Zum Vergleich wurden die den Gelatinegelen entsprechenden Gelatinesole gleicher Konz. u. Zuss. mit den entsprechenden Salzlgg. vermisch. Es ergab sich, daß die B. von Ndd. bei Anwesenheit von Gelatine erst oberhalb gewisser Schwellenwerte der Konz. eintrat. — Veränderungen der Konz. der reagierenden Salze in den Gelatinesolen bedingten verschieden gefärbte Sole bzw. Ndd. Diesen Farbänderungen entsprechen die Farben aufeinanderfolgender Liesegangsringe, die in den entsprechenden salzhaltigen Gelatinegelen beim Überschichten mit den entsprechenden Salzen erhalten wurden. (Kolloid-Ztschr. **35**. 23—45. 1924.) THIES.

I. Traube und **K. Takehara**, *Theorie der Liesegangstrukturen*. Aus den von TAKEHARA (vorst. Ref.) gefundenen experimentellen Ergebnissen schließen die Verf. ab, daß die B. der Liesegangringe lediglich auf die Änderungen der Konz. der Salzlgg. bei der B. u. beim Durchdringen der Ringmembranen zurückzuführen sei.

nur die diffundierende, durch die Membran diosmierende Lsg. eine Verengung der Konz. erleidet, werden sich verschieden gefärbte Ringe ohne fl. Zwischenschicht ausbilden. Wenn in der Nähe der Membran auch für das im Gel. Salz ein Konz.-Gefälle sich ausbildet, wird eine fl. Zwischenschicht die beiden voneinander trennen, (Kolloid-Ztschr. 35. 245—47. 1924. Charlottenburg, Hochsch.)

THIESSEN.

Duward Schubert, *Beiträge zur rhythmischen Krystallisation aus Schmelzen*. Beim Krystallisieren h. gesätt. Lsgg. von *Sulfanilsäure* in konz. H_2SO_4 tritt eine rhythm. Krystallisation in konzentr. Ringen, seltener in Spiralen. Auch beim Erstarren der Schmelzen von *p-Tolunitril*, *Salol* u. *Methylsalicylsäure* wurde eine rhythm. Krystallisation beobachtet, das in konzentr., radial unterteilten Ringen erfolgt. (Kolloid-Ztschr. 35. 219—20. 1924. Leipzig.)

THIESSEN.

Hatschek und R. H. Humphry, *Über physikalische Unterschiede zwischen wässrigen Solen und Gelen*. Agarsole sind in durchfallendem u. auffallendem Lichte bei einem Prozentgehalt von 3% u. mehr klar, die gleich konzentrierten Sole dagegen trüb. In durchfallendem u. trüb im auffallenden Licht. In zerstreutem Licht erscheinen die Gelen dunkeler als die Sole bei durchfallendem Licht u. gleicher Konz. Die Lichtintensität verringert sich nicht, wenn die Gele mehrere Tage auf einer Temp. von 20°, zwischen dem Schmelz- u. Erstarrungspunkt gehalten werden. — Die Leitfähigkeit ist in elektrolythaltigen Gelen für Gleich- u. Wechselstrom größer, als in den entsprechenden Solen; der Unterschied wächst mit steigendem Agar-gehalt. — Die Leitfähigkeit der Sole u. Gele ist hier für Wechselstrom größer als für Gleichstrom; der Unterschied ist unbedeutend größer, als der bei wss. Elektrolyten. — ohne Agar. Es wird ein neuer für die vorliegenden Zwecke sich prakt. verw. Überführungsapp. beschrieben. (Trans. Faraday Soc. 20. 18—22. 1924.)

V. HAHN.

O. Herzog und R. Gaebel, *Über die Reifung der Viscose*. Messungen der Reifungsrate ergaben, daß sich in der Viscose bei der Reifung eine gallertartige Struktur ausbildet. Die Festigkeit dieser Struktur u. die Geschwindigkeit ihrer Ausbildung bzw. der Neubildung des zerstörten Gelgerüsts wächst mit zunehmendem Alter der Viscose. — Mikro-Diffusionsverss. ergaben, daß durch die Reifung der Viscose die Diffusion stark behindert wird. Der Vergleich der Leitfähigkeit der Viscose u. ihres Dialysats zeigt, daß bei der Reifung eine Dehydratation des Gels eintritt. Verss. von **R. O. Herzog** und **K. Hegel** lehren, daß mit der Reifung der Viscose geringfügige Veränderungen in der Bindung des S eintreten. (Kolloid-Ztschr. 35. 193—98. 1924.)

THIESSEN.

O. Herzog und H. Selle, *Verhalten der Viscose bei Deformation*. Films aus verdünnter Cellulose werden in verschiedenen Salzlsgg. quellen lassen. Das Quellungsmittel wird dann ausgewaschen. Diese Vorbehandlung setzt die Dehnbarkeit der Filme unter gleichzeitiger Erhöhung der Reißfestigkeit herab. Die Quellung beträgt bis zu 60%. Die verfestigten Filme besitzen eine geringere Reißfestigkeit als die ursprünglichen. Entsprechende Verss. an *Nitrocellulose*, die **Endenburger** ausführte, ergeben im allgemeinen dasselbe Bild, wie bei verdünnter Cellulose. (Kolloid-Ztschr. 35. 199—201. 1924. Berlin-Dahlem, Kaiser Wilhelm-Institut.)

THIESSEN.

D. C. Henry und V. A. Morris, *Der Einfluß des Anions auf die Flockung von negativ geladenen kolloiden Solen*. In einem Dubose-Colorimeter wurde die Koagulation von *Gelsolen*, die nach der Zsigmondyschen Keimethode hergestellt und gegen Elektrolytsw. dialysiert waren, mittels Na-Salzen beobachtet. Die beobachtete Reihenfolge der Anionen stimmt weder mit der Hofmeisterschen Reihe überein, noch mit den Reihen, die **FREUNDLICH** u. a. für die Anionen bei der Flockung von *Solen* gefunden haben. Mit der von **FREUNDLICH** u. **SCHUCHT** gefundenen

Reihenfolge der Flockungswerte für Arsentrisulfid u. der Barcropschen Reihe die stabilisierende Kraft der Anionen stimmen die Ergebnisse überein. Die stabilisierende Wirkung der mehrwertigen Ionen, gegenüber den einwertigen tritt deutlich hervor. (Trans. Faraday Soc. **20**. 30—36. Manchester, Univ.) v. HALL

R. L. Howard und **Torald Sollmann**, *Die durch das spezifische Gewicht korrigierte Oberflächenspannung einiger wässriger Lösungen gegen Öl*. Vff. bestimmen mittels einer Pipette nach DONNAN (Ztschr. f. physik. Ch. **31**. 42. [1899]) die Oberflächenspannung von w. Lsgg. gegen Öl, indem sie die Tropfenzahl eines gegebenen Ölvolumens in W., das andere Mal in der Lsg. messen u. die relativ gegen die gemessene Oberflächenspannung noch für die D. des Öls u. der Lsg. korrigieren. Es ist dann die Oberflächenspannung der Lsg. gegen das Öl (Oberflächenspannung

von W. gegen Öl = 1) $\sigma = \frac{T_W}{T_L} \times \frac{D_{\text{Lsg.}} - D_{\text{Öl}}}{D_W - D_{\text{Öl}}}$, wenn T_W u. T_L die Anzahl

der Tropfen des Ölvolumens in W. u. der Lsg. sind u. $D_{\text{Lsg.}}$, $D_{\text{Öl}}$ u. D_W die Dichten von Wasser, Öl u. der Lsg. bedeutet. Die Salze der Hofmeisterreihe in einer Konzentration von $M/8$ zeigen nur sehr geringe Erhöhung (bis 2%) von σ gegen Petroleum- oder Olivenöl. Von organ. Verbind. zeigt Zucker u. Harnstoff fast keinen Einfluß, Glycerin, Chloralhydrat u. A. in Konz. von 0,5—4,5 M gegen Petroleum ein Abnehmen von σ , das bei A. am kleinsten ist. Emulgierende Substanzen, wie Seife, Tensin, Saponin, erniedrigen σ sehr stark. (Journ. Physical Chem. **28**. 1291—96. Wittenberg, Reserv. Univ.) BECKER

B. Anorganische Chemie.

W. Klemm, *Fortschritte der anorganischen Chemie seit 1921*. (Ztschr. f. angew. Chem. **38**. 1—4. 26—30. Hannover.) JÜNGER

A. Norman Shaw, *Eine Bemerkung über die Bildung von schwerem Isotop aus leichten Kryophoren*. Die erste Beobachtung von Eis, welches schwerer ist als Wasser u. langsam auf den Boden des Gefäßes sinkt, wurde von COX (vgl. Proc. Trans. Roy. Soc. Canada **10**. Sekt. III. 3 [1904]) bei Vorlesungsversuchen mit Wollastonschen Kryophoren gemacht. Seitdem ist dieses Phänomen zum ersten u. einzigen Mal wieder vom Vff. beobachtet worden u. die Erscheinung wird eingehend beschrieben. (Proc. Trans. Roy. Soc. Canada [3] **18**. Sekt. III. 187—89. 1921. McGill Univ.) JOSEPH

Edmund Brydges Rudhall Prideaux und **Gerald Green**, *Das Molekulargewicht von Selenioxyd in Äthylalkohol*. Vff. bestimmen das Mol.-Gew. von SeO_2 aus der Siedepunktserhöhung in reinem A. Bis zu einer Konz. von 55 g SeO_2 in 100 g A. ergibt sich das Mol.-Gew. zu 122,6. Korrigiert man es für den Dampfdruck des SeO_2 , dann erniedrigt es sich auf 117,5. Es muß unerörtert bleiben, wie weit sich bei längerem Kochen in A. $\text{SeO} \cdot \text{OH} \cdot \text{O} \cdot \text{C}_2\text{H}_5$ bildet, welches das Mol.-Gew. zu hoch erscheinen läßt. (Journ. Physical Chem. **28**. 1273—78. 1921. Nottingham.) BECKER

Alfons Klemenc und **Rudolf Schöller**, *Zur Kenntnis der Salpetersäure*. I. *Das Verhalten der Salpetersäure als Nitrierungsmittel*. (Vgl. KLEMENC u. SCHÖLLER, Monatshefte f. Chemie **39**. 641; C. **1919**. I. 827.) Zur Aufklärung der Vorgänge bei einer Nitrierung wurde der Ablauf der Rk. gemessen einerseits in Ä. u. W., andererseits in H_2SO_4 als Lösungsm. Salpetrige Säure zersetzt sich in Ä. viel langsamer als in wss. Lsg. u. die Rk. entspricht bei Vermeidung von Oxydation einem monomolekularen Vorgang. Der katalyt. Einfluß auf die Nitrierungsgeschwindigkeit ist kleiner als der des NO_2 . Der Nitrierungsvorgang wird mit dem Oxydationssystem KMnO_4 -Manganosalz verglichen. Durch Messungen der Nitrierung

windigkeiten wurden diese als proportional einer höheren Potenz der HNO_3 - festgestellt. In dem System HNO_2 - HNO_3 kann die Anlagerungsrk. $2\text{HNO}_3 + \text{O} \rightleftharpoons \text{H}_2\text{N}_3\text{O}_8$ mit dem Gleichgewicht $k' = [\text{H}_2\text{N}_3\text{O}_8]/[\text{HNO}_3]^2 \cdot [\text{NO}_2]$ angenommen werden, wobei $\text{H}_2\text{N}_3\text{O}_8$ von den Vff. als besondere *Säure* mit *E* bezeichnet wird. N bzw. NO_2 , die früher als Katalysatoren der Nitrierung bezeichnet wurden, sind ein Bestandteil der *E*-Säure ermittelt. Die *E*-Säure reagiert mit dem zu nitrierenden Stoff nach der Gleichung: $2\text{RH} + \text{H}_2\text{N}_3\text{O}_8 = 2\text{RNO}_2 + \text{NO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$ und schließlich abgeleitete Gleichgewichtsgleichung sagt aus, daß die Nitrierungsgeschwindigkeit direkt proportional sein muß der $5/2$ -Potenz der HNO_3 u. der Potenz der HNO_2 u. dem Quadrat der Konz. des organ. Stoffes. NO_2 muß bedeutend stärker katalysieren als HNO_2 . Neben der eigentlichen Nitrierung läuft NO_2 liefernder Oxydationsprozeß, der immer nur bei Ggw. von *E*-Säure vorliegen kann. Die Nitrierung stellt eine autokatalyt. Rk. dar. Die Oxydationsrk. der HNO_3 wird an dem Beispiel *arsenige Säure* geprüft, die auch hier über *E*-Säure als Anlagerungsprod. hinweggeht.

Die Gleichung der Nitrierungsgeschwindigkeit wurde ferner geprüft an dem *o*-Benzoesäuremethylester, *o*-Oxybenzoesäureäthylester, *m*-Chlorphenol in Ä. u. Phenol. Die Nitrierung verläuft nicht über das Nitrosophenol, die Salpetersäure entsteht zunächst an die *E*-Säure an. Die $[\text{H}^+]$ der Bzl.-Derivv. kann noch sehr gering sein, um durch Red. der HNO_3 meßbare Mengen HNO_2 zu liefern; doch ist vorherige Red. der HNO_3 gar nicht nötig, da ja die Nitrierung nicht über das Nitrosophenol verläuft. Für die Nitrierung des Phenols in wss. Lsg., die nur in Gegenwart von HNO_2 vor sich gehen kann, gelten im übrigen dieselben Gleichungen wie in äth. Lsg. Die Nitrierungsgeschwindigkeit wird durch Mercurinitrat katalytisch beeinflusst im negativen Sinne wie der Oxydationsvorgang. Diese beiden Rk. der HNO_3 scheinen demnach gleicher Art zu sein. Die Abhängigkeit der Nitrierungsgeschwindigkeit von der Phenolkonz. kann auf einer teilweisen Anlagerung der *E*-Säure an Phenol beruhen; dies ändert nichts an dem Verteilungsverhältnis der *E*-Säure zwischen Ä. u. W. bei Ggw. von Phenol u. HNO_2 . Daß im System HNO_3 - H_2O die *E*-Säure tatsächlich existiert, haben Vff. durch Vergleich von Ergebnissen aus Titrationen versucht, die Messungen der Verteilung von HNO_2 u. HNO_3 zwischen Ä. u. W., der elektr. Leitfähigkeit einer HNO_2 enthaltenden HNO_3 u. der Nitrierungsgeschwindigkeit geliefert haben.

In konz. H_2SO_4 verläuft die Nitrierung ganz anders. Sie erfolgt hier auch in Gegenwart von NO_2 u. ohne die B. der *E*-Säure. Der Zustand der HNO_3 in der konz. H_2SO_4 ist noch nicht genügend klar. Vielleicht muß eine Spaltung des N_2O_5 angenommen werden. Je nach den Medien Ä. u. W. oder H_2SO_4 müssen zwei Nitrierungswege, die sehr voneinander verschieden scheinen, angenommen werden. Leicht nitrierbare Stoffe sind solche, die in Anwesenheit von *E*-Säure nitriert werden, schwer nitrierbare solche in Lsg. von konz. H_2SO_4 oder konz. HNO_3 . Im übrigen herrschen über die Gleichgewichtszustände von N_2O_5 u. HNO_3 in konz. H_2SO_4 noch viele Unklarheiten. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. **141**, 231-238 1924. Wien, Univ.)

HORST.

Robert Schwarz und Ernst Menner, *Zur Kenntnis der Kieselsäuren*. II. Ber. Dtsch. Chem. Ges. **57**, 1477; C. **1924**, II, 2130.) Die l. c. genannten Verfahren (auch die *Granatsäure*, $\text{H}_4\text{Si}_3\text{O}_8$, ist durch Zers. ihres Na-Salzes dargestellt) wurden zur Entfernung von überschüssigem adsorbiertem W. zunächst mit Ä. behandelt u. im Vakuum oder mittels Durchsaugen von Wasser (bei Metakieselsäure) von den organ. Lösungsm. befreit. Die Best. des Wassergehalts in den erhaltenen Präparaten führte zu folgenden Ergebnissen: *Metakieselsäure*, H_2SiO_3 , geht schon bei 15° in niedrigere Hydratstufen über, ihre Reinigung muß daher bei 0° durchgeführt werden. Die Entwässerung

der Säure mit Aceton bei 15 u. 56° (20 Stdn. u. 1 Stde.) führt zu *Granatsäure* unter veränderter Einwirkungsdauer des Acetons (vgl. Tabelle im Original) we Zwischenwerte für das Hydratwasser erhalten, die auf Vorliegen der $12\text{SiO}_2 + 10\text{H}_2\text{O}$ u. $12\text{SiO}_2 + 9\text{H}_2\text{O}$ deuten. Vff. schließen hieraus, eventuell die Zus. $(\text{H}_2\text{SiO}_3)_{12}$ hat u. beim Entwässern alle möglichen, mehr minder beständigen niedrigeren Hydratstufen durchläuft. **II.** *Granatsäure* $\text{H}_4\text{Si}_3\text{O}_8 (= 12\text{SiO}_2 + 8\text{H}_2\text{O}?)$, Darst. u. Entwässerung bei 15°, bei längerem von Aceton werden zu niedrige Werte erhalten, die Säure ist also noch ziemlich labil; bei 0° entwässertes Prod. gibt richtige Werte. — **III.** *Dikieselsäure* $\text{H}_2\text{Si}_2\text{O}_5 (= 12\text{SiO}_2 + 6\text{H}_2\text{O}?)$, beständig, wird bei 120-std. Einw. von Acet 2-std. Verbleiben im Hochvakuum nicht verändert. **IV.** *Trikieselsäure*, $\text{H}_2\text{Si}_3\text{O}_8 (= 12\text{SiO}_2 + 4\text{H}_2\text{O}?)$; das hartnäckig anhaftende Adsorptionswasser läßt durch sd. Aceton beseitigen, jedoch bleiben Spuren von Aceton adsorbiert. — Entwässerung der mit W. durchtränkten Säure **II** über konz. u. 68%ig. H_2SO_4 24° führte unter beständiger Abgabe von W. zu **III**. Bei 16° über 50%ig. H_2SO_4 zeigte ein Haltepunkt der Entwässerungskurve die Beständigkeit von **II** an nachfolgender Entwässerung über P_2O_5 entstand **III**. Die Tatsache, daß in den letzteren Falle nicht **IV** entstand, deutet daraufhin, daß **II** eventuell die $\text{H}_8\text{Si}_6\text{O}_{16}$ hat, woraus sich **III** bildet nach: $\text{H}_8\text{Si}_6\text{O}_{16} - 1\text{H}_2\text{O} = \text{H}_6\text{Si}_6\text{O}_{15} (= [\text{H}_2\text{SiO}_3]_6)$ — Der Beweis für die Existenz von **I** konnte jetzt auch durch Feststellung der Entwässerungskurve über 50%ig. H_2SO_4 bei 0° erbracht werden; die Kurve (im Original) verläuft 12 Stdn. lang (mit einem Fehler von 1% über dem theoretischen Wert) horizontal; eine bei 15° mit derselben H_2SO_4 aufgenommene Kurve zeigt, daß **I** bereits in $12\text{SiO}_2 + 10\text{H}_2\text{O}$ übergegangen ist. — Wenn die beiden genannten Hydrate $12\text{SiO}_2 + 10\text{H}_2\text{O}$ u. $12\text{SiO}_2 + 9\text{H}_2\text{O}$ sich als wirklich existenzfähig erweisen, kann man als Schema, dem alle Hydrate sich einfügen, folgende aufstellen: $12\text{SiO}_2 + 24\text{H}_2\text{O}$, Orthosäure (noch unbekannt); $12\text{SiO}_2 + 18\text{H}_2\text{O}$, Metasäure; $12\text{SiO}_2 + 10\text{H}_2\text{O}$, Dekahydrat; $12\text{SiO}_2 + 9\text{H}_2\text{O}$, Nonahydrat; $12\text{SiO}_2 + 8\text{H}_2\text{O}$, Granatsäure; $12\text{SiO}_2 + 6\text{H}_2\text{O}$, Dikieselsäure u. $12\text{SiO}_2 + 4\text{H}_2\text{O}$, Trikieselsäure. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. **58**. 73–77. Freiburg i. B., Univ.) H.

Herbert Reck, *Das Verwittern von Natrium sulfurosum*. Krystallisiert als Natrium Sulfid, $\text{Na}_2\text{SO}_3 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$, verliert zunächst durch Verwittern nahezu sein gesamtes Krystallwasser. Das dadurch bedingte Ansteigen des SO_2 -Gehaltes bleibt aber nicht bestehen, es entsteht Sulfat durch Oxydation. (Pharm. Zentralhalle **663**. Leipzig, DIETZ & RICHTER, Gebr. LODDE A.-G., Lab.) DIETZ


H. Freundlich und W. Malchow, *Zur Kenntnis der Eisencarbonyle*. (V. FREUNDLICH u. CUY, Ber. Dtsch. Chem. Ges. **56**. 2264; C. **1924**. I. 148.) In der Tetracarbonyl wurde die Bruttoformel $\text{Fe}(\text{CO})_4$ erneut bestätigt, doch scheiterten alle Verss. einer Mol.-Gew.-Best. Als brauchbares Verf., um einfach u. quantitativ zu der zu untersuchenden Verb. zu gelangen, wird empfohlen, die alkoh. Lsg. von Na-Alkoholat auf eine alkoh. Lsg. von *Pentacarbonyl* einwirken zu lassen. Man kommt so zunächst zu einer roten in W. l. Verb., die wahrscheinlich aus 1 Mol. 5CO u. 2 Moll. H_2O enthält. Zum Tetracarbonyl kommt man von der roten Verb. aus nach vorsichtigem Neutralisieren mit $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ durch Ausäthern u. Behandlung der äther. Lsg. mit wasserfreiem CuSO_4 , oder aber man verdampft die äther. Lsg. zur Trockne u. behandelt sie mit HCl . — Die Isolierung der in der äther. Lsg. zunächst gewonnenen roten Verb. bereitet wegen ihrer Zersetzlichkeit Schwierigkeiten. Beim Zerfall bildet sich teilweise $\text{Fe}(\text{CO})_4$, in der Hauptsache Fe_2O_3 . Im evakuierten Exsiccator trocken bei Nacht stehengelassen, wird sie bis zum nächsten Tage größtenteils in Fe_2O_3 zers., was ebenfalls unter gleichen Bedingungen mit $\text{Fe}(\text{CO})_4$ in geringen Mengen im Exsiccator beobachtet wird. Daher nehmen Vff. an, daß in der roten Verb. der ursprüngliche Komplex des Pentacarbonyls noch vorhanden

st. bei der Rk. des Alkoholats mit $\text{Fe}(\text{CO})_5$, dem Versetzen mit W., dem Neutralisieren u. Ausäthern kein CO verloren gegangen ist. Der Fe-Gehalt war etwa 4%. C, H u. O konnten wegen der leichten Zers. durch O_2 vorläufig nicht analysiert werden. Es sind wahrscheinlich nicht OH-Gruppen, sondern 2 Mole W. in der roten Verb. enthalten.

Vergeblich waren zahlreiche Verss., zu besser krystallisierenden Stoffen zu gelangen. Das $\text{Fe}(\text{CO})_4$ erwies sich als am widerstandsfähigsten u. meist als beständiges Endprod. einer teilweisen Zers. — Aus *Nonacarbonyl* erhält man durch Alkoholat eine ähnliche rote Verb., die aber nur 29,1% Fe enthält u. leichter zerfällt in Tetracarbonyl. Durch alkoh. Kali geht letzteres zwar auch in eine rote Verb. über, doch verwandelt diese sich leicht wieder zurück. Nach diesen Verss. können Vff. in den Eisencarbonylen Stoffe erkennen, wie sie in ähnlicher Weise bei Mo (II) u. Ru (II) bekannt sind. Man kennt dort Verbb. der Zus. $\text{Mo}_3\text{Cl}_6 \cdot \text{C}_2\text{H}_5$ oder $[\text{Mo}_3\text{Cl}_7 \cdot \text{H}_2\text{O}] \cdot \text{H} \cdot 3\text{H}_2\text{O}$. Auch die Eisencarbonyle repräsentieren Verbb. eines Metalls in niedriger Oxydationsstufe u. mit negativem Radikal CO, ferner eine Neigung zur Polymerisation u. zur Aufnahme von W. Rutheniumchlorür zeigt Eigenschaften, die stark auf die Analogie mit den Carbonylen hinweisen. Bestimmte Formeln wollen Vff. noch nicht aufstellen, vermuten aber im Pentacarbonyl die Konst. $[\text{Fe}(\text{CO})_4]\text{CO}$, da ein CO leicht reagiert u. $\text{Fe}(\text{CO})_4$ als beständiger ersehen scheint. Die rote Verb. mag nach dieser Auffassung als $[\text{Fe}(\text{CO})_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}]\text{CO}$ formuliert werden. Die Valenzbetätigung von CO dürfte in vorliegenden Verbb. eine andere sein, als wir es von der organ. Carbonylgruppe gewöhnt sind. (Monatsh. f. anorg. u. allg. Ch. **141**. 317—24. 1924. Berlin-Dahlem, Kaiser WILHELM-INSTITUT f. physikal. Chemie u. Elektrochemie.)

HORST.


A. Benrath und **H. Würzburger**, *Über neutrale und saure Salze einiger Cobaltake*. Aus den Löslichkeitskurven der neutralen Salze wurde versucht, saure Salze zu ermitteln, beim neutralen *Hexamminkobalt-(3)-nitrat* gelang das jedoch nicht, aber das saure Salz wurde durch Analyse des Bodenkörpers festgestellt, es hat die Formel $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6](\text{NO}_3)_3 \cdot \text{HNO}_3$. Die Löslichkeit des neutralen *Aquo-hexammincobalt-(3)-nitrats* nimmt wie die des Hexamminnitrats mit steigender Temperatur dauernd ab. Der Umwandlungspunkt in das saure Salz, das ebenfalls durch Analyse des Bodenkörpers gefunden wurde, liegt zwischen 34,27 u. 35,63%. Das saure Salz hat die Formel $[\text{Co}(\text{NH}_3)_5\text{OH}_2](\text{NO}_3)_3 \cdot \text{HNO}_3$. Das neutrale Salz ist dunkelrot, das saure hellrot. Die Löslichkeit von *Hexamminkobalt-(3)-sulfat*, $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6](\text{SO}_4)_3 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$, wurde in verd. H_2SO_4 wechselnder Konz. bestimmt, das saure Salz ist dunkelgelb. Die Löslichkeit nimmt mit steigender H_2SO_4 -Konz.



VII. 1.

stark zu, man gelangt zu dem sauren Salz mit 1 Mol. H_2SO_4 , dessen Löslichkeit zunächst mit steigender H_2SO_4 -Konz. bis zu einem Minimum sinkt, dann wieder etwas steigt, u. man erhält $[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]_2(\text{SO}_4)_3 \cdot 2\text{H}_2\text{SO}_4$, dessen Löslichkeit mit steigender H_2SO_4 -Konz. nicht mehr wächst. Die Löslichkeitsverhältnisse der *pentamminkobalt-(3)-sulfate* liegen ähnlich wie bei den Hexamminsulfaten. Es wurden das einfach saure Salz $[\text{Co}(\text{NH}_3)_5\text{OH}_2]_2(\text{SO}_4)_3 \cdot \text{H}_2\text{SO}_4$ u. das zweifach saure Salz $[\text{Co}(\text{NH}_3)_5\text{OH}_2]_2(\text{SO}_4)_3 \cdot 2\text{H}_2\text{SO}_4 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ erhalten, ob tatsächlich ein Hydrat liegt, ließ sich nicht genau feststellen. Abgesehen von dem W. ergaben die umstehenden Formeln als die zweckmäßigsten. Danach hat der Co-halbes Zentralkomplex die Koordinationszahl 4. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 135. 2 bis 232. 1924. Bonn, Univ.) JOSEPH.

A. Benrath und W. Schröder, *Über Cuprocupricyanidammoniakverbindungen*. Als Ausgangsmaterial für die meisten Verbb. der Tetracyanoreihe dient das leicht darstellbare, grüne *Triamminkupfer-(2)-tetracyanodikupfer-(1)-at*, $[\text{Cu}_2(\text{CN})_4][\text{Cu}(\text{NH}_3)_3]$ (vgl. TREADWELL u. GIRSEWALD, Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 39. 84 [1904] u. MALMBERG (Arch. der Pharm. 236. 246. [1898]). Die Farbe des Salzes ist immer gleich, doch sind alle Erscheinungsformen dieses Salzes ident., die Kristalle sind monoklin u. der Farbunterschied wird durch ungleiche Dicke der Kristalle u. den ausgeprägten Pleochroismus mit den Farben blau u. grün verursacht. Aus der Löslichkeitskurve des bereits übereinstimmend beschriebenen, blauen *Tetramminkupfer-(2)-tetracyanodikupfer-(1)-ats* ließ sich auf ein neues blaues Salz, das *Hexamminkupfer-(2)-tetracyanodikupfer-(1)-at* schließen, welches auch durch Behandlung des grünen Salzes im NH_3 -Strom unter Ausschluß von W. dargestellt wurde. — *Kupfer-(2)-tricyanoamminodikupfer-(1)-at*, $[\text{Cu}_2(\text{CN})_3\text{NH}_3]_2\text{Cu}$, braun, wird durch Verreiben unter W. von weißem $[\text{Cu}_2(\text{CN})_3\text{NH}_3]\text{NH}_4$ mit der äquivalenten Menge *Cupriat* dargestellt. Durch Behandlung des violetten *Diamminkupfer-(2)-tricyanoamminodikupfer-(1)-ats* mit konz. NH_3 wird ein neues blaues Salz, das *Tetramminkupfer-(2)-tricyanoamminodikupfer-(1)-at*, $[\text{Cu}_2(\text{CN})_3\text{NH}_3]_2[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]$, erhalten, das aber an der Luft schnell wieder NH_3 abgibt u. sich in das violette Salz zurückverwandelt. Bei den Analysen wurde Cu durch die Schnellelektrolyse bestimmt. Zur Bestimmung der Cyans wurde die Substanz mit HCl dest. u. derd. u. derd. weichende HCN in verd. NaOH aufgefangen u. nach LIEBIG titriert. NH_3 wurde durch Destillation verd. NaOH u. Titration mit H_2SO_4 in Ggw. von Methylrot bestimmt, da $\text{Cu}_2(\text{CN})_2$ nicht merklich durch NaOH verseift wird. — Die Konstitutionsformel der Salze der Tetracyanoreihe ist nebenstehend angegeben. Die Koordinationszahl von Cu^{II} ist demnach 3. Die Konstitutionsformeln der Tricyanoreihe unterscheiden sich von denen der Tetracyanoreihe dadurch,



durch, daß in dem Anion je eine Koordinationsstelle zweier Cu-Atome statt dreier CN— durch NH_3 besetzt ist. — Von den dargestellten Salzen sind Löslichkeitskurven aufgenommen u. die Bedingungen, unter denen die Glieder einer Reihe ineinander übergehen, ermittelt. An älteren Arbeiten wird Kritik geübt. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 135. 205—25. 1924. Bonn, Univ.) JOSEPH.

Tomimatu Isihara, *Das Gleichgewichtsdiagramm des Kupfer-Zinn-Systems*. Die bereits in früheren Arbeiten (Metal Ind. [Lodon] 24. 253; Journ. Inst. Metal 31. 315; C. 1924. II. 300. 1170) angegebenen Resultate werden ausführlich erörtert u. durch Kurven u. Schaubilder belegt. (The science reports of the Tôhoku univ. 13. 75—100. 1924.) BECK.

Kôtarô Honda und Yosikadu Ôkubo, *Die Messung des thermischen Ausdehnungskoeffizienten für Aluminiumlegierungen und Legierungen von Nickel-*

Kobalt-Eisen. Vff. bestimmen die Wärmeausdehnungskoeffizienten von Al, welches mit Cu, Cu + Mn, Cu + Sn, Cu + Zn, Cu + Co, Cu + Ni + Mg, Cu + Mg, Cu + Mn + Mg von wechselndem Mengenverhältnis legiert war, schon 20° u. 400°. Der Ausdehnungskoeffizient schwankt zwischen $K = 2,028 \cdot 10^{-4}$. **Fe-Ni-Legierungen** zeigen von $K = 1,163 \cdot 10^{-5}$ bei reinem Fe steigendem Ni-Gehalt einen leichten Abfall von K bis 18% Ni, dann ein Minimum bei 25% Ni u. bei 35% Ni ein scharf ausgeprägtes Minimum mit $K = 0,163 \cdot 10^{-5}$. Dann steigt K wieder rasch an, um bei 50% Ni den Wert $K = 1,276 \cdot 10^{-5}$ u. bei 100% Ni den Wert $K = 1,276 \cdot 10^{-5}$ zu erreichen. **Fe-Co-Legierungen** zeigen nur ein schwaches Minimum bei 50% Co mit $K = 0,867 \cdot 10^{-5}$, bei 100% Co mit $K = 1,225 \cdot 10^{-5}$. (The science reports of the Tôhoku imp. univ. 13. 101—7. BECKER.)

D. Organische Chemie.

Lespiau, Bildung echter Acetylenverbindungen aus gemischten Acetylenmagnesium-Verbindungen. Leitet man durch eine äth. C_2H_5MgBr -Lsg. Acetylen, bis die untere Schicht keine Zunahme mehr zeigt, u. fügt zu zwei gleichen Proben pro Atom Mg 1 Mol. Chloraldehyd u. b) $\frac{1}{2}$ Mol. Chloraldehyd, so erhält man, nachdem die Schichten nach mehrtägigem Stehen mit angesäuertem W. zers. u. mit Ä. extrahiert worden sind, aus dem äth. Auszuge bei a) ein größtenteils aus dem Glykol $CH_2Cl \cdot CH_2 \cdot CH_2 \cdot C : C \cdot CHOH \cdot CH_2Cl$ bestehendes Prod., bei b) ebenfalls dieses Glykol u. außerdem den Alkohol $CH : C \cdot CHOH \cdot CH_2Cl$, Kp_{12} 60°, D_{20}^{21} 1,171, $n_D^{21} = 1,475$, mit $AgNO_3$ u. (in wss. Lsg.) mit ammoniakal. $CuCl$ Ndd. gebend. Analog erhält man bei Ersatz des Chloraldehyds durch Acroleinchlorid der Alkohol $CH : C \cdot CHOH \cdot CHCl \cdot CH_2Cl$, Kp_{12} 91°, D_{20}^{23} 1,306, $n_D^{23} = 1,500$, sowie ein krystallisierendes Öl. Näher untersuchtes Prod. — Wirkt Chlormethyläther auf eine Lsg., in der 1 Mol. pargyl 48 Stdn. lang mit mehr als 2 Mol. C_2H_5MgBr in Kontakt gewesen ist, bildet sich der Dimethyläther eines Glykols mit C_8 u. Verb. $CH : C(CH_3)_2 \cdot C : C : OCH_3$. — Durch Einw. von Pentamethylen-MgBr auf 2,3-Propyldibromid erhält man Verb. $CH_3(CH_2)_6 \cdot CBr : CH_2$. (C. r. d. l'Acad. des sciences 179. 1606—7. HABERLAND.)

Lebedew und E. Filonenko, Untersuchungen auf dem Gebiete der Polymerisation. X. Mitt. Über die Einwirkung einiger Silicate auf ungesättigte Verbindungen. (IX. vgl. LEBEDEV, ANDREJEWSKI u. MATJUSCHKINA, Journ. Russ. Chem. Ges. 54. 223; C. 1923. III. 1014.) Die früher gemachte Beobachtung, dass unter der Einw. von *Floridin* (Floridableicherde, zur Entfärbung von Ölprodd. aus Silicat) ungesätt. Verbb. teilweise polymerisiert werden, teilweise unverändert bleiben, hat jetzt zu folgender Feststellung geführt: von den Äthylenverbb. werden nur diejenigen polymerisiert, die Derivv. von a. zwei- u. dreifach substituierten Äthylen sind ($R \cdot R' \cdot C : CH_2$ u. $R \cdot R' \cdot C : CHR''$); *Diäthylen*derivv., die einen oder mehrere genannten Komplexe enthalten, lassen sich ebenfalls polymerisieren. *Isopren*, $CH_2 : CH \cdot CH(CH_3) : CH_2$, *Allenderivv.* werden (wenigstens in der *Äther*) nicht polymerisiert, ebenso wenig *Acetylen*verbb. Die polymerisierende Wrkg. wird durch H_2SO_4 (2 Teile) : W. (1 Teil), Verharzung ist nicht beobachtet worden; bei Einw. auf *Pyrrrol* findet mit Floridin keine Polymerisation statt. Die Polymerisationsprodd. lassen sich durch Erwärmen mit Ä. bisweilen depolymerisieren. — Das zu den Rkk. benutzte Floridin wird durch H_2SO_4 aktiviert durch 2-std. Erhitzen auf 275—325°; W.-Verlust hierbei 12 bis 15%. Bei größerer oder geringerer W.-Abgabe werden unwirksame Präparate erhalten. Die Rkk. werden durchgeführt, indem die zu untersuchende Substanz bei 25—100% ihres Gewichts Floridin versetzt wird u. im zugeschmolzenen Ge-

fäß bei Zimmertemp. stehen bleibt (bisweilen einige Jahre, Tabelle im Origin). Polymerisation wurde erzielt bei: $CH_2 : C(CH_3)_2$; $CH_2 : C(CH_3)(C_2H_5)$; $CH_2 : C(C_6H_5)$; $CH_2 : C(C_6H_5)_2$; $CH_2 : C(CH_3) \cdot CH_2 \cdot C(CH_3)_3$; $CH_2 : C(CH_3) \cdot CH : CH_2$; $C(CH_3) \cdot C(CH_3) : CH_2$; $CH_2 : C(CH_3) \cdot CH_2 \cdot CH_2 \cdot C(CH_3)_3$; CH_2 ; $(CH_3)_2C : CH \cdot (CH_3)_2C : CH \cdot C(CH_3)_3$; $(CH_3)_2C : CH \cdot CH : C(CH_3)_2$; Neigung zu teilweiser Polymerisation trat ein bei: $CH_2 : CHBr$; $CH_2 : CH \cdot CH_2 \cdot CH_2 \cdot CH : CH_2$; $CH_2 : CH \cdot CH_2$; $C_6H_5CH : CH \cdot C_6H_5$; $C_6H_5CH : CH \cdot COOC_2H_5$; $(CH_3)_2C : C : CH_2$; $(CH_3)_2C : C : CH$; $(CH_3)_3C \cdot C : CH$; Pyrrol; nicht polymerisiert wurden: $CH_2 : CH_2$; $CH_2 : CH_3$; $CH_2 : CH \cdot CH(CH_3)_2$; $CH_3 \cdot CH : CH \cdot CH_3$; $(CH_3)_2C : C(CH_3)_2$. Die Einw. Floridin läßt sich anwenden zur Unterscheidung u. Absonderung der a. zw. dreifach substituierten Äthylenderivv. von den übrigen Substitutionsprodd. Äthylens. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58. 163—68. St. Petersburg, Militärakad.) HABERLAND

Sargent G. Powell, Die Darstellung von β -Chlorpropionsäure. Gute Ausb. liefert folgendes Verf.: 50 g Trimethylenchlorhydrin werden tropfenweise in ständigem Rühren zu durch W. gekühlten 220 g konz. HNO_3 in einem e. Kolben gegeben, die Mischung dann 1 Stde. auf dem Dampfbade erwärmt u. 3 Voll. W. verd. u. 4 mal mit je 60 ccm Ä. ausgeschüttelt. Nach Abdest. d. Ä. aus der mit Na_2SO_4 getrockneten Lsg. u. weiterem Erhitzen, bis nichts mehr geht, wird weiter im Vakuum dest. Kp_{35} der β -Chlorpropionsäure 127° . (J. Americ. Chem. Soc. 46. 2879. 1924. Seattle [Washington], Univ. of Washington)

E. Carrière und E. Vilon, Experimentelle Untersuchung der Einwirkung von Schwefelsäure auf das Calciumoxalat. 10 ccm einer Na-Oxalatlsg. werden mit gleichem Vol. einer gleichkonzentrierten $CaCl_2$ -Lsg. gefällt, ins Reaktionsgefäß die auf 1 c verd. äquivalente Menge H_2SO_4 zugegan, der Nd. abfiltriert u. im Filtrat die Oxalsäure mit $KMnO_4$ bestimmt. Mit steigender Konz. der Reaktionsteilnehmer im Nd. sinkt die relative Menge der im Filtrat gefundenen Oxalsäure ab (von 18% bei 0,25-n. auf 8% bei 0,5-n. Lsgg.). Bei gleichbleibender Konz. der Oxalsäure- u. der H_2SO_4 -Lsg. nimmt die $H_2C_2O_4$ im Filtrat geradlinig zu, wenn die Konz. der H_2SO_4 zunimmt. Schließlich wurde der Temperatureinfluß studiert (alle Konz. untereinander gleich). Die regenerierte Oxalsäuremenge steigt im allgemeinen mit der Temp. (15–50°) nur zwischen 30 u. 40° macht der Anstieg einem schwachen Abfall Platz, wahrscheinlich mit dem Löslichkeitsminimum des Calciumsulfats zusammenhängend. (C. r. d. l'Acad. des sciences 179. 1402—4. 1924.) BIKERMAN


Karl Freudenberg und Otto Huber, Die Verwandlung der d-Milchsäure in l-Alanin. (5. Mitteilung über sterische Reihen.) (4. vgl. FREUDENBERG u. HUBER, Ber. Dtsch. Chem. Ges. 57. 1547; C. 1924. II. 2027.) Der l. c. beschriebene Toluol-p-sulfonsäureester des Milchsäureäthylesters liefert mit alkoh. NH_3 b. neben Toluolsulfomilchsäureamid u. toluolsulfonsaurem NH_4 auch reichliche Mengen von toluolsulfonsaurem Alaninamid. Bei den opt.-akt. Formen findet hierbei Widesche Umkehrung statt, aus d(–)-Milchsäure entsteht teilweise racemisiertes al. l(+)-Alanin, das mit N_2O_3 ohne Umkehrung l(+)-Milchsäure (Fleischilsäure) liefert. Dieser neue Übergang kann zur Erklärung der B. von Aminosäuren in der Pflanze herangezogen werden. Nach dem gleichen Verf. gelingt auch die Synthese von Aminosukern. — Aus der früher (vgl. FREUDENBERG u. BAUMANN, Ber. Dtsch. Chem. Ges. 55. 1340; C. 1922. III. 245. WOHL u. SCHELLEBERGER, Ber. Dtsch. Chem. Ges. 55. 1404; C. 1922. III. 343) gegebenen Aufklärung der Konfiguration der Milchsäure ergibt sich, daß bei dem natürlichen Übergang d-Glucose in l(+)-Milchsäure der als Zwischenprod. angenommene Glycerinaldehyd der d-Reihe zugehören u. bei der Disproportionierung zu Milchsäure auch der d-Form geben müßte, wenn bei dem Zerfall das a. C-Atom 2 u. 5 der Glucose unberührt bliebe. Daß tatsächlich l(+)-Milchsäure entsteht, ist nur so zu erklären

See
Lutata
P 3063

das Atom 2 u. 5 eine inakt. Oxostufe durchlaufen muß, die dann in eine a. Gppe, nunmehr mit umgekehrter Konfiguration, verwandelt wird, ein neuer Beweis dafür, daß als Vorstufe für die Milchsäure eine Oxoverb. von Art des Methylaloxals oder des α, α' -Dioxyacetons anzunehmen ist. — *Toluolsulfomilchsäureäthyl-* *see* *data* *23063*
 Kp._2 158–160°; Drehung jetzt etwas höher gefunden, $\alpha_{578}^{15} = +53,5^\circ$, $\alpha_{578}^{15} = +60,7^\circ$ (100 mm-Rohr). — *Toluolsulfonsaures Alanin*, $\text{C}_{10}\text{H}_{16}\text{O}_4\text{N}_2\text{S}$, d,l-Salz, $\text{F. } 13-214^\circ$. Salz aus reinem Amid des l(+)-Alanins, $\text{F. } 162^\circ$, $[\alpha]_{578}^{17} = +5,11^\circ$, *enter* l. als das vorige. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58. 148–50. Karlsruhe, Techn. Hsch.)

SPIEGEL.

A. Blanchetière, *Konstitution der Asparagin- und Glutaminsäureanhydride. Ihre biologische Bedeutung.* Bzgl. der Konst. der beiden genannten Anhydride vgl. ENNA, Gazz. chim. ital. 51. II. 281; C. 1922. I. 1015 u. BLANCHETIÈRE, S. 220. D. l. c. angegebene tricycl. Konst. der Anhydride u. die aus ihnen durch Hydrolyse zu erhaltenden Spaltprodd. lassen sich zur Erklärung der B. gewisser Stoffwechselprodd. gut heranziehen. Eine *Histidylasparaginsäure* (I) wird ein *Diketo-*



Im =
Imidazol-
rest

piperazin (II) liefern, das, je nachdem der Angriff bei der Hydrolyse erfolgt, entweder in das *n*-Peptid (III) oder das ω -Peptid (IV) zerfällt; das der NH_2 -Gruppe benachbarte COOH in IV wird durch Carboxylase unter Abspaltung von leicht in *Carnosin* (V) übergeführt werden. Unter der Annahme der Richtigkeit der letzteren Vermutung ergibt sich, daß *Glutathion* (vgl. QUASTEL, STEWART, UNNICLIFFE, Biochemical Journ. 17. 586; C. 1924. I. 296) der Formel VI entsprechen muß, da ein VII entsprechendes Prod. ähnlich wie IV durch Carboxylase in γ -Aminobutyrylcystein übergeführt werden müßte. — Ein Cyclopeptid ist wahrscheinlich auch das Prod. gewesen, das ABDERHALDEN u. KAUTSCH (Ztschr. physiol. Ch. 78. 115 [1912]) durch fermentative Spaltung des Caseins erhielten, da weder eine Pyrrolidincarbonsäure, noch ein Peptid war, u. bei der Hydrolyse HCl Glutaminsäure lieferte. (Bull. Soc. Chim. Biol. 6. 854–60. 1924.) HA.

Wilhelm Weltzien und **Keizo Nakamura**, *Die Bestimmung des Reduktionsvermögens von Cellulosepräparaten.* IX. Mitt. über *Cellulose* von Kurt Hess und Mitarbeitern. (VIII. vgl. HESS, WELTZIEN u. MESSMER, LIEBIGS Ann. 435. 1; 1924. I. 751.) Die neue Methode der Cu-Zahl-Best. läßt sich bisher nur auf unlösl. Cellulosepräparate anwenden; das Arbeiten nach ihr bietet insofern Vorteile, als durch Überführung der in Alkali l. Cellulose in die unl. Cu-Verb. (vgl. 1924. I. 754) es möglich ist, die Cellulose dem sek. Einfluß der w. NaOH zu entziehen, u. den unbekannten Einfluß des Verteilungszustandes der Substanz aus-

zuschalten bzw. herabzusetzen, wodurch sich die neue Arbeitsweise vorteilhaft von der von SCHWALBE (Chemie der Cellulose S. 625 [Berlin 1911]) angegebene unterscheidet. Herst. der Cu-Lsg.: 124,12 g Seignettesalz in wenig w. W. werden versetzt mit 24,97 g CuSO_4 in ca. 130 ccm W., 125 ccm 12-n. NaOH gegeben u. im Meßkolben auf 500 ccm aufgefüllt. — In einem 500 ccm Rundkolben (Abb. des App. vgl. Original), durch dessen Hals ein Rührwerk, Thermometer u. eine Kühlvorr. eingesetzt werden können, werden 0,4 g Substanz möglichst schnell unter Schütteln in 3-n. NaOH (unter Vermeidung von Erwärmen) gel. In ein 50 ccm Meßkölbchen werden nach der folgenden Tabelle die Reagenzien gemischt u. um die gewünschte Alkalikonz. in der Gesamtlsg. zu erhalten mit W. bis zur Marke aufgefüllt.

Vorratslsg.	Alkalikonz. in der Gesamtlsg.				
	2-n.	4-n.	6-n.	8-n.	10-n.
3-n. NaOH	10 ccm	10 ccm	10 ccm	10 ccm	10 ccm
Cu-Lsg.	10 „	10 „	10 „	10 „	10 „
12-n. NaOH	5 „	15 „	25 „	35 „	—
13,5-n. NaOH	—	—	—	—	40
Siedetemp. —→	104°	108°	112°	116°	120°

Diese Lsg. wird zur alkal. Kohlenhydratlsg. im Reaktionskolben gegeben, worauf die Cu-Alkaliverb. sich rasch abscheidet. Nach $\frac{1}{4}$ -std. Rühren bei gewöhnlicher Temp. wird in ein 150° warmes Glycerinbad gesetzt u. 5 Min. bei dieser Temp. gehalten. Nach schnellem Abkühlen wird der Kolbeninhalt zentrifugiert; durch Zugabe von W. werden Kohlenhydrat u. Cuprisalz gel.; es wird mit 10 ccm alkal. Seignettesalz u. schließlich mit W. gewaschen (unter Zentrifugieren), das red. Cu in HNO_3 gel. u. elektrolyt. bestimmt. — Aus den Tabellen des Originals ergibt sich, daß die Menge des abgeschiedenen Cu stark mit der Temp. wechselt; 5 Min. Kochen sind zur vollständigen Abscheidung von Cu ausreichend; die red. Cu-Menge nimmt mit steigender Alkalikonz., ebenso, wenn auch weniger ausgeprägt, wirkt die Erhöhung der Cu-Konz. Die Verss. der Vff. deuten daraufhin, daß die Reduktionsvorgänge zum größten Teil nicht in der Lsg., sondern an der Oberfläche des Niederschlages verlaufen. Wird das einmal red. Material durch Behandeln mit Seignettesalz wieder regeneriert u. die Best. der Cu-Zahl wiederholt, so ergibt sich, daß kein Cu mehr red. wird, woraus zu schließen ist, daß in dem untersuchten Material vornehmlich reduzierende Gruppen vorhanden waren, u. daß beim Arbeiten nach oben genannter Methode ein Angriff der Substanz nicht stattgefunden hat. Es ergibt sich hieraus ferner, daß die reduzierenden Bestandteile stärker l. Kupferalkaliverb. bilden, als die nicht reduzierenden Bestandteile. Im Gegensatz zu der neueren Methode der Best. der Cu-Zahl ergibt die Best. dieses Wertes nach der Methode von SCHWALBE bei jeder Wiederholung wechselnde Cu-Zahlen, die erst nach öfterem Wiederholen des Verf. auf 0 sinken; in diesem Falle wird die Substanz unter Freilegung reduzierender Gruppen verändert. (LIEBIGS Ann. 440. 29 bis 304. 1924. Dahlem, Kais. WILH.-Inst. f. Ch.) HABERLAND.

T. S. Patterson, Andrew Mc Millan und Robert Somerville, Isolierung der isomeren Xylole aus Rohxylole. (Vgl. CLARKE u. TAYLOR, Journ. Americ. Chem. Soc. 45. 831; C. 1923. III. 31.) Koksofenxylole (Kp. 137—141°) wurde mit gewöhnlicher konz. H_2SO_4 (1,84) $\frac{3}{4}$ Stdn. geschüttelt. Aus dem Rückstand wurde mit stärker konz. H_2SO_4 *p*-Xylol abgeschieden. Die sulfosaure Fl. wurde beim Abkühlen auf 10° fest u. konnte filtriert werden. Bei 130° Ölbadtemp. wurde am überhitzten W.-Dampf durch die rohe Sulfonsäuremasse getrieben, der auf 1 Teil

Dampf 4 Teile *m*-Xylol mitnahm; es wurden 74,9% *m*-Xylol von der H_2SO_4 aus dem Xylol absorbiert. Die so erhaltene Sulfonsäure entsprach einem Gemisch von *o*-*m*-Xylolsulfonsäure. Nach Umkrystallisieren aus Chlf. wurde eine bei 61–62° schmelzende *m*-Xylol-4-sulfonsäure erhalten (Sulfonamid F. 136–137°. Der F. (fl. Luft u. Pyranthermometer) von rohem Koksofenxylol wurde gemessen zu –70°, reines Xylol (MERCK) –47°, nicht umkrystallisiertes *m*-Xylol (über die Sulfonsäure) –5,5°, letzteres 3-mal aus Chlf. F. –40,5°, der durch Anwendung der gebräuchlichen Korrekturen einen dem reinen synthet. *m*-Xylol entsprechenden Wert von –3° ergibt. — Zum Vergleich mit den isolierten *m*-Verbb. wurde *o*-Xylol-4-sulfonsäure synthet. dargestellt, sehr hygroskop. F. 63–64° (aus Chlf.). Sulfonamid F. 43–144°. Das Ca-Salz dieser Säure ist zum Unterschied von dem entsprechenden Salz l. in h. W., aber viel wl. in k. W. Diese Löslichkeitseigenschaften haben zur Trennung des *o*-Xylols von *m*-Xylol benutzen können. Die Ausbeute an Xylol betrug in bezug auf das rohe Ausgangsmaterial 4,7%. Auch zur Prüfung der Reinheit von *o*-Xylol kann der Nachweis des in W. wl. Ca-Salzes der *m*-Xylol-4-sulfonsäure dienen. (Journ. Chem. Soc. London **125**. 2488–90. 1924. Glasgow, U. 7.)

HORST.

R. C. Goodwin und J. R. Bailey, *2-Phenylsemicarbazid*. Das nach ARNOLD (B. Dtsch. Chem. Ges. **30**. 1016; C. **97**. I. 1202) bei Kochen von *Aceton-2-phenylsemicarbazon*, $C_6H_5N(CONH_2) \cdot N : C(CH_3)_2$, mit W. entstehende Prod. hat sich als *1-Phenylsemicarbazid*, $C_6H_5NH \cdot NH \cdot CONH_2$, erwiesen. Dagegen erhält man das *2-Phenylsemicarbazid* aus der ersten Verb. leicht, wenn man die Spaltung in Ggw. von HCl vornimmt, während in Ggw. von Alkali *Acetonphenylhydrazon* entsteht. — Die Darst. des *Aceton-2-phenylsemicarbazons* aus *Acetonphenylhydrazon* erfolgt besser nach ARNOLD aus dem freien Hydrazon in Eg. + $\frac{1}{3}$ W. mit Cyanat; man kann auch das Cyanat verwenden, wie es durch Schmelzen von NaCN mit PbO oder durch Erhitzen von $K_2Cr_2O_7$ mit $K_4Fe(CN)_6$ erhalten wird. — Eine bequeme Methode zur Darst. von *Benzal-2-phenylsemicarbazon* bietet die Einw. von $C_6H_5 \cdot CHO$ auf die des *Aceton-2-phenylsemicarbazons* in 1 Äqu. verd. HCl. — *Cyclohexanon-2-phenylsemicarbazon*, $C_{18}H_{17}ON_3$, aus Cyclohexanon, dem Semicarbazid u. geschm. $NaC_2H_3O_2$ (Nadeln (aus verd. A.), F. 177°. — Auf *Glucose* wirkt *2-Phenylsemicarbazid* an: den für Darst. des Phenylglucosazons üblichen Bedingungen unter B. dieser Fe. (Journ. Americ. Chem. Soc. **46**. 2827–32. 1924. Austin [Texas], Univ. of Texas.)

SPIEGEL.

G. Giltz, *Die Krystallform einiger organischer Arsenderivate*. II. (I. vgl. Bull. Soc. Chim. Belgique **32**. 19; C. **1923**. III. 1154.) Abb. u. genaue Beschreibung der Krystalle einiger Salze der *p*-Aminophenylarsinsäure. *K*-Salz, $NH_2 \cdot C_6H_4 \cdot AsO_3HK$, rhomb., $a : b : c = 0,778011 : 1 : 0,758124$. — *Li*-Salz, $NH_2 \cdot C_6H_4 \cdot AsO_3HLi$, rhomb., $a : b : c = 0,944731 : 1 : 0,830419$, $B = 91^\circ 16'$. — *NH*-Salz, $NH_2 \cdot C_6H_4 \cdot As(NH_4)_2$, 2H₂O, orthorhomb., $a : b : c = 1,037944 : 1 : 0,657969$. (Bull. Soc. Chim. Belgique **33**. 532–38. 1924. Brüssel, Univ.)

SPIEGEL.

E. Ectors, *Beitrag zum Studium der Reaktion der Organomagnesiumverbindungen mit Nitrilen*. Das Benzonitril. (Bull. Soc. Chim. Belgique **33**. 521–24. 1924. Louvain, Univ. — C. **1924**. II. 2463.)

SPIEGEL.

Henry Gilman und Harold H. Parker, *Die Reaktion zwischen Organomagnesiumsalzen und Kupferchlorid*. Die Rk. wurde bei Komplexen $RSMgX$, $ROMgX$, $AlR_3 \cdot MgX$ u. $RCH : CHMgX$ untersucht. Eine Kupplungsrk. im Sinne der Gleichung $C_6H_5MgBr + 2CuCl_2 = C_6H_5 \cdot C_6H_5 + Cu_2Cl_2 + 2MgBrCl$ oder eine Oxydationsrk. erfolgt bei allen untersuchten Typen außer denen, wo das Mg an O gebunden ist, aber nur bei den Verbb. $RSMgX$ werden gute Ausbeuten erreicht. (Journ. Americ. Chem. Soc. **46**. 2823–27. 1924. Ames [Iowa], Iowa State Coll.) SP.


Fr. Hein, F. Petzchner, K. Wagler und Fr. A. Segitz, *Über das Salzverhalten der Alkaliäthyle in Metallalkylen als Lösungsmitteln.* Wie Fr. HEIN (Ztschr. f. Elektrochem. **28**, 469; C. 1923. I. 579) schon am Beispiel des *Natriumäthyls* zeigen konnte, leiten auch andere Alkaliäthyle wie LiC_2H_5 , KC_2H_5 , LiC_4H_9 , $\text{LiC}_6\text{H}_{13}$ u. $\text{LiCH}_2\text{C}_6\text{H}_5$ in $\text{Zn}(\text{C}_2\text{H}_5)_2$ -Lsgg. den elektr. Strom u. können wohl die entsprechenden Alkalihydride als salztartig konstituiert angesehen werden. LiC_2H_5 , das für sich allein geschmolzen (95°) gar kein Leitvermögen zeigt, verleiht dagegen in der $\text{Zn}(\text{C}_2\text{H}_5)_2$ -Lsg. ein erhebliches Leitvermögen auf. Je größer der elektropositive Charakter des Alkalimetalls, desto größer die molare Leitfähigkeit, desto höher der F. u. gleichzeitig damit Abnahme der Mischbarkeit mit dem Lösungsm. Während sonst bei Elektrolyten mit zunehmender Verd. die molare Leitfähigkeit ansteigt, wurde hier der gegenteilige Effekt beobachtet. Demnach ist nicht Solvation allein, sondern wohl auch hiermit verknüpfte Assoziation und Autokomplexen für die Ionenbildung verantwortlich zu machen. KC_2H_5 hatte entsprechend dem höheren F. eine größere molare Leitfähigkeit der Schmelze als $\text{KC}_2\text{H}_5\text{-Zn}(\text{C}_2\text{H}_5)_2$ als die Lsg. von NaC_2H_5 . Bei starker Verd. wesentlicher Abnahme des Leitvermögens. Da K elektropositiver ist, so ist auch der Salzcharakter der Alkylverb. ausgeprägter. — LiCH_3 erwies sich im Gegensatz zu den beschriebenen Äthylverb. als mit $\text{Zn}(\text{C}_2\text{H}_5)_2$ vollkommen mischbar. Es leitet etwas besser als LiC_2H_5 , zeigt im übrigen aber beim Verd. analoge B. von assoziierten Strukturkomplexen mit abfallender Leitfähigkeitsgröße. — Auch $\text{LiC}_6\text{H}_{13}$ ist vollkommen mischbar, aber trotz der negativen Phenylgruppe leitet es bedeutend weniger wie Vff. mit der schon im konz. Zustand eintretenden Solvation in Verb. bringend. Auch beim Verd. trat bei $\text{LiC}_6\text{H}_{13}$ keine 2-Schichtenbildung ein. — $\text{Li}\cdot\text{CH}_2\text{C}_6\text{H}_5$ wurde durch Umsetzen von LiC_2H_5 in Bzl. mit $\text{Hg}\cdot(\text{CH}_2\cdot\text{C}_6\text{H}_5)$ als leuchtend gelbe amorphe Verb. dargestellt. Es besitzt von allen untersuchten Li-Alkylen die größte molare Leitfähigkeit. Das Bestehenbleiben der charakterist. gelben Farbe auch in Lsg. läßt Vff. zur Überzeugung kommen, daß darin ein Beweis für die Vorliegen solvatisierter Ionen erblickt werden kann.

Da am Beispiel des LiC_2H_5 erkennbar war, daß das Lösungsm. von Einfluß auf die elektrochem. Erscheinung ist (in Bzl. war LiC_2H_5 nichtleitend), wurde $\text{Al}(\text{C}_2\text{H}_5)_3$ u. $\text{Zn}(\text{C}_2\text{H}_5)_2$ als Lösungsm. für Alkaliäthyle untersucht. Die $\text{Al}(\text{C}_2\text{H}_5)_3$ -Solvate von LiC_2H_5 u. NaC_2H_5 haben höheren F. u. ausgesprochenen Salzcharakter als die $\text{Zn}(\text{C}_2\text{H}_5)_2$ -Solvate. Durch den Einfluß der Propylgruppe wird aber der Salzcharakter des Na- u. K-Propyls beeinträchtigt. Der elektr. Strom wurde nicht geleitet in verd. Lsgg. der Alkalimethyle in $\text{Zn}(\text{CH}_3)_2$ u. $\text{Al}(\text{CH}_3)_3$ u. in den verd. Lsgg. des Na- u. Li-Äthyls in $\text{Cd}(\text{C}_2\text{H}_5)_2$. Vff. suchen diese Unmöglichkeit in dem hohen F. der Alkalimethyle bzw. ihrer Solvate zu erklären. Auch in $\text{Al}(\text{C}_2\text{H}_5)_3$, $\text{Cd}(\text{C}_2\text{H}_5)_2$ u. $\text{Li}(\text{C}_2\text{H}_5)$ wurden keine besseren Resultate erzielt.

Als Anodenprodd. der Elektrolyse der rein dargestellten $\text{NaC}_2\text{H}_5\text{-Zn}(\text{C}_2\text{H}_5)_2$ -Lsg. konnten festgestellt werden ein aus 80% C_2H_4 u. C_2H_6 bestehendes Gasgemisch von KW-stoffen, die vermutlich aus vorübergehend entstehenden C_2H_5 -Gruppen gebildet wurden. Unter Bestätigung der elektrolyt. Natur der Stromleitung auf Grund der Faradayschen Beziehungen wurde an der Kathode nur Zn nachgewiesen. Die den Stromtransport vermittelnden Ionen sind nach den ausgeführten Bestimmungsverss. wahrscheinlich dem NaC_2H_5 [nicht dem $\text{Zn}(\text{C}_2\text{H}_5)_2$] entnommen. Verwendet man Pb als Anode, so konnte durch die der B. von Bleitetraäthyl entsprechende Gewichtsabnahme die vorübergehende Existenz freier C_2H_5 -Gruppen nachgewiesen werden. — Für die Darst. der einzelnen Alkylverb., die Analysemethoden, elektr. Messungen sind ausführliche Anweisungen wie auch apparative Vorschriften im Original mitgeteilt. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. **141**, 161–224, 1924. Leipzig, Univ.)

Shrirang M. Sané und Shiam Sunder Joshi, *Reaktionen von Nitrophenolen mit *p*-Toluolsulfonylchlorid*. (Vgl. ULLMANN, Ber. Dtsch. Chem. Ges. **41**. 1870; **12**. I. 229.) Vff. untersuchen die Einw. von *p*-Toluolsulfonylchlorid (I) auf Nitrophenole u. 2,4,6-Tribromphenol in Ggw. von Na_2CO_3 oder Diäthylanilin. Versuche zeigten das von ULLMANN (l. c.) beschriebene Verh. mit Ausnahme des 4-Nitro-6-chlor-*m*-kresols, das in Ggw. von Diäthylanilin in den *p*-Toluolsulfonylchlorid anstatt in das entsprechende Polynitrochlorbenzol übergeführt wird. — Aus 4-Tribromphenol u. I in Ggw. von Diäthylanilin (Wasserbad, 4 Stdn.) entsteht 4-Tribromphenyl-*p*-toluolsulfonsäureester, $\text{C}_{13}\text{H}_9\text{O}_3\text{Br}_3\text{S}$, aus A. F. 113°. — 2-Nitro-6-bromphenyl-*p*-toluolsulfonsäureester, $\text{C}_{13}\text{H}_9\text{O}_5\text{NBr}_2\text{S}$, aus A. F. 140°. — 4-Nitro-6-brom-*p*-toluolsulfonsäureester, $\text{C}_{13}\text{H}_9\text{O}_5\text{NBr}_2\text{S}$, aus A. F. 128—129°. — 4,6-Dinitro-2-brom-*p*-toluolsulfonsäureester, $\text{C}_{13}\text{H}_9\text{O}_7\text{N}_2\text{BrS}$, aus den Komponenten in Ggw. von Na_2CO_3 , aus A. F. 157°. — 4,6-Dinitro-1-chlor-2-brombenzol, $\text{C}_6\text{H}_2\text{O}_4\text{N}_2\text{ClBr}$, aus 4-Nitro-2-bromphenol u. I in Ggw. von Diäthylanilin, aus A. F. 63°. — 4,6-Dinitro-2-bromdiphenylamin, $\text{C}_{13}\text{H}_9\text{O}_4\text{N}_3\text{Br}$, aus 4,6-Dinitro-1-chlor-2-brombenzol, Anilin u. Na_2CO_3 , aus Bzl. gelb, F. 150°. — 4,6-Dinitro-2-bromdimethylanilin, $\text{C}_8\text{H}_8\text{O}_4\text{N}_3\text{Br}$, aus 4,6-Dinitro-1-chlor-2-brombenzol, A. u. Dimethylanilin, aus A. orangefarbene Masse vom F. 96°. — Tetranitrodibromdiphenyl-*p*-phenylendiamin, $\text{C}_{18}\text{H}_{10}\text{O}_8\text{N}_6\text{Br}_2$, aus 4,6-Dinitro-1-chlor-2-brombenzol, *p*-Phenylendiamin u. Na_2CO_3 in A., rot, F. über 300°. — 2,4-Dinitro-6-chlor-*m*-tolyl-*p*-toluolsulfonsäureester, $\text{C}_{14}\text{H}_{11}\text{O}_7\text{N}_2\text{ClS}$, aus Bzl. F. 119°. — 4,6-Dinitro-3-chlorphenol, $\text{C}_6\text{H}_3\text{O}_5\text{N}_2\text{Cl}$, aus *m*-Chlorphenol mit rauchender HNO_3 -Eg. — Mischung, aus A. F. 92°. — 4,6-Dinitro-1,3-dichlorbenzol, $\text{C}_6\text{H}_2\text{O}_4\text{N}_2\text{Cl}_2$, aus 4,6-Dinitro-1-chlor-2-brombenzol, Diäthylanilin, aus Eg. F. 102°. (Journ. Chem. Soc. London **125**. 2481—84. 1924. Lucknow, Univ.)

Hans Stobbe und Friedrich Kuhrmann, *Zwei Photodimere des Cinnamaldehyds*. (Vgl. STOBBE u. BARBASCHINOW, Ber. Dtsch. Chem. Ges. **45**. 3396; **13**. I. 266.) Die Depolymerisierung des früher bei Belichtung des monomeren Cinnamaldehyds allein erhaltenen farblosen Dimeren A gelingt nach Vers. von **Ritz Rau** in Trichloressigsäure bei 60—80°, in geschm. Naphthalin bei 100° durch trockenes Erhitzen auf 100—110°. Das damals nur als Nebenprod. bei der Einw. von Br auf A erhaltene zweite Dimere B entsteht auch bei Belichtung des monomeren in Ggw. von Spuren J neben A, ferner aus diesem durch mäßiges Erhitzen seines Krystallpulvers oder durch Kochen in Eg.-Lsg., ferner bei Entfernung des Tetrabromids von A durch Zn u. Eg. Es wird ebenso wie A durch



dem kürzerwelligen U.-V.-Gebiet verschoben. B erscheint als das stabilere, energiereichere Stereoisomere. Die Isomerie kann nicht auf ungleicher Verteilung der Atome gegenüber der Ringebene beruhen, sondern nur auf verschiedener Orientierung von C_6H_5 u. CN an einer oder beiden Äthylgruppen der Seitenketten. — Die Polymerisation des monomeren Cyanids erfolgt nur in Lsgg. In Form sind sowohl das Monomere wie die Dimeren gegen Licht jeder Wellenlänge äußerst stabil. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. **58**. 85—87.)

SPIEGEL.

Larry L. Sherrill, *Die Reaktion von Bromnitromethan mit aromatischen Ver-*

bindungen bei Gegenwart von Aluminiumchlorid. Zur Darst. von Bromnitron zeigte sich das Verf. von SCHOLL (Ber. Dtsch. Chem. Ges. **29**. 1824) mit gen. Modifikationen am geeignetsten. Mit Bzl. reagiert es in Ggw. von AlCl_3 in 2 tungen. In der einen entstehen *Phenylnitromethan*, bezw. seine Zersetzungspr. $\text{C}_6\text{H}_5\cdot\text{CHO}$ u. $\text{C}_6\text{H}_5\cdot\text{CO}_2\text{H}$, im ganzen zu 19—45%. Die zweite Richtung zeigt in B. von $\text{C}_6\text{H}_5\text{Br}$ (12—30%). Mit Brom- u. Chlorbenzol u. Anisol tritt die R. im ganzen zu ca. 40—85% [ebenfalls in beiden Richtungen unter Eintritt der substituenten in p-Stellung ein. Es wird angenommen, daß das Bromnitromethan

der Rk. als Gleichgewichtsgemisch von 2 elektromeren Formen, $\text{Br}\cdot\text{CH}_2\cdot\text{N}^+\text{Br}^-\cdot\text{CH}_2\cdot\text{NO}_2$, besteht. (Journ. Americ. Chem. Soc. **46**. 2753—58. 1924. U. S. Chicago. Mount Holyoke Coll.)

Henry Gilman und **Harold H. Parker**, *Eine Untersuchung über die opt. Bedingungen zur Darstellung normaler Valeriansäure aus Butylmagnesiumbromid und Kohlenstoffdioxid*. Die beste Ausbeute wurde bei 0° erhalten. (Bei einigen anderen Säuren scheint Anwendung einer Kältemischung noch günstiger.) Bei Anwendung von 0,2 Mol n-Butylmagnesiumbromid waren die Ergebnisse bei einer Menge zwischen 150 u. 300 ccm gleich, bei 100 ccm etwas geringer. Der Druck der CO_2 war ohne Einfluß. $\frac{1}{2}$ l CO_2 pro Min. war am günstigsten, als Gesamtmenge 0,2 Mol 45 l. Die Schnelligkeit des Rührens steigert bis ca. 845 Umdrehungen die Ausbeute, darüber hinaus die Geschwindigkeit der Rk. Erwärmen unter Einfluß, nachdem das erforderliche CO_2 durchgeleitet war, ist ohne Einfluß auf die Mündung des Einleitungsrohres wird zweckmäßig etwas (ca. 12 mm) über der Oberfläche der Fl. gehalten. Unter den optimalen Bedingungen war die Ausbeute an n-Valeriansäure 78,9%. — Von anderen Säuren wurden unter den gleichen Bedingungen erhalten *Benzoesäure* aus $\text{C}_6\text{H}_5\text{MgBr}$ 71,5—72,5%, aus $\text{C}_6\text{H}_5\text{MgJ}$ 35,46%, *Cyclohexancarbonsäure* 68%, *Cyclohexansulfonsäure* aus $\text{C}_6\text{H}_{11}\text{MgCl}$ u. SO_2 28% (Journ. Americ. Chem. Soc. **46**. 2816—22. 1924. Ames [Iowa], Iowa State Coll.)

V. Grignard und **J. Savard**, *Über die Enolform des Pulegons*. Läßt man ein Organomagnesiumverb. RMgX auf *Pulegon* wirken, so findet, je nach der Art von R, X u. der Temp. mehr oder weniger reichliche Gasentw. (B. von RH) statt, daß geschlossen werden muß, daß *Pulegon* enolisiert wird. Nach den Untersuchungen Vff. (Tabelle im Original) ist die Enolisation um so größer, je größer R ist. Bromide sind wirksamer als die Jodide, von den untersuchten Alkylen ($\text{R} = \text{C}_2\text{H}_5$ bis C_5H_{11}) bewirkt $(i\text{-C}_3\text{H}_7\text{Br})$ bei 40° eine 100%ige Enolisation. Um die Enolform zu fassen, wurde das aus *Pulegon* + CH_3MgBr erhaltene Reaktionsprodukt mit $\text{C}_6\text{H}_5\text{COCl}$ behandelt; hieraus wurde durch Hydrolyse erhalten *Methylpulegolat*, Kp.₁₀ 64°, u. der *Benzoesäureester der Enolform des Pulegons*, $\text{C}_{17}\text{H}_{20}\text{O}_2$, weißer Kristalle, F. 230°, unl. k. in Ä., ll. in der Hitze u. in sd. Bzl., Ausbeute 27%; bei Verseifung wird gewöhnliches *Pulegon* erhalten. Wird statt $\text{C}_6\text{H}_5\text{COCl}$ zu U. CH_3COCl angewandt, so erhält man neben *Methylpulegon* die *Enolform des Pulegons*, indem der gebildete Essigester sofort hydrolysiert wird; Kp.₃ 91°, $n_D^{16} = 1,47690$, $D_4^{16} 0,9087$; der Geruch ist weniger mentholartig u. ein wenig als der der Ketoform; Ausbeute 24%. Mit Propionsäureanhydrid werden die Enol-Verbb. erhalten. Die Enolform ist beim Aufbewahren in reinem Zustand am besten beständig. Durch Wasserdampfdest., Einw. von Alkalien (nicht durch K_2CO_3 carbonate) oder MgO wird die Ketoform zurückgebildet. (C. r. d. l'Acad. sciences **179**. 1573—76. 1924.)

L. Ruzicka, *Zur Frage der Umwandlung von Campher in Fenchon*. Entgegen zu den Ausführungen von S. Nametkin. Vff. wahrt gegenüber NAMETKIN (Ibid. Ann. **438**. 202; C. **1924**. II. 836) seine Priorität in genannter Frage. (Ibid. Ann. **440**. 322. 1924.)

LINDENBERG.

see
errata
P. 3063




K. Alb. Vesterberg, *Beiträge zur Chemie der Terpene, Phytosterine und Harze*.
K. Alb. Vesterberg und **E. Borge**, *Zur Kenntnis der pyrogenen Zersetzung Abietinsäure*. (I. u. II. vgl. LIEBIGS Ann. **428**. 243; C. **1922**. III. 1007.)
 Es gelang etwaiger Gewinnung dehydrierter Zers.-Prodd. der Abietinsäure wurde 1 kg
 Platinium mit 50 g Ni-Bimsstein (= 5 g Ni) langsam dest. Das erhaltene
 Öl gab bei der Dest. nur sehr wenig „Leichtöl“ u. ging fast ganz zwischen
 300–400° über, die Hauptfraktionen zwischen 335 u. 375°, welch letztere unter
 5 mm in 4 zwischen 175 u. 230° sd. Fraktionen zerlegt wurden. Aus der
 Fraktion krystallisierte etwas Reten aus (aus Bzl. u. A., F. 98°, Kp.₁₁ 216°). Aus
 beiden 1. Fraktionen, welche die Liebermannsche Cholestolrk. gaben (tief wein-
 gelb), J verbrauchten, doch so, daß die Jodzahlen erst nach 2 Stdn. konstant
 wurden, wurden unter 1 mm schließlich reichliche Mengen zweier Prodd. mit fol-
 genden Konstanten gewonnen: Kp.₇₅₈ 323°; 331° (korr.), Kp.₁ 142–143°; 145–148°,
 n_D²⁰ 1,9686; 0,9822, n_D²⁰ = 1,5370; 1,5474, [α]_D (in Bzl.) = –48,43°; –53,01°. Das
 1. dürfte reines Retenocotylhydrin, C₁₈H₂₆, u. ident. oder isomer mit der von
 R. N. N. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. **53**. 1880; C. **1920**. III. 924) beschriebenen
 sein. Das 2. Prod. ist wahrscheinlich ein Gemisch von C₁₈H₂₆ u. C₁₈H₂₄.
 Die k.-Gase enthielten keinen H, sondern (neben wenig „schweren KW-stoffen“) auch
 CO u. noch mehr CH₄, wodurch die Auffassung obigen KW-stoffes als
 C₁₈H₂₆ u. nicht C₁₉H₂₈ gestützt wird. — An Stelle der erwarteten Dehydrierung ist
 nach eine bemerkenswert glatte Zers. der Abietinsäure eingetreten, offenbar
 nach dem Sinne der Gleichung: C₂₀H₃₀O₂ = C₁₈H₂₆ + CH₄ + CO₂. Die
 kleinen Mengen von Reten u. über 375° sd. Prodd. ist wahrscheinlich einer
 „Oxydation“ unter Abspaltung von CO u. H₂O zuzuschreiben. (LIEBIGS
 Ann. **440**. 305–10. 1924. Stockholm, Univ.)

LINDENBAUM.

Schönberg, *Einige Bemerkungen über die Benzilsäureumlagerung*. Er-
 gänzung auf die Ausführungen von SCHEUING (Ber. Dtsch. Chem. Ges. **57**. 1963;
 C. **1925**. I. 67.) (Ber. Dtsch. Chem. Ges. **58**. 235.)

HABERLAND.

Reynold C. Fuson, *Naphthalin und die zentrische Struktur*. Nach den An-
 nahmen von HUGGINS (Journ. Americ. Chem. Soc. **44**. 1607; C. **1923**. I. 182)
 ist die peri-Brückenverb. nicht, wie bisher angenommen, 1,8-Deriv., sondern
 ein 1,5-Deriv. des Naphthalins sein. Zur Entscheidung muß die Aufklärung der Orien-
 tierung in Naphthalolacton dienen. Von den beiden bekannten α,α-Oxynaphthoe-
 sauren mit den Substituenten in verschiedenen Ringen hat man entsprechend der
 gegen Anschauung die in das Lacton überführbare als 1,8-, die andere als
 1,5-Naphthoesäure bezeichnet. Es mußte eine dieser Säuren auf einem Wege
 isoliert werden, bei dem die Stellung der Substituenten außer Zweifel blieb.
 Die 1,5-Naphthylparaconsäure (I) wurde, entsprechend der Kondensation des ent-
 sprechenden Chlorderiv. (vgl. ERDMANN u. KIRCHHOFF, LIEBIGS Ann. **247**. 372)
 durch Erhitzen in 1,5-Bromnaphthol (II) verwandelt. Dessen Methoxyderiv.
 nach der Grignardschen Rk. 1,5-Methoxynaphthoesäure (III), ident. mit dem
 Äther der bisher als 1,5-Oxynaphthoesäure bezeichneten Säure. Die Huggin-
 s'sche Formulierung des Naphthalins ist daher unrichtig, u. dies dürfte auch für die
 in gewonnene Struktur des Benzols gelten.



1,5-Naphthylparaconsäure, C₁₁H₉O₄Br (I), aus o-Brombenzaldehyd u. Bernstein-
 säure. Ggw. von NaC₂H₃O₂, Krystalle (aus W.), F. 133–135°. — 1,5-Bromnaph-

thol, $C_{10}H_7OBr$ (II), aus der vorigen bei 250—300°, Dest. im CO_2 -Strom, Krystallisation aus W. Feine Nadeln von deutlichem Phenolgeruch, F. 137° mit $FeCl_3$ weißen, nach einigen Stdn. tief purpurfarben werdenden Nd. Di. Verb. wurde auch aus 1,5-Bromnaphthylamin (vgl. ULLMANN u. CONSONNO, Dtsch. Chem. Ges. 35. 2803; C. 1902. II. 1117) durch Diazotieren des Sulf. Umkochen in stark schwefelsaurer Lsg. gewonnen. — *Methyläther des 1,5-naphthols*, $C_{11}H_9OBr$, aus dem vorigen durch $(CH_3)_2SO_4$, Tafeln (aus A.), F. 67° — 1,5-Methoxynaphthoesäure, $C_{12}H_{10}O_3$ (III), aus dem vorigen nach Umsetzu. Mg durch CO_2 oder aus nach ROYLE u. SCIEDLER (Journ. Chem. Soc. London 1647; C. 1923. III. 767) dargestellter „1,5“-Oxynaphthoesäure, deren F. (unkl.) 231,5—233° gefunden wurde, mit $(CH_3)_2SO_4$, schwach gelbe Tafeln (aus 95%ig. F. 227—228,5°. (Journ. Americ. Chem. Soc. 46. 2779—88. 1924. Univ. of M. sota.) SPIEGLER

David E. Worrall, *Die Anlagerung von Natriumacetessigester an substituierte aromatische Senföle*. Die früher (Journ. Americ. Chem. Soc. 40. 415; C. 1918. 16) beschriebenen Rkk. wurden an einer Anzahl weiterer Senföle studiert. Die untersuchten Senföle lagerten Na-Acetessigester an, u. die entstandenen Verbl. litten leicht Säurespaltung, wenn auch die dabei zu erwartenden Säuren zuweilen infolge Unbeständigkeit nicht isoliert werden konnten. Ein Fall von Ketonsynthese wurde jetzt nicht gefunden. Die Anlagerung geht bei p-substituierten Senfölen meist in wenig Min. vor sich, langsamer bei m- u. noch langsamer bei o-substituierten. Die Na-Derivv. gehen durch Säuren in zähe Öle über, die meist nach Stehen über Nacht an kühlem Orte krystallin werden. Wo Krystallisation gelang, konnte doch die stattgehabte Anlagerung durch B. von Isoxazolonen und Pyrazolonen nachgewiesen werden. Das früher angegebene Ausbleiben der Hydrolyse bei m- u. o-Toluididen erklärt sich so, daß die Hydrolyse zwar so rasch wie bei den p-Derivv. eintritt, die entstehenden Säuren aber niedrig schmelzend und verb. sind, die bei gewöhnlicher Temp. CO_2 verlieren, so daß nicht Thioamie, sondern Malonsäure, sondern solche der Essigsäure isoliert werden. Die Existenz des erwähnten *Thioacetoacetyl-o-toluidids* ist sehr zweifelhaft, wahrscheinlich handelt es sich um unreines *Thioacetyl-o-toluidid*. Ebenso ist das früher angegebene *Thioacetoacetyl-m-toluidid* zu streichen.

Versuchsteil. Äthylacetylmalonsäuremonothio — *o-Toluidid*, $C_{14}H_{17}O_3NS$, Öl, nicht rein erhalten. — *o-Anisidid*, $C_{14}H_{17}O_4NS$, Öl. — *m-Toluidid*, $C_{14}H_{17}O_3NS$, prismat. Krystalle, F. 78—80°. — *m-Anisidid*, Öl. — *m-Bromanilid*, $C_{13}H_{14}O_3NSBr$, Prismen, F. 81—82°. — *p-Anisidid*, Prismen, F. 81—82°. — *p-Phenetidid*, $C_{15}H_{17}O_4NS$, Prismen, F. 87—88°. — *p-Chloranilid*, $C_{14}H_{13}O_3NSCl$, Prismen, F. 77—79°. — *p-Jodanilid*, $C_{13}H_{14}O_3NSJ$, Nadeln, F. 61—62°. — *α-Naphthylamid*, $C_{17}H_{17}O_3NS$, Prismen, F. 82—84°. — *Malonsäuremonothio-m-Anisidid*, Öl. — *m-Toluidid*, $C_{10}H_{11}O_2NS$, Tafeln, [bei Zimmertemp. schmelzen]. — *m-Bromanilid*, $C_9H_8O_2NSBr$, Tafeln, F. 101° (Zers.). — *p-Anisidid*, $C_{10}H_{11}O_3NS$, Tafeln, F. 90—91° (Zers.). — *p-Phenetidid*, $C_{11}H_{13}O_3NS$, Tafeln, F. 90—91° (Zers.). — *p-Chloranilid*, $C_9H_8O_2NSCl$, flache Nadeln, F. 105° (Zers.). — *p-Jodanilid*, $C_9H_8O_2NSJ$, Tafeln, F. 132—133° (Zers.). — *α-Naphthylamid*, $C_{13}H_{11}O_2NS$, Plättchen, F. 56—57°. — *Thioessigsäure-m-Anisidid*, $C_9H_{11}ONS$, gelbe Tafeln, F. 52—53°. — *m-Toluidid*, $C_9H_{11}NS$, Nadeln, F. 42—43°. — *m-Bromanilid*, C_9H_8ONS , Nadeln, F. 75—76°. — *p-Anisidid*, Nadeln, F. 114°. — *p-Phenetidid*, gelbe Ad., F. 113—114°. — *p-Chloranilid*, Nadeln, F. 141—142°. — *p-Jodanilid*, Nadeln, F. 111°. (Journ. Americ. Chem. Soc. 46. 2834—38. 1924. TUFTS Coll. [Mass.].) SPIEGLER

Walter Hückel, *Zur Stereochemie bicyclischer Ringsysteme. I. Die Stereoisomerie des Dekahydronaphthalins und seiner Derivate*. Die vorliegenden Arbeiten

weisen einwandfrei, daß es zwei *Dekahydronaphthaline* gibt, deren Isomerie, wie (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 55. 230; C. 1922. I. 1028) angegeben hat, auf cis-Isomerie beruht. Ein sicherer Beweis dafür, welcher Reihe die cis- u. trans-Form zugehört, hat sich bisher noch nicht erbringen lassen; die benutzte Nomenklatur ist auf Grund von Analogieschlüssen gewählt worden: bei der katalyt. Hydrierung in 1,2-Stellung bisubstituierter arom. Stoffe in sg. ganz überwiegend cis-Derivv. gebildet werden (vgl. z. B. WILLSTÄTTER, Ber. Dtsch. Chem. Ges. 51. 776; C. 1918. II. 364), nimmt Vf. an, daß dasselbe der Fall bei der Hydrierung von Naphthalin oder Tetralin sein wird; die so bezeichneten trans-Formen folgen in ihren physikal. Eigenschaften der Auwers-Skitaschen; die cis-Formen haben höheren Kp., höhere D. u. n_D , aber niedrigere Mol.-Gew. als die trans-Formen. Beide isomere Verb. sind, wie ihre Derivv., sehr beständig; ein Übergang der einen in die andere Form ist bisher nur in einem Falle beobachtet worden: *cis- α -Dekalon* lagert sich bei der Dest. unter gewöhnlichem Druck zu etwa 95% in *trans- α -Dekalon* um.

Mit **Rudolf Mentzel**, *Stereoisomere β -substituierte Dekaline*. Zur Darst. von *trans- β -Dekalon* sollte zunächst ein synthet. Weg dienen: wenn es gelang, *trans-Cyclohexan-1-essig-2-propionsäure* darzustellen, so mußten diese bei der Reaktion mit Acetanhydrid cis- u. trans- β -Dekalon liefern. Durch Hydrierung von *trans-2-propionylcyclohexan-1-carbonsäure* konnte jedoch nur die cis-Form der Säure erhalten werden, daraus ein *cis- β -Dekalon*, das sich ebenso wie das hieraus zu erhaltende *cis- β -Dekalol* (F. 105°) von dem früher von LEROUX (Ann. Chim. et Phys. [8] 21. 910) beschriebenen β -Dekalon u. β -Dekalol (F. 75°) deutlich unterscheidet. Da die beiden Ketone, in Übereinstimmung mit der Mohrschen Vorstellung, im Verhältnis von cis zu trans-Isomerie, so müssen bei der Oxydation aus jedem zwei Säuren $C_{10}H_{16}O_4$, *Cyclohexan-1,2-diessigsäure* u. *Cyclohexan-1-propion-2-carbonsäure*, entstehen, u. zwar aus dem einen Keton die cis-, aus dem anderen die trans-Formen; diese Annahme wurde durch den Vers. bestätigt. Bei alkal. Oxydation der Dekalole mit $KMnO_4$ wurden cis- u. trans-Cyclohexan-1-propion-2-carbonsäure, sowie cis- u. trans-Hexahydrophenylendiessigsäure isoliert. — β -Dekalon enthält drei a. C-Atome, demgemäß müssen 8 opt.-akt. u. 4 Racemformen darstellbar sein. Rac. cis- u. trans- β -Dekalon müssen je 2 rac. Alkohole u. je 2 Amine entstehen; alle geforderten Verb. sind bisher noch nicht erhalten worden; bisher sind dargestellt worden 2 Amine der trans- u. eins der cis-Reihe; bei den Dekalonen ist die Existenz von mehr als 2 Formen ebenfalls sichergestellt, sie können jedoch noch nicht in reinem Zustande isoliert werden.


Versuche. *cis-Cyclohexan-1-essig-2-propionsäure*, $C_{11}H_{18}O_4$, aus 22,07 g Phenylendiessigsäure in 120 ccm Eg. + 1,7 g Platinmohr (nach WILLSTÄTTER) durch Erhitzen bei 180°; nach öfterem Umkrystallisieren aus wss. Aceton F. 109—110°; aus Mutterlaugen erhaltene Fraktionen haben F. bis 85° hinab; in wss. Lösung oder durch Hydrieren des K-Salzes wird die Säure einheitlicher erhalten; *Diäthylester*, Kp.₇₆₀ 315—320°, Kp.₂₀ 183°; *Dianilid*, $C_{23}H_{28}O_2N_2$, aus CH_3OH u. F. 163°. Verss., die Säure durch Erhitzen mit konz. HCl auf 180° oder in Rohr in die trans-Form überzuführen, mißlingen. — *cis- β -Dekalon*, $C_{10}H_{16}O$, durch Erhitzen der vorigen werden mit 50 ccm Acetanhydrid übergossen, dieses bei 140—180° u. das Keton bei 210—260° übergetrieben; nach Reinigung über das Semicarbazon: Kp.₂₆ 128°, D.₄²⁰ 1,0038, $n_D^{20} = 1,49265$, $n_D = 1,49041$, $n_D = 1,49947$, $n_D = 1,50534$; *Semicarbazon*, $C_{17}H_{19}ON_3$, F. 182—183° (Zers.), ll. in A.; *Oxim* zähes Öl, Kp.₁₆ 161—165°. Das aus cis- β -Dekalol durch Oxydation mit Eg.- CrO_3 erhaltene cis-Dekalon hat nach Reinigung über das Semicarbazon F. —14°, Kp.₇₅₅ 247°, D.₄²⁰ 1,0039, $n_D^{21} = 1,49180$. — *cis- β -Dekalol*, $C_{10}H_{16}O$, Darst. durch Red. des Dekalons mit Na + A. oder durch katalyt. Hydrierung in Eg., durch katalyt.

Hydrierung von 1. α - β -Tetralol, 2. α - β -Tetralol nach WILLSTÄTTER, 3. α - β -Tetralol nach SKITA (in diesem Falle entstehen u. a. stereoisomere Alk. sowie ca. 30% Dekalin), 4. von α - β -Tetralol mit Ni im Schüttelautoklaven bei 150–170° u. 40–80 at. Aus PAe. Nadelchen, F. 105°; *Phenylurethan*, $C_{17}H_{22}O_2$, aus A. Nadeln, F. 134°; *Benzoat*, $C_{17}H_{22}O_2$, F. 57–58°. — Oxydation der β -Dekalols mit alkal. $KMnO_4$ führt zu *cis-Cyclohexan-1-propion-2-carbonsäure* aus wss. Aceton F. 101° u. *cis-Cyclohexan-1,2-diessigsäure*, aus W. F. 159° (Sinterp. 161°, ist in W. weniger l. als vorige. — *cis- β -Dekalylamin*, durch Hydrierung von Oxims (13 g) in 70 ccm Eg. + 1 g Pt (als Gummiarabicumkolloid) + 100 ccm 15 ccm HCl bei 2–3 at, oder durch Red. des Oxims in Na + A.; Isolierung als *Acetylderiv.*, $C_{12}H_{21}ON$, aus Aceton F. 154–155°. — *trans- β -Dekalol*, bei Hydrierung von α - β -Tetralol mit Ni-Katalysator im Schüttelautoklaven bei 150 bis 170° erhält man neben KW-stoff ein Gemisch von *cis*- u. *trans- β -Dekalol*, nicht immer konstanter Zus. „Techn.“ *Dekalon* (aus techn. Dekalol [RIEDEL]) wird in Portionen von je 10 g in 150 ccm A. mit 10 g Na red., beim Aufarbeiten wird eine Hauptfraktion Kp.₄₅ 145° erhalten, die zum Teil erstarrte; die Krystalle wurden abgesaugt u. nach Waschen mit k. PAe. aus diesem umkrystallisiert, worin *cis- β -Dekalol* weniger l. ist als die *trans*-Verb.; letztere krystallisiert in rechtwinkligen Vierecken mit abgestumpften Ecken, F. 75°. — *trans- β -Dekalon*, aus vorigem durch Oxydation, F. 6°, Kp.₇₅₅ 241°, Kp.₃₀ 126°, D._{15.7} 0,9797, D.₂₀ 0,975, $n_D^{19} = 1,408$, riecht etwas stumpf, während die *cis*-Verb. süßlicher riecht; *Semicarbazon*, 11 bis 193° (Zers.), in A. weniger l. als *cis*-Isomeres; *Oxim*, F. 76°, sechseckige Tafeln, „Techn.“ *Dekalon* besteht der D. nach aus 60% *trans*- u. 40% *cis*-Verb., *Semicarbazon*, F. 182–183°, *Oxim* ölig. — *trans-Cyclohexan-1-propion-2-carbonsäure*, $C_{10}H_{16}O_4$, aus *trans- β -Dekalol* durch Oxydation mit alkal. $KMnO_4$ oder CrO_3 (Erd) aus W. F. 143°; außerdem entsteht hierbei *trans-Cyclohexan-1,2-diessigsäure*, $C_{10}H_{16}O_4$, aus W. Nadeln, F. 167°, weniger l. in W. als vorige. — *trans- β -Dekalylamin*, durch Hydrierung von *trans*-Dekalonoxim; *Acetylderiv.*, $C_{12}H_{21}ON$, nach 10-maligem Umkrystallisieren aus wss. Aceton F. 128–129°.

2. Mit **Ewald Brinkmann**, *Stereoisomere α -substituierte Dekaline*. Bei Hydrierung von *ar*- u. *ac- α -Tetralol* nach WILLSTÄTTER entsteht als Hauptprod. u. c. *α -Dekalol*; bei Anwendung von *ac*-Tetralol entsteht hierbei neben wenig *trans- β -Dekalol* auch *cis-Dekalin*. Das aus diesem Dekalol zu erhaltende *Dekalon* wird nach Reinigung über sein Semicarbazon ein teilweise krystallisierendes Produkt, dessen feste Anteile ident. sind mit dem von LEROUX (l. c.) beschriebenen *α -Dekalon* (F. 33°). Wird das Keton über die Disulfitverb. gereinigt, so erhält man einheitliches *cis- α -Dekalon* (F. 2°), das durch längeres Kochen mit Oxalhydrat durch h. HCl im Rohr, durch Kochen mit alkoh. NaOH u. durch Dest. unter gewöhnlichem Druck in die *trans*-Verb. (F. 33°) umgelagert werden kann. Übergang von der *cis*- in die *trans*-Reihe konnten auch festgestellt werden beim Verdampfungsdarst. von Derivv. des *cis- α -Dekalons*; von diesen konnte nur das Semicarbazon des *cis*-Deriv. erhalten werden, während Oxim, Benzalverb. u. ein mit C_2H_5ON dargestelltes Kondensationsprod. mit den aus der *trans*-Verb. bereiteten Derivv. ident. waren. Die Konst. der beiden *α -Dekalone* ergibt sich daraus, daß das Keton mit F. 2° bei der Oxydation mit HNO_3 *cis-Cyclohexan-1-propion-2-carbonsäure* liefert, während das Keton mit F. 33° die *trans*-Form der Säure liefert. Durch Sprengung des Ringes an der Verknüpfungsstelle müssen beide Ketone durch Oxydationsprod. liefern. Mit $KMnO_4$ oder CrO_3 wurde aus beiden Ketonen *δ -Ketosebacinsäure* erhalten, indem die intermediär gebildete *Cyclohexanonbuttersäure* ihrerseits wieder unter Ringöffnung gespalten wurde. — Von den 4 möglichen stereoisomeren *α -Dekalolen* wurden bisher 3 isoliert, von den 4 *α -Dekalylaminen* 2.

versuche. *cis- α -Dekalol*, $C_{10}H_{18}O$, Darst. am besten durch Hydrieren von *α -Terthalol* in Eg., aus PAe. Nadelchen, F. 93° , bei gewöhnlicher Temp. fast geruchlos, in der Wärme fenchonartig riechend; *Phenylurethan*, $C_{17}H_{23}O_2N$, aus Aceton F. 118° . — *cis- α -Dekalon*, $C_{10}H_{16}O$, aus vorigem in Eg. + CrO_3 , aus Disulfidverb. mit Na_2CO_3 isoliert; F. 2° ; von intensivem etwas an Menthol erinnerndem Geruch, Kp.₂₀ 126° , D.₄²¹ 1,0077, D.₄²⁰ 1,008, $n_D^{20} = 1,49364$; *Semidekalin*, $C_{11}H_{19}ON_3$, F. $220-221^\circ$ (Zers.). Das *cis- α -Dekalon* geht durch katalyt. Hydrierung wieder quantitativ in *cis- α -Dekalol* über, bei alkal. Red. mit Na + A. entsteht ein stereoisomerer Alkohol der *trans*-Reihe, Kp.₂₈ 130° , aus PAe. F. 63° . — *Sebacinsäure*, aus W. weiße Nadeln, F. 116° ; *Semicarbazon*, $C_{10}H_{19}O_5N_3$, aus Nadelchen, F. $178-180^\circ$ (Zers.), geht durch Red. nach CLEMMENSEN oder mit A. im Rohr über in *Sebacinsäure*, aus A. F. 124° , *Dimethylester* F. 33° . — *trans- α -Dekalon*, Geruch mentholartig; nach Reinigung über die Disulfidverb. ohne Zersetzung, F. 22° , 0,9840, D.₄²⁰ 0,986, $n_D^{23} = 1,48372$; nach Dest. Kp.₇₅₅ 239° , D.₄^{21,5} 0,9846, 0,986, $n_D^{21,5} = 1,48487$, Kp.₂₀ 122° ; *Semicarbazon* F. $229-230^\circ$, weniger l. in Ä. als *cis*-Verb.; *Oxim* F. 168° ; *Benzalverb.*, $C_{17}H_{20}O$, aus CH_3OH gelbliche Nadeln, F. $11-12^\circ$. — *trans- α -Dekalol*; durch alkal. Red. entsteht ausschließlich die Verb. mit Kp.₂₈ 130° , bei gewöhnlicher Temp. fast geruchlos; bei katalyt. Hydrierung des *trans- α -Dekalons* entsteht dieselbe Verb. u. ein fl. Dekalol, das nach längerem Stehen allmählich erstarrt; *Phenylurethan des fl. Prod.*, $C_{17}H_{23}O_2N$, F. 134° , aus wss. Nadelchen, ll. in PAe. — *trans- α -Dekalylamine*; durch katalyt. Hydrierung von *trans- α -Dekalonoxims*, Alkalisieren u. Übertreiben mit Wasserdampf zu erhaltendes Gemisch hat Kp.₂₉ $128-129^\circ$, Geruch unangenehm bas., an Luft rasch CO_2 entwickelnd, durch Erwärmen mit Benzoesäureanhydrid in Ä. werden durch rasche Krystallisation aus Bzl. zwei *Benzoylderivv.*, $C_{17}H_{23}ON$, erhalten; die eine l. Verb. hat F. 194° , die leichter l. F. 112° , letztere macht etwa $\frac{2}{3}$ des Gemisches aus; *Acetylverb.*, $C_{12}H_{21}ON$, aus W. F. 127° . — *Bis- α -dekalon*, $C_{10}H_{16}O_2$ (nebenstehend), durch 3-std. Erhitzen von 2 g *cis*- oder *trans*-Dekalon mit 2 g Na in 20 ccm CH_3OH auf dem Wasserbad; aus CH_3OH Nadelchen, F. 151° ; gesätt. gegen $KMnO_4$ u. Tetranitromethan. —

Mit **Erich Goth**, *Synthese des α -Dekalons*. Die synthet. Darst. gelang, indem die durch Hydrieren von γ -Phenylbutter-o-carbonsäure zu erhaltende *cis-Cyclohexan-1-butter-2-carbonsäure* (I) durch Erhitzen mit HCl im Rohr in die *trans- α -Dekalon- β -carbonester* (II) umgelagert wurde. Der hieraus zu erhaltende *trans- α -Dekalon- β -carbonester* (III), der auch aus der *cis*-Säure mit C_2H_5ONa oder durch Oxalesteresterung von *cis- α -Dekalon* (V) u. Abspaltung von CO erhalten wird, geht bei Abspaltung in *trans- α -Dekalon* (IV) über.



versuche. *cis-Cyclohexan-1-butter-2-carbonsäure* (I), aus γ -Phenylbutter-

o-carbonsäure durch Hydrierung nach WILLSTÄTTER oder besser nach SKITA wss. Aceton F. 92—94°; *Monoanilid*, $C_{17}H_{23}O_3N$, aus CH_3OH Blättchen, F. 152°; *Dianilid*, $C_{23}H_{25}O_2N_2$, aus wss. Aceton F. 196—201°; *Diäthylester*, Kp.₁₈ D.^{20,8}₄ 1,0175, $n_D^{19,7} = 1,45687$. — *trans-Cyclohexan-1-butier-2-carbonsäure* (II) voriger durch 5-std. Erhitzen mit konz. HCl im Rohr auf 200°; aus wss. A F. 92—94°; *Monoanilid*, $C_{17}H_{23}O_3N$, aus CH_3OH Nadelchen, F. 152°; *Dianilid* CH_3OH F. 210—213°; *Diäthylester*, Kp.₂₁ 188°, D.²⁰₄ 1,0118, $n_D^{19,7} = 1,455$; *trans- α -Dekalon- β -carbonester* (III), durch Erwärmen des Diäthylesters von I mit C_2H_5ONa u. Zerlegung des durch Zugabe von W. abgeschiedenen Na mit H_2SO_4 ; nach Extraktion mit Ä. Rückstand aus äth. Lsg. aus PAe krystallisiert; Nadeln, F. 76°. — *Dekalonoxalester* (VI), durch Mischen von cis- α -Dekalon + 41 g Oxalester mit 7 g Na in 140 ccm A. bei -10 bis nach 12-std. Stehen im Eisschrank Zers. durch Aufgießen auf 1 kg Eis + 17 konz. H_2SO_4 , ölig, gibt mit $FeCl_3$ Rotfärbung; durch Erwärmen mit C_6H_5NH steht das *Pyrrolidinderiv.* $C_{24}H_{24}ON_2$, aus CH_3OH F. 216—217°. Abspaltung CO aus VI erfolgt bei 160—180°; der Rückstand wird bei Kp.₂₃ 160° dieser Temp. geht teilweise IV über: Hauptfraktion hat Kp.₂₃ 162—174°, bei maliger Dest. Kp.₁₈ 171—172°; das Destillat erstarrt allmählich zu Krya von III; *Phenylpyrazolon des α -Dekaloncarbonesters*, $C_{17}H_{20}ON_2$, aus III + P hydrazin, F. 199—200°; der nach der letztgenannten Methode dargestellte lag erstarrende Ester III hatte D.^{18,5}₄ 1,0692, $n_D^{18,5}$; aus dem hieraus sich ergehn M_D-Wert folgt, daß ein Gemisch von etwa 40% Enol- u. 60% Ketoform r. Bei der Säurespaltung mit Na-Cyclohexanolat zerfällt III in II. — *trans- α -I* (IV) aus III durch Erwärmen mit 5%ig. KOH, F. 33°.

4. *cis- und trans-Dekalin.* Um die den vorher beschriebenen Derivv. zu u liegenden KW-stoffe, *cis- u. trans-Dekalin* in möglichst reinem Zustande a halten, wurden die β -Dekalole zu den entsprechenden Dekalonen oxydiert u zu cis- u. trans-Dekalin red. Ferner wurden die Dekalole durch Abspaltu H_2O mittels $KHSO_4$ in die entsprechenden Oktaline übergeführt u. diese Hydrierung in cis- u. trans-Dekalin verwandelt. Zwischen den beiden Isom ergab sich eine erhebliche Differenz der Kpp. Techn. Dekalin konnte fraktionierte Dest. ebenfalls in die beiden Isomeren zerlegt werden. *trans-Ik* erstarrt in Ä.-CO₂ sofort, die cis-Verb. langsamer, techn. Dekalin wird krystallisiert aber nach dem Impfen mit einer der beiden Formen teilweise. V ständig rein waren die erhaltenen Dekaline noch nicht.

Versuche. *cis- u. trans-Dekalin* aus cis- u. trans- β -Dekalon nach CLEMMNS 11 g trans-Dekalon + 60 g amalgamiertes Zn + 50 ccm konz. HCl + 100 m werden unter öfterer Erneuerung der Säure 9 Stdn. gekocht u. der K danach mit Wasserdampf dest. (etwas trans- β -Dekalol wird ebenfalls gild das mit Ä. extrahierte über Na dest. *trans-Dekalin* hatte F. -36°, K 1 $n_D^{20,5} = 0,8715$, $n_D^{19} = 0,8734$, D.²⁰₄ 0,872, $n_D^{18} = 1,47225$, $n_D^{20} = 1,473$, Oktalin dargestellt: Kp. 185°, D.²⁰₄ 0,8695, $n_D^{20} = 1,46958$; aus techn. Ika F. -36°, Kp. 185°, D.¹⁷₄ 0,8743, D.²⁰₄ 0,8715, $n_D^{21,5} = 1,46978$, D.²⁰₄ 1,45. *cis-Dekalin* analog dargestellt (Dauer der Red. 12 Stdn., in diesem Falle line von Dekalol): F. -51°, Kp. 193°, D.¹⁹₄ 0,8986, D.²⁰₄ 0,898, $n_D^{19} = 1,4823$, $n_D^{20} = 1,4823$; aus Oktalin dargestellt: Kp. 193°, D.²⁰₄ 0,8952, $n_D^{20} = 1,480$ aus techn. Dekalin erhaltenes Prod.: F. -51°, Kp. 193°, D.¹⁷₄ 0,8959, D.²⁰₄ 0,895. Weitere Daten vgl. Tabelle im Original. (LIEBIGS Ann. 441. 1—48. Göttingen Univ.)

Paul Pfeiffer, *Zur Kenntnis der Chinhydrone.* (Experimentell bearbeitet von F. Goebel und Olga Angern.) Man rechnet zwar die *Chinhydrone* allgemein den Molekülverbh., nimmt aber meistens an, daß bei denen im engeren Sinne

Chinhydrone, das H-Atom der OH-Gruppe die Verknüpfung der Komponenten übernimmt (vgl. GOLDSCHMIDT u. CHRISTMANN, Ber. Dtsch. Chem. Ges. 711; C. 1924. I. 2693). Da Vf. nun früher gefunden hat, daß außer Phenolen auch Phenoläther u. KW-stoffe zur B. von chinhydrontartigen Verbb. geeignet sind, vertritt er die Auffassung, daß in der ganzen Gruppe die ungesätt. C-Atome der benzoiden u. die O-Atome der chinoiden Komponente die gegenseitige Bindung vermitteln, so daß die Phenol-, Phenoläther- u. Aminchinhydrone als Deriv. der KW-stoffchinhydrone erscheinen. Dafür spricht, daß die Chinone den von den Farbstoffen her bekannten Farbgesetzen folgen, denn die Lösungsfarbe verschiedenartiger Chinone in den nachfolgenden benzoiden Komponenten vertieft sich von hell- oder grünstichig gelb über orange u. rot bis zu fast schwarzlich blau oder violett in der Reihenfolge: Bzl. $\rightarrow$ Anisol $\rightarrow$ Phenol $\rightarrow$ Anilin $\rightarrow$ Dimethylanilin. Andererseits gehen die Farben der Chinhydrone nicht parallel mit den Halochromieerscheinungen der Chinone überein, was bei der Auffassung jener als Phenolate der Fall sein müßte. Es tritt danach carbo- u. hydrophile Chinone zu geben, erstere (an der Spitze der ungesätt. Chinone) mit besonderer Affinität zu Ring-C-Atomen, letztere (an der Spitze der methylierten Chinone) mit ebensolcher zu sauren H-Atomen.

Weiter wird untersucht, welche im Chinonmol. enthaltene Atomgruppierung die Chinhydronebildung maßgebend ist, ob:

$-\text{CO}-\text{CH}=\text{CH}-\text{CO}-$ (I.) oder $-\text{CH}=\text{CH}-\text{CO}-\text{CH}=\text{CH}-$ (II.)

beide. Daß Verbb. vom Typus I. zu den Chinhydronebildnern gehören, ist bereits gezeigt worden (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 55. 413; C. 1922. I. 810). Daß Verbb. vom Typus II. nur ganz vereinzelte Beobachtungen vorliegen über Verbb. vom Typus II. nur ganz vereinzelte Beobachtungen vor.

Zur zwecks Auffindung neuer Molekülverbb. die Schmelzkurven von Kombinationen der Ketone *Benzophenon*, *Fluorenon*, *Chalkon*, *Cinnamylidenacetophenon*, *Dianisalacetophenon* u. (*Dianisalacetophenon*) mit KW-stoffen, Phenolen, Phenoläthern u. Aminen genommen. Gut ausgeprägte Maxima wiesen jedoch nur die Diagramme der letzten Ketone mit einigen Phenolen auf, u. die entsprechenden Verbb.

ebenfalls rein dargestellt werden. Bei den anderen Kombinationen werden nur sehr oder weniger tief gefärbten Schmelzen beim Erstarren wieder farblos.

Man nimmt die Farbe der Komponenten an. — Zur Erreichung des eigentlichen Zweckes nämlich der Darst. farbiger KW-stoff- u. Phenolätherverbb. von Ketonen vom Typus II., führte erst die Überlegung, daß solche Verbb. bei weitgehender Halogenierung der Chinonkomponente leicht erhalten worden waren (l. c.). Da geeignete Reaktionsmaterialien in der Dibenzalacetoneihe nicht bekannt sind, griff man zum

analog gebauten *Perchlorindon* (nebenst.), das den Erwartungen auch durchaus entsprach. — Daß die neuen Molekülverbb. konstitutionell den Chinhydrone entsprechen,

ergibt sich daraus, daß die Lösungsfarben der ungesätt. Ketone in benzoiden Komponenten den für die Chinhydrone charakterist. Farbgesetzen folgen (vgl. oben), und auch die Farbunterschiede hier weniger stark ausgeprägt sind. — Da nun auch für Verbb. vom Typus I. u. II. die Fähigkeit zur Chinhydronebildung erwiesen ist, darf man schließen, daß diese nicht von einer ringförmigen Struktur, sondern von der ungesätt. Ketonnatur bedingt wird.

Zur Versuche. Die Molekülverbb. werden aus den Komponenten entweder in geeigneten Lösungsm. oder durch Zusammenschmelzen u. Umkrystallisieren erhalten. — Verbb. des Dibenzalacetons. Mit Resorcin. $\text{C}_{17}\text{H}_{14}\text{O}$, $\text{C}_6\text{H}_6\text{O}_2$.

1. Gelbe Nadeln, F. 95°. — Mit α -Naphthol. $\text{C}_{17}\text{H}_{14}\text{O}$, $2\text{C}_{10}\text{H}_8\text{O}$. Kanariengelbe Prismen aus Bzl., F. 68°. — Verbb. des Dianisalacetons. Mit Resorcin, $\text{C}_{17}\text{H}_{14}\text{O}$, $2\text{C}_6\text{H}_6\text{O}_2$. In Eg. Orangefarbene Prismen, F. 88—90°. — Mit α -Naphthol, $\text{C}_{17}\text{H}_{14}\text{O}$, $3\text{C}_{10}\text{H}_8\text{O}$. In Toluol. Orangefarbene Nadeln, F. 69° (vgl. K. H. MEYER).

II. 1.

Ber. Dtsch. Chem. Ges. **43**. 163 [1910]. — Mit β -Naphthol. $2C_{19}H_{18}O_3$, $3C_{10}H_8O$. Gelbe Nadelchen aus Toluol, F. 73—74°. — Verbb. des Perchlorind. (Dieses bildet goldgelbe Blättchen aus Eg., F. 151—152°.) Mit Acenaphth. C_9Cl_6O , $C_{12}H_{10}$. In Eg. Orangefarbene Nadeln, F. 132—133°. — Mit Fluor. C_9Cl_6O , $C_{13}H_{10}$. In Eg. Orangefarbene Nadeln, F. 100—102°. — Mit D. C_9Cl_6O , $C_{10}H_{14}$. In Eg. Goldgelbe Nadeln, F. 70—71° (Zers.). — Mit Sk. C_9Cl_6O , C_9H_9N . In Eg. Mkr. rotbraune Prismen, F. 119—121°. — Mit α -Naph. 1. C_9Cl_6O , $C_{10}H_8O$, $\frac{1}{2}C_6H_6$. In Bzl. Mkr. dunkelrote Kryställchen 2. C_9Cl_6O , $C_{10}H_8O$, $\frac{1}{2}C_2H_4O_2$. In Eg. Rote Prismen, F. 108—109°. — Mit β -Naphthol. C_9Cl_6O , $C_{10}H_8O$, $\frac{1}{2}C_6H_6$. In Bzl. Mkr. orangefarbene Kryställchen, F. 88—91°. — Mit α -Naph. methyläther. C_9Cl_6O , $C_{11}H_{10}O$. Braungelbe Nadeln, F. 100—103°. — Für die Lsg. der EE. wird ein einfacher App. angegeben. Die Ergebnisse sind in Kurzt. tabeln wiedergegeben. (LIEBIGS Ann. **440**. 241—64. 1924.) LINDENBAU.

Paul Pfeiffer, *Molekülverbindungen der aromatischen Aminoketone*. (Experimentell bearbeitet von F. Goebel und Olga Angern.) (Vgl. vorst. Ref.) Vf. hat die Schmelzkurven folgender Aminoketone mit benzoiden Substanzen aufgenommen: *p*-Dimethylaminobenzophenon (I), Michlers Keton (II), *p*-Dimethylaminobenzalacetophenon (III), *p*-Dimethylaminobenzal-*p*-methoxyacetophenon (IV), *p,p'*-Tetramethylaminodibenzalacetone (V). Ausgeprägte Maxima, die auf homogen schm. Verb. hindeuteten, zeigten nur die Kurven von II mit Resorcin u. IV mit α -Naphthol deutliche Knicke, die auf inhomogen schm. Verb. wiesen, besaßen die Kurven von II mit den Naphtholen. Diese Verb. konnten dargestellt werden, außerdem noch eine solche von V mit Resorcin, obwohl hier die EE. der sirupartigen Schmelzen wegen nicht zu bestimmen waren.

Zur Entscheidung der Frage, ob sich die neuen Molekülverb. ebenfalls mit Chinhydronen eng anschließen, wurden die Lösungsfarben der Aminoketone in Bzl., Anisol, Guajacol, Anilin u. Dimethylanilin miteinander verglichen u. — abweichend von den Chinonen — hinsichtlich der Farbvertiefung (von farblos bis rot) folgende Reihenfolge festgestellt: Bzl. (Anisol) $\rightarrow$ Dimethylanilin $\rightarrow$ Anilin $\rightarrow$ Guajacol. Die Lsgg. in Dimethylanilin, das mit Chinonen die tiefsten Färbungen gibt, sind kaum farbiger als die in Bzl. Vf. nimmt daher einen konstitutionellen Unterschied zwischen den Chinhydronen u. den Molekülverb. der Aminoketone dahingehend an, daß die Phenol- bzw. Anilinkomponenten (Verb. mit letzteren sind bis jetzt nur in Lsg. bekannt) bei diesen nicht mit den ungesätt. Ring-C-Atomen sondern mit den Hydroxyl- bzw. Amin-H-Atomen an das Aminoketon gebunden sind. Dafür spricht, daß sich die Aminoketone (den Farbrkk. nach) nicht direkt mit KW-stoffen, Phenoläthern u. tert. Aminen verbinden, dagegen unter Farbvertiefung in Alkoholen (nicht in Ä.) lösen. Aus der tiefen Färbung der Molekülverb. muß weiter geschlossen werden, daß der Carbonyl-O der Aminoketone die Bindung vermittelt u. nicht etwa die $N(CH_3)_2$ -Gruppe. Dafür sprechen auch die Aminoketone auch mit organ. Säuren stark gefärbte halochrome Aldehyde bilden (z. B. $CO(CH:CH \cdot C_6H_4 \cdot N(CH_3)_2)_2$, $C_2H_4O_2$, dunkelrote Blättchen). — Vf. ist übrigens der Ansicht, daß die Chinhydronen u. die Phenolverb. der Aminoketone nicht scharf voneinander zu trennen sind, sondern die äußersten Glieder einer Reihe bilden, die durch zahlreiche Übergangsglieder verbunden sind.

Hinsichtlich der Lokalisation der Nebenvalenzkräfte (vgl. Ztschr. f. anorg. allg. Ch. **137**. 275; C. **1924**. II. 1425) ist neu, daß sich der Hydroxyl-H der Alkohole an den Carbonyl-O der Aminoketone anzulagern vermag, wobei die Farbtiefe der Lsgg. wesentlich von der Natur des Alkohols abhängt. Die tiefste Färbung (blau-rot) gibt Allylalkohol, dann folgen Benzylalkohol, gesätt. prim. u. sek. Alkohole (abnehmend mit der Größe des Mol.-Gew.), tert. Alkohole (gelb). Vielleicht kann man die Farbtiefe als Maßstab für die Affinität der Alkohole zu den Ketone an-

n. — Noch ausgeprägter kommt die Nebenvaleanzkraft des Hydroxyl-H bei den Phenolen in den intensiv gefärbten Lsgg. mit Aminoketonen zum Ausdruck, derart, daß sich mittels letzterer Phenole in Phenoläthern nachweisen lassen. Gut geeignet sind die Ketone II u. V. — Überraschend ist, daß sich auch die an N gebundenen H-Atome arom. Amine als additionsfähig erwiesen haben, während sich in NH_3 u. aliph. Aminen indifferent verhalten. Zu erklären ist dies mit der relativ großen Beanspruchung der N-Affinität durch den arom. Rest.

Versuche. Verbb. des p,p'-Tetramethyldiaminobenzophenons. Mit p-Tol. $\text{C}_{17}\text{H}_{20}\text{ON}_2$, $\text{C}_6\text{H}_5\text{O}_2$. In Bzl. Citronengelbe Nadeln, F. 127—128°. — β -Naphthol. $\text{C}_{17}\text{H}_{20}\text{ON}_2$, $\text{C}_{10}\text{H}_8\text{O}$. Citronengelbe Krystalle aus Eg., F. 87—88°. — Mit β -Naphthol. $\text{C}_{17}\text{H}_{20}\text{ON}_2$, $\text{C}_{10}\text{H}_8\text{O}$. In Bzl. Grünstichig gelbe Prismen, F. 96—107° (Zers.). — p-Dimethylaminobenzal-p-methoxyacetophenon- α -Naphthol, $\text{C}_{21}\text{H}_{24}\text{ON}_2$, $\text{C}_{10}\text{H}_8\text{O}$. Orangefarbene Kryställchen aus Toluol, F. ca. 80°. — p,p'-Tetramethyldiaminodibenzalacetone-Resorcin, $2\text{C}_{21}\text{H}_{24}\text{ON}_2$, $\text{C}_6\text{H}_6\text{O}_2$. In Bzl. Dunkle, grünstichige Nadeln, F. 105—107°. — Hinsichtlich der EE. (Kurvetafeln) sei auf das oben verwiesen. (LIEBIGS Ann. 440. 265—89. 1924. Bonn, Univ.) LINDENBAUM. S. A. Mahood und C. R. Harris, Die Chemie des Furfurals. Die Darstellung von Furananalogen des Benzoflavins oder Dimethyldiaminofurylacridinchlorhydrats. Dimethyldiaminoditolylfurylmethan. Das Sulfat des m-Toluylendiamins wurde mit Furfurol 10%ig. A. gekocht, nach beendeter Rk. der A. abdest. u. die Ausscheidung abfiltriert. Das rohe Sulfat wurde durch Erhitzen mit 6-n. HCl im Rohr in Dihydrodimethyldiaminodimethyldiaminofurylacridin verwandelt, dieses in eisalter salzsaurer Lsg. mit FeCl_3 in das Chlorzinksalz des Dimethyldiaminofurylacridins, das durch mehrfache Fällung der Lsg. in h. W. mit verd. HCl gereinigt wurde. Die Zus. schwankt mit dem HCl -Gehalt je nach Anzahl dieser Umfällungen u. der Menge des dazu verwendeten W., entspricht annähernd $3\text{C}_{19}\text{H}_{18}\text{ON}_2 \cdot 3\text{HCl} \cdot \text{ZnCl}_2$. Der sehr echte Farbton auf ungebeizter Baumwolle stumpfbraun, auf Wolle, Seide u. Viscoseseide dunkelbraun, ist ll. in h. W., in Anilin u. Chinolin, wl. in 95%ig. A., unl. in Bzl., Benzol, Ä., Essigester, PAe., CS_2 , CCl_4 u. CHCl_3 . (Journ. Americ. Chem. Soc. 46. 1—13. 1924. New Orleans [Louisiana], Tulane Univ.) SPIEGEL.

A. Terentjew und W. Tschelinzew, Über die Bromierung und Jodierung von Pyrrol-derivaten. α -Pyrrolaldehyd, $\text{C}_4\text{H}_4\text{N} \cdot \text{CHO}$. Bromierung in k. PAe. unter lebhafter Rk. zu einem an Luft äußerst unbeständigen Prod., F. ca. 100°. (Anscheinend Gemisch von Mono- u. Dibromderiv. Nach Bromierung in wss. Lsg. gelang schließlich aus dem gleichfalls sehr unbeständigen Prod. durch Umfällung in wss. Lsg. die Gewinnung von Dibrommaleinimid. Wurde in sehr verd. Lsg. bromiert, so können Zwischenprodd. dieser Rk. beobachtet werden. Bei Ausfällen mit Ä. äußerst unbeständige, an Luft stark rauchende Substanz, F. 102°; bei weiterem Bromieren beständige gelbe Krystalle, annähernd von der Zus. des α -Pyrrolaldehyds, $\text{C}_4\text{H}_4\text{ONBr}_2$, F. 146—147°. Die Bromierung dürfte sich zu Gunsten gegen die β -Stellung richten u. die CHO-Gruppe noch unberührt lassen. — Jodierung. Zu 0,5 g des Aldehyds, gel. in 1 l W., wurden 10 ccm 5%ig. KOH gegeben, dann J-KJ-Lsg. (ca. 0,7 g in 100 ccm) bis zu schwacher Gelbfärbung. Bei Anwesenheit von Jodabscheidung feiner Nadeln, durch Zusatz von Essigsäure oder H_2SO_4 wird die Jodierung von α -Pyrrolaldehyd, $\text{C}_4\text{H}_4\text{ONJ}_2$, F. 137°. — Jodierung von α -Acetylpyrrol verläuft analog der vorigen. β , β' -Dijod- α -acetylpyrrol, $\text{C}_6\text{H}_5\text{ONJ}_2$, weißlich (aus h. verd. A.), F. 157°, ll. in Ä., A., Bzl. u. Essigsäure, wl. in W., Lg. in Ä., l. in Laugen, daraus durch Säuren gefällt. Die Oxydation dieser Verb. mit HNO_3 (D. 1,48) lieferte Dijodmaleinimid, $\text{C}_4\text{HO}_2\text{NJ}_2$, Nadeln (aus A.), F. 255°, wl. in k. A. — Jodierung von α -Propionylpyrrol lieferte ebenfalls das ebenfalls zu Dijodmaleinimid oxydierbare β , β' -Dijodpropionylpyrrol, $\text{C}_6\text{H}_5\text{ONJ}_2$, Nadeln (aus A.), F. 148°, in Aussehen u. Löslichkeit der Acetylverb.

sehr ähnlich, bei Ausführung in konzentrierteren Lsgg. mit Überschuß an J u. Halogen *Trijod- α -propionylpyrrol*, $C_7H_6ONJ_3$, silberglänzende, an Luft lang gelb werdende Schuppen, F. 193°. — Jodierung von α -Benzoylpyrrol je nach Menge des J u. Temp. zu verschiedenen Prodd., die schwierig zu trennen sind. Zunächst scheinen Monojodderiv. zu entstehen, die aber nicht rein zu scheiden werden konnten. Bei 70—75° entstand meist *Dijodbenzoylpyrrol*, $C_{11}H_7O_2N_2J_2$, F. 168—169°, durch Krystallisation aus A. von höher schm. Prodd. trennbar. Weiterer Behandlung mit J u. Erwärmen auf 50° *Trijodbenzoylpyrrol*, $C_{11}H_7O_2N_2J_3$, grünlich, aus Bzl. + PAe. krystallisierbar, F. 215°. Dieses liefert mit rauchendem HNO_3 eine hellgelbe Substanz vom F. 195°, anscheinend β -Nitro- β' -jodpyrrol. Analogien wird dem Dijodbenzoylpyrrol die Formel des β, β' -Dijodderiv. zugeschrieben. — Verss. an α -Pyrrolcarbonsäure u. ihrem Äthylester sind noch nicht abgeschlossen. Die jetzige Veröffentlichung ist durch das C.-Referat über diejenige von PIERCE (Atti R. Accad. dei Lincei, Roma [5] **31**. I. 321; C. 1923. I. 665) veranlaßt. Dtsch. Chem. Ges. **58**. 66—71. Moskau, I. Univ.) SPIEGEL.

Frank Lee Pyman und **Edmund Stanley**, *Substitution im Benzolkern bei der Nitrierung von 2-Phenylglyoxalin und seiner Carbonsäuren*. Die Einführung der Nitrogruppe in 2-Phenylglyoxalin nach der Methode von GRANT u. PYMAN (Journ. Chem. Soc. London **119**. 1893; C. 1922. I. 813) führte neben teilweiser Oxydation zu Benzoesäure, wodurch die Ausbeuten verringert wurden, hauptsächlich zu 2-*p*-Nitrophenylglyoxalin (50%) u. den entsprechenden *o*- u. *m*-Verbb. (5% u. 0,2%). Die Nachprüfung der Zus. des Nitrierungsprod. der 2-Phenylglyoxalin-4,5-dicarbonsäure von FARGHER (vgl. Journ. Chem. Soc. London **119**. 163; C. 1922. I. 998) ergab die von letzterem als 2-*m*-Nitrophenylglyoxalin-4,5-dicarbonsäure bezeichnete Säure als ein Gemisch von **I** (52%) mit dem *p*-Isomeren (19%), wofür die Decarboxylierung erkennen ließ. Durch Nitrierung von 2-Phenylglyoxalin (oder 5)-carbonsäure wurde 2-*p*-Nitrophenylglyoxalin-4 (oder 5)-carbonsäure (**II**) erhalten. Die Decarboxylierung liefert 52% des 2-*p*-Nitrophenylglyoxalins u. 9% des *m*-Verb.



Die Einführung von Carboxylgruppen in den Glyoxalinkern von 2-Phenylglyoxalin setzt also den Anteil der *p*-Nitrierung zugunsten der in *m*-Stellung liegenden Vff. bringen dies in Zusammenhang mit der Fähigkeit des 2-Phenylglyoxalins, seiner Monocarbonsäure mit Mineralsäuren Salze zu bilden, während die Dicarbonsäure dies nicht tut. Die vorherrschende *m*-Substitution im letzteren Falle ist wohl mit der negativen Polarität der doppelt gebundenen N-Atome zusammenhängend, die bevorzugte *p*- bzw. *o*-Substitution im ersteren Falle mit dem Umstand, daß der N in diesen Verbb. durch Salzbildung positiv geladen wird. Vff. bestätigen die Auffassung von FARGHER (l. c.), welcher die Metasubstitution mit dem vorherrschend negativen Charakter der Glyoxalindicarbonsäuren begründet hat.

Versuchssteil: 2-*p*-Nitrophenylglyoxalin, $C_9H_7O_2N_3$, aus A. gelbe Nadeln vom F. 310—315° (Zers.). — *Nitrat*, aus W. gelbbraune Prismen (mit $2H_2O$), F. 171° (Zers.). — *Pikrat*, aus h. A. gelbe Nadeln vom F. 262°. — 2-*m*-Nitrophenylglyoxalin, aus h. W. oder A. schwachgelbe Nadeln vom F. 193—194°. — *Nitrat*, aus W. strohgelben Blättchen vom F. 182° (Zers.). — *Pikrat*, aus W. gelbe Nadeln vom F. 245—246°. — 2-*o*-Nitrophenylglyoxalin, aus W. fast farblose Blättchen vom F. 188—189°. — *Nitrat*, aus W. fast farblose Prismen vom F. 153—154°. — *Pikrat*, aus W. lange gelbe Nadeln vom F. 212°. Die 3 isomeren 2-Nitrophenylglyoxaline sind in wss. NH_3 u. Na_2CO_3 unl., dagegen l. in verd. NaOH mit orangefarbener Färbung.


or Farbe, deren Intensität entspricht $p > o > m$. — *2-p-Nitrophenylglyoxalin-carbonsäure*, $C_{10}H_7O_4N_3$, gelbe Nadeln, wl. in W. F. 288° u. nach Wiedererstarrung 08°. Erhitzen mit W. bei 200° lieferte *2-p-Nitrophenylglyoxalin*. — *Sulfat*, Nadeln vom F. 286° (Zers.). — *2-m-Nitrophenylglyoxalin-4-carbonsäure*, farblose Nadeln, wl. in W., F. 248°. — *Sulfat*, strohgelbe Blättchen (Zers. 230°). — Die Carboxylierung der 3 Isomeren wurde durch Kochen mit W. bei 240° (6 Stdn.) durchgeführt. — *2-m-Nitrophenylglyoxalin-4,5-dicarbonsäure*, $C_{11}H_7O_6N_3$, aus W. strohgelbe Nadeln vom F. 279°. Erhitzen mit 10 Teilen W. bei 200° (6 Stdn.) entcarboxyliert zur *m*-Verb. u. *p*-Verb., wodurch die entsprechende Dicarbonsäure als Gemisch von *m*- u. *p*-Verb. erkannt war. (Journ. Chem. Soc. London 125. 2484, 2488. 1924. Manchester, Univ.)

HORST.

K. v. Auwers, Th. Bahr und E. Frese, Über Tetrahydrobenzisoxazole. Durch Einwirkung von salzsaurem Hydroxylamin auf eine wss. oder alkoh. Lsg. von *Oxy-methylecyclohexanon* entsteht ein Gemisch von α, β -Tetrahydrobenzisoxazol (*Tetrahydroindoxazen*, I) u. β, γ -Tetrahydrobenzisoxazol (*Tetrahydroanthranil* II) u. zwar erhalten 75–80% I u. 25–20% II; bei Anwesenheit überschüssiger HCl wird die Ausbeute an I auf 85% erhöht. Beim Arbeiten in alkal. Lsg. wird II reichlich gebildet, es entstehen jedoch, da bereits gebildetes Isoxazol in *Cyanecyclohexanon* verwandelt wird, das seinerseits mit NH_2OH reagiert, in diesem Falle auch noch andere Prodd. Das als Zwischenprod. zu erwartende Oxim des Oxymethylecyclohexanons konnte in keinem Falle isoliert werden, es geht anscheinend unter Abspaltung von H_2O sogleich in das Isoxazol über. — Einw. von NH_2OH , HCl auf *Methyloxymethylecyclohexanon* (III) führt zu einem Gemisch von ca. 7–8 Teilen I u. 1 Teil V; in schwach alkal. Lsg. sinkt die Gesamtausbeute, das Gemisch enthält ca. 5 Teile IV u. 1 Teil V; in 30%ig. Lauge wird 1 Teil V u. 3 Teile IV gebildet, die Gesamtausbeute beträgt in diesem Falle nur 25% (in den vorigen 80–70%), da ein Teil des Isoxazols durch Alkali in Cyanketon gespalten wird, andererseits III in 1-Methylecyclohexanon zerfällt, dessen Oxim gebildet wird. — Einw. von NH_2OH , HCl in sodaalkal. Lsg. auf den Äthyläther von III führte zu dem Oxim der freien Verb. III (VIII oder IX), indem durch Anlagerung von NH_2OH an die Doppelbindung in III zunächst wohl VI entsteht, das durch Abspaltung von C_2H_5OH VII liefert, das sich sofort in VIII oder IX umlagert. (Vgl. Beobachtungen deuten darauf hin, daß das Oxim ein Gemisch von VIII und IX ist. — Wird III in neutraler Lsg. mit NH_2OH behandelt, so erhält man ein Oxim, das bei der Abspaltung von H_2O IV liefert; die Leichtigkeit mit der die Wasserabspaltung erfolgt (zum Teil schon beim Umkrystallisieren aus Bzn.) spricht für Konst. IX. — Die Isolierung von I u. II aus dem Gemisch gelang nicht. II konnte nur dadurch erhalten werden, daß I mittels C_2H_5ONa zum *Cyanecyclohexanon* aufgespalten wurde. I konnte nur in angereichertem Zustande untereignet werden. Die Trennung von IV u. V wurde dadurch begünstigt, daß IV mit $HgCl_2$ eine wl. Doppelverb. gibt; zur Isolierung von V mußte IV wieder durch C_2H_5ONa zerstört werden. — Die hydrierten Benzisoxazole sind sehr schwache Basen. Die Verbb. vom Typus I u. IV werden in äth. Lsg. schon bei gewöhnlicher Temp. durch CH_3ONa gespalten, es entsteht das Na-Salz der Enolform des entsprechenden Cyanketons (X); beim Erwärmen der Verbb. mit alkoh. Lauge wird das Cyanketon gespalten, es entsteht das *Halbnitril* der *Pimelinsäure* (XI), bei weiterem Kochen ein Salz der *Pimelinsäure* (XII). Die Verbb. II u. V sind gegen Alkali unbeständiger. Mit alkoh. NaOH wird erst bei 50° NH_3 entwickelt, bei weiterem Kochen entsteht auch hier *Pimelinsäure*. — Über die spektr. Unters. der hydrierten Isoxazole vgl. v. AUWERS, Ber. Dtsch. Chem. Ges. 57. 461; C. 1924. 25.

Versuche. α, β - u. β, γ -Tetrahydrobenzisoxazol, C_7H_9ON (I u. II), 63 g Oxy-


methylencyclohexanon in A. + konz. wss. Lsg. von NH_2OH , HCl (bei 7° gemischt bleiben stehen, bis keine Rk. mit FeCl_3 mehr eintritt. Kp_{14} des Gemisches 90–95°. — Ein 90%ig. Präparat von I hatte Kp_{13} 90–92°, HgCl_2 -Doppelverb. F. 135°. Zur Isolierung von II wird äth. Lsg. des Gemisches allmählich mit CH_3 oder $\text{C}_2\text{H}_5\text{ONa}$ versetzt (Temp. nicht über 20–25° steigen lassen), wobei Abscheidung von X, Filtrat, das II enthält, wird wiederholt mit W. durchgeschüttelt, teilweise eingedampft u. mit Ä. extrahiert; um II ganz rein zu erhalten, muß Behandlung mit Alkoholat öfter wiederholt werden; Kp_{14} 87–88°, D_{20}^{20} 1,051, $n_{\text{He}}^{20} = 1,4983$ (vgl. auch l. c.). — α, β - u. β, γ -Methyltetrahydrobenzisoxazol, $\text{C}_8\text{H}_{11}\text{ON}$ (IV u. V.), das in alkoh.-salzsaurem Lsg. dargestellte Gemisch hatte Kp_{10} 86–



beim Arbeiten in 30%ig. NaOH (das Gemisch bleibt 3–4 Tage stehen) wird isoliert: 1-Methylcyclohexanon, Semicarbazon F. 189–190°, Oxim des Methylcyclohexanons, Kp_{15} 108–110° u. Gemisch aus 3 Teilen IV + 1 Teil V, Kp_{11} 86–90°, ein α -Aminoderiv. von V (vgl. nachsteh. Ref.). — HgCl_2 -Verb. des α, β -[1'-Methyltetrahydrobenzisoxazols, $(\text{C}_8\text{H}_{11}\text{ON})_2 \cdot \text{HgCl}_2$, aus dem Gemisch in A. + alkoh. FeCl_3 Prismen, die anscheinend $1\text{H}_2\text{O}$ enthalten, F. 66°, unl. in W. u. Bzn., sonstl. organ. Mitteln; hieraus durch Erwärmen mit HCl , Alkalisieren mit $\text{Na}_2\text{C}_2\text{O}_4$, Wasserdampfdest. IV, Kp_{11} 85–86°, D_{20}^{20} 1,059, $n_{\text{He}}^{20} = 1,4917$. — Behandlung des Gemisches mit Alkoholat führt zu β, γ -[1'-Methyltetrahydrobenzisoxazol, $\text{C}_8\text{H}_{11}\text{ON}$ (V), Kp_{10} 90–91°, D_{20}^{20} 1,051, $n_{\text{He}}^{20} = 1,4880$. — Oxim des 3-Methyl-2-ketocyclohexanonformaldehyds (VIII) oder des 3-Methyl-2-oxycyclohexen-(1)-formaldehyds, $\text{C}_8\text{H}_{11}\text{O}_2$ (IX). zähfl. Öl, Kp_{11} 140–144°, wenn aus dem Äthyläther von III dargestellt oder aus III dargestelltes Oxim F. 66–68°; Dibenzoylderiv. des Oxims, $\text{C}_{22}\text{H}_{21}\text{O}_4\text{N}$, zähfl. Öl, F. 66–68°; — α -Methylpimelinsäure aus IV oder V durch mehrtägiges Kochen mit 2%ig. alkoh. NaOH , F. 55–57°. (LIEBIGS Ann. 441. 54–67.) HABERLAND.

K. v. Auwers, Th. Bahr und E. Frese, Über Cyancyclohexanone und einige ihrer Umwandlungsprodukte. (Vgl. vorst. Ref.) Die in vorst. Ref. erwähnten Verbindungen a) 1-Cyancyclohexanon-2 u. b) dessen 3-Methylderiv. sind Gemische der Keto-Enolform, u. zwar enthält ersteres ca. 10,5%, letzteres nur 1,7% Enol. Alkylierung von a mit Halogenalkylen u. Na-Alkoholat führt zu einem Gemisch von O-Alkylderiv. (I u. II). Werden die Cyancyclohexanone in Abwesenheit von Alkali mit NH_2OH behandelt, so entstehen die Oxime (aus a z. B. III), die sich

längerem Stehen oder durch Schütteln mit Alkali (auch bei Darst. der Oxime
 g. w. von Alkali) leicht in alkalisch. bas. Verbb. überführen lassen. Dieselben
 Prodd. werden gebildet, wenn die *Oxymethylenderivv. der Cyclohexanone* mit
 OH u. Alkali im Überschuß behandelt werden (vgl. vorst. Ref.). Von den
 für die bas. Verbb. in Betracht kommenden Formeln (IV u. V) ist auf
 des chem. Verh. V vorzuziehen: die bas. Derivv. reagieren mit p-Nitrobenz-
 yd unter Abspaltung von H_2O , beim Erhitzen mit CH_3Br werden 2 CH_3 -
 aufgenommen u. ihre Monoacylderivv. sind so stark sauer, daß sie ll. in
 Lauge sind. Die in 1 alkylierten Oxime der Cyancyclohexanone erleiden
 Umlagerung nicht. — Einleiten von NH_3 in eine äth. Lsg. von a u. Auf-
 schmelzen des Reaktionsprod. mit W. führt zu *Cyanaminocyclohexenen*, die wieder
 zwei Formen (VIIa u. b) reagieren. Aus 3-Methylcyancyclohexanon entstehen
 die homologen Derivv. Die B. von VII erfolgt wahrscheinlich über die
 Anlagerung von NH_3 an a zunächst gebildete Verb. VI; dieses Zwischen-
 ist darstellbar, ist jedoch sehr unbeständig. — Einw. von Semicarbazid auf
 n. zum Semicarbazon, mit b bildet sich in diesem Falle das *Aminopyrazol*-
 VIII, das beim Kochen mit konz. HCl oder Laugen in 7-Methyl-3-amino-
 5,7-tetrahydroindazol (IX) übergeht. Beim Erwärmen mit verd. Säure (HCl,
 H_2O_2 , $C_2O_4H_2$) entsteht eine als 3,3'-Di-(7-methyl-4,5,6,7-tetrahydroindazol) (X)
 fassende Verb. Dieses Prod. bildet sich neben Hydrazodicarbonamid auch
 bei Behandeln von b mit essigsauerm Semicarbazid, u. zwar bildet sich in diesem
 wohl zunächst das Semicarbazon von b, aus 2 Mol. werden die $NHCONH_2$ -
 abgespalten u. bilden Hydrazodicarbonamid, die restlichen Radikale ver-
 einigen sich zu X. Da für diese Verb. eventuell auch Konst. XI in Frage kam,
 wurde versucht, die Konst. durch Synthese sicherzustellen. Es wurde das Ag-Salz
 3-Methyltetrahydroindazols mit Br_2 behandelt, u. das (neben halogenhaltiger
 erhaltene 2,2'-Di-(7-methyl-4,5,6,7-tetrahydroindazol) (XI) erwies sich als
 verschieden von der aus b u. essigsauerm Semicarbazid erhaltenen Verb. — IX
 geht auch bei Einw. von Hydrazin auf b. Das chem. Verh. von IX deutet



darauf hin, daß nur die Aminoverb. (nicht ein Iminoderiv.) vorliegt (vgl. dages. v. MEYER, Journ. f. prakt. Ch. **90**, 8 [1914]). Einw. von $K_3Fe(CN)_6$ auf eine Lsg. von IX führt zu 3,3'-Azo-(7-methyltetrahydroindazol) (XII), aus dem mit $SnCl_2 + HCl$ IX zurückgewonnen wird. Durch Diazotieren von IX in sehr saurer Lsg. entsteht eine Verb., die wahrscheinlich (vgl. BAMBERGER u. W. Ber. Dtsch. Chem. Ges. **39**, 4276 [1906]) als ein Diazohydroxyd (XIII) aufzufassen ist, das leicht unter Abspaltung von H_2O in 7-Methyltetrahydroindazoltriazolen (XIV) übergeht. Letztere Verb. geht beim Lösen in konz. HCl in ein Diazoniumsalz über, das mit β -Naphthol kuppelt (XV). Wird IX in stark saurer Lsg. diaziiert u. die Lsg. mit β -Naphthol versetzt, so bildet sich ebenfalls XV, dessen azob. Lsg. beim Eindampfen das Triazinderiv. (XVI) bildet.

Versuche. 1-Cyancyclohexanon-2, C_7H_9ON , das in vorst. Ref. aus Oxymethylen-cyclohexanon + NH_2OH beschriebene Isoxazolgemisch bleibt 12 Std. mit verd. Alkoholat + Ä. stehen, danach Na-Salz in W. gel., wss. Schicht nach Durchschütteln mit Ä. angesäuert u. ausfallendes Cyanketon in Ä. gel.; Kp_{10} 136°, $D_{15,9}^{20}$ 1,0741, D_{20}^{20} 1,070, $n_D^{20} = 1,47689$, $n_{He}^{20} = 1,47932$, $n_B^{20} = 1,4821$, $n_Y^{20} = 1,49156$ bei 15,0°, $n_{He}^{20} = 1,4775$; nach 1–2-tägigem Stehen Gelbfärbung u. süßlicher unangenehmer Geruch, bei längerem Stehen (rascher in alkal. Lsg.) in einer festen, weißen Substanz, unl. in Alkali; Na-Salz in festem Zustande beständig. — Oxim des Cyancyclohexanons, $C_7H_{10}ON_2$, aus A. flache Nadeln, F. 117–118,5°, wsl. in A., k. W.; p-Nitrophenylhydrazon, $C_{13}H_{14}O_2N_4$, aus A. gelbe Nadelchen, F. 163–164°. — Semicarbazon, $C_8H_{12}ON_4$, aus A. weiße Nadeln, F. 165°. — 3,3'-Ditetrahydroindazol, $C_{14}H_{18}N_4$, durch 1-std. Erhitzen des Semicarbazons mit 15%ig. HCl oder C_2H_5OH u. Zusatz von NH_4OH ; aus CH_3OH Nadeln, F. 265–266°, wsl. in Bzn., Bzl., W., ll. in Säuren; Pikrat aus A. gelbe Nadelchen, F. 237–238°. — 3-Methyl-1-cyancyclohexanon-2, $C_8H_{11}ON$, Kp_{11} 127–129°, Kp_{18} 138–140°, D_{20}^{20} 1,040, D_{15}^{20} 1,0443, $n_D^{20} = 1,47084$, $n_{He}^{20} = 1,47305$, $n_B^{20} = 1,47969$, $n_Y^{20} = 1,48479$ bei 15,0°, $n_{He}^{20} = 1,4710$; Oxim, $C_8H_{12}ON_2$, F. 115–116°, unl. in Bzn., W. u. verd. Säuren, sonst ll., verändert sich bei längerem Aufbewahren. — 7-Methyl-3-amino-4,5,6,7-tetrahydroindazolcarbonamid, $C_9H_{14}ON_4$ (VIII), aus CH_3OH Schuppen, F. 142, b. 143,5°, ll. in A., Aceton, Eg. u. verd. Säuren, wsl. in CH_3OH u. Bzl., unl. in Ä., Bzn., W. u. Laugen. — 1-Methyl-1-cyancyclohexanon-2, $C_8H_{11}ON$ (I, R = H), farbloses, campherartig riechendes Öl, Kp_{13} 94°, $D_{16,1}^{20}$ 1,0189, D_{20}^{20} 1,015, $n_D^{20} = 1,45976$, $n_{He}^{20} = 1,46239$, $n_B^{20} = 1,46820$, $n_Y^{20} = 1,47341$, $n_{He}^{20} = 1,4606$; Semicarbazon, $C_9H_{14}ON_4$, aus A. weiße Nadeln, F. 206–207°, eignet sich gut zur Trennung von gleichzeitig gebildetem II; Oxim, $C_8H_{12}ON_2$, aus h. W. weiße Nadeln, F. 137–138°, unl. in PAe., sonst ll. — 2-Cyanoenanthylsäure, $C_8H_{13}O_2N$, durch Schütteln von 1-Methyleyancyclohexanon mit 10%ig. NaOH, schwerfl. Öl, von starkem Geruch, Kp_{14} 183–184°, D_{17}^{20} 1,0250; D_{20}^{20} 1,022; $n_D^{17} = 1,44686$, $n_{He}^{20} = 1,44940$, $n_B^{20} = 1,45495$, $n_Y^{20} = 1,45968$, $n_{He}^{20} = 1,4481$. — 1-Äthyl-1-cyancyclohexanon-2, $C_9H_{11}ON$ (I, R = C_2H_5), Kp_{15} 114–115°, Kp_{25} 129°, $D_{13,6}^{20}$ 1,0136, D_{20}^{20} 1,008, $n_D^{20} = 1,46619$, $n_{He}^{20} = 1,46851$, $n_B^{20} = 1,47476$, $n_Y^{20} = 1,47980$, $n_{He}^{20} = 1,4656$; Semicarbazon, $C_{10}H_{16}ON_4$, aus A. weiße Nadeln, F. 195°, wsl. in Ä. u. Bzn., wsl. in B., in A. u. CH_3OH ; Oxim, $C_9H_{14}ON_2$, aus h. W. weiße Nadeln, F. 117°. — 1-Cyano-2-äthoxy-cyclohexen-1, $C_9H_{13}ON$ (II, R = C_2H_5), Kp_{16} 133–135°, Kp_{24} 142–145°, $D_{13,3}^{20}$ 1,0270, D_{20}^{20} 1,021, $n_D^{13,3}$ 1,49404, $n_{He}^{20} = 1,49741$, $n_B^{20} = 1,50702$, $n_Y^{20} = 1,51511$; $n_{He}^{20} = 1,4944$ (andere Werte vgl. Original); wird durch sd. 10%ige H_2SO_4 zu Cyancyclohexanon verseift. — 1-Propyl-1-cyancyclohexanon-2, $C_{10}H_{13}ON$ (I, R = C_3H_7), campherartig riechendes Öl, Kp_{13} 122°, D_{20}^{20} 0,9968; D_{20}^{20} 0,978, $n_D^{20,1} = 1,46459$, $n_{He}^{20} = 1,46721$, $n_B^{20} = 1,47320$, $n_Y^{20} = 1,47836$, $n_{He}^{20} = 1,473$; Semicarbazon, $C_{11}H_{18}ON_4$, aus A. weiße Nadeln, F. 212–213°, l. in A., sonst v. i.







Mitteln. — *1-Cyan-2-propoxycyclohexen-1*, $C_{10}H_{15}ON$ (II, $R = C_3H_7$), Kp_{13} 137°⁹, $D_{20}^{21.2}$ 0,9897, D_{20}^{20} 0,991, $n_D^{21.2} = 1,48676$, $n_{He} = 1,49053$, $n_B = 1,49957$; $n_D = 1,4911$. — *1-Allyl-1-cyancyclohexanon-2*, $C_{10}H_{13}ON$ (I, $R = CH_2 : CH \cdot CH_2$), schwach campherartig, Kp_{13} 120—121°⁰, $D_{20}^{18.6}$ 1,0179; D_{20}^{20} 1,017; $n_D^{18.6} = 1,472$, $n_{He} = 1,48147$, $n_B = 1,48848$, $n_{He}^{20} = 1,4808$; *Semicarbazon*, $C_{11}H_{16}ON_4$, weiße Nadeln, F. 197°⁰. — *1-Benzyl-1-cyancyclohexanon-2*, $C_{14}H_{15}ON$ (I, $R = C_6H_5$), aus Bzl. + PAe. weiße Nadeln, F. 56—57°⁰, ll. in organ. Mitteln; *Semicarbazon*, $C_{15}H_{18}ON_4$, aus A. weiße Nadeln, F. 201°⁰. — α -Amino- β,γ -[tetrahydroisoxazol, $C_7H_{10}ON_2$ (V), aus CH_3OH oder h. W. Nadeln, F. 130°⁰, ll. in Säuren, in H_2O u. A., wl. in Ä., Bzl. u. k. W.; *p-Nitrobenzylidenderiv.*, $C_{14}H_{13}O_3N_3$, gelbe Nadeln, F. 216—217°⁰, l. in A., Eg., Bzl., wl. in Ä. u. Bzn.; *Acetyl-deriv.*, $C_9H_{12}O_2N_2$, aus Ä. derbe Krystalle, F. 82—83°⁰, ll. in organ. Mitteln, unl. in H_2O , l. in NaOH, hieraus bald Abscheidung des Na-Salzes. — α -Dimethylamino- β,γ -[tetrahydrobenz]-isoxazolbromhydrat, $C_9H_{14}ON_2 \cdot HBr$, aus V + CH_3Br in CH_3OH 11-std. Erhitzen auf 100°⁰; aus A. mit Ä. gefällt weiße Nadeln, F. 95—96°⁰, aus Ä. u. PAe., l. in Aceton, Bzn. u. Bzl., ll. in Alkoholen in W.; *freie Base* angenehm riechendes Öl, bei Vakuumdest. Zers.; Pikrat aus A. gelbe Nadeln, F. 150—155°⁰. — α -Amino- β,γ -[1-methyltetrahydrobenz]-isoxazol (entsprechend V), aus α -[1-cyancyclohexanon, klebrige M., F. 66—70°⁰; Chlorhydrat, $C_8H_{13}ON_2Cl$, im Exsiccator über CaO allmähliche Zers., an Luft Braunfärbung; die Base kocht bei längerem Kochen mit NaOH Ammoniak u. verharzt; *p-Nitrobenzylidenderiv.*, $C_{15}H_{15}O_3N_3$, aus Aceton gelbe Nadelchen, F. 215—216°⁰, wl.; *Benzoylderiv.*, $C_{15}H_{16}O_2N_2$, aus CH_3OH Nadeln, F. 95—97°⁰, ll. in A., Bzl., Eg. u. Laugen, Bzn., unl. in W. u. Säuren. — *1-Cyan-2-aminocyclohexen-1*, $C_7H_{10}N_2$ (VIIb), Schmelze von Cyancyclohexanon mit verd. $(NH_4)_2CO_3$ -Lsg. entsteht allmählich feste M., die erneut mit $(NH_4)_2CO_3$ versetzt wird, wenn die Fl. nicht mehr reagiert; aus A. derbe Nadeln, F. 94—95°⁰, ll. in A., Ä., Bzl., l. in h. W., Bzn.; beim Aufbewahren Geruch nach Cyanketon u. Zerfließen; Verreiben mit konz. HCl führt zu einem in W. klar l. Salz, aus der Lsg. scheidet sich bald das Cyanketon ab; Chlorhydrat am besten darstellbar durch Einleiten von HCN in äth. Lsg. der Base; sehr hygroskop., wird durch W. in Keton u. Alk. gespalten; Einw. von Acetylchlorid auf die Base in Pyridin führt zu einer Verbindung mit F. 160—161°⁰, die kein einfaches Acetylderiv. der Base ist. — *1-Cyan-2-aminocyclohexanol-2*, $C_7H_{12}ON_2$ (VI), aus dem Cyanketon in Ä. durch Einleiten von HCN F. 78—79°⁰, ll. in W., A. u. Eg., wl. in Bzl. u. Aceton, unl. in Ä., sehr zerflüchtig. — *1-Cyan-3-methyl-2-aminocyclohexanol-2*, $C_8H_{14}ON_2$, F. 68—70°⁰, zers. sich in Ä. zu *1-Cyan-3-methyl-2-aminocyclohexen-1*, $C_8H_{12}N_2$ (entsprechend VIIb), aus dem Cyanketon in A. + 10%ig. NH_4OH durch 2-tägiges Stehen, F. 87—88°⁰, ll. in Ä., wl. in A., Ä., Eg. u. Bzl., unl. in PAe., Kp_{10} ca. 150°⁰, bei längerem Erhitzen auf 100°⁰ Zers.; $D_{20}^{99.5}$ 0,9704, $n_D^{99.5} = 1,49701$, $n_{He}^{99.5} = 1,50525$; *Benzoylderiv.*, $C_{15}H_{16}ON_2$, aus CH_3OH oder Aceton Nadelchen, F. 201°⁰, ll. in A. u. Eg., in CH_3OH , Aceton u. Bzl., unl. in Ä. u. Bzn., l. in w. Laugen u. Säuren, Bzn. unverändert färbbar. — *7-Methyl-3-amino-4,5,6,7-tetrahydroindazol* (IX), feste M., Kp_{15} ca. 190°⁰, sehr hygroskop., gibt mit $AuCl_3$ krystallin. rotbraunen Niederschlag, Cl_4 gelben, mit $HgCl_2$ u. $AgNO_3$ weiße Ndd.; Pikrat aus A. gelbe Nadelchen, F. 200°⁰, unl. in Bzl., Bzn. u. W.; Chlorhydrat, $C_8H_{14}N_3Cl$, aus Eg. mit Ä. gefällt durch Erhitzen F. 226—228°⁰, bei langsamem Erhitzen F. 223°⁰, ll. in OH-Alk. Mitteln, unl. in Ä., Aceton, Bzl.; *p-Nitrobenzylidenderiv.*, $C_{15}H_{16}O_2N_4$, aus A. gelbe Blättchen, F. 177°⁰, unl. in Bzn.; *Diacylderiv.*, $C_{12}H_{17}O_2N_3$, aus CH_3OH glänzende Nadelchen, F. 122,5—123,5°⁰, l. in organ. Mitteln, h. W. u. verd. Alk.; *Monoacetylderiv.*, $C_{10}H_{15}ON_3$, aus vorigem durch Stehenlassen mit NaOH

oder durch kurzes Kochen mit verd. Essigsäure u. Übersättigen mit NH_4OH CH_3OH F. 212—213° (unter Braunfärbung), unl. in Ä., Bzl., Bzn. u. Laugen, h. W., verd. Säuren, A. u. Aceton; *Dibenzoylderiv.*, $\text{C}_{22}\text{H}_{21}\text{O}_2\text{N}_3$, aus A. Nadeln, F. 194°, unl. in Ä., Bzn., Säuren u. Laugen. — *3,3'-Azo-[7-methyltetrahydroindazoltriazin]*, $\text{C}_{16}\text{H}_{22}\text{N}_6$ (XII), aus salzsaurer Lsg. mit NH_4OH gefällt orangerotes Pulver, l. in Ä., Bzl., Bzn., unl. in CH₃OH, A., Eg. u. Mineralsäuren, wl. in Bzl., Ä. u. Aceton; bei längerem Kochen mit A. Verharzung. — *7-Methyltetrahydroindazoltriazin*, $\text{C}_8\text{H}_{10}\text{N}_4$ (XIV) (Druckfehler im Original), aus salzsaurer Lsg. mit Na-Acetat gelber Nd., F. 137—145° (Zers.), ll. in CH₃OH, A., Ä., Aceton, Eg., wl. in Bzl. u. in Bzn. u. k. NaOH; durch h. NaOH Zers.; beim Kochen der alkoh. Lsg. Zers. Gasentw., beim Erhitzen auf dem Spatel Verpuffen; Lsgg. in Mineralsäuren. — *7-Methyltetrahydroindazolazo-β-naphthol*, $\text{C}_{18}\text{H}_{18}\text{ON}_4$ (XV), aus A. carminfarbene Nadelchen, F. 208°, ll. in Aceton u. Eg., wl. in A. u. Bzl., unl. in Ä. u. Bzn., l. in konz. H_2SO_4 permanganatähnlich, durch W. himbeerrot werdend. — *7-Methyltetrahydroindazolnaphthotriazin*, $\text{C}_{18}\text{H}_{16}\text{N}_4$ (XVI), aus A. goldgelbe Nadeln, l. in Ä., Bzl., Bzn., unl. in verd. Säuren u. Laugen; Lsg. in sd. Eg. mit Zinkstaub versetzt wird farblos, durch Luft-O₂ Zugabe von FeCl_3 u. Durchsaugen von Luft tritt die Färbung wieder ein. — *3,3'-Di-(7-methyl-4,5,6,7-tetrahydroindazolyl)*, $\text{C}_{16}\text{H}_{22}\text{N}_4$ (X), aus CH₃OH farblose Nadelchen, F. 229—231°, ll. in A., Eg. u. Mineralsäuren, wl. in CH₃OH, Aceton, Bzl., unl. in Ä., Bzn., W. u. Laugen; Pikrat F. 212—213°; *Monoacetylderiv.*, $\text{C}_{18}\text{H}_{24}\text{ON}_4$, aus CH₃OH hellgelbe Nadelchen, F. 195—196°, ll. in A., Aceton, Bzl., u. Bzl., wl. in Lg., unl. in Ä.; in der Hitze l. in NaOH, unl. in NH_4OH ; l. in verd. HCl, Lsg. gelb, auf Zusatz von Alkali farblos werdend; durch konz. H_2SO_4 Verseifung; *Diacetylderiv.* wurde nur amorph erhalten, F. 105—120°; in alkoh. Lsg. durch wenig konz. H_2SO_4 Verseifung; *Dimethylderiv.* von $\text{C}_{18}\text{H}_{26}\text{N}_4$, über Pikrat gereinigt F. 156—160°, ll. in organ. Mitteln, außer Ä. u. Bzn., Chlorhydrat hygroskopisch; Pikrat, $\text{C}_{18}\text{H}_{26}\text{N}_4 \cdot \text{C}_6\text{H}_5\text{O}_7\text{N}_3$, aus Eg. gelbe Nadeln oder Blättchen, F. 244°, l. in Ä., Eg., swl. in CH₃OH u. Aceton, unl. in Ä., mit w. NaOH entsteht ein orangefarbenes Pikrat, $\text{C}_{24}\text{H}_{31}\text{O}_8\text{N}_7$ (Hydrat des vorigen), aus CH₃OH Nadelbüschel, F. 189—190°, ll. in Aceton, wl. in CH₃OH, A. u. Bzl., durch konz. HCl wird die Pikrinsäure verdrängt. — *2,2'-Di-(7-methyl-4,5,6,7-tetrahydroindazolyl)*, $\text{C}_{16}\text{H}_{22}\text{N}_4$ (XI), aus Eg. gelbe Nadeln, F. 272—273°, ll. in Bzl., wl. in Ä. u. Bzn., swl. in Eg., Aceton, A., unl. in CH₃OH, A., Säuren u. Laugen. Das bei der Darst. dieser Verb. nebenbei erhaltene Br-haltige Prod. war vermutlich *3-Brom-7-methyltetrahydroindazol*, schwach saure Base, die kein Pikrat bildet. (LIEBIGS Ann. 441. 68—100. Marburg, Univ.) H.

R. F. Hunter, *Die Bromierung thiazolringhaltiger Substanzen. IV. Die Struktur von Benzothiazolbromiden und die Huguershoffsche Synthese von Benzothiazolbromiden aus arylierten Thioharnstoffen bei ihrer Anwendung auf 1-Phenylaminobenzothiazol-tetrabromid.* (III. vgl. S. 76.) Bzgl. der Struktur der Benzothiazolbromide wiederholt Vf. das schon l. c. angegebene noch einmal. — Der Mechanismus, den HUGERSHOFF (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 37. 3120 [1903]) für die B. von 1-Anilidobenzothiazol (Bromieren von Diphenylthioharnstoff in Chlf. u. Red. des Br-Deriv.) angibt, ist nicht richtig. Nach den Unterss. des Vfs. entstehen durch Bromieren von Diphenylthioharnstoff zunächst rote Krystalle von 1-Anilidobenzothiazolbromid, die allmählich zu einem gelben Pulver zerfallen, indem Br abgespalten wird; ein tetrabromid mit F. 136°, das HUGERSHOFF erhalten haben will, konnte Vf. nicht nachweisen.

Versuche. Bei allmählicher Zugabe von 8 cem Br in gleichem Vol. Chl. z. 10 g Diphenylthioharnstoff in 50 cem Chlf. scheidet sich zuerst ein gelbes B. Additionsprod. aus, das bei weiterer Zugabe von Br sich löst unter Entwicklung von Wärme u. HBr; die nach beendeter Zugabe von Br erhaltene Lsg., die zeitweilig


entwickelt, wird auf sd. Wasserbad erhitzt, wobei sich rote Krystalle, F. 115°, bilden; hieraus nach einiger Zeit die gelbe Verb. F. 125°, Zers. bei 130°; beide geben bei Red. mit SO₂ u. nachfolgender Behandlung mit NaOH 1-Anilidomiazol. (Chem. News 129. 396—99. 1924. Highbury New Park, Chem. Lab.) HA. F. Rassweiler und Roger Adams, Die Struktur der Dehydracetsäure. Die Formel (I.) wird definitiv als richtig erwiesen. Nach ihr müßte die durch Bildung mit 85%ig. H₂SO₄ entstehende isomere Säure Formel II. u. die hieraus H₃ entstehende Iminoverb. die Formel des 3-Carboxy- γ -lutidons (III.) haben. Diese Formel wurde nun durch Synthese bestätigt. Der aus dem Kondensations- des Cu-Acetessigsäureäthylesters mit COCl₂ durch NH₃ erhaltene γ -Lutidonsäureester (IV.) gibt durch partielle Verseifung eine Estersäure (V.), die Erhitzen CO₂ verliert unter B. des Esters VI. Die daraus erhaltene einbas. (III.) zeigte sich ident. mit der aus Dehydracetsäure erhaltenen, wie diese mit VI. ident. Äthylester lieferte.



Versuchsteil. 3,5-Dicarbäthoxy- γ -lutidon (IV.) wurde nach CONRAD u. GUTH (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 20. 155) hergestellt. Ein geringer Überschuß von O ist von Vorteil. — 3-Carboxy-5-carbäthoxy- γ -lutidon, C₁₁H₁₃O₅N (V.); durch Erhitzen des vorigen mit 2 Äquiv. 4-n. alkoh. KOH-Lsg. bis zur beginnenden Ausfällung, Eingießen in gleiches Vol. Eiswasser u. Zusatz eines geringen Überschlusses von konz. HCl wird ein Gemenge der Estersäure, der Disäure u. unveränderten Ausgangsmaterials erhalten, woraus die beiden ersten mit Na₂CO₃-Lsg. abgesaugt u. wieder durch HCl gefällt werden. Dem getrockneten Nd. entzieht man (f. die Estersäure. Flache Nadeln (aus h. W.), F. 181—184° (korr.; Zers.), aus h. W., zu ca. 16% l. in h. W. — 3,5-Dicarboxy- γ -lutidon wurde vom F. 275° (Zers.) gefunden, der aber stark von der Schnelligkeit des Erhitzens abhängig. — 3-Carbäthoxy- γ -lutidon, C₁₀H₁₃O₃N (VI.), aus V. im Vakuum bei 240° (Badtemperatur). (Dabei entstanden stets auch γ -Lutidon, 3,5-Dicarbäthoxy- γ -lutidon, Äthoxy- γ -lutidon u. wahrscheinlich Pyridinderivv.) Nadeln (aus Essigester oder Aceton), ll. in V. u. 95%ig. A., wl. in absol. A., Essigester u. Aceton, unl. in Ä. — γ -Äthoxy- γ -lutidon, C₈H₁₃ON, D.²⁵ 0,9822, n._D²⁵ 1,5018. — 3-Carboxy- γ -lutidon, C₈H₉O₃N (III.), aus h. W. mit 1 H₂O, das bei 100° entweicht, F. wasserfrei 158—159° (Zers.), fast unl. in h. W. u. A., ll. in der Wärme, unl. in Ä., Bzl. u. Chlf. — γ -Lutidon, aus dem vorigen bei 270°, F. 227,5—229° (korr.). (Journ. Americ. Chem. Soc. 46. 2758 [1924]. Urbana [Ill.], Univ. of Illinois.) SPIEGEL.

Skar Seide, Über die Konstitution des sogenannten α -Chinochinolons. Ein Beitrag zur Tautomeriefrage des α -Aminopyridins. Die von REISSERT (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 28. 119 [1895]) aus α' -Chlornicotinsäure u. Anthranilsäure gewonnene α -Chinochinolon (I.) aufgefaßte Verb. hat Vf. durch Erhitzen von α -Aminopyridin u. o-Chlorbenzoesäure mit K₂CO₃ u. Naturkupfer C dargestellt. Sie verhält sich indifferent gegen PCl₃ u. POCl₃ bis 240°, Zn-Staub bei der Dest. oder in sd. Aceton, Zn u. Säuren, Sn u. HCl, Na-Amalgam in sd. A., Carbonylreagenzien, N, Diazolsgg. In Ätzlaugen ist sie zwar l., wird aber schon durch CO₂ wieder ausgeschieden. Diese vom Acridon, dem I. strukturanalog wäre, gänzlich ab-

weichenden Eigenschaften führten Vf. zu der Vermutung, daß die prim. gelbe α -Pyridylanthranilsäure sich in die tautomere Form II. umgelagert habe. TSCHITSCHIBABIN, Ber. Dtsch. Chem. Ges. 57. 1168; C. 1924. II. 983) u. der schluß zum Pyridin-N hin erfolgt sei unter B. eines 2,3-Dihydrobenzchinazolins (III.). Dies ist in der Tat der Fall, denn die Verb. wird von saurem KMnO_4 zu 2,4-Dioxychinazolin (IV.) vom F. 356° (korr.) oxydiert. Die Löslichkeit von IV. in Ätzlauge erklärt sich durch Ringöffnung zu Salzen der α -Pyridylanthranilsäure, die auch isoliert wurden. Die Säure selbst war wegen Ringschlusses nicht f. Das Ba-Salz geht beim Erhitzen mit Ba(OH)_2 in α -Anilinopyridin, F. 108°, über. Die große Neigung zur B. des Chinazonrings geht auch aus folgendem hervor. Kocht man das Na-Salz der α -Pyridylanthranilsäure mit $\text{C}_6\text{H}_5\text{J}$ u. Cu, so erhält man beim Ansäuern der nach üblicher Aufarbeitung gewonnenen wss. Lsg. nicht die erwartete Phenyl- α -pyridylanthranilsäure, sondern VII. Als Zwischenstufe werden V. u. VI. angenommen. Die Konst. von VII. folgt erstens aus der Oxidation mit saurem KMnO_4 zum 1-Phenylderiv. von IV., zweitens daraus, daß auch durch Erhitzen auf 210–220° von α -Anilinopyridin mit o-Jodbenzoesäure Ggw. von K_2CO_3 u. Cu entsteht. Beide Bildungsweisen zeigen, daß die Pyridin-Komponente in der aromat. Form reagiert u. Tautomerisierung erst beim Ringeschluß eintritt.



2,3-Dihydrobenzchinazolin-4, $\text{C}_{12}\text{H}_9\text{ON}_2$ (III.). Isolierung über das Chlorhydrat. Zers. desselben mit NH_3 . Hellgelbe Nadeln aus verd. A., F. 211°, sl. in CH_2Cl_2 , Bzl., zl. in A., wl. in Ä., Lg., W. — Chlorhydrat, $\text{C}_{12}\text{H}_9\text{ON}_2\cdot\text{HCl}$. Hellgelbe Nadeln aus verd. A., F. 293°, ll. in W. mit blauer Fluorescenz, wl. in A. — K_2CO_3 -Salz, $\text{C}_{12}\text{H}_9\text{ON}_2\cdot\text{K}_2\text{CO}_3$. Gelbe Nadeln aus Aceton, F. 238° (Zers.), wl. in W., l. in Ä. — Chlorplatinat, $(\text{C}_{12}\text{H}_9\text{ON}_2\cdot\text{HCl})_2\text{PtCl}_4\cdot 2\text{H}_2\text{O}$. Orangefarbene Platten aus W., F. 290°. — Trichlorverb., $\text{C}_{12}\text{H}_9\text{ON}_2\cdot\text{Cl}_3$. Mit PCl_5 u. POCl_3 im Rohr (180–190°, 6 Stdn.). reißt. Nadeln aus Bzl., dann Nitrobenzol, F. 328°, unl. in W., A., Säuren, Alkalien, o. wl. — Bromverb., $\text{C}_{12}\text{H}_7\text{ON}_2\text{Br}$. Mit Br in Eg. Gelbe Nadeln aus A., F. 160°, in CH_2Cl_2 , Bzl., zl. in A., wl. in W., Lg., l. in Säuren. Wird von saurem KMnO_4 zu einem Brom-4-oxychinazolin, $\text{C}_8\text{H}_5\text{ON}_2\text{Br}$, oxydiert; Nadeln aus Eg., F. 227° (Zers.). Das Br befindet sich also im Benzolkern. — 1,1-Jodmethylat, $\text{C}_{13}\text{H}_{11}\text{ON}_2\text{J}$. Mit H_2 u. CH_3OH (Rohr, 130–160°, 3 Stdn.) oder mit h. $(\text{CH}_3)_2\text{SO}_4$ u. Eingießen in Ä. Orangefarbene Nadeln aus verd. A., wl. in k. W., A., ll. in h. W. Spaltet b. 250° bis 290° im Vakuum CH_3J ab. Wird von saurem KMnO_4 zu 1-Methyl-2,4-dioxychinazolintetrahydrid, $\text{C}_9\text{H}_9\text{O}_2\text{N}_2$ (nach IV.), oxydiert; Nadeln aus W., F. 264–266°, wl., l. in Ätzlauge. — 1,1-Jodphenylat, $\text{C}_{16}\text{H}_{13}\text{ON}_2\text{J}$ (VII.). Dunkelbraune Prismen aus W., F. 365°, wl. in A., W. — 1-Phenyl-2,4-dioxychinazolintetrahydrid, $\text{C}_{14}\text{H}_{11}\text{O}_2\text{N}_2$ (nach IV.). Graue Nadeln aus A., F. 295–296°, l. in Alkalien, mit CO_2 schwer fällbar. — Na-Salz der α -Pyridylanthranilsäure, $\text{C}_{12}\text{H}_9\text{O}_2\text{N}_2\text{Na}$, H_2O . Durch Säuern von III. in w. $\text{C}_6\text{H}_5\text{ONa}$ -Lsg. Nadeln, ll. in W., A. (LIEBIGS Ann. 440. 31–32, 1924. Moskau, Techn. Hochschule.)

LINDENBAUM

Arthur W. Dox, *Äthylphenäthylbarbitursäure und verwandte Derivate*. Nach der Äthylbenzylideriv. wegen Erzeugung tetan. Symptome (vgl. DOX u. YODER, *Americ. Chem. Soc.* **44**. 1141; C. **1923**. I. 198) als Ersatz des Luminals in Betracht kommen konnten, erschien die Prüfung des entsprechenden Äthylderiv., bei dem das C_6H_5 sich in β -Stellung zum Barbitursäure-C befindet, von Interesse. Die Verb. zeigt in der Tat bei intraperitonealer Anwendung als hypnot. Wrkg. von der allgemeinen Art der Dialkylbarbitursäuren ohne Abwrkg.; per os wirkt sie viel weniger, wahrscheinlich wegen ihrer geringen Löslichkeit u. langsamen Resorption. — Phenäthylbromid läßt sich besser als nach RIARD (C. r. d. l'Acad. des sciences **138**. 1049; C. **1904**. I. 1493) durch Einw. $IBr + H_2SO_4$ auf Phenyläthylalkohol darstellen. Kp.₄ 79—81°. — Phenylmalonsäureäthylester, $C_{15}H_{20}O_4$, fl., Kp.₇₄₁ 296—298°, Kp.₂ 142—143°, D.₂₅ 1,058. — Äthylmalonsäure, $C_{11}H_{12}O_4$, Nadeln, F. 132°, Gasentw. ca. 145°, ll. in A., wl. in W. — Phenäthylmalonäthylestersäureamid, $C_{13}H_{17}O_3N$, Nadeln (aus Bzl.), F. 98°. — Äthylmalonamid, $C_{11}H_{14}O_2N_2$, Nadeln, F. 232°. — Äthylphenäthylmalonsäure-äthylester, $C_{17}H_{24}O_4$, wird am besten erhalten, wenn zuerst die Phenäthylgruppe geschützt wird, etwas zähes Öl, Kp.₇₄₁ 314—316°, Kp.₂ 148—150°, D.₂₅ 1,0382. — Phenäthylmalonsäure, $C_{13}H_{16}O_4$, Kryställchen von bitterem Geschmack, F. 125—126°, Gasentw. ca. 160°, l. in A., fast unl. in W. — 5-Phenäthylbarbitursäure, $C_{13}H_{16}O_3N_2$, F. 212—213°. — 5-Phenäthyl-1-phenylbarbitursäure, $C_{18}H_{16}O_3N_2$, F. 164°. — Äthylphenäthylbarbitursäure, $C_{14}H_{16}O_3N_2$, F. 168°. — 5,5-Äthylphenäthyl-1-phenylbarbitursäure, $C_{20}H_{20}O_3N_2$, F. 110°. — 5,5-Äthylphenäthyl-1-benzylbarbitursäure, $C_{19}H_{18}O_3N_2$, F. 141—142°. Alle diese Barbitursäuren sind wl. in W., ll. in A. u. unl. in Alkali. (*Journ. Americ. Chem. Soc.* **46**. 2843—46. 1924. Detroit [Michigan], Davis u. Co.) SPIEGEL.

E. Biochemie.

E₁. Enzymchemie.

Rudolf Kochmann, *Über Auxoureaen. Der Mechanismus der Kalkwirkung*. In HOSOKAWA (*Biochem. Ztschr.* **149**. 363; C. **1924**. II. 1927) beobachtete die Steigerung der Ureasewrkg. durch Ca u. Sr wird näher untersucht. Die Steigerung durch Ca ist proportional der Konz. des Ca u. am stärksten, wenn das Ca-Salz in einem Fermentzusatz auf den Harnstoff wirkt. Ca-Salze schützen das Ferment vor spontaner Zers. Diese Steigerung der Wrkg. läßt sich nicht durch Adsorption des Fermentes an den in den phosphathaltigen Lsgg. entstehenden Nd. von Calcium erklären. Auch das Filtrat dieses Nd., das frei von Ca ist, wirkt noch stark auf Urease. — Kohlepulver steigert ebenfalls die Wrkg., ohne aber eine Schutzwrkg. wie Ca zu haben. — Mg, das für sich die Ureasewrkg. steigern würde, hemmt die Wrkg. des Ca. — Aus den Befunden ergibt sich, daß schon ein geringer Auxokörper der Urease an verschiedenen Punkten angreifen kann. (*Biochem. Ztschr.* **151**. 259—67. 1924. Berlin-Moabit, Krankenh.) HESSE.

Hatano, *Über die Spaltung von Seidenfibroinpepton durch Takadiastase*. (Vgl. *Biochem. Ztschr.* **149**. 228; C. **1924**. II. 1927.) 5 g Seidenpepton in 50 ccm W. + 5 ccm Toluol werden von 5 g Takadiastase in 5 Tagen zu etwa 90% gespalten. Es bleibt während der Spaltung konstant 6,5—6,4. (*Biochem. Ztschr.* **151**. 1—6. Berlin-Dahlem, KAISER WILHELM-Inst. f. exper. Ther. u. Biochemie.) HSE. Ernst Herzfeld und Werner Engel, *Über chinin- und atoxylfeste Lipasen in Myxoglyphaeiden*. (Vgl. RONA u. PETOW, *Biochem. Ztschr.* **146**. 144; C. **1924**. II. 1927.) In den Schilddrüsen von Hammeln u. Rindern finden sich chinin- u. atoxylfeste Lipasen, deren Wrkg. auch durch sehr hohe Giftkonz. nicht aufgehoben wird. (*Biochem. Ztschr.* **151**. 310—13. 1924. Berlin, Univ.) HESSE.

E₂. Pflanzenchemie.

Georg Borissow, *Über die eigenartigen Kieselkörper in der Wurzelendosporien bei Andropogonarten*. Beschreibung von SiO₂-Ablagerungen, die stockwerkartig Celluloseschichten unterbrochen, in verdickten Endodermiszellwänden von *Andropogon eusorghum*, *A. saccharatus* u. *A. Ischaemum*, sowie in etwas anderer Weise bei *Crianthus Ravennae* P. B. aufgefunden wurden u. die Vf. vorschlägt RASDORF Körperchen oder Schräubchen zu benennen. (Ber. Dtsch. Botan. Ges. 42. 36. 1924. Wladikawkas, Landw. Hochschule.) HABERLAND

Marcel Mirande, *Über die optischen Eigenschaften der Sterinoplasten und Phytosterins der Knollen der weißen Lilie*. (Vgl. S. 101.) Aus der eingehenden Beschreibung des opt. Verh. verschiedener Sterinoplasten der Lilienknollen geht hervor, daß das *Liliosterin* sich in 2 Formen, einer doppeltbrechenden und einer nichtdoppeltbrechenden, findet. Diese physikal. verschiedenen Formen entsprechen höchstwahrscheinlich auch verschiedenen chem. Zuständen entsprechen. (C. R. Acad. des sciences 179. 986—89. 1924.) SPIEGEL

Alfred Heiduschka und Constantin Pyriki, *Über die Isolierung von Lignocerinsäure aus Arachisöl*. Durch sehr häufiges Umkrystallisieren des Fettsäuregemisches aus 96% ig. A. u. Reinigung über das Pb-Salz, bequemer nach zweimaliger Krystallisation aus A. durch Anwendung von Aceton, in dem Acetonsäure merklich leichter l. ist als Lignocerinsäure, gelang es, diese vom richtigen Mol.-Gew., aber abweichend von der Angabe KREILLINGS (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 21. 880) nur vom F. 77,5° (korr.) zu gewinnen. (Pharm. Zentralhalle 66. 1924. Dresden, Staatl. Landesstelle f. öffentl. Gesundheitspfll.) SPIEGEL

M. Nakao, *Über die Bestandteile von mandschurischem Pappelknospenöl*. Der Dampfdest. der Blattknospen der mandschur. Pappel wurden ca. 2% ein hellgelbes Öl erhalten. Konstanten: D.¹⁸ 0,9136, $\alpha_D = +7,43$, $n_D^{20} = 1,493$, SZ. 55,91, nach der Acetylierung 69,92. Bei der Dest. unter Atm.-Druck steigt die Temp. schnell bis 175°, bei 250—270° gehen ca. 70% über. Unter 8 mm drückt die Hauptmenge bei 127° u. liefert bei der Rektifikation über Na ein Destillat bei Kp. 121—122°, D.¹⁵ 0,9135, $\alpha_D = +21,22$, $n_D = 1,504$ u. der Formel C₁₅H₂₆O. Dieses Sesquiterpen, vom Vf. *Populen* genannt, gibt ein Chlorhydrat, F. 8°, ein Bromhydrat, F. 117°, u. bei der Dehydrierung mit S einen KW-stoff, dessen Schmelzpunkt bei 115° schm. — Aus der unter 16 mm zwischen 70° u. 115° sd. Fraktion des Öles wurde durch Verseifung mit alkoh. KOH ein Alkohol C₁₅H₂₆O (Phenylurethan, F. 142°), aus der unter Atm.-Druck bis 175° sd. Fraktion ein Alkohol C₁₆H₁₈O₂ (kein Phenylurethan) gewonnen. Beide Alkohole sind an Valeriansäure gebunden. — In den tiefer sd. Fraktionen wurde Cineol nachgewiesen, aus den höchsten Fraktionen ein Paraffin, F. 47°, isoliert. (Journ. Pharm. Soc. Japan 1924. Nr. 4—5.) LINDENBAUM

M. Nakao und C. Shibuye, *Über die Bestandteile von Sannaöl*. Das in der Sanna genannte zerschnittene Rhizom von *Hedychium spicatum* Ham. liefert bei der Dampfdest. ca. 2% eines hellgelben, zimtartig riechenden Öles, aus dem *p-cumarsäureäthylester* auskrystallisiert. Das abgetrennte Öl hat die Konstanten: D.¹⁵ 0,8769, $[\alpha]_D = -2,74$, $n_D = 1,480$, SZ. 1,83, EZ. 100,16, nach der Acetylierung 101,17. Es wurde in folgende Fraktionen zerlegt: 80—120° (18—2 mm), 120—170° (8—18 mm), 170—180° (8 mm). Die 1. ölige Fraktion ist sehr geruchlos, riecht nach Cineol. Aus der 2. Fraktion wird durch Kühlung *Pentadecan*, F. 13°, abgeschieden (Kp.₁₆ 143—148°, F. 10°, D.¹⁵ 0,7743); der ölige Teil ist *Zimtaldehydäthylester*. Die 3. Fraktion erstarrt ganz u. ist *Methyl-p-cumarsäureäthylester*, C₁₅H₁₄O₃, F. 50°. Auch sehr geringe Mengen Zimtaldehyd scheinen im Sannaöl enthalten zu sein. (Journ. Pharm. Soc. Japan 1924. Nr. 513. 2—3.) LINDENBAUM

Garino-Canina, *Beitrag zur Kenntnis und zur Bestimmung der Gerb- und Stoffe der Weintraube*. Eingehende u. krit. Besprechung reichlichen Literaturmaterials unter stellenweiser Nachprüfung. Es herrscht im großen Ganzen Klarheit über die chem. u. physikal. Eigenschaften der Weinfarbstoffe, nur in bezug auf Catechotannin herrscht noch Dunkel. (Staz. sperim. agrar. ital. 57. 245—74. 1921.)

GRIMME.

Gadamer, *Über das Vorkommen von Berberin in Chelidonium majus L.* Vf. fand durch Zufall in *Chelidonium majus* L. die Ggw. von *Berberin* feststellen. ROCK hatte bei der *Chelidonin*-Darst. krystallisierte Salze als Nebenprodd. gefunden, die als unreines, salzsaures Sanguinarin bezeichnet wurden. Ihre Aufreinigung geschah nach dem Cyanidverf.; es wurden gelb gefärbte Krystallnadeln erhalten, die nach dem Reinigen in allen Eigenschaften dem *Berberinchlorhydrat* entsprachen. Es wurde ferner nachgewiesen, daß *Berberinpseudocyanid* gegen Erwartung im Gegensatz zu analogen Pseudocyaniden bereits durch Eg. zerlegt u. in *Berberin* verwandelt wurde. Nach diesen Verss. ist *Berberin* tatsächlich als ein *tertiäres Alkaloid* u. seine Identität mit dem *Chelidoxanthin* als sicher anzusehen. (Ztg. 39. 1569—70. 1924. Marburg, Univ.)

DIETZE.

Stenzl, *Die Alkaloide der Lobelia inflata*. Das wichtigste Alkaloid, *Lobelin*, erst 1921 von WIELAND isoliert, ist als Erregungsmittel für die Atmung durchschlagender Wrkg. Daneben kommen noch andere Basen in der Pflanze vor, mehrere sind krystallisiert, voraussichtlich nahe Verwandte des α -Lobelins; andere sind amorph mit swl. Chlorhydraten. Diese haben neben der Brechwrkg. eine starke Wrkg. auf die Gefäßnerven, sind ausgesprochene Collapsgifte u. unterscheiden sich dadurch völlig vom α -Lobelin. Ein „Lobelin“ unbekannter Herkunft zeigte Vergiftungssymptome schwerster Art. (Pharm. Zentralhalle 65. 730—31. 1924. H. BOEHRINGER & Söhne, Nieder-Ingelheim, wissenschaftl. Lab.)

DIETZE.

Charles E. Sando, *Isolierung und Identifikation von Quercetin aus Apfelschalen*. Nach Unters. des Pigments der Apfelschale isolierte Vf. aus 68,6 kg frischer Schale 2,45 g unreines *Quercetin*, das über das Azetylderiv. rein dargestellt werden konnte. Vf. diskutiert u. begründet die Ansicht, daß *Quercetin* oder sein Glukosid, welches nicht dargestellt wurde, die Ursache der Braunfärbung der Apfelschale ist. (Journ. Agricult. Research. 28. 1243—45. 1934.)

TRÉNEL.

E₃. Pflanzenphysiologie. Bakteriologie.

Theodor Peters, *Die Wirkung des Lichtes bei der Keimung der Samen von Phacelia tanacetifolia*. Eine Abspülung der Samen von *Phacelia tanacetifolia*, mit wässriger Lösung im Licht hergestellt, u. den Samen derselben Pflanze als Keimbett gegeben, bewirkt sowohl bei der Keimung am Licht als auch im Dunkeln eine erhebliche Abnahme des Keimprozents. Gegenüber zur Kontrolle angewandtem dest. Wasser zeigten sich folgende Verhältnisse der Keimprozente (erste Zahlen durch Abspülung im Licht, zweite durch Abspülung im Dunkeln): 4 : 23, 7 : 13, 13 : 24, 3 : 26 etc. Im Dunkeln hergestellte Keimbetten hemmte die Keimung nur in geringem Maße oder überhaupt nicht. Der dunkle in den Samenschalen enthaltene braune Farbstoff ist mit dem Keimungsstoff nicht ident. Die Abspülungen reagieren alkal. (Ber. Dtsch. Bot. Ges. 42. 381—87. 1924. Braunschweig, Techn. Hochsch.)

HABERLAND.

Brieger, *Über den Siliciumstoffwechsel der Diatomeen*. Kulturverss. mit den Diatomeen: *Fragilaria elliptica*, *Nitzschia palca* u. *Navicula* sp., bei denen der Siliciumgehalt (1,5% Agar, 0,01% K_2HPO_4 , 0,01% $MgSO_4$, 0,02% $Ca(NO_3)_2$) in bestimmten Mengen (0,0 bis 0,250%) K_2SiO_5 zugesetzt wurden, zeigten, daß es für diese Arten eine optimale K_2SiO_5 -Konz. gibt; die höchste Konz. verträgt *Fragilaria*, sie gedeiht noch bei 1% K_2SiO_5 . Die Frage, ob die Diatomeen SiO_2

lösen können, konnte nur für *Fragilaria* entschieden werden; auf einem aus N wasserglas + HCl hergestellten, kurze Zeit mit Nährlsg. angefeuchteten Si traten bei Kultur von *Fragilaria* nach einiger Zeit deutliche (nicht auf Eintro zurückzuführende) Vertiefungen auf; auf 1 qmm wurden im Laufe eines Jahres etwa 2,5 mg SiO₂ (Trockengewicht) gel.; auf welche Weise die Lsg. hat Vf. nicht feststellen können. Es ist bisher auch noch ganz unkl., welcher Form SiO₂ sich in den Schalen der Diatomeen befindet. (Ber. Dtsch. Ges. 42. 347—55. 1924. Jena, Bot. Inst.) HABERLAND

S. Herke, *Kohlensäureerzeugung der Wurzeln*. Die Menge der erzeugte ist im 1. Wachstumsabschnitt sehr gering u. ist am größten zurzeit der Bt der Ährenb. Die Intensität der B. der CO₂ ist im nährstoffarmen Boden als in nährstoffreichen. Beim Eintauchen der Wurzeln lebender Pflanzen in g Lsgg. wandern beträchtliche Mengen von rechts- u. linksdrehenden reduzierten Zuckerarten in die Lsg. desgl. verschiedene P₂O₅-Verbb. u. Amide. (Kölöner a „Kisérletügyi Közlemények 24. 1921, kötét 2 fuzéböl.; BIED. Zentralbl. Agrik.-Ch. 53. 463—64. 1924.) BERG

Chr. Zoeller, *Vaccinierte Nährböden*. Erörterung über Nährböden, die u Impfung mit einem Keim u. Entfernung der gewachsenen Keime refraktär g über neuer Einsaat, häufig auch von anderen Keimen, geworden sind, die Ure dieser Veränderung u. die Verwendung dieser Art Nährböden, u. a. zu u behandlung. (Journ. de physiol. et de pathol. gén. 22. 361—76; Ber. ges. Physiol. 28. 143. 1924. Ref. SELIGMANN.) SPIEGEL

Max Levine und **F. W. Shaw**, *Weitere Untersuchungen über die Verflüssigung der Gelatine durch Bakterien*. (Vgl. LEVINE u. CARPENTER, Journ. of bacteriol. 297; C. 1924. I. 2160.) Für quantitative Best. der Viscositätsänderung u Bakterien störte die Eigenschaft der Gelatine, auch unbeimpft durch längere brütung bei 22° ihre Viscosität zu verringern. Es zeigte sich, daß dieser Effekt durch 20 Min. lange Erhitzung auf 50° vor Messung der Viscosität ausgemittelt werden kann. Es werden noch Befunde über Änderung der Viscositäts- u. Fz wert durch verflüssigende Bakterien mitgeteilt. (Journ. of bacteriol. 9. 25—28; Ames, Iowa State coll.; Ber. ges. Physiol. 28. 142. 1924. Ref. PUTTER.) SPIEGEL

Frank L. Meleney und **Zung-Dau-Zau**, *Die Lebensfähigkeit hämolytischer Streptokokken in bestimmten, Gelatine enthaltenden Lösungen*. Zusatz von Gelatine erhöht die Lebensfähigkeit von in gewissen Salzlgg. suspendierten Streptokokken. Dieser Einfluß zeigt sich bei den einzelnen Lsgg. in verschiedenen Grade, am besten bei 0,2% ig. Na-Citratlgg. (Proc. of the soc. f. exp. biol. med. 21. 259—61. Peking, Peking union med. coll.; Ber. ges. Physiol. 28. 141. 1924. Ref. SELIGMANN.) SPIEGEL

Walter H. Eddy, **Ralph W. Kerr** und **R. R. Williams**, *Die Isomerisierung einer bei 223° schmelzenden Substanz von den Eigenschaften eines Bios ausautolyseierter Hefe*. Das krystallin. Prod. wurde aus Hefeautolysat zu ca. 0,03% ei Trockengewichtes durch ein Verf., dessen Hauptteil die spezif. Adsorption in Eisenoxydhydrosol u. die Freimachung daraus durch Ba(OH)₂ ist, schließlich in Krystallisation aus h. 95% ig. A. gewonnen. Es bildet orthorhomb. Krystalle der Zus. C₅H₁₁O₃N u. entsprechendem Mol.-Gew. (ebullioskop. in A.), von schwach bitterem Geschmack, l. in W., Säuren u. Alkalien, l. in k. A. bis zu 80% ig. unl. in k. 95% ig. A., unl. in W. u. absol. Aceton, in letzterem ll. bei 1 g eine Spur W., im Vakuum (1 × 10⁻⁶ mm) unverändert sublimierbar. Die h Prüfungen machen bisher einen N-Ring mit einer Carboxylgruppe wahrscheinlich u. weisen auf nahe Beziehungen zu Prolin hin. Für das Hefewachstum zeigt Substanz in geringen Mengen (0,005 mg pro ccm) fördernden Einfluß, auf

re Formen besser als auf untergäridge. Mit Vitamin B kann sie nicht ident. da sie keine antineurit. Eigenschaften erkennen ließ. (Journ. Americ. Chem. 46. 2846—55. 1924. New York, Columbia Univ.) SPIEGEL.


S. C. Johnson und R. G. Green, *Leitfähigkeit von Hefezellen*. Lebende erhöhen den Widerstand von Elektrolytsgg. mehr als tote. Die Erniedrigung abtötendem Erhitzen beruht offenbar auf Diffusion von Elektrolyten aus dem Zellen, zum Teil aber auch auf Verringerung der Zellgröße. Exosmose aus getöteten Zellen wurde noch bei 1%ig. NaCl-Lsg. festgestellt. Wird die Salzkonz. der Elektrolytsg. höher als die im Zellinnern, so kann es auch zur Endosmose kommen. (Journ. of infect. dis. 34. 186—91. Minneapolis, Univ. of Minnesota. Ber. ges. Physiol. 28. 141. 1924. Ref. SELIGMANN.) SPIEGEL.


Keiji Nakamoto, *Über Bernsteinsäure, die durch Sake-Hefe gebildet wird*. Vf. hat die Ausbeuten an Bernsteinsäure fest, die aus Glutaminsäure u. Asparagin in verschiedenen Hefen erzeugt wird. Die Bernsteinsäure, die nach EHRLICH der Hauptbestandteil der alkoh. Gärung von Glutaminsäure ist, wird aus der Differenz der Bernsteinsäure u. der flüchtigen Säuren bestimmt. (Journ. Coll. Agric. Tokyo 27—89. 1924.) TRÉNEL.

Polakorny, *Zellchemischer Ursprung des Fettes, Vorkommen in Hefe, andern Pilzen und den Samen*. Als Ursprung des Fettes in Hefe ist das Zelleiweiß anzusehen. Nach Zusatz von Harn zur Nährlsg. konnten wohl Trockensubstanz u. Eiweiß nachgewiesen werden, nicht aber der Fettgehalt der Hefe gesteigert werden. (Allg. Brauer- u. Zuckerz. 65. 31—32.) HESSE.

E₄. Tierchemie.


W. Fischer und J. Hilger, *Zur Kenntnis der Porphyrine*. XII. *Ätioporphyrin aus Uroporphyrin*. (XI. vgl. S. 242.) Um die auf Grund der früheren Arbeiten vermuteten Beziehungen zwischen den Porphyrinen der B-Reihe — Uroporphyrin — u. den Porphyrinen der A-Reihe festzustellen, erstrebten die Verf. den Abbau des Uroporphyrins zu Ätioporphyrin auf dem von WILLSTÄTTER und FISCHER (Ztschr. f. physiol. Ch. 87. 423; C. 1913. II. 1979) vorgezeichneten Wege. Das so erhaltene Ätiouroporphyrin erwies sich nach F., krystallograph. u. chem. mit dem aus Chlorophyll u. Hämin dargestellten Ätioporphyrin ident. Der Abbau des Uroporphyrins zum Ätioporphyrin über die Mg-Verb. erfolgt ohne Umwandlung durch glatte Decarboxylierung. Diese Tatsache führt zur Annahme von 4 Carboxylen im Uroporphyrin u. von 8 Carboxylen im Koproporphyrin entgegen der früheren Annahme von 3 bzw. 7 Carboxylen. Beim Uroporphyrin sind die Carboxylgruppen in Malonsäurestellung angeordnet, wodurch sich die glatte Umwandlung in das Koproporphyrin erklärt. Da Uro- u. Koproporphyrin 4 saure Pyrrrolekerne enthalten, erklärt sich, warum beim Abbau im Gegensatz zu den Porphyrinen der Häminreihe mit nur 2 sauren Pyrrrolekernen keine Basenfraktion entsteht. Ein weiterer Unterschied liegt in der weitergehenden Hydrierung der Kernringe der B-Porphyrine, die eine glatte Umwandlung in Ätioporphyrin gestattet. Die folgenden Formeln werden entgegen WILLSTÄTTER die nachstehenden, der Zus. C₃₂H₃₆N₄ u. C₃₂H₃₄N₄ entsprechenden Formeln zugeschrieben:






Bei der Annahme von 31 C-Atomen könnte die punktierte wiedergegebene Tetrapyrrolylformel in Betracht gezogen werden. Für das Ätiouroporphyrin WILSTÄTTER kann möglicherweise eine um 2 H-Atome ärmere gesätt. Verb. in Betracht gezogen werden, während das Ätiouroporphyrin als gesätt. Verb. angesehen werden muß. Für das Koproporphyrin ergibt sich danach die Formel

$C_{36}H_{36}N_4O_8$ bzw. $C_{36}H_{38}N_4O_8$, für das Uroporphyrin die Formel $C_{40}H_{36}N_4O_{16}$ bzw. $C_{40}H_{38}N_4O_{16}$:



bzw.:

Experimentelles. Zur Einführung des Mg in das Koproporphyrin wurden 0,2 g Koproporphyrinmethylester in 5 ccm Pyridin gel. u. mit 3 ccm konz. methylalkoh. KOH u. 0,06 g MgO 4 Stdn. auf 180° erhitzt. Der mit Ä. gewaschene Niederschlag des K-Salzes der Mg-Verb. wurde in W. gel., worauf sich nach Zusatz von Na₂P₂O₇ mit Ä. das freie Koproporphyrin extrahieren ließ. Absorptionsspektrum: I 220, II 584,4 u. 577,1, III 560,0, 548,0, 525,8, IV 499,6, V 418,6. Intensität: III, IV, I. Beim Erhitzen des K-Salzes im Vakuum sublimiert in geringer Ausbeute das Ätioporphyrin. Spektrum in äth. Lsg. I 617,2, II 579,3, III 561,0, IV 502,7, V 432,7. Intensität: III, II, I, IV. Spektrum des freien Ätioporphyrins I 643,9, II 631,7, III 596,2, IV 577,7, V 528,4, VI 495,4, VII 466,4. Endabsorption 441,1. Die Darst. des Uroporphyrins erfolgt ähnlich wie die des Koproporphyrins. Der Niederschlag des K-Salzes der Mg-Verb. ist in W., das freie Phyllin wird jedoch bei Ggw. von NaH₂PO₄ in Ä. unl. Mit HCl ließ es sich in Uroporphyrin zurückverwandeln. Zur Isolierung des Ätiouroporphyrins wurde das Sublimat des Uroporphyrins in Ä. gel., mit 25%ig. methylalkoh. KOH ausgeschüttelt, mit 1%ig. HCl von einem Nebenprod. befreit u. die äth. Lsg. mit 3 Vol. PAe. versetzt. Der durch Filtrieren erhaltene Niederschlag wurde das Porphyrin mit 6%ig. HCl entzogen u. bei essigsaurem pH-Wert mit Ä. extrahiert.



kn. Ä. gebracht. Blauschwarze Krystalle aus Chlf. Krystallograph. Beschreibung
ergleich mit Ätioporphyrin aus Hämophyllin durch **Steinmetz**. Bis 300° keine
entliche Veränderung, bei 325° Sintern, F. 330—335°. Ein anderes Präparat
ie schwaches Sintern bei 220° u. F. 270—280°. Mol.-Gew.-Best. in Bzl. 425,
erhnet $C_{32}H_{36}N_4$ 476,49. — *Fe-Salz des Ätioporphyrins*, Darst. mit $Fe(CH_3 \cdot$
 O_2 . Kleine Würfel, ll. in Chlf. Spektrum: I 633,7, II 581,8, III 536,0, in
ylin: I 562,6, II 543,7, III 514,7, Endabsorption 488,0. Nach Zusatz von Sulfid-
Hämochromogenspektrum. *Cu-Salz des Ätioporphyrins*, $C_{32}H_{36}N_4Cu$, Krystalle
3g., F. 260°. (Ztschr. f. physiol. Ch. **140**. 223—43. 1924. München, Techn.
sch.)

GUGGENHEIM.

J. B. Zanda, *Anwesenheit des Kupfers im normalen Auge und unter verschiedenen
experimentellen Bedingungen*. (Vgl. Biochim. e terap. sperim. **11**. 7; C. **1924**. II.
31) Mittels der Hämatoxylinprobe (Phenolphthalein war hier zu wenig empfindlich)
ue das V. von Cu auch in n. Augen von Rind, Pferd, Meerschweinchen u.
ut nachgewiesen. Nach Injektionen von Cu (beim Hunde) war der Gehalt ver-
et. (Arch. di ottalmol. **31**. 97—107. Cagliari, Univ.; Ber. ges. Physiol. **28**.
32—33. 1924. Ref. ASCHER.)

SPIEGEL.

E₅. Tierphysiologie.

Henry M. Feinblatt, *Kreatininämie, nach Untersuchungen, welche sich auf
Blutanalysen stützen*. Nach den im Originalreferat wiedergegebenen Angaben
e Kreatiningehalt des Blutes u. Lebensende erscheint hoher Kreatiningehalt
rost. ungünstig. 14 Kranke mit 10 mg/% u. darüber starben sämtlich inner-
al 17 Tagen, von 15 Kranken mit 5—10 mg/% 11 in derselben Zeit, 3 später,
21 Kranken mit 2,5—5 mg/% im ganzen 16. (Americ. Journ. of the med.
ices **166**. 249—56. 1923. Brooklyn, Long Island coll. Hosp.; Ber. ges. Physiol.
3. 05. 1924. Ref. BÜRGER.)

SPIEGEL.

Harry Bakwin und **Helen Rivkin**, *Die Bestimmung der Blutmenge bei
neuln Säuglingen und bei Säuglingen mit schwerer Unterernährung*. Die Best.
ft nach einer Mikromodifikation der Methode von KEITH, ROWNTREE u.
EGHTY. Es ergab sich, daß bei der Geburt das Vol. der Blutkörperchen

relativ hoch ist, dann aber rasch fällt. Das Vol. von Blut u. Plasma ist bei Säuglingen in Beziehung zum Körpergewicht höher u. schwankender als bei Erwachsenen (im Durchschnitt 101 ccm bezw. 61 ccm pro kg), bei marant. Säuglingen noch größer als bei n., in Beziehung zur Körperoberfläche aber viel kleiner (pro qm). (Americ. Journ. of dis. of children **27**. 340—51. New York, COBBLE Univ. med. coll.; Ber. ges. Physiol. **28**. 95—96. 1924. Ref. ARON.) SPIEGEL.

Maurice Nicloux, *Neue Nachweise der Gegenwart von Kohlenoxyd im Blut*. Nachstehend genannte Verss. bestätigen die schon früher von einigen Autoren angegebene Anwesenheit von CO im Blut: 1a) die zu untersuchende Blutprobe wird allein im Hochvakuum bei 40° behandelt: das aufgefangene Gas ist nicht brenzlich (keine Zers. von Kohlenoxydhämoglobin bei dieser Temp.); 1b) Behandlung der Probe im Hochvakuum bei 100° in Ggw. von Phosphorsäure; Best. des abgespaltenen CO eudiometr. (vgl. C. r. soc. de biologie **85**. 118; C. **1921**. IV. 556) u. als Kohlenoxydhämoglobin nach dem vom Vf. früher (Bull. Soc. Chim. de France [4] **33**. 333) C. **1923**. IV. 633) angegebenen Verf. Die in Ochsen-, Schweine- u. Pferdeblut gefundene CO-Menge beträgt ca. 0,1 ccm in 100 ccm Blut. — 2. Das im Blutserum haltene CO wird durch NO₂ verdrängt, indem 200 ccm durch schwach ammoniakal. Na₂S₂O₄-Lsg. red. Blut mit NO₂ gesätt. u. 4—6 Stdn. mit 300 ccm NO₂ geschüttelt werden; in dem NO₂-CO-Gemisch wird NO₂ durch O₂ zerstört, das rückständige Gasvol. (CO) wird mit Luft gemischt u. CO nach dem zweiten Verf. spektr. nachgewiesen. 3. Das Versuchstier läßt man einige Zeit in reinem O₂ atmen u. sammelt die ausgeatmeten Gase (Gemisch von O, CO₂, N₂ u. durch O₂ verdrängtes CO). In den ersten beiden Gasen werden durch alkal. Na₂S₂O₄ entfernt u. im Restgemisch ist CO spektr. nachweisbar. (C. r. d. l'Acad. des sciences **179**. 1633—36. 1924.) SPIEGEL.

Erich Adler und Leo Strauß, *Beitrag zum Mechanismus der Bilirubinretention im Blutserum*. I. *Physiologischer Teil*. Auf die verschiedene Art des Zustandskommens der Rk. haben sicher die Serumeiweißkörper Einfluß. Besonders scheinen die Globuline beteiligt. Zusatz sowohl von Globulin, als auch von Serum zu direkt kuppelndem stark bilirubinhaltigem Serum führt zu deutlicher Verzögerung der Rk., u. verzögert kuppelndes Serum zeigt nach Wegnahme der Globulinfraction direkte Diazokuppelung. (Ztschr. f. d. ges. exp. Medizin **44**. 1—8. 1924.) SPIEGEL.

Erich Adler und Leo Strauß, *Beitrag zum Mechanismus der Bilirubinretention im Blutserum*. II. *Experimentell-klinische Untersuchungen*. (I. vgl. vorst. Ref.) Es konnte gezeigt werden, daß gallehaltiges Serum die Diazork. um so sehr verzögert, je niedriger der Wert des Verhältnisses Globulin : Albumin (E. Q.) ist, u. daß Zusatz von Globulin zu solchem Serum den Eintritt der Rk. verzögert. Bei destruirenden Leberprozessen mit Ikterus u. prompter direkter Rk. findet sich eine deutliche Senkung von E. Q., bei Besserung des Zustandes sich asymptotisch der Norm nähernd, bei rein mechan. Ikterus mit relativ geringerer Störung der Leberfunktion nur mäßige Erniedrigung, die in der Rekonvaleszenz rasch zur Norm zurückkehrt. Bei kompensierten Herzkranken ist E. Q. unverändert, bei Kreislaufstörungen mit Leberstauungen mäßige Erniedrigung, bei dynam. Ikterusformen (perniziöse Anämie usw.) mit sogenannter indirekter Gallenfarbstoffrk. ohne wesentliche Leberfunktionsstörung durchschnittlich physiol. Wert. Bei Gelbsuchtsformen mit direkter Diazork. im Serum ist gewöhnlich stärker erniedrigter E. Q. pathologisch für destruirende Lebererkrankungen. (Ztschr. f. d. ges. exp. Medizin **44**. 1—8. 1924.) SPIEGEL.

Erich Adler und Leo Strauß, *Beitrag zum Mechanismus der Bilirubinretention im Serum*. III. (II. vgl. vorst. Ref.) Während in eiweißfreier Duodenalgal die Diazoniumkuppelung von der Temp. unabhängig ist, tritt sie in gallehaltigem Blutserum bei Erwärmen rascher u. farbstärker auf. Ferner erfolgt sie im O₂-sättigten

arteriellen Serum rascher als im mit CO₂ beladenen oder venösen. Die ent-
enden Salze der Hofmeisterschen lyotropen Reihe beschleunigen die Rk., die
enden Elektrolyte verzögern sie. 1 Tropfen NH₃-Lsg. verhindert den Eintritt
Rk. im Iktusserum, ohne den Gallenfarbstoff zu zerstören. Kleine Mengen
N oder Basen verzögern sie. A., tropfenweise zugefügt, beschleunigt sie da-
ganz außerordentlich. Gelatine, Gummi arabicum, Glycerin verzögern. Es
also ganz allgemein Kolloidquellungsmittel verzögernd, Kolloidentqueller
leunigend auf den Eintritt der Diazork. (Ztschr. f. d. ges. exp. Medizin **44**.
-12. 1924.)

SPIEGEL.

Erich Adler und Leo Strauß, *Über den Mechanismus der Bilirubinreaktion*
rum. IV. (III. vgl. vorst. Ref.) Wie entquellende Elektrolyte beschleunigen
Diuretica aus der Klasse des Coffeins die Diazork. gallenfarbstoffhaltigen
eras, *Digalen*, *Digipan*, *Strophanthin* aber nicht, auch nicht *Harnstoff*, *Na-Sali-*
u. *Ca. Novasurol* erzeugt fast momentan die Rk. Verschiedene *Hormone*
yophysin, Thyreoidin, Thyreoglandol) zeigten keine eindeutige Wrkg., *Adrenalin*
hich beschleunigende (Konz. 1 : 100—500 Millionen). *Na-Taurocholat* wirkt in
um beschleunigend, *Cholesterin* hemmend. Als Ursache aller beobachteten Be-
anigungen wird die entquellende Wrkg. angesehen. Die Wrkg. des Nova-
r zeigte sich auch in vivo nach intravenöser Eingabe bei abklingender Gelb-
e. Bei Coffein u. A. wurde nachgewiesen, daß sie, in Serum eingetragen, auch
n E. Q. (vgl. Mitteilung II) erniedrigen. Der Einfluß auf den Eintritt der
ark. in ikt. Serum kann zur Prüfung von Substanzen auf quellungshemmende
efördernde Wrkg. benutzt werden. (Ztschr. f. d. ges. exp. Medizin **44**. 43—68.
2 Frankfurt a. M., Univ.)

SPIEGEL.

L. Henschke und H. Zwerg, *Über die Bedeutung der Serumlipase bei der*
tuberkulose. Die Herabsetzung der lipolyt. Kraft des Serums ist kein Maß-
ßler Reaktionsfähigkeit des tuberkulösen Organismus, sondern steht nur mit
rachexie im Zusammenhang. (Beitr. z. Klin. der Tuberkul. **58**. 324—28. Neukölln,
Krankenh. Hasenheide; Ber. ges. Physiol. **28**. 139. 1924. Ref. GYÖRGY.) Sp.
Moshibumi Masumizu, *Das Schicksal der in den Warmblüterorganismus ein-*
trittenen Amylase. Über die Beziehung der peroral oder subcutan zugeführten, amylo-
lytischen Ferment enthaltenden Präparate und der Ausscheidung der Amylase im Urin
Verhältnis zu der des Blutserums und Beobachtungen über den Blutzuckergehalt
iesen Versuchen. Die Wirksamkeit der Amylase schwankte im Laufe des
g, auch die Gesamtausscheidung eines Tages war nicht konstant. Nach per-
oder subcutaner Zufuhr war die Ausscheidung im Harn vermehrt, der Gehalt
utserum blieb stets ziemlich konstant. Nach Pankreatin war der Blutzucker
enig gesteigert. (Tôhoku Journ. of exp. med. **5**. 1—11. Sendai, Tôhoku Univ.;
ges. Physiol. **28**. 139. 1924. Ref. JACOBY.)

SPIEGEL.

Bogendorfer, *Untersuchungen über den Antikörpergehalt der Haut*. Zer-
rte, von Blut u. Gewebesaft befreite Haut von bei der Schickprobe negativen
titen entgiftete Diphtherietoxin, solche von positiv reagierenden nicht. Es
n also bei der Rk. spezif. Antikörper, die ihren Sitz in den Zellelementen
laut haben, beteiligt sein. (Zentralbl. f. allg. Pathol. u. pathol. Anat. **33**.
n rbd. 198—206. 1923. Würzburg, Univ.; Ber. ges. Physiol. **28**. 149. 1924.
f. SELIGMANN.)

SPIEGEL.

W. Seuffert und Erich Voigt, *Vergleichende Studien über den Amino-N-*
gehalt des Harnes beim Menschen nach Aufnahme von Glykokoll und Gelatine.
SEUFFERT u. MARKS, S. 539.) Bei Verabreichung etwa gleicher Mengen
ykokoll als solches (bis 10 g täglich) u. in Form von Gelatine zeigte sich nach
Verhältnis zwischen dem formoltitrierbaren N im Harn u. dem aufgenommenen
Verabfolgung der reinen Aminosäure für die Verwertung viel ungünstiger.

Bei Vergrößerung der Glykokollgabe über 10 g hinaus vermehrte sich die Ausscheidung von Amino-N stark. (Beitr. z. Physiologie 2. 257—62. 1924.) SPIEGEL.

Bernard J. Alpers, Clarence J. Campbell und A. M. Prentiss, *Der Zuckergehalt des Liquors n. zu 0,10,065%, bei epidem. Encephalitis gesteigert auf im Mittel 0,085%. Bei unbehandeltem allgemeiner Parese fanden sich hohe Normalwerte, die bei Behandlung auf niedrige zurückgingen, bei man.-depressiven Irresein n. Werte. Bei Dementia praecox eine starke, aber etwas weniger häufige Steigerungen wie bei epidem. Encephalitis. Diabetes mellitus weit größere.* (Arch. of neurol. and psychiatry 11. 65—74. 1924. Boston, Psychopath. Hosp.; Ber. ges. Physiol. 28. 105. 1924. Ref. SCHMITZ.)

Aldo Muggia, *Die Peroxydase in der Frauenmilch.* Die Rk. nach MARCHAND fällt stark aus, solange noch Colostrum in der Milch vorhanden ist, später nimmt die Form eines Ringes an der Berührungsfläche von Milch u. Guajaklsg. Vf. untersuchte sie nur bei 73% der stillenden Mütter, unabhängig von deren Alter und Ernährungszustand von Mutter u. Kind. Der negative Ausfall kann also ebenfalls angenommen wurde, diagnost. für Stillinsuffizienz verwertet werden. (Pect. 32. 674—79. Torino, Osp. infant. Regina MARGHERITA; Ber. ges. Physiol. 28. 105. 1924. Ref. LAQUER.)

H. Roger, Léon Binet et M. Vagliano, *Wirkung der Lungenfette auf die Kalkbindung.* (Vgl. auch C. r. soc. de biologie 90. 1310; C. 1924. II. 1702.) Die Fette der Lungen wirken bei Ratten, welche eine Rachitis erzeugende Kollagen bekommen, antirachit.; sie fördern also die Kalkbindung im Organismus. (C. r. soc. de biologie 91. 357—60. 1924.)

Amy L. Daniels und Genevieve Stearns, *Die Wirkung der Hitzebehandlung von Milchmischungen auf den Mineralstoffwechsel von Säuglingen.* Verschiedene Versuche wurde beobachtet, daß Säuglinge bei einer bestimmten Milchmischung nicht in Gewicht zunahmen, wenn diese pasteurisiert wurde, wohl aber, wenn die gleiche Milchmischungen rasch aufgekocht wurden. Die Ca- u. P-Retention der Säuglinge war erheblich größer, wenn sie die rasch aufgekochten Milchmischungen bekamen als wenn diese Milchmischungen pasteurisiert wurden. Je länger die Hitzebehandlung der Milch dauerte, desto größer war die Ca- u. P-Ausscheidung in den Urin u. desto geringer die Menge Ca u. P, welche zur Verfügung stand. Säuglinge, welche lange Zeit mit pasteurisierter Milch ernährt werden, erhalten wahrscheinlich zu wenig Ca für ihren Wachstumsbedarf. (Journ. Biol. Chem. 61. 22—28. 1924. Iowa, Univ.)

P. A. Levene und B. J. C. van der Hoeven, *Die Konzentration von Vitaminen in Hefe.* (Journ. Biol. Chem. 40. 383; C. 1920. III. 747.) Es wurde versucht, die in OSBORNE u. WAKEMAN angegebene, aus Hefe erhaltene Vitaminfraktion weiter zu reinigen u. konzentrieren. Ein Teil des inakt. Materials kann daraus durch Cetylaldehyd gefällt werden. Mit Lloyd's Reagens kann ein Teil des Vitamins adsorbiert werden. Die beste Adsorption findet sich bei $pH = 4$. Mit $Ba(OH)_2$ wird ein Teil des Vitamins gefällt. Kaolin gab unbefriedigende Resultate. Die beste Adsorption überhaupt wurde mit Kieselsäure-Gel bei einer Rk. von $pH = 5$ erhalten. Aus diesem Gel kann die akt. Substanz durch Alkalien u. durch Säuren bei einer $pH = 1$ wieder extrahiert werden. Eine sehr gute Konz. des Vitamins wurde durch Kombination zweier Adsorbentien erhalten. So wurde durch Adsorption mit dem Kieselsäuregel aus einer Lsg., welche das mit dem Ba-Verf. gewonnene Material enthält, ein Extrakt erhalten, der 200—400 Mal so wirksam war als trockene Hefe. (Journ. Biol. Chem. 61. 429—43. 1924. ROCKEFELLER Inst.)

J. Deas, *Prüfung des Hefewachstums fördernden Vitamins auf seine Wirkung bei Tieren.* Aus den Malzwürzelchen durch Aufgüsse u. Fällungsverf. bereitete Fraktionen, die als Bios I u. Bios II bezeichnet werden u. die das Hefewachstum

rende Vitamin enthalten, sind nicht imstande, das Wachstum von Ratten zu ern. Demnach sind WILDIERS „Bios“, FUNKS Vitamin D, nicht mit dem das Wachstum der Ratten fördernden Vitamin B ident. Auch mit dem antiscorbut. Vitamin C sind sie nicht ident. (Journ. Biol. Chem. 61. 5—8. 1924. Toronto, ARON.)

C. Dunn, *Die Wirkung von Lebertran in verschiedenen Mengen und Formen auf das Wachstum junger Hühner*. Einer von fettlös. u. antirachit. Stoffen freien, sonst ausreichenden Nahrung in einer Menge von 0,25—0,5% zugesetzt, gegeben Lebertran, um bei jungen Hühnern in der Gefangenschaft Rachitis zu vermeiden. Erhöhung des Lebertrangehaltes der Nahrung über 0,5% vermehrt die wachstumsfördernde Wrkg. nicht. Die antirachit. Wrkg. des Lebertrans geht verloren, wenn der Lebertran mit granulierter Stärke gemischt, aufgehoben wird. (Journ. Biol. Chem. 61. 129—36. 1924. Storrs, Landw. Vers. Stat.) ARON.

William E. Anderson und Arthur H. Smith, *Die Wirkung akuten Scorbutis auf die darauffolgende Ernährung und das Wachstum von Meerschweinchen*. Der Gewichtsverlust, den Meerschweinchen auf der Höhe eines akuten Scorbutis erleiden, kann nicht durch Unterernährung allein erklärt werden. Nach dem Durchgehen eines schweren Scorbutis verläuft die Gewichtskurve der Meerschweinchen wieder ebenso steil oder noch steiler als die normaler. Die Nahrungsaufnahme wird diesen postscorbut. Stadium erheblich vermehrt. (Journ. Biol. Chem. 61. 181—191. 1924. New Haven, Yale Univ.) ARON.

Ralph Hoagland und Alfred R. Lee, *Antineurit. Vitamin in Geflügelfleisch und Eiern*. An antineurit. Vitamin war von allen Geflügelfleischarten das Hühnerfleisch am reichsten; auch das Perlhuhnfleisch enthält reichlich antineurit. Vitamin. Hühner- u. Putenfleisch enthalten nur wenig, das Fleisch junger Küken noch mehr antineurit. Vitamin. Hühnereier hatten ebenfalls eine geringe Vitaminmenge. (Journ. Agricult. Research 28. 461—72. 1924. Unit. States Dep. Agric.) ARON.

H. Werkman, V. E. Nelson und E. I. Fulmer, *Immunologische Bedeutung der Vitamine*. IV. Einfluß des Fehlens von Vitamin C auf die Resistenz von Meerschweinchen gegen Bakterieninfektion, auf spezifische Agglutininbildung und auf phagocytäre Aktivität. (III. vgl. WERKMAN, Journ. of infect. dis. 32. 263; C. 1924.) Mangel an Vitamin C, der Meerschweinchen skorbut. macht, vermindert ihre Widerstandskraft gegen Infektion mit Milzbrand u. Pneumokokken. Ursache davon ist die erniedrigte Körpertemp.; B. von spezif. Agglutininen (z. B. Typhusbacillen) u. phagocytäre Kraft zeigten sich durch den Vitaminmangel beeinträchtigt. (Journ. of infect. dis. 34. 447—53. Ames, Iowa State coll.; Ber. Physiol. 28. 148—49. 1924. Ref. SELIGMANN.) SPIEGEL.

Kakuji Kodama, *Wirkung der Asphyxie auf die Größe der Adrenalinausscheidung bei Meerschweinchen*. Die Steigerung der Ausfuhr bei Asphyxie (vgl. S. 117) wird gegenüber Anzweiflung durch STEWART u. ROGOFF durch besondere Verss. bestätigt. Unter 17 Verss. blieb nur bei einem das Ergebnis zweifelhaft. Diese Steigerung tritt in der Regel früher ein als die maximale Dunkelfärbung des Blutes. Der Adrenalinegehalt der Nebennieren wurde dabei nicht deutlich vermindert. (Jap. Journ. of exp. med. 5. 47—70. Sendai, Tôhoku Univ.; Ber. ges. Physiol. 24—25. 1924. Ref. FROMHERZ.) SPIEGEL.

Adolf Bickel, *Zur Kohlenstoffbilanz bei der Avitaminose*. (Mit Bemerkungen über die Kohlenstoffbilanz beim Diabetes und zur Insulinwirkung.) (Vorl. Mitteilung.) Bei der Avitaminose wird im Vergleich zur Norm ein beträchtlicher Teil des bei der Verbrennung von N-freien Materials freiwerdenden C in Form C-haltiger Verb. durch die Nieren zur Ausscheidung gebracht, anstatt bis CO₂ oxydiert u. ausgeatmet zu werden. Eine ähnliche partielle, unvollkommene Oxydation des C wie bei der Avitaminose dürfte sich auch beim Diabetes u. bei anderen Stoffwechselkrankheiten

finden, besonders, wenn diese mit einem verminderten O_2 -Verbrauch einhergeht (Münch. med. Wchschr. 71. 1603—4. 1924. Pathol. Univ. Inst.)

Theod. Brugsch und Hans Horsters, *Cholere und Choleretica. Ein Beitrag zur Physiologie der Galle.* III. Über die choleretische Wirkung von Chinolinderivaten insbesondere der Atophanreihe. (II. vgl. S. 543.) Nachdem die choleret. Wrkg. d. Atophans gefunden war (vgl. Ztschr. f. d. ges. exp. Medizin 38. 367; C. 191. 1826), wurde sie jetzt an verschiedenen Hunden verfolgt. Bei ca. 10% trat sich keine Rk. (Tier mit stark cirrhot. Leber) oder nur geringe (auch bei Aufschwere Veränderungen der Leber). Für alle sonstigen Verss. wurden damals Hunde benutzt, die auf die intravenöse Atophaninjektion stark reagiert hatten, leberhalb als lebergesund angesprochen wurden. Von den Einzelbeobachtungen der Atophanverss. sei noch angeführt, daß mit der Atophancholere Sinken von I. der inneren Reibung u. der Oberflächenspannung, Zunahme der Trockensubstanz hauptsächlich der Gallensäuren u. anderer l. Salze, u. besonders der Farbstoffe der Galle einhergeht. — Die Kombination von Atophan u. Gallensäuren (Cholere) bietet keinen Vorteil vor reinem Atophan, wenn dieses überwiegt, u. bei Steigerung der Cholsäurekomponente über 50% des Gemisches sogar eher eine Abnahme der Wrkg. — Chinolin u. andere Chinolinderiv. Es wird berichtet über Verss. mit Chinolin, Chinaldin, 2-Phenylchinolin, 6-Methoxychinolin, 7-Methyl-2-phenylchinolinsäure, 6-Methyl-2-phenylcinchoninsäure (III), 2,2'-Phenyldichinolin-4,4'-carbonsäure (6,6'-Diatophan), 2-p-Oxyphenylcinchoninsäure (I), 2-p-Oxy-m-Carboxyphenylchinolin-4-carbonsäure (IV), 8-Methoxy-2-piperonylcinchoninsäure, 2-Piperonylcinchoninsäure (II), 2-Sulfophenylcinchoninsäure (V), 2-(m,p)-Dimethylphenylcinchoninsäure (VI) ferner kurz über solche mit Chinin, Chinidin, Eucupin, Vucin u. Optochin. Am nächsten kommt dem Atophan in choleret. Wrkg. I, die auch den höchsten Oberflächenquotienten hervorruft, dann II u. III. Geringe Werte zeigt IV, keine Wrk. u. VI. 2-Phenylchinolin ließ bei 0,5 g per os schon choleret. Wrkg. erkennen, lähmte dagegen die Gallenbildung bei 2 g. Soweit diese Atophanderiv. auf Wrksamkeit bzgl. des Harnsäurestoffwechsels untersucht sind (vgl. IMPENS, Arch. de nat. de pharmacodyn. et de therap. 22. 383 [1912]), zeigt sich meist, aber nicht immer, Parallelismus mit der choleret. Wrkg. — Die Atophancholere kommt scheinend nicht auf dem Wege über das vegetative Nervensystem zustande, sondern vornehmlich durch Steigerung der vitalen Vorgänge in der Leberzelle oder direkte Anregung der biochem. Umsetzungen. (Ztschr. f. d. ges. exp. Medizin 4. 716—40. 1924. Berlin, Charité.)

Eugenia de Micheli, *Studien über die Bilirubinämie.* Nach den Ergebnissen der Vf. kann die physiol. Bilirubinämie nicht als Maß der Hämolyse u. als Brücke für Abgabe von fertigem Bilirubin an die Leberzelle herangezogen werden. Die Ergebnisse RETZLAFFS bzgl. Resorption aus dem Darm werden bestätigt. Bzgl. indirekten Bilirubink. sieht Vf. die Bindung an Eiweiß nicht als den urspr. Schritt, sondern als einen erst beim Verweilen des Bilirubins in der Blutbahn auftretenden Zustand des Bilirubins an. Danach sind Konz. u. Zustand der Plasm. eiweißkörper für die Rk. von Bedeutung. Ihr Charakter kann sich mit der Intensität des Bilirubinzuflusses ändern infolge Änderung der Adsorptionsbedingungen. Läßt er bei Durchgängigwerden der Gallenwege nach, so wird die urspr. indirekte Rk. in die zweiphas., dann weiter in die indirekte übergehen. Im hämolyt. Ikterus wird es wegen des geringen Zustroms u. der langen Verweildauer zu vollständiger Bindung kommen. — Auf die ausführliche Erörterung der Literatur auf diesem Gebiet hier nur hingewiesen werden. (Arch. di patol. e clin. med. 3. 42—56. Pavia, Univ. Ber. ges. Physiol. 28. 109—10. 1924. Ref. SCHMITZ.)

Francis R. Fraser, *Ein Vortrag über Jod bei exophthalmischem Kropf.* Auf der Anwendung des Jods in 24 Fällen u. den dabei angestellten Unterss. zieht V.

ge de Schlüsse: J kann eine Senkung des Grundstoffwechsels u. der Herz-
higkeit sowie Steigen des Körpergewichtes mit auffälliger Besserung des
neinzustandes herbeiführen. Diese Besserung hält aber in der Regel nicht
Die Dosierung des J (in 10%ig. alkoh. Lsg.) muß nach dem Zustande des
genau geregelt werden. Zunehmende Härte der Schilddrüse ist eine
ation für Verringerung der Dosis, die bei längerer Behandlung auch sonst,
die anfängliche Besserung eingetreten ist, vorgenommen werden soll. Zu
Gaben können den Zustand eher verschlechtern. (Brit. Medical Journal 1925.

14. St. BARTHOLOMEWS Hosp.)

SPIEGEL.

h. Richet fils, *Physiologie der von ihren zentralen Verbindungen mit Nerven*
Herz isolierten Gefäße. Ausführlichere u. teilweise erweiterte Wiedergabe
früheren Veröffentlichung (vgl. C. r. soc. de biologie 89. 890; C. 1924. -I. 685).
rung der Durchströmungstemp. ergab Zunahme der Durchströmungsmenge bei
inder, Abnahme bei sinkender Temp. Bei Hunden stimmt die Größe dieser
nkungen mit der nach der Viscositätsänderung der Fl. zu erwartenden im
einen überein, bei Kaninchen sind sie aber größer. Auch reagiert entgegen
was nach jenem physikal. Einfluß zu erwarten wäre, die Durchflußmenge um
um stärker als um 20%. — *Digitalis* wirkt erst in sehr hoher Konz. (1% der
rströmungsfl.) vasokonstriktor., *Trinitrin* auch dabei nicht. (Journ. de phy-
t de pathol. gén. 22. 303—11; Ber. ges. Physiol. 28. 117—18. 1924. Ref. LEH-

N)
uigi Villa, *Bestimmungen des Stickstoffs im Blute und in der Ausscheidung*
abetikern während der Insulinbehandlung. Unterss. an 2 Fällen, wo nach je
ulineinheiten Hyperglykämie u. Glykosurie zurückgegangen waren, zeigten im
t auch Verminderung des Refraktionswertes u. N-Gehaltes, auch des Nicht-
e- u. Harnstoff-N. Im Harn (nur in 1 Falle untersucht) hatte die Harnstoff-
scheidung gleichfalls abgenommen. (Problemi d. nutrizione 1. 101—5. Pavia,
Ber. ges. Physiol. 28. 105. 1924. Ref. LAQUER.)

SPIEGEL.

usumu Maki, *Beiträge zur Pharmakologie des Tuberkulins. Versuche am Meer-*
schendarm. Unterss. mit Altuberkulin, albumosefreiem Tuberkulin, zerriebenen
kelbazillen u. Extrakten aus tuberkulösen Organen ließen keinen Unterschied
rkg. auf den Darm gesunder oder tuberkulös erkrankter Meerschweinchen
einen. Sie erregten meist die glatte Darmmuskulatur, nur das albumosefreie
rat lähmte sie. (Dieses bewirkte am isolierten Froschherzen in hoher Konz.
Stillstand, der durch Atropin u. Strophanthin nicht behoben werden konnte.)
I) Empfindlichkeit des Darmes gegen *Adrenalin* scheint beim tuberkulösen Tier
herabgesetzt zu sein. (Ztschr. f. d. ges. exp. Medizin 44. 143—57. 1924.
nurg, Univ.)

SPIEGEL.

Watson-Williams, *Psicain, ein künstliches Cocain*. Bei Anwendung in der
s fand Vf. Psicain etwa ebenso wirksam wie natürliches Cocain, wobei auch
e „Schrumpfung“ eintritt. Wahrscheinlich werden Nebenwrkkg. wie Erregung,
e usw. durch Psicain nicht so leicht hervorgerufen, so daß es bei empfind-
e Personen von Nutzen sein kann. (Brit. Medical Journal 1925. I. 11. Bristol
Infirmary.)

SPIEGEL.

J. Copeland, *Psicain, ein neues Lokalanästheticum*. An der Hornhaut fand
icain 16mal schwächer anästhesierend als Cocain; auf die Herzfasern des
u. die sensor. Fasern des vorderen Cruralnervs wirkte es im Vergleich zu
u. Tutocain sehr schwach (*Novocain* wirkt auf die letzten ebenso stark
rid wie Cocain, auf die ersten aber selbst in doppelter Konz. gar nicht). Bei
ehen wirkt Psicain subkutan mehr tox. als Cocain, intravenös etwa ebenso,
erschweinchen u. Mäusen schwächer. Die Symptome der Wrkg. sind im
uter, aber nicht im Grade gleich denen des Cocains. Die erregende Wrkg.

des Psicains ist stärker, die Reizwrkg. geringer, Wrkg. auf Gefäße relativ geringer. Im ganzen kommt Vf. zu einer Ablehnung des Psicains. (Brit. Medical Journal 1925. I. 9—11.) SPIEGEL.

A. Le Comte, *Ist Campher ein Reizmittel für das Herz?* Campher ist als Öl ein Spasmolyticum u. wirkt daher lähmend auf glatte Muskeln. Seine Anwendung ist daher angezeigt bei Überreizungen des Herzens, nicht bei Lähmungserscheinungen u. Verblutungen. (Nederl. Tijdschr. Geneeskunde 68. II. 3248. 1924. Hilversum.) GROSZFE.

Wilhelm Heupke, *Über die Einwirkung von Arzneimitteln auf die Gehirnwirkung des Menschen.* Bei 2 Hirnverletzten wurden folgende Wrkgg. verschiedener Substanzen beobachtet: Amylnitrit u. Nitroglycerin steigerten stark die Blutfüllung des Gehirns. Coffein verengte die Hirngefäße nach kurzer Erweiterung. Campher, Strychnin, Pyramidon u. Luminal waren in therapeut. Gaben ohne Einfluß auf diese Gefäße, A. teils unwirksam, teils dauernde Schwankungen des Blutdrucks bedingend. Adrenalin verminderte die Blutfüllung nicht oder sehr wenig. (Ztschr. f. d. ges. exp. Medizin 44. 198—214. 1924. Frankfurt a. M., Univ.) SPIEGEL.

Otto Kauders, *Über die Wirkung kleiner Chinindosen auf die therapeutische Impf-Malaria.* 0,1—0,3 g Chinin sind meist genügend, um die Fieberanfälle bei Impfmalaria vorübergehend abzuschwächen oder ganz zu beseitigen u. sie an einer gewissen Pause wieder zu provozieren. Dabei zeigten sich 3 verschiedene Stufen der Chininempfindlichkeit, damit auch verschiedene Reaktionsarten der Aale. Bei einer Reihe, die auf die kleine Dosis mit Aufhören des Fiebers bei positiver Parasitenbefunde reagierten, dürfte es sich um Immunisationsvorgänge handeln. In einigen Fällen dieser Gruppe ließen sich eigentümlich degenerierte Parasitenformen nachweisen, den Chininformen ähnelnd, aber davon durch absol. Chronizität u. mangel unterschieden. (Ztschr. f. d. ges. exp. Medizin 44. 69—82. 1924. Frankfurt a. M., Univ.) SPIEGEL.

H. J. van Giffen, *Vergiftung mit dem Milchsafte von Euphorbia tirucalli.* Anlässlich eines Vergiftungsfalles wurden die Eigenschaften dieses auf Schleimhäute sehr heftig wirkenden Milchsafte, wie folgt, näher ermittelt: Mkr. knäuelartige körnige Stärkekörnchen, Milchsaftegefäße, in polarisiertem Licht aufleuchtend vorz. einzeln Ringtracheiden vorhanden. Aus PAe. nadelförmige Krystalle F. ca. 174°, unscharf. 5 cem der Lsg. + 5 cem etwas HNO₃-haltige H₂SO₄ (1 Tropfen/2 cem) liefern roten Ring. Rückstand mit wenig H₂SO₄ befeuchtet, liefert Orangefärbung. Physiolog. Verss. mit alkoh. Auszuge: Eine Spur auf der Zunge bewirkt ein haltendes Brennen u. Flimmern. Eine Spur in W. (10 mg Extrakt/Liter) lähmt u. tötet Goldfische, bewirkt im Kaninchenauge heftige Entzündung. (Pharm. Tijdschr. voor Nederlandsch Indie 1. 376—87. 1924.) GROSZFE.

G. Buglia und G. Barbieri, *Warum das Aalgift nach Einführung durch den Magen nicht giftig ist.* (Vgl. BUGLIA, Arch. ital. de biol. 72. 81; C. 1924. II. 300.) Behandelt man die wss. Auszüge mit Quarz verriebener junger Aale mit HCl, wird die Giftwrkg. vermindert; bei 0,1—0,3% HCl ist sie (für Frösche) völlig verschwunden, bei höherer Konz. tritt sie wieder auf. NaOH führt ebenfalls zu Entgiftung, am besten bei 0,3%. An Hunden zeigt sich die Entgiftung durch HCl zwar auch, aber nicht vollkommen. Das Ausbleiben von Vergiftungen bei Verwendung von Aalen zur Ernährung erklärt sich durch Zerstörung des Giftes durch den sauren Magensaft u. den alkal. Darminhalt. (Arch. ital. de biol. 72. 11—15. 1923. Pisa, Univ.; Ber. ges. Physiol. 28. 160. 1924. Ref. FLURY.) SPIEGEL.

Giorgio Ferri, *Untersuchungen über den Schlangenbiß und die Vergiftung durch Schlangen.* Feststellungen über die Art, wie der Biß von Vipera ammodytes wirkt. In Bestätigung älterer Verss. von M. u. C. PHISALIX wurde festgestellt, daß subcutane Einspritzung von wss. Extrakt des Wiesenchampignons Meerschweinchen gegen

gift immunisiert. Die Immunität ist nach 2 Tagen vollständig. Das reife, tragende Gewebe des Champignons ist giftig, sein wss. Auszug wirkt bei innerer Injektion unter Umständen tödlich. (Boll. dell'Ist. sieroterap. Milanese 3. 5. Pavia, Univ.; Ber. ges. Physiol. 28. 159. 1924. Ref. FLURY.) SPIEGEL.

F. Pharmazie. Desinfektion.

H. Wester, *Angreifbarkeit (Brauchbarkeit) einiger Metalle, von Emaille und an durch Bereitung einzelner pharmazeutischer Präparate usw.* Verss. über law. von Extrakten aus Cortex Cascara, Aloe, Pulpa Tamarindorum cruda, des Myrtilli sowie von 0,186-n. H_2SO_4 u. 0,9-n. NaOH auf Platten aus Neusilber, Nick, Nirostastahl, Rotkupfer, Messing, Phosphorbronze, Emaille, Zinn u. zian lassen das letzte, wenn von guter Qualität, als vorzüglichstes Material für pharmazeut. Präparate erscheinen. Von Metallen u. Legierungen kann bisher nur Nirostastahl als allgemein verwendbar in Betracht kommen. (Pharm. Med. 62. 26—28. Arch. der Pharm. 262. 575—77.) SPIEGEL.

Golaz und K. Siegfried, *Über die Extraktion der therapeutischen pflanzl. Substanzen.* Das Problem der Extraktion dieser Substanzen erfordert die Kenntnis der chem. u. biolog. Zus. der frischen Vegetabilien u. der getrockneten, welche zur Extraktion verwendet werden sollen. Zu berücksichtigen sind law. der Oxydasen u. Peroxydasen, die Abscheidung der Ballaststoffe u. dgl. schildert die zweckmäßige Extraktion der frischen Vegetabilien, der getrockneten im allgemeinen, sowie im besonderen die Extraktion der zuckerhaltigen, der Glycyrrhiza glabra, die der aromat. Stoffe, Glucoside, glucosid. Tannoide, beide enthaltenden Drogen, wie Opium, der Atropindrogen, Chinindrogen u. Mutterkorns. (Schweiz. Apoth.-Ztg. Sonderbeilage Dezember 1924. 16—22.) Dr.

Siegfried, *Grundlagen zur Extraktbereitung.* Bei der Extraktion sollen die wirksamen Stoffe ausgezogen werden, die aber beim Trocknen u. Extrahieren viel verändert werden, z. B. bei Cola bzw. bei Digitalis. Es bedarf daher bei diesen Punkten einer intensiven Aufklärungsarbeit, auch über die Stabilisation der Drogen. (Schweiz. Apoth.-Ztg. Sonderbeilage Dezember 1924. 22—28.) DIETZE.

Arends, *Konzentrierte Decocta und Infusa.* Abkochungen u. Aufgüsse sind einfach zu bereiten. Diese uneingeschränkte Verwerfung von konz. Aufgüssen, die in Deutschland zurzeit noch geübt wird, ist nicht überall gebräuchlich. In bestimmten Fällen könnte neben dem Infusum eine *Tinctura Ipecacuanhae aquosa* geführt werden. Vorschrift wird gegeben. (Pharm. Ztg. 70. 29.) DIETZE.

Casparis, *Über das Ammoresinol.* Der mit verd. NaOH aus Ammoniacum herausgelöste Anteil (58%) wurde acetyliert; ein gut krystallisierendes Monoammoresinol wurde in farblosen Prismen erhalten u. daraus durch vorsichtiges Schmelzen das ursprünglich im Harz vorliegende Ammoresinol in farblosen, sechsseitigen Blättchen vom F. 110° , Zus. $C_{18}H_{24}O_3$. Acetylderiv. F. $102,5^\circ$, Benzoylderiv. F. $102,5^\circ$. Ammoresinol hat phenol. HO-Gruppe u. stark sauren Charakter; Funktion der anderen O-Atome noch unbestimmt. Gibt keine cholesterinähnlichen Rkk. Mit Fehlings Reagens beim Erwärmen schmutzigrot. Aus alkal. Lsgg. durch CO_2 in Fehlingsche Lsg. wird nicht reduziert. Löst sich in Chlorkalklg. mit gelber Färbung, bedingt die Pluggesche Chlorkalkrk. der Droge; die rote Färbung wird bald hellgelb, Fl. trübt sich. Mit NH_3 krystallin. Verb., die mit W. verd. gespalten wird. Ag-Verb. leicht zersetzlich. Opt.-inakt. Mit Luft, Licht u. Wärme wird es gelb u. verharzt. Aus Lösungsm., außer Bzl., scheidet es sich als krystallin. Substanz aus. Ammoresinol ist kein Salicyl-deriv., läßt sich mit Lubanolbenzoat in Parallele setzen; beide sind Proto-

retine (nach TSCHIRCH). (Schweiz. Apoth.-Ztg. Sonderbeilage Dezember 1923—34.)

E. Wilczek, *Bemerkung über zwei neue alkanninhaltige Pflanzen*. Die Wurzeln von in Tunis gesammeltem *Echium humile* Desf. sind in frischem Zustande fälschlich beim Trocknen färben sie sich rot. Ein chem. u. spektr. Vergleich der Tinkturen von *Echium humile* u. *Alkanna* ergab Identität der Farbstoffe. Die trockenen Wurzeln von *Echium longifolium* Lam. u. anderen verwandten aus Marokko enthalten Alkannin, dieses ist weder bei *Alkanna*, noch bei *Echium* präformiert. (Schweiz. Apoth.-Ztg. Sonderbeilage Dez. 1924. 14. Lausanne.)

L. Winkler, *Die Signaturlehre und deren Arzneimittel*. Signaturlehre ist die früher übliche Heilmittellehre von der arzneilichen Verwendung von Drogen nach ihrer „Signatur“. PARACELSUS gab die Parole aus, daß die Naturprodd. zu einem Zwecke der Erkenntnis ihrer Wrkg. bezeichnet oder „signiert“ seien, z. B. Gichtkraut wegen der Blattform für Milzleiden, Leberkraut für Leberleiden usw. Die wissenschaftliche Beziehung zu dieser Lehre steht die heutige Homöopathie u. auch die moderne Organotherapie. Durch zahlreiche Beispiele wird die Signaturlehre erläutert. (Arch. der Pharm. 262. 520—27. 1924.)

Willi Wobbe, *Spezialitäten und Geheimmittel*. *Albusol* (WOLFG. SCHIDLER, Serumwerk A.-G., München IX), indifferentes Eiweißpräparat zur unspezif. Körpertherapie, soll die „Abwehrbereitschaft des Körpers“ erhöhen. (Arch. der Pharm. 262. 534—43. 1924.)

H. Mentzel, *Neue Arzneimittel, Spezialitäten und Vorschriften*. *Lorocopräparat* (LOUIS RITZ & Co., Hamburg 8), *Lorococreme*, amerikan. Vaseline Wilburine, *Lolol* u. *Al-Lactat*; *L.-Katarrh-Remedy*, Menthol; *L.-Rheumasalbe*, Salicylsäure; *L.-Rheumseife*, S u. HCOOH ; *L.-Hämorrhoidalsalbe*, Perubalsam; *L.-Peruschwefelpomade*, *S Balsam peruv.* — *Stenergine* (A. BEAUGONNIN, Paris), nucleinsaures Mn. — *Stener* (Ap. SCHUHS, Köln), homöopath. Komplexmittel, bei Kropf. — *Tonarsan* (Pharm. zeutika A.-G., Wien-Graz), Monomethyldinatriumarsenat in Ampullen. — *Urui* (A. BEAUGONNIN, Paris), bernsteinsaures Li, bei Arthritis, per os 0,05—0,06; per injection 0,02 g. — *Alcesta*, Tabletten mit Alkaloiden von 0,6 g Rad. Ipecac. hydr. Al-Silicat. — *Decholin* (J. D. RIEDEL, Berlin-Britz), dehydrocholsäure Natrium bei Erkrankungen der Leber- u. Gallenwege, in 5- oder 20%ig. Lsg. intravenös. — *Gute-Fee* (WIELAND-Apotheke, Charlottenburg), Fluidextrakt von *Cochlearia officinalis*, *Betula alba*, *Hamamelis virg.*, *Gelsem. semperv.* u. *Sulfur*. Dil. D. 10, bei *Ischias*. — *Plumhoff-Rheuma* (FRITZ W. PLUMHOFF, Berlin W. 62), 10% *Salicylsäure* u. überfettete Kaliseife. — *Proktosalsuppositorien* (HENRY COHRS, Hannover), gegen Hämorrhoiden. (Pharm. Zentralhalle 65. 733—35. 1924. 66. 8—9.)

—, *Spezialitäten und Geheimmittel*. *Asbisan* (Stella-Labor., Hamburg), bisher Bismarsan. — *Besana*, Na-Glycerophosphat u. NaHCO_3 , Ol. Menthol. — „Autospor.“ — *Neopanchinal* (Dr. K. SCHMITZ, Breslau), dickfl. Chinaextrakt. — *Nymphosansirup* (Nymphosan-A.-G., München), „Emulsion“ des Zimtsäureäthers mit Maltose, Fe, NaBr u. Na-Benzoeat, gegen Tuberkulose, Asthma usw. — *Partagon* (SANDOZ, Basel), Urethralstäbchen mit AgCl, NaCl u. AgNO_3 . — *Pan* (Ges. f. biochem. Erzeugn., München O. 27), Proteinkörperpräparat mit Eiweiß u. Milcheiweiß, Roborans. — *Quimbo* (TROMMSDORFF, Aachen), Waschsall. — *Tussiva-Hustensaft* u. *Tussiva-Hustenbonbons* (EDUARD PALM, München 23), enthalten K-Sulfoguanajacolat. — *Verit* (Pharm. Labor. Verit, Halle a. S.), Schmerzmittel aus ZnO, A., Thymol, Oleum Cinnam., Caryophyll., Menthol, pip. — *Weh-vergeh* (Apoth. H. KONRAD, Mügeln b. Leipzig), poröses Kautschukpräparat mit Camphor, Rosmarin-, Thymianöl, Extr. Lauri eps., Salicylsäure, Phenol, Chlorophyll. (Apoth.-Ztg. 40. 21—22.)

ie Kansas Blackleg Serum Company, Inc., Denver, Colorado, übert. von: M. Franklin, Amarillo, Texas, V. St. A., *Herstellung eines Impfstoffes* der die Klauenseuche der Schafe. Man züchtet den Erreger der Krankheit in geeigneten Kulturmedium unter aeroben Bedingungen, behandelt die Kultur dem Desinfektionsmittel, ohne die Antigene zu zerstören, u. dekantiert einen Teil der überstehenden Fl. ab oder schleudert die abgetöteten Bakterien aus u. trocknet sie. — Zur Herst. des Kulturmediums wird gemahlene Leber mit W. extrahiert, hierauf gekocht u. der Saft aus dem Brei austr. Zu der Bouillon wird die übliche Menge an Pepton u. Nährsalzen gegeben. Alsdann ein geschlossenes, Stärke u. CaCO_3 enthaltendes Musselinsäckchen eingehängt u. das Kulturmedium wie üblich sterilisiert. Das Einbringen der u. des CaCO_3 in dem verschlossenen Säckchen erfolgt zwecks Verhinderung des Verschens dieser Stoffe mit der Nährfl. u. zwecks späteren leichten Abtrennens der gewonnenen Bakterienkultur. Stärke u. CaCO_3 beschleunigen das Wachstum der Bakterien, das letztere dient auch dazu, die pH der Fl. nahezu neutral zu halten. Dieses Kulturmedium wird alsdann mit erkrankten Schafen frisch entnommen, gereinigten unverdünnten, virulenten oder pathogenen Bakterien geimpft. Züchtung des Erregers der Klauenseuche „Clostridium chauvei“, eines anaeroben, widerstandsfähige Sporen bildenden Bakteriums, erfolgt in dem beschriebenen Medium unter aeroben Bedingungen. Ist eine genügende Vermehrung der Bakterienkolonie erfolgt, so wird die Fl. zwecks Entfernung gröberer Teilchen auf Baumwolle oder ein Drahtnetz geseiht, mit $\frac{1}{2}\%$ des Gesamtvolumens an 37 bis 45° CH_2O versetzt u. 3—7 Tage auf einem Wasserbad bei ca. 45° gehalten. Vegetativen u. Sporenformen der Bakterien werden so abgetötet, nicht jedoch die Antigene, die ihre volle Immunitätswirkg. beim Impfen der Tiere mit der Vaccine behalten. Man gießt schließlich nach Absitzenlassen der Bakterienleiber, die überstehende Fl. bis auf $\frac{1}{10}$ des ursprünglichen Vol. ab u. trocknet sie. Das erhaltene trockne Pulver kann entweder in einer geeigneten Fl. suspendiert oder in Wasser injiziert oder zu Kügelchen geformt werden. (A. P. 1511557 vom 10/2. 1924, usg. 14/10. 1924.)

SCHOTTLÄNDER.

lle & Co., Aktiengesellschaft, Biebrich a. Rh., *Herstellung eines Nährmediums für Influenzabacillen und zur Herstellung von Impfstoffen aus diesen*, 1. dad., daß Pneumokokken- u. Streptokokkenkulturen durch Erwärmen auf etwa 50° abgetötet werden, worauf die so erhaltenen Kulturen, mit Venenblut versetzt zu werden verarbeitet werden. — 2. dad. gek., daß man auf diesen Nährböden getötete Influenzabacillen mit NaCl-Lsg. aufschwemmt u. mit schwach saueren Stoffen so lange behandelt, bis nur ein Teil der Influenzabacillen aufschwammen wird, worauf man den Impfstoff auf die gewünschte Verd. einstellt. — 3. werden Strepto- u. Pneumokokken aus Grippeputum oder Grippeemphysem in der Bakteriologie üblichen Plattenverf. in Reinkultur gezüchtet u. auf Virulenz an weißen Mäusen durchgeprüft. Bei einem Titer von 1 : 10000 wird die Reinkultur weiter gezüchtet. Aus den Bouillonreinkulturen werden die Bakterien abgetrennt u. bei 35° mit physiolog. NaCl-Lsg. ausgeschüttelt. Nach 1 std. Erhitzen der M. auf 56° wird mit Kaninchenblutagar (9 Teile auf 1 Teil Schüttelmedium) vermisch. Auf diesem Nährboden werden die Influenzabacillen wie üblich aufgezogen, nach gutem Wachstum mit ca. $\frac{1}{2}$ —1% ig. Milchsäure-NaCl-Lsg. von den Nährböden abgeschüttelt u. bis zum vollständigen Aufschluß digeriert. Das Prod. wird etwa die gleiche Menge nur mit NaCl-Lsg. abgeschüttelter Influenzabacillen hinzugesetzt. Die gemischten Aufschwemmungen werden auf dem Diaphanieverf. nach einem Standardtyp eingestellt. Die so gewonnenen Impfstoffe haben unverkennbare spezif. Heilwirkg. bei Grippe u. Grippepneumonie. (A. P. 196830 vom 27/9. 1922, usg. 10/5. 1924.)

SCHOTTLÄNDER.

Rudolf Reitler, Wien, *Herstellung einer neuartigen Vaccine*, 1. dad. gek. da man eine Kultur der fluoreszierenden Art von *Bacterium proteus*, die aus gonorrhoeisch erkrankten Organen isolierbar ist, für sich allein oder im Gemenge mit einer Bakterienkultur eines spezif. Erregers in üblicher Weise zu einer Vaccine verarbeitet. — 2. dad. gek., daß man eine Vaccine aus der fluoreszierenden Art von *Bacterium proteus*, die aus gonorrhoeisch erkrankten Organen abscheidbar ist, mit einer Vaccine eines spezif. Erregers vermischt. — Man stellt z. B. eine Aufschwemmung von einem Gehalt von 20 Millionen Gonokokken u. 40 Millionen *Bacterium proteus* pro ccm in 0,5%ig. Phenollsg. her, indem man Gonokokken- u. Proteuskulturen auf festen Nährböden mit der Phenollsg. abspült. Dann wird die Gonokokkenaufschwemmung auf 40, die Proteusaufschwemmung auf 80 Millionen Keime pro ccm mit Phenollsg. verd. Diese beiden Aufschwemmungen werden miteinander zu gleichen Teilen vermischt u. in Ampullen gefüllt, die nach Verschluss an drei aufeinanderfolgenden Tagen je 1 Stde. lang auf 60° erwärmt werden. Die zur Verwendung kommende, sich in einer fluoreszierenden Abart des *Bacterium proteus* zuweilen als Begleiter von gonorrhoeischen Urethriden u. Cystiden in der Harnröhre u. im Harn findende Bakterienstamm ist wie folgt gek., 1. morphologisch bewegliche, in ihrer Größe sehr schwankende Stäbchen von ca. 2 μ Länge, ranzig negativ, peritr. Begeißlung; 2. kulturell auf allen üblichen Nährböden leicht wachsend, starke B. eines *Bacterium fluorescens*, Kolonien rund, leicht gebuchtet, Gelatine wenig verflüssigend; *Drygalski*-Agar bleibt unverändert (keine Evans Säuren), Sporen fehlen. Zur Herst. der Aufschwemmung werden Reinkulturen des Bakteriums auf Agar mit physiolog. NaCl-Lösg. abgespült u. nach Abtöten entweder allein bei Infektionen mit nicht kultivierbaren Erregern oder in Mischung mit Vaccinen kultivierbarer Mikroorganismen verwendet, u. zwar in Form von intramuskulären oder intravenösen Injektionen. (Oe. P. 93946 vom 6/12. 1921, ausg. 0. 1923.) SCHOTTLÄNDER.

Franz Ressel, Wien, *Herstellung eines Präparates zum provisorischen Auffüllen der Wurzelkanäle und Kronendefekte*, dad. gek., daß ZnO, ZnSO₄, CaCO₃, Mastix, Glycerin, Sandarak, Vaseline, Ceresin u. Bienenwachs unter Anwendung von Lithium zu einer leicht knetbaren M. verarbeitet werden. — Man schmilzt die Bestandteile bei ca. 70° zusammen u. setzt nach Bedarf die bei der Zahnbehandlung üblichen Desinfektionsmittel zu. Die keine Guttapercha enthaltende M. kann bereits bei 3 g brauchsfertig gemacht werden u. übt keine Reizwirkung aus. (Oe. P. 96963 vom 10. 1923, ausg. 26/5. 1924.) SCHOTTLÄNDER.

Alexander Keskula, Zürich, Schweiz, *Schönheitsmittel*, das auch hautpflegend, hygien., d. h. äußerlich erfrischende u. desinfizierende Eigenschaften hat, gek. u. eine gesätt. Lsg. von H₃BO₃ in A. — Zum Gebrauch wird das Mittel, dem außer Glycerin oder ein Riechstoff, wie Benzoecharz, zugesetzt sein können, mit Watte auf das Gesicht aufgetragen u. hinterläßt nach dem Trocknen einen matten, mattfälligen, weißen Schimmer auf der Haut. (Schwz. P. 102863 vom 5/8. 1922, ausg. 2/1. 1924.) SCHOTTLÄNDER.

G. Analyse. Laboratorium.

O. Wittstock, *Ein praktischer Gasentwickler*. Der App. (Abbildung in Original) eignet sich besonders zur Entw. von HCl. Er besteht aus einem Erzeugungsgefäß, auf dem sich ein Aufsatz in Form einer Woulffschen Flasche befindet, der am Boden 2 verschieden lange Röhren hat. Die kürzere ist durch einen Hahn verschließbar. Das entwickelte Gas streicht durch die H₂SO₄ im Aufsatz und wird so getrocknet. (Ztschr. f. angew. Ch. 38. 14—15. Godesberg.) J. G.

Marie Anna Schirmann, *Über die Erzeugung, Erhaltung und Messung hoher Vakua*. (Die Extremvakuumpumpe, das Adsorptionsmanometer). Vf. beschreibt

(Einzelheiten anzugeben) die Möglichkeit, eine Pumpe mit einer Saugwindigkeit bis 30 l/sec zu konstruieren, welche bei Verwendung von Absorptions- ein Extremvakuum von 10^{-12} — 10^{-15} mm erreichen soll. Mittels elektrodenentladung werden diese Extremvakua aufrecht erhalten u. mittels Absorptionsmeter gemessen. (Physikal. Ztschr. 25. 631—35. 1924. Wien, Univ.) BECKER.

Stern, Schnellviscosimeter. Antwort an KLEVER (S. 411). (Ztschr. f. angew. 945. Charlottenburg. 1924.) JUNG.

C. Mc Lennan und G. M. Shrum, Eine neue Art von Metallvakuumflaschen. Proc. Trans. Roy. Soc. Canada [3] 16. Sekt. III. 31; C. 1922. III. 474.) Vff. eine Beschreibung u. Abbildung eines Metallvakuumgefäßes (Nickelsilber) zur Absorption von H_2 . Der Absorptionsbehälter ist so eingebaut, daß 30 g Holz- darin der tiefsten Temp. unterworfen werden können. Besondere Beachtung verdient der ähnlich wie ein kleiner Blasebalg konstruierte Expansionsraum. (Proc. Roy. Soc. Canada [3] 18. Sekt. III. 151—53. 1924. Toronto, Univ.) JOS.

Adolf Auerbach, Beiträge zur Meßmethodik und zur Theorie, der Diffusions- gefärbter Stoffe. Die Diffusion in verd. Gelatinesgg. verläuft symbar mit ungehinderten Diffusion. Für Teilchen, die über eine bestimmte Größe hinaus- wirkt eine Gelatinegallerte als Ultrafilter. Verss. über Diffusion durch verd. sind deshalb zur Charakterisierung von Systemen, die an der Grenze von kolloider u. kolloider Zerteilung stehen, sehr geeignet. Das Fortschreiten der Diffusion kann nach einer vom Verf. angegebenen Methode colorimetr. einfach u. verfolgt werden. Die Abhängigkeit der Diffusion von der absol. Teilchen- wird auf Grund des Einsteinschen Gesetzes berechnet u. führt zur Auf- einer Standardkurve für die Dispersoidanalyse von Farbstoffen. (Kolloid- 35. 202—15. 1924. Leipzig, Univ.) THIESSEN.

A. Thiessen, Leitfähigkeitsmessungen mit Wechselstrom unter Anwendung empfindlichen Gleichstromnullinstrumentes. Wechselstrom beliebig zu wählender Spannung wird in die Meßbrückenschaltung gesandt. An der Stelle, an der bei der Schaltung das Telephon (Nullinstrument) hängt, wird der Wechselstrom durch einen von Eigenschwingungen freien Elektronenröhren-Verstärker verstärkt. Der verstärkte Wechselstrom wird durch eine Elektronenröhre gleichgerichtet (Gitter- schaltung) u. mittels eines empfindlichen Drehspuleninstrumentes gemessen. Die objektive Ablesbarkeit der Galvanometerausschläge kann die Nullstellung der Meßbrücke sehr genau ermittelt werden. (Ztschr. f. Elektrochem. 30. 473—74. Göttingen, Univ.) THIESSEN.

Percy Baumberger, Drei Hinweise bezüglich der Wasserstoffelektroden- technik. Eine Pt-Folie kann dünner, spiralig gewundener, glatt gehämmert werden. Als Verb. werden mit KCl gesätt. Agarröhren empfohlen. Auch wird eine einfache Schüttelanordnung beschrieben. (Journ. of laborat. med. 9. 720—22. STANFORD Univ.; Ber. ges. Physiol. 28. 322. 1924. Ref. ANT.) SPIEGEL.

Friederich, Das Interferometer und seine Verbindungsmöglichkeiten. (Druck- Original: Verwendungsmöglichkeiten.) Vortrag. (Süddtsch. Apoth.-Ztg. 64. 1924.) JUNG.

Vili Claus, Über elektrometrische Analysen. In Anlehnung an KOLTHOFF werden die elektrometr. Analysenverf. eingeteilt in: 1. einfache Leitfähigkeits- messungen, 2. konduktometr. oder Leitfähigkeits-Titrationen, 3. potentiometr. oder Redox-Titrationen. Ihre theoret. Unterlagen werden nacheinander besprochen, und einzelner Beispiele wird das Wesentlichste dieser Verf. erörtert u. gezeigt, daß es heute schon möglich ist, mit analyt.-gravimetr. bisher schwer faßbaren Substanzen auf leichter Art fertig zu werden u. die Best. mehrerer Stoffe nebeneinander

in einer Lsg. ohne große analyt. Operationen unter größter Zeitersparnis mit Genauigkeit vorzunehmen. (Gießereiztg. **22**. 7—12.) NEUFÉ

W. Jaeger und H. von Steinwehr, Über die Festsetzung der Verbrennungswärme von Normalsubstanzen. (Vgl. ROTH, Naturwissenschaften **12**. 622; C. **1919**. II. 1831.) Es wird nur die Verbrennungswärme von Benzoesäure behandelt P. T. FISCHER-WREDE 1909—1911 u. DICKINSON; 26470 u. 26436 Joule pro g, auf Vakuum reduziert, DICKINSONS Zahl mit dem elektr. Wärmeäquivalent der Vff. Dtsch. Physik. Ges. **21**. 25; C. **1919**. I. 801) aus dem Wert in cal.₂₀ berechnet. Die Abweichung der beiden Zahlen vom Mittel übersteigt nicht die Genauigkeitsgrenze der Einzelwerte. Der von den Vff. berechnete Mittelwert weicht über $\frac{1}{2}$ Promille von dem durch die „internationale“ Kommission angenommenen Dickinsons Wert ab. Die Kritiken, welche die Zahlen von FISCHER-WREDE u. die Einzelnachrichten der Reichsanstalt erfahren haben, werden zusammengestellt. Wenn Differenzen bestehen, dürfen diese nicht ohne weiteres auf die Eichung geschoben werden. Das Bureau of Standards u. die Physikal.-Techn. Reichsanstalt müssen, unter Entscheidung herbeizuführen, die Messungen unter Benutzung derselben Eichsubstanz wiederholen. Der von der „internationalen“ Kommission geäußerte Wunsch, daß das Verhältnis zwischen Joules u. cal. genau bestimmt wird, ist bereits in den Messungen der Vff. erfüllt. (Ztschr. f. physik. Ch. **114**. 59—64. 1924. h. Lottenburg, Phys.-Techn. Reichsanstalt.) W. A. ROTH

W. A. Roth und R. Lassé, Mikroverbrennungsbombe und Mikrocalorimeter. II. Anhang: Abnorme Verbrennungen. (I. vgl. Ztschr. f. Elektrochem. **30**. 41; C. **1924**. II. 2189.) Statt des Mikrobeckmann wird ein gutes, wenn auch langumfassendes gewöhnliches Modell benutzt. Eine bequeme Methode, die Verbrennungsgeschwindigkeit eines calorimetr. Thermometers zu bestimmen, wird angegeben. Geeicht wird das Calorimeter mit Benzoesäure (6324,5 cal pro g) u. verbrannt werden Paraffin. liq. u. reinste Salicylsäure. Die Unsicherheit der Resultate ist halb so groß wie beim Arbeiten mit dem Mikrobeckmann u. kaum größer als bei einer Makrobombe (bei 3—5 Verss. mittlere Abweichung vom Mittel 0,5 Promille, rechnerische Unsicherheit des Resultates 0,3 Promille), Verbrennungswärme von Salicylsäure 5241,5 cal. pro g, in Luft gewogen, wie bei VERKADE u. COUSIN (Rec. trav. chim. Pays-Bas **43**. 561; C. **1924**. II. 1244), wo Salicylsäure als Eichsubstanz vorgeschlagen wird. — Eine unvollständige Verbrennung und Sublimation konnte trotz des kleinen Wegs für die Flamme nicht nachgewiesen werden. W. A. ROTH hatte unvollständige Verbrennung in der Makrobombe beobachtet bei Benzoylsuperoxyd beobachtet (Explosion u. Rußbildung); wahrscheinlich Verbrennungswärme 6417 cal. pro g. Daraus werden weitere thermochem. Werte berechnet. (Ztschr. f. Elektrochem. **30**. 607—9. 1924. Braunschweig, techn. Hochsch.) W. A. ROTH

—, Ein neuer CO₂-Indicator für das Kesselhaus. Der „Apex“ Indicator beruht darauf, daß die durch Absorption der CO₂ hervorgerufene Druckverminderung in einem Röhrenmanometer, dessen Skala nach Gehalt CO₂ geeicht ist, sichtbar gemacht wird. (Engin. Mining. Journ. Press. **118**. 1035.) J. G.

Elemente und anorganische Verbindungen.

E. Rupp, Zur Gehaltsbestimmung von Hydrosulfitpräparaten. Vff. empfiehlt Titersalz anstelle von K₃FeCy₆ Eisenalaun, als Endanzeiger durch etwas Reduktion ammon erzeugtes Ferrirhodanid, das nach Red. des Fe^{III} verschwindet. Die Resultate mit ausgekochter Lsg. liegen um 0,3% höher als mit unausgekochter. Resultate stimmen mit denen nach ORLOFF (vgl. Lunge-Berl **3**. 884) überein. Zur Vermeidung des hohen Verbrauchs an KJ nach diesem Verf. reduziert Verf. g.

Hydrosulfit, filtriert Hg ab, löst in HNO_3 u. titriert mit Rhodanlsg. Eine Al-
lierung der HgCN -Lsg. ist nicht nötig. (Chem.-Ztg. **49**. 42. Breslau.) JUNG.
-, *Entsilberte Kupferlösungen. Schnellbestimmungen des Jodgehaltes*. In den
ten von der Best. des Ag mit ZnJ_2 wird der Überschuß an Reagens bestimmt
Ausschütteln der von Fe befreiten Lsg. mit CS_2 nach dem Ansäuern u. unter
s von konz. HNO_3 . Man stellt zum Vergleich eine Lsg. von J in CS_2 gleicher
efe aus einer Standard-KJ-Lsg. her. (Chem. Trade Journ. **76**. 39.) JUNG.
a. **Rosenthaler**, *Zur Bestimmung des Eisens in Ferrum reductum*. Die Methode
h. Helv. IV. zur Best. des Fe im Ferr. reduct. ist unbrauchbar, ebenso wie
n SCHMIDT zum Nachweis von Hg in Hg_2Cl_2 . — Vf. gibt ein Verf. an zur
hrung der jodometr. Best. des Cu neben Fe. Man oxydiert die zu unter-
ade, überschüssiges Cu enthaltende Fl. bei Vorhandensein von Fe^{++} mit Brom-
Chlorwasser, entfernt den Überschuß durch Kochen, wobei man eine ent-
de Trübung durch verd. H_2SO_4 wegnimmt u. setzt NH_3 im Überschuß hinzu.
igw. von Fe^{+++} fällt die vorherige Oxydation fort. Man füllt auf ein be-
ntes Vol. auf, filtriert u. verwendet einen Teil des Filtrats zur Titration. Dazu
das Filtrat zunächst mit verd. H_2SO_4 angesäuert u. dann mit $\frac{1}{4}$ Vol. konz.
S versetzt. Nach dem Erkalten wird KJ zugesetzt u. die Titration in üblicher
ei zu Ende geführt. Ohne den Zusatz von konz. H_2SO_4 verläuft die Zers. des
langsam; offenbar ist in der Lsg. ein Cu-haltiger Komplex vorhanden, der
die konz. H_2SO_4 aufgespalten wird. (Schweiz. Apoth.-Ztg. **62**. 765—66. 1924.)

DIETZE.

L. Mitschek, *Manganbestimmung in mit Kobalt hochlegierten Spezialstählen*
Verlegerungen. Das Chlorat-Verf., das bei niedrigen Mn-Gehalten versagt,
e gute Resultate (Analysentabelle im Original), wenn man der kobalthaltigen
Lsg. eine abgemessene Menge eingestellte KMnO_4 -Lsg. hinzufügt, so daß alles
s MnO_2 -Hydrat ausfällt. (Chem.-Ztg. **49**. 25—27. Tarnitz a. d. Südbahn.) JU.
s, *Zinnanalyse*. Zur Analyse von Verunreinigungen, wie Cu, Pb, Ni, Zn, Fe
tall. Sn werden 10—50 g des Sn in einem Br_2 -HBr-Gemisch gelöst, die Lsg.
ampft, u. der Vorgang wiederholt. Sn, As, Sb werden auf diese Weise voll-
ag verflüchtigt, während im Rückstand die anderen Metalle nach bekannten
den bestimmt werden. Es wird an mehreren Analysenbeispielen gezeigt, daß
itverflüchtigung von Fe mit dem Sn nicht zu befürchten ist u. daß Fe mittels
otr. Titration quantitativ im Rückstand bestimmt werden kann. (Mitt. Material-
f.-Amt Groß-Lichterfelde **42**. 13—14. 1924.)

BECKER.

Organische Substanzen.

S. West, *Verhinderung der Hypochloritreaktion des Anilins durch Ammoniak*.
lt das mit Hypochlorit zu prüfende Anilin geringe Menge NH_3 oder Ammo-
ulze, so tritt statt der Violettfärbung zunächst Gelb- u. Braunfärbung u. schließ-
eines braunen Nd. auf. Durch Zugabe von HCl oder H_2SO_4 vor Zufügen
ypochlorits wird Violettfärbung erzeugt; alkalisieren wirkt ähnlich, jedoch
er gut. Nach Vertreiben von NH_3 durch Durchleiten von Luft (bei Anwesen-
on Ammoniumsalzen nach Zugabe von Alkali) tritt die Violettfärbung un-
ert auf. Das Ausbleiben der Violettfärbung in Ggw. von NH_3 ist teils auf
k. zwischen Hypochlorit u. NH_3 , teils auf eine Rk. zwischen NH_3 u. der ge-
n Verb. zurückzuführen. NaCl u. andere Salze, wenn sie in hoher Konz.
nden sind, verhindern gleichfalls die Violettfärbung. In Ggw. aller hindernden
tritt die Rk. ein, wenn die Anilinslg. tropfenweise mit der Hypochloritlsg.
eichtet wird. (Ind. and Engin. Chem. **16**. 1270—71. 1924. Chicago, Univ.) HA.
W. van Urk, *Die Reaktion mit Nitroprussidnatrium auf Aceton und Acetaldehyd*.
Bätigung der Angaben von MULLIKEN fand Vf. die Legalsche Rk. mit gereinigtem
II. 1.

Aceton erst orange, nach 20 Min. reingelb, nach Ansäuern mit Eg. purpurstichig, nach 20 Min. noch unverändert, wenn auch etwas abgeschwächt. Reiner Acetaldehyd gibt dagegen schon mit NaOH die rote Färbung, die nach 5 Min. in Orange, nach 20 Min. wieder in schmutziges Violett, nie aber in reines Gelb übergeht, u. nach Zugabe von Essigsäure Orange, das nach 20 Min. fast verblichen ist. Bei Erwärmen der alkal. Lsg. fallen die Proben mit beiden Stoffen grün bis blaugrün aus, was für Acetaldehyd auch bei langem Stehen der essigsauren Lsg. gilt. Bei der Rk. nach ROSENBACH gibt Acetaldehyd überhaupt keine Färbung, ebensowenig bei der Ausführung nach WAGENAAR, bei der übrigens das Ansäuern ganz unterbleiben kann. Bei der Rk. ist die Ggw. von NH_4 -Salz erforderlich, die erste ist empfindlicher. Daß die Rk. mit Acetaldehyd in Ggw. von NaOH, nicht aber in Ggw. von NH_3 eintritt, scheint darauf hinzuweisen, daß zur B. eines gefärbten Prod. mit Nitroprussidnatrium eine Kette von mindestens 3 C erforderlich ist, was beim Acetaldehyd erst in Ggw. von NaOH infolge Aldolkondensation der Fall ist; der Fortgang dieser Kondensation würde dann das Verschwinden der Färbung erklären. (Pharm. Weekblad 1924, 2—8.)

SPIEGEL.

H. W. van Urk, *Das Verhalten verschiedener Ammoniumsalze bei der Reaktion von Rothera*. (Vgl. vorst. Ref.) Verss. mit verschiedenen NH_4 -Salzen zeigten, daß die Rotherasche Rk. auf Aceton am empfindlichsten mit $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ ist. Aus der Reihenfolge der Empfindlichkeit mit den verschiedenen Salzen schließt Vf., daß die Ggw. von NH_4 -Salzen notwendig ist, um die Dissoziation des $\text{NH}_4(\text{OH})$ zurückzudrängen, u. daß in dem verschiedenen Einfluß auf die Empfindlichkeit derjenigen der Anionen auf die Löslichkeit des entstehenden Reaktionsprod. zum Ausdruck kommt. (Pharm. Weekblad 62. 8—10.)

SPIEGEL.

Walter Parri, *Über die Unterscheidung von Citronen- und Weinsäure*. Trägt man in einige ccm einer Lsg. von 3 g Ammoniumphosphormolybdat u. 0,3 g Ammoniumvanadat in 100 ccm konz. H_2SO_4 etwas von der auf Citronensäure zu prüfenden Weinsäure ein, so bildet sich bei Anwesenheit von Citronensäure ein blauer Niederschlag, bzw. färbt sich das Reagens blau. Beim Erwärmen Farbumschlag in Grün, Rückschlag in Blau beim Wiederabkühlen. *Zimtsäure* gibt bei gleicher Behandlung ein flüchtiges Rotviolett, welches beim Erwärmen in Kastanienbraun, beim Abkühlen in Veilchenblau umschlägt, *Bernsteinsäure* in der Kälte u. in der Wärme goldglänzend, *Äpfelsäure* k. goldgelb, w. hellblau, auch beim Abkühlen. (Giorn. di Chim. 1924, ed appl. 6. 537—38. 1924. Udine.)

GRIMM.

Bestandteile von Pflanzen und Tieren.

J. Vincent Falisi und Vera A. Lawton, *Tafeln für blutchemische Berechnungen*. Die unter Benutzung des Systems von FOLIN u. WU aus den colorimetr. Ablesungen errechneten Werte für *Kreatinin*, *Rest-N*, *Harnstoff-N*, *Zucker u. Harnsäure* werden in Tabellen in mg/% gegeben. (Journ. of laborat. and clin. med. 9. 566—71. Denver, FITZSIMONS Gen. Hosp.; Ber. ges. Physiol. 28. 106. 1924. Berlin, SCHMITZ.)

SPIEGEL.

E. Jacobs und W. Scheffer, *Quantitative Urobilinogenbestimmungen im Stuhl*. Unterss. nach der Brugsch-Retzlaffschen Methode unter Benutzung eines dazu geeichten Autenriethschen App. Die Methode gibt im Vergleich zu gewichtsanalyt. Bestst. gute Resultate, einige dagegen erhobene Einwände konnten widerlegt werden. Die n. Ausscheidung von Urobilin (Urobilinogen) im Stuhle wurde zu 0,1 g täglich im Durchschnitt ermittelt. Sie geht parallel dem Blutfarbstoffumsatz, wobei in Wechselbeziehung zwischen Neubildung von Blutkörperchen, Zerfall u. Ausscheidung besteht. Die Resorption oder Zerstörung von Urobilin im Darm errechnet sich auf ca. 40%. Zwischen Urobilingehalt in Stuhl u. Harn besteht keine Parallelität. — Bei mit stärkerer Hämolyse einhergehenden Erkrankungen geht fast das ganze

Urobilin in den Darm über, nur wenig mehr als n. in den Harn, bei Lebererkrankungen umgekehrt. Vielleicht handelt es sich bei Stuhl- u. Harnurobilin um verschiedene Pyrrolkomplexe, die aber bisher nicht unterschieden werden können. Ein Füllen von perniziöser Anämie ist, abgesehen vom Endstadium, die Urobilinausscheidung im Stuhl stets vermehrt (zuverlässiges Frühsymptom), was niemals bei Endokarditis, Carcinom, Aorteninsuffizienz usw. festgestellt wurde. (Ztschr. f. klin. exp. Medizin **44**. 116—42. 1924. Berlin, Charité; Städt. Krankenh. Charlottenburg-Westend.)

SPIEGEL.

F. v. Bruchhausen und Cäcilie Pomp, *Über die Bestimmung des Chroms in biologischen Füllen*. Zur Best. des Cr in toxikolog. Füllen kann man gewichtsanalyt. oder jodometr. verfahren. Letzteres Verf., von GADAMER empfohlen, gibt nur 0% zu niedrige Werte. Nach einer Voroxydation mit KClO_3 wird die restl. Zerstörung der organ. Substanz mit einer Na_2CO_3 - KNO_3 -Schmelze vorgenommen. In alkal. Lsg. der Schmelze wird mit Essigsäure angesäuert u. das Chromat durch Ba^{++} als BaCrO_4 gefällt. Das auf Asbestfilter gesammelte BaCrO_4 wird mit Na_2CO_3 -Lsg. gekocht, das entstandene Na_2CrO_4 wird in saurer H_2SO_4 -Lsg. mit KJ versetzt u. als ausgeschiedene J_2 mit $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ titriert. — Die gefundenen Unterwerte werden durch Nitrite verursacht. Auch Versuche mit $\text{Mg}(\text{NO}_3)_2$ u. H_2O_2 gaben keine einwandfreien Resultate. Brauchbar als Oxydationsmittel war KClO_4 ; Vorversuche mit Chromalaun in der Weise, daß man ein Gemisch von 1 g mit 1 g trockenem Na_2O u. 2 g KClO_4 im Porzellantiegel zum Schmelzen erhitzte, zeigten, daß die Oxydation der Chromverb. in Chromat sehr leicht u. quantitativ stattfindet. Die Zerstörung wurde durch Veraschen bewerkstelligt u. die Asche dann mit Na_2CO_3 -Lsg. in einem Porzellantiegel verpufft. Wenn auf andere Metallgifte Rücksicht genommen ist, wird die auf nassem Wege mit KClO_3 u. HCl zerstörte Substanz mit H_2S von den Metallen der H_2S -Gruppe befreit u. das Filtrat nach dem Einengen möglichst weitgehend verascht. Die etwa noch kohlehaltige Asche wird mit 1 g Na_2CO_3 u. 2 g KClO_4 gemischt u. in Porzellantiegel (50 ccm) in kleinen Portionen eingetragen. Die Verpuffung ist milde, wenn nicht zuviel organ. Substanz vorhanden. Ist die Schmelze nicht gelb, so schmilzt man nochmals mit KClO_4 . Starkes Erhitzen ist nicht statthaft, da Red. zu Chromverb. eintreten kann. Die Schmelze wird mit W. gel., ev. filtriert, mit H_2SO_4 versetzt (auf 15 ccm 1 g), mit 1 g KJ u. nach 10 Min. mit $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ titriert. (Apoth.-Ztg. **40**. 9—10. Marburg, 1924.)

DIETZE.

Lloyd D. Felton, *Ein neuer Indicator zur Prüfung des reduzierenden Vermögens von Bakterien*. (Vgl. Journ. Exp. Med. **38**. 291; C. 1924. I. 1393.) Manche Bakterien färbeln, je nach Beschaffenheit des Nährbodens in verschiedener Stärke, *p*-Nitrophenol in Rot zu erkennen gibt. (Journ. of infect. dis. **34**. 414—19. Boston, HARVARD Univ.; Ber. ges. Physiol. **28**. 143—44. 1924. Ref. SELIGMANN.)

SPIEGEL.

R. Esty und C. C. Williams, *Studien über Hitzeresistenz*. I. Eine neue Methode zur Bestimmung der Hitzeresistenz von Bakteriensporen. 25—30 Röhrchen mit gleichen Sporenaufschwemmungen werden verschiedene Zeit lang erhitzt; der Proz. der Sporen, in denen noch Wachstum auftritt, wird berechnet u. in ein Koordinatensystem (Abszisse = Zeit, Ordinate = Proz. der Überlebenden) eingezeichnet. (Journ. of infect. dis. **34**. 516—28. Boston, Physiol. **28**. 142—43. 1924. Ref. SELIGMANN.)

SPIEGEL.

W. Lamson, *Die van Slykesche Methode für die Bestimmung des Aminosäuregehalts, angewandt für die Untersuchungen von Bakterienkulturen*. Vf. bevorzugt die van Slykesche Methode vor der Sörensenschen, benutzt zur Verhinderung der Gärung Caprylalkohol. Die Ergebnisse sind von der Technik, auch von der Art des Schüttelns stark abhängig. Neben einigen Analysenergebnissen gibt

Vf. theoret. Betrachtungen bzgl. Berechnung des Durchschnittswertes aus verschiedenen Bestst. (Journ. of bacteriol. 9. 307—13. Boston, HARVARD med. school. Ber. ges. Physiol. 28. 141—42. 1924. Ref. KADISCH.) SPIEGEL

C. R. Fellers, O. E. Shostrom und E. D. Clark, *Schwefelwasserstoffbestimmung in Bakterienkulturen und in bestimmten Konserven.* H_2S , aus der Kultur durch Luft ausgetrieben, wird durch Jodlsg. geführt, das dabei verflüchtigte J in $Na_2S_2O_3$ -Lsg. aufgefangen. Jene wird dann mit $Na_2S_2O_3$ -Lsg., diese mit J-Lsg. titriert, den J-Verbrauch zu ermitteln. 15 Min. Durchlüftung lassen 99—100% des vorhandenen H_2S gewinnen. Die gewöhnlichen Stoffwechselprodukte der Bakterien (flüchtige Fettsäuren, Phenol, Indol, Skatol, geringe Mengen NH_3) stören nicht. Für die Unters. ist die Art des verwendeten Peptons von Bedeutung. Mit „Difco“-Pepton erhielten Vf. Entbindung von H_2S bei 12 von 53 untersuchten Kulturen im allgemeinen nicht durch nichtproteolyt. Arten, mit hohen Werten durch Vertreter der Coli- u. Proteusgruppen, Paratyphusstämmen u. einen proteolyt. Anaerobier. — Die Methode ist auch für Unters. von Nahrungsmittelkonserven verwendbar. (Journ. of bacteriol. 9. 235—49. Seattle [Washington], Nat. Canners assoc. Ber. ges. Physiol. 28. 145. 1924. Ref. SELIGMANN.) SPIEGEL

J. Stamm, *Phenolphthalin als Reagens zum Nachweis der Zersetzung des Acetoneäthers.* (Vgl. Pharmacia 4. 18; C. 1924. II. 515). Das empfindlichste Reagens zum Nachweis einer beginnenden Ä.-Zers. ist eine alkal. Phenolphthalinlsg. Zur Darst. kocht man 1 g Phenolphthalein mit 5 g Zn-Staub in 10 g NaOH + 20 g Wasser bis zur Entfärbung, verd. mit W. auf 50 ccm u. filtriert die Lsg. durch Asbest. Zur Ausführung der Probe bringt man 2 ccm dest. W., 1 Tropfen der alkal. Phenolphthalinlsg., 1—2 Tropfen $CuSO_4$ -Lsg. (1 : 2000) zusammen, schüttelt durch u. überschiebt mit 0,5—1 ccm des zu untersuchenden Ä. Ist dieser unzersetzt, so bleibt das Reagens farblos. Enthält der Ä. aber Peroxyde, so bildet sich nach 1—2 min an der Berührungsfläche beider Schichten ein rosa bis intensiv rot gefärbter Ring. — Außer dieser Probe ist es notwendig, die Neßlersche Probe auszuführen, die durch dieselbe der höhere Zers.-Grad des Ä. festgestellt werden kann. — Narkoseflaschen sind in braunen Flaschen, die in schwarzes Papier eingeklebt werden müssen, aufzuheben, da braune Flaschen allein keinen Schutz gegen Licht, auch nicht gegen elektr. Strahlung, bieten. (Pharmacia 1924. 8 Seiten. Sep.) DIETZ

J. I. Dorgels, Delft, Holland, *Calorimeter.* Ein Kessel wird durch zuströmendes W. teilweise gefüllt, wobei die von den Behälterwänden u. dem W. eingeschlossene Luft Anteile des W. in 3 senkrechten Röhren empordrückt. In 2 von diesen Röhren münden Leitungen für das zu untersuchende Gas bzw. die Füllung eines Luftthermometers, welche das W. abwechselnd schließt u. öffnet. Das dritte Rohr enthält einen Überlauf, der den Kessel in regelmäßigen Zeitabschnitten siphonartig entleert. Das zu untersuchende Gas gelangt durch ein Rohr mit unterem Wasserverschluß, der durch das aus dem Kessel ablaufende Wasser zeitweilig geschlossen wird, zu einem Brenner, der mittels einer drehbaren Scheibe, in den Heizraum des Calorimeters geschwungen wird. Im Innern des Calorimeters befindet sich das erwähnte Luftthermometer. Dieses ist mit dem bereits erwähnten absperrbaren Rohr verbunden, von dem eine Zweigleitung zu einem drehbaren Manometer führt, das eine Schreibvorr. betätigt. (E. P. 222 839 vom 22/8. 1924, Auszug veröff. 12. 1924. Prior. 1/10. 1923.) KÜHLING

H. Angewandte Chemie.

I. Allgemeine chemische Technologie.

H. Illies, *Die Quecksilberdampfturbine von Emmet.* Bei der Quecksilberdampfturbine von W. E. R. EMMET wird Hg in einem Kessel bei 2,45 at u. 435° erh.

pft. Der expandierte Hg-Dampf dient zum Antrieb einer Turbine, der Hg-Dampf wird bei 1 at Vacuum u. 210° in einem Kessel zur Erzeugung von Wasserdampf ausgenutzt, der eine Dampfturbine antreibt. Beschreibung u. schemat. der Anlage bei der Hartford Electric Light Co. (Feuerungstechnik 13. 61—62. (gl.) NEUFELD.

O. Brunler, *Dampfkessel mit Innenfeuerung. Seine Bedeutung für die chemische Industrie.* Vf. beschreibt einen Dampferzeuger, bei dem eine Ölflamme unter W. rent u. berichtet über seine Anwendung zum Eindampfen von Pottaschelösungen, LiCl, H₂SO₄ usw. Die Verbrennung in Ggw. von W. liefert höhere calor. Werte als theoret. (Chem. Trade Journ. 76. 10—11.) JUNG.

Georg Weißenberger, *Trocknung empfindlicher gelatinöser Stoffe.* Die Trocknung findet in Kanälen im Gegenstrom statt; die Oberfläche bleibt dann weich u. fl. wird aus der M. gleichmäßig ausgetrieben. Empfindliche Stoffe werden im Luftbetrieb getrocknet; es zirkuliert dieselbe Luft, ein Teil wird abgezogen u. am Kanal Anfang durch Frischluft ersetzt. Die Luftzuführung erfolgt am Boden. Das Ausweichen der Luft zu verhüten, werden die Transportwagen mit Schirmen versehen oder so gebaut, daß sie in das Kanalprofil passen. (Mitt. d. Ges. f. angew. Chem. 3. 1 Seite. Sep. Wien, Techn. Hochschule.) JUNG.

S. C. Prescott, *Die Bedeutung der Bakteriologie für industrielle Probleme.* Kurze Berechnung der Wichtigkeit bakteriolog. u. fermentativer Prozesse in der Landwirtschaft, in der Nahrungsmittel-Konservierungsindustrie, den Leder- u. Faserindustrien, im Gärungsgewerbe, bei der Herst. von Aceton, Butylalkohol, Glycerin, etc., Milch- u. Buttersäure. Ausblick auf die Möglichkeit industrieller Gewinnung von Citronen- u. Propionsäure, n- u. i-Propylalkohol, Amylalkohol u. Glykol durch Mikroorganismen u. die Verwertung synth. Prozesse auf enzymat. Basis, endlich nützliche Bemerkungen über das Fermentproblem, wobei durchgehend die wesentliche Vermeidung jeder Erwähnung der Verdienste Deutschlands an der Bearbeitung der besprochenen Gebiete auffällt. (Journ. Amer. Leather Chem. Assoc. 19. 552—66. 1924. Boston [Mass.]) GERNGROSS.

Wilhelm Secker, München, *Herstellung eines säurebeständigen Überzuges für Behälter*, unter Verwendung einer aus S mit säurebeständigen Zusätzen bestehenden M., 1. dad. gek., daß die M. in geschmolzenem Zustand als Verputz auf Betonwand aufgetragen u. mit h. Eisen zusammengesmolzen, gedichtet u. die Oberfläche mit h. Eisen geplättet wird. — 2. M. bestehend aus einer Mischung von Fein- u. grobkörnigem Fein- u. grobkörnigem Ton. (D. R. P. 407823 Kl. 12f vom 12/10. 1921, ausg. 1924.) KAUSCH.

Paul H. Müller, Hannover, *Vorrichtung zum Ausscheiden fester Stoffe aus Flüssigkeiten* mit im wagerecht gelagerten Abscheideraum parallel zueinander angeordneten Wänden, 1. dad. gek., daß ein sich stetig bis auf den Querschnitt des Abscheideraumes erweiterndes Zuführungsrohr u. ein sich stetig verjüngendes Abführungsrohr vorgesehen ist, u. daß die Trennungswände in der Strömungsrichtung fl. u. schräg von oben nach unten unter Freilassung eines Zwischenraums am unteren Ende verlaufen, wobei der Abscheideraum gegebenenfalls die Gestalt eines dreiseitigen oder vierseitigen auf eine Kante gestellten Prismas besitzt. 2. dad. gek., daß der Abscheideraum zylinderförmig gestaltet ist, wobei ein zylinderförmiger, als Schlammabfuhrungskammer dienender Ausbau am unteren Ende des Abscheideraumes vorgesehen ist. (D. R. P. 407374 Kl. 12d vom 25/3. 1924, ausg. 19/12. 1924.) KAUSCH.

De Laval Separator Company, New York, übert. von: **Cyrus Howard Hapgood**, Nutley, N. J., *Trennen fester Stoffe von Flüssigkeiten.* Man unterwirft fl. Gemische zweier Stoffe einer Temp., bei der der leichtere Bestandteil fl. bleibt,

der schwerere dagegen fest wird, zentrifugiert das Gemisch, um es in Zonen trennen, erhitzt den schwereren Teil während des Zentrifugierens derart, daß der dem leichteren anhaftende Teil fl. wird. (A. P. 1513986 vom 25/3. 1922, aus 4/11. 1924.) KAUSCH

Société Ricard, Allenet & Cie., übert. von: **Eloi Ricard**, Melle, De Sèvres, Frankreich, *Reinigen von Flüssigkeiten*. Man setzt zu der Fl. ein in W. Alginat u. ein Fällmittel für die Alginsäure hinzu. (A. P. 1515968 vom 24. 1921, ausg. 18/11. 1924.) KAUSCH

Westinghouse Lamp Company, übert. von: **Henry Kneeland Richardson**, Newark, und **Theodore Mac Lean Switz**, East Orange, V. St. A., *Herstellung von Tiegeln*. 400 Teile gepulvertes ThO₂ werden mit 0—600 Teilen gepulverter Stübe von bei wiederholtem Glühen unbrauchbar gewordenen Thoriumtiegeln, 20—0 Teilen Kryolith, 0—100 Teilen ZrO₂, 300—600 Teilen W. u. einer kleinen Menge P₂O₅ oder eines anderen Elektrolyten vermischt, die Mischung in Kugelmöhlen zu einem gewissen, aber nicht zu hohem Feinheitsgrade vermahlen u. von geschlossenen Luftblasen in geeigneter Weise, zweckmäßig durch Evakuieren befreit. Hierauf wird die M. geformt, bei von 30—90° steigenden Temp. getrocknet u. bei von 800 bis 1920° steigenden Temp. gebrannt. Der Zusatz der Reste von verbrannten Thoriumtiegeln verhindert zu starkes Schwinden der M. u. die dadurch bedingte Verringerung der Porosität der Erzeugnisse. (A. P. 1512801 vom 23. 1923, ausg. 21/10. 1924.) KÜHLING

Deutsche Gasglühlicht-Auer-Gesellschaft m. b. H., Berlin, *Doppelwandiges Glasgefäß mit Ausgußring*. Doppelwandiges Glasgefäß nach DEWAR-WEINHOLD mit als Schutzkappe über der Halsverschmelzstelle angeordnetem Ausgußring, d. gek., daß dieser Ausgußring eine weit seitwärts in eine scharfe Tropfkante überlaufende Trichterform besitzt. (D. R. P. 407623 Kl. 341 vom 15/4. 1921, ausg. 29/12. 1924.) KAUSCH

Louis Gumz, Niederdollendorf a. Rh. und **Albert Weimar**, Meissen i. S., *Tellerrockner*, 1. gek. durch die Verb. zweier Gruppen von an sich bekannten treppenartigen Tellerflächen zu einem Doppelkegel. — 2. dad. gek., daß in dem Doppelkegel ein der Neigung der Treppenstufen folgender Hohlkörper eingelegt ist. (D. R. P. 407652 Kl. 82a vom 2/2. 1921, ausg. 31/12. 1924.) KAUSCH

B. F. Goodrich Company, New York, übert. von: **George Oenslager** und **Julian C. Howard**, Akron, Ohio, *Wiedergewinnung flüchtiger Lösungsmittel*. In zu behandelndes Gut (Fäden) wird im untersten Teil einer aufrechten Trockenkammer mit einer (Kautschuk-)Lsg. überzogen, dann in der Kammer nach oben befördert, unten in die Kammer eine beschränkte Menge Luft eingeführt, das Innere der Kammer erwärmt u. die mit dem Dampf des flüchtigen Lösungsm. beladene Luft oben aus der Kammer in solcher Menge abgezogen, daß sich ein explosives Gase-dampfgemisch in der Kammer nicht bilden kann. (A. P. 1513928 vom 26/4. 1920, ausg. 4/11. 1924.) KAUSCH

III. Elektrotechnik.

W. Braumüller, *Der Fiat-Elektroofen*. Der Fiatilektroofen ist ein verbessertes HÉROULT-Ofen. Sein Wirkungsgrad ist von 50% des sonst üblichen von HÉROULT auf 70% gebracht. Sein Elektrodenverbrauch beträgt 4,5 kg je t Schmelzgut. Er hat Graphitelektroden, die kleinere Durchmesser als Kohleelektroden zulassen u. Stromverluste verringern. (Gewerbefleiß 103. 247—50. 1924.) NEUFELD

W. Redenbacher, *Über den Gebrauch von Thermoelementen*. Bei einer in zwei Hülsen eingeschlossenen Thermoelement findet durch Nacheilen u. Wärmeableitung eine Falschmessung statt; letztere macht sich auch bemerkbar, wenn das Rohr fensterartige Aussparungen hat. Bei frei hervorstehender Thermostelle es

er-Konstantan-Elementes findet Beeinflussung durch Korrosion u. B. einer
 orschicht von Flugasche u. Ruß statt. Vf. schlägt folgende Bauart vor: Im
 rohr steckt durch Asbest isoliert ein Kupferklotz; durch eine axiale Bohrung
 er mit Perlen isolierte Konstantendraht geführt, der beim Austritt in schrauben-
 gen Rillen mit dem Kupferklotz verschweißt ist. Da die Stellung des Elements
 Rauchschieber für die Messung wichtig ist, empfiehlt Vf. das *Rauchgasthermo-*
 t mit dem Schieber zu verbinden. — Störungen lassen sich durch vergleichs-
 eis Einschalten eines Zusatzwiderstandes in den Widerstand des Galvanometers
 enen. Das Verhältnis der Anzeigen mit u. ohne Zusatzwiderstand bleibt bei
 e Tempp. konstant, solange keine Störung auftritt. Wenn der Kontakt der
 telle gestört ist, ändert sich das Verhältnis der Anzeigen sofort. (Apparate-
 16. 298—300. 1924. Weihenstephan.)

JUNG.

F. Monnot, Mill Hill, *Elektrolyte für alkalische Sammler*, bestehend aus
 33%ig. wss. Lsgg. von KOH, vorzugsweise 29,4%ig. Lsgg., welche den ge-
 en spezif. Widerstand bieten. (E. P. 222701 vom 15/11. 1923, ausg. 30/10.

KÜHLING.

Elektrizitäts-Akt.-Ges. vorm. Schuckert & Co., Nürnberg, übert. von:
 tz, Nürnberg, *Elektrolyse*. Man verwendet in einer Zelle (für die Elektrolyse
 N.) mit Wänden aus Zement o. dgl., die mit den Elektroden in Verb. stehen,
 oder mehrere in die Wände in der Zone zwischen anliegenden Elektroden ein-
 te Metallagen, die den Durchbruch des Stromes durch die Wände infolge
 e polarisierenden Wrkg. vermindern sollen. (E. P. 222856 vom 23/9. 1924,
 sg veröff. 3/12. 1924. Prior. 3/10. 1923.)

KAUSCH.

Henri David, Frankreich, *Diaphragma für elektrolytische Verfahren* bestehend
 nem Metallgewebe, auf dem ein Gemisch von Zement u. NaCl oder andere
 utgemische befestigt sind. (F. P. 573155 vom 15/11. 1923, ausg. 19/6. 1924.
 or. 29/11. 1922.)

KAUSCH.

Elektric Water Sterilizer & Ozone Company, Scottdale, Pennsylvan.,
 von: Frank E. Hartman, Scottdale, *Ozon*. Man unterwirft den Inhalt einer
 reuzgereinheit der Einw. ungedämpfter Hochfrequenzwechselströme. (A. P.
 964 vom 30/1. 1923, ausg. 11/11. 1924.)

KAUSCH.

rich Oppen, Hannover, *Anordnung der Isolatoren elektrischer Gasreiniger* in
 kammern gemäß D. R. P. 406062, 1. dad. gek., daß das Durchtrittsloch kon.
 2. dad. gek., daß der Ringspalt im Durchtrittsloch durch einen verstellbaren
 verändert werden kann. — 3. dad. gek., daß der Konus zweiteilig ist.
 P. 407294 Kl. 12e vom 7/11. 1922, ausg. 15/12. 1924. Zus. zu D. R. P. 406062;
 5. I. 421.)

KAUSCH.

abelfabrik und Drahtindustrie Aktiengesellschaft, Wien, *Isolierverfahren*
Ahtspulen. Die Spulen werden zunächst beliebig, z. B. mit Phenolformaldehyd-
 imprägniert, dann mit einer Schicht von härtbarem Kunstharz (Resinol) um-
 u. diese Schicht durch Erhitzen in den unl. u. unschmelzbaren Zustand
 übergeführt. (Oe. P. 98168 vom 30/8. 1923, ausg. 10/10. 1924.) KÜHLING.
 rthur Wehnelt, Deutschland, *Oxydkathoden für Entladungsröhren*. Die Ka-
 , welche aus edlen Metallen, wie Pt oder Au, aber auch aus unedlen Metallen,
 oder W, bestehen können, werden mit, gegebenenfalls vorher durch Pressen
 itzen geformten Mischungen von Oxyden, Hydroxyden oder beliebigen
 n. oder organ. Verb. verschiedener Alkali- oder Erdalkalimetalle mit Aus-
 der Salze der stickstoffhaltigen Säuren überzogen, z. B. mit einer Mischung
 Teilen $\text{Ca}(\text{OH})_2$, 5 Teilen $\text{Ba}(\text{OH})_2$ u. 5 Teilen $\text{Sr}(\text{OH})_2$. Die Erzeugnisse sind
 er, ihre Fähigkeit Elektronen auszusenden, ist mindestens die gleiche als die der
 ten Oxydkathoden, der Überzug kann in dickerer Schicht aufgetragen u. die

Kathoden deshalb länger benutzt werden als die bekannten Kathoden u. schließl. ist ihr elektr. Widerstand viel geringer als der der letzteren. (F. P. 551008 vom 5/5. 1922, ausg. 26/3. 1923. D. Priorr. 6/5. 1921 u. 4/4. 1922.) KÜHLIN

N. V. Philips' Gloeilampenfabrieken, Eindhoven, Holland, *Oxydationskathoden*. Kathoden aus Pt, Pd, Ni, Cu o. dgl. bezw. Legierungen dieser Metalle werden mit einer Schicht eines oder mehrerer Erdalkalimetalle überzogen, z. B. durch Aufschmelzen, Führen von Drahtkathoden durch geschmolzenes Erdalkalimetal, Auftragen zersetzlicher Erdalkaliverbb., z. B. BaN₂ u. Erhitzen. Hierauf wird die Kathode unter Luftabschluß über den F. des Erdalkalimetalls erhitzt, wobei die Legierung, oder wenn das Grundmetall in poriger Form verwendet wurde, auch das Aufsaugen des Erdalkalimetalls eintritt. Das Erdalkalimetal wird dann, zweckmäßig nur teilweise, oxydiert, z. B. dadurch, daß die Kathode der Luft ausgesetzt wird. Besteht das Grundmetall aus Cu, so ist ein besonderer Oxydationsvorgang überflüssig, weil das Cu genügend Oxyd enthält, um eine ausreichende Menge Erdalkalimetal zu oxydieren. Poriges Grundmetall wird z. B. dadurch erhalten, daß es mit Cu überzogen u. so stark erhitzt wird, daß sich das Cu erst mit der Pt legiert u. dann verdampft. (O. P. 97876 vom 18/12. 1923, ausg. 25/9. 1924.) KÜHLIN

Adolfo Pouchain, Turin, *Sammler*. Die negativen Elektroden bestehen aus oder teilweise aus Zn, der Elektrolyt aus in W. gel. ZnSO₄, Al₂(SO₄)₃, Alkalifluorid u. HgSO₄. Die Lsg. kann auch mit einem mehrwertigen Alkohol besonders Glykolin u. mit Vaselineöl vermischt werden. Die Selbstentladung des Sammlers bei offener Stromkreis soll vermieden werden. (A. P. 1512485 vom 18/4. 1921, ausg. 21/12. 1924.) KÜHLIN

Naamlooze Vennootschap Philips' Gloeilampenfabrieken, Eindhoven, Holland, *Chemische Reaktionen*. Chem. Verbb. (Zr-, Ti-, Nb-, Vd-, B-Nitride) werden als Überzug auf glühenden Körpern (Drähte, Stäbe), die Kathoden für thermoelektr. App., X-Strahlenrohre o. dgl. darstellen, gewonnen, indem man die Drähte oder Stäbe in einem flüchtigen Halogenid des positiven Elements der zu bildenden Kathode u. einem oder mehr Gasen des negativen Elements gegebenenfalls in Ggw. eines reduzierenden Gases (H₂, CO, KW-stoff) erhitzt. (E. P. 223244 vom 10/10. 1924, Auszug veröff. 10/12. 1924. Prior. 11/10. 1923.) KAUSCH

IV. Wasser; Abwasser.

W. Nover, *Verwendung von Wässern für industrielle, insbesondere Kühl- und Kesselspeisezwecke*. Einwände gegen eine frühere Veröffentlichung von BAMBERG (Gas- u. Wasserfach 66. 720; C. 1924. I. 820). (Gas- u. Wasserfach 67. 755 vom 1924. Bremen.) SPLITTGERBER

Fr. Bamberg, *Praktische Erfahrungen über das Verhalten der in Wasser gelösten Gase und Salze und ihr gegenseitiges Abhängigkeitsverhältnis bei der Wasseraufbereitung*. Polemik gegen NOVER (vgl. vorst. Ref.). (Gas- u. Wasserfach 67. 756—58. 775—78. 1924. Berlin-Charlottenburg.) SPLITTGERBER

Keppner, *Abwasserreinigung, System Hoffmann*. Empfehlung des von A. HOFFMANN in Lübeck ausgearbeiteten Systems für Hauskläranlagen. (Gesundheitsingenieur 47. 590. 1924. Holzminden a. d. W.) SPLITTGERBER

A. Frederking, *Die Inbetriebsetzung und Überwachung der Wasserreinigung*. Allgemeine Angaben über Chemikalienzusatz, Wasserunters. [Wasserprüfer FRIEDRICH KING] u. Betriebsüberwachung. (Die Wärme 47. 613—14. 1924.) SPLITTGERBER

W. Lohmann, *Einwandfreies Wasser für die Mineralwasserindustrie*. Die Arbeit begründet die Notwendigkeit der Verwendung von einwandfreiem Wasser in der Mineralwasserindustrie u. gibt Hinweise zur Probeentnahme u. Unters. (Zentralblatt f. ges. Mineralwasser- u. Kohlensäure-Ind. 30. 411—12. 429—30. 445—46. 461—62. 477—78. 493—94. 509—10. 526—27. 573—74. 589—90. 1924.) SPLITTGERBER

Splittgerber, *Die verschiedenen Ursachen des Fischsterbens*. Fischsterben eintreten: 1. durch Vergiftung der Fische durch schädliche Abwässer, 2. durch Sauerstoffschwund, verursacht a) durch die eigene Lebenstätigkeit von Wassertieren und Pflanzen, hauptsächlich zur Zeit der Wasserblüte u. bei ruhender Sauerstoffproduktion während der Nacht oder im Schatten, b) durch meteorolog. Einflüsse, c) durch die biol. Selbstreinigung des Wassers, 3. durch Entbindung von Fischen aus den Gasen aus dem Grundschlamm infolge rascher Verminderung des Barometerstandes. (Wasser u. Gas 15. 245—51. 1924. Wolfen, Kr. Bitterfeld) SPL.

C. de Graaff, *Nochmals die bakteriologische Trinkwasseruntersuchung*. Bericht mit u. Erwiderung von SMIT (vgl. Chem. Weekblad 21. 461; C. 1924. II. 27). Wesentlich für die Beurteilung ist, ob überhaupt fäkale Verunreinigungen, alten oder neuen Datums, nachgewiesen werden. (Chem. Weekblad 21. 511 u. 512. 566—67. 605—6. 1924. Utrecht) GROSZFELD.

Gartzweiler, Berlin-Friedenau, *Lösung von Gasen in strömenden Flüssigkeiten besonders in zu reinigendem Wasser und Abwasser*. Das in bekannter Weise beliebigen Gaserzeugungs- oder Aufspeicherungsstelle entnommene Gas, wie CO_2 , wird unter Einschaltung bekannter Regelungs- u. Anzeigevorr. in den Wasserstrom in fein verteiltem Zustande in Form von Gasblasen eingeblasen. Das W.- u. Gasblasengemisch wird hierauf entweder im Gleichstrom gegen horizontal oder geneigt angeordnete rauhe, geriefte oder gerippte Oberflächen geführt, so daß die Gasblasen gegen diese gedrückt werden. — Es erfolgt eine rasche u. vollständige Lsg. der Gase in dem W. erreicht. (D.R.P. 407244 vom 18/1. 1921, ausg. 17/12. 1924.) OELKER.

V. Anorganische Industrie.

B. Kinney, *Die Herstellung von Chromsalzen aus Chromerz in den U.S.A.* Beschreibung der in den Vereinigten Staaten vorkommenden Chromerze, der Gewinnung von $\text{Na}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ u. $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$, der Fabrikations- u. Importziffern für K_2CrO_4 , $\text{Na}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$, $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$, der Preisschwankungen während der Jahre 1915—1922. (Journ. Leather Chem. Assoc. 19. 579—87. 1924. Napa [Cal.]) GERNGROSS.

Chemania Verein Chemischer Fabriken Akt.-Ges., Aachen (Erfinder: Fritz Jahn, Stolberg, Rhld.), *Gewinnung von Schwefel, Thiosulfaten und Sulfhydraten* aus Gasen, welche H_2S u. SO_2 enthalten, dad. gek., daß man die Gase zunächst mit Sulfhydratlaugen der Alkalien oder Erdalkalien wäscht u. darauf der Einwirkung von Hydroxyden oder Sulfiden der Alkalien oder Erdalkalien aussetzt. (D.R.P. 405125 Kl. 12i vom 4/8. 1923, ausg. 24/12. 1924.) KAUSCH.

Chemical Construction Company, New York, übert. von: **Ingenuin Hechenbleicher** und **Peter S. Gilchrist**, Charlotte, Nord Carolina, *Schwefelsäure*. Man läßt SO_2 mit einem Gemisch von nitroser H_2SO_4 , H_2SO_4 u. HNO_3 reagieren, leitet den Überschuß des SO_2 u. die Stickoxyde durch zwei Reaktionskammern, deren erste verhältnismäßig konz. nitrose H_2SO_4 u. deren zweite verd. nitrose H_2SO_4 enthält. (A. P. 1513903 vom 20/12. 1923, ausg. 4/11. 1924.) KAUSCH.

Law Chemical Company, Midland, Michigan, übert. von: **Coulter W. Jones**, Detroit, Mich., *Bromextraktion*. Br-enthaltende Lauge wird fein verteilt, am besten in Füllkörper, einem Vakuum ausgesetzt. (A. P. 1513821 vom 7/5. 1920, ausg. 1/12. 1924.) KAUSCH.

Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co. (Erfinder: **Wolf Johannes Carstens** und **Hanns Carstens**), Leverkusen b. Köln a. Rh., *Herstellung von Salzen aus nitrosen Gasen*. (D.R.P. 407617 Kl. 12i vom 27/2. 1923, ausg. 1/12. 1924. — C. 1924. II. 224.) KAUSCH.

Arthur B. Lamb, Trustee, Cambridge, übert. von: **Alfred T. Larson**, hington, *Katalysator für die Ammoniaksynthese*. Den üblichen Katalysatoren, geschmolzenem Fe_2O_3 , wird ein Gemenge von Cs_2O u. dem Oxyd eines elektronegativeren Metalls, z. B. Al_2O_3 zugemischt, u. die M., welche von Halogenen, Schwefel, Se, Te, P, As, Sb, Bi, Pb, Sn, B u. dgl. frei sein muß, zunächst bei 300–400°, später bei 400–500° im Strom von H_2 oder H_2 u. N_2 reduziert. Der Katalysator synthetisiert NH_3 bei 400–500° u. gewöhnlichem oder erhöhtem I. (A. P. 1510598 vom 10/11. 1923, ausg. 7/10. 1924.) KÜHLI

Stockholms Superfosfat Fabriks Aktiebolag, Schweden, *Stickoxyde*. Calciumcyanamid oder andere Cyanamide oder Metalleyanide werden in Luft, O_2 od. verbrannt. (F. P. 571017 vom 24/9. 1923, ausg. 10/5. 1924. D. Prior. 1/1922.) KAUS

Luigi Casale, Rom, *Katalysatoren für die Ammoniaksynthese*. (Kurzes Res. nach A. P. 1502336 vgl. C. 1924. II. 1969.) Als Ausgangsstoff dient Fe des Häute oder andere Metalle der Eisengruppe, oder ihre Legierungen, welche beträchtliche Mengen von Beimengungen, darunter auf Metalloide enthalten können. Diese Stoffe werden zweckmäßig bei Ggw. von Oxyden der Alkalien oder Erden unter Bedingungen geschmolzen, bei denen sie in heftigstes Sieden geraten u. wesentlicher Teil der M. verdampft. Z. B. werden Eisendrehspäne in einem Magnesiumtiegel unter Zusatz von CaO an einem Punkt erhitzt u. dann ein starker Strom von O_2 durchgeleitet. Mit dem verdampfenden Metall verflüchtigen sich die Verunreinigungen. (Oe. P. 97665 vom 11/7. 1922, ausg. 25/8. 1924.) KÜHLI

Federal Phosphorus Company, Birmingham, Alabama, übert. von: **Belmont G. Klugh**, Anniston, Alabama, *Bindung von Phosphorsäure*. Vom Schmelzen natürlicher Phosphate herrührende P_2O_5 -Dämpfe werden in Ggw. von CO-Gas mit Wasser in Berührung gebracht. Das gebildete $(\text{NH}_4)_3\text{PO}_4$ wird alsdann von dem Gas getrennt. (A. P. 1514912 vom 20/10. 1920, ausg. 11/11. 1924.) KAUS

Vernon T. Stewart, Montclair, N. J., *Arsensäure*. Man behandelt wasserlöslichen Arsenik in Ggw. von W. unter Kochen mit Cl_2 -Gas am Rückflußkühler, wobei die B. von AsCl_3 oder anderer flüchtiger As-Verbb. vermieden wird. (A. P. 151017 vom 18/9. 1922, ausg. 11/11. 1924.) KAUS

Frans Georg Liljenroth, Stocksund, Schweden, *Wasserstoff und Phosphorsäure*. (D. R. P. 406411 Kl. 12i vom 24/4. 1923, ausg. 24/11. 1924. Schwed. Pat. 28/8. 1922. — C. 1924. I. 2625.) KAUS

Rhenania Verein Chemischer Fabriken Act.-Ges. Zweigniederlage Mannheim (Erfinder: **Friedrich Rüsberg**), Mannheim, *Gewinnung von Salzen der Alkalien*, insbesondere der fixen Alkalien durch Umsetzung von $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ mit entsprechenden in W. l. Salzen der fixen Alkalien, 1. dad. gek., daß die in W. l. Salze der fixen Alkalien im Überschuß angewendet werden. — Die Abscheidung der Sulfate der fixen Alkalien erfolgt bei Temp. unterhalb 35°, zweckmäßig bei gewöhnlicher Temp. oder darunter. Die ammoniakal., NH_4Cl - u. NaCl -haltigen Mutterlaugen werden nach entsprechender Anreicherung mit NaCl in der Ammoniasodafabrikation verwendet. (D. R. P. 407341 Kl. 12i vom 28/3. 1922, ausg. 1/11. 1924. Zus. zu D. R. P. 405922; C. 1925 I. 425.) KAUS

Robert Illig, Jülich, *Aufbereitung von Steinsalz in lockeres Speisesalz*, u. bestehend, daß man gemahlenes Steinsalz mit voluminösem Salz von im wesentlichen gleicher Körnung, das durch Trennung der feinen Krystalle von den gröberen Steinsalzes durch Schlämmen in einer für NaCl indifferenten Fl. von hoher Viskosität oder durch Ausfällen konz. NaCl-Lsg. erhältlich ist, vermischt. (D. R. P. 407341 Kl. 12i vom 26/4. 1921, ausg. 31/12. 1924.) KAUS

American Lurgi Corporation, New York, übert. von: **Conway von Conway** und **Hans Weidmann**, Frankfurt a. M., *Lithiumsalze und Lithium*. 1.

die Li enthaltende Lsg., fällt das Li als Fluorid u. scheidet dieses von der Lsg. ab. Das LiF kann mit anderen Metallsalzen (z. B. CaCl_2) umgesetzt u. das so erhaltene Li-Salz elektrolysiert werden. (A. P. 1515001 vom 19/4. 1923, ausg. 11/11. 1924.) KAUSCH.

Dr. S. Sadtler, Springfield, Pennsylvan., *Calciumarsenat*. Man mischt eine Lsg. von As_2O_3 mit $\text{Ca}(\text{OH})_2$ u. einer organ. Substanz (Zucker), die mit dem Ca ein Salz als $\text{Ca}_3(\text{AsO}_4)_2$ zu bilden vermag. (A. P. 1513934 vom 13/10. 1921, ausg. 1. 1924.) KAUSCH.

Dr. J. Dickinson, Dundee, V. St. A., *Metallisches Beryllium*. Ein Berylliumfluorid (BeF_2) wird, zweckmäßig unter Zusatz eines Flußmittels, wie CaF_2 oder NaF , oberhalb 1285° , dem F. des metall. Be, elektrolysiert, wobei sich das Be an der Kathode abscheidet. (A. P. 1511829 vom 1/10. 1921, ausg. 14/10. 1924.) KÜ.

Dr. J. Dickinson, New York, V. St. A., *Herstellung von Aluminiumsulfatlösungen*. In einem durchbrochenen Betriebe, gek. durch Anwendung mehrerer Lösebehälter, in denen die Bauxit u. die Säure allmählich eingeführt werden, das zersetzte Material einer unten an einer hohlen, zentrischen Welle befestigten Rührvorrichtung in der Mitte des Behälterbodens geschaufelt, durch die Welle zu einer Verteilerbohrung oberhalb des Behälters gehoben, von dort wieder in die Behälter ausgetragen u. darauf es durch Überlaufvorr. in die nächsten Lösebehälter geführt, hier in die gleiche Weise bewegt u. von da zum Waschen einer aus mehreren Behältern bestehenden Waschanlage zugeführt wird, in denen das ungelöste Gut mittels über einer rotierenden Rührwerke nach einer zentralen Austragsöffnung geschaufelt u. durch Pumpen in die nächsten Behälter geschafft wird, wobei die Waschlfl. in der umgesetzten Richtung zu der Stromrichtung des Bauxitaufschlusses durch die Behälter geführt wird. (D. R. P. 407484 Kl. 12m vom 5/1. 1923, ausg. 24.) KAUSCH.

Dr. J. Dickinson, Sewaren, N. J., übert. von: Dr. H. Cowles, Sewaren, *Tonerde, Alkali und Dicalciumsilicat*. Man stellt ein Produkt her, das 2 Moleküle $\text{Ca}(\text{O})_2$ auf 1 Molekül SiO_2 u. weniger als 1 Molekül Alkalioxyd enthält, laugt das Prod. aus u. scheidet die Al_2O_3 aus der Lsg. ab. (A. P. 1514657 vom 20/11. 1915, ausg. 11/11. 1924.) KAUSCH. see errata 3063

Dr. J. Dickinson, Mines de Potasse d'Alsace, Amelie, Max, Joseph, Else, Théodore, Eugène, Fernand (Autrefois Reichsland) Anna Marie, et Marie Wittersheim, Frankreich, *Magnesiumsulfat*. Man behandelt eine Suspension eines anionisierten Dolomit u. Gips mit CO_2 , das bei der Calcinierung des Dolomits abgetrieben wurde. (E. P. 224223 vom 25/10. 1924, Ausz. veröff. 24/12. 1924. Prior. 1923.) KAUSCH.

Dr. J. Dickinson, M. Loeb, New York, übert. von: Alan Kissock, Los Angeles, Californien. Man unterwirft ein Gemisch von Mo- u. Fe-haltigem Gut einem oxydierenden Röstprozeß. (A. P. 1514972 vom 1/4. 1924, ausg. 11/11. 1924.) KAUSCH.

Dr. J. Dickinson, International Filter Company, Chicago, übert. von: Abraham S. Behrman, *Basenaustauschender Stoff*. Man mischt eine Lsg. eines Salzes eines bestimmten Metalls (Al) mit einer Lsg. eines Alkalisilicats, wobei sich ein alle Ausfällung einschließendes Gel bildet. (A. P. 1515007 vom 8/10. 1923, ausg. 11/11. 1924.) KAUSCH.

VI. Glas; Keramik; Zement; Baustoffe.

Dr. J. Dickinson, Rötliche Verfärbungen an Schmelzglasuren. Die bekannten rötlichen Verfärbungen von Schmelzglasuren werden auf einen Gehalt an Chromoxyd zurückgeführt. Außerst geringe Mengen dieses Oxydes vermögen mit dem in der Glasur enthaltenen Zinn einen Pinkfarbkörper zu bilden, der diese rötliche Ver-

färbung hervorruft. (Ber. Dtsch. Keram. Ges. 5. 50—52. 1924. Staatl. Porz. Man. Berlin.)

G. Kopka, *Wärmebilanzen eines Porzellanrundofens*. Vf. führt die Bilanz an einem Rundofen mit überschlagender Flamme mit 3 Etagen durch. Ofen gab vor einem Umbau nach moderneren Gesichtspunkten einen therm. Wirkungsgrad von 17%. Nach dem Umbau erhöhte sich der Wirkungsgrad auf 20%. Kohlenersparnis durch Umänderung und Verbesserung der Ofenkonstruktion durch Herabminderung der Wärmeverluste erzielt worden. Brandführender Ofenkonstruktion und, dadurch bedingt, kurze Branddauer, sowie wirtschaftl. Rauchgaszus. geben Ersparnisse. (Keramos 3. 495—98. 1924. Karlsbad. Sep.)

Karl Otto, *Die Gasverwendung in der Glasindustrie*. Histor. Entw. der Glasindustrie durch die Verwendung der Gasfeuerung bis zum heutigen hohen Grad. (Gas- u. Wasserfach 67. 753—55. 772—75. 1924. Dermbach, Rhön.) SPLITTER

G. Klitzke und **H. Tropitzsch**, *Betriebstechnische Untersuchungen der Rohmaterialien in Porzellanfabriken*. Es werden kurz die bekannten Unterss. besprochen, die in der Keramik üblich sind, um einen ungefähren Überblick über die Eigenschaften der Rohmaterialien zu erhalten, ohne wissenschaftlich genaue Resultate zu bekommen. (Keramos 3. 505—7. 1924. Marktrechwitz, Bayern. Sep.)

Ernst P. Bauer, *Viscositätsmessungen in der Keramik*. Vf. bespricht ein ihm konstruiertes Viskosimeter, das aus dem Viskosimeter von FISCHER hervorgegangen ist. Das *Fischer-Bauer Viskosimeter* ist ein Kugelfallviskosimeter, gestattet, zähe u. undurchsichtige Suspensionen auf ihre Zähflüssigkeit zu prüfen. Für die Keramik kann man mit seiner Hilfe die Gießfähigkeit bestimmen. Es mit den bisher gebräuchlichen Ausflußviskosimetern nur möglich, das Fließvermögen des Gießschlickers zu kontrollieren, vermag man jetzt auch die Versteifung der Ansteifung bei längeren Stehen des Schlickers zu finden. Formel zur Berechnung des vom Verf. neu gebrauchten Ansteifungswertes, des Versteifungsfaktors, und genaue Beschreibung des Apparates. (Ber. Dtsch. Keram. Ges. 5. 27—35. 1924. Staatl. Porz. Man. Berlin.)

Fred M. Locke, Victor, V. St. A., *Glas*, enthaltend mehr als 78% SiO₂, weniger als 5% Alkali, u. geringe Mengen Al₂O₃ u. BaO, SrO, CaO oder Na₂O. z. B. 78,73% SiO₂, 14,22% B₂O₃, 4,24% Na₂O, 0,62% K₂O, 1,33% CaO, 0,86% Al₂O₃ u. Spuren von MgO u. Mn. Die Gläser besitzen niedrige FF., große Zähigkeit u. Isolierfähigkeit u. Ausdehnungskoeffizienten von etwa 0,0000032. (Z. 1510521 vom 16/9. 1916, ausg. 7/10. 1924.) KÜHN

Société Chimique de la Grande Paroisse, Frankreich, *Glasherstellung*. Anstelle der üblichen Verwendung von Gemischen von Na₂SO₄ u. CaO oder Na₂CO₃ bei der Glasherstellung wird ein Gemisch von Na₂CO₃ u. CaSO₄ verwendet. kann so das voraussichtlich demnächst im Überschuß zur Verfügung stehende Na₂CO₃ in die Glasindustrie einführen, ohne auf die Ggw. von SO₄ verzichten zu müssen, welches für gewisse Zwecke wichtig zu sein scheint. (F. P. 575279 vom 5/11. 1916, ausg. 26/7. 1924.) KÜHN

Corning Glass Works, Corning, V. St. A., *Durchsichtiges, aber für ultraviolette Strahlen undurchlässiges Glas*. Dem Glassatz wird V₂O₅ u. ein oxydierend wirkendes Salz, z. B. KNO₃, zugesetzt. Ein Teil des V₂O₅ kann durch TiO₂ oder Ce(NO₃)₃ ersetzt werden. (Oe. P. 97388 vom 12/12. 1919, ausg. 25/6. 1924. A. Prior 2. 1916.) KÜHN

Medusa Cement Paint Company, übert. von: **Spencer B. Newberry**, Portland, V. St. A., *Zementfarbe*, bestehend aus Portlandzement, 1/10—1% vom Gew. des Portlandzementes an Borsäure oder Borax u. 1—10% einer hygroskop. Verbindung, z. B. NaOH, K₂CO₃, CaCl₂ o. dgl. Zum Gebrauch wird die Mischung mit 0

zum Brei angerührt u. auf die zu behandelnde Fläche mit Bürsten auf-
oder aufgesprüht. (A. P. 1510795 vom 29/10. 1921, ausg. 7/10. 1924.) KÜ.
rin C. Eckel, Washington, V. St. A., *Herstellung von Zement*. Mischungen
haltigem Eisenerz u. Kalkstein werden im Hochofen mit Koks verschmolzen.
Menge des Fe schm. aus, sammelt sich am Boden u. wird von dort ab-
die übrigen Bestandteile bilden eine aus CaO , TiO_2 , Al_2O_3 u. Fe_2O_3 be-
Schlacke, welche fein gepulvert u. als Bindemittel verwendet wird. Von
einschlossenes metall. Fe kann magnet. abgeschieden werden. (A. P.
vom 14/1. 1924, ausg. 14/10. 1924.) KÜHLING.

ery-Dewitt Company, Detroit, übert. von: Joseph A. Nagle, Columbus,
Bindemittel für keramische Stoffe. Mehl wird mit W. zu einem dünnen
erührt u. dieser mit Dampf behandelt. Der Mischung können Desinfektions-
tenvertilgungsmittel zugesetzt werden. Die M. dient vorzugsweise zum
ven Siliciumcarbid, Sillimanit, Diaspor u. dgl. (A. P. 1512299 vom 10/1.
1924, ausg. 21/10. 1924.) KÜHLING.

L. Wright und Edward Toal, Oakland, V. St. A., *Schutzanstrichmittel*.
Mel, welches marine Bauten gegen den Angriff von Bohrtieren schützen soll,
aus einer Mischung von Asphalt, gemahlenen roten Ziegeln u. durch Luft-
keit gelöschten Kalk oder Kieselgur. (A. P. 1512659 vom 18/5. 1921,
10. 1924.) KÜHLING.

VII. Agrikulturchemie; Düngemittel; Boden.

kinner, B. E. Brown und F. R. Reid, *Einwirkung von Borax auf Wachs-*
Entwicklung von Feldfrüchten. (Vgl. S. 155.) Durch Feldverss. wurde fest-
daß schon geringe Mengen von B-Verbb., wie z. B. 2 bis 3 lbs Borax je
Kopfdüngung zu Kartoffeln, schädigend auf das Pflanzenwachstum ein-
Hierdurch konnte die schädliche Wrkg. von einem Borax enthaltendem
salz von Searles Lake Cal. erklärt werden. (U. S. A. Dep. of Agric. Bull.
23; BIED. Zentralblatt f. Agrik.-Ch. 53. 472—74. 1924. Washing on. Ref.

BERJU.

Magan Gowda, *Nitrifikation und die nitrifizierenden Organismen*. I. Ein-
Unterss. über Isolierung von Nitrit- u. Nitratbildnern, von denen einige
ihre konstanten Begleiter beschrieben werden. Als bestes Nährmittel
sich ein aus Bodenextrakt mit gewaschenem Agar hergestelltes. (Journ. of
i. 9. 251—72; Ber. ges. Physiol. 28. 144. 1924. Ref. SELIGMANN.) SPIEGEL.
Miyake und Ishio Tamachi, *Über das Wesen der Acidität, die auf*
Feld nach der Düngung mit Sojabohnenölkuchen auftritt. Vff. untersuchen
stadiumsmäßig die Einw. von 10 g lufttrocknem Sojabohnenölkuchen während
Zeit bis zu 60 Tagen auf 200 g gleichfalls lufttrockenen u. auf 1 mm gesiebten
tlen in 200 ccm H_2O , die Zers. des organ. Düngers u. sein Einfluß auf den
wurde jeden 10. Tag durch Analyse der abfiltrierten Bodenlösung verfolgt.
difizierten an Säuren SiO_2 , H_3PO_4 , H_2SO_4 ; CO_2 , Fettsäuren — darunter mit
elit Ameisen-, Essig- u. Milchsäure —, Aminosäuren, HCl nur in Spuren u.
rn Falle HNO_3 ; die Säuren waren zum größeren Teil an NH_4 , Fe, Al, Mn,
u. Na, K gebunden. Die erhebliche Menge titrierbarer Acidität kann
nur durch die saure Rk. von in 1. Linie Al-Salzen erklärt werden u. damit
dige Einfluß des organ. Düngers durch die tox. Wrkg. des Al. (Journ.
istry 3. 305—23. 1924.) TRÉNEL.

Miyake, Michitaro Sugawara und Koji Nakamura, *Über das Wesen*
Ammonium-Absorption durch Böden. Zur Klärung der Frage, ist die Boden-
pn von Ammonium ein physikal. oder chem. Vorgang, studieren Vff. die
on von NH_4 ; indem sie 1. die Konz., 2. die Einwirkungszeit, 3. die Temp.

u. 4. die Anionen der Ammoniumsalze verändern u. kommen zu folgendem Ergebnis:
 1. Bei Konz. kleiner als 0,1-n. gehorcht die Ammonium-Absorption in guter Näherung der Freundlich'schen Formel. 2. Die Absorption gehorcht fern-zeitformel $x = k \cdot t^m$, in der x der absorbierte Betrag u. k u. m Konstanten bezeichnen, die von Vff. experimentell bestimmt wurden. — Nach etwa 30 Min. ist die Absorption konstant. 3. Temp.-Erhöhung erniedrigt die Absorptionswerte; fände ein chem. Rk. statt, so müßte das Gegenteil eintreten. 4. Ammoniumsalze schwächer werden stärker absorbiert als die starker Säuren; bei einem chem. Vorgang infolge der größeren Dissoziation starker Säuren auch hier das Gegenteil statfindend. — Danach sprechen Vff. die Ammonium-Absorption als physikalischen Vorgang an u. erklären sie wie folgt: NH_4Cl ist in Lsg. dissoziiert gemäß $\text{NH}_4\text{Cl} + 10 \text{ NH}_4\text{OH} + \text{HCl}$; NH_4OH wird durch die Bodenkolloide physikal. absorbiert; in Freiheit gesetzte HCl löst in sekundärer chem. Rk. die Basen des Bodensandes ab. Al u. Fe leichter gel. werden als Ca u. Mg. (Journ. Biochemistry 3. 28—29. 1924.)

N. Hannsson, *Einfluß von Cocoskuchen, Cocosmehl und Leinsamenschrot auf die Milchproduktion*. Nach den Ergebnissen der Fütterungsverss. sind Cocoskuchen u. Mehl ein ausgezeichnetes Futtermittel für Milchkühe. Beide erhöhen den Fettgehalt der Milch. 1 kg Leinsamen von n. Zus. hat etwa den gleichen Nährwert als 1 kg Haferschrot + 1 kg Weizenkleie. Leinsamenschrot wird von den Kühen gern genommen. Es hat einen hohen Nährwert u. übt einen günstigen Einfluß auf die Behaarung aus. (Kungl. Landtbruks-Akademiens, Handlingar och Tidskrift 497—519. 1922, BIED. Zentralblatt f. Agrik.-Chem. 53. 481—82. 1922.)

Mineraria Italiana, Italien, *Düngemittel*, bestehend aus Mischungen von gepulvertem Rohphosphat, KCl , CaCO_3 , MnO_2 u. geeigneten Oxyden u. Salzen. (F. P. 574777 vom 20/12. 1923, ausg. 18/7. 1924.)

Josef Mayerl, Wien, *Herstellung eines Mittels zur Bekämpfung der Raupen und anderer Parasiten des Weinstocks*, dad. gek., daß man Gaswasser von der Gärung gewinnung ansäuert u. mit einem wss. Auszug von $\text{Ca}(\text{OCl})_2$ versetzt. — Man versetzt z. B. $\text{Ca}(\text{OCl})_2$ mit W. aus u. gibt die Lauge zu Gaswasser, das durch Einleiten von konz. H_2SO_4 60—66° B. angesäuert wurde. (Oe. P. 95731 vom 7/1. 1924, ausg. 25/1. 1924.)

Harry C. Young, St. Louis, Missouri, *Schwefel in kolloidaler Form enthaltende fungicides und insekticides Mittel*. Man gibt zu wss. Lsgg. von Ca-Sulfid oder K-Sulfiden, solange noch ein Nd. entsteht, eine Säure, wie H_3PO_4 , HCl , oder eine andere Mineralsäure, u. bis die pH zwischen 3,2 u. 6,4 beträgt, oder gleichzeitig SO_2 u. H_2S , in W. letzteren im Überschuß. Zu dem so gewonnenen flockigen Nd. wird dann eine Leimlsg. oder Lsgg. von Casein bezw. Kieselsäure gesetzt. Das Prod. enthält den S in leicht, sogar bei gewöhnlicher Temp., verflüchtbarer Form u. hat starke fungicide oder insekticide Wrkkg. Man kann ihm auch andere insekticide Mittel zusetzen. — Die Herst. des Mittels kann auch auf andere Weise erfolgen. Z. B. werden gesätt. wss. Lsgg. eines Alkali-, Erdalkali- oder NH_4 -Thiosulfats, wie $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$, zunächst in der Kälte langsam mit H_2SO_4 zur völligen Umsetzung der Komponenten versetzt, hierauf auf 80° erwärmt u. durch Gaze, Filtertuch usw. filtriert. Dann wird die pH des Filtrats auf 3 eingestellt. Dies Prod. wird mit einer wss. Lsg. von der gleichen pH eine Pflanzensubstanz vermischt, das durch gleichzeitiges Einleiten von SO_2 u. H_2S , ersteres im Überschuß, in W. gewonnen wurde. Das Gemisch enthält l. S, $\text{H}_2\text{S}_5\text{O}_6$, Salze von Thionsäuren, unl. S, W. u. als Verunreinigungen Sulfate. Die Ggw. des Schwefels in der Mischung verhindert eine allzu schnelle Verflüchtigung der $\text{H}_2\text{S}_5\text{O}_6$, andere

Die Menge des S u. des W. zur fortdauernden Erzeugung neuer Mengen aus. Beim Bespritzen von Bäumen mit dem Mittel haftet es gut an den u. kann nicht so leicht durch Regen ausgewaschen werden wie andere Präparate. (A. P. 1515803 vom 4/4. 1923, ausg. 18/11. 1924.) SCHOTTL.

II. Metallurgie; Metallographie; Metallverarbeitung.

Kijiro Nishio, *Alter Bergbau in Japan*. Abhandlung über den Gebrauch von bei den prähistorischen Stämmen u. über den Bergbau u. Metallurgie in Japan. (Engin. Mining Journ.-Press **118**. 1013—16. 1924. Tokio, Japan.) JUNG.
W. T. Slater, *Manganbergbau in Indien*. Vf. erörtert V. der Manganerze bergmännische Gewinnung. (Engin. Mining Journ.-Press **118**. 1017—18. Hassan, Mysore State, Indien.) JUNG.

W. Mason, *Temperfarben*. Vf. bespricht die Literatur, welche sich experimentell mit den Anlauffarben der Metalle befaßt u. kommt zu dem Schluß, daß Temperfarben durch Interferenz des Lichtes an dünnen Schichten entstehen, von der Oberfläche des Metalls u. der Oberfläche einer auf diesem gebildeten, der weniger durchsichtigen Verb. gebildet werden. Eine körnige Struktur des Films erhöht die Lebhaftigkeit der Farbe, desgleichen eine gewisse Durchsichtigkeit, bezw. Eigenfärbung des Films. Eine Erklärung durch Brechung der Reflexion des Lichts reicht allein zur Erklärung der Anlauffarben nicht aus. (Journ. Physical Chem. **28**. 1233—44. 1924. Cornell Univ.) BECKER.

Eno Schapira, *Über mechanische Röstöfen*. Zur Verarbeitung von n. Kiesen, Masse für H₂SO₄- oder Sulfiterzeugung u. von S-armen Erzen, sowie von kies-Zinkblendekonzentraten u. ä. dienen mechan. Röstöfen. Beschrieben werden ein Röstofen mit Vortrocknung von HUMBOLDT, ein Herkules-Röstofen, ein gekühlter Röstofen mit 7 Stockwerken von WAGNER für Durchsatz 5 t hochwertigen Feinkieses, ein BRACQ-MORITZ-Röstofen mit 8 Stockwerken für Durchsatz u. Luftkühlung der Rührarme. Die luftgekühlten Rührarme der Ofens werden abgebildet u. eine Frischlaugenbereitung nach dem Lurgi-Beschrieben, ebenso ein Drehtellerofen von KRUPP. (Feuerungstechnik **13**. 1924.) NEUFELD.

Harô Honda, *Über die Schmiedetemperatur des Stahls*. Vf. bestimmt die Abhängigkeit der Längsdehnung von Stählen mit wechselndem C-Gehalt von der Temperatur. Es zeigt sich, daß die Dehnungs-Temp.-Kurve zwei Minima bei etwa 200° u. zwei Maxima bei 760° u. 1200° besitzt. Diese Werte verschieben sich mit dem C-Gehalt. Als optimale Schmiedetemperatur kommt 1200° in Betracht. (Science reports of the Tôhoku imp. univ. **13**. 21—25. 1924.) BECKER.

W. Fallock, *Spezifische und latente Wärme von Eisen und Stahl*. (Vgl. Nature **114**. 429; C. 1924. II. 160. 2451.) Vf. erhitzt wie früher Fe mit Holzkohle statt Graphit wie bei den ersten Verss.) u. nimmt die Abkühlungskurven für Stähle mit verschiedenem C-Gehalt auf. Es ergibt sich, daß mit steigendem C-Gehalt die Umwandlungsdauer beim Abkühlen von hoher auf tiefe Temp. zunimmt, bei welcher diese Umwandlung vollendet ist, sinkt. Desgleichen sinkt mit steigendem C-Gehalt die gesamte Wärmemenge ab, welche notwendig ist, um Stahl von Zimmertemp. auf etwa 400° zu erhitzen. Die effektive spezifische Wärmekapazität schwankt weitgehend mit dem C-Gehalt. Am stärksten ändert sie sich, wenn gegen Null abnimmt. Die spezif. Wärmen oberhalb von 850° u. unterhalb von 850° verhalten sich zu einander wie 1:3. (Nature **115**. 14. Exeter.) BECKER.

F. J. Smith, A. A. Dee und W. V. Mayneord, *Der Magnetismus von anderen Kohlenstoffstählen*. Eine frühere Arbeit von SMITH u. GUILD (Proc. Roy. Soc. London **24**. 342 [1912]) über die Selbstentmagnetisierung von anderen Stahlblöcken hatte ergeben, daß das restliche magnet. Moment des

magnetisierten Blockes nicht kontinuierlich Null wird, wenn die Temp. ansteigt, sondern bei etwa 180° des Vorzeichen wechselt u. bei 220° ein Maximum des positiven Moments erreicht wird. Dann fällt es langsam ab, bis das Temperaturniveau erreicht ist, bei welchen Stahl aufhört ferromagnet. zu sein. Vf. stellen nur fest, daß der Umkehrpunkt bei 180° auf die lamellenartige Struktur des Fe-Fe₃C-Eutektikums zurückzuführen ist, welches stets in den Stählen enthalten ist. Wird die Lamellenstruktur zerstört, dann verschwindet auch der Vorzeichenwechsel des magnet. Moments. Durch Messungen wurde festgestellt, wie weit die Stärke des Restmomentes bei 220° von den äußeren Abmessungen des Stahlbarrens abhängt. magnet. Feld, welches zur primären Magnetisierung diente, abhängt. Die Resultate sind in Kurven wiedergegeben. (Proc. Physical. Soc. London **37**. 1—14. 9. 1924. Birmingham, Univ.)

E. Walter, *Ergebnis einer Rundfrage bei den chemischen Fabriken über die Verwendung mit Aluminiumverwendung*. Al-Gefäße sind im Braugewerbe zum Lagerung von Bier sehr günstig; es bildet sich ein Al-freier glasurartiger Ansatz aus u. phosphorsaurem CaO, Eiweiß usw., der das Al vor dem Angriff des gärungsfördernden Bieres schützt. Ein Fruchtestig von 2,5% Säure griff 99%ig. Al in der Kälte nicht, beim Sieden nur in Spuren an; die Verwendung von Al-Gefäßen zum Lagerung von Essig erfolgt somit bedenkenfrei. Zur Verwendung für Essigleitungen sind dagegen unbrauchbar u. zwar greift Spritessig Al 5—30mal stärker an als heisse reine Essigsäure gleicher Konz. (1—10%); der stärkste Angriff geschah bei 10% Säure. Zur Aufbewahrung von Milch u. von gezuckerten u. ungezuckerten Produkten eignet sich 99%ig. Al ebenfalls. Auch zum Transporte von HNO₃ sind Al-Gefäße verwendet. Gegen Weinsäure ist Al in der Kälte sehr beständig. (Ztschr. des Vereins deutscher Kupferschmiedereien **1924**. Nr. 45 u. 46; 1924. Essigind. **28**. 342—43. 1924.)

N. F. Budgen, *Pyrophore Legierungen; ihre Herstellung und Eigenschaften*. Darst. der Gewinnung u. Verwendung des Ce u. seiner Legierungen. (Trade Journ. **75**. 761. 1924.)

E. P. Polushkin, *Bestimmung der strukturellen Zusammensetzung von Legierungen mit einem metallographischen Planimeter*. Vf. mißt mittels eines Planimeters in Mikrophotographien von metallograph. Schliffen die von den einzelnen Komponenten eingenommenen Flächen aus u. bestimmt auf diese Weise deren räumliche Volumverhältnis. Die Methode eignet sich zur Best. der Volumen der Bestandteile bei binären Eutektika u. anderen binären Legierungen von beliebiger Zus. Die Genauigkeit der Messung ist hinreichend groß, um unter Umständen eine chem. Analyse zu ersetzen. Geprüft wurde sie am Bi-Sn-Eutektikum, Ag-Cu-Eutektikum, Fe₃P-Fe-Eutektikum u. Bronze. (Trans. Amer. Inst. Mining and Metall. Eng. **1924**. Nr. 1387. 19 Seiten. New York.)

L. Quack, *Ein neues Flammenwerkzeug zum Bleilöten*. Beschreibung des Bleilötbrenners „ASSA“, der es ermöglicht, Blei mit Leuchtgas u. O₂ zu löten. (Ber. Ztg. **49**. 36. Berlin.)

Minerals Separation Ltd., London, *Schwimmbarmachung von Kupfersulfid*. Zur unterschiedlichen Schwimmbarmachung von Kupfersulfiden vor anderen Eutektikumsulfiden, wie ZnS, PbS u. FeS durch Anwendung eines bekannten, nur schwer wasserlöslichen Schaumbildners, wie Kresol, wird der letztere einer alkal. Bläue mit einer solchen Menge zugesetzt, die in der verwendeten Wassermenge ohne Anwendung weiterer Lösungsm. vollständig in echte Lsg. übergeht. — Es wird eine prakt. vollkommene Abscheidung des CuS als hochgradiges Konzentrat erzielt. (D. R. P. **405957** Kl. 1a vom 8/7. 1920, ausg. 10/11. 1924. E. Prior. 29/3. 1918.)

John Allingham, Los Angeles, V. St. A., *Reduktion von Erzen*. Zur Aus-
 erung der Red. dient ein geneigt angeordneter Schachtofen, in dessen oberen
 ein fast wagerecht liegender Drehrohrföfen mündet. Die zerkleinerten Erze
 n mit einem kohlenstoffhaltigen Stoff, wie Kohlepulver, Petroleumrückstände
 d. gemischt u. dem Drehrohrföfen zugeführt, in dem sie durch die Abhitze
 schachtofens, gegebenenfalls auch durch einen am unteren Ende angebrachten
 er erhitzt u. teilweise reduziert werden. Aus dem Drehrohrföfen gelangt die
 i den Schachtofen, in dem sie mittels in einer Anzahl von Brennern erzeugter
 en stark erhitzt wird. Als Brennstoff für diese Brenner dienen fl. oder
 mige Kohlenwasserstoffe, die Menge der zugeführten Luft bezw. sauerstoff-
 en Luft ist so gewählt, daß der Gehalt an O₂ völlig verbraucht wird u. noch
 orannte Kohlenstoffverb. zur völligen Red. der Erze vorhanden sind. Das
 i entstandene Metall sammelt sich am Boden des Schachtofens. (A. P. 1512262
 18. 1921, ausg. 21/10. 1924.)

KÜHLING.

Louis Burgess und Maurice Barnett, New Jersey, *Reduktion von Oxyden*.
 y: des Al, Ti, Zr, Be, B, Si usw. in reiner Form oder als Erze o. dgl. werden,
 ohle oder in der Hitze verkohlenden Stoffen gemischt, im letzteren Fall in
 e indifferenten bezw. reduzierenden Atm., geglüht, u. im Lichtbogen erhitzt. Je
 l der angewendeten Menge Kohle entsteht das entsprechende Metall bezw.
 oid, sein Carbid oder Gemische dieser Stoffe. Enthält der Rohstoff SiO₂, so
 at das entsprechende Silicid, gegebenenfalls neben dem Element, unter Um-
 n auch zugleich das Carbid u. SiC. Um Verflüchtigung von Teilen der
 onserzeugnisse zu verhüten, erfolgt die Umsetzung unter Druck, der mittels
 stehenden CO erzeugt wird. (A. P. 1512271 vom 11/9. 1920, ausg. 21/10.

KÜHLING.

Friedrich Schaffer, Budapest, *Verbesserung von Formstücken aus austenitischen*
Stählen. Die Formstücke werden aus Manganstahl hergestellt, dessen Ge-
 t Mn größer ist als zur Umwandlung des gesamten vorhandenen C in Mangan-
 erforderlich ist. Die Formstücke werden zunächst auf Temp. über 1000°
 u. dann abgekühlt; wobei die in der Zeiteinheit zur Einw. gebrachten
 ekapazitäten planmäßig entsprechend einer den gewünschten Eigenschaften
 ormstücks gewählten Zeittemperaturkurve geändert werden, die jedoch inner-
 es einerseits durch die Zeittemperaturkurve der Abschreckung u. anderer-
 urch die Zeittemperaturkurve der langsamen Abkühlung an freier Luft be-
 en Gebietes verlaufen muß. Die Erzeugnisse sind frei von ausgeschiedenem
 l. (Oe. P. 97789 vom 16/6. 1919, ausg. 10/9. 1924. D. Prior. 25/4. 1918.) KÜ.
Julian Detinning Company, Sewaren, übert. von: **William J. Buttfeld**,
 Plainfield, V. St. A., *Rückgewinnung von Zinn aus Altmetall*. Die Rohstoffe,
 zweisei Weißblech, werden, zweckmäßig mittels h. verd. Alkalilauge, von
 k, Lack, Fett o. dgl. befreit u. dann bei etwa 90° mit oxydierend wirkenden
 a Fl. behandelt, z. B. mit NaOH u. NaNO₃ enthaltenden wss. Lsgg. Hierbei
 ch das Sn als Stannat. Aus dieser Lsg. wird das Stannat durch Krystalli-
 o, z. B. nach Anreichern der Lsg. mit NaOH oder NaNO₃ oder beiden, oder
 Einengen u. Abkühlen, abgeschieden, in h. W. gelöst, bei etwa 80° mit
 noden u. Zinn- oder verzinnnten Kathoden elektrolysiert u. das an der Kathode
 nene Sn geschmolzen. Die Mutterlaugen von der Krystallisation des Stannats
 entzinnnte Elektrolyt werden zu weiterer Stannatb. in den Vorgang zurück-
 it. (A. P. 1511590 vom 1/11. 1920, ausg. 14/10. 1924.)

KÜHLING.

Carl Neumann-Spallart, Wien, *Reinigung von schwammförmig ausgefälltem*
Gold. Die aus ihren Lsgg. mittels unedler Metalle gefällten Edelmetalle
 i in w. W. verteilt, die anhaftenden unedlen Metalle durch vorsichtigen Zu-
 erd. HNO₃ oder anderer Säuren, in diesem Fall unter Mitverwendung eines

Oxydationsmittels gel. u. die Lsg. durch Auswaschen entfernt. (Oe. P. 98169 vom 15/10. 1923, ausg. 10/10. 1924.) KÜHLIN

John A. Boughton, Everett, V. St. A., *Formsand*. Scharfer Sand von hohem Gehalt an SiO_2 u. gleichmäßiger Korngröße wird innig verrührt mit einem dünnen Brei, der durch Vermischen von an SiO_2 , Fe_2O_3 u. Al_2O_3 reichem, an CaO , Al_2O_3 u. dgl. armem Ton mit W. erhalten worden ist. Unter diesen Bedingungen wird jedes Sandkörnchen mit dem Tonbrei überzogen u. das Erzeugnis ist bildsam, haltbar u. hitzebeständig. (A. P. 1511939 vom 26/10. 1922, ausg. 14/10. 1924.) KÜHLIN

Kemet Laboratories Company, Inc., New York, übert. von: **Hugh S. Coker**, Cleveland, V. St. A., *Emaillieren von Metallen*. An Stelle oder neben SnO_2 oder ZrO_2 wird den Emailsätzen CeO_2 oder das Oxyd einer anderen seltenen Erde bzw. Gemische von solchen Oxyden zugesetzt. Enthält das Oxyd Fe_2O_3 , so besitzt die Emailleschicht gelbliche Farbe. Dies kann durch Zusatz von etwas Co_2O_3 vermieden werden. (A. P. 1510829 vom 11/1. 1921, ausg. 7/10. 1924.) KÜHLIN

Ernst Mautner, Wien, *Blattmetalle*. Die Metalle werden in bekannter Weise auf mit Trennschichten aus Gelatine, Harz o. dgl. bedeckten Unterlagen aus feinem Porzellan, Cellon o. dgl. niedergeschlagen, hierauf an gummiertes Papier oder auf anderen verbrennlichen, zusammenhängenden Stoff gebunden, mit diesem abgezogen u. auf mit Fasergips ausgegossene Asbestplatten gelegt u. gegläht. Die Metallhäute werden dann, gegebenenfalls in mehreren übereinander gelegten Lagen, durch Pressen oder Walzen verdichtet u. geglättet. Es lassen sich so auch hauchdünne Häutchen unverletzt ablösen u. glätten. (Oe. P. 97406 vom 1/10. 1923, ausg. 1/10. 1924.) KÜHLIN

IX. Organische Präparate.

H. G. Chickering, *Cyanide und chemische Technik*. Vf. beschreibt die Erfindung eines Verf. zur Herst. von NaCN durch Überleiten von N_2 über Na_2CO_3 u. C bei 975° unter Druck. An Stelle von Soda u. Koks wurde eingedampfte Koehle aus der Papierfabrikation vorteilhaft verwendet u. dadurch als Nebenprod. eine färbungskohle gewonnen. (Chem. Metallurg. Engineering 31. 967—70; Chem. Technol. Journ. 76. 40—41. 1924.) JUN.

Holzverkohlungs-Industrie Akt.-Ges., übert. von: **Koloman Róka**, Budapest, *Verfahren zum Chlorieren von Acetylen*. Man läßt C_2H_2 u. Cl_2 in Gegenwart von Katalysatoren u. überhitztem Dampf als Verdünnungsmittel bei Temp. zwischen 400 u. 250° aufeinander einwirken. — Z. B. wird durch ein mit Tonscherben, die mit CuCl_2 , CaCl_2 oder FeCl_3 imprägniert sind, beschicktes Tonrohr C_2H_2 u. Cl_2 im Verhältnis von 1:2 u. gleichzeitig überhitzter Dampf geleitet, nachdem das Reaktionsrohr vorher auf die erforderliche Temp. gebracht wurde. Die aus dem Rohr tretenden, lediglich *Chlorierungsprodd. des Acetylens*, Dampf u. HCl enthaltenden Gase geben bei der Kondensation zwei Schichten, von denen die obere eine wss. HCl -Lsg., die untere schwerere die Cl -Deriv. enthält. Nach Trennung der beiden Schichten können die einzelnen Chlorierungsprodd. durch fraktioniertes Dest. abgeschieden werden. (Hierzu vgl. auch A. P. 1418882; C. 1923. II. 1555 bzw. E. P. 174635; C. 1922. IV. 941.) (A. P. 1516350 vom 1/9. 1922, ausg. 1/10. 1924.) SCHOTTLÄND

Auguste Lumière, Lyon, Frankreich, *Herstellung von Thioglycerinsulfosäure und deren Derivaten*. Man behandelt *Epichlorhydrin* bei 15° mit wss. NaHSO_3 -Lsg. u. löst das Na -Salz der *Chlorhydrinsulfosäure* $\text{Cl}\cdot\text{CH}_2\cdot\text{CH}(\text{OH})\cdot\text{CH}_2\cdot\text{SO}_3\text{Na}$ in Wasser u. setzt die theoret. Menge NaHS hinzu u. erhitzt zum Sieden. Man erhält so das Na -Salz der *Thioglycerinsulfosäure* $\text{SH}\cdot\text{CH}_2\cdot\text{CH}(\text{OH})\cdot\text{CH}_2\cdot\text{SO}_3\text{Na}$. Die wss. Lsg. des Salzes wird mit Ag_2O versetzt, wobei sich ein gräulicher Nd. bildet, der beim Erwärmen

gelb gefärbte Lsg. bildet. Ein Überschuß von Ag_2O muß vermieden werden, andernfalls Red. zu metall. Ag (Spiegel) erfolgen würde. Beim Abkühlen auf 0° fällt aus der Lsg. das *Ag-Na-Salz* der *Thioglycerinsulfosäure* $\text{AgS}\cdot\text{CH}_2\cdot\text{CH}(\text{OH})\cdot\text{SO}_3\text{Na}$ (hierzu vgl. C. r. d. l'Acad. des sciences 176. 540; C. 1923. I. 1406). Als innerliches *Antisepticum* kann es auch zur *Konservierung* von *Leim* u. *Wasser* dienen. Andere Metalle oder Metalloide, wie Hg, Pb, Sb oder As, geben keine Komplexe mit dem Na-Salz der *Thioglycerinsulfosäure*. (F. P. 548343 vom 11/5. 1921, ausg. 12/1. 1923.) SCHOTTLÄNDER.

Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Leverkusen b. Köln a. Rh., *Herstellung einer komplexen Silberverbindung der Thiodiglykolsäure*, darin bestehend, daß man die Thiodiglykolsäure durch Behandeln mit einer Ag-Verb. in eine komplexe Ag-Verb. überführt. — Z. B. wird Ag_2O in einer wss. Lsg. von Thiodiglykol unter Erwärmen gel., filtriert u. das Filtrat bis zur eben noch sauren Rk. mit Na_2CO_3 neutralisiert. Nach nochmaligen Erwärmen auf 100° u. 48std. Stehen wird in A. filtriert, wobei das *Ag-Na-Salz* der *Thiodiglykolsäure* ausfällt. Das Filtrat trocknet, in W. ill. Pulver, die neutral reagierende wss. Lsg. ist gut haltbar u. eine Beizwrkkg. aus. Anstelle des Ag_2O können auch die Ag-Salze der Adipinsäure, Zimtsäure, Salicylsäure oder Ag_2SO_4 verwendet werden. (Schwz. P. 105813 vom 13/7. 1923, ausg. 1/7. 1924.) SCHOTTLÄNDER.

Carl Mangold, Wien, **Rudolf Defris** und **Franz Hecke**, Stockerau, *Verfahren zur Gewinnung von Citronensäure oder deren Salzen* aus Citronen oder Citronensaft, dad. gek., daß man den rohen Saft oder die geschälten Citronen unter einem Druck von 3—5 at. u. einer Temp. von 130—150°, mit oder ohne Zusatz von Klär- u. Entfärbungsmitteln erhitzt, filtriert, den unl. Rückstand säurefrei auswascht u. das so gewonnene Filtrat in bekannter Weise auf *citronensaure Salze* durch Zerlegung dieser mit H_2SO_4 auf *Citronensäure* verarbeitet. — Als Klär- u. Entfärbungsmittel dienen z. B. Eponit oder gereinigte Tierkohle. Beim Erhitzen des Saftes scheiden sich Eiweiß- u. Schleimstoffe als unl. körniger, besonders leicht abfiltrierbarer Nd. ab. Das braun gefärbte u. brenzlich riechende Filtrat gibt bei der Neutralisation mit $\text{Ca}(\text{OH})_2$ oder CaCO_3 *Calciumcitrat* mit einem Gehalt von 72% Citronensäure gegen nur 64% bei der bisher im Handel erhältlichen Ware. (P. 93942 vom 19/7. 1921, ausg. 10/8. 1923.) SCHOTTLÄNDER.

Erwin S. Joseph, Rahway, V. St. A., *Herstellung von Alkalicyaniden*. Feinverteilter Kalkstickstoff wird in W. verteilt u. durch allmählichen Zusatz eines Kalksalzes, dessen Säurerest ein unl. Kalksalz bildet, in letzteres u. Alkalicyanamid überführt. Als Zusätze dienen z. B. Na_2CO_3 oder Na_2SO_4 , zweckmäßig, um das Filtrat alkal. Rk. zu verhüten, unter Mitbenutzung von NaHCO_3 bzw. NaHSO_4 . Das unl. Kalksalz filtrierte Lsg. wird bei niederer Temp., gegebenenfalls im Vakuum, zur Trockne verdampft u. der Rückstand mit Holzkohle o. dgl. verascht. (A. P. 1510891 vom 23/4. 1923, ausg. 7/10. 1924.) KÜHLING.

United States of America, übert. von: **Graham Edgar**, Washington, V. St. A., *Temperaturregelung bei chemischen Umsetzungen*. Umsetzungen zwischen festen u. gasförmigen Stoffen werden in der Weise durchgeführt, daß der feste Stoff in einem Luftstrom fein verteilt u. in diesem Zustand mit der fein verteilten (verstäubten) Fl. in Berührung gebracht wird. Hierbei werden unerwünschte Temperaturschwankungen vermieden u. das Erzeugnis der Umsetzung zugleich getrocknet. Z. B. wird in dieser Weise *Kalkstickstoff* mit verd. H_2SO_4 zu Harnstoff umgesetzt, Überschuß an H_2SO_4 kann durch fein verteiltes Rohphosphat neutralisiert werden. (A. P. 1511875 vom 1/1. 1920, ausg. 14/10. 1924.) KÜHLING.

Société Anonyme de Produits Chimiques de Saint-Denis, Paris, *Herstellung von Harnstoff aus Calciumcyanamid*. Man setzt zu H_2SO_4 54° Bé. fein getrocknetes $\text{CN}\cdot\text{N}\cdot\text{Ca}$ u. hält hierbei die Temp. durch Außenkühlung unterhalb 35°.

Nach kräftigem Verrühren der M., wird sie einige Stdn. auf 50° erwärmt, fein mahlen u. mit 40–50° w. W. extrahiert. Nach Abpressen des unl. Anteils die wss. Lsg. des Harnstoffs mit einer neuen Menge des mit H₂SO₄ vorbehandelten CN:N:Ca vermisch u. getrocknet. Das Prod. ist an Harnstoff angereichert. Die wss. Harnstofflsg. kann auch vorsichtig mit soviel H₂SO₄ angesäuert werden, daß die Lsg. ca. 67% H₂SO₄ enthält, u. wird dann zur Zers. von CN:N:Ca verwendet, wobei ein Prod. mit noch höherem Harnstoffgehalt entsteht. — Die Prodd. können auch mit natürlichen Phosphaten versetzt u. dann mit H₂SO₄ 53° bei ca. 75° behandelt werden. Man erhält ein l., H₃PO₄ u. Harnstoff enthaltendes Gemisch, das entweder als solches oder nach Extraktion mit W. u. Eindampfen unterhalb 75° als *Mischdünger* Verwendung finden kann. (F. P. 547514 vom 18/12. 1921, ausg. 18/12. 1922.)

SCHOTTLÄNDE

Eduard Kopetschni, Graz, *Darstellung von Hydrazoderivaten des Anthrachinon*, dad. gek., daß man Azoanthrachinone mit (NH₄)₂S behandelt. — Man erhitzt 2,2'-Azoanthrachinon in alkoh. Suspension mit wss. (NH₄)₂S-Lsg. zum Sieden, in der schwachgelbliche Ausgangsstoff eine kräftig ziegelrote Färbung angenommen hat. 2,2'-Hydrazoanthrachinon ist in h. A., Eg. u. Xylol fast unl., in Anilin u. Nitrobenzol in der Wärme ll. mit hellgelber Farbe, aus diesen Lsgg. krystallisiert es in roten Blättchen beim Erkalten wieder aus; stärkere Reduktionsmittel u. Na, O führen es in 2-Aminoanthrachinon über. — Das in analoger Weise aus 1,1'-anthrachinon erhaltliche 1,1'-Hydroazoanthrachinon ist ein in A. u. Eg. unl. in Nitrobenzol mit gelbroter Farbe l. violettrotes Pulver. Die Prodd. sind Ausgangsstoffe für die Herst. von Farbstoffen. (Oe. P. 96528 vom 17/6. 1922, ausg. 14/12. 1924.)

SCHOTTLÄNDE

F. Hoffmann-La Roche & Co. Akt.-Ges., Basel (Schweiz), *Darstellung von Bromdiäthylacetylbenzylamin*, dad. gek., daß man Bromdiäthylacetylhalogenide u. Benzylamin einwirken läßt. — Die Rk. wird zweckmäßig in Ggw. indifferenten Verdünnungsmittel, wie Ä., u. von halogenwasserstoffsäurebindenden Stoffen, wie NaOH oder einem Überschuß von Benzylamin, ausgeführt. Beispiele für die Herst. des Amids unter Verwendung von Bromdiäthylacetylbromid sind angegeben. a. *Bromdiäthylacetylbenzylamin*, C₆H₅·CH₂·NH·CO·C(Br)·(C₂H₅)₂, farblose, schwer bitter schmeckende Krystalle, F. 59–60°, swl. in W., ll. in A., Ä. u. Bzl., betz wertvolle sedative u. hypnot. Eigenschaften u. findet, da es nur wenig tox. wirkt, therapeut. Verwendung. (Schwz. P. 102419 vom 28/10. 1922, ausg. 12/12. 1923.)

SCHOTTLÄNDE

National Aniline & Chemical Company, Inc., New York, übert. n. **Homer W. Hillyer**, Farmington, Connecticut, V. St. A., *Herstellung von 6-Nitro-2-amino-1-oxybenzol-4-sulfosäure*. Reine 2-Amino-1-oxybenzol-4-sulfosäure wird in konz. H₂SO₄ gel. u. bei einer Temp. von 0° oder darunter mit der annähernd theoret. erforderlichen Menge Mischsäure nitriert. — Die Nitrosäure wird in derart reinem Zustande gewonnen, daß sie ohne besondere Abscheidung nach Neutralisation der konz. H₂SO₄ mit Alkali diazotiert u. mit Azofarbstoffkomponenten gekuppelt werden kann. Gießt man die Reaktionslsg. auf Eis u. krystallisiert aus, ausgeschiedene Rohprod. aus h. W. um, so wird die 6-Nitro-2-amino-1-oxybenzol-4-sulfosäure in durchsichtigen gelben Prismen erhalten, die Lsg. in verd. Alkalien orangefelb gefärbt, auf Zusatz von mehr Alkali dunkler werdend; Mononatriumsalz aus h. W. dunkelrote Platten mit 1 Mol. H₂O, gegen Congo sauer reagierend, die h. wss. Lsg. zers. Carbonate, NaCl fällt aus ihr das Na-Salz nahezu quantitativ in leuchtenden gelblichroten Krystallen aus. (A. P. 1504044 vom 12/3. 1924, ausg. 5/8. 1924.)

SCHOTTLÄNDE

National Aniline & Chemical Company, Inc., New York, übert. von: **W. Bissell** und **Robert B. Mc Cann**, Buffalo, New York, V. St. A., *Herstellung*

Oxy-4',4''-tetraäthyl-diaminotriphenylmethandisulfosäure. Man kondensiert 1 Mol. *o*-Nitrobenzaldehyd mit mindestens 2 Mol. *Diäthylanilin* in Ggw. von H_2SO_4 66° Bé. —115°, gießt den Inhalt des Gefäßes in eine eiserne Pfanne, zerkleinert die feste Schmelze u. vermahlt das entstandene *Sulfat* des *3-Oxy-4',4''-tetraäthyl-diaminotriphenylmethans* zu einem groben Pulver. Dieses wird in ein Gemisch aus S 66° Bé. u. 26%ig. *Oleum* eingetragen, wobei die Temp. nicht über 30° gehen soll, gibt weitere Mengen 26%ig. *Oleum* hinzu u. rührt 48 Stdn. bei 23—27°. Es wird das Sulfonierungsgemisch in W., das sich in einem verbleiten Kessel kocht, unter starkem Rühren eingegeben. Beim Abkühlen auf 15° scheidet sich das *Hydrat* der *Disulfosäure* in grauweißen feinen Krystallen ab, die mehrfach mit W. gewaschen, filtriert u. durch einen Luftstrom getrocknet werden. Das Prod. schmilzt bei ca. 70° sein gesamtes Krystallwasser u. geht in die wasserfreie *3-Oxy-4',4''-tetraäthyl-diaminotriphenylmethandisulfosäure*, feines, in W. u. verd. Säuren unl., in Ä. unl., Pulver, über, F. 282—282,5°, leicht wieder durch Einw. von W. das *Hydrat* rückbildend. Das Vorliegen einer zweibas. Säure ergibt sich daraus, daß 1 Mol. zur Lsg. ca. 2 Äquivalente NaOH benötigt. (A. P. 1509413 vom 29/11. 1922, ausg. 23/9. 1924.)

SCHOTTLÄNDER.

Edouard Goutal und Henri Hennebute, Paris, *Abscheidung von Phenolen aus Alkaliphenolatlösungen*. An Stelle der CO_2 aus Kalkbrennöfen werden die bei der Trocknung Dest. von Brennstoffen, wie Torf oder Braunkohle, zunächst enthaltenen an CO_2 reichen Gase in die wss. Lsgg. der Alkaliphenolate eingeleitet. Neben Na_2CO_3 werden so die freien *Phenole* erhalten. Gleichzeitig werden die in der Lsgg. austretenden Gase an CO , H u. CH_4 angereichert u. können so zu anderen Zwecken nutzbar gemacht werden, während sie ursprünglich nahezu unverbrennbar sind. (F. P. 545137 vom 11/11. 1921, ausg. 6/10. 1922.) SCHOTTLÄNDER.

National Aniline & Chemical Company, Inc., New York, übert. von: *Don J. B. Russell*, Buffalo, New York, V. St. A., *Herstellung von m-Nitrobenzaldehyd*. Man kocht allmählich in die 2 $\frac{1}{2}$ -fache Menge *Nitriersäure*, enthaltend ca. 28—30% HNO_3 , 10% H_2SO_4 u. 4—7% W., unter Rühren u. Innehaltung einer Temp. von 5 bis 10° *o*-Nitrobenzaldehyd ein, filtriert die ausgeschiedenen Nitroverb. ab, wäscht sie mit W. bei 40° w. Waschl. u. scheidet aus dem gebildeten Öl den *m-Nitrobenzaldehyd* dreimalige fraktionierte Krystallisation ab. Die ölige Mutterlauge enthält noch die Hauptsache *o-Nitrobenzaldehyd*. Die Ausbeute an Mononitroderiv. beträgt ca. 92—95%. B. von *Nitrobenzoesäure* tritt bei dem Verf. nicht ein. Der *o*-Nitrobenzaldehyd dient als Ausgangsstoff für die Herst. von *m-Aminobenzaldehyd*. (A. P. 1509412 vom 24/1. 1920, ausg. 23/9. 1924.)

SCHOTTLÄNDER.

Paul Karrer, Zürich (Schweiz), *Darstellung von Phlorisocaprophenon*, darin bestehend, daß man *Phloroglucin* mit *Isocaproensäurenitril* u. Halogenwasserstoff zu *Phlorisocaprophenon* kondensiert u. letzteres durch Verkochen mit W. zu *Phlorisocaprophenon* verseift. (Hierzu vgl. auch KARRER u. ROSENFELD, *Helv. chim. Acta* 707; C. 1922. I. 327.) (Schwz. P. 102196 vom 6/11. 1922, ausg. 1/12. 1923. Schwz. P. 97749; C. 1923. IV. 828.)

SCHOTTLÄNDER.

Industrial Resinera-Ruth, S. A., Bilbao, Spanien, *Darstellung eines Gemisches von Camphen und Isobornylester aus Pinenchlorhydrat* durch Erhitzen mit *Fettsäure* u. fettsaurem Zn, dad. gek., daß man die Entchlörung bei Temp., die über dem Kp. der angewandten *Fettsäure* liegen, vornimmt. — Z. B. wird *Pinenchlorhydrat* mit einer bereits einmal zur Entchlörung gebrauchten *Zn-Acetat-Lsg.*, enthaltend Eg., *Zn-Acetat*, etwas *Na-Acetat*, wenig *NaCl* u. *Terpene*, unter Druck auf 120—125° erhitzt, dann wasserfreies *Na-Acetat* zugefügt u. 1 $\frac{1}{2}$ Stde. bei 100° gerührt. Nach mehrstd. Stehen scheidet sich die *Terpene* klar ab. Diese u. das ebenfalls ausgeschiedene *NaCl* werden abgetrennt, die *Zn-Acetat-Eg.-Lsg.*, nach entsprechendem Konzentrieren, wieder ge-

brauchsfertig ist. (Schwz. P. 105232 vom 24/5. 1923, ausg. 2/6. 1924. Span. P. 5/1. 1923.) SCHOTTLÄNDE

The Grasselli Chemical Company, Ohio, übert. von: **Roger N. Wall**, New York, V. St. A., *Herstellung von 2-Oxynaphthalin-3-carbonsäure*. Man behauptet eine homogene Schmelze von β -Naphtholalkali in β -Naphthol bei ca. 200–300° mit CO₂ unter erhöhtem Druck. — Z. B. wird wasserfreies β -Naphthol-Na unter Rühren bei 225° in β -Naphthol gel. u. unter Druck in die Schmelze CO₂ eingeleitet, wobei die Temp. auf 250° gesteigert wird. Beim Erkalten wird der Autoklavinhalt mit W. extrahiert u. das gebildete Na-Salz der 2-Oxynaphthalin-3-carbonsäure in β -Naphthol in bekannter Weise getrennt. Das Verf. bietet den Vorteil, das die isomeren 2-Oxynaphthalin-1-carbonsäure u. deren Zersetzungsprodd., Naphtoxanthon u. W., fast ganz vermieden wird. (A. P. 1470039 vom 19/7. 1922, ausg. 9/10. 1923.) SCHOTTLÄNDE

National Aniline & Chemical Company, Inc., New York, übert. von: **H. Cone**, Mountain Lakes, New Jersey, V. St. A., *Herstellung von 2-Oxynaphthalin-3-carbonsäure*. Molekulare Mengen β -Naphthol u. NaOH werden in der eben ausreichenden Menge W. gel. u. im geschlossenen Gefäß unter vermindertem Druck mit Paraffinwachs erhitzt, bis das W. nahezu ganz ausgetrieben ist. Hierauf wird die Temp. auf 200° gesteigert u. die M. bis zur vollständigen Entwässerung bei dieser Temp. gehalten. Beim Erkalten erhält man eine feste Paraffinmasse, in der das absol. trockene β -Naphtholnatrium gleichmäßig fein verteilt ist. Zur Überführung in die Carbonsäure wird die geschmolzene Paraffinmasse auf 125–130° abgekühlt u. unter Rühren u. Druck mit CO₂ behandelt, wobei die Temp. zum Schluß auf ca. 250° gesteigert. Zur Trennung des Na-Salzes der 2-Oxynaphthalin-3-carbonsäure vom Paraffin wird die erkaltete M. aus dem Autoklav entnommen u. mit h. W. ausgelaugt, wobei das Na-Salz der Säure gel. wird, während das Paraffin auf der Oberfläche der Lsg. schwimmt, von der es leicht abgehoben werden kann. (A. P. 1503984 vom 15/2. 1922, ausg. 5/8. 1924.) SCHOTTLÄNDE

Gesellschaft für Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, *Herstellung von 4-Oxynaphthalin-1-phenylketon*, dad. gek., daß man auf 1 Mol. α -Naphthol, u. den Ausschluß von Alkalien, mindestens 1 Mol. Benzotrichlorid einwirken läßt. — an kann auch in Ggw. indifferenten Verdünnungsmittel u. von Kondensationsmitteln arbeiten. Beispiele sind angegeben für die Kondensation in Ggw. von H₂SO₄, bezw. von ZnO in einer Lsg. von Nitrobenzol. Das durch Umlösen u. Bzl. gereinigte 4-Oxynaphthalin-1-phenylketon ist ident. mit dem nach D. R. P. 378908 u. 378909; C. 1923. IV. 593 durch Abspaltung von CO₂ aus der entsprechenden 3-Carbonsäure erhältlichen Prod. (Schwz. P. 105396 vom 6/3. 1923, ausg. 16/6. 1924. Z. s. zu Schwz. P. 98559; C. 1923. IV. 593.) SCHOTTLÄNDE

The Barrett Company, New Jersey, übert. von: **George C. Bailey**, Wall-cliff-on-Hudson, New Jersey, V. St. A., *Herstellung von Anthrachinon und deren Kernsubstitutionsprodukten*. Benzoyl-o-benzoesäure oder deren Kernsubstitutionsprodd. werden bei erhöhter Temp. mit konz. H₂SO₄ oder Oleum behandelt u. die Reaktionsprodd. möglichst schnell, unter Vermeidung des Überkochens u. ständigem Rühren in h. W. gegossen. Hierbei scheiden sich das Anthrachinon u. die kernsubstituierten Derivv. in leicht filtrierbarer, krystallisierter Form ab. Beispiele sind angegeben für die Herst. von 2-Methylantrachinon aus m-Methylbenzoyl-o-benzoesäure, — oder Anthrachinon aus Benzoyl-o-benzoesäure, u. von 2-Chloranthrachinon aus m-Chlorbenzoyl-o-benzoesäure. Die betreffenden Ausgangsstoffe entstehen durch Kondensation von Phthalsäureanhydrid mit Toluol, bezw. Bzl., bezw. Monochlorbenzol in Ggw. von AlCl₃. (A. P. 1515325 vom 8/2. 1921, ausg. 11/11. 1924.) SCHOTTLÄNDE

The Eli Lilly & Company, übert. von: **Horace A. Shonle**, Indianapolis, Indiana, *Herstellung von C,C-Dialkylbarbitursäuren*. Man kondensiert in der üblichen

Harnstoff in Ggw. von NaOC₂H₅ mit *Isobutyläthyl-* bzw. *Isoamyläthyl-* säuredialkylestern. — *Isobutyläthylbarbitursäure* aus W. Krystalle, F. 174°. — *Isoamyläthylbarbitursäure* aus W. Krystalle, F. 153—155°. Die Prodd. l. in k., etwas l. in h. W., ll. in A. u. Ä., schwach bitter schmeckend; l. in k. W., weniger l. in absol. A. Die l. Salze finden in Form von kan. Injektionen therapeut. Verwendung, die freien Säuren auch per os. Verhältnis zwischen wirksamer u. letaler Dosis liegt bei den Prodd. wesentlich geringer als bei der Diäthylbarbitursäure, der Diisobutylbarbitursäure u. der n. Äthylbarbitursäure, die sie zum Teil durch geringere Giftwrgk. übertreffen. F. 1514572 u. 1514573 vom 21/3. 1921, ausg. 4/11. 1924.) SCHOTTLÄNDER.

Chemische Fabrik vormals Sandoz, Basel (Schweiz), *Darstellung von Lobelin*. Versetzt zu einem Gemisch der Alkaloide von *Lobelia inflata* *Anthrachinon-sulfosäure*. Hierbei scheidet sich das wl. *anthrachinon-β-monosulfosaure Lobelin* ab, worauf man filtriert u. das Salz durch eine Base zerlegt. — Z. B. das von nicht bas. Begleitstoffen befreite Alkaloidgemisch in A. gel., filtriert, in alkoh. Lsg. von *Anthrachinon-β-monosulfosäure* versetzt u. nach 24-std. in das ausgeschiedene Salz abgesaugt. Das *anthrachinon-β-monosulfosaure Lobelin* C₃₃H₂₉O₂N·C₁₁H₁₇O₂(SO₃H)^β, aus A. kanariengelbe, dünne, rhomb. Blättchen in w. l., oberhalb 200° unter Braunfärbung erweichend u. von 206° (korr.) an zers. schm., swl. in k. A., in 150 Teilen sd. A. l., in k. W. nahezu unl., 10% N u. 5,0% S, wird feingepulvert in W. suspendiert u. unter Ausschütteln durch NH₃ zerlegt. Beim Verdunsten des Ä. bleibt reines α-Lobelin zurück, das auf das Chlorhydrat weiter verarbeitet werden kann. — Man kann auch die Ägel. Rohbasen aus *Lobelia inflata* durch äth. Oxalsäure als *Oxalate* fällen, in A. lösen u. alsdann aus der alkoh. Lsg. wie oben mit *Anthrachinon-sulfosäure* das Salz des α-Lobelins abscheiden. — Oder man trennt das wertvolle α-Lobelin von den Begleitalkaloiden durch Ausschütteln des Gem. mit W. nicht mischbaren organ. Lösungsm. gel. Alkaloidgemisches mit wäss. Lsg. der *Anthrachinonsulfosäure* u. krystallisiert das *anthrachinon-sulfosäure-α-Lobelin* aus A. um. (Schwz. P. 102143 vom 20/11. 1922, ausg. 1923.) SCHOTTLÄNDER.

X. Farben; Färberei; Druckerei.

H. Calbeck, *Von 50 Pfund in der Stunde zu 15 tons im Tag. Ein typisches Beispiel der chemisch-technischen Entwicklung*. Vf. beschreibt die Verss. u. Übertragung der Methode der Herst. von *Bleiweiß*. Geschmolzenes Blei wurde in einer Naturgas-Ofen unter Zuleitung von SO₂ zerstäubt. Das Verf. lieferte bei geeigneten Bedingungen ein besonders weißes Prod. (Chem. Metallurg. Engineering 31. 920—24. 1923.) JUNG.

Snier, *Malerei auf Zement verwirklicht durch Verwendung von „Cimac“*. „Cimac“ ist ein Verputz, der das Malen auf Zement wie auf Holz ermöglicht. (Chim. analyt. appl. [2] 6. 355—57. 1924. Nantes.) JUNG.

Robert Mohr, Eibergen, Holland, *Vorrichtung zum Bleichen von Textilgut* nach Pat. 311456 dad. gek., daß das Expansionsgefäß mittels der Luftpumpe unter Druck gesetzt wird, der nur um so viel unter dem Druck im Bleichkessel liegt, daß der Überlauf aus diesem in das Expansionsgefäß gesichert ist, u. daß der Unterschied zwischen dem Expansionsgefäß u. dem Bleichkessel durch einen in beide eingeschaltete Druckausgleichvorrichtung aufrecht oder annähernd erhalten wird, deren aus zwei miteinander verbundenen Kolben zweier Zylinder bestehende Druckregler einerseits unter dem Drucke im Bleichkessel, anderseits unter demjenigen im Expansionsgefäße steht, u. entsprechend dem auf-

recht zu erhaltenden Druckunterschiede einseitig belastet, auf ein Regelungsverhalten in der Druckleitung wirkt. (D. R. P. 407293 Kl. 8a vom 30/5. 1923, ausg. 1/2 1924. Zus. zu D. R. P. 311546; C. 1919. II. 776.) FRAN

Kochelwerk Aktiengesellschaft für chemische Erzeugnisse, Berlin, *Herstellung von Bleicherden*, die auch zur Erzeugung von Körperfarben geeignet sind. Dad. gek., daß man natürliche oder künstliche Silicate mit alkal. Lsgg. oder Stoffe erwärmt, alsdann in bekannter Weise neutralisiert, auswäscht u. trocknet. (D. R. P. 407618 Kl. 12i vom 5/4. 1922, ausg. 18/12. 1924.) KAUSCH

American Tripoli Company, übert. von: **Ralph A. Airheart**, St. Louis, Missouri, *Waschverfahren*. Man setzt zu der Waschl. einen reibend u. adsorbierend wirkenden Stoff, wie amorphe kieselsäurehaltige Ablagerungen, z. B. Tripoli, oder den Zusatz wird Zeit u. Seife erspart. Man behandelt das zu reinigende oder Wäsche, in einer Waschmaschine mit der Seifenlsg. u. gibt nach einiger Zeit einen kieselsäurehaltigen Stoff zu. (A. P. 1515647 vom 8/5. 1922, ausg. 18/11. 1924.) BR

Société Alsacienne de Produits Chimiques, Elsaß, *Herstellung einer an Fixieren von basischen Farbstoffen auf Baumwolle dienenden Beize*. Man ertzt Ellagsäure mit Schwefel u. NaOH oder Na₂S, bis die H₂S-Entwicklung auftritt, leitet nach dem Erkalten Luft durch u. säuert an; das Prod. ist in Alkalien unlöslich. zieht unter Zusatz von Na₂CO₃, Na₂SO₄ oder NaCl auf Baumwolle; es dient als Ersatz für Tannin zum Fixieren bas. Farbstoffe, die Färbungen sind waschecht u. seifenechter als die mit Hilfe von Tannin hergestellten Färbungen. (F. P. 575815 vom 26/3. 1923, ausg. 4/8. 1924.) FRAN

Joseph Pokorný, Seine, Frankreich, *Reservieren der pflanzlichen Faser gegen substantive Farbstoffe und Küpenfarbstoffe*. Man behandelt die pflanzliche Faser mit Tannin u. Brechweinstein; beim Verweben von behandeltem Garn mit unbehandeltem u. Färben mit substantiven Farbstoffen erhält man Weiß- bzw. Effektfäden. Bedruckt man Baumwollgewebe mit einer verdickten Mischung von Tannin u. einem bas. Farbstoff, dämpft u. behandelt mit Brechweinstein, so erhält man nach dem Färben mit substantiven Farbstoffen oder Küpenfarbstoffen echte Farbergebnisse. (F. P. 575818 vom 14/1. 1924, ausg. 6/8. 1924.) FRAN

Chemische Fabrik Griesheim-Elektron, Frankfurt a. M. (Erfinder: **August Leopold Laska** und **Arthur Zitscher**, Offenbach a. M.), *Erzeugung echter schwarzer Färbungen auf der Faser*. (D. R. P. 403991 Kl. 8m vom 18/4. 1923, ausg. 1/10 1924. Zus. zu D. R. P. 383903; C. 1924 I. 2306. — C. 1924. II. 2503.) FRAN

Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Leverkusen b. Köln a. Rh. (Erfinder: **Georg Rudolph**, Köln-Mülheim), *Herstellung von Effektfäden aus tierischen Fasern*, dad. gek., daß man Gerbstoffe in Verb. mit Sn-Salzen unter Verwendung von Ameisensäure auf der Wolle niederschlägt. — Man erhält Effektfäden, die mit Wäsche u. Walke widerstehen, u. die mit un behandelter Wolle verwebt, im Seifenwasser gefärbt rein weiß bleiben. Bunteffekte erhält man, wenn man unter Zusatz von Tannin färbt. (D. R. P. 407834 Kl. 8m vom 10/4. 1923, ausg. 23/12. 1924.) BR

Kaumagraph Co., New York, übert. von: **Trowbridge Marston**, Morristown und **Winthrop Stanley Lawrence**, Brooklyn, *Druckfarbe für Gewebstoffe* bestehend aus einem neutralen, leicht oxydierbaren Träger, einem Trockenmittel u. einem Farbstoff, wie Bronzestaub, Chromgelb, Mennige, Ruß u. dgl. Der neutrale Träger besteht z. B. aus einer Mischung von Paracumaron, gekochtem Leinöl u. zwischemäßig etwas Mineralöl. Die Farbe wird zunächst in dem gewünschten Muster auf Papier aufgebracht, das Papier mit der bemusterten Seite auf den Gewebstoff gelegt u. die Übertragung durch Erhitzen, z. B. mittels Plätteisens bewirkt. (A. P. 1511816 vom 7/4. 1923, ausg. 14/10. 1924.) KÜHLIN

British Celanese Limited, formerly **British Cellulose and Chemical Manufacturing Company Limited**, London, und **George Holland Ellis**, Spalding

benzyl-, Färben und Drucken von Celluloseacetat. Man färbt mit den Leukoverb. -benzo- oder -naphthochinonmonoimide bezw. Indophenole mit oder ohne Schutzkolloiden u. behandelt dann mit Oxydationsmitteln wie Luft, Chloriten, Peroxyden. Der Farbstoff Dimethyl-p-aminophenol-1,4-naphthochinonimid färbt Acetylcellulose aus der Hydrosulfitküpe nach erfolgter Oxydation blau. (E. P. 220505 vom 17/3. 1923, ausg. 11/9. 1924.) FRANZ.

British Dyestuffs Corporation, Limited, James Baddiley, Arnold Shepherd-erbert Swann, James Hill und Leslie Gordon Lawrie, Blackley, Manchester. Färben von Celluloseacetat oder Celluloseacetat enthaltenden Geweben. Man färbt unl. Farbstoffe, die zu Celluloseacetat Verwandtschaft besitzen mit Hilfe von Kondensationsprod., die man durch Einw. von Naphthalin auf CH₂O in Ggw. von H₂SO₄ erhalten kann; man vermischt die Farbstoffe, z. B. Monoazofarbstoff aus p-Nitranilin u. Diphenylamin, Aminoanthrachinone usw., mit dem Naphthalinaldehyd-Kondensationsprod., die erhaltene Paste, die auch getrocknet werden kann, wird in W. eingetragen, nach dem Vermischen wird mit der Celluloseacetatseide eingegangen u. bei 70–80° gefärbt. (E. P. 224077 vom 19/10. 1923, ausg. 27/11. 1924.)

FRANZ.

Grand & Huguenin, A.-G., Basel, Schweiz, Färben und Drucken mit Küpenfarbstoffen. Man trinkt die Faser mit der Mischung des Salzes eines Esters von Küpenfarbstoffen u. einem Oxydationsmittel, Chlorate, der ein Katalysator, Natriumcyanid, Ammoniumvanadat oder Osmiumtetroxyd, zugesetzt sein kann, durch die Färbung durch Dämpfen; Reserveeffekte erhält man, wenn das Gewebe vor dem Dämpfen mit alkal. reagierenden Salzen, Na₂CO₃, Na-Acetat, oder Reduktionsmitteln, Hydrosulfit bedruckt, wenn man der Reserve basische, Nitrosaminrot, Küpenfarbstoffe usw. zusetzt, so erhält man bunte Effekte. (E. P. 20964 vom 25/8. 1924, Auszug veröff. 22/10. 1924. Prior. 25/8. 1923. Zus. 1203681; C. 1924. I. 1109.)

FRANZ.

Cumbrian Carbon Company, Williamsport, übert. von: George Charles New Dorp, V. St. A., Herstellung von Ruß. Die rußerzeugenden Flammen werden von Böden von hin u. her bewegten, offenen gekühlten Metallkästen. Sie werden selbst durch Metalldrähte gekühlt, welche zwischen ihren heißesten Teilen der Kästen angeordnet sind u. ebenfalls hin u. her bewegt werden. Durch je einen Draht oder je einen von ihnen u. die darüber angeordneten Kästen elektr. Strom geleitet. (A. P. 1510485 vom 30/3. 1923, ausg. 7/10. 1924.) KÜHLING. Hermann Cajar, Mödling, Niederösterreich, Pigmentschwarz für graphische Zwecke. Das durch Oxydation von Anilinsalzen mit Chromaten bei Ggw. von CuSO₄ hergestellte Anilinschwarz wird mit Mineralsäuren behandelt. Dabei wird das im Rohschwarz vorhandene Chrom größtenteils gel., das Erzeugnis enthält nur noch Kupfer, vorzugsweise aus CuO bestehender Asche. Es ist für graph. Zwecke im Vergleich zu dem nicht mit Säure behandelten Farbstoff vorzüglich geeignet. (Oe. P. 220120 vom 12/4. 1923, ausg. 10/7. 1924.)

KÜHLING.

Chemische Gesellschaft für Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, Leicht-herstellbare Azofarbstoffe. (D. R. P. 404262 Kl. 22a vom 25/7. 1920, ausg. 1/10. 1924. Zus. zu D. R. P. 394001; C. 1924. II. 2422. — C. 1921. IV. 267 [SIE].)

FRANZ.

Färbefabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Leverkusen b. Köln a. Rh. u. Dr. Richard Stüsser, Köln-Deutz, Darstellung von Azofarbstoffen, darin besteht, daß man die gemäß dem Verf. des Hauptpatents verwendeten diaziotierten Farbstoffe durch andere Diazo-, Tetrazo- oder Polydiazoverb. ersetzt. — Der Farbstoff aus diaziotierten Dehydrothiotoluidindisulfosäure u. Acetessig-5-nitro-4-chlor-2-anisid färbt Baumwolle gelb; man kann die Farbstoffe auf der Faser erzeugen u. die Herst. von Farblacken benutzen; das Acetessig-5-nitro-4-chlor-2-anisid

kann auch als Entwickler dienen. (D. R. P. 404354 Kl. 22 a vom 10/2. 1923, 17/10. 1924. Zus. zu D. R. P. 402869; C. 1924. II. 2502.)

Badische Anilin- & Soda-Fabrik, Ludwigshafen a. Rh., *Erzeugung von Farbstoffen auf der pflanzlichen Faser*. Die mit 2,3-Oxynaphthoylarylendiamin getränkte Faser wird mit neutralen oder alkal. Lsgg. von Diazoverbb., die Salze zugesetzt sein können, entwickelt; man kann hierzu auch Diazoverbb. anwenden, die bei der üblichen Entw. in saurer Lsg. nicht gebraucht werden können. Die mit Bis-(2,3-oxynaphthoyl)-1,5-naphthylendiamin getränkte Faser liefert diazotiertem *p*-Cumidin blaurote Färbungen, mit Bis-(2,3-oxynaphthoyl)-*m*-toluendiamin u. Diazobenzol erhält man gelbrote Färbungen. (E. P. 221359 vom 7/12. 1923, ausg. 2/10. 1924.)

L. B. Holliday & Co., Ltd., Arthur Clayton und Joseph Arthur St. Deighton, Huddersfield, *Hydrazonfarbstoffe*. Man erwärmt 2-Naphthylhydrazin mit Disulfonsäure mit Dioxyweinsäure in saurer Lsg. Der Farbstoff färbt Wolle etc. (E. P. 222031 vom 13/2. 1924, ausg. 16/10. 1924.)

Actien-Gesellschaft für Anilin-Fabrikation, Berlin-Treptow (Erfinder **Werner Lange**, Berlin-Friedenau, und **Ludwig Neumann**, Berlin), *Darstellung von Tetrakisazofarbstoffen*. (D. R. P. 404355 Kl. 22 a vom 16/12. 1921, ausg. 1/12. 1924. Zus. zu D. R. P. 397699; C. 1924. II. 2703. — C. 1923. IV. 990.)

National Aniline & Chemical Company, Inc., New York, übert. von: **John P. Penny**, Buffalo, New York, V. St. A., *Polyazofarbstoffe*. Man vereinigt die Diazoverbb. von Aminoazosulfonsäuren der Benzolreihe, wie Aminoazobenzo- oder Aminoazotoluendisulfonsäure mit 1 Mol. des 5,5'-Dioxy-2,2'-dinaphthylharnstoffdisulfonsäure. Die Farbstoffe färben Baumwolle in leicht ätzbaren sauren, u. lichtechten roten Tönen, in neutralem Glaubersalzbad wird nur Baumwolle gefärbt, während Wolle u. Seide ungefärbt bleibt, aus saurem Bade wird Wolle u. Seide gefärbt. (A. P. 1509442 vom 13/7. 1922, ausg. 23/9. 1924.)

Chemische Fabrik vorm. Sandoz, Schweiz, *Herstellung von Trisazofarbstoffen*. Man kuppelt diazotierte Amine der Benzol- oder Naphthalinreihe mit einer diazotierbaren Mittelkomponente, diazotiert wieder, vereinigt mit der gleichend. einer anderen Mittelkomponente u. kuppelt nach nochmaligem Diazotieren mit 1-Arylaminonaphthalinsulfosäuren. Der Farbstoff aus 1-Naphthylamin-6(7)-disulfosäure $\rightarrow$ 1-Naphthylamin-6(7)-sulfosäure $\rightarrow$ 1-Naphthylamin-6(7)-sulfosäure $\rightarrow$ 1-Phenylaminonaphthalin-8-sulfosäure färbt Baumwolle grau; verwendet man als Anfangskomponente 1-Methyl-2-aminobenzol-4-sulfosäure, so erhält man einen rötlichgrauen Farbstoff. Mit α -Naphthylamin als Anfangskomponente erhält man einen schwarz färbenden Farbstoff. Die Färbungen sind licht- u. waschecht. (E. P. 575761 vom 11/1. 1924, ausg. 6/8. 1924.)

Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Leverkusen b. Köln (Erfinder **Max Weiler**), *Darstellung von Triarylmethanfarbstoffen*. (D. R. P. 405312 Kl. 22 b vom 9/7. 1922, aus. 21/11. 1924. — C. 1924. II. 2425.)

Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Leverkusen b. Köln a. Rh., *Phthaleinfarbstoffe*. Man kondensiert Fluoresceinchlorid oder seine Derivate mit *v-m*-Xylidin in Ggw. von ZnO u. ZnCl₂ bei 200–210°; nach dem Auskochen des pulverisierten Prod. mit verd. HCl, Waschen u. Trocknen wird es bei niedriger Temp. sulfoniert, der erhaltene Farbstoff färbt Wolle aus saurem Bade in eleganten stichig roten Tönen. (E. P. 223596 vom 17/10. 1924, Auszug veröff. 17/12. 1924. Prior. 18/10. 1923.)

British Dyestuffs Corporation Limited, James Baddiley und William W. Tatum, Manchester, England, *Farbstoffe der Anthrachinonreihe*. (D. R. P. 406412 Kl. 22 b vom 18/4. 1923, ausg. 4/11. 1924. E. Prior. 28/4. 1922. — C. 1923. IV. 949.)

Gorg Kalischer und **Heinrich Salowski**,^f Mainkur b. Frankfurt a. M., *Herstellung von Dichlorderivaten des N-Dihydro-1,2,2',1'-anthrachinonazins*. Man verteilt 1,2,2',1'-anthrachinonazin in geschmolzenem Schwefel u. leitet durch die bei Temp., die über dem Kp. des S₂Cl₂, 210—220°; das erhaltene Dichlor-1,2,2',1'-anthrachinonazin färbt Baumwolle auch aus hartem W. in grün-blauen, chlorenchen Tönen. (A. P. 1509808 vom 10/4. 1924, ausg. 23/9.

FRANZ.

Gesellschaft für Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, *Pyrazolonfarbstoffe*. (D. R. P. 404647 Kl. 22a vom 12/5. 1923, ausg. 20/10. 1924. Schwz. Priorr. 18., 22., 24., 28/11., 1/12. 1922, 5., 10/1. u. 13/4. 1923 u. Schwz. PP. 105650, 105651, 105652, 105653 vom 13/4. 1923, ausg. 1/7. 1924. Zus. zu Schwz. P. 100479; C. 1924. II. 1278. — C. 1924. II. 1278.) FRANZ.

Gesellschaft für Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, *Chrompyrazolonfarbstoffe*. (D. R. P. 405722 Kl. 22a vom 12/5. 1923, ausg. 6/11. 1924. Schwz. Priorr. 14/11. 2/12. 1922 u. 13/4. 1923. Schwz. PP. 105654, 105655 vom 14. 1923, ausg. 1/7. 1924. Zus. Pat. zu Schwz. P. 100480; C. 1924. II. 1278. — C. 1924. II. 1278.)

FRANZ.

National Aniline & Chemical Company, Inc., New York, übert. von: **Leon Koller**, Hamburg, New York, *Pyrazolonazofarbstoffe*. Man vereinigt Diazolinit 1-(2'-Chlor-5'-sulfophenyl)-3-methyl-5-pyrazolon; der Farbstoff färbt Wolle in einem Bade in säure- u. lichtechten gelben Tönen; er kann auch zur Lackherstellung verwendet werden. (A. P. 1511074 vom 30/11. 1923, ausg. 7/10. 1924.) Fz. **Arnold Cassella & Co. G. m. b. H.**, Frankfurt a. M., (Erfinder: **Richard Cassella**, Frankfurt a. M.), *Herstellung von Küpenfarbstoffen*. (D. R. P. 398878 Kl. 22e vom 18. 1916, ausg. 19/7. 1924. Zus. zu D. R. P. 395692; C. 1924. II. 2505. — C. 1924. II. 165.)

FRANZ.

Le & Co., Akt.-Ges., Biebrich a. Rh., (Erfinder: **Maximilian P. Schmidt** (bzw. **Wilhelm Neugebauer**), *Darstellung von Küpenfarbstoffen*, dad. gek., daß man Perylentetracarbonsäureimid oder seine Deriv., bei denen wenigstens eine Gruppe unsubstituiert ist, Aldehyde der Fettreihe einwirken läßt. — Der Farbstoff Perylentetracarbonsäureimid gibt mit Paraformaldehyd in H₂SO₄ einen Farbstoff, der Baumwolle aus der Küpe in seifen- u. chlorenchen roten Tönen färbt. Der Farbstoff aus Aminoperylentetracarbonsäureimid liefert einen gelbstichig rot färbenden Farbstoff. Der Farbstoff aus Aminoperylentetracarbonsäureimid, erhalten durch Reduktion von Perylentetracarbonsäureimid u. darauffolgende Reduktion, liefert einen gelbstichig rot färbenden Farbstoff. (D. R. P. 406041 Kl. 22e vom 2/12. 1921, ausg. 24/11. 1924.)

FRANZ.

Chemische Anilin- & Soda-Fabrik, Ludwigshafen a. Rh., (Erfinder: **Max Kunz**, Ludwigshafen und **Karl Saurwein**), *Darstellung von Küpenfarbstoffen der Anthrachinonreihe*, dad. gek., daß man das bei der Einw. von Nitrosylchlorid auf 1-Aminoanthrachinon entstehende, von Anthrachinon-1,2-isoxazol verschiedene gelbe oder gelbbraune Produkt mit Hydrazin kondensiert. — Der Farbstoff färbt Baumwolle aus der Küpe in chlorenchen violettroten Tönen. (D. R. P. 406831 Kl. 22b vom 28/5. 1922, ausg. 24/11. 1924.)


FRANZ.

Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning, Höchst a. M., *Herstellung von Küpenfarbstoffen*, trockner, leicht löslicher Küpenpräparate. (D. R. P. 407474 Kl. 8m vom 10. 1924, ausg. 15/12. 1924. — C. 1922. II. 393.)

FRANZ.

Richard Herz, Frankfurt a. M., und **Jens Müller**, Hanau, *Herstellung von Küpenfarbstoffen der Thioindigoreihe*. Man behandelt o-Aminoarylthioglykolsäuren mit Kondensationsmitteln. An Stelle der Aminoverbb. kann man die Acyl- oder Azoverbb. benutzen. Als Kondensationsmittel kann man Chlorsulfonäure in Mischung mit H₂SO₄ oder rauchender H₂SO₄ u. unter Zusatz von

Katalysatoren, wie Borsäure, Phosphorsäure verwenden. 1-Methyl-5-chlor-2-acetylphenyl-3-thioglykolsäure, erhalten aus o-Toluidin u. S_2Cl_2 , Behandeln mit verd. N. u. Monochloressigsäure, Neutralisieren u. Fällern mit $CuSO_4$, liefert, als $Cu-S_2O_3$ H_2SO_4 eingetragen, einen Küpenfarbstoff, der die pflanzliche u. tierische Fas wasch-, licht- u. walkechten graublauen bis dunkelblauen Tönen anfärbt; ähnliche Farbstoffe erhält man aus 2-Amino-5-chlor-, 2-Amino-3-methoxy-5-chlor- oder 2-Amino-3,5-dichlorphenyl-1-thioglykolsäure. Aus o-Aminophenylthioglykolsäure erhält man nach dem Diazotieren u. Kuppeln mit 2 Naphthol-3,6-disulfosäure einen Azofarbstoff, der die Azogruppe auch nach der Kondensation zum Thioindigofarbstoff noch enthält, bei der Reduktion in der Küpe wird die Azogruppe gespalten, man erhält 2-Aminothioindigo. — 2-Aminonaphthalin-1-thioglykolsäure, erhältlich aus 2-Naphthylaminhydrochlorid u. S_2Cl_2 , Behandeln mit Monochloressigsäure u. verd. N.



echten, grünstichig blauen Tönen anfärbt. (A. P. 1498913 vom 7/2. 1924, in D. R. P. 512,412 vom 1/12. 1924, ausg. 12/11. 1924, Prior. 27/9. 1923.)

E. I. du Pont de Nemours & Company, Wilmington; Delaware, übertreten John H. Sachs, Wilmington, Delaware, und Vahan S. Babasianian, South Bethlehem, Pennsylvania, Herstellung von Anthrachinonküpenfarbstoffen. Das durch Verschlus von 2-Aminoanthrachinon mit KOH u. KNO_3 erhältliche Prod. wird als Leuk in Ggw. von Säuren zu N-Dihydro-1,2,2',1'-anthrachinonazin oxydiert, z. B. in Einleiten von Luft. Gegenüber der Oxydation in alkal. Lsg. hat das Verfahren den Vorteil, daß das während der Schmelze eingeführte Fe aus dem Farbstoff entfernt wird, daß der Farbstoff sich leichter filtrieren läßt u. daß die Oxydation schneller verläuft. (A. P. 1509846 vom 25/9. 1920, ausg. 30/9. 1924.)

Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning, Höchst a. M., Thioindigo-Küpenfarbstoffe. Man erhitzt die 2-Anile der 2,3-Diketodihydro-6-alkyloxythionaphthen oder ihre Kernsubstitutionsprodd. mit den Kernsubstitutionsprodd. des Oxithionaphthens; oder man erhitzt 3-Oxy-6-alkyloxythionaphthen oder ihre Kernsubstitutionsprodd. mit den Kernsubstitutionsprodd. des 2,3-Diketodihydrothionaphthen-2-anils. Die erhaltenen Farbstoffe färben Baumwolle aus der Küpe in den dem Alizarin ähnlichen Tönen. Man kondensiert z. B. 6-Äthoxy-3-oxythionaphthen mit 4-Methyl-6-chlor- oder -6-brom-2,3-dihydro-3-ketothionaphthen-2-(p-dimethylamino)-anil, 6-Äthoxy-2,3-dihydro-3-ketothionaphthen-2-(p-dimethylamino)-anil, 4-Methyl-6-brom-3-oxythionaphthen oder 4-Methyl-5,6-dichlor-3-oxythionaphthen-6-Methoxy-3-oxythionaphthen mit 4-Methyl-6-brom-2,3-dihydro-3-ketothionaphthen-2-(p-dimethylamino)-anil. (E. P. 222094 vom 21/8. 1924, Auszug veröff. 2/11. 1924, Prior. 27/9. 1923.)

Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning, Höchst a. M., Thioindigo-Küpenfarbstoffe. Man kondensiert 8-Halogen-1,2-naphthioindoxyle mit Isatin-deriv. 8-Chlor-1,2-naphthioindoxyl gibt mit Isatin- α -chlorid einen Baumwoll aus der Küpe blaugrau färbenden Küpenfarbstoff. (E. P. 222120 vom 15/9. 1924, Auszug veröff. 12/11. 1924, Prior. 19/9. 1923.)

Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning, Höchst a. M., Herstellung von blauen Küpenfarbstoffen der Thioindigoreihe. Der nach dem Verf. des D. R. P. 512,412 C. 1911. II. 1567 erhältliche 2,3,2',3'-Bisnaphthionaphthénindigo liefert nach der Halogenieren einen Küpenfarbstoff, der Baumwolle in chlor-, licht- u. bündel-

e Tönen färbt, einen ähnlichen Farbstoff erhält man durch Kondensation von Naphthoxythiophen mit den α -Derivv. des 2,3-Naphthisatins oder Isatins, von eine oder beide Komponenten im Kern halogeniert sein können, die er Farbstoffe können nachträglich weiter halogeniert werden. Ebenso erhält neue Farbstoffe, wenn man 2,3-Naphthooxythiophen-2-indolindigo halogeniert, Farbstoffe entstehen auch, wenn man 1-Brom-2(S)-3-(CO)-naphthoxythiophen und α -Chlorid des 5,7-Dibromisatins kondensiert. Zu halogenierten 2,3,2',3'-Bisnaphthoxythiophenindigo gelangt man auch, wenn man die NH_2 -Gruppe in der 1-Chlor-naphthoesäure nach SANDMEYER durch Cl ersetzt u. die 1,2-Dichlor-3-thioisatinsäure mit Thioglykolsäure kondensiert, aus der 1-Chlor-2-naphthylthioisatinsäure erhält man durch Kondensation das entsprechende Oxythiophen u. hieraus durch Oxydation den Farbstoff. (F. P. 575814 vom 7/1. 1924, 3/7. 1924. D. Priorr. 27/1., 12/2. u. 1/10. 1923.) FRANZ.

Gold Cassella & Co., G. m. b. H., Frankfurt a. M., (Erfinder: Richard Cassella, Frankfurt a. M. und Norbert Steiger, Fechenheim bei Frankfurt a. M.), Herstellung von sauren Beizenfarbstoffen. (D. R. P. 403273 Kl. 22e vom 28/8. 1924, ausg. 26/9. 1924. Zus. zu D. R. P. 395692; C. 1924. II. 2505. — C. 1922. 11. 2505.)

Charles Mordaunt Barnard, London, Herstellung von Farbstoffen. Man läßt auf ein Aminoaromaten-Verb. der arom. Reihen Dimethylanilin u. PCl_5 oder PCl_3 u. Cl_2 einwirken; nach Beendigung der HCl-Entw. u. dem Abdestillieren des PCl_3 wird das Aminoaromaten-Verb. mit Dampf das überschüssige Dimethylanilin abdest. u. die Farbstoffe werden durch Oxalat übergeführt. Der Farbstoff färbt tier. Faser violett u. tannierte Faser blau. (E. P. 222947 vom 10/7. 1923, ausg. 6/11. 1924.) FRANZ.

Land & Huguenin, A.-G., Basel, Schweiz, Herstellung von Beizenfarbstoffen. Aminoaromaten-Verb., die sich von Trichlortoluchinon u. Aminosalicylsäuren oder Aminosalicylsäuren ableiten, werden mit konz. H_2SO_4 u. HNO_3 behandelt, die Farbstoffe färbt bromgebeizte Wolle violett. Die B. der Chinondianilinderivv. aus Chloro-trichlortoluchinon u. Aminosalicylsäuren kann durch Zusatz von Oxydationsmitteln, $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$, begünstigt werden, so daß die Kondensation bei niedriger Temperatur ohne Erhitzen ausgeführt werden kann. (E. P. 223481 vom 3/3. 1924, 1/11. 1924. Zus. zu E. P. 197940; C. 1923. IV. 546.) FRANZ.

Max Schatz, Dresden, Herstellung bemalter Web- und Wirkstoffe aus Abfallstoffen, Abfallgemischen u. dgl., dad. gek., daß der Stoff in feuchtem Zustande auf eine Glasplatte gelegt, vollkommen glattgestrichen u. vor dem Trocknen bemalt wird. — Glasplatten als Unterlagen haben vor Holz, Stein usw. den Vorteil, daß sie die Farben nicht annehmen, sie kann durch Wasser gereinigt u. dann sofort wieder benutzt werden; das Bemalen des Stoffes bewirkt, daß die Ränder der Ornamente nicht ganz scharf sind, es jedoch ein Durcheinanderlaufen der Farben erfolgt. (D. R. P. 407867 vom 27/4. 1923, ausg. 24/12. 1924.) FRANZ.

Ernst P. Schmidt, Quincy, Illinois, Mittel zum Entfernen von Anstrichen, Lacken, Emaill, Fett usw. bestehend aus einem A., einem alkoh. Oxalat u. freier Base. (A. P. 1516064 vom 2/9. 1922, ausg. 18/11. 1924.) KAUSCH.

XIV. Zucker; Kohlenhydrate; Stärke.

Lebensmittel, Zuckerindustrie und neuere Wärmetechnik. Es werden Mittel u. Wege angegeben zur Verbesserung der Wärmewirtschaft in der Zuckerindustrie. Dabei sind in Betracht: neuere Rost- u. Feuerungsarten (Staubfeuerungen u. mechanische Einrichtungen); Verringerung der Abwärmeverluste durch Überhitzer, Economiser, Lufterhitzer; Erzeugung u. Verwertung von Überschußenergie; wirtschaftlicher Betrieb der Verdampferstation; Vermeidung der Schwankungsverluste

durch Wärmespeicher; Übergang zu höheren Dampfspannungen u. Ersatz Flammrohrkessel durch Röhrenkessel. (Die Wärme 47. 543—47. 576—79. 1924.)

—, „Norit“ und seine Anwendung in der Rübenzuckerindustrie. Herstellung Raffinade oder Weißzucker mit Hilfe der Entfärbungskohle „Norit“. Es wird sichtlich, durch eine eingehende Beschreibung der Eigenschaften des „Norits“, prakt. Anwendung in der Zuckerindustrie, seiner Wiederbelebung nach Gelb u. der dabei entstehenden Kosten, die Aufmerksamkeit der Zuckerindustrie auf Noritverf. in seiner Anwendung in Raffinerien u. Weißzuckerfabriken zu lenken. Das Verf. ist auch in der Rohrzuckerindustrie allgemein eingeführt. Norit von der „Allgemeinen Norit-Gesellschaft“ in Amsterdam seit 1911 in den Handel gebracht. (Dtsch. Zuckerind. 49. 1449—55. 1924.)

V. Rajtora, Über die Entzuckerung der Melasse mittels Essigsäure nach Methode Dr. Friedrich — Dr. Rajtora. Das Verf. zerfällt in die Konz. der Melasse auf 90—95° Bg., um einer zu weiten Verdünnung der Essigsäure vorzubeugen, in das Mischen der konz. Melasse mit konz. Essigsäure u. Bzl., was in etwa 10 Minuten geschieht; in die Krystallisation des Zuckers aus dem Gemische im Vakuumgeräten (in 4 Stdn. sind bereits 70—80% des gesamten Zuckers ausgeschieden) in die Scheidung des Zuckers durch Zentrifugen (Decken mit Essigsäure); Trennung der Säure vom Nichtzucker durch Dest. u. in die Verarbeitung des Nichtzuckerstoffes. Der Zusatz des Bzl. (etwa 0,2% oder auch mehr) dient dazu, die Viskosität der Melasse zu erniedrigen u. damit die Verarbeitung zu erleichtern. Der gewonnene Weißzucker ist etwas säuerlich, ganz weiß, u. kann überall verwendet werden, wo die Ggw. von wenig Säure willkommen ist (Marmeladen, Kanditen, Zuckerwaren usw.). Um den letzten Rest der Säure, die dem Zucker nur mechan. anhaftet, zu entfernen, behandelt man den Zucker, am besten letzten Mal, in der Zentrifuge, abwechselnd mit k. u. w. Luft, die die Essigsäure mit dem Dampf entfernt. Der nach diesem Verf. gewonnene Zucker ist ganz frei von Invertzucker, auch nach längerem Lagern von den letzten Säureresten mit dem freien Zuckers. Es beruht dies nach SAILLARD (Circulaire hebdomadaire du Comité central des Fabricants de Sucre de France 1924. Juli) auf der Ggw. von Kiesel, das die Inversion ganz bedeutend verlangsamt. Weitere Bemerkungen betreffen die Wirtschaftlichkeit des Verf. (Ztschr. f. Zuckerind. d. Tschechoslovak. Rep. 49. 0—1924.)

B. Bleyer und H. Steinhauser, Bestimmungsmethoden des Milchzucker. Ein schichtlicher Überblick über V. u. Bedeutung des Milchzuckers, krit. Besprechung der Bestimmungsmethoden. Für wissenschaftliche Zwecke sind die maltrazometrischen Methoden am besten. Die genauesten Ergebnisse ergibt die Reduktionsmethode nach einer Vorschrift von SCHEIBE unter Benutzung der Pflügerschen Titrationröhrchen. Für prakt. Zwecke im techn. Laboratorium ist von chem. Ver. u. diejenige von BRUHNS am geeignetsten. Bestst. der D. u. des Brechungsindex sind für Milchzucker ebenso brauchbar wie für Rohrzucker. Dabei ist das refraktometrische Verfahren von ZEISS auch für Milchzucker verwendbar, ebenso wie der Polarisationsapp. für Traubenzucker mit unveränderter Skala ohne merkliche Veränderung. Auch für Milchzucker brauchbar ist. Ein opt. wirksames Kohleraydröhrchen, das die polarimetr. Milchzuckerbest. beeinträchtigt, ist in der Milch nicht vorhanden. Beste Methoden zur Enteiweißung u. Klärung von Milchprodd. sind für polimere Stoffe. Best. die von SALKOWSKI mit $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ u. von RONA-OPPENHEIM mit erdalkal. oxydatum dialysatum solut., für die gewichtsanalyt. Best. nach SCHEIBE die von RITTHAUSEN-SOXHLET. Bzgl. Einzelheiten wird auf das Original verwiesen. (Milchwirtschaftl. Forsch. 1. 131—99. München, Lab. der Fabriken für Milchverarbeitung. BOEHRINGER, KNOLL. Weihenstephan, Landwirtsch. Hochschule; Ber. ges. Phyl. 21—22. 1924. Ref. PESCHECK.)

SPIEL

han Nicolaas Adolf Sauer, Amsterdam, *Reinigen von Zuckerlösungen und durch Behandlung derselben mit anorgan. Adsorptionsmitteln u. Entfärbungsmitteln*. Dad. gek., daß man die zu behandelnden Lsgg. erst mit Kieselgur u. darauf auf Aktivkohle behandelt. — Durch diese Arbeitsweise wird die Entfärbung erleichtert, da die gummi- u. schleimartigen Stoffe, welche die Wiedervergärung der Kohle erschweren, durch die Kieselgur entfernt worden sind. (D. R. P. 379 819 Kl. 89c vom 27/5. 1922, ausg. 13/12. 1924.)

OELKER.

Karl Steffen jun., Wien, *Fortlaufende Fällung von Tricalciumsaccharat*. Der Fällvorgang wird in mehreren räumlich voneinander getrennten Stufen derart durchgeführt, daß in der ersten Stufe Mono- u. Bisaccharat, in der zweiten Trisaccharat gebildet wird u. in der letzten Stufe die Ausfällung auf den gewünschten Saccharatgehalt der Abfallauren erfolgt, wobei für die Mono- u. Bisaccharatbildung die überschüssige bezw. durch Zers. frei werdende Kalk der in der zweiten Stufe gewonnenen Zuckerkalkmilch der ersten oder zweiten Verfahrensstufe zugesetzt werden kann. (Oe. P. 97 933 vom 20/1. 1923, ausg. 25/9. 1924.)

OELKER.

Karl Steffen jun., Wien, *Fortlaufende Waschung von Tricalciumsaccharat*. Tricalciumsaccharat enthaltenden Fl., die so, wie sie im Fällvorgang gewonnen werden, werden in mehr oder weniger konz. Form dem Waschvorgang unterworfen und in mehreren aufeinanderfolgenden Verfahrensstufen die in den einzelnen Stufen abgefilterte Lauge mit stufenweise fallendem Nichtzuckergehalt zuzuführen. Die Zufuhr von Waschlauge erfolgt vorteilhaft in gleichen Mengen, wie während der einzelnen Waschstufen abfiltriert wurden, so daß die Konz. der Lauge u. nach dem Durchgang durch eine Verfahrensstufe annähernd gleich ist, so daß der Nichtzuckergehalt der Lsg. nach dem Durchgang verringert ist. (D. R. P. 379 934 vom 20/1. 1923, ausg. 25/9. 1924.)

OELKER.

XV. Gärungsgewerbe.

Andrich Wendel, *Die Gärführung der Satz- und Hauptmaische im Dickmaischverfahren*. Schleppende Gärung in einer Kornbrennerei wurde auf zu warme Gärtemperatur zurückgeführt. Die ersten 12—18 Gärstunden gehören der Hefevergärung, die Vergärung soll zu gleicher Zeit nur langsam fortschreiten. Die Gärtemperatur sind 17,5—20°. Die Gärung der Hauptmaische ist so zu leiten, daß die Hauptgärung erst gegen Mittag des zweiten Tages einsetzt, u. daß die Temperatur nicht vor dem Abend dieses Tages erreicht wird. In ähnlicher Weise ist die Satzmaische zu behandeln. (Brennereiztg. 41. 189. 1924.)

RÜHLE.

L. Duntar und C. F. Wells, *Gärung von natürlichen Fruchtsäften*. Gärende Säfte erhalten bei konstanter Gärtemp. von 21° in 7—10 Tagen ihren Höchstgehalt an Alkohol. Ist dieser erreicht, so findet keine B. von Säure aus Alkohol statt. Zusatz von vergärbarem Zucker verzögert die Oxydation von Alkohol. (Ind. and Engin. Chem. 16. 739—40. 1924. Brookings [S. D.] GRIMME. Köppler, *Untersuchungen über das Desinfektionsmittel „Aktivin“ der Chemischen Fabrik G. m. b. H., Radebeul-Dresden*. Vf. berichtet über Verss. mit sehr verdünnter Lsgg. (0,001%—0,2%) gegen Hefen, Schimmelpilzen u. Bakterien. (Allg. Bierbrauerei u. Malzfabr. 52. 203—5. 1924.)

JUNG.

W. Bornand, *Betrachtungen über Trockenpräparate von Milchsäurebakterien und Hefen*. Bei der Unters. von getrockneten Yoghurt- oder Hefepräparaten wurde häufig nicht mehr entwicklungsfähige Präparate gefunden. Vf. fordert, daß alle Trockenpräparate das Herstellungsdatum tragen u. von Zeit zu Zeit untersucht werden.

(Apoth.-Ztg. 63. 13—15. Lausanne, Labor. des Sanitätsamtes.) HESSE.

W. Tenenbach, *Buchweizen-, Mais- und Kartoffelsprit und deren Verwendung zur Wein- und Likörfabrikation*. (Brennereiztg. 42. 1—2. Berlin.) HESSE.

Karl Hessenmüller, *Etwas vom Abläutern*. Erörterung der Schwierigkeiten des Läuterns. Haben sich nach dem Abmaischen die Treber im Läuterbottich gesetzt, so ist die darüber stehende Stammwürze prakt. fertig. Vf. empfiehlt bis auf die Treber abzuziehen u. den zwischen den Trebern stehenden Rest Würze durch Nachgüsse zu verdrängen. (Allg. Brauer- u. Hopfenztg. 64. 1924.) RÜH.

Tasuku Akaghi, Iwawo Nakajima und Kunijiro Tsugane, *Untersuchung über „Hatsucho-Miso“*. Das Prod. wird aus Sojabohnen wie folgt gewonnen: gereinigten Bohnen werden 6—7 Std. in W. gekocht, zerkleinert u. in ein zyl. Gefäß eingeknetet. In besonderen Räumen — den „Koji“-Zimmern bedeckt die Masse nach 20—40 Tagen mit Schimmelpilzen. Sie wird dann — mit S. W. gemischt — in ein Gärungsfaß gefüllt u. bleibt darin 3—5 Jahre bis zur völligen Reife. — Vf. isolierten aus Koji folgende Schimmelpilze: *Aspergillus Oryzae* 1 u. 2 *Aspergillus O. var. fulvus*, *T. Yamamoto*, *Sterigmatocystis* mit blauen Sporen, *Aspergillus niger*, *Penicillium luteum*, *P. glaucum*, *Mucor pyriformis*, *Rhizopus R. nigricans*, *Oidium lupuli*. Sie untersuchten die Zers. der Eiweißstoffe durch genannten Pilze, indem sie den N. der übrig gebliebenen l. Proteine, der gebildeten Aminosäuren u. des Ammoniums bestimmten. Die Kultur *Asp. Oryzae* 1 ergab die größte, die von *Asp. niger* die kleinste Menge an Protein-N. — Folgende Schimmelpilze wurden erkannt: *Torula*, *Willia anomala* u. *Mycoderma spec.* Die 3 Arten können Glucose, Galaktose, Saccharose, Laktose u. Dextrin nicht verwerten. *Willia anomala* vergärt wesentlich Glucose, *Mycoderma spec.* Glucose u. Galaktose. — Bezüglich der Bakterien werden als vorläufige Mitteilung *Sarcina cerevisiae*, *S. aurantiaca*, *Bacillus proteus fluorescens* angegeben. Vf. geben dann die Ergebnisse d. Unters. der Maische von „Hatsucho-miso“ tabellar. u. kommen zu dem Ergebnis, daß sich der Gehalt an Aminosäuren, der den Geschmack des Prod. bedingt, durch Auswahl der geeigneten Pilze leicht erhöhen u. dadurch die Reifezeit der Miso verkürzen läßt. (Journ. Coll. Agric. Tokyo 5. 263—69. 1924.) TRÉL.

Teizo Takahashi, *Die Veränderungen der Aminosäuren und anderer Bestandteile des Koji-Extraktes während der Gärung durch Willia anomala I, II, III* (Vgl. Journ. Coll. Agric. Tokyo 5. 131; C. 1913. II. 1247.) Vf. bestimmt nach 17, 31 u. 45 Tagen den Gehalt der Gärungsfl. an Alkohol, Gesamtsäure, Aminosäuren u. Estern. Abart I, die in einer früheren Unters. (Journ. Coll. Agric. Tokyo 1. Nr. 3) das schmackhafteste Getränk ergeben hatte, erzeugte die geringsten Mengen an Aminosäuren. Je weniger Aminosäuren im Saké enthalten sind, desto essbarer ist es also. Zu Beginn der Gärung überwiegt die Bildung organ. Säuren in Übereinstimmung mit kräftiger Assimilation der Nährlsg., nach einer gewissen Zeit dominiert das Gegenteil statt: die Aminosäuren nehmen zu. Diese Beobachtung bestätigt die Erfahrungstatsache, daß Saké während der Lagerung eine bemerkenswerte Zunahme der Aminosäuren zeigt, die die Güte des Getränks jedoch nicht beeinträchtigt. (Journ. Coll. Agric. Tokyo 5. 283—86. 1924.) TRÉL.

W. Redenbacher, *Eine neue Bauart des elektrischen Pyrometers für die Temperaturmessung in der Brauerei*. Es werden Thermoelemente mit Nachteiliger falscher Anzeige beschrieben u. an Hand zweier Abbildungen die Auskl. eines App. angegeben, bei dem die Einw. der Wärmeableitung auf ein Minimum zurückgeführt ist. Außerdem gibt Vf. ein prakt. Verf. an zur Erkennung von Störungen im Thermoelement u. erläutert die Umrechnung der Galvanometeranzeigen bei Anwendung von Thermoelementen verschiedener Länge. (Allg. Brauer- u. Hopfenztg. 64. 1171—72. 1924.) RÜH.

Marc Bridel, *Anwendung des biochemischen Verfahrens zur Charakterisierung der Glucose zum Nachweis der Maltase im Malz*. (Journ. Pharm. et Chim. 30. 450—59. 1924. — C. 1925. I. 444.) SPIEL.

Wilhelm Wöllmer, *Untersuchungen über Wertbestimmung des Hopfens*. (Vgl. f. ges. Brauwesen **41**, 1; C. **1918**, I. 581.) Wesentlich für die bittere von frischem Hopfen ist das *Humulon* u. in geringem Maße dessen erste Prodn., während *Lupulon* u. seine Verharzungsprodn., sowie das γ -*Harz* kaum den Geschmack beeinflussen. — Im Gegensatz zu FORD u. TAIT (Inst. Brewing **30**, 426; C. **1924**, II. 557), die als Wertmaßstab des Hopfens α -Anteil + $\frac{1}{5}$ β -Anteil annehmen, will Vf. als Brauwert des frischen oder gut verteilten Hopfens $\frac{1}{5}$ des Humulongehaltes ansehen. (Wechschr. f. Brauerei **42**, 3. Brauerei Sternburg, Lützschena b. Leipzig.) HESSE.

Yozo Takahashi, *Über die Bestimmung von Methylalkohol in alkoholischen Getränken*. Zur Bestimmung sehr kleiner Mengen von CH_3OH empfiehlt Vf. ein modifiziertes Verf. nach E. AWENG: 200 ccm der Probe werden mit CO_2 bei 80° unter Verwendung eines Fraktionsaufsatzes bei 80° wiederholt. Zu 10 ccm des Destillats werden 250 ccm einer 1% Permanganatlsg. u. 10 ccm gegeben, nach dreiminutigem Schütteln mit 8% Oxalsäure entfärbt u. noch dest., von Zeit zu Zeit mit RIMINIS oder JEANS Reagens geprüft bis zum Verschwinden der durch Acetaldehyd veranlaßten dunkelroten Farbe, dann wird das Destillat aufgefangen, noch einmal mit 3 g CaCO_3 dest., mit NH_3 versetzt u. unter vermindertem Druck (15–20 mm) unterhalb 45° eingedampft. So ausgeführt, giebt die Urotropinprobe mit HgCl_2 stets einwandfrei aus. (Journ. Coll. Agric. **5**, 301–3. 1124.) TRÉNEL.

Fritz Pritzer, *Zur Berechnung des Zuckergehaltes in Süßweinen*. Bei der Bestimmung des Zuckers in Süßweinen nach den Angaben des Vf. (Schweiz. Apoth.-Ztg. **53**, 2 [1915]) u. nach dem Schweiz. Lebensmittelbuch (III. Aufl. **1917**, 391) können in 20 ccm Wein bei 15° mit einer richtig justierten Pipette abgemessen werden. Die Wägung erübrigt sich. Zur Ermittlung des Gehaltes an Zucker wird die nach Ausführung der Red. mit Fehlingscher Lsg. gewonnene Menge gewogen; in der Zuckertabelle wird der Invertzuckergehalt abgelesen u. im Liter angegeben. Die Berechnung nach der Formel des Lebensmittelbuchs kann in Wegfall kommen. (Schweiz. Apoth.-Ztg. **62**, 753–55. 1924.) DIETZE.

The People of the United States, übert. von: **Herbert C. Gore**, Takoma Maryland, V. St. A., *Herstellung von Enzympräparaten*. Man behandelt wss. Extrakte mit Tannin oder anderen Gerbsäuren, trennt den Nd. ab u. digeriert in einer Gelatinelsg., Hautpulver oder anderen mit Tannin reagierenden N-Verbb., wobei der größte Teil der in dem Nd. enthaltenen Diastase in Lsg. geht, die abfiltriert u. im Vakuum konz. wird. — Z. B. wird gemahlenes Gerstenmalz unter Verwendung von Toluol längere Zeit mit W. geweicht, alsdann die Maische filtriert, das Filtrat mit 10%ig. wss. Tanninlsg. versetzt, abgenutscht, auf dem Nutschenfilter der Rest mit W. gewaschen, alsdann in W. aufgeschlemmt u. mit einer 10%ig. wss. Tanninlsg. versetzt. Nach Zugabe von gegläutem Kieselgur wird filtriert, das Filtrat im Vakuum eingedampft u. im Vakuumexsiccator über H_2SO_4 getrocknet. Das so gewonnene M. hat stark diastat. Wrkg. u. liefert bei der Einw. auf Stärke besonders wirksames Dextrin u. Maltosesirup, der sich beim Erhitzen auf höhere Temp. leicht verfärbt als mit Hilfe von gewöhnlichem Malzextrakt gewonnener. Diastaselsg. kann auch ohne Eindampfen besonders nach Zusatz von Toluol als Konservierungsmittel verwendet werden; ebenso läßt sich der Tannin-Gelatinendextrin mit der diastasehaltigen Fl. bei der Verzuckerung von Maisstärke verwenden. (A. P. **1479133** vom 22/5. 1923, ausg. 1/1. 1924.) SCHOTTLÄNDER.

Nikolaus Moskovits, Budapest, *Herstellung von Aceton und sonstigen Produkten bei Vergärung kohlenhydrathaltiger Stoffe mittels acetonbildender Organismen*, I. 1. 68

dad. gek., daß die Vergärung in einem alkal. reagierenden Medium erfolgt. Durch die Vergärung der sterilen Maische, mit z. B. *Bacillus macerans*, in gesprochen alkal. reagierendem Medium kann die Ausbeute an *Aceton* wesentlich gesteigert werden. Man setzt der Maische Stoffe alkal. Rk. zu, gegebenenfalls Neutralisierungsmitteln, wie CaCO_3 oder BaCO_3 u. verfährt im Übrigen wie beim Vergären in neutralem Medium. (Oe. P. 97662 vom 6/3. 1922, ausg. 1924.)

SCHOTTLÄND.

U. S. Industrial Alcohol Co., New York, *Vorrichtung zur Erzeugung absoluten Alkohols*. Die Vorr. dient zur Ausführung des in dem E. P. 20 (C. 1924. I. 1456) beschriebenen Verf. — Sie besteht im wesentlichen aus einer Rektifizierkolonne, in welche der wss. A. u. die mit W. nicht mischbare Fl. eingeführt werden, einem damit verbundenen Kondensator, einer an denselben angeschlossene Trennungskammer, einem Skrubber für die Behandlung der in der Trennungskammer erhaltenen unteren Schicht u. einer Einrichtung zur Zuführung der in dem Skrubber abgeschiedenen dritten Fl. in die Kolonne. (C. 213984 vom 11/1. 1923, ausg. 8/5. 1923.)

OELEK.

Nikolaus Moskowits, Budapest, *Scheidung des Acetons und Alkohols aus Aceton- u. Alkohol u. Wasser enthaltenden Lösungen mittels Destillation*. — Der bei der Destillation des Gemisches erhaltene Vorlauf wird zur Entfernung des A. u. W. über wasserentziehende Stoffe, u. der Nachlauf über acetonentziehende bzw. -bindende Stoffe geleitet, während der Mittellauf von neuem der Dest. unterworfen wird, u. der Prodd. wieder in der vorerwähnten Weise behandelt werden. — Zur Entziehung des A. u. W. wird z. B. CaCl_2 verwendet, während zur Bindung des Acetons Natriumbisulfite oder in einem Gemisch von A. u. Aceton l. Celluloseprodd. (Nitrocellulose, Acetylcellulose, Celluloid) dienen können. (Oe. P. 97906 vom 27/3. 1922, ausg. 25/9. 1924. Ungar. Prior. 4/5. 1921.)

OELEK.

XVI. Nahrungsmittel; Genußmittel; Futtermittel.

H. Serger, *Über das Bleichen von Heringsmarinaden mit Wasserstoffsuperoxyd*. Entgegen LÜNING (Ztschr. f. Unters. Nahrsg.- u. Genußmittel 48. 120; C. 1924. II. 2095) ist in Übereinstimmung mit LITTERSCHEID Bleichung mit H_2O_2 bei richtiger folgender Deklaration (!) weder eine Fälschung noch gesundheitsschädlich sondern ein Bleich- u. Sterilisationsmittel. Da Reste des H_2O_2 bald verschwinden ist eine Behandlung also lediglich als künstliche Färbung zu beurteilen. Vitaminschädlichkeit tritt sowohl durch H_2O_2 als auch durch andere Zusätze (NaCl , Essigsäure) und Erhitzen ein. (Konserven-Industrie 1924. 551—53. Sep.)

GROSZFE.

Adelaide Labò, *Verfälschung von Marmeladen*. Als Verfälschungen von Marmeladen kommen Glucose u. Saccharin, verbotene Konservierungs-, Farbstoffe u. Gelierstoffe in Frage. (Riv. It. delle essenze e profumi 6. 137—39. 1924.)

C. B. Morison, *Die Bildung von Schwefelwasserstoff durch Hefe*. An einem Mehl von normaler Beschaffenheit wurde beim Vermengen mit Bäckerhefe bei Behandlung mit $\text{Zn} + \text{HCl}$, nicht aber mit HCl allein, der Geruch von H_2S beobachtet. (Science 60. 482—83. 1924. Chicago, Inst. of Baking.)

HES.

S. Desider Farago, *Pektin und Pomosinextrakt*. Besprechung der Konstitution u. Wrkg. des Pektins, des Pomosinextraktes aus Schalen u. Kerngehäuse der Zitrone. (Konserven-Industrie 1924. 543—44. Sep.)

GROSZFE.

M. Wagenaar, *Beitrag zur Kenntnis des Ananassaftes*. Durch Behandlung von Fleisch oder gemahlenen Sojabohnen mit frischem bzw. 15 Min. am Rückflußkühler gekochtem Saft bei 37° während 17 Stdn. wurde bewiesen, daß derselbe ein *proteinspaltendes Enzym* enthält. (Pharm. Weekblad 61. 1494—97. 1924. Rotterdam.)

GROSZFE.

appin und Grosseron, *Die Mikrobenflora des Salzes. Reinheitsbedingungen, Salz als Zusatz zu Nährmitteln zu stellen sind.* Vortrag über die Ergebnisse bakteriolog. Unterss. von Kochsalz. Mit Ausnahme von *Bacterium coli* u. *Cholera* rauen, die etwas geschädigt werden, gedeihen fast alle Bakterien auch in konz. Zsg. Vf. haben auf verschiedenen Proben von Salz eine große Zahl Bakterien Siren gefunden. Die Industrie, die Salz zur Herst. von Nährmitteln verwendet, alle Maßregeln der Asepsis anwenden. (Ann. Chim. analyt. appl. [2] **6**. 353 15. 1924.)

JUNG.

to Lührs, *Kakaobutterverfälschung.* (Vgl. VAUBEL, Ztschr. f. angew. Ch. **37**. 1. 1924. I. 2908 u. COHN, Ztschr. f. angew. Ch. **37**. 304; C. 1924. II. 559.) Erkennung der Verfälschung von Kakaobutter gibt oft der Brechungsexponent einen Anhalt. Die Kakaobutterfettsäure muß dargestellt u. geprüft, außer Erstarrungspunkt, der genau bestimmt werden kann, die charakterist. Krystallb. et werden. Die Ermittlung des F. der Kakaobutter ist unsicher. Vf. be- einen Fall, bei dem die Fälschung nur an der Fettsäure erkannt wurde. f. angew. Ch. **38**. 30—31. Mannheim-Waldhof.)

JUNG.

udolf Ditmar, *Die Verwertung der Wasseradsorptionsfähigkeit der Kolloide Feuchtung von Tabak.* Vf. bespricht die Verss. zur Feuchthaltung von Tabak empfiehlt eine durchlöchernte Hülse aus Celluloid oder Cellon, in der sich ein Feuchteter Docht aus mercerisierter Baumwolle befindet. (Chem.-Ztg. **48**. 933. 1. Graz.)

JUNG.

Léger, *Über den Nährwert der Weinbergschnecke (*Helix pomatia* L.)* Von r Ernährung benutzten Schnecken wird ein großer Teil (z. B. Leber) ver- f. Die analyt. Unters. dieser nicht verarbeiteten Teile im Vergleich mit denen gessen werden, ergab, daß erstere an leicht verdaulichen Prodd. (Zucker, en) reicher waren als letztere u. mit Unrecht verworfen werden. (C. r. d. a. des sciences **179**. 1622—25. 1924.)

HABERLAND.

ter Biegler, *Über das Enttranen und Bleichen von Heringsmarinaden.* H₂O₂ t nicht die Tranb. sondern begünstigt sie. Die Bleichung damit ist also re 1. Güte nicht geeignet. Unangenehm ist auch die langsame Verfärbung schleichendes in ein schmutziggraues Gelb. Gebleichte Marinaden müssen schnell verbraucht werden. (Konserven-Industrie **12**. 31—32. Wien, Sep.

GROSZSFELD.

Wolff, *Alkoholische Milchprodukte.* (Allg. Brauer- u. Hopfenztg. **65**. 32—35. — **41**. II. 898.)

HESSE.

Valther Friese, *Beiträge zur Kenntnis der Zusammensetzung von Milchkäutchen.* a der Häute bei Erwärmen auf 100° u. ihre Trockensubstanzmenge waren bei annähernd gleichen Milchproben verschieden. Durchschnittliche Zus. O 49,5, H₃PO₄ 43,8, Fe₂O₃ 0,9, Oxyde von Na, K, Mg 5,7%, Spuren Cl u. anfangs ist bei den aufeinanderfolgenden Häuten die Zus. ziemlich konstant, zeigt der Gehalt an Alkalialen stark an unter Verminderung von PO₄ u. Ca. Eiweiß stehen in den Häuten einer Versuchsreihe in umgekehrtem Ver- zueinander. Unter sonst gleichen Verhältnissen fällt am meisten Albumin ulin bei kürzester Erhitzung aus, dann erst wieder bei langer Erhitzung t. Von großem Einfluß auf Zus. der Häute ist die Aufrahmungsfähigkeit der b (Milchwirtschaftl. Forsch. **1**. 316—29. Dresden, Landesstelle f. öff. Gesund- .; Ber. ges. Physiol. **28**. 344. 1924. Ref. PESCHECK.)

SPIEGEL.

lx Winckel, *Trocknungsindustrie und chemische Industrie.* II. *Milch und* (I. vgl. Chem.-Ztg. **48**. 621; C. 1924. II. 1968). Beschreibung der Trock- on Milch, Casein, Albumosen u. Milchserum. (Chem.-Ztg. **48**. 941—42. 1924. Schöneberg.)

JUNG.

Otto Rahn und **Walter Mohr**, *Fettverteilung in pasteurisiertem Rahm*. H pasteurisierter Rahm gibt etwas geringere Butterausbeute als roher oder d erhitzter. Die Butter daraus ist in physikal. Beschaffenheit u. Gehalt an W. verändert. Eine veränderte Fettverteilung im hochpasteurisierten Rahm ist u. erkennbar u. gleicht derjenigen von zu warm angebuttertem. Als Ursache d Erscheinung betrachten Vff. das Rühr- u. Hebewerk der üblichen Pasteurisie Solcher Rahm scheidet beim Stehen eine butterartige feste Schicht ab. (M wirtsch. Forsch. 1. 363—73. Kiel, Vers.- u. Forsch.-Anst. f. Milchwirtsch. Ber. ges. Physiol. 28. 345. 1924. Ref. PESCHECK.) SPIEGEL

K. Lendrich, *Über Trockenmilch*. Das nach dem Krauseschen Zerstäubv. hergestellte Prod. hat den Emulsionszustand des Fettes u. die kolloid. Löslichkeit der Eiweißkörper, die in der Milch vorliegen, trotz Aufhebung d. vorliegenden physikal. Gesetzmäßigkeiten beibehalten. Diese Eigenschaften jedoch nicht unbegrenzt beständig, sondern erleiden je nach der Behandlung fr. oder später Veränderungen. Das MilCHFett wird talgig oder ranzig, das Ca unl.; diese Erscheinungen werden indirekt durch den MilChzucker gefördert u. ausgelöst. Die im kolloidalen Casein fein verteilten sauren Phosphate, wie d. Anhydrid vorhandene MilChzucker machen hygroskop., treten mit dem Casein in (Entziehung von Ca), das dadurch in den Gelzustand übergeführt wird, während der Säuregrad vermindert. Luftdicht verpackt u. kühl gelagert, ist das M. pulver lange haltbar. Die Veränderungen des MilChfettes sind dem oxydiert. Einfluß der Luft zuzuschreiben. Sie würden durch feinere Verteilung des L. noch beschleunigt werden. Homogenisierung der Milch, die getrocknet werden darf daher nicht stattfinden. (Milchwirtschaftl. Forsch. 1. 251—93. Hamburg, Sa Hyg. Inst.; Ber. ges. Physiol. 28. 343. 1924. Ref. PESCHECK.) SPIEGEL

Otto Rahn, *Der Wassergehalt der Butter*. Nach einer von MARTINY 25 Jahren gemachten Zusammenstellung u. neueren Ergebnissen aus der Litter gelangt Vf. zu folgenden Schlüssen: 1. Der Gehalt der Butter an W. ist unabhängig vom Fettgehalte des Rahmes innerhalb der in deutschen Betrieben üblichen Grenzen. — 2. Er nimmt zu mit abnehmender Faßfüllung, kürzerer Butterungs- u. zunehmender Weichheit des Fettes beim Buttern u. Kneten, zunehmender Säure d. Rahmes, Dauer des Waschens (besonders mit w. W.), mit längerem et. Kneten u. mit der Größe der Fettkügelchen. — 3. Er ist ferner abhängig v. d. Art des Butterfasses, der Butterungsdauer, der Pasteurisierung des Rahmes u. v. Salzen. (Milchwirtschaftl. Forsch. 1. 294—315. Kiel, Vers.- u. Forsch.-Anst. f. Milchwirtsch.; Ber. ges. Physiol. 28. 344—45. 1924. Ref. PESCHECK.) SPIEGEL

G. Wiegner, **E. Crasemann** und **M. Kleiber**, *Die Verluste bei der Konservierung des Grases als Dürrfutter, Süßgrünfutter und Elektrofutter*. Bei d. Bereitung von Dürrheu können nach den bisher mitgeteilten Versuchsergebnissen et. bei gutem Erntewetter von 100 Stärkeeinheiten durch Wertigkeitsverminderung d. Grünfutters 10%, durch Atmung u. Gärung im Heustock 20—25% u. durch m. Abfall 10%, also im ganzen 40 bis 45% Stärkeeinheiten verloren gehen. Bei d. Konservierungsverss. an Hammeln wurde festgestellt, daß bei den 3 obengenannten eingehend beschriebenen Konservierungsverff. (vgl. Landw. Vers.-Stat. 100. 14 C. 1923. IV. 502) 40% der Stärkeeinheiten des verlustlos verfütterten Grases verloren gegangen waren. Süßgrünfutter gab bei diesen Verss. einen etwas höher. Elektrofutter einen etwas kleinen Stärkewertertrag als Heu. An verdaulichen to. protein mit Einschluß der Amide gingen bei der Heukonservierung 28%, b. d. Süßgrünfütterkonservierung 33% u. bei der Elektrofütterkonservierung 50% d. verdaulichen Rohproteins des Grases verloren. Bei Süßgrün- u. Elektrofutt b. stand der verdauliche Verlust gegenüber dem Ausgangsmaterial nahezu 70% ständig aus organ. Material, nämlich: zu $\frac{2}{3}$ aus Kohlehydraten zu $\frac{1}{4}$ aus N-haltig.

enzen u. zu $\frac{1}{12}$ aus Ätherextrakt u. Rohfaser. Bei der Heuwerbung war $\frac{1}{10}$ Verlustmaterials Asche, der organ. Rest hatte ähnliche Zus. wie das Verlustmaterial nach den andern Verff., er war ein wenig N-ärmer. Der Eiweißabbau bei Süßgrün- u. Elektrofutter bis zur B. von NH_3 gehen. Die Analyse einer von Säften, die häufig aus mit Gras gefüllten Silos austreten, ergab, daß Trockensubstanz dieser Säfte zu ca. $\frac{1}{4}$ aus freien Säuren vor allem aus Milchsäure zu $\frac{1}{2}$ aus Kohlehydraten u. zu $\frac{1}{4}$ aus N-haltigen Stoffen nebst Mineralbestandteilen bestehen. 100 kg der Trockensubstanz des Saftes werden zu durchschnittlich 1000 Stärkeeinheiten eingeschätzt. Die bisher untersuchten Säfte enthielten 91 bis 97. (Landw. Jahrb. d. Schweiz **37**. 435—96. 1923. Zürich, Techn. Hochschule.) **BE. J. J. Eckart**, *Messung der Konsistenz von Tomatenmark*. Vf. beschreibt ein von CARRASCO vorgeschlagene „Areopienometro Cirio“ (Hersteller: Fabbrica Strumenti Scientifici dott. Bonazzi & Comp., Mailand) zur Best. der Konsistenz von Tomatenmark. Der App. stellt eine Spindel dar, deren Körper mit dem Tomatenmark gefüllt wird u. unten durch einen mit Hg gefüllten eingeschliffenen Hahn verschlossen ist. Der Skalenteil ist unterhalb der Kugel mit einem Maßstab auf den Körper aufgesetzt. Die Eintauchtiefe in W. gibt die D. der eingetauchten M. an; die Eichung erfolgt mit Zuckerlsg. verschiedener Konz. (Chem.-Ztg. **58**—34. München.) **JUNG.**

Ernst Bühler, *Vergleichende Untersuchungen über die Reduktase-, Gärreduktase-, Tyndall- und den Keimgehalt der Milch*. Die Gärreduktaseprobe liefert bzgl. Gärzustand, Aussehen, Geruch, Geschmack wesentlich bessere Ergebnisse als die Tyndallprobe, bringt aber Milchfehler bzgl. Verwendbarkeit der Milch im Haushalt u. Milchverarbeitungsbetrieben schlechter in Erscheinung. Die Entgärungszeit ist bei der Gärreduktaseprobe wesentlich kürzer als bei der Reduktaseprobe. Ursache geringere Konz. der Methylenblaulsg. Die Gärreduktaseprobe wird zur Milchbeurteilung nicht empfohlen. Die Keimzählung nach SKAR liefert weithin höhere Zahlen als das übliche Kulturverf. (Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg. **25**—88. 1924. Wargen i. A., Milchwirtsch. Lehr- u. Forschungsanst.) **GROSZFELD. P. P. Pyl und W. Samter**, *Über Alkalität der Asche von Lebensmitteln*. III. Die Alkalitätswerte von Milch und Milchserum. Gleichzeitige Bestimmung anderer Bestandteile. (II. vgl. Ztschr. f. Unters. u. Nahrsg.- u. Genußmittel **46**. 241; **47**. I. 1874.) Die Alkalitätswerte u. der Phosphatgehalt der mit Na_2CO_3 hergestellten Milchasche sowie der gewöhnlichen Asche des Tetraserums II lassen sich durch dem früher beschriebenen Verf. zuverlässig ermitteln; daneben können Na, Pb, Zn, Fe, Al, B_2O_3 , K_2SiF_6 erkannt u. titrimetr. ermittelt werden. Sämtliche Mineralstoffe im Milchserum l. Mineralstoffe werden, wenn man sie in der Asche des Tetraserums II ermittelt, bei Milchproben mit gleichartigem Serum aber ungleichem Gehalt an Fett u. Casein, gleich gefunden, dagegen in der Asche der Milch selbst verschieden. Im Tetraserum II nicht oder teilweise gel. bleiben: Fe, Al. Der P_2O_5 -Gehalt der alkal. hergestellten Milchasche umfaßt nicht nur die Phosphate der Milch sondern auch die P_2O_5 aus Casein, Lecithin, Carniferrin u. Phosphorsäuren, der P_2O_5 -Gehalt der gewöhnlichen Asche des Tetraserums II (Gesamtmenge der ursprünglichen Phosphate der Milch u. die aus Carniferrin u. Phosphorsäuren gebildeten. Die Differenz des P_2O_5 -Gehaltes beider Aschen nach Umrechnung des Phosphatgehaltes der Asche von 1 l Serum auf 1 l Milch l. den P des Caseins u. Lecithins. Die P_2O_5 -Menge des Tetraserums II zeigt die Abweichungen als die der Milchasche. — Die Alkalität der alkal. hergestellten Milchasche ist durch den Einfluß der aus Casein, Albumin, Globulin, u. den entstammenden Mineralsäuren gegenüber der Alkalität der Asche von Tetraserum II erniedrigt, letztere daher gleichmäßiger. Gegenüber der ursprünglichen Alkalität der Milch selbst ist die Alkalität der Asche des Tetraserums II

durch den Einfluß des Carniferrins u. der Esterphosphorsäuren des Serums niedrigt. Die kleinsten Abweichungen bei beiden Aschen zeigt die durch E von organ. P am wenigsten beeinflusste Methylorange-Alkalität. — Patholog. u. physiolog. veränderte Milch liefert abnorm hohe oder tiefe Werte für Ca, P, C Alkalität sowie abnorme Differenzen zwischen den einzelnen Mineralstoffwerten Milch u. des Tetraserums II. Zusätze von W., Na₂CO₃, NaHCO₃, CaCO₃, Ca₃(P Na-Benzozat, -Salicylat, -Silicofluorid, Borax lassen sich bei vorliegender Stall aus Alkalität, Ca u. P₂O₅ beider Aschen quantitativ ermitteln, sonst angenä schätzen. H₃BO₃ wird durch Einw. auf die Phosphattitration, H₂SiF₆ durch b scheidung von CaF₂ erkannt, H₃BO₃ kann auch neben H₃PO₄ titriert werden. Nachweis von Pb, Zn, Cu, Fe, Al sind Vergleichsproben entbehrlich; alle bilden unl. Phosphate in der neutralisierten Lsg. der Milchasche. — In gewöhnlicher Milchasche sind nur nichtflüchtige Stoffe, wie Ca, Fe, Al, Zn einwandfrei ermitteln, der P₂O₅-Gehalt ist meist durch Verluste erniedrigt, dagegen die Alka infolge Zers. von NaCl, MgCl₂, CaSO₄ usw. erhöht. (Ztschr. f. Unters. Nahrungs Genußmittel **48**. 325—63. 1924. Berlin, Reichsgesundheitsamt.) GROSZFEL

W. Sturm, *Haltbarmachung von Milchproben für die Untersuchung*. 0,8 m Formalin/1 l hält die Milch etwa 1 Woche gut, ohne Änderung von Gefrierpunkt u. SZ. Da Formalin auf Eiweiß einwirkt, ist die Korrektur für den Zusatz rhan an W., sondern an Milch selbst zu ermitteln. Von der Verwendung von K₂CO zur Haltbarmachung ist, weil umständlicher, abzuraten, ebenso von Haltbarmachung durch Erhitzen. (Chem. Weekblad **21**. 606—7. 1924.) GROSZFEL

Rühmekorf, *Ein Beitrag zur Frage des Nachweises von Mastitisstreptokokken in Handelsmilch*. Mastitisstreptokokken (MS.) sind pathogene Varietäten der Milchsäurebildner aus der Streptokokkengruppe u. machen Milch verdorben u. gesundheitsschädlich. Unterscheidung von den Saprophyten ist morpholog. (Staketfärbung) möglich. Solche Milch enthält auch stets Phagocyten (Eiterpröpfchen). MS. findet sich reichlich im Bodensatz, spärlich im Rahm. Das Mastitissekret (Eiterpröpfchen) ist noch in sehr großer Verd. nachweisbar. Auch die letzte Milch aus dem Euter eignet sich zur Unters. 1919—1923 wurden in Leipzig in 18052 Handelsproben von Milch 612 mal (= 3,39%) MS. u. Eiterzellen gefunden. (Ztschr. f. Fleisch- u. Milchhyg. **35**. 81—84. 1924. Leipzig, Milchhygien. Unters.-Anst.) GROSZFEL

Jakob Lieberherr, Islikon, Schweiz, *Elektrischer Röstofen*, dad. gek., daß die übereinander liegenden, in ihrem Gang einzeln regelbaren Schnecken, zwischen denen Entnahmevorr. vorgesehen sind, in Kammern laufen, in deren feuerverstärktem Mauerwerk die elektr. Heizmittel eingebettet sind, u. daß in der untersten Kammer ein Siebblech angeordnet ist, auf dem das mittels Gebläse gekühlte fertige Produkt durch eine mit Schiebblechen versehene endlose Kette aus dem Ofen austritt. — Die Vorr. dient zum Rösten von Kaffee u. Mehl. (D. R. P. **407331** Kl. 2 vom 14/1. 1922, ausg. 18/12. 1924.) KAUSCH

International Takamine Ferment Company, New York, *Zur Bereitung von Brot geeignetes Präparat*, welches dadurch erhalten wird, daß man auf Getreide nährböden Pilze der Aspergillusart o. dgl. züchtet, die M. mit W. extrahiert, li. Fl. eindampft u. mit Glucosesyrup vermischt. (E. P. **207225** vom 24/7. 1922, 12. 1923, ausg. 20/12. 1923.) OELKE

Imbre Weinberger und **Mocha Manufacturing Company Ltd**, Birmingham, *Pastenförmiges Gewürz*. Gewürze beliebiger Art werden gepulvert u. mit einem geeigneten Speisefett gemischt. (Can. P. **237820** vom 27/4. 1922, ausg. 12/1. 1924.) OELKE

Richard Pfeiffer, Wien, *Trocken-Kaffeeconserven in fester Form*. Die zerkleinerten gebrannten Kaffeebohnen u. Zusatzstoffe (gebrannte zerkleinerte Feigen) enthalten

ücke werden zur dauernden Erhaltung des Kaffeearomas in aus den Kaffeestoffen bestehendes, gegebenenfalls mit säurefreiem Dextrin, rohem Zucker u. gl. gefestigtes, hartgetrocknetes u. allseits luftdicht schließendes Gefäß eingeschlossen. (Oe. P. 98247 vom 26/10. 1921, ausg. 25/10. 1924.) KAUSCH.

Georges Truffaut, Frankreich, Seine et Oise, Gewinnung von Nicotin aus Tabak. Man mährt die Tabakpflanzen zur Zeit des höchsten Nicotiningehaltes ab u. bringt sie sofort, zwecks Verhinderung schädlicher Enzymwrkkgg. der in den Pflanzen enthaltenen Oxydasen, Hydrolasen u. anderer Fermente mit einer schwachen Mineralsäure von der p_H 3—4. Hierauf wird die M. möglichst schnell unter Abzug von überschüssigem NaCl vermahlen, zur Zers. der Nicotinsalze mit wss. Alkalien versetzt u. der Brei ausgepreßt. Nach mehrmaligem Auswaschen des festen Rückstandes, werden die das gesamte Nicotin enthaltenden Filtrate vereinigt u. das Nicotin mit den üblichen Mitteln aus der wss.-alkal. Fl. extrahiert. Durch das Extrahieren werden die bei Verwendung von bereits getrocknetem Tabak eintretenden, 20—40% betragenden Verluste an Nicotin vermieden. (F. P. 571490 vom 4/10. 1923, ausg. 17/5. 1924.) SCHOTTLÄNDER.

Louis Étienne Joseph Bouchet, Frankreich (Seine), Gewinnung einer der menschlichen Muttermilch ähnlichen frischen, aseptischen Milch. Die mit Hilfe chemischer Mittel unter besonderen Vorsichtsmaßregeln von kastrierten Kühen erhaltene Milch wird bis zum Verbrauch in Kühlbehältern bei einer Temp. von etwa 4° C. bewahrt. — Die Milch von Kühen, denen die Eierstöcke fortgenommen sind, unterscheidet sich in der Zus. von derjenigen n. Kühe wesentlich unterscheiden u. der menschlichen fast gleich sein. (F. P. 574765 vom 19/12. 1923, ausg. 18/7. 1924.) OELKER.

Alvid Thomson, London, England, Proteine, Phosphate und Lactose aus Molken. Nach Ref. nach E. P. 173831; C. 1923. II. 1159 ist nachzutragen, daß das Molken durch Zugabe von Alkalischmachen u. Neutralisieren der Molkenfl. solange fortgesetzt wird, bis die Fl. eine Acidität von p_H 4,5 erreicht hat. Zum Alkalischmachen benutzt man $CaCO_3$ oder NaOH, zum Neutralisieren n. HCl. Das Verf. läßt den gelben Rückstand (Lactose) derart proteinfrei zurück, daß er leicht gewonnen werden kann. Hierzu wird die Endfl. nach Entfernen der Proteine auf etwa die Hälfte eingeengt. Bei 60° eingedampft, wieder auf p_H 4,5 gebracht u. auf 90° erhitzt. Der Rückstand hierbei koagulierten Proteine wird abgeschleudert u. die Lsg. eingekocht. Der Rückstand des Sirups krystallisiert der Milchzucker aus, der ebenso wie die Lactose zur Herst. von Tabletten Verwendung finden kann. (Schwz. P. 102015 vom 12. 1921, ausg. 1/11. 1923.) SCHOTTLÄNDER.

Edley Ralph Marston, Hyde Park (Australien), Herstellung einer Caseinlösung aus Magermilch oder saurer Milch, dad. gek., daß man überschüssiges Casein zu der Fl. setzt u. die klare Caseincalciumlsg. von dem Nd. trennt. — Man setzt das $Ca(OH)_2$ unter kräftigem Rühren zu u. erhöht dann die Temp. zweckgemäß auf 50°. Nachdem sich das überschüssige $Ca(OH)_2$ zusammen mit dem unl. Casein u. unl. Ca-Fettseifen abgesetzt hat, wird die überstehende Fl. abgetrennt. Die Lösung des Casein-Ca aus der Lsg. wird diese bis zur p_H 10^{-10} mit HCl versetzt, in Ggw. von Thymolphthalein als Indikator. Will man freies Casein aus der Lsg. abscheiden, so wird in Ggw. von Carminsäure als Indikator HCl bis zur p_H 10^{-5} zugegeben. Aus der vom Casein bzw. Casein-Ca befreiten Lsg., die, falls Bedarf, mit $Ca(OH)_2$ oder HCl in Ggw. von Phenolphthalein als Indikator, bis zur p_H 10^{-7} neutralisiert wird, kann man gegebenenfalls den Milchzucker gewinnen. Das Caseincalcium bzw. Casein findet zu techn. Zwecken Verwendung. (F. P. 105002 vom 13/1. 1923, ausg. 2/6. 1924.) SCHOTTLÄNDER.

Go-Gesellschaft A.-G. Bern, Bern, Haltbare Tierfuttermittel aus aufbereiteten, cellulosehaltigen Pflanzenteilen. Zur Herst. derselben vermischt man

die aufgeschlossenen Pflanzenteile mit Verbb. von Hefe mit ungiftigen oder Farbstoffen. Die Herst. der Hefe-Farbstoffverb. erfolgt zweckmäßig in der Weise, daß man die Hefe, gegebenenfalls unter Zusatz von etwas Kochsalz, mit antisporul. organ. Farbstoffen, z. B. Methylvioletthydrochlorid, in neutraler oder saurer Lösung zusammenbringt u. erhitzt. (Oe. P. 97930 vom 21/7. 1922, ausg. 25/9. 1924.) OELKNECHT

Landelektrizität G. m. b. H., Halle a. S., *Halbarmachen saftiger Futtermittel mittels Elektrizität*. Es werden am besten schraubenförmig ausgebildete Elektroden in Stabform in die Futtermasse eingeführt. (Oe. P. 98252 vom 4/4. 1923, ausg. 25/10. 1924. D. Priorr. 12/4. u. 28/8. 1922.) KAUSCH

XVII. Fette; Wachse; Seifen; Waschmittel.

Otto Rahn und Walter Mohr, *Der Luftgehalt der Margarine*. Die Luftmenge in Margarine ebenso gleichmäßig verteilt wie in Butter, ihre Menge in jener aber im allgemeinen beträchtlich größer. Der Luft-O₂ scheint die Zers. des Fettes weniger direkt zu bewirken als indirekt durch Begünstigung aerober Keime. Während reines mit Luft emulgiertes Fett sich monatelang hielt, war die gleiche Mischung, auf Margarine verarbeitet, schon nach 3—4 Wochen von schlechtem Geschmack. Durch längeres Kneten der Margarine kann Luft herausgearbeitet werden. (Milchwirtschaftl. Forsch. 1. 360—62. Kiel, Vers.- u. Forsch.-Anst. für Milchwirtsch.; Ber. ges. Physiol. 28. 345. 1924. Ref. PESCHECK.) SPIEGEL

O. Köpke, *Nachprüfung des Verfahrens von L. W. Winkler zur Jodbromzahlbestimmung ohne Kaliumjodid*. Das Winklersche Verf. hat vor dem v. Hübls Verfahren verschiedene Vorzüge. Schwierigkeiten bei der Erkennung des Titrationsumschlages werden durch 2 Tropfen wss. Lsg. von Indigocarmin (1 : 500) auch bei Lampenlicht vermieden. Der Br-Überschuß soll etwa der Menge des gebundenen Br gleich sein. Einwirkungszeit in der Regel 2 Stdn., bei trocknenden Ölen u. Tranen 20 Min. im Dunkeln. Angabe einer genauen amtlichen Arbeitsvorschrift. (Ztschr. f. Untersuch. Nahrungs- u. Genussmittel 48. 364—70. 1924. Berlin, Reichsgesundheitsamt.) GRUBER

Compagnie Française de Commerce International et Colonial, Frankreich (Seine), *Reinigung gewisser vegetabilischer Fette, wie Karité-Butter u. dgl.* Das Fett aus den Körnern von Butyrospermum Parkii erhaltene Fett wird durch Behandeln mit der 1½—3-fachen Gewichtsmenge Aceton in Lsg. gebracht, von den dabei ausgescheidenden gummiartigen Bestandteilen getrennt u. dann durch Verdampfen des Acetons wiedergewonnen. — Das so erhaltene gereinigte Fett kann für Nahrungsmittel- u. industrielle Zwecke Verwendung finden. (F. P. 575541 vom 1/12. 1923, ausg. 1/8. 1924.) OELKNECHT

Luigi Francesconi und Mario Gaslini, Italien, *Entsäuern von Fetten und Ölen*. Der größte Teil der in den Fetten u. Ölen enthaltenen Säuren wird durch Alkohole, gegebenenfalls unter Mitverwendung eines Katalysators, verestert, während der Rest mittels Alkalien verseift wird. — Es werden größere Verluste an essigsaurem Äther vermieden. (F. P. 575477 vom 7/1. 1924, ausg. 30/7. 1924. Ital. Priorr. 21/12. 1923.) OELKNECHT

Lever Brothers Ltd., England, *Herstellung fein verteilter Fette und Wachse*. Um Fette u. Wachse oder ihre Mischungen in ein feines, trockenes Pulver überzuführen, werden sie auf eine nur wenige Grade über ihrem F. liegende Temperatur erhitzt u. dann in der freien Luft oder einem inerten Gase zerstäubt. (F. P. 574766 vom 11/12. 1923, ausg. 18/7. 1924. E. Priorr. 12/12. 1922 u. 24/5. 1923.) OELKNECHT

A. Didier, geb. Andrée Deny, Frankreich (Seine), *Hygienische Seife*, welche insbesondere zum Reinigen u. Desinfizieren der weiblichen Geschlechtsorgane geeignet ist u. aus einem im wesentlichen aus einem länglich-ovalen, auf einem Halter angeordneten Seifenstück besteht, das einen Längskanal besitzt, der mit Wasser gefüllt werden kann.

er einer desinfizierenden Fl. gefüllt werden kann. (F. P. 574812 vom 21/12. 1923, ausg. 19/7. 1924.) OELKER.

liien Noyer, Frankreich (Bauches-du-Rhône), *Seifen, welche in jedem Wasser, in Meerwasser löslich sind*, werden dadurch erhalten, daß man ihnen 5—10% Fl. einverleibt, die durch Kochen von 20 kg Mollusken o. dgl. in 10 Ltr. W. an wird. (F. P. 575998 vom 19/1. 1924, ausg. 8/8. 1924.) OELKER.

ociété d'Études et d'Applications pour le Progrès de l'Industrie Re-
lie, Frankreich (Gironde), *Harzseifen*, zu deren Herstellung an Stelle des ge-
bräuchlich verwendeten Kolophoniums rohe Pimarsäure ($C_{20}H_{30}O_2$) verwendet wird. —
Diese Seifen von hervorragender Waschkraft erhalten werden, die nach dem
Waschen keine pechartigen Rückstände hinterlassen. (F. P. 575228 vom 4/1. 1924,
ausg. 25/7. 1924.) OELKER.

XVIII. Faser- und Spinnstoffe; Papier; Cellulose; Kunststoffe.

Ernst Altmann, *Asbestine und ihre Verwendung in der Papier- und chemischen
Industrie*. Überblick über die Verwendungsmöglichkeiten der „Schneeflocken-
seife“ der Firma BERNFELD u. ROSENBERG, Wien IX/3. (Chem.-Ztg. 49.
1924, 11. 1924.) JUNG.

Erik Hägglund, *Untersuchungen über die Chemie der Sulfitzellstoffkochung*.
(vgl. S. 590.) Für die Eigenschaften des Zellstoffes sind nicht nur Zus. der
Faser u. Art der Erwärmung, sondern auch die Menge des beim Abstellen
verbleibenden „disponiblen Sulfites“ wichtig. Zellstoffe von höchster Festigkeit
erhält man, wenn bei anfänglich verhältnismäßig hohem Gehalt an Kalk (dis-
poniblen Sulfite) u. mäßigem Gehalt an Gesamt- SO_2 das Kochen einige Zeit nach
Ver-
schwinden des disponiblen Sulfites beendet wird. Dabei kann man innerhalb
bestimmter Grenzen des Gehaltes an SO_2 u. CaO etwa 48—49% des Holzgewichtes an
Zucker- u. hohe Zuckerausbeuten erhalten. — Mit steigendem CaO-Gehalt der
Lauge steigen die Cu-Zahlen der Zellstoffe. — Die Br-Zahlen nach TINGLE steigen
nach dem Kochen, nehmen dann aber plötzlich ab. — Die Mengen von SO_2 ,
die gebunden sind u. die als Maß für den „Schwefelverbrauch“ anzusehen
sind, steigen mit steigender SO_2 -Konz. der Laugen. Nach Verschwinden des
disponiblen Sulfites tritt eine Beschleunigung der SO_2 -Bindung ein. (Svensk Kem.
Tekn. 36. 284—94. 1924. Åbo, Akademie.) HESSE.

Mount Hope Finishing Company, übert. von: John Marsden, North Dighton,
Massachusetts, V. St. A., *Reinigen von pflanzlicher Faser*. Zur Entfernung der
Lignin, Pektinstoffe usw. behandelt man Rohbaumwollgewebe usw. mit k. verd.
Lauge von Alkalien oder alkal. reagierenden Stoffen, quetscht ab, läßt einige Stdn.
ruhen u. wäscht dann aus; hierauf wird die Rohbaumwolle mit verd. NaOH ge-
waschen u. dann durch eine mit gasförmigem Cl_2 gefüllte Kammer geleitet, nach dem
Auswaschen der Kammer geht man mit der Baumwolle durch verd. NaOH, läßt
sie einige Zeit liegen, u. wäscht dann aus; man erspart bei dieser Arbeitsweise das
Waschen durch Kochen mit Lauge unter Druck. (A. P. 1515691 vom 11/11. 1922,
ausg. 18/11. 1924.) FRANZ.

the Calico Printers Association Limited und Emile Auguste Fourneaux,
Manchester, England, *Mercerisieren von Baumwollgeweben*. (D. R. P. 405517 Kl.
vom 26/1. 1923, ausg. 4/11. 1924. E. Priorr. 27/1., 25/5., 28/8. 1922. Oe. P. 98165
vom 5/1. 1923, ausg. 10/10. 1924. — C. 1923. IV. 341.) FRANZ.

Mathé Chemical Company, Brooklyn, New York, übert. von: Samuel A. Turner,
Brooklyn, New York, *Mottensichermachen von tierischer Faser*. Man behandelt Wolle

mit einer Lsg., die man durch Erhitzen eines Salzes der Naphthalinmonosulfosäure mit einem Sulfat u. einem Fluorid erhält; man verwendet z. B. die Zn oder Al-Salze der Naphthalin-1- oder -2-monosulfosäure, $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$, ZnSO_4 , die Fluoride des Zn, Na, K, NH_4 . (A. P. 1515182 vom 25/4. 1923, ausg. 11/11. 1924.) FRANZ

Pierre Levy, (gen. **Levy-Buhler**), Frankreich (Seine), *Transparente und undurchlässige Papiere*. Die Papiere werden auf beiden Seiten mit einem geeigneten Firnis überzogen. (F. P. 574465 vom 14/12. 1923, ausg. 11/7. 1924.) OELKE

Alessandre Ajmar, Italien, *Herstellung patinierter Papiere für typographische und andere industrielle Zwecke*. Das Papier wird mit einer M. überzogen, welche durch Vermischen von SiO_2 mit leim- oder harzartigen Substanzen (z. B. Casein, Dextrin, Gluten, Harzseifen etc.) hergestellt ist. (F. P. 574548 vom 14/12. 1923, ausg. 12/7. 1924.) OELKE

Ata A.-G., Baden, Schweiz, *Herstellung von Mottenschutzpapier*, dad. gek., ein Papier mit einem Mottenschutzmittel imprägniert wird. — Das als Wickelpackpapier in den Handel gebrachte Prod. dient zum Schutz von Stoffen, Waren oder Kleidern gegen Mottenfraß. (Schwz. P. 101949 vom 25/7. 1923, ausg. 16/11. 1923.) SCHOTTLÄNDER

Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Leverkusen b. Köln a. Rh., und **Rudolf Goebel**, Wolkenstein, Sachsen, *Widerstandsfähige und wasserfeste Gegenstände aus Hartpappe*. Man bringt auf aus schwach gepreßter Cellulose geformte Gegenstände Lacke aus Celluloseestern, Celluloseäthern oder anderen Cellulosederiv., preßt sie unter hohem Druck in Formpressen, überzieht sie mit Celluloselacken, preßt sie nochmals h. nach u. poliert. (Oe. P. 97293 vom 14/12. 1922, ausg. 25/6. 1924.) OELKE

Paul Knichalik, Magdeburg, *Geruchlosmachen der Abgase der Sulfatzellfabriken* nach Pat. 405612, dad. gek., daß die übelriechenden Gase durch Frischlauge geleitet werden. — 2. dad. gek., daß die Gase mit Schwarzlauge vor u. nach Frischlauge nachgewaschen werden. — Man erhält mit Sicherheit vollkommen geruchlose Gase. (D. R. P. 407326 Kl. 55b vom 24/1. 1924, ausg. 10/12. 1924.) Zus. zu D. R. P. 405612: C. 1924. II. 451.) OELKE

Erik Ludwig Rinman, Schweden, *Herstellung von Sulfitecellulose aus haltigem Holz*. Das Holz wird vor oder während des Kochens mit geeigneten organ. Lösungsmitteln für Harz (Bzl., Bzn., Terpentin, Ä., Toluol etc.) behandelt. Das Aufschließen des Holzes erfolgt leichter u. in bedeutend kürzerer Zeit als bisher. Die gel. Harze können wiedergewonnen u. besonders verwertet werden. (F. P. 574251 vom 8/12. 1923, ausg. 9/7. 1924.) OELKE

Deutsche Sprengstoff Actien-Gesellschaft, Hamburg, übert. von: **Alfred Fausten**, Köln a. Rh., *Nicht entflammare celluloidartige Massen*. Man vermischt gelatinierte Acetylcellulose oder ihre Lsg. in Aceton, Essigester, A., Bzl. mit geringen Mengen bis 5%, einer Nitrocellulose, die eine niedrige Viscosität besitzt u. in den Lösungsmitteln für Acetylcellulose II. ist, durch diesen Zusatz wird die Brennbarkeit nicht erhöht, dagegen wird die Geschmeidigkeit u. die Festigkeit des Acetylcellulosefilms erhöht u. seine Zersetzlichkeit verringert, zur weiteren Verringerung der letzteren setzt man der M. noch eine Acetylgruppen bindende Verbindung wie Amylalkohol zu. (A. P. 1512751 vom 29/5. 1923, ausg. 21/10. 1924.) FRANZ

Eastman Kodak Company, übert. von: **William B. Webb**, Rochester, New York, V. St. A., *Herstellung von Celluloseacetat*. Man zerstäubt das fl. Acetylierungsgemisch in einem w. Gasstrom, hierbei werden die flüchtigen Anteile, Eg., Acetaldehyd, verdampft, u. können durch Kondensation wieder gewonnen werden, das Celluloseacetat wird als Pulver gewonnen. Man zerstäubt z. B. das Acetylierungsgemisch mit Hilfe von erhitzter Luft in eine Kammer, in der das trockene Celluloseacetat zu Boden sinkt, u. von dort entfernt werden kann; die mit den Dämpfen

die Luft wird am anderen Ende der Kammer durch ein Rohr zum Kondensator geleitet, die Luft geht dann durch einen Kondensator u. eine Heizvorr., sie von neuem benutzt werden. (A. P. 1516225 vom 15/11. 1923, ausg. 18/11.

FRANZ.

Gele-Werke A.-G., Spandau, *Herstellung lederartiger Stoffe aus Kautschuk* mischen von Kautschuk mit Geweben, Faserstoffen, organ. oder anorgan. Stoffen durch Vulkanisierung, dad. gek., daß die Vulkanisierung in Ggw. eines Salzes von Cu oder Cu-Verbb. in solcher Menge ausgeführt wird, daß die Rk. der B. des lederartigen Zwischenprod. zwischen Weichkautschuk u. Hartkautschuk festgehalten werden kann. — Die Menge des zuzusetzenden Cu, 0,5—5%, durch einen Vorvers. bestimmt werden. (D. R. P. 407998 Kl. 39b vom 26/9. 1924, ausg. 30/12. 1924.)

FRANZ.

Sternberg, Berlin-Grunewald, *Hornähnliche Massen*, Defibriertes Blut vor dem Trocknen zerkleinert, zweckmäßig durch zwei übereinander angeordnete, sich in entgegengesetzter Richtung drehende Drahtbürstenpaare; unter der Drahtbürsten wird das Prod. mit Hilfe eines w. Luftstromes getrocknet; eine zerkleinerte Albumin wird durch Pressen zu hornähnlichen Massen getrocknet. (E. P. 224227 vom 27/10. 1924, Auszug veröff. 24/12. 1924, Prior. 29/10. 1924.)

FRANZ.

The Barber Asphalt Company, Philadelphia, Pennsylvania, übert. von: **John Miller Jr.**, Rahway, New Jersey, *Grundmasse zur Herstellung von Schellack*. Man vermischt Faserstoffe, wie Asbest, Baumwolle mit hoch schmelzenden Bitumen, beim Pressen bringt man eine Schicht von Schellack u. Faserstoffen auf. (E. P. 1516469 vom 13/12. 1921, ausg. 18/11. 1924.)

FRANZ.

Brennstoffe; Teerdestillation; Beleuchtung; Heizung.

C. Mohr, *Eine neue Kläranlage zur Rückgewinnung der Kokereiabwässer eines Werkes*. Kläranlagen nach Bauart „Oms“ der Deutschen Abwasser-Reinigungs-Gesellschaft. H. in Wiesbaden werden beschrieben. (Zentralbl. d. Hütten u. Walzw. 28. 1924.)

NEUFELD.

H. S. Tupholme, *Trockene Kokskühlung mit inertem Gase*. Beschreibung des Sinter-Prozesses für trockene Kühlung u. einiger europä. Ausführungen desselben. (Chem. Metallurg. Engineering 31. 574—75. 1924. London.)

BÖRNSTEIN.

V. Benedict, *Ein neuer Gasdruckregler*. Bei dem Gasdruckregler Bauart von Bochum, wird ein vollkommen entlastetes Doppelsitzventil je nach der Stellung einer Membran geöffnet oder verschlossen. Die Federspannung wird durch eine runde Scheibe ausgeglichen, so daß die Druckschwankungen nicht die Ventile überwinden müssen; es genügt eine winzige Druckänderung um die Stellung des Ventils herbeizuführen. Durch eine Mikrometerschraube kann die Einstellung auf Bruchteile mm Wassersäule eingestellt werden. (Chem.-Ztg. 1924.)

JUNG.

V. Allner, *Beiträge zur Praxis der Hochvakuumdestillation von Mineralölen*. u. tabellar. Darst. über Destillationsverlauf u. Prodd. bei der Hochvakuumdestillation rumän. Minus-Pacura. (Petroleum 21. 5—11. 1925. Berlin.)

BÖRNSTEIN.

„Mega“, Montanwachs. *Ein Material mit einzigartigen Eigenschaften*. Monographie des Montanwachses. (Chem. Trade Journ. 76. 3—4.)

JUNG.

Saschanow, *Zur Frage über die Erstarrung paraffinhaltiger Produkte*. Die Ursache des das Fließen behindernden krystallinen Paraffinnetztes in erstarrten Erdölen ist nicht stichhaltig, weil auch leichtfließende Destillate nach Paraffinzusatz erstarrt werden können u. weil eine mechan. Zerstörung des hypothet. Netztes das Einsetzen der Erstarrung nur verschiebt u. nicht ausschließt. Die Erstarrung der

Paraffinlsg. ist dem Gelatinieren wesensgleich (vgl. GURWITSCH, S. 596). (Neft i slancevoo Chozajstvo 7. 531—32. 1924.)

Robert Nowotny, *Die Rolle der Holzfeuchtigkeit bei der Imprägnierung Salzlösungen*. Vf. referiert über die Unterss. BATEMANNS (Chem. Metallurg. Engineering 22. 57; C. 1921. II. 48) u. rechnet nach, daß das W. des Holzes gegen den Konz.-Abfall zu erklären. Bei langer Einw. von NaF tritt eine Überaufnahme ein. (Österr. Chem.-Ztg, 27. 188—90. 1924. Wien.)

R. Tillmann, *Hochdruckdampfheizung*. Vf. vergleicht die Arbeitsweisen der Heißwasser- u. der Hochdruckdampfheizung ohne Umwälzpumpe. (Chem.-Ztg 35. Mannheim-Rheinau.)

T. R. Wollaston, *Die Verhütung von Rauchscheiden. Bedeutung des Generators („gas producer“)*. Vortrag über Generatoren u. Kohlenstaubeuerung. Beschreibung einer Verbesserung, bei der das Heizmaterial in dünner Schicht dem Gas entgegengeführt u. entgast wird. In einem den Generator umgebenden ringförmigen Dampfkessel wird der erforderliche Dampf erzeugt. (Chem. Trade Journal 4—6.)

—, *Naphthalinbestimmung*. Best. kleiner Mengen Naphthalin in Steinkohlenteer u. Imprägniermassen: 100 g Teer werden derart destilliert, daß die Fraktion zwischen 180° bis 250° getrennt abgenommen wird. Diese wird in Eiswasser gekühlt u. genutscht, das abgeschiedene Naphthalin auf einen Tonteller gestrichen, getrocknet u. gewogen. Spuren von Öl im isolierten Naphthalin u. die L. des Naphthalins im Teeröl kompensieren sich, so daß keine Korrektur angebracht zu werden braucht. Enthält der Teer viel W., dann werden 50 g des Teers abgewogen u. mit dem gleichen Vol. Xylol gemischt u. erst dann destilliert. Xylol u. W. gehen gemeinsam über, so daß dann die Naphthalinfraktion zwischen 180° u. 250° abgenommen werden kann. Es fallen aber bei dieser Methode die Naphthalinwerte zu tiefer aus. Deshalb wird vorgeschlagen, das Naphthalin nur mit Wasserdampf abzutreiben. (Mitt. Materialprüfungs-Amt Groß-Lichterfelde 42. 21—22. 1924.)

J. H. Goldsmith, *Die Gas-Probenahme*. Es wird darauf hingewiesen, daß es besonders in Gaswerken zur Gewinnung brauchbaren Analysenmaterials erforderlich ist, über einen längeren Zeitraum, 24 Stdn., dauernd Gas zu sammeln, so eine Durchschnittsprobe herzustellen u. ein passender App. beschrieben. (Journ. 168. 847—48. 1924. London.)

Minerals Separation Ltd., London, *Verfahren zur unterschiedlichen Schmelzbarmachung eines Gemisches aus heterogenen Kohlenarten*. (D. R. P. 406061 I. vom 14/6. 1922, ausg. 13/11. 1924. E. Prior. 20/6. 1921. — C. 1923. IV. 478.)

Hugh Alan Mackay, London, *Emulsionen bituminöser Substanzen*. Die bituminösen Stoffe, z. B. Asphalt, werden geschmolzen, dann nach Zusatz einer kleinen Menge Fettsäure, z. B. 2½—5% Ölsäure, mit einer verd. Alkalilsg. bei etwa 225° F. so lange verrührt, bis sich die Emulsion gebildet hat. Diese ist in jedem Verhältnis mit W. mischbar, trennt sich nicht ohne weiteres in ihre Bestandteile u. erzeugt auf den mit ihr behandelten Flächen nach Verdampfung des W. keine u. homogene Schichten der ursprünglichen bituminösen Substanz. Besonders geeignet ist sie als Bindemittel für Kohlenbrikette u. dgl. (E. P. 202231 vom 1922 u. 1/2. 1923, ausg. 6/9. 1923.)

R. Wolf Akt.-Ges., Magdeburg-Buckau, *Vortrocknen oder Trocknen von wasserhaltigen Stoffen, insbesondere von erdiger Braunkohle als Brennstoff für Kohlenstaubeuerungen*, unter Benutzung der Abgashitze einer Dampfkesselfeuerung dargestellt, gek., daß die Trocknung außerdem durch eine regelbare Heizgasmenge statuiert wird, die vor dem Economiser oder Überhitzer, also an einer heißeren Stelle, dem Gasstrom entnommen u. den Abgasen entweder beigemischt oder in einer besonderen Vorrichtung

nungsstufe verwendet wird. (D. R. P. 407929 Kl. 82a vom 12/3. 1922, ausg. 1924.) KAUSCH.

Catlin Shale Products Company, New York, übert. von: **Robert M. Catlin**, Catlin, N. J., V. St. A., *Destillation von kohlenstoffhaltigem Material*. Aus flüchtigen u. festen verbrennlichen Teilen bestehende kohlenstoffhaltige Substanzen werden in absteigender Richtung durch eine senkrecht stehende Kolonne geführt, deren unterem Teil, um die erforderliche Destillationstemp. zu erzeugen, eine Verbrennung des Materials erfolgt. In diese sogen. Verbrennungszone wird eine Mischung aus Luft u. einem unverbrennlichen Gas (CO₂) eingeleitet, deren Menge reguliert wird, daß oberhalb dieser Verbrennungszone nur eine Dest. erfolgt, die Verbrennung weiteren Materials dagegen verhindert wird. Die entwickelten u. Dämpfe werden oben aus der Kolonne abgeführt u. durch einen Kondensator geleitet. Die aus diesem entweichende Mischung von brennbaren u. nicht brennbaren Gasen wird entzündet, um etwaiges CO in CO₂ überzuführen, worauf das Gas wieder mit Luft gemischt in die Verbrennungszone eingeleitet wird. (A. P. 1667 vom 17/8. 1921, ausg. 23/9. 1924.) OELKER.

L. Oil Processes Ltd., England, *Spalten von Ölen nach dem Krackprozeß*. Die verschiedenen Bestandteile eines Öls, die einen verschiedenen Kp. haben, werden vor ihrer Einführung in eine Retorte auf eine Temp. erhitzt, welche höher ist als der Kp. des höchst sd. Bestandteils u. zwar unter einem Druck, welcher genügt, um die Verdampfung der verschiedenen Fraktionen zu verhindern, worauf plötzlich eine Druckentlastung in der Retorte herbeigeführt wird. — Es werden auf diese Weise gleichmäßigere Erzeugnisse erzielt, da alle Bestandteile der Öle gleichzeitig dem Krackprozeß ausgesetzt werden. (F. P. 572104 vom 20/10. 1923, ausg. 30/5. 1924. E. Prior. 1923.) OELKER.

Naamlooze Vennootschap Bataafsche Petroleum Maatschappij, Holland, *Herstellung von Asphalt-Emulsionen*. Man vermischt den Asphalt, vorzugsweise im flüssigen Zustande, mit Oxydationsprodd. von KW-stoffen u. emulgiert dann das Gemisch mit Hilfe von Alkali- oder Alkalisalzlösungen bei einer Temp. von 100°. — Die Oxydationsprodd. der KW-stoffe, welche neben unveränderten Stoffen Säureanhydride, Lactone, Alkohole, Ester etc. enthalten, dienen als Emulgierungsmittel. (F. P. 576336 vom 25/1. 1924, ausg. 14/8. 1924. Holl. Prior. 1923.) OELKER.

L. Oil Processes Ltd., England, *Behandlung von Mineralölen nach dem Krackprozeß*. Die Öle werden in einer Kolonne o. dgl. in Dampf verwandelt, wobei mittels eines inerten oder permanenten Gases in die zum Kracken dienende Zone übergeführt u. dort mit einer kleinen Menge H₂ oder NH₃ oder einem Gas, welches aus diesen beiden Körpern vermischt wird, dieser Zusatz bezweckt, den Sättigungsgrad der gekrackten KW-stoffe zu erhöhen u. die B. von freiem C zu verhindern. (F. P. 575600 vom 8/1. 1924, ausg. 1/8. 1924. E. Prior. 26/4. 1923.) OELKER.

Villy Kinberg, Prag, *Verfahren zum Imprägnieren schwer durchtränkbarer Holzarten*, wie Fichten- u. Tannenholz, dad. gek., daß man das Holz mit Wasserdampf, wobei ein Lösungsm., wie Trichloräthylen, für Harz, Terpentinöl, Fett u. dgl. zugegeben wird, dämpft u. anschließend hieran die Imprägnierung in einer, der Dämpfungsintensität entsprechenden Tiefe durchführt. — Durch diese Vorbehandlung werden die Holzarten auch für weniger stark konservierende Mittel als HgCl₂, auf das man bisher fast ausschließlich angewiesen war, zugänglich. (Oe. P. 96236 vom 18/5. 1924, ausg. 10/3. 1924.) SCHOTTLÄNDER.

Stanley Hiller, San Jose, Santa Clara, Calif., *Herstellung von Holzkohle*. Die Verbrennung des Materials erfolgt in einem offenen Zylinder, durch den es kontinuierlich hindurchgeführt wird, wobei die zur Verkohlung erforderliche Hitze durch

Verbrennung eines Teiles des zu verkohlenden Materials selbst erzeugt wird. (F. P. 206245 vom 3/8. 1922, ausg. 29/11. 1923.)

Maria Stahl, Frankreich (Seine-et-Oise), *Reinigen der leichteren Produkte Holzdestillation*. Man unterwirft diese Prodd. ($C_2H_4O_2$, CH_2O_2 , $CH_3-CO-CH_3$) einer Waschung mit einer wss. Lsg. eines Chlorids z. B. $ZnCl_2$ oder eines Alkali-Erdalkalisulfats, -borats, -phosphats oder -nitrats. (F. P. 575677 vom 30/3. 1922, ausg. 4/8. 1924.)

Gerald P. Young, Dayton, V. St. A., *Entkohlungsmittel für Explosionsmischungen* bestehend aus etwa 45 Teilen CS_2 , etwa 17,5 Teilen A., etwa 32,5 Teilen I. und etwa 5 Teilen Gasolin. Das Mittel wird in die k. oder h. Motore eingebracht und bleibt in ihnen kürzere oder längere Zeit vor dem Gebrauch, löst die harzigen Stoffe, welche die an den Innenwänden angesetzten Kohleteilchen verbinden, daß diese bei den anschließenden Explosionen im Motor mitverbrannt werden. (F. P. 1511152 vom 29/3. 1923, ausg. 7/10. 1924.)

Alfred M. Houghton, Washington Columbia, und **Richard Franchot**, New York, New York, übert. von: **Karl P. Mc Elroy**, Washington, Columbia, V. St. A., *Herstellung eines Motortreibmittels*. Man leitet Acetylen durch verd. H_2SO_4 und H_3PO_4 , der Hg als Katalysator zugesetzt ist, bei ca. 70° befreit das austretende C_2H_2 u. wenig Acetaldehyd enthaltende Gasgemisch von W. u. verflüssigt es unter Druck. — Das Verf. ermöglicht die Verwendung des C_2H_2 als Motortreibmittel, da die Ggw. der geringen Mengen des gebildeten CH_3CHO die Verflüssigung desselben wesentlich erleichtert, u. die Fl. bei gewöhnlicher Temp. nicht explosiv ist. (F. P. 1514977 vom 5/4. 1922, ausg. 11/11. 1924.)

Albert Verley und **Raymond Lestonnat**, Frankreich (Seine), *Motortreibmittel* welche aus den Estern der Fettsäuren mit anderen Alkoholen als Glycerin bestehen, z. B. denen des Methyl-, Äthyl- u. Butylalkohols. (F. P. 571314 vom 15/12. 1921, ausg. 15/5. 1924.)

XXI. Leder; Gerbstoffe.

Thomas Blackadder, *Ein praktischer Ausdruck für effektive Acidität*. Die Wirkung einer gerber. Fl. hängt vielfach von der Titrationsacidität — bzw. Alkalinität — einem Quantitätsfaktor — u. gleichzeitig in hohem Maße aber von der aktuellen oder effektiven Acidität bzw. Alkalinität, der $[H^+]$ bzw. $[OH^-]$ — potentiellen Faktor — ab. So wird eine saure Fl., wenn sie eine stark dissoziierte freie Säure enthält bei geringer Titrationsacidität infolge ihrer großen $[H^+]$ die aktuelle Acidität, eine stark schwellende Wrkg. haben, während umgekehrt eine konzentriertere Lsg. einer schwachen Säure bei großer Titrationsacidität eine geringere effektive Acidität, — kleine $[H^+]$ —, u. deshalb geringe Schwellkraft für tierische Haut besitzen kann. Der übliche Ausdruck für die demnach große prakt. Bedeutung habende aktuelle Acidität ist der von SÖRENSEN eingeführte „pH-Wert“ oder „Sörensen-Wert“ genannt, d. i. der negative Logarithmus der $[H^+]$. Da die pH-Werte den Zahlen für die Wasserstoffionenkonzentration, den „Wasserstoffzahlen“ = 10^{-pH} entgegengesetzt steigen u. fallen, ist für den Praktiker die Gefahr von Verwechslungen gegeben. Der Vf. schlägt deshalb vor, den $pH = 4,8$, den der alkal. isoelektr. Punkt der tier. Haut annimmt, in welchem das Minimum der Schwellkraft herrscht, als Nullpunkt festzusetzen u. durch Subtraktion der pH-Zahlen von diesem untersuchenden Fl. von 4,8 prakt. „Aciditäts-Potentiale“ zur Kennzeichnung zu gewinnen. So ergäbe sich $pH = 4,8$ als Aciditätspotential 0; 3,8 als -1,0; 1,8 als +3,0; 5,8 als -1,0; 9,8 als -5,0 usw. Auf der sauren Seite vor dem isoelektr. Punkt haben die Aciditäts-Potentiale positives, auf der alkal. negativwertiges Zeichen. Zu bedenken ist dabei, daß es sich um logarithm. Funktionen handelt.

Wachstum um jede Einheit in Wirklichkeit einen numer. 10fach größeren Betrag bedeutet. (Journ. Amer. Leather Chem. Assoc. **19**. 647—51. 1924.) GERNGROSS.

H. Gustavson, *Bemerkungen über den Ausdruck der Basizität von Chrom- u. Gerbstoffen*. Besprechung der vielen verschiedenen Ausdrucksformen für die Basizität und Acidität techn. Chrombrühen u. Hervorhebung der großen Vorteile, welche die Methode von SCHORLEMMER (Collegium **1920**. 536; C. **1921**. II. 467), bei der die Basizität in % des Cr, das mit OH-Gruppen verbunden ist, vom Cr-Gehalt ausgedrückt wird, vor allen anderen Verff. besitzt. Die bereits weit verbreitete Schorlemmersche Ausdrucksform sollte allgemein als offiziell eingeführt werden. (Journ. Amer. Leather Chem. Assoc. **19**. 574—78. 1924. Widen-Tanning Co., Danvers [Mass.]) GERNGROSS.

Stiasny, *Neuere Anschauungen über das Wesen der Chromgerbung*. Die Arbeit gibt einen Überblick über die wichtigsten Gerbtheorien seit Beginn chem. Gerbung u. verweilt bei den neueren Anschauungen, welche durch die Wrkg. von Valenzkräften das Zusammentreten von Gerbstoff u. tier. Haut bei der Gerbung erklären will. Neben dem Vorhandensein freier Nebenvaleizen muß aber auch eine genügende Molekülgröße oder eine genügend große Molekülagggregation im Gebiet semikolloider Verteilungen vorhanden sein, um lederbildende Eigenschaften hervorzurufen, da mit krystalloiden Stoffen keine richtige Gerbwirkung zu erzielen ist. Bei der Cr-Gerbung befriedigt die auf Ladungsausgleich beruhende Gerbtheorie von PROCTER u. WILSON nicht, da nach ihr nur anod. wandernde Cr-Komplexe gerbend sein sollten. Wie kataphorese. Verss. ergeben, ist die Wanderungsrichtung der Cr-Komplexe nicht ausschlaggebend für das Gerbverh. Es scheint vielmehr die Beständigkeit des Komplexes wichtiger zu sein als seine Ladungsart. Die Unters. einer Anzahl von 5 verschiedenen Typen wandernden Cr-Verbb., von denen nur ein Typ gerbt, dem außer den üblichen anod. wandernden Cr-Salzen das *Bromdiäthylendiamindisazo-chrombromid* angehört, führt zu folgender Anschauung: Ist das Cr in dem komplexen Salz mit Haupt- u. Nebenvaleizen vollkommen abgesättigt u. ist die Verb. außerdem stabil in wss. Lsg., so gerbt — ob anod. oder kathod. wanderndes Cr enthalten — keine Gerbwirkung. Ist aber der Cr-haltige Komplex unbeständig, tauscht er z. B. durch sein Stehen der wss. Lsg. Komplexreste gegen W. aus, oder bilden sich durch Dissoziation von H-Ionen neue Hydroxogruppen, so werden während dieser steten Neubildungen Nebenvaleizen wirksam, die sehr wohl die Adsorption durch die Gerbstoffe verursachen können. Kommt hierzu noch die Fähigkeit, durch Polymerisation Gerbstoffaggregate zu bilden, wie dies z. B. bei den Hydroxoverbb. (bas. Cr-Salzen) der Fall ist, so ist auch die zweite Forderung für die Gerbwirkung erfüllt, u. man kann mit einer gerbenden Cr-Verb. zu tun. (Ztschr. f. angew. Ch. **37**. 913—17. 1924. Darmstadt.)

GERNGROSS.

Kohn und E. Crede, *Acidität von vegetabilisch gegerbtem Leder*. (Vgl. STACY, *Begegnung der Kritik von PICKARD u. CAUNCE* (Journal Soc. Leather Chem. **8**. 156. [1924]) gegen die elektrom. Titrationsmethode der Verff. (Journ. Amer. Leather Chem. Assoc. **18**. 189; C. **1923**. IV. 269) unter Hinweis darauf, daß die Beobachtung des Anfangs-pH u. der Natur der Titrationskurve zwischen pH 2 und 4 die Hauptwichtigkeit zukomme. (Journ. Amer. Leather Chem. Assoc. **19**. 18. 1924. RÖHM u. HAAS Co. Philadelphia [Pa.]) GERNGROSS.

P. Veitch und T. D. Jarrell, *Feuchtigkeitsbestimmung im Leder*. Die Arbeit zeigt bis auf 20 Stdn. ausgedehnte Zeit-Feuchtigkeitskurven unter Verwendung vegetab. gegerbten Sohlen- u. Blankledern u. verschiedenen Trockenschrankapparaten aus denen hervorgeht, daß im Vakuumofen bei 105° u. im trockenen Luftbad bei 100° für alle Perioden der Trocknung die Feuchtigkeitszahlen höher als

unter Verwendung der anderen üblichen Trocknungsbedingungen ausfallen. (Journ. Amer. Leather Chem. Assoc. **19**. 568—71. 1924.) GERNGBERG

Aug. C. Orthmann, *Chromleder-Ergänzungs-Kommissionsbericht*. (Vgl. C. II. 143.) Mitteilung der von den Kommissionsmitgliedern erhaltenen Analyseergebnisse von BaSO₄-haltigen Chromlederaschen u. von Bestst. freier H₂SO₄-Leder nach der Methode von A. W. THOMAS (Hide and Leather **59**. 101; C. II. IV. 103). (Journ. Amer. Leather Chem. Assoc. **19**. 654—56. 1924.) GERNGBERG

C. E. Garland, *Die Gerbstoffe*. Zusammenfassender Vortrag über Gerbstoffe u. gegenwärtigen Stand unserer Kenntnisse der vegetab. Gerbstoffe. (Journ. Leather Chem. Assoc. **19**. 624—47. 1924.) GERNGBERG

H. van der Waerden, *Über das qualitative und quantitative Verhalten von unbehandeltem Quebracho, sulfitiertem Quebracho und Mischungen von Quebracho mit künstlichen Gerbstoffen und Zellstoffablaugen*. Untersucht werden fester, vollständig behandelte, ferner sulfitierte Quebracho-Auszug, Neradol D, ND, Gerbstoff Ordoval G, Zellstoffablaugen Saxonia, Hansa L u. Queol allein u. in Mischung mit Quebracho u. zwar auf Essigesterlöslichkeit, Gelatine-, Formaldehyd-, Schmelz-, ammonium-, Brom-, Anilin-, Ammonacetat-Alaunprobe u. Pentose-Best. Von den in Tabellen niedergelegten Ergebnissen ist hervorzuheben: Daß die Anilinsulfite nicht nur mit künstlichen Gerbstoffen u. Zellstoffablaugen, sondern auch mit sulfitierten Quebrachoauszügen positiv wird; die starke Erniedrigung der Essigesterlöslichkeit von Quebracho durch Sulfitieren u. Beimengen von künstlichen Gerbstoffen; das Auftreten einer Fällung mit Ammonacetat u. Alaun bei Neradol D, allerdings schwächer — bei Ordoval G. Die Verminderung des „Unlöslichen“ im gewöhnlichen Gerbstoffanalysengang nach der Schüttelmethode durch Beimengen von künstlichen Gerbstoffen u. Sulfitzellstoffablaugepräparaten zu Quebrachoauszügen beträchtlich. Paßt man jedoch die Verhältnisse durch Herst. einer konz. Lsgg. von sd. W. u. entsprechendes Verd. nach dem Erkalten mit k. W. oder durch Schütteln zentrifugieren der starken Lsgg. u. nachheriges Verd. der prakt. Verwendung Extrakte in den Gerbereien an, so ergibt sich, daß nur das Sulfitieren, nicht die Beimengung von künstlichen Gerbstoffen oder Zellstoffablaugen eine wesentliche lösende Wrkg. auf die Quebrachophlobaphene ausübt. (Collegium **5**. 345—53. 1924. Waalwyk [Holland].) GERNGBERG

R. W. Frey, *Einleitende Bemerkungen zum Kommissionsbericht über die Bestimmung des Zuckergehaltes im Leder*. (Vgl. Journ. Amer. Leather Chem. Assoc. **19**. 237. 339; C. **1924**. II. 907.) Die Kommission schlägt vor, anstatt der jetzt unzuverlässigen, bei der Amer. Leather Chem. Assoc. offiziellen Zuckerbestimmungsmethode im Leder die im Kommissionsber. angegebene anzunehmen. Es ist die gravimetrische Methode, deren wesentliche Änderung gegen die frühere in der Verwendung von K₂HPO₄ zur Entfernung von Pb u. von 7,5 ccm konz. HCl u. 5,0 ccm besteht. (Journ. Amer. Leather Chem. Assoc. **19**. 651—54. 1924.) GERNGBERG

Gaston Balland, Paris, *Verfahren zum Enthaaren von Fellen*. Man behandelt die Felle mit einer Lsg. eines vegetabil. Enzyms, des *Papains*. — Z. B. werden frische oder gepökelte Felle gründlich gewässert u. 36 Std. in einer Papainlösung von der Acidität 0,5% bei 85° behandelt. Nach dieser Zeit ist die Enthaarung vollständig. Man wäscht mit W. aus u. kann dann die Häute der Gerbung übergeben. Als Antisepticum kann dem Enthaarungsmittel NaF zugesetzt werden. Kleine Mengen von Salzen, wie Ca-Phosphat oder NaCl, beschleunigen den Vorgang. Das Verf. bietet den Vorteil, daß z. B. Schaffelle eine vollständig unversehrte Haut liefern. (F. P. **548606** vom 15/7. 1921, ausg. 19/1. 1923.) SCHOTTLÄNDER

Chemisches Zentralblatt.

25 Band I.

Nr. 8.

25. Februar.

A. Allgemeine und physikalische Chemie.

L. Clark, *Die Definition eines idealen Gases*. Es wird gezeigt, daß ein Gas durch zwei Bedingungen charakterisiert wird; sind diese erfüllt, so alle andern Kriterien auch erfüllt. 1. ein ideales Gas muß dem Gesetz von $pV = kT$ oder dem allgemeinen Gasgesetz $pV = RT$ gehorchen, doch dabei die absol. Temp. nicht thermodynam. definiert werden, sondern durch die tripletsche Temperaturskala (vgl. KAMERLINGH ONNES Comm. Phys. Lab. d. 97b [1907] 37. u. BERTHELOT Travaux et Memoires du Bureau International des Poids et Mesures XIII, [1907]). 2. der Ausdehnungskoeffizient eines idealen Gases ist unabhängig vom Vol. u. hat den Wert, der auch bei unbeschränkter Verdünnung jedes realen Gases erreicht wird. Daß ein so definiertes ideales Gas mit den sonst geforderten Gesetzen genügt, wird rechner. hergeleitet. (Proc. Trans. Roy. Soc. Canada [3] 18. Sekt. III. 293—311. 1924.)

JOSEPHY.

William Augustus Caspari, *Das System Natriumcarbonat-Natriumsulfat-Wasser*. Kryohydrat. Punkte, Isothermen u. festen Phasen des Systems $\text{Na}_2\text{CO}_3\text{-Na}_2\text{SO}_4\text{-W}$. untersucht. Für Na_2CO_3 liegt der kryohydrat. Punkt bei $-2,1^\circ$ u. einer Konz. von 5,75%, für das Gemisch von Na_2CO_3 u. Na_2SO_4 bei $-2,45^\circ$ u. 5,21% Na_2CO_3 u. 2,06% Na_2SO_4 . Die gesätt. Lsgg. haben bei Na_2CO_3 , 1 H_2O , Kp. $104,6^\circ$, Konz. 31,2% Na_2CO_3 , bei Na_2SO_4 Kp. $102,9^\circ$, D. 1,245, Konz. 29,6%. — Die feste Phase besteht aus den beiden Dekahydraten. Die Lsg. enthält im Gleichgewicht 3,2 Mol. Na_2CO_3 auf 1,5 Mol. Na_2SO_4 ; bei steigender Temp. ändert sich das Verhältnis. Es wurden Mischkrystalle der beiden Dekahydrate erhalten, die Maximalkonz. waren 7,3 Mol. Na_2CO_3 in 100 Na_2SO_4 u. 5,0 Na_2SO_4 in 100 Na_2CO_3 . Oberhalb des Übergangspunktes von $26,1^\circ$ existiert bis zum Kp. das Doppelsalz $\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot 2\text{Na}_2\text{SO}_4$; Krystalle von beträchtlicher Größe wurden durch langsames Verdunsten der Lsg. erhalten. Das Doppelsalz ist an trockener Luft beständig, zerfließt an feuchter Luft zu einer öligen Fl., aus der durch Impfen mit wässriger Na_2CO_3 -Lösung Krystall $\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$ oder $\text{Na}_2\text{SO}_4 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$ krystallisieren. Bei 67° ist das Doppelsalz in Kontakt mit seiner Lsg. beständig. Na_2CO_3 wird bei 67° (SCHULTEN, C. r. d. l'Acad. des sciences 123. 1325 [1896]) konnte nicht erhalten werden. Die Zus. der gesätt. Lsg. u. der festen Phase für 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100% Na_2CO_3 ist tabellar. zusammengestellt, das vollkommene System graph. dargestellt. (Journ. Chem. Soc. London 125. 2381—87. 1924. Widnes, United Alkali Co. Ltd.)

HERTER.

U. Sborgi und E. Bovalini, *Untersuchung der doppelten Umsetzung $(\text{NH}_4)_2\text{B}_4\text{O}_7 + \text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 + (\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ in wässriger Lösung*. V. Untersuchungen der doppelten Umsetzung bei der kryohydratischen Temperatur am Anfang des Intervalles des Doppelsalzes (IV. vgl. Gazz. chim. ital. 54. 322; C. 1924. II. 1550.) Der Anfang des Intervalles des Doppelsalzes liegt bei $-11,02^\circ$. Hier stellt sich das Gleichgewicht $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4 + \text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 \cdot 10\text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{Na}_2\text{SO}_4 \cdot (\text{NH}_4)_2\text{SO}_4 \cdot 4\text{H}_2\text{O} + (\text{NH}_4)_2\text{B}_4\text{O}_7 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$. Bei dieser Temp. wurde die Löslichkeit gemessen. (Gazz. chim. ital. 54. 919—33. 1924. Pisa, Univ.)

ZANDER.

U. Sborgi, E. Bovalini und M. Medici, *Untersuchung der doppelten Umsetzung $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 + \text{Na}_2\text{SO}_4 \rightleftharpoons \text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 + (\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ in wässriger Lösung*. VI. Untersuchung.

suchungen der Löslichkeit im Intervall des Doppelsalzes. (V. vgl. vorst. Ref.) Intervall des Doppelsalzes $\text{Na}_2\text{SO}_4 \cdot (\text{NH}_4)_2\text{SO}_4 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ reicht von $-11,02^\circ$ bis $+11,02^\circ$ in diesem Gebiet wurden eine Reihe von Isothermen in Abständen von ca. 5° untersucht; die Isothermen bei 26° u. 30° wurden durch Interpolation aus den polyt. Diagrammen konstruiert. (Gazz. chim. ital. **54**. 934—45. 1924. Pisa, Univ.) ZAN

U. Sborgi, Untersuchung der doppelten Umsetzung $(\text{NH}_4)_2\text{B}_4\text{O}_7 + \text{Na}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 + (\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ in wässriger Lösung. VII. Untersuchungen der Löslichkeit im Stabilitätsbereich des Paares Na_2SO_4 , $(\text{NH}_4)_2\text{B}_4\text{O}_7$. Mitarbeit von **E. Burci**. (VI. vgl. vorst. Ref.) Für den bei $38,7^\circ$ beginnenden Stabilitätsbereich des Paares Na_2SO_4 , $(\text{NH}_4)_2\text{B}_4\text{O}_7$ wurden eine Reihe von Isothermen untersucht. — VIII. Thermische Diagramme. Zusammenfassung der bisher erhaltenen Resultate. Man kann dieselben zur Herst. von Borax aus Ammoniumborat u. Na-Sulfat benutzen. Letzterem ist unter bestimmten Umständen vor dem NaCl der Vorzug zu geben. (Gazz. chim. ital. **54**. 946—64. 1924. Pisa, Univ.) ZAN

J. Czochralski, Zur Frage der Elastizität. Vf. bespricht die Veränderungen des Elastizitätsmodul einer Substanz unterworfen ist u. seine Abhängigkeit von der Vorgeschichte des Materials, so daß sich die elast. Konstanten in der Konstruktionstechnik nicht zu Materialkonstanten eignen. (Ztschr. f. Metallkunde **16**. 457—61. 1924. Frankfurt a. M.) BECH

A. Jouniaux, Über die Änderung des Molekulargewichtes von Natrium, Eisen und Tellur mit der Temperatur. Aus Messungen des F. von Legierungen von Natrium mit anderen Metallen folgert Vf., daß das Na-Mol. beim Kp. des Hg 1-atomig ist, bei $-38,9^\circ$ ist ein Gemenge von 1- u. 2-atomigen Moll. anzunehmen. Für Eisen liegen die Verhältnisse beim Kp.; bei $-39,6^\circ$ sind verschiedenatomige Moll. anzunehmen. Messungen beim Te zeigen, daß sein Mol. bei Temp. von ca. 1400° 2-atomig ist, im Gebiet des sd. Hg 1-atomig, um bei tieferen Temp. noch höheratomig zu werden. (Bull. Soc. Chim. de France [4] **35**. 1607—13. 1924. Lille.) ULM

Geoffrey Arthur Harrison, Eine Mitteilung über die Löslichkeit von Cetylseifen. Vf. macht Angaben über die Löslichkeit der Ca-Salze von Ölsäure, Palmitinsäure u. Stearinsäure in A., Ä., Chlf., Aceton, Bzl., Xylol, Lg. (Kp. 50 — 60°) bei verschiedenen Temp. u. über das Verh. dieser Salze beim Erhitzen. (Chemical Journ. **18**. 1222—23. 1924. Hosp. f. sick children.) SPIE

W. E. Garner, Heterogene Katalyse. Vf. bezieht sich auf die von **W. B. BLENCH** veröffentlichte Unters. über die Adsorptionswärmen von O_2 an Holzkohle (vgl. Journ. Chem. Soc. London **125**. 1288; C. **1924**. II. 1064) u. erörtert die Bedeutung der dort gewonnenen Resultate für die Theorie der heterogenen Katalyse. Aus der Veränderung des Wertes für die Adsorptionswärme der ersten, an Holzkohle adsorbierten O_2 -Mengen mit steigender Temp. schließt Vf. auf das Vorhandensein beträchtlicher Unterschiede des Gehalts an freier Energie zwischen den einzelnen C-Atomen an der Oberfläche der Kohle, was seinerseits wieder von großer Bedeutung für die Vorgänge bei der heterogenen Katalyse sein wird, bei denen vermutlich die Lage, Orientierung u. der Energiegehalt der Oberflächenatome eine entscheidende Rolle spielen werden. Die Folgerungen aus der Temperaturabhängigkeit der

Adsorptionswärmen u. der Verschiebung des Verhältnisses $\frac{\text{adsorbierter O}_2}{\text{z. CO- u. CO}_2\text{-B. verbraucht}}$

mit der Temperatur ergeben, daß die B. des Adsorptionskomplexes C_xO_y von einer größeren Wärmetönung als die CO_2 -B. begleitet ist u. daß die Valenzkräfte an der Oberfläche sitzenden C-Atome bei weitem nicht abgesättigt sind. Eine quantitative Best. der relativen Mengen der an der Oberfläche sitzenden C-Atome von verschiedenem Energiegehalt ist ohne weitere experimentelle Unterss. unausführbar. Im Gegensatz zu den Vorgängen zwischen O_2 u. Holzkohle werden bei der g

heterogenen Katalyse die besonders locker sitzenden Atome der Katalysator-
fläche nicht von derselben entfernt u. bilden vermutlich die Zentren der
Reaktionsbeschleunigung. (Nature **114**. 932. 1924. London, Univ.) FRANKENBURGER.
D. L. Chapman, J. E. Ramsbottom und C. G. Trotman, *Die Vereinigung von
Wasserstoff und Sauerstoff in Gegenwart von Silber und Gold*. Vff. untersuchen
die Reaktionen zwischen H_2 u. O_2 in Ggw. eines elektr. erhitzten Ag- bzw. Au-Drahtes
als Kontaksubstanz. Die Verss. werden nach sorgfältiger Reinigung der, nur mit
Kupferentleerten versehenen App. nach der stat. Methode ausgeführt; der Verlauf durch
Messungen verfolgt. Der H_2 wird aus Zn u. H_2SO_4 entwickelt, mit NaOH-Lsg.
waschen u. durch eine Pd-Röhre in die Apparatur geleitet; der O_2 wird durch
Zugabe von $KMnO_4$ bereit. Es zeigt sich, daß je nach der Vorbehandlung
Ag u. Au in verschiedenem Maße katalysieren; ihre „Aktivität“ wird durch die
Stärke des Heizstromes bestimmt, der ihnen zugeführt werden muß, damit sie im
gegebenen Fall den Eintritt der Vereinigung von H_2 mit O_2 mit meßbarer Ge-
schwindigkeit sich vollziehen lassen. Bei vorherigem Erhitzen in O_2 von einem
Druck $> 0,005$ mm Hg bedeckt sich Ag mit einem Oxydhäutchen, welches offen-
bar die katalyt. Fähigkeiten des Metalls bedeutend herabsetzt. Dieses Häutchen
wird sowohl durch Erhitzen des Metalls auf Rotglut im Vakuum als auch in O_2
bei noch geringerem Druck entfernt werden; sie ist dann ebenso groß als die nach
Erhitzen des Metalls in H_2 resultierende Aktivität. Dies entspricht der von BONE
u. HELLER festgestellten Tatsache (vgl. Philos. Transact. Roy. Soc. London [A]
241 [1906]), daß vorher in H_2 erhitztes Ag bedeutend aktiver als unbehandeltes
ist. Au verhält sich analog dem Ag; die Differenzen zwischen den Aktivitäten
sind bei ihm jedoch geringer. Beim Au ist die Oxydbildung, die beim vorherigen
Erhitzen in O_2 eintritt, deutlich an Schwarzfärbung zu erkennen; diese bleibt auch
nach der Vereinigung von H_2 u. O_2 mit Au als Katalysator bestehen. In Ggw.
des Ag-Häutchens, das auf der inneren Glaswand durch Sublimation entstanden
ist, vereinigen sich O_2 u. H_2 bereits bei Zimmertemp. (Proc. Royal Soc. London
Ser. A. **107**. 92—100. Oxford.) FRANKENBURGER.

A₁. Atomstruktur. Radiochemie. Photochemie.

H. Beckenkamp, *Die Feinstruktur des freien Benzolmoleküls*. Im Gegensatz
zu seiner früheren Auffassung (vgl. Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. **137**. 249; C. **1924**.
131) geht Vf. von der Voraussetzung aus, daß die Flächen des Benzolkrystals
nicht abgeleitete Form der Graphitgrundform darstellen, sondern daß diese Flächen
eigene Grundform bilden, die allerdings mit der des Graphits in sehr naher
Übereinstimmung steht. In einem freien chem. Mol. muß die Lage der Valenzelektronen
den Gesetzen der gegenseitigen Abstoßung dieser Elektronen folgen u. sich der
Symmetrie der Anordnung der Atomschwerpunkte möglichst anpassen. Das Mol.
müßte elektr. neutral u. magnet. astat. sein. Als primäre Bausteine der Krystalle
müßte die elektr. neutrale Fläche der Wirkungsfelder des positiven Atomkerns einer-
seits u. der inneren u. mittleren Elektronen andererseits betrachtet. Das H-Atom
hängt mit seinem Elektron senkrecht zur Hauptachse. Zur Erfüllung der ditrigonal-
bipyramidalen Symmetrie des Benzolkerns müssen dann die H-Atome in die
Ebene zur Hauptachse senkrechte Medianebene des Mol. fallen. Nur die Schwer-
punkte der C-Atome bilden in diesem Falle einen räumlichen Ring, während die
H-Atome einen ebenen Ring bilden. Es kommt also in erster Linie die richtende
Einwirkung der Elektronen zur Geltung. Nach demselben Grundsatz erfolgt die Ver-
teilung der 30 Valenzelektronen des Benzolmol. Bezeichnet man das Achsen-
verhältnis des Graphits in rhomb. Deutung als $a:b:c$, dann wird das des Benzol-
mol. als $a:2b:\frac{2}{3}c$. — Beim Diamanten gibt es drei verschiedene Arten von Zwillings-
kristallen. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. **139**. 220—32. Würzburg, Univ.) ZANDER.

B. Bruce Lindsay, *Die Quantenzahlen der Bohrschen Bahnen in den Atomen*. Vf. bezieht sich auf eine Arbeit von TURNER (Philos. Magazine [6] 384; C. 1924. II. 2733), in welcher eine von der Bohrschen Auffassung abweichende Zuordnung von Quantenzahlen zu den äußersten Elektronenbahnen der schweren Alkalimetallatome (Rb u. Cs) vorgeschlagen wird; zur Begründung dieser Änderung nimmt TURNER das Bestehen einer linearen Beziehung zwischen der Ordnung u. dem Quantendefekt (Differenz: Hauptquantenzahl — effekt. Quantenzahl) einzelnen Elemente an. Vf. stellt fest, daß unter Voraussetzung konstanter Beiträge der inneren Elektronen die Turnersche Auffassung zu unrichtigen Werten für effektiven Quantenzahlen führt; er findet weiterhin, daß die Berechnung der Dissoziationen der äußersten Bahnen in den ionisierten Alkaliatomen (nach BOHR) ergibt, daß diese der von GRIMM gefundenen Beziehung $R_K - R_{Na} > R_{Cs} - R_{Rb} > R_{Rb} - R_{K}$ gehorchen (vgl. Ztschr. f. physik. Ch. 98. 353; C. 1921. III. 1493); auch die relativen Quantenzahlen ordnen sich in diese fundamentale Regel ein. Vf. hält die Turnersche Auffassung für unzutreffend. (Science 60. 475—76. 1924. Univ.)

FRANKENBURG

Hawksworth Collins, *Die Struktur des Chroms*. Auf Grund der relativen Voll. u. der Bildungswärmen seiner Verbb. wird dem Cr die atomare Zus. Mg₂ beschrieben. (Chem. News 129. 331—34. 1924.)

HERT

J. E. Jones, *Die Bestimmung des molekularen Feldes*. III. Aus Krystallmessungen und der kinetischen Theorie. (II. vgl. Proc. Royal Soc. London, Serie A 106. 463; C. 1924. II. 2731.) Es wird eine mathemat. Ableitung zur Berechnung der potentiellen Energie eines kub. Krystalles gegeben u. die Rechnung auf CaS durchgeführt. Weiter werden die Atomabstände in diesen beiden Krystallen sowie im Ar berechnet. Sie zeigen mit den röntgenograph. gemessenen ein sehr reichend gute Übereinstimmung. (Proc. Royal Soc. London, Serie A 106. 704—705. 1924. Cambridge.)

BECK

J. R. Katz, *Die Bedeutung der Röntgenspektrographie für die Quellungsprozesse*. Vf. gibt an Hand seiner früheren Verss. (Physikal. Ztschr. 25. 321. 431; C. 1924. II. 1447. 2321) eine Zusammenfassung der Ergebnisse u. Vieldeutigkeiten der Röntgenspektroskop. Unters. quellbarer Krystalle. Insbesondere stellt er zur Diskussion, ob die Röntgenstrahlinterferenzen an hochmolekularen Körpern, wie Cellulose, Seide, Stärke nicht intramolekulare Ursachen haben könnten, u. von assoziierten Molekülkomplexen herrühren. (Physikal. Ztschr. 25. 659—66. 1924. Amsterdam.)

BECK

W. M. Lehmann, *Röntgenographische Untersuchungen an natürlichem u. synthetischem Metacinnabarit (HgS)*. Vf. unterzieht Metacinnabarit u. gelbes schwarzes HgS einer eingehenden Unters. nach dem Laue- u. Debye-Scherrer-Verf. Beide geben ident. Röntgenogramme. Sie gehören dem Zinkblendetypus der Raumgruppe T_d^2 , Gitterkonstante $a = 5,846 \text{ \AA}$, D._{ber.} 7,639. (Ztschr. f. Kristallphys. 60. 379—413. 1924. Hamburg.)

BECK

Irving Langmuir und **K. H. Kingdon**, *Die von Dämpfen der Alkalimetalle bewirkten Thermioneneffekte*. Vf. knüpft an frühere Unterss. an (Physical Review 21. 380 [1925]), denen zufolge ein über 1200° absol. erhitzter Wolframfaden auf ihn treffenden Cs-Atome eines gesätt. Cs-Dampfes ionisiert, was darauf zurückzuführen ist, daß die Elektronenaffinität des W (4,53 Volt) größer ist als die des Cs (3,88 Volt). Wird das Kontaktpotential des W durch Bedeckung mit einer monoatomaren Schicht von Th auf 2,69 erniedrigt, so wird auch die Erzeugung positiver Ionen verschwindend klein. Bei Temp. unter 1200° absol. bleiben gebildeten Cs-Ionen infolge der elektr. „Bildkraft“ an der Oberfläche des W adsorbiert, wodurch dessen Kontaktpotential erniedrigt wird und die Fähigkeit zur Ionisierung auftretender Cs-Atome verschwindet. Umgekehrt hat diese Erniedrigung

Elektronenaffinität ein starkes Anwachsen der Elektronenemission mit abnehmender Temp. zur Folge, bis bei noch tieferen Temp. auch diese gemäß der Saha-Gleichung abnimmt. Bei Erhitzen eines W-Fadens in O_2 von niedrigem Druck wird seine Oberfläche von einer monoatomaren Schicht von O-Ionen bedeckt, welche bis zu Temp. unter 1600° absol. adsorbiert bleiben u. die Elektronenaffinität der Oberfläche auf 9,2 Volt erhöhen; an solchen Oberflächen vermögen Cu-Atome ionisiert zu werden. Die gebildeten Cs-Ionen werden von einer bedeckten W-Fläche so fest adsorbiert, daß die Elektronenemission den sehr hohen Wert von $0,35 \text{ Amp./cm}^2$ erreicht. Vff. unterziehen diese Vorgänge thermodynamischen Betrachtungen, unter Zugrundelegung der Sahaschen Gleichung für Gleichgewichte zwischen Atomen, Ionen u. Elektronen; sie folgern daraus, daß zwischen einem Glühfaden im Dampf eines Alkalimetalls stattfindenden Emission von positiven Ionen u. von Elektronen gesetzmäßige Beziehungen bestehen müssen. Bei hohen Temp. des Glühfadens u. niedrigen Drucken des Alkalimetalldampfes ist die Elektronenemission dieselbe wie in Abwesenheit des Dampfes; auf Grund dieser Tatsache kann der Betrag der Emission positiver Ionen an verschiedenen Stellen innerhalb verschiedener Dämpfe berechnet werden. Verss. mit Cs- u. anderen Metaldämpfen sowie mit reinen, mit O_2 u. Th bedeckten Fäden geben Werte, die gut mit der theoret. Berechnung decken. Messungen der Emission von Elektronen u. positiven Ionen in Cs-Dampf geben Werte für die therm. Ionisierungswärme bei 1200° absol., welche vorzüglich mit den aus der Sahaschen Gleichung berechneten übereinstimmen. Bei hohen Temp. des Glühfadens erreicht die Emission an positiven Ionen einen Grenzwert, der durch die Häufigkeit bestimmt ist, mit der Atome des Metalldampfes auf die Oberfläche des Glühfadens auftreffen. Wenn diese sämtlichen Atome in Ionen verwandelt werden, lassen sich aus den Messungen der Ionisierungsströme die Dampfdrucke des Cs berechnen, welche sich durch die Formel $\log p = 10,65 - 3992/T$ (Druck in bar.) darstellen lassen. Bei niedrigeren Temp. des Glühfadens bewirkt die elektr. Bildkraft die Bedeckung der Oberfläche mit einer Schicht adsorbierter Cs-Ionen, welche in dem darunterliegenden Metall gemeinsame Elektronen besitzen. Die entstehende Doppelschicht bewirkt eine Erhöhung der Elektronenemission u. eine entsprechende Abnahme der Emission positiver Ionen. Vff. entwickeln eine Theorie der Adsorptionsschichten“ ($\delta < 0,2$), die Zustandsgleichung für dieselben ableiten und sie mit der der idealen Gase. In konzentrierteren Schichten ziehen Anziehungskräfte die Ionen einander näher u. verursachen bisweilen die Entstehung verschiedener zweidimensionaler Phasen. Die Verdampfungswärme für die auf der Oberfläche adsorbierten Cs-Atome beträgt 4 Volt für verdünnte u. 4,3 Volt für konzentrierte Schichten; die Verdampfungswärme der auf einer, mit einer monatomaren Schicht von O_2 bedeckten W-Oberfläche adsorbierten Cs-Atome beträgt 10,2 Volt. (Proc. Royal Soc. London Serie A **107**. 61—79. Schenectady, Gener. Electr.

FRANKENBURGER.

D. Smyth, *Die Anwendung der Kanalstrahlenanalyse auf Ionisierungsversuche*. Nach histor. Überblick behandelt Vf. die experimentelle Lösung des Problems, durch Verknüpfung der Methode der Ionisierung eines Gases durch Elektronenstoß mit einer Best. des e/m der erzeugten Ionen im magnet. Feld (Kanalstrahlenanalyse) exakten Aufschluß über die Natur der, besonders aus mehratomigen Gasen durch Elektronenstoß geschaffenen Ionen zu erhalten. Im Prinzip besteht eine Versuchsanordnung aus einem elektronenemittierenden Glühdraht, einem durch ein beschleunigendes Feld u. einer darauffolgenden Anordnung elektr. Felder durch welche die Elektronen wieder zur Umkehr gezwungen, die gebildeten Ionen dagegen mit definierter Geschwindigkeit weiterbewegt werden, um dann beim Durchgang quer zu den Kraftlinien eines magnet. Feldes entsprechend ihrem e/m

in einer mehr oder minder gekrümmten Bahn zur Auffangplatte eines Elektrometers zu gelangen. Eine Hauptschwierigkeit liegt darin, daß die Konzentration des zu ionisierenden Dampfes bzw. Gases in der Ionisierungskammer nicht gering sein soll, damit eine genügende Anzahl von Ionen entsteht, andererseits den Partien des App., durch welche das erzeugte Ion sich weiterbewegt, möglichst klein sein soll, um Komplikationen infolge von Sekundärreaktionen zwischen primär gebildeten Ionen möglichst zu vermeiden. Vf. erzielt dies bei Metalldämpfen dadurch, daß er sie in feinem Strahl quer durch den Ionisierungsraum treten läßt, bei Gasen durch Aufrechterhaltung einer Druckdifferenz mittels Einschalten eines feinen Schlitzes zwischen Ionisierungsraum u. anschließender Apparatur u. entsprechender Regulierung des Abpumpens. (Nähere Beschreibung der App. Proc. Royal Soc. London Serie A **105**. 116; C. **1924**. I. 2857). Der Verlauf am Auffangelektrometer gemessenen Stromes bei Veränderung der die Ionen beschleunigenden Feldstärke unter Festhaltung der Feldstärke des Magneten bei umgekehrter Variierung läßt die den e/m der unter diesen Bedingungen gebildeten Ionen entsprechenden Maxima erkennen; die unter Berücksichtigung der Lage des Entstehungsortes der Ionen u. möglicher Sekundärreaktionen zwischen denselben sich ergebenden rechner. Abweichungen werden diskutiert. Die Verss. ergeben: Minimalpotential für die B. von Hg^+ 10,4 Volt, für Hg^{++} 19 ± 2 Volt. Die Potentiale für die B. von N_2^+ , N^{++} , N^+ sowie O_2^+ , O^{++} u. O^+ liegen bei $24,1 \pm 1$, $27,7 \pm 0,8$ sowie $15,5$, $22,5 \pm 0,6$ u. $23,0 \pm 0,3$ Volt. Auffallend ist, daß die krit. Potentiale für die doppeltgeladenen Atomionen niedriger als die für die einfach geladenen Atomionen liegen. Beim H_2 liegt das zur B. von Atomionen benötigte Potential etwa um 4,2 Volt höher als das bekannte Ionisierungspotential von 16,5 Volt, bei welchem entgegen der üblichen Ansicht H_2^+ Ionen entstehen; die Dissoziation dieser H_2^+ -Ionen in $\text{H} + \text{H}^+$ ist kein primärer, sondern ein sekundärer Effekt, der bei gegenseitigen Zusammenstößen der H_2^+ -Ionen eintritt; bei höheren Drucken angestellte Verss. beweisen dies. Daneben entstehen — ebenfalls infolge von Sekundärreaktionen — auch noch H_3^+ -Ionen. Eine quantitative Betrachtung der gewonnenen Resultate zeigt, daß die für den Elektronenstoß benötigten Energiewerte mit thermochem. Größen, wie z. B. den Dissoziationswärmen, keinen einfachen Zusammenhang zu bringen sind. (Journ. Franklin Inst. **9**. 795—811. 1924.)

FRANKENBURG.

H. T. Pye, *Die optische Projektion der Spuren der α -Teilchen*. Vf. beschreibt eine opt. Apparatur, welche es ermöglicht, die Spuren von α -Teilchen, wie es bei der von WILSON angegebenen Weise zur Entstehung komme, durch Projektion deutlich sichtbar zu machen. (Journ. Franklin Inst. **198**. 813—16. 1924.) FRANKENBURG.

D. Yovanovitch und **J. d'Espine**, *Über das magnetische Spektrum des β -Strahlen großer Geschwindigkeit des Mesothor 2*. — Mit Hilfe eines sehr stark magnetisierten Präparates u. einer noch verbesserten Versuchsanordnung (bis auf $1/10000$ gleichmäßiges Magnetfeld) ist es den Vff. gelungen, die bereits in einer früheren Arbeit (C. r. d. l'Acad. des sciences **178**. 1811; C. **1924**. II. 1311) erwähnten außerordentlich geschwinden β -Strahlen einwandfrei nachzuweisen, u. zwar fanden sie 2 schwache Linien von $\beta = 0,998 \pm 0,0005$ u. $\beta = 0,986 \pm 0,001$, entsprechenden Energien von $7,55 \cdot 10^6$ bzw. $2,6 \cdot 10^6$ Volt. (C. r. d. l'Acad. des sciences **11**. 1162—63. 1924.)

PHILIPPE.

A. Ellett, *Polarisation der Resonanzstrahlung in magnetischen Feldern*. Vf. behandelt die Beeinflussung, welche Größe u. Richtung der in Metaldämpfen erzeugten Resonanzstrahlung durch das Anlegen magnet. Felder erleiden. Die Ergebnisse erlauben gewisse Rückschlüsse auf die Bewegung u. den Absorptionsemissionsmechanismus der strahlenden Atome. Ferner wird gezeigt, daß nicht alle bestimmten Spektrallinien (z. B. die D_2 , nicht die D_1 Linie des Na) eine polarisierte

Resonanzstrahlung anregen. (Nature **114**. 931—32. 1924. Washington, Bureau of Standards.) FRANKENBURGER.

A. Fowler, *Die Struktur des Spektrums des ionisierten Stickstoffs*. Vf. stellt Messungen des sekundären Linienspektrums des N_2 an, welches dem einfach ionisierten N-Atom (N^+ oder N II) zuzuschreiben ist. Im Bereich von λ 6650—2200 Å werden 52 Linien in Beziehung zu den Termen der zugrundeliegenden Serie gebracht. Alle identifizierten Terme gehören Singlett- oder Triplett-Systemen an; sie kombinieren sich untereinander gemäß dem Auswahlprinzip, wie es auch in anderen Spektren, welche die p'- u. d'-Terme enthalten, in Erscheinung tritt. Vf. ergibt in erster Annäherung dem 2p-Term den Wert 70000 zu. Der höchste zuzuweisende Term ist ein p-Term; dies spricht dafür, daß das Serienelektron im einfach ionisierten N-Atom normalerweise auf einer 2_s -Bahn sich befindet, so daß das N^+ -Ion 2 Elektronen auf 1_s -Bahnen, 2 auf 2_s -Bahnen u. 2 auf 2_p -Bahnen enthält. Gemäß dem spektroskop. Verschiebungssatz ist dies auch die vermutliche Anordnung der Elektronen im neutralen C-Atom, dessen Spektrum noch nicht in Einzelteile aufgelöst zu werden vermochte. 3 Liniengruppen, welche auf einen der Terme schließen lassen, zeigen starke Verschiebungen ($> 0,5$ Å) nach Rot hin bei relativ hohen Drucken in Entladungsröhren. (Proc. Royal Soc. London Serie A **103**. 31—42. South Kensington.) FRANKENBURGER.

Percy Lowe und **D. C. Rose**, *Intensitäten im Argonspektrum*. (Vgl. HUGHES, LOWE, Proc. Trans. Roy. Soc. Canada [3] **17**. Sekt. III. 197; C. **1924**. I. 1004.) Vf. untersuchen die Intensitätsverteilung im Ar-Spektrum als Funktion der Energie des Elektronenstoßes zwischen 20 u. 140 V. Der Elektronenstrom wurde auf 10 Milliamp. konstant gehalten, der Druck auf 0,0173 mm Hg. Die in diesen Vers. erhaltene Entladung ist durchaus verschieden von der Ar-Entladung im gewöhnlichen Geißlerrohr. Auch die Intensitätsverteilung ist völlig anders. Im Argon-Spektrum wurden 51 Linien gemessen. Eine Einteilung entsprechend dem gewöhnlichen roten u. blauen Spektrum macht sich deutlich bemerkbar, die Linien des roten Teils sind bei niedriger Spannung stärker, die des blauen erscheinen nur schwach unterhalb von 40 V u. erreichen dann schnell die volle Intensität, eine Ausnahme macht nur die Linie λ 4868. Das rote Spektrum wird in 2 Gruppen eingeteilt, die Linien der einen besitzen ein Intensitätsmaximum, die der andern nicht. Intensiveren Linien des blauen Spektrums erscheinen zuerst bei 39 V, schwächere bei 4 oder 5 V höher. Zwischen 40 u. 60 V nimmt die Intensität aller dieser Linien schnell zu u. erreicht bei 65 V ein Maximum. Nach ihrem Verh. oberhalb dieser Spannung zerfallen die Linien wieder in 2 Gruppen, in solche, deren Intensität ein 2. Maximum annimmt, u. solche bei denen das nicht der Fall ist. Die Serienbeziehungen wurden nicht gefunden. (Proc. Trans. Roy. Soc. Canada **1924**. Sekt. III. 313—23. 1924. Kingston, Queens Univ.) JOSEPHY.

Mollie Weinberg, *Die Funkenspektren des Indiums und Galliums im Bereich des äußersten Ultraviolett*. Vf. mißt die Funkenspektren des In u. Ga im äußersten Ultraviolett. Das Spektrum wird innerhalb eines Quarzkölbchens erzeugt, u. zwar durch ein Stäbchen aus In bzw. kleine, auf Al-Stäbchen ruhende Quarzbecher mit Ga (bei F. von $30,2^\circ$ C) die untere Elektrode, zugespitzte Al-Stäbchen die obere, beide Elektroden sind mittels Druckschläuchen gasdicht, jedoch verschieblich angebracht; der Abstand beträgt 2—3 mm. Das Licht fällt durch ein Quarzfenster in einen Eber-Quarz-Prismenspektrographen. Funkenspannung in einem Induktorium mit 1 Volt u. 4—6 Amp. Primärstrom erzeugt. Während des Funkens werden die Teile des Kölbchens u. das Quarzfenster durch kalte Preßluft gekühlt. Die Entladung geht in H_2 von Atmosphärendruck vor sich. Die Aufnahmen werden auf Schumannplatten gemacht. Vf. gibt eine tabellar. Zusammenstellung der gemessenen Linien; es werden 107 Linien des In, darunter einige sehr schwache im

Bereich von 1855—2337 Å u. etwas weniger Linien des Ga zwischen 18 2364 Å aufgezählt; im extremen Ultraviolett zeigen beide Elemente eine große von Linien, manche Platten zeigen 1000—1500 derselben. Nach Berücksichtigung der Verunreinigungen lassen sich 828 Linien des Ga im Bereich von 157—200 Å u. 464 des In im Bereich von 161—2082 Å identifizieren. Auf einer Platte zeigten sich Linien des Ga, welche bis $\lambda = 126$ ins äußerste Ultraviolett hineinreichten. (Proc. Royal Soc. London Serie A **107**. 138—56. Toronto.) FRANKENBURG

A. G. Shenstone, *Niederspannungs-Bogenspektren des Kupfers*. (Vgl. N. **114**. 501; C. **1924**. II. 2450.) Vf. beobachtet die Linienabsorption des n. Dampfes u. zählt 7 mit Sicherheit, 3 mit etwas geringerer Sicherheit gemeinliche Absorptionslinien auf. Die Linien ordnen sich gut in das Serienschema des Cu ein. (Nature **114**. 934. 1924. Toronto, Univ. [Canada].) FRANKENBURG

Karl Przibram, *Zur Verfärbung und Luminescenz durch Becquerelstrahlung*. (Vgl. Sitzungsber. Akad. Wiss. Wien **131**. Abt. II a. 449, **132**. Abt. II a. 45, C. **1924**. I. 620. 1479. II. 588.) Mit Becquerelstrahlen vorbehandelter Zn leuchtet bei neuerlicher γ -Bestrahlung stärker nach als nicht vorbestrahlter. (Vf. Verss. mit **Kara-Michailova**.) Vf. verfolgt nicht nur den Abfall der Luminescenz sondern hauptsächlich den Anstieg der Helligkeit mit der Bestrahlungsdauer frischen u. vorbestrahlten Stücken. Die photometr. Messungen sind durch Diagramme wiedergegeben. Ähnliches Verh. zeigten *Fluorit* u. eine *Zinksulfid*-Varietät. Außer dieser länger dauernden, einer Phosphorescenz ähnelnden Radioluminescenz tritt an einigen engl. Fluoriten auch eine momentane Radioluminescenz vom Charakter einer Fluorescenz auf. Einen ähnlichen Fall fand man an einer Gruppe von *Steinsalzkrystallen*, welche aus Staßfurt stammten. — Der innige Zusammenhang zwischen Verfärbung u. Luminescenz besteht, ist von (Messungen von **Bélár**) auch am Steinsalz von Wieliczka nachgewiesen worden. Messungen der Änderung der Absorption bei β - γ -Bestrahlung im nahen Ultraviolett zeigen bei Steinsalz, daß das Maximum der Absorption im Violett liegt, daß im Ultraviolett dieselbe rapid abnimmt. Bei *Kalkspat* liegt das Maximum der Absorption im Ultraviolett. — Während der β - γ -Bestrahlung zeigt Steinsalz (Wieliczka) im höchsten Grade die Ermüdungserscheinungen, die Luminescenzhelligkeit fällt rasch ab. Durch Erhitzen wird der Anfangszustand des Salzes hergestellt u. es leuchtet bei neuer Bestrahlung wieder hell auf. Vf. weist nach, daß diese Luminescenzfähigkeit, wenigstens teilweise, aber auch schon von selbst regeneriert. Erklärungen ließen sich letztere Tatsachen vielleicht durch Konfigurationserscheinungen innerhalb des Krystallgitters. (Physikal. Ztschr. **25**. 640—43. 1924. Wien.) ULMANN

W. W. Coblenz und **C. W. Hughes**, *Das ultraviolette Reflexionsvermögen einiger Metalle und Sulfide*. Vff. untersuchen einige Substanzen, welche eine glänzende Oberflächenglanz haben, auf ihr Reflexionsvermögen für ultraviolettes Licht. Die Versuchsanordnung besteht aus einer Quarzquecksilberlampe, einem Quarzspektrographen u. einer Vakuum-Thermosäule; die Messungen werden bis zu Wellenlängen von 240 μ im Ultraviolett ausgeführt. Während die Metalle ein relativ geringes Reflexionsvermögen für ultraviolette u. sichtbare, ein hohes u. gleichmäßiges steigendes für ultrarote Strahlung aufweisen (vgl. z. B. HAGEN u. RUBENS, Ann. der Physik **8**. 1. [1902]) zeigen die untersuchten, metall. glänzenden mineralischen *Bleiglanz* PbS, *Molybdänglanz* MoS₂, *Pyrit* FeS₂ u. *Antimonglanz* Sb₂S₃ ein Maximum ihres Reflexionsvermögens im Ultraviolett u. einen Abfall desselben in den sichtbaren u. infraroten Spektrum zu erheblich geringeren Werten. Das selbige Reflexionsmaximum des PbS, FeS₂ u. Sb₂S₃ liegt im Bereich von 310—320 μ . MoS₂ besitzt 4 Maxima je bei 260, 450, 610 u. 690 μ . Die Legierungen *Magnesium* u. *Duraluminium* zeigen den typ. Verlauf der Reflexionskurve der Metalle. Das Reflexionsvermögen des Duraluminiums im Ultraviolett ist geringer als das

aliums. Graphit wird als natürl. sibir. Mineral untersucht; er zeigt ein Reflexionsmaximum bei $260\ \mu\mu$ im Ultraviolett, einen ziemlich gleichenden Wert im sichtbaren Gebiet u. einen jähen Anstieg mit zunehmender Wellenlänge im Infrarot. Vff. weisen auf die durch ultraviolette Bestrahlung bedingte Aufrauung spiegelnder Oberflächen der Metalle u. Sulfide hin. (Scientific Papers of the Bureau of Standards 1924. Nr. 493. 9 Seiten. Washington Sep. FBBU.)

Ernst Batscha, Über die Phosphoreszenzfähigkeit des Fluoresceins. Phosphoreszenzeffekte am Fluorescein (vgl. TIEDE u. WULFF, Ber. Dtsch. Chem. Ges. 55. 1922. I. 731) können auch durch Einbetten in Wein- oder Citronensäure hervorgerufen werden. Die Färbung ist bei der ersten grünlichblau, bei der zweiten gelblich; ihre Intensität klingt in beiden Fällen rasch ab u. ist nach etwa 1 Sek. verschwunden. Das Verh. der Phosphore in bezug auf die Temp. ist verschieden; während das Weinsäurepräparat schon bei Zimmertemp. nachleuchtet, muß das Citronensäurepräparat erst auf -12° abgekühlt werden, um einen lebhaften Phosphoreszenzeffekt zu ergeben. Mitbedingend für den letzteren ist demnach der Härtegrad des Einbettungsmittels u. damit das Tempo der Molekularbewegung. In chem. indifferenten Einbettungsmitteln (Traubenzucker) wurde nur ein geringes Nachleuchten beobachtet; durch Zusatz von sauer reagierenden Substanzen, wie Salicylsäure, saurem K-Oxalat, Na-Hydrosulfat, zur ursprünglichen Lösung ließ sich die Phosphoreszenz aktivieren. Daraus kann gefolgert werden, daß zwischen dem Fluorescein u. dem Einbettungsmittel eine Wechselwrkg. besteht, die die Phosphoreszenzerscheinung verursacht. Auch Weinsäure u. Traubenzucker zeigen geringe Phosphoreszenz, die auch bei steigender Temp. abnimmt, sodaß auf die Fluoresceinphosphore keinen Einfluß hat. Es ist wahrscheinlich, daß diese Phosphoreszenzerscheinungen trotz der Reinheit der angewandten Präparate durch geringe Verunreinigungen verursacht sind. — Bei Zusatz von alkalischen Substanzen zu der Traubenzuckerschmelze war keine Änderung des Phosphoreszenzeffektes zu beobachten, eher jedoch eine Abschwächung als Verstärkung. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58. 187—93. Olmütz.)

ZANDER.

A₂. Elektrochemie. Thermochemie.

F. Foerster, Die Elektrolyse von Hypochloritlösung. Die Arbeit bietet eine umfassende Unters. der anod. Vorgänge bei der Elektrolyse von Hypochloritlsgg. mit besonderer Berücksichtigung der B. von Chlorat. Es wird gezeigt, daß die anod. Rkk. ausschließlich vom Anodenpotential abhängen, das seinerseits durch die Alkalität bzw. Acidität der Lsg. reguliert werden kann. — Die einzelnen Rk. sind: a) Entladung von OH' unter B. von O_2 -Gas, b) elektrol. Oxydation von ClO' zu ClO_3' (primäre Chloratbildung), c) Entladung von ClO' unter B. von O_2 u. Cl' (anod. Chloratbildung), d) Entladung von Cl' zu Cl_2 -Gas, e) B. von ClO_3' unter rein chem. Einw. von HClO auf ClO' im Elektrolyten (sekundäre Chloratbildung). Bei hoher $[\text{OH}']$ tritt zunächst beim niedrigsten Potential nur a) auf, wird bei weiterer O-Polarisation das Potential höher, so kommt b) u. schließlich c) dazu, so daß b) mehr u. mehr unterdrückt wird. In saurer Lsg. ist nur c) nachweisbar, während bei Zwischenstufen, am besten in einer anfänglich schwach sauren Lsg. auch e) stattfindet. Techn. am günstigsten arbeitet man, wenn e) stark auftritt, am besten durch Elektrolyse von h. konz. Alkalichloridlsg. unter Zusatz von wenig HCl u. einer geringen Menge Bichromat zur Depolarisation des kathod. H₂. Verss. an Alkalichlorid gaben die nach den obigen Angaben zu erwartenden Resultate. Die Vorgänge bei der Elektrolyse von KBr sind qualitativ ähnlich, doch verläuft die e) entsprechende Rk. mit ca. 100mal größerer Geschwindigkeit. (Trans. Amer. Electr. Soc. 46. 28 Seiten. 1924. Dresden, Techn. Hochsch.)

HERTER.

H. E. Haring, *Niederschlagskraft, Kathodenpotentiale und Wirksamkeit der Nickelabscheidung.* (Vgl. HARING u. BLUM, Trans. Amer. Electr. Soc. **44**, C. **1924**, II. 1159.) Die Niederschlagskraft (NK.) in Lsgg. von NiSO_4 u. NiCl_2 Ggw. oder Abwesenheit von Zusätzen wurde in der l. c. angegebenen Weise untersucht. Den größten Einfluß auf die NK. hat die Wirksamkeit der Kathode, bestimmt ist durch die Gleichgewichtspotentiale von Ni^{++} u. H^+ in der Lsg., deren „effektive“ Konz. in der Kathodenschicht u. durch die Überspannung H an der Kathode. Die NK. wird verbessert durch Vergrößerung des Verhältnisses $\text{Ni}^{++}:\text{H}^+$ in der Kathodenschicht. Mittel dazu sind; hohe Konz. der Lsg. an Ni^{++} , geringe Acidität, Ggw. von Chlorid in der Lsg., mäßige Pufferung der Lsg., verhaft mit H_3BO_3 , niedrige Temp., Rühren der Lsg. in der Nähe derjenigen Kathodenstellen, die die höchste Stromdichte aufweisen. Die NK. nähert sich dem Wert 0 bei Steigerung der Stromdichte, gleichviel ob sie vorher $+$ oder $-$ sie nimmt ab bei Zusatz von Oxydationsmitteln. Ggw. von Verunreinigungen bei langsamem Arbeiten nachteiliger auf die NK. als bei schneller Elektrolyse. (Trans. Amer. Electr. Soc. **46**, 23 Seiten. 1924. Washington, Bureau of Standards. Sep.)

HERT

Ludwig Ebert, *Über die Dissoziationskonstanten zweibasischer Carbonsäuren und das Normalpotential der Chinhydronelektrode in absolutem Methylalkohol.* Im Wechsel des Lösungsm. kann man die Brauchbarkeit der Theorie von BJERRUM über die Dissoziationskonstanten der zweibas. Säuren (vgl. Ztschr. f. physik. Chem. **220**; C. **1923**, III. 1589) u. die aus den für W. geltenden Dissoziationskonstanten abgeleiteten Werte der mol. Entfernung beider Säuregruppen prüfen. Die Dissoziationskonstanten in absol. $\text{CH}_3\cdot\text{OH}$ wurden aus H-Ionenaktivitäten in H-Gemischen abgeleitet, die mit der Büllmannschen Chinhydronelektrode nach dem Verf. von LARSSON (vgl. Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. **125**, 281; C. **1923**, I. 100) gemessen wurden. Die zunächst notwendige Best. des Normalpotentials E_0 der Chinhydronelektrode in absol. $\text{CH}_3\cdot\text{OH}$ wurde, um Störungen durch die Reduktion des Chinons mit HCl zu vermeiden, indirekt vorgenommen. Zunächst bestimmt man in einer Lsg., deren H-Ionenaktivität über 10^{-10} liegt, den Spannungsunterschied zwischen der Chinhydronelektrode u. der H-Gaselektrode ($p_{\text{H}_2} = 1$ at), das sogenannte Redox-Potential der Chinon-Hydrochinon-Mischungen in absol. $\text{CH}_3\cdot\text{C}$. Danach stellt man durch Messungen mit der H-Elektrode gegen eine passende Vergleichselektrode die Abhängigkeit ihrer Spannung von der HCl -Konz. fest, von der das Normalpotential der H-Elektrode abgeleitet werden kann ($E_0^{\text{H}_2}$). Für das Normalpotential der Chinhydronelektrode gilt dann: $E_0^{\text{Ch}} = \varepsilon - E_0^{\text{H}_2}$. ε wurde zu 724,4 Millivolt bei 18° bestimmt. Hiernach würde der Methylalkohol eine Stellung zwischen W. (704,4 bei 18°) u. A. (724 bei 25°) einnehmen. Das Normalpotential $E_0^{\text{H}_2}$ in absol. $\text{CH}_3\cdot\text{OH}$ wurde zu 602 Millivolt bestimmt, E_0^{Ch} zu 601,9 Millivolt gegen die 3,5-mol. Kalomelektrode (H^+ -Aktivität Eins). Die Löslichkeit des Chinons in W. ist etwa 180mal so groß wie in $\text{CH}_3\cdot\text{OH}$, aber die in $\text{CH}_3\cdot\text{OH}$ nur etwa doppelt so groß wie in A. — Zur Ermittlung der ersten Dissoziationskonstante bestimmt man die H-Ionenaktivität in Mischungen nahezu gleicher Molarität aus Säure u. primärem Salz, zur Ermittlung der zweiten die H-Aktivität in Mischungen nahezu gleicher Molarität von primärem u. sekundärem Salz. Die Dissoziationskonstanten (vgl. BJERRUM) bei 18° in absol. $\text{CH}_3\cdot\text{OH}$ wurden bestimmt für: *Kohlensäure* $p_1 = 9,09$, $p_2 = 10,50$; *Weinsäure* $p_1 = 7,48$, $p_2 = 9,50$; *Bernsteinsäure* $p_1 = 8,10$, $p_2 = 9,54$ (Na- u. Guanidinsalz); *Fumarsäure* $p_1 = 7,60$ (Guanidinsalz), $p_2 = 9,54$ (Guanidinsalz). Die Differenz der Stärke der ersten Dissoziation dieser Säuren in $\text{CH}_3\cdot\text{OH}$ gegenüber W. beträgt etwa 4,5–4,8 in p_1 , d. h. die Säuren sind 30–60000mal schwächer in W. — Die n -Werte ($n = p_2 - p_1 - 0,6$) betragen bei $\text{CH}_3\cdot\text{OH}$ 0,6, 0,6, 0,6, 0,6.

das Doppelte wie bei W.; qualitativ stimmt dies mit BJERRUMS Theorie überein.halb der Unsicherheit der Berechnung ergaben sich die Entfernungen der Gruppen in Übereinstimmung mit den aus der Röntgenstrahlenvermessung des u. aus capillarchem. Unterss. von LANGMUIR folgenden wahrscheinlichen n der Moll. Der Abstand der Ionenfronten ist für Korksäure 10,7 Å, für säure 7,2 Å. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58. 175—84.) ZANDER.

J. Allmand und V. S. Puri, *Der Einfluß eines überlagernden Wechselstroms auf das polarisierbare Element Zink/Schwefelsäure/Kohle. I. Niederfrequenz* Vff. knüpfen an eine Unters. von BROWN (Proc. Royal Soc. London Serie A. 90. 26. [1914]) an, in welcher dieser feststellt, daß die Polarisation eines SO₄/C-Elementes durch Überlagern eines 100- u. 12000 period. Wechselstroms bewirkt: ein Effekt, den BROWN nach seinen Vers. einer Depolarisierung der Elektrode durch den Wechselstrom zuschreibt. Vff. ziehen diese Erklärung in Zweifel, da die Zn/H₂SO₄ Elektrode eine reversibel arbeitende Elektrode ist, an der jederartige Beeinflussung noch nie beobachtet wurde. Der elektr. Teil der Veranordnung ist im Original näher beschrieben; Vff. bringen die Elektroden wenig an, daß sie mit verschiedenen großen Flächen in den Elektrolyten tauchen n. Verss. mit einem überlagernden Wechselstrom von 60 Perioden zeigen, daß die Depolarisationswrkg. hauptsächlich an der C-Kathode einsetzt. Das Studium einzelspotentiale der beiden Elektroden (mittels einer Hilfselektrode) bestätigen Es zeigt sich bei Veränderung der Frequenz des Wechselstromes, daß der arisationseffekt um so stärker auftritt, je geringer die Frequenz ist. Ein geringer Effekt ist auch an der Zn-Anode zu beobachten; er erweist, daß die Überlagerung des Wechselstromes das Zn gleichsam unedler macht. Vff. lassen zur Klärung des letzteren Befundes zwischen 2 gleichen, amalgamierten, in 1-n. H₂SO₄ tauchenden Zn-Elektroden einen direkten Strom übergehen, beschicken eine der Elektroden mit überlagerndem Wechselstrom u. messen deren Potential gegen die Hilfselektrode. Auch hier wirkt der Wechselstrom im Sinn einer Erhöhung des Lösungsdruckes des Zn bzw. einer Erniedrigung der Zn-Ionen Konz. an den Elektroden. (Proc. Royal Soc. London Serie A. 107. 126—37.) FRANKENBURGER.

L. Clark, *Polarisationskapazität und elektrische Doppelschichten*. Vff. will untersuchen, ob die von HELMHOLTZ zur Erklärung elektrocapillarer Phänomene angenommene elektr. Doppelschicht tatsächlich existiert, u. die Ursache der Kapazitätsänderungen polarisierter Oberflächen erforschen, wenn diese mit verschiedenen Potentialen geladen werden. Untersucht wurden Hg, Pt, Pt-Schwarz, Au, W, Pb (Die elektrolyt. Zelle bestand aus einer großen u. einer kleinen Elektrode aus demselben Material, die in einen Elektrolyten tauchten. Die Kapazität des Systems wurde bei einem in Serie geschalteten Kondensator gleich der der kleinen Elektrode, wurde direkt bestimmt u. aus Oszillationen berechnet, doch führen nicht beide zu gleichen Zielen, sondern die Abweichungen sind außer beim Au sehr beträchtlich, u. der Glaube an wirkliche Helmholtzsche Doppelschicht wird bestritten. Einzelheiten müssen ihres physikal. Charakters wegen im Original nachgesehen werden. Konzentrationsänderungen u. Änderung des Elektrolyten von H₂SO₄ zu KCl haben nur sehr geringen Einfluß auf die Potentialkurve. (Proc. Roy. Soc. Canada [3] 18. Sekt. III. 275—92. 1924. Kingston, Queens) JOSEPHY.

Frederick George Soper, *Die Ionisationskonstante der unterchlorigen Säure*. er von NOYES u. WILSON (Journ. Americ. Chem. Soc. 44. 1630; C. 1923. I. für die saure Dissoziationskonstante von HClO konduktometr. gefundene Wert $1,7 \cdot 10^{-10}$ ca. 50 mal kleiner ist, als der von SAND (Ztschr. f. physik. Ch. 46. 1904) aus der Löslichkeit von CO₂ in wss. NaClO bestimmte, ermittelte ihn neu durch Best. des Dampfdruckes von HClO über wss. NaClO nach der

Destillationsmethode zu $1,0 \times 10^{-8}$ bei 25°. Weiter weist Vf. auf starke Unstimmigkeiten hin, die zwischen den von NOYES u. WILSON (l. c.) für die Zus. des durchleiten von Luft durch wss. HClO entstehenden Gasgemisches entwickelten Formeln u. der rechner. Auswertung der diesbezüglichen Verss. bestehen. NaClO wurde dargestellt durch Neutralisieren von NaOH mit HClO, gewaschen durch Einleiten von Cl₂O (aus Cl₂ u. HgO) in W. u. Verd. der Ursubst. auf bis 10^{-3} -n. Diese Lsgg. wurden bei 25° unter vermindertem Druck dest., im ersten 15 ccm Destillat aus 300 ccm Fl. HClO jodometr. bestimmt. Als Mittel aus 2 Serien mit verschiedenen Ursubstg. ergab sich die Hydrolysenkonstante von NaClO zu $1,0 \times 10^{-6}$, daraus die Ionisationskonstante von HClO zu $1,0 \times 10^{-8}$ (Journ. Chem. Soc. London **125**. 2227—31. Bangor, Univ.) HERTZ

Reinhold Fürth, *Dielektrizitätskonstanten guter Leiter*. Vf. beschreibt eine Methode zur Messung der DE. in gut leitenden Fl. Die Fl. mit der DE. ϵ u. der Leitfähigkeit σ_0 wird in ein Gefäß zwischen zwei vertikalen Metallplatten gebracht u. ein konstantes Wechsellpotential angelegt. Zwischen diesen Platten wird an einem Torsionsfaden in die Fl. ein aus einem festen Körper verfertigtes Rotationsellipsoid eingehängt, dessen DE. u. Leitfähigkeit E u. σ bekannt ist. Durch Anlegen eines elektr. Feldes wird auf den festen Körper ein Drehmoment ausgeübt, welches gemessen wird. Aus diesem, sowie aus dem Verhältnis σ_0/ϵ , lassen sich E_0 berechnen. Verss. an W. u. Rohrzuckerlsgg. ergeben gute Übereinstimmung der DE. mit bisherigen Messungen. Bestst. von DE. an NaCl-Lsgg. von 1% NaCl zeigten, daß bis zu geringen Konz., etwa 0,3% NaCl, die DE. des W. niedrig u. ein Minimum erreicht wird. Mit zunehmender Konz. steigt dann wieder an u. erreicht den Wert des reinen W. Mit verschiedener Spannung ergeben sich der Größenordnung nach verschiedene Werte. Doch ist die Änderung der DE. mit der Konz. stets im gleichen Sinne. Höhere Konz. als 1% konnten nicht angewendet werden, da dann eine Elektrolyse der Lsg. einsetzt. (Physikal. Ztsch. **1924**. 676—79. 1924. Prag.) BECKER

Spencer W. Richardson, *Das Grundgesetz für elektrische Leitung in Dielektrika*. Vf. entwickelt mathemat. Beziehungen für die Leitfähigkeitserscheinungen in Dielektrika. Es folgt, daß bei genügend hohen Temp. u. nach einiger Dauer des Stromdurchgangs das Dielektrikum sich analog einem metall., von einem stationären Strom durchflossenen Leiter verhält, während es bei sehr tiefen Temp. sich nähernd wie ein Luftkondensator verhält. Verschiedene Verss. über den Elektrizitätsdurchgang durch Quarzplatten quer u. parallel zu deren opt. Achse erläutern diese Beziehungen. (Proc. Royal Soc. London Serie A. **107**. 101—12.) FRÜHLING

Karl Lichtenecker, *Über eine Analogie im Verhalten leitender und nichtleitender Mischkörper*. (Leitfähigkeit metallischer Aggregate und Dielektrizitätskonstante des Wienerschen Mischkörpers.) Anschließend an eine frühere Untersuchung die elektr. Leitfähigkeit künstlicher u. natürlicher Mischkörper (Ztschr. f. Physik **25**. 225; C. **1924**. II. 918) erbringt Vf. unter Zuhilfenahme der Wiener Theorie des Mischkörpers (WIENER, Leipziger Abhandl. d. sächs. Akad. d. Wiss. **1912**. 509) den mathemat. Beweis für die Analogie des leitenden u. nichtleitenden Mischkörpers. (Physikal. Ztschr. **25**. 666—70. 1924. Reichenberg.) BECKER

Maurice Prud'homme, *Über die Regel der drei Temperaturen*. Vf. bringt ein stützendes Material zu der empir. gefundenen Regel, daß für eine bestimmte Substanz das Verhältnis $\frac{F}{\text{krit. Temp.}} + \frac{Kp.}{\text{krit. Temp.}}$, alle 3 im absoluten Temperaturmaß gemessen,

nahe gleich 1,05 bis 1 beträgt. Von 85 daraufhin untersuchten Stoffen gehörend 72 dieser Regel. Vf. findet sie u. a. für die Mercurihalogenide, für J, die Antimon- u. Aluminiumhalogenide bestätigt. Für Tetralin u. Dekalin werden die krit. Temp. aus einer vom Vf. gegebenen Beziehung zwischen Oberflächenspannung u. krit. Temp.

net. Die Beziehung zwischen den 3 Temp. läßt sich auch so formulieren, daß beim Abstieg auf der Skala der absoluten Temp. das Intervall zwischen der emp. u. dem Kp. einer Substanz bei 1 at angenähert gleich demjenigen zwischen derselben Substanz u. dem absol. Nullpunkt ist. (Journ. de Chim. physique [3—46. 1924.]

FRANKENBURGER.

Albert Greville White, *Grenzen für die Fortpflanzung der Flamme in brennenden Gas-Luft-Gemischen*. Teil I. *Gemische von Luft und einem Gas bei gewöhnlicher Temperatur und gewöhnlichem Druck*. Die Brennbarkeitsgrenzen der Gemische aus C_2 , H_2S , CO , CH_4 , C_2H_6 , Pentan, Äthylen, Propylen u. Acetylen mit Luft sind in den Arbeiten anderer Autoren zusammengestellt. Je nach Rohrdurchmesser, Richtung der fortschreitenden Verbrennung, Zündung usw. gelangten diese oft zu sehr verschiedenen Werten. Vf. bestimmte die Brennbarkeitsgrenzen für diese Gase für *Butylen* in Rohren von 2,5, 5,0 u. 7,5 cm Durchmesser bei aufwärts, abwärts u. horizontal fortschreitender Verbrennung. Da die Brennbarkeit der Gase mit dem Feuchtigkeitsgehalt schwankt, wurden alle Verss. in Ggw. von Wasserdampf ausgeführt, bei CO von 2%. Der kühlende Einfluß der Glaswand scheint auch bei den engeren Rohren recht gering zu sein, dagegen war im engeren Rohr die obere Grenze oft erheblich anders als in 5 cm-Rohr, wahrscheinlich infolge der höheren Konvektion. Die Zahlen für die einzelnen Gase sind weit mehr regelmäßig, als es bei den früher (Journ. Chem. Soc. London **121**. 1244; **122**. III. 1319) untersuchten Dämpfen der Fall war. Vielleicht spielt die Art der Verbrennung zu lösenden Bindungen eine Rolle. Die *Brennbarkeitsgrenzen* sind im Original tabellar. zusammengestellt. (Journ. Chem. Soc. London **122**. 387—96. 1924. Ardeer, NOBEL-Lab.)

HERTER.

Fredrick Stanley Brown und **Charles R. Bury**, *Kryoskopische Messungen an Nitrobenzol*. Teil II. *Die Veränderung der Molekulardepression mit dem Wassergehalt* (I. vgl. ROBERTS u. BURY, Journ. Chem. Soc. London **123**. 2037; C. **1923**. 39.) In Übereinstimmung mit BECKMANN u. LOCKEMANN (Ztschr. f. physik. Chem. **385** [1907]) fanden Vff., daß mit steigendem Gehalt an W. die molekulare Siedepunktniedrigung von *Nitrobenzol* sinkt, wenn auch in geringerem Maße, als diese Autoren angeben, nämlich nur um 1,2 Einheiten bei Sättigung mit W. Vff. leiten die Raoult'sche Gleichung für unbefriedigend u. schlagen an ihrer Stelle die Formel vor $\Delta t_u = k n_u / (n_u + n_w)$, in der t_u die gemessene Depression, n_u u. n_w die Anzahl Mole Solut u. Lösungsm. sind; k ist mit der molekularen Depression verknüpft durch $M_w k = 100 K$ (M_w = Mol.-Gew. des Lösungsm.). Für $K = 68,7$ u. $M_w = 55,8$. Bei feuchtem *Nitrobenzol* ist auch das W. als Solut in Rechnung zu ziehen, man erhält, wenn n_w die Anzahl Mole W. ist, $\Delta t = \Delta t_u + \Delta t_w = k n_u / (n_u + n_w + n_w)$. — Verss. wurden ausgeführt mit trockenem *Nitrobenzol* in Ggw. von P_2O_5 , mit feuchtem in Ggw. von Na_2SO_4 , 0—10 H_2O u. mit mit feuchtem *Nitrobenzol*. Als Solute dienten Benzil, Naphthalin, α -Nitronaphthalin, u. s-Tetrachloräthan. Die Badtemp. wurde so reguliert, daß stärkere Unter- kühlung unmöglich war, mitunter wurde die Erstarrung durch Impfen eingeleitet. Die nach der Formel der Vff. berechneten Werte für die Mol.-Gew. der Soluten stimmten erheblich genauer als die aus der Raoult'schen Gleichung sich ergebenden. (Journ. Chem. Soc. London **125**. 2219—26. 1924. Aberystwyth, Univ.)

HERTER.

Th. M. Schmolke, *Eine Zukunftsaufgabe der technischen Physik*. Vf. stellt zusammen, was bisher an Forschungsarbeiten zur Best. der *spezif. Wärme* bei gleichbleibendem C_p geleistet worden ist, welche Bedeutung diese Größe für die Technik hat u. welche Aufgaben noch zu lösen sind. (Die Wärme **47**. 597—600. 1924.)

NEI.
Josef Mattauch, *Über eine Methode zur experimentellen Bestimmung eines Zustandsgesetzes kleiner Kugeln in Gasen*. Vf. bestimmt an Ölkügelchen vom Durchmesser 3 bis $12 \cdot 10^{-5}$ cm die Fallgeschwindigkeit in N_2 u. CO_2 bei wechsell-

dem Druck. Die Ladung der Kügelchen wich bis 3,5% von dem gemeinsamen Mittelwert $c = 4,709 \cdot 10^{-10}$ d. st. E. ab. (Physikal. Ztschr. 25. 620—24. Wien, Univ.)

Nevil Vincent Sidgwick und **Elinor Katherine Ewbank**, *Die Messung des Dampfdruckes wässriger Salzlösungen durch die Erniedrigung des Gefrierpunktes von Nitrobenzol*. Die von ROBERTS u. BURY (Journ. Chem. Soc. London 123. C. 1923. III. 1539) angegebenen physikal. Daten von trockenem u. feuchtem Nitrobenzol wurden bestätigt u. Messungen über den F. von Nitrobenzol im Gemisch mit wässr. Lsgg. von bekanntem Dampfdruck ausgeführt. Benutzt wurden Lsgg. von Rohrzucker, Na_2SO_4 , CaCl_2 , SrCl_2 u. Oxalsäure. Die Gefrierpunktserniedrigung wird besser als durch die Gleichung von R. u. B. (l. c.) wiedergegeben durch $0,0689 p' + 0,00130 p'^2$ (p' = Dampfdruck des W. über der Lsg.). Während R. u. B. der Formel keine theoret. Bedeutung beilegen, außer der Aussage, daß Nitrobenzol in Nitrobenzol zu 15—20% assoziiert ist, zeigen Vf., daß sie der numer. Ausdr. für $d = E \cdot c \cdot p' + E \cdot K \cdot c^2 \cdot p'^2$ ist, in der E die kryoskop. Konstante des Nitrobenzols (für 1 Mol. pro l), K den Assoziationsfaktor des W. u. c den Verteilungskoeffizienten des W. zwischen Dampf u. Nitrobenzol. Beim E. des feuchten Nitrobenzols beträgt die Anzahl Moll. H_2O 14,6% der einfachen W.-Moll. — Zu Vergleichung von unbekanntem p' ermittelt man das Verhältnis $p':p$ (p = Dampfdruck des W. bei der betreffenden Temp.) nach $p':p = 2,14 d - 0,35 d^2$ (Genauigkeit 0,1%). Dies wurde für Lsgg. verschiedener Konz. von NaCl , KCl , NaNO_3 , KNO_3 , K_2SO_4 , CuSO_4 u. ZnSO_4 ausgeführt u. die für $+5^\circ$ gefundenen Werte mit den von TAMMANN (Mem. Acad. Petersbourg [7] 35. Nr. 9 [1887]) für 100° angegebenen Werten verglichen. (Journ. Chem. Soc. London 125. 2268—73. 1924. (6) Dyson Perrins Lab.)

Nevil Vincent Sidgwick und **Elinor Katherine Ewbank**, *Die Hydratation von Salzen und ihr Einfluß auf den Dampfdruck des Wassers*. Das Zahlenmaß der vorstehend referierten Arbeit zeigt, daß die einzelnen Salze den Dampfdruck des W. sehr verschieden beeinflussen. Für eine größere Anzahl von Salzen, Säuren, Basen u. Salzen wurde auf Grund der Angaben anderer Autoren der Quotient Depression : Mol.-% gebildet für Lsgg. von 3,6 u. 9 Mol.-%. Er war bei wasserfreien krystallisierenden Verbb. stets niedriger, oft sehr erheblich, als bei mit Krystallwasser krystallisierenden Verbb. Es liegt nahe, an eine Hydratation der Ionen oder undissoziierten Moll. der letzteren Verbb. zu denken, wodurch das System W. entzogen u. so Dampfdruck u. E. erniedrigt werden. In der verdünnten u. zentrierteren Lsgg. wird auch Assoziation der Anionen für möglich gehalten. (Journ. Chem. Soc. London 125. 2273—75. 1924. Oxford, Dyson Perrins Lab.)

A₃. Kolloidchemie. Capillarchemie.

Ernest Walter John Mardles, *Die Auflösung von Substanzen in gemischten Flüssigkeiten unter besonderer Berücksichtigung von Kolloiden*. Die Auflösung von Celluloseacetat u. Tannin in binären Lösungsmitteln, bei denen Komplexbildung wahrscheinlich ist oder angenommen werden kann, wurde untersucht. Verwandt wurden Gemische von Anilin mit Eg., Nitrobenzol, Phenol, o-Chlorphenol, von Phenol mit Pyridin u. von A. mit W. Viskosität, Oberflächenspannung u. Ausfällung durch andere Fl. (Lösungsvermögenszahl) dieser Lsgg. wurden gemessen. Grund für das erhöhte Lösungsvermögen der Gemische gegenüber ihren Bestandteilen ist keineswegs die B. von Komplexen anzunehmen, die fast immer eine Verminderung der Löslichkeit verursacht, vielmehr nimmt Vf. Verringerung der Assoziation der Lösungsmittel an, deren die Löslichkeit erhöhender Einfluß durch die gegengesetzten der Komplexbildung oft verschleiern kann. Komplexbildung in binären Gemischen läßt sich häufig durch die Kurve der peptisierenden W.

die Zus. nachweisen; Maxima etc. in der Viscositäts-Zus.-Kurve werden durch von Kolloiden sehr viel stärker ausgeprägt. (Journ. Chem. Soc. London **125**, 459, 1924. London, Birkbeck Coll.)


HERTER.

Edouard Urbain, Über die Absorption von Gasen durch Kohle. Um das veränderte Verh. einer akt. Kohle gegenüber Gasen zu untersuchen, wird die Dichte (Kompaktheit) C als Abszisse, die von 5 ccm Kohle absorbierte Gasmenge (in Millimol) als Ordinate aufgetragen. Bezeichnet man das Porenvol. in der Kohle mit v , das nur von der Kohle eingenommene Vol. mit V u. mit φ das Porenvol. der Kohle ($\varphi = v + V$), so erhält man $C = V/\varphi$. Die mit Dämpfen von Cl_2 u. Chlorpikrin angestellten Absorptionsverss. mit $C = 0,19 - 0,39$ (Kurven im Original), daß Bzl. bei $C = 0,30$ ein Maximum der Absorption (in Millimol) zeigt. Chlorpikrin wurde bei C ca. 0,19 am reichlichsten absorbiert; mit zunehmendem C sinkt die absorbierte Menge ständig; der Verlauf der Kurve ist dem absteigenden Ast der Bzl.-Kurve. Cl_2 wird mit steigendem C -Wert stärker absorbiert, die Kurve gleicht dem aufsteigenden Ast der Bzl.-Kurve. Die Lage der Optima u. der Siedetemp. der Gase scheint eine gewisse Abhängigkeit zu bestehen. (C. r. d. l'Acad. des sciences **180**, 63—65.)

HABERLAND.
Jan Effront, Über die absorbierende Kraft von Agar-Agar. (Vgl. C. r. d. l'Acad. des sciences **178**, 2032; C. **1924**, II. 1569.) Mit 0,1-n. HCl behandelter Agar absorbiert, je nach dem Aschengehalt (Alkalinitätsgrad) mehr oder weniger HCl (Tabelle im Original). Schon eine schwache Säure wirkt entkalkend, das gebildete Salz geht in Lsg.; das vorher mit Säure behandelte Agar absorbiert keine Säure mehr. — Die Absorption von Alkali von Agar ist vom Aschengehalt weniger abhängig, sie muß auf B. eines neutralen Agars zurückgeführt werden, das nur in Ggw. von überschüssigem Alkali sich mit Alkali in einem Gleichgewichtszustande befindet. Das Verh. von Agar gegen Alkali scheint auf eine lactonartige Konst. des Agars hinzudeuten. — Wird Agar mit CuSO_4 -Lsg. behandelt, so werden pro 100 g 1,42 g Cu absorbiert; entkalkter Agar absorbiert kein Cu; wird Agar mit Alkali behandelt u. das Agarku. mit W. gewaschen, so wird mehr Cu absorbiert als beim nicht mit Alkali behandelten Agar; die Absorption des Metalls wird in diesem Falle durch Verwitterung des Alkalis bedingt. (C. r. d. l'Acad. des sciences **180**, 29—33.)

B. Anorganische Chemie.

Arthur Rosenheim und **Fritz Lehmann**, Über innerkomplexe Beryllate. (Vgl. ROSENHEIM u. VERMEHREN, Ber. Dtsch. Chem. Ges. **57**, 1337; C. **1924**, II. 2015.) Die abweichende Verh. des bas. Berylliumacetats u. der entsprechenden Be-Salze zu den niederen Fettsäuren dürfte in der Natur des Kations begründet sein, das als hochpolymer aus assoziierten Be-Atomen bestehend aufgefaßt werden kann u. als radikalischen Salze bildet, die Nichtelektrolyte darstellen. Den Berylliumtartraten ähnliche innerkomplexe Salze konnten Vff. mit Oxyssäuren u. Polyphosphorsäuren darstellen. Auch hier wurde die B. Be-reicher Verbb. bestätigt. — Die Salze, Lsgg. von Alkalisalicylaten mit Berylliumhydroxyd in der Siedehitze erhaltenen Salicylsäureberyllaten haben die Zus. $\text{R}_2[\text{Be}(\text{C}_6\text{H}_4\text{O} \cdot \text{CO}_2)_2] \cdot x \text{H}_2\text{O}$. Der Natriumsalz ist außerordentlich beständig. Es wurden dargestellt: die Alkalisalze (K, Na, H_4) u. das Ba-Salz in gut krystallisierter Form (Nadeln, NH_4 -Salz Blättchen). Vff. geben diesen Verbb. die nebenstehende Struktur. — Mit der *o*-Kresotinsäure wurden in ähnlicher Weise bei Verwendung frisch gefällten Berylliumhydroxyds oder -carbo-



oder Na- u. NH_4 -Salz der Kresotinsäureberyllate der Formel $\text{R}_2[\text{Be}(\text{C}_6\text{H}_3\text{O}_2)_2]$ u.









bei Verwendung gealterten Berylliumcarbonats das bas. NH_4 -Salz der F. $(NH_4)_2 \cdot [Be_2O(C_8H_6O_3)_2] \cdot 1H_2O$ erhalten. Letzteres ist weniger l. als das n. S. scheidet sich schon aus verd. Lsgg. in Nadeln ab. Nach der Formel ist ein innerkomplexes Salz des bimolekularen Be_2O_2 . — Aus äquimolekularen Mischungen von Glykolsäure u. Alkaliglykolaten werden entsprechend nur Be-reiche Glykolsäureberyllate erhalten. Glykolsäure fungiert hier als zweibas. Säure, daher innerkomplexer Verbb. Auf 1 Mol. Glykolsäure werden 2 Moll. BeO gekrystallisierten Alkalisalze (*K-Salz* Nadeln, *Na-Salz* Prismen, *NH_4 -Salz* Tafeln) haben die Zus. $R_2[Be_3(C_2H_2O_3)_4] \cdot xH_2O$ u. enthalten trimolekulares Beryllium. — Die Brenzcatechinberyllate wurden in fünf verschiedenen Salzreihen erhalten. Je geringer der Überschuß an Alkali zur angewendeten Menge Brenzcatechin, umso stärker bas. Verbb. wurden gebildet. Stark alkal. Lsgg. liefern n. Beryllatsalze. Zus. $R_2[Be(C_6H_4O_2)_2]$. Es wurden dargestellt das NH_4 -, *Na*- u. *K-Salz* in Nadeln, das *Ba-Salz* in Blättchen. Außer dieser Reihe wurden noch Salze der 1. $(NH_4)_2[Be_2OC_6H_4O_2]$, 2. $(NH_4)_4[Be_3(C_6H_4O_2)_5]$, 3. $(NH_4)_4[Be_2O_3(C_6H_4O_2)_5]$, 4. $R_2[Be_3(C_6H_4O_2)_9]$ dargestellt ($R = K, Na$). Brenzcatechin verhält sich hier wie eine zweibas. Säure, u. diese Wrkg. der Hydroxylgruppen liegt auch noch bei der neutralen dreibas. Brenzcatechinmonosulfonsäure vor, deren NH_4 -Beryllat die Zus. $[Be_3(C_6H_3O_2 \cdot SO_3)_4] \cdot 8H_2O$ hat. — Die dargestellten Salzreihen zeigen eine große Analogie, die zwischen ihnen u. den bas. Acetaten u. anderen fettsäure Salzen des Radikals $(Be_4O)^{IV}$ besteht. (LIEBIGS Ann. **440**. 153—166. 1924. Berlin, Wissensch. Lab.)

F. Zambonini und G. Carobbi, Die Doppelsulfate der Metalle der seltenen Erden und der Alkalimetalle. I. Doppelsulfate von Lanthan und Kalium. Vff. untersuchen bei 25° die ternären Systeme mit den Komponenten: $La_2(SO_4)_3, K_2SO_4$. Die Lsgg. wurden in einem Thermostaten bis zu 14 Tagen in Bewegung gehalten, bis das Gleichgewicht erreicht war. Die Zuss. der Bodenkörper betrugen: $La_2(SO_4)_3 : K_2SO_4 : H_2O = 1 : 5 : 2, 1 : 4\frac{1}{2} : 2, 1 : 4 : 1, 1 : 3 : 0, 2 : 3 : 8, 1 : 1 : 2$. Verb. 1:4 ist ein weißes Pulver, u. Mk. kleine Kügelchen, ebenso Verb. 1:4 $\frac{1}{2}$:2; Verb. 1:4 $\frac{1}{2}$:2 weiß, u. Mk. gut ausgebildete kugelförmige Struktur; Verb. 1:3:0 kleine Rosetten, die aus winzigen krystallin. Täfelchen bestehen; Verb. 2:3:8 glänzende Krystalle, monoklin.; Verb. 1:1:2, Tafeln, Prismen. (Atti R. Accad. dei Lincei, Roma [5] **II**. 301—308. 1924.)

Ferruccio Zambonini und V. Caglioti, Die Doppelsulfate der Metalle der seltenen Erden und der Alkalimetalle. II. Sulfate von Neodym und Kalium. (Vorst. Ref.) Vff. untersuchen das ternäre System: $Nd_2(SO_4)_3 - K_2SO_4 - H_2O$ bei 25°. Verwandt wurde ein Nd-Präparat, das durch häufige fraktionierte Krystallisation des Doppelnitrats mit Mg rein erhalten wurde. Die Lsgg. von $Nd_2(SO_4)_3$ u. K_2SO_4 wurden sich 5 Tage zur Krystallisation überlassen. Erhalten wurden Doppelnitratsalze von den Zuss.: $Nd_2(SO_4)_3 : K_2SO_4 : H_2O = 1 : 5 : 2, 1 : 4 : 2, 1 : 4 : 1, 1 : 4 : 1 + 13 : 1 : 3 : 2, 1 : 3 : 2 + 2 : 3 : 8, 2 : 3 : 8, 2 : 3 : 8 + 1 : 1 : 2$ u. $1 : 1 : 2$. Verb. 2:3:8 krystallin. rosenrote Täfelchen, zu Rosetten vereinigt, monoklin. (Atti R. Accad. dei Lincei, Roma [5] **33**. II. 308—13. 1924. Neapel, Univ.)


Hans Reihlen, Richard Illig und Rudolf Wittig, Über die Reaktionsfähigkeit komplex gebundener organischer Verbindungen. (Vgl. REIHLEN, Ztschr. f. phys. u. allg. Ch. **133**. 82; C. **1924**. II. 20.) Aus dem Verh. kleinerer Moll. oder es beim Eintritt in einen Komplex diesen reaktionsunfähiger zu machen, kann man ohne weiteres dasselbe auch für größere Moll. erwartet werden, die mehrere Angriffspunkte besitzen, aber doch nur eine Koordinationsstelle besetzen. In der Tat haben die Vff. zu diesem Zweck untersuchten Fällen trat durchaus keine Hemmung ein. Die der Unters. dienenden Komplexsalze mußten vor allem äußerst beständig sein, um keinen durch die Zers. in Spaltstücke hervorgerufenen Reaktionsverlauf zu zeigen.

chen. Dies traf zu für das *Triacetylacetonatochrom* (I) u. das *Hexamonochloro-dihydroxotrichromikation* (II) gegen H-Ionen u. das *Dibrenzcatechinatodiaquonickelion* (III) gegen OH-Ionen. — Bei der Einw. der berechneten Menge Br_2 in konz. Lsg. auf I bildet sich sofort das in A. unl. *Chromi- γ -monobromacetylacetonat* (IV). Br_2 hat sich an die Doppelbindung angelagert u. sofort die Hälfte Br_2 wieder abgespalten. Die Isolierung der Zwischenverb. gelang nicht. Die Reaktion ist ein Beweis für die Theorie von K. H. MEYER über den Reaktionsmechanismus der Keto-Enole. — Um Komplexsalze vor Zers. zu schützen, empfiehlt sich Arbeiten in konz. Lsg. u. die Beachtung des Umstandes, daß Zentralatome mit hoher elektr. Wertigkeit von größerer Beständigkeit sind. — Wenn die Bromierung in Chlf. als Lösungsm. vorgenommen wird, so werden 6 Atome Br aufgenommen. Die Rk. geht vermutlich zunächst über IV u. dann durch Verschiebung der Doppelbindung zu V, das weiterhin Br_2 anlagert u. wieder mit dem β -ständigen H-Atom HBr absplattet, wodurch die Doppelbindung zurückwandert (VI). Die Lösungs- u. Wanderungsfähigkeit wird demnach in einem innerkomplexen System nicht durch eine zugehörige Doppelbindung beeinträchtigt.



• X

XII




Bei der B. von *Protocatechualdehyd* aus *Brenzcatechin* u. *Chlf.* in alkal. Lsg. (R. TIEMANN) wurde beobachtet, daß auch der Phenylrest des komplex gebildeten Brenzcatechins im Kern substituiert wird. Das Na-Salz des *Brenz-catechinnickeloats* (VII) ist seiner Konst. nach ein Diaquonickeloat mit der Koordinationszahl 4. Das *Ni-Na-Salz des Protocatechualdehyds* ist bedeutend komplizierter. Bezeichnet man den Protocatechualdehydrest mit dem Zeichen $\text{O} - \text{T}$ (Ring mit Carbonylgruppe), so ist die Konst. durch VIII veranschaulicht. Es werden diese Konfiguration 10 oder 13 Aldehydgruppen durch Komplexbildung gebunden. Durch den Komplexschutz wird der sonst beobachteten Verschmierung vorgebeugt u. die Ausbeute gesteigert, da tatsächlich das Chlf. mit dem komplex gebildeten Phenol reagiert. Es beträgt die Steigerung der Ausbeute etwa 90%, Anwendung von KOH (1 Stde.) besser als mit NaOH. — Verwendet man anstatt II das *Tribrenzcatechinchromiat* (IX), ein echtes inneres Komplexsalz, so muß

man feststellen, daß hier das innerkomplex gebundene Brenzcatechin viel schwächer mit CHCl_3 reagiert (60% der n. Ausbeute an Aldehyd).

Fettsäuren (Benzoesäure u. substituierte Monocarbonsäuren) bilden mit wertigem Cr komplexe Kationen von größter Säurebeständigkeit. WERNER formuliert das diesen Verbb. zugrunde liegende *Hexaacidodihydrozotrichromikation* X. Die brückenbildenden Carboxylgruppen nehmen an weiteren Rkk. nicht teil, während die heraushängenden Reste R dies noch tun. Das monochloressige Chrom (X, $\text{R} = \cdot\text{CH}_2\text{Cl}$) geht mit KJ in neutraler oder schwach saurer Lsg. bei 50° in 1 Stde. in das wl. monoiodessigsäure Chrom über. Monochloressigsäure reagiert mit Anilin unter teilweiser Hydrolyse das wl. *Tetraphenylglycinodioldihydrozotrichlorid*. Mit methylalkoh. NH_3 wird X unter Umlagerung des zunächst gebildeten 3-wertigen Komplexes übergeführt in ein Gemisch der einkernigen V. XI u. XII, *Diglycinohydroxoquochochrom* u. *Glycinotetramminchromidichlorid*. Die Umlagerung wird wohl an der Gruppe R u. nicht am Zentralatom stattgefunden haben, da die von WEINLAND u. HERGET (vgl. Arch. der Pharm. 262. 169; C. 192. 1183) dargestellten Additionsprodd. von Säuren an o-aminobenzoesaures Eisen schon als eine Komplexbildung im Komplex angesprochen werden konnten. (Dtsch. Chem. Ges. 58. 12—19. Greifswald, Univ. u. Karlsruhe, Techn. Hochsch.)

L. Hackspill und R. Grandadam, *Über die Verdrängung von Alkalimetallen durch Eisen.* Bei genügend hohen Temp. wird im Vakuum aus Alkalimetall- oder -Hydroxyden das Alkalimetall durch Fe verdrängt; in einigen Fällen gelingt es das Alkalimetall zu isolieren, in anderen ist es nur durch B. von H_2 bei 100° von W. nachweisbar. Die B. von K oder Na findet statt beim Erhitzen von Fe mit den Chloriden, Bromiden u. Jodiden von Na oder K; bei Anwendung von Fluoriden ist die Isolierung des Alkalimetalls leicht möglich. Mit Fe u. NaCl entstand *Eisencarbid* u. N_2 . — K_2CO_3 u. Fe reagieren bei 800—900° nach:



Die Alkalisulfate reagieren bei 1000° nach folgenden Gleichungen:

a) $\text{Me}_2\text{SO}_4 + \text{Fe} \rightleftharpoons \text{FeSO}_4 + 2\text{Me}$, hieraus: b) $2\text{FeSO}_4 \rightleftharpoons \text{Fe}_2\text{O}_3 + 2\text{SO}_2$. Mit überschüssigem Fe bildet sich noch FeS u. Fe_3O_4 aus b). — Mit KOH verläuft folgende Rk. statt: $2\text{Fe} + 3\text{KOH} \rightleftharpoons \text{Fe}_2\text{O}_3 + 1,5\text{H}_2 + 3\text{K}$, es werden 70–80% des in KOH enthaltenen K gewonnen; die Rk. beginnt bei ca. 500° u. wird bei 600—650° durchgeführt. (C. r. d. l'Acad. des sciences 180. 68—70.) HABER

Carlo Mazzetti, *Studien über die Kobaltchloridlösungen.* I. u. II. Mitteilung. I. Über die verschiedenartigen Farbenänderungen von CoCl_2 -Lsgg. durch Hinzufügen anderer Salze ist zu bemerken, daß, wenn das Kation der hinzugefügten Chloridlsg. stark elektropositiv ist, die Färbung nach Blau übergeht (Alkalimetalle), dann stufenweise nach Rot (Hg, Zn) u. mit CH_3J nach Orangerot. Hinzufügen einer geringen Menge CoCl_2 zu konz. HCl gibt grüne Färbung. — Die Leitfähigkeit u. Viskosität der CoCl_2 -Lsgg. wurden gemessen u. die Beweglichkeit des Co^{2+} bei verschiedenen Temp. berechnet. Die Überföhrungszahl des Co-Ions ist bei 20° $n = 0,489$ (Verdünnung ∞). Aus den erhaltenen Werten ist zu ersehen, daß es sich bei den CoCl_2 -Lsgg. bei verschiedenen Temp. sowohl um Hydratations- als auch um B. komplexer Ionen handelt. Daß n mit steigender Temp. kleiner wird, erklärt sich leicht aus der Dehydratationshypothese des Co-Ions, jedoch nicht auf Grund dieser Theorie auch mit steigender Konz. abnehmen, was jedoch in diesem Fall ist; hier wäre die Hypothese der B. komplexer Ionen anzunehmen.

II. *Bariumchloridlösungen und Bariumchlorid-Kobaltchloridlösungen.* Um den Einw. anderer Elektrolyte auf CoCl_2 -Lsgg. zu untersuchen, wurden zunächst von BaCl_2 -Lsgg. Viskosität u. Leitfähigkeit bestimmt, alsdann von Gemischen verschiedener Zus. von BaCl_2 u. CoCl_2 . Eine Entscheidung zugunsten einer

kommenden Theorien (Dehydratation oder B. komplexer Ionen) wird nicht
 fen. (Gazz. chim. ital. **54**. 891—907. 908—18. 1924. Rom, Univ.) ZANDER.

Alfons Klemenc und Adolf Schroth, Über die Einwirkung des Stickstoff-
 des auf metallisches Kupfer und dessen Adsorption an Kupferoxydul. Die erst-
 von SABATIER u. SENDERENS beobachtete Reaktionsfähigkeit der Metalle (Cu)
 über NO_2 war fälschlich von TARTAR u. SEMON (vgl. Journ. Americ. Chem.
13. 494; C. **1921**. III. 599) im Sinne der B. von Cupronitrat erklärt worden.
 zeitig mit den Vff. haben auch PARK u. PARTINGTON (vgl. Journ. Chem. Soc.
125. 72; C. **1924**. I. 2090) das Nitrokupfer einer Unters. unterzogen. Bzgl.
 für die einzelnen physikal.-chem. Unterss. benutzten App. muß auf die Ab-
 igen im Original verwiesen werden. Es wurde meist im Hochvakuum ge-
 et. — NO_2 wurde in abgeschmolzenen Glasballons verwandt; das reduzierte
 ar im elektr. Ofen mit H_2 reduziert u. wurde nach vorsichtiger Zertrümmerung
 O_2 -Ballons im 0,0001 mm-Vakuum nur sehr langsam von NO_2 angegriffen.
 ichtbraune Pulver wurde analysiert; Cu elektrolyt., N in einem Nitrometer.
 iche Verss. bestätigten das auch von anderen Forschern (l. c.) gefundene
 rhältnis $\text{O}:\text{N} = 1:3,2$ unabhängig von der Menge des angewandten Cu. Bei
 e höheren P_{NO_2} sinkt der Gehalt an NO erheblich, auch wenn besonders
 mmiges Cu im Kupferbehälter auf 40° erwärmt wird. Vollkommen trockenes
 erakuum- NO_2 reagiert sehr träge. Das Reaktionssystem Cu- NO_2 zerfällt in
 3.; 1. die wirkliche Adsorption von NO_2 durch metall. Cu, 2. die Oxydation
 u zu Cu_2O u. Adsorption von NO_2 an dieses. Metall. Cu adsorbiert mehr
 als die gleiche Menge Cu_2O . Nach den Verss. der Vff. muß gesagt werden,
 „Nitrokupfer“ u. andere Nitrometalle als chem. Verbb. nicht existieren. Zur
 ung der Adsorptionsisotherme des Systems $\text{Cu}_2\text{O}-\text{NO}_2$ wird ein Verf. zur Darst.
 einem Cu_2O mitgeteilt, indem man schwarzes CuO bei möglichst tiefer Temp.
 reduziert u. über das so gewonnene Cu bei 90° NO_2 leitet u. schließlich
 Erwärmen im N_2 -Strom das NO u. NO_2 vertreibt. Die Einwirkungs-
 O_2 auf das Oxydul betrug immer 40 Stdn.; doch stellt sich das Gleichgewicht
 früher ein. Die Adsorptionskurve durchläuft ein Maximum (Gebiet der
 ung) bei 40° u. einem Druck von 1,6 Atm. — N_2O_4 ist für Cu_2O eine benetzende
 das Oxydul ist auch für Stoffe mit kleiner Oberflächenspannung ein benetz-
 e Pulver. Der Verlauf der Adsorptionskurve ist nicht aus einem besonderen
 des Systems $\text{Cu}_2\text{O}-\text{NO}_2$ bzgl. der Grenzflächenspannung herzuleiten. (Ber.
 Chem.-Ges. **58**. 168—75. Wien, Univ.)

HORST.

William Wardlaw und Robert Louis Wormell, Verbindungen des drei-
 ten Molybdäns. Teil II. Molybdänylmonochlorid. (I. vgl. WARDLAW, NICHOLLS
 SILVESTER, Journ. Chem. Soc. London **125**. 1910; C. **1924**. II. 2577.) Durch
 klyt. Red. einer Lsg. von MoO_3 in HCl wird diese olivgrün, bei nochmaliger
 adlung der Kathodenfl. rötlichbraun. Beim Eingießen in Aceton scheidet
 ein brauner Nd. aus, der nach dem Waschen mit Aceton, A. u. Ä. im
 km getrocknet wurde. Bei allen Operationen wurde in CO_2 -Atmosphäre
 itet. Nach der Analyse liegt MoOCl , $4\text{H}_2\text{O}$ vor, allerdings ist der Gehalt
 , wohl infolge des Stehens im Exsiccator etwas zu gering. Manganometr.
 r die Dreiwertigkeit des Mo erwiesen. Die getrocknete M. ist braun, an der
 oxydabel, nicht zerfließlich, ll. in W. u. HCl mit rotbrauner Farbe, unl. in
 a u. Ä., wl. in k., ll. in h. absol. A. Reduziert Cu^{++} u. Hg^{++} zu Cu^+ u. Hg^+ ,
 flüchlich bis zu den Metallen, FeCl_3 zu FeCl_2 , AgNO_3 zu Ag. Mit NaOH, NH_3
 FN entstehen schwarze Ndd., wahrscheinlich $\text{Mo}(\text{OH})_3$. Gibt mit Kaliumferri-
 ul Rotfärbung; mit essigsauem Pb-Acetat entsteht kein PbCl_2 , das Cl ist also
 ionogen gebunden. Die Struktur wird zu $[\text{Cl MoO } 4\text{H}_2\text{O}]$ mit der Koordinations-

Br_6 , gefällt, rotbraun, in W. etwas l., in HCl mit blauer Farbe l., in konz. erst nach längerem Erhitzen l., mit NaOH Zers., mit BaCl_2 sofort Nd. *nitrotetramminkobaltihexabromoirideat*, $1,2[\text{Co}(\text{NH}_3)_4(\text{NO}_2)_2]\cdot\text{IrBr}_6$, aus Cisdinitrotetramminkobaltinitrat u. (A), in W. unl., mit Alkali Zers., in h. HCl mit blauer l. in konz. H_2SO_4 , mit gelber Farbe l. *Transdinitrotetramminkobaltihexabromoirideat*, $1,6[\text{Co}(\text{NH}_3)_4(\text{NO}_2)_2]\cdot\text{IrBr}_6$, aus (A) u. Transdinitrotetramminkobaltichlorid, in h. Alkali Zers., in h. konz. HCl mit blauer Farbe l., in konz. wl. *Carbonatotetramminkobaltihexabromoirideat*, $[\text{Co}(\text{NH}_3)_4\text{CO}_3]\cdot\text{IrBr}_6$, aus Carbonatotetramminkobaltinitrat, schokoladenbraun. In der Hitze mit Säuren zers. *Nitroaquotetramminkobaltihexabromoirideat*, $[\text{Co}(\text{NH}_3)_4\text{H}_2\text{O}\cdot\text{NO}_2]\cdot\text{IrBr}_6$, aus Nitrotetramminkobaltichlorid u. (A), tiefschwarz, unl. in W., mit h. NaOH in konz. HCl mit blauer, in konz. H_2SO_4 mit gelber Farbe l. *Bishydroxoaquotetramminkobaltisulfathexabromoirideat*, $[\text{Co}(\text{NH}_3)_4\text{H}_2\text{O}(\text{OH})_2]\cdot\text{SO}_4\cdot\text{IrBr}_6$, aus (A) u. Nitrotetramminkobaltidisulfat, mit A. violetter Nd. wurde an der Luft, besonders in h. Alkali Zers., in h. konz. HCl mit blauer Farbe l., in konz. H_2SO_4 mit gelber Farbe l. *Bisdiaquotetramminkobaltisulfathexabromoirideat*, $[\text{Co}(\text{NH}_3)_4(\text{H}_2\text{O})_2]\cdot\text{SO}_4\cdot\text{IrBr}_6$, aus (A) u. Diaquotetramminkobaltisulfat durch Fällung mit A. schmutzgelblich in HCl mit blauer, in konz. H_2SO_4 mit gelber Farbe l., in Laugen mit grüner l. *Bisdiaquotetramminkobaltidisulfathexabromoirideat*, $[\text{Co}(\text{NH}_3)_4(\text{H}_2\text{O})_2]\cdot(\text{SO}_4)_2\cdot\text{IrBr}_6$, Darst. wie beim vorigen Salz nur in schwefelsaurer Lsg., rosarotes Pulver, in h. Alkali unl., in Alkalien wl., beim Ansäuern der alkal. Lsg. Rosafärbung. Die beschriebenen Salzen abzuleitenden Beziehungen zwischen Konst. u. Farbe sind zusammengestellt u. kurz besprochen.

Hexachloro- u. Hexabromoirideate hochmolekularer organischer Salze. *Monochininhexachloroirideat*, $\text{C}_{20}\text{H}_{24}\text{O}_2\text{N}_2\cdot\text{H}_2\text{IrCl}_6$, aus salzsauren Lsgg. von Chinin (B) u. Chininchlorhydrat, aus 12%ig. HCl umkrystallisiert. *Bichininhexachloroirideat*, $(\text{C}_{20}\text{H}_{24}\text{O}_2\text{N}_2)_2\cdot\text{H}_2\text{IrCl}_6$, aus (B) u. Chininchlorhydrat in neutraler Lsg., gelbes Pulver. *Monocinchoninhexachloroirideat*, $\text{C}_{19}\text{H}_{22}\text{N}_2\text{O}\cdot\text{H}_2\text{IrCl}_6$, aus (B) u. Cinchonin in salzsaurer Lsg. Aus 12%ig. HCl rotbraunes Krystallpulver. *Bicinchoninhexachloroirideat*, $(\text{C}_{19}\text{H}_{22}\text{N}_2\text{O})_2\cdot\text{H}_2\text{IrCl}_6$, Darst. wie beim Monosalz nur in neutraler Lsg., trocken rotweinfarbiges Pulver. *Monocinchonidinhexachloroirideat*, $\text{C}_{19}\text{H}_{22}\text{N}_2\text{O}\cdot\text{H}_2\text{IrCl}_6$, in salzsaurer Lsg. rötlich gefärbtes Krystallpulver. In neutraler Lsg. *Bicinchonidinhexachloroirideat*, $(\text{C}_{19}\text{H}_{22}\text{N}_2\text{O})_2\cdot\text{H}_2\text{IrCl}_6$. *Strychninhexachloroirideat*, $\text{C}_{21}\text{H}_{22}\text{N}_4\text{O}_2\cdot\text{H}_2\text{IrCl}_6$, rotbraun, bronzeeartig glänzende Kryställchen. *Brucinhexachloroirideat*, $(\text{C}_{23}\text{H}_{26}\text{N}_2\text{O}_4)_2\cdot\text{H}_2\text{IrCl}_6$, gelbes Pulver. *Nitronhexachloroirideat*, $(\text{C}_{20}\text{H}_{16}\text{N}_4)_2\cdot\text{H}_2\text{IrCl}_6$. Alle entsprechenden organ. Hexabromoirideate wurden analog dargestellt. Alle alle blau. An allen außer den in W. zersetzlichen Bialkaloidhexabromoirideaten wurden Leitfähigkeitsmessungen ausgeführt. Die Bromoirideate sind schwerer l. als die entsprechenden Chloroirideate. Die Bialkaloidsalze sind schwerer l. als die Monosalze. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. **135**. 233—54. Bonn, Univ.) JOSEPHY.

C. Mineralogische und geologische Chemie.

Yamada, Über die Oberflächenenergie von Krystallen und die Krystallform. Derselbe Inhalt wie Physikal. Ztschr. **24**. 364. **25**. 52; C. **1924**. I. 723. 2406 ausführlicherer Wiedergabe der rechner. Einzelheiten. (The Science Reports of the Tôhoku Imp. Univ. **13**. 27—51. 1924.) BECKER.

Yamada, Über die Krystallform und die Krystallgitter. Derselbe Inhalt wie Physikal. Ztschr. **25**. 289; C. **1924**. II. 1452, mit ausführlicherer Wiedergabe der rechner. Einzelheiten. (The Science Reports of the Tôhoku Imp. Univ. **13**. 53—61. 1924.) BECKER.

A. Gockel, *Über die Ionisation der Atmosphäre*. Besprechung der Ursache der luftelektr. Schwankungen, insbesondere der Leitfähigkeit. (Physikal. Ztschr. 646—47. 1924. Schweiz.)

H. Bongards, *Messungen des Gehalts der Luft an radioaktiven Zerfallsprodukten vom Flugzeug aus*. Messungen des Vf. in 3600 m Höhe des Gehalts der Luft an radioakt. Zerfallsprod. ergaben einen parallelen Gang der Temp. mit der Aktivität. Vf. schließt daraus u. auf Grund früherer Beobachtungen, daß die in den hohen Luftschichten enthaltenen radioakt. Stoffe durch eine Atomstrahlung von der Sonne in die Atmosphäre transportiert werden. Da die beim Zerfall der radioakt. P. frei werdende Wärme nicht für derartige Temperaturänderungen wie die von gemessenen in Betracht kommt, muß hier eine unbekannte Strahlung vorhanden sein. Die gemessenen Abklingungskurven deuten auf Th, doch ist kein eindeutiger Beweis dafür vorhanden. Sollte es sich bestätigen, dann müßte das Th als außerird. Herkunft angesehen werden. (Physikal. Ztschr. 25. 679—82. Göttingen.)

D. Organische Chemie.

John Smeath Thomas und **Richard William Riding**, *Untersuchungen über die organischen Polysulfide*. Teil II. *Die Einwirkung von wasserfreiem Kaliumdisulfid auf Allyljodid und auf einige aromatische Halogenverbindungen*. (I. RIDING u. THOMAS, Journ. Chem. Soc. London 123. 3271; C. 1924. I. 1352.) Allyljodid bzw. Benzylchlorid u. K_2S_5 in absol. Ä. wurden *Diallylpentasulfid* (I) bzw. *Dibenzylpentasulfid* (II) erhalten. Die Verbb. ähneln den entsprechenden Alkylverbb., sind aber stabiler, geben wie diese Piperidinverbb., von I wurden Halogenadditionsverbb. dargestellt. Bei Einw. von K_2S_5 auf p-Bromnitrobenzol in Ä. entstand $(C_6H_4NO_2)_2S_3$, $2C_2H_5OK$ (III), gelber krystalliner Nd., l. in W., in konz. wss. Lsg. mit HCl ein alkoholhaltiges Disulfid, das im Vakuum über CaH_2 in 4,4'-Dinitrodiphenyldisulfid (IV) vom F. 178—180° (WOHLFART, Journ. f. prakt. Ch. [2] 66. 551 [1902]) übergeht. — I. $C_6H_{10}S_5$. Reinigung durch 6-wöchiges Stehen im Vakuumexsiccator. Hellgelbes, stark lichtbrechendes Öl von charakteristischem knoblauchartigem Geruch, D.¹⁸ 1,249, mischbar mit Ä., Chlf., Hexan, Bzl., CS₂ in A. u. Aceton, prakt. unl. in W., ohne starke Zers. flüchtig mit Wasser. Piperidinverb. $C_6H_{10}S_5$, $3C_5H_{11}N$ rotes Öl. Tetrajodid $C_6H_{10}J_4S_5$ schwarzes, glänzendes Pulver, F. ca. 92°. Mit Br lieferte I Diallyldisulfidtetraabromid und anscheinend Tribromid $C_6H_9Br_3S_5$, das mit Piperidin reagiert, anscheinend unter B. von $2C_6H_9Br_2S_5$. — II. $C_{14}H_{14}S_5$. Schweres, hellgelbes Öl, bei — 80° noch nicht flüchtig mit Wasserdampf, wird durch sd. W. nur sehr langsam zers. in rote, ölige Piperidinverb. $C_{14}H_{14}S_5$, $3C_5H_{11}N$ oxydiert sich an der Luft zu Benzoylpiperidin. — $(C_6H_4NO_2)_2S_2$, $2C_2H_5ONa$ aus IV u. alkoh. Natriumäthylat, e. federige M. Daraus mit HCl dasselbe Disulfid wie aus der K-Verb. F. 73—74° (Journ. Chem. Soc. London 125. 2214—19. 1924. Kapstadt u. Liverpool, Univ.)

Kathleen Short und **W. Frank Short**, *Die Polymerisation von Formaldehyd bei Vorhandensein anorganischer Substanzen*. In Gefäßen, die mit einer Metallplatte (Zn mit 0,24% Mg, frei von As u. Cd) bedeckt waren, wurde unter Einfluß von Sonnenlichtes B. von Zucker beobachtet. Es wurden dann Verss. mit verschiedenen Substanzen angestellt, die teils in die Fl. eingebracht, teils in der Luft dül. gehalten wurden. In 18 Monaten betrug der Verlust an CH_2O bei der zeitl. (ersten Anordnung) mit Metalldeckel (vgl. oben) 34,3 (4,2), Mg 13,2 (17,4), Zn 20,8 (20,8), bas. Zn-Carbonat 3,8 (3,6), ZnO 1,4 (24,2), MgO 3,8 (7,2), Magnesit 0,4 (2,2), ZnO + MgO 6,2 (32,2), Magnesit + bas. Zn-Carbonat (13,3 (26,4) %). Der geringste Gehalt an CH_2O zeigte, daß von dem verschwundenen CH_2O < 22% in CIO

(H verwandelt sein konnten. Die Fl. hinterließ bei Verdampfen einen zuckerartigen Sirup, der teilweise vergärbbar war u. sowohl Pentosen als Hexosen zu enthalten schien. Das erhaltene Osazon wies auf Ggw. mehrerer Zucker hin, doch Phenylglucosazon zu überwiegen. (Biochemical Journ. **18**. 1330—33. 1924. and [New Zealand], Univ. Coll.)

SPIEGEL.

Adickes, Die α -Ketopimelinsäure und die α -Ketokorksäure und ihr Verhalten konz. Schwefelsäure. Bei der α -Ketopimelinsäure (**I**) u. der α -Ketokorksäure die Neigung zur Abspaltung von CO_2 u. W. durch konz. H_2SO_4 bedeutend, neben der allen α -Ketosäuren gemeinsamen Abspaltung von CO. Da die letzten cycl. Verb., Cyclopentanon u. Cyclohexanon, bei der in Frage kommenden Temp. von der konz. H_2SO_4 sofort angegriffen werden, konnten sie nicht isoliert werden. Bei **I** wurden nur 5%, bei **II** 25% eines Mol. CO_2 abgespalten. Bei Hitzezers. im N-Strom spaltete **I** 1 Mol. CO_2 u. W., **II** nur $\frac{1}{2}$ Mol. CO_2 u. W. ab; CO-Abspaltung (im CO_2 -Strom) bei beiden nur 2% eines Mol. Die Säuren verhalten sich also bzgl. ihrer CO_2 -Abspaltung bei der Hitzezers. der Schwefelsäurerk. gerade umgekehrt. — Die Herst. der beiden Säuren nach der von GAULT (vgl. Bull. Soc. Chim. de France [**4**] **11**. 383; C. **1912**. [**9**]) bei den niedrigeren Homologen angewandten Methode über die entsprechenden Oxaltriäthylester. Erschwert wurde die Darst. dadurch, daß als Nebenprodd. die Ausgangssäure zurückerhalten wurden.

Versuche: α -Oxaladipinsäuretriäthylester wurde nach GAULTS Vorschriften in α -Oxalglutarsäuretriäthylester gewonnen. Das Phenylhydrazon konnte erhalten werden; mit salzsaurem Semicarbazid entstand (offenbar unter Abspaltung von A.) Verb. $\text{C}_{13}\text{H}_{19}\text{O}_6\text{N}_3$, F. 158—159°, (sintert bei ca. 154°), vierseitig krist. — α -Ketopimelinsäure, $\text{C}_7\text{H}_{10}\text{O}_5$ (**I**), F. 93—94°, (sintert bei ca. 90°), ll. in A., W., wl. in k. Bzl. — Semicarbazon, $\text{C}_8\text{H}_{13}\text{O}_5\text{N}_3$, Prismen aus W., F. 194—195°. — Oxim, F. 142° (Zers.). — Phenylhydrazon, schwachgelbe Prismen aus verd. Essigsäure, F. 143—144° (Zers.). — 2,4-Dinitrophenylhydrazon, $\text{C}_{13}\text{H}_{14}\text{O}_8\text{N}_4$, gelbe Nadeln aus W. oder wss. A., F. 190—191° (Zers.). — α -Oxalpimelinsäureester, wie entsprechende Adipinsäureverb. dargestellt, konnte nicht in α -Carboxyadipinsäure übergeführt werden. — α -Ketokorksäure, $\text{C}_8\text{H}_{12}\text{O}_5$ (**II**), aus vorigem durch Erhitzen mittels HCl neben Oxalsäure u. Pimelinsäure, Blättchen aus Chlf., F. 124°, ll. in A., W. u. h. Chlf. — Semicarbazon, $\text{C}_9\text{H}_{15}\text{O}_5\text{N}_3$, Prismen, F. 168—169°. — 2,4-Dinitrophenylhydrazon, $\text{C}_{14}\text{H}_{16}\text{O}_8\text{N}_4$, gelbe Nadeln F. 173—174°. (Dtsch. Chem. Ges. **58**. 211—16.)


ZANDER.

Kartwig Franzen † und **Friedrich Schmitt**, Die Bildung der Citronensäureketipinsäure. Die B. der Citronensäure in Pflanzen ist von einigen Forschern in der Weise wie die B. der Saccharine aus Zucker erklärt worden, die als Benzilsäureumlagerung erkannt worden ist. Nach dieser Auffassung geht die Citronensäure den Weg von der Glucose zunächst zur Zuckersäure, aus der Ketipinsäure, $\text{C}_6\text{H}_6\text{O}_6$, u. durch eine der Benzilsäure analoge Umwandlung die Citronensäure gebildet wird. Der Übergang läßt sich experimentell durchführen. Man angenommen werden, daß die Ketipinsäure, die bis jetzt aus Pflanzen nicht isoliert wurde, natürlich vorkommt. Das Diacetyl, ein Prod. der trockenen Destillation von Ketipinsäure, findet sich in den Destillaten vieler äth. Öle u. man kann annehmen, daß es durch CO_2 -Abspaltung aus der Ketipinsäure in der Pflanze entsteht. Die Darst. des Ketipinsäureesters gelang mit einer Ausbeute von 24% nach veränderten Verf. von WISLICENUS (Ber. Dtsch. Chem. Ges. **20**. 589 [1887]), bei der Kondensation des Oxalesters mit Essigester weniger Na u. tiefere Temp. verwendet wurden. Die Umlagerung wird besser mit wss. KOH vollzogen; entstehende Säuregemisch wurde nach der Veresterung fraktioniert dest. u. die Ester als Hydrazide u. Benzylidenverb. identifiziert. Es wurden neben wenig

Oxalsäure etwa 12% Citronensäure gefunden, was einer wirklich vorhandenen Menge von 20–30% entsprechen dürfte.

Versuchsteil. *Ketipinsäureester*, $C_{10}H_{14}O_6$, aus 2 Moll. Na, 1 Mol. Oxal- u. 2 Moll. Essigester bei guter Kühlung (nicht zu langsam zutropfen) u. 24 Std. stehen lassen. Die Aufarbeitung geschieht bei Eiskühlung mit 2-n. H_2SO_4 u. d. folgendem Ausäthern. Ausbeute 24% der Theorie. Aus A. (absol.) umkrystallisiert. Die Umlagerung erfolgt durch Kochen (1 Stde.) mit wss. KOH. Nach dem Ansäuern mit H_2SO_4 u. Einengen hinterbleibt eine dunkelbraune zähe Krystallmasse, die mit der 5-fachen Menge absol. A. (2% HCl) aufgenommen wird. Verestert durch 4-std. Erhitzen auf dem Wasserbad (mehrfach wiederholen). Unveresterte Säuren als K-Salze fällen. Die aus den Ä.-Auszügen gewonnene ölige Fl. wird bei 11,5 mm destilliert. Es wurden isoliert aus Fraktion II (70–80%) *ε-Säuredihydrazid*, $C_2H_6O_2N_4$, aus verd. A. F. 241–242°, demnach bestand die Fraktion aus *Oxalester*. — Aus Fraktion IV wurden mit Hydrazinhydrat isoliert das *Citronensäuretrihydrazid*, $C_6H_{14}O_4N_6$, u. Mk. kleine Nadeln, F. 107–108°, konnte in die Benzylidenverb. übergeführt werden. Die Fraktion IV bestand demnach aus Citronensäureester. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58. 222–26. Karlsruhe, 1905. Hochsch.)

C. S. Marvel, D. W. Mac Corquodale, F. E. Kendall und W. A. L. Die Synthese einiger möglicher Vorläufer des Lysins. Um die Fähigkeit des Lysins bzgl. der B. von Lysin aus Oxy- u. Aminocapronsäuren zu prüfen, wurde folgende, größtenteils schon bekannte Capronsäurederiv. hergestellt u. lysinähnliche Nahrung zugegeben. Es erwies sich, daß keine der Verbb. in Frage kam, um Lysin zu ersetzen. Untersucht wurden: *α-Oxy-*, *ε-Amino-*, *ε-Oxy-*, *α-Amino-*, *ε-Amino-α-oxy-*, *α,ε-Diamino-(d,l-lysin)* u. *α,ε-Dioxycapronsäure*. — Da HELFERICH u. MALKOMES (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 55. 702; C. 1922. I. 94) die Darst. von *δ-Hexensäure* als Nebenprod. erhaltene Lacton der *ε-Oxycapronsäure*, worin die Stellung der OH-Gruppe in der Säure noch nicht sicher war, u. über folgende Verbb. synthetisiert u. die Synthese bestätigte die l. gegebene Konst.



Versuche. *α-Oxycapronsäure*, 70 g *α-Bromcapronsäure* + 70 g Na_2CO_3 in 1 l W. werden 1 Stde. gekocht u. die h. Lsg. mit 35 g Cu-Acetat versetzt. Cu-Salz der Säure wird in h. W.-Suspension mit H_2S zers.; aus PAe. F. 60–62°. *ε-Aminocapronsäure*, Darst. nach dem Verf. v. BRAUNS (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 36. 1839 [1907]) aus Benzoylpiperidin; F. 203°. — *d,l-Lysindichlorhydrat*, Darst. v. BRAUN (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 42. 839 [1909]); es ist vorteilhafter bei der Darst. der *ε-Benzoylamino-capronsäure* das *ε-Benzoylaminoamylecyanid* mittels HClV ständig zum Chlorhydrat der *ε-Aminocapronsäure* zu verseifen u. diese dann zu benzoylieren; F. 192–193°. — *ε-Phenoxybutylmalonsäurediäthylester*, $C_{17}H_{24}O_4$, aus *δ-Phenoxybutylbromid* (I) + Malonester in Ggw. von C_2H_5ONa in alkohol. Lsg. durch 4-std. Kochen; Kp.₂₀ 224–228°, $n_D^{22} = 1,4879$; $D_4^{20} = 1,081$. — *ε-Phenoxybutylmalonsäure*, $C_{15}H_{16}O_5$ (III), aus voriger durch Verseifen; aus h. W. krystallisiert F. 152° (geringe Zers.). — *ε-Phenoxycapronsäure* (IV), aus III u. Erhitzen auf 225°; aus PAe. F. 69°. — *ε-Bromcapronsäure*, $C_6H_{11}O_2Br$ (V), aus IV durch 5-std. Kochen mit der 5-fachen Menge 48%ig. HBr; aus PAe. F. 155°. Kp.₂₀ 165–170°. Auch darstellbar durch 2-std. Kochen von 55 g PBr_3 , 3 g $NaBr$ u. 35 g *ε-Benzoylaminoamylecyanid*, Entfernung des $POBr_3$ durch Dest.; d. Kp.₆ 80–130° übergehende Anteil des Rückstands wird 10 Stdn. mit 48%ig. HBr gekocht, das Prod. mit Wasserdampf dest. u. aus dem Rückstand die Bromcapronsäure

mit Ä. extrahiert. Es wurde ferner versucht, die Säure darzustellen aus methylenbromid in A. + NaCN u. Kochen des Reaktionsprod. mit HBr; bei fraktionierten Vakuumdest. wurden ca. 35% unverändertes Pentamethylenod, wenig unreine Bromcapronsäure u. Pimelinsäure erhalten. — ϵ -Oxycapron- (VI) u. ihr Lacton wurden als öliges Gemisch beim Kochen von V in W. t. g₂O erhalten; in einem Falle wurde eine wachsartige M., F. 54°, erhalten. — Salz der Säure, C₆H₁₁O₃Na (VII). — α -Brom- ϵ -phenoxybutylmalonsäure aus III + Br₂; aus Bzl. mit PAe. gefällt weiße, krystallin. M. F. 108—113° (geringe F.); aus Essigsäure Tafeln, F. 112—117°, danach aus PAe. F. 116—117°. — ϵ -Bromcapronsäure, C₆H₁₀O₂Br₂, durch 8-std. Kochen der vorigen mit 45%ig. aus Ä.-A., danach aus W. Nadeln, F. 144—146°. (Journ. Americ. Chem. Soc. 46. 2838—42. 1924. Urbana [Ill.]. Univ.)


HABERLAND.

Minshaw Rattonji Nanji, und Frederic James Paton, Aluminiumamalgam als Reduktionsmittel in der Zuckergruppe. Auf verd. alkoh. oder wss. Lsgg. von Zuckern Al-Amalgam fast gar nicht ein. Dagegen tritt in Ggw. von NH₃, insbesondere wss. Lsg. bei 45—50° weitgehende Red. ein (bis zu 90% des Zuckers). Folgende Reduktionen erwiesen sich als die günstigsten: 10 g Al werden wie üblich amalgamiert u. mit 100 ccm 25%ig. Glucoselsg. u. 1 ccm wss. NH₃ (D. 0,880) mehrere Stdn. bei 45—55° zur Rk. gebracht. Die Lsg. wird mit A. bis zu 60%, bzw. 40% A. versetzt u. das Al mit H₂SO₄ bzw. Oxalsäure in filtrierbare Form gebracht. Die reagierten Glucose wird mit Hefe vergoren. Ausbeute 60% Sorbit. — Ganz analog liefert Mannose 55—58% Mannit, Galaktose 55—60% Dulcit. In diesen Fällen genügt Durchleiten von CO₂, um das Al filtrierbar zu machen. Auch die Reinigung des Zuckers ist nicht erforderlich. (Journ. Chem. Soc. London 125. 174—76. 1924. Birmingham, Univ.)

OHLE.

Walter Norman Haworth, David Arthur Ruell und George Crone West, Amylen- und Butylenoxydformen der Tetramethylgalaktose. Das von PRYDE u. Chem. Soc. London 123. 1808; C. 1923. III. 1397) durch direkte Methylierung von Galaktose mit (CH₃)₂SO₄ u. NaOH erhaltene Tetramethylmethylgalaktosid $[\alpha]_D = +4,4^\circ$ u. die daraus gewonnene Tetramethylgalaktose mit $[\alpha]_D = +84,9^\circ$ (Gleichgewichtswert) sind nicht einheitlich, sondern enthalten ein Strukturisomeres. Die Wiederholung der Oxydation der reinen Tetramethylgalaktose, dargestellt aus kristallisiertem Tetramethylgalaktoseanilid, führte zu einem Tetramethylgalaktonsäurelacton mit $[\alpha]_D = +155^\circ \rightarrow +27,4^\circ$ (PRYDE gibt an $+106,7 \rightarrow 16,7^\circ$). — Das von Prydeschen Tetramethylmethylgalaktosid enthaltene Strukturisomere konnte auf anderem Wege dargestellt werden. Läßt man methylalkoh. HCl bei 15°, nicht 0°, auf Galaktose einwirken, so entstehen nicht die bekannten α - u. β -Methylgalaktoside, sondern ein stark linksdrehendes Methylgalaktosid, dessen Methylierung dem Tetramethylmethylgalaktosid von $[\alpha]_D = -45,2^\circ$ führt. Die daraus bereitete Tetramethylgalaktose zeigt $[\alpha]_D = -21,2^\circ$ (Gleichgewichtswert) reduziert neu gekochte KMnO₄-Lsg. u. liefert bei der Oxydation ein Tetramethylgalaktonsäurelacton mit $[\alpha]_D = -27,1^\circ \rightarrow -25,2^\circ$. Vff. halten diese Verb. für ident. mit der von PRYDE durch Methylierung von Galaktonsäurelacton erhaltenen 2,3,5,6-Tetramethylgalaktonsäurelacton (I) u. schreiben daher dem neuen Methylgalaktosid die Konst. II zu. — Das von CUNNINGHAM (Journ. Chem. Soc. London 113. 596; C. 1919. I. 714) beschriebene Tetramethyl- γ -methylgalaktosid ist nicht einheitlich, sondern augenscheinlich ein Gemisch der Amylen- u. Butylenoxyformen. Die von CUNNINGHAM ebenfalls erhaltene Octamethyldigalaktose halten Vff. für unverändertes Tetramethylgalaktosid auf Grund des Kp. u. den Angaben über die Verseifungsgeschwindigkeit des Tetramethylmethylgalaktosids, wonach die Hydrolyse nicht vollständig sein kann.


Versuche. Die Bildungsgeschwindigkeit des Methylgalaktosids **II** hängt von der Korngröße, dem Mengenverhältnis Galaktose zu Lösungsm. u. der Schmelzgeschwindigkeit ab. Die opt. Drehung des Reaktionsgemisches durchläuft ein Minimum, das in allen Fällen bei $[\alpha]_D = -58,1^\circ$ liegt. Die negative Drehung wird dann allmählich kleiner u. nach genügend langer Zeit positiv. **II** ist ein Sirup, für dessen Einheitlichkeit Vff. den Umstand anführen, daß bei wiederholter Extraktion mit trockenem Essigester stets das gleiche Prod. erhalten wird. — **Methylmethylgalaktosid**, $C_{11}H_{22}O_6$ (gemäß **II**), durch Methylierung von **II** mit $(CH_3)_2SO_4$ u. NaOH oder CH_3J u. Ag_2O , Fl. vom Kp._{0,015} 112° , $n_D = 1,4405$, $[\alpha]_D = -14,2^\circ$ (W., $c = 1,42$). Wird von 0,137-n. HCl bei 95° in 400 Min. vollständig gespalten. — **2,3,5,6-Tetramethylgalaktose**, $C_{10}H_{20}O_6$, Sirup vom Kp._{0,05} $145,4^\circ$, $[\alpha]_D = -21,2^\circ$ (W., $c = 2,12$); zeigt keine Mutarotation. — Bei Oxydation mit Br-W. bei $30-35^\circ$ (6,5 Stdn.), dann über Nacht bei Zimmertemp., steht das Lacton der **2,3,5,6-Tetramethylgalaktonsäure**, $C_{10}H_{18}O_6$ (**I**), mattgelber



vom Kp._{0,02} $127-128^\circ$, $n_D = 1,4502$, $[\alpha]_D = -27,1^\circ \rightarrow 25,2^\circ$ (W.; $c = 1,4$). Bei der analogen Oxydation von **2,3,4,6-Tetramethylgalaktose (III)** entstehen **2,4,6-Tetramethylgalaktonsäure**, krystallin. M., wl. in A., vom F. 84° u. $[\alpha]_D = +26,6^\circ$ (W.; $c = 0,58$) u. ihr Lacton, Sirup vom Kp._{0,03} 128° , $n_D = 1,4502$, $[\alpha]_D = +155^\circ \rightarrow 27,4^\circ$ (W.; $c = 1,04$). (Journ. Chem. Soc. London **125**, 4 bis 2474. 1924. Newcastle-Upon-Tyne, Univ.)

Amé Picet, *Die Anhydride der Zucker und die Synthese von Disacchariden*. Zusammenfassende Darst. der Arbeiten des Vfs. u. seiner Schüler auf diesem Gebiet. (Vgl. Helv. chim. Acta **7**, 934; C. **1924**, II, 2519.) (Rev. gén. des Sciences pures et appl. **35**, 668—75. 1924. Genf, Univ.)

Max Bergmann, Arthur Miekeley und Fritz Stather, *Über das Anhydrid eines Disaccharids aus 4-Oxy-4-acetobutylalkohol*. II. (Vgl. Ber. Dtsch. Chem. Ges. **56**, 2255; C. **1924**, I, 641.) Wie früher gezeigt, geht der bei der Oxydation von **Anhydroacetobutylalkohol (I)** mit Benzopersäure entstehende **4-Oxy-4-acetobutylalkohol (II)** leicht in das **Anhydrid eines Disaccharids** desselben (**III**) über. Es wird u. a. mehr festgestellt, daß die Substanz, die jene Umwandlung bewirkt, eine Säure ist, die dem rohen Zucker **II** anhaftet, die unter 11 mm Druck schon mit Wasserdampf flüchtig ist. Ihre Wrkg. wird schon durch Verestern mit CH_3N_2 oder durch Neutralisieren mit Alkali verhindert. Vom letzten Agens wird sie rasch zerstört. o. schneller machen Tierkohle oder Fasertonerde den Katalysator unwirksam. — u. andere Säuren z. B. HCl, lösten den gleichen Vorgang aus, doch treten erhebliche Mengen des Anhydrids **III** erst auf, wenn der größte Teil des zur Lsg. dienenden W. verdampft wird, da die Rk. umkehrbar ist. Diese außerordentlich leichte Umwandlung eines Zuckers in ein Bioseanhydrid verdient um so mehr Beachtung, als **II** der Fructose ziemlich nahe steht u. als **d,l-1,4,5-Trideoxyfructose** aufgefaßt werden kann.




di kann. — Der umgekehrte Vorgang, die Hydrolyse von **III** zu **II** wird durch die Schwerlöslichkeit von **III** beeinträchtigt. Während mit starken Säuren neben **II** sein Anhydrid **IV** entsteht, bleibt bei der Hydrolyse mit verd. ($1/100$ -n. HCl) die B. von **IV** völlig aus, so daß angenommen werden muß, im ersten Fall einer sekundären Rk. seine Entstehung verdankt. Die direkte Umwandlung von **IV** in **III** ist bisher nicht gelungen. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 1885. Dresden, Kaiser WILHELM Inst. f. Lederforschung.) OHLE.

W. S. Wheeler und **R. W. Bost**, *4-p-Tolylsemicarbazid und einige Derivate*. Harnstoff, dargestellt nach DAVIS u. BLANCHARD (Journ. Americ. Chem. Soc. 1916; C. 1924. I. 1177) durch Kochen von 50,4 g Harnstoff + 121 g p-Toluidinhydrat in 500 ccm W., wobei bald Abscheidung von Di-p-tolylharnstoff eintritt; wird bis zum Stoßen der Mischung gekocht, heiß abgesaugt u. Di-p-tolylharnstoff h. W. gewaschen; aus dem Filtrat beim Abkühlen p-Tolylharnstoff; hierauf erhaltenes Filtrat wird erneut gekocht (im ganzen viermal); Reinigung am Ende durch Lösen in h. Eg. u. Einfließenlassen in k. W.; weiße Tafeln, F. 184°. — *4-Tolylsemicarbazid*, aus 9 g des vorigen + 9 g Hydrazinhydrat in 30 ccm absol. Ethanol 12std. Kochen, Reinigung über das Chlorhydrat; die freie Verb. kristallisiert aus A. in farblosen Tafeln, bei 157—159° erweichend, bei 274° Zers. unter Säuren; ammoniakal. Ag-Lsg. u. Fehlingsche Lsg. werden reduziert; mit FeCl₃ (Grünfärbung, nach längerem Stehen grüner Nd. — *Aceton-4-p-tolylsemicarbazid*, $C_{10}H_{15}ON_3$, Darst. in A. durch Zugabe von einigen Tropfen Eg.; aus A. kristallisiert, Zers. unter Aufschäumen bei 205°. — *Acetophenon-4-p-tolylsemicarbazid*, $C_{16}H_{17}ON_3$, aus A. Nadeln, F. 165° zu farbloser Fl., die beim Abkühlen erstarrt u. bei erneutem Erhitzen bei 165° weich wird, danach F. 198° zu farbiger Fl.; der F. ändert sich auch, wenn die Verb. einige Tage dem Sonnenlicht ausgesetzt wird. — *Benzophenon-4-p-tolylsemicarbazid*, $C_{21}H_{19}ON_3$, aus A. Nadeln, F. 166 (hellgelbe Fl.). — *p-Chinon-4-p-tolylsemicarbazid*, $C_{14}H_{13}O_2N_3$, aus A. braune Kristalle, F. 165° (dunkelbraune Fl.). — *Campher-4-p-tolylsemicarbazid*, $C_{18}H_{25}ON_3$, kristallisiert durch Zugabe von wenig W. Nadeln, F. 225—229° (bräunliche Fl.). (Journ. Americ. Chem. Soc. 46. 2813—16. 1924. Chapel Hill [Nord Carol.], Univ.) HAB.

Valerio Bigiavi, *Einwirkung der salpetrigen Säure auf die Azoxyphenole*. Im Gegensatz zu der β -Form der p-Azoxyphenole, die mit HNO₂ nicht reagiert (vgl. Bigiavi, Bigiavi u. Carrara, Atti R. Accad. dei Lincei, Roma [5] 31. 439; C. 1923. 1929), wird die α -Form in Nitroderiv. übergeführt, wobei die NO₂-Gruppe in Verbindung zur OH-Gruppe eintritt. Es wurden so nitriert Benzol- α -azoxy-p-kresol, Benzol- α -azoxy- α -naphthol, das Monobenzoylderiv. des Benzol- α -azoxyhydrochinons u. Benzolazo-p-kresol. Verbb. mit verätherten Hydroxylen treten nicht in Rk. — Bei Zugabe der konz. äth. Lsg. der Oxyverb. mit nitrosen Gasen (aus HNO₃ u. H₂O bei 0° gesätt. u. einige Stdn. bei gewöhnlicher Temp. stehen gelassen, entstehen auch die Verbb., die vorher mit HNO₂ (aus NaNO₂ u. verd. H₂SO₄) nicht entstehen. Die Nitroderiv. kristallisieren aus der äth. Lsg. nahezu quantitativ aus Benzol- β -azoxyphenol (F. 117°) wurde so Benzol- β -azoxy-m-nitro-p-oxyphenol erhalten, F. 174°. — Benzol- β -azoxy-p-kresol (F. 125°) ergab Benzol- β -azoxy-p-nitro-m-nitro-o-oxybenzol, F. 121°. — p-Nitrophenol ergab 2,4-Dinitrophenol, aus dem 2,6-Dinitrophenol ergaben sich Mischungen von 2,4- u. 2,6-Dinitrophenol, hauptsächlich 2,4-Isomere. — Das Benzol- α -azoxy-p-phenol, das mit HNO₂ das Mononitroderiv. in o-Stellung zu OH gibt, wird durch die nitrosen Gase direkt in die Di-nitroverb. (beide Nitrogruppen in o- u. o'-Stellung zur OH-Gruppe) (vgl. Valerio, Atti R. Accad. dei Lincei, Roma [5] 23. II. 284; C. 1915. I. 732) übergeführt. — Es ist ein stärkeres Nitrierungsmittel als die nitrosen Gase, da auch Äther, wie Nitrophenetol, von ihr nitriert werden, während sie durch nitrose Gase

nicht angegriffen werden. (Atti R. Accad. dei Lincei, Roma [5] **33**. II. 319 1924. Florenz, Ist. di studi sup.)






G. Rastelli, *Über das Verhalten einiger in halogenierten Lösungsmitteln gel. Phenylhydrazone*. Die Phenylhydrazone der Aldehyde u. Ketone ändern in halogenierten Lösungsm. ihre Farbe, indem sie sich teils gelb, teils violett färben. An Lösungsm. wurden verwandt: Chlf. , CCl_4 , CHBr_3 , Perchloräthylen, Dibrommethan, Äthylenchlorid, Äthylbromid u. Alkylbromide u. -jodide; halogenierte Lösungsm. haben keinen Einfluß auf die Farbe. Violettfärbung gaben die Phenylhydrazone des Benz-, Toluy-, Anisaldehyds, des Piperonal-, Vanillins u. Cuminlaldehyds, schwache Violettfärbung gaben die Phenylhydrazone des *p*-Amino- u. *p*-Oxybenzaldehyds. Gelbfärbung zeigten die Phenylhydrazone von *p*-Nitrobenz- u. Zimtaldehyd, Benzophenon, Michlers Keton, der Acetylglyoxy-, Brenztraubensäure, ferner die Methylphenylhydrazone u. Azine des Benz- u. Cinnamaldehyds u. Piperonals. Am schnellsten erscheinen die Färbungen mit Bromoform, dann Chlf. u. Dichlorbrommethan. Licht zeigt keine Einw. auf die Farbbänder. Die Lsg. des Benzalphenylhydrazons (I) zeigt die größte Farbintensität bei 20°C. Durch feuchte Luft schlägt die Farbe der violetten Lsgg. in Gelb um. Der Rückstand nach Abdampfungsrückstand der violetten Lsgg. besteht aus dem unveränderten Ausgangsmaterial mit Spuren von Oxydationsprodd. Aus der sich vierzehn Tage lang selbst überlassenen violetten Lsg. von I in Chlf. schieden sich geringe Mengen eines gelben Körpers ab. Das Dehydrobenzalphenylhydrazon (II) aus. Da es sich demnach nicht um eine Oxydation handeln konnte, blieb nur die Möglichkeit einer Addition, deren B. durch physikal. Untersuchungsmethoden nachgewiesen wurde. Rein chem. gelang der Nachweis nur bei



Phenylchloroform, $\text{C}_6\text{H}_5 \cdot \text{CCl}_3$, welches nach der Regel von ANGELI im chem. a. dem Chlf. gleich ist; dieses gab mit I eine Additionsverb., violette Kristalle, Schmp. F. 65—67°, die an der Luft HCl abspalteten u. in ein grünes Harz übergingen, in A. — Die kryoskop. Best. des Mol.-Gew. von I in Bromoform ergab für das einfache Mol.-Gew., für die violette Lsg. (nach 36-std. Stdn. das doppelte Mol.-Gew.; nach diesem zu urteilen, würde das Additionsprodukt aus zwei Moll. Phenylhydrazon bestehen. Da sich auf diese Art jedoch nicht zu schließen ließ, wie weit das Chlf. an der Rk. beteiligt ist, wurde I in Bzl. gel. u. die Gefrierpunktserniedrigung bei Zugabe verschiedener Mengen Chlf. gemessen. Der Minimalwert ergab sich für das Verhältnis 1 Mol. I : 1 Mol. Chlf. , desgleichen für Bromoform. Die Additionsverb. besteht demnach aus der gleichen Anzahl Moll. der beiden Komponenten, auf diese ist also die Violettfärbung der Phenylhydrazone in den halogenierten Lösungsm. zurückzuführen. Da sich aus der Best. des Mol.-Gew. von I ergeben hatte, daß zwei Moll. I in der Addition vorhanden sind, muß letztere also aus zwei Moll. I u. zwei Moll. Chlf. (oder Bromoform) bestehen. Für die Bindung der einzelnen Moll. untereinander bestehen verschiedene Möglichkeiten. (Gazz. chim. ital. **54**. 964—72. 1924. Bologna Univ.)

I. A. Koten und Roger Adams, *Einige Reaktionen der Alkyl- und Arylsilberhydroxyde*. Die durch Einw. von alkoh. NaOH auf Alkyl- oder Arylsilberchlorid zu erhaltenden Alkyl- oder Arylsilberhydroxyde reagieren in Gegenwart von wenig NaOH mit Alkoholen u. CS_2 unter B. von Xanthogenaten nach I oder selbst entstehen aus Alkyl- oder Arylsilberchlorid u. Natriumthioacetat nach II; beim Aufbewahren, vor allem im Sonnenlicht, werden die Verbindungen langsam zers.; mit J_2 in Chlf. entstehen aus diesen Xanthogenaten Alkyl- oder Arylsilberjodid u. gelbe Öle, die anscheinend Konst. III haben. — Wird die substituierten Quecksilberhydroxyde aus den entsprechenden Mercurijodiden

(dargestellt, so entstehen aus ihnen bei Einw. von CS_2 + Alkoholen Gesteine von Xanthogenat u. *Alkyl- oder Arylquecksilbermercaptan*, die B. der Mercaptane wird in Ggw. von wenig NaOH verhindert. Die Mercaptane entstehen in Hydroxyden auch nach IV. — Wird in eine alkoh. Lsg. während des Abkühlens des A. bei gewöhnlicher Temp. dauernd CO_2 eingeleitet, der Rückstand in Pyridin gel., die Lsg. mit CO_2 gesätt. u. mit Ä. versetzt, so erhält man *Alkyl- oder Arylquecksilberdicarbonate*; bei Einw. von CO_2 auf eine alkoh. Lsg. von Arylquecksilberhydroxyd entstehen die *n. Carbonate* (anfangs gelartig). Sowohl die Carbonate als auch die Dicarbone reagieren mit CS_2 u. Alkoholen unter B. von Xanthogenaten (teilweiser Hydrolyse). — Beim Erhitzen von *Alkyl- oder Aryl-Hg-Salzen* (z. B. *nitrobenzoesäure* über den F. tritt Rk. V ein. — Die Einführung der Alkyl- oder Aryl-Hg-Gruppe in organ. Verbb. mittels der entsprechenden Hydroxyde erschweren sich als nicht möglich, die Alkyl- u. Aryl-Hg-Hydroxyde reagierten nicht mit CS_2 , Acetessigestern, Zimtestern oder Phenolen.



Versuche. *Methylquecksilbermethylxanthogenat*, $\text{CH}_3\text{OCS} \cdot \text{SHgCH}_3$, aus A. (wie oben) F. 59°. — *Methylquecksilberäthylxanthogenat*, $\text{C}_2\text{H}_5\text{OCS} \cdot \text{SHgCH}_3$, F. 53°. — *Äthylquecksilberäthylxanthogenat*, $\text{C}_2\text{H}_5\text{OCS} \cdot \text{SHgC}_2\text{H}_5$, F. 53°. — *n-Propylquecksilberäthylxanthogenat*, $\text{C}_2\text{H}_5\text{OCS} \cdot \text{SHgC}_3\text{H}_7$, F. 38–39°. — *n-Butylquecksilberäthylxanthogenat*, $\text{C}_2\text{H}_5\text{OCS} \cdot \text{SHgC}_4\text{H}_9$, ölig. — *p-Tolylquecksilberäthylxanthogenat*, $\text{CH}_3 \cdot \text{SHg} \cdot \text{C}_6\text{H}_4\text{CH}_3$, F. 128°. — *p-Tolylquecksilbermethylxanthogenat*, $\text{CH}_3\text{OCS} \cdot \text{SHg} \cdot \text{C}_6\text{H}_4\text{CH}_3$, F. 145°. — *Benzylquecksilberäthylxanthogenat*, $\text{C}_2\text{H}_5\text{OCS} \cdot \text{SHgCH}_2\text{C}_6\text{H}_5$, F. 145°. Alle genannten Verbb. bilden aus A. weiße Krystalle, l. in Ä. u. Chlf., unl. in W., am Sonnenlicht schwarz werdend. — *Methylmercurimercaptan*, CH_3HgSH , durch Zugabe von Methylmercuridicarbonat zu CS_2 oder Einleiten von H_2S in alkoh. Lsg. von Methylquecksilberhydroxyd. Aus A. schmelzende Tafeln, F. 143°, an Sonne schwarz werdend. — *Äthylmercurimercaptan*, $\text{C}_2\text{H}_5\text{HgS}$, aus A. silbrige Tafeln, F. 104°. — *p-Tolylmercurimercaptan*, $\text{CH}_3 \cdot \text{HgSH}$, gelb, unl. in üblichen Lösungsm. — *Methylmercuridicarbonat*, $\text{CH}_3\text{Hg} = \text{CH}_3\text{HgHCO}_3$, aus Pyridinlsg. mit Ä. gefällt weißes Pulver, F. 123°. — *Äthylmercuridicarbonat*, $\text{C}_{15}\text{H}_{14}\text{O}_3\text{Hg}_2 = [\text{CH}_3 \cdot \text{C}_6\text{H}_4\text{Hg}]_2\text{CO}_3$, Zers. oberhalb 260° in organ. Mitteln, l. in Essigsäure unter Zers. — *Äthylmercuri-2,4,6-trinitrophenyl*, $\text{C}_6\text{H}_7\text{O}_8\text{N}_3\text{Hg}$ (V, R = C_2H_5), aus A. weiße Tafeln, F. 164°. — *Äthylmercuri-2,4,6-trinitrophenyl*, $\text{C}_6\text{H}_7\text{O}_8\text{N}_3\text{Hg}$ (vgl. V), aus 70%ig. A. gelbliche Nadeln, F. 162°, unl. in üblichen Lösungsm. — *p-Tolylmercuri-2,4,6-trinitrophenyl*, $\text{C}_{14}\text{H}_9\text{O}_8\text{N}_3\text{Hg}$ (V, R = $\text{C}_6\text{H}_4 \cdot \text{CH}_3$), F. 192°, unl. in üblichen Lösungsm. — *p-Tolylmercuri-2,4,6-trinitrophenyl*, $\text{C}_{14}\text{H}_9\text{O}_8\text{N}_3\text{Hg}$, die durch Erhitzen der vorigen Verb. erhaltene Schmelze wird mit Ä. extrahiert, aus dem Extrakt erhaltener Rückstand in Aceton-A. gel., F. 192°. (Journ. Americ. Chem. Soc. 46. 2764–69. 1924. Urbana [Ill.], HABERLAND.)

Alph C. Huston, *Einwirkung aromatischer Alkohole auf aromatische Verbindungen in Gegenwart von Aluminiumchlorid*. III. *Kondensation von Benzylalkohol mit Phenol*. (II. vgl. HUSTON u. FRIEDEMANN, Journ. Americ. Chem. Soc. 40. 785; 43. II. 531.) Aus einer Suspension von je 1 Mol. Benzylalkohol u. Phenol u. AlCl_3 in PAe. wird, wenn die Temp. unter 30° gehalten wird, *p-Benzylmercaptan* erhalten; der *Methyl- u. Äthyläther* werden analog mittels *Anisol u. Phenetol*

see
errata
P 3063

dargestellt. Einw. von AlCl_3 auf Benzylalkohol unterhalb 35° ergab, daß 96% Alkohols unverändert zurückgewonnen wurden. Wurde die Temp. nicht unterlassen, so wurden aus dem Reaktionsgemisch 25–30% Benzylchlorid erhalten. Hieraus ergibt sich, daß bei der Kondensation von Benzylalkohol mit Phenol oder aromat. KW-stoffen Benzylchlorid nicht unbedingt als Zwischenprod. entfallen muß. Kondensation von $\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_2\text{Cl}$ mit $\text{C}_6\text{H}_5\text{OH}$ in Ggw. von AlCl_3 gab *p*-Phenol in 36%ig. Ausbeute.

Versuche. Beim Zusammengeben von 50 g Phenol u. 30 g AlCl_3 in PAc . (Temp. nicht über 20°) wurden nach Zers. der beim Stehen abgeschiedene gelatinösen M. (Al -Phenolat) mittels W. u. verd. HCl 48 g unverändertes Phenol zurückgewonnen. — *p*-Benzylphenol, $\text{C}_{13}\text{H}_{12}\text{O}$, Kp.₄ $141\text{--}143^\circ$, aus PAc . M. F. 83,58; Ausbeute 43–45%. — Methyläther des *p*-Benzylphenols kann auch vorher angegeben auch aus vorigem + CH_3J dargestellt werden; Kp. 305° nach viermaliger Dest. Kp.₄ $133\text{--}135^\circ$. — Äthyläther des *p*-Benzylphenols, Kp. bis 317° , nach sechsmaliger Dest. Kp.₁₂ $171\text{--}173^\circ$. (Journ. Americ. Chem. Soc. 2775–79. 1924. East Lansing [Mich.], Agricult. Coll.)

HABERL

Ernst Späth, Zur Synthese des ψ -Ephedrins. (Vgl. Ber. Dtsch. Chem. Ges. 57. 1687; C. 1924. II. 2404.) Im Anschluß an Arbeiten von FOURNEAU, PUYAL u. KANAO (Bull. Soc. Chim. de France [4] 35. 614; C. 1924. II. 2404.) denen einige frühere Ergebnisse des Vfs. mit GÖHRING (Monatshefte f. Chem. 41. 319; C. 1921. I. 241) angezweifelt werden, hat Vf. die in Frage gestellten Punkte nachgeprüft u. in allen Stücken bestätigt gefunden, so daß die von FOURNEAU ohne jede experimentelle Begründung erhobenen Zweifel hinfällig sind. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58. 197–99. Wien, II. Chem. Lab. d. Univ.)

R. Feldtkeller und **R. Walter**, Strukturbeobachtungen an der zweiten kryogenen Phase des Anisal-*p*-aminozimtsäureäthylesters. Der Anisal-*p*-aminozimtsäureäthylester bildet drei, möglicherweise auch vier verschiedene krystall.-fl. Modifikationen. Phase I. erscheint dünnfl., schlierig, zwischen Objektträger u. Deckglas optisch einachsigt aufgerichtet; II. ist zähfl., unter den gleichen Bedingungen wie I. zwischen zwei Glasplatten nicht aufgerichtet u. tritt in Stäbchen oder scheinbar marmorierten Formen auf; IIIa., ein krystallines Harz, behält bei seiner B. die Form des Gefäßes ziemlich bei; IIIb. ist in seiner Sonderstellung neben IIIa. noch nicht vollständig sicher. Bei der Entstehung von II. aus I. durch Abkühlung ordnen sich die Krystallstäbchen parallel der Glasfläche, zunächst in allen möglichen Richtungen. Bei Präparaten ohne Deckglas setzt dann die richtende Wrkg. der Substanzoberfläche ein; ein großer Teil der Stäbchen verschwindet u. verschmilzt zu einer für das Auge strukturlosen, doch einachsigt aufgerichteten Krystallmasse, während die vorher teilweise sternförmig geordneten Stäbchen größtenteils zu kreisförmigen Gebilden zusammenlaufen. Es kommt eine hügelige oder wellige Oberfläche der krystallinen Fl. zustande. Benutzt man dagegen ein Deckglas, so äußert sich die Wrkg. ebenso wie die Glasunterlage sofort seine parallelisierende Wrkg. Hierbei entstehen die marmorierten Formen. (Ztschr. f. Krystallogr. 60. 349–60 1924. Halle, Univ.)

ZAT

Marcel Sommelet, Untersuchungen in der Diphenylmethanreihe. Über Trimethylaminbenzhydrylammmoniumbromid. (Vgl. C. r. d. l'Acad. des sciences 175. 1149; C. 1924. III. 146.) Genanntes Bromid (I) entsteht aus CH_3Br u. Dimethylbenzhydrylamin in Bzl., oder aus Diphenylbrommethan u. Trimethylamin in Bzl.; II. in CHCl_3 u. W. in A., wl. in Bzl. u. Ä.; beim Umkrystallisieren aus A.-Ä. werden Krystalle, die 1 Mol. H_2O enthalten, das durch langes Trocknen bei 100° abgegeben wird. Dem Vers., das Krystallwasser durch Erhitzen auf $130\text{--}140^\circ$ zu entfernen, widersteht Zers. ein; als Spaltprodd. bilden sich Benzhydroläther u. Trimethylaminbromid. Die Entstehung dieser beiden Verb. wird durch das Krystallwasser bedingt.

Einfluß dissoziiert **I** nach a, das entstandene Benzhydrol reagiert mit nicht dissoziiertem **I** nach b. Daß die Zers. so erfolgt, ergibt sich daraus, daß **I** beim Erhitzen mit W. nach a) zerfällt, u. daß durch Erhitzen von **I** mit Benzhydrol auf 130° die nach b) zu erwartenden Reaktionsprodd. gebildet werden. — Einw. des Milchsäureesters auf **I** bei 125° u. Verseifung des gebildeten Esters führt zu Benzhydrolmilchsäure, $(C_6H_5)_2CH \cdot O \cdot CH \begin{smallmatrix} COOH \\ \diagup \\ CH_3 \end{smallmatrix}$, F. 131°; Ba-Salz krystallisiert mit 2 H₂O. — Aus **I** u. tert. Amylalkohol wurden nur Benzhydrol u. Benzhydroläther erhalten. — Außer der l. c. angegebenen Erklärung für den Mechanismus der Einw.

a) **I** $(C_6H_5)_2CH \cdot N(CH_3)_3Br + H_2O = (C_6H_5)_2CHOH + (CH_3)_3N, HBr$
 $(C_6H_5)_2CH \cdot N(CH_3)_3Br + (C_6H_5)_2CHOH = [(C_6H_5)_2CH]_2O + (CH_3)_3N, HBr$
 In Alkoholen auf **I** könnte man auch annehmen, daß **I** in $N(CH_3)_3Br$ u. $(C_6H_5)_2CH \cdot$ zerfällt u. daß durch Anlagerung des Alkohols aus letzterem der Benzhydroläther entsteht. Zers. von **I** alleine in der Hitze müßte dann zur B. von Tetraphenyläther führen; ein Vers. ergab jedoch nicht diese Verb., sondern ein Gemisch von Trimethylamin, Dimethylbenzhydroläther u. ihren Bromhydraten, sowie Tetraäthyläther u. anscheinend Diphenylmethan neben harzigen Prodd. (C. r. d. l'Acad. des sciences 180. 76—79.)

HABERLAND.


W. R. Orndorff und C. V. Shapiro, Die Dimethyl- und Diäthyläther von Phenolsulfonphthalein und o-Kresolsulfonphthalein. (Vgl. ORNDORFF u. SHERWOOD, Journ. Americ. Chem. Soc. 45. 486; C. 1923. III. 210.) Die l. c. genannten Äther des Phenolsulfonphthaleins sind nicht die Monoäther, sondern, wie sich jetzt aus der Best. der OCH_3 - u. OC_2H_5 -Gruppen ergeben hat, die Dimethyl- u. Diäthyläther. Die entsprechenden Äther des o-Kresolsulfonphthaleins werden gleichfalls als farblose Verbb. erhalten beim Kochen des Phthaleins mit CH_3OH bezw. H_2SO_4 u. HCl oder H_2SO_4 . Die farblosen Dimethyläther beider Phthaleine entstehen auch durch Kochen mit CH_3OH alleine. Die farblosen Äther haben lactoide Natur, sie absorbieren weder NH_3 , noch HCl ; beim Erhitzen über den F. werden ihnen Gewichtsverlust zu erleiden, in die farbigen chinoiden Äther übergeführt; die farbigen Dimethyläther sind unbeständig, beim Behandeln mit CH_3OH gehen sie wieder in die farblosen Äther über.

Versuche. Phenolsulfonphthaleindimethyläther, $C_{19}H_{12}O_3S(OCH_3)_2$, Darst. des farblosen Äthers vgl. l. c. unter Phenolsulfonphthaleinmonomethyläther; die dort angegebenen Eigenschaften sind wie folgt zu berichtigen: der farblose Äther ist in CH_3OH u. A., Lsg. rot; l. in Aceton, Bzl., Chlf. u. Essigester, Lsgg. farblos. In n. Ä., Lsg. farblos, swl. in W., unl. in PAe.; Lsg. in Eg. rot, hieraus krystallisiert der farblose Äther; farbiger Dimethyläther erhalten durch $\frac{1}{2}$ -std. Erhitzen des vorigen im CO_2 -Strom auf 180°, rot; absorbiert, wie voriger, kein NH_3 ; zerfällt durch Kochen mit 5%ig. NaOH vollständig verseift zu Phenolsulfonphthalein, $C_{19}H_{12}O_5S$; ein Na-Salz des Mono- oder Dimethyläthers bildet sich hierbei nicht; Verseifung findet auch durch sd. W. oder sd. HCl statt. Der Dimethyläther zerfällt was l. in 5%ig. NaOH, Lsg. gelb; Lsg. in k. Anilin rot, beim Kochen blau gelblich grün werdend unter Abscheidung grüner Krystalle von Diphenylsulfonphthalein (vgl. l. c.). Lsg. des Äthers in k. Dimethylanilin gelb, beim Erhitzen etwas dunkler werdend; Lsg. in Pyridin ebenfalls gelb, keine Veränderung beim Kochen. — Phenolsulfonphthaleindiäthyläther, $C_{19}H_{12}O_3S(OC_2H_5)_2$, farblose Verbb.: Darst. mittels A. + H_2SO_4 , nach dreimaligem Umkrystallisieren aus A. ein wenig CH_3OH u. dreimal aus Ä. umkrystallisiert; F. 124—126°, die Krystalle zerfallen nach dieser Behandlung schwach rötlich gefärbt; Verh. gegen Lösungsmittel etc. wie der Dimethyläther; farbige Form: aus voriger durch Erhitzen auf 171° der F., der l. c. für den Monoäthyläther angegeben wurde (171°), war der Dimethyläthers, der sich bildet, wenn der Diäthyläther mit CH_3OH behandelt

wird. — *o*-Kresolsulfonphthaleindimethyläther, $C_{21}H_{16}O_3S(OCH_3)_2$, farblose Nadeln, durch Kochen mit CH_3OH ; nacheinander aus Ä., Eg. wieder Ä. umkrystallisiert, F. 167° ; Lsgg. in CH_3OH , Ä., Eg., Aceton u. Essigester rot, in Ä., Xylol farblos; wl. in W., unl. in PAe., absorbiert kein HCl; rote Form: Erhitzen der vorigen auf 190° , absorbiert bei 4-std. Stehen in HCl-Atmosphäre zwischen 1 u. 2 HCl; Chlorhydrat, $C_{21}H_{16}O_5S(OCH_3)_2 \cdot HCl$, hellgrün, verliert beim Stehen im Vakuum. Der farblose Dimethyläther ist l. in k. 10%ig. Lsg. gelb; Lsg. in k. verd. HCl rötlich; durch Kochen beider Lsgg. Verseifung zu Diäthyläther des *o*-Kresolsulfonphthaleins, $C_{21}H_{16}O_3S(OC_2H_5)_2$, farblose, krystallisiert aus Eg. mit 1 Mol. Krystall-Eg., F. $99-101^\circ$; aus PAe. wird der Äther erhalten, Tafeln, F. $131-132^\circ$, ll. in CH_3OH , Aceton, Essigester, Ä., Xylol, l. in Ä., Eg., CCl_4 , Chlf., PAe., wl. in W.; Lsg. in HCl rötlich, in Alkali gelb, beim Kochen beider Lsgg. Verseifung; keine Absorption vor oder NH_3 ; rote Form: aus voriger durch Erhitzen auf 140° (CO_2 -Atmosphäre) absorbiert 3 Mol. NH_3 u. 2 Mol. HCl, $C_{21}H_{16}O_3S(OC_2H_5)_2 \cdot 2HCl$; beide Gase beim Stehen über H_2SO_4 bzw. KOH abgegeben, indem die rote Form zu gelber umgewandelt wird. (Journ. Americ. Chem. Soc. **46**. 2856—60. 1924. Ithaca [CORNELL Univ.] HABERLAND)

Walter C. Holmes, *Der Einfluß konstitutioneller Veränderung einiger generierter Fluoresceinderivate auf die Absorption und die Stabilität gegen Wasserstoffionen*. Die Best. der Absorptionsmaxima der Dikaliumsalze nachgenannter Stoffe in W. u. A. (eingeklammerte Zahlen) führte zu folgenden Werten: Fluorescein 490 (499) $\mu\mu$; Dibromfluorescein 505 (510); Eosin 516 (523); Erythrosin 524 (528); Tetrachlorfluorescein 509,5 (520); Tetrabromfluorescein 510 (521); Tetraiodfluorescein 511 (522); Tetrachloreosin 537,5 (549); Tetrabromeosin 539 (550); Tetraioderythrosin 540 (551); Tetrachlorerythrosin 548 (557); Tetraioderythrosin 550 (558); Dibromerythrosin 549,5 (556,5). Aus diesen Daten ergibt sich, daß eine Verschiebung der Absorptionsmaxima infolge Halogensubstitution eintritt; diese Verschiebung, je nach Art des Halogens wechselt, ist auch dann deutlich, wenn der Phthalanhydridrest substituiert wird u. zeigt sich noch ausgeprägter, wenn die Substitution innerhalb der Resorcinreste stattfindet. Substitution in den 1- u. 8-Stellung der Resorcinreste ist ohne merklichen Einfluß auf die Absorption. Die Annahme von MOIR (Trans. Roy. Soc. S. Afr. [3] **10**. 159 [1922]), daß das Absorptionsmaximum eines Br-Deriv. mittels eines besonderen Faktors für jede Stellung im Molekül dem Br-freien Prod. berechnet werden kann, konnte Vf. an den vorliegenden Beispielen nicht bestätigen; ebenso wenig ließ sich das Absorptionsmaximum eines Halogenderiv. aus einem anderen Halogenderiv. rechner. vorausbestimmen. Halogensubstitution in den Resorcinresten vermehrt die Stabilität wss. Lsgg. von Farbstoffen gegen Wasserstoffionen; Substitution im Phthalanhydridrest hat den gegengesetzten Wrkg. Die Beständigkeit der Farbstoffe gegen Säuren wird vermindert beim Ersatz von J durch Br u. von Br durch Cl. (Tabelle im Original.) (Journ. Americ. Chem. Soc. **46**. 2770—75. 1924. Washington, Bur. of Chem.) HABERLAND


A. Orechow und Max Roger, *Über die Semipinacolidesaminierung von Aminoalkoholen*. (Vgl. ORECHOW u. TIFFENEAU, C. r. d. l'Acad. des sciences **1619**; C. **1924**. II. 650.) PAAL u. WEIDENKAFF (Ber. Dtsch. Chem. Ges. **35**. 2122. 1902.)




6) hatten durch Einw. von HNO_2 auf 1,1-Diphenyläthanolamin-2 (I) eine Verb. erhalten, die sie als a. Diphenyläthylenoxyd ansahen. Vff. haben jetzt gefunden, dieses Prod. Desoxybenzoin (IV) ist. Seine Entstehung erklären Vff. damit, daß durch Einw. von HNO_2 auf I erhaltene Prod. II unter Abspaltung von H_2O in die unbeständige Verb. III übergeht, die sich sofort zu IV umlagert. Die eignet sich gut zur Feststellung der Wanderungsmöglichkeit verschiedener kate, wobei aus einem Aminoalkohol V durch Einw. von HNO_2 sowohl VI, als VII entstehen können. Es wurde demgemäß *p*-Methoxy-1,1-diphenyläthanolamin-2 (V, $\text{R} = \text{C}_6\text{H}_5$, $\text{R}' = \text{C}_6\text{H}_4\text{OCH}_3$) mit HNO_2 behandelt u. *p'*-Methoxydesoxybenzoin (VI, $\text{R} = \text{C}_6\text{H}_5$, $\text{R}' = \text{C}_6\text{H}_4\text{OCH}_3$), F. 98–99°, erhalten, ein Zeichen dafür, die $\text{OCH}_3\cdot\text{C}_6\text{H}_4$ -Gruppe sich leichter umlagert als die C_6H_5 -Gruppe. (C. r. d. acad. des sciences 180. 70–73.)

HABERLAND.

G. R. Levi und G. Natta, *Einwirkung des Aluminiumsulfids auf einige organische Verbindungen*. Al_2S_3 zeigt bei der Einw. auf organ. Verbb. neben der dehydratisierenden Wrkg. (B. von Al_2O_3 u. H_2S) Ersatz des O der Verbb. durch S; katalysierende Wrkg. (wie bei AlCl_3) wurde nicht beobachtet. Der Austausch des gegen O wird erklärlich durch die Gleichungen:



dehydratisierende Wrkg. ist ebenfalls mit starker Wärmetönung verbunden:



Aromat. KW-stoffe (Bzl., Toluol) reagieren bei Tempp. dicht über ihrem Kp. mit Al_2S_3 ; bei Tempp. zwischen 800 u. 900° werden die Benzoldämpfe durch Al_2S_3 teilweise zers. unter B. von Kondensationsprodd. u. Abscheidung von C. am dem Reaktionsprod. ließen sich durch fraktionierte Dest. u. Krystallisation Diphenyl, Phenanthren u. Triphenylen isolieren, jedoch keine S-haltigen Prodd. diese Zersetzungswrkg. keine spezif. Wrkg. von Al_2S_3 ist, ergibt sich daraus, die Rk. in Ggw. anderer poröser Stoffe (Bimsstein), aber in Abwesenheit von Al_2S_3 in demselben Sinne verläuft. Die Ausbeute an Diphenyl aus 40 g Bzl. betrug in beiden Fällen 6,8–6,9 g bei 800°. — Ganz anders ist die Einw. auf O-haltige Subst. sowohl der aliphat., als auch der aromat. Reihe. Phenole u. Naphthole werden dehydratisiert, indem sich aus zwei Moll. ein Mol. Diphenyl- bzw. Diäthyläther bildet: $6\text{C}_6\text{H}_5\text{OH} + \text{Al}_2\text{S}_3 = \text{Al}_2\text{O}_3 + 3(\text{C}_6\text{H}_5)_2\text{O} + 3\text{H}_2\text{S}$. Die Rk. verläuft schnell bei Tempp., die nur wenig über den Kpp. der Phenole liegen. — Bei Alkoholen der Fettreihe verläuft die Rk. nach dem Schema:



oder B. der entsprechenden Mercaptane; bei höheren Tempp. bilden sich daneben auch. Beim A. begann die Zers. bei 200°. Die Dauer des Vers. betrug drei Stunden für 40–50 ccm A. Der %-Gehalt an unverändertem A. sank von 17,5% (250°) auf 2,9% (360°), die Ausbeute an Äthylmercaptan stieg in dem gleichen Temperaturintervall von 12,5 auf 39,1%, die von Äthylsulfid stieg von 10,7% (310°) auf 18,5% (360°); daneben bildeten sich bei höherer Temp. höher sd. Subst. Unter 300° traten auch Organoaluminiumverbb. auf. Methylalkohol gab bei 300° 40–45% Methylmercaptan u. 15% Methylsulfid, *n*-Propylalkohol gab bei 300° 32,5% Propylmercaptan (Kp. 67–68°) u. 7,5% Propylsulfid (Kp. 142°) u. 11,3% unveränderten Alkohol. — Aliphat. Äther reagieren leicht mit Al_2S_3 , indem sie O gegen S austauschen unter B. der entsprechenden Sulfide. Daneben bilden sich auch Teil auch höher sd. Kondensationsprodd. Der Gehalt des Reaktionsprod. an unverändertem Ausgangsmaterial betrug bei Ä. 67,5% (300–330°) u. 10,1% (425°), die Ausbeute an Äthylsulfid betrug bei 300–330°: 23,1%, bei 350–375°: 44,0% u. bei 400–425°: 11,5%. (Gazz. chim. ital. 54. 973–77. 1924. Mailand, Politecn.) ZAN.

F. M. Rowe und V. J. Tarbett, *Hydrierung in der Naphthalinreihe. Eigenschaften der hieraus abgeleiteten Azofarbstoffe*. Die Hydrierung von Naphthalin u. VII. 1.

Naphthalinderivv. wird geschichtlich besprochen u. im Anschluß daran eine von Vff. neu dargestellter Azofarbstoffe von ar.-Tetrahydronaphthalinderivv. beschrieben. — Als Ausgangs- bzw. Zwischenverb. wurden angewandt: 1. ar.-hydro- α -naphthylamin, 2. 4-Nitro-ar.-tetrahydro- α -naphthylamin, dargestellt durch Nitrieren von Benzyliden-ar.-tetrahydro- α -naphthylamin, 3. ar.-Tetrahydro- α -naphthalin-4-sulfonsäure, 4. Naphthalin- α -azo-ar.-tetrahydro- α -naphthylamin, aus ar.-Tetrahydro- α -naphthalin, aus PAe. rote Nadeln, F. 135°; bei der Darst. entstehen gleichzeitig weißliche l. orange gelbe Nadeln, F. 118° (vgl. BAMBERGER u. BORDT, Ber. Dtsch. Chem. Ges. **22**, 625 [1885]); 6. ar.-Tetrahydronaphthalin- α -azo-ar.-tetrahydro- α -naphthylamin aus PAe. bräunlichrote Nadeln, F. 141°; nebenbei entstehen weniger l. dunkelrote Nadeln, F. 172° (vgl. MORGAN u. RICHARDS, Journ. Soc. Chem. Ind. **24**, 652 [1905]). Zum Vergleich wurden Farbstoffe aus den nichthydrierten Naphthalinderivv. analogen Benzolderivv. dargestellt. A. Salicylsäure kuppelte a) mit diazotiertem Farbstoff aus Eg. gelblichrote Nadeln, F. 215° (Zers.), chromgebeizte Wolle wird orangebraun gefärbt; b) mit diazotiertem 4-Nitro- α -naphthylamin; Kupplungsprodukt aus Eg. rote Nadeln, F. 196° (Zers.); chromgebeizte Wolle wird braun gefärbt; c) mit diazotiertem p-Nitroanilin; Farbstoff (Alizarin gelb R) aus Eg. hellrote Nadeln; chromgebeizte Wolle rötlichbraun färbend; die Haltbarkeit der Färbungen ist mit allen Farbstoffen fast gleich, gegen Alkali u. Weißbleiche ist a) beständiger als b). B. Chromotropsäure kuppelte a) mit diazotierter 1., der Farbstoff färbt Wolle aus saurem Bad hell kirschrot, durch Nachchromieren rötlich violett werdend; b) mit diazotiertem α -Naphthylamin; der Farbstoff (Chromotrop 10B) färbt Wolle aus saurem Bad rötlichviolett, durch Nachchromieren bläulichschwarz werdend; c) mit diazotiertem Anilin; Farbstoff (Chromotrop 2R) färbt Wolle aus saurem Bad dunkelblaurot, durch Nachchromieren schwärzlichviolett werdend; a) war gegen Alkali weniger echt als b). — C. a) Diazotierte Sulfanilsäure + α -Naphthylamin; b) diazotierte 3. + α -Naphthylamin; c) diazotierte Sulfanilsäure + 1.; d) diazotierte 3. + 1. Die Na-Salze dieser vier Farbstoffe waren gelblichbraune Tafeln; a—c waren gegen Säuren empfindlich; Ausfärbung mit a) dunkel orangebraun; mit b) rötlichorange; mit c) hell orange; mit d) rötlichorange. Die Einführung eines Tetrahydro-naphthalinrestes vermindert die Löslichkeit, erhöht das Egalisierungsvermögen, vermindert die Empfindlichkeit gegen Säuren u. erhöht die Reib-, Alkali- u. Bleichechtheit. — D. a) Diazotiertes 2. + H-Säure in saurer Lsg. gekuppelt u. es wird ein tief purpurschwarz gefärbt; b) Naphthol-Blauschwarz (diazotiertes p-Nitroanilin) + H-Säure in saurer Lsg. gekuppelt, dieses Prod. in alkal. Lsg. mit diazotiertem Anilin gekuppelt; Wolle wird grünlichschwarz gefärbt; Echtheit beider Farbstoffe fast gleich, a) ist weniger reibeht. — E. α -Naphthol-3,6-disulfonsäure gekuppelt a) mit diazotiertem 6.; b) mit diazotiertem 5.; c) mit diazotiertem 4.; d) mit diazotiertem Naphthalin- α -azo- α -naphthylamin; e) mit diazotiertem Aminoazobenzol (Crocetin AZ); Ausfärbungen auf Wolle (aus saurem Bad) sind mit a—d) dunkelbrauner u. schwächer als mit e); die Unterschiede treten beim Färben von Baumwolle aus Al- oder Na₂SO₄-Bad noch deutlicher hervor. (Journ. Soc. Dyers & Colourists **41**, 5—8. Manchester, Coll. of Techn.)

HABERLAP.


Marston Taylor Bogert und John J. Ritter, Untersuchungen über ungesättigte Ketosäuren. I. Die Konstitution der sogenannten „Pechmannschen Stoffe“ und der Mechanismus ihrer Bildung aus β -Benzoylacrylsäure. Kurzes Mittheilung nach Proc. National Acad. Sc. Washington vgl. C. **1924**, II. 2332. Aus dem experimentellen Teil ist folgendes nachzutragen: Diphenacylmaleindilacton, C₂₀H₁₂O₄ (Konstitutionsformeln vgl. I. c.), Darst. durch 1-std. Kochen von 100 g β -Benzoylacrylsäure + 150 g Acetanhydrid, aus Diphenacylmaleinsäure durch Kochen

(lin.) mit überschüssigem Acetanhydrid, oder nach dem Verf. von KUGEL (vgl. e aus Xylol dunkelrote, tief blau schimmernde Nadeln oder Tafeln, unl. in eualen Mitteln, sublimiert bei starkem Erhitzen; Lsg. in konz. H_2SO_4 grünlich- beim Stehen tief blau werdend; durch Zusatz von W. wird die Verb. un- ert ausgefällt; durch 2-std. Kochen mit überschüssigem Acetanhydrid, durch rminen oder wiederholtes Umkrystallisieren aus Xylol entsteht das trans- ore (VI). — *Diphenacylfumarsäuredilacton* (Pechmannscher Farbstoff), $\text{C}_{20}\text{H}_{12}\text{O}_4$ (VI), r 2—3-std. Kochen von 1 Teil Benzoylacrylsäure mit 1,5 Teilen Acetanhydrid, usute 10—25%; aus Xylol tief rote bronzeglänzende Tafeln, wl. in neutralen it n; Bzl.-Lsg. fluoresciert goldgelb, durch Zugabe von Lsg. wird die Fluorescenz rft. Sublimiert beim Erhitzen. Lsg. in konz. H_2SO_4 kobaltblau, durch Zugabe n V. wird VI unverändert ausgefällt. Die blaue Lsg. wird nach 24-std. Stehen t. Die Verb. entsteht ebenfalls, wenn Benzoylacrylsäure über F. oder mit HOCl , SnCl_4 , PCl_3 , PCl_5 , POCl_3 , H_2SO_4 u. AlCl_3 erhitzt wird. Bei der Darst. n VI wurde beim Erhitzen von 75 g Benzoylacrylsäure + 115 g Acetanhydrid (n.) nach Entfernung von VI u. Zugabe von A. zum Filtrat ein seiner Konst. noch nicht aufgeklärtes Nebenprod. erhalten als hellrotes Pulver, ll. in Acet- hrid, Chlf., Äthylenbromid u. Eg., l. in Essigester, Bzl. u. Toluol, unl. in W. ; im Gegensatz zu VI wird dieses Prod. durch sd. 10%ig. NaOH in *Aceto-* n u. teerige Prodd. gespalten. — *Diphenacylfumarsäure*, $\text{C}_{20}\text{H}_{16}\text{O}_6$ (VII), durch oden von 10%ig. alkoh. KOH (1 Teil VI + 1,2 Teile KOH) entsteht ein Ge- si von VII u. VIII, trennbar durch fraktionierte Krystallisation aus 95%ig. A. or VII leichter l. ist; hellgelbe Nadeln, die bei 130—140° ohne zu schmelzen l (vgl. unten) übergehen; aus Essigester gelbe Prismen, unl. in W., l. in organ. itta, Lsg. in wss. Alkali tief rot; beim Kochen mit Acetanhydrid entsteht IX. — *ipnacylmaleinsäure*, $\text{C}_{20}\text{H}_{16}\text{O}_6$ (VIII), aus sd. Bzl. (worin wl.) farblose Blättchen, i 10° ohne F. allmählich dunkel werdend, l. in Essigsäure u. -Ester, sonst wl. can. Mitteln; mit sd. Acetanhydrid entsteht V; Lsg. in Alkali tief rot. — *Di-* *erylfumarsäuredilactid*, $\text{C}_{20}\text{H}_{14}\text{O}_4$ (IX), durch 1-std. Kochen von VII mit über- üßigem Acetanhydrid; aus Xylol orangefarbene Nadeln, beim Erhitzen subli- end; Lsg. in konz. H_2SO_4 bräunlichrot, in alkoh. KOH hellrot. — Beim Kochen n *Benzoyl- α -methylacrylsäure* mit überschüssigem Acetanhydrid entsteht eine lb Lsg., aus der durch Zugabe von W. eine gelbe Verb. noch unbekannter n. erhalten wird, unl. in organ. Mitteln außer Chlf., Lsg. in h. 10%ig. NaOH au — *Di- α -naphthacylfumarsäuredilacton*, $\text{C}_{28}\text{H}_{16}\text{O}_4$, aus β -(α -Naphthoyl)acryl- ur + Acetanhydrid; aus Xylol fast schwarze, bläulich glänzende Nadeln, bei h Temp. schm. unter Zers.; Lsg. in konz. H_2SO_4 tief blau. — *Di- β -naphthacyl-* *säuredilacton*, $\text{C}_{28}\text{H}_{16}\text{O}_4$, dunkelrote Nadeln. (Journ. Americ. Chem. Soc. 46. 71-78. 1924. New York, Columbia Univ.)

HABERLAND.

. A. Jacobson und Roger Adams, *Polyoxymethylanthrachinone*. IV. Kon- sion von Opiansäure mit substituierten Phenolen. Orientierung bei der Dar- llig von Anthrachinonen. (III. vgl. Journ. Americ. Chem. Soc. 46. 1312; C. 24. II. 650.) Kondensation von Opiansäure, die in der tautomeren Form I ght, mit *p*-Bromkresol in Ggw. von konz. H_2SO_4 führt zu dem Phthalid II, urch Red. mittels Zn + NaOH unter gleichzeitiger Abspaltung von Br über- ata III. Die Möglichkeit II zu einem Benzylbenzoesäurederiv. zu reduzieren, g daß eine zur CH-Gruppe im Phthalid *p*-ständige OCH_3 -Gruppe (vgl. BISTR- u. ZEN-RUFFINEN, *Helv. chim. Acta* 3. 369; C. 1920. III. 385) die Red. h infolge ster. Hinderung unmöglich macht, u. daß die Nichtreduzierbarkeit der a STRZYCKI aus Opiansäure u. o-Kresol etc. erhaltenen Prodd. auf andere Um- n zurückgeführt werden muß. Durch Einw. konz. H_2SO_4 auf das Br-Deriv. irsteht das Anthron V, das durch Oxydation in das Anthrachinonderiv. VI


übergeführt werden kann. Wenn *Morindon* sich tatsächlich als 1,2,5-*Trimethylanthrachinon* erweisen sollte, so wäre **VI** der *Bromdimethyläther des Morindon* auf eine Verwandtschaft zwischen **VI** u. *Morindon* deutet die ähnliche Farbe, die mit konz. H_2SO_4 eintritt.



Versuche. 5,6-Dimethoxy-2-(2'-oxy-3'-methyl-5'-bromophenyl)-phthalid, $\text{C}_{17}\text{H}_{13}\text{O}_5$ (**II**), aus 25 g Opiansäure + 22,5 g p-Brom-o-kresol durch allmähliche Zugabe von 65 ccm 85%ig. H_2SO_4 (unter Rühren); die M. erstarrt im Laufe von 10–15 Min. nach Waschen mit W. aus Eg. (oder A.) weiße Nadeln, F. 204–205°. — 5,6-Dimethoxy-2-(2'-oxy-5'-bromophenyl)-phthalid, $\text{C}_{16}\text{H}_{13}\text{O}_5\text{Br}$, aus **I** + p-Bromphenol in Essigsäure weiße Nadeln, F. 219–220°. — 5,6-Dimethoxy-2-(2'-oxy-3'-methyl-5'-bromophenyl)-benzoesäure, $\text{C}_{17}\text{H}_{13}\text{O}_5$ (**III**), aus 25 g **II** in 500 ccm 10%ig. NaOH + 75 g Zink durch 15-stdg. Kochen; aus Toluol weiße, rechteckige Tafeln, F. 137–138°. — 5,6-Dimethoxy-2-(2'-oxybenzyl)-benzoesäure, $\text{C}_{16}\text{H}_{16}\text{O}_5$, aus Toluol oder Bzl. kleine ovale Krystalle, F. 138,5–140°. — 5,6-Dimethoxy-2-(2'-oxy-3'-methyl-5'-bromophenyl)-benzoesäure; $\text{C}_{17}\text{H}_{13}\text{O}_5\text{Br}$ (**IV**), durch Bromieren von **III** in Eg., weiße Nadeln, F. 190–191°. — 1,2-Dimethoxy-5-oxy-6-methyl-8-brom-9,10-dihydro-9-ketoon (V), aus 6,2 g **IV** + 60 ccm konz. H_2SO_4 durch 10 Min. langes Stehen bei gewöhnlicher Temp.; beim Aufgießen auf Eiswasser wurde ein schweres, gelbes, nicht krystallisierendes Öl erhalten. — 1,2-Dimethoxy-5-oxy-6-methyl-8-bromanthrachinon (**VI**), aus **V** in Eg. mittels CrO_3 ; aus Eg. gelbe Nadeln, F. 193–194°. Lsg. in konz. H_2SO_4 tiefblau. (Journ. Americ. Chem. Soc. **46**. 2788–93, 1924. Urbana [Ill.], Univ.)

D. van Os, *Furfurol*. Zusammenfassende Übersicht über Darst., physikal. chem. u. physiol. Eigenschaften u. Verwendungsmöglichkeiten dieses Aldehyds (Chem. Weekblad **22**. 18–20. Amsterdam.)

Adolf Sonn und Erich Patschke, Über die Darstellung von *Bz-Oxycumaron* und *Oxycumaron*. Aus 6-Oxycumaron-3 (I.) ließ sich über das Oxim u. das Oxid ein guter Ausbeute das 6-Oxycumaron (II.) gewinnen. Bei der katalyt. Hydrierung des Oxids unter Aufnahme von 2 Atomen H in Oxycumaron über. — 3,6-Bis-acetoxycumaron (III.) u. 3-Acetyl-6-methoxycumaron nahmen bei der katalyt. Red. leicht H auf.




Versuche. O¹-Methyl-O³-[β-oxyäthyl]resorcin. Aus Resorcinmonomethyläther u. Glykolchlorhydrin. Kp.₁₄ 153°; ll. in A., Ä. u. Essigester. — Phenylacetat $\text{C}_{16}\text{H}_{17}\text{O}_4\text{N}$. Aus Bzl. Prismen, F. 92°, ll. in A., Ä. u. Essigester, etwas schwer

Bzl., wl. in Lg. — Oxim des 6-Oxycumaranon-3, $C_8H_7O_3N$ (vgl. I.). Aus sehr A. oder W. Prismen, F. 158—159° (Zers.), ll. in A., Ä. u. Essigester, wl. in — 3-Amino-6-oxycumaronacetat. In A. + Eg. mit Na-Amalgam. red. F. 105 06°. — 6-Oxycumaron (II.). Beim Sieden der konz. wss. Lsg. des Acetats, — 6-Oxycumaron, ölig. — Benzoylderiv. Aus A. Prismen, F. 69—72°. — Carbazon des 6-Methoxycumaranon-3, $C_{10}H_{11}O_3N_3$ (vgl. I.). Aus A. gelbe Nadeln, 2° (Zers.). — 3,6-Bis-[acetyloxy]cumaron (III.). 6 g 6-Oxycumaron-3 werden 10 g Essigsäureanhydrid u. 60 g Acetylchlorid 5 Stdn. zum Sieden erhitzt. Die Eingießen in W. abgeschiedene M. wird mit 100 cem Methylalkohol erwärmt, Angelöste aus Aceton umkrystallisiert, F. 158—160°. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 1906—98. Königsberg in Pr., Univ.)

SONN.

Gustav Heller, Zur Konstitution des Indophenins. Die von SCHLENK u. BLUM (Ann. 433. 95; C. 1924. I. 183) aufgestellte Formel für das Indophenin widerspricht der Tatsache, daß bei allen Kondensationen des Isatins stets der am 4-Atom befindliche O in Aktion tritt. Die Ähnlichkeit des Farbstoffs mit dem Indigo, welche LIEBERMANN u. KRAUSS (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 40. 2500 [1907]) in der Annahme der α -Bindung veranlaßte, ist eine mehr zufällige. Der Farbcharakter der Indophenylgruppe wird lediglich bestimmt durch die chinoiden Doppelbindungen, denn einmal ist das Dibenzoylindophenin ebenfalls noch blau, N-Diacetylindophenin dagegen rot, u. ferner müßte der nach Ausschaltung der Thiophenreste aus dem Indophenin von SCHLENK u. BLUM verbleibende Dicarbintetracarbonsäure-Residuum $(CO_2C_2H_5)_2C:C(CO_2C_2H_5)_2$, wie der Indigo blau sein, während er farblos ist. Auch die Verküppbarkeit des Indophenins kann nicht zu gunsten der α -Bindung geltend werden, da auch Isoindigotin eine Leukoverb. bildet, für welche übrigens auch die von HANSEN (Ann. de Chimie [10] 1. 94; C. 1924. I. 2697) angegebenen Formel I. in Betracht kommt, denn Vf. hat neben dem Hauptprod. ein isomeres erhalten, das sich nicht zurückoxydiert. — Ein positiver Beweis für die β -Bindung liegt schließlich darin, daß kein β -Isatinderiv., wohl aber einige Isatinderiv. die Indopheninrk. geben. Auch das von REISSERT u. HESSERT (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 57. 970; C. 1924. II. 964) sogenannte Diacetylisatol- α -imid, das



unzweifellos als Diacetyl- α -isatinimid (II.) anzusehen ist, gibt die Rk. — Aus den vorgelegten Gründen erteilt Vf. dem Indophenin Formel III. (Ztschr. f. angew. Chem. 17. 1017—18. 1924. Leipzig, Univ.)



LINDENBAUM.

David E. Worrall, Die Einwirkung von Hydroxylamin und Hydrazin auf die α -Thioamide des Acetylmalonsäureäthylesters. II. (I. vgl. Journ. Americ. Chem. Soc. 45. 3092; C. 1924. I. 1532.) Als Fortsetzung der früheren Arbeiten von Worrall u. anderen aus Arylmonothioamiden des genannten Esters u. NH_2OH bzw. $NH_2 \cdot NH_2$ ausgehend aufgeführte Derivv. des 5-Oxyisoxazols u. 5-Oxypyrazols dargestellt. Diese sind ll. in w. A., letzte fast unl. in organ. Mitteln; beim Erhitzen werden sie zerf. unter Gasentw. gewöhnlich in schwarze, teerige M. übergeführt; mit

Säuren u. Basen werden Salze gebildet; die CH_2 -Gruppe ist reaktionsfähig. Verb. lassen sich leicht acetylieren u. benzoylieren.

Derivv. des 5-Oxyisoxazols: 3-o-Toluidinderiv., $\text{C}_{10}\text{H}_{10}\text{O}_2\text{N}_2$, federartige Nadeln, F. 146—147°. — 3-m-Toluidinderiv., $\text{C}_{10}\text{H}_{10}\text{O}_2\text{N}_2$, Nadeln, Zers. bei 160—161°. — 3-o-Anisidinderiv., $\text{C}_{10}\text{H}_{10}\text{O}_3\text{N}_2$, Nadeln, Zers. bei 173—174°. — 3-m-Anisidinderiv., $\text{C}_{10}\text{H}_{10}\text{O}_3\text{N}_2$, federartige Nadeln, F. 136°. — 3-p-Anisidinderiv., $\text{C}_{10}\text{H}_{10}\text{O}_3\text{N}_2$, Nadeln, Erweichen bei 120°, Zers. bei 146°. — 3-p-Phenetidinverb., $\text{C}_{11}\text{H}_{12}\text{O}_3\text{N}_2$, Nadeln, Zers. bei 150°. — 3-m-Bromanilinderiv., $\text{C}_9\text{H}_7\text{O}_2\text{N}_2\text{Br}$, Nadeln, Zers. bei 180°. — 3-p-Chloranilinderiv., $\text{C}_9\text{H}_7\text{O}_2\text{N}_2\text{Cl}$, Nadelchen, Erweichen bei 160°, Zers. bei 180°. — 3-p-Jodanilinderiv., $\text{C}_9\text{H}_7\text{O}_2\text{N}_2\text{J}$, federartige Nadeln, F. 173°. — 3- α -Naphthylamininderiv., $\text{C}_{13}\text{H}_{10}\text{O}_2\text{N}_2$, Nadelchen, Zers. bei 148—149°. — 3- β -Naphthylamininderiv., $\text{C}_{13}\text{H}_{10}\text{O}_2\text{N}_2$, gelbes Pulver, Zers. bei 146°. — 5-Oxypyrazolderivv.: 3-o-Toluidinderiv., $\text{C}_{10}\text{H}_{11}\text{ON}_3$, wie alle nachgenannten Verb. weiße Tafeln; Erweichen bei 100°, Zers. bei 223—224°. — 3-m-Toluidinderiv., $\text{C}_{10}\text{H}_{11}\text{ON}_3$, Zers. bei 250—251°. — 3-o-Anisidinderiv., $\text{C}_{10}\text{H}_{11}\text{O}_3\text{N}_3$, F. 199,5—200°. — 3-m-Anisidinverb., $\text{C}_{10}\text{H}_{11}\text{O}_3\text{N}_3$, F. 212,5—213°. — 3-p-Anisidinverb., $\text{C}_{10}\text{H}_{11}\text{O}_3\text{N}_3$, Zers. bei 205—206°. — 3-p-Jodanilinderiv., $\text{C}_{10}\text{H}_{13}\text{O}_2\text{N}_3$, Zers. bei 198—199°. — 3-m-Bromanilinderiv., $\text{C}_9\text{H}_9\text{O}_3\text{N}_3$, Zers. bei 271°. — 3-p-Chloranilinderiv., $\text{C}_9\text{H}_9\text{ON}_3\text{Cl}$, Zers. bei 249°. — 3-p-Jodanilinderiv., $\text{C}_9\text{H}_9\text{ON}_3\text{J}$, Zers. bei 222—223°. — 3- α -Naphthylamininderiv., $\text{C}_{13}\text{H}_{11}\text{ON}_3$, el. Tafeln, F. 214—215°. — 3- β -Naphthylamininderiv., $\text{C}_{13}\text{H}_{11}\text{ON}_3$, Zers. bei 239—240°. (Journ. Americ. Chem. Soc. **46**. 2832—34. 1924. Massachusetts, Tufts Coll.)

Arthur J. Hill und Henry R. Henze, Kondensationsreaktionen cyclische Hydantoine. I. Einwirkung von Isatin und α -Chlorisatin auf einige Hydantoine. In E. Lsg. in Ggw. von Na-Acetat kondensiert sich Isatin mit Hydantoin zu I, entsprechende Derivv. werden mit 3-Phenyl-2-thiohydantoin u. 3-Phenylhydantoin erhalten. Aus α -Chlorisatin u. Hydantoin entsteht II, ein analog konstituiertes Derivv. wurde mit 3-Phenyl-2-thiohydantoin erhalten. Parabansäure u. Hydantoin verhalten sich nicht kondensieren, woraus der aktivierende Einfluß einer C_6H_5 -Gruppe auf eine CO-Gruppe ersichtlich ist.



Versuche. Hydantoin- $\Delta^{5,9}$ -oxindol, $\text{C}_{11}\text{H}_7\text{O}_3\text{N}_3$ (I), Darst. durch 3-st. Hydantoin hitzen auf 150° in Ggw. von Na-Acetat (ohne dieses tritt keine Kondensation ein); rotbraun, F. über 300°, unl. in sd. Eg. u. Nitrobenzol, unl. in W. u. organ. Me. Lsg. in konz. H_2SO_4 tiefrot. — Hydantoin- $\Delta^{5,9}$ -pseudooxindol, $\text{C}_{11}\text{H}_7\text{O}_3\text{N}_3$ (II), schokoladenbraun, F. über 300°, in Eg. u. Nitrobenzol leichter l. als I. — 3-Phenyl-2-thiohydantoin- $\Delta^{5,9}$ -oxindol, $\text{C}_{17}\text{H}_{11}\text{O}_2\text{N}_3\text{S}$, entsprechend I aus 3-Phenyl-2-thiohydantoin dargestellt, F. ca. 300°, rotbraun. — 3-Phenyl-2-thiohydantoin- $\Delta^{5,9}$ -pseudooxindol, $\text{C}_{17}\text{H}_{11}\text{O}_2\text{N}_3\text{S}$, aus α -Chlorisatin analog vorigem dargestellt bei 125°, dunkelrot, über 300°, unl. in W. u. organ. Mitteln. — 3-Phenylhydantoin- $\Delta^{5,9}$ -oxindol, $\text{C}_{17}\text{H}_{11}\text{O}_3\text{N}_3$, aus Isatin + 3-Phenylhydantoin, gelbbrot, F. 300°, aus Nitrobenzol umkrystallisiert, unl. in h. A. u. Eg. (Journ. Americ. Chem. Soc. **46**. 2806—10. 1924. New York, [Conn.], Yale Univ.)


HABERLAND

Marston Taylor Bogert und Moses Chertcoff, Untersuchungen über Thiazole. VI. Eine neue Gruppe von Farbstoffen aus giftigen Gasen mit 2-Aminothiazole. Zwischenprodukten. Darstellung von Thiazolfarbstoffen vom Typus des Doebner'schen Violett. (IV. vgl. BOGERT u. SNELL, Journ. Americ. Chem. Soc. **46**. 1308; C. 1924. II. 656 u. S. 77.) Kurzes Ref. nach Proc. National Acad. Sc. Washington, D. C. 1925. I. 77. Nachzutragen ist aus dem experimentellen Teil der Arbeit folgendes:


di röm. Ziffern beziehen sich auf die l. c. angegebenen Konstitutionsformeln):
 2-*aminothiazol* (I, R = H), Darst. nach TRAUMANN (LIEBIGS Ann. **249**, 35 [1888])
 aus Dichloräther u. Thioharnstoff; F. 92° (korr.); kuppelt mit diazotiertem p-Nitro-
 benzol zu rotem Azofarbstoff. — 4-*Methyl-2-aminothiazol* (I, R = CH₃), aus Chlor-
 acetone + Thioharnstoff; nach Reinigung durch Vakuumdest. F. 42° (korr.); geht
 in Essigester über. — *Di-(4-methyl-2-aminothiazyl-5)-phenylmethan*, C₁₅H₁₆N₄S₂ (II, R = CH₃, Ar = C₆H₅), aus 2 Mol.
 4-Methyl-2-aminothiazol + 1 Mol. C₆H₅CHO + ²/₃ Mol. HCl durch 3-std. Erhitzen auf 145°;
 Bzl. bräunliche Krystalle, F. 180° (korr.) unter Zers. u. vorherigem Sintern; ll.
 in A., Aceton, Anilin, Diphenylmethan, wl. in Chlf., Bzl., Toluol, Xylol, unl. in
 W. alkoh. Lsg. mit PbO₂ u. HCl oxydiert gibt purpurrote Lsg. — 4-*Phenyl-2-*
aminothiazol (I, R = C₆H₅), aus Chloracetophenon; aus A. Nadeln, F. 152,5° (korr.);
 in sd. W., A., Ä. u. Bzl.; *Acetylderiv.* F. 212,3°; beim Vers. dieses zu nitrieren,
 die I (R = C₆H₅) erhalten; das Aminothiazol ließ sich über die Diazoverb.
 in das Nitril überführen. — 4-*Phenyl-2-p-nitrobenzalaminothiazol*, C₁₆H₁₀O₂N₃S,
 aus A. orangefarbene Nadeln, F. 156,8°.
 4-*Piperonal* trat keine Kondensation ein. — *Di-(4-phenyl-2-aminothiazyl-5)-phenyl-*
methan, C₂₅H₂₀N₄S₂ (II, Ar = C₆H₅, R = C₆H₅), aus A. rhomb. Tafeln, bei 181°
 unter Sinterung grau werdend, bei 207° Erweichen, F. 221° (korr.) unter
 Zers.; ll. in Essigester, wl. in A., Toluol, Xylol, swl. in Ä., Aceton, Bzl., unl. in
 W. bei der Oxydation mit KMnO₄ entsteht Benzoesäure, ebenso (neben wenig
 anderen Prodd.) bei der KOH-Schmelze; durch Diazotieren u. Kuppeln mit Amin-
 en, deren Sulfosäuren entstehen Azofarbstoffe; *Carbinol*, C₂₅H₂₀ON₄S₂, aus
 dem durch Oxydation mit PbO₂; aus Toluol dunkelrotes Pulver, F. 197,3° (korr.)
 unter Zers. u. vorherigem Sintern, unl. in Lg.; *Oxalat*, 2C₂₅H₁₈N₄S₂, 3C₂H₂O₄ (III,
 R = C₆H₅), aus dem Carbinol in Aceton durch Zusatz von C₂O₄H₂ u. NH₄-Oxalat;
 dunkelgrünes Pulver, l. in essigsäurehaltigem W.; Wolle u. tanningebeizte
 Wolle werden dunkelblaugrün gefärbt. — *Di-(4-phenyl-2-aminothiazyl-5)-p-*
nitrophenylmethan, C₂₅H₁₉N₄S₂Cl (II, Ar = C₆H₄Cl, R = C₆H₅), aus Aceton Nadeln
 prismat. Tafeln, bei ca. 148° (korr.) zu rötlicher M. sinternd, dann dunkler
 werdend, F. 203° (korr.) zu dunkelroter Fl.; mit PbO₂ in saurer Lsg. entstand das
 Carbinol, hieraus das *Oxalat*, 2C₂₅H₁₇N₄S₂Cl, 3C₂H₂O₄, dunkelgrünes Pulver, Wolle
 blaugrün färbend. — *Di-(4-phenyl-2-aminothiazyl-5)-o-nitrophenylmethan*, C₂₅H₁₉O₂N₅S₂
 (I, Ar = C₆H₄NO₂, R = C₆H₅), aus A. orangegelbe, prismat. Nadeln, F. 231,5°
 unter Zers., wl. in Chlf., sonst ll. in organ. Mitteln; mit PbO₂ in saurer
 Lsg. oxydiert entsteht eine blaugüne Lsg., die bald nach rot umschlägt. — *Di-(4-*
phenyl-2-aminothiazyl-5)-m-nitrophenylmethan, C₂₅H₁₉O₂N₅S₂, aus Bzl. mit 1 Mol. C₆H₆
 umkristallisierend, hellgelbe Rhomben, F. 202,3° (korr.) unter Zers. u. vorherigem
 Sintern; durch 24-std. Erhitzen auf 100° wird Krystallbenzol abgegeben; dieses
 aus A. umkristallisiert gibt dunkelgelbe Nadeln, F. wie vorher (ohne Sintern);
 Carbinol u. *Oxalat*, 2C₂₅H₁₇O₂N₅S₂, 3C₂H₂O₄, aus Aceton schwarzgrünes Pulver,
 dunkelblaugrün färbend. — *Di-(4-phenyl-2-aminothiazyl-5)-p-nitrophenylmethan*,
 C₂₅H₁₉O₂N₅S₂, aus CH₃OH grünlichgelbe Nadeln, F. 238,5° (korr.) unter Zers. u.
 vorherigem Sintern; ll. in CH₃OH, A. u. Aceton, l. in Bzl., Toluol, Xylol u. Chlf.,
 l. in W. *Oxalat*, 2C₂₅H₁₇O₂N₅S₂, 3C₂H₂O₄, Eigenschaften wie m-Isomeres. —
Di-(4-phenyl-2-aminothiazyl-5)-p-dimethylaminophenylmethan, C₂₇H₂₅N₅S₂ (II, Ar =
 H.N.C₆H₄, R = C₆H₅), aus A. farblose Nadeln, F. 235,8° (korr.) unter Zers. u.
 vorherigem Sintern; l. in CH₃OH, Aceton, Bzl., Xylol, verd. HCl u. Eg.; *Oxalat*,
 2C₂₇H₂₃N₅S₂, 3C₂H₂O₄, aus A. grünlichschwarzes Pulver, dessen blaugüne Lsg.
 durch überschüssige konz. HCl purpurrot wird; die ursprüngliche Farbe tritt bei
 Zugabe von W. wieder ein. — *Di-(4-phenyl-2-aminothiazyl-5)-o-oxyphenylmethan*,
 C₂₅H₁₉O₃N₄S₂ (II, Ar = C₆H₄OH, R = C₆H₅) aus Salicylaldehyd; aus A. Rhomben,

die bei 148° schrumpfen u. gelb werden, F. 222,5° (korr.) unter Zers., wl. in Chlf., sonst l. in organ. Mitteln; durch Oxydation mit PbO₂ entsteht eine rote des Carbinols; durch Schmelzen mit KOH (145–150°) wird NH₃ abgegeben, der Schmelze wird Benzoesäure isoliert. — *Di-(4-phenyl-2-aminothiazyl-5)-phenylmethan*, C₂₅H₂₀ON₄S₂, aus A. farblose Nadeln, die bei 248° (korr.) Färbung sintern, F. 252,4° (korr.) unter Zers.; Oxydation mit PbO₂ in saurer gibt grünlichbraune Färbung, hieraus das *Oxalat* als dunkelviolettes Pulver, *p-Nitrobenzoldazo-(4-phenyl-2-aminothiazol)*, C₁₅H₁₁N₅S (IV, Ar = NO₂·C₆H₄, R = aus Nitrobenzol grüne metall. glänzende Nadeln, F. 179,6°; Wolle wird rot gefärbt. II. in Nitrobenzol u. Anilin, wl. in sonstigen organ. Mitteln. — *p-Sulfobenzyl-(4-phenyl-2-aminothiazol)*, aus I (R = C₆H₅) + diazierte Sulfanilsäure; als dunkelrotes Pulver, wss. Lsg. karmoisinrot, beim Ansäuern hellgelb werdend; mit Zusatz von Alkali wird die ursprüngliche Färbung wieder hergestellt. (u. Americ. Chem. Soc. 46. 2864–71. 1924. New York, Columbia Univ.) HABER.

G. Charrier und M. Gallotti, *Phenylen-2-N-aryltriazolylenglykolsäuren*. I. Analogie zwischen den 2-N-Aryl- α,β -naphthotriazol-o-chinonen (I) u. dem o-naphthanthrenchinon zeigt sich auch in ihrem Verh. zu verd. alkal. Lsgg., durch welche in Glykolsäuren übergeführt werden. Bei den ersteren verläuft die Rk. nach folgendem Schema (I $\rightarrow$ II):






Die entstehenden *Phenylen-2-N-aryltriazolylenglykolsäuren* (II) sind farbl. sehr lichtempfindlich, ihre Farbe geht schnell in Gelb über. Durch Oxydation gehen sie in glänzende gelbe Verbb., wahrscheinlich die entsprechenden Ketone (III), über. Diese geben gut krystallisierte, lichtempfindliche Na-Salze, deren I. schwach fluoresziert. Diese Ketone sind als heterocycl. Analoga des Fluoranthens aufzufassen. — Durch Einw. von H₂O₂ in essigsaurer Lsg. werden die 2-N-Aryl- α,β -naphthotriazolchinone durch Ringöffnung in 2-N-Aryltriazolylphenyl-o'-dicarbonsäuren übergeführt (allgemeine Rk. der o-Chinone mit —CO—CO—Br):



Versuche. *Phenylen-2-N-phenyltriazolylenglykolsäure*, C₁₆H₁₁O₃N₃, aus 2-N-Phenyl- α,β -naphthotriazolchinon durch 5%ig. NaOH; die Farbe geht zunächst blaugrün über, nach längerem Sieden erfolgt Lsg. als Na-Salz. Die durch Zugabe gefällte Säure ist gelblichweiß, nach dem Umkrystallisieren farblos, wl. in A. sich bei 135°, ohne zu schmelzen. — *Na-Salz des Phenylen-2-N-phenyltriazolylenglykolsäuren*, C₁₆H₁₀O₃N₃Na·4H₂O, durch Oxydation aus vorigem, leuchtende Bläue aus W., F. gegen 200°, sehr lichtempfindlich. — *Phenylen-2-N-p-chlorphenyltriazolylenglykolsäure*, C₁₆H₁₀O₃N₃Cl·2H₂O, aus 2-N-p-Chlorphenyl- α,β -naphthotriazolchinon farblose Blättchen, F. 197–198° (Zers.), sehr lichtempfindlich, swl. in W., l. in Bzl., Chlf., zl. in Eg. u. A. — *Na-Salz*, C₁₆H₉O₃N₃ClNa·4H₂O, seidenartige Masse oder Blättchen, F. 252° (Zers.), wird durch Licht gelb gefärbt. — *Phenyl-2-N-phenyltriazolyl-o,o'-dicarbonsäure*, HOOC·C₆H₄·C₂N₃(C₆H₅)·COOH, aus 2-N-Phenyl- α,β -naphthotriazolchinon durch Oxydation mit H₂O₂ bei 90–95°, F. 242°, l. in W. — *Mononatriumsalz* mit 4H₂O, F. 325°. — *Phenyl-2-N-p-chlorphenyltriazolyl-o,o'-dicarbonsäure*, HOOC·C₆H₄·C₂N₃(C₆H₄Cl)·COOH, aus 2-N-p-Chlorphenyl- α,β -naphthotriazolchinon u. H₂O₂, F. 264–265°. (Gazz. chim. ital. 54. 982–88. 1924. Pavia, Univ.)









I. Nierenstein, *Die Konstitution des Catechins*. VII. 4,5,7,3',4'-Pentaoxyflavan. Vgl. HAZLETON u. NIERENSTEIN, Journ. Americ. Chem. Soc. **46**. 2100; C. 1924. 38.) Als Formel für Catechin ist u. a. von PERKIN (Journ. Chem. Soc. London 1905) 4,5,7,3',4'-Pentaoxyflavan (**III**) angegeben worden. Vf. hat diese Verb. stellt, indem 5,7,3',4'-Tetramethoxyflavanon (**I**) zu **II** reduziert u. diese Verb. I entmethyliert wurde. Das erhaltene Prod. ist in seinem Verh. von d,l-Acocatechin u. d,l,i-Acacatechin vollkommen verschieden: durch Kochen mit HJ tritt Zerstörung ein; in dieser Beziehung gleicht **III** dem Quercetin; wie dieses mit Fichtenholz + HCl keine Phloroglucinrk. Die Annahme FREUDENBERG (Ber. Dtsch. Chem. Ges. **53**. 1416; C. 1920. III. 714), daß die Catechine Verh. zwischen Flavonen, Anthocyaninen u. Tanninen sein sollen, wird den Nachweis der Nichtidentität von **III** mit Catechin hinfällig.



Versuche. 5,7,3',4'-Tetramethoxyflavanon (**I**), Darst. nach KOSTANECKI u. TAMBOUR (Ber. Dtsch. Chem. Ges. **37**. 793 [1904]), F. 157 bis 159°. — 4-Oxy-5,7,3',4'-tetramethoxyflavan, C₁₉H₂₂O₆ (**II**), aus 8 g des vorigen in 1000 cem 80%ig. sd. A. + 500 g Zn-Staub + 50 cem KOH (8 Stdn. auf sd. Wasserbad); hieraus erhaltenes K-Salz wird in W. H₂SO₄ zers.; aus A. Nadeln, F. 159—160°, l. in Essigester, viel Bzl. u. CS₂; s. sg. + FeCl₃ gibt Grünfärbung, durch k. KOH u. HCl keine Veränderung (Catechin unter denselben Bedingungen B. roter Zersetzungsprodd.); Suspension in H₂SO₄ mit FeCl₃ versetzt gibt Violettfärbung. — 4-Acetoxy-5,7,3',4'-tetramethoxyflavan, C₂₁H₂₄O₇, aus A. Nadeln, F. 171°. — 4,5,7,3',4'-Pentaoxyflavan, C₁₉H₁₈O₆ (**III**), aus **II** durch 6-std. Kochen mit überschüssigem HJ (D. 1,94), aus A. Nadeln mit 4H₂O, die im Vakuum über P₂O₅ bei 100° abgegehen werden, F. 212—214°, (geringe Zers. u. Gasentw.), l. in A. u. Essigester, wl. in Ä., unl. in CCl₄. — 4,5,7,3',4'-Pentaoxyflavan, C₂₅H₂₄O₁₁, aus A. Nadeln, F. 167°. Tabelle über die Konstitutionen von **III**, d,l-Acacatechin u. d,l,i-Acacatechin u. ihrer Derivv. vgl. Original. Ein Vergleich der FF. von **III** u. FREUDENBERGSchen Angaben über die Konstitutionen von ihm hergestellten Verb. ergibt sich, daß **III** u. d,l-Catechin, sowie 4-Acetoxy-5,7,3',4'-Pentaoxyflavan (**V**) u. FREUDENBERGS Pentaacetyl-d,l-catechin u. Pentaacetyl-d,l-epicatechin dieselben FF. haben. Es besteht daher die Möglichkeit, daß FREUDENBERGSchen Catechine tatsächlich in Beziehung zu **III** stehen; das Material, das FREUDENBERG seine Catechine isoliert hat, stammt wahrscheinlich nicht aus dem Acacia-catechinholz, da auch andere Acaciaarten zur Herst. von Catechin benutzt werden. (Journ. Americ. Chem. Soc. **46**. 2793—98. 1924.) HABERLAND.

F. Dean und **M. Nierenstein**, *Die Konstitution des Catechins*. VIII. 4,5,7,3',4'-Pentaoxy-2-benzyl-1,2-dihydrocumarone. (VII. vgl. vorst. Ref.) Genannte (**V**) sollte nach KOSTANECKI u. LAMPE (Ber. Dtsch. Chem. Ges. **40**. 720 [1907]) die Konstitutionsformel des Catechins sein. Vff. haben sowohl (**V**) als auch die freie Verb. (**VI**) synthetisiert; beide Verb. sind mit Catechin nicht ident. Die Umwandlung wurde auf folgendem Wege durchgeführt: Veratroylchlorid u. 3,5-Dimethyl-2-dihydrocumarone kondensieren sich zu einem Gemisch von **I** u. **II**, die durch Übergehen in **III** u. **IV**; durch Entmethylieren werden hieraus **V** u. **VI** erhalten. Die Konst. von **V** u. **VI** ergibt sich auch aus den Abbauprodd. Bei der

Oxydation geht **III** über in α -Oxy-5,3',4'-trimethoxy-4-benzyl-1,2-dihydro-3,6-cumaron (**VII**), während **IV** in Veratrinaldehyd u. 5-Methoxy-1,2-dihydro-3,6-cumaron (**VIII**) zerfällt. Sowohl **VII** als auch **VIII** lassen sich zu den in hydroxylierten Derivv. reduzieren; beide Verbb. sind farblos, wodurch die von NIERENSTEIN (LIEBIGS Ann. **396**. 194 [1913]) ausgesprochene Ansicht, daß die OH-Gruppe in 6-Stellung chromophore Eigenschaften besitzt, hinfällig wird.



Versuchsteil. 3,5-Dimethoxy-1,2-dihydrocumarone

$C_{10}H_{12}O_3$, aus 5 g des nachgenannten Hydrazins 25 ccm A. durch 22-std. Erhitzen mit 1,5 g C_2H_5O im Rohr auf 160° ; aus A. nach wiederholten Umräumen krystallisieren farblose Nadeln, F. 109° , l. in g. Mitteln; eine Suspension in konz. H_2SO_4 gibt

$FeCl_3$. Violettfärbung (wie alle nachstehend genannten Cumaranderivv.), geht an Red. mit Na + A. u. nachfolgende Methylierung über in 1,3,5-Trimethoxy-2-hydroxyphenylglucosin, aus Lg. Nadeln, F. $29-30^\circ$. — Hydrazon des 3,5-Dimethoxycumaron-2-on, $C_{10}H_{12}O_3N_2$, aus A. gelbliche Nadeln, F. $157-159^\circ$. — 3,5-Dioxy-1,2-dihydrocumarone, $C_8H_8O_3$, aus erstgenanntem Dimethoxyderiv. in Essigsäure durch Erhitzen (Wasserbad) mit CH_3COCl + Lg.; durch Zugabe von W. erhalten wird in NaOH gel., Lsg. mit H_2SO_4 angesäuert; aus A. prismat. Nadeln, F. 178° ; Diacetylderiv., $C_{12}H_{12}O_5$, aus A. Nadeln, F. 177° . — 5-Methoxy-1,2-dihydro-3,6-chinocumaron, $C_9H_8O_4$ (**VIII**), aus 3,5-Dimethoxy-1,2-dihydrocumarone in CrO_3 bei gewöhnlicher Temp.; aus Eg. lachsfarbene Nadelchen, F. $168-170^\circ$ (reiner) — 3,6-Dioxy-5-methoxy-1,2-dihydrocumarone, $C_9H_{10}O_4$ (entsprechend **VIII**), aus A. in Eg. mittels Zn-Staub; aus A. prismat. Nadeln, F. $191-192^\circ$; Lsg. in Alkali e. Diacetylderiv., $C_{13}H_{14}O_6$, aus A. Nadeln, F. $207-209^\circ$. — 3,5,3',4'-Tetramethoxy-4-benzoyl-1,2-dihydrocumarone, $C_{19}H_{20}O_6$ (**I**); Darst. in Chlf. in Ggw. von $AlCl_3$ auf 60° ; das nach Zers. des Reaktionsprod. mit Eiswasser + verd. HCl erhalten Gemisch von **I** u. **II** wird mit sd. A. extrahiert u. in W. filtriert. Nd. wird auf Trocknen über P_2O_5 mit Sand gemischt u. zuerst (einige Tage) mit Lg. extrahiert, worin **II** gel. wird; danach Extraktion mit Bzl., wodurch **I** erhalten wird; aus A. Nadeln, F. 148° ; Phenylhydrazon, $C_{25}H_{26}O_5N_2$, aus Essigsäure hellgelbe Nadeln

8—222° (Zers.). — 3,5,3',4'-Tetramethoxy-6-benzoyl-1,2-dihydrocumaron, $C_{19}H_{20}O_6$, aus A. Nadeln, F. 132—133°; Phenylhydrazon, $C_{25}H_{26}O_5N_2$, aus Essigsäure Kristalle, F. 204—207° (Zers.). — α -Oxy-3,5,3',4'-tetramethoxy-4-benzyl-1,2-dihydrocumaron, $C_{19}H_{22}O_6$ (III), aus I. in A. durch Erhitzen mit NaOH u. Zinkstaub einmalige Red. ist erforderlich; aus CCl_4 Nadeln, F. 124—126°, l. in organ. Mitteln. — 4,6,3',4'-Pentamethoxy-3-äthylidiphenylmethan, durch Red. von III mittels Na + Methylierung mit $(CH_3)_2SO_4$, F. 91—92°, geht bei Oxydation mit alkal. $KMnO_4$ in 2,4,6,3',4'-Pentamethoxydiphenylmethan-3-carbonsäure, F. 108°. — α -Acetoxy-3,5,3',4'-tetramethoxy-4-benzyl-1,2-dihydrocumaron, $C_{21}H_{24}O_7$, aus A. Nadeln, F. 147—148°. — α -Oxy-5,3',4'-trimethoxy-4-benzyl-1,2-dihydro-3,6-chinocumaron, $C_{18}H_{18}O_7$, aus Essigsäure rote Nadeln, F. 272—275° (Zers.); Monoacetylderiv., $C_{20}H_{20}O_8$, aus A. gelbliche Nadeln, F. 297—299°. — α ,3,6-Trioxy-5,3',4'-trimethoxy-4-benzyl-1,2-dihydrocumaron, $C_{18}H_{20}O_7$ (entsprechend VII), aus verd. A. prismat. Nadeln, F. 171—202° (Zers.), Lsg. in Alkalien gelb; Triacetylderiv., $C_{24}H_{26}O_{10}$, aus Aceton Tafeln, F. 217—218°. — α -3,5,3',4'-Pentaoxy-4-benzyl-1,2-dihydrocumaron, $C_{21}H_{24}O_8$ (V), aus 8 g III in 50 cem 80%ig. Essigsäure durch 8-std. Erhitzen mit $H_2COCl + 50$ cem Eg.; durch Zugabe von W. erhaltener Nd. wird in H_2 -Atmosphäre mit Alkali behandelt u. alkal. Lsg. angesäuert; Nd. aus W. prismat. Nadeln, F. 200—201°, mit d,l-Acacatechin gibt V eine F.-Depression von 16—29°; in A. u. Essigester, unl. in Bzl. u. Lg.; wss. Lsg. + $FeCl_3$ gibt Grünfärbung, durch Zusatz von Na-Acetat nicht verändert wird; keine Fichtenspanrk., aus V kristallisiert V mit $4H_2O$; beim Erhitzen mit festem KOH auf 120° wird Protocatechinsäure als einziges Spaltprod. gebildet; Pentaacetylderiv., $C_{25}H_{24}O_{11}$, aus A. Nadeln, F. 157—158°. — α -Oxy-3,5,3',4'-tetramethoxy-6-benzyl-1,2-dihydrocumaron, $C_{21}H_{24}O_6$ (IV), aus A. Nadeln, F. 127—128°, durch CrO_3 -Oxydation werden erhalten I u. Veratrumaldehyd mit Wasserdampf flüchtig; aus Lg. Nadeln, F. 46—47°. — α -Acetoxy-3,5,3',4'-tetramethoxy-6-benzyl-1,2-dihydrocumaron, $C_{21}H_{24}O_7$, aus A. Nadeln, F. 136—137°. — α -3,5,3',4'-Pentaoxy-6-benzyl-1,2-dihydrocumaron, $C_{15}H_{14}O_6$, aus W. Nadeln mit $4H_2O$, F. 187—188°, Eigenschaften entsprechen denen von Pentaacetylderiv., $C_{25}H_{24}O_{11}$, aus A. F. 151—152°. (Journ. Americ. Chem. Soc. 48—2806. 1924. Bristol, Univ.)

HABERLAND.

G. Powell und Norman G. Johnson, β -Toloxypropionsäuren und die entsprechenden Chromanone. (Vgl. POWELL, Journ. Americ. Chem. Soc. 45. 2708. 2879; 1924. I. 2140. 1925. I. 948.) β -(m-Toloxyl)- u. β -(p-Toloxyl)-propionsäure wurden durch Oxydation der entsprechenden γ -Toloxypropylalkohole erhalten; beim Kochen in Benzol. Lsg. mit P_2O_5 wurde aus letzterer 6-Methylchromanon erhalten. Das aus ersterer erhaltene Prod. kann entweder 5- oder 7-Methylchromanon sein; aus Analogiegründen (vgl. PFEIFFER u. OBERLIN, Ber. Dtsch. Chem. Ges. 57. 208; 1924. I. 2431) schließen Vff., daß das 7-Methylderiv. entstanden ist. — β -(o-Toloxyl)-propionsäure war analog nicht darstellbar.

Versuche. γ -(m-Toloxyl)-propylalkohol, $C_{10}H_{14}O_2$, Darst. aus Trimethylenchlorid + m-Kresolnatrium (30 Min. unter Rückfluß gekocht); anfangs ölig, bei weiterem Stehen zu farblosen Krystallen erstarrend, F. 30—31°, Kp_{13} 146—147°. — γ -(m-Toloxyl)-propionsäure, $C_{10}H_{12}O_3$, durch Zutropfenlassen von 10 g der vorigen Subst. zu einer Lsg. von 40 g kristallisiertem $MgSO_4 + 260$ cem 5%ig. $KMnO_4$ -Lösung, aus h. W. Nadeln, F. 105°; Amid, $C_{10}H_{13}O_2N$, aus h. W. F. 108°. — 7-Methylchromanon, $C_{10}H_{10}O_2$, gelbliche, stark lichtbrechende Fl., Geruch citronenartig; F. 38°; Oxim, $C_{10}H_{11}O_2N$, aus h. W. weiße Nadeln, F. 98—99°. — γ -(p-Toloxyl)-propylalkohol, $C_{10}H_{14}O_2$, F. 21—22°, Kp_{39} 171°. — β -(p-Toloxyl)-propionsäure; die durch Oxydation des Alkohols erhaltene Säure (Ausbeute 41%) hat dieselben Eigenschaften wie die von KROLLPFEIFFER u. SCHULTZE (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 57. 208. 1924. I. 1380) auf anderem Wege dargestellte Verb.; Amid, $C_{10}H_{13}O_2N$, aus

h. W. Nadeln, F. 128°. — 6-Methylchromanon vgl. KROLLPFEIFFER u. SCHULZE (Journ. Americ. Chem. Soc. 46. 2861—63. 1924. Seattle [Wash.], Univ.)

Ernst Koenigs und Franz Karl Hoffmann, *Über eine neue Synthese von β -Kollidins und ein neues Parvolin*. Das als Ausgangsmaterial dienende β -Pyridin wurde z. T. aus Aldehydkollidin durch Kondensation mit CH_2O zum Kollidin, Oxydation desselben mit CrO_3 zur 3-Äthylpyridin-6-carbonsäure u. Abspaltung von CO_2 dargestellt. — Wird β -Äthylpyridinjodmethylat ca. $1\frac{1}{2}$ Stdn. im Rohr erhitzt, mit NaOH versetzt u. mit Dampf dest., so erhält man ein Prod., welches bei der Dest. neben viel Aldehydkollidin wenig β -Kollidin (3-Äthyl-4-methylpyridin) liefert. Kp. 198°. Pikrat, $\text{C}_8\text{H}_{11}\text{N}, \text{C}_6\text{H}_5\text{O}_7\text{N}_3$, F. 144°. — Um die Wanderung von CH_3 nach der α' -Stellung zu verhindern, wurde 6-Vinyl-3-äthylpyridinjodmethylat derselben Rk. unterworfen (2 Stdn.). Als Hauptprod. wurde ein unangenehm riechendes Öl der erwarteten Zus. $\text{C}_{10}\text{H}_{13}\text{N}$ erhalten. Kp.₃₀ 106—107°. — $\text{C}_{10}\text{H}_{13}\text{N}, \text{C}_6\text{H}_5\text{O}_7\text{N}_3$, gelbe Nadeln aus W., F. 164°. Chlorplatinat, orangefarbene Nadeln, F. 104—105°. HgCl_2 -Doppelsalz, Nadeln, F. 137°. Jedoch erwies sich die Base als gesätt. gegen Br in Eg. u. KMnO_4 , so daß ihre Konst. noch ungewiß ist. Um festzustellen, ob bei obiger Rk. CH_3 überhaupt die γ -Stellung einnimmt, wurde Aldehydkollidinjodmethylat in gleicher Weise behandelt. Dabei bildet sich ein neues Parvolin, nämlich 2,6-Dimethyl-3-äthylpyridin, $\text{C}_9\text{H}_{13}\text{N}$. Öl, Kp.₂₃ 84—85°. D.¹⁸ 0,9120, wl. in W. Pikrat, $\text{C}_8\text{H}_{13}\text{N}, \text{C}_6\text{H}_5\text{O}_7\text{N}_3$, hellgelbe Blättchen, F. 178°. Chlorplatinat, orangefarbene Blättchen, F. 178°. Die Konst. der Base folgt aus der Oxydation mit saurem KMnO_4 zur Pyridin-2,3,6-tricarbonsäure, gekennzeichnet durch das in wl. Nadeln krystallisierende Ca-Salz der Zus. $\text{Ca}_3(\text{C}_8\text{H}_2\text{O}_6\text{N})_2 + 10\text{H}_2\text{O}$, während das Salz der Pyridin-3,4,6-tricarbonsäure (Berberonsäure) $8\text{H}_2\text{O}$ enthält. Das CH_3 besetzt demnach die 2- u. nicht die 4-Stellung, so daß der beabsichtigte Weg als aussichtslos erscheint. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58. 194—97. Festschr. Univ.)

Walther Dilthey, *Zur Kenntnis der N-Alkylchinopyridane*. [Über alkalische Chinopyridine. VI.] (Bearbeitet von A. Schaefer.) (V. vgl. Journ. f. prakt. Chem. 1924. I. 2606, irrtümlich als IV. bezeichnet. — IV. vgl. Journ. f. prakt. Chem. 1923. I. 1231.) Wie prim. aromat. Amine reagieren auch Nitranilinderivate mit p- u. m-Phenylendiamin mit arylierten Pyryliumsalzen, die in 2 oder 4 Molek. Phenolrest enthalten, unter B. von Salzen, die der Formel I. (V. Mitt.) entsprechen, wenn die Gruppe $>\text{N} \cdot \text{C}_6\text{H}_5$ durch $>\text{N} \cdot \text{C}_6\text{H}_4 \cdot \text{NO}_2$ bzw. $>\text{N} \cdot \text{C}_6\text{H}_4 \cdot \text{NH}_2$ ersetzt wird. Die zugehörigen roten N-Arylchinopyridane (nach III. ohne das C_6H_5) sind kaum tiefer gefärbt als die in der V. Mitt. beschriebenen. Der negative chromochrome Einfluß des NH_2 geht auch aus der noch immer hellroten Färbung der Acetylverbb. der Basen hervor (Diacetylverbb. entstehen nicht). — Die Basen bilden ein- u. zweisäurige Salze (beide hellgelb). Würde die Salzbildung statt am NH_2 stattfinden, so müßten die einsäurigen Salze noch tieffarbig sein; da es aber der Farbumschlag auch mit schwachen Säuren sofort eintritt, so bildet sich das Salz los unter Beseitigung der chinoiden Bindung gleich das I. entsprechend. Auch das 2. Säuremol. dürfte nicht an das NH_2 treten, denn erstens neigen auch die NH_2 -freien Basen zur B. saurer Salze, u. zweitens erweisen sich auch die Acetylverbb. noch als starke Basen. — Auffallend ist das Additionsvermögen der Basen u. ihrer Acetylverbb. für Bzl. (vgl. V. Mitt.), A. u. besonders W. Es werden bis zu $4\text{H}_2\text{O}$ aufgenommen, die teilweise, bei den aminierten Basen gerade 1 Molek. sehr fest gebunden sind. Doch kann es sich der tiefen Färbung wegen nicht um Ammoniumbasen handeln, sondern nur um Molekülverbb. etwa nach Formel II. Sämtliche Basen schmecken stark bitter.

Für das 4-(p-Oxyphenyl)-2,6-diphenylpyryliumbromid(chlorid) (vgl. DILTHEY u. TAUCHER, Ber. Dtsch. Chem. Ges. 53. 258; C. 1920. I. 736) wird ein vorteilhaftes

angegeben. — *1-(m-Nitrophenyl)-2,6-diphenyl-4-(p-oxyphenyl)-pyridiniumbromid*, $\text{C}_{21}\text{H}_{17}\text{O}_3\text{N}_2\text{Br}$. Aus dem Pyryliumbromid u. m-Nitranilin bei 150° . Mkr. grüngelbe Krystalle aus Eg., F. über 360° . Mit NH_3 Umschlag in Rot. — *1-(m-Aminophenyl)-2,6-diphenyl-4-chinopyridan*, $\text{C}_{29}\text{H}_{22}\text{ON}_2 + \text{H}_2\text{O}$. Aus dem Pyryliumchlorid u. m-Phenylendiamin in sd. A. (2 Stdn.), Zers. mit NH_3 . Tiefrote Krystalle aus A., W., F. ca. 305° . Gibt das H_2O erst bei 150° u. 12 mm ab. — *Pikrat*, $\text{C}_{31}\text{H}_{25}\text{O}_8\text{N}_5$. Grüngelbe Nadelchen, F. 233° . — *Acetylverb.*, $\text{C}_{31}\text{H}_{24}\text{O}_2\text{N}_2 + 3\text{H}_2\text{O}$ (d. $1\text{C}_2\text{H}_6\text{O}$?). Hellrote Blättchen aus A., F. $322-324^\circ$. — *1-(p-Aminophenyl)-2,6-diphenyl-4-chinopyridan*, $\text{C}_{29}\text{H}_{22}\text{ON}_2 + 4\text{H}_2\text{O}$. Mit p-Phenylendiamin. Rote, glänzende Krystalle, die bei 95° ca. $3\text{H}_2\text{O}$ abgeben, bei 160° u. 12 mm wasserfrei werden u. dann bei $308-309^\circ$ schm. — *Chlorhydrat*, $\text{C}_{29}\text{H}_{23}\text{ON}_2\text{Cl} + \text{H}_2\text{O}$. Rote Krystalle, F. ca. 275° . — *Bromhydrat*, $\text{C}_{29}\text{H}_{23}\text{ON}_2\text{Br}$. Grünlichgelbe Krystalle, F. 299° . — *Pikrat*, $\text{C}_{35}\text{H}_{25}\text{O}_8\text{N}_5$. Gelbgrüne Nadeln, F. 214° . — *Acetylverb.*, $\text{C}_{35}\text{H}_{24}\text{O}_2\text{N}_2 + 4\text{H}_2\text{O}$. Hellrote Blättchen aus A., F. 352° . Verliert $1\text{H}_2\text{O}$ bei 100° , erst bei 200° u. 12 mm in 10 Stdn. wasserfrei u. dunkelrot, zieht dann bei 300° W. an unter Hellrotfärbung. — *1-Phenyl-2,4,6-tri-(p-oxyphenyl)-pyridiniumbromid*, $\text{C}_{29}\text{H}_{22}\text{O}_3\text{NBr}$. Aus 2,4,6-Tri-(p-oxyphenyl)-pyryliumbromid (tiefrote Krystalle aus Eg., F. über 360°) u. Anilin. Hellgelbe Krystalle aus Eg., F. 252° . — *1-(m-Aminophenyl)-2-(p-oxyphenyl)-4,6-diphenylpyridiniumchloridchlorhydrat*, $\text{C}_{29}\text{H}_{23}\text{O}_2\text{N}_2\text{Cl}_2$. Aus 2-(p-Oxyphenyl)-4,6-diphenylpyryliumchlorid (l. c.) u. p-Phenylendiamin. Aus W. + HCl , F. 245° . Mit NH_3 Umschlag in Rot. (Journ. f. prakt. Chem. **88**, 332–40. 1924. Bonn, Univ.)

LINDENBAUM.

J. Giemsa und K. Bonath, Über China-Alkaloide. VI. Mitt. Über die Einwirkung von Schwefelsäure (D. 1,84) bei 100° auf Hydrocinchonin, Hydrochinin, Apochininid und Chinin. Über Apochinin. (V. vgl. Ber. Dtsch. Chem. Ges. **54**, 18 C. 1921. III. 482.) H_2SO_4 (D. 1,84) verwandelt Hydrocinchonin bei 100° in 1 Stdn. quantitativ in die Sulfonsäure. Unterwirft man Hydrochinin u. Hydrochinin der gleichen Behandlung, so wird außerdem die Methoxylgruppe verseift. Während dieser Umwandlung erkennt man am Verschwinden der blauen Fluorescenz der Lsg. im Lichtkegel der Bogenlampe. Die gebildeten Sulfonsäuren lassen sich mit sd. verd. H_2SO_4 oder besser mit HCl (D. 1,126) leicht zu Hydrocuprein oder Hydrocupreidin verseifen. — Chinin liefert nach diesem Verf. weder Cuprein noch Apochinin, sondern ein S-haltiges Prod., das augenscheinlich durch Anlagerung von H_2SO_4 an die Vinylgruppe entstanden ist u. als (Oxy-9-oxy-6'-rubyl-3)-chininschwefelsäure aufzufassen ist.


Die Annahme, daß Chinin der Methyläther des Apochinins, nicht des Cupreins, wird durch den Befund von LIPPMANN u. FLEISSNER (Monatshefte f. Chemie **88**, 1 [1895]) widerlegt, wonach bei der Äthylierung von Apochinin nicht Chinin, sondern ein Isomeres entsteht. Dieser Befund wird durch Äthylierung von Apochinin mit Diäthylsulfat bei 70° bestätigt. Auch der Umstand, daß sich Chinin im Gegensatz zu Cuprein mit Ni- als Katalysator nicht hydrieren läßt, stimmt gegen die obige Annahme. Es ist daher wahrscheinlich, daß Apochinin ein Isomeres des Cupreins ist.

Versuche. *Hydrocupreinsulfonsäure*, $\text{C}_{19}\text{H}_{23}\text{O}_2\text{N}_2 \cdot \text{SO}_3\text{H}$, aus schwefelsaurer Chinin mit NH_3 amorph u. leicht verschmierend, wird in Berührung mit CH_3OH krystallin. Aus sd. CH_3OH . Nadeln vom F. 270° , sonst durchweg schwer bis unl. in nicht die Chininrk. mit Br-Wasser u. NH_3 . Ist gegen KMnO_4 unbeständig. $d_4^{20} = -93,3^\circ$ (in abs. A., dem 25% 10%ig. alkoh. NH_3 zugesetzt waren; $d_4^{20} = 0,487$). — *Sulfat*, $(\text{C}_{19}\text{H}_{23}\text{O}_2\text{N}_2 \cdot \text{SO}_3\text{H})_2\text{H}_2\text{SO}_4 + 4\text{H}_2\text{O}$, aus W. lichtgrüne Nadeln vom F. 231° . — *Nitrat*, aus h., sehr verd. HNO_3 lange, feine Nadeln. — *Hydrocupreidinsulfonsäure*, $\text{C}_{19}\text{H}_{23}\text{O}_2\text{N}_2\text{SO}_3\text{H}$, aus der Lsg. in einem geringen Überschuß von NaOH mit Essigsäure sofort krystallin., mit konz. NH_4Cl -Lsg. amorph.

Durchweg schwer- bis unl.; aus 50%ig. A. Nadeln vom F. 282°, in trocken stand stark elektr. erregbar; geschmacklos. — *Sulfat*, $(C_{10}H_{23}O_2N_2)_2 \cdot H_2SO_4 + mkr.$ hellgrüne Nadeln. — *Hydrocinchoninsulfonsäure*. Das *Sulfat*, $(C_{19}H_{21}SO_3H)_2 \cdot H_2SO_4 + 8H_2O$, fällt bei der Neutralisation der schwefelsauren Lsg. zum Kongopunkt als Gallerte aus, die im Eisschrank allmählich in ganz schwach grünl. Nadelchen übergeht. $[\alpha]_D^{18} = +139^\circ$ (W.; $c = 2,86$). — *Disulfat aus Chinin*, $C_{19}H_{21}O_2N_2 \cdot SO_3H \cdot H_2SO_4 + 2,5H_2O$, aus der alkal. Lsg. ihres S. mit Essigsäure oder NH_4Cl , gelbes amorphes Pulver, ll. in CH_3OH , A., w. Amylalkohol, wl. bis unl. in Chlf., Essigester, Bzl., Ä., PAe., reagiert in alkoh. Lsg. gegen Lackmus neutral. Sie krystallisiert nach Auskochen mit aus sd. abs. A. u. ist dann in A. u. Aceton wl., F. 255–56°. Die aus dem Reaktionsgut mit NH_3 direkt abgeschiedene amorphe Säure verharzt leicht in Luft. — Das *Sulfat* scheidet sich beim Neutralisieren des in Eiswasser geg. Reaktionsgutes mit NH_3 bis zur schwachsauren Rk. ab. Erwärmt sich dabei, so tritt Rotfärbung unter teilweiser Zers. ein. Aus W. hellgrüne Nadeln ($C_{19}H_{21}O_2N_2 \cdot SO_3H \cdot H_2SO_4$) $\cdot H_2SO_4 + 5H_2O$, wl. in CH_3OH . — *Chlorhydrat* ($C_{19}H_{21}O_2N_2 \cdot SO_3H \cdot H_2SO_4$) $\cdot 2HCl + 4H_2O$, Nadeln, die sich über H_2SO_4 unter Verlust des Krystallw. gelb färben. *Hydrocuprein*, $C_{19}H_{24}O_2N_2$, durch Verseifung der Sulfonsäure mit HCl (D. 1,19) 1 Stde. bei 100°. Ausbeute 96% (bezogen auf *Chinin*). Aus A. feine gelbliche Nadeln vom F. 186°, $[\alpha]_D^{23} = -159,2$ (A.; $c = 1$). — *Chlorhydrat*, $C_{19}H_{24}O_2N_2 \cdot 2HCl + H_2O$, aus W. oder verd. HCl vierseitige deckelartige, hellgelbe Prismen, aus CH_3OH mit Ä. Nadeln oder Blättchen vom F. 224°. — *Bas. Sulfat*, $(C_{19}H_{24}O_2N_2)_2 \cdot H_2SO_4$. — *Neutrales Sulfat*, $C_{19}H_{24}O_2N_2 \cdot H_2SO_4 + 4H_2O$. — *Neutrales Nitrat*, $C_{19}H_{24}O_2N_2 \cdot 2HNO_3 + H_2O$, aus w. v. HNO_3 regelmäßige, derbe Krystalle, die sich bei 165° im Vakuum dunkelrot zu zerfallen, vermutlich unter B. eines Nitroprod. — *Bas. Tartrat*, $(C_{19}H_{24}O_2N_2)_2 \cdot C_4H_6O_6 + H_2O$, F. 242° in W. u. A. swl., daher zur Reinigung der Base sehr geeignet. — *Bas. Steinsäures Salz*, Stäbchen vom F. 251°. — *Hydrocupreidin*, $C_{19}H_{24}O_2N_2$, F. 193°. $[\alpha]_D^{20} = +242,5^\circ$ (A.; $c = 0,806$), l. in CH_3OH , A., Amylalkohol, Aceton, Pyridin, im sd. Essigester u. Tetralin, weniger l. in Ä., Xylol, Bzl., Chlform, kalin, fast unl. in PAe.; kuppelt mit Diazobenzolsulfosäure, fluoresciert in schwefel- oder salpetersaurer Lsg., gibt mit Br-Wasser u. NH_3 keine Grünfärbung, sondern wie Hydrocuprein blaue Fluorescenz. — *Chlorhydrat*, $(C_{19}H_{24}O_2N_2)_2 \cdot HCl$, aus W. große gelbe Krystalle. — (*Oxy-9-oxy-6'-rubbyl-3*)-äthylschwefelsäure, $C_{19}H_{24}O_2N_2 \cdot H_2SO_4$, durch Verseifung der Disulfonsäure aus Chinin mit sd. HCl (D. 1,12) in alkal. Lsgg. ihrer Salze mit verd. Essigsäure oder NH_4Cl -Lsg. gelber, krystallin, ll. in CH_3OH , A., Aceton, sonst fast unl. Aus sd. CH_3OH mit h. V. krystallin. Pulver vom F. 234°, durchweg wl. $[\alpha]_D^{23} = -102,8^\circ$ (A.; $c = 1$). Gibt mit Diazobenzolsulfosäure in alkal. Lsg. blutrote Färbung. Die Lsg. in H_2SO_4 oder HNO_3 fluoresciert nicht. Thalleiochinrk. negativ, doch tritt in verd. schwache grüne Fluorescenz auf. — *Chlorhydrat*, $(C_{19}H_{22}O_2N_2 \cdot H_2SO_4)_{1/2} \cdot 3HCl + H_2O$, aus konz. HCl Krystalle. — *Methylhydrocuprein* (= *Hydrochinin*), $C_{20}H_{26}O_2N_2$, Hydrocuprein in CH_3OH mit Nitromethylurethan u. KOH , F. 172°. $[\alpha]_D^{18} = -13,5^\circ$ ($c = 1,040$). Das *bas. Sulfat* krystallisiert mit $6H_2O$, die nach dem Trocknen ständig aus feuchter Luft wieder aufgenommen wurden. — *Äthylapochinin*, krystallin, F. 183°. *Bas. Sulfat*, ll. in W. (Ber. Dtseh. Chem. Ges. 58. 1891). Hamburg, Inst. f. Schiffs- u. Tropenkrankheiten.)

Ernst Späth und Ernst Bernhauer, Über das Laudanidin. Für das im Opium vorkommende *Laudanin* haben SPÄTH u. LANG (Monatshefte f. Chemie 47. 1922. I. 502) durch Synthese die Konst. I bestätigt. Es wird nunmehr festgestellt, daß das gleichfalls im Opium vorkommende *Laudanidin* die gleiche Konst. hat u. das *Laudanin* die *Racemform* des *Laudanidins* ist. Das *methylierte Laudanin*


stänlich mit *d*-Laudanosin *rac.* Laudanosin. Zur Best. der Stellung der freien Gruppe im Laudanidin wurde, da die Racemisierung dieser Base infolge der kleinen zur Verfügung stehenden Mengen (0,3 g) bisher nicht gelang, die entsprechende Äthylverb. mit KMnO_4 oxydiert, wobei 3-Äthoxy-4-methoxybenzoesäure erhalten wurde.



den F. 114–115°. — Zum Oxydationsvers. wurden 0,055 g Laudanidin mit $\text{C}_2\text{H}_5\text{J}$ ins Jodäthylat verwandelt, dieses durch Zusatz von 0,12 g Na in Ä. 2-malige Wiederholung dieses Zusatzes nach je 10 Stdn. in den Äthyläther überführt, die Fl. mit AgCl entjodet u. bei 50–60° mit $\frac{1}{10}$ -n. KMnO_4 in kleinen Portionen oxydiert. Nach Behandlung mit SO_2 mit HCl angesäuert, mit Ä. erschöpfend extrahiert, Ä.-Rückstand in verd. NH_3 gel., im Vakuum über H_2SO_4 eingeengt u. mit W. aufgenommen, wobei ein kleiner Teil ungelöst blieb. Mit den wässrigen wurde dieser Prozeß solange wiederholt, bis keine unl. Verb. mehr abgetrennt werden konnte. Die vereinigten Ndd. wurden im Vakuum bei 180–210° sublimiert, u. erwiesen sich nach Umlösen aus W. als 3-Äthoxy-4-methoxybenzoesäure vom F. 164–165°. Auch das daraus dargestellte Amid erwies sich als identisch mit dem synthet. gewonnenen. — Äthylisovanillin, $\text{C}_{10}\text{H}_{12}\text{O}_3$, aus Isovanillin mit H_2O u. $\text{C}_2\text{H}_5\text{J}$ in sd. Ä. Aus verd. Ä. F. 50–51°. — Oxim, $\text{C}_{10}\text{H}_{13}\text{O}_3\text{N}$, aus Ä. F. 98–99°. — Durch Oxydation des Äthylisovanillins mit w. KMnO_4 -Lsg., u. von etwas KOH 4-Äthoxy-8-methoxybenzoesäure vom F. 165–166°. Ihr Äthylsalz ist in W. stark hydrolysiert. — Amid, $\text{C}_{10}\text{H}_{13}\text{O}_3\text{N}$, aus verd. Ä. Krystalle vom F. 196–197°. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58. 200–204. Wien, II. Chem. Lab. (iv.)

OHLE.

ix Polonovski und Michel Polonovski, Über Oxyserin und seine Derivate. (Vgl. C. r. d. l'Acad. des sciences 179. 178; C. 1924. II. 2269.) In der Reihe werden durch Behandlung mit CH_3J neue, von den Ausgangsverb. verschiedene Basen erhalten, die Vff. als ψ -Basen bezeichnen, u. die Oxyserine entstanden durch Übergang der Gruppe I in II. — ψ -Generesolmethin (Oxyserin) $\text{C}_{14}\text{H}_{20}\text{O}_2\text{N}_2$ (III), aus Geneserol durch Behandlung mit CH_3J , F. 171°; Dihydrat, $\text{C}_{14}\text{H}_{20}\text{O}_2\text{N}_2 \cdot \text{HCl}$; zweisäurige Salze oder Dijodmethylate werden mit



erhalten; erschöpfende Methylierung führt zum Jodmethylat des ψ -Methylgeneresolmethins, F. 153°. — Das Jodmethylat von III gibt beim Behandeln mit NaOH oder bei der NaOH -Schmelze durch Abspaltung von CH_3J das ursprüngliche ψ -Generesolmethin, zweitens kann durch Abspaltung von $\text{N}(\text{CH}_3)_2\text{HJ}$ ψ -Generesolen

*see
errata
P. 3063*
(*Oxyeserolen*), $C_{12}H_{13}O_2N$ (IV), F. 224°, gebildet werden, $\alpha_D = -85^\circ$ (in A., diese Verb. ist l. in Alkali, unl. in Säuren, unempfindlich gegen saure Redmittel u. Alkalien. — Der Umstand, daß Eserolin oder Eserethol (mit geschl. bas. Ring) unter Verlust von zwei C-Atomen in *Physostigmol* (VI) übergeht darauf hin, daß die Konfiguration des bas. Teiles des Eserinmol. der F entsprechen muß. (C. r. d. l'Acad. des sciences **180**. 73—76.) HABER

E. Biochemie.

H. Schroeder, *Die Kohlendioxydversorgung der Chloroplasten*. CO_2 durch Diffusion teils in den Intercellularen (Gasphase), teils in gel. Form in die Zellwände der Assimilationszellen u. durch die Chlorophyllkörner selbst in die Chloroplasten (Flüssigphase). Um aus der Diffusionsformel die an den Phasengrenzen herrschenden Konzz. zu bestimmen, sucht Vf. die erforderlichen Größen (Querschnitt u. Länge des Diffusionsweges, Diffusionskonstanten) durch Messungen zu ermitteln. Er findet, daß trotz des 10000mal größeren Koeffizienten der Hydrodiffusion der Widerstand in der Hydrophase nur ca. 4,5mal so groß wie derjenige der Gasphase ist. (Flora N. F. **17**. 1924. Ber. ges. Physiol. **28**. 396. 1924. Ref. ARNECK.) SP

E₃. Pflanzenphysiologie. Bakteriologie.

Muneo Yabusoe, *Über den Temperaturkoeffizienten der Kohlensäureassimilation*. II. Mitteilung. *Über die Blackmansche Reaktion*. (I. vgl. WARBURG u. K. 1924. Biochem. Ztschr. **146**. 486; C. **1924**. II. 680.) Die Geschwindigkeit der Blackmanschen Rk. ist zwischen 10° u. 30° eine lineare Funktion der Temp.; bei 30° Temp. ist die Geschwindigkeit größer, als sie bei linearem Verlauf der Kurve sein würde. Ebenso verhält es sich bzgl. der Geschwindigkeit der Peroxydspaltung u. der Chlorellen. Dagegen besteht bei der Atmung der roten Vogelblutzellen, der Hefezellen, der Gärung der Hefezellen u. der Milchsäurebakterien, der Gärung der Carcinomzelle, der Leucinoxydation an Kohle keine lineare Temperaturfunktion. (Biochem. Ztschr. **152**. 498—503. 1924. Berlin-Dahlem, Kaiser Wilhelm Inst. f. Biol.) VO

F. E. Denny, *Wirkung von Äthylen auf die Atmung von Citronen*. (Vgl. Denny u. DENNY, Ind. and Engin. Chem. **16**. 339; C. **1924**. II. 1525.) Die g. Wrkg. auf die Reifung scheinen mittlere Konzz. von C_2H_4 zu haben. Die Atm. von CO_2 stieg von 100 auf 250%. Unterbrechung der C_2H_4 -Zufuhr vermindert die Atmungsintensität wieder. (Botan. gaz. **77**. 322—29. Los Angeles [Cal.] J. of Chem.; Ber. ges. Physiol. **29**. 65. 1924. Ref. DÖRRIES.) SE

A. Kozłowski, *Beitrag zur Kenntnis der Genese des Anthocyans*. Von Blüten fand Vf. bei *Mathiola* u. *Pelargonium* in dem im Auszug mit 80% ig A. die 3fache Menge Ä. erzeugten sirupösen Nd. kein Anthocyanogen. In *Dianthus*, *Phlox*, *Dahlia* u. *Aster* soll die weiße Farbe durch einen biochem. Defekt verursacht sein, der die Synthese des Anthocyans hindert. Diese werden im ganzen Zellkörper diffus gebildet. (Trav. de l'Inst. M. NENCKI Nr. 9. Ber. ges. Physiol. **29**. 64. 1924. Ref. KOPEĆ.) SE

José Carra, *Die Ausnutzung der Aminosäuren als Stickstoffquelle in Bakterienkulturen*. (Vgl. Biochim. e terap. sperim. **10**. 419; C. **1924**. II. 681.) In der Uschinskischen Lsg. werden die N-haltigen Bestandteile (NH_4 -Lactat u. Asparagin) jeweils durch Asparagin allein oder Alanin, Glykokoll, Leucin, Tyrosin oder Tryptophan ersetzt. Bei den verschiedenen untersuchten Bakterien gab Tryptophan den besten Resultate, bei den empfindlicheren war auch die Lsg. von Alanin oder Tyrosin der üblichen überlegen. Vf. empfiehlt die Uschinskilsg. mit Alanin + Tryptophan.

- allgemein verwendbar. (Ann. d'ig. **34**. 397—405. Modena, Univ.; Ber. ges. bot. **29**. 138. 1924. Ref. ROSENTHAL.) SPIEGEL.
- I. S. Reed und A. R. C. Haas**, *Die Eisenversorgung im Nährmedium*. Fe in von Tartrat wird in Nährlsgg. bald in unl. Verbb. übergeführt, um so schneller, höher pH ist. Einleiten von CO₂ erniedrigt den pH-Wert in schwach sauren, analen oder alkal. Lsgg., erhöht aber die Löslichkeit der darin vorhandenen Fe-er. nicht. Zusatz gewisser organ. Verbb. (NH₄- u. Na-Salze von organ. Säuren) kal. Nährlsg. ist zur Erhaltung eines angemessenen Vorrats von l. Eisen eig. (Botan. gaz. **77**. 290—99. Berkeley, Univ. of California. Riverside, EITOMS-
stat.; Ber. ges. Physiol. **29**. 70. 1924. Ref. DÖRRIES.) SPIEGEL.
- Gertrud Meißner**, *Die Bindungsverhältnisse zwischen Bakteriophagen und E. coli*. (Vgl. Zentralblatt f. Bakter. u. Parasitenk. I. Abt. **92**. 424; C. **1924**. **32**.) In Bestätigung der Ergebnisse anderer Forscher ergaben die Verss. der C. coli, daß Lysin durch den homologen lysosensiblen Mikroben erschöpft, durch lyso-
sensitive aber nicht geschwächt wird. Nur ausnahmsweise können ganz schwache
Lysine auch durch nicht homologe Bakterien geschwächt werden. Bei einem
Lysin trat durch Behandlung mit lysoresistenten Bakterien sogar regelmäßig
eine Verringerung der Wirksamkeit ein. Die Bindungsverhältnisse bleiben nach Erhitzen
der Bakterien auf 100° bestehen, erst 1std. Erhitzen auf 120° hebt sie auf. Bei
wiederholter Digestion der sensiblen Bakterien mit immer neuen Lysinmengen
ist eine völlige Absättigung der lysinbindenden Kraft nur äußerst schwer. Der
Prozess wird als chem. Bindung aufgefaßt, eine Trennung der vorausgesetzten
unveränderlichen Rezeptoren vom Bakterienleibe gelang nicht. (Zentralblatt f. Bakter.
u. Parasitenk. I. Abt. **93**. 489—95. 1924. Greifswald, Univ.) SPIEGEL.
- W. J. Pozerski**, *Über die Ausscheidung von Phosphorverbindungen durch Mikroben*.
(Journ. of the soc. de biologie **90**. 602; C. **1924**. II. 195.) Wie die früher unter-
suchten Shiga- u. Proteusbacillen, scheiden auch sämtliche anderen vom Vf. ge-
prüften Arten, so lange sie am Leben sind, in dest. W. P-Verbb. aus, nämlich
Typhus- u. Y-Ruhrbacillen, Typhus u. Paratyphus A. u. B, B. coli, Staphylokokken.
(Journ. de biologie **91**. 1004—5. 1924. Paris, Inst. PASTEUR.) SPIEGEL.
- Martha A. Pratt**, *Die Selbstvergiftung von Pilzkulturen*. Allgemeine und chemische
Untersuchung über die Selbstvergiftung von Fusarium. Die eingetretene B. schädigen-
den Stoffwechselprodd. wird angenommen, wenn in der filtrierten Kultur vor-
handene Sporen von Botrytis cinerea im Wachstum gehemmt werden. Die Hemmung
tritt bis zu gewissem Grade schon durch angemessenes Verd. beseitigen, ferner
durch Aufkochen oder Ansäuern der alkal. gewordenen Fl., besonders durch beide
Maßnahmen zusammen, durch Holzkohle oder besser noch kolloidalen Ton in Verb.
mit H₂SO₄ ansäuern. Die chem. Unters. ergab in den Stoffwechselendprodd. neben NH₃
auch organ. Säuren. Diese könnten für die im angesäuerten Filtrat noch vor-
handene Hemmung, die durch Ausäthern vermindert wird, verantwortlich gemacht
werden. (Ann. of botany **38**. 563—95. London, Coll. of science and technol.; Ber.
ges. Physiol. **28**. 396. 1924. Ref. ARNBECK.) SPIEGEL.
- Arthur Isaac Kendall und Reba Cordelia Haner**, *Micrococcus ovalis*. Unter-
suchungen über Bakterienstoffwechsel. 70. (69. vgl. Journ. of infect. dis. **32**. 377;
C. **1924**. I. 1393.) Microc. ovalis, wahrscheinlich ident. mit dem Enterococcus der
Mäusen, findet sich im Darm gesunder Säuglinge, auch im Duodenalinhalte Er-
wachsener. Er ist nicht proteolyt., bildet weder Aminosäuren noch Indol, lebt viel-
leicht auf Kosten von Kohlenhydraten, die er unter B. von Milchsäure zers. Gegen
die Gifte des oberen Darmabschnitts ist er sehr widerstandsfähig. (Journ. of infect.
dis. **67**—76. Chicago, Northwestern Univ. med. school; Ber. ges. Physiol. **28**.
1924. Ref. SELIGMANN.) SPIEGEL.

S. Henry Ayers und Wm. T. Johnson jr., *Streptokokkenstudien*. VII. Nährboden für Stammkulturen von Streptokokken und anderen Bakterien. (Vgl. A. u. MUDGE, Journ. of bacteriol. 7. 449; C. 1923. III. 462.) 500 ccm Bouillon, Pepton (PARKE, DAVIS & Co.) u. 2 g $\text{Na}_2\text{HPO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ werden h. gel. u. auf pH eingestellt, dann mit h. bereiteter Lsg. von 5 g reinem, nach HAMMARSTEN gestellten Casein u. 2 g $\text{Na}_2\text{HPO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ in 150 ccm dest. W., alsdann mit Gelatine (DIFCO) versetzt, die Mischung nach 10 Min. langem Erhitzen im kochen mit 0,5 g Glucose, pH nun = 7,6, u. durch Papier filtriert. Dann wird dazu 250 g filtrierte 3%ig. Agarls. mit 3 g Na-Citrat gegeben, mit dest. W. 1000 ccm aufgefüllt. Endrk. pH = 7,5. (Journ. of bacteriol. 9. 111—14. Washington, U. S. Dep. of agric.; Ber. ges. Physiol. 29. 139. 1924. Ref. LOEWENHARDT.)

S. Henry Ayers und Wm. T. Johnson jr., *Streptokokkenuntersuchungen*. Mitteilung über die Schwefelwasserstoffproduktion der Streptokokken. (VII. vgl. Ref.) B. von H_2S nach Zusatz von S-Verbb. zum Nährboden wurde bei verschiedenen Streptokokken beobachtet, kann aber bisher nicht differentialdiagnostisch verwertet werden. (Journ. of bacteriol. 9. 115—17. Washington, U. S. Dep. of agric.; Ber. ges. Physiol. 29. 139. 1924. Ref. EMMERICH.)

E₄. Tierchemie.

Stanislas Kon und Casimir Funk, Ein ungewöhnlicher Typus von Fettsäurebindungen in einem Produkt tierischen Ursprungs. Die von FUNK (Proc. of the f. exp. biol. and med. 20. 421; C. 1924. I. 2711) aus Casein extrahierte fettsäurehaltige Substanz lieferte bei Verseifung lediglich eine Fettsäure, deren Anhydrid ein Oxystearinsäureanhydrid sein scheint, von der Zus. $\text{C}_{18}\text{H}_{36}\text{O}_3$, Tafeln (aus 70%ig. A. u. Bzl.), F. 57,5—58,5°, E. 55,5°, nicht ident. mit einer der bekannten Oxystearinsäuren. Ag-Salz, Krysal. F. 57,5—58,5°. (Biochemical Journ. 18. 1238—39. 1924. Warschau [Polen], Ber. ges. Physiol. 29. 139. 1924. Ref. EMMERICH.)

Otto Rosenheim, Die Isolierung von Sperminphosphat aus Samen und Hoden. Die „Spermakrystalle“, deren Entdeckung gewöhnlich BÖTTCHER (1865) zugeschrieben wird, sind schon von VAUQUELIN 1791 u. noch früher, 1678, von LEEUWENGODART beschrieben. Die Schreinersche Originalmethode zur Gewinnung dieser Krystalle ist nicht brauchbar. Durch Abänderung dieser u. der Vauquelinschen Methode gelangte Vf. aber zu guten Ergebnissen. Danach findet sich das Sperminphosphat (krystallograph. Messungen von T. V. Barker) auch in Hoden, verschiedenen anderen tier. Organen, z. B. Pankreas, u. auch in Hefe. (Biochemical Journ. 18. 1253—62. 1 Tafel. 1924. London, Kings Coll. Mt. Vernon.)

Harold Ward Dudley, Mary Christine Rosenheim und Otto Rosenheim, Die chemische Konstitution des Spermins. I. Die Isolierung des Spermins aus tierischen Geweben und die Darstellung seiner Salze. (Vgl. vorst. Ref.) Spermin wurde bisher näher angegebenen Verff. aus Hoden, Ovarien, Pankreas, Muskel, Leber, Cholesterin, Milz, Thymus u. Schilddrüse, ferner aus Hefe gewonnen. Die freie Base hat M. 444, Analysen verschiedener Salze u. dem Mol.-Gew. des Benzoylderiv. die Zus. $\text{C}_{10}\text{H}_{26}\text{N}_4$, nadelförmige Krystalle (durch Erstarren des aus Chlf. bei Verdampfen zurückbleibenden Öles), F. 55—60°, Kp. ca. 150° (unzers.), opt.-inakt., ll. in W., A., u. in 90% alkohol, unl. in Ä., Bzl. u. Lg., an Luft unter Aufnahme von CO_2 schnell verflüssigt. Sulfat, Nitrat, Acetat u. Carbonat sind sehr hygroskop. Oxalat, Blättchen, F. 225°. Phosphat, $\text{C}_{10}\text{H}_{26}\text{N}_4 \cdot 2\text{H}_3\text{PO}_4 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$, Erweichen 227° (Gasentw.), F. 234°, weiße Ausscheidung bei 240°, bei 260—262° sinternd, l. in W. 1% bei 100°, 0,037% bei Zimmertemp. Pikrat, gelbe Nadeln (aus sd. W.), $\text{C}_{10}\text{H}_{26}\text{N}_4 \cdot 4\text{C}_6\text{H}_5\text{O}_7$, Schmelzung ca. 242°, F. 248—250° (Zers.). Chlorhydrat, $\text{C}_{10}\text{H}_{26}\text{N}_4 \cdot 4\text{HCl}$, p. 310 G. Nadeln (aus h. W. nach Zusatz von sd. A.), Braunfärbung 300—302°, fl. 310 G. (Gasentw.), sl. in W., swl. in h. CH_4O u. A., unl. in Aceton, Ä. u. Chlf. Pikro-

gelbe prismat. Nadeln (aus sd. W.), F. 288—289° (Zers.), l. in W. von 5° ca. 6500. *Chloraurat*, $C_{10}H_{28}N_4 \cdot 4HCl \cdot 4AuCl_3$, goldgelbe Blättchen (aus 5%ig. HCl), F. 25° (Zers.). *Chlorplatinat*, $C_{10}H_{28}N_4 \cdot 2H_2PtCl_6$, große Krystalle (aus 5%ig. HCl, F. 42—245° (Zers.)). — *Benzoylspermin*, $C_{10}H_{22}N_4(COC_6H_5)_4$, wollige Nadeln (aus h. A. nach Zusatz von Lg.), F. 155°. — *Phenylisocyanatderiv. des Spermins*, Nadeln (aus A.), F. 179—180°. (Biochemical Journ. 18. 1263—72. 1924. London, Kgs Coll. Mount Vernon.)

SPIEGEL.

Fanny Pollecoff, *Glucuronsäure als ein wahrscheinlicher Bestandteil des Urochroms*. (Vorläufige Mitteilung.) Sorgfältig gereinigtes Urochrom gab bei Kochen mit 10%ig. HCl Dämpfe, die mit Anilinacetat Rosafärbung lieferten, also wahrscheinlich ein Furfural enthalten, u. selbst in kleinen Mengen deutlich die Rkk. von L. E. LENS-NEUBERG u. von VAN DER HAAR (Biochem. Ztschr. 88. 205; C. 1918. II. 7. von denen die letzte für Glucuronsäure spezif. sein soll. (Biochemical Journ. 18. 1263—72. 1924. Univ. of Liverpool.)

SPIEGEL.

Yuzuru Okuda, *Über die Chemie des „Chiai“-Fleisches*. Chiai ist das blutarme Fleisch im lateralen Muskel der Fische, von dem eine besondere Zus. u. Funktion anzunehmen ist. Diese Art Fleisch wurde mit dem gewöhnlichen verglichen beim Bonito (*Katsuwonus pelamis* Kishinouye = *Gymnosarda affinis*; Journ. Coll. Agric. Tokyo 5. 25; C. 1913. I. 1289), ferner untersucht bei *Auxis hypnosoma*. Es enthält mehr Ä.-Extrakt u. weniger Kohlenhydrate, l. Stoffe, mehr Taurin u. N-Verb., mehr Lipoid-, aber weniger Inosinsäure-P, mehr S in Form von Taurin, daher auch mehr Gesamt-S, in der Asche mehr Fe u. SO_4 . In den vorgebildeten Basen besteht ein größerer Unterschied als in denen der prodd. Im frischen Fleische von *Katsuwonus* wurden außer *Histidin* u. *Xanthin*, *Hypoxanthin*, *Guanin*, *Methylguanidin*, *Taurin*, *Tyrosin*, *Inosinsäure*, *Milchsäure* nachgewiesen; im gewöhnlichen Fleisch überwiegt die *Inosinsäure*, Chiai das *Guanin*. (Journ. Coll. Agric. Tokyo 7. 1—28. 1919.)

SPIEGEL.

Yuzuru Okuda, Tamazo Okimoto und Takeshi Yada, *Hydrolyse der Muskelproteine des Walfisches und des Dorsches*. (Vgl. vorst. Ref.) Auf 100 g asche- u. wasserfreies Muskeleiweiß berechnet, wurden beim Wal (bezw. Dorsch) gefunden: *Glykokoll* 0,0 (0-Spur), *Alanin* 4,66 (3,53), *Valin* 6,25 (3,88), *Leucin* 3,54 (2,46), *Prolin* 5,1 (68), *Phenylalanin* 2,59 (2,31), *Asparaginsäure* 1,47 (0,61), *Glutaminsäure* 3,28 (2), *Serin* 0,49 (0,51), *Tyrosin* 2,40 (2,46), *Arginin* 6,48 (6,68), *Histidin* 3,44 (2,29), NH_3 9,48 (8,35), NH_3 0,91 (0,75) g, *Tryptophan* bei beiden vorhanden. (Journ. Coll. Agric. Tokyo 7. 29—37. 1919.)

SPIEGEL.

Yuzuru Okuda, Seijiro Uematsu, Kihachi Sakata und Kiyoshi Fujikawa, *Hydrolyse der Muskelproteine von Loligo breckeri, Palinurus japonicus und Paralithea camtschatica*. Die Ergebnisse der Best. der Spaltprodd. von Muskeleiweiß der Molluske *Loligo breckeri* u. der Crustaceen *Palinurus japonicus* u. *Paralithea camtschatica* sind, auf 100 g asche- u. wasserfreies Eiweiß berechnet: *Glykokoll* 0, *Alanin* 3,10—3,01—4,41, *Valin* 1,50—+?—2,79, *Leucin* 10,80—11,30—9,09, *Prolin* 3,09—2,26—2,89, *Phenylalanin* 3,41—3,18—3,07, *Asparaginsäure* 3,87—4,24—3,6, *Glutaminsäure* 8,80—?—9,67, *Serin* ?—?—?, *Tyrosin* 2,56—3,31—1,87, *Arginin* 2,72—8,75, *Histidin* 2,33—2,87—2,21, *Lysin* 6,87—9,06—5,88, NH_3 0,91—0,84—0,6, *Tryptophan* +—+—+. Diese Ergebnisse werden mit bekannten Daten des Muskeleiweiß von Säugern, Vögeln u. Fischen verglichen. (Journ. Coll. Agric. Tokyo 7. 39—54. 1919.)

SPIEGEL.

Yuzuru Okuda, *Über die Extraktivstoffe von Palinurus japonicus und Loligo breckeri*. (Vgl. vorst. Ref.) Bei der Crustacee *Palinurus* wurden folgende Extraktivstoffe aus dem Muskelfleisch isoliert (die Zahlen bedeuten g für 1 kg frischen Fleisches): *Hypoxanthin* 0,16, *Arginin* 5,2, *Histidin* 0,013, *Lysin* 0,35, *Betain* 2,4, *Taurin*, *Alanin* 0,35, *Prolin* 0,1, *Taurin* wenig, *Milchsäure* 0,2; bei der Molluske

Loligo: *Hypoxanthin* 0,24, *Histidin* 0,01, *Betain* 1,7, *Kreatin* Spur, *Tyrosin* +, To 1,8, *Milchsäure* +. Die Ergebnisse werden mit den bei Fischen u. Säugeti ermittelten im Vergleich gestellt u. erörtert. (Journ. Coll. Agric. Tokyo 7. 55-1919.)

SPIEGL.

Makoto Yamagawa, *Über neue Protamine*. Aus dem Sperma von 6 j Fischarten wurden Protamine in Form ihrer Sulfate isoliert. Sie ähneln in i allgemeinen Eigenschaften den bereits bekannten. Bei der hydrolyt. Spaltung hauptsächlich *Arginin*, stets aber auch *Histidin* erhalten. Diese Protamine wi giftig auf Mäuse, Meerschweinchen, Kaninchen u. Hunde u. scheinen g erweiternde u. gerinnungshemmende Wrkg. zu haben. — *Lateolin*, $C_{30}H_{85}O_4$ von „Suzuki“ (*Lateolabrex japonicus*), stark alkal.; *Sulfat*, sl. in W., unl. i u. Ä., $[\alpha]_D^{20} = -94,61^\circ$; *Pt-Salz* orangerot, unl. in w. W., CH_4O u. Ä. — *Scia C₁₈H₅₅O₁₀N₁₂* (?), von „Nibe“ (*Sciaena schlegeli*); *Sulfat*, wl. in k., ll. in h. $[\alpha]_D^{20} = -128,44^\circ$; *Pt-Salz* hellbraun. — *Scombropin*, $C_{25}H_{57}O_4N_{12}$, von „M (Scombrops boops); *Sulfat*, ll. in W., $[\alpha]_D^{20} = -76,64^\circ$; *Pt-Salz* hellbrau *Seriolin*, $C_{29}H_{56}O_3N_{13}$, von „Buri“ (*Seriola aureovittata*); *Sulfat*, l. in W., $[\alpha]_D^{20} = 88,44^\circ$; *Pt-Salz*, gelblichbraun. — *Scombremin*, $C_{28}H_{62}O_6N_{13}$, von „Sawara“ (*S bremorus nipponius*); *Sulfat*, sl. in W., $[\alpha]_D^{20} = -118,30^\circ$; *Pt-Salz* rötlichor. — *Stereolin*, $C_{25}H_{64}O_6N_{14}$, von „Ishinagi“ (*Stereolepis ishinagi*); *Sulfat*, ll. in W. $[\alpha]_D^{20} = -97,14^\circ$; *Pt-Salz* hellrotgelb. (Journ. Coll. Agric. Tokyo 5. 419-1916.)

SPIEGL.

E₅. Tierphysiologie.

W. W. Prawdicz-Neminski, *Über die hormonale Bedeutung des Ammoniu Der Antagonismus und Synergismus zwischen den Ionen des Ammoniums un Magnesiums im Organismus*. Bei Hunden mit chron. Magenfistel entstehen s Magenbewegungen bei Einführung unbedeutender Mengen NH_4OH oder NH_3 . Das sich physiol. während des Prozesses der Sekretion bildende NH_3 nimr den rhythm. Bewegungen des Magen-Darmkanals teil. Es ist aber immer t die Möglichkeit der gleichzeitigen Wrkg. anderer Hormone anzunehmen. Das H das sich im Herzen während der Zuckung bildet, hat eine Bedeutung für die fernung von Ca u. Mg. (Biochem. Ztschr. 152. 388—405. 1924. Kiew, Ula Akad. d. Wissensch.)

WOLF.

C. W. Mc Clure, *Studien über Pankreasfunktion. Die Enzymkonzentratu des Duodenalinhaltes in Gesundheit und Krankheit*. Bei Gesunden erschein c Reizung der äußeren Pankreassekretion mehr durch die Natur der Nahrungsor als durch die Acidität des Magensaftes bedingt u. gemeinsam mit derjenige d Gallensekretion. Zerstörung des Pankreas, vor allem des Kopfes (besonde chron. Pankreatitis) führt zu erheblicher Verminderung des Pankreassekrets, cu Pankreasnekrose oft zu Dissoziation (?) der Enzymkonz. (Americ. Journ. (t med. sciences 167. 649—64. Boston, EVANS Mem.; Ber. ges. Physiol. 29. 94. 92 Ref. VAN REY.)

SPIEGL.

W. B. Cannon, J. R. Linton und R. R. Linton, *Bedingungen für die Ativ tät in endokrinen Drüsen*. XIV. *Die Wirkung von Muskelstoffwechselprodukte a die Nebennierensekretion*. (Vgl. CANNON, MC IVER u. BLISS, Amer. Journ. Physic 69. 46; C. 1924. II. 1363.) Eine Beobachtung von JOHANSSON (Skand. An. Physiol. 5. 59. [1895]), daß das entnervte Herz beschleunigt wird, wenn tot wechsellprodd. des gereizten Muskels in den Kreislauf gelangen, wird bestig Diese Wrkg. bleibt aber aus, wenn die Nebennieren außer Tätigkeit gesetzt in u. es wird daraus geschlossen, daß diese Drüsen die Wrkg. vermitteln, ab scheinlich durch Erregung ihrer Nervenreglung. (Amer. Journ. Physiol. 71. 63-62. 1924. HARVARD Med. School.)

SPIEGL.

Aksel O. Haneborg, *Untersuchungen über die Magensaftsekretion bei gesunden Tieren*. Bittermittel bewirkten keine Steigerung der Sekretion. Cacao fördert ebenfalls Kaffee, Tee nicht sicher; nach Verss. mit Kaffee Hag u. Kornkaffee stufenweisem Zusatz von Kaffein dazu ist diesem die Wrkg. des Kaffees zuzuschreiben. *Fleischextrakt* steigert die Sekretion erheblich. (Norsk magaz. f. lægevidenskaben **85**. 369—407. Christiania, Univ.; Ber. ges. Physiol. **28**. 413—14. B. HARNISCH.) SPIEGEL.

Ardney W. Downs und **Nathan B. Eddy**, *Secretin*. VI. *Seine Einwirkung auf die Antikörper des Blutes: Agglutinin*. Bei Zufuhr von Secretin subcutan an Kaninchen durchschnittlich höheren Agglutinationswert ihres Blutes gegenüber Typhusbacillen als nicht behandelte. (Amer. Journ. Physiol. **71**. 40—43. 1924. Edmonton [Canada], Univ. of Alberta.) SPIEGEL.

Ardney W. Downs, **Nathan B. Eddy** und **Robert M. Shaw**, *Secretin*. V. *Seine Einwirkung auf die Antikörper des Blutes: Komplement*. VIII. *Hämolytischer Amboceptor*. (Vgl. vorst. Ref.) Die Verss. an gewaschenen Hammelblutkörperchen ergeben unter Einw. des Secretins keinen Einfluß auf das Komplement durchschnittlich wesentlich geringeres hämolyt. Vermögen als bei unbehandelten. (Amer. Journ. Physiol. **71**. 44—45. 46—48. 1924. Edmonton [Canada], Univ. of Alberta.) SPIEGEL.

Erwin Becher, *Über das Vorkommen von aromatischen Oxysäuren und Phenolen im enteiweißten Blut und über die Bedeutung derselben bei echter Urämie*. (Vgl. S. 91.) In u. Blute fehlen aromat. Gruppen oder sind sie nur in geringer Menge vorhanden, stärker treten sie auf bei Niereninsuffizienz, besonders bei echter Urämie. Bei hochgradiger Azotämie scheinen *Phenole* u. *aromat. Oxysäuren* auch frei im Blute aufzutreten. Vielleicht sind die Phenole von Bedeutung für den Symptomenkomplex der echten Urämie u. die aromat. Oxysäuren für die uräm. Acidose verantwortlich. (Dtsch. Arch. f. klin. Med. **145**. 333—38. 1924. Halle, Med. Kl.) SPIEGEL.

Kantaro Onohara, *Über den Blutchemismus während der Tätigkeit der Verdauungsdrüsen*. Bei starker Magen- u. Pankreassekretion setzt am Hunde ein starker Wasserstrom vom Gewebe ins Blut ein. Der Trockensubstanzgehalt des Blutes hängt ab von dem Verhältnis der antagonist. Faktoren: Blutwasserverlust durch die Drüsensekretion u. Gewebswasserzustand zu Blut (kompensator. bis überkompensator.), abgesehen von den anderen Wegen, auf denen der Körper W. verliert. Je stärker die Drüsensekretion ist, um so mehr wird NaCl mit dem Gewebswasser u. auch durch Vermittlung dieses aus den Geweben selbst ins Blut gezogen. Der NaCl-Gehalt des Blutes hängt ab von dem Verhältnis der antagonist. Faktoren des NaCl-Verlustes bei der Sekretion u. dem NaCl-Ersatz aus der Gewebssfl. u. aus den Geweben, abgesehen vom NaCl-Verlust durch den Harn. Der Blutzuckergehalt des Serums ändert sich während der Verdauung wenig oder steigt vorübergehend an. Der Anstieg fällt ebensowohl mit der Erhöhung der Sekretion wie auch mit der Ernährung durch zuckergebende Substanzen (Fleisch u. Kohlenhydrat) zusammen. Es ist durch diese Verss. nicht zu entscheiden, ob die Blutzuckererhöhung lediglich ein alimentär glykosur. Phänomen ist. Bei Stopffütterung verhalten sich Bluttrockensubstanz, NaCl- u. Zuckergehalt des Blutes prinzipiell wie bei Normalfütterung. Ebenso bei Scheinfütterung. (Biochem. Ztschr. **154**. 26—77. 1924. Berlin, Charité.) WOLFF.

H. J. Stander, *Die Chemie des Blutes während der Schwangerschaft*. Vf. ermittelte folgende Mittelwerte in mg für 100 ccm bei n. Schwangerschaft: Rest-N **28** (n. 32), Harnstoff-N **12,5** (n. 18), Harnsäure **3,3** (wie n.), CO₂-bindende Kraft **47** Vol.-% (n. 52). Bei schwererem neurogenen Erbrechen steigen die Werte für Harnstoff u. Harnsäure. Letztere ist bei allen Toxämien gesteigert. Der Harn-

stoffanteil am Rest-N steigt bei nephrit. Toxämie, ist n. oder gesenkt im präekl. Stadium. Bei Eklampsie fanden sich Rest-N u. CO₂-bindende Kraft ziemlich (Bull. of the JOHNS HOPKINS Hosp. **35**. 133—37; Ber. ges. Physiol. **28**. 426. 1924. Ref. SCHMITZ.) SPIEGEL

H. Zerner, Über den relativen Phosphorgehalt des Blutes bei Krebskranken. Der „Phosphorquotient“ — mg P₂O₅ in 10 ccm Blut: Erythrocytenzahl (Millionen in 1 ccm — war bei malignen Tumoren erhöht, bei anderen Erkrankungen von Werten. (Ztschr. f. Krebsforsch. **21**. 157—59. Berlin, Univ.; Ber. ges. Physiol. **428**. 1924. Ref. LASNITZKY.) SPIEGEL

O. L. V. de Wesselow, Die anorganischen Bestandteile des Blutes unter verschiedenen pathologischen Bedingungen. (Vgl. Quart. Journ. of med. **16**. 341. 1924. I. 1819.) Bei Diabetikern fand sich keine Abnahme der bas. Bestandteile auch nicht bei ausgesprochener Ketosis u. trotz herabgesetzter Alkalireserve, offenbar weil die Verluste an fixem Alkali durch Entnahme aus dem Bestande des Körpers ausgeglichen werden. Anorgan. PO₄ ist zuweilen deutlich vermindert, ebenso Cl im Plasma (Übertritt in Erythrocyten?). — Bei azotäm. Nephritis ist infolge herabgesetzter Fähigkeit der Niere zu Ausscheidung von PO₄ die Menge der sauren Radikale im Blute erhöht, PO₄ angehäuft, HCO₃' vermindert, Ca zuweilen bis auf die der idiopath. Tetanie eigentümlichen Werte erniedrigt, K meist normal. HCO₃' u. Cl zeigen gegensätzliche Bewegung. — Bei eklampt. u. präeklampt. Zuständen wurden nur geringe Erhöhung von Cl u. Erniedrigung von HCO₃' (kann größer als bei n. Schwangerschaft) festgestellt. (Lancet **206**. 1099—1101; Ber. ges. Physiol. **28**. 427. 1924. Ref. SCHMITZ.) SPIEGEL

Samuel A. Levinson, Die Giftigkeit menschlichen Blutplasmas bei verschiedenen Krankheiten. IV. Studien über die Giftigkeit menschlichen Blutplasmas für Mäuse. (II. vgl. Journ. Immunology **7**. 511; C. **1924**. I. 1820.) Bei Best. der Oberflächenspannung u. Giftigkeit zeigte sich, daß die Giftigkeit des Plasmas höchstens bei gleichzeitiger deutlicher Körperchenzerstörung ist. Unter solchen patholog. Bedingungen, verbunden mit einem quantitativen Anstieg des Fibrinogens, steigt die Toxizität, u. zwar parallel damit. Der Tod nach intravenöser Injektion von Plasma verschiedener patholog. Herkunft beruht auf intravaskulärer Gerinnung. (Journ. Immunology **9**. 463—80. 1924. Chicago [Ill.], Univ. of Ill., Coll. of Med.) SPIEGEL

Yuhei Fujimori, Studien über die Giftigkeit der nonprotein-N-haltigen Substanzen im Blutserum der Tiere. Nach der von HATTA modifizierten Fe-Methode von MICHAELIS u. RONA wurden aus 1 l Pferdeserum 0,8 g eiweißfreie N-Substanz gewonnen, in A. l., in Ä. unl., mit 4,6% Asche. Sie wurde zu 10—20% in physiol. NaCl-Lsg. gel. u. bewirkte an Kaninchen u. Hunden Gefäßerweiterung, Blutdrucksenkung u. Atmungserregung, am Zentralnervensystem mannigfache Reiz- u. Lähmungserscheinungen, bei Maus u. Frosch Tod durch Atemstillstand, keine Nierenschädigung oder uräm. Erscheinungen. — Aus dem Blute von durch Urethritis gemachten Hunden auf ähnliche Weise gewonnene Substanz wirkte nicht blutdrucksenkend, sonst wie die vorige. — Für andere Verss. wurde das Material durch Erhitzen des angesäuerten Serums bis zur Gerinnung des Eiweißes u. Filtration mit Zusatz von Kaolin gewonnen, u. zwar aus n. Serum (I), uranephrit. (II) u. cantharidin-nephrit. (III). Das Verhältnis Rest-N : NH₃-N war bei I 72 : 1, bei II u. III 24 : 1. Diese wirkten beim Kaninchen blutdrucksteigernd u. krampferzeugend, wahrscheinlich durch das NH₃, denn (NH₄)₂CO₃ wirkte auch in dieser Weise. (Abh. a. d. med. Fak. d. Kais. Univ. zu Tokyo **30**. 207—67; Ber. ges. Physiol. **29**. 1924. Ref. SCHOEN.) SPIEGEL

Oskar Weltmann und Eduard Klimesch, Beitrag zur physikalischen Chemie des Serums. Serum wird mit 1/100-n. HCl titriert. Aus den Trübungsphänomenen können diagnost. Schlüsse bzgl. Pneumonie u. prognost. bei der Niereninsuffizienz

gegen werden. Die Trübung, die bei der Verd. des Serums mit der 10fachen Menge dest. W. auftritt, hängt vom CO_2 -Gehalt des Serums wie des W. ab; aber bei Ausschluß von CO_2 tritt eine, wenn auch weit schwächere Trübung auf. Der „Wassereffekt“ besteht aus 2 Komponenten: Fällung des Globulins durch Verdrängung der Löslichkeitsvermittler u. der einer weiteren Fraktion durch die CO_2 . Der Wassereffekt hat beim Serum Lebender zu keinen prakt. brauchbaren Resultaten geführt. Bei der Säuretitration des Serums entspricht der Titrationswert dem Pufferungsvermögen des Serumalkalis. Alkali u. Eiweiß können wechselseitig die Säure ausgleichen u. derart kompensierend auf das Pufferungsvermögen des Serums einwirken. Erniedrigte Titrationswerte finden sich vor allem bei Niereninsuffizienz mit u. ohne Urämie. (Ztschr. f. d. ges. exp. Medizin **43**. 626—46. 1924. Wien, Univ.)

WOLFE.

William Ogilvie Kermack und **Peter Mac Callum**, *Einige kolloidale Eigenschaften der Wassermannantigene*. Alkoh. Extrakt von Herzmuskel gibt mit W. ein opalisierendes Sol, das durch NaCl selbst in hohen Konz. nicht ausgeflockt wird, in Säure erst, wenn pH bis ca. 1,9 gesunken ist. Durch ein gleiches Vol. 1%ig. CaCl_2 -Lsg. erfolgt Flockung, nicht aber, wenn der CaCl_2 -Gehalt der zusetzten Lsg. 2,5% oder mehr beträgt; auf das Verh. des CaCl_2 übt die $[\text{H}^+]$ nur geringen Einfluß. Durch niedrig konz. Gelatinelsgg. erfolgt die Fällung wie für Benzoecharzsol (vgl. WRIGHT u. KERMACK, Biochemical Journ. **17**. 635; C. **1923**. I. 1642) bei $\text{pH} = < 4,7$. (Biochem. Journ. **18**. 1381—87. 1924. Edinburgh, Roy. Soc. of physicians; Roy. Infirmary.)

SPIEGEL.

A. T. Mac Conkey, *Die Stabilität von Tetanustoxin in 50 prozentigem Glycerin*. Tetanustoxin in 50%iger Glycerinlösung ist in gesättigter Salzlösung. Tetanustoxin hielt sich in Mischung gleicher Mengen Glycerin u. dest. W. 18 Monate lang fast unverändert, antitox. Serum, mit NaCl gesätt., ebenfalls monatelang. (Journ. of Hyg. **22**. 473—76; Ber. ges. Physiol. **28**. 483—84. 1924. Ref. SELIGMANN.)

SPIEGEL.

George E. Coleman, *Wirkung von Leukocyten und Hirngewebe auf das Toxin B. botulinus nebst einer Bemerkung über Peptonbehandlung beim experimentellen Botulismus*. 1 cem 5%ig. Lsg. von Wittepepton, in verschiedenen Intervallen nach intraperitonealer Toxininjektion Meerschweinchen injiziert, beschleunigte deren Tod an Botulismus. Gewaschene Leukocyten, in vitro mit dem Toxin bebrütet, erhöhten deren Giftigkeit oft erheblich. Zerriebenes Gehirngewebe absorbierte bei 30-stünd. Bebrütung das Toxin nicht. Schutz gegen das Toxin (intraperitoneal) gewährt eine 18 stünd. vorher gemachte Einspritzung von Pepton in die Bauchhöhle, vermutlich dadurch, daß das schleimige Exsudat an der Peritonealoberfläche die Resorption des Giftes hindert. (Journ. of infect. dis. **34**. 614—20; Ber. ges. Physiol. **29**. 154—55. 1924. Ref. SCHNITZER.)

SPIEGEL.

Edwin F. Hirsch, *Wasserstoffionenstudien. XI. Herstellung von Antitoxin- und Agglutinin-trockenpulver*. (X. vgl. HIRSCH u. LE COUNT, Journ. of infect. dis. **34**. 103; C. **1924**. II. 1941.) Genaue Vorschriften zur Herst. dieser Pulver in l. u. w. wirksamem Zustande, im ganzen auf ähnliche Weise wie bei der Herst. von Antitoxinpulver (l. c.). (Journ. of infect. dis. **34**. 390—94. Chicago, St. Lukes Hosp.; Ber. ges. Physiol. **29**. 144—45. 1924. Ref. PUTTER.)

SPIEGEL.

David I. Macht und **C. F. Elvers**, *Wirkung von Menotoxin auf die Lebensfähigkeit von Spermatozoen*. (Vgl. S. 687.) Menstrualserum zeigte sich für Spermatozoen nicht giftiger als n. Serum. Auch Oxycholesterin u. Gallensäuren, mit denen das Menotoxin chem. verwandt sein soll, zeigten keinen Einfluß. (Proc. of Soc. f. exp. biol. and med. **21**. 254—55. Baltimore, Johns Hopkins Univ.; Ber. ges. Physiol. **29**. 160. 1924. Ref. SCHÜBEL.)

SPIEGEL.

Ludwig Hektoen und **Kamil Schulhof**, *Weitere Beobachtungen über Linseningipitine*. Antigene Eigenschaften der α - und β -Krystalline. α - u. β -Krystalline

der Augenlinse zeigen sich bei der Präcipitnrk. völlig voneinander versch. jedes bei den verschiedenen untersuchten Säugetierlinsen aber prakt. ident. Linsenkörper der Fische kann die gleichen antigenen Elemente enthalten, da aber noch in größerer Menge andere, für Fischlinsen spezif. antigene Bestandteile (Journ. of infect. dis. **34**. 433—39. Chicago, JOHN MC CORMICK Inst. f. infect. Ber. ges. Physiol. **29**. 148. 1924. Ref. DOLD.)

C. E. Pico, *Wirkung des Mangans auf die Phänomene der Immunität*. Die Erhöhung des Antitoxingehaltes im Serum gegen Diphtherie immunisierter durch $MnCl_2$ (vgl. WALBUM u. MÖRCH, Ann. Inst. Pasteur **37**. 396; C. **1923**. 263) wird bestätigt. Bzgl. Tetanusantitoxins sowie des Wertes von Präcip. Hämolsinen u. des Antiserums gegen das Gift von *Lachesis alternatus* waren Ergebnisse negativ. Für die Komplementbindung bei Antimeningokokken scheint der Titer erhöht zu sein, nicht aber für dessen Agglutinationsvermögen sensibilisierten Meerschweinchen wirkte $MnCl_2$ in $\frac{1}{3}$ der Fälle antianaghylykt. unmittelbar darauf folgende Einspritzung des auslösenden Antigens. (C. r. s. biologie **91**. 1049—53. 1924. Buenos-Aires, Dép. nat. d'Hyg.)

Lela E. Booher und **John A. Killian**, *Ketosis in Verbindung mit Alkalosezuständen*. Bei unkompensierter Alkalose im Laufe von Alkalitherapie oder häufigerem starken Erbrechen fanden sich in Blut u. Harn abnorm hohe Mengen von Acetonkörpern. (Proc. of the soc. f. exp. biol. and med. **21**. 528—29. N. York, Postgraduate med. school and hosp.; Ber. ges. Physiol. **28**. 406. 1924.)

H. J. Stander, **E. E. Duncan** und **B. L. Moses**, *Die Harnstoffausscheidung bei Schwangerschaftsintoxikationen*. Vff. benutzen den Index $X = \frac{B \times TN}{D}$,

D die Harnstoffmenge im Harn von 24 Stdn. in g, B den Harnstoff in 100 ccm Blut in mg, TN den Gesamt-N des Harns von 24 Stdn. in g angibt. X wurde im Durchschnitt n. zu 26,5, bei n. Schwangeren zu 16,4, bei Nierenstörungen 23, bei Eklampsie 26,2—28,7 gefunden. (Bull. of the JOHNS HOPKINS Hosp. **35**. 103 bis 103; Ber. ges. Physiol. **28**. 440—41. 1924. Ref. VAN REY.)

Paul György, *Zur Frage der Säureausscheidung im Urin*. Verd. des Harns führt zu einer Abnahme der Harnacidität u. zu einer Erhöhung des NH_3 -Koeffizienten. Der aus diesen beiden Komponenten gebildete „Gesamtsäurekoeffizient“ $\frac{A + NH_3}{N} \times 100$, bleibt in engen Grenzen konstant. Konz. (Wasserentzug)

fuhr von Salzen, z. B. Phosphaten, KCl , $NaCl$, innerer Zellzerfall) bedingt in der Verd. reziproke Veränderung. Der Gesamtsäurekoeffizient bleibt wie konstant, kann aber auch leicht erhöht sein. Allein dieser Koeffizient eignet sich für die Beurteilung des intermediären Säure-Basengleichgewichtes. Die [H] ist nur ein unterstützender Faktor, dessen gesonderte Betrachtung zu Trugschlüssen führen kann. Die Fieberwrkg. äußert sich in einer Erniedrigung des Gesamtsäurekoeffizienten u. parallel damit meist auch in einer Abnahme der $[H^+]$ im Blut, z. B. im Kochsalzfieber. Beim tox. Fieber, (Schutzpockenimpfung, Typhusvakz. subcutan) gesellt sich zu der alkalot. Fieberwrkg. der Konzentrierungseffekt, der sich dann in erniedrigten pH -Werten äußert. Der Gesamtsäurekoeffizient bleibt aber noch stark erniedrigt, so daß die alkalot. Stoffwechselrichtung mit Hilfe der Größe eindeutig erkennbar ist. (Ztschr. f. d. ges. exp. Medizin **43**. 605—25. 1924. Heidelberg, Kinderklin.)

F. M. Bricker, *Zum Problem des Diabetes*. Die Einführung einer überschüssigen Menge von OH -Ionen in das Blut von Kaninchen ruft eine Hyperkämie hervor, die von H Ionen eine Hyperglykämie. Beide Erscheinungen ebnen bei n. Tieren rasch zurück. Isoliertes lebendes Gewebe unter günstigen Bedingungen

ockesch. Lsg. mit pH über n. (7, 4) verbraucht Glucose aus der Lsg., bei entgegengesetzten Bedingungen aber scheidet es Glucose in die umgebende Nährfl. Überlebende Extremitäten von Kaninchen reagieren bei Durchspülung mit ockercher Lsg. auf die Einführung von Säure u. Alkali innerhalb bestimmter Anknüpfungsgrenzen nach beiden Seiten des Gleichgewichtes der H- u. OH-Ionen so wie isoliertes Gewebe. Das Gleichgewicht der H- u. OH-Ionen spielt in der Lehre des Diabetes eine große Rolle. (Biochem. Ztschr. 154. 328—42. 1924. Moskowitz, Med. Inst.)

WOLFF.

J. Wright Wilson, W. L. Long, H. C. Thompson und Sylva Thurlow, *Veränderungen in der Zusammensetzung des Harns nach Muskeltätigkeit*. Die Harnvoll. ist, auch bei Aufnahme kleiner Mengen W. in kurzen Zwischenräumen. Höhere (entsprechend mehr anorgan. Phosphate) u. Titrationsacidität, höhere Ausscheidung von NH_3 u. Anwachsen des NH_3 -Quotienten erwiesen Steigerung der N-Ausfuhr u. Einsparung von Alkali. Die Chloride sanken in 20 Min. auf ein Minimum. Gesamt-N nahm stark ab, Kreatinin nicht. (Proc. of the soc. f. exp. biol. med. 21. 425—26. Philadelphia, Univ. of Pennsylvania school of med.; Ber. Physiol. 28. 439. 1924. Ref. SCHMITZ.)

SPIEGEL.

Wald H. Boltz, *Liquorstudien mit einer Essigsäureanhydrid-Schwefelsäuremischung*. Zu 1 ccm Liquor tropfenweise 0,3 ccm Acetanhydrid, dann nach Schütteln tropfenweise 0,8 ccm konz. H_2SO_4 gegeben u. wieder geschüttelt. Bläuliche oder bräunliche Färbung trat stets ein bei Paralyse, unter psychiatr. Material hauptsächlich bei Syphilis, um so deutlicher, je vorgeschrittener u. aktiver die Krankheit war, je mehr sie nichtsyphilit. u. funktionellen Psychosen, bei Tabes schwankend. Die Rk. trat mehrmals auch bei Nervensyphilis mit negativer Wassermannrk. auf. (Americ. J. of psychiatry 3. 111—19; Ber. ges. Physiol. 29. 154. 1924. Ref. KAFKA.) SP. **Andro Tronconi**, *Das Calcium in der Rückenmarksflüssigkeit rachitischer und rachitischer Säuglinge*. Solche Liquores enthalten Ca in geringerer Menge als die von gesunden Säuglingen u. im umgekehrten Verhältnis zwischen organ. u. anorgan. Ca. Diese Verhältnisse werden durch die Therapie beeinflusst. (Clin. Chim. Acta 6. 129—42. Pavia, Univ. Milano, Ist. clin. di perfezion; Ber. ges. Physiol. 29. 154. 1924. Ref. KAFKA.)

SPIEGEL.

Joseph Needham, *Untersuchungen über Inosit*. III. *Das Stoffwechselverhalten von Inosit im sich entwickelnden Vogelei*. (II. vgl. Biochemical Journ. 18. 891; 19. 125. I. 113.) Bei Eiern von schwarzen u. von weißen Leghornhühnern waren die absoluten Mengen i-Inosit abs. verschieden. Ihre Änderung im Laufe der Entw. folgte demselben Gange. Einspritzung von Glucose in das befruchtete unbefruchtete Ei verursachte erhebliche Vermehrung des Inositgehaltes während der ersten Entw. Die Glucose dürfte danach als n. Ausgangsmaterial für Inosit betrachtet sein. (Biochemical Journ. 18. 1371—80. 1924. Univ. of Cambridge.) SP.

Verner Teschendorf, *Über die Resorptionszeit von Gasen in der Brusthöhle*. Künstlicher Pneumothorax an Hunden. Infundiert wurden Luft, N_2 , O_2 , H_2 , CO , N_2O , CO_2 , $CH \equiv CH$ u. SH_2 . Die Resorption von Gasen geht in der Brusthöhle des Hundes schneller vor sich als in der Bauchhöhle (vgl. Arch. f. exp. Med. u. Pharmak. 92. 302; C. 1922. III. 184). Vergleicht man den Blutweg mit der Flüssigkeitsschicht, so geht die Diffusion von Gasen aus der Brust- oder Bauchhöhle nach dem Gesetz von EXNER vor sich (POGGENDORFS Annalen der Physik u. Chemie 115. 231. 443 [1875]); Abweichungen beruhen auf spezif. Löslichkeit. Bindungsvermögen einzelner Gase im Blut, z. B. namentlich bei C_2H_6 wohl nur die Fettlöslichkeit. Bei SH_2 konnten durch verschiedene Dosen die einzelnen Stadien der Giftwrkg. gezeigt werden. An sich tödliche Mengen zusammen mit Luft eingeatmet waren mehr oder weniger wirkungslos. Ein Pneumothorax war bei Hunden mit O_2 , CO_2 , $CH \equiv CH$ u. SH_2 wegen der schnellen Resorption dieser Gase nicht

anzulegen. (Arch. f. exp. Pathol. u. Pharmak. **104**. 352—74. 1924. König Univ.)

Aline Guth, *Einwirkung des Hexetons auf die Atmung des Menschen*. Fre Minutenvol. u. Einzelvoll. steigen an. Der Ventilationseffekt wird gehoben. Atmung bedeutend verbessert. (Arch. f. exp. Pathol. u. Pharmak. **104**. 37. 1924. Heidelberg, Med. Klin.)

Jayme Regallo Pereira, *Über den Einfluß der Wasserstoffionenkonzentration auf den Sauerstoffverbrauch bei Meerwasserfischen*. Im allgemeinen zeigte sich steigender $[H^+]$ der O_2 -Verbrauch verringert. Bei $p_H = 5$ findet sich ein Minimum. Die optimale Rk. liegt bei ca. 8,0. (Biochemical Journ. **18**. 1294—96. 1924. de Janeiro, Med. Fak.)

L. R. de Buys und **L. von Meysenbug**, *Der Kalkgehalt der Brustmilch in Beziehung zur Rachitis*. Die Unterss. ergaben im allgemeinen für rachitische Kinder einen geringeren Ca-Gehalt der entsprechenden Muttermilch. (Americ. Journ. of Pediatrics **27**. 438—43; Ber. ges. Physiol. **29**. 74. 1924. Ref. FREUDENBERG.)

Richard Priesel, *Der Nährwert von frischem Fleisch*. Die Pirquetsche Methode wurde an großem Material nachgeprüft u. für die Praxis brauchbar gefunden. (Ztschr. f. Kinderheilk. **38**. 161—63. Wien, Univ.; Ber. ges. Physiol. **28**. 399. 1924. Ref. EDELSTEIN.)

Werner Kollath, *Vitaminähnliche Substanzen in ihrer Wirkung auf das Wachstum der Influenzabazillen (Bac. Pfeiffer)*. I. Mitteilung. Herstellung eines festen vitaminhaltigen Nährbodens und Verhalten der vitaminhaltigen Substanzen auf diesem. Die Verss. bezweckten, die beiden für das Wachstum des Influenzabazillus erforderlichen Faktoren (vgl. THJÖTTA u. AVERY, Journ. Exp. Med. **34**. 97; C. **1924**. III. 1505) je für sich zu erhalten, um sie für sich genauer untersuchen zu können. Dies gelang für Faktor X im Blute durch hochgradiges Verd., für V durch Inkubation steriler roher Kartoffelstückchen mit sterilem dest. W. (das in der Kartoffel ebenfalls vorhandene X geht erst nach 5—6 Wochen in Lsg.). Durch Zugabe beider Lsgg. zu Agar wurde ein klarer, fast blutfreier, vitaminreicher Nährboden gewonnen, auf dem die Influenzabazillen üppig wuchsen u. sich über 25 Generationen in typ. Formen weiterzüchten ließen. Es zeigte sich, daß außer jenen beiden Faktoren der Bacillus noch eine dritte, nicht genauer zu definierende Substanz braucht, wenn Fleischwasser u. ähnliches fehlen, bei größeren Bakterienmengen auf festen Nährböden, in fl. schon bei kleineren aus den Leibern der toten Bakterien gewonnen werden kann, wofür der Ausdruck „Kannibalismus“ vorgeschlagen wird. Die X-Substanz ist wahrscheinlich eine Fe-haltige organ. Verb., die in geringen Mengen im Blutfarbstoff, aber auch in Früchten vorkommt. Die Bezeichnung des Bacillus als „hämophil“ ist daher vielleicht besser durch „siderophil“ zu ersetzen. Die Benzidinrk. eines Körpers ist nicht unbedingt gleichbedeutend mit wachstumsförderndem Einfluß auf den Bacillus. (Zentralblatt f. Bakter. u. Parasitenk. Abt. B. **506**—19. 1924. Breslau, Univ.)

A. V. Hill, *Muskeltätigkeit und Kohlenhydratstoffwechsel*. (Vgl. HILL, Journ. Physiol. **1924**. II. 1820 u. LUPTON, Proc. Royal Soc. London, Serie B **96**. 438; C. **1924**. II. 1820.) Die Förderung der ganzen Frage an Hand der umfangreichen Literatur. Bisherige veröffentlichte Unterss. von **K. Furusawa** über den Respirationskoeffizienten als Erkennen, daß der ganze oxydative Ablauf der Erholung auf Kosten von Kohlenhydrat erfolgt, wenn die Tätigkeit des Muskels nur so kurz u. gering war, daß kein meßbarer Mangel an Kohlenhydrat in ihm eintritt. Erst, wenn dessen Kohlenhydrat aufgebraucht ist, müssen andere Stoffe, wahrscheinlich Fett, umgewandelt werden, was sich an Sinken des R.-Q. zu erkennen gibt. (Science **60**. 505—14. 1924.)

Marja Starzewska, *Über den Einfluß des Asparagins und des Ammoniumsnitrats auf den Stickstoffumsatz eines Wiederkäuers*. Zusatz von Asparagin u.

lichem Eiweiß armer Kost hatte bei einem Widder positiven Einfluß auf die Harnkonz., ebenso von $(\text{NH}_4)\text{NO}_3$. Der Rest der verabreichten Substanzen wurde als Harnstoff ausgeschieden. (Roczniki Nauk Rolniczych 10. 527—44. 1923. Krakau, Univ.; Ber. ges. Physiol. 29. 74. 1924. Ref. KOPEĆ.) SPIEGEL.

Henry M. Thomas jr., *Der Gebrauch von Glycerin als antiketogener Substanz bei Diät Zuckerkranker*. Bei Ersatz von 14 g Kohlenhydraten in der Nahrung durch 30 g Glycerin verschwanden bei 2 Kranken aus dem Harn Acetonkörper u. u. erfuhr dieser auch im Blute eine Erniedrigung. Rückkehr zur vorigen Nahrung bewirkte sofort wieder das Gegenteil. (Bull. of Johns Hopkins Hosp. 29. 6—8. 1924. Ref. VAN REY.) SPIEGEL.

Rangier, *Über die Ausscheidungsform der Harnsäure*. Vf. gelangt auf Grund bekannter Tatsachen u. besonders auf Grund der Beobachtungen bei einem nachgeprüften u. genau gefundenen Verf. von DUCUNG zur Best. der Ausscheidungsform im Harn mittels Cu-Thiosulfats zu der Feststellung, daß die Harnsäure in Form eines durch Kuppelung an eine Substanz, deren Natur noch nicht festgestellt werden konnte, im sauren Medium l. ist. Bei der Einw. des genannten Cu-Salzes zerlegt sich diese gekuppelte Verb. in das unl. Cu-Salz der Harnsäure u. eine l. Verb. des kuppelnden Komplexes. Dabei gehen von dem erforderlichen $\text{Cu}^{2/3}$ $\frac{1}{3}$ in Nd., während $\frac{2}{3}$ in Lsg. bleibt. Das Verhältnis des unl. Cu zum l. Cu kann man erkennen, ob die Harnsäure noch völlig gekuppelt vorliegt oder schon teilweise entkuppelt, u. der Gehalt in der Lsg. läßt den ursprünglichen Gehalt an Harnsäure in der gekuppelten Harnsäureverb. erschließen, auch wenn ein Teil vorher infolge der Kuppelung ausgeschieden war, wie dies in Harnen mit Harnsäuresand der Fall ist. (Bull. Soc. Chim. Biol. 6. 935—70. 1924. Bordeaux, Fac. de méd. et de pharm.) SPIEGEL.

Chelle und M. Rangier, *Über die Form der Harnsäure in sauren Uraten und in sauren Harnen*. Die Unters. nach dem von RANGIER (vgl. vorst. Ref.) entwickelten Schema gestattet die Feststellung, daß die Harnsäure, die in Form saurer Urate ausgeschieden wird, nicht mehr gekuppelt ist. (Bull. Soc. Chim. Biol. 6. 935—70. 1924. Bordeaux, Fac. de méd. et de pharm.) SPIEGEL.

Chelle und Rangier, *Die Ausscheidungsformen der Harnsäure des Harns*. (Vgl. vorst. Ref.) Auf Grund der vorangehenden Feststellungen geben Vff. Vorschriften zur Best. der Harnsäure in den verschiedenen Arten von Harnen mit völlig freier Harnsäure, sandigen Ausscheidungen von Harnsäure u. amorphen Ausscheidungen von Uraten. Die Verss. zur Charakterisierung der in u. Harn mit der Harnsäure gekuppelten Substanz haben infolge der leichten Umsetzung ihrer Cu-Verb. mit den Reaktionsgemischen vorhandenen Stoffen noch nicht zum Erfolg geführt. Annahme einer Aminosäure (vgl. MAILLARD, Bull. Soc. Chim. Biol. 5. 930; 1924. II. 2179) ist ihnen wahrscheinlicher als die einer Pentose. (Bull. Soc. Chim. Biol. 6. 980—93. 1924. Bordeaux, Fac. de méd. et de pharm.) SPIEGEL.

Camis, *Über den Phosphorsäurestoffwechsel der Glandula submaxillaris*. Es wurde geprüft, ob auch in der Drüse Zerfall von Lactacidogen erfolgt. Bei fortgesetzter farad. Reizung stieg der PO_4 -Gehalt der Drüse um bis 337%, was die Drüse verlassende Blut zeigte eine leichte Steigerung des Gehaltes, noch die gleichzeitige Steigerung der Strömungsgeschwindigkeit zu berücksichtigen ist. Es scheint also auch bei Drüsentätigkeit eine komplexe P-haltige Substanz umgesetzt zu werden. Bei längerer Dauer der Reizung läßt die PO_4 -Ausscheidung nach. (Arch. internat. de physiol. 22. 345—62. Parma, Univ.; Ber. ges. Physiol. 29. 4. 1924. Ref. SCHMITZ.) SPIEGEL.

Jiménez Díaz, *Ein neuer Faktor im Kohlenhydratstoffwechsel*. Eine zufällige, mehrfach systemat. wiederholte Beobachtung zeigte, daß bei Diabetikern die Abführung von Gallenabfluß (durch Duodenalsonde) bei gleichzeitiger Gabe von

Glucose, nicht von Lävulose, Glykosurie ohne wesentliche Hyperglykämie. Auch bei n. Menschen erzeugen geringe Mengen Zuckerlsg., in das Rectum getropft, Glykosurie. Vf. nimmt danach in der Galle einen Stoff an, der ein bei der Assimilation der Kohlenhydrate spielt, weist aber selbst auf Erfahrungen die gegen eine solche Annahme zu sprechen scheinen. (Siglo méd. 73. 6. Ber. ges. Physiol. 28. 406—7. 1924. Ref. KOLMER.)

Zofja Sokolowska, *Beiträge zur Kenntnis des Stoffumsatzes bei Vögeln*. Cellulose aus Gerste zeigte sich völlig unverdaulich, die von Weizenkleie u. K. größtenteils assimilierbar. Ausgewachsene Mastgänse können neben Fett größere Mengen Fleisch produzieren. Das Fett wird bei ihnen selbst bei reicher Nahrung vorwiegend aus Kohlenhydraten gebildet. (Roczniki Nauk przyr. 9. 211—34. 1923. Krakau, Jagellon. Univ.; Ber. ges. Physiol. 29. 81. Ref. KOPEĆ.)

Franz Schroeter, *Stoffwechsel bei reiner Kohlenhydrat- und reiner Fleischnahrung*. Bei reiner Kohlenhydratkost wird der Stoffwechsel zum Teil auch von den Lipiddepots des Körpers bestritten. Bei reiner Eiweißkost sind die Werte etwas niedriger als früher von ZUNTZ u. von RUBNER berechnet. (Beitr. z. Physiologie 2. 3. 1924. Berlin, Kaiser WILHELM-Inst. f. Arbeitsphysiol.)

T. Vieweger, *Über die Entstehung stickstofffreier Reservestoffe während der Eiweißassimilation bei poikilothermen Tieren*. An Blutegeln, die nach mehrtägigem Hungern mit Kaninchenblut gefüttert wurden, wurde während der intensiven Eiweißassimilation ein sehr erheblicher Zuwachs an Glykogen (20—30%) festgestellt, während sich Fett nur um 5—15%, Eiweiß um 1,3—20% vermehrte. Das Verhältnis Glykogenzuwachs:N-Desassimilation war ca. 1,6. Der Glykogenzuwachs erfolgt hauptsächlich durch Synthese der während der Desaminationsprozesse des Eiweißes entstehenden C-Ketten. (Trav. de l'Inst. M. NENCKI 1923; Ber. ges. Physiol. 29. 83. Ref. KOPEĆ.)

B. P. Babkin, *Der Einfluß natürlicher chemischer Reize auf die Bewegungen des Froschmagens*. Der Pylorusteil des Magens ist für HCl höchst empfindlich. Schwache Lsgg. (0,05%) verstärken die Kontraktionen unter Verminderung der Frequenz, konzentriertere (0,1—0,2%) schwächen die Bewegungen oder verhindern sie, im letzten Falle mit merklicher Erniedrigung des Tonus. Na_2CO_3 erhöht den Tonus sowie die Stärke u. Frequenz der Kontraktionen je nach der Erregbarkeit des neuromuskulären App. (Quart. Journ. of exp. physiol. 14. 259—77. 1924. Univ.; Ber. ges. Physiol. 29. 92. 1924. Ref. SCHEUNERT.)

P. Lasarew, *Die Ionentheorie des peripherischen Sehens*. Vf. behauptet, daß Gesetze, welche für die Gesichtseindrücke gelten, welche an den peripherischen Netzhaut gelegenen Stäbchen zustandekommen. Der, diesem „Stäbchensehen“ zugrundeliegende Prozeß ist die photochem. Zers. u. Regeneration des Sehpurpurs. Vf. studiert die quantitativen Beziehungen mit Benützung der in Betracht kommenden Gleichungen für die Geschwindigkeiten des Abbaus u. Aufbaus des Sehpurpurs unter der Annahme, daß die beim photochem. Zerfall entstehenden Ionen die Prodd. die unmittelbaren Erreger der Nervenfortleitung des Gesichtseindrucks sind. Im weiteren Verfolg dieser Theorie behandelt Vf. die für die „Anpassung“ des Auges geltenden Beziehungen sowie die für die Empfindlichkeit desselben geltenden Größen u. findet befriedigende Übereinstimmung zwischen der Ergebnisse der physiolog. Verss. u. der physikal. chem. Theorie. Weiterhin gelangt Vf. auf den period. Charakter der Nervenregung u. die Erklärung des intermittierenden Erregung kontinuierlich empfundenen Sehens ein. Die Intensität der Empfindung des Auges wird mit einer Abhängigkeit der Stärke des Gesichtseindrucks von der Zahl der erregten Stäbchen erklärt; sie ist durch die Zahl der

- 7teinheit auf die Netzhaut auffallenden Lichtquanten bestimmt. (Journ. de physique **21**. 231—42. 1924.) FRANKENBURGER.
- La Franca**, *Ist die Absorption der Harnsäure durch die Gewebe reversibel?* Organe wurden erst mit urathaltiger, dann mit uratfreier Salzlsg. durch-
 (ts A) u. diejenige des bei der zweiten in der Fl. enthaltenen (T) bestimmt.
 (r 1, daß das Verhältnis $T:A > 1$ war, wurde die Umkehrbarkeit der Harn-
 sorption in Nieren von Lamm u. Hund u. Leber vom zweiten erwiesen.
 (h internat. de physiol. **23**. 49—53. Neapel, Sassari; Ber. ges. Physiol. **28**.
 . 1924. Ref. SCHMITZ.) SPIEGEL.
- La Hutzler Oppenheimer**, *Versuche über die extrahepatische Bildung von*
 (r n. Vf. konnte in den Extremitäten von Hunden, die vom Kreislauf völlig
 (es nitten waren, nach Injektion von Hämoglobin innerhalb 6 Stdn. keine B.
 (irubin mittels des Verf. von VAN DEN BERGH nachweisen u. bestreitet, daß
 (n der der bisher vorliegenden Verss. einen Übergang von Hämoglobin in
 (run außerhalb der Leber bei Mensch oder Hund beweise. (Bull. of the
 (N HOPKINS Hosp. **35**. 158—60; Ber. ges. Physiol. **28**. 407—8. 1924. Ref.
 (M Z.) SPIEGEL.
- C Heymans**, *Einfluß der Ionenzusammensetzung des Meerwassers auf einige*
biose. Es wird der Einfluß eines künstlichen Meerwassers aus NaCl, CaCl₂,
 i, gCl₂ u. MgSO₄ u. der Fortlassung einzelner Ionen daraus auf Medusen usw.
 (rcht. (Arch. internat. de pharmacodyn. et de thérapie **29**. 123—40. Neapel,
 (l tation; Ber. ges. Physiol. **29**. 48—49. Ref. SPEK.) SPIEGEL.
- S Hirsch**, *Der Förderungsmechanismus des Darmes unter der Einwirkung*
früher Mineralwässer. II. **S. Hirsch**, **A. Federlin** und **A. Martin**, *Röntge-*
gehe Beobachtungen über eine „Zweiphasenwirkung“ sogenannter muriatischer
statischer Wässer. (I. vgl. HIRSCH, Ztschr. f. d. ges. exp. Medizin **32**. 307;
 191. III. 169.) Alle geprüften Mineralwässer riefen eine charakterist. Zwei-
 se wrkg. hervor, nämlich Transportbeschleunigung u. Tonusdämpfung am Darm.
 se weiphasenwrkg. enthält offenbar die beiden Hauptkomponenten der Salzwrgg.,
 pnäre motor.-neurotrope u. die sekretor.-physikal.-chem. Wrkg. (Ztschr. f. d.
 o. Medizin **43**. 741—60. 1924. Frankfurt a. M., Krkh. Sandhof.) WOLFF.
- Inns Raida**, *Formaldehydwirkung auf überlebende Organe*. Die Kontraktions-
 (kt) des Herz-, Darm- u. Uterusmuskels erlischt unter CH₂O in kurzer Zeit.
 (schskelettmuskel jedoch ist auch bei größerer CH₂O-Gabe noch immer voll
 (itfähig. (Ztschr. f. d. ges. exp. Medizin **43**. 549—55. 1924. Breslau, Pharma-
 (t.) WOLFF.
- Itz v. Graevenitz**, *Über die verfettende Wirkung einiger ätherischer Öle*. In
 (ss u. der weißen Maus wurde die bereits bekannte verfettende Wrkg. einiger
 (, nämlich *Safrol*, *i-Safrol*, *Pulegon*, *Thujon*, bestätigt. Neu gefunden wurde
 (se Wrkg. durch chem. u. histolog. Fettunters. bei *Dihydrosafrol*, *Eugenol*,
 (g ol, *Methyleugenol*, *Methyl-i-eugenol*, *Menthon*, *Limonen* $\Delta^{1,3}$, *Terpinen* $\Delta^{1,4}$,
 (pilen $\Delta^{1,4}$, α -*Phellandren* $\Delta^{1,5}$, β -*Phellandren* $\Delta^{2,1}$ u. *Sabinol*. Nicht verfettend
 (kt bei gleichen Versuchsbedingungen *Thujylalkohol*, *Menthenon*, *i-Pulegon*,
 (d jdrocarvon u. Δ^3 -*Carvenon*. Bei den nach chem.-physikal. u. chem. Kon-
 (tismomenten ausgewählten Gruppenvertretern ergibt sich in ihrer pharma-
 (yn. Wirksamkeit folgendes: 1. Die Toxizität nimmt bei den gesätt. Körpern
 (k; 2. die leberfettende Wrkg. ist in den untersuchten Gruppen unabhängig
 (r Stellung der Doppelbindung in oder zum Kern. Sättigung oder Nicht-
 (ig spielt hierbei überhaupt keine Rolle. Toxizität u. Grad oder Lokalisation
 (fettung in der Leber zeigen keinen Parallelismus. Zwischen Leberver-

fettung u. Hämolyse bestehen keine erkennbaren Zusammenhänge. (Arch. f. Pathol. u. Pharmak. **104**. 289—322. 1924. Leipzig, Pharmakol. Inst.) WOF

A. Rabbeno, *Über die Wirkung der Thyreoidea auf das aus dem Organ isolierte Herz und Nervensystem des Frosches*. Wss. 2—10%ig. Extrakt der Schilddrüse verstärkt die Kontraktionshöhe des Herzens ohne Frequenzänderung. Enteiweißung durch Kochen ist nur noch eine geringe u. nicht konstante schädig. Wrkg. vorhanden. Schilddrüsenhydrolysate, durch 40std. Kochen mit 25%ig. erhalten, wirkten wie frische Extrakte, Muskelhydrolysate aber ebenso. Es hand. sich dabei nicht um Hormonwrkg. Die Reflexerregbarkeit wird durch Schilddr. extrakte nicht beeinflusst. (Arch. di fisiol. **22**. 37—59. Torino, Univ.; Ber. ges. Physiol. **28**. 444. 1924. Ref. PASCHKIS.) SPIE

A. Dubus, *Klinische und experimentelle Studie über einige schädigende Eigenschaften des als Anästhetikum angewendeten Chloroforms und Äthers. Giftwirkungsmechanismus, insbesondere auf die Leber*. I. Technik. II. Ergebnisse. Nach Narkose steigt beim Menschen die N-Ausscheidung bedeutend über die Aufnahme. Harnstoff erreicht 4—6 Tage nach der Narkose ein Minimum, gleichzeitig t. NH₃ auf recht beträchtliche Höhe. Der N-Gehalt des Harnes vermindert sich schreitend bis zum 5. Tage. Bei der stärksten NH₃-Ausscheidung wird der Harn alkal. Acetonurie besteht noch 9 Tage nach der Narkose. Fleischkost vermindert die Ausscheidung von N u. Harnstoff, macht nach vorheriger Milchkost a. Ausscheidung von NH₃. Leber u. Urogenitalapp. fungieren unzureichend, besonders bei Leberkranken. In gewissen Fällen wurde Albuminurie beobachtet. — Ä. ist selbst in großen Dosen für die Leber viel ungiftiger als Chlf. (Journ. physiol. et de pathol. gén. **22**. 321—28. 335—40 u. I—XVI. Lille, Fac. de med.; Ber. ges. Physiol. **29**. 159. 1924. Ref. SCHÜBEL.) SPIE

W. Storm van Leeuwen, *Über die narkotische Wirkung von reinstem Ä.* Ä. läßt sich über eine krystallisierte Verb. mit Benzidin in reinster Form, f. Peroxyden, solche auch bei Durchleiten von Luft in Sonnenlicht nur sehr langsam bildend, gewinnen. Solcher Ä. wirkt bei Menschen u. Mäusen in gleichen Dosen ebenso narkot. wie gewöhnlicher Narkose-Ä. — Die tödliche Blutkonz. ist n. dieselbe bei Verwendung von Ä. mit Zusätzen von 1/2—1% Aceton, Methylketon, n. oder i-Butylalkohol, Peroxyden, Aminoäthylalkohol. 1% i-Amylalkohol erhöht deutlich, 1% Essigsäureäthylester erheblich die Giftigkeit. (Proc. Roy. soc. of med. **17**. Sect. of anaesth. 17—34; Ber. ges. Physiol. **29**. 15—19. 1924. Ref. FROMHERZ.) SPIE

C. M. Gruber und H. H. Shackelford, *Die Pharmakologie des Benzylalohols und seiner Ester*. III. Einige Beobachtungen über die Wirkung von Benzylalohol auf arterielle Hypertonie beim Menschen. (II. vgl. GRUBER, Journ. of laborat. clin. med. **9**. 92; C. **1924**. II. 1004.) Unter geeigneten Vorsichtsmaßnahmen u. nach innerlicher Darreichung von 20—30 Tropfen 20%ig. Lsg. von Benzylalohol benzyloxyester keine Blutdrucksenkung beobachtet, auch bei wochenlanger Behandlung mit täglich 4maliger Wiederholung dieser Gaben keine oder nur ganz unbedeutende Senkung. (Journ. of laborat. and clin. med. **9**. 685—98. St. Louis, Washington Univ. School of med.; Ber. ges. Physiol. **28**. 486. 1924. Ref. FROMHERZ.) SPIE

Lancelot T. Hogben und Walter Schlapp, *Untersuchungen über die physiologische Wirkung der Hypophysenextrakte in der Wirbeltierphysiologie*. III. Die Gefäßwirkung der Hypophysenextrakte in der Wirbeltierphysiologie. Beobachtungen an der Katze nach Enthirnung u. nach Vagusdurchschneidung, wobei charakterist. Unterschiede hervortreten, an Ente, Huhn, Schildkröte u. Igel. (Quart. Journ. of exp. physiol. **14**. 229—58. Edinburgh, Univ.; Ber. ges. Physiol. **28**. 443. 1924. Ref. FROMHERZ.) SPIE

Henry Dryerre, *Der Einfluß von Schilddrüsenextrakt und Thyroxin auf die Adrenalinwirkung*. Da die Wrkgg. der Schilddrüsenpräparate sich auf lang

ken, können die Ergebnisse sehr verschieden ausfallen, je nachdem man nach oder kurzer Einw. prüft. „Akute“ Verss. an Katzen u. Kaninchen in Nar- durch Ä. oder Urethan ergaben häufiger Verminderung als Verstärkung der alinwrkg. (Quart. Journ. of exp. physiol. **14**. 221—24. Edinburgh, Univ.; es. Physiol. **28**. 444. 1924. Ref. FROMHERZ.) SPIEGEL.

J. Sumbal, *Die Wirkung von Hypophysenextrakten, Acetylcholin und Histamin ie Coronararterien der Schildkröte*. Diese Gefäße reagieren bei der Schild- auf Vagus- u. Sympathicusreize umgekehrt wie bei Säugetieren. Lsgg. von physenextrakten erweitern alle Teile, wahrscheinlich auch die Capillaren, setzen artotisdruck herab, heben die Gefäßkontraktion durch Adrenalin auf. Diese k. werden durch vorhergehende Atropinbehandlung stark vermindert. — Das gilt für Acetylcholin 1:10000 bis 1:200000 u. für Histamin 1:30000, nur die Wrkg. des letzten durch Atropin nicht behindert. (Heart **11**. 285—97; es. Physiol. **28**. 437—38. 1924. Ref. FROMHERZ.) SPIEGEL.

Wilhelm Stroß, *Psychophysische Versuche mit Campher*. (Vgl. STROSS, Arch. Pathol. u. Pharmak. **95**. 304; C. **1923**. I. 1047.) Mit der Kraepelinschen tle des fortlaufenden Addierens ergab sich in Verss. an 5 Personen, daß dem nter zwar sicher keine alkoholähnliche Wrkg. auf höhere psych. Funktionen om, ja daß ihm sogar wahrscheinlich eine fördernde Wrkg. zugeschrieben a kann, daß ihm aber auch keine coffeinähnliche Wrkg. eignet. (Arch. f. exp. h. u. Pharmak. **104**. 323—51. 1924. Prag, Deutsche Univ.) WOLFF.

Koopman, *Untersuchungen über Morphinismus*. Chron. Aufnahme von rin bedingt Funktionsstörungen der innersekretor. Drüsen, besonders der idrüse. Erhalten Kaninchen wochenlang steigende Mengen, so sinkt allmäh- er Nüchternwert des Blutzuckers u. verläuft die alimentäre Hyperglykämie ungssamer mit späterer Rückkehr zum Ausgangswert als bei n. Tieren. Die eität von Blut u. Serum steigt. Die Differenz der Zuckergehalte von arteriellen ösem Blut, die Vf. als Maß des Gewebsstoffwechsels betrachtet, schwindet n chron. vergifteten Tieren. (Arch. internat. de pharmacodyn. et de thérap. —30; Ber. ges. Physiol. **28**. 488. 1924. Ref. HESSE.) SPIEGEL.

ölckers und Koopmann, *Über Cyankalivergiftung*. Mitteilung des Obduktions- ules bei einem Fall von KCN-Vergiftung. Als Todesursache ist die zentrale ung anzusprechen. KCN ist weniger Blutgift als Plasma- oder Gewebsgift. t: auf die Leiche keine fäulnishemmende Wrkg. aus. Es wirkt per os sicherer scutan. — Hellrotes Leichenblut wird nur bei frühzeitiger Obduktion gefunden. so. Ztschr. f. d. ges. gerichtl. Medizin **4**. 344—52. 1924.) BORINSKI.

F. Pharmazie. Desinfektion.

ocke, *Die praktisch wichtigsten Ergebnisse der neueren Digitalisforschung*. eueren Erfahrungen u. Forschungen werden besprochen. Zur Haltbarmachung fuses für mehrtägigen Gebrauch in der Praxis hat sich ein Zusatz von 4. A. bewährt. (Jahres-Bericht der CAESAR & LORETZ A.-G. **1924**. 147—64. DIETZE.

A. Pierce, *Ein Studium bei der Extraktion von Nux vomica*. Aus den geht hervor, daß ein Zusatz von 1% Essigsäure wesentlich die Menge des erschöpfung von Nux vomica nötigen Lösungsm. verringert. Zur Erschöpfung 00 g Nux vomica waren 7054 ccm Menstruum U. S. P. IX nötig, bei einem von 1% Essigsäure aber nur 3857 ccm. Die Qualität der Prodd. war von der Art. Die Menge des gleichzeitig extrahierten Fettes wird aber durch den satz nicht geändert. (Journ. Amer. Pharm. Assoc. **13**. 1128—29. 1924. Polyn [N. Y.]. Lab. E. R. SQUIBB & Sons.) DIETZE.

Josiah C. Peacock und Bertha L. DeG. Peacock, *Bemerkung über den eisengrünenden Faktor der Digitalisblätter*. Die aus Digitalis durch A. gelbte Stoffe sind nicht für die Fe-Grünfärbung verantwortlich; sie schließen nur die Ursachen ein. Der Fe-grünende Faktor ist in 95%ig. A. l. Digitalis eine farblose, nicht bittere, krystallin., saure Substanz, die mit FeCl_3 keine Färbung gibt; sie enthält auch weder Gallussäure, noch Gallotannin oder Gerbstoff, wie solche in Eichenrinde, Hickorynuß, roter Rose, Maté usw. gefunden wurden. Während der Fe-grünende Faktor von Hauptpulver vollständig absorbiert wird, ist er befähigt, durch tier. Haut zu gehen. (Amer. Journ. Pharm. 96. 875—85. 1924.)

M. V. Carbonell, A. Largaia und E. Mayer, *Reinigung der Kuhpockenimpfung mit Hilfe von Yatren*. Bei Zusatz von 5% Yatren wurden die Keime stark vermindert, es schien aber, als ob die so behandelte Lymphhe als Impfstoff nicht verwendbar sei (das betreffende Virus wirkte aber auch in ungereinigtem Zustand nicht besser). Nach Zusatz von 3% war die Keimverminderung weniger betriebl., Impfung beim Kalbe lieferte lymphereiche Pusteln mit einer geringeren Entzündungszone als mit dem unbehandelten Virus. (C. r. soc. de biologie 91. 105—106. 1924. Buenos Aires, Dép. nat. d'Hyg.)

W. Wedemann, *Praktischen Verhältnissen angepasste Desinfektionsversuche mit Rohecaporit und Chlorkalk*. (Vgl. S. 122.) Laboratoriumsverss. nach der Böttcherlappchenmethode ergeben sowohl bei Caporit wie bei Handelschlorkalk gute Ergebnisse. Caporit zeigte gegenüber Chlorkalk eine Wrkg., die seinem ca. 2-fachen höheren Gehalt an wirksamem Cl entsprach. Prakt. Verss. im Stall sowie Eisenbahn-Viehtransportwagen, Jauche etc. verliefen weniger günstig. (Arb. d. Reichsgesundheitsamt 55. 89—105. 1924.)

Georg Lockemann und Werner Ulrich, *Über „Bacillol“*. Bacillol erwies sich dem Lysol annähernd gleichwertig, dem Liquor Cresoli saponatus etwas höher. (Desinfektion 9. 176—78. 1924.)

Lloyd W. Cyrenius, New York, V. St. A., *Verfahren zur Überführung von wirksamen Arzneimitteln in eine bei subcutanen oder intramuskulären Injektionen langsam resorbierbare Form*. Man mischt in W. l. Arzneimitteln HgCl_2 , As_2O_3 -Salze, Fe-Salze, Strychnin, Chininsalze, Organpräparate, wie die Samenbestandteile der Hypophyse, mit einem Anästheticum u. einem weichen Fett emulgiert einen anderen Teil des Arzneimittels mit einem Lösungsm. u. einem neutralen Fett, u. emulgiert die Emulsion mit der Mischung. — Z. B. wird Glycerin mit Campher, Phenol u. hydriertem, säurefreiem Baumwollsaamenöl von hoher Viskosität erhitzt u. erkalten gelassen, wobei das Gemisch zu einer halbfesten Masse wird. Dann wird eine Lsg. von HgCl_2 in Glycerin mit einem weichen Fett von Fettart oder Schmalzkonsistenz gemischt u. gründlich emulgiert, diese Emulsion wird mit der ersten Mischung gründlich emulgiert, wobei das HgCl_2 sich in hochdisperser Form in der Emulsion befindet u. sich nicht ausscheiden kann. Bei intramuskulären Injektionen der Emulsion wird das HgCl_2 so langsam resorbiert, daß bedeutend größere Mengen des Mittels als in rein wss. Lsg. injiziert werden können u. die Zahl der Injektionen wesentlich verringert werden kann. Reiz- oder Allerg. wrkgg. treten hierbei nicht ein. Das in den Muskel injizierte Fett wird durch Lipase u. die alkal. Säfte des Muskels in Alkalisalze von Fettsäuren u. Glycerin gespalten u. in dem gleichen Verhältnis wie das Arzneimittel vom Körper resorbiert. — Als Anästheticum kann man Emulsionen anderer Arzneimittel anstatt von Phenol auch Novocain zusetzen. (A. P. 1510259 vom 30/10. 1919, ausg. 1924.)

C. H. Boehringer Sohn, Niederlingelheim a. R., *Für chirurgische Zwecke geeignetes Narkotisierungsmittel aus Acetylen*. Zu dem Ref. nach E. P. 202

125. I. 258 ist nachzutragen, daß die Reinigung des C_2H_2 von P-Verbb. mit unter der Bezeichnung *Heratol* bekannt gewordenen, CrO_3 enthaltenden M. t, von der mindestens 3 kg oder mehr für 5 cbm C_2H_2 zu verwenden sind. (P. 406636 Kl. 30h vom 19/5. 1922, ausg. 24/11. 1924.) SCHOTTLÄNDER.

arbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Leverkusen bei Köln a. Rh., er von Jürgen Callsen, Elberfeld, *Derivate basischer Oxyalkyläther*. Zu dem ach D.R.P. 398010; C. 1924. II. 1399 ist nachzutragen, daß die eine dem elin ähnliche Wrkg. aufweisenden Prodd. als *Laxativa* in Form von subcutanen ionen therapeut. Verwendung finden. (A. P. 1518689 vom 14/2. 1924, ausg. 2/1924.)

SCHOTTLÄNDER.

arbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Leverkusen bei Köln a. Rh., er von: Hans Hahl und Walter Kropp, Elberfeld, *Herstellung eines Natrium- umkomplexsalzes der Nitrilotriessigsäure (Triglykolumidsäure)*. Man mischt rtriessigsäure mit wss. Na_2CO_3 -Lsg., setzt Vanadinoxid V_2O_5 hinzu, erhitzt r neutralen Rk. u. dampft die Fl. zur Trockne ein. — Die so erhaltene Na- Kplexverb. der Nitrilotriessigsäure, $[N : (CH_2CO_2Na)_2 \cdot (CH_2COO)]_3V$, bräunliches, othes Pulver, in W. mit gelber, bald nach Grün unschlagender Farbe l.; die altbare Lsg. wird durch Mineralsäuren blau gefärbt, findet als *Antilueticum* reut. Verwendung. (A. P. 1517003 vom 14/2. 1924, ausg. 25/11. 1924.) SCHOTTL. William James Penfold, Melbourne, Australien, *Gesteigerte Gewinnung von uräparaten*. (D. R. P. 406833 Kl. 30h vom 2/11. 1920, ausg. 3/12. 1924. Aust. 28/11. 1919. — C. 1921. II. 471.)

SCHOTTLÄNDER.

inford P. Larson, Minneapolis, Minnesota, V. St. A., *Verfahren und Vor- g zur Gewinnung von Impfstoffen*. In einer Fl. von niedriger osmot. Spannung ghewemmte Bakterienkulturen werden mit einem in der Fl. l. Gase unter Druck aleit, bis die Fl. u. die Bakterienleiber mit dem Gase gesätt. sind u. hierauf lück plötzlich aufgehoben, so daß durch die plötzliche Expansion des Gases lakterien abgetötet u. zertrümmert werden u. den Zellinhalt abgeben können. ZB. werden die Bakterienkulturen in CO_2 unter Druck enthaltendem dest. W. ediert u. so lange unter Druck gehalten, bis die Bakterienzellen mit der CO_2 it sind. Hierauf wird der Druck plötzlich aufgehoben. Das Verf. bietet einer- en Vorteil, daß die Proteinkörper der Bakterien keine Denaturierung erleiden, i der sonst erforderlichen Hitzebehandlung, u. daß andererseits die wirksamen teile (Antigene) in kolloidaler fein verteilter Form gewonnen werden u. so e immunisieren können als die üblichen aus festen Teilchen bestehenden Impfe — Eine zur Ausführung des Verf. geeignete Vorr. besteht aus einem CO_2 r Druck enthaltenden Gasbehälter, der durch einen Stutzen mit einem innen iten Stahlrohr verbunden ist. Dieses Rohr ist oben durch eine Haube ver- oen u. enthält am Boden im Inneren eine Spiralfeder. In das Stahlrohr ist nizzierend u. mit genügendem Spielraum zwischen den Wandungen beider en offenes Glasrohr eingesetzt, das auf der Spiralfeder ruht. Ein zweites ur befindet sich im ersten, ist oben mit einer Muffe verschlossen u. unten a. reicht bis zum Boden des äußeren Glasrohr, in dem sich etwa zu $\frac{3}{4}$ ge- ie wss. Bakteriensuspension befindet. Haube u. Muffe der beiden Röhren urch Regulierschrauben u. Ventile verschließbar. Beim Öffnen der Ver- e füllt sich zunächst Stahlrohr u. äußeres Glasrohr mit der unter Druck en CO_2 ; diese löst sich in der Bakterienflüssigkeit u. drückt gleichzeitig die ch das innere Glasrohr durch einen Auslaß in den oberen Raum der Stahl- ube, wobei das Gas expandiert wird u. seine abtötende u. zertrümmernde Wrkg. d Bakterienleiber ausübt. Durch ein im oberen Raum der Haube befindliches krohr wird dann der fertige *Impfstoff* abgelassen. (A. P. P. 1517844 vom 18, ausg. 2/12. 1924 u. 1517845 vom 27/3. 1918, ausg. 2/12. 1924.) SCHOTTL. I. 1.

John Edmond Rew, Niagara Falls, New York, V. St. A., *Medizinisches Rückmittel*, bestehend aus Galgantwurzel, Holzkohle u. Muskatnuß. — Man form gepulverte Gemisch entweder zu Tabletten oder imprägniert mit ihm Baupdochte. Der beim Verbrennen entwickelte Rauch dient zur Heilung von Schmerzen, Bronchitis, Schnupfen, Asthma, Herzklopfen, Kopfschmerzen oder fieber. (A. P. 1519053 vom 25/4. 1923, ausg. 9/12. 1924.) SCHOTTLÄNDER

Perley Staples Brown, Drumbheller, Alberta, Canada, *Herstellung eines Ton für medizinische und kosmetische Pasten*. Kreidiger Ton (Bentonit) wird n aufgerührt, von den Verunreinigungen befreit u. bis zur Verdampfung d erhitzt. Der reine, feingepulverte Bentonit wird dann in reinem W. suspel u. mit Ölen, Drogen, Salzen oder Essenzen zu den Pasten verarbeitet. (C. 238632 vom 24/3. 1923, ausg. 18/3. 1924.) SCHOTTLÄNDER

Nazik Shahapzian, Washington, Columbia, V. St. A., *Heilsalbe*, bestehend aus Sesamöl, Hammeltalg, Bienenwachs, weißer Seife, Teer u. Mastixharz. (A. P. 1519053 vom 23/6. 1923, ausg. 9/12. 1924.) SCHOTTLÄNDER

Shepherd Chemical Company, übert. von: **John P. Shepherd**, Chicago, Illinois, V. St. A., *Zahnpaste*, enthaltend Cholesterin u. Jod. — Die Menge Cholesterins u. J darf höchstens 10% der ganzen Mischung betragen. Cholesterin dient zur schnelleren Absorption des J durch das Zahnfleisch. N vermisch mit z. B. Kreide, Glycerin, gepulverten Zucker, Süßholzwurzel, etwas K-Wintergrünöl, Thymol, Menthol u. Honig mit 8% Cholesterin u. 1½% J. A. 1484415 vom 20/2. 1920, ausg. 19/2. 1924. E. P. 218222 vom 4/2. 1924, 20/8. 1924.) SCHOTTLÄNDER

Frank P. Giannandrea, Rosebank, New York, V. St. A., *Haarwaschlösung*, bestehend aus einem wss. Auszug von Teeblättern, Zimtrinde u. Hafer, der zur Konservierung A. zugesetzt ist. (A. P. 1508785 vom 7/6. 1921, ausg. 1924.) SCHOTTLÄNDER

Antonio G. Calabro, Boston, Massachusetts, V. St. A., *Mittel zur Haar-Kopflege*, bestehend aus einer Lsg. oder Suspension von Citronensaft, Olein u. gepulvertem S, Bergamottöl u. Na₂B₄O₇ in 95%ig. A. — Zum Gebrauch wird Mittel in den Haarboden eingerieben. Es dient zur Beseitigung von Schuppen, Entzündungen der Kopfhaut. (A. P. 1516562 vom 6/7. 1923, ausg. 5/12. 1924.) SCHOTTLÄNDER

Dame Pierre Lamarre und **Augusta Cochez**, Montreal, Quebec Canada, *Mittel zur Kräftigung des Haarwuchses*, bestehend aus A., Olivenöl, Borsäure u. Glycerin. (Can. P. 238391 vom 8/2. 1923, ausg. 4/3. 1924.) SCHOTTLÄNDER

Eugen Seyfferth, Berlin, und **Rheinisch-Westfälische Sprengstoff-Fabrik**, Abteilung Nürnberg, vormals **H. Utendoerffer**, Nürnberg, *Radioaktive platinhaltige Massen*. (E. P. 196518 vom 28/6. 1922, ausg. 17/5. 1923. — C. 1923. I. 100 [F. P. 553100].) SCHOTTLÄNDER

G. Analyse. Laboratorium.

Dartrey Lewis, *Ein Prüfungsapparat für Temperaturanzeiger*. Der Apparat ist eine Einrichtung ohne die beigegebenen Abbildungen nicht geschildert werden kann. Er ist dazu bestimmt, Temperaturanzeiger u. -registrierapp., die mit Thermoelementen betrieben werden, einfach u. schnell auf ihre Genauigkeit zu prüfen. (Journ. of Scientific Instruments 2. 45—50. 1924.) BÖTTGER

K. F. Tromp, *Ein selbsttätiger Gasabschluß*. Es wird eine verhältnismäßig einfache Vorrichtung beschrieben, die bei mit Gas beheizten App. die Gaszufuhr sofort u. mit Sicherheit abschließt, sobald aus irgend einem Grunde Wassermangel eintritt. Der zunächst für das automat. Calorimeter von JUNKERS & Co., Dessau

App. bedarf keinerlei Wartung, wie z. B. elektr. Alarmanlagen, u. ist auch andere Zwecke vorteilhaft zu verwenden, so bei der Herst. von dest. W., bei Extraktionsanlagen u. in abgeänderter Form auch zum Löschen von Gasflammen einer vorher genau bestimmten Zeit. (Het Gas **44**. 305—8. 1924. Utrecht.) W. **Ebert**, *Kritisches zur Bewertung von Hochvakuumpumpenmodellen*. Von den Faktoren, welche bei der Bewertung der Hochvakuumpumpenmodelle vornehmlich in Betracht kommen: 1. das erforderliche Vorvakuum, 2. das erreichte Endvakuum, 3. die Sauggeschwindigkeit, 4. die Betriebssicherheit ist die Frage des Vakuums nicht mehr ausschlaggebend, seitdem bei geeigneter Wahl der Vor- u. Hauptpumpe nur eine Zwischenstufe erforderlich ist; vielmehr sind die beiden Pumpen eines sehr hohen Endvakuums u. einer großen Sauggeschwindigkeit allein maßgebender Bedeutung u. gehören, wie des Näheren ausgeführt wird, zusammen, schon deshalb, weil man mittels der Sauggeschwindigkeit auf die Zahl von Drucken schließen kann, die unterhalb der Grenze der meßbaren Drucke (mm Hg) liegen. Hinsichtlich des 4. Punktes wird darauf hingewiesen, daß zahl gebaute Modelle in bezug auf Haltbarkeit den augenblicklichen Anforderungen vollauf genügen. Bei dem Vergleich der einzelnen Pumpenmodelle muß auch der Wirkungsgrad berücksichtigt werden. (Ztschr. f. Instrumenten-**44**. 497—500. 1924. Charlottenburg.)

BÖTTGER.

Ray Barr, *Die Kekulé'sche Wasserluftpumpe*. Bei der nach demselben Prinzip arbeitenden Sprengelschen Quecksilberluftpumpe arbeitenden Vorr. wird die Luft beim Ausfließen aus einer weiteren in eine engere Röhre in Blasenform mitgerissen. In der Handlung sind zwei Ausführungsformen skizziert. (Journ. Scient. Instruments

BÖTTGER.

Paul Schmalfuß und **Hans Werner**, *Über einen äußerst einfachen und wirkungsvollen Extraktionsapparat für feste Stoffe bei erhöhter Temperatur*. Mit einfachen herstellbarer App. nach Art des Schacherlschen Extraktionsapp. für Fl. ist das Doppelte wie der Soxhlet'sche App. (Abbildung.) (Journ. f. prakt. Ch. **31**. 55—57. 1924. Hamburg, Univ.)

LINDENBAUM.

E. Beer, *Notizen für Laboratorium und Werkstatt. Temperaturregulator mit Registriervorrichtung*. Vf. beschreibt zwei Vorr., von denen die eine die Temp. elektr. Ofens bis auf $\pm 1\%$ reguliert, falls sie 300° nicht übersteigt, während die andere die Temp. von 5 Öfen von 5 zu 5 Min. selbsttätig auf demselben Blatt aufzeichnet. (Journ. Scient. Instruments **2**. 61—63. 1924.)

BÖTTGER.

Arnold Lassieur, *Eine ökonomische Anode für die Schnellelektroanalyse*. Vf. schlussfolgert, daß der von BERTIAUX (Bull. Soc. Chim. de France [4] **35**. 1030; **4**. II. 2065) beschriebene App. mit rotierender Anode auf denselben Prinzipien beruht, wie der vorher von KLING u. Vf. (Chimie et Industrie **4**. 457; **4**. II. 714) in Beschreibung u. Abbildung gegebene. Die geringen Unterschiede beider werden besprochen. Wegen des hohen Wertes des Pt wird die Größe der Anode so weit wie möglich vermindert, u. eine kleine, ökonom. wird beschrieben. (Bull. Soc. Chim. de France [4] **35**. 1530—32. 1924.)

J. & J. Beck, Ltd., *Neue Instrumente: das Londoner Baby-Mikroskop*. Beschreibung eines Mikroskops, welches zerlegt in einem Kasten von den Dimensionen $5\frac{1}{2} \times 2\frac{1}{2} \times 2$ Platz findet, so daß es in einer Rocktasche untergebracht werden kann. Das aufgestellte Instrument ist von hinreichender Standfestigkeit. (Journ. Scient. Instruments **30**—61. 1924.)

BÖTTGER.

Liesbny und **H. Schwarz**, *Registrieremethode zur gleichzeitigen Bestimmung des Sauerstoffverbrauchs und der Kohlensäureabgabe*. Die B. der CO_2 wird fortgesetzt gewichtsanalyt. gleichzeitig mit der Feststellung des O_2 -Verbrauches bestimmt. (Biochem. Ztschr. **154**. 191—94. 1924. Wien, Univ.)

WOLFF.

Hermann Schmidt, *Zur spektrophotometrischen Bestimmung der Temp. glühender Körper*. Vf. bespricht die Bedeutung des Absorptionsvermögens glühenden Körpers für die Pyrometrie. Besonders bei der Temperaturbestimmung der Methode der logarithm. Isochromaten hängt die Bedeutung des Meßergebnisses von dem spektralen Verlauf des Absorptionsvermögens ab. Ist die Farbtemperatur des glühenden Körpers von der Wellenlänge unabhängig, dann läßt sie sich durch die Ermittlung des Strahlungsmaximums bestimmen. Ist für einen Strahler $\lambda_m T = \text{const.}$ u. bilden die Isochromaten ein Strahlenbüschel, dann muß das Absorptionsvermögen konstant sein. (Naturwissenschaften 12. 1162—65. 1924. Düsseldorf, Kaiser-Wilhelm-Institut f. Eisenforschung.)

W. E. L. Brown, *Messung der Wasserstoffionenkonzentration mittels Kalomelektroden*. Mit der Lsg., deren $[H^+]$ ermittelt werden soll, wird eine an einer Kalomelröhre angeblasene, sehr dünnwandige Glaskugel (Wandstärke 0,03 mm, Durchmesser 2 cm) gefüllt, die in eine Lsg. von bekannter $[H^+]$ getaucht wird. Zwischen beiden Lsgg. entsteht dann eine von der $[H^+]$ abhängige Potentialdifferenz, die dadurch gemessen wird, daß man jede der Lsgg. mit einer Kalomelelektrode verbindet, die ihrerseits an ein Quadrantenelektrometer angeschlossen sind. Die Schaltung ist in ihren Einzelheiten in einer Skizze erläutert, ebenso das Verfahren der Messung der Potentialdifferenz mit dem Elektrometer, welche wegen des Widerstandes der Elektrode besondere Maßnahmen in bezug auf die Isolierung erfordert. Die Elektrode ist besonders zur Ermittlung der $[H^+]$ in pflanzlichen Extrakten bestimmt. (Journ. Scient. Instruments 2. 12—17. London, Univ.) Böttger.

M. N. J. Dirken, *Ein Apparat zur möglichst schnellen Ausführung zahlreicher Gasanalysen*. Die App. von PETERSON u. HALDANE sind so abgeändert worden, daß die zur Ausführung einer größeren Zahl von Analysen erforderliche Gasmenge erheblich vermindert wird. Die erreichbare Genauigkeit beträgt wie bei den ursprünglichen App. 0,02 u. 0,04%, je nach der Größe der Gasbürette (Durchmesser 5 cm). Das in der Bürette abgemessene Gasvol. wird in die Absorptionsbürette übergeführt, welche von der Bürette getrennt u. in eine Schüttelvorr. gebracht wird. Während sich die Absorption vollzieht, wird eine neue Gasprobe in die erste Bürette u. in eine zweite Absorptionsvorr. gebracht. Bei den mitgeteilten Analysen handelt es sich um die Absorption von 2 Gasen (O_2 , CO_2); die dazu dienende Apparatur besteht deshalb aus zwei Gefäßen, die durch eine mit Hahn versehene Calomelröhre in Verb. stehen. Eine neue Vorr. zur Entnahme von Gasproben wird ebenfalls beschrieben. (Journ. Scient. Instruments 2. 55—60. 1924.) Böttger.

Joseph Švéda, *Gasometrische Bestimmungen durch Verbrennung mit Kalomel*. Teil I. Es wird eine Methode ausgearbeitet zur gasometr. Best. brennender Gase durch Oxydation mittels CuO , das, in einem porösen Tiegel in das Kalomel eingeführt, elektr. auf 280—290° erhitzt wird. Beimengung von O_2 ist nicht erforderlich. Bzgl. der Apparatur vgl. Original. Die Belege zeigen, daß CO auf 290° quantitativ oxydiert wird. Analysen von mit N_2 verd. H_2 ergaben Abweichungen von 0,03—0,15% vom theoret. Wert, trotz nicht allzu feiner Meßapparatur. (Chem. News 130. 1—5. Prag, KARLS-UNIV.) HERZOG.

Elemente und anorganische Verbindungen.

Albin Kurtenacker und Karl Bittner, *Ein Verfahren zur Analyse eines Gemisches von Sulfid, Sulfit und Thiosulfat auf jodometrischem Wege*. Von der jodometrischen aldehydmethode zur Best. von Sulfit u. Thiosulfat nebeneinander (vgl. Ztschr. für analyt. Chem. 64. 56; C. 1924. II. 868) ausgehend, haben Vf. eine jodometr. Methode zur Best. von Sulfid, Sulfit u. Thiosulfat nebeneinander ausgearbeitet. In einem Teil der untersuchten Lsg. wird die Summe der drei S-Verbb. durch Titration mit einer verd. gesäuerter Jodlsg. bestimmt. In einem andern Teil werden Sulfid u. Thio-

men bestimmt. Nach Fällung des Sulfids mit Zn-Acetat wird, ohne den Nd. zu trieren, mit W. verd., CH_2O zugesetzt, mit Essigsäure angesäuert, ein Überfluß an J_2 zugegeben, kräftig geschüttelt u. mit $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ zurücktitriert. Sulfid wird dabei nicht oxydiert. In einem dritten Teil wird Thiosulfat allein bestimmt, indem nach dem Auffüllen auf ein bestimmtes Vol. ZnS abfiltriert wird. In einem anderen Teil des Filtrats wird Thiosulfat neben Sulfid mittels CH_2O jodometr. bestimmt. Die Methode kann prakt. bei Unters. der Sodamutterlaugen angewandt werden, da Carbonat die Best. nicht stört. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. **141**. 297—303. 1924. Brünn, Deutsche Techn. Hochsch.) JOSEPHY.

S. Marvel und V. du Vigneaud, Ein neues organisches Reagens zum Nachweis von Nitraten und Perchloraten. Das früher (vgl. Journ. Americ. Chem. Soc. **46**. 193; C. 1924. II. 2335) von Vff. beschriebene Chlorhydrat des *p*-Nitrobenzoesäureesters von α -Phenyl- β -diäthylaminoäthanol gibt noch mit 0,005-n. Nitratlsgg. in verdünnter oder Ggw. von wenig verd. HCl nach längerem Stehen einen Nd. des Nitrats, der Base, hiervon sind bei 25° ca. 0,0310 g l. in 10 ccm W. Perchlorat der Base $\text{C}_{16}\text{H}_{22}\text{O}_4\text{N}_2$, HClO_4 , entsteht noch als Nd. aus einer 0,0025-n. Perchloratlsgg., die sich aus konz. Lsg. anfangs in zähem Zustande ab u. wird bald flüssig; aus A. hellgelbe Krystalle, F. 114° ; 0,0296 g sind bei 25° l. in 25 ccm W. löslich. Krystallin. Nd. entsteht auch in Ggw. von HCl mit Jodid, Oxalat u. Nitrit, letzter ist mit dem Nitratlsgg. ident.; infolge Zers. von HNO_2 entsteht wahrscheinlich NO_3 ; in neutraler Lsg. entsteht mit Nitrit nicht sofort ein Nd.; Bromat gibt in saurer Lsg. einen öligen, in neutraler Lsg. keinen Nd.; Thiocyanat u. Dichromat geben sowohl in saurer als auch neutraler Lsg. einen öligen Nd. (Journ. Americ. Chem. Soc. **46**. 2661—63. 1924. Urbana [Ill.], Univ.) HABERLAND.

Laude Rimington, Bemerkung über die Wirkung von Ammoniumsulfat und anderen Salzen auf die colorimetrische Bestimmung des Phosphors. Bei dem colorimetrischen Nachweis von BRIGGS (Journ. Biol. Chem. **53**. 13; C. 1922. IV. 739) verlangsamt sich die Färbung in Konz. von $> 1,4$ -n. deutlich die Entw. der Färbung. Ist diese eingetreten, so stört der Zusatz dieses Salzes nicht. Der Einfluß der verschiedenen Konz. wird gemessen u. in Kurven wiedergegeben. Ebenso wird für andere Salze von Oxalsäure, Citronensäure, H_2SO_4 u. HF die Konz. bestimmt, die auf die Rk. wirkt. Sie liegt mehr oder weniger über derjenigen, die bei der Anwendung dieser Salze als Gerinnungshinderer vorzuliegen pflegt, bei anderen allerdings sehr nahe daran. (Biochemical Journ. **18**. 1297—1300. 1924. Cambridge, Biochem. Lab.) SPIEGEL.

B. Smith und P. M. Giesy, Die Alkalität von Magnesiamilch, bestimmt durch Wasserstoffelektrode. II und III. (I. vgl. Journ. Amer. Pharm. Assoc. **12**. 955; C. 1923. I. 576.) In der vorigen Arbeit gaben die Vff. an, daß p_{H} bei Magnesiamilch 0,51 sei. Bei einem Vers. fiel beim Freiwaschen der Milch (p_{H} 13,11) von p_{H} auf 10,20. Weitere Verss. zeigten, daß p_{H} reiner Magnesiamilch zwischen 10,1 und 10,54 liegt. Die Angaben der U. S. P. über die Prüfung sind unzuverlässig, die elektrometr. p_{H} -Best. ist genauer. — Beim Studium der Einw. von MgCO_3 wurde beobachtet, daß dieses nach gutem Waschen p_{H} 10,00 bei 25° besitzt; wird dazu CO_2 gegeben, so steigt p_{H} der Mischung auf 10,17. Das Carbonat erniedrigt die Werte für Magnesiamilch, aber nicht in dem Maße, daß das früher erhaltene Ergebnis erklärt wird. (Journ. Amer. Pharm. Assoc. **13**. 1118—19. 1119—20. Brooklyn [N. Y.], Lab. E. R. SQUIBB & Sons.) DIETZE.

J. H. de Boer und E. A. van Arkel, Die Trennung von Zirkonium und Thorium durch Krystallisation ihrer Ammoniumdoppelfluoride. Vff. arbeiten nach der Methode von HEVESY u. JANTZEN (Chem. News **127**. 353; C. 1924. I. 1165), hatten die von Vff. analysierten Mineralien einen viel geringeren Hf-Gehalt. Der Hf-Gehalt war 10% Hf bezogen auf Zr in einem „Zirkit“

mit 1% Hf wurde die Trennung ebenfalls durchgeführt. Die Erze wurden Graphitiegeln mit der 5-fachen Menge NaHSO_4 geschmolzen, die Schmelze auf eine Steintafel gegossen u. noch h. in W. gebracht. Aus der Sulfatlsg. w. nach Filtration die Metalle mit NaOH gefällt, die Hydroxyde durch Dekantation ausgewaschen, dann in HCl gel. Die Lsg. wurde eingedampft. Die Oxyde von Hf u. Zr wurden von den übrigen Metallen durch Waschen mit alkohol. befreit. Zr u. Hf wurden darauf aus den Oxychloriden mit NH_4OH wie Hydroxyde gefällt, die in einer h. Lsg. von Ammoniumdifluorid gel. wurden. Nach Abkühlen krystallisierten die Ammoniumdoppelfluoride aus. Ein Überschuß an sauren Fluorids ist zu vermeiden, da sonst statt $(\text{NH}_4)_2\text{ZrF}_6$ u. $(\text{NH}_4)_2\text{HfF}_6$ die $(\text{NH}_4)_3\text{ZrF}_7$ u. $(\text{NH}_4)_3\text{HfF}_7$ auskrystallisieren. Die Doppelfluoride werden an verschiedenen Arten durch fraktionierte Krystallisation getrennt. Zur Erläuterung einige Beispiele angeführt. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. **141**. 284—88. 1924.)

A. E. van Arkel und **J. H. de Boer**, *Die Trennung des Zirkoniums von anderen Metallen, einschließlich Hafnium, durch fraktionierte Destillation.* (Vgl. Ref.). Beim Erhitzen eines Gemisches von ZrCl_4 u. PCl_5 entsteht eine $2\text{ZrCl}_4 \cdot \text{PCl}_5$, welche sich bei ca. 416° gut dest. läßt. Mit POCl_3 entstand eine 363° destillierbare Verb. $2\text{ZrCl}_4 \cdot \text{POCl}_3$, die beim Abkühlen zu einer glasigen erstarrte, während die erste eine harte kompakte M. bildete. Durch Dest. in Verb. gelang es, Zr von den Elementen, die es in seinen Erzen begleiten, Si, Fe, Hf, Ti, Th, Al u. B, zu trennen. Die Herst. der Additionsverb. in Gang der fraktionierten Dest. sind im einzelnen beschrieben. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. **141**. 289—96. 1924. Eindhoven, Philips' Glühlampenfabriken A.-G.)

H. Schottky, *Beiträge zum metallographischen Nachweis des Schwefels und Phosphors. I. Versuche über die Baumannsche Schwefelprobe.* Nach Behandlung Baumannschen Schwefelprobe werden die Verff. zur Unterscheidung von Zinn- bzw. Ledeurit vom Phosphideutektikum nachgeprüft u. abgeändert. MATWIEB. Angaben konnten bestätigt werden, daß man beide Bestandteile durch Ätz. in neutralen bzw. alkoh. Natriumpikrat unterscheiden könne. Neutrales Pikrat enthält nur das Phosphid, alkoh. Natriumpikrat sowohl Zementit wie Phosphid. (Krupp Monatshefte **5**. 93—98. 1924.)

Bestandteile von Pflanzen und Tieren.

Archibald Neil Currie, *Eine Methode zur Bestimmung kleiner Mengen von Eisen in Geweben.* Colorimetr. Best. auf Grund der B. von Scheeles Grün. Als Farbstoff wird eine Lsg. von wasserfreiem AsCl_3 in verd. NaOH verwendet. Das Gew. wird nasser Verbrennung unterworfen, der anorgan. Rückstand mit h. W. gewaschen, Spur verd. HNO_3 enthaltend, ausgezogen, das Filtrat verdampft, mit h. W. gewaschen, aufgenommen, mit H_2S behandelt, der Nd. in h. verd. HNO_3 gel., die Lsg. aufgekocht, Trockne gebracht u. der Rückstand durch Erhitzen in CuO verwandelt, das Filtrat mit 2 Tropfen 0,1%ig. H_2SO_4 gel. u. auf 6 ccm aufgefüllt. Die Rk. ist empfindlich 1:135000 CuSO_4 . Die Konz. darf nicht so stark sein, daß ein Nd. entsteht. Erwärmen ist zu vermeiden. Ggw. von Fe u. Mg stört. (Biochemical Jour. **1224**—26. 1924. Glasgow, Royal Cancer Hosp.)

Yuzuru Okuda und **Keiichi Sanada**, *Eine Methode zur Bestimmung von Taurin in Muskeln.* 5 g frisches oder 1 g getrocknetes Fleisch (von Molass) werden verrieben u. im Mörser erst mit k., dann mit w. W. extrahiert, der Extrakt extrahiert unter Zusatz von etwas Essigsäure gekocht u. das Koagulat beseitigt, Filtrat nach Neutralisation mit Bleiessig unter Vermeidung eines Überschußs von Bleiessig reinigt, mit H_2SO_4 vom Pb u. mit $\text{Ba}(\text{OH})_2$ vom Überschuß der H_2SO_4 befreit, verbleibenden Filtrat wird der S nach KOCH u. UPSON (Journ. Americ. Chem. Soc. **46**. 1924.)

- 355; C. 1910. I. 1381) oder DENIS (Journ. Biol. Chem. 8. 401; C. 1911. I. 348) amt. (Journ. Coll. Agric. Tokyo 7. 77—80. 1919.) SPIEGEL.
- V. Denis und J. L. Beven**, *Verfahren zur Haltbarmachung von Blutproben* *Bestimmung der organischen Nichteisweißbestandteile*. 1 Tropfen Formalin auf 1 ccm Blut, sonst ausgezeichnet, hindert die Best. von Harnstoff u. Amino-N, zu Nacht auch das Blut dickfl. Lackfarbigmachen mit 7 Voll. W. erlaubt die Best. von Zucker noch nach 8 Stdn. vorzunehmen, dann fällt aber der Zucker rasch mit Rest-N zu. $Hg(CN)_2$ konserviert über 24 Stdn. hinaus nicht zuverlässig. Natriumborat leistet Borax (20 mg auf 10 ccm) bis 44 Stdn. bei Temp. bis 30°. Natriumfluorid (100 mg auf 10 ccm) schützt 48 Stdn. macht aber Best. der Alkalireserve unmöglich u. erhöht den gesamten Rest-N. Nach NaF (60 mg auf 10 ccm) nach 48 Stdn. bei 28—31° die Menge von Zucker, Rest-N, Harnstoff, Kreatinin, Harnsäure unverändert, kann auch die Alkalireserve bestimmt werden. Die von MORD empfohlene Beimischung von K-Phosphat zum NaF bietet keine Vorteile. Journ. of laborat. and clin. med. 9. 674—79. New Orleans, Tulane Univ. school of med.; Ber. ges. Physiol. 29. 102. 1924. Ref. SCHMITZ.) SPIEGEL.
- Baechler**, *Über den Blutnachweis mit Benzidin*. Zum Blutnachweis verwendet man meistens eine frisch bereitete Lsg. einer Messerspitze Benzidin in 10 ccm Eg., die mit dem doppelten Vol. 3%ig. H_2O_2 -Lsg. versetzt wird. Nur negative Ausfall der Probe ist sicher beweisend, da neben Blut auch andere Substanzen eine Grün- oder Blaufärbung hervorrufen können. Selbst die Reagenzien können zu Täuschungen Veranlassung geben, z. B. Eg. Man prüft diesen am besten durch Auflösen von 0,1 g Benzidin in 5 ccm Eg., u. versetzt mit 10 ccm H_2O_2 ; die Probe darf innerhalb 5 Min. höchstens gelb, aber nicht schmutzig grün bis rot werden. Die Ursache einer Rk. bei Eg., der eine Grünfärbung gab, war nicht zu ermitteln. (Schweiz. Apoth.-Ztg. 63. 5—7.) DIETZE.
- Verda und P. Regazzoni**, *Harnstoffbestimmung im Blut*. Vorgeschlagen folgendes Verf.: Man läßt 20 ccm Blut koagulieren, gibt 10 ccm Serum, freies Fibrin u. roten Blutkörperchen, in das Zentrifugierrohr u. fügt 10 ccm Reagens TANRET, modifiziert von FOSSE (2,71 g $HgCl_2$, 7,2 g KJ, 66 ccm Eg., dest. W. bis 100 ccm) zu. In ein ebensolches Rohr bringt man 10 ccm Harnstofflsg. (1% in 100 ccm NaCl-Lsg.) u. 10 ccm Reagens TANRET-FOSSE. Dann zentrifugiert man in 10 Röhren. 10 ccm der zentrifugierten Fl. bringt man in ein Röhren derselben Spezialform, setzt 10 ccm Eg. u. 3 ccm 10%ig. Xanthidrol-Lsg. (in CH_3OH) zu. 1 Stde. ruhig absetzen, zentrifugiert alsdann 10 Min. u. verfährt in derselben Weise mit der Typ-Lsg. Nun liest man das Vol. der beiden Ndd. ab u. berechnet den Harnstoffgehalt im Blut; X ist das Vol. des Serum-Nd., a das des Typ. Lsg.; dann ist x/a = die Menge Harnstoff in 1000 ccm Blut. (Schweiz. Apoth.-Ztg. 63. 4—5. Lugano, Hygien. Kantonlab.) DIETZE.
- Alberto Bizzarri**, *Bemerkungen über die Technik der Reststickstoffbestimmung*. Die gesamten Nichteisweißbestandteile des Serums im Filtrat zu erhalten, muß die Eisweißfällung (mit Trichloressigsäure) zentrifugiert u. der Bodensatz mehrfach gewaschen werden. Es wurden so 0,01—0,05% Harnstoff mehr gefunden. Rivista di patologia medica 16. 152—53. Torino, Osp. magg. di San Giovanni Battista; Ber. ges. Physiol. 29. 102. 1924. Ref. SCHMITZ.) SPIEGEL.
- Villy Engelhardt**, *Über die quantitative Bestimmung kleinster Wismutmengen im Urin*. Übertragung der colorimetr. Best. des Quecksilbers als Sulfid nach TRIETH-MONTIGNY auf Bi. (Dermatol. Ztschr. 41. 287—94. Gießen, Univ.; Ber. ges. Physiol. 28. 439. 1924. Ref. SCHMITZ.) SPIEGEL.
- Henry Cohen**, *Die Bestimmung der Harnsäure nach der Methode von Benedict*. Abhängigkeit nicht nach den Angaben von BENEDICT (Journ. Biol. Chem. 54. 233; Journ. Biol. Chem. 54. 153; C. 1923. II. 77) bei

dem benutzten Cyanid die Färbung im Blindvers. unterhalb des angeblichen Grenzwertes zu halten. Sie muß im Einzelfalle bestimmt u. als Korrektur bei der Ableitung des Wertes in der untersuchten Probe verwendet werden. Dann erhält man in einem weiten Bereiche der Konz. genaue Werte. (Biochemical Journ. 18. 1327—29. 1924. Univ. of Liverpool.) SPIEGEL

William White Taylor, *Die Bestimmung der Glucose in physiologischen Flüssigkeiten durch die Reduktion von Kupfersalzen*. Glucoselsg., mit n. Harn zeigt sowohl gegen das Reagens von FOLIN u. MC ELLROY wie gegen das von BENEDICT u. gegen Fehlingsche Lsg. stärkeres Reduktionsvermögen als die gewöhnliche Lsg., mit W. verd. Harnstoff ist dabei unwirksam, NH_4 nur in zu vernachlässigender Menge wirksam, dagegen wurde die Red. gesteigert durch Harnsäure u. Kreatinin. Das letztere wirkt unregelmäßig, verzögert ferner schon in kleiner Menge die gesamte Red. so, daß die Titration nicht in den vorgeschriebenen 8 Min. durchgeführt werden kann. (Biochemical Journ. 18. 1232—37. 1924. Univ. of Edinburgh.) SPIEGEL

J. F. Mc Clendon, *Die Bestimmung der Acidität und des p_H des Magens*. Die freie HCl des Mageninhaltes läßt sich unter Anwendung von Bromphenolblau als Indicator titrieren. Die $[\text{H}^+]$ kann colorimetr. unter Benutzung von Chinalbum (vgl. Journ. Biol. Chem. 59. 437; C. 1924. II. 694) bestimmt werden, indem man p_H entsprechend der durch die Farbe angezeigten Dissoziation nach einer von Vf. mitgeteilten Tabelle berechnet. (Proc. of the soc. f. exp. biol. and med. 23. 341—42. Minneapolis, Univ. of Minnesota; Ber. ges. Physiol. 28. 414. 1924 Rekrzywanek.) SPIEGEL

Raestrup, *Über den Nachweis von Benzol bei Vergiftungen*. Das feinerkörnige Untersuchungsmaterial wird in einem im Original abgebildeten App. mit n. u. das abdest. Bzl. in dem U-Rohr aufgefangen, das in eine Eis- oder CO₂-Mischung taucht u. vor Beginn der Dest. durch den verschließbaren trichterförmigen Ansatz mit einem feinen Staub von Sudan beschickt wird. Die ersten Dämpfe läßt man frei durchstreichen u. kühlt erst, wenn die Überleitungsröhren h. w. werden. Man beobachtet dann bei Ggw. von Bzl. das Auftreten weißer Dämpfe, die bei Zusammentreffen mit dem Sudan dieses lösen u. in dem gekühlten Teil des U-Rohrs sich zu einem weißen Belag verdichten. Hebt man das Rohr aus der Kältemischung, so tritt eine allgemeine kirschrote Verflüssigung des Sudans ein. Auf bekannter Weise läßt sich das Bzl. in dem U-Rohr auch nitrieren. Das Verf. ist besonders zum raschen Nachweis sehr kleiner Mengen Bzl. geeignet. (Dtsch. Ztschr. f. gerichtl. Medizin 4. 337—43. 1924.) BORNI

H. W. Knipping, *Beitrag zur Technik der Gasstoffwechseluntersuchung*. Verbesserungen an dem früher (Ztschr. f. d. ges. exp. Medizin 41. 363; C. 1921. I. 519) beschriebenen App. (Ztschr. f. d. ges. exp. Medizin 43. 656—58. 1924. Landburg, Univ.) WOLF

Edward E. Swanson, *Die Standardisation und Stabilisation von Emulsionen* II. (I. vgl. Journ. Amer. Pharm. Assoc. 12. 957; C. 1924. I. 578. Aus den Verss. ergab sich, daß die Verschlechterung der Aconittinkturen durch Zersetzung einer Säure zu dem fertigen Perkolat oder Menstruum verzögert bzw. verringert werden kann. Die Verss. über die Zers. der reinen Alkaloide des Aconits zeigten, daß diese sich in einer sauren alkoh. Lsg. nicht zers. Die Verschlechterung der Tinkturen u. Fluidextrakte wird jedenfalls durch die Zers. oder Hydrolyse der Alkaloide verursacht u. kann als eine Wrkg. der $[\text{H}^+]$ betrachtet werden. (Journ. Amer. Pharm. Assoc. 13. 1108—12. 1924.) DIEBEL

A. Stohmann, *Die Capillaranalyse und ihre Anwendung bei der Arzneimitte Normung*. Ausführliche Besprechung der Capillar-Unterss., der Apparatur, der Papersorten, der Arbeitsbedingungen, Rk.-Empfindlichkeit, Anwendungsmöglichkeiten.

usw. Zunächst werden die Tinkturen behandelt. (Pharm. Ztg. 70. 27—29.

wi:au.)

DIETZE.

David I. Macht und John C. Krantz, *Ein phytopharmakologisches Verfahren zur Prüfung von Digitalis*. Die Vff. stellten Verss. an, um zu ermitteln, ob man die blische physiol. Wertbest. von Digitalis nicht durch eine solche an Pflanzen anstellen kann. Es scheint dies in der Tat möglich zu sein. Verwendet wurden Keimlinge von *Lupinus albus*, die unter bestimmten Verhältnissen in SHIVES Nährlsg. (10,4 cem 0,5 molare Lsg. von $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2$, 30 cem 0,5 molare Lsg. von MgSO_4 in 100 cem 0,5 molare Lsg. vor KH_2PO_4 erzeugt wurden. Die Länge der austretenden Wurzeln wurde als Maßstab genommen. Gleichzeitig wurden Tierverss. mit Katzenherzen angestellt. Es wurde gefunden, daß das Wachstum der Keimlinge umgekehrt proportional der Konz. der Tinktur aus Digitalisblättern in der Nährlsg. ist. Andere Arten Tinktur aus anderen Digitalisblättern waren abweichend, aber bei 1:1000 konstant. Die Abweichungen zeigten sich in demselben Verhältnis auch bei Tierverss. Die relative Giftigkeit zweier verschiedener Digitalistinkturen auf Lupinenkeimlinge war im Verhältnis 107,6% zu 100%, u. auf das Katzenherz 11,28 zu 100,4, die Resultate stimmten also vorzüglich überein. (Journ. Amer. Pharm. Assoc. 13. 15—17. 1924. Baltimore [M. D.] JOHNS HOPKINS UNIV.)

DIETZE.

V. Peyer, *Über den Aschengehalt der Drogen und seine Bestimmung*. 2 bis 4 g (sofern irgend möglich) 5 g Substanz werden lufttrocken in Porzellan-Glühgeschälchen von 5 cm Durchmesser verascht. Die Schalen werden zunächst über kleinerer Flamme allmählich erhitzt, wobei man etwaige Dämpfe brennen läßt; nach u. nach erhöht man stärker. Bei zu starkem Erhitzen sintern Phosphate u. Chloride, durch Zersetzung der Kohleteilchen u. hindern die Verbrennung. Die Flamme wird zeitweise erloscht. Läßt sich völlige Veraschung nicht erreichen, so wendet man das vom Verf. vorgeschlagene Auslaugeverf. an. Vorzuziehen ist es, die erkaltete Kohle mit 1. zu befeuchten u. die harten Krusten mit Pistill zu verreiben. Der Schaleninhalt wird auf dem Wasserbade u. Trockenschrank getrocknet u. erneut, zuerst im Trockenschrank gegläht. Vorteilhaft ist es, einige Tropfen $(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3$ - oder NH_4NO_3 -Lsg. hinzuzugeben. Man soll bei möglichst niedrigen Temp. glühen, um keine Verflüchtigung der Alkalien zu bewirken. — Zur Best. des „Sandes“ bringt man in das Schälchen 10 cem HCl (10%), erhitzt auf dem Wasserbade, dekantiert, filtriert das Filtrat bestehende durch gewogenes Filter, wiederholt das Verf., spült Schaleninhalt auf das Filter, wäscht, trocknet im Wägegläschen, wägt u. notiert das Gewicht als Sand. (Jahres-Bericht der CAESAR & LORETZ A.-G. 1924. 133—46. Sep.)

DIETZE.

H. Fromme, *Zusammenstellung von Vorschriften und Methoden zur Wertbestimmung von Drogen*. (Jahres-Bericht der CAESAR & LORETZ A.-G. 1924. 133—306. Sep.)

DIETZE.

Carl Zeiss, Jena, *Gefäß aus Glas oder Quarz*, dad. gek., daß sein oberer Teil außen mit vulkanisiertem Kautschuk überzogen ist. — Das Gefäß läßt sich ohne Beteiligung durch beim Kochen o. dgl. eintretende Erhitzung mit der bloßen Hand bewegen. (D. R. P. 407021 Kl. 421 vom 6/4. 1924, ausg. 3/12. 1924.) KÜHLING.

Georg Görz, Berlin-Grünwald, *Bestimmung der Leitfähigkeit von Elektrolyten unabhängig von Verdünnung und Temperatur*, 1. dad. gek., daß neben einer Wechselstrommessung eine Gleichstrommessung bei konstanter Spannung ausgeführt u. aus den ermittelten Werten der Quotient gebildet wird. — 2. Verf. zur Erkennung eines gel. Elektrolyten, dad. gek., daß der Quotient nach Anspruch 1 als Charakteristikum für den in Lsg. befindlichen Elektrolyten benutzt wird. — Die Gleichstrommessung gibt infolge des auftretenden Polarisationsstroms einen höheren Wert als die Wechselstrommessung; die Erhöhung entspricht dem Dissoziationsgrad des Elektrolyten. Durch Änderung von Temp. u. Verdünnung wird der Quotient nicht

geändert, weil die Werte für die Gleich- u. Wechselstrommessung gleichartig ändern werden. (D. R. P. 406877 Kl. 21e vom 6/3. 1924, ausg. 29/11. 1924.)

H. Maihak Akt.-Ges., Hamburg, *Vorrichtung zur elektrischen Anzeige- und Registrierung für gasanalytische Apparate, bei der das Anzeige- bzw. Registrierorgan bis kurz vor Beendigung der Analyse gesperrt ist u. von einer mit dem Absorptionsraum verbundenen Tauchglocke aus durch ein Rollenpaar u. Zwischenorgan betätigt wird, wobei in einem elektr. Stromkreis ein Widerstand u. der Meßapparat geschaltet sind, dad. gek., daß der Widerstand an einem die Verstellung des Anzeige- bzw. Registrierorgans bewirkenden Teil mit diesen beweglich gegen feststehenden Kontakten des Stromkreises so angeordnet ist, daß der jeweilige Widerstand des Organs bzw. dieses Teiles entsprechend verschiedene Längen des Widerstandsdrahtes im Stromkreis wirksam werden.* — Mittels des Widerstands kann die Nullstellung des Meßorgans eingestellt bzw. eine etwaige Schwankung der Batteriespannung kompensiert werden. (D. R. P. 406955 Kl. 421 vom 1/12. 1922, ausg. 6/12. 1924. Schwed. Prior. 10/12. 1921.) KÜHLIG

H. Angewandte Chemie.

I. Allgemeine chemische Technologie.

—, *Das Henleysche Forschungslaboratorium.* Es wird die Einrichtung des von Gravesend erbauten Laboratoriums an Hand mehrerer Abbildungen u. die bedeutende Entw., die es in kurzer Zeit genommen hat, erörtert. Das Laboratorium wird von der W. T. HENLEYS Telegraph Works Co., Ltd., unterhalten. n. Rubber Journ. 68. 1117—19. 1914.) RÜBE

Felix Hahn, *Stopfbüchsenlose Schleuderpumpe zum Fördern von Säuren, Laugen und Ölen.* Beschreibung mit Abbildung einer stopfbüchsenlosen Schleuderpumpe (Bauart der A. G. KÜHNLE, KOPP & KAUSCH). Über dem eigentlichen Pumpengehäuse mit dem senkrecht gelagerten Förderrad ist ein größerer Füllkörper angeordnet, durch welchen die Förderradwelle hindurchgeht. Der Füllkörperpaß ist offen oder geschlossen sein; oberhalb desselben wird die Antriebsvorr. angebracht. (Chem. Apparatur 11. 193—94. 1924. Berlin-Wilmersdorf.) NEIDHART

C. Hahn, *Gasreinigung durch Elektrofilter.* Kurze Darst. des Staubabscheiders, der durch Elektrizität nach COTTREL mit Abbildungen. (Umschau 28. 99—100. 1924. Düsseldorf-Oberkassel.) NEIDHART

Jenaer Glaswerk Schott & Gen., Jena, *Filter mit einem porösen Körper aus zusammengesinterten Glasteilchen besteht*, dad. gek., daß der poröse Glaskörper in einen nichtporösen Behälter aus Glas eingeschmolzen ist. (D. R. P. 407771 Kl. 12d vom 28/6. 1923, ausg. 2/1. 1925.) KAUSCH

Georg Bollmann, Hamburg, *Strahlwäscher für das körnige Filtermaterial.* In einem um den Düsenauslauf angeordneten u. durch ein Sieb abgedeckten Ring als Hilfsauslaß für das Treibmittel, dad. gek., daß das Sieb zylindermantelförmig einen die Düse tragenden zylindr. Aufsatz der Treibmittelzuführung im Altumgibt u. mit schräg nach abwärts gerichteten Öffnungen abgedeckt ist. (D. R. P. 407771 Kl. 12d vom 3/1. 1923, ausg. 2/1. 1925.) KAUSCH

Philip L. Woostert, Manhasset, N. Y., *Filter- und Entfärbungsmaterial.* Man kocht rohe Knochen, erhitzt sie auf Rotglut, kühlt sie in einem geschlossenen Gefäß in solcher Nähe eines KW-stoffs ab, daß sich Kohleteilchen in den Poren der Knochen abscheiden, unterwirft sie der Einw. eines die anorgan. Bestandteile zum Teil reduzierenden Agens. Dann werden die Knochen ausgewaschen u. der Rückstand wird gemahlen u. der Einw. des bei der unvollständigen Verbrennung

in KW-stoffs entwickelten Gases ausgesetzt. (A. P. 1518289 vom 13/11. 1919, 9/12. 1924.) KAUSCH.

Franz Herrmann G. m. b. H., Cöln-Bayenthal, *Filtrieren von Flüssigkeiten, besonders alkoholischen*. Die Fl. wird durch eine Schicht hochakt. Entfärbungsmittel, wie solche durch Verkohlen C-haltiger Stoffe in Ggw. von W. entziehenden Mitteln bei niedriger Temp. hergestellt wird, geleitet. (Schwz. P. 106548 vom 20/12. 1922, ausg. 1/9. 1924. D. Prior. 15/7. 1921.) KAUSCH.

Safety Car Heating & Lighting Co., New Jersey, übert. von: **Rudolph Kuleumier**, New Rochelle, New York, *Trennen flüssiger Gase*. Man verflüssigt ein Gas, indem man dessen Wärme auf fein verteilte Teilchen von starker Wärmeleitfähigkeit überträgt, läßt die erhaltene Fl. expandieren u. verdampfen u. führt sie dann fortschreitend wärmere Teilchen obiger Beschaffenheit u. benutzt die aufgenommene Wärme zum Verdampfen der expandierten Fl. (A. P. 1518377 vom 1/11. 1916, ausg. 9/12. 1924.) KAUSCH.

Theodor Kautny, Düsseldorf-Grafenberg, *Evakuierung des Zwischenraumes zwischenwandiger Transportgefäße für flüssige Gase*. In dem Zwischenraum wird einer einzuführenden Luftmenge mittels eines Absorptionsmittels solche Gasreste entzogen, die in den bei tiefen Temp. wirksam werdenden Absorptionsmitteln nicht oder nur unvollkommen l. sind. (Schwz. P. 107193 vom 9/10. 1923, ausg. 1/11. 1924.) KAUSCH.

François Duvieusart, Santiago, Chile, *Krystallisation von Salzlösungen*, bei der eine mit diesen nicht mischbare Fl. die Wärme der zu krystallisierenden Lsg. abmittelbar aufnimmt, 1. dad. gek., daß die erwärmte, nicht mischbare Fl. im Gegenstrom zur Vorwärmung von Mutterlauge benutzt wird. — 2. dad. gek., daß die Abkühlung der h. Lsg. in zwei Stufen bewirkt u. nach der ersten Stufe die Lsg. mit Salz gesätt. wird. (D. R. P. 407772 Kl. 121 vom 10/3. 1920, ausg. 2/1. 1925. Prior. 3/4. 1919.) KAUSCH.

Albert Boecler, Schweden, *Gewinnung von Lösungsmitteln beim Trocknen von Stoffen*. Das Trocknen der Stoffe wird in Behältern vorgenommen, die eine Kühlfläche u. eine Hilfskühlfläche zum Kondensieren der erzeugten Dämpfe enthalten. (P. 575574 vom 8/1. 1924, ausg. 1/8. 1924. D. Prior. 28/3. 1923.) KAUSCH.

Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning, Höchst a. M., *Destillation*. Die Austreiben einer flüchtigen Substanz mittels eines Wasserdampfstromes werden die erhaltenen gemischten Dämpfe komprimiert u. kondensiert. Das Kondensat wird nach Abscheidung der flüchtigen Substanz durch Druckentlastung wieder verdampft; die Dämpfe werden durch einen Wärmeaustauscher geschickt, in dem die Wärme entfernt wird u. sie verdichtet werden. (E. P. 224431 vom 19/2. 1924, ausg. 4/12. 1924.) KAUSCH.

Westfälische Stahlgesellschaft Ossenberg & Co., Hagen i. W., *Erzeugung von metallisch leitenden und als Katalysator metallisch wirkenden Oberflächenschichten auf feuerfesten Steinen*, dad. gek., daß feuerfeste Steine, enthaltend Silicate oder Al_2O_3 oder ZrO_2 oder Oxyde der Schwermetalle durch ein Gemisch von fein gepulvertem Al oder Mg oder Legierungen dieser Metalle mit fein gepulvertem Al_2O_3 oder MgO bei einer Glühtemp., die oberhalb des F. des Al oder Mg, aber unterhalb des Erweichungspunktes des feuerfesten Materials zu liegen hat, bei Ggw. verdampfender Gase, wie H_2 , an der Oberfläche zu Metall reduziert werden. — Bei dem Verf. auf porige Steine angewendet, so werden auch die Wände der Form mit Metall bekleidet. (D. R. P. 398919 Kl. 80b vom 10/5. 1922, ausg. 16/7. 1924.) KÜHLING.

Ellis Foster Company, New Jersey, übert. von: **Carleton Ellis**, Montclair, N. J., **Harry M. Weber**, Bloomfield, N. J., *Katalysator*. Zur Herst. eines für die Verflüssigung geeigneten Katalysators mahlt man *Nickelformiat* in einem Öl bis es die

katalyt. Eigenschaften angenommen hat, dann wird das Prod. reduziert. (1519088 vom 15/7. 1920, ausg. 9/12. 1924.) KAUSCH.

III. Elektrotechnik.

—, *Kabelpapier, seine Rohstoffe und seine erforderlichen chemischen und technischen Eigenschaften*. Angaben für Herst. von Telephon- u. Hochspannungskabelpapier. Der Rundsiebmaschine ist vor der Langsiebmaschine der Vorzug zu geben. Stoff u. Papier 4. 309—11. 1924.) SÜVE.

Robert Edler, *Silber-Kupfer-Legierungen für Schmelzsicherungen (Streifenlegierungen)*. Vf. stellt im Zusammenhange mit theoret. Ergebnissen durch Verss., daß für Schmelzeinsätze die Legierung 200% Ag + 800% Cu („Zeus“-Draht) Firma L. ROESZLER, (Wien) sich in techn. Hinsicht noch als einwandfrei erwiesen während deren geringer Ag-Gehalt ihren wirtschaftlichen Wert kennzeichnet. Legierung wird für Schmelzsicherungen, besonders auch für stehende u. liegende Streifensicherungen, verwendet. (Elektrotechn. Ztschr. 45. 1397—98. 1924.) K.

H. D. Holler und J. P. Schrod, *Theorie und Herstellung von Gleichrichtern*. Theorie, Bauart, Wirkungsgrad u. Kurve des gleichgerichteten Stromes einer Anzahl von Gleichrichtern verschiedener Systeme (elektrolyt., thermion., Schwingungsgleichrichter) werden genau beschrieben. Tabellen u. 72 Schaltskizzen, Diagramme u. Photogramme von Stromkurven heben die Deutlichkeit der Ausführungen. (Department of commerce. Technologic Papers of the Bureau of Standards. 12. No. 265. 63 Seiten. Sep.) HERTZ.

Royal Baking Powder Company, New York, *Elektrolytischer Zersetzungsgenerator mit Quecksilberkathode*. (D. R. P. 407874 Kl. 12h vom 11/5. 1922, ausg. 5/1. 1925. A. Prior. 26/2. 1921. — C. 1922. II. 1207 [A. P. 1411507].) KAUSCH.

John Pressly Scott, Toronto, Canada, *Elektrolytischer Apparat*. (D. R. P. 407836 Kl. 12i vom 7/12. 1922, ausg. 6/1. 1925 u. Schwz. P. 107000 vom 1/12. 1922, ausg. 1/10. 1924. — C. 1924. II. 387.) KAUSCH.

Koholyt Aktiengesellschaft, Berlin, und **A. von Antropoff**, Karlsruhe *Halbhartmachung von Graphit- oder Kohleelektroden*, 1. dad. gek., daß die Elektroden mit Seife imprägniert werden. — 3 weitere Ansprüche kennzeichnen Ausführungsformen des Verf. (D. R. P. 407987 Kl. 12h vom 7/5. 1922, ausg. 2/1. 1925.) KAUSCH.

Siemens & Halske Akt.-Ges., Siemensstadt b. Berlin (Erfinder: **Martin Herfeld**, Charlottenburg), *Herstellung von Mangansuperoxydanoden für wss. Elektrolysen*. 1. dad. gek., daß die Anoden aus einem chem. u. elektrochem. unveränderlichen mit $Mn(NO_3)_3$ versehenen, als Träger dienenden Stoff gebildet u. bei Temp. bis 100° gebrannt werden, bis alles $Mn(NO_3)_3$ in MnO_2 verwandelt ist. — 5 weitere Ansprüche kennzeichnen Ausführungsformen des Verf. (D. R. P. 408059 Kl. 12 vom 13/9. 1922, ausg. 5/1. 1925.) KAUSCH.

Patent-Treuhand-Gesellschaft für elektrische Glühlampen m. b. H., Berlin (Erfinder: **Franz Skaupy** und **Hans Hoffmann**, Berlin, und **Helmuth Schröder**, Berlin-Pankow), *Erzeugung durchsichtiger Körper aus nicht metallischen, undurchsichtigen oder bloß durchscheinenden Substanzen*, insbesondere Oxyden, durch Schmelzen. 1. dad. gek., daß diese Substanzen, die zweckmäßig vorerst in bekannter Weise die Gestalt von Formstücken gebracht werden, nach Anheizung auf die Temperatur, bei der sie elektr. leitend sind, als Elektroden eines Lichtbogens benutzt werden, bis die der Lichtbogenansatzstelle naheliegenden Teile der Formstücke durchsichtig werden. — 2. dad. gek., daß zwecks Erhöhung der Leitfähigkeit bei ihrer Verwendung als Bogenlichtelektroden die genannten Substanzen mit solchen Substanzen, die eine höhere Leitfähigkeit besitzen, gemischt werden. — Als Grundstoff kommen z. B. Al_2O_3 in Frage. Bei Zusatz von CeO_2 , Co_2O_3 oder Mn_2O_3 werden gefärbte

erhalten. Die Erzeugnisse sollen als *Leuchtkörper, künstliche Edelsteine* oder *and. Zwecken* verwendet werden. (D. R. P. 405318 Kl. 21 f vom 24/2. 1923, 31/10. 1924.)

KÜHLING.

Philipp Burger, Berlin, *Galvanisches Element*, 1. dad. gek., daß die negative Elektrode aus einem schraubenförmig gewundenen Draht besteht. — 2. dad. daß die übereinanderliegenden Spiralwindungen durch Stäbe, Drähte o. dgl. verbunden sind. — Die Elektrode besitzt eine wesentlich größere wirksame Oberfläche als die bekannten Metallelektroden. (D. R. P. 396391 Kl. 21 b vom 16/12. 1921, ausg. 4/12. 1924.)

KÜHLING.

Elektrowerk Gebr. Rilling A.-G., Dußlingen, Württemberg, *Galvanische Kohleatterie*, insbesondere Stabbatterie, mit Berührungskontakt am Boden des Bechers, dad. gek., daß die Batterie aus an sich bekannten Füllelementen mit Korkstopfen verschlossenen Füllöffnungen am Boden des Zinkbeckers besteht. Der Berührungskontakt an diesem Boden durch den Rand eines den Korkstöpsel umgebenden Metalltellers bewirkt wird. — Die Einrichtung ist für Batterien mit beliebiger Anordnung u. Zahl der Elemente geeignet. Die einzelnen Elemente können beliebig ausgewechselt werden. (D. R. P. 406137 Kl. 21 b vom 14/10. 1923, 20/11. 1924.)

KÜHLING.

Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft, Berlin, *Thermostatisches Element* zur Erzeugung eines durchfließenden elektr. Stromes, das aus 2 Metallen von verschiedenen therm. Eigenschaften besteht, 1. dad. gek., daß die beiden Metalle einander gleichen, verhältnismäßig hohen elektr. Widerstand besitzen. — 2. dad. daß die beiden Metalle, aus denen die beiden Teile des Elements bestehen, verhältnismäßig hohen Gehalt an Ni besitzen. — Der eine Teil kann z. B. aus Kupfer, der andere aus einer Legierung bestehen, welche mehr Cu als Ni, z. B. 90% Cu u. 10% Ni enthält. (D. R. P. 406369 Kl. 21 c vom 8/8. 1922, ausg. 18/11. 1924. A. Prior. 9/8. 1921.)

KÜHLING.

Richard Reinhold, Leipzig, *Galvanisches Primärelement* für Chromsäurefüllung, bestehend aus einem Zinkzylinder stehendem hohlem Kohlezylinder, dad. gek., daß der zur Aufnahme der sauren Chromatlg. dienende Kohlezylinder MnO_2 in Stücken oder Pulverform enthält u. der Raum zwischen Kohle u. Zn mit Asbestwolle ausgefüllt ist. — Das Element soll bis zu 2 Jahren eine konstante Spannung von 1,2 V liefern können. (D. R. P. 406423 Kl. 21 b vom 20/6. 1922, ausg. 25/11. 1924.)

KÜHLING.

Manhattan Electrical Supply Co., Inc., New York, *Trockenelement mit ringförmigen Elektroden*, aus einer Mischung von Braunstein und Graphit bestehenden Depolarisationszellen, 1. dad. gek., daß die ringförmigen Tabletten mit einem Überzug von Zinn oder anderem kohlenstoffhaltigem Material versehen sind. — 2. dad. gek., daß die Kohlelektroden umgebende zylindr. Schicht von Graphit in inniger Berührung mit der genannten Elektrode, den Tabletten u. den Schichten von Zinn ist. — Gegenüber bekannten Trockenelementen ist die wirksame Oberfläche der Kohlelektrode erheblich vergrößert u. der innere Widerstand vermindert. (D. R. P. 406424 Kl. 21 b vom 29/1. 1924, ausg. 22/11. 1924. A. Prior. 30/7. 1923.)

KÜHLING.

Richard Wetzels, Leipzig, *Trockenelement mit chemisch reinen Zinkelektroden*, dad. gek., daß die Zinkelektrode aus auf dem Wege der Vakuumdest. hergestellten Zinn besteht, welches frei von Eisen-, Zinn- u. Bleiverunreinigungen ist. — Anscheinend unbegrenzte Lagerfähigkeit des Elementes erzielt. (D. R. P. 407122 Kl. 21 b vom 4/10. 1923, ausg. 6/12. 1924.)

KÜHLING.

Janislaw Laszczynski, Miedzianka, Polen, *Umkehrbares galvanisches Element nach Leclanchéschen Typus mit Zink und Kohle (oder Magnetit) als Elektroden und Salzsäure als Elektrolyt*, gek. durch Verwendung einer neutralen Lsg. von $ZnCl_2$ oder

ZnSO_4 u. zweiwertigen Eisensalzen (FeCl_2 , FeSO_4), gegebenenfalls unter Zusatz neutralen Alkalisalzen oder Salzen der alkal. Erden am Zinkpol, u. einer eben neutralen Lsg. von Zinksalz u. dreiwertigem Eisensalz (Chlorid oder Oxyd) am Kohlepol, wobei diese Fll. durch gewöhnliche Diaphragmen aus porösem Zellulose oder aus organ. Substanzen, wie Papier, Pappe, getrennt sind. — Das Elektro ist im ungeladenen Zustande unbegrenzt haltbar; es soll gleich schwere Bleisäure an Kapazität erheblich übertreffen. (D. R. P. 407123 Kl. 21b vom 12/2. 1924. ausg. 8/12. 1924.) KÜHL

Bell Telephone Manufacturing Company Soc. an., Antwerpen, *Herstellung von Magneten aus einer Metalllegierung mit über 25% Nickel*, 1. dad. gek. d. feinst zerteilte isolierte Teilchen der Legierung zusammengepreßt werden. — 2. dad. gek., daß die Legierung Fe enthält. — 3. dad. gek., daß aus den die Legierung bestandteile bildenden Metallen ein Gemisch in fein zerteilter Form gebildet wird, dieses Gemisch auf eine Temp. erhitzt wird, die genügend hoch ist, um die Legierung hervorzurufen, worauf das erhaltene Prod. gemahlen wird u. die hierbei erhaltenen Legierungsteilchen mit Isoliermaterial belegt werden, worauf die Teilchen schließlich in eine feste M. geformt werden. — Der Hysteresisverlust der Erzeugnisse ist in manchen Fällen viel geringer als der von Fe; sie sind besonders für beladene Telephonleitungen wertvoll, wo eine Permeabilität nicht höher als die des Eisens gewünscht ist. (D. R. P. 406880 Kl. 21g vom 16/12 1921, ausg. 29/11. 1924, A. 11/12. 1920.) KÜHL

V. Anorganische Industrie.

Carl Ritter, *Die Salzsäure-Industrie und Drehofen zur Salzsäuregewinnung*, Beschreibung einer Anlage zur Gewinnung von HCl u. *Magnesia* aus Magnesiumoxychlorid, das in einem mit Gas beheizten Drehofen zersetzt wird. (Chem. Zentralblatt 11. 181—84. 1924. Berlin-Wilmersdorf.) NEIDHART

Rex Furness, *Neue Verwendungszwecke von Natriumwasserglas*. Hinweis auf die Verwendung von Wasserglas zum Auskleiden von Fässern, zu feuerfesten Estrichen, als Mörtelzuschlag, für Straßenbau, zu Fabrikfußböden u. in Verbindung mit Casein als Klebstoff. (Chem. Age 12. 48—49.) HELLMANN

Alice A. Hall, San Francisco, übert. von: **Charles J. Reed**, San Francisco, Californ., *Schwefelblumen*. Man verdampft S bei einer Temp., die nicht niedriger als sein Kp. ist, mischt den erhaltenen S-Dampf mit einem zirkulierenden, inerten Gase bei einer wenigstens den Kp. des S erreichenden Temp. u. mischt schließlich die erhaltenen Prodd. mit einem inerten Gase bei einer niedrigeren Temp. (A. 1518126 vom 1/8. 1923, ausg. 2/12. 1924.) KAUFMANN

E. de Haën Akt.-Ges., Seelze b. Hannover, übert. von: **A. F. Meyer**, Zürich, *Kieselflußsäure und Fluorborwasserstoffsäure*. Man läßt H_2SO_4 auf O_2 u. SiF_4 einwirken. (E. P. 222836 vom 24/7. 1924, Auszug veröff. 3/12. 1924. r. 1/10. 1923.) KAUFMANN

Hermann Frischer, Köln a. Rh., *Überführung verdünnter Salpetersäure in Dampfform*. (D. R. P. 304305 Kl. 12i vom 20/1. 1917, ausg. 5/1. 1925. O. 31/8. 1916. — C. 1921. II. 789.) KAUFMANN

Donald B. Bradner, Edgewood, Maryland, *Stickoxyde und Ätzkalk*. Ein Gemisch von Alkalinitrat u. Fe_2O_3 wird durch Verbrennungsgase erhitzt, umgibt u. während des Erhitzens im mechan. Ofen in Bewegung gehalten:



Das $\text{Na}_2\text{Fe}_2\text{O}_4$ wird nach Entnahme aus dem Ofen mit W. behandelt:



(A. P. 1516588 vom 10/8. 1921, ausg. 25/11. 1924.) KAUFMANN

Stewart Joseph Lloyd und Absalom Mason Kennedy, Montgomery, Ala., *Arsenate*. Man oxydiert ein Arsenit auf elektrolyt. Wege. (A. P. 1517516 vom 2/5. 1923, ausg. 2/12. 1924.) KAUSCH.

George J. Ferguson, Philipsburg, Pennsylvan., *Behandlung von Calciumcarbid*. Handelsprod. CaC_2 wird mit Schmalzöl behandelt u. dann dieses Öl erhitzt der Einw. von Dämpfen. (A. P. 1516813 vom 5/3. 1924, ausg. 25/11. 1924.) KAUSCH.

Henry L. Doherty & Company, New York, übert. von: **Robert C. Allen**, Wood, Ohio, *Aktive Kohle*. Man führt ein aktivierendes Medium durch eine bewegende M. von kohlenstoffhaltigem Material hindurch. (A. P. 1517523 vom 3/3. 1921, ausg. 2/12. 1924.) KAUSCH.

General Electric Company, New York, übert. von: **Frank M. Dorsey**, Cleveland, Ohio, *Aktive Kohle*. Kohlenstoffhaltige Stoffe werden zuerst bei Temp. über 100°C , bis wenigstens 2 Stdn. vor ihrer Vollendung u. dann der Einw. von H_2O in den Ausgangsstoffen enthaltenen KW-stoffe oxydierendem Gas (Wasserdampf) ausgesetzt. (A. P. 1517543 vom 16/7. 1919, ausg. 2/12. 1924.) KAUSCH.

Estes M. Jones, New York, übert. von: **William Jones**, New York, *Knochenkohle*. Gedämpfte, d. h. vom Leim oder von der Gelatine befreite Knochen werden mit einem bei der Verkohlung akt. Kohle gebenden Material gemischt u. geglüht. (A. P. 1518072 vom 1/9. 1923, ausg. 2/12. 1924.) KAUSCH.

Wolfram-Metall G. m. b. H., Berlin. *Wolfram- und Molybdäncarbid*. (N. P. 1518072 vom 28/1. 1920, ausg. 10/12. 1923. — C. 1915. II. 447. [D. R. P. 286184]) KÜ.

de Haën Akt.-Ges., Seelze b. Hannover, übert. an: **A. F. Meyerhofer**, Berlin, *Alkalisalze komplexer Fluorwasserstoffsäuren, Siliciumfluoride, Alkalicarbonate und Hydrate*. NaNO_3 (KNO_3), NaCl (KCl) oder Na_2SO_4 (K_2SO_4) werden mit einer konzentrierten F-Säure (H_2SiF_6 o. dgl.) behandelt. Die erhaltenen Salze werden durch Erhitzen in Alkalifluorid u. SiF_4 übergeführt. Das Alkalifluorid wandelt man mit CaF_2 in Alkalicarbonat um. (E. P. 222838 vom 31/7. 1924, Auszug veröff. 3/12. 1924. Prior. 1/10. 1923.) KAUSCH.

Société Anonyme „Appareils et Evaporateurs Kestner“, Lille, Frankr., *Erzeugung von Natronsalzen aus bicarbonathaltigen Mineralwässern*, dad. gek., daß man zuerst die Ca-Salze durch Erhitzen des Mineralwassers ausgefällt, dann das CaCO_3 entfernt, die Ca-freie Lsg. bis zur Sättigung eingedampft u. alsdann durch Erhitzen eines Stromes gasförmiger CO_2 NaHCO_3 ausgeschieden wird. (D. R. P. 2730 Kl. 121 vom 15/10. 1922, ausg. 2/1. 1925. Belg. Prior. 5/11. 1921.) KA.

William H. Volek, Watsonville, Californien, *Calciumsulfide*. Man unterwirft CaI_2 u. S der Einw. von H_2S in Ggw. von W. (A. P. 1517522 vom 13/6. 1922, ausg. 2/12. 1924.) KAUSCH.

Bernard, Mesvin-Ciply bei Mons, Belgien, *Phosphate*. Um phosphathaltigen Kalk oder andere Stoffe, die CaCO_3 oder Ca(OH)_2 enthalten, anzureichern, werden diese Salze in Ca(OH)_2 übergeführt, das von den unl. Stoffen mit soviel W. als zur Lösung des Ca(OH)_2 erforderlich ist, ausgelaugt wird. (E. P. 224468 vom 1/12. 1924, ausg. 4/12. 1924.) KAUSCH.

Alexander Nathansohn, Oker a. Harz, *Hüttenfähige Erzeugnisse aus Zinklösungen*. (D. R. P. 407507 Kl. 40a vom 10/7. 1923, ausg. 16/12. 1924. — C. 1924. II. 2078.) KÜHLING.

Chemische Fabrik Griesheim-Elektron, Frankfurt a. M., übert. von: **Erich Specketer**, Griesheim a. M., **Julius Söll**, Schwanheim a. M., und **Hilbert Bilfinger**, Griesheim a. M., *Aluminiumfluorid-Alkalifluoridverbindungen, die basisch eisenfrei sind*. (A. P. 1517686 vom 1/9. 1923, ausg. 2/12. 1924. — C. 1924. I. 439.) KAUSCH.

Aladar Pacz, Cleveland Heights, Ohio, *Aluminiumfluorid*. Man läßt metall. Al bei erhöhter Temp. Aluminiumsilicofluorid einwirken. (A. P. 151 vom 16/4. 1920, ausg. 9/12. 1924.) KAUF

Cobb Electro Reduction Corporation of Canada Limited, Toronto, *Canada Metalloxyde*. Oxyde des As, Sb, Co, Mo, Sn, Vd, Zn u. dgl. werden durch bringen des fein verteilten Metalls in eine oxydierende Zone über einem das durch eingetauchte Elektroden zum Schmelzen gebracht u. erhalten. (E. P. 223271 vom 11/6. 1923, ausg. 13/11. 1924.) KAUF

VI. Glas; Keramik; Zement; Baustoffe.

Hobart M. Kraner, *Gefärbte Zinkkrystallglasuren*. Die bekannten Zinkkrystallglasuren wurden mit Kobalt-, Kupfer-, Mangan-, Eisen-, Nickel-, Uran- u. C. oxyden angefarbt. Die Reihenfolge der Anfärbbarkeit fiel in die angegebene Reihenfolge der Oxyde. Chrom färbte nur sehr schwach. Vf. gibt noch einen Vorschlag, das Na der Glasur durch Natriumsilicat einzuführen. (Journ. Amer. Ceram. Soc. 7. 868—77. 1924. Flint, Mich.) BAUF

John D. Martin, *Weitere Entwicklung eines automatischen Ofenrosts für industrielle Öfen*. Vf. bespricht einen neuen automat. Rost, den er 3 Jahre im Einsatz hat, hinsichtlich der feuerungstechn. Vorzüge. (Journ. Amer. Ceram. Soc. 7. 87—94. 1924. New Straitsville [O.]) BAUF

E. E. Ayars, *Das Brennen von feuerfesten Materialien in einem Rundofen mit mechanischem Rost*. Mechan. Roste waren in der Fabrikation von Terracotten sehr erfolgreich verwandt. Es schien nicht sicher, daß sie auch bei der Größe der feuerfesten Materialien gute Ergebnisse brachten. Es zeigte sich aber Ersparnis an Brenndauer u. Feuerkosten. (Journ. Amer. Ceram. Soc. 7. 889—94. 1924. Cleveland [O.]) BAUF

Marya Kahanowicz und **Ada Estrafalaces**, *Selektive Absorption gesättigter Gläser und radiometrische Methode zur Bestimmung ihres Reflektionsvermögens*. Die Autoren untersuchten gefärbte Gläser der Firma SCHOTT (Jena) u. zwar rotes Glas, Marke F. 4512 u. zwei blaue Gläser, Marke F. 3873 u. F. 3654. Für das rote Glas ergab sich für das Reflektionsvermögen $R = 0,091$. Die für die Glasstrahlung u. für die filtrierte Strahlung erhaltenen Energiekurven führen zu der Formel $E = A \cdot E_0 \cdot e^{\beta T}$, worin E_0 die der Gesamtstrahlung, E die der filtrierte Strahlung entsprechende Energie, T die absol. Temp. der Lichtquelle u. A eine Konstante. Es werden zwei Fundamentalkonstanten abgeleitet: $c = \beta \Delta \lambda = 0,001$ u. $R = A \cdot d / \delta \Delta \lambda = 0,091$ (d = Dicke des Glases, δ = 2,69). Werden diese in obigen Ausdruck für E eingesetzt, so ergibt sich $E = (R \delta \Delta \lambda / d) \cdot E_0 \cdot S$, worin S die neue Formel für das Gesetz der selektiven Absorption, worin der Faktor $R \delta \Delta \lambda / d$ die monochromat. Funktion des Filters bedeutet u. der Faktor S die Emission der Lichtquelle bezogen auf die spektrale Zone λ bestimmt wird. Zuerst liefert die neue Formel eine radiometr. Methode für die Best. des Reflektionsvermögens R . (C. r. d. l'Acad. des sciences 179. 890—93. 1924.) K. W.

Fred A Harvey und **Earle N. McGee**, *Die Ursachen der Widerstandsfähigkeit von Silicasteinen gegenüber der Abnutzung*. Vf. besprechen die Methoden, die zur Best. der Widerstandsfähigkeit gegen die Schleifwerk. (abrasion) verwendet wurden. Sie benutzten eine Carborundscheibe. Sie setzten die gefundenen Resultate mit den Hauptfaktoren, Porosität u. Höhe des Brandes, in Beziehung und fanden eine gewisse Abhängigkeit. (Journ. Amer. Ceram. Soc. 7. 895—906. 1924. Abt. Union [Pa.]) BAUF

C. Debrun, *Nachweis des Bleies in tönernem Kochgeschirr*. Zur Prüfung der inneren Glasur auf Abgabe von Pb empfiehlt Vf., wie folgt zu verfahren, um bei sehr geringen Mengen Pb eine scharfe Rk. zu erhalten. Man läßt 10 c.c. Essigsäure von 6% 24 Stdn. lang in dem zu prüfenden Gefäße auf die Glasur einwirken. (Journ. Amer. Ceram. Soc. 7. 907—908. 1924. Abt. Union [Pa.]) BAUF

n, dampft dann nach Zugabe von 5—6 Tropfen HNO₃ (36° Baumé) zusammen
 em Nachspülwasser in einer Porzellanschale zur Trockne, nimmt mit 5 cem sd.
 f u. dampft wieder zur Trockne. Dann löst man in 15 cem sd. W., filtriert
 ft zu 50 cem auf. Zu je 10 cem der Fl. gibt man 5 Tropfen 10%ig. Lsg. von
 er von K₂CrO₄. Das PbJ₂ bildet sich fast sofort; die Empfindlichkeit der Rk.
 30000. Der Nd. des PbCrO₄ bildet sich namentlich an der Grenze der
 ndlichkeit nicht sofort, es empfiehlt sich etwa 2 Stdn. zu warten; die Empfind-
 it ist 1:100000. Für den vorliegenden Zweck genügt die mit KJ erreichte
 ie der Rk. (Ann. des Falsifications 17. 467. 1924. Nizza.) RÜHLE.

larke C. Minter, New York, *Mischung zum Aufräumen von Glas*, bestehend
 nem in W. l. Silicat, W. u. fein zerteiltem Glas. (A. P. 1518807 vom 27/5.
 1924, ausg. 9/12. 1924.) KAUSCH.

emens & Halske A.-G., Berlin, *Zweigniederlassung Wien, Künstlicher
 mer. Niedrig schmelzende Teile des herzustellenden Erzeugnisses, vorzugs-
 is Natriumcalciumsilicat (Fensterglas), werden als Lösungsmm. für die übrigen
 stteile benutzt, deren FF. oberhalb der Entstehungstemp. des Glimmers liegen
 Wird eine fein gepulverte Mischung von 7 Teilen Fensterglas, 5 Teilen MgO,
 Ten K₂SiF₆ u. 3 Teilen AlF₃ in einem widerstandsfähigen Tiegel geschmolzen
 c Schmelze 2—3 Stdn. bei einer Temp. von etwa 1450° erhalten. (Oe. P.
 91 vom 4/12. 1920, ausg. 25/9. 1924. D. Prior. 6/12. 1919.) KÜHLING.*

urt Becker, Berlin-Wilmersdorf, *Herstellung formbarer Massen auf kaltem
 g dad. gek., daß man Gemische von Magnesiumsilicaten u. Aluminiumsilicaten
 s der Einw. von H₂SO₄ u. HCl auf Fluoride erhaltener HF unter Zugabe
 aun, gegebenenfalls auch H₃PO₄ oder Wasserglas, vermengt u. durch Pressen
 n — Gegenüber einem bekannten, mit fertigen Fluorsilicaten arbeitenden
 f wird schnellere u. bessere Erhärtung erzielt, auch werden beim Pressen
 ihre Umrisse erhalten. (D. R. P. 406517 Kl. 80b vom 31/12. 1922, ausg.
 1924.) KÜHLING.*

ecker-Porzellan G. m. b. H., Berlin, *Glasurverfahren*, 1. dad. gek., daß
 st MM. aus Fluorsilicaten u. Ton vor oder nach dem Formen oder vor oder
 dem Trocknen mit Alkalisilicatlgg., gegebenenfalls unter Zusatz von Farben,
 boffen oder sonstigen Beimischungen überzogen werden. — 2. dad. gek., daß
 st. MM., die gemäß Patent 406517 (vgl. vorst. Ref.) erhältlichen Erzeugnisse
 widet werden. — Die Glasuren haften gut auf der Unterlage, Abspringen u.
 iverden wird ganz oder in der Mehrzahl der Fälle vermieden. (D. R. P.
 5 Kl. 80b vom 22/7. 1923, ausg. 9/12. 1924.) KÜHLING.

Polysius, Eisengießerei und Maschinenfabrik, Dessau, *Brennen von
 u. dgl., insbesondere in Drehrohröfen*, dad. gek., daß das Brennen bei
 Gasunterdruck erfolgt, welcher den durch gewöhnlichen Schornsteinzug
 ichten wesentlich unterschreitet. — Es wird große Ersparnis an Wärme
 weil auch die Temp., bei der die CO₂ entweicht, bedeutend herabgedrückt
 (D. R. P. 406493 Kl. 80b vom 22/2. 1922, ausg. 18/11. 1924.) KÜHLING.

chard Grün, Düsseldorf, *Verwertung saurer reaktionsträger Hochofenschlacke*,
 Umwandlung in einen Grundstoff für einen Mörtelbildner durch Versetzen
 slacken in glühendfl. Zustände mit CaO oder Kalksalzen, dad. gek., daß das
 n geheizten Mischern ausgeführt wird. — Das Erzeugnis kann mit CaO,
 bsplattendenden Körpern oder Portlandzementklinker auf Zement vermahlen
 d. (D. R. P. 406667 Kl. 80b vom 25/4. 1920, ausg. 24/11. 1924.) KÜHLING.

urry Stehmann, Berlin-Hohenschönhausen, *Vorrichtung zum Brennen von
 e, Magnesit, Kalk u. dgl. nach Patent 378364*, bestehend aus einem Dreh-
 n, dem ein von Luft durchströmter Kühlbehälter in Form einer Kühltrommel
 I. 1.

vorgeschaltet ist, dad. gek., daß die Kühltrommel mit dem Drehofen luftdicht verbunden ist, u. am unteren Ende zur Regelung der einzuführenden Luft mit einer windsicheren Austragschleuse abgeschlossen ist. — Es wird die Wrkg. wie gemäß dem Hauptpatent, aber in einfacherer Weise erzielt. (D. 407171 Kl. 80c vom 29/1. 1921, ausg. 6/12. 1924. Zus. zu D. R. P. 378364; C. 378364; C. 378364.) KÜHL

Josef Weibel, Gloten-Sirnach, Schweiz, *Herstellung von Bauelementen*. (D. 407365 Kl. 80b vom 17/7. 1923, ausg. 11/12. 1924. — C. 1924. I. 702.) KÜHL

John Duncan Whyte, Perth übert. von: **John Thompson Ellis**, Kalg Australien, *Poröse Massen*. Man vermischt etwa 40 Teile gebrannten Gips 1 Teil Asbest u. Borsäure u. 4 Teilen Holzkohle, zu dem trockenen Gemisch man NH₃-enthaltendes W., die erhaltene Paste wird dann geformt; die M. z. B. zum Bau von Wänden für Kühlräume. (A. P. 1518189 vom 17/1. 1923, ausg. 9/12. 1924.) FR

Paul Anft, Thal-Itter, Bez. Cassel, *Herstellung einer Kunststeinmasse*, dad. gek., daß lufttrocken zerkleinerter Torf mit fein gemahlenem CaCO₃ trocken mengt u. mit mit NaCl versetzter Kalkmilch getränkt u. nach nochmaliger Trocknung mit Portlandzement u. erforderlichenfalls mit Füllstoffen trocken gemischt u. in Mischmaschinen mit reinem W. unter Beifügung von CaCO₃ bis zum erdfeuchten Zustande gemischt wird. — Die mit der M. hergestellten Bausteine sind u. große Isolierfähigkeit gegen Wärme, Kälte u. Schall, Leichtigkeit, Druckfestigkeit u. niedrigen Herstellungspreis auszeichnet. (D. R. P. 406446 Kl. 80b vom 2/12. 1923, ausg. 21/11. 1924.) KÜHL

Georg Fredl, Harburg, Schwaben, *Ausbildung des Verfahrens zur Aufschlüsselung von Traß durch Ätzkalk*, dad. gek., daß an Stelle der mit dem Namen „Traß“ bezeichneten Tuffe auch Gesteine vom Typus der übrigen vulkan. Tuffe treten, z. B. Leuzit-, Phonolith-, Basalt-, Andesit-, Dazituffe o. dgl., oder deren eigentlichen Ergußsteine, wie Trachit, Phonolith, Andesit, Dazit u. dgl. — Die auf Zerkleinerung in feine Feinheit vermahlenen Gemenge lassen sich wie Portlandzement verwenden u. g. (D. R. P. 406393 Kl. 80b vom 13/5. 1924, ausg. 21/11. 1924. Zus. zu D. R. P. 376615; C. 1923. IV. 199.) KÜHL

Wilhelm Eberlein, Stockport, Engl., *Herstellung von Guß- und Präparaten*, 1. dad. gek., daß Substanzen in kolloidaler Feinheit mit Schwefel innig vermischt werden. — 2. dad. gek., daß Substanzen in kolloidaler Feinheit mit Ölen, Mineralölen, Paraffin oder ähnlichen Stoffen ausgeflockt, getrocknet u. dann mit Schwefel gemengt werden. — Geeignet sind kolloide Mineralien jeder Art, Holzkohle, Knochenkohle u. dgl. (D. R. P. 407038 Kl. 80b vom 5/1. 1924, ausg. 21/11. 1924.) KÜHL

Chemisches Laboratorium für Tonindustrie und Tonindustrie-Zubehör, Prof. Dr. H. Seger & E. Cramer G. m. b. H., Berlin, *Schmelzkegel mit Schutzschicht*, Messen höherer Temperaturen, dad. gek., daß die Schutzschicht aus widerstandsfähigen Harzlacken, insbesondere künstlicher Herst., besteht. Bei Benutzung der Schmelzkegel sind erheblich genauere Temperaturmessungen ausführbar als mit den bekannten Kegeln u. zwar auch in nicht neutraler oder feuchter Atm. (D. 406835 Kl. 42i vom 1/7. 1922, ausg. 28/11. 1924.) KÜHL

VII. Agrikulturchemie; Düngemittel; Boden.

Bronislaw Niklewski, *Über den Einfluß von Nitrifikationsbakterien auf Stickstoffsubstanzen im Stallmist*. (Vgl. Bull. Soc. Chim. Biol. 5. 491; C. 1914. 107.) In steril erhaltenem u. aufbewahrt Stallmist blieb der N-Gehalt nach 257 Tagen fast unverändert, bei größeren Harnmengen trat Verlust von 5-10% ein, mit Nitrifikationsbakterien infizierter verlor in gleicher Zeit 20-24%, vor

u. Denitrifikationsbakterien zusammenwirken können. Die Nitrifikationsbakterien wirken auch an Aminosubstanzen, anscheinend auch an organ. Kolloiden. (Roczniki Nauk Rolniczych 9. 193—210. 1923. Posen, Univ.; Ber. ges. Physiol. 29. 7. 1924. Ref. KOPEĆ.) SPIEGEL.

3. Rousseaux, Vergleichende Versuche mit Phosphorsäuredüngemitteln. Feinstes kolloidales Rohphosphat wirkte für Gerste u. Kartoffel selbst in halber Gabe weniger günstig als Superphosphat u. Thomasmehl. (Ann. de la science agronom. franç. et étrangère 41. 241—50; Ber. ges. Physiol. 29. 69. 1924. Ref. UNGERER.) SPIEGEL.

Jan Zólcziński, Über das Sonnenlicht und die chemische Nitrifikation. In wss. Ammoniak. Lsgg. natürlicher oder künstlicher Humussubstanzen konnte im Sonnenlicht nicht im Dunkeln, chem. Nitrifikation festgestellt werden, in Quarzgefäßen schneller als in Glasgefäßen. Bei Zusatz künstlich hergestellter Humusstoffe oder bei 210—220° gebranntem $\text{Al}(\text{OH})_3$ verläuft der Prozeß schneller. In Lsgg. Stärke oder arab. Gummi erfolgte er nicht. (Roczniki Nauk Rolniczych 10. 1. 32. 1923; Ber. ges. Physiol. 29. 67—68. 1924. Ref. KOPEĆ.) SPIEGEL.

Łygmunt Pietruszczyński, Über den Einfluß des Mangans auf den Nitrifikationsprozeß des Ammoniaks. Die Mn-Salze üben fördernden Einfluß auf die Nitrifikation von NH_3 in fl. Nährmedien, auch im Boden, wo der schädigende Einfluß größerer Gaben geringer ist. In Topfverss. mit Hafer zeigte sich bessere Ausnutzung von $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ bei Zusatz von MnSO_4 (Optimum 0,25 g auf 12 kg Erde), als bei Zusatz von Salpeter. (Roczniki Nauk Rolniczych 9. 235—87. 1923; Ber. ges. Physiol. 29. 1. 3. 1924. Ref. KOPEĆ.) SPIEGEL.

Henryk Malarski und Józef Sypniewski, Über den Einfluß der Feuchtigkeit des Bodens und der Belichtung auf die Entwicklung von *Lupinus angustifolius* L. auf den Alkaloidgehalt in dessen Samen. Feuchtigkeit u. Sonnenlicht begünstigen die Entwicklung. Der Alkaloidgehalt der Samen war besonders hoch bei 20% Feuchtigkeit bei 65% ungefähr n., bei 35 u. 50% auffallend gering. Zu seiner Best. wurde die gravimetrische Methode benutzt. (Mém. de l'Inst. nat. polonais d'écon. rurale 4. 302—27; Ber. ges. Physiol. 29. 68—69. 1924. Ref. KOPEĆ.) SP.

Vincent, Die Acidität und die organischen Substanzen des Bodens. Wie gesättigte neutral reagierende Stoffe (Zucker, Pektine) vermögen auch organ. Stoffe des Bodens CaO zu binden; ferner bilden sich durch Wrkg. des Luft- O_2 Säuren. Das Bindungsvermögen gegenüber der freien Base ist demnach von dem durch die organ. bedingten Anteil zu unterscheiden. Der letzte läßt sich feststellen durch die Einw. von Dicarbonaten der Erdalkalien oder Alkalien entbundene CO_2 . Das Kalkbindungsvermögen wächst bei gleichem Gehalte an organ. Substanz mit der Menge der organ. Substanz, Torf kann bis 11% CaO binden. Die organ. Substanz wird durch die Einw. von CO_2 in nicht unbedeutender Menge gel. u. aus der Lsg. durch Neutralisieren wieder ausgeflockt. Auch die Kieselsäure des Pflanzengewebes bindet anscheinend CaO , da dieses bei Lösen von mit Kalkwasser behandeltem Torf in Essigsäure nur teilweise wiedergefunden wird. Der organ. gebundene Kalk ist l. in CO_2 , kann aber nicht von der Pflanze aufgenommen werden. Es wird ein Schema für die Bindung des CaO in den einzelnen Bindungsformen im Boden aus der Menge der organ. Substanz, der Acidität (vgl. oben) u. dem gesamten Kalkbindungsvermögen aufgestellt. (Ann. de la science agronom. franç. et étrangère 41. 260—71; Ber. ges. Physiol. 29. 69. 1924. Ref. UNGERER.) SPIEGEL.

Arthur Pierson Kelley, Rauch und Bodenacidität. (Vgl. Soil Science 16. 41; 1924. II. 2696.) Anlässlich von Pflanzenschädigungen in Philadelphia vorgenommene Unterss. ließen die vermutete Beziehung zwischen der Bodenacidität u. der durch industrielle Anlagen erzeugten Rauch nicht erkennen. (Botan. gaz. 77. 1. 5-39; Ber. ges. Physiol. 29. 70. 1924. Ref. DÖRRIES.) SPIEGEL.

Edith Seymour Jones, *Einfluß von Temperatur, Feuchtigkeit und Sauerstoff auf die Sporenkeimung von Ustilago avenae*. Um die Einw. der Temp. auf die Auskeimung u. B. der Sporen genauer festzustellen, werden diese in Tiegheimschen Zellen oder hohlgeschliffenen Objektträgern in Rindfleischbouillon von Rk. + 10 der Fullerskala ($p_H = 6,1$) bei Temp. von 4–35° gehalten. Als Optimum wird diejenige Temp. betrachtet, bei der Keimung u. die übliche B. von Sporen innerhalb 24 Std. eintritt. So wurde für die Keimung die niedrigste Temp. 4–5°, als maximale 31–34°, als optimale 15–28° festgestellt. B. von Sporen ergaben sich die gleichen Werte, nur das Maximum etwas niedriger bei 29–30°. Für Unterss. des Einflusses von Feuchtigkeit wurden die Sporen auf Agar-schichten zwischen Filtrierpapier in Böden gebracht, die zu 30, 60 u. 90% mit Feuchtigkeit gesätt. waren. Bei 30% war die Keimung am stärksten, schwach bei 60%, sehr deutlich vermindert bei 80%. In Suspension einer O₂-freien Luft ausgesetzt, keimten die Sporen nicht. (Journ. Agricult. Research **24**. 571–577. 1923.)

Edith Seymour Jones, *Einfluß der Temperatur auf die Sporenkeimung von Ustilago Zeae*. (Vgl. vorst. Ref.) Maisbrandsporen kamen in düngerhaltigen Halmproben nur ausnahmsweise zu merklicher Keimung, reichlich aber in vielen anderen Medien, von denen Pasteursche Lsg. für die folgenden Verss. gewählt wurden. Für die Keimung (I) sowohl als auch für die B. (II) der Sporen liegt das Optimum zwischen 26 u. 34°, das Maximum zwischen 36 u. 38°, das Minimum für I bei 18°, für II jedenfalls nicht höher. Hohe Temp. dürfte danach die Infektivität des Maises begünstigen. (Journ. Agricult. Research **24**. 593–97. 1923. U. S. Department of Agric.)

Fritz van Emden, *Bericht über die entomologische Überwachung der Speicher- und Kulturen der Firma Caesar & Loretz A.-G. im Jahre 1923*. Ausführliche Besprechung der „echten“ Speicherschädlinge u. der „unechten“ Speicher- u. Vegetativschädlinge, ferner der Insekten, die der Vegetation in den Versuchsfeldern im allgemeinen u. im besondern schaden oder nützen. (Jahresbericht der CAESAR & LORETZ A.-G., **1924**. 165–232. Sep.)

Eugen Ketterer, Essen, *Gewinnung trockener Kohlensäure zu Düngezwecken*. Kurzes Ref. nach E. P. 204063 vgl. C. **1924**. I. 368.) Heizgase durchströmen einen Füllm., welche von einer Alkalicarbonatlsg. berieselt wird. Die entstehende Alkalicarbonatlsg. fließt in einen die Feuerung umgebenden Mantelraum, das in diesem entwickelte Gemisch von Dampf u. CO₂ wird innerhalb eines Behälters gegen einen Rippenkörper geleitet, der gleichzeitig einem k. Luftstrom ausgesetzt wird. Wasserdampf wird kondensiert u. fließt ab, die CO₂ wird in trockenem Zustand am Verbrauchsort (Gewächshaus) zugeführt. (Schwz. P. **106143** vom 4/9/1924, ausg. 1/8. 1924. D. Prior. 16/9. 1822.)

Erhard Britzke, Rußland, *Düngemittel*, bestehend aus einer wss. Lsg. von H₃PO₄, welche in konz. Zustand versendet, am Verbrauchsort verd. u. auf der düngenden Fläche gleichmäßig verteilt wird. Zur Gewinnung der H₃PO₄ wird Rohphosphat, gegebenenfalls unter Zusatz von SiO₂, mit Brennstoffen gemischt. Der Generator verbrannt, wobei ein Gemisch von CO u. P entsteht. Dies Gemisch wird mit der zur Umwandlung des P in P₂O₅ erforderlichen Menge Luft verbrannt, P₂O₅ mittels Cottrellverf. abgeschieden u. durch W. in H₃PO₄ verwandelt. (Schwz. P. **575166** vom 31/12. 1923, ausg. 25/7. 1924.)

Chem. Fabrik Dr. Heppes & Co., G. m. b. H., Hamburg, *Herstellung eines Düngemittels* aus organ. Stoffen wie Torf, Braunkohle o. dgl., dad. gek., das mit einem Gemisch dieser Stoffe mit Meeresalgen mit Sulfitablauge, verd. Säuren oder verd. Alkalien im Autoklaven unter Druck erhitzt u. gegebenenfalls nach Neutralisation

ochkolloidem Meeresschlick u. frischen Algen gemischt wird. — Das Düngemittel soll als guter Nährboden für Luftstickstoff bindende Mikroben dienen. (P. 407 007 Kl. 16 vom 22/7. 1922, ausg. 3/12. 1924.) KÜHLING.

dispersoid Syndicate Limited, England, *Herstellung von Pflanzenschutzmitteln*. Gemahlener Schwefel wird in einer Kolloidmühle unter Zusatz geringer Mengen Phenolen, Halogenphenolen oder phenolhaltigen Teer- oder Schieferölen dispersiert. — Man vermischt z. B. S mit Toluol, setzt Naphthalinsulfosäure als Dispersionsbeschleuniger, Teeröl u. W. hinzu u. behandelt das Ganze in einer durchlaufenden Kolloidmühle kurze Zeit. Das Steinkohlenteeröl läßt sich durch Kresole, Kresole oder Xylenole ersetzen. Man erhält eine beständige Dispersion kolloidalen S, die weiß gefärbt u. von hoher Desinfektionskraft ist. Diese u. die Beständigkeit der Dispersion lassen sich wesentlich steigern, wenn man bei der Herstellung Chlor-m-xylenol verwendet. — Der fertigen Dispersion oder während ihrer Lagerung kann man Cu-Salze, As-Verbb. oder Naphthalin zusetzen. — Die fl. Dispersionen lassen sich nach Zusatz eines Schutzkolloids, wie Gelatine, bei niedriger Temp. im Vakuum zu einem festen pulverförmigen, den S als reversibles Kolloid enthaltenden Prod. eindampfen, das in W. ll. ist. Die Prodd. finden entweder in Form von Spritzbrühen oder Pulver als Pflanzenschutzmittel Verwendung. (F. P. 912 vom 18/8. 1923, ausg. 19/4. 1924. D. Prior. 28/9. 1922.) SCHOTTLÄNDER.

James Wright van Meter, San Francisco, V. St. A., *Herstellung von Gasen zur Schädlingsbekämpfung*. Zu den Reff. nach A. P. 1399829; C. 1923. IV. 61, F. P. 548380 u. E. P. 197706; C. 1923. IV. 648 ist nachzutragen, daß bei der Einwirkung von Cl₂ auf Alkalicyanide in Ggw. von Fe-Feilspänen nicht Dicyanogen HCN, neben CNCl u. FeCl₂, entsteht u. das Insekticid bildet. — Als Reagenz zur Ausführung des Verf. dient eine an einer auf einem geeigneten Gestell befestigten Wage befestigte Chlorbombe, die mit einem mit Cyanid u. Metall beschickten Entwicklungsgefäß verbunden ist. Durch die Ablesung an der Wage kann die Entnahme des Cl₂ aus der Bombe jederzeit leicht gemessen werden. (D. R. P. 407324 Kl. 451 vom 11/12. 1921, ausg. 22/12. 1924.) SCHOTTLÄNDER.

Curie Creegan Roark, Baltimore, Maryland, V. St. A., *Desodorierungs- und Insektenvertilgungsmittel*, gek. durch die Verwendung von p-Nitrochlorbenzol oder anderen festen u. flüchtigen Nitroderiv. der arom. Reihe, wie Dinitrobenzol, Dichlorbenzol, Dinitronaphthalin, m-Nitrochlorbenzol oder Dinitrochlorbenzol. — Man mischt z. B. p-Nitrochlorbenzol u. rührt in die geschmolzene M. einen Riechstoff oder Farbstoff ein, gibt einen Farbstoff hinzu u. gießt die Mischung in geeignete Formen. Man kann sich so feste, vollständig flüchtige Blöcke herstellen, die zur Geruchsverbesserung der Luft von Innenräumen aller Art dienen können. — Als Insekticid kann das p-Nitrochlorbenzol in Krystall-, Flocken-, Pulver-, Körner-, Block- oder Pulverform über Kleider, Wollstoffe, Pelze u. Felle gestreut u. verhindert den Schmutz. Oder es wird in A., Bzl. oder CS₂ gel., bezw. mit Seife, Sulfosaponin, Saponin, Casein oder Caseinaten in W. emulgiert u. mit der Lsg. oder Suspension Felle oder Kornkästen besprengt. Zur Vernichtung des Pfirsichbaumschwarzes wird die die Stammenden der Bäume umgebende Erde ausgehoben u. der Boden um die Bäume mit dem festen p-Nitrochlorbenzol bestreut. Dann wird der umgebene Boden wieder auf die bestreuten Stellen gedeckt u. festgestampft. Erfolgreich erfolgt die Behandlung im Frühjahr oder Herbst, da die Bodentemp. im Sommer weniger als 10° betragen soll. (A. P. 1515364 vom 19/4. 1922, ausg. 11/11. 1924.) SCHOTTLÄNDER.

Alfour, Guthrie & Company, San Francisco, übert. von: **Paul R. Jones**, San Francisco, California, V. St. A., *Herstellung eines Insektenvertilgungsmittels*. Man mischt naphthensaures Na, mit KOH 23° Bé., gemahlenem Fichtenharz, hochkonz. Rohkresol u. W. u. erhitzt. Mit dieser Seife wird Petroleum oder leichtes

Schmieröl emulgiert. — Das beständige Emulsionen bildende Prod. findet als *Mittel* für Pflanzen Verwendung, auf die es keine schädlichen Nebenwrgg. ausübt. (A. P. 1502956 vom 27/4. 1921, ausg. 29/7. 1924.) SCHOTTLÄNDER.

The Dow Chemical Company, übert. von: **Max Y. Seaton**, Midland, Michigan, V. St. A., *Insektenvertilgungsmittel*, bestehend aus einer Mischung von $\text{Pb}_3(\text{AsO}_4)_2$ u. Caseinnatrium oder Gelatine. — Durch die Beimengung der Kaseinlösung läßt sich das $\text{Pb}_3(\text{AsO}_4)_2$ beim Mischen mit W. in feine Verteilung bringen, die sich auf den Pflanzenblättern gleichmäßig verspritzt u. haftet nach dem Verdunsten des W. fester an den Pflanzenteilen. (A. P. 1514348 vom 27/1. 1919, ausg. 29/7. 1924.) SCHOTTLÄNDER.

The Dow Chemical Company, übert. von: **Herbert H. Dow** und **William J. Hale**, Midland, Michigan, V. St. A., *Insektenvertilgungsmittel*, bestehend aus einem Gemisch von Benzylalkohol, Glykol- oder Propylenchlorhydrin u. W. — Durch Zusatz der Chlorhydrine wird der in W. unl. Benzylalkohol mit diesem mischbar u. haftet dann besser auf den mit dem Mittel bespritzten Pflanzenteilen. Man kann dem Gemisch auch Nicotin u. andere Giftstoffe zusetzen oder es von absorbierenden Stoffen, wie CaO oder den Arseniaten des Ca, Pb oder Mg, aufsaugen lassen u. Bestäubungspulver verwenden. Es dient vornehmlich zur Vertilgung von Blattläusen. (A. P. 1514377 vom 31/3. 1920, ausg. 4/11. 1924.) SCHOTTLÄNDER.

VIII. Metallurgie; Metallographie; Metallverarbeitung

H. C. H. C., *John Edward Stead*. Nachruf auf den 1851 geborenen am 31. Oktober 1923 verstorbenen Eisenhüttenchemiker. (Proc. Royal Soc. London Serie A. 106. I—V. 1924.) BECKER.

E. Diepschlag, *Die Entwicklung der Groeisenindustrie in Deutschland vor und nach dem Kriege*. (Ztschr. f. angew. Ch. 38. 41—43. Breslau.) JUNG.

G. Masing, *Über einige Fragen der Kaltreckung und Verfestigung bei Metallen*. Es wird die theoret. Vorstellung des Kaltreckungsvorganges gegeben, die sich aus der Theorie der Elemente der älteren Gleitungstheorie als auch der Verlagerungstheorie ergibt u. einige neue Probleme gekennzeichnet. (Naturwissenschaften 13. 1—5.)

R. C. Gale, *Mitteilung über „Temper“-Farben*. Zweck der Arbeit war, zu entscheiden, ob die beim Erhitzen von Stahl entstehenden Anlauffarben auf Interferenz oder auf Lichtzerstreuung an körnigem Material zurückzuführen sind. Die Untersuchung der Schichten wurde gravimetr. bestimmt unter der Annahme, daß sie aus Fe_2O_3 u. Fe_3O_4 bestehen. Sie schwanken danach zwischen $4,2 \times 10^{-7}$ cm für strahlungslos u. $21,3 \times 10^{-7}$ für dunkelpurpur. Die Beziehung von TAMMANN (Rec. trav. chim. Pays-Bas 42. 547; C. 1924. I. 1337) $T_A : T_M = \mu$, worin T_M die Dichte der Schicht, T_A die einer Luftschicht der gleichen Interferenzfarbe u. μ der Brechungsindex des Oxyds ist, trifft nicht für alle Farben zu. Aus der Tatsache, daß man durch Polieren eine blaue Anlaufschicht purpurn u. gelb werden kann, darf man nicht endgültig schließen, daß man es mit Interferenzfarben zu tun hat, die durch Veränderung der Schichtdicke sich ändern. Bei dieser Annahme müßte nach den Ergebnissen des Vfs. der Brechungsindex der Schicht zwischen 2,53 für hellgelb u. 0,63 für dunkelviolett schwanken. Vf. neigt zu der Ansicht, daß die Anlaufschicht körnige Struktur hat u. die Farben durch Lichtzerstreuung zustande kommen, wofür auch spricht, daß h. angelaufene Stahlschrauben in feuchter Luft viel schneller an Gewicht zunehmen als unerhitzte derselben Abmessungen. (Journ. Soc. Chem. Ind. 43. T. 34—35. 1924. Woolwich, Artillery Coll.) HERZOG.

Ernst Aster, *Über deutsche Konstruktionsstähle im Automobilbau*. Es wird ein Überblick über die mechan. Eigenschaften u. chem. Zuss. der S.M.-Stähle u. legierten Einsatzstähle, 2—4% ig. Cr-Ni-Einsatzstähle, unlegierten niederen, höher-

u. 3—4% ig. Cr-Ni-Vergütungsstahl, sowie 3—4% ig. Cr-Ni-Universalstähle
gen. (Auto-Technik 13. Nr. 25 a. 30—33. 1924.) WILKE.

d. Fry, *Verziehungsfreie Oberflächenhärtung von Sonderstahl durch Nitrieren*.
Nitrierhärtung liegt wie der Einsatzhärtung ein Diffusionsvorgang zugrunde.
läßt N unterhalb 580°, also bei wesentlich tieferer Temperatur als sie bei der
tzhärtung erforderlich ist, in die Oberfläche der zu härtenden Stücke ein-
ern. Nachfolgende Abschreckung ist nicht mehr nötig. Durch diese neue
bildung bleiben die Oberflächen sauber, es treten keine Verziehungen auf, u.
lanen keine Formänderungen durch Alterung stattfinden. Da kein Ausfall an
rissen auftritt, kann man schwierige Teile mit diesem Verfahren härten, die
r Abschreckhärtung hohe Ausschußzahlen aufweisen würden. Das teure Nach-
hilfen kommt fast vollständig in Wegfall, da die Stücke schon poliert gehärtet
rn können. Zur Anwendung der Nitrierhärtung eignen sich aber nur be-
re Sonderstähle. Die Kanten nitrierter Gegenstände schneiden leicht Glas
zen Quarz. Da mit dieser Härte eine gewisse Sprödigkeit der äußersten
hit verbunden ist, so muß man am besten die Kanten u. Ecken abrunden.
ipsche Monatshefte 5. 266—69. 1924.) WILKE.

W. Wazau, *Das Gefüge des Elektrolytnickels*. Vf. untersucht die Ursachen der
üchtigkeit von Elektrolytnickel. Eine eindeutige Erklärung konnte nicht ge-
bt werden, doch hatte es den Anschein, als ob okludierter H_2 diese Erscheinung
rucht. Wurden einzelne Proben gestaucht u. dann bei verschiedenen Tempp.
hre Stdn. geglüht, dann verschwand die ursprüngliche strahlige Struktur des
ekrolytnickels u. es trat eine Rekristallisation ein. Die Brüchigkeit der Proben
eljedoch auch nach dem Glühen erhalten. Es besteht die Möglichkeit, daß ein
heden bei tieferer Temp. den Blechen eine gewisse Biegezüglichkeit verleihen
m. (Ztschr. f. Metallkunde 16. 482—83. 1924. Christiania.) BECKER.

G. Wolfram und W. N. Harrison, *Die Herstellungsbedingungen einiger
nder Deckemaitlen*. In einigen Verss. fanden Vff., daß die besten Ergebnisse bei
von Borsäure u. Blei oder Kieselsäure erzielt werden. Ein höherer Prozent-
z on Blei ist empfehlenswert. Bei Verwendung von Alkalioxyden ist Kalium-
wünschenswerter als Natron. Emailen, die in ihrer Körnung zwischen dem
100. Maschensieb liegen (nach amerik. Siebnormung!), gaben die besten
state. Glanz, Beschaffenheit der Oberfläche u. allgemeines Aussehen der
an wurden durch die färbenden Bleioxyde beeinflußt. (Journ. Amer. Ceram.
cl. 857—67. 1924.) BAUER.

H. Shapleigh, *Korrosion in ihrer Beziehung zur Sicherheit chemischer An-
ei* Solche Korrosionen fl. u. gas- oder dampfförmiger Chemikalien können sich
(bäuden, sowie an App. u. sonstigen Anlagen chem. Fabriken zeigen u. deren
rbsicherheit schwächen oder ganz vernichten. Vf. erörtert die Umstände, die
rsionen entstehen lassen u. unterstützen, u. die Maßnahmen, Korrosionen vor-
beugen, oder wo dies nicht möglich ist, sie rechtzeitig zu erkennen u. Schäd-
igi zu verhüten. (Chem. Metallurg. Engineering 31. 768—69. 1924. Wilmington
el.) RÜHLE.

Georges Freydier-Dubreul, Frankreich, *Behandeln gemischt zusammengesetzter
e* Gemäß dem Hauptpatent werden den zu schm. Erzen $CaCO_3$ oder SiO_2 als
mittel zugegeben. An deren Stelle wird gemäß der Erfindung eisenhaltiger
u. verwendet. Die M. erfordert zwar eine etwas stärkere Erhitzung, die ent-
de Schlacke besitzt aber die Eigenschaften eines Schmelzzementes, bildet also
ertvolles Nebenerzeugnis. Zweckmäßig arbeitet man auf einen Gehalt der
lke an 40% Al_2O_3 , 40% CaO , 10% SiO_2 u. 10% Fe_2O_3 hin. Ist der Gehalt
uxits an Fe_2O_3 zu hoch, so schm. man den Überschuß davon durch Steigerung

der Temp. als Metall aus. (F. P. 27676 vom 8/2. 1923, ausg. 16/8. 1924. Z. F. P. 525616; C 1921. IV. 1216.) KÜHLI.

Gustave Fabre und **Louis Bergognon**, Frankreich, *Reduktion eisenhaltiger Rückstände*. Pyritabbrände o. dgl. werden in einer Atm. reduzierender Gase eingeatmet u. dadurch in einen Zustand übergeführt, in dem das vorhandene Fe ohne weiteres als FeSO₄ gel. werden kann. Zu diesem Zweck werden die Rückstände in stetigen Betrieben durch einen gedrehten Muffelofen geführt, in dem ihnen reduzierende Gase entgegengeleitet werden, während der Ofen dadurch auf Dunkel- oder Hellrotglut erhitzt wird, daß ein Teil der reduzierenden Gase verbrannt wird u. die Verbrennungsprodd. durch einen isolierten Ringraum geleitet werden, der den Ofen umgibt. (F. P. 574922 vom 7/12. 1923, ausg. 21/7. 1924.) KÜHLI.

Hugo Kaufmann, Karlsruhe i. B., **Sally Kaufmann** und **Myrtill Kaufmann**, Rheinbischofsheim, Baden, *Mittel zum Entschwefeln flüssigen Eisens* in der Schmelzpfanne oder im Kupolofen, bestehend aus einem Gemisch einer Alkaliverb. u. Kalk, dad. gek., daß reiner C in Form von Flockengraphit verwendet wird. — Die Entschwefelung erfolgt ohne besondere Vorr. zu erfordern u. ist vollständig. (D. R. P. 406156 Kl. 18b vom 1/6. 1923, ausg. 14/11. 1924.) KÜHLI.

Erich A. Beck, New York, übert. von: **Karl Bornemann**, Breslau, *Reinigung von Zink und Zinklegierungen*. (A. P. 1515140 vom 20/5. 1922, ausg. 11/11. 1923. — C. 1923. IV. 877. [D. R. P. 381886.] KÜHLI.)

Westinghouse Lamp Company, Bloomfield, V. St. A., *Herstellung von sehr hellen und von sehr hoch schmelzenden Metallen*. (D. R. P. 407508 Kl. 40a vom 18/12. 1921, ausg. 16/12. 1924. A. Prior. 21/12. 1920. — C. 1922. II. 1078 [173236.] KÜHLI.)

Manfred Gottfried Semper, Altona-Bahrenfeld, *Raffiniervverfahren für Edelmetalle und deren Legierungen*, dad. gek., daß durch Ein- oder Aufblasen von gasförmigen Oxydationsmitteln ohne direkte Einw. einer Flamme in oder auf die Oberfläche eine äußere Wärmequelle im geschmolzenen Zustande erhaltenen Edelmetall oder Legierung geschädlichen unedlen Metalle ausgeschieden werden. — Das zur Entfernung von Löt- u. dgl. -metallen bisher erforderliche umständliche, zeitraubende u. kostbare Scheideverf. wird erspart. (D. R. P. 406430 Kl. 40a vom 10/2. 1923, ausg. 1/11. 1924.) KÜHLI.

Fritz Doeblin, Mannheim, *Säurebeständige Legierung* nach Patent 38739 nicht unter 32% Si, 1. dad. gek., daß ein Teil des Co durch W, V, Mo, Cr oder Ti ersetzt ist. — 2. dad. gek., das bis zu 10% des Co durch eines oder mehrere der genannten Metalle ersetzt sind (vgl. auch D. R. P. 389189; C. 1921. I. 2540). — Die Erzeugnisse besitzen größere Festigkeit als die Legierungen nach dem Hauptpatent. (D. R. P. 407017 Kl. 40b vom 16/5. 1924, ausg. 3/12. 1924. Zus. zu D. R. P. 387398; C. 1924. I. 961.) KÜHLI.

Aktiebolaget Ferrolegeringar, Stockholm, *Verfahren, einem Metall oder einer Legierung Wärme zuzuführen*, z. B. zwecks Schmelzens eines Metalles oder einer Legierung, dad. gek., daß ein stromleitender Körper oder eine Elektrode aus Metall oder einer Legierung von größerer D. als geschmolzene Schlacke, welche das Metall bzw. die Legierung bedeckt, in das Schlackenbad so tief eingesenkt gehalten wird, daß bei geeignetem Spannungsunterschied zwischen dem Metallkörper u. der Schlacke ein elektr. Strom von geeigneter Stärke von dem genannten Körper zum Schlackenbad selbst übergeht u. dabei eine Überhitzung des vom elektr. Körper durch Einw. der vom Strom erzeugten Wärme abgeschmolzenen Metalles (oder Legierung) bewirkt, das dann durch das Schlackenbad hinabsinkt u. wenn es an das darunter befindliche Metall oder die Legierung überführt u. gegebenenfalls sich mit dem genannten Metall oder der Legierung legiert. — Das Verf. arbeitet ohne nennenswerte Verluste an Metall u. mit äußerst niedrigem Energieverbrauch.

P. 407249 Kl. 18b vom 24/4. 1923, ausg. 10/12. 1924. Schwed. Prior. 14/2.

KÜHLING.

Villoughby Statham Smith und **Henry Joseph Garnett**, England, *Legierung* von hoher Magnetisierbarkeit, bestehend aus mehr als 45% Ni, Fe u. Cu, ferner mäßig auch W, Cr, Si, V, Ti, Mo oder Al. Zur Erhöhung der Schmiedbarkeit kann auch eine kleine Menge Mn zugesetzt werden. Geeignete Zuss. sind 4% Ni, 5,4% Cu, 20,7% Fe, 0,6% W u. 0,3 Mn bezw. 72,6% Ni, 5,3% Cu, 5% Fe, 1,2% Si u. 0,3% Mn. (**F. P. 575247** vom 4/1. 1924, ausg. 25/7.

KÜHLING.

Ernhard van der Laan, Troisdorf, *Erzeugung von glänzenden Metallüberzügen* an Gegenständen aus Celluloid, Cellon und ähnlichen Kunststoffen, die bei einseitiger Erwärmung Gase entwickeln, dad. gek., daß die zu überziehenden Gegenstände beim Hindurchführen durch das den Elektrodenstaub der aufzubringenden Überzüge enthaltende Vakuum gekühlt werden. — Die Beeinträchtigung des Glanzes durch Farbertones der Überzüge durch die in der Wärme entwickelten Gase wird vermieden. (**D. R. P. 407213** Kl. 48b vom 18/8. 1922, ausg. 8/12. 1924.) KÜHLING.
Friedrich Körber, Düsseldorf, *Erzeugung bunter Oberflächenfärbung auf Eisen*, dad. gek., daß der zu färbende Gegenstand der Einw. einer alkal. Lsg. oxydierender Salze ausgesetzt wird, dad. gek., daß zur Durchführung des Verf. silicium- bzw. manganhaltige Eisenlegierungen benutzt werden. — Die Färbungen zeichnen sich durch Klarheit, festes Haften u. große Beständigkeit aus. (**D. R. P. 406803** vom 25/12. 1923, ausg. 27/11. 1924.)

KÜHLING.

IX. Organische Präparate.

Carbide & Carbon Chemicals Corporation, New York, übert. von: **George C. Cline, jr.**, Clendenin, West Virginia, V. St. A., *Herstellung von Alkylchloriden*. Man läßt HCl auf Olefine in Ggw. von AlCl₃ unter Druck bei Abwesenheit von Wasser einwirken. — Zur Herst. von *i*-Propylchlorid läßt man z. B. HCl-Gas unter 15 at. auf Propylen einwirken. Der Zusatz von AlCl₃ ist hierbei nicht erforderlich, die Komponenten sich unter den angegebenen Bedingungen sehr leicht vereinigen. — Dagegen muß bei der Herst. von Äthylchlorid aus Äthylen u. HCl-Gas in Ggw. von AlCl₃ gearbeitet u. der Druck auf 35 at. gesteigert werden. Die Rk. verläuft bereits ohne äußere Wärmezufuhr bei 15° glatt. Die Prodd. finden außer in Äthylen auch als Lösungsmittel u. zur Kälteerzeugung Verwendung. (**A. P. 15832** vom 17/5. 1922, ausg. 9/12. 1924.)

SCHOTTLÄNDER.

Math B. Hunt, Trustee, Mount Kisco, New York, übert. von: **Matthew Mann, jr.**, Roselle, New Jersey, V. St. A., *Reinigen und Geruchlosmachen von Alkylalkohol*. Der aus olefinhaltigen Gasen gewonnene rohe *i*-Propylalkohol wird mit H₂SO₄ 66° Bé. angesäuert, mit ca. 0,1% KMnO₄ gründlich durchmischt, mit Wasser neutralisiert u. dest. (hierzu vgl. auch Standard Development Co. u. **A. P. 1498229**; C. 1924. II. 1631 u. HUNT u. MANN, JR., A. P. 1491916; C. 1924. II. 2367.) (**A. P. 1518339** vom 7/3. 1921, ausg. 9/12. 1924.) SCHOTTLÄNDER.

Carbide and Carbon Chemicals Corporation, New York, übert. von: **George C. Cline jr.**, Charleston, West Virginia, und **Charles O. Young**, Elmhurst, New York, V. St. A., *Herstellung von Chlorhydrinen*. Ungesätt. KW-stoffe der Olefinreihe werden mit einer wss. Lsg. von Hypochloriten mit einem Gehalt von ca. 0,09% HOCl bei 10° nicht übersteigenden Tempp. behandelt. — Das Verf. liefert *i*-Propyl- u. Glycerinmonochlorhydrin, die frei von Chloriden des Äthylens u. Propylens sind. (**Can. P. 238729** vom 18/2. 1923, ausg. 18/3. 1924.) SCHOTTLÄNDER.

Chemische Gesellschaft für Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, *Darstellung von einseitig acylierten Derivates des Äthylendiamins*, dad. gek., daß man *a*. Diäthylendiamin mit einer das Radikal der Ölsäure enthaltenden Verb. behandelt. —

Z. B. werden *Ölsäure* u. a. *Diäthyläthylendiamin* 10 Stdn. auf 200—220° erhitzt, das Reaktionsprod. durch Dest. im Vakuum vom gebildeten W. befreit. Das *Diäthylaminoäthylmonoamid der Ölsäure*, dickes, nicht destillierbares, in W. unlöslich, organ. Lösungsmitteln l. Öl, bildet mit Säuren in W. l. Salze, von denen das *Hydrat*, *Silicofluorid*, *Citrat*, *Lactat*, *Benzoat*, *p-Chlorbenzoat*, *Salicylat* dicke Öle bilden. Die Verb. u. ihre Salze finden techn. u. therapeut. Verwendung. (Schwz. P. 107202 vom 17/7. 1923, ausg. 1/10. 1924.) SCHOTTLÄNDER

Chemische Fabrik Griesheim-Elektron und Nathan Grünstein, Frankfurt a. M., *Herstellung von Acetaldehyd aus Acetylen*. (D. R. P. 408181 vom 10/3. 1916, ausg. 12/1. 1925. — C. 1924. I. 2542. 2543 [A. P. 1477951].) K

Dr. Alexander Wacker, Gesellschaft für elektrochemische Industrie, München, *Herstellung von Essigsäureanhydrid*. Man läßt auf freie CH_3COH u. Cl_2 , bezw. Chloride des S u. Cl_2 einwirken. — Es gelangen hierbei auf jedes CH_3COH 4 Atome Cl u. mindestens 4 Mol. $\text{CH}_3\text{CO}_2\text{H}$ zur Verwendung. Das Reaktionsgemisch wird zunächst gekühlt u. gerührt u. dann zur vollständigen Umsetzung erhitzt. Um das Verf. kontinuierlich zu gestalten, behandelt man das Gemisch aus S u. S_2Cl_2 oder SCl_2 u. $\text{CH}_3\text{CO}_2\text{H}$ im Gegenstrom unter Kühlung mit Cl_2 u. leitet das Gemisch von der empir. Zus. $4\text{CH}_3\text{CO}_2\text{H} + \text{S} + 4\text{Cl}$ ebenfalls kontinuierlich durch eine Rektifizierkolonne in der die Umsetzung sich im Sinne der Gleichung $\text{SCl}_2 + \text{Cl}_2 + 4\text{CH}_3\text{CO}_2\text{H} = 2(\text{CH}_3\text{CO})_2\text{O} + \text{SO}_2 + 4\text{HCl}$ beim Erhitzen vollzieht. Hierbei entweichen SO_2 u. HCl gasförmig, während sich das *Essigsäureanhydrid* im Destilliergefäß ansammelt u. in üblicher Weise gereinigt werden kann. — Zeitmäßig wird das Cl_2 ganz oder teilweise unter Druck in das Gemisch eingeleitet. Die Ausbeuten an Essigsäureanhydrid betragen 80—85% der Theorie. (F. P. 5188 vom 15/1. 1924, ausg. 7/8. 1924. D. Prior. 6/2. 1923. E. P. 211167 vom 2/12. 1924, ausg. 9/4. 1923. D. Prior. 12/2. 1923.) SCHOTTLÄNDER

Dr. Alexander Wacker, Gesellschaft für elektrochemische Industrie, München, *Herstellung von reinem Aluminiumacetat*. Zu dem Ref. nach D. R. P. 379512; C. 1923. IV. 581 ist nachzutragen, daß zur Herst. von reinem *Al-Acetat* techn. Al-Blech in einer Elektrolysierzelle der anod. Oxydation unterworfen wird. Als Kathode dient ein Cu-Drahtnetz, als Elektrolyt eine mit 0,1% Ca-Acetat versetzte 6%ig. $\text{CH}_3\text{CO}_2\text{H}$. Man elektrolysiert bei einer Anodenstromdichte von 0,5 A pro qdm während 24 Stdn. u. erhält eine farblose, den Reinheitsanforderungen für Arzneibuch genügende *Al-Acetat*lsg. nach Filtration von geringen Mengen Schmutz. Die Verunreinigungen des Al scheiden sich an der Kathode aus. — Unterwirft man eine infolge eines Gehaltes von 0,1% an gel. Fe tiefgelb gefärbte *Al-Acetat*lsg. mit Hilfe einer Al-Anode der Elektrolyse, so ist die Lsg. nach kurzer Zeit farblos u. Fe-frei geworden. (Schwz. P. 106775 vom 10/3. 1923, ausg. 1/9. 1924. D. Prior. 13/3. 1922.) SCHOTTLÄNDER

Badische Anilin- & Soda-Fabrik, übert. von: **Alwin Mittasch** und **Carl Balz**, Ludwigshafen a. Rh., *Oxalsäure*. (A. P. 1518597 vom 19/8. 1921, ausg. 1/12. 1924. — C. 1923. II. 743.) SCHOTTLÄNDER

The Barrett Company, übert. von: **Charles R. Downs** und **Charles G. Sullivan**, Cliffside, New Jersey, V. St. A., *Herstellung von Maleinsäure durch katalytische Oxydation von Benzol*. Ein Gemisch aus dampfförmigem Bzl. u. O_2 -haltigen Gasen wird auf 400° erhitzt u. dann in eine Reaktionskammer geleitet, die durch parallel übereinander u. horizontal gelagerte Platten in mehrere Abteile geteilt ist. Auf den durchlochenden Platten befindet sich in dünner Schicht ausgebreitet eine präparierte V-Oxyd enthaltende Katalysatormasse aus gemahlenem Bimsstein oder Asbest, die in geeigneter Weise auf ca. 400° beheizt wird. Über den einzelnen Platten befinden sich Kühlvorrichtungen. Beim Eintritt in die Kammer wird das Gasgemisch zunächst etwas abgekühlt, geht dann über das erste Abteil mit dem Katalysator

die Temp. infolge der exothermen Rk. sehr schnell ansteigt (auf ca. 450°). Auf wird das Gemisch wieder abgekühlt u. gelangt dann in den nächsten Schnitt mit der h. Katalysatormasse. Durch die abwechselnde Kühlung u. Erhitzung wird eine zu weit gehende Oxydation des Bzl. zu CO₂ u. H₂O vermieden. Die Temp. dauernd zwischen 400 u. 450° gehalten. Durch einen Auslaß am Boden der Kammer wird dann die fertige *Maleinsäure* entfernt. — Die gleiche Vorrichtung kann bei geeigneten Temp. auch zur teilweisen katalyt. Oxydation anderer aromatischer oder anorgan. Verb., wie *Naphthalin*, *Toluol*, *Anthracen*, *Phenanthren*, *Anilin*, *Kresol*, *Phenol*, *Xylol*, CH₃OH, A., C₂H₄, C₂H₂, NH₃, SO₂, in Dampfform mit anderen gasförmigen Gasen gemischt, Verwendung finden. (A. P. 1515299 vom 7/12. 1918, 11/11. 1924.)

SCHOTTLÄNDER.


Société des Produits Azotés, Paris, *Verfahren zur Gewinnung von Harnstoff aus verdünnten sauren Lösungen*. Zu dem Ref. nach E. P. 189787; C. 1923. II. 1111 folgt folgendes nachzutragen: Das Konzentrieren der sauren wss. Harnstofflsg. im Vakuum kann auch bei Temp. oberhalb 60°, jedoch nicht über 75°, erfolgen. — Wenn man von einem Gemisch aus W., 10–20% H₂SO₄ u. Harnstoff aus u. kühlt, so scheidet sich auf –10 bis –15° ab, so scheidet sich ein an Monohydrat armes, krystallin. Harnstoffmonohydrat ab. Dieses wird abfiltriert u. die Lsg. dann wie oben konzentriert. Bei Abkühlen auf 0° scheidet sich der Harnstoff aus der W. u. H₂SO₄ enthaltenen Mutterlauge ab. Diese kann vorteilhaft zur Überführung von *Cyanid* in *Harnstoff* dienen, wobei die gesamte Menge des letzteren krystallin. abgeschieden wird. (Schwz. P. 554263 vom 29/11. 1921, ausg. 8/6. 1923 u. F. P. 27337 [Zus.-Pat.] vom 1/12. 1922, ausg. 6/6. 1924. N. P. 38139 vom 23/11. 1922, ausg. 29/10. 1923. F. P. 107197 vom 13/11. 1922, ausg. 16/10. 1924. F. Priorr. 29/11. 1921 u. 11/12. E. P. 206489 vom 19/10. 1923, ausg. 31/12. 1923. F. Priorr. 3/11. 1922. A. P. 189787; C. 1923. II. 808.)

SCHOTTLÄNDER.

Société d'Études Chimiques pour l'Industrie, Genf (Schweiz), *Herstellung von Harnstoff aus Cyanamid*. Man behandelt eine zweckmäßig konz. wss. Lsg. von H₂ unter Druck, der unterhalb 10 at liegen soll, mit einem sauren Katalysator wie HNO₃, H₂SO₄, H₃PO₄ oder NaHSO₄, dessen Menge weniger als 10% der Gewichtsmenge der Bindung des gesamten entstandenen Harnstoffs als Salz der entsprechenden Katalysatormenge beträgt, bei Temp. unterhalb 75°. — Z. B. wird eine konz. N-N-Ca u. CO₂ in Ggw. von W. erhaltliche Lsg. von CN-NH₂ mit 5% konz. H₂SO₄ verd. H₂SO₄ versetzt u. in einem verbleiten u. mit einem Rührwerk versehenen, durch Einleiten von komprimiertem N₂ unter einem Druck von 5 at. 5 at gesetzten Autoklaven während 6 Stdn. unter Rühren auf 65–70° erhitzt. Die saure Lsg. wird dann mit CaCO₃ neutralisiert, filtriert u. die klare Harnstofflsg. eingedampft. Die Ausbeute an techn. reinem Harnstoff ist nahezu quantitativ. Das Prod. findet als *Düngemittel* Verwendung. (Schwz. P. 100177 vom 2/12. 1922, ausg. 16/7. 1923. E. P. 192703 vom 1/2. 1923, ausg. 5/4. 1923. F. Priorr. 4/2. 1922. F. P. 561554 vom 29/1. 1923, ausg. 24/10. 1923. Schwz. P. 561554 vom 4/2. 1922.)

SCHOTTLÄNDER.

Union Carbide Company, New York, übert. von: **George Oliver Curme jr.** und **Norman Bunsen Heyn**, Pittsburg, Pennsylvania, V. St. A., *Herstellung von Harnstoff aus Dibenzyldibenzylcarbamid und deren Alkalisalzen*. Man behandelt *Dibenzyl* mit O₂ oder O₂-haltigen Gasen wie Luft, bei erhöhter Temp. (150–500°) unter Druck, in Ggw. eines gasförmigen Überträgers, wie MnO₂, Fe₂O₃ u. von Alkalihydroxyden oder Carbonaten. — Die Reaktion erfolgt im Sinne der Gleichung:



Es wird ein Gemisch aus *Dibenzyl*, MnO₂ u. NaOH in einem mit Rührwerk versehenen Autoklaven unter kräftigem Rühren u. Einleiten von Luft oder reinem Sauerstoff auf 200–300° erhitzt, bis kein unverändertes *Dibenzyl* mehr vorhanden ist. Das

Na-Benzolat wird nach den üblichen Methoden aus dem Reaktionsgemisch
schieden u. auf freie *Benzoessäure* verarbeitet. Das Verf. liefert völlig
Prodd. (A. P. 1463255 vom 20/4. 1917, ausg. 31/7. 1923.) SCHOTTLÄN

Carbide and Carbon Chemicals Corporation, New York, übert. von: **Russell Curme**, Clenderim, West Virginia, V. St. A., *Herstellung von Benzaldehyd und Benzoessäure*. Man behandelt *Dibenzyl* mit O₂ oder Luft bei Temp. zw. 150 u. 284°, bei Abwesenheit eines Sauerstoffüberträgers. — (Hierzu vgl. auch A. P. 1463255; vorst. Ref.) Man erhitzt z. B. *Dibenzyl* in einem geschlossenen Gefäß gewöhnlichem Druck unter Einleiten von O₂-haltigen Gasen. Die aus einem Gefäß laßrohr entweichenden Dämpfe gehen zunächst in einen durch Luft geleiteten Kondensator, in dem sich W., *Benzaldehyd* u. *Benzoessäure* fl. abscheiden u. teilweise aus ihm entfernt werden. Der Rest der kondensierbaren Gase geht durch den Kondensator in einen Wasserkühler u. wird dort verflüssigt. Das Verf. liefert den *Benzaldehyd* u. die *Benzoessäure* in hohen Ausbeuten, neben geringen Mengen nicht identifizierbarer Oxydationsprodd. Zweckmäßig arbeitet man bei Temp. zw. 284°, dem Kp. des *Dibenzyls*. (E. P. 197319 vom 24/4. 1923, ausg. 4/7. 1924. A. Prior. 4/5. 1922. A. P. 1502941 vom 4/5. 1922, ausg. 29/7. 1924. C. P. 238730 vom 9/4. 1923, ausg. 18/3. 1924. F. P. 565153 vom 16/4. 1924, ausg. 2/7. 1924. A. Prior. 4/5. 1922. Schwz. P. 106554 vom 17/4. 1923, ausg. 16/9. 1924. A. Prior. 4/5. 1922.) SCHOTTLÄN

The Selden Company, Pittsburgh, V. St. A., *Vorrichtung zum Reinigen von Phthalsäureanhydrid*. Kurzes Ref. nach E. P. 153252; C. 1921. II. 314. Folgendes ist zutragen ist folgendes: Zur Reinigung des durch Oxydation von Naphthalin gewonnenen rohen *Phthalsäureanhydrids* durch Sublimation u. fraktionierte Kondensation, unter Benutzung eines Gas- oder Luftstromes als Träger der *Phthalsäureanhydrid*dämpfe, dient eine Sublimationskammer, an die sich eine durch Siebwände in einzelne verschieden temperierte Abteilungen geteilte Kondensationskammer anschließt. Die Abteilungen sind in der Strömungsrichtung stufenförmig erhöht u. an den Siebwänden befinden sich Schüttelvorrichtungen. Z. B. wird das rohe *Phthalsäureanhydrid* unter Einblasen von Gas in der Sublimationskammer auf 150°C erhitzt. Das mit den Dämpfen beladene Gas wird dann in die erste Abteilung der Kondensationskammer geleitet u. gelangt durch die Siebwände in die folgenden Abteilungen. Hier erfolgt in der Hauptsache in den ersten zwei oder drei Abteilungen die Kondensation der reinen Krystalle, die sich vornehmlich an den Siebwänden absetzen. Durch hinter diesen angeordnete Gewichte oder Pendel, die zeitweise gegen die Wände schlagen, werden die Krystalle abgeschüttelt u. in die nächsten Kondensationskammer durch in der Nähe des Bodens befindliche Türen entnommen. In der Kondensationskammer wird eine Temp. zwischen 70 u. 115° eingehalten. Man erhält aus rohem *Phthalsäureanhydrid* mit einem Gehalt von 97,7% *Phthalsäureanhydrid*, 0,6% *Maleinsäureanhydrid*, 0,5% *Benzoessäure*, 1% W. u. 0,2% *Naphthalin* mit 100% ig. *Phthalsäureanhydrid* in einer Ausbeute von 85%. Der Rest der Verunreinigungen wird von neuem der Behandlung unterworfen. (D. R. P. 406203 Kl. 12o vom 9/1. 1920, ausg. 18/11. 1924. E. Prior. 14/10. 1919.) SCHOTTLÄN

C. F. Boehringer & Soehne G. m. b. H., Mannheim - Waldhof (Erlangen), *Herstellung von p-Aminobenzoessäurealkalinesalzen*. (Albert Rothmann, Heidelberg), *Am Stickstoff substituierte Anthranilsäurederivate*. (D. R. P. 406148 Kl. 12p vom 21/7. 1921, ausg. 15/11. 1924. — C. 1923. I. 9.) SCHOTTLÄN

The Abbott Laboratories, Chicago, Illinois, übert. von: **Russell L. Jenkins**, Urbana, und **Ernest H. Volwiler**, Chicago, Illinois, V. St. A., *Herstellung von p-Aminobenzoessäurealkalinesalzen*. Man behandelt *p-Nitrobenzochlorid* in benzol. Lsg. mit einem N-Disekündärbutylaminoalkohol u. reduziert zu *p-Aminobenzoessäure* oder kondensiert *p-Aminobenzoessäure-β-* oder *γ-*halogen-

ster mit Diskundärbutylamin. — Z. B. wird Äthylenchlorhydrin mit Diskundärbutylamin kondensiert u. der β -Diskundärbutylaminoäthylalkohol, Kp.₇₅₀ 225° (korr.), mit einer Lsg. von p-Nitrobenzoylchlorid in Bzl. auf 100° erwärmt u. Nitroester mit Sn u. HCl unterhalb 50° reduziert. Nach dem Entzinnen mit Ä. wird ausgeäthert, der Ä. abdest. u. der p-Aminobenzoesäure- β -diskundärbutyläthylester $C_6H_4 \cdot (NH_2)^4 \cdot (CO_2 \cdot CH_2 \cdot CH_2 \cdot N[C_4H_9]_2)^1$ mit HCl in das Chlorhydrat überführt; aus A. oder W. Krystalle, F. 185—187°. — Behandelt man den p-Aminobenzoesäure- γ -brompropylester mit Diskundärbutylamin bei 60° u. reduziert u. verd. HCl, so erhält man den p-Aminobenzoesäure- γ -diskundärbutylaminopropylester $C_6H_4 \cdot (NH_2)^4 \cdot (CO_2 \cdot CH_2 \cdot CH_2 \cdot CH_2 \cdot N[C_4H_9]_2)^1$; Monochlorhydrat, aus A. oder W. Krystalle, F. 164—165°. Die freien Alkaminester sind fl. oder niedrig siedend in W. unl., in den üblichen organ. Lösungsm. ll. Stoffe u. besitzen ebenso wie ihre Salze wertvolle anästhesierende Eigenschaften. (A. P. 1513730 vom 11/12 1922, ausg. 4/11. 1924.) SCHOTTLÄNDER.

Joseph Ebert, Lyons Farms, New Jersey, V. St. A., Herstellung von Campher. Campherester werden mit wss. Alkalien in Ggw. von MnO₂ oder PbO₂ mit oder ohne Druck auf höhere Temp. erhitzt. — Beispiele sind angegeben für die Oxydation von *i*-Bornylacetat zu Campher durch Erhitzen mit wss. NaOH u. MnO₂ im Rückflußkühler auf 180—200°, — bezw. unter 6—10 at Druck auf 160—180°. In dem Reaktionsgemisch wird der Campher durch Dest. mit Wasserdampf nahezu quantitativ abgeschieden. (A. P. 1518732 vom 13/5. 1920, ausg. 9/12. 1924.) SCHOTTLÄNDER.

Gesellschaft für Chemische Industrie in Basel, übert. von: Guillaume de Molin und Gérald Bonhôte, Basel, Schweiz, Aryloxynaphthylketone. (A. P. 14676 vom 17/7. 1922, ausg. 18/11. 1924. — C. 1923. IV. 593 [D. R. P. 406733].) SCHOTTLÄNDER.

Chemische Fabriken Worms Akt.-Ges., Frankfurt a. M., Anthrachinon und Derivate. (D. R. P. 406245 Kl. 12o vom 19/5. 1918, ausg. 17/11. 1924 u. D. R. P. 406777 [Zus. Pat.] Kl. 12o vom 16/8. 1919, ausg. 27/11. 1924, 406778 [Zus. Pat.] Kl. 12o vom 14/9. 1920, ausg. 1/12. 1924. — C. 1921. II. 560. 1921. IV. 592. 1922. II. 145.) SCHOTTLÄNDER.

Chemische Holzverkohlungs-Industrie Akt.-Ges., Konstanz i. B., Hexamethylenetetramin und Äthylenchlorid. (D. R. P. 406217 Kl. 12p vom 29/3. 1922, ausg. 15/11. 1924. — C. 1924. II. 1026.) SCHOTTLÄNDER.

Chemische Fabrik vorm. Sandoz, übert. von: Eugen Sonnenfeld und Emil Stoll, Basel, Schweiz, Derivate des Hexamethylenetetramins. (A. P. 1497995 vom 8/5. 1921, ausg. 17/6. 1924. — C. 1921. IV. 1010.) SCHOTTLÄNDER.

X. Farben; Färberei; Druckerei.

H. Bock, Über Fällungsbleiweiß. Einzelheiten über Herst. von Fällungsbleiweiß u. seine Verarbeitung auf bunte Pb-Farben. Gegenüber Kammerbleiweiß spielt Fällungsbleiweiß nur eine bescheidene Rolle. (Farbe u. Lack 1925. 20—21.) SÜVERN.

F. Sacher, Bleiweißherstellung nach dem Vorschlage von Max Rascher und Ad. Plauehn. Gegenüber Klatte (Farbe u. Lack 1924. 407) u. Philipp (Chem.-Ztg. 1924. 750) werden Vorzüge des Plauehnschen Verf. nicht anerkannt. Das Hauptnachtei. der CO₂-Fällung aus bas. Pb-Acetatslgg. ist PbCO₃ u. nicht bas. PbCO₃, das zu Pb-Weiß. Die B. von bas. Carbonat ist auf die hydrolyt. Spaltung des basischen PbCO₃ zurückzuführen. (Farbe u. Lack 1925. 4. Düsseldorf.) SÜVERN.

J. Kohnstamm & Co., Inc., übert. von: Robert A. Phair, Allendale, New Jersey, Bleichmittel. Man verwendet ein Gemisch von NaOCl u. NaOH, das auf 100 Teile wirksames Cl 20 Teile NaOH enthält, zum Schutz der Faser u. der Färbung.

bung setzt man der Mischung 27 Teile Zucker zu. (A. P. 1514068 vom 27/11. 1923, ausg. 4/11. 1924.)

Joseph Pokorný, Seine, Frankreich, *Verbessern der Eigenschaften der lichen Faser*. Man behandelt die Faser mit starken Lsgg. von Ameisensäure durch wird der Glanz der Faser u. das Aufnahmevermögen für Farbstoffe (F. P. 573739 vom 23/11. 1923, ausg. 28/6. 1924.)

William H. Boser und Frederick J. Boser, Minneapolis, Minnesota, *zur Herstellung von Druckwalzen*. Man vermischt eine h. Lsg. vom Leim, Gla Borax, Firnis u. Ricinusöl mit Chromsulfid, Melasse, Eisenoxyd u. Schw formt. (A. P. 1514249 vom 11/10. 1923, ausg. 4/11. 1924.)

Antonin Germot, Asnières, Frankr., *Herstellung von einheitlichem Antitrioxyd*, dad. gek., daß unter die Oberfläche des in einem geschlossenen befindlichen geschmolzenen Metalls ein Strom eines oxydierenden Gases gele wird u. die entstehenden Dämpfe abgeführt u. in einer Kammer gesammelt v — Das Erzeugnis ist sehr reines, deshalb im Gegensatz zu dem durch Röst Antimonsulfiderz gewonnenen zur Herst. von Farben geeignet. (D. R. P. 43 Kl. 22f vom 10/9. 1922, ausg. 20/11. 1924. — Kurzes Ref. nach F. P. 5520 C. 1923. IV. 360.)

Heinrich Hocking, Nagytétény, und **Orion Kupferhütte und Kupferfabrik A. G.**, Budapest, *Herstellung von Mennige* aus metall. Pb in einem A gänge, 1. dad. gek., daß das auf über seinem F. liegende Temp. erhitze e Pb bei erhöhtem Drucke unter gleichzeitigem Vermahlen der Einw. oxydier Gase unterworfen wird. — 2. Vorr. zur Ausführung des Verf. nach Anspr dad. gek., daß eine mit einer Druckgasspeisung verbundene, druckdie geschlossene Kugelmühle, die das zu oxydierende Gas aufnimmt, innerhalb Ofenheizraumes angeordnet ist. — Gegenüber den bekannten Verff. zur I von Mennige bedeutet das vorliegende Verf. beträchtliche Zeit- u. Arbeitersu Die Verarbeitung einer Menge Pb, welche nach den früheren Verff. 144 Stn forderte, soll gemäß der Erfindung in 5 Stdn. erfolgen. (D. R. P. 406630 vom 17/10. 1923, ausg. 28/11. 1924. Ung. Prior. 16/8. 1923.)

Actien-Gesellschaft für Anilin-Fabrikation, Berlin-Treptow (Ein **Werner Lange**, Berlin-Friedenau), *Darstellung von Tetrakisazofarbstoffen* gek., daß man 1. ein Monoacidyl-p-diamin der Benzol- oder Naphthalinreihe ein p-Nitroamin diazotiert, mit einer α - oder β -Naphtholsulfosäure kuppe, Acidylaminogruppe verseift bzw. die Nitrogruppe reduziert, weiterdiazotiert, einer Zwischenkomponente der Benzol- oder Naphthalinreihe ohne freie Hydroxygruppe kuppelt, nochmals diazotiert, wieder mit einer Zwischenkomponente der Benzol- oder Naphthalinreihe ohne freie Hydroxylgruppe kuppelt, nochmals diazotiert u. schließlich mit Resorcin kuppelt, 2. oder ein Monoacidyl-p-diamin bez. p-Nitroamin der Benzol- oder Naphthalinreihe diazotiert, mit einer Zwischenkomponente der Benzol oder Naphthalinreihe ohne freie Hydroxylgruppe kuppelt, weiterdiazotiert, mit einer α - oder β -Naphtholsulfosäure kuppelt, die Acidylaminogruppe verseift bzw. die Nitrogruppe reduziert, wieder diazotiert, mit einer Zwischenkomponente der Benzol- oder Naphthalinreihe ohne freie Hydroxylgruppe kuppelt, nochmals diazotiert u. mit Resorcin kuppelt, 3. oder ein Monoacidyl-p-diamin bez. ein p-Nitroamin der Benzol- oder Naphthalinreihe ohne freie Hydroxylgruppe kuppelt, weiterdiazotiert, nochmals mit einer solchen Zwischenkomponente kuppelt, wieder diazotiert, mit einer α - oder β -Naphtholsulfosäure kuppe, Acidylaminogruppe verseift bzw. die Nitrogruppe reduziert, diazotiert u. mit Resorcin kuppelt. — Man kuppelt z. B. diazotiertes p-Nitranilin mit 1-Naphthyl-5-sulfosäure, reduziert mit Schwefelnatrium, diazotiert u. kuppelt mit 1-Naphthylamin-6-sulfosäure, nach nochmaligem Diazotieren wird mit 1-Methyl-3-amino-

nzol vereinigt, wieder diazotiert u. mit Resorcin gekuppelt; der Farbstoff
rt Baumwolle in rotstichigblauen, lichtechten Tönen; bei Anwendung anderer
ronenten erhält man blaue bis grünstichigblaue sehr echte Farbstoffe. (D. R. P.

764 Kl. 22a vom 10/8. 1922, ausg. 18/12. 1924.) FRANZ.

esellschaft für Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz. Her-

llung von Anthrachinonküpenfarbstoffen. Man behandelt 2-Aminoanthrachinon-
onsäure oder ihre Salze mit Oxydationsmitteln, MnO₂ in Ggw. von H₂SO₄
er mit geschmolzenen Alkalien bei erhöhter Temp. zweckmäßig in Ggw. von
ge. Flußmitteln, wie A., Paraffin, Glycerin, Anilin, Xylidin, Anisidin usw., das
rie Rohprod. kann durch Behandeln mit konz. H₂SO₄ oder durch Behandeln
tydationsmitteln u. darauffolgende Behandlung mit Alkalien, oder durch alkal.
ktion u. Füllen der Leukoverb. gereinigt werden. Der Farbstoff färbt Baum-
l in sehr reinen wasch-, chlor-, u. lichtechten blaugrünen Tönen. (F. P. 574221

ri/12. 1923, ausg. 8/7. 1924. Schwz. Priorr. 23/12. 1922; 7., 8., 9/3. u. 26/7.
2: Schwz. PP. 105238 vom 9/3. 1923, ausg. 2/6. 1924. 105853 vom 9/3.
2: ausg. 1/7. 1924, 106134 vom 26/7. 1923, ausg. 16/8. 1924, 107339 vom 26/7.
2: ausg. 16/10. 1924.) FRANZ.

alle & Co. Akt.-Ges., Biebrich a. Rh. (Erfinder: Maximilian Schmidt und
fd Hagenböcker.) Küpenfarbstoffe (vgl. A. P. 1497231; C. 1924. II. 2426.)
benzylidenacenaphthenon, aus Acenaphthenon u. Salicylaldehyd, gelbe Nadeln
s g., F. 186, ll. in organ. Fl. mit Ausnahme von Lg., l. in NaOH mit orangegelber
r. (D. R. P. 405394 Kl. 22e vom 22/10. 1921, ausg. 31/10. 1924. F. P.
711 vom 23/2. 1924, ausg. 10/9. 1924. Schwz. P. 107208 vom 14/2. 1924,
s/1/10. 1924.) FRANZ.

ladische Anilin- & Soda-Fabrik, übert. von: Paul Nawiasky, Ludwigs-
ft a. Rh., Grüne Küpenfarbstoffe. (A. P. 1513851 vom 12/12. 1923, ausg. 4/11.
2: — C. 1924. II. 2506 [F. P. 572971].) FRANZ.

Josef Lorenz, Eger, Tschechoslowakei, Herstellung von Wachsfarbenbindemitteln,
dyek., daß Bindemittel, wie z. B. Knochenleim, Gelatine, Casein, Kartoffelstärke
tem Rührwerk gel. u. mit einer Lsg. von K₂CO₃, NaOH, Borax oder NH₃
rsicht werden u. dieser Mischung je nach der zu erzielenden Bindekraft,
awrkg. oder Geschmeidigkeit eine Schmelze von Pflanzenwachs, Paraffin u.
en u. schließlich eine Mischung von Leinöl, Terpentinöl u. Bzn. unter steter
ea-eitung mit dem Rührwerk zugesetzt werden, bis das Ganze vollständig ge-
nn ist u. sich in k. u. in h. W. flockenlos auflöst. (D. R. P. 401056 Kl. 22g
n29/11. 1923, ausg. 27/8. 1924.) KAUSCH.

he Alchemic Gold Company, New York, N. Y., V. St. A., Farbe für Metall-
u. und Metallprägung, insbesondere auf Buchdecken. (D. R. P. 401057 Kl. 22g
n21/2. 1923, ausg. 25/8. 1924. A. Prior. 20/5. 1922. — C. 1923. IV. 598 [E. P.
76.] KAUSCH.

he Alchemic Gold Company, Inc., New York, N. Y., V. St. A., Metallfarbe
r Metalldruck und Metallprägung, insbesondere von Buchdecken. (D. R. P. 401060
2g vom 21/2. 1923, ausg. 25/8. 1924. A. Prior. 16/6. 1922. — C. 1923. IV.
21. P. 1450692.] KAUSCH.

Valentin Anton Petkovic, Linz a. D., Herstellung von Druckfarbe mittels FeS-
er., dad. gek., daß hierzu frisch auf nassem Wege bereitete Eisensulfide ver-
etzt werden, welche in bekannter Weise entweder mit Leinölfirnis oder mit
i Firnisersatzmitteln oder mit trocknenden Emulsionen zu Druckfarben angerieben
em. (D. R. P. 405870 Kl. 22g vom 20/7. 1922, ausg. 10/11. 1924.) KAUSCH.

ritz Croner, Charlottenburg, Druckfarbe und Verfahren zu ihrer Herstellung.
rtfarbe, 1. dad. gek., daß sie als Bindemittel neutralisierte Sulfitcelluloseablauge
ft. — 2. dad. gek., daß sie einen Gehalt an hygroskop. Stoffen besitzt. —

3. Verf., dad. gek., daß man neutralisierte Sulfitcelluloseablauge mit verseiften Mitteln behandelt u. darauf mit Farbkörpern vermischt zum Zweck der Erzielung einer Farbe von verminderter Wasserlöslichkeit. — 4. Verf., dad. gek., daß man die der Verseifung unterworfenen, neutralisierte Abfallauge vor der Vermischung mit der Farbe mit wasserabstoßenden Mitteln (Wachs u. Öl) versetzt. (D. R. P. 418 814 Kl. 22g vom 5/9. 1922, ausg. 24/12. 1924.) KAUFH

Plönnis & Co., Berlin-Friedenau, *Anstrichmittel*. Verf. zur Herst. eines Anstrichmittels aus Zement, 1. dad. gek., daß diesem zwecks Umwandlung des in ihm enthaltenen $\text{Ca}(\text{OH})_2$ in CaCO_3 CO_2 bzw. Alkalicarbonate zugeführt wird. — 2. gek. durch den Zusatz von Al_2O_3 , Talkum, Quarzmehl, Schwersparit oder anderen Mineralien in fein gemahlenem Zustand zum Zement. — 3. gek. durch den Zusatz von Wasserglas zum Zement. (D. R. P. 386948 Kl. 22g vom 17/1. 1922, ausg. 25/8. 1924.) KAUFH

Alfred Pulz, Coswig, Anhalt, *Stoff zum Anstreichen von Wänden, Eisen u. Holzteilen u. dgl. und Verfahren zu seiner Herstellung*. Verf. dad. gek., daß man Papier oder neue Faser-, Füll- u. Leimstoffe bis zur gänzlichen oder fast gänzlichen Zertrümmerung der Fasern gemahlen, nach entsprechender Verdünnung zu Schaum geschlagen u. dieser Schaum eingedickt wird, während das nicht zu Schaum geschlagene wieder in den Fabrikationsgang zurückgeführt wird. (D. R. P. 392 814 Kl. 22g vom 6/3. 1923, ausg. 23/12. 1924.) KAUFH

Max Weinberg und **Karl Kroell**, Frankfurt a. M., *Schutzanstrich für Wände u. Böden*, bestehend aus einer Anmischung von Hg_2O . (D. R. P. 401009 Kl. 22g vom 26/8. 1923, ausg. 25/8. 1924.) KAUFH

Heinrich Koenig, Crefeld, *Herstellung von Lösungen zur Signierung von Materialien auf chemischem Wege*, 1. dad. gek., daß Metallsalze oder organ. Verbb., die mit Metallen chem. Färbungen eingehen, einzeln oder Mischungen dieser Stoffe mit einander in Glycerin, A., W. oder Mischungen dieser Lösungsm. gel. u. diese auf eine dem jeweiligen Verwendungszwecke angepaßte Konz. gebracht werden. 2. dad. gek., daß bei Auflösung der Stoffe ein Zusatz von Gummi oder Extrakt gemacht wird. — Den Lösungen können noch organ. oder anorgan. Farbstoffe zwecks vorübergehender Sichtbarmachung der Signierung zugesetzt werden. (D. R. P. 401059 Kl. 22g vom 2/9. 1922, ausg. 25/8. 1924.) KAUFH

Adolf Knapp, Basel, *Herstellung einer haltbaren und waschechten Mineralienfarbe zum Anstreichen, Aufdrucken usw.* (D. R. P. 401061 Kl. 22g vom 7/1. 1922, ausg. 25/8. 1924. Schwz. Prior. 16/9. 1922. — C. 1923. IV. 666.) KAUFH

Chemisches Laboratorium für Anstrichstoffe G. m. b. H. (Erfinder: **Rudolf Weithöner**), Wandsbeck, *Herstellung von auf Teergrund aufstreichbaren, widerstandsfähigen Farben*, dad. gek., daß einer Ölfarbe größere Mengen harz- oder fettlöslicher Al-Verbb. beigemischt werden. (D. R. P. 404250 Kl. 22g vom 27/3. 1923, ausg. 14/10. 1924.) KAUFH

Ernst Stern, Charlottenburg, *Herstellung wetterfester, farbiger Anstriche*, dad. gek., daß anorgan. oder organ. Pigmente mit verhältnismäßig geringen Zusätzen von Bitumenemulsionen zu streichfertigen, als Adsorptionsfarben zu bezeichnenden farbigen Anstrichen verarbeitet werden. — 2. dad. gek., daß die Oberflächennetze dieser Farben durch geringe Zusätze von Leinöl oder anderen öligen Bindemitteln gehoben wird. (D. R. P. 404356 Kl. 22g vom 27/8. 1922, ausg. 18/10. 1924.) KAUFH

Ernst Stern, Charlottenburg, *Herstellung heller oder farbiger Anstrichmittel*, D. R. P. 404356, dad. gek., daß Bitumenemulsionen unter Zusatz verhältnismäßig geringer Mengen von Kolloiden, vorzugsweise organ. Kolloiden, wie Leim, (seiner) Stärke oder deren Abbauprodukten, Salzen der Fett-, Harz- u. Wachssäuren usw. verwendet werden. (D. R. P. 405930 Kl. 22g vom 22/11. 1922, ausg. 11/11. 1923.) KAUFH

Zus. zu D. R. P. 404356; vorst. Ref.)

Jacob William Spensley, Manchester, Engl., *Bereitung von Druck-, Anstrich-, Firnissen u. dgl.*, dad. gek., daß man die Bestandteile, darunter Öl, W. oder andere Fl. einmal oder mehrmal durch eine schnellaufende Stiftscheibenschleuder mit einem Entleerungsauslaß schickt, der im wesentlichen um den ganzen Umfang der Mühle herum offen ist. (D. R. P. 405 834 Kl. 22g vom 8/2. 1923, ausg. 12/11. 1924. E. Prior. 23/2. 1922.) KAUSCH.

Paul Lechler, Stuttgart, *Herstellung von bituminösen Anstrichmitteln*, die Metallpulver in stabiler Suspension enthalten, dad. gek., daß man beliebige Mengen Alkaliseifen in wss. Lsg. durch starkes Rühren in das bituminöse Anstrichmittel hineinrührt u. dann in wss. Lsg. unter ständigem Weiterführen in berechneter Menge mit mehreren Metallsalzen des oder der Metalle hineingibt, deren Seife oder Pulver man im Anstrichmittel suspendieren will unter Trennung der nach dem Absetzen geschiedenen bituminösen, die Metallseifen enthaltenden Lsg. von der durch den Wechselwrg. von Alkaliseife u. Metallsalz entstandenen wss. Alkaliseife. (D. R. P. 407 199 Kl. 22g vom 26/4. 1924, ausg. 8/12. 1924.) KAUSCH.

Carl Fischer, Berlin, *Herstellung eines mit trockenem Zement und feinem Holzmehl präparierten Rostschutzanstriches*, dad. gek., daß 1 kg gedörrtes Holzmehl mit 300 g trockenem Zement, 500 g reinem Bleiweiß u. 3 kg reinem Zement miteinander vermahlen sind. (D. R. P. 407 849 Kl. 22g vom 27/9. 1923, ausg. 24/12. 1924.) KAUSCH.

XI. Harze; Lacke; Firnis.

Tschirch, *Die Schellackfabrikation in Britisch-Indien*. (Chem. Umschau a. d. Fette. Öle, Wachse, Harze 32. 1—3. — C. 1925. I. 578.) HELLER.

Martell, *Der Schellack, seine Gewinnung und Verwendung*. Gewinnung, Verarbeitung, Bleichung, sowie die wichtigeren Handelsmarken werden beschrieben. (Dtsch. Öl- u. Fettind. 45. 23—25.) HELLER.

Scheiber, *Zur Kenntnis der Vorgänge bei der Öllackbereitung*. Aus Bestst. der Öle bei verschiedenen langem Erhitzen von Kolophoniumharzen, Kopal-schmelzen, fetten Ölen u. Harz-Ölgemischen sowie aus der Kontrolle der mittleren Öle. Es wird geschlossen, daß die Harzsäure irgendwelche der im Glycerid-Öl befindlichen Fettsäuren in Freiheit setzt u. an deren Stelle tritt, was zur Bildung eines Harzsäure-Fettsäureglycerids führt. Die abgespaltene Fettsäure bleibt aber in Kontakt, sondern bildet entweder für sich oder mit noch vorhandener Fettsäure ein Gemisch. Zwischen einem Kolophoniumharz u. einem Kopalrückstand wie Kopal, gegenüber Öl besteht ein grundsätzlicher Unterschied. Die Umsetzung von Kopal u. Öl folgt dem Massenwirkungsgesetz. (Farbe u. Lack 1925. 1. Leipzig.) SÜVERN.

Fredrick D. Crane, Montclair, New Jersey, V. St. A., *Herstellung von Harz-Produkten*. Natürliche Harze, wie Kolophonium, Amine- oder Elemiharz, werden mit Alkoholen, wie Benzylalkohol oder Tolyicarbinolen, verestert. — Man verestert z. B. Kolophonium mit wss. KOH, gibt Benzylchlorid hinzu u. erhitzt 24 Stdn. unter Rückflußkühlung. Man erhält eine bräunliche harzige, bis-Weichere als Kolophonium M., den Abietinsäurebenzylester, der sich hydrieren läßt. Durch Behandeln mit O₃ bzw. durch gelindes Erwärmen mit S härten läßt. Die Harzsäureester finden zur Herst. von Kaugummi, Lacken, plast. MM., Klebstoffen u. wasserdichten Überzügen für Papier Verwendung. (A. P. 1513 802 vom 9. 1920, ausg. 4/11. 1924.) SCHOTTLÄNDER.

Barrett Company, New Jersey, übert. von: **Alfred E. Roberts**, Corn-Elkhights, Pennsylvania, V. St. A., *Gewinnung von Cumaron-, Inden- usw. -harzen*. Man läßt die polymerisierbaren Stoffe enthaltende Naphtha durch das fl. Polymerisat. I. 1.

sationsmittel laufen. Man leitet z. B. durch zwei Rohre auf 1 Teil N 100 Teile H₂SO₄ in den Boden eines mit Rührwerk versehenen Gefäßes, durch Kühlen eine Steigerung der Temp. vermieden wird, das Gemisch läuft oben Teil des Gefäßes in ein Absetzgefäß, die Naphtha wird dann neutral gewaschen u. zur Gewinnung des Harzes destilliert. (A. P. 1515315 vom 2. 1921, ausg. 11/11. 1924.)

Carleton Ellis, Montclair, New Jersey, V. St. A., *Herstellung von plattenförmigen Massen aus aliphatischen Ketonen und Formaldehyd*. Man kondensiert zu Aceton mit wss. CH₂O in Ggw. von Na₂CO₃ unter mäßigem Erwärmen bis zu einer weichen, schmelzbaren rötlichen, in A. u. einem Gemisch aus A.-Bzl. Diese wird in CH₃OH gel. u. unter Kühlung mit alkoh. KOH vorsichtig versetzt, hierauf im Vakuum zur Trockne gedampft u. möglichst schnell in geeigneten Formen unter Druck bei ca. 166° gehärtet. Der alkoh. Lsg. des Anhydrids als Kondensationsprod. lassen sich auch die üblichen Füllmittel zusetzen. Man erhält unl. u. nicht schm. hornartige, schildpattähnliche oder knochenartige MM. — *Herst. hellfarbiger, elfenbeinartiger Prodd.* erwärmt man ein Gemisch aus Paraformaldehyd u. wss. Na₃PO₄-Lsg. gelinde, gießt die wss. Schicht ab, trocknet im Vakuum bei 70 oder 80°. Der wasserhelle dicke Sirup wird vorsichtig unter Kühlung mit konz. wss. KOH versetzt, in Formen gegossen, nach Zeit in diesen stehen gelassen u. ca. 1 Stde. auf 120° erhitzt. Dem l. Zweifelsfall prod. kann man weiße Pigmente, BaSO₄, MgO, Asbest usw. als Füllmittel zusetzen. Beeinflussung der Färbung zusetzen. (A. PP. 1514508 vom 9/5. 1922, ausg. 4/11. 1924 u. 1514509 vom 17/5. 1922, ausg. 4/11. 1924.)

Carl Ebel, Mailand, *Lederlack*, bestehend aus einer Schellackboraxlösung, gek., daß diese einen Zusatz von Saponin enthält. (D. R. P. 407691 Kl. 22 vom 21/3. 1924, ausg. 20/12. 1924.)

Frank J. Baumgardner und **Frank L. Phipps**, Cleveland, Ohio, *Überzugsmasse* bestehend aus pulverisierten Austernschalen, einem Farbstofflösung, Zinkoxyd u. gegebenenfalls einem Sikkatif. (A. P. 1513794 vom 5/8. 1918 a. 4/11. 1924.)

British Thomson-Houston Co. Ltd., London, und **General Electric Co.**, Schenectady, N. Y., *Überzugsmasse*. (E. P. 221334 vom 16/8. 1923, ausg. 4/11. 1924. — C. 1924. II. 1982 [General Electric Co. u. W. P. DAVEY].) F. N.

XIV. Zucker; Kohlenhydrate; Stärke.

H. Zscheye, *Warum lassen sich gewisse Rohzucker nicht weiß decken?* (S. 10) Krystalle ein Körper eingeschlossen, der die totale Reflexion des Lichtes nicht so läßt sich der Zucker nie weiß decken. Dieser Körper ist in fast allen Rohzuckern in irgend einer Form. Fe gelangt in den Krystall, wenn 1. im Vakuum alkal. Dicksaft neutral oder sauer gegen Phenolphthalein wird, wodurch er eingeht — 2. gelangt aus der Schlammpresse etwas trüber, gefälltes Fe enthaltender Dicksaft in die zweite Saturation, so wird das Fe als dunkel gefärbtes glucinsäures Salz gel. — 3. Wird der Saft in der ersten Saturation unter 0,05 Alkalität saturiert, geht auch glucinsäures Fe in Lsg. — 4. Sind Abläufe, die zur ersten Prozedur gehören, in das Vakuum eingezogen werden, nicht alkal. gegen Phenolphthalein wird der Weißzucker mißfarben. Rohzucker, die mit Ferrocyanalkalium Rk. eingehen, lassen sich nie weiß decken. (Zentralblatt f. Zuckerind. 32. 1931 1. Biendorf.)

Maschinen- und Werkzeugfabrik Akt.-Ges. vorm. Aug. Paschen, 36. Anh., *Auslaugapparat*. Dieser aus mehreren Kammern bestehende, zum Auslaugen von Waschen etc. von festem oder halbfestem Arbeitsgut, besonders zum Extrahieren

haltiger Pflanzenschnitte im Gegenstrom dienende App., bei dem zwischen Auslauekammern Trennwände angeordnet sind, über welche das Auslauegut mit von der Fl. durch Huborgane befördert wird, ist dad. gek., daß das Gut oberhalb der Fl. u. der Trennwände angeordnete durchlässige Flächen, dgl. hinweggeführt wird. Es wird dadurch eine gute Trennung der Fl. in festen Stoffen erzielt. Diese Trennung kann noch vollständiger dadurch gemacht werden, daß man das Gut durch die Huborgane mit leichtem Druck gegen durchlässigen Flächen preßt. (D. R. P. 407110 Kl. 89c vom 10/2. 1924, ausg. 12/1924.)

OELKER.

Ans Nitze, Berlin-Dahlem, *Herstellung eines mit kaltem Wasser Kleister bildenden Produktes aus Stärke oder stärkehaltigen Stoffen*, dad. gek., daß man der Stärke vor, während oder nach der Verkleisterung Diastase oder sonst ein stärkeverdaues Ferment zusetzt u. sie dann in üblicher Weise mit Hilfe von h. Wasser, Walzen o. dgl. trocknet, wobei die Menge des Fermentzusatzes bezw. die Trocknungsdauer so zu bemessen ist, daß sie nicht bis zur Dextrinbildung führt. — Dadurch wird der Vorteil erzielt, daß das entstehende Prod. nicht durch Salze, Säuren oder Alkalien verunreinigt ist, daß es neutral reagiert u. kaum eine Spur von Fermentkörpern enthält. (D. R. P. 407789 Kl. 22i vom 17/8. 1920, ausg. 23/12. 1924.)

OELKER.

Adolf Meiler und Heinrich Scholler, München, *Herstellung von reinem Traubenzucker aus cellulosehaltigem Material*. Eine hochprozent. Lsg. von Cellulose in HCl wird von den säureunlöslichen Rückständen (Lignin) durch Abfiltrieren oder Abpressen getrennt, worauf man in an sich bekannter Weise aus dem Filtrat die entstandenen Cellulosedextrine durch Verdünnen mit W. fällt, die unlöslichen Nichtcellulosestoffe von den Cellulosedextrinen abfiltriert u. diese in Glycerin überführt. (D. R. P. 407412 Kl. 89i vom 27/3. 1921, ausg. 12/12. 1924.)

OELKER.

Adolf Meiler und Heinrich Scholler, München, *Herstellung von reinem Traubenzucker aus cellulosehaltigem Material*. Bei dem Verf. des Hauptpat. wird zur Erleichterung der Filtration die in Lsg. gegangene Cellulose des Ausgangsmaterials mit Säure mittlerer Konz. (25%ig. HCl) aufgenommen. (D. R. P. 407412 Kl. 89i vom 1/9. 1923, ausg. 30/12. 1924. **Zus. zu D. R. P. 407412; vorst.**)

OELKER.

Grande Cidrerie de Lorient, Frankreich (Morbihan), *Zur Herstellung von Cidre u. dgl. geeignetes Präparat*, welches durch Vermischen von fein gepulvertem Pektin mit Zuckermehl (50—95%) erhalten wird. — Das Prod. ist sehr leicht l. in Wasser u. zeichnet sich durch ein hohes Gelatinierungsvermögen aus. — Das Pektin wird erhalten, indem man zu einer konz. wss. Pektinlsg. A. hinzufügt u. mit Wasser verdünnt. (F. P. 576401 vom 28/1. 1924, ausg. 20/8. 1924. A. Prior. 23/4. 1923.)

OELKER.

XV. Gärungsgewerbe.

g. Reichspfarfarr, *Vom Abläutern*. Techn. Erörterungen über das Arbeiten am Läuterbottich u. Angabe einer einfachen Vorr. nach EMSLANDER, die eine rasche u. ersparnissagende Schnellabläuterung beim Läuterbottich bei höchst erreichbarer Ausbeute gestattet. (Allg. Brauer- u. Hopfenztg. 64. 1197. 1924. Heilbronn a. N.) Rf.

Lüers und S. Nishimura, *Die chemischen Vorgänge beim Darren des Malzes*. Zusammenfassende Erörterung der Ergebnisse der Unterss. der Vff. an hellen u. dunklen Malzen bei Gelegenheit eines Vortrages. Danach besteht zwischen dem hellen u. dunklen Malze ein deutlicher Unterschied. Bei den hellen Malzen haben sich während des Darrens der l., der koagulierbare u. der Formol-N nur unbedeutend vermindert; der Wassergehalt des Korns wird hier so rasch erniedrigt, daß weder

das Wachstum des Korns, noch die Tätigkeit der Enzyme die N-Verh. nennenswert beeinflussen können. Auch die niedrige Abdarrtemp. wirkt in mit dem niedrigen Wassergehalt in dem Endzustande des Darrvorganges ka. Demgegenüber erfolgt bei den dunkeln Malzen noch ein bemerkenswertes Wa. n. bei dem länger anhaltenden höheren Wassergehalte des Korns eine erh. enzymat. Tätigkeit, die sich in einer Zunahme des l. u. koagulierbaren N im A. des Darrens äußert; während des Abdarrens erfolgt dann infolge der hohen temp. ein sehr erheblicher Abfall beider Werte (fast 10%). Auch der formo- bare N nimmt deutlich ab, infolge der Rk. von Aminosäuren mit Zucker. Säure erfährt bei allen Malzen eine Zunahme, bei den hellen Malzen wenig, den dunklen Malzen bedeutend mehr. Der direkt reduzierende Zucker erfährt bei allen Malzen eine Abnahme, der Rohrzuckergehalt nimmt durchg. der Stärkegehalt vermindert sich bei den hellen Malzen u. bleibt bei den prakt. unverändert. Die enzymat. Tätigkeit wird beim hellen Malze nur unbed. geschwächt, beim dunkeln aber ganz außerordentlich; Katalase z. B. fällt auf den zehnten Teil der vor dem Darren vorhandenen Menge hinab. Beim dunklen Malze sind die Bedingungen zur Farb- u. Geruchbildung gegeben, da die Amino- bei den geringen Wassergehalten u. hohen Temp. rasch mit reduzierenden hydraten reagieren unter B. von Melanoidinen; es entstehen Körper von u. saurer Art, u. es entweicht CO₂, wie Vf. nachgewiesen haben. Damit ist e. LINDNER 1913 aufgestellte Melanoidinbildung als in Wirklichkeit bestehend wiesen. (Ztschr. f. ges. Brauwesen 47. 61—66. 1924. München, Wissensch. Brauerei.)

E. Lühder, *Der Gebrauch des Celsiusthermometers für Wärmemessungen in Brennereien*. Es wird dringend empfohlen, die Verwendung von Thermometern nach Réaumur in der Spiritusindustrie aufzugeben u. dafür solche nach Celsius zu verwenden. (Brennereiztg. 41. 193—94. 1924.)

L. Moreau und E. Vinet, *Über den antiseptischen Wert und die praktische Brauchbarkeit des Allylsenföls bei der Weinbereitung*. I. Vf. erörtern eingehend hierzu angestellten Verss. Danach vernichten 50 mg Allylsenföl in 1 l i. Füllen sofort jede Gärung, eine solche Menge ist aber prakt. nicht brauchbar, den Geschmack beeinflusst. Mit Mengen von 5 mg u. mehr auf 1 l ist dies unsicher, sie hängt von den Verhältnissen des einzelnen Falles ab. Mengen von 1—3 mg wirken nur in Verb. mit andern Erhaltungsmitteln, die zuweilen allein genügen. Überlegenheit über die SO₂ zeigt das Allylsenföl bei den untersuchten Weinen von Anjou nicht. (Ann. des Falsifications 17. 477—80. 1924. Angers.)

G. F., *Ein hundertjähriger Wein*. Er stammte aus Argeliers, Dep. Aude, von der Ernte 1805. Seine ursprünglich rote Farbe war gelblich geworden, das Aussehen trübe (Klärung nach längerer Ruhe); das Bukett war fast vollständig verloren gegangen, der Geschmack war madeirartig, mäuseind. Der Nd. bestand hauptsächlich aus dem abgeschiedenen Weinfarbstoffe. Die Zus. des Weins: A. 12,8 Raum-%, Extrakt bei 100° 18,80, gesamte Weinsäure 2,41, Asche 0,15, Gesamtsäure als H₂SO₄ 4,75, flüchtige Säure 1,76. (Ann. des Falsifications 17. 490—91. 1924.)

W. Kluger, *Rückblicke und Ausblicke. Ein Beitrag zur Frage der Malzuntersuchung*. Vf. erörtert die Bedeutung der Malzunters. für die Wahl der Maßzahl, die bei der weiteren Verarbeitung des Malzes in der Bierbrauerei je nach Zweck und Beschaffenheit des jeweils vorhandenen Malzes zu ergreifen sind. Es genügt aber nicht lediglich eine Handelsmalzanalyse, sondern man muß sich nicht unbedingt vor der Verarbeitung ein klares Bild über die innere Zus., den Zustand der aus dem Malze erzielbaren Würze verschaffen. Das Ergebnis

im Laboratorium, zu der man am besten gleich das betreffende Betriebs-
nimmt, bestimmt dann erst das einzuschlagende Maisch- u. Arbeitsverf.
Feststellung des Abbauzustandes eines Malzes dient die Stufen- u. Formol-
ti, deren Ergebnissen in der Malzanalyse ausschlaggebender Wert beizu-
ist. Als weitere wertvolle Hilfsmittel zur Best. der Würzezus. treten hinzu
Nessung der Konz. der H-Ionen u. die Best. des Endvergärungsgrades in der
ez (Allg. Ztschr. f. Bierbrauerei u. Malzfabr. 52. 193—96. 1924.) RÜHLE.
Tizo Takahashi, Masaji Gunke und Takeji Yamazaki, *Über den Nachweis*
Äthylalkohol in alkoholischen Getränken. II. (Journ. Coll. Agric. Tokyo 7.
1922. — C. 1918. II. 225.) SPIEGEL.

Departementale analysekomité, *Alkoholtafel für Äthylalkohol*. Er ist aus
L₄ zu entnehmen. Als Grundlage der Berechnung der Tafel diente die D.²⁰₄
64 (nach RIIBER), sowie die Tabellen des „Bureau of Standards“. Die Inter-
ti ist nach einer Parabel durchgeführt. Die Berechnung geschieht nach der
$$n_s = \frac{c - a}{b - a} \cdot 0,99823$$
 (a Gewicht des leeren, b des mit W., c des mit dem
renden A. beschickten Pyknometers). Die D.D. der Tafel beziehen sich auf
t-leeren Raum. Der Alkoholgehalt ist in Gramm absol. A. in 1 l Fl. an-
b.. Der Alkoholgehalt in Voll. A. in 1 l wird durch Division mit 0,789334
lt. (Den departementale analysekomité. Forslag Nr. 7. 33 Seiten. 1924.)

RÜHLE.

T Karantassis, *Bestimmung des Arsens im Weine*. 100 ccm Wein werden mit
er HNO₃ zum dicken Syrup eingeeengt, wobei man die Schale mit einem
elarten Trichter mit kurzem Stiel bedeckt. Nach dem Abkühlen gibt man
er HNO₃ u. 5 ccm H₂SO₄ zu u. erhitzt mäßig, bis keine nitrosen Dämpfe mehr
ehen. Dann läßt man langsam (8—10 Tropfen in der Minute) im ganzen
n NO₃ zulaufen, wobei man die Fl. nahe am Sieden hält. Wenn sich die
t mehr schwärzt oder bräunt, ist die organ. Substanz zerstört, andernfalls
ch mehr HNO₃ zugesetzt werden. Man erhitzt dann noch bis zum Auf-
weißer Dämpfe. Man läßt dann erkalten, gibt 15 ccm W. zu u. wenig
O₂ u. erhitzt nochmals vorsichtig bis zum Entweichen weißer Dämpfe u.
eriert bis auf 2—3 ccm. Nach dem Abkühlen bringt man einschließlich der
waiser für Trichter u. Schale auf etwa 30 ccm u. löst die ausgeschiedenen
t mit Ausnahme des PbSO₄. Die gesamte Lsg. gibt man in den Marshschen
. bestimmt die Menge des erhaltenen As durch Wägung oder durch Ver-
hles Spiegels mit As-Spiegeln bekannter Menge. Die Ergebnisse des Verf.
sür genau. (Ann. des Falsifications 17. 461—64. 1924.) RÜHLE.

A. R. Ling und D. R. Nanji, Birmingham, *Herstellung einer Mischung von*
o. und Amylopektinderivaten für Brauzwecke, Zuckerwaren o. dgl. Vermittelt
srot verflüssigte Stärke wird mit einem Extrakt aus ungekeimtem Getreide,
Orste, u. danach oder gleichzeitig mit einem Extrakt aus gekeimtem Getreide
zu Verschwinden der Jodreaktion behandelt. Der Extrakt aus gekeimtem
ei: kann evtl. durch einen Pankreasextrakt oder andere, ähnliche Enzyme
alude animal. oder vegetabil. Extrakte, welche fähig sind, die Amylopektin-
vin Isomaltose zu verwandeln, ersetzt werden. (E. P. 224269 vom 11/7.
1924. 4/12. 1924.) OELKER.

Deutsch Koloniale Gerb- & Farbstoff-Gesellschaft m. b. H., Karlsruhe,
on: Adolf Römer, Stuttgart, *Gärverfahren*. (A. P. 1510195 vom 27/8.
1924. 30/9. 1924. — C. 1921. IV. 139 [D. R. P. 336557].) OELKER.

Robert Pollak-Rudin und Orville Adalbert Dafert-Sensel-Timmer, Oester-
er, Verbesserung und Sterilisation von Weinen, Likören, Parfüm u. dgl. — Die

Fl. werden unter beständigem Rühren der Einw. eines mit Hilfe von W. strömen erzeugten elektr. Feldes ausgesetzt, gegebenenfalls unter Mitverw. von Katalysatoren, die aus Edelmetallen oder ihren Legierungen oder Mg u. c. Legierungen bestehen können. Auch können die Behandlungsgefäße selbst Teile derselben die Katalysatoren bilden. (F. P. 576325 vom 25/1. 1924 a. 14/8. 1924. Oe. Prior. 26/1. u. 11/10. 1923.) OEIE

Chemisch-techn. und hygienisches Institut Prof. Dr. Heinrich I. Frankfurt a. M., *Beseitigen übler Geruchs- u. Geschmacksstoffe* aus rohen Säften, Bodenfrüchten (Topinambur, Kartoffeln, Hülsenfrüchte, Sojabohnen), unverg. Obst- u. Beerensäften oder -weinen, Rübenweinen sowie deren Destillaten, Destillationsrückständen, insbesondere auch Weindestillaten (Brennweinen), Ölen, Essenzen, Bukettstoffen, Parfüms u. dgl., darin bestehend, daß man Prodd. mit Mineralien der Zeolith- u. Natrolithgruppe (Analcim, Apophyllit, Clinoptilomit, Desmin, Fanjasit, Harmotom, Heulandit, Inesit, Laumontit, Lermosolith, Natrolith, Philippsit, Plombierit, Prehnit, Skolezit, Xenolith) oder diesen gleichwertigen Naturprodd. bzw. ihren Ersatzstoffen (künstlichem) behandelt, u. zwar entweder mit einzelnen dieser oder deren Mischungen allein oder aber in Verb. mit Stoffen bzw. Methoden, welche bisher zu dem gleichen Zweck Verwendung gefunden haben. (D. R. P. 407340 Kl. 6d vom 14/11. 1923. ausg. 12/12. 1924.) OEIE

Fleischmann Company, New York, übert. von: **F. Hayduck**, Berlin *Herstellung*. (Can. PP. 238172, 238173, 238174, 238175, 238176, 238178, 238179, 238180, 238181, 238182 vom 9/5. 1921, ausg. 26/2. 1924. C. 1919. IV. 969. 1920. II. 88—89. 197—198 u. 455 [Verein der Speisefabrikanten in Deutschland].) OEIE

XVI. Nahrungsmittel; Genußmittel; Futtermittel

M. Glaubitz, *Die Biologie der Kartoffeleinsäuerung*. (Vgl. S. 782.) f.örtert zusammenfassend die Arbeiten HENNEBERGS über die für die *Einsäuerung der Kartoffeln* günstigen u. schädlichen Kleinlebewesen. (Ztschr. f. Spiritusindustrie 47. 330—31. 1924.) RUL

E. Parow, *Die Prüfung der Kartoffelflockenanlage in Dahlenburg*. f. schreibt die Einrichtung u. Wirkungsweise der Anlage an Hand einer Abbild. u. zweier Skizzen. Die Anlage ist im Gebäude der Molkerei Dahlenburg (Haloge) untergebracht u. kann gleichzeitig mit der Molkerei betrieben werden, e arbeitet täglich bei 16std. Betriebe etwa 270 Zentner Kartoffeln. (Ztschr. f. Spiritusindustrie 47. 324. 1924.) RUL

F. Reiss, *Zur kombinierten Milchfälschung und deren Errechnung nach F. Noth*. Nochmalige Erwiderung (vgl. Ztschr. f. Unters. Nahrsg.- u. Genußmittel 47. C. 1924. II. 2803). (Ztschr. f. Unters. Nahrsg.- u. Genußmittel 48. 390—91. 1924. Kalkberge-Mark.) GROSZIL

Zygmunt Moczarski, *Beitrag zur Feststellung der Korrelation zwischen Fettgehalt in der Milch und der Milchproduktion beim friesländischen Rind*. Der sprechende Korrelationskoeffizient betrug bei 749 Kühen kaum $-0,118 \pm 0,004$. (Roczniki Nauk Rolniczych 9. 90—94. 1923. Posen, Univ.; Ber. ges. Physiol. 74. 1924. Ref. KOPEĆ.) SPIEL

Józef Dubiski, *Die chemische Zusammensetzung und der Nährwert der mageren Milch*. Nach Verss. an Mäusen kann kondensierte gezuckerte Milch nicht als vollwertige Nahrung für den wachsenden Organismus gelten, was auf Mangel der Vitamine zurückgeführt wird. Die chem. Unters. lieferte keine entscheidenden Ergebnisse bzgl. des Nährwertes der einzelnen Präparate. (Roczniki Nauk Rolniczych 9. 90—94. 1923. Posen, Univ.; Ber. ges. Physiol. 74. 1924. Ref. KOPEĆ.) SPIEL

h 11. 370—403. Warschau, Landwirtschaftl. Hochsch.; Ber. ges. Physiol. 29.
 1924. Ref. KOPEČ.) SPIEGEL.
 Marchadier und Goujon, *Nachweis der Reisspreu in Weizenkleie*. II. (I. vgl.
 des Falsifications 17. 328; C. 1924. II. 1865.) Ein weiteres unterscheidendes
 enal ist neben der SiO₂ (l. c.) die P₂O₅, die in der Asche der Weizenkleie
 gähr 40% beträgt, in der der Reisspreu aber nur in Spuren bis etwa 0,3%
 rimmt. Um die Verwendung von HF bei der Best. der SiO₂ zu umgehen,
 ehlt Vf. die SiO₂ durch wiederholtes Eindampfen der weiß gebrannten Asche
 NO₃ unl. zu machen, davon abzufiltrieren u. im Filtrate P₂O₅ wie üblich zu
 ill. (Ann. des Falsifications 17. 458—61. 1924.) RÜHLE.

Arthur Huch und Hermann Serger, *Konservieren von Nahrungsmitteln*. Man
 lit die mit den Nahrungsmitteln gefüllten, hermet. verschlossenen Gefäße
 nst so schnell wie möglich über Bruttemp. u. erhitzt sie dann weiter für eine
 ituer, die mindestens zweimal so groß ist als die bisher zum Pasteurisieren
 rndete, auf eine über 37,5, aber unter 100° liegende Temp. — Beispielsweise
 ern mit Erdbeeren gefüllte Gefäße schnell auf 50° erhitzt u. dann etwa zwei
 d auf dieser Temp. gehalten. — Selbstverständlich ist die Dauer der Erhitzung
 der Natur der Konserven abhängig. Bei diesem Verf. werden die in den
 alungsmitteln enthaltenen Vitamine nicht zerstört. (F. P. 576243 vom 24/1.
 1924. ausg. 13/8. 1924.) OELKER.

Saxonia“ Fabrik für Metallwaren vorm. Insam & Co., Schwarzenberg
 S: *Konservieren von Lebensmitteln*. Aus den Konservengläsern wird die Luft
 itis eines zwischen Deckel u. Glasrand eingeführten Mundstücks, das möglichst
 e ausgebildet ist, durch eine Luftpumpe abgesaugt. Das Verf. kann auch in
 r Weise ausgeführt werden, daß man zum Abdichten statt eines zwei Gummi-
 elzringe verwendet u. dann das Saugmundstück zwischen diese einschiebt.
 elz. P. 106769 vom 21/8. 1923, ausg. 16/9. 1924. D. Prior. 22/8. 1922.) OE.
 rucht- und Gemüse-Edelkonserven-Versuchsgesellschaft m. b. H., Berlin,
 enellung einer unbeschränkt haltbaren, vollständig gelierfähigen pastenförmigen
 ar aus Obst und Gemüse, bei welchem das zerkleinerte oder zerriebene Material
 it. u. versetzt u. die alkoh. Lsg. nach einiger Zeit von den festen Rückständen
 gogen wird, dad. gek., daß die abgezogene Lsg. bis zur syrupartigen Konsistenz
 nglampft u. dann mit den festen Rückständen wieder vereinigt wird. (D. R. P.
 1717 Kl. 53k vom 30/7. 1922, ausg. 29/12. 1924.) OELKER.

A. Stevenson, Alvaston, Derbyshire, Engl., *Sterilisieren von Milch*. Die
 il wird unter Ausschluß von Luft auf 120—130° erhitzt, dann 1½—2 Minuten
 itinem elektr. Wechselstrom behandelt u. schließlich auf 50—55° F. abgekühlt.
 224037 vom 8/9. 1923, ausg. 27/11. 1924.) OELKER.

Charles Edward North, New York, *Gewinnung von MilCHFett*. (Schwz. P.
 0682 vom 17/1. 1923, ausg. 16/10. 1924. A. Prior. 6/7. 1922. — C. 1924. I.
 74 [A. P. 1485698.]) OELKER.

Sheshire Kitchens, Inc., New York, übert. von: Walter S. Morton, New
 on. *Nährmittel*, welches aus 82—84 Tln. geriebenem Vollfettkäse, dessen Feuchtig-
 eichhalt auf 18—22% reduziert ist, u. 18—16 Tln. eines geschmackgebenden
 rüstrats besteht, das aus 9000—12000 Tln. Mehl, 2000—3000 Tln. Salz,
 500 450 Tln. NaHCO₃, 1500—1800 Tln. Senf, 100—200 Tln. Pfeffer u. 2700 bis
 70 Tln. Eieralbumin zusammengesetzt ist. (A. P. 1514780 vom 4/1. 1922, ausg.
 1/1. 1924.) OELKER.

Price Flavoring Extract Co., Illinois, übert. von: August F. Wussow,
 e. *Herstellung von Vanille- und ähnlichen Extrakten*. Vanillebohnen, Tonkabohnen u.
 ure vegetabilische Körper, welche vanilleähnliche Geschmacksstoffe enthalten,

werden mit einer wss. NH_3 -Lsg. ausgelaugt. Der Extrakt wird mit W. ver i
 Vakuum der Dest. unterworfen, wodurch der größte Teil des NH_3 u. das zugez
 W. wieder entfernt werden, u. schließlich mittels einer geeigneten Säure neu
 siert. (A. P. 1515714 vom 22/5. 1922, ausg. 18/11. 1924.) OELK.

Erwin Falkenthal, Berlin-Dahlem, *Fermentation von Tabak*, 1. dad. gek d
 der mit Fermentierbakterien beimpfte u. gegebenenfalls gebeizte Tabak ohne
 herige Trocknung in lockeren Schichten niedrig gestapelt oder lediglich
 gehängt u. die Luft des Fermentierraumes, die somit in das Innere des Ha
 eindringen kann, künstlich erwärmt u. feucht gehalten wird. — 2. dad. gek. d
 eine höhere Schichtung bzw. festere Packung angewendet u. die künstlich erw
 u. feucht gehaltene Luft des Fermentierraumes vermittelt Röhren oder Kanä
 das Innere des Haufens geleitet wird. — Das früher erforderliche Umpacke d
 Stapel erübrigt sich u. die Behandlungszeit wird infolgedessen abgekürzt. (D.
 407065 Kl. 79c vom 29/3. 1922, ausg. 3/1. 1925.) OELK.

J. Sartig, Berlin-Zehlendorf, *Behandlung von Tabak*. Um dem Tabak d
 Nicotin u. andere schädliche Substanzen zu entziehen, setzt man ihn dem 13
 licht u. der freien Luft aus u. zwar unter period. Befeuchtung mit reinem
 solcher Menge, daß eine beständige Verdampfung des W. an der Oberfläche enl
 (E. P. 224439 vom 5/3. 1924, ausg. 4/12. 1924.) OELK.

XVII. Fette; Wachse; Seifen; Waschmittel.

G. Stadnikow, A. Generosow und E. Iwanowsky, *Polymerisation des Sonnenblumenöls*. Nach allgemeinen Ausführungen über Polymerisationserscheinungen wird von eigenen Verss. berichtet. Die bei 270° durchgeführten Polymerisationen, wobei Luft prakt. ausgeschlossen blieb, lieferten mit der Erhitzungsdauer wachsende viskose Öle, die nach zwei Jahren noch fl., also nicht gelatiniert waren. Mit Naphthenate beschleunigen den Prozeß, Luft verlangsamt ihn. Die Veränderungen der Viscosität der polymerisierten Öle mit der Temp. ist noch geringer als bei Ricinusöl. (Ztschr. f. angew. Ch. 38. 71—73. Moskau.) HELLE.

Arthur D. Holmes, *Lebertran und seine Nebenprodukte*. Die verschiedenen Lebertransorten werden nach Art ihrer Gewinnung besprochen. Die Bereitung von „Leberöl“, „Chum“ (Preßkuchen des Leberöls), Leberstearin, sulfoniertes Leberöl oder „raffiniertem Lebertran“ wird geschildert. Während es möglich ist, durch chem. Behandlung ein Leberöl so zu veredeln, daß es hinsichtlich seines Geruch u. Geschmack völlig genügt, kann die chem. Reinigung den ursprünglichen Vitamingehalt des Leberöls nicht erhöhen. Um sicher zu sein, einen Lebertran zu gewinnen, der hohen Gehalt an Vitamin A besitzt, muß man von einem Öl ausgehen, das biol. auf seinen Vitamingehalt geprüft wurde. (Journ. Amer. Pharm. Assoc. 13. 1112—15. 1924. E. L. PATCH Comp., Res.-Labor.) DIETL.

B. Klein, *Einiges über Seifenkühlung*. Die Kühlung ohne Druck hat, auch bei sorgfältiger Betriebsführung, durchaus den Vorzug. Die Kühlung durch Platten ist nicht empfehlenswert, ebenso wenig die fertig geprägten Stücke. (Ztschr. Dtsch. Öl- u. Fettind. 45. 30—31.) HELLE.

M. Ost, *Über Autoklavenspaltung*. Mitteilungen aus der Praxis nebst Anweisungen. Der Vorreinigung ist besondere Aufmerksamkeit zu widmen. Die besten Spaltergebnisse liefern Gemische von ZnO u. Zinkstaub. (Chem. Umschau a. d. Geb. d. Fette, Öle, Wachse, Harze 32. 10—12.) HELLE.

W. Herbig, *Über die Untersuchung neuerer Netz-, Bäuche-, Avivieröle und Waschmittel*. Die neuerdings häufigen Zusätze hydrierter KW-stoffe bzw. Phosphor machen folgende Abweichungen vom bisherigen Analysengang notwendig: a) Best. der H_2SO_4 werden 50—70 g des Öles unter Zusatz von 150 ccm verd. H_2SO_4 der Dest. unterworfen. Ausäthern des Filtrates, Verdampfen des Ä., Trocknen

Wägung der Lösungsmm. Diese werden in neutral-alkoh. Lsg. mit $\frac{1}{10}$ -n. KOH titriert, das Ergebnis auf Ölsäure umgerechnet u. deren Betrag zu dem Kolbenrückstand wie üblich ermittelten Ölsäureanteil addiert. (Ztschr. Öl- u. Fettind. 45. 29—30. Chemnitz.)
HELLER.

Duciaux, Paris, *Reinigen von Ölen, Teeren u. dgl.* Auflösungen von animal., ge. bil. oder mineral. Fetten u. Ölen, Teer, Asphalt, Fettsäuren, Glycerin usw. ftigen Lösungsmm. werden der fraktionierten Dialyse unterworfen u. zwar e: Anwendung von Membranen aus Nitrocellulose oder Celluloseacetat. (E. P. 42 vom 3/11. 1924, Auszug veröff. 31/12. 1924. Prior. 2/11. 1923.) OELKER.
Theodor Legradi Wien, übert. von: **Theodor Wieninger**, München, *Wasser-seifen*. (E. P. 202263 vom 5/12. 1922, ausg. 3/10. 1923. D. Prior. 8/8. 1922. C 1924. I. 714. [F. P. 558188].) OELKER.

Welter, Crefeld-Rheinhafen, *Spalten von Fetten*. Bei der Spaltung von te in zwei Stufen, werden in der zweiten Stufe Alkalihydrat, Alkalicarbonate, ice oder Seife verwendet. Beispielsweise spaltet man 8000 kg Kokosnußöl in er Autoklaven unter einem Druck von 6—7 at mit W. u. 25 kg Zinkstaub. Nach er Spaltungsdauer von 6—7 Stdn. läßt man 2 Stdn. stehen, zieht das Glycerin- es u. die emulsionsartige Mittelschicht ab u. spaltet dann weiter mit einer wss. g. on 40—80 kg NaOH bei 6—7 at. — Nach 4—6 Stdn. beträgt die Spaltung er 90%. (E. P. 223898 vom 10/10. 1924, Auszug veröff. 24/12. 1924. Prior. 10/12. 1923.) OELKER.

William A. Johnson und **Arthur W. Roberts**, Yonkers, New York, V. St. A., *kosmetisches Mittel*, bestehend aus einem Gemisch von Dextrin, Seife, gepulvertem Ionium, etwas Phenol u. W. — Das pasten- oder salbenförmige Prod. wird d: Haut eingerieben u. verhindert so das Eindringen von Schmutz, Fett u. b: in die Hautporen u. läßt sich mit k. W. leicht wieder abwaschen. (A. P. 620 vom 26/3. 1921, ausg. 25/11. 1924.) SCHOTTLÄNDER.

KVIII. Faser- und Spinnstoffe; Papier; Cellulose; Kunststoffe.

Huebner und **E. Wootton**, *Die Einwirkung von Natronlauge auf Baum- le*. Gereinigte Baumwolle (Gewebe oder Garn), die, um ein leichteres Eindringen lge zu ermöglichen, mit W. gekocht u. dann getrocknet worden war, wurde t: bei 15° mit NaOH von 5, 10, 20, 30, 40 u. 50° Tw. behandelt; es ergab e, läß die Schrumpfung des Gewebes bei einer Lauge von 20—30° Tw. am t: war, die Reißfestigkeit war am größten bei Behandlung mit einer Lauge Tw., sie fiel stark bei 10° Lauge u. stieg danach wieder allmählich an. Die t: gkeit eines durch Kochen mit 2%ig. NaOH gereinigten Baumwollgewebes, m ein Teil gebleicht wurde, nahm bei Prüfung des ungebleichten mit NaOH sen 5 u. 10° Tw. behandelten Prod. nicht so stark ab, wie das gebleichte d dieses gleicht bzgl. der Abnahme der Reißfestigkeit dem nur leicht ge- igen vorher genannten Gewebe; bei einer NaOH-Konz. von 50° Tw. sinkt die t: gkeit, während sie bei genannter Konz. bei dem gut gereinigten Prod. noch t: in allen Fällen ist die Reißfestigkeit der Kette größer als die des Ein- la. — Es wurde dann a) graues, b) gereinigtes u. c) gebleichtes Garn, das rschieden konz. NaOH 24 Stdn. lang behandelt worden war, bzgl. der Jod- orion untersucht, wobei sich ergab, daß die Jodabsorption in allen Fällen > c war. Die Absorption steigt bei Behandlung mit einer Lauge von T an, u. fällt nach Behandlung mit Lauge von 10° Tw.; bei Lauge von T. nimmt die Jodabsorption bei a) weiter ab, bleibt bei b) u. c) fast konstant,

steigt bei Lauge von 30° Tw., fällt stark bei 40°, steigt wieder bei 50°, fällt bei b) u. c) u. steigt allmählich bei a). Tabelle über die Farbänderung d. Jodlsg. behandelten Prodd. a—c nach 15 Min. langem Belassen an Luft Original. — Sowohl Garne als Gewebe, die mit NaOH verschiedener Konz. behandelt worden waren, enthalten mehr Luftfeuchtigkeit absorbiert, als die behandelten Prodd. — Bzgl. der Cu-Zahl der mit NaOH behandelten Garne zeigt sich, daß leichte Reinigung des Garns diesen Wert erniedrigt; durch Bleichen steigt die Cu-Zahl; die durch Bleichen u. Reinigen bedingten Unterschiede Cu-Zahl werden bei steigender Konz. der NaOH wieder ausgeglichen, nach Behandlung mit Lauge von 50° Tw. sind die Cu-Zahlen (auch für graues Garn) nahezu ident. — Bei Behandlung von gebleichtem u. gereinigtem Garn mit Lauge von 70—100° (graues Garn wurde von Laugen dieser Konz. ungleichmäßig gereinigt) wurde die Jodabsorption nicht merklich gegenüber den verd. Laugen verändert; die hygroskop. Feuchtigkeit bleibt hoch, das Maximum (11,1—11,5%) wird nach Behandlung mit Lauge von 80° Tw. erreicht. Mit 70° Tw. zeigen beide eine Abnahme der Cu-Zahl, die nach Behandlung mit Lauge von 80° Tw. Maximum zeigt u. zwischen 80—100° wieder fällt. (Journ. Soc. Dyers Colourists 41. 10—18. Manchester, Univ.) HABERLE

William Smith Denham und **Alan Crummett**, *Übersicht über neuere Fortschritte in den Färbe-, Druck- und verwandten Industriezweigen. I. Textilindustrie. Seide*. Die in den letzten zehn Jahren über Zus., Degummieren, Beschweigen, Färben von Seide erzielten Fortschritte werden besprochen. (Journ. Soc. Dyers Colourists 41. 19—27. Brit. Silk Res. Assoc.) HABERLE

Walter Klug, *Die Papierherstellung der Ureinwohner Mexikos*. Angaben über eine Arbeit von N. LEON, Direktor des mexikan. Nationalmuseums über Papierherstellung während der Kulturperiode der Azteken. (Wehbl. f. Papierfabr. 55. 3307—914. Berlin-Karlshorst.) SÜV

Arthur St. Klein, *Chemie und Wärmebedarf des Sulfitkochens*. (Vgl. 15.) Die wichtigsten Veröffentlichungen über den Kochprozeß werden besprochen, die die Stoffqualität beeinflussenden Faktoren, Holzbeschaffenheit, mechan. Vorbereitung, Tränkung, Art der Kochlauge, Temp., Abkochen u. Aufbereitung des Kochsulfits werden erörtert. (Zellstoff u. Papier 4. 318—22. 1924.) SÜV

Johannes Teicher, *Heißschleifen mit dem hydraulischen Mehrpressen- und stetigem Schleifer*. Mitgeteilte Verss. lassen erkennen, daß Schleifen bei hohem Druck u. hoher Temp. einerseits sehr kraftsparend ist, andererseits aber auch einen züglichen Stoff liefert. Bei dem Stetigschleifer wurden nur 4,8 PS für 0,5 kg lufttrocknen Stoff in 24 Stdn. gebraucht. Die Reißlänge betrug im günstigsten Falle über 3800 m. Vorteilhaft erwies sich beim Stetigschleifer die große Schleifgeschwindigkeit, die dem Stoff eine schmierige, gut gemahlene Beschaffenheit verlieh. Die gezielte Produktion der großen Schleiffläche konnte durch einen etwas größeren Stetigschleifer stärkere Schleifung vorteilhaft verändert werden. (Zellstoff u. Papier 4. 31—32. 1924.) SÜV

Jarl Enckell, *Harzschwierigkeiten bei der Papierfabrikation*. Angaben über die Harz im Holz u. seine teilweise Beseitigung durch verschiedene Art der Kochung, wechselnde Zusammensetzung der Kochsäure u. besondere Art der Aufbereitung. Die Möglichkeiten der Überführung des Harzes in eine für die Fabrikation ungünstige Form durch Kaolin- oder Alkalizusatz an bestimmten Punkten werden erörtert. (Papierfabr. 23. Verein der Zellstoff- u. Papier-Chemiker u. -Ingenieure 13—16. Nach Pappers- och Trävarutidskrift för Finland 1924. Nr. 20.) SIE

E. Belani, *Die Veredelung der Graupappe*. Die Vorschläge zum Härten der Graupappe, zur Erzielung von Farbeffekten, Öl-, Fett- u. Luftdichtmachen, zur Herst. von Isoliermaterial mittels Bakelit, zum Kaschieren, Metallisieren, Emaillieren

er Nachahmung von Holzfournieren nach dem Sapofixverf. werden besprochen.
 erfabr. 22. Verein der Zellstoff- u. Papier-Chemiker u. -Ingenieure 541—44.
 2 Villach.) SÜVERN.

2. **M. Hoffmann Jacobsen**, *Untersuchungen betreffend Falzzahl*. Ergebnisse
 von Interess. mit dem Schopperschen Falzaapparat werden mitgeteilt. (Papierfabr.
 3. Verein der Zellstoff- u. Papier-Chemiker u. -Ingenieure 7—8.) SÜVERN.

Gunnar Pettersson, *Die Mitscherlichprobe bei der Sulfitzellstoffkochung*. SO_2
 ur. Fällen als CaSO_3 u. Abschätzen des Fällungsvolumens zu bestimmen wird
 ascharfe, von den in der Lauge befindlichen Aufschlammungen u. Trübungen
 schlagige Methode bezeichnet. Geeignete Probenahme u. direktes Titrieren der
 mittels J_2 dürfte zuverlässiger sein. (Papierfabr. 22. Verein der Zellstoff- u.
 ar-Chemiker u. -Ingenieure 613—17. 1924. Skoghall, Schweden. Nach Svensk
 erstidning 1924. 384.) SÜVERN.

L. Belani, *Der „Chamäleon“-Indicator in Zellstoff- und Papierfabrik*. Der
 adator läßt bei Überschreiten einer bestimmten Temp. auf rotem Grunde ein
 churzes Zeichen hervortreten, welches beim Abkühlen wieder verschwindet. Der
 adator ist zwischen $+50$ u. 90° anwendbar, Überziehen des aufgebracht
 nrichs mit Schellack wird empfohlen. (Papierfabr. 22. 853—54. 1924.
 illh.) SÜVERN.

Harry H. Beckwith, Brookline, übert. von: **Charles E. Swett**, Boston,
 Massachusetts, *Mittel zum Steifmachen von Geweben*. Man trinkt Gewebe mit einer
 eines mit NH_3 verseiften Harzes u. eines in W. l. Kolloids, Leim; nach dem
 ronen kann das imprägnierte Gewebe durch Erwärmen formbar gemacht werden,
 e Stoffe unempfindlich gegen W. zu machen, kann man sie mit CH_3O , Al- oder
 r-lzen behandeln. (A. P. 1517520 vom 24/8. 1920, ausg. 2/12. 1924.) FRANZ.

Marcel Jeanson & Cie., Frankreich, *Dekoration von Stoffen*. Die Stoffe
 (ur) werden mit Hilfe einer Flamme an bestimmten Stellen bis zu einer ge-
 nigen Tiefe gebrannt. (F. P. 575 688 vom 30/3. 1923, ausg. 4/8. 1924.) KAUSCH.

Sayles Finishing Plants, Inc., Saylesville, Rhode Island, übert. von: **Harold**
liey, Saylesville, *Erzeugung wollähnlicher Effekte auf Baumwollgeweben*. Man
 erndet Gemische von H_2SO_4 mit einer anderen Säure (HCl) von einer Stärke
 n 4— 42° Bé. (A. P. 1518931 vom 31/5. 1922, ausg. 9/12. 1924.) KAUSCH.

Deutsche Asbest-Gesellschaft G. m. b. H., Duisburg, *Herstellung einer Iso-*
erg aus Schlackenwolle, 1. dad. gek., daß aus Draht oder Asbestpappe her-
 eselte Formen mit Schlackenwolle ausgefüllt werden. — 2. dad. gek., daß
 inden dem zu isolierenden Körper u. dem Isolierkörper eine Zwischenschicht
 n Kieselgurasbest aufgebracht u. durch Umwicklung mit Draht o. dgl. auf dem
 olkörper festgehalten wird. — Die sehr gut isolierenden MM. bleiben selbst
 i starken Spannungen unversehrt. (D. R. P. 406242 Kl. 80b vom 27/4. 1924,
 is 20/11. 1924.) KÜHLING.

h. Jonathan Sternkopf, Rittersgrün i. Sa., *Herstellung von Holzschliff für*
papier- u. dgl. Fabrikation, bei dem während des Schleifens h. W. dem Schleifer-
 eizugeführt wird, dad. gek., daß auch das Schleifholz unmittelbar vor dem Schleifen
 ht u. h. auf den Schleiferstein gebracht wird. — 2. dad. gek., daß das Schleif-
 ol unmittelbar vor dem Schleifen durch in Umlauf gehaltenes h. W. (z. B. Kondens-
 e durch Kesselgase erhitztes W.) erhitzt wird. — Es wird an Kraft für die Zer-
 sung des Holzes gespart u. ein feiner zäher Stoff erzielt. (D. R. P. 400049
 l. 5a vom 11/9. 1923, ausg. 29/12. 1924.) OELKER.

Beckwith Manufacturing Company, Boston, Mass., übert. von: **Albert**
app, Danvers, Mass., V. St. A., *Wasserbeständige, hornartige Pappe u. dgl.*,
 ele in der Weise erhalten wird, daß man Cellulose u. einen tier. Stoff, z. B.

Leder, Knochenmehl, Fischabfälle usw., mit kaustischen Alkalien unter 1 kocht u. die M. alsdann mit einem Metallsalz versetzt. — Die M. kann dann in üblichen Papiermaschinen weiter verarbeitet werden. (A. P. 1514655 vom 3 1920, ausg. 11/11. 1924.) OELK.

Erich Laaser, Berlin, *Vorrichtung zur Wiedergewinnung der aus Kochl zur Herstellung von Sulfitzellstoff beim Erwärmen sich abscheidenden Gase*, bei diese Gase vom oberen Teil des Kochers abgesaugt u. in den unteren Te Kochers wieder eingedrückt werden, dad. gek., daß der Umlauf der Gase leichter Verdichtung derselben durch einen Kolben- oder Zentrifugalkomp bewirkt wird. — Es wird ein besserer Umlauf der Kochlauge erzielt. (D. 407962 Kl. 55b vom 2/2. 1921, ausg. 6/1. 1925.) OELK.

Celluloid Company, New Jersey, übert. von: **William G. Lindsay**, New N. J., V. St. A., *Herstellung von Pyroxylin und einer plastischen celluloidähn Masse daraus*. Man nitriert 1 Teil Cellulose in etwa 71 Tln. einer Mischung 61 Tln. H₂SO₄, 22 Tln. W. u. 17 Tln. HNO₃ bei einer Temp. von 100—105° Das so erhaltene, gut ausgewaschene u. getrocknete Pyroxylin wird mit Tric phosphat u. CH₃OH gelatiniert u. in der bei der Celluloidfabrikation übli Weise weiter verarbeitet. (A. P. 1508457 vom 26/8. 1922, ausg. 16/9. 1924.) OELK.

Celluloid Company, New Jersey, übert. von: **John Henry Stevens**, South On *Plastische Masse*, welche aus Schießbaumwolle, Chloral oder Chloralhydrat, kle Mengen Campher, Äthylacetat, A. u. Aceton zusammengesetzt ist. Das Chlor in der M. als Campherersatz dienen. (A. PP. 1508483 vom 1/10. 1921 u. 1504 vom 14/8. 1923, ausg. 16/9. 1924.) OELK.

William Porter Dreaper, London, *Kunstseide u. dgl.* Man unterwir Kunstseide in Strangform in hydratisierter plast. Form einem Vortrocknen Spannen, bringt die Stränge dann über einer Vorr. in Bewegung u. läßt sta h. Luft darauf einwirken unter rascher Bewegung der Fäden. (A. P. 1515 vom 10/1. 1922, ausg. 11/11. 1924.) KAUS.

J. P. Bemberg Akt.-Ges., Rittershausen, Barmen, *Kunstseide*. Die ld werden beim Streckspinnverf. zuerst im Gegenstrom zu einer Fällfl. geführt, a mit einer im Gleichstrom zu den Fäden geführten Fll. behandelt. (E. P. 225 vom 20/8. 1924, Auszug veröff. 7/1. 1924. Prior. 5/11. 1923.) KAUS.

La Soie de Chatillon (Societa Anonima Italiana), *Regenerierung unnn aus verschiedenen chemischen Prozessen stammender Lösungen*. Man unterwir Lsgg. der fl. Kataphorese in Verb. mit einer Elektrolyse (Elektroosmose), u sauren oder alkal. Lsgg. in die anod. oder kathod. Zone zu bringen. (F. P. 576 vom 10/1. 1924, ausg. 2/8. 1924. It. Prior. 13/1. 1923.) KAUS.

Eastman Kodak Company, übert. von: **William R. Webb**, Rocht New York, *Herstellung von Celluloseacetat*. Man leitet durch das Acetylierungsmisch zur Entfernung des Eg. u. Essigsäureanhydrids ein Gas, aus welche Dämpfe abgeschieden werden; die Mineralsäuren werden mit Natriumacetat u. gesetzt. Man leitet z. B. durch das in einer mit Rührern versehenen Misch befindliche Acetylierungsmisch komprimierte, erwärmte Luft, die mit den S dämpfen beladene Luft wird durch eine mit Na-Acetat gefüllte Waschvorr. geit in der die flüchtigen Mineralsäuren, wie HCl, unter Freimachen von Eg. gebu werden, die Luft gelangt dann in einen Kondensator, in dem die Eg. kondens wird. (A. P. 1514274 vom 15/9. 1923, ausg. 4/11. 1924.) FRAZ.

Eastman Kodak Company, übert. von: **John M. Donohue**, Rocht New York, *Filme*. Filme aus Celluloseäthern werden auf beiden Seiten mit in dünnen Schicht eines Celluloseesters, z. B. mit einer Lsg. von Nitrocellulose Aceton überzogen; die Filme bleiben auch bei längerem Erhitzen auf 65° biea (A. P. 1518396 vom 13/10. 1923, ausg. 9/12. 1924.) FRAZ.

Eastman Kodak Company, übert. von: **Ray L. Stineckfield**, Rochester, New York, *Celluloseäthermassen*. Man löst ein in W. unl. Celluloseäthyläther in einem Gemisch von Bzl. u. CH_3OH , z. B. 70 Teile CH_3OH u. 30 Teile Bzl., die Lsg. gie zur Herst. von *Filmen*. (A. P. 1518417 vom 8/6. 1922, ausg. 9/12. 1924.) FRANZ.

Wanner & Co., A.-G., Horgen, Schweiz, *Herstellung von imprägniertem Korkste*. Korkschat wird in einen dreh- u. heizbaren Behälter gebracht, dieser auf ein Temp. erhitzt, bei welcher das in zerkleinertem Zustande zugebrachte Bindemittel, vorzugsweise Pech, schm., der Kork aber nicht verkohlt u. so lange bewegt, bis eine völlig gleichmäßige M. entstanden ist. Diese wird dann in Formen bis hart Festwerden gepreßt. (Schwz. P. 106221 vom 28/7. 1923, ausg. 1/9. 1924.) KÜ.

Duplan Silk Corporation, Hazleton (Pennsylvan.), *Prüfen von Seidenfäden*. Die Seidenfaden wird unter eine vorher bestimmte Spannung gebracht u. mit einem stumpfen, relativ zum Faden sich diesem entlang bewegendem Klinge betrieben. Dadurch werden die Fasern des Fadens voneinander gel. u. von der sie umgebenden Klebmasse wenigstens teilweise befreit. (Schwz. P. 106579 vom 5/5/1923, ausg. 1/9. 1924. A. Prior. 19/1. 1922.) KAUSCH.

K. Brennstoffe; Teerdestillation; Beleuchtung; Heizung.

Milton H. Fies, *Praxis der Kohlenförderung in Alabama*. (Mining and Metall. 5. 87-90. — C. 1924. II. 2378.) BEHRLE.

Rudolph Kudlich, *Magnetische Auslese von Brennstoffen aus dem Rückstand der Kesselfeuerung*. Diese magnet. Ausscheidung ermöglicht eine 87%ig. Ausbeute. Amerikan. Firmen sind bis zu 50% Ausbeute gekommen. (Journ. Franklin Inst. 96 835—36. 1924.) FRANKENBURGER.

J. Mangold, *Die Entwässerung des Rohteeres*. Das auf dem Gaswerk St. Margarethen, Schweiz, erfolgreich angewandte Verf. zur Entwässerung des Rohteers ist beschrieben. Der möglichst lange in der Sammelgrube abgelagerte Teer wird in ca. 25 cbm fassenden, mit einer Heizschlange ausgerüsteten Hochbehälter empfangt u. etwa 48 Stdn. mit überhitztem Dampf aus der Abwärmanlage erwärmt. Die Heizschlange besitzt keinen Ablauf für Kondenswasser, dieses wird daher vom einströmenden Dampf mitgerissen u. verursacht eine fast ständige Vibration der Röhren, die jedenfalls von günstigem Einfluß auf die Abscheidung des Wassers aus dem Teer ist. Es wird ein Höchstwassergehalt von 2% gewährleistet. Bei Abkühlung des Teers in noch w. Zustande kommt die dadurch bedingte Dünnpflüssigkeit zum Vorschein. (Monats-Bulletin Schweiz. Ver. Gas- u. Wasserfachm. 4. 365—66. 1924. St. Margarethen.) WOLFFRAM.

J. Grosjean und M. Dosios, *Über kohlenwasserstoffhaltige Posidonomyschiefer aus dem Toarcien des Jura der Franche-Comté*. Analyse der in ihrer Zus. den Rhenanien-Ölschiefern fast entsprechenden Schiefer u. der aus ihnen zu erzeugenden Öle, die 24—30% Leuchtöle enthalten u. reich an Schmierölen u. Paraffin. Bei der Dest. der Schiefer wird auch NH_3 (7,7—12,9 kg $[\text{NH}_4]_2\text{SO}_4$ pro t) erhalten. (C. r. d. l'Acad. des sciences 180. 79—82.) HABERLAND.

E. R. Watson und H. M. Mulany, *Reibungsversuche mit Ölen für Automotoren*. Ziel der Unters. war, festzustellen, ob die teuren Autoöle des Handels durch billigere ersetzt werden können. Die Best. des Reibungskoeffizienten bei verschiedenen Temp. geschah mittels einer kleinen Thurstonmaschine mit 1700 bis 3000 Umdrehungen pro Minute. Die Reibung erwies sich als von der Geschwindigkeit unabhängig. In 10 Diagrammen ist die Abhängigkeit des Reibungskoeffizienten von Temp. u. Druck bei verschiedenen Ölen dargestellt. Die höchsten Werte, bis zu der harte Reibung nicht stattfindet, weist Ricinusöl auf (90%). Beinahe ausnahmslos vertragen viele Öle das Temperaturmaximum bei mittleren Drucken weit schlechter als bei hohen Drucken. Bei gut wirkendem Schmier-

system, das das Öl dem Lager immer wieder zuführt, ist es möglich, dünner die gebräuchlichen Öle zu verwenden. (Quarterly Journ. Indian Chem. Soc. 1 bis 105. 1924. Cawnpore, Indien.)

-Wi.-, *Die Verwendung, Bewertung und Untersuchung starrer Maschinen* Angaben über die an ein gutes Mineralschmierfett zu stellenden Anforderungen die verschiedenen Untersuchungsverff. (Papierfabr. 22. 854—57. 1924.) SÜVE

D. J. W. Kreulen, *Die Bestimmung der Backfähigkeit von Steinkohle.* bisher bekannten Verff. zur Best. der Backfähigkeit von Kohlen werden ausführlich beschrieben. (Vgl. S. 804.) Alle Methoden ähneln sich darin, daß sie die mehr oder weniger vorgetrocknete u. feingepulverte Kohle mit einem indifferenten Stoff, z. B. Quarzpulver usw. mischen, unter bestimmten Bedingungen im Tiegel verkoken, das Mischungsverhältnis so lange ändern, bis die Backfähigkeit eben aufhört. Nach dem letztgenannten Verf. trennt die Kohle durch Extraktion mit Phenol in einen löslichen u. einen unl. Anteil u. schließt aus der in Lsg. gegangenen Gewichtsmenge die Backfähigkeit der betreffenden Kohle. Der Grad der Backfähigkeit wird durch den erzielten Kokskuchen durch Aufstellen von Gewichten oder durch Fallhöhe bestimmter Höhe auf eine Holz- oder Metallplatte bestimmt, wobei die Anzahl der entstandenen Bruchstücke maßgebend ist. Zum Schluß macht Vf. einige Vorschläge zur Vereinbarung einer allgemein gültigen Standardmethode. (Het Gas 44. 321—324. 1924. Rotterdam.)

R. Kattwinkel, *Beitrag zur Bestimmung von Benzol in Benzin.* Sulfosäurehaltiges Essigsäureanhydrid löst Bzl.-KW-stoffe, dagegen KW-stoffe der Methan- u. Naphtenreihe nicht. Die besten Werte erhält man bei 11 cem Reagens u. 10 cem Bzl.-Bzn.-Mischung; auch ist eine bestimmte Menge H₂SO₄ im Essigsäureanhydrid einzuhalten. Bei 50% Bzl. tritt Lsg.-Gleichgewicht ein. Etwas niedrigere Werte bei einem Motorenbz. führt Vf. auf ungesätt. Verbb. zurück. Bei hydrocar. arom. KW-stoffen wirkt Sulfoessigsäure — Essigsäureanhydrid ebenfalls extrahierend; genaue Werte sind nur bis 10% zu erhalten. Das Reagens kann auch zum Nachweis von Steinkohlenteerderiv. in Mineralöl dienen. (Chem.-Ztg. 49. 1924. Gelsenkirchen.)

William Warwick Stenning, Percy Thomas Williams, Walter H. Beasley und Arthur Beresford Middleton, London, *Behandlung fein verteilter Kohle.* (E. P. 193466 vom 18/11. 1921, ausg. 22/3. 1922. — C. 1924. II. C. 10.) [Minerals Separation North American Corporation.]

Édouard Porcy Cranwill Girouard & Frederick William Salis Jones, England, *Herstellung von Brennstoffen.* Kohle wird bei niedriger Temperatur (von 350—700°) so lange der Dest. unterworfen, bis die Kohle in eine plastische Masse übergeführt u. der von ihr eingeschlossene Teer ganz oder zum größten Teil entfernt ist. Die Dest. wird unterbrochen, wenn der Rückstand noch etwa 6—8% flüchtige KW-stoffe enthält, worauf der Rückstand durch Zuführung von Wasserdampf abgekühlt, aus der Retorte genommen, gegebenenfalls getrocknet u. fein kleinert wird. (Vgl. auch E. P. 202667; C. 1924. I. 374.) (F. P. 559771 vom 1/11. 1922, ausg. 21/9. 1923.)

Robert N. Graham, Long Island City, N. Y., übert. von: Byron E. Elmer, Great Neck, V. St. A., *Trennung von Kohle und Gangart nach dem Schwimmprozess.* Das kohlehaltige Material wird in einem zum Teil mit W. gefüllten schräg stehenden Behälter eingeführt, während über der Oberfläche des W. ein ziemlich hohes Vakuum aufrecht erhalten wird. Hierbei steigen die Kohleteilchen an die Oberfläche des W., die Gangart dagegen sinkt nach unten u. wird von hier abgehoben. Nachdem die an der Oberfläche befindliche Kohle längere Zeit dem Vakuum ausgesetzt gewesen ist, verliert sie ihre Schwimmkraft u. fängt an zu sinken, u. w.

der Schrägstellung des Behälters auf einem Wege, welcher außerhalb des der aufsteigenden Kohle liegt, wodurch ermöglicht wird, die sinkende reine durch eine an einer Seite des Behälters angeordnete Leitung ebenfalls geleitet abzuführen. (A. P. 1515942 vom 23/4. 1920, ausg. 18/11. 1924.) OELKER.

mile Baptiste Gustave Bascou, Neuilly-sur-Seine, Frankr., *Behandlung von einer Öl-Wassermischung nach dem Schwimmprozeß gereinigter Kohle*. Die des Schwimmprozesses nach dem Filtrieren erhaltene ölhaltige viscose M. zwecks Wiedergewinnung des Öles u. Herst. von Kohlenkonglomeraten erzt. dabei einer starken Pressung unterworfen. (A. P. 1516171 vom 26/4. 1923, 18/11. 1924.) OELKER.

arl Jacobs, Hamburg, *Brikettieren von Brennstoffen*. Zwecks Brikettierung oder sonst nicht ohne weiteres brikettierbarer Rohbrennstoffe, werden an s Einbindungsmittel nicht geeignete Brennstoffe (außer plastischem Torf) mit einer Dispersion von schleimiger Beschaffenheit vermahlen, worauf mit se Dispersion das einzubindende Rohgut gemischt u. verpreßt wird. — Das rfnötigt nur geringer Preßdrucke u. ist infolgedessen sehr wirtschaftlich, e mehr, als wesentliche Temperaturerhöhungen nicht erforderlich sind. (D. R. P. 770 Kl. 10b vom 25/5. 1921, ausg. 24/12. 1924.) OELKER.

ugene P. Schoch, Austin, Texas, *Herstellung eines Brennstoffs aus Lignit in en*. Man tränkt die Lignitstücke mit einem KW-stofföl, erhitzt auf eine Temp., le genügt, den größten Teil der Feuchtigkeit aus dem Lignit auszutreiben, eine Änderung der Stückform zu bewirken, u. entfernt dann den Überschuß s es. (A. P. 1508617 vom 17/7. 1922, ausg. 16/9. 1924.) OELKER.

Caspari, *Destruktive Destillation von Kohle, bituminösen Stoffen u. dgl.* Die est. zu unterwerfenden Stoffe werden in Form fein verteilten Staubes in die toe eingeführt, wo sie durch die Einw. eines elektr. Feldes veranlaßt werden, an den erhitzten Wänden der Retorte entlang zu bewegen. (E. P. 223878 vom 9. 1924, Ausz. veröff. 24/12. 1923. Prior. 24/10. 1923.) OELKER.

egin A. G. und Wilhelm Müller, Butzbach, *Verschwelen grubenfeuchter bitunkohle u. dgl. im Drehofen*. Das Verf. des Hauptpat. wird zum Verschwelen a obbraunkohle, Torf u. ähnlichen wasserreichen u. nichtbackenden Brennff angewendet, um eine gleichmäßige Verteilung über den Umfang der Trommel eilen u. eine Staubentw. zu verhindern. — Dem Rohmaterial kann Koks beieht werden, um die künstliche Vertrocknung zu vermeiden. (D. R. P. 407542 vom 4/11. 1923, ausg. 18/12. 1924. Zus. zu D. R. P. 367536; C. 1923. 7.) OELKER.

inerals Separation Ltd., London, *Erhöhung der Backfähigkeit schlecht ch der Kohlen beim Verkoken*. Das Brikettierverf. nach den Patt. 371043 23. IV. 750) u. 390656 (C. 1924. I. 1887) wird auf Kohle von geringer tücher Backfähigkeit angewendet. (D. R. P. 407624 Kl. 10a vom 23/8. 1922, 18/12. 1924. E. Priorr. 24/8. 1921 u. 5/4. 1922. Zus. zu D. R. P. 371043; C. 1923. 0.) OELKER.

skar Baumann, Amberg, Oberpf., *Trocknen und Verkohlen von junger Kohle*, re einen inneren beschränkten Verbrennungsprozeß, der zwischen parallelen un fortschreitet, dad. gek., daß eine beliebig veränderliche Mischung von Luft Asen in die erhitzte Kohle durch einen luftdurchlässigen Boden so gedrückt r daß die Überhitzung vermieden u. der Prozeß beschleunigt wird. — 2. dad. k. daß durch Absaugen der Abgase aus Kanälen, die vor der Erhitzungszone g, die Abgase teilweise in der Längsrichtung des Lagers geleitet werden u. e Fortpflanzung der Erhitzung beschleunigt wird. (D. R. P. 407625 Kl. 10a 26/11. 1922, ausg. 29/12. 1924.) OELKER.

Walter Broadbridge, Edwin Edser, William Warwick Stennin, Minerals Separation Ltd., London, Behandlung fein verteilter, kohlenstoffhaltiger Substanzen. Nach dem Schaumschwimmverf. erhaltene Kohlenkonzentrate oder andere pulverige Kohlen werden mit W. zu einem Brei angerührt, der dann mit Zusatz eines geeigneten Öles, Teeres oder eines anderen KW-stoffs, welche die Eigenschaft hat, die Kohlenteilechen mit einer Schicht zu überziehen u. auszufällen, mit Luft behandelt wird. — Es wird eine M. erhalten, die mit oder ohne Anwendung von Druck leicht u. fast vollständig von W. getrennt werden kann, besonders für die Koksherst. gut geeignet ist. (**E. P. 193947** vom 29/11. 1922, ausg. 29/3. 1923.)

Chemische Werkstätten G. m. b. H., Duisburg a. Rh., Herstellung von kältebeständiger Öle aus Teerölen unter Anwendung von Kälte, dad. gek., das nach der Dest. aus dem Destillat die Verunreinigungen durch schnelle Abkühlung ausfrieren läßt. — Durch Abnahme einzelner Fraktionen mit oder ohne Vakuum bei der erforderlichen Dest. lassen sich Öle verschiedenster Viscosität erhalten. (**D. R. P. 382901** Kl. 12r vom 1/3. 1919, ausg. 8/10. 1923.)

Chemische Werkstätten G. m. b. H., Duisburg, Herstellung klarer, kältebeständiger Öle aus Teerölen. Das Verf. des Hauptpat. wird in der Weise durchgeführt, daß die Dest. im Vakuum vorgenommen u. das Ausfrieren gleich im Vakuum vollzogen wird. — Es wird an Energie für Kälteerzeugung gespart, außerdem eine Veränderung der Substanz vermieden, da diese mit Luft in Berührung kommt. (**D. R. P. 392068** Kl. 12r vom 1/4. 1922, ausg. 15/3. 1923, Zus. zu **D. R. P. 382901**; vgl. R. f.)

Gelsenkirchener Bergwerks-Akt.-Ges., Franz Schütz und Wilhelm Isenmann, Gelsenkirchen, Raffination von Urteerölen, darin bestehend, daß man das Öl unter Ausschluß von W. mit kleinen Mengen von festen Alkalien bei hoher Temp. zweckmäßig unter Rückflußkühlung behandelt. — Es werden im Gegensatz zur Raffination mit konz. H_2SO_4 nur geringe Mengen der Öle zerstört. Außerdem kann das Verf. in jeder beliebigen eisernen Apparatur ausgeführt werden. (**D. R. P. 407876** Kl. 12r vom 16/10. 1923, ausg. 30/12. 1924.)

Rudolf Maag, Dielsdorf (Zürich, Schweiz), Wasserlösliche Teeremulsion, dadurch erhalten wird, daß man die Teeröle mit einer konz. wss. Lsg. eines Salzes einer Sulfosäure eines vegetabil. Öles emulgiert. Beispielsweise 30 Tle. Teeröl mit 1 Tl. NaOH (40° Bé), 6 Tln. Türkischrotöl u. 1 Tl. Schmelz emulgiert. (**Schwz. P. 106549** vom 12/10. 1923, ausg. 1/9. 1924.)

Ralph L. Brown und William W. Odell, Pittsburgh, Pa., V. St. A., Reinigung von Brenngasen. Um aus derartigen Gasen die Bestandteile zu entfernen, bevor es in den Gassammler eintritt, ein sauerstoffhaltiges Gas in solcher Menge (weniger als 5%) ein, daß die B. der harztartigen Körper beschleunigt wird, dann die Gasmischung in den Sammler, wo die Rk. vervollständigt wird, u. das Gas u. wäscht dann das Gas zwecks Entfernung der gebildeten Harzkörper. (**A. P. 1514889** vom 31/3. 1923, ausg. 11/11. 1924.)

F. Wilhelm Brandes, Hannover, Verarbeitung von Torf u. dgl. auf Brennstoffe. Die Brennstoffe, wie Fasertorf, Braunkohle, Pflanzenreste, Schilf, Stroh, Bagasse, werden so hoch erwärmt, daß sie brüchig werden. Hierauf werden sie in der Presse durch Druck zerkleinert u. gleichzeitig zu Preßlingen geformt, die durch Zerschlagen oder anderweitiger Behandlung zu Staub zerfallen. Es wird auf diese Weise ein Brennstaub in transportfähiger Form geschaffen, da die Preßlinge genügenden Zusammenhalt zeigen, um eine Beanspruchung zu ertragen, wie bei kürzeren oder längeren Transporten in Frage kommt. (**D. R. P. 407768** Kl. 12r vom 18/8. 1923, ausg. 23/12. 1924.)

Chemotechnische Gesellschaft m. b. H., Berlin-Halensee, *Verschwelung bituminöser Gesteine*. Bei der Verschwelung derartigen Gesteins, z. B. Ölschiefer, in Gegenwart von Luftzufuhr in Ggw. wärmeaufnehmender Stoffe, werden dem Schwelung solche feste oder fl. Stoffe — mit Ausschluß von Ölen — zugeführt, die durch die Verschmelzung oder wärmebindende Zers. oder Umsetzung die Entstehung überhöhter Tempp. verhindern, wie z. B. bituminöser Kalkstein oder W. — Es werden Verbrennungen vermieden, die zu einer Verschlackung des ausgeschwelten Gesteins führen und mit zu Betriebsstörungen Veranlassung geben. (D. R. P. 407541 Kl. 10a vom 15/12. 1921, ausg. 23/12. 1924.)

OELKER.

Société „Asphalte et Pétrole“, Paris, *Kontinuierliche Destillation von Ölen und anderen bituminösen Stoffen*. Man bringt die in den betreffenden Stoffen enthaltenen festen u. fl. KW-stoffe durch Erhitzen zur Verdampfung unter Anwendung von Tempp., welche eine Zers. der KW-stoffe nicht herbeiführen, wobei die erforderliche Hitze durch Verbrennung eines Teiles dieser KW-stoffe erzeugt wird. Die erzeugten Dämpfe werden dann kondensiert u. die erhaltenen Prodd. zentrifugiert, wodurch eine Fl. gewonnen wird, welche dem natürlichen Petroleum sehr ähnlich ist. (Schwz. P. 106784 vom 26/1. 1923, ausg. 1/10. 1923, F. Prior. 26/1. 1923.)

OELKER.

American Oil Dehydrating Co., Los Angeles, Calif., übert. von: **Virgil C. Wright u. Kenneth A. Wright**, Los Angeles, *Entwässern von Öl*. Man erhitzt das Öl auf eine zwischen 140 u. 200° F. liegende Temp. u. leitet es sodann durch eine mit 180° F. erhitzte CaCl₂-Lsg., deren D. etwa 1,35—1,6° Bé beträgt. (A. P. 151093 vom 4/2. 1924, ausg. 11/11. 1924.)

OELKER.

Henry A. Gardner, übert. von: **Elias Bielouss**, Washington, Columbia, *Herstellung von Nitrochloriderivaten aliphatischer Kohlenwasserstoffe*. Paraffin-KW-stoffe mit mindestens der D. 0,882 werden nacheinander der Chlorierung u. Nitrierung unterworfen. — Die Chlorierung kann nach irgend einer bekannten Methode, mit oder ohne Zusatz eines Katalysators erfolgen. Überraschenderweise geben die Cl-Deriv. mit einem Cl-Gehalt bis zu 20—25% feste harzartige Nitrochlorideriv.; während die höher chlorierten KW-stoffe mit 40—50% Cl bei der Nitrierung in fl. bis 5° schwere viscose Fl. übergehen. Zur Nitrierung werden die Cl-Deriv. entweder in Mischsäure eingetragen, oder erst mit H₂SO₄ gemischt u. dann die H₂N₃ zugegeben, bezw. mit NaNO₃ gemischt u. in H₂SO₄ eingetragen. Beispiele angegeben für die Nitrierung nach diesen Methoden von einem durch Chlorierung eines Paraffinöls D. 0,882 erhältlichen Cl-Derivat mit 17% Cl bei Tempp. bis u. 55°. Nach einigem Stehenlassen werden die Nitrierungsprodd. von der Mutterlauge getrennt u. in der Filterpresse in feste u. fl. Bestandteile zerlegt. Die festen Nitrochlorideriv. sind gelbe bis braune, harzige, von 60—108° schm. MM., l. in Benzol, Bzl. oder Mischungen aus A. u. Bzl. Die fl. u. festen Prodd. sind ferner mit Nitrocelluloselsgg. mischbar u. können zur Herst. von plast. MM. dienen. Beim Einengen des Lösungsm. der gel. Nitrochlorideriv. hinterbleiben zusammenhängende Lackschichten. (A. P. 1519017 vom 30/7. 1921, ausg. 9/12. 1924.)

SCHOTTL.

Charles Walcott Stratford, San Francisco, Calif., *Entfärben von Petroleumprodukten mittels Bleicherden u. dgl.* Man erhitzt sowohl das Bleichmittel als auch das Öl, bringt beide unabhängig voneinander in einen Behälter, in dem sie gut gemischt werden, läßt dann die h. Mischung durch eine Anzahl weiterer Behälter fließen u. trennt schließlich das Bleichmittel vom Öl durch Filtration. — Das Verf. kann in kontinuierlichem Betriebe ausgeführt werden. (A. P. 151625 vom 21/3. 1921, ausg. 16/9. 1924.)

OELKER.

Standard Oil Company, San Francisco, Calif., *Gewinnung eines niedrig siedenden Kohlenwasserstoffs durch Destillation eines höher siedenden Öles*. (Schwz. P. 106783 vom 15/3. 1922, ausg. 16/9. 1924. — C. 1923. IV. 684. [E. P. 199766].)

OELKER.

Gasoline Recovery Corporation, Delaware, übert. von: **Leo Waller**, New York, *Gewinnung von Gasolin aus natürlichem Gas*. Man behandelt das Gas mit einer Kohle von hoher Absorptionsfähigkeit, wodurch dem Gas das Gasol entzogen u. von der Kohle absorbiert wird. Aus letzterer wird dann das Gasol durch Dest. u. Kondensation wiedergewonnen. (A. P. 1516166 vom 30/4. 1924, ausg. 18/11. 1924.) OELK.

Norddeutsche Portland-Cement-Fabrik Misburg und Willy Re, Misburg (Erfinder: **Ludwig Rexhausen**, Hannover-Kirchrode), *Veredlung von natürlichem Asphalt u. dgl. Stoffen*, dad. gek., daß die Stoffe mit NH_3 , zweckmäßig in der Wärme, für sich oder in Ggw. etwaiger Füllstoffe behandelt werden, was das NH_3 u. das W. durch Erwärmen vertrieben werden, um die gebildete Emulsion zu zerstören, u. ein trockenes, wasserunl., hartes u. in der Wärme zähes Produkt zu erhalten. — Von dem Erzeugnis sind verhältnismäßig geringe Mengen zur ausreichenden Durchtränkung einer großen Menge von Füllstoffen ausreichend. (D. R. P. 407106 Kl. 80b vom 15/2. 1924, ausg. 5/12. 1924.) KÜHLI.

Ges. für chemische Produktion, H. Müller-Clemm und I. Schmidt, Valldorf b. Mannheim, *Aktive Holzkohle*. Holz, Kork oder dgl. wird mit Schwefelkohlenstoff oder einer Lsg. von K_2S oder dessen Polysulfiden imprägniert, geglüht u. m. V. ausgekocht u. gegebenenfalls mit HCl behandelt. (E. P. 224521 vom 22/10. 1924, ausg. 7/1. 1925. Prior. 5/11. 1923.) KAUSH.

XXIII. Tinte; Wichse; Bohnermassen usw.

Paul Seidler, Weissand, Anh., *Herstellung von Tinten*, dad. gek., daß als Färbemittel Sulfitablauge verwendet wird. (D. R. P. 400976 Kl. 22g vom 8/6. 1923, ausg. 25/8. 1924.) KAUSH.

Chemische Fabrik Pharma G. m. b. H., Hannover, *Herstellung von Tinten*, die NH_3 abgeben, u. Farbbmm. nach D. R. P. 389833, dad. gek., daß an Stelle von Zn -Halogen- NH_3 -Verbb. andere NH_3 abgebende komplexe Metall- NH_3 -Verbb. verwendet werden. (D. R. P. 404263 Kl. 22g vom 20/11. 1923, ausg. 18/10. 1924.) KAUSH.

Dello Ink Corporation, New York City, N. J., V. St. A., *Tinte*. (D. R. P. 405869 Kl. 22g vom 12/8. 1923, ausg. 10/11. 1924. — C. 1924. II. 414.) KAUSH.

H. Heinrici & Co., Kosmetische und Chemische G. m. b. H., Berlin, *Herstellung von Tintentabletten* aus Milchzucker u. Farbstoff, dad. gek., daß man das Gemisch noch Eiweiß oder Gelatine, Stärke u. Diastase beimengt. (D. R. P. 401111 Kl. 22g vom 1/1. 1924, ausg. 8/12. 1924.) KAUSH.

Robert Ganßen, Berlin-Grünwald, *Herstellung einer Tinte*, dad. gek., daß man Humussäurehaltige oder leicht in solche übergehende Prodd., wie Kohlenhumus, Humuskohle, Steinkohle, Braunkohle, Torf, Faulschlamm, Moorerde, Waldhumus, humose Ackererde, unmittelbar oder nach Behandlung mit Säuren, gegebenenfalls bei erhöhter Temp. u. Druck mittels Alkalien oder alkal. reagierenden Salzen, auf u. diese Auszüge mit den Einwirkungsprodd. von Wasserdampf, alkal. u. sauren Substanzen auf organ. Verbb. oder auch mit Farbstoffen organ. oder anorgan. Natur oder deren Derivv. vermischt. (D. R. P. 407787 Kl. 22g vom 28/12. 1922, ausg. 23/12. 1924.) KAUSH.

Karl Schindler, Berlin-Friedenau, *Herstellung von trockener Eisengallustinte*, dad. gek., daß die zur Herst. von Eisengallustinte erforderlichen Rohmaterialien in wässr. sd. Wasser gel. u. sodann durch Zusatz von Klebstoffen, welche an der Luft schnell trocknen (z. B. Gummi arabicum), zugleich mit diesen zur festen M. erstarrt gelassen werden. (D. R. P. 407945 Kl. 22g vom 28/4. 1923, ausg. 29/12. 1924.) KAUSH.

Peerless Ink Corporation, New Jersey, übert. von: **Herman Kruse**, New Jersey,

7, Tinte, bestehend aus einer Farbbase, Glycerin, verseiftem Harz, Kerosin-
 raffinöl. (A. P. 1515123 vom 16/12. 1921, ausg. 11/11. 1924.) KAUSCH.

ritz Brandt, Zürich, *Herstellung von Schuhcreme, Bohnermassen, Metallputz-
 Holz- und Lederpolituren u. dgl.* unter Verwendung von hydrierten
 naphthalinen als Lösungs- bzw. Emulsionsmittel für die festen Rohstoffe, dad.
 daß man dem Lösungs- oder Emulsionsmittel doppelt ungesätt. Menthanderiv.
 zusetzt. — Ein Gemisch von 70 Teilen Tetrahydronaphthalin mit 30 Teilen Di-
 methylterphenyl bildet z. B. ein angenehm riechendes Lösungs- oder Emulgierungsmittel für
 Ceresin, Paraffin usw. mit günstigen Entflammungs- u. Siedegrenzen.
 (D. R. P. 394601 Kl. 22g vom 2/3. 1923, ausg. 4/7. 1924.) MAL.

ritz Brandt, Zürich, *Herstellung von Schuhcreme, Bohnermassen, Metallputz-
 Holz- und Lederpolituren u. dgl.*, nach D. R. P. 394601, darin bestehend,
 daß man Gemische von hydrierten Naphthalinen mit polycycl. Terpenen in Verb.
 mit doppelt ungesättigten Menthanderiv. oder mit Körpern, welche diese beiden
 Gruppen enthalten, verwendet. — 2. dad. gek., daß Gemische von hydrierten Naph-
 thalinen mit polycycl. Terpenen ohne Zusatz von ungesättigten Menthanderivaten
 benutzt werden. (D. R. P. 404310 Kl. 22g vom 28/3. 1924, ausg. 14/10. 1924.
 s. D. R. P. 394601; s. vorst. Ref.) KAUSCH.

Heinrich Schäfer, Dresden, *Herstellung eines glanzgebenden Lederkonservierungs-
 Mittels*, dad. gek., daß Wachsarten mit Kakaobutter evtl. unter Zusatz von Farb-
 stoffen zusammengeschmolzen werden. (D. R. P. 407496 Kl. 22g vom 21/4. 1923,
 ausg. 16/12. 1924.) KAUSCH.

Heinrich Schäfer, Dresden, *Herstellung eines Lederputzmittels und Bohner-
 massen in fester Form*, dad. gek., daß als Lösungsm. für Wachs, Stearin, Bitumen
 ein leicht flüchtiges Öl verwendet wird. (D. R. P. 405871 Kl. 22g vom 26/4. 1923,
 ausg. 11/11. 1924.) KAUSCH.

T. Brown, Glasgow, *Verhinderung des Beschlagens von Glasflächen mit Feuchtig-
 keit*. Man kocht 10 Pfund Seife in 1½ Gallone W., setzt eine weitere ½ Gallone W.
 hinzu, kocht 20—30 Min. u. fügt 1—1¼ Pfund Wasserglas, 3 Unzen Glycerin u.
 1 Unze Harzöl hinzu. Dieses Gemisch rührt man, bis es die Form einer Paste
 annimmt. Mit letzterer wird die getrocknete Glasfläche mittels eines Tuches ein-
 gerieben u. alsdann mit einem reinen Tuche nachgereinigt. (E. P. 224344 vom
 9/9. 1923, ausg. 4/12. 1924.) KAUSCH.

XXIV. Photographie.

C. Toy und H. A. Edgerton, *Untersuchungen über das latente photo-
 graphische Bild*. Teil I. *Die Beziehung zwischen Wellenlänge des Lichts und Anzahl
 der entwickelbaren Keime*. Vff. stellen theoret. Betrachtungen an über Reflexion
 und Absorption an Gelatine u. am AgBr-Krystall. Für die experimentellen Unterss.
 eine Apparatur ausgearbeitet u. sorgfältig geeicht. Zur Messung der Licht-
 intensitäten dient eine mit der Hefnerkerze geeichte Thermosäule, es werden Ein-
 schmelzplatten verwendet, entwickelt wird mit Amidol, die beanspruchten Teilchen
 werden u. Mk. ausgezählt. Das Verhältnis der absorbierten Quanten bei Bestrahlung
 mit lauem u. violetterem Licht wird festgestellt u. in Übereinstimmung gefunden
 mit dem Verhältnis der bei beiden erzeugten entwickelbaren Keime. Das gleiche
 ist für das Verhältnis Violett zu Ultraviolett. Vff. kommen ähnlich wie EGGERT
 u. DODDACK (Ztschr. f. Physik 20. 299. 1923; C. 1924. I. 855) zu folgenden
 Schlüssen: Der Primäreffekt besteht in der Absorption eines Quants an der Krystall-
 oberfläche; die Anzahl der in Freiheit gesetzten Ag-Teilchen ist der Anzahl der
 Quanta proportional; die Anzahl der entwickelbaren Keime ist der Anzahl der
 Ag-Teilchen proportional. Bei geringen Lichtintensitäten wird das Verhältnis der

Anzahlen der Keime größer; diese Abweichung wird mit der spezif. Eigenschaft des Entwicklers erklärt. (Philos. Magazine [6] **48**, 947—61. 1924.) KELLERMAN

G. Hansen, *Intensitätsmarken auf photographischen Platten*. Vf. beschreibt ein einfaches Verf., um auf einer photograph. Platte neben dem zu untersuchenden Vergleichsmarken anzubringen. Als leuchtende Fläche dient eine Stufenblei zur Abbildung eine Kombination von einer gewöhnlichen u. einer Zylinderlinse. Die Helligkeit der Marken ist den Längen der entsprechenden Blendenstrahl proportional. (Ztschr. f. Physik **29**, 356—59. 1924.) KELLERMAN

Oswald Oglethorpe Hayward, London, *Erzeugung von vom Träger abziehbaren Hautnegativen*, dad. gek., daß zur Herst. der lichtempfindlichen Schicht W. gel. Gelatine mit FeCl_3 , Citronensäure, Fischleim, $(\text{NH}_4)_2\text{Cr}_2\text{O}_7$, u. Formaldehyd versetzt wird. — Die Hautnegative können als Vorlagen für Druckformen für direkten oder indirekten Druck verwendet werden. (D. R. P. **406514** Kl. 57b vom 31/8. 1921, ausg. 21/11. 1924.) KÜHLIN

Aktien-Gesellschaft für Anilin-Fabrikation, Berlin-Treptow, *Photographischer Film* mit einer auf der Rückseite angebrachten Kolloidschicht, welche das Recken des Films u. die B. von Lichthöfen verhindert, dad. gek., daß diese Schicht in eine eingebetteter fein verteilter Stoffe eine zur Anbringung von Retuschen unmittelbar geeignete Oberfläche besitzt. — Geeignete Stoffe sind Carbonate, Sulfate, Phosphate der Erdalkalien, Schwermetallverbind. u. dgl. (D. R. P. **406614** Kl. 57b vom 13/8. 1923, ausg. 21/11. 1924.) KÜHLIN

Erich Lehmann, Charlottenburg, *Ausgleich der verschiedenen Kopierarten kinematographischer Bildbänder*, 1. dad. gek., daß die Gelatineschicht mit der einen die Gelatine nicht anfärbenden u. aus ihr auswaschbaren Farbstoffes getränkt wird, die selbst bei dem Vorgang ihre Konz. nicht ändert. — 2. dad. gek., daß basische Farbstoffe verwendet werden. — Saure Farbstoffe sind nur in seltenen Fällen u. nur unter Zusatz von Alkali verwendbar. (D. R. P. **406846** Kl. 57b vom 17/8. 1923, ausg. 28/11. 1924.) KÜHLIN

Carl Blunk, Altona-Ottensen, *Herstellung von Photohochglanzpapier*, darin bestehend, daß das Rohpapier mit zwei Überzügen versehen wird, von denen der erste im wesentlichen ein Gemisch aus Ruß o. dgl. u. Tafelleim mit einer Seifenemulsion enthält, während der zweite im wesentlichen eine Harzseife oder eine Weichseife enthält. (D. R. P. **407928** Kl. 55f vom 11/9. 1921, ausg. 29/12. 1924.) KÜHLIN

Eugen Seyfferth, Berlin, *Kopierfolie für photomechanische Übertragungen*, dad. behandelt durchscheinende Folien aus Cellon mit einem Gemisch von Eg. u. Acet. u. rauht dann die Oberfläche leicht, z. B. durch Pressen mit rauhen, erwärmten Metallplatten. (A. P. **1514677** vom 30/12. 1921, ausg. 11/11. 1924.) FRANK

Karl Fröhlich, Breslau, *Herstellung von Drei- und Mehrfarbenrastern für die Farbenphotographie*, dad. gek., daß auf eine durchsichtige Unterlage mittels photomechan. Feinverteilers nacheinander Emulsionen aufgebracht werden, die aus chem. sich nicht verbindenden Fll. bestehen, welche in dem kleinsten geschleuderten Tröpfchen nicht voneinander getrennt werden, u. deren eine den Farbstoff enthält, während der anderen geringe Mengen eines Zusatzes (Lack, Harz, Öl o. dgl.) beigefügt sind, der den Farbelementen einen gewissen Schutz gegeneinander verleiht u. durch ein geeignetes Lösungsm. am Schluß der Herst. des Rasters samt den Farbüberdeckungen ohne ungünstige Beeinflussung der Farbelemente wieder von der Unterlage entfernt werden kann. (D. R. P. **406706** Kl. 57b vom 29/5. 1924, ausg. 25/11. 1924.) KÜHLIN

Chemisches Zentralblatt.

25 Band I.

Nr. 9.

4. März.

A. Allgemeine und physikalische Chemie.

Albert T. Morgan, *Eine dynamische Hypothese der chemischen Bindung*. Statt bisher vorherrschenden stat. Auffassung der Elektronen zur Erklärung der Konst. u. Stereochemie tritt Vf. für die dynam. Theorie der chem. Bindung. Die gegebene Erklärung basiert auf der Vorstellung, daß sich die Valenzelektronen in einer planetenbahnähnlichen Kurvenbewegung befinden. Im *H-Mol.*, einfachsten Vertreter der zweikernigen Systeme mit nichtpolarer Bindung, bewegen sich die beiden Elektronen unter der Einw. zweier Kerne, so daß ihre Bahnen mehr kreisförmig sind wie beim Atom, sondern auf den in bezug auf beide Kerne äquipotentiellen Flächen liegen müssen. Das konstante Potential V für diese Kurve ergibt sich aus: $e/r + e/r' = V$, wo e die Ladung jedes Kernes u. r die Abstände an jedem Punkt der Kurve von den Kernen ist. Die so erhaltenen Cassinischen Kurven werden durch die Grenzkurve in innere (annähernd kreisförmige) u. äußere (zunächst Lemniscaten, die sich in größerem Abstände von den Kernen der Ellipsenform u. schließlich der Kreisform nähern) geteilt. — Bei der nichtpolarer Bindung liegt die Bahn des Valenzelektrons auf einer äußeren Cassinischen Kurve; zwei Elektronen werden sich zueinander wie die beiden Valenzelektronen im He-Atom einstellen. Die dynam. Auffassung der einfachen Bindung erklärt die Stabilität der gesätt. Verbb. mit der Ähnlichkeit ihrer mol. Struktur u. der Atomstruktur des inerten He in Beziehung. Im *Methan* revolvieren um jeden Kohlenstoffkern zwei Elektronen in äußeren Cassinischen Kurven, die vier Elektronenpaare repräsentieren, die den zentralen C-Kern, so daß eine tetraed. Anordnung resultiert, obwohl trotz der dynam. Natur der Bindungen beständig ist. — Bei elektrovalenter Bindung bewegen sich die Valenzelektronen auf den inneren Cassinischen Kurven, deren Form sich in diesem Falle etwas mehr oval gestalten wird. Mit dieser Kurvenänderung geht die Änderung der physikal. u. chem. Eigenschaften als Hand in Hand. — Sind die Ladungen der beiden Kerne verschieden, Ne u. $N'e$, dann gilt für die Kurven gleichen Potentials:

$$Ne/r + N'e/r' = V.$$

Die doppelte Bindung in der organ. Chemie würde nach LANGMUIRS Annahme aus zwei Kovalenzen in vier verteilten Elektronen bestehen, die sich um beide Kerne in äußeren Cassinischen Kurven bewegen, deren Ebenen gegeneinander um 45° bilden. Die gegenseitige Abstoßung der Elektronen würde jedoch die Anordnung verhindern, so daß die von LOWRY (vgl. Journ. Chem. Soc. London, 123, 822; C. 1923. III. 274) angenommenen gemischten doppelten Bindungen nicht vereinbar sind. Hiernach würden sich dann zwei von den vier Elektronen um einen Kern in inneren Cassinischen Kurven, die anderen beiden (nicht um einen Kern) um beide Kerne in äußeren Cassinischen Kurven bewegen. — Diese liegen die Verhältnisse bei der dreifachen Bindung. Bei Annahme dreier Kovalenzen würden die Ebenen, in denen sich die Elektronen in äußeren Kurven um die Kerne bewegen, Winkel von ungefähr 30° bilden. Diese wegen der gegenseitigen Abstoßung der Elektronen unwahrscheinliche Anordnung führt zu der Annahme, daß nur ein Elektronenpaar verteilt wäre, während ein Atom zwei Elektronen von dem anderen übernehmen würde. Die verteilten Elektronen be-

wegen sich auf äußeren Bahnen um beide Kerne, die übernommenen Elektronen auf inneren Bahnen um das betreffende Atom. — Beim CrCl_3 (drei nichtpolare Bindungen) bewegen sich die Elektronen auf äußeren Bahnen um alle Kerne. Durch die Addition von 5 Moll. NH_3 zu $[\text{Cr}, 5\text{NH}_3]\text{Cl}_2$ werden zwei von den Cr-Elektronen von zwei Cl-Systemen aufgenommen, zwei kovalente Bindungen werden also elektrovalent. Zwei Cr-Elektronen kreisen dann auf inneren Bahnen um die Kerne von zwei Cl-Ionen; das dritte Cr-Elektron befindet sich in einer unipolaren Bindung u. kann erst durch ein weiteres NH_3 -Mol. in elektrovalente Bindung übergeführt werden zu $[\text{Cr}, 6\text{NH}_3]\text{Cl}_3$. Alle Kerne sind regelmäßig um das zentrale Cr-Atom angeordnet. Man kommt zu tetraedr. u. oktaedr. Anordnungen. — Den Fettsäuren stellt die *pseudo*-Form die nichtpolare Bindung dar, das Elektron des Hydroxylwasserstoffs bewegt sich in äußeren Cassinischen Kurven um beide Kerne (O u. H). In der wahren Säure hat das H-Elektron die Grenzzone überschritten u. bewegt sich auf einer inneren Bahn um den O-Kern. (Chemistry of Ind. 43. 1071—73. 1924. Birmingham, Univ.) ZANDEH

A. Byk, Zur Synthese der molekularen Asymmetrie. (Vgl. Ztschr. f. physik. 49. 641; C. 1905. I. 318.) Eine Synthese molekularer Asymmetrie, die die Erzeugung einseitig akt. Substanz ohne Zuhilfenahme bereits vorhandener Körper fordert, kann sowohl eine a. Synthese wie Analyse im Fischerschen Sinne sein. Von den klass. Pasteurschen Spaltungsmethoden kommt hierfür nur die spontane Spaltung durch getrennte Krystallisation des d- u. l-Körpers in Betracht oder eine eventuelle Spaltung inakt. Körper durch innerliche a. Wrkkg. physikalischer Natur. In der Arbeit wird diskutiert, wie weit die spontane Krystallisation bei der Synthese molekularer Asymmetrie betrachtet werden darf. Nach Erörterung der inzwischen als hinfällig erkannten Bedenken, die PASTEUR gegen die Möglichkeit der spontanen Spaltung von durch Totalsynthese erzeugter Traubensäure erhoben hatte, wird darauf hingewiesen, daß nach den Verss. von E. ERLÉNMEYER (Z. Biochem. Ztschr. 52. 469; C. 1913. II. 578) eine Lsg. des Razemats nicht nur aus l-Krystalle in gleicher Menge ausscheiden könne, sondern auch imstande ist, spontan bzgl. der Mutterlauge zu aktivieren. Diese Erscheinung wird im Gegensatz zu ERLÉNMEYER durch den zufälligen Überschuß der Krystallisationskeime eines oder anderen Enantiomorphen erklärt, der bewirkt, daß die Mutterlauge bald rechts- bald linksdrehend wird, wobei wegen des durchaus zufälligen Charakters des Vorganges bei einer langen Versuchsreihe die Mischung sämtlicher Mutterlaugen wieder inakt. sein muß. Die Selbstaktivierung der Lsg. stellt sich als ein typ. Schwankungserscheinung im Sinne der molekular bedingten Abweichungen vom zweiten Hauptsatz der Thermodynamik dar. Ob diese Erscheinung als Erklärung der primären Entstehung opt. akt. Substanz in Betracht kommt, hängt von der Häufigkeit ab, mit der solche Selbstaktivierungen unter natürlichen Verhältnissen anzunehmen sind. (Naturwissenschaften 13. 17—21.) BY

N. Tananajew, Über die Gleichgewichtsreaktion $\text{Fe}^{++} + \text{Ag}^+ \rightleftharpoons \text{Fe}^{+++} + \text{Ag}$ bei sorgfältig gereinigten Ausgangsmaterialien: FeSO_4 , Ag_2SO_4 u. $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$ u. Ag bei 25 u. 45° Vf. unter Luft, CO_2 oder N_2 in einem Thermostaten bei 0,25 u. 45° zur Rk. Die Versuchsdaten werden tabellar. wiedergegeben. Die Rk. $\text{Fe}^{++} + \text{Ag}^+ \rightleftharpoons \text{Fe}^{+++} + \text{Ag}$ ist umkehrbar, das Gleichgewicht ist im allgemeinen sehr schnell erreicht. $K_0 = 0,09$; $K_{25} = 0,0060$; $K_{45} = 0,0110$. Die unter CO_2 ausgeführte Best. der Wärmetönung der Rk. beträgt 7868 cal. für 1 Grammatom Ag. Nach der Gleichung von VAN'T HOFF berechnete Werte stimmen befriedigend mit den gefundenen Konstanten überein. (Ztschr. f. physik. Ch. 114. 49—58. 1924. Kiew, Polytechn. Inst.) ULMAN

N. Kurnakow, Singuläre Punkte chemischer Diagramme. Anwendung der Topologie (Analysis situs) auf die chemischen Diagramme. Das Kontinuitätsprinzip der Topologie besagt, daß die Kurven $f(t, p, x_1 \dots x_n, \alpha)$, worin t die Temp., p den

... die Konz., α die zu messende Eigenschaft bedeutet, stetig sind; die van der Waalsche Kurve unter der krit. Temp. Das Korrelationsdiagramm: jeder Phase entspricht ein Zweig des Diagramms; aus der Anzahl der Phasen kann man die Anzahl der Phasen ermitteln. Singuläre Punkte sind die Punkte, in welchen zwei verschiedene Kurvenzweige (derselben Kurve) einander schneiden; Maxima u. Minima sind also nicht singulär, sowohl wie die eutekt. Punkte, die am Kreuzpunkt zweier verschiedener Kurven liegen. Die distekt. Punkte chem. Verbb. entsprechenden Punkte gehören nach LE CHATELIER (C. r. Acad. des sciences **108**. 1015; C. **89**. II. 14) zwei selbständigen Zweigen, so kann in diesem Punkte zwei Tangenten ziehen kann. Es wäre hier ein Widerspruch mit dem Korrelationsprinzip vorhanden, wenn man die beiden Zweige nicht als einer einzigen Kurve, die jenseits der Tangenten eine (im Falle chem. Verbb. instabile) Schleife bildet, betrachten könnte. Alsdann wird der distekt. Punkt zu einem „Doppelpunkt“, d. h. zu einem singulären, wie es einer bestimmten Phase zukommt. Wenn die Verb. AB im fl. Zustande dissoziiert ist, so stellt das Maximum der liquidus-Kurve des Systems A + B, obwohl seine Abszisse genau 50% (molar) hat, keinen singulären Punkt dar; es liegt an der Abszisse der Verb. AB nur deshalb, weil es mit dem Schnittpunkt zweier, das Gebiet der fl. Lösungen von A u. B in AB abgrenzenden Kurvenäste zusammenfällt. Diese Kurvenäste bilden einen Doppelpunkt, weil AB im festen Zustande eine nicht dissoziierte Verb. ist. Wenn die Verb. AB auch im festen Zustande dissoziiert, so ist das Maximum der liquidus-Kurve zugleich das Maximum der solidus-Kurve, die aber keinen singulären Punkt aufweisen kann, weshalb auch das Maximum nicht ausgezeichnet ist. Trotzdem also die im festen Zustande dissoziierte Verb. ein Individuum darstellt, ist, wie die Erfahrung lehrt, sein Existenzgebiet nicht begrenzt; diese Verbb. nennt Vf. „Berthollide“. (Vgl. Ztschr. f. anorg. u. phys. Chem. **88**. 109; C. **1914**. II. 813.) (Annales de l'institut d'analyse physicochimique **2**. 1924. [Russ.] Sep.)

BIKERMANN.

Prof. Holluta, *Der Reaktionsmechanismus der Permanganatreduktion und seine physikalisch-chemischen Grundlagen*. IX. Die Permanganatreduktion beim Übergang von neutraler zu alkalischer Lösung. (VIII. vgl. Ztschr. f. physik. Ch. **107**. 333; C. **1913**. 1495.) Vf. untersuchte, in welcher Weise der Wechsel des Permanganatreduktionsschema beim Übergang von neutraler zu alkal. Lsg. sich vollzieht u. von welchen äußeren Bedingungen derselbe abhängt. Die Verss. zeigen, daß diese Änderung nicht sprunghaft, sondern allmählich erfolgt: mit steigender Alkalität tritt immer größerem Ausmaß Manganat als Zwischenprod. der Permanganatreduktion. folgedessen ist schon bei niedriger Hydroxylionkonz. der für stark alkal. charakterist. Zweiphasenverlauf zu beobachten. Als Übergangserscheinung tritt eine Nebenwrkg., indem das Permanganat sowohl nach der Gleichung $\text{H}_2\text{MnO}_4 + \text{HCO}_2' + \text{H}_2\text{O} = \text{H}_2\text{MnO}_4' + \text{HCO}_3'$ als auch nach der Beziehung $2\text{MnO}_4' + 2\text{OH}' + \text{HCO}_2' = 2\text{MnO}_4'' + \text{HCO}_3' + \text{H}_2\text{O}$ abgebaut wird. Bei geringen Alkalitäten wurde ferner eine Herabsetzung der Nebenwrkg. des Permanganats u. eine Reaktionsverzögerung durch Hydroxylionen beobachtet, für deren Ursache eine Selbstzersetzung des primär gebildeten Manganats unter Rückbildung von Permanganat verantwortlich gemacht wird. — Der Hydroxylioneneinfluß auf die Geschwindigkeit der Permanganatreduktion in schwach alkal. Lsg. wurde bestimmt. Das Zahlenmaterial ist aus 5 Tabellen ersichtlich. Versuchsergebnisse stehen im Einklang mit der von Vf. aufgestellten Sauerstoffabhaltungstheorie. (Ztschr. f. physik. Ch. **113**. 464—81. 1924. Brünn, Techn. Verh.)

K. WOLF.

Richard Lorenz und **W. Herz**, *Über Freiraumzahlen*. I. Vff. untersuchen die Beziehung $v - \Psi = F$, worin v des Vol. des Stoffes unter irgendwelchen Be-

dingungen der Temp. u. des Druckes ist, Φ stellt im Sinne der Lorenzschen Raumerfüllungszahlen den „wirklich von den Molekülen eingenommenen Raum“ dann ist F der Freiraum, d. h. „der von den Molekülen nicht eingenommene Raum“. Die Raumerfüllungszahl $\psi = \Phi/v$ ist mit der Freiraumzahl χ durch die Beziehung $1 - \psi = \chi$ verknüpft. Mit Hilfe dieser Beziehung wird für eine Reihe von Verbindungen ψ bekannt ist (vgl. Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. **135**. 372; C. **1924**. II. 1200). χ berechnet, dabei ergibt sich für Methylalkohol 0,4314; A. 0,4299; Propylalkohol 0,4206; Hexan 0,4338; Heptan 0,4192; Octan 0,4057; Essigsäure 0,3942; Propionsäure 0,3864; n-Buttersäure 0,3791; Methylacetat 0,4344; Äthylacetat 0,4270; 0,4093; Toluol 0,3947; o-Xylol 0,3755; Di-i-butyl 0,4146; Chlf. 0,4228; Fluorbenzol 0,4102; Chlorbenzol 0,3772; Brombenzol 0,3601; Chlor 0,4750; HCl 0,5199; W. 0,3333; H₂S 0,4966; NH₃ 0,4812; PH₃ 0,5197; CCl₄ 0,4118; SnCl₄ 0,3956; CO₂ 0,5297; 0,4134; CH₃Cl 0,4762; C₂H₄ 0,5401. Die Gesetzmäßigkeiten der Werte der ψ in einander in Beziehung stehenden Verb. wird besprochen. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. **141**. 304—8. 1924. Frankfurt a. M., Breslau, Univv.) JOSEPH

Edgar Wöhlisch, *Theoretische Stöchiometrie der Raumerfüllung und der intermolekularen Kräfte, der Viscosität und der Ionenbeweglichkeit flüssiger organischer Verbindungen*. (Vgl. Ztschr. f. Elektrochem. **27**. 295; C. **1921**. III. 835.) 1. Raumerfüllung u. intermolekulare Kräfte. Der Raum, den ein Mol einer Flüssigkeit einnimmt, ihr molekulares Gesamtv. V , setzt sich zusammen aus dem von den Molekülen wirklich erfülltem Raum, dem molekularen Eigenvol. Φ , u. dem den Molekülen für die Bewegung zur Verfügung stehenden Raum, dem intermolekularen Vol. $I = V - \Phi$. Vf. bezeichnet mit LORENZ das Verhältnis $\psi = \Phi/V$ als die Raumerfüllungszahl. Vf. untersucht an Hand der van der Waals'schen Gleichung, der Molekularrefraktion nach CLAUSIUS u. MOSOTTI, der Kelvinschen Formel für den Molekulardurchmesser ρ , das in der Literatur niedergelegte Zahlenmaterial, u. erhält folgende Ergebnisse: Die Säuren haben größeres Eigenvol. als die isomeren Ester, obwohl sie ein kleineres Gesamtv. aufweisen. In formaler Analogie haben die Alkohole wahrscheinlich ein größeres Eigenvol. als die isomeren Äther. Die Häufung von Methylgruppen oder Cl-Atome an einem C-Atom bewirkt eine Verkleinerung des Eigenvol. Φ u. V verhalten sich demnach in ihrer Konstitutionsabhängigkeit einander häufig genau entgegengesetzt. — Entspricht einer Erhöhung des Kp. eine Verkleinerung von V , so gilt das gleiche auch für I . Gehen Kp. u. V parallel, so weisen V u. I entgegengesetzte Konstitutionsabhängigkeit auf. Das wahre Wesen der Kauffmannschen „Eurogenie“ ist nicht die Dehnung von V , sondern die Verkleinerung von Φ . — Die höher sd. Verb. hat stets die größere Raumerfüllungszahl als das niedriger sd. Isomer. In homologen Reihen steigt ψ an.

2. Stöchiometrie der Viscosität. Indem Vf. seinen Unterss. über die Stöchiometrie der Viscosität organ. Fl. die kinet. Theorie der inneren Reibung idealer Fl. von JÄGER zugrunde legt, ergibt sich: Von zwei Isomeren hat das höherem Kp. fast stets den größeren η -Wert (η = Reibungskoeffizient), der umgekehrt hat das größere Mol. u. das kleinere I . Beim Aufsteigen in homologen Reihen steigt die innere Reibung, auch wenn die D. abnimmt. Der Grund ist die Zunahme von ρ (Molekulardurchmesser) u. die Abnahme von c (mittlere molekulare Geschwindigkeit). Bezüglich des abnormalen Verh. der Alkohole betrachtet Vf. die Assoziation als bedingt durch eine Unvollkommenheit des Schmelzprozesses, derzufolge die Moll. teilweise noch wie im festen Zustande in mehr oder minder großen Molekularplexen zusammenhängen. Das Vol. eines Molekularkomplexes muß nun wesentlich größer sein als die Summe der Einzelvoll. der den Komplex zusammensetzenden Moll. Denn die Moll. berühren einander auch im festen Zustande nicht im Zwischenraum. Die Assoziation bewirkt deshalb eine scheinbare Vergrößerung von Φ u. eine entsprechende Abnahme von I , wodurch eine Erhöhung der inneren

ung gemäß der Jägerschen Gleichung herbeigeführt wird. Hiernach wird das Verh. der Viscosität der isomeren Alkohole zu beobachtende Verh. verständlich. Das Verh. der ebenfalls assoziierten Säuren wird durch die Tatsache erklärt, daß dieser Körperklasse die Verzweigung der C-Kette auf den F. gerade den entgegengesetzten Einfluß hat wie bei den Alkoholen.

Stöchiometrie der Ionenbeweglichkeit. Nach LORENZ lassen sich die Ionenbeweglichkeit die Eigenvoll. organ. Ionen berechnen. Hierbei ist Voraussetzung, daß die Ionen das Stokessche Gesetz befolgen. Vergleicht man isomere Ionen, so wandert dasjenige Ion am schnellsten, das seinen krit. Φ -Wert aufweist. Es ergibt sich nun bei einem Vergleich von Isomeren eine sehr deutliche umgekehrte Proportionalität der Ionenbeweglichkeit zu den Kpp. Vf. erklärt die Ungültigkeit der Stokesschen Gleichung in diesem Falle. Je höher der Kp. der gel. Verb., desto größer sind die von einem Ionen ausgehenden Attraktionskräfte, desto stärker wird also das gel. Mol. die Moll. Lösungsm. an sich heranziehen. Der Effekt dieser Kräfte auf die Ionenbeweglichkeit muß sich in demselben Sinne geltend machen, wie eine Vergrößerung des Molekülradius. Vergleicht man dagegen Homologe, die beträchtliche Volumenzunahmen aufweisen, so wird sich der fälschende Einfluß der intermolekularen Kräfte bei Anwendung der Stokesschen Gleichung weniger geltend machen. (Biochem. Ztschr. **153**. 120—28. 1924. Würzburg, Univ.)

K. WOLF.

Saldau, Die Leitfähigkeitsmethode bei höheren Temperaturen und ihre Bedeutung bei der Aufklärung des Wesens fester Lösungen. (Annales de l'institut chimique **2**. 352—70. 1924. [Russ.] Sep. — C. **1923**. III. 606.) BIK.

A₁. Atomstruktur. Radiochemie. Photochemie.

Walter Wessel, Zur Messung der Gitterenergie von Kristallen. (Vgl. Physikal. Ztschr. **25**. 270; C. **1924**. II. 1047.) Man kann aus den Ionen-Partialdrücken im Kristalle eines Salzes auf seine Gitterenergie schließen. Vf. erläutert den Verlauf der Gitterenergie, die die Gitterenergie aus den Partialdrücken zu gewinnen gestattet, und die wesentlichen in der Auflösung eines Systems von thermodynam. Gleichgewichtsbedingungen (Massenwirkungsgesetz) besteht. Bei einem einwertigen Salz (Metall, X Säurerest) treten folgende Spaltungen: $MX = M^+ + X^-$ — [Gitterenergie — (Schmelz- u. Verdampfungswärme)]; $X^- = X + e$ — Elektronenaffinität, also Synthesen auf: $M^+ + e = M$ — Ionisierungsarbeit; $2X = X_2 +$ Dissoziationsarbeit. Hierin ist e Elektron. — Speziell für einwertige Salze, die in der gegebenen Schema folgen, ergibt sich folgende Vorschrift: Man messe den Partialdruck p u. den Partialdruck p_M der positiven Metallionen im Gleichgewicht, den Partialdruck p_X der negativen Säureionen diesen, den der Moll. p_{MX} in der Gleichung: $-(U - S - V)/RT + a \ln T + b = \ln(p_M + p_X) - \ln p_{MX}$ die zwei Konstanten a u. b u. die Gitterenergie U durch Messungen bei drei Temp. (S Schmelz-, V Verdampfungswärme). Zur Übersicht sind die theoret. Dampfdruck- u. Sättigungsstromkurven für NaCl gezeichnet. Es ergibt sich, daß man in einfachen Fällen sämtliche Konstanten bis auf S u. V berechnen kann. (Ztschr. f. Physik **30**. 217—24. 1924. Göttingen.) K. WOLF.

Henry Garnett, Molekulare Dimensionen von Celluloid. Da die handelsüblichen Celluloidsorten Gemische von wechselnder Zus. sind, verlangt Vf. die Angabe der Molekulardimension des Celluloids, welches bei den Verss. zur Best. der Molekulardimension benutzt wurde. (Nature **115**. 51. Heaton Moor bei Leeds.)

BECKER.

Becker, Über die Elektronenemission der Metalle. I. In einer früheren Arbeit (Ann. der Physik [4] **75**. 217; C. **1924**. II. 2383) wurde gezeigt, daß die

Geschwindigkeitsverteilung der durch α -Strahlen ausgelösten Elektronen (= δ -Strahlen) mit der Geschwindigkeitsverteilung der glühelekt. u. der lichtelekt. Elektronen nicht übereinstimmt. Die für δ -Strahlen gefundene Maxwell'sche Verteilung ist aber unmöglich die wahre Gesetzmäßigkeit darstellen, weil man die Maxwell'sche Verteilung für die im Metallinnern befindlichen Elektronen erwarten muß, die Verteilung der äußeren, beobachtbaren Geschwindigkeiten kann aber mit der inneren Verteilung nicht übereinstimmen: die Elektronen müssen das das Metall umhüllende Oberflächenfeld durchsetzen u. leisten dabei eine Austrittsarbeit. Ad man die im Oberflächenfeld verloren gegangene Geschwindigkeit zur beobachtbaren u. dividiert man solcherweise gefundene Geschwindigkeiten durch die wahrscheinlichste (auch so berechnete) Geschwindigkeit, so erhält man eine neue Verteilungskurve. Ihre Gestalt wird natürlich durch die für die Austrittsarbeit angesetzte Constante bestimmt; für sehr große Austrittsarbeit nähert sich die Kurve an die der lichtelekt. Elektronen. Die Aussendung von δ -Strahlen unterscheidet sich somit von der der Glühelektronen nur durch eine relativ geringere Austrittsarbeit; da aber das Oberflächenfeld u. die Austrittsarbeit in beiden Fällen wahrscheinlich gleich sind, so rührt die Differenz davon her, daß die Austrittsgeschwindigkeiten der δ -Strahlen ca. das zehnfache der der Glühelektronen betragen. Allen Elektronenemissionen liegt also derselbe Mechanismus zugrunde. — Die Temperaturunabhängigkeit der δ -Strahlenemission zeigt an, daß es nicht die gleichen Elektronen sind, die therm. u. durch α -Teilchen im Metallinnern in Freiheit gesetzt werden. (Ztschr. f. Physik [4] **75**. 781—800. 1924. Heidelberg, Radiol. Inst.) BIKERMANN

A. Günther-Schulze, *Einige neue charakteristische Abstände bei der Glühkathodenentladung*. (Vgl. Ztschr. f. Physik **28**. 129; C. 1924. II. 2732.) Bei einer n. Glühkathodenentladung verschwindet bei einem scharf einstellbaren Abstände D die Glühkathode, wenn Anode u. Kathode einander genähert werden. Gleichzeitig ändert sich die Spannung um den Betrag der Ionisierungsspannung des benutzten Gases. Bei gegebenem Gas ist $p \cdot D = \text{konst.}$, wenn p der Gasdruck ist. Im Gebiet der anomalen Falles ist $p \cdot D / V_a^2 = \text{konst.}$ in N_2 , O_2 u. H_2O , dagegen annähernd $p \cdot D / V_a = \text{konst.}$ in H_2 . (V_a = Spannung zwischen den Elektroden). Ein abweichendes Verh. zeigt Ar. Die Dicke der anod. Glühkathode ist bei großem Gasdruck vom Gasdruck fast gänzlich unabhängig. (Ztschr. f. Physik **30**. 171—180. 1924. Charlottenburg.) K. WEDER

D. L. Webster und **P. A. Ross**, *Der Comptoneffekt*. Vff. wiederholen die früheren Verss. (vgl. Ross, Proc. National Acad. Sc. Washington **10**. 304; C. 1924. II. 1555) zur experimentellen Prüfung des Comptoneffektes, indem sie unter geeigneten Vorsichtsmaßregeln Mo-Strahlung an S u. Al als Streustrahler streuten und das Spektrum der Sekundärstrahlung aufnehmen. Es zeigte sich wieder wie früher, daß die von der Comptonschen Theorie geforderte Verschiebung der Wellenlänge durch Störende Nebeneffekte, welche eventuell hätten von dem den Sekundärstrahlung erzeugenden Kasten herrühren können, waren peinlichst vermieden worden. (Phys. Rev. **115**. 51. Stanford Univ., Cal.) BECKER

W. M. Hicks, *Über Sommerfelds und Landés Klassifikationsregeln für die Serien und Zeemantypen in den Spektren*. Formale Betrachtungen zu obigen Regeln zur Diskussion des Für u. Wider einer von LANDÉ angenommenen Regel für die Separationsverhältnisse in Multipletts. (Philos. Magazine [6] **48**. 1036—48. 1924. Sheffield.) KYROPOULOS

Léon Bloch, Eugène Bloch und **Georges Déjardin**, *Spektren höherer Ordnung von Argon, Krypton und Xenon*. (Ann. de Physique [10] **2**. 461—505. 1924. — C. 1924. I. 2566.) K. WEDER

P. Lindau, *Über den Bau der zweiten positiven Gruppe der Stickstoffverbindungen*. (3. Mitt. (2. vgl. Ztschr. f. Physik **26**. 343; C. 1924. II. 1888.) Vf. stellt neue

Kombinationsbeziehungen auf, für solche Banden, die im Kantenschema die Ecken des Rechtecks bilden. Diese Beziehungen werden an den Banden 3805, 3536, 3755, die zu je zweien gleiche Laufzahlen n' u. n haben, geprüft. Es werden die gleichbezeichneten Linien der Banden kombiniert u. dann die Beziehungen festgestellt, die die Verallgemeinerung der früher aufgestellten Kombinationsbeziehungen für die Banden einer Längs- bzw. Querserie sind. Das Zahlenmaterial ist aus Tabellen zu entnehmen. (Ztschr. f. Physik **30**. 187—99. 1924. Fran, Univ.)

K. WOLF.

B. C. Johnson, Die Einwirkung von Argon auf das erste positive Bandenspektrum des Stickstoffs. (Vgl. Proc. Royal Soc. London Serie A **106**. 195; C. **1924**. 1557.) Im Anschluß an die früheren Unterss. des Einflusses von Ar auf die Spektren von Gasen werden nach Besprechung früherer Verss. insbesondere Unterss. über die Energieverschiebung im ersten positiven Bandenspektrum des Stickstoffs unter dem Einfluß von Ar wiedergegeben. Die Ggw. von N-Spuren im Ar, d. h. in großer Ar-Mengen bewirkt das Auftreten nur einiger der Bandenköpfe jeder Gruppe, um mit etwa 5% N das n. Bandenspektrum zu ergeben. Die selektive Wirkung von Ar ist äußerlich ähnlich der Wrkg. welche beim Nachglühen des Stickstoffs gefunden wurde, aber ursächlich verschieden. Die Unters. der Intensitätsverschiebungen erfolgte auf Grund von Spektrogrammen verschiedener bekannter Stickstoffmischungen durch Neutralkeile. Sie ergab für Spuren von N in Ar eine Energieverschiebung, entsprechend 30 bis 40 Å. nach dem stärker brechbaren Ende der Spektrallinien. Es wird eine Analogie zwischen den Erscheinungen beim Nachglühen u. den untersuchten insofern vermutet, als im einen Falle unionisierte Stickstoffmoleküle des N, im anderen die große Anzahl der Ar-Moleküle die elektr. Felder zwischen den aktivierten Molekülen schwächen. (Philos. Magazine [6] **48**. 1069—74. 1924. Kyropoulos.)

KYROPOULOS.

H. Lowery, Pollinien, die im unterbrochenen Bogenspektrum von Silber, Gold u. Kupfer vorkommen. Zur Erzeugung des Lichtbogens bediente sich Vf. des Lichtbogens von HEMSALECH und DE GRAMONT (Philos. Magazine [6] **43**. 287; C. **1922**. 100), wobei mittelst einer Zugvorrichtung der Bogen sofort nach seiner B. unterbrochen werden konnte. Die Spektren wurden mittels eines Rowlandgitter-Spektrographen aufgenommen. Unabhängig vom Gase, in dem der Bogen erzeugt wurde, wurden charakterist. Linien gefunden, die dem ruhenden, unteren Pol, unabhängig von seinem Ladungssinn, zugeordnet waren, u. die Vf. als Pollinien bezeichnet. Vf. unterscheidet zwei Arten: 1. Linien, die bei allmählich abnehmender Intensität mit 1—3 mm Poldistanz verschwinden. 2. Linien, die plötzlich bei 1 mm Poldistanz verschwinden ohne sichtliche Intensitäts- oder Längenänderung. Die Linien der ersten Art konnten größtenteils mit bekannten Bogen- oder Funkenspektren der betr. Metalle identifiziert werden, was für die Linien der zweiten Art nicht gelang. Eine Liste dieser „neuen“ Linien wird gegeben. (Philos. Magazine [6] **43**. 1122—31. 1924. Manchester, Univ.)

KYROPOULOS.

Ernest Johannes Hartung, Studien mit der Mikrowage. I. Die photochemische Zersetzung von Silberbromid. Die früher (Journ. Chem. Soc. London **121**. 682; C. **1923**. I. 8) erhaltenen Resultate wurden bestätigt. Der Gewichtsverlust betrug 96,4% des Br. Die Belichtungszeit ließ sich erheblich abkürzen durch Führen von Cu-Drahtnetz als Br-Absorbens in das evakuierte Belichtungsgefäß. H₂ u. NaOH wirkten nicht absorbierend, in ihrer Ggw. schlug sich das Br an den Gefäßwandungen nieder. Die Bromierungsgeschwindigkeit von Ag-Schichten auf Cu wurde bestimmt. Sie war bei den durch photochem. Zers. von AgBr erhaltenen Ag-Schichten erheblich größer als bei in gewöhnlicher Weise versilberten, gelühten Quarzblättchen. (Journ. Chem. Soc. London **125**. 2198—2207. 1924. Bourne, Univ.)

HERTER.

Emile Rousseau, *Photochemische Resonanz oder Verdichtung der ultravioletten Energie durch gewisse Substanzen*. Gewisse Metallsalze (von Mn, Mg, Fe, Ni usw.) werden ebenso wie andere Stoffe, besonders Serumeiweiß, unter der Einwirkung ultravioletter Strahlen photokatalyt. u. häufen in gewissem Maße ihre photochem. Energie an. Man kann sie durch die Zunahme der Polymerisation in Formalinlösungen u. den entsprechend geringeren Verbrauch an Fehlingscher Lsg. nachweisen. In dieser Mitteilung wird für $MnCl_2$ nachgewiesen, daß der Polymerisierungsgrad, an sich durch die Bestrahlung etwas gefördert wird, diese Förderung in Ggw. eines Mn -Salzes in erheblich höherem Grade erfährt. Das Maximum wird in $1\frac{1}{2}$ –2 Stdn. erreicht, dann folgt wieder ein Abfall. Die Temp. ist zwischen 28 u. 54° ohne Einfluß. (C. r. soc. de biologie **91**. 1009–11. 1924. Paris, Fac. de méd.) SPIEGEL.

Selig Hecht, *Zur Photochemie des Sehens*. Kurze Zusammenfassung der in den letzten 5 Jahrgängen des Journ. of General Physiology veröffentlichten Verss. über die lichtempfindlichen Tieren, der Seescheide *Ciona intestinalis*, u. der Muschel *Mytilus arenaria*, die auf Belichtung durch Zusammenziehung der Siphonen reagieren, sowie mit dem menschlichen Auge. Wenn in den betreffenden Organen eine lichtempfindliche Substanz bedeutet u. ferner P u. A sowohl deren Zersetzung als auch prodd. wie auch deren Ausgangsstoffe, so läßt sich für die Berechnung der Lichtempfindlichkeit die Gleichung einer chem. Rk. $S \xrightleftharpoons[\text{hell}]{\text{dunkel}} P + A$ erfolgreich verwenden.

Zum Verständnis der Funktion des Auges ist ferner die Idee wichtig, daß die Schaffung einer gewissen Gesichtsempfindung eine gegebene Menge photochem. Zers. stattfinden muß, unabhängig von dem Zustand, in dem sich das Sinnesorgan befinden mag. (Naturwissenschaften **13**. 66–72. Boston, Harvard Medic. School.) BRUNNEN.

Th. Dreisch, *Die Absorptionskoeffizienten einiger Flüssigkeiten und ihrer Dämpfe im Ultraroten unterhalb 3 μ* . Es wurde im Bereiche bis 3 μ die Absorption von W., Bzl. u. $CHCl_3$ im fl. u. gasförmigen Zustande mit Quarzprisma gemessen u. die Absorptionskoeffizienten berechnet. Allen untersuchten Stoffen ist gemeinsam, daß bei den kurzen Wellenlängen die Absorption des Dampfes viel kräftiger ist als die der Fl. Mit zunehmender Wellenlänge dagegen kehrt sich das Bild um. Die Stelle, von wo ab die Absorption des Dampfes gegen die Fl. zurückbleibt, liegt bei W. u. $CHCl_3$ ungefähr gleich, nämlich bei etwa 2 μ , bei Bzl. liegt sie erheblich früher bei etwa 1,5 μ . Bei dem Vergleich der Lage der Dampfbanden mit denen der Fl. zeigten sich kleine Verschiebungen, für die sich keine bestimmte Regel aufstellen ließ. Diese Verschiebungen sind für Bzl. u. $CHCl_3$ sehr gering. Beim W. ist die Verschiebung sehr wesentlich u. nimmt mit steigender Wellenlänge zu. 9 Tabellen u. 4 graph. Darst. unterrichten über das Zahlenmaterial. (Ztschr. f. Physik **10**. 200–16. 1924. Bonn, Univ.) K. WOLFF.

Pauthenier, *Elektrostriktion in Flüssigkeiten mit geringer Doppelbrechung* (Vgl. C. r. d. l'Acad. des sciences **178**. 1899; C. **1924**. II. 914.) Die Erhöhung des Brechungsindex durch Elektrostriktion erfolgt in Fl. ohne Doppelbrechung, was allgemein in quantitativer Übereinstimmung mit einer theoret. Formel, die die Einführung der Lorentzschen Beziehung zwischen Brechungsindex u. D. erhaelt, wurde. Die für CCl_4 beobachteten Resultate sind nicht in Übereinstimmung mit den theoret. berechneten; die Theorie muß daher ergänzt werden. (Journal de Physique et le Radium **[6]** **5**. 312–20. 1924.) K. WOLFF.

A₂. Elektrochemie. Thermochemie.

P. O. Pedersen, *Über den elektrischen Funken. II. Experimentelle Untersuchungen über Funkenverzögerung und Funkenbildung*. (Ann. der Physik **[4]** **2**. 827–47. 1924.) BIKERMAN.

L. Dunoyer und P. Toulon, *Über eine bemerkenswerte Eigenschaft der positiven des Quecksilberlichtbogens. Relais für starke Lichtbogen.* (Vgl. S. 470.) Fortsetzung der Diskussion über apparative Einzelheiten u. deren Eigenschaften. (Journ. de Physique et le Radium [6] 5. 289—303. 1924.) **K. WOLF.**

J. Guyot, *Voltaeffekt zwischen Metall/Elektrolyt und monomolekulare Schichten.* Untersucht die Gesetzmäßigkeiten, gemäß denen die Potentialdifferenz zwischen Metall u. einer verd. Elektrolytlsg. variiert, wenn man 1. die Konz. u. die Natur des Elektrolyten sowie die Natur der reversiblen Elektrode ändert, 2. die Flüssigkeitsoberfläche mit einer dünnen Schicht sehr geringer Mengen unl. organ. Substanzen bedeckt. Es zeigt sich bei den Verss. mit einer großen Anzahl von Elektrolyten bei verschiedenen Konzz. u. unter Anwendung verschiedener reversibler Elektroden, daß der Voltaeffekt unabhängig ist von der Natur des Elektrolyten, für äquimolekulare Lsgg., die dieselbe reversible Elektrode enthalten. Er ändert sich zu oder ab mit der Konz., je nachdem ob die Elektrode der Lsg. positive oder negative Ionen zu liefern vermag. Er gehorcht denselben Gesetzen wie die K. von Voltaketten, die man erhält, wenn zwei verd. Lsgg., die reversible Elektroden benetzen, durch eine gesätt. Lsg. von KCl oder NH_4NO_3 miteinander verbunden werden. Wird die Elektrolytoberfläche von einer organ. Substanz in dünner Schicht bedeckt, so beobachtet man eine Abnahme des Voltaeffekts. Diese Abnahme tritt sofort, nachdem die ersten organ. Moll. auf die Flüssigkeitsoberfläche gelangt werden; sie wächst mit der D. der Schicht u. erreicht schließlich einen Grenzwert. Die Abnahme des Voltaeffekts muß den Moll. des Oberflächenhäutchens zugeschrieben werden, die ein elektr. Moment besitzen u. deren spontane Orientierung auf der Flüssigkeitsoberfläche das Auftreten einer elektr. Doppelschicht bewirkt. Einzelheiten über die Struktur des Oberflächenhäutchens sind im Original anzusehen. Die dünne Schicht ist in allen untersuchten Fällen monomolekular. (Journ. de Physique [10] 2. 506—638. 1924.) **K. WOLF.**

Heinrich Goldschmidt und Peter Dahll, *Die Leitfähigkeit und die katalytische Wirkung der drei starken Halogenwasserstoffsäuren in methyl- und äthylalkoholischer Lösung.* (Vgl. Ztschr. f. physik. Ch. 112. 423; C. 1924. II. 2737.) Vff. untersuchen die Leitfähigkeit von NaCl , NaBr u. NaJ einerseits, HCl , HBr u. HJ andererseits in H_2O u. A. bei 25° . Die Messungsergebnisse werden tabellar. wiedergegeben. Der Verlauf der λ -V-Kurven der untersuchten Verbb. ist sowohl in CH_3OH , wie in $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ verschieden. NaCl zeigt die steilste, HJ die flachste Kurve. Das Kohlrauschsche Gesetz von der unabhängigen Wanderung der Ionen gilt für Lsgg. in beiden Alkoholen. Die rechner. ermittelte Differenz der Wanderungsgeschwindigkeit der Ionen in beiden Alkoholen zeigt sich als genügend konstant. Der Einfluß des Lösungsmittels auf das λ_∞ von HCl , HBr u. HJ ist derselbe. Gleich konz. Lsgg. der drei Verbb. katalysieren die Esterbildung in beiden Alkoholen in gleichem Grade. Die kinet. Verss. deuten darauf, daß die drei Halogenwasserstoffsäuren in Lsgg. in beiden Alkoholen zwar sehr weitgehend, aber doch nicht vollständig dissoziiert sind. (Ztschr. f. physik. Ch. 114. 1—22. 1924. Kristiania, 1924.) **ULMANN.**

M. Bourgeaud und A. Dondelinger, *Untersuchungen über die Affinitätskonstanten einiger organischen Basen.* Es wurde die Hydrolyse der Lsgg. von Natriumchloriden nachstehender Basen gemessen u. daraus die Affinitätskonstanten berechnet: *Methylanilin* ($2,1 \cdot 10^{-10}$), *Dimethylanilin* ($9,3 \cdot 10^{-11}$, Druckwert im Original!), *Äthylanilin* ($1,05 \cdot 10^{-9}$), *Diäthylanilin* ($2,7 \cdot 10^{-8}$)*, *Indanylamin* ($1,7 \cdot 10^{-7}$), *Methylindanylamin* ($5,65 \cdot 10^{-8}$), *Dimethylindanylamin* ($1,7 \cdot 10^{-7}$), *Äthylindanylamin* ($2,7 \cdot 10^{-7}$), *Diäthylindanylamin* ($5,2 \cdot 10^{-8}$), *Methylbenzylamin* ($7,95 \cdot 10^{-8}$),

* Im Original steht versehentlich Dimethylanilin. Privatmitt. d. Acad. des sciences.

Dimethylbenzylamin ($1,05 \cdot 10^{-5}$), *Äthylbenzylamin* ($5,04 \cdot 10^{-5}$), *Diäthylbenzylamin* ($3,6 \cdot 10^{-5}$), *Phenylindanylamin* ($6,25 \cdot 10^{-13}$), *o-Tolyindanylamin* ($6,7 \cdot 10^{-14}$), *m-Tolyindanylamin* ($3,1 \cdot 10^{-12}$), *p-Tolyindanylamin* ($6,3 \cdot 10^{-13}$), *m-Nitrophenylindanylamin* ($3,5 \cdot 10^{-15}$), *p-Nitrophenylindanylamin* ($7,4 \cdot 10^{-16}$), *4-Amino-1,3-xylylindanylamin* ($2 \cdot 10^{-13}$), *Methylbenzylindanylamin* ($7,4 \cdot 10^{-8}$), *Diindanylamin* ($2,9 \cdot 10^{-8}$), *Methyldiindanylamin* ($4,4 \cdot 10^{-10}$), α -*Naphthylindanylamin* ($3,7 \cdot 10^{-13}$), β -*Naphthylindanylamin* ($1,8 \cdot 10^{-14}$) u. *1,3-Dimethyl-4-aminobenzol* ($5,65 \cdot 10^{-10}$). Indanylamin liegt also in seinen bas. Eigenschaften anbelangt, zwischen Anilin u. Benzylamin. Das Indanylradikal hat einen negativierenden Einfluß; dessen Einführung in die NH_2 -Gruppe isomerer Amine ändert die relative Stärke der Amine nicht. Zur Bestätigung dieser letzten Gesetzmäßigkeit wurden die Affinitätskonstanten von *o-Toluidin* ($3,1 \cdot 10^{-10}$), *m-Toluidin* ($7 \cdot 10^{-10}$) u. *p-Toluidin* ($4,5 \cdot 10^{-10}$) neu bestimmt u. stimmen mit den Bredig'schen abweichende Werte (in Klammern) gefunden. (C. r. d. Acad. des sciences **179**. 1159—61. 1924.)

BIKERM.

E. H. L. Meyer, *Dielektrizitätskonstante und chemische Konstitution bei organischen Flüssigkeiten*. Es wurde die DE. (ϵ) von *Hexan*, *Benzol*, *Toluol*, *Ä.ä.*, *Chloral* u. *Nitrobenzol* nach der Resonanzmethode mit Hilfe ungedämpfter aufrechter Schwingungen gemessen. Die Genauigkeit der Absolutmessungen beträgt 0,5—1%, der Relativmessungen 0,1—0,5%. Ergebnisse: Hexan. DE. = 1,839 (—1,7, 1,776 (—20,0°), 1,749 (+3,7°), 1,739 (+12,0°) Bzl. DE. = 2,260 (+9,0°), 2,239 (+1,8, 2,195 (51,5°). Toluol. DE. = 2,557 (—77,9°), 2,382 (—15,7°), 2,311 (+8,5°), 2,241 (+34,0°). Ä.ä. DE. = 6,6976 (—78,5°), 5,1055 (—25,8°), 4,5929 (+0,5°), 4,3446 (+1,6, Chlf. DE. = 6,598 (—49,3°), 5,636 (—20,4°), 4,850 (+13,2°), 4,352 (+41,9°). Chloroform DE. = 7,580 (—40,1°), 6,073 (—7,2°), 5,044 (+14,5°), 4,228 (+62,1°). Nitrobenzol DE. = 34,94 (+11,6°), 30,38 (35,4°), 27,41 (59,8°), 24,44 (85,2°). Die Daten befriedigen weder die Debyesche, ($\epsilon - 1) \cdot T / (\epsilon + 2) d = a + b T$, noch die Bredig-Boguslawskische, ($\epsilon - 1) d_0 / (\epsilon + 2) d_i = A - B T$, Beziehung (d_i die D. bei T_i) (Ann. der Physik [4] **75**. 801—18. 1924. Freiburg i. Br., Univ.)

BIKERM.

W. M. Thornton, *Das Wärmeleitvermögen fester elektrischer Isolatoren*. II. (v. Philos. Magazine [6] **38**. 705; C. **1920**. I. 549.) Vf. diskutiert die früher von ihm gefundene Proportionalitätsbeziehung zwischen Elastizität u. Wärmeleitvermögen, die sich mit der Debyeschen bzw. Einsteinschen Auffassung des Mechanismus der Wärmeleitung in festen Stoffen gut verträgt. Es wird gezeigt, daß die Geschwindigkeit der molekularen Wärmeschwingungen demselben Gesetz wie die Schallgeschwindigkeit in Gasen ihrer Abhängigkeit von der Elastizität folgt u. die vom Vf. gefundene Beziehung gelten muß, wenn die Wärme durch Molekularschwingungen übertragen wird, und nicht durch Atomschwingungen, wenn deren Energie in konstantem Verhältnis zu der Molekularschwingungen steht, wie bei n. Temp. Letzteres wird durch eine berechnete Schlagsrechnung am Graphit bestätigt. Abweichungen, die bei einigen Gläsern gefunden wurden, deutet Vf. qualitativ aus Annahmen über deren Struktur. (Philos. Magazine [6] **48**. 1054—56. 1924. Armstrong Coll. Newcastle-upon-Tyne.)

K. Stratton und J. R. Partington, *Latente Schmelzwärmen*. II. *Palmitinsäure und Benzol*. (I. vgl. Philos. Magazine [6] **43**. 436; C. **1922**. I. 1162.) In Fortsetzung der früheren Unterss. wurden die Schmelzwärmen für Palmitinsäure u. Benzol Bzl. zu 51,03 bzw. 29,92 cal./g bestimmt, sowie ihre molekularen Gefrierpunktniedrigungen in *Mesitylen*. (Philos. Magazine [6] **48**. 1085—89. 1924. London, Univ.)

KYROPOULS.

J. M. Mullaly und H. Jacques, *Die Diffusion von Quecksilber und Jodmolekülen durch Stickstoff*. (Vgl. Nature **113**. 711; C. **1924**. II. 161.) Ausführliche Untersuchung durch Methode; Apparatur u. Ergebnissen. (Philos. Magazine [6] **48**. 1105—22. 1924. Oxford.)

KYROPOULS.

Alfred C. Egerton, *Notiz über die Dampfdrucke einatomiger Stoffe*. Vf. entwickelt eine einfache lineare Gleichung mit zwei Stoffkonstanten, welche, wie an mehreren Beispielen (Metalldämpfen) gezeigt wird, die Dampfdrucke mit guter Annäherung gibt. (Philos. Magazine [6] **48**. 1048—54. 1924. Oxford.) KYROPOULOS.


A₃. Kolloidchemie. Capillarchemie.

E. Keeser, *Studien über Cholesterin und seine Ester*. Stabile Sole von Cholesterin u. Lecithin wurden durch langsames Eintragen der alkoh. Lsgg. in sd. W. gewonnen. Physikal.-chem. Unterss. an diesen Solen, sowie an solchen der Cholesterinester mit Ameisen-, Essig-, Butter-, Benzoe- u. Palmitinsäure führen zu folgenden Schlüssen: 1. Cholesterin u. Lecithin zeigen in ihren physikal.-chem. Eigenschaften weitgehend analoge Wrkgg. — 2. Beide wirken sensibilisierend auf native Kolloide. — 3. Die homologe Reihe der Cholesterinfettsäureester sensibilisiert negative Kolloide mit zunehmender C-Kette abnehmend stark. — 4. Cholesterin senkt stark die Oberflächenspannung des W., desgleichen seine Fettsäureester, deren Oberflächenaktivität mit zunehmender C-Kette abnimmt. — 5. Der Fällungsgrad des Cholesterins u. seiner Fettsäureester steigt mit zunehmender C-Kette an. — 6. Die Konstanz der Proportionalität zwischen freiem Cholesterin u. Cholesterinestern ist von Wichtigkeit für den physikal. Zustand der Körperkolloide. (Biochem. Ztschr. **154**. 321—27. 1924. Berlin, Univ.) SPIEGEL.

L. Grunmach und **G. Schweikert**, *Oberflächenspannung von Tetralin, Dekalin und Spindelöl*. Vff. bestimmten die Oberflächenspannung von Tetralin (Tetralin-Gesellschaft, Berlin), Dekalin (Firma J. D. RIEDEL, Berlin) u. Spindelöl (STERN & SINEBOERN, Hamburg). Die Unterss. wurden nach zwei Grunmachschen Methoden durchgeführt: 1. nach der Steighöhenmethode zwischen geeigneten Platten mit dem Capillarplattenapparat, 2. nach der Methode der Capillarwellen mit dem Capillarwellenapparat. Als Gesamtmittel ergab sich für Tetralin 3,493 mg/mm bei 18,3°, Dekalin 3,210 (18,8°), Spindelöl 3,171 (19,8°). — Schließlich wird gezeigt, wie die von V. DALLWITZ-WEGENER abgeleitete Formel (Best. des Randwinkels von Öl gegen Flächen aus verschiedenen festen Stoffen) korrigiert werden kann. (Ztschr. f. physik. Chem. **113**. 432—40. 1924.) K. WOLF.

Fred Fairbrother und **Harold Mastin**, *Untersuchungen über Elektroendosmose*. I. Die in der Zeiteinheit durch ein Diaphragma unter dem Einfluß eines elektr. Stromes hindurchgehende Menge Fl. μ ist nach PELLAT (PERRIN, Journ. de Chim. physique **2**. 601. [1904]) gegeben durch $\mu = qE\zeta\epsilon/4\pi\eta l$, in der E der Potentialabfall über die ganze Länge des Diaphragmas, ζ das Potential zwischen den beiden Teilen der Doppelschicht, ϵ die DE. der Doppelschicht u. q u. l effektiver Querschnitt u. Länge des Diaphragmas, η die Viscosität der Fl. ist. Vff. geben eine Methode u. Versuchsanordnung zur Best. von E an u. ermitteln gleichzeitig q nach $C = Ekq/l$, wo C die Stromstärke u. k die spezif. Leitfähigkeit von 0,1 n. KCl ist. In einer solchen Lsg. nehmen sie an, daß die vermehrte Leitfähigkeit auf Grund der „Oberflächenströme“ in den Capillaren (STOCK, Anzeiger f. d. Wiss. Krakau **1912**. A. 635; C. **1912**. II. 2009) zu vernachlässigen ist. An pulververtem Carborundum (blaue u. grüne Form) als Diaphragma mit NaOH u. HCl als Elektrolyten angestellte Verss. werden mit ausführlichem Zahlenmaterial wiedergegeben. Das elektrokinet. Potential hat ein Maximum in verd. NaOH. Carborundum hat gegen dest. W. ein Potential ζ von — 0,0698 V (Mittel aus 15 Bestst.). Im Gegensatz zu anderen Autoren (vgl. z. B. BRIGGS, BENNET u. PIERSON, Journ. Physical Chem. **22**. 256; C. **1921**. III. 1056) fanden Vff., daß Carborundum in HCl bis zu $1/50$ -n. keine Umkehrung der Richtung der Elektroosmose hervorbringt. (Journ. Chem. Soc. London **125**. 2319—30. 1924. Manchester, Univ.) HERTER.

H. Freundlich und Henry P. Zeh, *Über den Einfluß der Wertigkeit bei Koagulation und der Kataphorese*. (Vgl. Kolloid-Ztschr. **34**. 230; C. **1924**. II. 43 Kolloidchem. Beihefte **16**. 267; C. **1924**. II. 920.) Vff. messen die kataphoretische Wanderungsgeschwindigkeit der Kolloidteilchen eines As_2S_3 -Sols unter dem Einfluß komplexer Co-Salze, die in steigender Konz. zugesetzt wurden:



Mit den gleichen Elektrolyten wird auch der Koagulationswert γ bestimmt. Zur Ableitung des elektrokinet. Potentials ζ , bestimmen Vff. die Abhängigkeit von der Elektrolytkonz. c . Aus diesen ζ - c -Kurven ergeben sich für ein bestimmtes ζ diejenigen Konz. (α), die bei etwa diesem ζ -Wert den verschiedenen Kationen zugehören. Entsprechend der Freundlich'schen Adsorptionstheorie erweisen sich die α -Werte völlig in der gleichen Weise von der Wertigkeit der Ionen abhängig wie die Koagulationswerte. Besonders deutlich zeigten die 1—5-wertigen Kationen, daß diese in äquimolarer Konz. gleich stark adsorbiert werden, u. daß bei gleicher Koagulation äquivalente Mengen adsorbiert werden. Das 6-wertige Kation zeigt zu hohe γ - bzw. α -Werte. — Entsprechende Messungen stellen Vff. an einem Fe_2O_3 -Sol, unter dem Einfluß von Salzen mit komplexen Cyanionen an: $Au(CN)_4K$; $Pt(CN)_4K_2$; $Cu(CN)_4K_3$; $Fe(CN)_6K_3$; $Fe(CN)_6K_3$; $Fe(CN)_6K_4$. Auch hier war der Parallelismus zwischen den γ - u. α -Werten vollkommen. Die Annahme, daß die verschiedenen Anionen in äquimolarer Konz. gleich stark adsorbiert würden, erwies sich aber nur in ganz beschränktem Maße gültig. — Im Gegensatz zu früheren Messungen der Abhängigkeit des ζ -Potentials von der Elektrolytkonz., zeigten die von Vff. mit oben erwähnten Salzen gefundenen ζ - c -Kurven keinen anfänglichen Anstieg des ζ -Potentials. Vermutlich besitzt das reine As_2S_3 - bzw. Fe_2O_3 -Sol von vornherein einen hohen ζ -Wert. (Ztschr. f. physik. Ch. **114**. 65—88. 1924.) ULMANN, Berlin-Dahlem, Kaiser WILHELM-Inst.)

Claude Fromageot, *Adsorption und Kataphorese*. Die in der Arbeit von FROMAGEOT u. WURMSER (S. 627) zur Adsorptionsmessung benutzte Kohle wurde nun nach Vermahlen in einem Mörser in W. aufgeschwemmt u. ihre kataphoretische Wanderungsgeschwindigkeit gemessen. Die Meßmethode war die ultramikroskopische Beobachtungstrog war 0,5 mm tief. Die Suspension erwies sich als negativ, ihre Geschwindigkeit in reinem W. ($[H^+] = 3,16 \cdot 10^{-7}$) betrug $5,2 \cdot 10^{-4}$ cm/sec bei 1 V/cm Spannung. Eine Ansäuerung erniedrigt die Geschwindigkeit in dem Maße, in dem sie die $[H^+]$ erhöht; es konnte also — im Gegensatz zu Adsorptionsmessungen — kein individueller Unterschied zwischen HCl, Eg., Propion-, Ameisen-, Oxal-, Bernstein-, Brenztrauben- u. Citronensäure gemerkt werden. Ebenso wenig verschieden ist der Einfluß der Na-Salze derselben Säuren, obwohl ihre Adsorbierbarkeit verschieden ist. — Eine Umladung bewirken weder Säuren — es sei denn $[H^+] > 10^{-2}$ — noch ihre Na-Salze; sie wird dagegen leicht durch Krystallviolen (0,0001-molar) bewerkstelligt. Vfs. Erklärung: bei gleicher Anzahl der vom Teilchen adsorbierten Kationen wird von denselben eine größere Fläche in Anspruch genommen, wenn sie umfangreicher sind; infolgedessen bleibt für die negativen Ionen weniger Platz. (C. r. d. l'Acad. des sciences **179**. 1404—6. 1924.) BIKERMAN

B. Anorganische Chemie.

Georg-Maria Schwab und Sigmund Loeb, *Über rein elektrische Stickoxyd-bildung*. Da bei der B. von NO im Gebiet des Lichtbogens, wo erhebliche Energien verfügbar sind, sich die Gesetze der Thermodynamik nicht anwenden lassen, stellen Vff. eine näher beschriebene Apparatur her, wo N_2 u. O_2 in einem „kalten“ Gleichgewicht

trihogen, mit Oxydkathode bei 6 mm Druck, zur Rk. gebracht werden, wobei die thermodynam. NO-Konz. u. die Zerfallsgeschwindigkeit elektr. gebildeten NO verlässigt werden kann. Die gebildete NO-Menge wird chem.-analyt. bestimmt. Parallel. wiedergegebene Messungsergebnisse zeigen, daß die Bildungsgeschwindigkeit des NO zwischen 20 u. 80% N₂-Gehalte annähernd konstant ist, um außerhalb dieser Werte gegen 0 abzufallen. Die Zerfallsgeschwindigkeit des NO zeigt sich auf reproduzierbarer Weise von der Entladungsform abhängig. Für die Aktivierung der Komponente gilt, unabhängig von der Energieverteilung im Bogen, näherungsweise das opt. Absorptionsgesetz; dieses führen Vff. in einen kinet. Ansatz ein, der die Messungen wiedergibt:


$$10^8 \frac{dNO}{dt} = (1 - e^{-(27[N_2] + 0,9[O_2])}) \cdot \frac{27[N_2]}{27[N_2] + 0,9[O_2]} \cdot \frac{[O_2]}{0,05[O_2] + 0,001}.$$

Die erhaltenen Werte schließen Vff., daß ein großer Teil der vom O₂ aufgenommenen Energie nachträglich noch durch Stoß von Sauerstoffionen auf Stickstoffmoleküle der Aktivierung des N₂ dient. Die vom N₂ absorbierbare Energie, die das Absorptionsgesetz gilt, ist unter den Versuchsbedingungen nur ein geringer Teil der Stromenergie, während die Hauptmenge durch Aufprall auf die Elektroden verloren geht. (Ztschr. f. physik. Ch. **114**. 23—43. 1924. Berlin, ULMANN.)


E. H. Boomer, *Chemische Verbindung des Heliums*. Ähnlich der von MANLEY (1926) beschriebenen Methode versucht der Vf., durch Elektronenbombardement einer He-Atmosphäre in Gegenwart von Hg, J, S oder P-Dampf an einer mit fl. N₂ gekühlten Oberfläche He-Verbb. niederzuschlagen. Das He verschwand vollständig aus der Entladungsröhre u. trat erst wieder nach Erwärmung der Apparatur auf. Waren keine gekühlten Flächen vorhanden, dann verschwand das He nur zu einem sehr geringen Anteil. Es konnte einwandfrei nachgewiesen werden, daß das Verschwinden des He nicht auf Adsorption oder mechan. Okklusion zurückzuführen ist. Bei -185° haben diese He-Verbb. einen Dampfdruck von 0,05 mm. Hg. Verbb. mit Hg u. J wurden bei -70° wieder zersetzt u. das He zum ursprünglichen Betrag zurückgebildet. Die S u. P-Verbb. wurden bei -125° zersetzt. Die Verbb. mit Hg u. J sehen den reinen Elementen nicht ähnlich. Erst nach der Zersetzung werden diese als gewöhnliche Ndd. gebildet. Die P-Verbb. zersetzen sich zu elementarem P, während sich, wenn keine Rk. stattfindet, roter P niederschlägt. (Nature **105**. 6. Cambridge.)

BECKER.

Ennio Cambi, *Die Reaktion zwischen Arsensäureoxyd und Chlor*. Vf. untersucht die Einwirkung von Cl₂ auf festes As₂O₃ u. auf Mischungen von As₂O₃ mit W. bei verschiedenen Konz. In verd. Lsg. verläuft der Prozeß nach der Gleichung:



Die Einwirkung von Cl₂ auf festes As₂O₃ verläuft nach:



Vf. untersucht experimentell alle Möglichkeiten, besonders die Erlangung von hochkonz. Lsgg. von Arsensäure u. die gleichzeitige Produktion von AsCl₃. Ferner untersucht die Löslichkeit von AsCl₃ in konz. Lsgg. von Arsensäure u. die von HCl in Arsensäure bestimmt. Zum Schluß bringt Vf. techn. Einzelheiten über die Gewinnung von Ca-Arsenat u. über den Umsatz zwischen Tricalciumarsenat u. elementarem Pb-Salzen zur Gewinnung von techn. Pb-Arsenat. (Giorn. di Chim. ind. **1**. 6. 527—32. 1924. Pavia, Univ.)

GOTTFRIED.

Konstantin F. Hüttig und **Achilles Krajewski**, *Studien zur Chemie des Lithiums*. I. Über Lithiumhydrid. (II. vgl. HÜTTIG u. POHLE, Ztschr. f. anorg. u. allg. Chem. **138**. 1; C. **1924**. II. 2455.) Die Darst. von LiH erfolgte in einer Versuchsanordnung, die im wesentlichen der Anordnung von MOERS (vgl. Ztschr. f. anorg. u. allg. Chem. **113**. 179; C. **1921**. I. 557) mit dem horizontal liegenden Porzellanrohr

entspricht. Die Reinigung des H_2 wurde noch insofern verbessert, als er vor Eintritt in das horizontale Rohr durch 2 App. geleitet wurde, die im wesentlichen dem eigentlichen Darstellungsapp. mit vertikalem Rohr gleichen; der erste war mit reinem metall. Na, der zweite mit reinem metall. Li beschickt. Bei diesem Reinigungsverf. wird der H_2 gewissermaßen umdest., bei etwa $300-400^\circ$ wird er von Na genommen, bei höheren Temp. wieder abgegeben. Die Additionsrk. mit Li läuft anfangs sehr schnell. Das erhaltene Präparat hat einen etwas geringen Gehalt an H als der Formel LiH entspricht. Von Luft wird es bald angegriffen, es ließ sich auch nicht ohne Zers. sublimieren. Vff. messen die Wasserstoffdrücke des Lithiumhydrids. Die Ergebnisse sind in einer Tabelle zusammengefaßt u. in Druckkurven gezeichnet. Auch röntgenspektroskop. Aufnahmen von LiH sind gemacht. Eine Anordnung zum Einfüllen luft- oder feuchtigkeitsunbeständiger Präparate in das schmale dünnwandige Glasröhrchen, in dem die Substanz durch einen Strahl wird, ist abgebildet. Aus den Experimenten ergab sich, daß LiH bereits bei Zimmertemp. (25°) einen meßbaren Druck von $0,023\text{ mm}$ zeigt, was durchaus im Widerspruch steht zu dem von MOERS thermodynam. berechneten Wert $4,57 \cdot 10^{-22}\text{ mm}$ bei 13° . Bei Wasserstoffdrücken zwischen $0,001$ u. 1 mm sublimiert LiH bei 220° , das bei der teilweisen Zers. entstehende metall. Li ist schwerer flüchtig als LiH . Entzieht man dem Lithiumhydrid etwas Wasserstoff, so bleibt eine eigens als homogene Phase veränderlicher Zus. zurück. Das erklärt die Abweichungen der Werte von den auf thermochem. Grundlage unter der Voraussetzung der Existenz zweier Phasen konstanter Zus. berechneten Werten. Im Lithiumhydrid u. sein bei teilweisen Abbauprodukt besitzt ein Teil der gesamten negativen H-Ionen freie Beweglichkeit innerhalb des übrigen Krystallgitters u. hat demnach das Bestreben, das ganze Gittergerüst gleichmäßig auszufüllen. Bei weiterem Entzug von H_2 findet eine Art Entmischung statt, wobei metall. Li u. ein zweiter Stoff, der weniger Wasserstoff enthält, als der Formel LiH entspricht, entstehen. In das Gitter des metall. Li kann der Wasserstoff nicht eindringen. Einfacher gestalten sich die Verhältnisse beim absol. Nullpunkt, wo die Beweglichkeit aufhört u. die verschiedenen Gitterbestandteile feste Stellungen einnehmen müssen. Das Molekularvol. des LiH beim absol. Nullpunkt läßt sich aus der Unters. von GÜNTHER (Ann. der Physik [4] 63. 746; C. 1921. I. 647) über den Verlauf der spezif. Wärmer mit tiefen Temp. u. den von VALENTINER u. WALLOT (Ann. der Physik [4] 46. 37; C. 1915. I. 1049) gegebenen Beziehungen über die Abhängigkeit des Ausdehnungskoeffizienten fester Körper von der Temp. als Funktion der Atomwärme angeben. Es wird eine Formel aufgestellt, in der die durch Temperatursteigerung bedingte Volumenzunahme proportional der 3. Potenz der dabei zugeführten Wärme ist. Der lineare Ausdehnungskoeffizient wird darin übereinstimmend mit dem Ausdehnungskoeffizienten von dem LiH ähnlich konstituierten Verbb. (KCl , $NaCl$) zu $4 \cdot 10^{-6}$ bei $T = 213$ angenommen, was einem Volumenunterschied von nicht ganz 1% beim absol. Nullpunkt u. Zimmertemp. bedingt. Das Molekularvol. beim absol. Nullpunkt ergibt sich somit zu $9,8\text{ ccm}$, woraus die halbe Gitterkonstante, Abstand des Mittelpunktes eines Li^+ -Ions von einem H^- -Ion, zu $2,00 \cdot 10^{-8}\text{ cm}$ berechnet wird. Diese Größe ist kleiner als die bei allen anderen Alkalihalogeniden vom Steinsalztypus. Die Energietönung bei der Vereinigung von metall. Li mit gasförmigem H_2 nach $2Li + H_2 \rightarrow 2LiH$ ist nach MOERS $U_0 = 40775\text{ cal}$. Demnach wird beim absol. Nullpunkt durch Entnahme von 2 Atomen Li aus einem Aggregat von metall. Li die Entnahme von 1 Mol. H_2 aus einem Aggregat von gasförmigem H_2 u. Vereinigung dieser zu 2 Molekülen LiH u. Einverleibung dieser in ein Aggregat von kristallisiertem LiH ein Energiegewinn von $6,717 \cdot 10^{-20}\text{ cal}$. erzeugt. (Ztschr. f. anorg. allg. Ch. 141. 133—60. 1924. Jena, Univ.)

Erich Müller, *Das System Bleihydroxyd, Bleioxyd, Plumbit und Natronlauge*. (Verss. von **Erik Reißmann** und **Otto Ballin**.) (Vgl. Ztschr. f. physik. Ch. 110. 3. 1924. II. 1322.) Wird eine Lsg. von Bleiacetat in NaOH-Lsg. langsam eintreten, so resultiert ein Präparat, dessen Zus. zwischen $3\text{PbO} \cdot \text{H}_2\text{O}$ u. $2\text{PbO} \cdot \text{H}_2\text{O}$ dasselbe ist bis zu ca. 9-n. NaOH weiß, bei höher konz. Lsgg. verfärbt es sich nach oliv u. rot. Tabellar. wiedergegebene Löslichkeitsbestst. zeigen, daß die Löslichkeit des weißen Hydroxydes zu einem Maximum ansteigt um danach zu sinken über sehr lange Zeit nahezu konstanten Wert, abzusinken. In den Fällen, wo eine Verfärbung eintritt, sinkt die Löslichkeit von ihrem höchsten Anfangswert allmählich zu niedrigen Werten ab, die konstant werden, wenn der Bodenkörper vollständig oliv oder rot gefärbt ist. Mit der Verfärbung sinkt auch der Wassergehalt bis zu völligem Verlust. Durch Verss. zeigt Vf., daß die Verwandlung des Bleihydroxydes in gefärbtes PbO nur ein Geschwindigkeitsphänomen darstellt, anzunehmen ist, daß im Konzentrationsgebiet von 8,3–9-n. NaOH die Entfärbung eine sprunghafte Beschleunigung erfährt. Diese Grenze wird durch die Temp. verschoben, so daß die Umwandlung schon bei geringer Laugenkonzentration zu beobachten ist. — Je nach der Darst. der Oxyde sind die verschiedensten Färbungen zu beobachten, welche aber nicht einzelnen Modifikationen zuzuschreiben sind, sondern auf verschiedener Ausbildung der Krystalle beruhen. Ein aus wss. Lsg. im Eisschrank erhaltenes *Natriumphumbit* hat die Zus. PbO_2 oder Na_2PbO_2 . — Die Resultate der Löslichkeitsbestst. mit dem Hydroxyd, den beiden Oxyden u. dem Plumbit führen Vf. zur Konstruktion eines Gleichgewichtsdiagrammes, welches aber die Stabilitäts- u. Umwandlungsbedingungen für konz. Laugen abzulesen gestattet, während es für verd. noch Zweifel läßt. Die Verb. $\text{PbO} \cdot \text{H}_2\text{O}$ wird vom Vf. in kleinen weißen Krystallen aus der gesätt. Lsg. des wasserwärmeren Hydrates $3\text{PbO} \cdot \text{H}_2\text{O}$ erhalten. Erklärt wird diese, zum Teil befremdliche Erscheinung, durch Aufstellung einer Theorie, wonach die weißen Hydroxyde als unterkühlte feste Fl. aufzufassen sind. Auch aus dem *Natriumphumbit* u. dem oliven Oxyd ist letztes Hydroxyd darstellbar. (Ztschr. f. physik. Ch. 114. 129–56. 1924. Dresden.) ULMANN.

Saldau, *Gleichgewicht im System Gold-Zink. Auf Grund der Untersuchungen über die elektrischen Leitfähigkeit bei hohen Temperaturen*. Mit Hilfe der Methode der elektrischen Leitfähigkeit bei hohen Tempp. wird es möglich gemacht, Gleichgewichtstafeln von Legierungen in Gebieten kennen zu lernen, die bisher nicht zugänglich waren. Die durch Leitfähigkeitsisothermen dargestellten Resultate geben ein Bild von der Natur der Phasen veränderlicher Zus. u. die Temp.-Grenzen bzw. Umwandlungspunkte dieser Phasen lassen sich aus den Knicken auf den Widerstandskurven der einzelnen Proben bestimmen. — Man kann beobachten, daß drei Fälle vorkommen, wobei 1. auf den Isothermen ein Maximum der elektr. Leitfähigkeit nicht beobachtet ist, 2. das Maximum bei Veränderungen der Gleichgewichtsfaktoren des Systems unbeweglich ist u. auf der gleichen Ordinate bleibt, entsprechend dem mol. Verhältniß der Komponenten. Fehlt das Maximum, so haben wir es mit einem Fall zu tun, die nur von den Komponenten des gegebenen Systems gebildet werden; andererseits deutet ein unbewegliches Maximum auf Phasen, die gebildet werden aus den Komponenten und dem nichtdissoziierten chem. Individuum. Die Leitfähigkeitsisothermen dienen somit zur sicheren Erkennung, ob die betreffende Phase veränderlicher Zus. ein chem. Individuum enthält. Als 3. Fall kann das Maximum beweglich sein u. strebt bei Erniedrigung der Temp. zur Ordinate, die die mol. Verhältnisse des die betreffende Phase bildenden chem. Individuums entspricht. Diese Phasen haben sich aus dem bis zu einem gewissen Grade dissoziierten chem. Individuum u. den Komponenten gebildet. Die Natur der festen Phasen kann also auf Grund der elektr. Leitfähigkeit bei hohen Tempp. erkannt

werden; es ist möglich, die Zus. des chem. Individuums sowohl im undissoziierten wie auch im dissoziierten Zustand zu ermitteln.

Die Leitfähigkeitsisothermen der untersuchten Proben weisen drei Maxima entsprechend den Atomverhältnissen $\text{Au} : \text{Zn} = 3 : 1, 1 : 1, 1 : 3$. Am schärfsten ausgeprägt ist das Maximum mit dem Atomverhältnis $1 : 1$. Es behält die Kurve auf der betreffenden Ordinate bei allen Temp. bis zum F. bei, woraus auf ein undissoziiertes chem. Individuum, das Monoaurid des Zn (AuZn) geschlossen werden kann. Die beiden anderen Maxima, untereinander verschieden, haben die gleiche Eigenschaft, oberhalb einer bestimmten Temp. gänzlich zu verschwinden. Die beiden Maxima sind umkehrbar. In den Gebieten, die dem Verschwinden der Maxima entsprechen, entstehen demnach neue Phasen im festen Zustand. — Das dem Atomverhältnis $\text{Au} : \text{Zn} = 1 : 3$ entsprechende Maximum behält seine Lage bis 600° , verschwindet dann u. die Isothermen haben dann die Form gleichmäßiger Kurven. Bei 37 Atom-% Zn u. etwas unterhalb 600° (γ -Lage) scheidet sich demnach ein bestimmtes chem. Individuum AuZn_3 in festem Zustand aus, welches bei weiterer Erniedrigung der Temp. eine neue Phase γ_1 veränderlicher Zus. bildet, die bei etwa 250° eine zweite Modifikation γ_2 ausscheidet, welche bei Temp. unter 250° stabil ist. — Komplizierter ist das Maximum, welches dem Atomverhältnis $\text{Au} : \text{Zn} = 3 : 1$ (25 Atom-% Zn) entspricht. Im Gebiet der Phase α bei einer Temp. von etwa 420° scheidet sich beim Abkühlen ein bestimmtes chem. Verb. Au_3Zn aus, die bei weiterer Erniedrigung der Temp. eine Phase α_1 bildet u. weiterhin bei 270° eine erneute Umwandlung in eine Modifikation α_2 erleidet. AuZn existiert wahrscheinlich auch in fl. Zustand u. scheidet sich aus der fl. Phase unmittelbar aus. Au_3Zn u. AuZn_3 sind nur in festem Zustand stabil u. scheiden sich aus der festen Phase veränderlicher Zus. bei niedriger Temp. aus. — Um die Grenzen der verschiedenen Zustände genauer zu bestimmen war es notwendig, die Umwandlungspunkte der Schmelzproben zu bestimmen, die dann auf das Schmelzdiagramm aufgetragen werden. Doch sind Diskontinuitäten an den Grenzen zum Beispiel bei dem System mit 32% Zn durch Stufen auf den Isothermen erkennbar. Auf die weniger erkennbaren Beziehungen zwischen Eutektica, Peritektica u. Leitfähigkeit wird hingewiesen. Auch aus dem Diagramm der Temp.-Leitfähigkeit des elektr. Widerstands sind sehr deutlich die drei Maxima u. somit die Existenz von Au_3Zn , AuZn u. AuZn_3 im System Au-Zn zu erkennen.

Die im Widerspruch zu den obigen Ergebnissen stehenden Befunde von R. VOGEL (vgl. Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. **48**. 319; C. **1906**. I. 1148) auf andere Wege werden vom Vf. auf Grund einer eingehenden thermoanalyt. Nachprüfung diskutiert. Die von VOGEL angegebene Verb. Au_3Zn_5 existiert bestimmt nicht, was auch durch Mikrostruktur bestätigt wurde. Auch die Abkühlungskurven zeigen, daß in den festen Phasen Umwandlungen komplizierter Art vor sich gehen. Die Bestätigung für die Umwandlung bei 400° im Gebiet der α -Phase u. bei 500° im Gebiet der γ -Phase wird dadurch ermöglicht, jedoch nicht für die aus den Leitfähigkeitsisothermen hergeleitete Umwandlung bei 250° . Die Umwandlungspunkte u. die Stabilitätsverhältnisse im Gebiet der α -, γ - u. ε -Phase sind in Kurvenblättern veranschaulicht. Durch Mikroanalyse (Photogramme der Schiffe im Original gegeben) konnten die Ergebnisse der Leitfähigkeitsunters., wie auch der therm. Unters. bestätigt werden. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. **141**. 325—62. St. Feinberg, Berginst.)

C. Mineralogische und geologische Chemie.

R. Brauns, Alfred Bergeat †. Nachruf für den am 30. Juli 1924 in Kiev verstorbenen Petrographen u. Vulkanologen. (Zentralblatt f. Min. u. Geol. **1925**. 705—11. Bonn.)

ENSZIN.

Groth, *Zur Geschichte der Krystallkunde*. Kurzer Abriß der Geschichte physikal. Krystallographie insbesondere der Entdeckung des Gesetzes der Ähnlichkeit der Krystallindices. (Naturwissenschaften **13**. 61—66. München.) **BEHRL.**
Alfred Schoep, *Dumontit, ein neues radioaktives Mineral*. (Bull. Soc. Chim. **leue** **33**. 525—26. 1924. — C. **1925**. I. 354.) **BEHRLE.**

Georg Kalb, *Erzmikroskopische Untersuchung von Magnetit und Eisenglanz*. Magnetit ist im Anschliff braun u. weicher als Eisenglanz. Er läßt sich mit konz. HCl sehr schön ätzen. Eisenglanz ist im Anschliff weiß, stark doppelbrechend. Ätzung geschieht entweder mit verd. HCl in der Hitze oder konz. HCl in der Kälte (Zentralblatt f. Min. u. Geol. **1924**. 712—16. Köln, Univ.) **ENSZLIN.**

Valdemar T. Schaller, *Das Vorkommen und die Eigenschaften des Sincosits, eines neuen vanadiumhaltigen Minerals von Sincos, Peru*. Sincosit, ein grünlisches Mineral, daß in amorpher u. krystallisierter Form vorkommt, hat die Zus. $V_2O_4 \cdot O_2O_5 \cdot 5H_2O \cdot D. 2,84$. Die Krystalle sind tetragonal, optisch ein- u. zweiaxig u. zeigen starken Pleochroismus von farblos über hellgelb nach graugrün. Der einachsigen ist α 1,655; β 1,680 u. γ 1,685. Für die zweiaxigen α 1,675; β 1,690 u. γ 1,693. Beim Erhitzen wird das Mineral dunkelbraun u. schwarz oxidiert. Dabei tritt ein Sublimat von Se auf. L. in verd. Säuren mit blauer Lösung (Amer. Journ. Science, **SILLIMAN** [5.] **8**. 462—80. 1924. Washington.) **ENSZ.**
Henry S. Washington, *Die Radial-Verteilung gewisser Elemente in der Erde*. Berechnet Zahlen für den prozentualen Gehalt der einzelnen Erdschalen an Si u. O_2 . Der Ni-Fe-Kern enthält weder Si noch O_2 , dagegen sollen Karbid- u. Phosphide u. Sulfide vorhanden sein (Silicide? Anm. des Ref.). Im übrigen ist der Gehalt an Si u. O_2 nach der Oberfläche hin zu. (Journ. Washington Acad. of Sciences **14**. 435—42. 1924.) **ENSZLIN.**

H. Scheumann, *Prävariskische Glieder der sächsisch-fichtelgebirgischen krytallinen Schiefer. I. Die magmatisch orogenetische Stellung der Frankenger Gneise*. (Abhdlgg. d. Sächs. Akad. d. Wissenschaften Mathemat.-physisch. Kl. **39**. 1924. Leipzig. Sep.) **ENSZLIN.**

Petrascheck, *Studien zur Geochemie des Inkohlungsprozesses*. Es wurde der Einfluß untersucht, den die Mächtigkeit des Deckgebirges auf die Kohlenqualität hat. Der Einfluß der Teufe wirkt sich vor allem in der Abnahme des Sauerstoffgehalts aus. Die Gültigkeit der Hilttschen Regel konnte in keinem Revier mit mesozoischen u. tertiären Steinkohlen nachgewiesen werden. Alter u. Vegetation sind von ausschlaggebendem Einfluß auf die Kohlenqualität, was die Kohle von Rußland am deutlichsten zeigt. Somit ist der Gebirgsdruck der wesentlichste Faktor für den Inkohlungsprozeß. (Montan. Rdsch. **17**. 17. Ztschr. Dtsch. Geol. Gesellsch. **B. 76**. 200—14. Leoben.) **WILKE.**

Vegard, *Das Nordlichtspektrum und die höheren Atmosphärenschichten*. (Ztschr. **25**. 685—89. 1924. — C. **1924**. II. 169. 1907. 2450.) **BECKER.**

C. Mc Lennan, *Über die Luminescenz von festem Stickstoff und Argon*. Vf. stimmt sich gegen VEGARDS (S. 355) Deutung des Nordlichtspektrums u. führt aus seiner früheren Arbeit (Mc LENNAN u. SHRUM, Proc. Royal Soc. London, Serie A **138**; C. **1924**. II. 1565) Zahlen an, welche kleinere Unstimmigkeiten mit den Beobachtungen VEGARDS ergeben. Vf. zieht den Schluß, daß die grüne Nordlichte nicht von festem N_2 herrühren könne, u. daß die experimentellen Bedingungen, unter welchen sie entsteht, noch nicht erzielt sind. (Nature **115**. 46—47. Toronto, 1924.) **BECKER.**

D. Organische Chemie.

Howard J. Lucas und **Archibald Y. Jameson**, *Elektronenverschiebung in Kohlenstoffverbindungen. I. Elektronenverschiebung gegen abwechselnde Polarität in Kohlenwasserstoffen*. **I. 1.**

[Original. — *Methylester*, $C_9H_{16}O_4S_2$, Kp.₁₅ 207—208°, D.₄¹⁶ 1,210. — *Äthylester*, $C_{11}H_{20}O_4S_2$, Kp.₂₃ 224—225°, D.₄¹⁶ 1,143. — *Amid*, $C_7H_{14}O_2N_2S_2$, unl. in k. W., wird in k. W. zum NH_4 -Salz hydrolysiert; F. 127°. — $C_7H_{10}O_4S_2Na_2 + H_2O$; Blätter, Doppelbrechung NaD 0,028. $C_7H_{11}O_4S_2Na$, deutliche Doppelbrechung; D.₂₀²⁰ 1,568. — $C_7H_{10}O_4S_2K_2 + H_2O$: Doppelbrechung NaD 0,035; D.₂₀²⁰ 1,700. — Übersaures Salz $C_7H_{10}O_4S_2K_2$, $2C_7H_{12}O_4S_2$: F. 147—149°. — $C_7H_{10}O_4S_2Rb_2$, $2C_7H_{12}O_4S_2$: F. >160° (schmelzbar). — $2C_7H_{10}O_4S_2Cs_2$, $5C_7H_{12}O_4S_2$: F. ca. 130°. — $C_7H_{10}O_4S_2Ba + \frac{1}{2}H_2O$. — $C_7H_{10}O_4S_2Mg + 4H_2O$. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58. 53—56.) BUSCH.

Frederick George Mann und **William Jackson Pope**, *1,2,3-Triaminopropan* und seine komplexen Metallverbindungen. Im Sinne der Koordinationstheorie von WERNER dürften von den dem Hexamminkobaltchlorid $[Co(NH_3)_6]Cl_3$ entsprechenden Verbindungen des 1,2,3-Triaminopropan, den *Bistriaminopropankobaltchloriden*, $[Co(NH_2 \cdot CH_2 \cdot (NH_2) \cdot CH_2 \cdot NH_2)_2]Cl_3$, isomere Verbb. existieren, die zum Teil in opt.-akt. Formen spaltbar sein müssen. Um *1,2,3-Triaminopropan* in größeren Mengen zu erhalten, wird von den Vff. ein Verf. mitgeteilt, das in seinen einzelnen Phasen noch unbekannt ist, aber von den untersuchten Methoden als beste erkannt wurde. *Triaminopropansäure* wird in *Acetondicarbonsäure* übergeführt, letztere in *Di-i-nitrosoaceton*, welches mit $SnCl_2$ zu *Diaminoacetondihydrochlorid* reduziert wird. Über die *Diacetyltriaminopropansäure* wird das entsprechende Oxim erhalten u. mit Al-Amalgam zum *Trihydrochlorid*, $[ON_3]Cl_3$, des 1,2,3-Diaminopropan reduziert. — *Trihydrobromid*, $C_3H_{14}N_3Br_3$, gelbe Nadeln vom F. 307—310° (Zers.). — Die freie Base zeigt den Kp.₁₅ 105—110°. — *Diaminopropanrhodochlorid*, $C_3H_{18}O_2N_3Cl_6Rh$, aus Triaminopropantrihydrochlorid und Natriumchlorid rote Krystalle bis 310° beständig. — *Triacetyltriaminopropan*, $C_{18}H_{24}N_3O_6$, aus A., F. 200—202°. — *Tribenzoyltriaminopropan*, $C_{24}H_{23}O_3N_3$, F. 217—218°. — *Diaminoacetoximidihydrochlorid*, $C_3H_{11}ON_3Cl_2$, aus Diaminoacetondihydrochlorid u. Hydroxylamin in alkal. Lsg., lange, farblose Nadeln vom F. 207° (Zers.). — *Acetyldiaminoacetophenylhydrazon*, $C_{18}H_{18}O_2N_2$, farblose Krystalle vom F. 115—118° aus Essigester. — *Acetylaminomethylglyoxalosazon*, $C_{17}H_{19}ON_5$, gelbe Nadeln vom F. 186°.

Mit 3-wertigen Metallen der achten Gruppe des period. Systems werden komplexe Salze gebildet. Untersucht wurden solche des Co u. des Rh. In nachfolgenden Tabellen soll „ptn“ ein Mol. Triaminopropan bedeuten. — *Bispropantriemininkobalttrichlorid*, $[Co ptn_3]Cl_3$, orangefarbene Krystalle aus h. W., F. 312—314° (Zers.). — *Bispropantriemininkobalttrijodid*, $[Co ptn_3]J_3$, orangebraune Nadeln bis 320° beständig, unl. in A., l. in h. W. — *Bispropantriemininkobaltplatinichlorid*, $[Co ptn_3]_2, 3PtCl_6$, orangebraune Nadeln, 130° wasserfrei, F. 270° (Zers.). — *Bispropantriemininkobalttrijodid*, $[Rh ptn_3]J_3$, cremefarbene Krystalle bis 300° beständig. — *Bispropantriemininkobaltplatinichlorid*, $[Rh ptn_3]_2, 3PtCl_6, 4H_2O$, orangefarbene Krystalle, unl. in h. W., schm. wasserfrei bei 328° (Zers.). — *Bispropantriemininkobalttrichlorid*, $[Rh ptn_3]_2, RhCl_6, 4H_2O$, grau amorphes Pulver, wl. in W., bis 310° beständig. (Royal Soc. London Serie A 107. 80—92.) HORST.

Reiner, Über den Verlauf der Acetaldehydoxydation. II. Mitteilung über den Mechanismus. (I. vgl. Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 127. 187; C. 1923. 135.) In einer Mischung von *Acetaldehyd* u. H_2O_2 erfolgt eine beträchtliche Abnahme der Molekülzahl, ohne daß sich die Eigenschaften der Komponenten ändern. Die Abnahme war stark abhängig von dem Verhältnis Aldehyd/ H_2O_2 u. war am stärksten bei deren Verhältnis 2:1 in Molen. Die beiden Komponenten bilden demnach ein Additionsprod. der Zus. $(Aldehyd)_2 \cdot (H_2O_2)_1$, dessen Menge sich bei 0° nach 24 Stn. langem Stehen nicht mehr ändert u. 80% der Theorie beträgt. Auch in verd. von Essigsäure ist die Abnahme der Molekülzahl dieselbe; diese nimmt also teil an der B. des Additionsprod. WIELAND (vgl. LIEBIGS Ann. 431. 301; 433. III. 826) schreibt dem *Diacetalhydroperoxyd*, das mit dem vorliegenden

Additionsprod. ident. ist, eine große Bedeutung zu bei der Weiteroxydation des Aldehyds zu Essigsäure. Ausgehend von letzterer Verb. wird nach den Bestimmungen des Vfs. mehr Essigsäure gebildet als H_2O_2 verbraucht war. Die Reaktionsgeschwindigkeit der Aldehydoxydation ist bedeutend größer als die etwaiger Nebenreaktionen u. auch abhängig von der Konz. des Additionsprod. Die B. der „überschüssigen Essigsäure“ geht durch das Zwischenprod. Auf Grund der experimentellen Beobachtung muß die B. eines zweiten Additionsprod. angenommen werden. Die Rk. von Diacetalhydroperoxyd $\rightarrow$ Essigsäure ist keine einfache von bestimmter Ordnung, etwa: Diacetalhydroperoxyd + Aldehyd $\rightarrow$ Essigsäure = 2 Aldehyd. Vielleicht muß das Additionsprod. mit dem Aldehyd reagieren, entsprechend dem Reaktionsschema: $(\text{CH}_3\text{COH})_2 \cdot \text{H}_2\text{O}_2 + \text{CH}_3 \cdot \text{COH} \rightleftharpoons (\text{CH}_3\text{COH})_3 \cdot \text{H}_2\text{O}_2$ (Additionsprod.) weiterhin durch O_2 zu 3 Moll. Essigsäure gemäß: $(\text{CH}_3\text{COH})_3 \cdot \text{H}_2\text{O}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 3 \text{CH}_3\text{COOH}$.

Ein Teil des H_2O_2 wird demnach als solches verbraucht, der Rest zerfällt in H_2O u. O_2 , welches letzterer vom Additionsprod. II absorbiert wird. Aus diesen Gleichungen wird auch erklärlich, warum viel H_2O_2 die Reaktionsgeschwindigkeit in geringem Maße hemmt, da H_2O_2 die Konz. des $(\text{CH}_3 \cdot \text{COH})_2 \cdot \text{H}_2\text{O}_2$ vermindert, die akt. Menge des Aldehyds verringert. Es konnte auch bewiesen werden, daß tatsächlich molekularer O_2 in der Rk. teilnimmt, indem dieser nach Möglichkeit entfernt wurde, wodurch bei einzelnen Verss. die Menge der überschüssigen Essigsäure um mehr als 50% abnahm. Entgegen den früheren Auffassungen nimmt also die Essigsäure in der Rk. nicht teil. Die Oxydation des Aldehyds mit H_2O_2 ist eine *Autoxydation*. Vf. konnte keinen prinzipiellen Unterschied zwischen nasser u. trockener Autoxydation feststellen, die hier als eine intramolekulare Umlagerung erfolgt. Die Konst. des Additionsprod. II ist noch unaufgeklärt. — Sicher erscheint zu sein, daß die Oxydation durch O_2 erfolgt, selbst in Ggw. von H_2O in wss. Lsgg. Der Mechanismus der Rk. entspricht einer mehrstufigen Folgereaktion. Die Einw. von O_2 erfolgt erst nach der B. des Additionsprod. II aus Aldehyd u. Diacetalhydroperoxyd. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. **141**. 363—74. Pécs [Univ. Hor.])

Karl Pankoke, Über β, β' -Dioxyadipinsäure. Verss. zur Darst. des Esters aus Glyoxal durch Zn u. Bromessigester scheiterten an der vor Eintritt der Reaktion folgenden Polymerisierung des Glyoxals, das dann nicht reagierte, Verss., auch der Red. von Glyoxylsäure zu Traubensäure (vgl. GENVRESSE, C. r. d. l'Académie des sciences **114**. 555 [1892]) Na-Formylessigester zum gewünschten Ester zu reduzieren an der bisher unbekannten Spaltung jenes Esters in der stark alkal. Lsg. zu Ameisen- u. Essigsäure. Oxalyldimalonsäureester, $\text{C}_{16}\text{H}_{22}\text{O}_{10}$, wurde aus Oxalchlorid u. Na-Malonester nach CONRADS Verf. (LIEBIGS Ann. **204**. 129 [1880]) in sehr geringer Ausbeute gewonnen, mit besserer (bis ca. 22%) aus der Lsg. von Na in absol. äth. Lsg. des Malonesters gewonnen. Dunkelbraunes, grünlich fluoreszierendes Öl, durch FeCl_3 blutrot, durch Alkali unter B. von CO_2 völlig emulsiert. Dieser Ester ließ sich mit amalgamiertem Al in feuchtem Ä. leicht zu Dioxyadipinsäureester reduzieren, hellgelbem, nicht krystallisierbarem, im Vakuum nicht destillierbarem Öl. Die zugrunde liegende Dioxyadipinsäure lieferte ein Ba-Salz $\text{C}_6\text{H}_5(\text{Ba})_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$, amorph u. nicht zerfließlich, das sein H_2O bei längerem Stehen an Luft nasssam, schließlich im Vakuum über H_2SO_4 vollständig abgab, scheint danach nicht die Säure von PRZYBYTEK (Journ. Russ. Phys.-Chem. Ges. **18**. 429 [1886]), nicht aber mit der von LIMPRICHT (LIEBIGS Ann. **165**. 267 [1873]) ident. zu sein. Die reine Säure wurde durch Eindampfen der Lsg. bei 40° als gelblicher, auch in Sirup erhalten, der bei längerem Stehen im Vakuumexsiccator geringe Mengen winziger Kryställchen abschied. Der Ester ließ sich in Chlf. durch PBr_5 in β, β' -Dibromadipinsäureester überführen, der bei Erhitzen mit alkoh. KOH Muconsäureester


Versuchsteil. β, β' -Dioxy- α -piperidon- β -carbonsäurelacton, $C_6H_7NO_4$, Darst. **III** durch Erwärmen mit einer wss. Lsg. von $KHCO_3$, bis zum Aufhören der CO-Entw.; dann Eindampfen bis Sirupkonsistenz; Rückstand mit *Perchlorsäure* versetzen (20%ig. Lsg.). Tafeln oder Prismen, F. 222–223° (Zers.) aus h. W., wl. u. Ä. — δ -Amino- α, γ -dioxyvaleriansäure, $C_5H_{11}NO_4$ (**V**) aus **IV** durch Erhitzen mit 10% H_2SO_4 im geschlossenen Rohr bei 120° (4 Stdn.), ll. in W., Abscheidung durch Zusatz von A, Sternchen vom F. 183–186°. — *Pikrat*, $C_5H_5NO_3 \cdot C_6H_2 \cdot (NO_2)_3$, F. 181°. — *Cu-Salz*, $C_{10}H_{16}N_2O_3Cu_3 + 8H_2O$. — *Tribenzoylverb.* $C_{26}H_{23}NO_7$, aus A. u. Lg., F. 150°. — β, β' -Dioxy- α -piperidon, $C_5H_9NO_3$ (**VI**), aus **V** durch trockenes Erhitzen (20 Min., 185°); aus A. u. Essigester Prismen, F. 118 bis 119 mit 15%ig. H_2HO_4 3 Stdn. auf 140° erhitzt: Übergang in **V**. — δ -Methylamino-*valerolacton- α -carbonsäuremethyramid*, $C_8H_{14}N_2O_3$ (**VIII**). Blättchen aus A. vom F. 50°, unl. in Ä. u. Aceton. — *N-Methyl- β -brom- β' -oxy- α -piperidon- β -carbonsäurelacton*, $C_7H_8BrNO_3$, aus A. Nadeln vom F. 193°. Nebenher entsteht das Bromhydrat des bromierten **VIII**, $C_8H_{13}BrN_2O_3 \cdot HBr$, aus verd. A. Nadeln vom F. 171°. — *N-Methyl- β, β' -dioxy- α -piperidon- β -carbonsäurelacton*, $C_7H_9NO_4$, aus voriger Verb. durch Kochen mit verd. wss. Lsg. von $KHCO_3$ u. dann Zusatz von Perchlorat; aus

A. Prismen vom F. 155°. — δ -Methylamino- α,γ -dioxvaleriansäure, $C_6H_{13}O_4$ F. 190—193°; bildet auch ein blaues Cu-Salz. (LIEBIGS Ann. **440**. 167—76. 22. Berlin, Univ.)

Maurice Duncan Farrow und **Christopher Kelk Ingold**, Von der Beweglichkeit einer Hydroxylgruppe abhängige Tautomerie. I. Triadensysteme in offenen Ketten. Vff. untersuchen, ob eine OH-Gruppe beweglich u. dadurch zu einem akt. Tautomerisystem (A) $[OH]X \cdot Y : Z \rightleftharpoons X : Y \cdot Z \cdot [OH]$ Veranlassung geben kann. Wie aus dem Beispiel des Übergangs von 1-Oxyindol-2-carbonsäure in Indoxylsäure abgeleitet werden kann, ist weiterhin die Möglichkeit, das Tautomerisystem von einem beweglichen H-Atom (anstatt OH) abhängig zu machen, zur Prüfung zu unterziehen. Es kann daher ebensogut ein System (B) mit Ringketten tautomerie möglich sein: $[H]O \cdot X \cdot Y : Z \rightleftharpoons X \cdot \overset{Y[H]}{\underset{O}{\text{>}}} \cdot Z \rightleftharpoons X : Y \cdot O[H]$. Deutlich

untersuchten Vff. das System der N-Oxyamidine, deren hypothet. Ringzwischenglieder bereits durch INGOLD (vgl. Journ. Chem. Soc. London **125**. 87; C. **192**. 1187) untersucht waren. (Dort auch Nomenklatur.) Die Amidine selbst sind als tautomere Verbb. bekannt. In dem Methoxymethylenverb. vom Typus $Ar \cdot N : H \cdot OCH_3$ mit Hydroxylamin kondensiert wurden, nach der Gleichung:

$Ar \cdot N : CH \cdot OCH_3 + NH_2 \cdot OH = Ar \cdot N : CH \cdot NH \cdot OH + CH_3OH$ gelangten Vff. zu den für die Unters. geeignet scheinenden isomeren Verbb. in bekannter Lage der Doppelbindung: $Ar \cdot N(OH) \cdot CH : N \cdot Ar'$ u. $Ar \cdot N : CH \cdot N(OH) \cdot Ar'$. Doch ergaben die Spaltungsverss. keinen Anhalt für einen gegenseitigen Übergang. Jedes Isomere gab eigene Spaltprodd. — Die nicht umkehrbare Zers. eines Isomergbildes in ein oder das andere der nach System B angedeuteten Prodd. ließ den Weg gangbarer erscheinen. Nach der Gleichung C:





könnte der gleiche Ring auf zwei verschiedenen Wegen gebildet werden. Dennoch wäre zwar die Ringstruktur, aber noch nicht die symmetr. Struktur erwiesen. Um dies nachprüfen zu können, war die umgekehrte B. der beiden Verbb. in Gleichung über Verbb. mit symmetr. Struktur nachzuweisen, da die beiden Prodd. der Isomere zers. mit einem der oben erwähnten Oxyamidine ident. sein mußten. Für die Beweglichkeit einer OH-Gruppe über ein 4-gliedriges Ringsystem ließen die Verss. keine Belege erbringen.

Versuchsteil. *N'*-Phenyl-*N*-oxy-*N*-*p*-tolylformamidin, $C_{14}H_{14}ON_2$ (I), aus *p*-Tolylhydroxylamin u. Methoxymethylenanilin durch Erhitzen (50—60°, $\frac{1}{2}$ Stde. in methylalkoh. Lsg.; Nadeln aus verd. A. F. 151—152° (im Vakuumexsiccator; trocknet 3 Tage F. 158° aus Bzl.). Verss. zur Überführung in das Isomere nach System B durch Kochen mit verd. Säuren, Alkalien u. W. waren erfolglos. — *Monohydrat*, Nadeln aus verd. A. F. 142°. — *Cu*-Verb., aus sd. Xylol in Nadeln von schokoladebrauner Farbe u. F. 249° (Zers.). — *Hydrochlorid*, Nadeln aus sd. F. 196° (Zers.). — Die Zers. von I mit alkalk. Mitteln liefert *p*-Azoxytoluol, Ameisensäure u. Anilin. — *N*-Phenyl-*N*-oxy-*N'*-*p*-tolylformamidin, (II) aus Methoxymethylen-*p*-toluidin u. Phenylhydroxylamin; aus verd. A. oder Bzl. F. 130—140°. Nach dem Trocknen aus Bzl. F. 151°. Diese Verb. ist ident. mit dem früher (vgl. INGOLD u. WEAVER, Journ. Chem. Soc. London **125**. 1456; C. **1924**. II. 1350) beschriebenen Phenyltolylmethylenoxadiimin; Eigenschaften wie das Isomere. Überführung in das Isomere erfolglos. — *Monohydrat*, Nadeln vom F. 138°. — *Cu*-Verb., rotbraune Nadeln aus Xylol F. 253°. — *Hydrochlorid*, Blättchen aus Eg. vom F. 200° (Zers.). — Die Zers. von II mit Alkalien liefert Azoxybenzol, Ameisensäure u. *p*-Toluol. — *N*-*p*-Chlorphenyl-*N*-oxy-*N'*-*p*-bromphenylformamidin, $C_6H_4Cl \cdot N(OH) \cdot CHN \cdot C_6H_4Br$, (III), aus Methoxymethylen-*p*-bromanilin u. *p*-Chlorphenylhydroxylamin

alkoh. Lsg. ($\frac{1}{2}$ Stde. auf dem Wasserbad bei 60° erhitzt); aus Bzl. Nadeln vom F. 171° . — *Cu-Deriv.*, aus Xylol carmoisinrote Nadeln vom F. 275° . — *Hydrochlorid*, aus Eg. Blättchen vom F. 260° . — Die Zers. von **III** mit Alkalien ergab *Acetyl* von *p,p'*-Dichlorazoxybenzol, *p*-Bromanilin u. Ameisensäure. — *N'-p-Chlorphenyl-N-oxy-N-p-bromphenylformamidin*, $C_6H_4 \cdot Br \cdot N(OH) \cdot CH : N \cdot C_6H_4Cl$, (**IV**) durch Kondensation von *Methoxymethylen-p-chloranilin* u. *p-Bromphenylhydroxylamin* in alk. Lsg. bei 60° ; aus Bzl. F. 168° ; der größte Teil wird nur als Hydrat gewonnen; **IV** ist im Gegensatz zum Isomeren **II** in h. Bzl. u. bildet rasch mit W. ein Hydrat. — *Hydrat*, Nadeln aus verd. A. F. $144-145^\circ$. — *Cu-Deriv.*, schokoladefarbene Nadeln aus h. Xylol vom F. 255° . — *Hydrochlorid*, Blättchen aus Eg. vom F. 250° . — Die Zers. von **IV** liefert *p,p'*-Dibromazoxybenzol, *p*-Chloranilin u. Ameisensäure. (Journ. Chem. Soc. London **125**. 2543—53. 1924. South Kensington, College of Science and Technol.) HORST.

Richard Anschütz und Gustav Schultz, Über die Konstitution der beiden isomeren Dehydro-thio-m-xylylidine. Für die aus m-Xylidin durch Erhitzen mit S früher (Ber. Dtsch. Chem. Ges. **22**. 580; C. **89**. I. 425) hergestellten isomeren Basen wurde die Konst. I u. II. nachgewiesen. — Die bei $120-121^\circ$ schm. *Isodehydro-thio-m-*



xylylin ist μ -3-Methyl-6-aminophenyl-m-xylothiazol, $C_{10}H_{16}N_2S$ (**II**); strohgelbe Nadeln aus Amylalkohol. *Acetylverb.*, $C_{18}H_{18}ON_2S$, F. $201-202^\circ$, Nadeln aus A. — **II** zerfällt bei der Spaltung mit KOH in 3,5-Dimethyl-2-aminothiophenol u. asymm. o-Aminothiazolylsäure, $C_8H_9O_2N$, F. 177° ; Chlorhydrat: F. 207° . — Die bei 107° schm. *Dehydrothio-m-xylylin* ist μ -3-Methyl-4-aminophenyl-m-xylothiazol (**I**) u. gibt mit KOH 3,5-Dimethyl-2-aminothiophenol u. *p*-Amino-m-toluylsäure, $C_8H_9O_2N$; F. 170° . $(C_6O_2N)SO_4H_2 + 2H_2O$. — **I** gibt substantiv Baumwollfarbstoffe, sein Aminyl steht in *p*-Stellung zum μ -C-Atom des Thiazolringes, während das von **II** in *m*-Stellung steht u. keine substantiven Baumwollfarbstoffe liefert. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. **58**. 64—66. Bonn u. München.) BUSCH.

L. W. Rosenmund und G. Jordan, Über den Reaktionsmechanismus bei der katalytischen Reduktion von Oximen und Nitrilen und über eine neue Methode zur Gewinnung sekundärer Amine. GULEWITSCH (Ber. Dtsch. Chem. Ges. **57**. 1645; C. **24**. II. 2399) hat bei der Prüfung der Theorie von ROSENMUND u. PFANHAUSEN (Ber. Dtsch. Chem. Ges. **56**. 2259; C. **1924**. I. 177) über die B. von sek. aus prim. Aminen $2R \cdot NH_2 \rightarrow R_2NH + NH_3$ übersehen, daß der in Frage kommende Reaktionsmechanismus stattfinden soll, so lange sich das Reaktionsprod. noch innerhalb der Wirkungssphäre des Katalysators befindet. — Benzylamin gibt mit $BaSO_4$ -Pd-Katalysator im H_2 -Strom in sd. Xylol Dibenzylamin, im Luftstrom statt in H_2 Benzaldehydamin, in N von letzterem 10—15% u. als Rest Dibenzylamin. — β -Phenylthioamin gibt wie oben in H_2 Bis- β -phenyläthylamin, Chlorhydrat, F. 265° . — Der Einfluß des Lösungsm. u. der Temp. auf die Geschwindigkeit der Rk. ist beträchtlich. Xylol wirkt besser als das höher sd. Cumol. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. **58**. 1—3. Berlin, Univ. Pharmaz. Inst.) BUSCH.

L. W. Rosenmund und G. Jordan, Über die katalytische Reduktion aromatischer Aldehyde. (Vgl. vorst. Ref.) Wie schon früher (vgl. ROSENMUND, ZETZSCHE u. PFANHAUSEN, Ber. Dtsch. Chem. Ges. **54**. 2038; C. **1921**. III. 1279) beobachtet, läßt sich bei Hydrierung von Benzaldehyd die bei Aufnahme von 1 Mol. H erfolgende Reduktion zu 35% Alkohol u. 6% KW-stoff (neben unverändertem Aldehyd) durch Chinolinlösung so leiten, daß 75% Alkohol u. 2,5% KW-stoff entstehen. Dasselbe ist bei


Anisaldehyd u. *o*-Chlorbenzaldehyd der Fall. Bei Red. von *Piperonal* u. *Vanillin* erhält man bei Aufnahme von 1 Mol. H auch ohne Chinolin etwa 80—90% Aldehyd u. keinen KW-stoff; bei Aufnahme eines weiteren Mol. H wird der Aldehyd vollständig zum KW-stoff reduziert. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. **58**. 160—62. F. 1924. Paria, Univ.)

G. Charrier und **A. Beretta**, *Nitroazobenzole*. Das schon von BAMBERGER u. HÜBNER (vgl. Ber. Dtsch. Chem. Ges. **36**. 3811; C. **1904**. I. 16) dargestellte *p*-Nitroazobenzol wurde durch Kondensation von Nitrosobenzol mit *p*-Nitrophenylamin dargestellt u. durch Red. zu *p*-Aminoazobenzol identifiziert. Anders verläuft die Red. beim *o*-Nitroanilin, wo sich das *o*-Nitro-*p*'-nitrosodiphenylamin (vgl. S. 1179) bildet. Das *m*-Nitroazobenzol wurde wie die *p*-Verb. dargestellt u. durch Na_2S zu *m*-Aminoazobenzol red.

Versuche. *m*-Nitroazobenzol, $\text{O}_2\text{N}\cdot\text{C}_6\text{H}_4\cdot\text{N}_2\cdot\text{C}_6\text{H}_5$, orangegelbe Nadeln aus $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$, F. 96°. — *m*-Aminoazobenzol, aus vorigem durch Red. mit Na_2S , orangefarbene Nadeln aus Lg., F. 62°. — *2,4,6*-Trinitro-3'-phenylazodiphenylamin, aus vorigem durch Red. mit Na_2S , gelbe Nadeln aus Essigsäure, F. 212°. — *p*-Nitroazobenzol, aus vorigem durch Red. mit Na_2S , F. 135°. — *p*-Aminoazobenzol, aus vorigem durch Na_2S , orangegelbe Krystalle aus $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$, verd. A., F. 127°. — *2,4*-Dinitro-4'-phenylazodiphenylamin, aus vorigem mit *m*-Dinitrochlorbenzol (anscheinend 1,3-Dinitro-4-chlorbenzol, Ref.), rote Nadeln aus $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$, F. 176°. (Gazz. chim. ital. **54**. 977—82. 1924. Paria, Univ.)

F. Mauthner, *Die Synthese des Divarins*. (Vgl. SONN u. SCHEFFLER, Ber. Dtsch. Chem. Ges. **57**. 959; C. **1924**. II. 459.) *m*-Dimethoxyphenyläthyläther (MAUTHNER, Journ. f. prakt. Ch. [2] **107**. 103; C. **1924**. I. 2115) liefert bei Red. nach CLEMMENSEN 3,5-Dimethoxy-1-*n*-propylbenzol, $\text{C}_{11}\text{H}_{16}\text{O}_2$ (II). Farblos, Kp.₁₀ 126—127° (vgl. Journ. f. prakt. Ch. [2] **103**. 391; C. **1922**. III. 496). Bei Entalkylierung mit konz. HJ entsteht aus II 3,5-Dioxy-1-*n*-propylbenzol, $\text{C}_9\text{H}_{10}\text{O}_2$, Farblose Nadeln (aus Bzl. u. PAe.), F. 83—84°, identisch mit dem Divarin, von dessen Konst. erwiesen ist. (Journ. f. prakt. Ch. **108**. 275—77. 1924. Budapest, Univ.)

Hermann Leuchs und **Kurt Dziengl**, *Über die Methylierung des Phloroglucindicarbonsäureesters*. Diazomethan in äth. Lsg. liefert mit dem Phloroglucindicarbonsäureester in glatter Rk. einen *O*-Trimethyläther als Deriv. der Triphenolform. Die krystallisierte Ester ist demnach die benzoide Form. Mit Dimethylsulfat in konz. Lsg. werden krystallisierte Deriv. einer C-alkylierten Ketoform erhalten. Wir nehmen für das C-Dimethylderiv. die Konfiguration eines enolisierbaren Körpers an. Für die analoge CH_2 -Gruppe des Phloroglucins ist die Methylierbarkeit erwiesen. Bei $\text{>C}(\text{H})\text{CO}_2\text{C}_2\text{H}_5$ wird die Rk. ster. gehindert sein. Deswegen findet man auch keine Tri- u. Tetramethylderiv. gefunden.



Versuchsteil. *O*-Trimethylphloroglucindicarbonsäureäthylester, $\text{C}_{15}\text{H}_{20}\text{O}_7$; Darst. durch Erhitzen (24 Stdn.) des Esters mit bei 0° verd. Nitrosomethylurethan abdest. Diazomethan in $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ bei einer Temp. von 15°. Tafeln aus h. A., Kp. 91°. — Trimethyläther des Phloroglucindicarbonsäuremethylesters, $\text{C}_{13}\text{H}_{16}\text{O}_7$, Platten aus Ä. Kp. 120—121°. — C-Monomethyl-*ps*-phloroglucindicarbonsäureäthylester, $\text{C}_{13}\text{H}_{16}\text{O}_7$, aus der alkal. Lsg. ausgefallen, aus h. A. Nadeln vom F. 97—98°. — C-Dimethyl-*ps*-phloroglucindicarbonsäureäthylester, $\text{C}_{14}\text{H}_{18}\text{O}_7$, saurer als der monomethylierte Körper, Nadeln aus A. vom F. 147—149°. (L. Ann. **440**. 149—53. 1924. Berlin, Univ.)

HOR.

B. Fricke und G. Spilker, *Über die Darstellung des o-Äthylthiophenols durch Hydrierung von Thionaphthen.* o-Äthylthiophenol, $C_8H_{10}S$, aus Thionaphthen in sd. Lsg. bl. A. u. Na. Kp.₇₆₀ 210° (unkorr.). Wasserhell, stark lichtbrechendes Öl, stark pfeffertangeruch, D.¹⁵ 1,037. — $C_{16}H_{18}S_2Hg$, weiße Nadeln, aus A., F. 135°. — $C_{18}H_{20}S_2Pb$: citronengelb, aus A., F. 147,5°. — o-Äthylthiophenolmethyläther, $C_9H_{12}S$, Kp.₇₆₀ 229—230° (unkorr.). (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58. 24—26. Münster i. W., 1925.)

BUSCH.

Paul Pfeiffer, *Über die saure Natur der Ketoxime.* (Nach Verss. von **G. Armbruster, P. Backes und H. Oberlin.**) Das Trimethoxyhydrochalkonoxim erwies sich als sauer, wartet als fast unl. in NaOH, woraus zunächst auf eine durch die OCH_3 -Gruppen verursachte Verringerung der Acidität geschlossen wurde. Eine vergleichende Unters. mehrerer Oxime hat diese Annahme jedoch nicht bestätigt. Es wurde bestimmt, wieviel Mole Oxim von 100 Molen NaOH bei Zimmertemp. u. der gleichen Menge Fl. gel. werden, nachdem festgestellt war, daß unter den Versuchsbedingungen der ungel. Anteil keine Na-Salze der Oxime enthält. Die Ergebnisse gehen aus der folgenden Tabelle hervor. Danach sind die OCH_3 -Gruppen in den

I. $(OCH_3)_4C_6H_4 \cdot C(:NOH) \cdot CH_2 \cdot CH_2 \cdot C_6H_3(OCH_3)_2$	0,2
II. $(OCH_3)_4C_6H_4 \cdot C(:NOH) \cdot CH_2 \cdot CH_2 \cdot C_6H_4(OCH_3)_4$	0,4
III. $C_6H_5 \cdot C(:NOH) \cdot CH_2 \cdot CH_2 \cdot C_6H_4(OCH_3)_4$	0,5
IV. $(OCH_3)_4C_6H_4 \cdot C(:NOH) \cdot CH_2 \cdot CH_2 \cdot C_6H_5$	0,6
V. $C_6H_5 \cdot C(:NOH) \cdot CH_2 \cdot CH_2 \cdot C_6H_5$	0,6
VI. $C_6H_5 \cdot C(:NOH) \cdot CH_2 \cdot C_6H_5$	4,7
VII. $C_6H_5 \cdot C(:NOH) \cdot CH_2 \cdot CH_2 \cdot CH_2 \cdot CH_2 \cdot C_6H_5$	—
VIII. $C_6H_5 \cdot C(:NOH) \cdot CH_3$	93
IX. $C_6H_5 \cdot C(:NOH) \cdot CH_2 \cdot CH_3$	60
X. $C_6H_5 \cdot C(:NOH) \cdot CH_2 \cdot CH_2 \cdot CH_3$	30
XI. $C_6H_5 \cdot C(:NOH) \cdot CH_2 \cdot CH_2 \cdot CH_2 \cdot CH_3$	11

Hydrochalkonoximen (I.—V.) ohne Bedeutung. Verminderung der Zahl der CH_2 -Gruppen zwischen CO u. C_6H_5 erhöht (wenn auch schwach), Vermehrung derselben verringert die Alkalilöslichkeit bis auf 0 (VI. bzw. VII.). Das am Ende der Kette stehende C_6H_5 ist von überraschend starker Wrkg., denn sobald es durch CH_3 ersetzt wird, steigt die Acidität der Oxime stark an (VIII.—XI.). Aus denselben Resultaten folgt, daß Verlängerung der CH_2 -Kette die Acidität herabdrückt.

Versuche. 0,03—0,5 g Oxim wurden in 1,2 ccm A. gel., mit 12 ccm W. fein zerfällt, 1,2 ccm 10%ig. NaOH zugesetzt, geschüttelt, nach Stehen über Nacht eingelangt. Teil abgesaugt, gewaschen, getrocknet u. gewogen. Ein Parallelvers. wurde ohne NaOH angestellt. — Neu oder nach neuen Verff. dargestellt wurden folgende Verbb.: *Hydrochalkon*, $C_{15}H_{14}O$. Durch Hydrieren von Chalkon in Eg. (F. + Mohr). — *Tetrahydrocinnamylidenacetophenon*, $C_{17}H_{18}O$. Durch Hydrieren von Amylidenacetophenon. Kp.₃ 160°, langsam erstarrend. Nadelchen aus verd. EtOH, F. 45—46°. — *Oxim*, $C_{17}H_{19}ON$ (VII.). Nadelchen aus verd. A., F. 78 bis 80°. — *4-Methoxyhydrochalkon*, $C_{16}H_{16}O_2$. Durch Hydrieren von 4-Methoxychalkon. Nadeln aus A., F. 65,5° (nicht 59—60°). H_2SO_4 -Lsg. gelb, die des 4-Methoxychalkons. — *Oxim*, $C_{16}H_{17}O_2N$ (III.). Nadeln aus verd. A., F. 88°. — *2,3,4'-Trimethoxychalkon*, $C_{18}H_{18}O_4$. 1. Man kondensiert o-Vanillin mit p-Acetylanisol in A. durch Erhitzen (Wasserbad, 1½ Std.) u. zers. das Na-Salz in viel W. mit HCl. Das 2-Oxy-4-Methoxychalkon, $C_{17}H_{16}O_4$, bildet gelbliche Blättchen oder Nadelchen aus A., F. 113—113,5°. Es wird schließlich methyliert. 2. o-Vanillin wird in den Methyläther übergeführt u. dieser mit p-Acetylanisol wie oben kondensiert. Das 2-Oxy-4-Methoxychalkon bildet gelbliche Blättchen oder Nadeln aus Eg. + W., dann Bzl. + F. 102—103°, wl. in Ä. — *2,3,4'-Trimethoxydihydrochalkon*, $C_{18}H_{20}O_4$. Blättchen

aus A., dann PAe., F. 53—54°. H_2SO_4 -Lsg. hellorangefarben. — Oxim, $\text{C}_{18}\text{H}_{21}\text{O}_4$. Nadeln aus A., F. 127—128°. — 2-Oxy-3-methoxychalkon, $\text{C}_{16}\text{H}_{14}\text{O}_3$. Aus o-Va. u. Acetophenon. Gelbe Nadeln oder Blättchen aus Lg., F. 110—111°, ll. auf Lg. Die Alkalisalze bilden dunkelrote Krystalle. — Acetylverb., $\text{C}_{18}\text{H}_{16}\text{O}_4$. Kryst. aus A., F. 124,5°. (Journ. f. prakt. Ch. **108**. 341—55. 1924. Bonn, Univ.)

N. Nagornow und **L. Rotinjanz**, *Die Existenzfläche des cyclo-Hexans*. Ber. über die vor dem Kriege ausgeführten Messungen. Das benutzte cyclo-Hexan Bzl. nach SABATIER hergestellt u. sorgfältig gereinigt, hatte F. 6,54°, nach Austreiben der gel. Gase 6,63°; Kp. 80,75°. — Die Abhängigkeit des spezif. V. von der Temp. t zwischen 7 u. 78°:

$$v = 1,26482 / (1 - 0,0011599 [t - 7] - 0,0000008356 [t - 7]^2).$$


Die Abhängigkeit des F., T_f , vom Druck P (in m Hg): $T_f = 6,63 + 0,072$ (zwischen 0 u. 156 m Hg); woraus $dP/dT_f = 13,85$. Das Vol. des krist. Cyclohexans bei 156 m Hg: $v = 1,1823 + 0,00081 t$. Daraus ergibt sich die CLAUSIUS-CLAPEYRON berechnete Schmelzwärme zu 7,73 cal/g bei 6,7°. — Tripelpunkt: 6,63°, 40,0 mm. — Die krit. Temp.; $T_c = 281,0^\circ$, der krit. D. $\rho_c = 30835$ mm. Der Dampfdruck zwischen $-4,51^\circ$ (20,55 mm) u. T_c wird tab. angegeben. Einige Werte: über festem C_6H_{12} : $-1,02^\circ$ 25,65 mm, $2,27^\circ$ 30,80 mm, $4,03^\circ$ 34,05 mm, $6,14^\circ$ 38,70 mm; über fl. C_6H_{12} : $6,90^\circ$ 40,60 mm, $10,03^\circ$ 48,45 mm, $12,10^\circ$ 54,00 mm, $16,10^\circ$ 65,70 mm, $19,78^\circ$ 78,40 mm, $35,40^\circ$ 154,2 mm, $45,34^\circ$ 228,4 mm, $55,33^\circ$ 350,5 mm, $64,44^\circ$ 453,1 mm, $75,37^\circ$ 646,0 mm, $120,25^\circ$ 2155 mm, $140,49^\circ$ 3392 mm, $160,31^\circ$ 5070 mm, $180,27^\circ$ 7313 mm, $200,35^\circ$ 10190 mm, $220,58^\circ$ 13820 mm, $243,82^\circ$ 18230 mm, $260,89^\circ$ 23860 mm, $275,95^\circ$ 28920 mm. Der van der Waalsche Faktor schwankt zwischen 3,026 u. 2,811. — Die Voll. des Dampfes u. der Fl. befriedigt die Cailletet-Mathiasche Gleichung; die Gleichung des „Durchmessers“:

$$(D_R + D_d)/2 = 0,3942 - 0,000433 t;$$

woraus das krit. Vol. sich zu 3,670 ergibt. — Der Ausdehnungskoeffizient bei 80 m Hg Druck (mit 10^5 multipliziert): 112 zwischen 30 u. 40°, 125 (71—80°), 135 (110—120°), 154 (140—160°), 170 (180—200°), 253 (240—261°), 339 (285—301°). Die Kompressibilität (mit 10^6 multipliziert) bei 49,90°: 149 zwischen 26 u. 53 m, 127 (79—105 m), 116 (158—184 m), bei 160,31°: 413 (26—53 m), 304 (79—105 m), 267 (158—284 m Hg). — Das Verh. des gasförmigen Cyclohexans zwischen 24 u. 5000 mm Hg u. zwischen 140 u. 285° wird durch die van der Waalsche Gleichung ziemlich gut wiedergegeben. Das Gesetz der korrespondierenden Zustände ist an C_6H_{12} u. cyclo-Pentan (nach YOUNGS Angaben) bestätigt gefunden. (Anal. de l'institut d'analyse physicochimique **2**. 371—404. 1924. [Russ.] Sep.) BIKERA

S. Nametkin und **Antonina Zabrodin**, *Über das sekundäre α -Nitrocamphe*. Tricyclen (vgl. MEERWEIN u. VAN EMSTER, Ber. Dtsch. Chem. Ges. **53**. A. C. **1920**. III. 884) wird schneller u. leichter als andere alicycl. KW-stoffe nitriert u. liefert als einziges neutrales Prod. eine sekundäre Nitroverb. $\text{C}_{10}\text{H}_{15}\text{O}_2\text{N}$ von ungesprochen ungesätt. Charakter gegen KMnO_4 u. Br, bei deren B. also Spaltung des tricycl. Systems unter Herst. einer Doppelbindung eingetreten sein muß. D. B. kann aufgefaßt werden als Ergebnis zweier aufeinander folgenden Vorgänge: 1. Anlagerung von HNO_3 an Tricyclen (I.) in Richtung 1-2 oder 1-6 unter Bildung sehr unbeständigen Nitroalkohols (II.). — 2. Abspaltung von $1\text{H}_2\text{O}$ aus II., so daß die ungesätt. Nitroverb. das noch unbekannte sekundäre α -Nitrocampphen (III.) = V sein muß. Wenn man die Ansicht, daß bei Einw. von HNO_3 als erster Vorw. Nitrierung u. Oxydation erst als sekundärer zu betrachten sei, auf die tricycl. W. stoffe ausdehnt, sind dann in der Säureschicht die auch bei Oxydation des Campphen entstehenden Prodd. zu erwarten. Es gelang darin der Nachweis von *i*-Camphorsäure (V.). — Der hier angenommene Nitrierungsverlauf über das Anlagerungspro-


allgemein für die ersten Stadien der Einw. von HNO_3 auf Grenz-KW-stoffe.



sek.- α -Nitrocamphen, $\text{C}_{10}\text{H}_{15}\text{O}_2\text{N}$ (III., IV.), bei 3-std. Erhitzen von 57 g Tri-
 u. 285 cem HNO_3 (D. 1,075) auf 125–130°. Nach Abscheidung der Säure-
 Reaktionsprod. mit W.-Dampf dest., wobei erst unveränderter KW-stoff
 übergang, dann schweres Öl, das nach Trocknen mit Na_2SO_4 im Vakuum dest.
 Farbloses Öl von charakterist. Geruch der sek. höheren aliphat. Nitroverb.,
 119–119,5°, D.²⁰₄ 1,0689, $n^{20}_D = 1,4942$, l. in Alkalien mit intensiv gelber
 — Pseudonitrol aus dem vorigen, $\text{C}_{10}\text{H}_{14}\text{O}_3\text{N}_2$, rhomb. Blättchen (aus Chlf.),
 (Zers.). — α -Aminocamphen, $\text{C}_{10}\text{H}_{17}\text{N}$; die Red. der Nitroverb. mit Zn u.
 Säure verläuft bei 6-std. Erwärmen unvollständig u. unter teilweiser Verharzung.
 197–198°, D.²⁰₄ 0,9369, $n^{20}_D = 1,4938$. Chlorhydrat, 4-eckige Blättchen
 (LIEBIGS Ann. 441. 181–87. Moskau, 2. Univ.) SPIEGEL.

Ror Holmberg und Wilhelm Rosén, Über Bornylxanthogenamide. Die
 führung von Terpenalkoholen in die entsprechenden, einfachen oder N-sub-
 stituierten, Xanthogenamide (Thionurethane) dient zur Identifizierung der Terpen-
 kole in Holzdestillaten u. zur Darst. der entsprechenden Terpene mittels therm.
 ang der Xanthogenamide in Terpen, COS u. NH_3 bezw. Amin. Darst. der
 orlxanthogenamide (vgl. HOLMBERG u. SUNESEN, Svensk Kem. Tidskr. 35. 226;
 194. I. 1773): Aus Borneol in Xylol mit Na bei 140–145° erhaltenes Na-Bornylat
 m gleichen Reaktionsgemisch mit CS_2 bornylxanthogensaures Na, das bei Aus-
 eln des Gemisches mit einer Lsg. von chloressigsäurem Na in W. als Bornyl-
 nogenacetat, $\text{C}_{10}\text{H}_{17}\text{O} \cdot \text{CSSCH}_2 \cdot \text{COONa}$ in die wss. Schicht geht; dort mit NH_3
 Amin Übergang in $\text{C}_{10}\text{H}_{17}\text{O} \cdot \text{C}(\text{S})(\text{NH}_2)$ bezw. (NR_2) , die aus A. + W.
 yllisiert werden. — *d,l*-Bornylxanthogenamid, $\text{C}_{11}\text{H}_{19}\text{ONS}$, F. 135–136°. —
 Bnylxanthogenamid mit etwa 13% Racemform, F. 127–128,5°, $[\alpha]_D = +16,5^\circ$
 6 g in 10 cem Bzl., $[\alpha]_D = +11,9^\circ$ bei gleicher Konz. in A. — *d,l*-Bornyl-
 nogenmethyamid, $\text{C}_{12}\text{H}_{21}\text{ONS}$, F. 78–79°. — *d,l*-Bornylxanthogendimethyamid,
 $\text{C}_{13}\text{H}_{23}\text{ONS}$, F. 111,5–112,5°. — *d,l*-Bornylxanthogenäthyamid, $\text{C}_{13}\text{H}_{23}\text{ONS}$, F. 66 bis
 68°. — *d,l*-Bornylxanthogendiäthyamid, $\text{C}_{15}\text{H}_{27}\text{ONS}$, F. 34–35°. — *d,l*-Bornylxanthogen-
 äthyl, $\text{C}_{17}\text{H}_{29}\text{ONS}$, F. 152–153°. — Bei gleicher Behandlung von indifferenten,
 185 u. 240° sd. Fraktionen eines hauptsächlich aus Kiefernholz gewonnenen
 holztees wurde durch Isolierung des entsprechenden Xanthogenamids das
 ndensein von schwach rechtsdrehendem (zu etwa 75% rac.) Borneol nach-
 wesen, aus den niederen Fraktionen auch ein, voraussichtlich nicht ganz reines,
 rechtsdrehendes Xanthogenamid vom F. etwa 110° erhalten, sonst nur teerige Öle. —
 rnylxanthogenacetamid, $\text{C}_{10}\text{H}_{17}\text{OCSSCH}_2\text{CONH}_2$, aus *d,l*-bornylxanthogensaurem
 A. mit Chloracetamid, Nadeln aus verd. A., F. 87–88°. — Aus Borneol mit
 d-Form wurde ein Bornylxanthogenacetamid vom F. 88–89° u. $[\alpha]_D = +22,0^\circ$
 5 g in 10 cem A. gewonnen. (Svensk Kem. Tidskr. 36. 204–15. Stockholm,
 ca. Hochsch.) ARNDT.

J. Bredt und Assen Iwanoff, Über die Bildung von Campher- und Chlorcampher-*sek.-tert.-nitrlsäurechlorid* aus Camphersäureimid mittels Phosphorpentachlorids. Camphersäureimid (I.) u. PCl_5 entsteht zunächst Campher-*sek.-tert.-nitrlsäure* (III.), ident. mit dem Einw.-Prod. von PCl_5 auf Campher-*sek.-tert.-nitrlsäure* wahrscheinliches Zwischenprod. wird II. angesehen. Bei weiterer energ. Einw. PCl_5 auf III. bildet sich IV., das auch direkt aus I. erhalten werden kann, weniger vorteilhaft, da die Trennung von gleichzeitig gebildetem III. schwierig. Saure Hydrolyse führt IV. in V. über. Letzteres wurde von MANNESSIER (chim. ital. **44**. 698; C. **1914**. II. 1152) als einziges Rk.-Prod. bei der Einw. PCl_5 auf I. in Octan bei 120–125° u. nachfolgendem Krystallisieren erhalten. Vf. weisen jedoch nach, daß dabei prim. ein Gemisch von III. u. I. bildet, IV. in die entsprechende Nitrlsäure übergeführt u. diese durch die V. zu V. umgelagert wird.




Campher-*sek.-tert.-nitrlsäurechlorid*, $\text{C}_{10}\text{H}_{14}\text{ONCl}$ (III.). Aus I. mit 2 Mol PCl_5 in Lg. bei 110° bis zur Beendigung der HCl-Entw. Das Prod. wird im App. von BREDT u. VAN DER MAAREN-JANSEN (LIEBIGS Ann. **367**. 354 [1909]) fraktioniert. Kp.₁₃ 146–148°, F. 92°, schwach verunreinigt durch IV. (über das reine Prod. v. BORSCHKE u. SANDER, Ber. Dtsch. Chem. Ges. **48**. 117; C. **1915**. I. 429). Wirkt auf verd. A., F. 151–152°, von w. konz. HCl in I. übergeführt. Die Säure liefert mit PCl_5 in Octan (Kühlung) wieder III. — Campher-*sek.-tert.-nitrlsäureamid*, $\text{C}_{10}\text{H}_{14}\text{ON}$. Aus III. mit NH_3 -Gas in Ä. (Kühlung). Blättchen mit $1\text{H}_2\text{O}$ aus W., F. 85–86°, wasserfrei aus Xylol, F. 129–130°. Beide Formen werden im geschlossenen F.-Röhrchen gegen 200° wieder fest u. schm. dann bei 248 bzw. 265° (Umlagerung in Iminocamphersäureimid?). — Anilid. Nadeln aus A., F. 200–201°. — *Chlorcampher-sek.-tert.-nitrlsäurechlorid*, $\text{C}_{10}\text{H}_{13}\text{ONCl}_2$ (IV.). Aus III. mit 1 Mol PCl_5 in Octan (125°, 5 Stdn.). Kp.₁₄ 152–153°. — *Chlorcamphersäureimid*, $\text{C}_{10}\text{H}_{14}\text{O}_2\text{NCl}$ (V.). Aus IV. mit sd. konz. HCl (5 Stdn.). Umfällen aus verd. NaOH mit CO_2 . Blättchen aus verd. A., F. 293° (Zers.). (Ber. Dtsch. Chem. Ges. **58**. 56–62.) LINDENBAUM



J. Bredt, Über Campher- und Chlorcampher-*sek.-tert.-nitrlsäure*. Den Angaben des Vfs. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. **45**. 1419; C. **1912**. I. 2013) über den Iminocampher-*sek.-tert.-nitrlsäure* (Formel nach IV. im vorst. Ref.) ist hinzuzugufügen, daß beim Erhitzen im Reagensglas bei ca. 180° die Temp. plötzlich auf ca. 200° steigt, u. zwar unter starker HCl-Entw., d. h. B. von Camphanonitril. Berücksichtigt man weiter, daß SCHEIBER u. KNOTHE (Ber. Dtsch. Chem. Ges. **45**. 1551; C. **1912**. II. 120) den F. in einem Bad von 190° zu 180–190° festgestellt haben, vermag die Schmelze bei höherer Temp. wieder erstarrt unter Umlagerung in *Chlorcamphersäureimid* (V. im vorst. Ref.), so erkennt man, daß die Umwandlung der *Chlorcamphersäure* nach 2 Richtungen erfolgt. — V. ist übrigens zuerst von WORNAST (LIEBIGS Ann. **328**. 338 [1903]) erhalten worden. Die Angaben von DEUTSCHLAND (Dtsch. Chem. Leipzig 1911) hat Vf. nicht bestätigen können. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. **58**. 6–7.) LINDENBAUM

Heinrich Wieland, Über die chemische Natur der Hopfenharz-Säuren. — Gemeinschaft mit **Walter Schneider** und **Erwin Martz**. Aus Hopfenharz


el wie schon WÖLLMER (Ber. Dtsch. Chem. Ges. **49**. 780; C. **1916**. I. 1077) ge-
 ig hat, in krystallisierter Form α -Hopfenbittersäure oder Humulon, $C_{21}H_{30}O_5$, u.
 e entsprechende β -Säure, das Lupulon, $C_{25}H_{36}O_5$, isolieren. Vff. unternahmen
 er. zur Konstitutionsaufklärung, die jedoch noch nicht zu ihrem Ziel geführt
 b. Die bisher untersuchten Umsetzungen des Humulons werden in folgendem
 hina zusammengefaßt:



Humulon entspricht der Beschreibung von WÖLLMER (l. c.); die Bindung der
 A-Atome konnte noch nicht ermittelt werden; sicher ist keine Carboxylgruppe vor-
 handen. Die bei der Spaltung mit verd. Alkali neben Humulinsäure entstehende
 gesätt. Säure (vgl. WÖLLMER, l. c.) wird als $\Delta^{1,2}$ -i-Hexensäure erkannt. In der
 Humulinsäure ist die saure Enolgruppe des Humulons noch vorhanden, eine
 Carboxylgruppe ist bei der Spaltung nicht entstanden. Red. der Humulinsäure
 (C. CLEMMENSEN führt zu einem KW-stoff $C_{15}H_{28}$, was beweist, daß die C-Atome
 der Säure miteinander verbunden sind u. daß in ihr eine Ringbindung vor-
 handen ist. — Bei Hydrierung von Humulon mit Pd-Katalysator entsteht, wie
 ebenfalls WÖLLMER schon gezeigt hat, Isopentan u. Humulohydrochinon, welches
 durch Luft- O_2 in das rote Humulochinon übergeht. Bei der Red. verschwindet
 die Enolgruppe; diese war also im Kern. Das Chinon gibt beim Kochen mit
 Dihydrohumulinsäure + CO_2 . Humulon läßt sich nicht in ein Oxychinon
 überführen, in ihm ist also kein aromatischer Kern enthalten. — Oxydationsverss.
 von Dihydrohumulinsäure u. Humulochinon führten bisher zu keinem durchsichtigen
 Ergebnis. Es wird aber stets eine einbasische Fettsäure (Valerian- oder Capron-
 säure) abgespalten. — Die Ergebnisse der Spaltung des Humulons bei Hydrolyse
 und Hydrierung führen zu folgenden vorläufigen Formeln für Humulon (I) u.
 Humulohydrochinon (II).



Die Spaltung bei Hydrierung erfolgt also so, daß von dem nicht aromat. Ring-
 kern eine Isopentankette vom C abgelöst wird unter B. eines Hydrochinons; bei
 der Hydrolyse wird dieselbe Kette vermehrt um eine Carboxylgruppe heraus-
 gelassen, wobei Humulinsäure als Cyclopentanderivat (III) gebildet wird. Die
 Red. von Dihydrohumulinsäure erfolgt dann unter Hydrierung der Seitenkette



$C_{10}H_{18}O \rightarrow C_{10}H_{20}O$. — Bei Oxydation des Chinons
 durch Br in alkal. Lsg. wird unter B. von CO_2
 i-Humulinsäure gebildet, die alle Eigenschaften eines
 1,3,4-Triketocyclopentanderivs. zeigt. — Die Seiten-
 kette $C_{10}H_{18}O$ enthält eine Doppelbindung u. eine
 Carboxylgruppe; da die Doppelbindung bei der Hydrierung der Humulinsäure zum







KW-stoff erhalten bleibt, steht sie wahrscheinlich der CO-Gruppe nicht benachbart, diese scheint wegen ihrer leichten Abspaltbarkeit unter B. von Valeriansäure. Capronsäure nicht direkt am Ring gebunden zu sein. Die Gruppe $C_{10}H_{18}O$ demnach aufzulösen sein in $-CH_2 \cdot CO \cdot CH_2 \cdot CH(CH_3)_2$.

Humulinsäure, $C_{15}H_{22}O_4$, F. 92° , Kp.₁ $130-131^\circ$, völlig unzersetzt d'bei 100° . — *Humulinsäureoxim*, $C_{15}H_{23}O_4N$, F. $152-153^\circ$, Krystalle aus verd. A. — *i-Humulinsäure*, $C_8H_{10}O_2$, farblose Fl. von ranzigem dabei an Hopfen erinnerndem Geruch, Kp.₁₁ $102-104^\circ$, nach mehrfacher Dest., liefert bei Hydrierung Isocapronsäure. — *KW-stoff* $C_{15}H_{28}$, erhalten durch Red. der Humulinsäure, Kp.₁₃₋₁₄ $122-123^\circ$, flüchtig u. fast geruchlos, wird in Eis-NaCl-Mischung nicht fest, addiert Br in $CHCl_3$ entfärbt $KMnO_4$ in Eg. schnell, unl. in W., zll. in organ. Lösungsm. — *Humulochinon*, $C_{18}H_{22}O_5$, rote verfilzte Nadeln, F. 63° ; Red. führt zu *Humulohydrochinon*, F. 118° (im offenen Röhrchen). *Semicarbazon des Humulochinons*, rote verfilzte Nadeln, F. $184-186^\circ$; in Alkali l. mit tief roter Farbe. — *Dihydrohumuloxim*, $C_{15}H_{24}O_4$, aus Methylalkohol, F. 125° . — *i-Humulinsäure*, $C_{15}H_{22}O_4$, hellgelbe Nadeln aus Methylalkohol, F. 143° , starke Säure, orangegelbe Alkalisalze, tiefe Rk. mit $FeCl_3$, entfärbt $KMnO_4$, reduziert Fehlingsche Lsg. beim Kochen, sehr flüchtig mit Wasserdampf, spaltet beim Kochen mit starkem Alkali ein noch nicht untersuchtes Keton ab; die Reduktion führt wieder erwarten nicht zur Dihydrohumulinsäure; ist wahrscheinlich ein 1,3,4-Triketocyclopentanderiv. — *Monoisomer der i-Humulinsäure*, $C_{21}H_{27}O_3N$, gelb, F. 90° , *Disemicarbazon*, $C_{17}H_{26}O_4N_6$, F. $170-171^\circ$. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58. 102—12. Freiburg i. B., Univ.)

K. v. Auwers und O. Jordan, *Zur Kenntnis der Beckmannschen Umlagerung*. (I. vgl. Ber. Dtsch. Chem. Ges. 57. 800; C. 1924. II. 36.) Vff. gehen der auffälligen Erscheinung nach, daß das *o*-Oxybenzophenonoxim, dem nach der Meisenheimerschen Auffassung die syn-Konfiguration zukommt, sich nicht zu Phenylindoxazon hydrieren läßt, sowie der von MEISENHEIMER u. MEIS (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 56. 290; C. 1924. I. 1784) hierfür gegebenen Erklärung. — Bei Darst. größerer Mengen des bekannten *o*-Aceto-*s.m*-xylenoloxims (F. 143°) wurde auch die stereoisomere Form aufgefunden, die bei 121° schm. u. von sd. verd. NaOH allmählich in die höher schm. Form umgelagert wird. Nach der elektrochem. Theorie von E. MANN, LIESCHE u. CORRENS (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 56. 341; C. 1923. I. 18) würde dem alkalibeständigen h-Oxim (143°) Formel I. (anti-Form), dem u. a. beständigen n-Oxim (121°) Formel II. (syn-Form) zukommen. Allerdings kann durch Säuren nicht in II. umgewandelt werden, denn es erleidet schon durch CH_2O_2 , Eg.-HCl, HCl 1:1, wenn auch langsam, Beckmannsche Umlagerung, nach anschließender Anhydrierung zu III., schnell u. quantitativ mit Beckmannschem Gemisch oder PCl_5 in Ä. II. liefert mit letzterem Reagens neben einem P-halogenierten Hauptprod. ebenfalls, aber nur wenig III. I. sd. im Vakuum fast unzers., n. Atmosphärendruck geht es zwischen 180 u. 210° unter Abspaltung von H_2O in III. über. II. sd. unter 10 mm bei $180-185^\circ$, das Destillat enthält große Mengen I.; unter Atmosphärendruck entsteht ein Gemisch von III. u. einem dickfl. unl. löslichen Prod. Die Chlorhydrate beider Oxime, die mit HCl-Gas in Ä. gewaschen werden, gehen beim Erhitzen auf $128-130^\circ$ (bei I.) bzw. $145-150^\circ$ (bei II.) in III. über. — Nimmt man die Formeln I. u. II. als zutreffend an, so ist die Umlagerung von III. aus I. eine neue Stütze für die Meisenheimersche Regel. Die Umlagerung von III. aus II. durch PCl_5 , welche die Umlagerung von II. in I. durch verd. HCl frei werdenden HCl zur Voraussetzung hat, kann bei der Säurebeständigkeit von II. damit erklärt werden, daß HCl in indifferenten Medien oft umgekehrt wirkt wie wss. HCl. Die größere Neigung von I. zur Umlagerung ist auch insofern verständlich, weil wegen der Nebervalenzen am aromat. Rest, die dem CH_3 fähig sind, von vornherein Beziehungen jenes Restes zum N bestehen. — Dagegen trifft

Meisenheimersche Annahme, daß die anti-Oxime infolge Betätigung von Restatzen besonders zur intramolekularen Wasserabspaltung neigen, für I. nicht zu, sein Verh. bei der Dest. (vgl. oben) zeigt. Selbst beim *o,o'*-Dioxybenzophenonoxim ließ sich die Rk. nicht verwirklichen, es sd. im Vakuum unzers. u. erleidet unter Atm.-Druck bei über 250° Beckmannsche Umlagerung unter B. von IV. Diverenzierende Mittel sind entweder unwirksam oder bewirken ebenfalls Umlagerung, besonders glatt KHSO_4 . Da *o*-Aceto-*p*-kresoloxim sich ebenso verhält, so kann man folgern, daß aromat. *o*-Oxyketonoxime nicht zur Indoxazenbildung neigen. Auch *o*-Acylphenoloxime, die nur in einer Form bekannt u. in Oxazole überführbar sind, die anti-Form besitzen, besonders wenn das Acyl aliph. Natur ist. Dem *o*-Oxybenzophenonoxim wird von MEISENHEIMER u. MEIS die syn-Form erteilt, da es mit PCl_5 Salicylsäureanilid u. sehr wenig 2-Phenylbenzoxazol gibt. Bei B. des letzteren wird auf das anti-Oxim zurückgeführt, ohne daß über dessen Umlagerung etwas gesagt wird. Nun haben v. AUWERS u. CZERNY (Ber. Dtsch. Chem. Ges. **31**. 2692 [1898]) aus dem *o*-Benzo-*p*-kresoloxim mit PCl_5 außer 2-Phenylbenzoxazol (VI.) reichlich *p*-Kresotinsäureanilid u. einen Phosphorsäureester erhalten. Neuerdings lieferte reinstes Oxim (F. 134—135°) mit PCl_5 bei -10° hauptsächlich VI., etwas *N*-Benzoyl-*o*-amino-*p*-kresol u. Spuren Phosphorsäureester, ein unreineres Oxim (F. 130—131°) dagegen weniger VI. (ca. $\frac{2}{3}$ des Rk.-Prod.), *p*-Kresotinsäureanilid u. einen Phosphorsäureester (F. 203—204°). Das Chlorhydrat des Oxims zers. sich beim Erhitzen auf 150° in entsprechender Weise. (Ein Indoxazen kann auch hier nicht zu erhalten.) Zur Erklärung dieser Ergebnisse glauben Vff. die Möglichkeit eines verschiedenen Verlaufes der Beckmannschen Umlagerung bei den demselben Oxim nicht von der Hand weisen zu dürfen, solange — wie im besprochenen Fall — der Nachweis eines isomeren Oxims nicht gelungen ist. Die Richtigkeit der Meisenheimerschen Regel soll dadurch nicht beeinträchtigt werden. Nach ihr wäre dem *o*-Benzo-*p*-kresoloxim im Gegensatz zum *o*-Oxybenzophenonoxim die anti-Form V. zu erteilen, u. da man es auf Grund seines Verh. gegen Alkali als das „alkalibeständige“ Isomere betrachten darf, so folgt es auch aus elektrochem. Theorie (vgl. oben), da das negativere *p*-Kresylradikal wandert. Dagegen versagt diese Theorie bei dem ebenfalls alkalibeständigen *o*-Oxybenzophenonoxim, denn hier wandert das weniger negative Phenyl; sie gestattet also nicht, eines Oxims bei der Beckmannschen Umlagerung nicht sicher vorauszusagen.


Schließlich wird an einigen Beispielen untersucht, wie weit die Meisenheimersche Regel auch für Aldoxime zutrifft. Rein chem. Betrachtungen, die hier nicht wiederholt werden können, führen dazu, in den unbekannten Formen des Salicylaloxims u. Benzoylacetaldoxims syn-, in den bekannten Formen anti-Oxime zu erteilen, denn an Stelle ersterer treten, wo sie zu erwarten wären, die betreffenden Oxime auf. Das bekannte Salicylaloxim gibt nun bei der Beckmannschen Umlagerung Salicylsäureamid, d. h. entsprechend obiger Regel. — Ebenfalls auf Grund der Nitrilbildung käme dem Mesitylaloxim, $(\text{CH}_3)_3\text{C}_6\text{H}_2 \cdot \text{CH} : \text{N} \cdot \text{OH}$, vom F. 179°



die syn-, dem Isomeren vom F. 124° die anti-Form zu. Letzteres gibt nur mit PCl_5 Formmesidid, $(\text{CH}_3)_3\text{C}_6\text{H}_2\cdot\text{NH}\cdot\text{CHO}$, d. h. im Sinne des alten Schemas unter gegen obiger Regel.

h-o-Aceto-s-m-xylenoloxim (I.). Aus den Komponenten in überschüssiger 10%iger NaOH (4 Tage), dann annähernd neutralisieren. F. 143°, Kp.₁₀ 180°. — *Dibenzoylverb.*, $\text{C}_{24}\text{H}_{21}\text{O}_4\text{N}$. Blättchen aus A., F. 143,5–144°. — *n-Oxim*, $\text{C}_{10}\text{H}_{13}\text{O}_2\text{N}$. Aus dem Filtrat von I. durch Ausäthern. Nadelchen aus Bzl. oder verd. CHCl_3 . F. 121–121,5°, ll. in A., Ä., wl. in k. Bzl. Die alkoh.-ammoniakal. Lsg. gibt mit NiSO_4 nur eine Trübung, während bei I. ein dichter grauer Nd. fällt. — *Dibenzoylverb.*, $\text{C}_{24}\text{H}_{21}\text{O}_4\text{N}$. Blättchen aus A., F. 109–110°. — *2,4,6-Trimethylbenzoxazol* II. HgCl_2 -Verb., Nadeln, F. 155°. — *o-Aceto-p-kresoloxim*. F. 145°, Kp.₁₄ 168–70°. Kp. 265–267°. Wird von P_2O_5 in sd. Bzl. oder ZnCl_2 (Wasserbad) kaum angegriffen, von PCl_5 in Ä., besser von KHSO_4 bei 150–160° (5 Min.) in *2,5-Dimethylbenzoxazol* (Kp.₁₀ 100–102°; HgCl_2 -Verb., Nadelchen, F. 194,5–195,5°) übergehend. — *o-Benzo-p-kresoloxim* (V.). Das Keton wird aus p-Kresylbenzoat u. AlCl_3 bei bis 130°, $\frac{3}{4}$ Stde.) bequem erhalten. Reinigung des Oxims aus Eg., dann als das Chlorhydrat. F. 134–135°. — *o,o'-Dioxybenzophenonoxim*. Aus den Komponenten in sd. A. ($\frac{3}{4}$ Stde.). Nadelchen aus Bzl., F. 104–105°, nicht 99° (GRUBNER). Sublimiert unzersetzt. — *2-[o-Oxyphenyl]-benzoxazol*, $\text{C}_{13}\text{H}_9\text{O}_2\text{N}$ (IV). Nadelchen aus A., F. 120–121°. Wurde zum Vergleich aus o-Aminophenol u. Salol (200°, 1 d.) synthetisiert. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. **58**. 26–36.) LINDENBAUM.

Karl v. Auwers, Margarete Lechner und Helmut Bundesmann, Zur Kenntnis der Beckmannschen Umlagerung. III. (II. vgl. vorst. Ref.) Die bei den Oximen des o-Aceto-s-m-xylenols u. seines Methyläthers ungewöhnlich leicht (schon in sd. verd. HCl) eintretende Beckmannsche Umlagerung (vgl. v. AUWERS u. BORCHERS, Ber. Dtsch. Chem. Ges. **48**. 1704; C. **1915**. II. 1181) veranlaßte Vff. zur Untersuchung einer größeren Anzahl Ketoxime (hauptsächlich von Acetophenonderiv.) in der gleichen Richtung. Sie wurden 1–1½ Stdn. mit der 20fachen Menge 17–18% HCl gekocht, dann wurde unverändertes Oxim durch Ausäthern beseitigt, eingedunstet, die etwa gebildete Aminoverb. abgeschieden u. in geeigneter Weise identifiziert. Es ergab sich, daß nur durch ein Alkyl oder OCH_3 o-substituierte Ketoxime teilweise oder ganz die Beckmannsche Umlagerung erleiden; ist dagegen der ortho-Substituent ein Halogen, OH , NO_2 oder NH_2 , so erfolgt wie bei nicht o-substituierten Oximen nur Hydrolyse zum Keton. Ein weiter hinzutretender Substituent sei in p zur Oximidoseitenkette im allgemeinen die Umlagerung zu begünstigen, während die quantitativ verlaufende Umlagerung bei Besetzung der p- u. beider o-Stellungen gut im Einklang steht. Die Natur des anderen mit der Gruppe $>\text{C}:\text{N}\cdot\text{OH}$ verbundenen Radikals ist ohne jeden Einfluß. — Die Erklärung für diese Erscheinung erblicken Vff., da elektrochem. u. ster. Gründe nicht in Betracht kommen, in der ungleichen Valenzbeanspruchung der einzelnen Elemente u. Gruppen. Verbringt der o-Substituent viel C-Valenz, so kann das betreffende C-Atom nur entsprechend wenig für die Bindung des benachbarten, die Oximidoseitenkette tragenden C-Atoms hergeben, so daß an diesem Valenz verfügbar wird. Je größer letztere ist, umso leichter wird eine Bindung zwischen C u. N zustande kommen u. unter Lsgd. der Seitenkette Umlagerung eintreten (A). Andernfalls sind die Nebenvalenzen schwach, u. es erfolgt Hydrolyse (B). Befindet sich in der anderen o-Stellung



ebenfalls ein stark valenzverbrauchender Substituent, so wird noch mehr Valenz am mittleren C-Atom frei, so daß A zur Haupttrk. wird. Diese Deutung bu

auf der Meisenheimerschen Theorie u. dient ihr als Stütze. — Weiter wäre zu folgern, daß Halogen, OH, NO₂ u. NH₂ wenig, Alkyl u. OCH₃ viel C-Valenz beanspruchen, was mit der Erfahrung jedoch nur teilweise übereinstimmt.

Versuche. Die Oxime wurden mit wenigen Ausnahmen in Ggw. überschüssigen Eis bei gewöhnlicher oder wenig erhöhter Temp. dargestellt. Die im folgenden aufgeführten Spaltungszahlen geben den %-Gehalt der Spaltprodd. an. Amin an, verändertes Oxim ist nicht berücksichtigt. Wo keine Zahl angegeben ist, entsteht bei der Spaltung kein Amin, sondern nur Keton. — *o*-Oxyacetophenonoxim, D. 1,112,5°. — *o*-Methoxyacetophenon. D.^{18,7}₄ 1,0897, $n_D^{19,7} = 1,53339$, $n_D^{19,7} = 1,56945$, für $\alpha = +0,83$, für $\gamma - \alpha = +59\%$. — Oxim. Spaltung: 40% *o*-Anisidin. — *o*-Methoxyacetophenonoxim, C₉H₁₁O₂N. Öl, Kp.₉ 159°. — *p*-Methoxyacetophenonoxim, C₉H₁₁O₂N. Nadelchen aus Leichtbzn., F. 86—87°, ll. Na-Salz, Prismen. — *o*-Acetophenonoxim. Aus *o*-Kresylacetat u. AlCl₃; Trennung vom *p*-Isomeren durch Dampfesreinigung über das Na-Salz. Kp. 235—237°, Kp.₉ 103—104°, D.^{18,1}₄ 1,1010, $n_D^{19,1} = 1,54933$, $n_D^{19,1} = 1,58095$, $E\Sigma$ für $\alpha = +1,31$, für $\gamma - \alpha = +97\%$. — Oxim, C₉H₁₁O₂N. Nadelchen aus verd. A., Blättchen aus Leichtbzn., F. 132—133°, ll., lichtempfindlich. — *o*-Aceto-*o*-kresolmethyläther, C₁₀H₁₂O₂. Mit (CH₃)₂SO₄, p. 240°, Kp.₁₂ 115°, D.^{19,1}₄ 1,0610, $n_D^{19,1} = 1,51930$, $n_D^{19,1} = 1,54869$, $E\Sigma$ für $\alpha = +0,51$, für $\gamma - \alpha = +37\%$. — Oxim, C₁₀H₁₃O₂N. Nadeln aus Bzn., F. 96°, ll. in A., Bzl. Spaltung: wenig 1-Methyl-2-methoxy-3-aminobenzol. — *p*-Acetophenonoxim. Darst. vgl. oben. — Oxim, C₉H₁₁O₂N. Nadeln aus Bzl., F. 92,5—93,5°, ll. in A., Bzl. Spaltung: wenig 1-Methyl-2-methoxy-3-aminobenzol. — *p*-Aceto-*o*-kresolmethyläther, C₁₀H₁₂O₂. Öl, Kp.₁₄ 145—146°. — Oxim, C₁₀H₁₃O₂N. Nadeln aus Leichtbzn., F. 101,5—102,5°, sll. — *a*-*o*-Aceto-*m*-kresol. Aus *m*-Kresylacetat u. AlCl₃ neben wenig *p*-Verb. Kp.₈ 101°. — Semicarbazon, C₁₀H₁₃O₂N₃. F. 130°. — Oxim. F. 103°. — *a*-*o*-Aceto-*m*-kresolmethylätheroxim. Spaltung: 80% 1-Methyl-3-methoxy-4-aminobenzol. — *p*-Aceto-*m*-kresol. Darst. vgl. oben. — Oxim, C₁₀H₁₃O₂N. Nadeln aus Bzl. oder verd. A., F. 153—154°, ll. Spaltung: 80% *o*-*m*-kresol. — *p*-Aceto-*m*-kresolmethyläther. Kp.₁₄ 140—141°. — Oxim, C₁₀H₁₃O₂N. Nadeln aus PAe., F. 81,5—82°, sll. Spaltung: 75% *p*-Amino-*m*-kresolmethyläther. — Semicarbazon, C₁₁H₁₅O₂N₃. Nadeln aus A., F. 194—195°. — *o*-Aceto-*p*-kresoloxim (vgl. vorst. Ref.). — *o*-Aceto-*p*-kresolmethylätheroxim, C₁₀H₁₃O₂N. Nadelchen aus Leichtbzn., F. 89—90°, ll. Spaltung: 33% *o*-Amino-*p*-kresolmethyläther. — *o*-Aceto-*o*-kresolmethyläther, C₁₁H₁₄O₂. Mit (C₂H₅)₂SO₄. Prismen aus CH₃OH oder PAe., F. 44—45°. — Oxim, C₁₁H₁₅O₂N. Aus CH₃OH, F. 107°, ll. — Semicarbazon, C₁₂H₁₇O₂N₃. Nadelchen aus A., F. 195—196°, ll. in CH₃OH, wl. in Bzl. — *o*-Aceto-*p*-kresol-*i*-oxim. Aus dem Na-Salz mit C₃H₇Br (Rohr, 120—130°, 5 Stdn.). Gelbliches Öl, p.₁₅ 136—137°. — Semicarbazon, C₁₃H₁₉O₂N₃. Blättchen aus A., F. 174—175°. — Oxim. Gelbliche Nadelchen aus Bzl., F. 93°. (Dieses u. das vorige Oxim wurden bei der Spaltung noch nicht untersucht.) — *o*-Propio-*p*-kresoloxim, C₁₀H₁₃O₂N. Prismen aus CH₃OH, F. 134—135°, ll. — Semicarbazon, C₁₁H₁₅O₂N₃. Nadelchen aus A., F. 202—212°. — *o*-Propio-*p*-kresolmethylätheroxim. Spaltung: wie bei der Aceto-*o*-*o*-Aceto-*a*-*m*-xylenol, C₁₀H₁₂O₂. Aus *a*-*m*-Xylenolacetat u. AlCl₃ bei 120°. F. 53—54°, Kp.₁₈ 124,5—126°. Mit FeCl₃ tiefblau. — Oxim, C₁₀H₁₃O₂N. Nadeln aus PAe., F. 139,5—141°, sll. — *o*-Aceto-*a*-*m*-xylenolmethyläther, Kp.₁₄ 132°. — Oxim, C₁₁H₁₅O₂N. Nadelchen aus Schwerbzn., F. 86—86,5°. Spaltung: 40% Amin (nicht identifiziert). — *o*-Aceto-*s*-*m*-xylenolmethylätheroxim. Spaltung: 40% *o*-Amino-*s*-*m*-xylenolmethyläther.

Methylacetophenonoxim, C₉H₁₁ON. Gelbliche Oktaeder aus Leichtbzn., F. 61,5°, ll. Spaltung: 40% *o*-Toluidin. — *m*-Methylacetophenonoxim, C₉H₁₁ON. Nadeln aus Leichtbzn., F. 54—56°, ll. Na-Salz, Nadeln. — *a*-Aceto-*o*-xyloloxim. — *a*-Aceto-*m*-xyloloxim, C₁₀H₁₃ON. Kp._{18,5} 146°. Spaltung: 40% *a*-*m*-Xylidin. — Semicarbazon, C₁₁H₁₅ON₃. F. 185—187°. — *a*-Propio-*m*-xyloloxim. Kp._{18,5} 164,5°.

Erstarrte salbenartig (Gemisch von Isomeren?). Spaltung: wie beim vorigen. *Semicarbazon*, $C_{12}H_{17}ON_3$. Nadelchen aus A., F. 158,5—160°, ll. außer in Ä., Bz. *p-Nitrophenylhydrazon*, $C_{17}H_{19}O_2N_3$. Gelbe Nadeln aus A., F. 154—155°, un Bzn. — *a. Benzo-m-xyloloxim*. F. 121°. Spaltung: wie bei den vorigen. — *s. Methyl-m-xylolcarbinol*, $C_{10}H_{14}O$. Aus Acetaldehyd u. s. m-Xylol-MgBr in Ä. u. D. dest. Öl, Kp.₁₂ 115—116°. — *s. Aceto-m-xylol*, $C_{10}H_{12}O$. Aus dem vorigen Beckmannscher Mischung. Gelbliches Öl, Kp. 236—237°. — *Oxim*, $C_{10}H_{12}O$. Nadelchen aus CH_3OH , F. 114—114,5°, ll. — *p-Nitrophenylhydrazon*, $C_{16}H_{17}ON_2$. Gelbe Nadeln aus Xylol oder Eg., F. 179—180°, wl. — *Aceto-p-xyloloxim*. Kp.₁₄ bis 149°, F. 57°. Spaltung: 37% *p-Xylidin*. — *Benzo-p-xyloloxim*, $C_{15}H_{15}ON$. Nadeln aus A., F. 135—135,5°, ll. Spaltung: wie beim vorigen. — *Aceto-p-diäthylbenzoxim*, $C_{12}H_{17}ON$. Gelbliches Öl, Kp.₁₆ 168°. Spaltung: 35% *Amino-p-diäthylbenzol*, Kp.₁₁ 128—130°; *Benzoylverb.*, $C_{17}H_{19}ON$, F. ca. 130°. — *p-Dipropylbenzol*, $C_{17}H_{21}$. Durch Red. von *p-Propylpropiophenon* nach CLEMMENSEN. Kp.₂₂ 109°, D._{19,4} 0,83, $n_D^{19,4} = 1,48775$, $n_D^{19,4} = 1,50136$, $E\Sigma$ für $\alpha = +0,54$, für $\beta - \alpha = +15\%$. — *Aceto-p-dipropylbenzol*, $C_{14}H_{20}O$. Aus dem vorigen mit CH_3COCl u. $AlCl_3$ in S. Angenehm riechendes Öl, Kp.₁₄ 140—141°. — *Oxim*, $C_{14}H_{21}ON$. Öl, Kp.₁₈ 212°. Spaltung: 30% *Amino-p-dipropylbenzol*; *Benzoylverb.*, $C_{19}H_{23}ON$, Nadeln aus Lehmbein, F. 81—83°.





Methyl-o-chlorphenylcarbinol, C_8H_9OCl . Aus o-Chlorbenzaldehyd u. CH_3MgBr in Ä. Angenehm riechende Fl., Kp.₁₂ 115—116°. — *o-Chloracetophenon*. Aus dem vorigen mit Beckmannscher Mischung. Kp.₁₃ 113°, D._{16,6} 1,2016, $n_D^{16,6} = 1,545$, $n_D^{16,6} = 1,57504$, $E\Sigma$ für $\alpha = +0,33$, für $\gamma - \alpha = +25\%$. — *Oxim*. Nadeln aus W., F. 112—113° (nicht 103°), meist ll. — *o-Iodacetophenon*, C_8H_7OJ . Aus o-Aminoacetophenon durch Diazork. u. Dampfdest. Gelbliches, sich bald bräunelndes Öl, Kp.₁₂ 139—140°, D._{18,1} 1,7487, $n_D^{18,1} = 1,61634$, $E\Sigma_\alpha = +0,50$. — *o-Chlorbenzophenon*, C_8H_5ONJ . Mit NH_2OH , HCl in wenig sd. A. (1½ Stdn.). Blättchen, F. 130—210°, ll. in A., Ä. — *o-Chlorbenzophenon*. Aus PAe., F. 52—56° (nicht 45,5°). — *o-Nitrobenzophenon*. Dargestellt wie das vorige, aber bei 125° (1 Tag). Aus Schwerbzn., F. 125° (nicht 121°). — *o-Brombenzophenonoxim*. Darst. bei 135° (2 Tage). — *o-Nitroacetophenonoxim*. Mit $(NH_2OH)_2$, H_2SO_4 in sd. verd. A. (1 Tag). — *o-Nitrobenzophenonoxim*. Nadeln aus verd. A., F. 122—123°, ll. in A., Ä., wl. in Bzl. — *o-Aminoacetophenonoxim* wird von sd. HCl nur wenig angegriffen. — Über die *o-Aminobenzophenonoxim* vgl. I. Mitt. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58. 36—51. Marburg, Univ.) LINDENBAU.

W. Ipatjew und N. Kljukwin, *Die Pyrogenisation des Naphthalins unter der gemeinschaftlichen Wirkung der Oxyde von Aluminium und Nickel*. Nach den gescheiterten Erfolgen von IPATJEW u. MATOW (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 45. 3205; C. 191. 157) mit einem aus $Ni + Al-Oxyd$ bestehenden Katalysator bei der Hydrierung von Naphthalin (vgl. auch ZELINSKY u. KOMMAREWSKY, Ber. Dtsch. Chem. Ges. 57. 667; C. 1924. I. 2407) haben Vff. die Rk. bei höherer Temp. untersucht. In dem mit 40—60 g $C_{10}H_8$ u. 3 g $Ni + Al-Oxyd$ (zu gleichen Teilen) beschickten Hochdruckapp. wurde H bis zu 100 Atm. gedrückt. Die Rk. verlief bei 450 bis 480° in 25—30 Stdn. Die Restgase (geringe Menge) bestanden zu ca. 90% aus H_2 , außerdem war etwas CH_4 vorhanden. Das Rk.-Prod., eine braune, opaleszierende Flüssigkeit, wurde in 19 zwischen 45 u. 205° sd. Fraktionen zerlegt. Die Fraktionen bis 195° bestanden fast ganz aus Bzl.-KW-stoffen (ca. 30%), außerdem wurden Bzl., Toluol u. o-Xylol nachgewiesen wurden, die höher sd. Fraktionen aus Naphthalin (ca. 20%) u. Tetralin (Rest). — Danach zerfällt bei der hohen Temp. das Tetralin im Moment seiner Entstehung, u. zwar ein beträchtlicher Teil unter Aufspaltung des hydrierten Kerns u. B. von Bzl.-KW-stoffen. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58. 1—3.) LINDENBAU.

W. Ipatjew und N. Kljukwin, *Polymerisationserscheinungen unter der geringen*

stftlichen Einwirkung von Aluminiumoxyd und metallischem Eisen bei hohen Temperaturen und Drucken. Da frhere Verss. über die Polymerisation des Äthylens in (w. von Al_2O_3 unter Druck bei $400\text{--}450^\circ$ Prodd. geliefert hatten, die nur 35 bis $3\frac{1}{2}\%$ unter 150° sd. Anteile, im übrigen hochmolekulare KW-stoffe enthielten, wurde jetzt das C_2H_4 im Moment seiner B. aus A. der Polymerisation ausgesetzt u. d. eine wesentlich höhere Ausbeute an niedrig sd. KW-stoffen erzielt. In einem Hochdruckapp. mit innerem Eisenrohr wurden 80 ccm A. u. 6 g Al_2O_3 6 Stdn. auf $5\text{--}540^\circ$ erhitzt, der Maximaldruck betrug $240\text{--}260$ Atm. Dabei entwickelten sich ca. 19—20 l Gas, das neben CH_4 u. H als Hauptbestandteilen 16—20% CO_2 u. 5—7% CO enthielt. Das Rk.-Prod. bestand aus 2 Schichten, im Mittel einer Dichte von 22 u. einer unteren von 30—34 ccm. Beide Schichten enthielten namentlich die obere bis zu 35%) wasserl. Verbb., in denen mit ziemlicher Sicherheit nachgewiesen wurden: Acetaldehyd, Aceton, i-Propylalkohol, Methyläthylketon, Methyläthylcarbinol; wahrscheinlich war auch Acetal zugegen. Der in W. unl. Rk. bestand vorwiegend aus Polymethylen-KW-stoffen, u. zwar Olefinen. Die Mengen der einzelnen Prodd. ließen sich nicht quantitativ bestimmen; in der oberen Schicht dürften ca. 20% i-Propylalkohol u. Aceton enthalten sein.

Das Auftreten der O-haltigen Verbb. ist überraschend, da bekanntlich die Dehydratation des A. schon gegen 400° vor sich geht, die B. von Aldehyd unter dem Einfluß von Fe jedoch erst oberhalb 500° einsetzt, die letztere Rk. also eigentlich nicht zu erwarten war. Sie tritt jedoch unter den Versuchsbedingungen u. dem Einfluß der Eisenwände ebenfalls ein, u. weiterhin wird der Aldehyd unter der Wkg. des Al_2O_3 polymerisiert. Letztere Rk. läßt die Analogie zwischen einem organ. Katalysator u. einem Enzym erkennen, denn Al_2O_3 wirkt hier auf Aldehyd in der gleichen Weise (vgl. unten II.) polymerisierend wie die kürzlich von NEUBERG entdeckte „Carboligase“. — Die Polymerisationsmöglichkeiten u. die weitere mögliche Rk.-Prodd. gibt folgendes Schema wieder:




Aus der Menge der gebildeten CO_2 berechnet sich, daß ca. die Hälfte des angewendeten A. in Aldehyd zerfällt, der nach III. der Cannizzarischen Rk. unterliegt. Ein gewisser Teil des übrigen u. des nach III. neu gebildeten A. zerfällt ebenfalls in Aldehyd, dieser aber erleidet die Umwandlungen I. (B. von CO) u. II. Der Rest des A. zers. sich in C_2H_4 u. H_2O , ersteres wird polymerisiert. — Hinsichtlich der Arbeitsweise muß auf das Original verwiesen werden. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58. 4—12. Leningrad, Artill.-Akad.) LINDENBAUM.

William Morris Colles und **Charles Stanley Gibson**, *Die α - und β -Naphthalinsulfonylalanine*. Die Trennung der opt.-akt. α -Naphthalinsulfonylalanine wurde durch Brucin u. Strychnin nach der Methode von GIBSON u. SIMONSEN (vgl. Journ. Chem. Soc. London 107. 798; C. 1915. II. 1017) durchgeführt. Das Brucinsalz der α -Säure u. das Strychninsalz der β -Säure wurden rein dargestellt. Zur Trennung der β -Naphthalinsulfonylalanine wurde das Strychninsalz der β -Säure in ähnlicher Weise wie bei den α -Verbb. abgetrennt. Das Brucinsalz der α -Säure ist wsl. in W. Die rohe β -Säure wurde mit NaOH u. Brucin versetzt, wodurch die fast reine β -Säure als Na-Salz in Lsg. blieb. Nach ihrer Isolierung wurde die

l- β -Säure in das NH_4 -Salz übergeführt u. einmal aus A. umkrystallisiert rein halten. Die opt. Drehung der β -Naphthalinsulfonylalanine ist von umgekehrtem Vorzeichen als die der opt.-akt. Alanine, von denen ausgegangen war. Die α - u. β -Naphthalinsulfonylalanine sind *rac.* Verbb., von welchen der F. der α -Säure tiefer liegt als die der akt. Formen, während die β -Racemate höher liegen als die akt. Isomere. Die opt. Drehung der Na- u. NH_4 -Salze der *d*- u. *l*- β -Naphthalinsulfonylalanine ist vom gleichen Vorzeichen wie bei den freien Säuren. Dagegen ist jene der akt. α -Naphthalinsulfonylalanine in A. u. in Aceton vom gegengesetzten Vorzeichen als die der Salze in W. Die Salze der β -Naphthalinsulfonylalanine haben größere Drehung aufzuweisen als die isomeren α -Verbb.

Versuchsteil. *d,l*- α -Naphthalinsulfonylalanin, $\text{C}_{13}\text{H}_{13}\text{O}_4\text{NS}$, Nadeln aus F. 133,5° aus viel h. W. oder Bzl. — *d,l*- β -Naphthalinsulfonylalanin, Nadeln aus Bzl., F. 150—150,5°. — NH_4 -Salz, Nadeln aus A. — *Brucinsalz* des *d*- α -Naphthalinsulfonylalanins, Nadeln aus A. vom F. 145°, $[\alpha] = -12,3^\circ$. — *Strychninsalz* des *l*- α -Naphthalinsulfonylalanins, Blättchen aus W., Nadeln aus verd. A., F. 132°, $[\alpha] = -19,63^\circ$. — *Strychninsalz* des *d*- β -Naphthalinsulfonylalanins, Nadeln aus A. vom F. 197°, $[\alpha] = -9,94^\circ$ (in A.). — *Brucinsalz* des *d,l*- β -Naphthalinsulfonylalanins aus h. W. Nadeln vom F. 188,5°, $[\alpha] = -19,9$ (in A.). — *d*- α -Naphthylsulfonylalanin, Prismen aus Bzl., F. 141,5—142,5°, $[\alpha] = +34,58^\circ$ u. $+40,77^\circ$ (in W.), $[\alpha] = +23,01^\circ$ (in A.), $[\alpha] = -22,76^\circ$ (in Aceton). — *l*- α -Naphthalinsulfonylalanin, Prismen aus Bzl., F. 141,5—142,5°, $[\alpha] = -34,52^\circ$ (als Na-Salz in W.), $[\alpha] = +23,01^\circ$ (in A.), $[\alpha] = +22,4^\circ$ (in A.). — *d*- β -Naphthalinsulfonylalanin, NH_4 -Salz aus A. Nadeln, F. 142°, $[\alpha] = +44,13^\circ$ (in W.). Freie Säure, F. 127—128°, $[\alpha] = +51,74^\circ$. — *l*- β -Naphthalinsulfonylalanin, Nadeln aus Bzl., F. 127—128°, $[\alpha] = -22,0^\circ$ (in A.). — *Brucinsalz*, $[\alpha] = -44,2^\circ$ (in W.). (Journ. Chem. Soc. London **125**. 2505—10. 2. 1902. Cairo, School of Med.; London, GUYS Hosp. Med. School.)

K. v. Auwers, Über 1-Methyl- Δ^1 -dihydronaphthalin. Die Vermutung, daß durch Dehydratation von 1-Methyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthol-1 gewonnene 1-Methyl- Δ^1 -dihydronaphthalin (I.) das isomere II. enthalte (vgl. LIEBIGS Ann. **415**. 6. C. 1918. II. 347), hat sich als richtig erwiesen. — Zunächst wurde das Pikrat o. F. 142° als das bereits beschriebene des α -Methylnaphthalins erkannt, was auf die leichte Dehydrierbarkeit von I. schließen läßt. I. übertrifft darin anscheinend das Δ^1 -Dihydronaphthalin. — Daraufhin wurde die Dehydratation des Carbinols unter milderen Bedingungen vorgenommen: 1. mit k. 95%ig. CH_2O_2 , Aufnehmen in Ä. Waschen, Vakuumdest. oder einfaches Absaugen des Ä.; 2. Erwärmen mit KIO_4 im Vakuum u. H-Strom u. sofortiges Übertreiben; 3. mit Grignardreagenzien im Vakuumdest. im H-Strom. Die $E\Sigma$ -Werte des so gewonnenen Prod. liegen merklich höher als die der analog gebauten α -Alkylstyrole, $\text{C}_6\text{H}_5\cdot\text{CR}:\text{H}$, während zwischen dem Δ^1 -Dihydronaphthalin u. den Styrolen Übereinstimmung herrscht. Aufklärung brachte die Oxydation. Diese lieferte außer der Ite Säure III. u. dem Glykol IV., das nach den Ausführungen von STRAUS u. REICHENBACHER (Ber. Dtsch. Chem. Ges. **54**. 48; C. 1921. I. 534) als *cis-cis*-Form angesehen wird, auch α -Tetralon, womit die Ggw. von II. (etwa 10—20%) neben I. erwiesen u. die Höhe der $E\Sigma$ -Werte verständlich ist. — Das Carbinol steht also nach dem Verlauf der Dehydratation, wie zu erwarten war, zwischen den gesättigten hydroaromat. Carbinolen u. den ungesätt. Carbinolen vom Typus V., indem die Carbinolgruppe benachbarte Doppelbindung von denen des Benzolringes weitgehend neutralisiert wird.



Das Carbinol wurde jetzt mit CH_3MgBr dargestellt. — Gemisch von 1-Methyl-*1,2,3,4-tetrahydronaphthalin* (I.) u. 1-Methen-1,2,3,4-tetrahydronaphthalin (II.), $\text{C}_{11}\text{H}_{12}$. Schwach naphthalinartig riechendes Öl, Kp_{20} 107–109°, D_{20}^{20} 0,992, $n_{\text{D}}^{20} = 1,48$, E_D für $\alpha = +0,78$, für $\gamma - \alpha = +44\%$ (Mittelwerte). — Oxydation mit KMnO_4 (1–3 O) in feuchtem Aceton unter Kühlung. Bei der Dampfdest. geht α -Tetralon über (Semicarbazon, F. 219–223°). Der stark eingeeengte Rückstand liefert durch Ausäthern *cis-cis-1,2-Dioxy-1-methyl-1,2,3,4-tetrahydronaphthalin*, $\text{C}_{11}\text{H}_{14}\text{O}_2$ (IV.), Nadelchen aus Lg., F. 75–76°, meist ll. Ansäuern der ätherischen Fl. ergibt schließlich (am reinsten bei Oxydation mit 2 O) β -[o-Acetoxyethyl]-propionsäure, $\text{C}_{11}\text{H}_{12}\text{O}_3$ (III.), Nadelchen aus W., F. 69–70°, ll. außer in Benzol; Äthylester, Kp_{15} 160–163°, D_{20}^{20} 1,0992, $n_{\text{D}}^{12,2} = 1,52618$, $n_{\text{D}}^{12,2} = 1,54327$, E_D für $\alpha = +0,71$, für $\beta - \alpha = +35\%$; Oxim, $\text{C}_{11}\text{H}_{13}\text{O}_3\text{N}$, gelbliche Nadelchen aus Bzl. + Lg., F. 123°; Semicarbazon, aus W., F. 129–131°. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58. 151–56. Marburg, Univ.)




LINDENBAUM.

W. A. ROTH und R. LASSÉ, *Verbrennungswärme der Dekahydro-Naphthaline und der Dekalone*. (Vgl. HÜCKEL, S. 956.) Die Dekaline werden mit „brennbarem Dekal“ untersucht (Zellondeckel, der mit Vaseline aufgeklebt wird); vgl. W. A. ROTH u. H. WALLASCH, LIEBIGS Ann. 407. 134; C. 1915. I. 292; Eichung mit Benzoesäure (6324,5 cal. pro g), daneben mit Naphthalin (9614 cal. pro g). Die von CLEMMENSEN aus Dekalonen hergestellten Dekaline geben zu niedrige Verbrennungswärmen. Verbrennungswärme von *cis-Dekalin* (aus techn. Material herausfraktioniert u. aus Oktalin reduziert) 10858 ± 7 cal. pro g; von *trans-Dekalin*, wo identischsprechenden Präparate stärker differieren, 10836 ± 8 cal. pro g. Wenn das *cis-Dekalin* rein gewesen ist, beträgt die Umwandlungswärme *cis* $\rightarrow$ *trans* 22 cal. Das *cis-Dekalin* ist auch therm. mit WILLSTÄTTERS u. dem von ROTH u. LEROUX untersuchten Präparat (LIEBIGS Ann. 407. 161; C. 1915. I. 293) ident.; das *trans-Dekalin* gibt eine kleinere Verbrennungswärme als LEROUXs Präparat (C. 1915. I. 293; Acad. des sciences 151. 384; C. 1910. I. 1059), was sich vielleicht durch LEROUXs andere Eichung erklärt. Bei *cis*- u. *trans-Dekalon* ist die Verbrennungswärme gleich (9204 cal. pro g). Eine Erklärung dafür müssen weitere Verss. mit anderen Präparaten bringen. (LIEBIGS Ann. 441. 48–53. Braunschweig, Techn. Hochschule.)

W. A. ROTH.

Alfred Schaarschmidt, C. Mayer-Bugström und Johann Sevon, *Neue Kondensationsprodukte aus Anthracen und Phenanthren*. I. Verss. mit Anthracen u. Phenanthren in Ggw. von AlCl_3 in aromat. KW-stoffen zeigten, daß Kondensationsprodukte eingeleitet werden, bei denen neben einer Selbstkondensation des Anthracens u. Phenanthrens eine Kondensation dieser Ringsysteme mit den aromat. KW-stoffen vorgeht. 2 Mol. AlCl_3 , 1 Mol. Anthracen u. 9 Mol. Benzol geben beim Durchleiten von O bei 50° eine grünschwarze M., die sich mit W. in die rotgefärbte, unlösl. Lsg. der Reaktionsprodd. zerlegt, während das AlCl_3 in das W. geht. Das Kondensationsprod. ist sl. in aromat. KW-stoffen mit carminroter Farbe, swl. d. in Eg.; Vf. nimmt deshalb an, daß das hochmolekulare Kondensationsprod. aus sl. weitgehend in niedrig molekulare Reste mit dreiwertigem C dissoziiert. Danach läge eine neue Klasse von KW-stoffen vor, die je nach dem Lösungsmittel oder weniger in monomolekularem rotgefärbten Zustand vorhanden, in fester Form dagegen bimolekular u. rotbraun gefärbt sind. Bei der Kondensation mit steigenden Mengen von AlCl_3 werden noch stark anthracenhaltige Prodd., beim Durchleiten von HCl weniger anthracenhaltige Prodd. erhalten. — Beim Arbeiten mit steigenden AlCl_3 -Mengen u. Einleiten von HCl tritt eine wesentliche Menge des Lösungsmittels mit in Rk. — Beim Phenanthren liefern katalyt. Mengen AlCl_3 ganz andere Kondensationsprod. — Aluminiumchlorid übt eine stark labilisierende Wrkg. auf die C-Atome, die an ungesätt. C-Atome gebunden sind, aus, wenn es sich an diese

ungesätt. Bindung addiert, so daß derartig gebundener H auf andere unge-
Moleküle reduzierend wirkt oder mit O direkt oxydiert werden kann. —



Phenanthren geben mit 320 g *m*-Xylol u. 100 g AlCl_3 bei 50° im CO_2 -Strom $\text{C}_{22}\text{H}_{16}\text{O}$ (I. bzw. II.); citronengelb bis oliv gefärbte Nadeln, aus Bzl., stark lichtbrechend, l. in konz. H_2SO_4 mit intensiv roter Farbe u. grünlicher Fluoreszenz unl. in Soda u. NaOH ; F. 218° . — I. gibt in sd. Eg. mit Chromsäureanhydrid $\text{C}_{22}\text{H}_{12}\text{O}_4$ (III.); grünlichgelbe Krystalle aus Eg., F. 232° , wobei Sublimation beginnt; die Lsg. in H_2SO_4 , Lauge etc. ist gelb; zeigt mit $\text{NaOH} + \text{Zn}$ Staub die Liebermannsche Rk. — III. gibt in NH_3 mit Zn-Staub Verb. $\text{C}_{22}\text{H}_{10}\text{O}_4$ weiße Nadeln aus A., F. 168° . Gibt bei der Oxydation wieder III. zurück. (Dtsch. Chem. Ges. 58. 156–60. Berlin, Techn. Hochschule.) Busc.

K. v. Auwers und **W. Kohlhaas**, *Zur Spektrochemie der Thiophenderivate*. Eine größere Anzahl von Thiophenderiv. wurde spektrochem. untersucht. Die Hauptergebnisse gibt folgende Tabelle wieder.

Name	D_{20}^{20}	n_D^{20}	$E \Sigma_\alpha$	$E(\Sigma_\beta - \Sigma_\gamma)$
Thiophen	1,064	1,529	−1,31	−3°
α -Thiotolen	1,018	1,522	−0,77	+1
α -Äthylthiophen	0,992	1,513	−0,64	+2
α -Propylthiophen	0,970	1,507	−0,52	+1
α -Isoamylthiophen	0,941	1,498	−0,42	+5
α -[o-Methylbenzyl]-thiophen	1,083	1,586	−0,35	+9
α -Chlorthiophen	1,278	1,548	−0,75	±0
α -Bromthiophen	1,684	1,587	−0,37	+3
β -Thiotolen	1,022	1,521	−0,88	±0
α, α' -Dimethylthiophen	0,985	1,514	−0,44	+7
α, α' -Dibromthiophen	2,141	1,630	−0,27	+12
β, β' -Dimethylthiophen	0,989	1,520	−0,26	+5
α -Acetothienon	1,170	1,567	+0,33	+51
α -Propiothienon	1,131	1,556	+0,22	+45
α -Butyrothienon	1,098	1,542	+0,31	+41
α -Isovalerothienon	1,062	1,536	+0,34	+42
α -Thienylglyoxylsäureäthylester	1,247	1,554	+0,75	+90
α -Benzothienon	—	—	+0,88	+61
α -Methyl- α' -acetothienon	1,123	1,563	+0,74	+74
α -Äthyl- α' -acetothienon	1,079	1,551	+0,90	+63
α -Propyl- α' -acetothienon	1,061	1,545	+0,76	+63
α -Thiophencarbonsäureäthylester	1,159	1,526	+0,16	+30
α -Nitrothiophen	—	—	+0,74	—


Demnach bestätigt die Thiophengruppe in bester Weise die spektroc. Grundregeln. Die Neutralisation innerhalb des Thiophenringes beschränkt sich auf die „freie“ Affinität der Partialvalenzen, sondern auch ein Teil der Affinität der Doppelbindungen selbst wird dazu verbraucht, so daß das Thiophen opt. gesättigter erscheint, als die Formel erwarten läßt, was in den kräftigen Depressiven zum Ausdruck kommt. „Störende“ Substituenten (Alkyl, Halogen) verkleinern die Depressionen oder verwandeln sie in Exaltationen, wobei ein Unterschied in e

Stellungen α u. β nicht hervortritt. Enthält die Seitenkette eine Doppelbindung, so wird mit einer solchen des Kerns eine „aktive“ Konjugation bilden kann (Ketone), so werden die Depressionen der Stammkörper in Exaltationen umgewandelt, die denjenigen der analogen Benzolderivv. im Brechungsvermögen fast gleichkommen, im Lichtstreuungsvermögen sie noch übertreffen. Das Gleichgewicht im Thiophenring ist offenbar labiler als im Benzolring, was auch im chem. Verh. zum Ausdruck kommt. — Das opt. Verh. der Thiophenderivv. ist mit der alten, richtig verstanden (vgl. v. AUWERS, LIEBIGS Ann. **415**. 139; C. **1918**. II 347) Thiophenformel genügend vereinbar, allerdings werden die feineren Abstufungen durch keine der bisher beschlagenen Formeln erklärt.

Im Anschluß an diese Unterss. wird noch über 2 Thionaphthenderivv. berichtet. — Das *Methylthionaphthen* (F. 52°) von WEISSGERBER (Brennstoffchemie **2**. 1; C. **1921**. II. 709) lieferte folgende Werte: $D_{20}^{99,7}$ 1,0490, $n_D^{99,7} = 1,57608$, $n_D^{99,7} = 1,6204$, $E\sum$ für $\alpha = +1,11$, für $\beta - \alpha = +45\%$. Bringt man wegen der hohen Siedetemp. die Korrektur von $-0,25$ an, so stimmen die Werte mit den Konstanten der α -Alkylcumarone überein. Die Verb. ist daher als α -*Methylthionaphthen* anzusehen. — Der *Thionaphthen-2-carbonsäureäthylester* von WEISSGERBER u. KRUBER (Ber. Dtsch. Chem. Ges. **53**. 1560; C. **1920**. IV. 609) gab folgende Werte: $D_{20}^{55,4}$ 1,1720, $n_D^{55,4} = 1,58370$, $n_D^{55,4} = 1,61332$, $E\sum$ für $\alpha = +1,42$, für $\beta - \alpha = -79\%$. Dieselben stimmen mit denen des α -Cumarilsäureäthylesters weitgehend überein. — Die Beobachtungen von WEISSGERBER u. KRUBER, daß Thionaphthen mit Na oder NaNH_2 unter Ersatz von 1—2 H-Atomen durch Na, ferner mit Grignardreagenzien reagiert, bieten nach neueren ähnlichen Beobachtungen keinen Anlaß, die alte Thionaphthenformel aufzugeben. (Journ. f. prakt. Ch. **108**. 321—31. 1922 Marburg, Univ.)


LINDENBAUM.

Harold Burton und Charles Stanley Gibson, *Eine neue Methode zur Darstellung von 9-Alkylcarbazolen*. (Vgl. STEVENS u. TUCKER, Journ. Chem. Soc. London **2**. 2145; C. **1923**. 123. 2145.) Wird *N*-Methylantranilsäure mit *o*-Nitrobrombenzol in Gegenwart von K_2CO_3 u. Cu-Pulver kondensiert, so gelangt man zu *N*-Methyl-2'-nitrodiphenylamin-6-carbonsäure (I) u. durch Red. zur entsprechenden Aminosäure II, oder Acetylderiv. beim Erhitzen über den F. in das Lactam III übergeführt werden kann. Wenn I mit konz. H_2SO_4 erhitzt wird, geht diese Säure zu einem anderen Betrag in *N*-Methyl-9-nitroacridon (IV) über. Durch Diazotierung von II nachträgliche Behandlung mit NaOH wird 9-Methylcarbazol (V) in guter Ausbeute erhalten.



Versuchsteil. *N*-Methyl-2'-nitrodiphenylamin-6-carbonsäure, $\text{C}_{14}\text{H}_{12}\text{O}_4\text{N}_2$ (I), aus *N*-Methylantranilsäure, *o*-Bromnitrobenzol, K_2CO_3 , Amylalkohol u. wenig Cu-Pulver durch 4-std. Kochen. Aus A. tiefrote Prismen vom F. 136—137° (Zers.). — *N*-Methyl-2'-aminodiphenylamin-6-carbonsäure, $\text{C}_{14}\text{H}_{14}\text{O}_2\text{N}_2$ (II), aus I durch Red. mit H. u. Ferrosulfat. Mit SO_2 fällen. F. 130° (Zers.). — Anhydro-*N*-methyl-2'-aminodiphenylamin-6-carbonsäure (Lactam), $\text{C}_{14}\text{H}_{12}\text{ON}_2$ (III), entsteht durch Erhitzen von II über den F. oder durch Lösen von II in sd. Xylol oder durch Verdampfen der wässr. Lsg. des NH_4 -Salzes der Aminosäure; Blättchen aus Xylol oder A. vom F. 213°.

als Basen sind. — Zur Darst. von 3-Halogenindazolen wurden die Indazole allmählich mit NaOCl, NaOBr bezw. J behandelt, wobei Ausbeute u. Reinheit der Prodd. stets sehr befriedigend waren.



Öl, Kp.₁₂ 125—126°. Pikrat, grünstichig-gelbe Nadelchen, F. 146—147°; Löslichkeit wie die des Isomeren. — 2-Allyl-5-methylindazol, C₁₁H₁₂N₂. Gelbliches Öl, Kp.₁₂ 146—147°. Pikrat, goldgelbe Nadeln (aus A.), F. 137,5—138,5°; zwl. in A. — 1-Allyl-5-methylindazol, C₁₁H₁₂N₂. Dickflüssiges Öl, Kp.₁₂ 137—138°. Pikrat, F. 115—116°. — 2-Benzyl-5-methylindazol, C₁₅H₁₄N₂. Weiße Prismen (aus Bzn.), F. 45—42,5°, Kp.₁₅ 214—215°. Sll. in organ. Lösungsmm. (außer Lg.). Pikrat, grünlich-gelbe Blättchen (aus A.), F. 151—152°, wl. in Ä. — 1-Benzyl-5-methylindazol, C₁₅H₁₄N₂. Glasglänzende Blättchen (aus Bzn.), F. 52—53°. Sll. in organ. Lösungsmm. (außer Lg.). Pikrat, gelbe Nadeln, F. 99—100°; ll. in Ä., A. — 5-Methylindazol-2-carbonsäuremethylester, C₁₀H₁₀O₂N₂. Aus 1 Mol. Methylindazol u. 2 Mol. Ameisensäuremethylester (2 Stdn., Wasserbad). Perlmutterglänzende Blättchen, F. 66—66°, ll. in organ. Lösungsmm. (außer Bzn.). Gibt bei der CO₂-Abspaltung 26 mm; 225° gleiche Mengen 1,5- u. 2,5-Dimethylindazol. — 5-Methylindazol-2-carbonsäureäthylester, C₁₁H₁₂O₂N₂. Weiße Nadeln (aus verd. A.), F. 67—68°. Löslichkeit wie beim Methylester. CO₂-Abspaltung (150 mm; 215°) führte zu gleichen Mengen 1- u. 2-Äthyl-5-methylindazol. — 2-Benzyl-3-methylindazol, C₁₅H₁₄N₂. Weiße Blättchen (aus Bzn.-PAe.), F. 85—86°; sll. in den meisten organ. Lösungsmm., zl. in Ä., A., wl. in Bzl., ll. in h. Eg., zwl. in k. Eg. — 1-Benzyl-3-methylindazol, C₁₅H₁₄N₂. Nadelchen (aus Bzn.-PAe.), F. 58—59°. In organ. Lösungsmm. ll. — 1-Methyl-2-benzylindazoliumjodid, C₁₆H₁₇N₂J. Aus 2-Benzyl-3-methylindazol u. J oder 1,3-Dimethylindazol u. C₇H₇J (im Rohr; 10 Stdn.). Nadelchen, F. 187°, in h. A. Bei der Spaltung entsteht 1,3-Dimethylindazol. — 2,3-Dimethyl-1-benzylindazoliumjodid, C₁₆H₁₇N₂J. Prismen (aus W.), F. 197°. Bei der Zers. (Vak.) B. in 1,3-Dimethylindazol sowie 1-Benzyl-3-methylindazol.

stab. u. stab. isomere Nitrobenzoylderivv. stab. o-Nitrobenzoyl-3-methylindazol, C₁₅H₁₁O₃N₃. Aus 3-Methylindazol u. o-Nitrobenzoylchlorid im Schmelzfluß. Nadeln, F. 175—176°; ll. in h. Eg., zl. in Bzl. u. A., wl. in Ä. u. CH₃OH. Wird leicht rotbraun. — lab. Form. Gelbe Prismen, F. 139°; sll. in Aceton u. Bzl., in k. A. u. Ä. Wird am Licht langsamer braun als das Isomere. Lagert sich allmählich um bei längerer Aufbewahrung. — stab. m-Nitrobenzoyl-3-methylindazol, C₁₅H₁₁O₃N₃. Prismen (aus Eg.), F. 141—142°. — stab. p-Nitrobenzoyl-3-methylindazol, C₁₅H₁₁O₃N₃. Weiße Nadelchen (aus Eg.), F. 131—132°, wl. in A. u. Bzn., swl. in Ä., ll. in h. Eg. u. h. Bzl. — lab. Form. Gelbe Prismen (aus Aceton), F. 143,5—145°. Wl. in Ä. u. Bzn., zll. in Bzl.; h. A. verseift leicht zum 3-Methylindazol. Lagert sich bei längerem Erhitzen auf F. völlig um. — stab. o-Nitrobenzoyl-3-bromindazol, C₁₄H₈O₃N₃Br. Weiße Nadeln (aus Eg.), F. 182—183°.


Halogenderivv. des einfachsten Indazols. 3-Chlorindazol, F. 147—148°. 3-Bromindazol, F. 141—142°. — 3-Jodindazol, F. 142°. — 2-Methyl-3-bromindazol, F. 133—134°. — 1-Methyl-3-bromindazol. B. bei Darst. des 2-Deriv. Öl. Gibt mit Br₂ 2-Methyl-3,5-dibromindazol, F. 105—107°. — 1,2-Dimethyl-3,5-dibromindazoliumbromid,

$C_9H_9N_2Br_3$. Aus 3,5-Dibromindazol u. CH_3Br (Rohr, 10 Stdn. 120°). Weiße Nadeln, F. 216°. Bildet beim Erhitzen über F. 1-Methyl-3,5-dibromindazol. — 5,7-Dibromindazol, $C_7H_5N_2Br_2$. Aus der Acetylverb. des 3,5-Dibrom-o-toluidins, $C_9H_9Br_2$ (Prismen, F. 201—202°) in Eg. durch Einleiten nitroser Gase u. Kochen ($\frac{1}{2}$ Std.) der Nitroverb. in Bzl. Nadelchen, F. 197—198°. Ll. in Aceton u. Ä., zl. in CH_3OH , wl. in k. Bzl., ll. in h. Bzl. — 2-Methyl-5,7-dibromindazol, $C_8H_7Br_2$. Weiße Nadelchen, F. 123°. Löslichkeit ähnlich wie beim 5,7-Dibromindazol. — 1,2-Dimethyl-5,7-dibromindazoliumbromid, $C_9H_9N_2Br_3$. Aus dem 2-Methylderiv. mit CH_3Br (10 Stdn., 130°). Weiße Nadeln (aus W.), F. 228° (unter Zers.; B. eines Gemisches von 1- u. 2-Methylderiv.) — 3,5,7-Tribromindazol, $C_7H_3N_2Br_3$. Aus Diindazol in 2-n. NaOH u. NaOBr. Weiße Nadelchen, F. 205—206°, sll. in Aceton, ll. in h. Bzl. u. A., zl. in Schwerbzn, swl. in W. u. Leichtbzn. — 2-Methyl-3,5,7-tribromindazol, $C_8H_5N_2Br_3$. Nadelchen (aus Bzn.), F. 173°. Löslichkeit wie beim 5,7-Dibromderiv. — 2-Methyl-3-jodindazol, $C_8H_7N_2J$. Aus 3-Jodindazol mit CH_3OAc u. CH_3J in CH_3OH . Prismen, auch Blättchen, F. 150—151°, ll. in organ. Lösungsmitteln, außer in Leichtbzn. — 1-Methyl-3-jodindazol. Wurde bei Darst. des 2-Methylderiv. als Öl erhalten. — 1,2-Dimethyl-3-jodindazoliumjodid, $C_9H_{10}N_2J_2$. Aus dem 2-Methylderiv. mit CH_3J (im Rohr, 10 Stdn., 100°). Farblose Krystalle, F. 220°. Bei Spaltung von CH_3J entsteht 1-Methyl-3-jodindazol.

Bromderiv. des 5-Methylindazols. 2,5-Dimethyl-3-bromindazol, C_9H_9Br . Aus 5-Methyl-3-bromindazol in 2-n. NaOH u. Dimethylsulfat in 30—35%ig. wässr. Lsg. beute. Weiße Nadelchen, F. 127—128°, ll. in den meisten organ. Lösungsmitteln, in Lg. Pikrat, gelbe Nadeln, F. 153—154° (aus CH_3OH); sll. in Ä. u. Aceton, zwl. in k. CH_3OH u. A. Vermutlich bildet sich neben dem 2,5-Dimethylderiv. ein isomere 1,5-Dimethyl-3-bromindazol; Verss. zu seiner Darst. u. Isolierung führt zu einem nicht näher charakterisierten Öl. — 1,2,5-Trimethyl-3-bromindazoliumjodid, $C_{10}H_{12}N_2BrJ$. Weiße Nadelchen, F. 221° (unter Zers.; B. eines Gemisches von 1,2,5- u. 2,5-Dimethyl-3-bromindazol). (Journ. f. prakt. Ch. 108. 297—320. 1924. Marini, Univ.)



NITSCH.

Wolfgang Langenbeck, Der Abbau des Histidins zur l-Asparaginsäure. V. hat natürliches Histidin zur Benzoyl-l-asparaginsäure wie folgt abgebaut:



Da eine Veränderung am a. C-Atom nicht vorgenommen wurde, sind die Waldensche Umkehrung ausgeschlossen. Damit ist bewiesen, daß dem Histidin wie anderen einfachen natürlichen Aminosäuren die l-Konfiguration zukommt, die übliche Bezeichnung l-Histidin auch systemat. zu Recht besteht. Danach ist aber auch ein Abbau des l-Histidins zum l-Asparagin in der Pflanze möglich. Tribenzoylverb. $C_{27}H_{25}O_5N_3$ (II.). Aus Histidinmethylester (I.) u. C_6H_5COCl (III.) KOSSEL u. EDLBACHER, Ztschr. f. physiol. Ch. 93. 396; C. 1915. II. 710). In CH_3OH , F. unscharf, $[\alpha]^{18}_{633} = -52,4^\circ$ (in Pyridin). — Benzoyl-l-asparaginsäure (IV.). II. wird in Eg. mit 3%ig. Ozon bis zur Lsg. behandelt, destilliert im Vakuum abdest., der Rückstand (III.) mit konz. methylalkoh. HCl 1 Stde. gekocht u. nach Entfernung des CH_3OH nochmals mit wss. n. HCl 1 Stde. erhitzt. Ausbeute ca. 8%. Nadeln, F. 179°, $[\alpha]^{18}_{633} = +38,4^\circ$ (in 2-n. Na_2CO_3), identisch mit aus l-Asparagin hergestelltem Vergleichsmaterial. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 55. 227—29. Karlsruhe, Techn. Hochsch.) LINDENBAUM.

Vorländer, Säure, Salz, Ester und Addukt. Aus den krystallin.-fl. (= kr.-fl.) Eigenschaften der Carbonsäure, ihrer Salze u. Ester, die von der linearen Gestalt voll. abhängig sind (vgl. Ztschr. f. physik. Ch. **105**. 211; C. **1924**. I. 117), man zu räumlichen Auffassungen der zwischen ihnen bestehenden Verhältnisse aren. Zuweilen kommen andere Einflüsse hinzu, für die zunächst eine Erklärung fehlt. Auf Grund der Lehre von den innermol. Gegensätzen (vgl. Ber. Chem. Ges. **52**. 263; C. **1919**. I. 518) wird angenommen, daß zwischen Kation u. Anion eine veränderliche Bindungsspannung herrscht, die etwa der veränderten elektrolyt. Leitfähigkeit entspricht; der wesentliche Unterschied zwischen Carbonsäure, ihrem Salz u. ihrem Ester ist demnach folgender: Zwischen Alkylsulfonion im Ester besteht eine äußerst kleine Spannung, zwischen H u. Anion der Carbonsäure eine bedeutend größere u. zwischen Metall u. Anion im Alkalisalze eine relativ sehr große Spannung. Ersetzt man die verwickelten Kraftlinienfelder durch gerade Linien, so erhält man folgende Formeln:



Die Linien nicht nur energet., sondern auch geometr. Bedeutung haben, das Mol. des Esters kurz in seiner Gestalt, das der Säure länger u. das des Alkalies am längsten. Das Carbonsäureanion selbst ist kurz im Vergleich zum Kation des Metallatoms. Hiermit stimmen die Beobachtungen über die kr.-fl. Eigenschaften überein: der überragende Salzfaktor bei den kr.-fl. Alkalisalzen der Carbonsäuren, die Abschwächung bei den freien Carbonsäuren u. stärker noch bei den Estern. Der geringeren Bindungsspannung u. Ionisationsfähigkeit entspricht die größere Linienlänge, der größeren Spannung u. Ionisationsfähigkeit der größere Abstand. Der andere Weg, der zu den gleichen raumerget. Ergebnissen führt, geht von der innermol. Addukten verschiedener Art aus, die bei den arom. α -ungesätt. Ketonen (vgl. Ber. Dtsch. Chem. Ges. **36**. 1470. **37**. 3364; C. **1903**. I. 1348. **1904**. I. 12) u. auch bei Aminen auftreten. Was aber allgemein als Bindungsspannung betrachtet wurde, tritt nun bei den Addukten im besonderen als Additionsspannung zwischen den ganzen Moll. in die Erscheinung. Bei den gefärbten, lockeren Säure-Addukten u. Alkalenaddukten der α -ungesätt. Ketone (A) stehen die Addenden in größerem Abstand voneinander, bei den farblosen, beständigeren Addukten (B) ist dieser Abstand sehr klein. Die Alkalisalze der α -ungesätt. Ketone sind mehr oder wenig gelb bis rot; chinoider Struktur ist wenig wahrscheinlich. Im allgemeinen ist die Farbe nach Rot hin lebhafter bei Salzen derjenigen Oxyverb. (Oxychalkone), welche das Hydroxyl im Benzalrest enthalten; intensiv rot sind die Salze der Bis-oxychalkonverb. Wie bei den Carbonsäuren die kr.-fl. Eigenschaften, so nehmen auch bei Phenolketonen die Färbungen ab in der Richtung: Alkalisalz $\rightarrow$ Phenol $\rightarrow$ Ester. Dennoch ist der Unterschied zwischen dem Phenol u. seinem Ester oft nicht groß. Bei den Dinatriumsalzen der p,p'-Dioxyketone, welche gegen die Mononatriumsalze vorherrschen, wird die Farbe durch die zweifache Alkalisalzbildung an der C-Doppelbindung an den zwei p-Oxybenzalresten gesteigert, aber nicht durch die Anionumlagerung. Außer der Adduktenfärbung kommt auch eine Adduktenfärbung vor. — Die freien Phenole, ihre Alkalisalze u. ihre Acyl- u. Alkylderiv. zeigen dieselbe Struktur, sind jedoch energet. verschieden. Die Bindungsspannung zwischen Metall u. Phenolsauerstoff macht sich bei den Na-Salzen der α -ungesätt. Ketone bemerkbar, deren Additionsvermögen sowohl an der C-Doppelbindung als auch an Carbonyl bedeutend schwächer auftreten, als bei den freien Phenolen u. Alkylderiv. Der p-Oxybenzaldehyd ist dementsprechend in alkal. Lsg. viel

reaktionsträger als in saurer Lsg. — Wesentliche Unterschiede zeigen sich in der Richtung der Ketone in Ggw. von Uranylsalzen; hier, wo sonst die α -C- β -Bindung in Tätigkeit tritt, sind die p-Oxybenzalketone äußerst beständig. Hydroxyl, bezw. Metalloxyd in den Phenolketonen, bezw. deren Salzen, stehen nach mit der α -C-Doppelbindung u. dem Carbonyl in stark reaktivem Zusammenhang. Mit Hilfe der kr.-fl. Beziehungen ließ sich nur schwer ein Einblick in die Verhältnisse gewinnen, da die in Frage kommenden Verbb. sich meistens beim Erhitzen oder Schmelzen zers. Bei den Phenolen ist das Krafftlinienfeld vorwiegend nach der Breite, bei den Carbonsäuren nach der Länge entwickelt. — Die gesätt. Phenolketone geben mit Säuren sehr leicht Addukte der Art A, die gelblich u. zuweilen sogar gegen W. ziemlich widerstandsfähig sind. Besonders zeigt sich in dieser Hinsicht Hydrobromide des Bisoxycyclohexanon aus, wo die entsprechenden Hydrobromide des Bisoxycyclopentanons durch W. gespalten werden. Der schwächeren Säure (erstes Keton) entsprechen also stärkeren amin. Eigenschaften. B-Addukte mit Halogenwasserstoff bilden sie überhaupt nicht. Die Adduktenfärbungen sind nicht von derselben Art wie die Färbungen der Alkalisalze. Das p,p'-Dioxydibenzalacetone addiert ebenso wie andere α -ungesätt. Ketone zwei Moll. Halogenwasserstoff. — Beim Bisoxycyclopentanone, -cyclohexanon u. - β -methylcyclohexanon wurden gelbe u. grüne Formen gefunden. Die grünen Formen entstehen bei der Zerlegung der Alkohole mit W., die gelben bei der Ausfällung der Oxyketone aus alkal. Lsg. Essigsäure oder CO_2 . Ihre Stabilitätsverhältnisse sind sehr verschieden; die grünen Formen gehen leicht ineinander über; oft entstehen beide Formen nebeneinander. Mit Alkalilauge entstehen aus beiden gleich schnell die gleichen rotorangenen Salze. Um die Präparate unter Bewahrung ihrer Eigenart chem. in Tätigkeit zu setzen, wurden sie zunächst acetyliert, wobei sich beträchtliche Unterschiede in der Reaktionsfähigkeit der beiden Formen ergaben. Beide ergaben die gelben Diacetyl-derivate, die bei den Ringketonen monotrop kr.-fl. waren, was in der Struktur der n. p-Disubstitutionsprodd. übereinstimmt. Bei der Acylierung der p-Bisoxycyclohexanone verschwindet ihre Fähigkeit, in verschiedenen farbigen Formen aufzutreten; diese fehlen bisher auch bei Monooxybenzalketonen, bei Mono- oder Disalicylen sowie bei m-Oxybenzal-Verbb. — In verschiedenen verhalten sich die trockenen gepulverten gelben u. grünen Präparate beim Überleiten von trockenem HCl (bezw. HBr). Vom Bisoxycyclopentanone wurden gelbe Präparate hergestellt, die sich indifferent gegen Halogenwasserstoff verhielten, während sich die entsprechenden grünen Präparate momentan gelblich-blau-schwarz färbten. Durch Zusatz sehr kleiner Mengen Eg. oder A. ließen sich auch die gelben Formen für die Additionsrk. aktivieren. Auf Grund der bisherigen Erfahrungen kann vorläufig noch keine Erklärung für diese verschiedenen Formen gegeben werden. Stereoisomerie kommt nicht in Frage; möglicherweise handelt es sich um die grünen Formen gleichsam um die freien Radikale der farbigen Säureaddukte.



Versuche. Mit **Heinrich Hiemesch**, **Karl Schoenemann**, **Walther Stroh** u. **Karl Kunze**. p-Oxybenzalacetophenon, $\text{C}_{15}\text{H}_{12}\text{O}_2$ (I), aus p-Oxybenzaldehyd u. Acetophenon, gelbe Schuppen aus Bzl., F. 182—183°. Na-Salz, mit Na-Alkohol ziegelrot. NH_4 -Salz auch rot. — Einw. von CH_3J auf das Na-Salz ergab p-Methoxybenzalacetophenon, F. 76°. Dibromid, F. 140°, nicht kr.-fl. — Acetylierung ergab das weiße Acetoxybenzalacetophenon, $\text{C}_{17}\text{H}_{14}\text{O}_3$, F. 130°, nicht kr.-fl. — Benzoyl-Blättchen aus A., F. 104—105°, nicht kr.-fl., in konz. H_2SO_4 orangegelbe Lösung. Spaltung von I mit KOH ergab Acetophenon u. Oxybenzaldehyd. — Mit Phenylhydrazin u. A. + Na ergab I das Pyrazolin $\text{C}_{21}\text{H}_{18}\text{ON}_2$, goldglänzende Blätter aus (A. + W.), F. 146°. — Durch Red. von I in alkoh. Lsg. mit Na-Amalgam bis orange Farbe in schwachgelb überging, entstand Verb. $\text{C}_{15}\text{H}_{14}\text{O}_2$ oder $\text{C}_{15}\text{H}_{14}\text{O}$.

Nadeln, F. 81—83°. — *Benzal-p-oxyacetophenon* (vgl. KOSTANECKI, Ber. Dtsch. Chem. Ges. **32**, 1924), orangegelbes *Mononatriumsalz*. — *Acetylverb.*, F. 90°; *Acetylverb.*, gelbliche Blättchen aus A., F. 142°, beide nicht kr.-fl. — *p-Oxybenzal-p-oxyacetophenon*, $C_{15}H_{12}O_3$, aus *p*-Oxyacetophenon u. *p*-Oxybenzaldehyd, Nadeln aus W., F. 197°. Konz. H_2SO_4 gibt rotes Addukt. — *Acetylverb.*, gelbliche Nadeln aus A., F. 126°, nicht kr.-fl. — *Benzoylverb.*, gelbliche Nadeln aus A. (Bzl.), F. 183°, nicht kr.-fl. — *p-Oxybenzal-p-methoxyacetophenon*, $C_{16}H_{14}O_3$, Acetylanisol, gelbe Nadeln aus verd. A., F. 180°, mit konz. H_2SO_4 dunkelrot. — *Acetylverb.*, Nadeln aus A., F. 144°; *Benzoylverb.*, Nadeln aus A., F. 141°, beide nicht kr.-fl. — *p-Methoxybenzal-p-oxyacetophenon*, $C_{16}H_{14}O_3$, aus Anisaldehyd u. Oxyacetophenon, gelbe Nadeln aus A., F. 188—190°, nicht kr.-fl., mit konz. H_2SO_4 rotes Addukt u. gelbrote Lsg.; gelbes A-Hydrochlorid. — *Acetylverb.*, gelbliche Nadeln aus A., F. 101°. — *Benzoylverb.*, gelbliche Nadeln aus A., F. 154°. — *p-Dioxydibenzalacetone*, $C_{17}H_{14}O_3$ (II), nach ZINCKE u. MÜHLHAUSEN (vgl. Ber. Dtsch. Chem. Ges. **36**, 129; C. **1903**, I. 457); die Natur des Lösungsm. ist von Einwirkung auf die Darst. der gelben u. grünen Formen. — *Monohydrochlorid* u. *Monobromid*, beide blau-schwarz. — Die Lsgg. der grünen Form sehen grün, die gelben gelb aus (in A., Eg.); die gelbe Form ist unbegrenzt haltbar, die grüne zeigt die Tendenz, sich gelbbraun zu färben. In konz. H_2SO_4 sind die Lsgg. von beiden Formen gleichmäßig purpurrot. — Bei Einw. von Acetanhydrid auf II wird die grüne Form nach 10 Tagen bei 15—20° von der grünen Form 84%, von der gelben nur 16% acetyliert; beide Formen gaben die gleiche *Diacylverb.*, F. 166°, nicht kr.-fl. — Die Lsg. der grünen Form geht mit überschüssigem Acetanhydrid in violett über. — *Dibenzoat* von II, gelbliche Blättchen aus A., F. 208°, nicht kr.-fl. — *p-Dioxydibenzal-cyclopentanone*, $C_{19}H_{16}O_3$, aus Cyclopentanone u. *p*-Oxybenzaldehyd, gelbe Form: Pulver oder Nadeln aus A., F. oberhalb 300° (vorher beginnende Zers.). Die grüne Form verwandelt sich beim Erhitzen in die gelbe, zers. sich bei 250°, F. 300° (völlige Zers.). — *Monohydrochloride* u. *-bromide* A, blaue Kristalle. — Die gelbe Form wurde aus ihrer alkal. Lsg. mit verd. HCl in gelblicher Nd. gefällt, doch ging die grüne Färbung an der Luft wieder in gelbe über. — *Diacetat*, aus beiden Formen die gleiche Verb., F. 240°, zwei krystall.-feste Formen, monotr. kr.-fl. — *Dibenzoat*, gelbe Nadeln oder Blättchen aus A., F. 228°, I. F. 230°, enantiotrop kr.-fl.; 2 krystall.-feste Formen. Die gelbe u. grüne Form gaben beide das gleiche Dibenzoat. — *Bisäthylcarbonat*, mit Äthyläthylsäureäthylester, gelbe Blättchen aus A., II. F. 182—183°, I. F. 187°; enantiotrop kr.-fl. — *p,p'-Dioxydibenzal-cyclohexanone*, $C_{20}H_{18}O_3$ (III), aus Cyclohexanone durch Oxydation von Cyclohexanol mit $Na_2Cr_2O_7 + H_2SO_4$ u. *p*-Oxybenzaldehyd, gelbgrünliche Nadeln aus A. (Mischung von beiden Formen), F. 282° (Zers.). Die Formen sind hier weniger beständig als beim Cyclopentanone. *Monohydrochloride*, schwarzblaue oder blauviolette glänzende Blättchen oder Nadeln; Spaltung in zwei Mischungen, zuweilen rein grüne Präparate, F. 291° (korr.) unter Zers. ohne nennenswerter Verwandlung in die gelbe Form. — *Diacetat*, $C_{24}H_{22}O_5$, gelbe oder Prismen aus (Chlf. + A.), F. 182°; bei der gelben Form verlief die Spaltung in zwei; beide Formen gaben das gleiche Diacetat; monotrop kr.-fl.; rotviolette Kristalle. — Konz. H_2SO_4 . — *Dibenzoat*, $C_{34}H_{26}O_5$, gelbe Nadeln aus (Chlf. + A.), II. F. 252°, I. F. 252°, enantiotrop kr.-fl.; 2 krystall.-feste Phasen. — *Bisäthylcarbonat*, gelbe Nadeln oder Tafeln aus (Chlf. + A.), II. F. 133°, I. F. 163°. — *p-Dioxydibenzal-cyclohexanone*, a) aus Anisaldehyd u. Cyclohexanone, b) aus III u. Methyläthyläther: Zerlegung des blauvioletten *Monohydrochlorids* mit W. gibt keine grüne Form. — Gelbe Nadeln, II. F. 162°, I. F. 173°, enantiotrop kr.-fl. — Red. von III in Suspension mit Na-Amalgam ergab *p-Dioxydibenzylcyclohexanol*, $C_{20}H_{24}O_3$, gelbe Kristalle aus 40%ig. A., II. in A. u. Ä., wl. in W., F. 185° (korr.), nicht kr.-fl. —

Triacetat, $C_{26}H_{30}O_6$, Nadeln aus Essigsäure, F. 133° (korrr.), nicht kr.-fl. *benzoat*, $C_{41}H_{36}O_6$, Nadeln aus (Bzl. + A.), F. 168° (korrr.), nicht kr.-fl. — *oxydibenzal- β -methylcyclohexanon*, $C_{21}H_{20}O_3$ (IV). Aus β -Methylcyclohexan-p-Oxybenzaldehyd in A. bei Ggw. von trockenem HCl entstand zunächst schwarzblaue *Monohydrochlorid* A, hieraus durch Zers. mit Alkali gelbe, I. Krystalle, F. 227° (manchmal auch gelbgrün oder blaugrün); beim Erhitzen die grüne Form in die gelbe über; nicht kr.-fl. Rotes *Dinatriumsalz*, Lsg. H_2SO_4 violett. — *Diacetat*, $C_{25}H_{24}O_5$, schwach gelbe Nadeln aus A., F. 175° kr.-fl. — *Dibenzoat*, blaßgelbe Nadeln aus (Chlf. + A.), II. F. 160° , I. I. enantiotrop kr.-fl. — *Dianisal- β -methylcyclohexanon*, a) aus IV u. Dimethylb) aus β -Methylcyclohexanon u. Anisaldehyd in alkoh. Lsg. mit trockenem Zerlegung des blauen Hydrochlorids A mit W. oder Alkalien, gelbe Nadeln aus wss. $CH_3 \cdot OH$, F. 114° ; keine grüne Form, rote Lsg. in konz. H_2SO_4 , nicht kr.-fl. — *Monoanisal- β -methylcyclohexanon*, $C_{15}H_{18}O_2$, aus Anisaldehyd u. dem in alkoh.-alkal. Lsg., gelbe Prismen aus wss. $CH_3 \cdot OH$, F. $96-97^{\circ}$; blaues Hydrochlorid gibt mit W. keine grüne Form, nicht kr.-fl. — *p-Oxybenzalanisal- β -methylcyclohexanon*, aus vorigem u. p-Oxybenzaldehyd durch HCl, rotviolett. Hydrochlorid zerlegen, gelbe Nadeln aus $CH_3 \cdot OH$, F. 193° , keine grüne Form; Na-Salz; violette Lsg. in konz. H_2SO_4 ; nicht kr.-fl. Methylierung ergibt Anisalverb.; Acetylierung ergibt *Acetat*, gelbe Nadeln, F. 168° , nicht kr.-fl. der Kondensation der Salicylaldehydverb. der cycl. Ketone gehen die roten Dinatriumsalze der o-Bisoxycyclohexanverb. u. daraus durch verd. Säuren die freien gelben oxycyklohexanone hervor. *Disalicylalcyclopentanone*, F. gegen 193° (Zers.). — *Disalicylalcyclohexanon*, gelbe Nadeln aus Bzl., F. 150° . — Bei der Kondensation mit Eg. entstehen nach Zerlegung der primär gebildeten Hydrohaloide farblose Aldehyde vom Charakter der Dilactone (vgl. BORSCHKE u. GEYER, LIEBIGS ANZ. 1899, 29; C. 1912. II. 1969), die unter Violettfärbung 1 HBr aufnehmen, hieraus durch Einw. von W. Verb. $C_{20}H_{16}O_2$, Nadeln aus Aceton, F. 159° . — Beim Disalicylalacetone treten gelbe u. grüne Formen auf.


Mit **Heinrich Hiemisch**. Die Na-Salze wurden durch Zusatz der berechneten Mengen Na-Methylatlsg. zur äth. Lsg. des Phenols hergestellt. Die Farbe der Salze war bei: p-Oxybenzoesäure u. deren Methylester: weiß; p-Oxyacetophenon: orange; p-Oxybenzaldehyd: farblos [in Lsg.]; p-Oxyzimtsäure: gelb, deren Methylester: orangegelb; Benzal-p-oxycetophenon: orangegelb; p-Methoxybenzal-p-oxycetophenon: gelb in Lsg.; p-Oxybenzal-p-methoxyacetophenon: rotorange; I: ziegelrot; p-Oxybenzal-p-oxycetophenon: bräunlichrot; II: gelbe Form + $2NaOCH_3$: ziegelrot, + $1NaOCH_3$: rot; p-Oxybenzal-p-anisal- β -methylcyclohexanon: gelb in Lsg.; IV: rotorange in Lsg.; III alle Formen: rotorange; p,p'-Dioxydibenzal-cyclohexanon: alle Formen: rot; Disalicylal-cyclohexanon: rot.

Mit **Heinrich Hiemisch**, **Karl Schoenemann** u. **Walter Schade**: Aus den p,p'-Dioxydibenzalketonen mit HCl u. HBr. Von den beiden Formen nimmt die grüne mehr Halogenwasserstoff auf als die gelbe; Addukte der ersten enthalten 2 Mol. HCl. Die gelbe Form des *Bis-p-oxycyclopentanons* enthält 2 Mol. HCl, die grüne nur 1 Mol. Die Additionsfähigkeit der grünen Form wird durch A. oder Eg. nicht steigern. Von HBr addierten beide, die gelbe Aktivierung durch A., 2 Mol. Die gelbe Form von III addierte nahezu 1 Mol. HCl oder 2 Mol. HBr, die grüne Form 1–2 Mol. HBr.



Mit **Karl Schoenemann**. Bei der Einw. von Hydroxylamin auf I entstehen neben Ringschluß zu Isoxazolen noch andere Rkk., wie die Spaltung von I

des p-Oxybenzaldehyds u. des Acetophenons. In alkal. Lsg. entsteht das *γ-Phenyl-α-p-oxyphenylhydroisoxazol*, $C_{15}H_{13}O_2N$ (b), glänzende Blättchen aus wss. Lsg., F. 147°. — *Acetat*, weiße Krystalle aus A., F. 104°, nicht kr.-fl. — *Benzoat*, aus h. Bzl., F. 158–160°, nicht kr.-fl. — *Methyläther*, Blättchen aus wss. Lsg., F. 103°. — In essigsaurer Lsg. entsteht aus I mit Hydroxylamin das *γ-Phenyl-α-p-oxyphenylisoxazol*, $C_{15}H_{11}O_2N$ (a), glänzende Blättchen aus A., F. 165–166°, mit C u. H_2SO_4 keine Färbung. — *Methyläther*, F. 120°. — Bei der Einw. von Hydroxylamin auf das *Anisalacetophenon* entstehen neben anderen schwer zu isolierenden Verb. das *γ-Phenyl-α-p-methoxyphenylisoxazol*, $C_{16}H_{13}O_2N$, F. 120° (vgl. den Methyläther oben), u. das *γ-Phenyl-α-p-methoxyphenylhydroisoxazol*, F. 103° (vgl. den Methyläther oben). (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58. 118–43. Halle, Univ.) ZANDER. — Sieglitz und H. Koch, *Über Dibenzohomopyran*. Vff. haben *Dibenzohomopyran* (I) aufgebaut u. in *Phenanthren* übergeführt. Die Unters. bildet einen Beweis für die Formel II des *Thebenols* u. stützt, unter der Voraussetzung, daß bei der Umwandlung des *Thebains* in *Thebenol* keine Verschiebung der Brücke eintritt, erneut die Annahme, daß sich die Brücke in 5-Stellung des Morphinrings angegliedert befindet; gleichzeitig stellt sie eine neue *Phenanthrensynthese* auf. (Vgl. FREUND, Ber. Dtsch. Chem. Ges. 30. 1383; C. 97. II. 317; PSCHORR, Ber. Dtsch. Chem. Ges. 33. 56; C. 1910. I. 2112).





Versuche. (Vgl. Diss. HERBERT KOCH, München 1924.) *o-Nitrophenolbenzyläther*, $C_{13}H_{11}O_3N$, aus *o-Nitrophenol*kalium u. Benzylchlorid; Kp.₁₀ 210°; F. 29° (aus Lg.). — *o-Aminophenolbenzyläther*, $C_{13}H_{13}ON$, F. 39–40°, Blättchen, aus Lg. — $C_{15}H_{14}ONCl$: Nadeln, aus A. + Ä. oder W. + HCl, Fl. 193°. — *Acetylverb.* $C_{15}H_{15}O_2N$, Blättchen, aus Lg., F. 92°. — *Iodphenylbenzyläther*, $C_{13}H_{10}OJ_2$, aus *o-Jodphenol* u. *o-Jodbenzylbromid* mit H. sd. A.; Blättchen, aus A., F. 94°. — Verss., durch Diazotieren von *o-Aminophenolbenzyläther* oder aus *o,o'-Dijodphenylbenzyläther*, *Dibenzohomopyran* herzustellen, nicht zum Ziel. — *o-Nitrophenol-β-phenyläthyläther*, $C_{14}H_{13}O_3N$, Kp.₁₄ 221°; gelbe Nadelchen, aus absol. A., F. 38–39°. — *o-Aminophenol-β-phenyläthyläther*, $C_{14}H_{15}ON$, Kp.₁₃ 198°. — *Acetylverb.* $C_{16}H_{17}O_2N$, Nadeln, aus Lg., F. 83°. — *Benzoylverb.* $C_{21}H_{19}O_2N$, Blättchen, aus Lg., F. 113–114°. — *Dibenzohomopyran*, (I), aus *o-Aminophenol-β-phenyläthyläther* durch Diazotieren u. Verkochen; Nadeln, aus Lg., F. 116°. — Daneben entsteht als Hauptprod. *Brenzcatechin-β-phenyläthyläther*, $C_{14}H_{14}O_2$, Nadeln, F. 49°, l. in Alkali. — *Benzoylverb.* $C_{21}H_{18}O_3$, rötliche Nadeln, F. 78–79°, aus Lg. — *Dibenzohomopyran* gibt mit konz. H_2SO_4 bei 220–250° u. Erwärmen mit Chromsäure u. Eg. *Phenanthrenchinon*. — *o-Thiophenolbenzyläther*, $C_{13}H_{11}O_2NS$, citronengelbe Nadeln, aus Lg., F. 82–83°; Kp.₁₀ 230°. — *o-Aminothiophenolbenzyläther*, $C_{13}H_{13}NS$, Blättchen, aus Lg., F. 45°. — *Benzoylverb.* $C_{15}H_{15}ONS$, Nadelchen, aus Lg., F. 57°. — *Benzoylprod.*, $C_{20}H_{17}ONS$, I, F. 67–68°. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58. 78–82. München, Bayer. Akad. Wiss.)

BUSCH.

Görg Wittig, *Über die Einwirkung von Ammoniak auf o-Oxyphenyl-1,3-diaceton* (Vorläufige Mitteilung). (Vgl. Ber. Dtsch. Chem. Ges. 57. 88; C. 1924. I. 100.) Als Ausgangsmaterial diente das *2-Methyl-6-acetylacetophenol*, $C_{11}H_{12}O_3$ (I). 10 g *2-Methyl-6-acetophenol*, 50 g Essigester u. 8 g Na. Nadeln aus verd. H_2SO_4 , F. 85–86°, unl. in PAe., Bzn., wl. in Bzl., ll. in A., Eg., Aceton. [Die Vorschrift gibt auch für das l. c. beschriebene *4-Methyl-6-acetylacetophenol* (II) Ausbeute.]. — Durch kurzes Kochen mit Acetanhydrid u. Na-Acetat geht I,

wie in Gemeinschaft mit **Bangert** gefunden wurde, über in *2,8-Dimethyl-3-chromon*, $C_{15}H_{12}O_3$ (III.). Aus Schwebzbn., F. 121,5—122,5°, unl. in PAe., Bzn., l. in Bzl., ll. in A., Eg., Aceton. — Sättigt man eine alkoh. Suspension I. mit NH_3 -Gas, läßt über Nacht stehen u. verdunstet bis auf wenige cc krystallisiert eine Verb. aus, die als *2,8-Dimethyl-3-aminochromanon*, $C_{11}H_{13}O_2N$ aufgefaßt wird, da sie in gleicher Weise auch aus III. entsteht. Citronen-Nadeln aus Bzl. + Bzn., F. 100,5—101°, swl. in PAe., Bzn., l. in A., Bzl., Eg., Aceton, kaum l. in NaOH, l. in Säuren. Geht bei mehrstd. Stehen mit HCl in *2,8-Dimethylchromon* über, wird von sd. NaOH zu *3-Methylsalicylsäure* gespalten. Färbung mit Spuren $FeCl_3$ rot, mit alkoh. $FeCl_3$ intensiv blau. Nicht acylierbar; mit sd. Acetanhydrid u. Na-Acetat entsteht *2,8-Dimethylchromon* — *2,8-Dimethyl-2-aminochromanon* (?), $C_{11}H_{13}O_2N$. Aus der Mutterlauge von (ca. 1 Teil auf 9 Teile II.). Nadeln aus Bzl. + Bzn., F. 119—120°, von ähn. Löslichkeit wie II. Mit alkoh. $FeCl_3$ grüngelb. — Einw. von Semicarbazid auf II. liefert unter Ringaufspaltung 2 Verbb., deren Konst. sich daraus ergibt, daß sie mit demselben Reagens auch aus I. entstehen: 1. *Semicarbazon* v. $C_6H_5(OH)(CH_3)[C(N:NH.CO.NH_2).CH_2.CO.CH_3]$. Mikrokrystallin. Nd., F. 1



197° unter Gasentw., unl. außer in Eg., unverändert in NaOH. — 2. *5-Methyl-3-[3'-methyl-2'-oxyphenyl]pyrazol*, $C_{11}H_{12}ON_2$ (IV.). Aus dem Filtrat des vor. mit W. Nadeln aus Bzl. + Bzn., F. 133—133,5°, in PAe., Bzn., l. in Bzl., ll. in A., Eg., Aceton, S

u. Alkalien. Mit $FeCl_3$ intensiv blau. Bildet sich auch aus dem vorigen mit 2-n. NaOH u. Füllen mit Essigsäure. — Wird I. mit 25%ig. wss. NH_3 10. gekocht, so entsteht die Molekülverb. *2,8-Dimethyl-3-aminochromanon* + *2,8-Dimethylchromon*, $C_{22}H_{25}O_4N$, die auch aus den Komponenten in Bzl. dargestellt werden kann. Gelbliche Krystalle aus Bzl. + Bzn., F. 98,5—99°, unl. in PAe., l. in Bzl., ll. in Bzl., A., Eg., Aceton, swl. in Säuren u. Alkalien. Mit $FeCl_3$ wie II. mit Semicarbazid dieselben Prodd. wie II. bezw. I. neben *2,8-Dimethylchromon*. Mit $(C_2H_5)_2NH$ liefert I. nur *2,8-Dimethylchromon*, III. wird nicht angegriffen (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58. 19—24. Marburg, Univ.) LINDENBAUM

O. Magidson und G. Menschikow, Über die Jodierung von α -Aminopyridin. Aminopyridin läßt sich leicht jodieren, indem sich zuerst ein ziemlich stabiles Jodid bildet, das mit h. Alkalilauge ein Jodaminopyridin liefert. — Das Jodid bildet β' -Stellung; ein zweites J-Atom konnte nicht eingeführt werden. — Die Einführung des J beeinflusst den bas. Charakter des Aminopyridins nur wenig. — Versuch β' -Jod- α -aminopyridin, $C_5H_5N_2J$, aus α -Aminopyridin in 36%ig. HJ, W. u. u. Verkochen der zuerst gebildeten Verb. $C_5H_5N_2J_2$ mit KOH oder aus α -Aminopyridin + J- KJ-Lsg.; Nadeln aus W., F. 129°, ll. in Ä. — Pikrat, $C_6H_5N_2(C_6H_4(NO_2)_3(OH))$, F. 240° (Zers.). — *N-Methyl- α -acetaminopyridiniumjodid* gibt mit HJ das Jodhydrat des *N-Methyl- α -pyridonimids*, Prismen, aus Ä., F. 148—149°. — *Perjodid*, $C_5H_5N_2J_2$, dunkle Nadeln, F. 144—146°. — β' -Jod- α -nitraminopyridin, $C_5H_5N_2J.NH.NO_2$, aus Jodaminopyridin in H_2SO_4 (D. 1,84), W. u. HNO_3 (D. 1,4) unter Eiskühlung; gelbliche Nadeln, aus Essigester, F. 189° (Zers.). Läßt sich mittels H_2SO_4 nicht zu Jodaminonitropyridin umlagern. — β' -Jod- α -pyridon, $C_5H_4N_2O$, aus β' -Jod- α -aminopyridin durch Diazotieren in H_2SO_4 oder aus α -Pyridon

Perhydrol; Prismen, aus W., F. 183—189°; ll. in schwachen Alkalien u. konz. Säuren; beginnt bei 140° zu sublimieren. — β' -Jod- α -chlorpyridin, $\text{O}_5\text{H}_3\text{NClJ}$, aus α -aminopyridin durch Diazotieren in HCl; Schuppen, aus A., F. 99°; riecht stark nach Benzaldehyd; ist nicht bas. — β' -Jod- α -methoxypyridin, aus β -Jod- α -chlorpyridin mittels Natriummethylats, Kp. 231°. Riecht nach Nerolin; ist eine schwache Säure. Pikrat, $\text{C}_8\text{H}_3\text{N}(\text{OCH}_3)$, $\text{C}_6\text{H}_2(\text{NO}_2)_3(\text{OH})$: rhomb. Krystalle oder Nadeln, aus W., F. 147°. — β' -Nitro- α -methoxypyridin, $\text{C}_6\text{H}_3\text{N}(\text{NO}_2)(\text{OCH}_3)$, aus β' -Nitro- α -pyridon, durch Reduktion mit CH_3J ; Nadeln, aus W., F. 110°; ist mit Wasserdämpfen flüchtig, besitzt einen charakteristischen Geruch. — β' -Amino- α -methoxypyridin, aus der NO_2 -Verb. mit SnCl_2 u. HCl. — β' -Jod- α -methoxypyridin, Kp. 85°. (Dtsch. Chem. Ges. 58. 113—18. Moskau.)

BUSCH.

Robert Behrend, *Zur Geschichte der Harnsäuresynthesen*. Die erste Synthese ist bekanntlich von HORBACZEWSKI veröffentlicht, der sie durch Schmelzen von Glykokoll, Trichlormilchsäureamid, freier Trichlormilchsäure u. Monochloressigsäure mit Harnstoff erhalten haben will. Nachprüfung durch Eduard Hoffmann ergab, wie erwartet wurde, bei Verwendung von Glykokoll keine die Murexidprobe liefernde Substanz (nach Zusatz von 2% Harnsäure war die Rk. schwach aber deutlich, von 10% sehr deutlich), bei Verwendung von Trichlormilchsäureamid dagegen aus je 10 g 9 Harnsäure. (LIEBIGS Ann. 441. 215—16.)



SPIEGEL.

August Prüsse, *Synthese methylierter Harnsäuren nach Behrend und Roosen*. Bei Verss., den Anwendungsbereich der Harnsäuresynthese von BEHREND u. ROSEN (vgl. LIEBIGS Ann. 251. 235 [1889]) weiter zu prüfen, führten Vff. verschiedene Verss. aus. Aus Isodialursäure u. Methylharnstoff entstand nachweisbar 7-Methylharnsäure, bei Oxydation mit PbO_2 β -Methylallantoin liefernd, mit s. Methylharnstoff 7,9-Dimethylharnsäure. — 3-Methyl-i-dialursäure gab mit Methylharnstoff 3,7-Dimethylharnsäure, durch Chlorierung in 3,7-Dimethyl-5-chlor- $\Delta 4,9$ -i-dialursäure (vgl. BILTZ u. DAMM, LIEBIGS Ann. 406. 29; C. 1914. II 697) überführt. Verss. zur Vereinigung von 3-Methyl-i-dialursäure mit s. Dimethylharnstoff führten nur zu Methyl-i-barbitursäure, die aus jener auch für sich bei Kochen mit conc. HCl entstand. — 1-Methyl-i-dialursäure gab mit Harnstoff die erwartete Dimethylharnsäure, charakterisiert durch das Mg-Salz, mit Methylharnstoff 1,7-Dimethylharnsäure, überführbar in 1,7-Dimethyl-5-chlor- $\Delta 4,9$ -i-dialursäure (vgl. BILTZ u. DAMM, LIEBIGS Ann. 413. 142; C. 1917. I. 386), mit s. Dimethylharnstoff aber nicht in 1,3-Dimethylharnsäure, sondern eine Verb. vom F. 195—197°, für die aus den Analysen keine einfache Formel errechnen ließ. — 1,3-Dimethylisodialursäure, in W. u. konz. Säuren unl., konnte weder mit Harnstoff noch mit methylierten Harnstoffen kondensiert werden. — Es lassen sich also nach der bekannten Methode 1-, 3- u. 7-Methylharnsäure, 1,7-, 3,7- u. 7,9-Dimethylharnsäure, ferner aber 9-Methylharnsäure, 1,3-, 1,9-, 3,9-Dimethylharnsäure, ferner keine der Trimethylharnsäuren oder Tetramethylharnsäuren gewinnen. Mit Methylharnstoff erhält man das CH_3 stets in 7-Stellung.

7-Methylharnsäure, $\text{C}_6\text{H}_6\text{O}_3\text{N}_4$, F. 370—372° (Zers.; nach E. FISCHER 370—380°), in 200 Teilen sd. W. — β -Methylallantoin, F. bei langsamem Erhitzen 211—213°, bei raschem 217—219° (nach FISCHER korr. 225—227°). — 7,9-Dimethylharnsäure, $\text{C}_8\text{H}_8\text{O}_3\text{N}_4$, F. 393—395°. — 3,7-Dimethylharnsäure, F. 395—400° (Zers.). — 1-Methyl-i-barbitursäure, $\text{C}_5\text{H}_6\text{O}_3\text{N}_2$, aus 1-Methylnitrouracil mit Sn u. HCl, Nadelchen (aus W.), F. 247—249°, bei Liegen an Luft rot gefärbt. — 1-Methyl-i-dialursäure, $\text{C}_6\text{H}_6\text{O}_3\text{N}_4$, aus der vorigen durch Br, krystallin., F. 103—108°, durch geringste Verunreinigungen rote, hygroscop. M., mit $\text{Ba}(\text{OH})_2$ veilchenblau. — 1-Methylharnsäure, beim Erhitzen schwache Bräunung 400°. — Dimethylnitrouracil entsteht aus 3-Methylharnstoff auch mit $(\text{CH}_3)_2\text{SO}_4$. — 1,3-Dimethyl-i-barbitursäure, $\text{C}_6\text{H}_8\text{O}_3\text{N}_2$, Nadelchen, F. 195—197°. — 1,3-Dimethyl-i-dialursäure, $\text{C}_8\text{H}_8\text{O}_4\text{N}_2$, rhomb. Blättchen, F. 227°.

bis 229°, l. in ca. 300 Teilen h. W., fast unl. in A. u. Ä. (LIEBIGS Ann. 441 bis 215.)

Kurt Schmedes, *Über die Einwirkung von Formaldehyd auf alkylierte Methyluracile*. Läßt man unter den von BEHREND u. KIRCHER (LIEBIGS Ann. 385, C. 1912. I. 496) für Darst. von 5-Oxymethylmethyluracil aus Methyluracil gegebenen Bedingungen CH_2O auf 1,4-Dimethyluracil wirken, so bleibt das Ausgangsmaterial unverändert, u. bei längerem Kochen entstehen untrennbare Gemische fast unl. Kondensationsprodd., ebenso, wenn man zu zum Sieden erhitzter Lsg. Dimethyluracils in Formalin nach Entfernen der Flamme eine größere Menge HCl gibt. Möglicherweise liegt mehr oder weniger verunreinigtes polymeres Methyluracil nach Analogie des Prod. aus Trimethyluracil (vgl. unten) vor. In vielen weiteren Verss. konnte unter Lösen des Dimethyluracils in sehr ger. Überschuß von konz. HCl eine einheitliche Verb. $\text{C}_7\text{H}_9\text{O}_2\text{N}_2\text{Cl}$, 5-Chlormethyl-1,4-methyluracil (I) erhalten werden. Dieses spaltet bei Kochen mit W., mit N. schon in der Kälte CH_2O ab neben einem wl., wahrscheinlich dimolekularen Kondensationsprod. des Dimethyluracils. Br-W. liefert in der Wärme unter Abspaltung von CH_2O 5-Brom-1,4-dimethyluracil, in Kälte ein sehr unbeständiges Zwischenprod., das an Luft unter Abgabe von Br gelb wird, bei Erhitzen mit W. in NH_3 -Lsg. in jenes übergeht, vermutlich 4,5-Dibrom-5-oxymethyl-1,4-dimethyldihydrouracil. Red. mit Sn u. HCl lieferte 1,4,5-Trimethyluracil (vgl. BEHREND u. KIRCHER l. c.), dessen F. zu 217—218° gefunden wurde. — Beim Trimethyluracil zeigte die Anlagerung von CH_2O ganz unmöglich. Ein einheitlicher Körper wurde erhalten, wenn CH_2O der zum Sieden erhitzten Lsg. in Gemisch von 10 Vol. V. 1 Vol. konz. H_2SO_4 oder konz. HCl nach Entfernen der Flamme zugegeben wurde. Er ist in allen Lösungsmitteln außer konz. Säuren wl., hat die Zus. des Trimethyluracils, aber keine Doppelbindung u. wird daher als Hexamethylbisuracil (II) bezeichnet. Da die Ausbeute mit der Menge CH_2O bis zu $\frac{1}{2}$ Mol. steigt, kann man annehmen, daß sich 1 Mol. desselben an 1 Mol. Trimethyluracil anlagert u. das Prod. mit einem 2 Mol. Trimethyluracil unter Abspaltung des CH_2O reagiert. Das Verb. reagiert mit Br heftig unter Entw. von HBr u. B. von Dibromhexamethylbisuracil, ganz verschieden vom monomolekularen Monobromtrimethyluracil (vgl. HAGEN, LIEBIGS Ann. 244. 11 [1888]), dessen F. Vf. zu 134—135°, nach Siegel bei 126° fand. Bei Verss., das Br durch Alkali, NH_3 oder $\text{Ba}(\text{OH})_2$ abzuspalten, wurde die Dibromverb. unter B. von $\text{CH}_3\cdot\text{NH}_2$ weitgehend zers.; die Abspaltung gelang schließlich durch frisch gefälltes $\text{Pb}(\text{OH})_2$, wobei als Nebenprodd. eine i. l. Verb. vom F. 258—260°, nicht näher untersucht, entstand, als Hauptprod. die Verb. von der ungefähren Zus. $\text{C}_{14}\text{H}_{18}\text{O}_5\text{N}_4$, vielleicht durch Ersatz von beiden durch 1 O, F. 291—293°, zwl. in h. W., ll. in konz. Säuren.




Die Darst. größerer Mengen Dimethyluracil u. Trimethyluracil mittels CH_2O muß unter langsamer Zugabe desselben u. sorgfältiger Kontrolle der Temp. erfolgen. Dimethyluracil wird dem Nd. aus der angesäuerten Lsg. durch Chlf. entzogen. Trimethyluracil nach Abfiltrieren des aus der angesäuerten Lsg. nach 24 Stdn. geschiedenen Dimethyluracils u. Abdampfen aus dem Rückstande mit Ä. ausgezogen. — 1,4-Dimethyl-5-chlormethyluracil, $\text{C}_7\text{H}_9\text{O}_2\text{N}_2\text{Cl}$ (I), Krystalle, gelbliche Färb. 230°, Zers. 238—240°, spaltet in wss. Lsg. schon in der Kälte HCl ab. — 4,5-brom-5-oxymethyl-1,4-dimethyldihydrouracil(?) (vgl. oben), Zers. 160—170° (Aufblähen), dann wieder fest u. F. unscharf 180—190°. — Hexamethylbisuracil, $\text{C}_{14}\text{H}_{18}\text{O}_5\text{N}_4$.

chen, Zers. 300—310° (Braunfärbung), krystallisierbar aus Eg. — *Dibromhexabisuracil*, $C_{11}H_{18}O_4N_4Br_2$, Braunfärbung von 215° an, F. 249—251° (Aufblähen). — *b. C₁₁H₁₈O₅N₄* (? , vgl. oben), Nadelchen, F. 291—293°. (Einzelheiten vgl. Station, Hannover 1924.) (LIEBIGS Ann. 441. 192—203.) SPIEGEL.


urt Brass und Grete Nickel, *Phenanthrenchinondiazide*, *Diaminodioxy- und triphenanthrenchinone*. Das Phenanthrenchinon-2,7-diazid spiegelt in seinen Eigenschaften diejenigen des Phenanthrenchinon-2-azids (vgl. BRASS, FERBER, SIEDLER, Ber. Dtsch. Chem. Ges. 57. 121. 128; C. 1924. I. 1028. 1029) durchaus in dem Maße wieder, wie die Einführung einer weiteren Azidgruppe in die Stellung gleichwertige 7-Stellung erwarten lassen sollte. Hier u. auch bei den Fällen vorliegender Arbeit erkennt man den negativen Einfluß der mehrfachen Besetzung gleichwertiger Stellen des Phenanthrenchinons. — Versuche: *4,5-Dinitrophenanthrenchinon*, hellgelbe Nadeln, aus Eg., F. 301°. — *4,5-Dinitrophenanthrenchinonoxaline*, farblose bezw. blaßrosa Nadeln schm. bei 356 bezw. 262°. — *Luminophenanthrenchinon*, $C_{14}H_{10}O_2N_2$, aus der Dinitroverb. mit Natriumhydroxid alkal. Lsg.; schwarzviolette Nadeln, aus der tiefblauen Lsg. in A., schm. nicht bei 360°; l. in Pyridin u. Nitrobenzol mit blauer Farbe, in Bzl., Eg. wl. unlöslich, in alkoh. KOH mit gelber Farbe (Red. zum Hydrochinon), die mit der Zeit nach Olivgrün umschlägt (K-Salz des Chinhydrons); nach einigem Stehen wird gelb. In konz. H_2SO_4 l. mit gelber Farbe. Läßt sich mit Nitrosylschwefel-azid Diazotieren. Die Diazolsg. scheidet beim Verkochen das rotbraune *2,7-Dioxyphenanthrenchinon* aus. — *2,7-Diacetoxypheanthrenchinon*, rote Täfelchen, aus Eg., F. 262°. — *2,7-Diaminophenanthrenchinon* ist ein Farbstoff, der eine gewisse Ähnlichkeit mit dem 2-Aminophenanthrenchinon hat; es färbt gebeizte u. ungebeizte Baumwolle grau. — *2,7-Diaminophenanthrophenazin*, $C_{20}H_{14}N_4$, blauschwarze Nadeln, aus A., F. 320°, F. 325°, sl. in C_6H_5N mit blaustichig roter Farbe, in konz. H_2SO_4 unlöslich. — *Monoxim des 2,7-Diaminophenanthrenchinons*, $C_{11}H_{11}O_2N_3$, aus der violetten Oxim-Lsg., olivschwarze Nadeln; ll. in Eg. mit roter, in C_6H_5N mit violetter Farbe. — *Phenanthrenchinon-2,7-tetrazoniumperbromid*, aus dem Diamin in konz. H_2SO_4 mit Nitrosylschwefelsäure u. Br in KBr-Lsg. — *Phenanthrenchinon-2,7-diazid*, $C_{11}H_8O_2N_6$, als Perbromid mit 10% ig. NH_3 ; braune Krystalle, aus A., F. 248° (Zers.); l. in Pyridin mit braunroter Farbe; verpufft mit konz. H_2SO_4 explosionsartig, desgl. beim Erhitzen, nicht durch Schlag. Gibt in geringer Menge mit k. konz. H_2SO_4 (Vorsicht) intensiv rote Lsg.; in verd. H_2SO_4 l. mit gelbbrauner Farbe unter N-Entw. — *Chinoxalin*, $C_{20}H_{10}N_8$, gelbe Nadeln, aus Pyridin, sintert bei 200°, F. 211°, l. mit gelber Farbe in Eg., Bzl., wl. mit roter in A., mit rotbrauner Farbe in konz. H_2SO_4 unter N-Entw. — *2,7-Diamino-3,6-dioxyphenanthrenchinon*, $C_{11}H_{10}O_4N_2$, als Diazid mit H_2SO_4 (3 Vol. konz. H_2SO_4 , 1 Vol. W.) bei 100°; Nadeln, aus A., F. 160°; schwarz, swl., in C_6H_5N l. u. in Alkali wl. mit grüner Farbe; mit Fe-Salz färbt Baumwolle wird fast schwarz, mit Cr-Salz gebeizte oder ungebeizte Schaf- und Baumwolle gefärbt. — *2,3,6,7-Tetraoxyphenanthrenchinon*, $C_{14}H_8O_6$, aus der Diazidverb. mit Nitrosylschwefelsäure u. Verkochen; swl. mit brauner Farbe in A., in konz. H_2SO_4 mit olivbrauner Farbe in Lsg., in Alkali l. olivbraun. Ist ein schlechter Farbstoff, färbt mit Cr-Salz gebeizte Baumwolle u. Schafwolle echt braun. — *4,5-Dinitrophenanthrenchinon* läßt sich infolge seiner größeren Empfindlichkeit nur in saurer Lsg. (mit Sn u. HCl) zum *4,5-Diaminophenanthrenchinon* reduzieren; F. 230°; färbt Schafwolle grauschwarz, mit Fe-Salz gefärbte Baumwolle violett-schwarz. Die Diaminoverb. gibt über das *4,5-Perbromidphenanthrenchinon-4,5-diazid*, $C_{14}H_8O_2N_6$, aus A., F. 160°; l. in C_6H_5N mit tief violetter Farbe unter N-Entw. — *Chinoxalin*, $C_{20}H_{10}N_8$, gelbe Nadeln, aus C_6H_5N , F. 211°; wl. mit gelber Farbe in Eg., Bzl., mit roter Farbe in C_6H_5N , in konz.

H_2SO_4 intensiv rot unter N-Entw. — 4,5-Diamino-1,8-dioxyphenanthren $\text{C}_{11}\text{H}_{10}\text{O}_2\text{N}_2$, aus dem 4,5-Diazid mit verd. H_2SO_4 (2 Vol. H_2SO_4 , 1 Vol. W.) neben hochmolekularen Zers.-Prodd.; schwarze Blättchen, aus A., wl. mit rotv. Farbe in A., in Alkali wl. mit olivgrüner, in $\text{C}_5\text{H}_5\text{O}$ mit braunvioletter Färbung ein mangelhafter Farbstoff. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58. 204—11. Stuttgart 1896, Dtsch. Forsch.-Inst. f. Textilind.)

Gustav Heller, Über organische Thiosulfonsäuren. Nach Versuchen von Johannes Quast und Kurt Blanc. Zur Darst. von Thiosulfonsäuren dürfte das älteste Verf. von BERNTHSEN (LIEBIGS Ann. 230. 73. 251. 1. Ber. Dtsch. Chem. Ges. 25. 3128) die in der Technik aufgefundene Methode (D. R. P. 84849) in präparativer Hinsicht vorzuziehen sein, bei welcher salzsaure Nitrosobasen mit $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ bei 100° von Eg. unter B. von Thiosulfonsäure in 30—40%ig. Ausbeute reagieren:



Bei Behandlung der Säuren mit 1 Mol Dimethylsulfat in soda-alkalischer Lösung werden fast ausschließlich die Thiosulfonsäureester erhalten; bei der Diäthylsulfat-Lösung bildete sich nebenher in geringer Menge eine alkylierte Säure. Läßt man I. mit NH_3 u. CS_2 stehen, so bildet sich primär das Losanitschsche Salz, das unter Spaltung von SO_3 u. S in 5-Dimethylamino-1-mercaptobenzothiazol (II.) übergeht:



II. läßt sich mit H_2O_2 zum Disulfid oxydieren, das bei der Red. das Disulfid zurückliefert. Es ist tautomer im Sinne der Formeln III. u. IV., was sich li. Alkylierung kundgab. Aus dem Alkalisalz entstand mit CH_3J das Jodmethylat des N-Alkyläthers (V.), aus dem Ag-Salz dagegen das Jodmethylat des S-Alkyläthers (VI.). Einw. von KCN auf I. führte zum Deriv. des 1-Aminobenzothiazols (VII.) (vgl. FICHTER u. BECK, Ber. Dtsch. Chem. Ges. 44. 3636; C. 1912. 222).

erhaltene Verb. ist die desmotrope Iminform (VIII.), denn sie gibt mit ein nicht krystallisierendes Nitrosamin.

Mittels HCOOH gelang es, aus I. das 5-Dimethylaminobenzothiazol (IX.) darzustellen. Mit $\text{C}_6\text{H}_5\text{OH}$ kann I. leicht durch ClONa zu einer Thiosulfonsäure des Typs (X.) oxydiert werden, die beim Stehen in ätzalkal. Lsg. von selbst in 5-Dimethylamino-3-oxythiazim (XI.) übergeht. Von Interesse ist, daß I. sich mit 1-Naphthochinon-4-sulfosaurem Salz zu einem Thiazinfarbstoff vereinigt, wobei zunächst in der Kälte ein Indophenol (XII.) bildet, das beim Erwärmen den Indophenol (XIII.) (D. R. PP. 83046, 84849).

Eine andere Methode zur Darst. von Thiosulfonsäuren besteht in der Einw. von S_2O_3 u. CH_3COOH auf Chinone. Aus Benzochinon läßt sich so Hydrobenzothiosulfonsäure erhalten, die sich zur Chinonthiosulfonsäure oxydieren läßt (D. R. P. 175070). Ihre Reaktionsfähigkeit gegen Basen führte aber nicht zur Bildung einfacher Derivv. β -Naphthochinon gibt nach diesem Verf. eine 1,2-Dioxy- β -naphthalinthiosulfonsäure (D. R. P. 71314), die sich durch HNO_3 zur 1,2-Naphthochinonthiosulfonsäure oxydieren ließ. Die 4-Stellung der Thiosulfonsäuregruppe wurde durch B. von Anilidonaphthochinon erwiesen werden. Mit Amidodimethylthiosulfonsäure u. Naphthochinonthiosulfonsäure wurde dasselbe Brillantalarin gewonnen wie aus 1,2-Naphthochinon-4-sulfonsäure. Es fand sich weiter, daß 1-Naphthochinon sich nach derselben Methode in eine 1,4-Dioxy-naphthalinthiosulfonsäure überführen ließ, die mit $\text{K}_3\text{Fe}(\text{CN})_6$ zur α -Naphthochinonthiosulfonsäure oxydiert wurde. Daß die S-haltige Gruppe im Chinonkern steht, ergibt sich aus der Überführung in p-Toluidinonaphthochinon.


Versuche. 1-Amino-4-N-dimethylanilin-2-thiosulfonsäure, $\text{C}_8\text{H}_{12}\text{O}_3\text{N}_2\text{S}_2$ (I.), 195° (Zers.). Methylester, grünliche Prismen, in organ. Lösungsm. wl. 212–238° (aus 50%ig. CH_3COOH). — 5-Dimethylamino-1-mercaptobenzothiazol, $\text{C}_7\text{H}_9\text{S}_2$ (II.). Gelbe Nadeln, F. 230° (Braunfärbung); ll. in Aceton, A., Essig. wl. in Ä. Ist amphoter (B. farbloser, krystallisierter Salze mit Mineralsäuren). In salzsaurer Lsg. mit FeCl_3 bläuliche Färbung, in alkoh. Lsg. mit Natrialkal. AgNO_3 -Lsg. grüngelben, lichtempfindlichen Nd. Zeigt keine Senfölrk., und an Reduktionsmitteln nicht angegriffen u. ist unverseifbar. Bildet mit NaNO_2 in konz. Nd. Benzoylverb., $\text{C}_{10}\text{H}_{11}\text{ON}_2\text{S}_2$. Goldgelbe Nadeln (aus 80%ig. A.), ll. in Bzl., A., Essigester; F. 119–120°. N-Methyläther, $\text{C}_{11}\text{H}_{15}\text{N}_2\text{S}_2\text{J}$ (V.). Nadeln in H_2O , F. 187° (Zers.). S-Methyläther, $\text{C}_{11}\text{H}_{15}\text{N}_2\text{S}_2\text{J}$ (VI.). Farblose Nadeln in H_2O , F. 205°. — Bis-(dimethylaminobenzothiazol)-disulfid, $\text{C}_{18}\text{H}_{18}\text{S}_2\text{N}_4$, rote Nadeln (aus A.), ll. in Bzl., F. 161°. — 5-Dimethylamino-1-iminobenzothiazol, $\text{C}_7\text{H}_9\text{S}$ (VIII.), schwach gefärbte Nadelchen (aus A.-haltigem W.), F. 176–177°. Benzoylverb., $\text{C}_{16}\text{H}_{15}\text{ON}_2\text{S}$, grüngelbe Nadeln (aus A.), F. 218–219° (unter Dunkelheit). — 5-Dimethylaminobenzothiazol, $\text{C}_7\text{H}_{10}\text{N}_2\text{S}$ (IX.), farblose Blättchen (aus A.), F. 79°. Im allgemeinen ll. — 3-Dimethylaminoindophenol-1-thiosulfonsaures Natrium, $\text{C}_{11}\text{H}_{13}\text{O}_4\text{N}_2\text{S}_2\text{Na}$ (X.), grünliche Nadeln. — 9-Dimethylaminophenthiazon (Dimethylthionolin), $\text{C}_{14}\text{H}_{12}\text{ON}_2\text{S}$ (XI.), grünliche Nadeln. In Bzl. rot mit blauer, in A. violett mit bräunlicher, in CCl_3H feuerrot mit roter Fluoreszenz. Wl. in Lg. mit scharlachroter Farbe. — 3-Dimethylamino-3'-indophenol-1-thiosulfonsaures Na, $\text{C}_{11}\text{H}_{12}\text{O}_4\text{N}_2\text{S}_2\text{ClNa}$. Aus der Thiosulfonsäure durch Chlorphenol. Grünliche Krystalle. — 9-Dimethylamino-6-oxy-5-oxobenzothiazin (Brillantalarinblau), $\text{C}_{13}\text{H}_{11}\text{O}_4\text{N}_2\text{S}$ (XIII.). Bläuliche Nadeln, in A. (bläuliche), Bzl. (carmoisinrot), Essigester, wl. in Eg. (blau), Xylol (blau), mit grüner Farbe in konz. Mineralsäuren. Sintert bei 160°; Zers. bei 305°. — 11-Dimethylamino-2-oxyindonaphthol-6-sulfosaures Kalium-13-thiosulfonsaures Kalium, $\text{C}_{16}\text{H}_{14}\text{O}_5\text{N}_2\text{S}_3\text{K}_2$ (analog XII.). Aus der Thiosulfonsäure u. 1-Naphthochinon-4,6-disulfonsaures K. Hellblaue Nadeln (aus W.). Alkalien lösen

rotbraun, Säuren gelb. — 9-Dimethylamino-6-oxy-5-oxonaphthoparathiazim-2-saures K, $C_{18}H_{13}O_5N_2S_2K$. Blaue Substanz; wss. Lsg. blauviolett. Konz. I. löst gelb. Freie Säure, $C_{18}H_{11}O_5N_2S_2$. Schwarzviolett; wss. Lsg. blauviolett. — 1-Amino-4-diäthylanilin-2-thiosulfonsäure, $C_{10}H_{16}O_3N_2S_2$. Krystalle, F. 228° (Zers.). Methylester, $C_{18}H_{18}O_3N_2S_2$; Krystalle (aus CH_3OH), F. 199°. — 9-Diamino-6-oxy-5-oxobenzonaphthoparathiazim, $C_{20}H_{18}O_3N_4S$. Grüne Nadeln (aus die bei 215° sintern (unter Violettfärbung). — 1-Amino-5-methyl-4-äthylanilin-sulfonsäure. Farblose Prismen (aus W.), F. 232° (unter Zers.). — Hydrochinosulfonsaures K, $C_6H_5O_5S_2K$, farblose Nadeln (aus verd. A.). — Chinonthiosulfonsaures K, $C_6H_5O_5S_2K$. Gelbe Nadeln. — 1,2-Dioxynaphthalin-4-thiosulfonsaures K, $C_{10}H_7O_5S_2K$. Krystalle (aus W.). — 1,2-Naphthochinon-4-thiosulfonsaures K, $C_{10}H_5O_5S_2K$. Gelbe Nadeln, wl. in A. mit gelber Farbe. — 1,4-Dioxynaphthalin-2-thiosulfonsaures K, $C_{10}H_7O_5S_2K$. Wss. Lsg. zersetzt sich beim Stehen, rasch erwärmen. — 1,4-Naphthochinon-2-thiosulfonsaures K, $C_{10}H_5O_5S_2K$. Gelbe Prismen (aus Bzl., F. 290°). Bei Red. H_2S -Entw. u. B. gelblicher Nadeln (F. 134°). (f. prakt. Ch. 108. 257—74. 1924. Leipzig, Univ.) NITSCHE

Karl Freudenberg, Hans Fikentscher und Max Harder, *Abbau- und Umwandlungsversuche am Catechin*. 18. Mitteilung über Gerbstoffe und ähnliche Verbindungen (17. vgl. FREUDENBERG u. BLÜMMEL, LIEBIGS Ann. 440. 45; C. 1924. II. 331). Aus dem Unvermögen des Tetramethylcatechins zur Abspaltung von W., das aus den Ergebnissen der Einw. seines Toluolsulfoesters auf Hydrazin (vgl. FREUDENBERG, ORTHNER u. FIKENTSCHE, LIEBIGS Ann. 436. 286; C. 1924. I. 103; FREUDENBERG u. FIKENTSCHE, LIEBIGS Ann. 440. 36; C. 1924. II. 2753) hervorgeht, wurde gefolgert, daß in jener Substanz (I.) das OH in Transstellung zu dem benachbarten Ringgliede (beide in I. fest gedruckt) steht. Umgekehrt tritt dann im raumisomeren Tetramethylepicatechin (vgl. FREUDENBERG u. PURKLE, LIEBIGS Ann. 437. 274; C. 1924. II. 331) die Abspaltung von W. eintreten können. Es wurde wieder der Umweg über den Toluolsulfoester gewählt. Aus diesem geht in der Tat durch Hydrazin Toluolsulfosäure abgespalten unter B. einer unvollständigen Verb., Tetramethylanhydroepicatechin, der einstweilen die Formel (II.) eines Epicatechin-cumarons zugewiesen wird, leicht zur gesätt. Verb., Tetramethyldeoxyepicatechin (III.) reduzierbar. II. u. III. sind opt.-inakt., woraus zugunsten der Formel (II.) die Nachbarschaft der beiden hierin a. C-Atome geschlossen wird. Trotz der verschiedenen Gründe für diese Formel kann sie nur mit Vorbehalt als endgültiger Ausdruck für Tetramethylcatechin u. -epicatechin angesprochen werden. Denn ein jetzt aus dem Toluolsulfotetramethylcatechin durch energ. Behandlung mit Chinolin erhaltene Tetramethylanhydrocatechin, das inzwischen auch von DRUMM, MAC MAHON u. CO. (Proc. of the Roy. Irish Acad. 36. Sect. B 41 [1923]. 149 [1924]) aus dem milchsauren Chlorid des Tetramethylcatechins durch Einw. von Pyridin gewonnen wurde, ist zwar auch opt.-inakt., aber nicht, wie nach I. zu erwarten wäre, dem Prod. aus dem Epicatechinderiv. ident., auch die Hydrierungsprodd. verschieden. Es läßt dies darauf schließen, daß in einem der beiden Ringe eine Ringerweiterung oder tiefer greifende Umlagerung eingetreten ist. Tatsächlich konnte aus dem Tetramethylanhydrocatechin durch Red. nach KOSTANECKI das für das C-Gerüst des Tetramethylcatechins kennzeichnende Diphenylpicatechin (IV., R = H) bereit werden. — Bei Verss., aus Tetramethylcatechin durch Erhitzen mit $Ba(OH)_2$ W. abzuspalten, trat Phloroglucintrimethyläther auf; dies läßt aber nicht auf die Konst. des Catechins schließen, da auch Phloroglucinmonomethyläther auf gleichem Wege zu ca. 10% in den Trimethyläther übergeführt werden konnte.

Gegenüber HAZLETON u. NIEBENSTEIN (Journ. Americ. Chem. Soc. 46. 1924. 1511).

24. II. 2338) wurde erneut die Identität des aus Catechin gewonnenen Reaktionsprod. vom F. 87—88° mit synthet. Pentamethoxy- α,γ -diphenylpropan (IV., $\text{C}_{20}\text{H}_{24}\text{O}_5$) festgestellt, gleiches auch für das Äthoxytetramethoxyderiv. (vgl. FREUDENBERG u. COHN, Ber. Dtsch. Chem. Ges. 56. 2127; C. 1923. III. 1620). Dies gilt auch für das aus Acaciaholz stammende oder durch Umlagerung gewonnene *Epigallocatechin* (Verss. von O. Huber).



synthet. Verss. gingen vom 3,4-Dimethoxybenzal-3,5-dimethoxycumaranon (V.) aus, das DUMONT u. TAMBOR (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 43. 1969; C. 1910. II. 395) aus 3,5-Dimethoxycumaranon (VI.) u. Veratrumaldehyd hergestellt haben. Die Synthese dieses Cumaranons verläuft aber nach ihrer Vorschrift mit schlechter Ausbeute u. ist von ihnen irrtümlich gedeutet worden. Bei der Kondensation von Phloroglucintrimethyläther u. Bromacetyl bromid mit AlCl_3 entsteht nicht, wie sie annehmen, α -Bromphloracetophenontrimethyläther (VII., $\text{X} = \text{Br}$), sondern ein Ester von α -Chlorphloracetophenontrimethyläther (VIII.) mit dem entsprechenden Alkohol. Die entsprechenden Trimethyläther (VII.) wurden in sehr guter Ausbeute durch Kondensation des Phloroglucintrimethyläthers mit Chlor- bezw. Bromacetyl- gewonnen, mittels AlCl_3 bezw. AlBr_3 daraus die beiden Dimethyläther, u. diese wurden nun mit K-Acetat das Dimethoxycumaranon in befriedigender Menge. Das 3-Methoxybenzal dimethoxycumaranon (V.) läßt sich katalyt. mit Pt hydrieren, wobei die Anlagerung nicht genau bei 1 Mol. H_2 Halt macht u. schwer zu entfernende Nebenprodd. entstehen, besser mit Ni, wobei 1-(3,4-Dimethoxybenzyl)-3',5'-dimethoxy-

cumaranon vom F. 136° , 10° höher als das von HAZLETON u. NIERENSTEIN haltene, entsteht. Seine Konst. wird durch die B. des früher (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 56. 2117; C. 1923. III. 1620) beschriebenen [2-Oxy-4,6-dimethoxyphenyl- β -(3',4'-dimethoxyphenyl)-äthyl]-ketons bei alkal. Red. mit Zn-Staub erwiesen. $\text{C}_6\text{H}_5\cdot\text{NH}\cdot\text{NH}_2$ entsteht ein Gemisch von Einwirkungsprodd. von 1 u. 2 Moll. Hydrazins. Dagegen liefert 3,4-Dimethoxybenzylcumaranon, durch katalyt. Red. Kondensationsprod. von Cumaranon u. Veratrumaldehyd erhalten, glatt das M-phenylhydrazon. — Phenylbrompropionylchlorid (vgl. E. FISCHER, Ber. Dtsch. Chem. Ges. 37. 3062; C. 1904. II. 1206) konnte in das Amid, dieses in das Nitril übergeführt werden, das sich auch mit Phloroglucintrimethyläther nach HOFMANN kondensieren ließ. An dem entstandenen ω -Brom- ω -benzyltrimethylphloracetophenon (X.) ließ sich aber der Ringschluß mittels K-Acetat nicht erzwingen.

Cumaronylphenylcarbinol (XI.) (vgl. STOERMER, CHYDENIUS u. SCHINN, Ber. Dtsch. Chem. Ges. 57. 72; C. 1924. I. 773) wurde aus 1-Benzoylcumaron glatt als Al-Amalgam erhalten (Verss. von H. HESS). Dieses Benzoylcumaron ergab O. Huber bei Vakuumdest. von *o*-(Benzoylmethoxy)-benzylalkohol (XII.), der ebenso wenig wie sein Bromid zu n. Ringschlusse neigt. Auch das Phenacylderiv. Phenols konnte nicht mit Methylal zum Ringschluß gebracht werden. Derselbe Mitarbeiter stellte das Phenacylderiv. des Resorcinmonomethyläthers, 1-(Benzoylmethoxy)-3-methoxybenzol her u. arbeitete ein neues Verf. zur Darst. von 4-Benzoylveratrol aus. — W. Stoll hydrierte (2-Oxystyryl)-(3',4'-dimethoxyphenyl)-keton (XIII.) als Benzoylderiv. zum gesätt. Keton u. gewann ferner (2,4,6-Trimethoxystyryl)-(3',4'-dimethoxyphenyl)-keton (XIV.) u. das zugehörige gesätt. Keton.

Versuche. H. Fikentscher: *p*-Toluolsulfotetramethyl-*l*-epicatechin, $\text{C}_{26}\text{H}_{28}\text{O}_5$, Nadeln (aus A. oder besser aus Lsg. in wenig Chlf. durch CH_4O), am Tageslicht allmählich rot werdend, F. $165\text{--}168^{\circ}$ (Rotfärbung), $[\alpha]_{\text{D}}^{25} = -16.9^{\circ}$ (in Acetylchlorid, 3.5%). — Tetramethylanhydroepicatechin, $\text{C}_{19}\text{H}_{20}\text{O}_5$ (II.?), Nadeln (aus A.), F. 119° , l. in Bzl., Chlf. u. h. A., mäßig l. in Ä., k. A., swl. in Lg., unl. in wss. Säuren u. Alkalien. — Tetramethylanhydrocatechin hat F. 136° . — Bei E. von PCl_5 auf Bzl.-Lsg. von Tetramethyl-*l*-epicatechin entsteht ein roter flockiger Nd., aus CH_4O krystallisierbar, in W. l., dann bei Zusatz von Säuren in roten Nadeln ausgeschieden, l. in h. Alkalilauge mit gelber Farbe, dabei verändert. Dieses Oxoniumsalz, verschieden von dem von HAZLETON u. NIERENSTEIN beschriebenen, entsteht auch durch Einleiten von HCl in Bzl.-Lsg. von Tetramethylanhydroepicatechin. — Tetramethyldesoxyepicatechin, $\text{C}_{19}\text{H}_{22}\text{O}_5$ (III.?), Blättchen (aus A.), F. 112° .

M. Harder: 1,3,5-Trimethoxy- ω -chloracetophenon, $\text{C}_{11}\text{H}_{13}\text{O}_4\text{Cl}$ (VII., R = Cl), Krystalle (aus A.), F. $95\text{--}96^{\circ}$. — 1,3,5-Trimethoxy- ω -bromacetophenon, $\text{C}_{11}\text{H}_{13}\text{O}_4\text{Br}$ (VIII., R = Br), F. 86° . — 1,3-Dimethoxy-5-oxy-6-chloracetophenon, $\text{C}_{10}\text{H}_{11}\text{O}_4\text{Cl}$ (VIII., R = Cl), Krystalle (aus CH_4O), F. $144\text{--}146^{\circ}$. — 1,3-Dimethoxy-5-oxybromacetophenon, $\text{C}_{10}\text{H}_{11}\text{O}_4\text{Br}$ (VIII., R = Br), F. $130\text{--}131^{\circ}$. — 3,4,1',3'-Tetramethoxybenzylcumaranon, $\text{C}_{19}\text{H}_{20}\text{O}_8$, Nadeln (aus CH_4O), F. 136° , Kp._{1.5} $210\text{--}220^{\circ}$. Gibt mit amalgamiertem Al in fast neut. Lsg. ein Reduktionsprod. $\text{C}_{19}\text{H}_{21}\text{O}_8$, Nadelchen, F. $127\text{--}128^{\circ}$, l. in h. CH_4O , scheinend nicht acetylierbar, mit $\text{H}_2\text{SO}_4 + \text{FeCl}_3$ die Farbrk. des Tetramethylanhydrocatechins zeigend, mit Zn-Staub in alkal. Lsg. Oxytetramethylhydrochalkon 3,4-Dimethoxybenzylcumaranon, $\text{C}_{17}\text{H}_{17}\text{O}_4$, Krystalle (aus viel CH_4O), F. 150° . 3,4-Dimethoxybenzylcumaranon, hellgelbe Nadeln (aus Ä.), F. $78\text{--}79^{\circ}$. Phenylhydrazon, $\text{C}_{23}\text{H}_{22}\text{O}_3\text{N}_2$, farblose Krystalle (aus CH_4O), F. 171° . — β -Phenyl- α -brompropionylamid, $\text{C}_9\text{H}_{10}\text{ONBr}$, Krystalle (aus Bzl.), F. 127° . — β -Phenyl- α -brompropionitril, $\text{C}_9\text{H}_9\text{NBr}$ (IX.), schwach gelbes Öl, Kp.₁₀ $130\text{--}135^{\circ}$. — ω -Brom- ω -benzyltrimethylphloracetophenon, $\text{C}_{18}\text{H}_{19}\text{O}_4\text{Br}$ (X.), farblose, an der Oberfläche bald gelb gefärbte Krystalle (aus Eg.), F. $101\text{--}102^{\circ}$. — H. HESS: 1-Benzoylcumaron,

aldehyd u. Bromacetophenon in absol. A. bei Erhitzen mit K_2CO_3 . F. 91° . — *o*-phenylcarbinol (XI), F. 76° .

Huber: *o*-(Benzoylmethoxy)-benzylalkohol (Phenacylsaligenin), $C_{15}H_{14}O_3$, bei Einwirkung von Salicylalkohol u. K_2CO_3 in Aceton mit ω -Bromacetophenon, Büschel von sechsseitigen Prismen (aus $CH_4O + W.$), F. $86-87^\circ$, sl. in Aceton, Essigester, Bzl., wl. in k. A. u. CH_4O , swl. in Ä. u. CCl_4 , unl. in PAe. u. Lg. In konz. H_2SO_4 allmählich mit weinroter Farbe gel. — *o*-(Benzoylmethoxy)-benzylbromid, $C_{15}H_{13}BrO_2$, Nadeln (aus Lg., Kp. $70-130^\circ$), F. 93° , ll. in Bzl., Chlf., Pyridin, zwl. in Ä. u. CH_4O , Lg. u. Ä., in konz. H_2SO_4 tief dunkelrot l. — 1-(Benzoylmethoxy)-2-oxymethylbenzol (Phenacylresorcinmonomethyläther), $C_{15}H_{14}O_3$, Prismen, F. $85-86^\circ$. — 4-Brombrenzcatechin-2-methyläther wird mit $(CH_3)_2SO_4$ methyliert, es fällt ein isomeres Bromveratrol ausgeäthert u. im Vakuum dest., Kp. $127-128^\circ$.

J. Stoll: (2-Oxystyryl)-(3',4'-dimethoxyphenyl)-keton (XIII). Benzoylderiv. $C_{24}H_{22}O_5$, hellgelbe Krystalle, F. $127-128^\circ$. — [β -(Benzoyl-2-oxystyryl)-äthyl]-[3',4'-dimethoxyphenyl]-keton, $C_{24}H_{22}O_5$, aus dem vorigen mit H_2 in Ggw. von Pt-Mohr in Bzl., Nadeln [aus CH_4O], F. $100-101^\circ$. Oxim, $C_{24}H_{23}O_5N$, F. $150-151^\circ$, gibt ein Oxim, F. $120-121^\circ$. — (2,4,6-Trimethoxystyryl)-(3',4'-dimethoxyphenyl)-keton, $C_{26}H_{24}O_6$, aus Trimethylphloroglucinaldehyd u. Acetoveratron mit NaOH in A. bei Erhitzen, gelbe Blättchen (aus A.), F. $164-165^\circ$. — [β -(2,4,6-Trimethoxystyryl)-äthyl]-[4-dimethoxyphenyl]-keton, $C_{26}H_{24}O_6$, Nadeln (aus CH_4O), F. 111° . Oxim, $C_{26}H_{25}O_6N$, F. 140° . (LIEBIGS Ann. 441. 157-80. Karlsruhe, Techn. Hochsch.) SP.

Linderström-Lang, Über die Ionisation der Proteine. (Vgl. SORESENSEN, C. r. du Lab. Carlsberg 12. 1; C. 1918. II. 821.) Vf. wendet das Massenwirkungsgesetz an die einfache Adsorption auf die Ionisation der Proteine in wss. Lsgg. an. Die Ionenadsorption wird ein Ausdruck formuliert, der hauptsächlich aus den Erfahrungen von HELMHOLTZ u. DEBYE über elektr. Doppelschichten u. statist. Berechnungen abgeleitet wird. Die theoret. Werte werden mit den experimentellen Werten u. in zulänglicher Übereinstimmung befunden. Durch osmot. Messungen wird der Radius des Eialbuminmol. (Mol.-Gew. nach SORESENSEN zu 35000 angenommen) zu $2,21 \cdot 10^{-7}$ cm, aus dem Säurebindungsvermögen zu $3,80 \cdot 10^{-7}$ cm berechnet. Die mittlere Wertigkeit des Mol. schwankt zwischen 0 ($p_{aH} = 4,867$) u. 1 ($p_{aH} = 4,043$). (C. r. du Lab. Carlsberg 15. 1-29. 1924.) ZANDER.

E. Biochemie.

J. Mestrezat und M. Janet, Die Dispersität der elektrolytischen Kolloide in Beziehung zur Mineralernährung der Zelle. Kurzes Ref. nach C. r. d. l'Acad. des sciences vgl. C. 1924. II. 1472. Nachzutragen ist, daß der Ausgleich der Cl^- in W. u. in Seifenlsg. 11-24 Tage in Anspruch nimmt. (Bull. Soc. Chim. 1923. 829-53. 1924.) BIKERMAN.

L. Hugo Haehn und Albert Pülz, Über ein neues Oxydoreduktionssystem und seine biochemische Bedeutung. Es handelt sich um das bereits in einer vorläufigen Mitteilung von HAEHN (Ztschr. f. Spiritusindustrie 47. 61; C. 1924. I. 2784) angegebene System von Glykokoll, Aldehyd, Methylenblau u. Phosphaten. Der n. Versuch unter Anwendung von Propionaldehyd; er gelingt zwar auch mit Acetaldehyd, tritt aber eine Nebenrk. unter Mitleidenschaft des Methylenblaus (B. eines blauen Farbstoffs, der mit restlichem Methylenblau nach der Oxydation grün wird). Als Reaktionstemp. werden jetzt 74° angegeben. In dem System ist Glykokoll der Hauptfaktor, Phosphat der Aktivator, Aldehyd unbedingt erforderlich. Für plasmophile Stoffe verwendet werden, ist ein solches System in Zellen oder anderen Sekreten möglich (Zymoreaktion), man kann diese Rk. auch bei gegebenem Zusatz von Phosphat bei physiol. Tempp. hervorrufen. Ihre Intensität

kann durch Aktivatoren u. Paralysatoren beeinflusst werden. Als Aktivator können A., Glycerin u. Lecithin dienen, hemmend wirken in geringem Grade KCN, unregelmäßig Milchzucker. Formaldehyd statt Propionaldehyd war brauchbar, Salicylaldehyd u. Benzaldehyd ebenfalls, diese, weil sie bei Umschlag den Farbstoff aufnehmen u. sich dann in Form blauer Tropfen absetzen, dagegen reagierte Butyraldehyd sehr gut. Ersatz des Glykokolls durch andere Aminosäuren gab bei einigen (Tyrosin, Glutaminsäure, Cystin) ganz negative Resultate, weniger gute. Von den verschiedenen Formen des Alanins reagierte die natürliche Form am besten. Die Phosphate können mit gleicher Wrkg. durch Arsenat ersetzt werden. Das System, dessen Reaktionsmechanismus noch nicht aufgeklärt werden konnte, hat große Ähnlichkeit mit der Schardingerschen Rk. in der M. (Chemie d. Zelle u. Gewebe 12. 65—99. 1924. Inst. f. Gärungsgew.) SPIEGEL

E₃. Pflanzenphysiologie. Bakteriologie.

Nicolaus Iwanow, *Der Pilzharnstoff als Ersatzmittel des Asparagins*. Abweichend von den Vorgängen in grünen Pflanzen u. Schimmelpilzen findet sich bei höheren Pilzen, z. B. Bovisten, bekanntlich Harnstoff. Vf. untersuchte nun die Verhältnisse, unter denen dieser gebildet u. verbraucht wird. Taucht man Frischkörper von Bovisten (Lycoperdon), Champignons (Psalliota) u. Tricholoma mit Stielen in eine Glucoselslg., so dringt diese in den Pilzhut ein. Hier hemmt sie in einem Falle die in den Pilzgeweben stattfindenden autolyt. Prozesse, die zu Verfall von Harnstoff führen, im anderen Falle ruft sie Abnahme u. sogar völliges Verschwinden des vorher anwesenden Harnstoffs hervor. Mit dem Verbrauch von Harnstoff in Ggw. von Glucose geht stets eine Zunahme des durch Bleiessig fällbaren N u. überhaupt des N komplizierter, in W. unl. Verbb. einher. Der Harnstoff häuft sich also in den Pilzen bei Mangel oder Fehlen von Kohlenhydraten an, wird aber in Ggw. von ihnen für synthet. Prozesse des Pilzes verbraucht ist deshalb als Vorratssubstanz analog Asparagin u. Glutamin zu betrachten. (Biochem. Ztschr. 154. 376—90. 1924.) SPIEGEL

Nicolaus Iwanow, *Über die Ursache des verschiedenen Harnstoffgehaltes bei Pilzen*. B. u. Anhäufung von Harnstoff in Pilzen hängt nicht nur vom Mangel an Kohlenhydraten (vgl. vorst. Ref.) ab, sondern auch von einem Überschuß an N-Nahrung. Bei derselben Art, z. B. Lycoperdon piriforme, kann Harnstoff bis 4,3% angehäuft werden, wenn hoher Gehalt an Gesamt-N vorliegt (7,9%), u. fast gar keiner bei niedriger N-Menge (4,2%). Der Champignon häuft in Kulturen bei Überschuß von N-Nahrung (Gelatine + Malzextrakt) große Mengen Harnstoff an, bei geringerer N-Nahrung (Agar + Malzextrakt) keine Spur. (Biochem. Ztschr. 154. 391—98. 1924. Petersburg-Leningrad, Univ.) SPIEGEL

S. Ancel, *Die Wirkung schwacher Dosen von X-Strahlen auf trockene Samen*. Aus zahlreichen Verss. ergibt sich, daß Bestrahlung trockener Samen mit X-Strahlen in Mengen von $\frac{1}{12}$ —20 H keine Beschleunigung der Keimung zur Folge hat. (C. r. soc. de biologie 91. 1435—36. 1924. Straßburg, Fac. de pharm.)

Wl. Butkewitsch, *Über die Bildung der Glucon- und Citronensäure in Pilzkulturen auf Zucker*. Nachdem MOLLIARD (C. r. d. l'Acad. des sciences 191. 41; C. 1924. I. 1213) B. von Gluconsäure aus *Aspergillus niger* nachgewiesen hatte, konnte auch Vf. die von ihm in den Kulturen dieses Pilzes u. von *Citromyces glaucus* aufgefundenen, l. Ca-Salz gebende Säure (vgl. Biochem. Ztschr. 142. 204; C. 1924. I. 490) damit identifizieren. Zur Isolierung wurde jetzt die Fällbarkeit des Calciumsalzes durch A. benutzt. Bei Einw. des *Aspergillus* auf Gluconsäure konnte keine Citronensäure nachgewiesen werden, jene scheint also bei B. dieser Art aus Zucker keine Zwischenstufe zu sein, sondern zu Oxalsäure oxydiert zu werden. Für den Grad der Anhäufung von Glucon- u. Citronensäure in den Kulturen

is auf Zucker ist in gewissem Grade die Acidität maßgebend, bei niedriger wiegt die erste, bei hoher die zweite, die demgemäß in den Kulturen später tritt. In Zusammenhang damit steht auch die relativ starke Anhäufung der bei Ggw. von CaCO_3 ; daß trotz dieser auch Citronensäure in reichlichen Mengen entsteht, erklärt sich durch Anhäufung der freien Säuren in der oberen Schicht der Kulturf. B. von A. in den Zuckerkulturen der Aspergillaceen ist unter anaeroben Bedingungen ganz unbedeutend. (Biochem. Ztschr. 154. 177—90. Moskau, Staatl. TIMIRJAZEFF-Forschungsinst. Landwirtsch. Akad. Petrowsko-mowskoje.) SPIEGEL.

E. W. Schmidt, *Zur Bewertung der Fungizidität eines Stoffes*. Der fungicide Wert eines Stoffes wird für den Pilz Botrytis cinerea mit 10000 Sporen je ccm festgestellt. Es wird der Tötungswert u. der Hemmungswert bestimmt. Als Ausmaß der Konz. für den Tötungswert wird die Konz. gewählt, die bei optimalen Bedingungen absol. Hemmung hervorruft. Je näher der Tötungswert an den Wert des Hemmung heranrückt, um so giftiger ist die Substanz. Der Tötungswert wird in dest. W. vorgenommen; für den Hemmungswert müssen Nährstoffe optimale Bedingungen geboten werden. Am praktischsten ist die Benutzung von Petriplatten. Als n.-Nährboden verwendete Vf. 0,01 KH_2PO_4 , 0,01 CaCl_2 , 0,03 $\text{MgSO}_4 + \text{H}_2\text{O}$, 0,01 NaCl, 0,001 Fe_2Cl_6 , 1 Asparagin, 2 Traubenzucker, 100 W., (1,5 Agar). Die Verwendung von Membranfiltern hat sich sehr bewährt. Vf. beschreibt ein Verfahren, bei dem die Sporen auf ein über einen Glasring gespanntes Kollodiumhäutchen ausgesät werden; der Glasring wird mit der Giftlsg. gefüllt; die Sporen können auf dem Häutchen ausgewaschen u. mikroskopiert werden. (Ztschr. f. angew. Ch. 38. 67—70. Hannover.) JUNG.

Silbert T. Morgan und E. Ashley Cooper, *Baktericide Wirkung von Chinonen und verwandten Verbindungen*. Zur Stütze der früher (Biochemical Journ. 15. 587; 1922. I. 877) ausgesprochenen Ansicht, daß das relativ hohe Keimtötungsfähigen des Benzochinons mit der Eigenschaft der dynam. Isomerie zusammenhängt u. auf der Wirksamkeit der in wss. Lsgg. vorhandenen Peroxydmoll. im überdauerenden Zustande beruhe, wurden in Gemeinschaft mit A. W. Burtt u. J. Corby weitere Verss. angestellt. Dazu dienten außer p-Benzochinon Toluylchinon, Xylochinon, Thymochinon, m-Dichlorchinon, Trichlorchinon, Chloranilsäure, Bromanilsäure, α - u. β -Naphthochinon, Chinhydrin, Campherchinon, Mono- u. Dichlorbenzochinon u. p-Dibrombenzochinon. Die baktericide Wrkg. der Chinone steht im Verhältnis zu Phenol mit der Zeit beträchtlich zu, worauf bei Best. des Koeffizienten zu achten ist. Es zeigte sich ferner, daß organ. Substanzen, wie sie in einem Nährboden übertragen werden, die Wrkg. stark hemmen u. demgemäß die Verd. der Kultur mit steriler physiol. NaCl-Lsg. sehr viel höhere Koeffizienten erzielten wurden. Ihr Verhältnis ist aber im allgemeinen in beiden Reihen analog, während das gleiche u. ergab die Überlegenheit des Benzochinons über alle anderen mit Ausnahme von m-Dichlorchinon u. allenfalls noch Trichlorchinon in geistlicher Kultur. Im übrigen setzt aber jede Substitution die Wirksamkeit herab, was zu der oben erwähnten Annahme paßt. Im übrigen zeigt β -Naphthochinon stärkere Wrkg. als die α -Verb., Bromanilsäure stärkere als Chloranilsäure, die Wirksamkeit durch Überführung in das Na-Salz noch stark vermindert wurde. In der Hemmwrgg., nach dem Verf. von MORGAN, COOPER u. BURTT (Biochemical Journ. 17. 30; C. 1923. I. 1632) bestimmt, zeigt sich zwar auch die Überlegenheit des Benzochinons, liegen aber die Werte näher beieinander u. zeigen in der Reihenfolge einige Abweichungen. Hindernd zeigten sich auch hier organ. Substanzen in Form von Peptonbrühe, Peptonwasser, Harn oder Rinderurin. Dadurch werden die Chinone als Desinfizienten prakt. wertlos. — Die Wirkung auf *Eiweißkörper* wurde besonders untersucht. Sie geben mit Lsgg. vieler

Rotfärbung, deren Intensität parallel dem baktericiden Vermögen läuft. Es dabei chem. Wrkg. ein, deren Geschwindigkeit aber nicht völlig durch die Möglichkeit einer dynam. Isomerie bedingt wird, zum Teil wahrscheinlich durch Neben ohne biol. Bedeutung. (Journ. Soc. Chem. Ind. 43. T. 352—54. 1924. Edgbar Univ. of Birmingham.)

Ph. Bretin, A. Rochaix und C. Roux, *Über den Mangel mikrobicider sterilisierender Eigenschaften bei der Essenz aus Calycanthus occidentalis*. Calycanthusöl ähnelt sehr dem Eucalyptusöl. Abtötungsverss. an Typhusbac. u. Staphylococcus aureus sowie Sterilisierungsverss. am ersten verliefen negativ. Nach längerer Einw. des Öles war lediglich eine geringe Hemmung der Entwicklung festzustellen. (C. r. soc. de biologie 91. 1417—19. 1924.)

F. Verzář und A. Zih, *Weitere Untersuchungen über die Stoffwechselregulierung bei B. coli comm.* III. (Vgl. VERZÁŘ, NÁBRÁČKY u. SZANYI, Biochem. Ztschr. 141. 30; C. 1924. I. 349.) Es ist früher gefunden worden, daß gewisse Gifte die obere Grenze der Säurebildung durch B. coli vermindern. Die Ursache wurde jetzt in Verss. mit A., Methylalkohol u. Formaldehyd in der durch sie bewirkte Vermehrungshemmung erkannt. Primäre Beeinflussung des Säurebildungsvermögens war nicht nachzuweisen. Die obere Grenze der $[H^+]$ wurde jetzt bei $pH = 4.5$ gefunden, einen höheren als dem früher (l. c.) gefundenen Werte. Dieser Unterschied könnte durch Verschiedenheiten in der Zus. des Nährbodens bedingt sein. Die in dieser Richtung angestellten Verss. zeigten, daß Unterschiede in der Konzentration an Zucker, Pepton u. Bouillon ohne Einfluß sind. (Biochem. Ztschr. 151. 254—256. 1924. Debreczen, Univ.)


P. Lemay und L. Jaloustre, *Vergleich der Einwirkung von Wismut auf Staphylococcus, Streptococcus und Bact. coli*. Verss. an Staphylococcus aureus, Streptococcus haemolyticus u. B. coli mit K-Na-Bismutotartrat ergaben für den ersten Züchtung in Bouillon Stillstand der Entw. schon durch Konz. an Bi 1:400000. Bei 1:500000, während die beiden anderen noch bei 1:2500 gut gedeihen, der Streptococcus nur bei hohen Konz. kürzere Ketten bildet. Die Empfindlichkeit des Staphylococcus gegen Bi ist größer als die gegen Hg. (C. r. d. l'Acad. des sciences 1441—42. 1924.)

William A. Hagan, *Bildung von Wasserstoffsuperoxyd durch einen obligat Anaerobier (Actinomyces necrophorus)*. Die Toleranz dieses Keimes für Superoxyd. Wurden die Bouillonkulturen des genannten Mikroben nach 24—48std. anaerob. Wachstum einige Std. der Luft ausgesetzt, so fand sich in ihnen H_2O_2 in geringen Mengen, nicht aber, wenn die Kultur bei 120° sterilisierte Fleischstückchen enthalten. Diese üben Katalaseeigenschaften aus, daher ist auch Zusatz von H_2O_2 in kochendem Bouillon wachstumshemmend, in solcher mit Fleischfragmenten nicht. (Proc. the soc. f. exp. biol. and med. 21. 570—72. Ithaca, CORNELL Univ.; Ber. d. Physiol. 28. 471. 1924. Ref. SELIGMANN.)

A. Gottschalk und C. Neuberg, *Untersuchungen über Phosphorylierung. I. Fähigkeit, anorgan. Phosphate an Zucker zu binden, wird mit der Ggw. von Hefe ferment in Verb. gebracht*. Acetonoberhefe, die dieser Fähigkeit ermangelt, gewinnt sie zu 100%, wenn man Kochsaft aus Unterhefe zugibt, sowie auch, ebenso wie ausgewaschene, nicht veresternde Acetonunterhefe, zu 50—60% durch Kochsaft aus Kaninchenmuskulatur. Tumorzellen können durch Auswaschen von Coferment ihres sehr starken glykolyt. Vermögens beraubt werden. (Biochem. Ztschr. 1492—94. 1924. Berlin-Dahlem, Kaiser-WILHELM-Inst. f. exp. Therap. u. Pathol. chem.)

U. Suzuki, S. Odake und T. Mori, *Über einen neuen schwefelhaltigen Bestandteil der Hefe*. Eine früher (Journ. Tokio Chem. Soc. 34. 1134 [1914]) von Suzuki beschriebene, aus alkoh. Extrakt von Hefe isolierte Base, der damals die

$C_{11}H_{15}O_3N_5S$ zugeschrieben wurde, hat sich als S-haltig erwiesen u. ist nach den jetzigen Unterss. aufzufassen als *Adenylthiomethylpentose*, $C_{11}H_{15}O_3N_5S$ (Konst. nebensteh.); die Gewinnung erfolgt aus der Rohoryzaninfraktion des Hefeextraktes nach der



inmethode. Die Base bildet Prismen, F. 208° , wl. in k., ll. in w. W., unl. in Ä. Die wss. Lsg. reagiert fast neutral, bildet kein Cu-Salz, wird nicht gelöst durch Hg-Nitrat oder J-KJ-Lsg. FeCl_3 gibt schwache Braunfärbung, Phosphorwolframsäure flockigen Nd., H_2PtCl_6 Fällung, fast unl. in A. u. W., Phosphorwolframsäure weißlichgrünen Nd., klar u. ohne Blaufärbung l. in NH_3 . *Pikrate*. $\text{C}_{11}\text{H}_{15}\text{O}_3\text{N}_5\text{S} \cdot \text{C}_6\text{H}_5\text{O}_7\text{N}_3$, aus Eg.-Lsg. durch wss. Pikrinsäurelsg., Tafeln oder feine Nadeln (aus h. W.), F. 183° . $(\text{C}_{11}\text{H}_{15}\text{O}_3\text{N}_5\text{S})_2 \cdot \text{C}_6\text{H}_5\text{O}_7\text{N}_3$, neben dem ersten bei Erhitzen der wss. Lsg. mit Pikrinsäure, F. niedriger. Die Substanz gibt keine Färbk., aber Pentoserk. u. bei Erhitzen der Lsg. in 3% ig. HCl mit Zn vorübergehende rotviolette Färbung (Adeninrk.) unter Entw. von stark riechendem, in Hg-Lsg. weiße Fällungen hervorrufendem Gase $[\text{CH}_3 \cdot \text{SH}$ oder $(\text{CH}_3)_2\text{S}]$. Durch verd. Lsg. wird sie leicht in *Adenin* u. eine *Thiomethylpentose*, $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_4\text{S}$, die *Phenylalanin* vom F. $158-159^\circ$, gelbe Prismen (aus 50% ig. A.), bildet, gespalten. Bei Erhitzen mit H_2SO_4 entsteht Furfurol, bei Oxydation mit HNO_3 *Hypoxanthin* u. *Adenin* neben *Oxalsäure*. (Biochem. Ztschr. 154. 278-89. 1924. Tokio, Univ.) SP.

Karl Myrbäck, Über die Selbstgärung der Trockenhefe. Bei einer trockenen Hefe wurde festgestellt, daß die Selbstgärung in zuckerfreier Lsg. größere Mengen CO_2 liefern kann als die von derselben Menge dieser Hefe bei Ggw. kleinerer Mengen Glucose verursachte Gärung, daß bei Ggw. von Zucker die gesamte CO_2 -Menge stets kleiner ist als die Summe der von der Selbstgärung u. von der Zuckergärung bedingten u. daß bei sehr großen Mengen Glucose Selbstgärung kaum in Betracht kommt. Aus diesen Tatsachen, von denen die erste auch von MACFADYEN, ROUS u. ROWLAND (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 33. 2764; C. 1900. II. 1028) beobachtet wurde, schließt Vf. auf Hemmung der Spaltung von *Glykogen* durch Ggw. von Glucose. (Chemie d. Zelle u. Gewebe 12. 61-64. 1924. Stockholm, Hochsch.) SPIEGEL.

I. Neuberg und **G. Gorr**, Neue Untersuchungen über die Vergärung der Oxalazessigsäure. (Vgl. NEUBERG u. KARCZAG, Biochem. Ztschr. 36. 76; C. 1911. II. 1607.) Oxalazessigsäure (vgl. NEUBERG u. HIRSCH, Biochem. Ztschr. 115. 282. NEUBERG u. LIEBERMANN, Biochem. Ztschr. 121. 311; C. 1921. III. 44. 1130), vermög Oxalazessigsäure, die als Carboxybrenztraubensäure aufgefaßt werden kann, bei Gärung durch Hefe in carboligat. Rk. Acyloine zu bilden. Es wurden außer Acetaldehyd beträchtliche Mengen *Acetoin* gefaßt. Die Ausbeute daran schwankte, betrug aber mindestens 15% der umgesetzten Säure. Außerdem entsteht durch Gärung *Äpfelsäure*, ferner, offenbar durch carboligat. Aufbau aus erst entstandenem Acetaldehyd, β, γ -Butylenglykol. — Zu den Verss. dienten die aus Oxalazessigsäure nach dem Verf. von SIMON (C. r. d. l'Acad. des sciences 137. 855; C. 1904. I. 85) bereitete *Oxymaleinsäure* u. untergärrige Bierhefen; mit einer Oberflächengärung verlief der Prozeß sehr viel langsamer u. unvollständig. (Biochem. Ztschr. 154. 495-502. 1924. Berlin-Dahlem, Kaiser WILHELM-Inst. f. exp. Therapie u. Biochemie.) SPIEGEL.

E. Tierchemie.

A. Flößner und **F. Kutscher**, Biochemische Studien über *Petromyzon fluviatilis* L. Mitteilung. Nachweis von Adenin, Xanthin, Methylguanidin, Leucin, Tyrosin, Fett-

säuren der Reihe $C_nH_{2n}O_2$ und der Gärungsmilchsäure. 2. Mitteilung. Nach von Neosin als Hauptextraktstoff von *Petromyzon* und weiterer Nachweis von Bet Cholin, Crangitin. In Auskochung des Fleisches des Neunauges fehlte Guanin; KRUKENBERG u. EWALD (Ztschr. f. Biologie 19. 154 [1883]) in der Haut abgelesen, ganz. Von Säuren $C_nH_{2n}O_2$ werden nach den Analysen der fraktionierten Ag-Salze Ameisen-, Essig-, Propion- u. Buttersäure angenommen. A sonst wesentliche enthalten die Überschriften. (Ztschr. f. Biologie 82. 302—5 bis 310. Marburg; *Univ. Königsberg, Univ.) SPIEGE

O. Flößner, Neue Untersuchungen über die Echinococcusflüssigkeit. 2. Mitteilung. In der Fl. von *Echinococcus multilocularis* wurden wie in derjenigen von *unilocularis* Na, K, NH_4 , Ca u. Mg als Chloride, Carbonate, Sulfate u. Phosphate gefunden, kein Eiweiß, von Kohlenhydraten nur Glykogen, ferner Betain, Alkalibasen, Bernsteinsäure u. n. Valeriansäure. In der erstgenannten Fl. konnten Essig- u. Propionsäure nachgewiesen werden. Kreatinin fand sich nur in ca. 1/10 der Fälle. — In den Blasenwänden der Echinococcuseysten findet sich nach Behandlung mit konz. HCl Glucosamin, wahrscheinlich als einzige, jedenfalls als hauptsächlich reduzierende Substanz. (Ztschr. f. Biologie 82. 297—301. Marburg; Lahn, Univ.) SPIEGE

Hidesaburo Matsui, Über die Isolierung von Putrescin durch Dampfdestillation von gefaultem „Agemaki“ (*Solecurtus constricta*). Das Dampfdestillat der gefaulten, mit HCl u. Gerbsäure gereinigten M. nach Alkalisieren enthielt kein Indol, aber eine Base, die ein in A. l. Chlorhydrat, ein darin unl. $HgCl_2$ -Doppelsalz gab u. des Pikrat (F. 250°; Zers.) u. Chloroplatinat (Zers. 227°) für Putrescin stimmende Analysenwerte lieferten. (Journ. Coll. Agric. Tokyo 5. 401—3. 1916.) SPIEGE

Madge Kaye, Beobachtungen über das Verhalten einer die Nitroprussidreaktion in der Haut und in den Haaren ergebenden Substanz. (Vgl. KAYE u. LLOYD, chemical Journ. 18. 1043; C. 1925. I. 401.) Diese Substanz wird nach ihren ganzen Verh. in Übereinstimmung mit HOPKINS (Biochemical Journ. 15. 286. 1921. III. 485) als Glutathion angesprochen. Sie findet sich in den Zellstrukturen der Haut, in Teilen der Epidermis u. der Haare, in den Haarfollikeln, der Verdünnung von Talg- u. Schweißdrüsen, dem Musculus erector pili u. den Wandungen von Arterien u. Venen in verschiedener Menge oder verschiedener Aktivität. Sie fehlt in Strukturen extracellulären Ursprungs. Im Haar nimmt sie mit sinkender Vitalität ab. Sie dürfte daher mit dem akt. Stoffwechsel eng verbunden sein und mit dessen Veränderungen schwanken. (Biochemical Journ. 18. 1289—93. 1924.)

Hidesaburo Matsui, unter Beihilfe von Y. Miyama, Über die chemischen Veränderungen von „Shiokara“ während seiner Reifung und Konservierung und die Wirkung gewöhnlichen Salzes auf dasselbe. Es handelt sich hier um aus Tintengallen hergestellte Prodd. Die bei der Reifung vor sich gehende Zers. mit Zunahme des l. N verläuft anfangs schnell, dann einige Zeit allmählich langsamer, später wieder schneller. Wahrscheinlich ist die anfängliche Zers. durch Enzyme, die später durch Mikrobenwrkg. bedingt. Die wesentlichen chem. Veränderungen sind in der Reifung Zunahme der organ. Basen mit Einschluß der Peptone, bei der Konservierung Zunahme der Monoaminosäuren u. des NH_3 , das zum Teil in freier Zustände auftritt. Zusatz von 15% NaCl vermindert die B. dieser Prodd. (Journ. Coll. Agric. Tokyo 5. 405—11. 1916.) SPIEGE

Yuzuru Okuda, Hydrolyse von Fischgelatine. (Vgl. Journ. Coll. Agric. Tokyo 5. 1. 25; C. 1913. I. 1042. 1289. u. S. 1091.) Gegenüber der handelsüblichen Gelatine aus Rinderknochen zeigt Fischgelatine in der Verteilung des N keine erheblichen Unterschiede. Erheblich größer sind die Ausbeuten an Glykokoll, Alanin, Leucin, Phenylalanin, Glutamin- u. Asparaginsäure, doch wurden die Ester unter geringem Drucke dest. als bei der Handelsgelatine. Prolin u. Serin wurden nach der Es

ble nur in geringen Mengen gewonnen, doch gab die Barytmethode für Prolin e: Mengen wie in Handelsgelatine. Die Menge der *Diaminosäuren* war in de Prodd. ziemlich gleich. (Journ. Coll. Agric. Tokyo 5. 355—63. 1916.) Sp. izuru Okuda und Kiyoshi Ōyama, *Hydrolyse von Fischmuskeln*. (Vgl. st Ref.) Die Muskeln von *Pagrus major* wurden hydrolysiert, die Befunde im lysat mit den von OSBORNE u. HEYL (Amer. Journ. Physiol. 23. 81; C. 91. 92) beim Heilbutt verglichen. *Glykokoll* u. *Serin* waren auch hier nicht nur in Spuren vorhanden, *Arginin*, *Histidin* u. *Lysin* in geringeren Mengen im Heilbutt, aber in sehr ähnlichem Verhältnis zueinander. Gewisse Diffe- fanden sich auch in *Prolin* u. *Asparaginsäure* (Pagrus weniger) u. *Phenyl-* i die größten bei *Alanin* (Pagrus $> 1\%$) u. *Glutaminsäure* (Pagrus 1,63%). Coll. Agric. Tokyo 5. 365—72. 1916.)

SPIEGEL.

izuru Okuda, *Über die Nuclease von Fischen und Mollusken*. (Vgl. vorst.) Die Existenz von Nuclease wurde nachgewiesen in: Leber, Magenblindsack, ovarium, Magen- u. Darmschleimhaut von Pagrus; Hepatopankreas, Milz, e Kiemen, Magen- u. Darmschleimhaut des Karpfens; Leber, Magenblindsack, e u. Darmschleimhaut des Bonito; ferner in den Organen einiger Mollusken. r kaum nachweisbar im Fischfleisch, Blut u. Galle. Aus durch die Extrakte der u. Verdauungsorganen von Pagrus zers. Hefenucleinsäure wurden Guanin (ain isoliert. In allen Fällen regten schwach saure Lsgg. die Enzymwrkg. während alkal. Lsgg. verzögerten, Optimum bei Leberextrakt von Pagrus 0,05 0,1% Essigsäure; die Wrkg. des Karpfenhodenextraktes wurde fast völlig ger durch 0,5% Essigsäure, 0,5% Na_2CO_3 , 0,06% NaOH . Die Pagrusleber- ee wurde bei 80° in 5 Min. völlig zerstört. Die Optimaltemp. ihrer Wrkg. i ca. 25°, doch ist sie auch bei 10° noch deutlich u. geht bei $> 30^\circ$ noch en weiter. Durch Fällung mit ZnSO_4 oder einem Gemisch von A. u. Ä. t die Nuclease aus den Extrakten isoliert werden. (Journ. Coll. Agric. Tokyo 73—83. 1916.)

SPIEGEL.

izuru Okuda, *Über das Vorhandensein Inosinsäure spaltender Enzyme in anen und in Aspergillus melleus*. Durch die gleichen Organe des Karpfens, b Hefenucleinsäure spalten (vgl. vorst. Ref.), wird auch die Spaltung von riure bewirkt. Das wirksame Enzym dürfte mit der Nuclease ident. sein. Isinsäure des Hühnerfleisches wird bei der Autolyse gespalten, gleiches ei inosinsäurehaltigem Fischfleisch vor sich gehen. Auch *Aspergillus melleus* zerlegt Inosinsäure, das mit A. + Ä. daraus hergestellte Enzym ist stark sa. (Journ. Coll. Agric. Tokyo 5. 385—89. 1916.)

SPIEGEL.

E. Tierphysiologie.

William Willcox, *Die Einwirkung chemischer Untersuchungen auf die Medizin e gerichtliche Medizin*. Nach einem kurzen histor. Rückblick erörtert Vf. inw., wie sie sich etwa seit 1775 (Entdeckung des O_2) entwickelt hat bis zu gegenwärtigen Zustande, der durch die Zusammenhänge auf physiolog., pharma- u. toxikolog. Gebiete bezeichnet ist. (Chemistry and Ind. 43. 1172—76.)

RÜHLE.

A. P. Winogradow, *Die Wirkung einiger Medikamente auf die Gallensekretion. mentelle Untersuchung*. (Vgl. S. 543.) Verss. an Gallenblasen fistelunden; ef eine bedeutende Zunahme der abgesonderten Gallenmenge hervor; die elbst wurde viel dünnflüssiger. Es ist ein äußerst wirksames galletreibendes l *Antipyrin* wirkt in kleinen Dosen nicht auf die Gallensekretion ein, erhöht i großen Gaben die Menge der fl. u. noch mehr die der festen Gallen- teile; die Menge der Galle vergrößert sich; sie wird dickflüssiger. *Pyra-* ist ohne Einfluß. *Salipyrin* vergrößert die Menge der Galle u. macht sie

dünnflüssiger. *Phenacetin* wirkt in kleinen Dosen nicht auf die Gallensekretion; mittlere Gaben erhöhen die Sekretion u. verd. die Galle. *Lactophenin* different. *Aloe* vergrößert manchmal die Gallenmenge u. macht die Galle dünnflüssiger, die Wrkg. ist aber unbedeutend; es ist kein Grund vorhanden, zu den gallentreibenden Mitteln zu rechnen; ebenso *Rhabarber* u. *Cascara sagrada*. *Podophyllin* dagegen vergrößert die Menge der Galle um 27,6—38%, den Gehalt an festen Stoffen um 5—23% u. macht die Galle um 11—17% dünnflüssiger. (Ztschr. f. d. ges. exp. Medizin 43. 584—604. 1924. Odessa, Neuruss. Univ.)

Arloing, Cluzet und Kofman, *Veränderung der Blutalkalität beim kranken Meerschweinchen*. Im Laufe der experimentellen Tuberkulose, etwa den 2. Monat, zeigt sich im allgemeinen eine Verminderung der [H] mit individuellen Verschiedenheiten u. auch bei demselben Individuum mit unregelmäßigen Verläufe. Diejenigen Tiere, bei denen sie am deutlichsten war, wiesen bei Autopsie in ausgesprochenstem Maße Leberschädigungen auf. (C. r. soc. de biol. Paris 91. 1411—13. 1924. Lyon, Labb. de phys. biol. et de méd. exp.)

G. Mouriquand, A. Leulier und P. Michel, *Schwankungen des Eisens im Blut im Verlauf von experimentellem Skorbut*. Nach dem 24. Tage der skorbutmachenden Ernährung sinkt das Fe im Blute der Versuchstiere annähernd, einstimmend mit der Kurve für die Blutkörperchen, u. dieser Parallelismus zeigt sich auch im Verh. nach Behandlung mit antiskorbut. Substanzen. Mit der Abnahme der Erythrozytenzahl schien in einer Reihe gleichfalls Parallelismus zu bestehen, in 2 anderen aber weniger deutlich. (C. r. de l'Acad. des sciences 180. 86—88.)

René Fabre, *Über die Natur und die Veränderungen des im Blute enthaltenen Acetaldehyds*. Im mit Phosphorwolframat u. H_2SO_4 nach FOLIN gereinigten Blute mit NESSLERS Reagens in der von BOUGAULT u. GROS (Bull. Soc. Chim. de Paris [4] 31. 1348; C. 1923. IV. 702) angegebenen Art wie auch nach STEPP mittels methyleyclohexandions *Acetaldehyd* nachgewiesen werden, mit der letzten Reaktion in steril aufgefangenem Plasma oder Serum. Er ist also im Blute primär vorhanden. Die Best. stößt wegen der gleichzeitigen Ggw. von Ketonkörpern Schwierigkeiten, kann aber nach der Methode von BOUGAULT u. GROS (l. c.) ohne Beobachtung verschiedener Kautelen, die an anderer Stelle beschrieben werden sollen, ausgeführt werden. Es wurden so im Blute beim Pferde 0,61 (im e. 0,50), beim Rind 0,24 u. 0,50, beim Hunde 0,32, beim n. Menschen 0,50 u. 0,32 gefunden, bei starker Blutdruckerhöhung 0,81%. Nach Entfernung des Plasmas stieg der Gehalt beim Hunde auf > das 10-fache, verschwand dann aber auf Anwendung von *Insulin* fast völlig. (C. r. d. l'Acad. des sciences 180. 83—85.)

A. T. Mac Conkey, *Über die Konzentrierung von Serum mittels Natriumsulfat*. Zusatz von 10—11 g Na_2SO_4 zu 100 ccm Plasma oder Serum bei 33—40° f. *Englobuline*, weiterer Zusatz von 7,5—8,5 g zum Filtrat scheidet die *Pseudoglobuline* von den *Albuminen*. Die Antitoxine des Serums finden sich hauptsächlich im *Pseudoglobulinanteil*, 4—5-fach konz. gegenüber dem Vollserum. Um Verluste möglichst zu vermeiden, wird für die Praxis gemeinsame Fällung von *Pseudoglobulinen* empfohlen. Na_2SO_4 ist weniger giftig als $(NH_4)_2SO_4$, die schlechteren Bedingungen für Entw. von Bakterien u. hat weitere prakt. Vorteile. (Journ. of Hyg. 22. 413—16. London, LISTER Inst.; Ber. ges. Physiol. 2. 1924. Ref. SELIGMANN.)

Wodon-Rousseau, *Einwirkung des Schilddrüsenextraktes auf den pH-Wert des Blutserums*. Verfütterung von Schilddrüsenextrakt an Kaninchen ergab eine Senkung des pH-Wert des Serums, der bei Aussetzen der Behandlung wieder zurückanstieg. Jene Erniedrigung fällt mit dem Gewichtsverlust u. den verschied. beschriebenen histolog. u. klin. Veränderungen zusammen. Bei subcutane

ing der Extrakte treten die gleichen Erscheinungen schneller u. stärker auf.
(C. r. soc. de biologie 91. 1450—51. 1924.) SPIEGEL.

V. Kopaczewski, *Die Oberflächenspannung und das Krebsproblem*. Bei natürlichen u. experimentellen Krebsgeschwülsten wurde eine Verminderung der Oberflächenspannung in Blutserum u. Plasma festgestellt. Die Entstehung dieser Erscheinung u. ihr Wirkungsmodus werden hypothet. erörtert. (C. r. d. l'Acad. des sciences 179. 1445—47. 1924.) SPIEGEL.

Martin Jacoby und Margarete Jacoby, *Über die Einwirkung der Sonnenstrahlung auf das Komplement*. Ca. 2-std. Bestrahlung von Komplement (Meerschweinchen- oder Menschen- Serum bzw. Lsg. von daraus gewonnenem Trockenkomplement) mit ultravioletten Licht schwächte seine Wirksamkeit nicht oder (in einem Vers.) nur unbedeutend. (Biochem. Ztschr. 151. 314—17. 1924. Davos, Inst. f. Hochgebirgsphysiol. u. Tuberkuloseforsch.) SPIEGEL.

Ernest Arloing und L. Langeron, *Anaphylaxieversuche beim Meerschweinchen mit Eiweißsubstanzen (Muskeln und inneren Organen) von derselben Tierart*. (Vgl. ARLOING, LANGERON u. SPASSITCH, S. 109). Peptone, die von der Fabrik FARMANN-LAROCHE durch pankreat. Verdauung von Meerschweinchenmuskeln u. Organen von Herz, Leber, Lungen u. Nieren des Meerschweinchen hergestellt waren, wurden zur Sensibilisierung von Meerschweinchen verwendet, die dann subdural oder das andere Pepton erhielten. Sie zeigten fast gar keine Erscheinungen. In Vers. mit Caseinpepton sensibilisierten Tieren lösten jene Peptone etwas deutlichere Erscheinungen aus, Caseinpepton bei den mit Meerschweinchenpeptonen sensibilisierten Tieren sehr heftige. (C. r. soc. de biologie 91. 1413—15. Lyon.) SPIEGEL.

E. Walbum und S. Schmidt, *Die Bedeutung der Metallsalze für die Amboceptorbildung*. (Vgl. WALBUM, C. r. soc. de biologie 89. 1007. 90. 1171; C. 1924. II. 487.) Nach Überblick über die bisherigen Unterss. von WALBUM u. anderen bzgl. des Einflusses von Metallsalzen auf die B. von Antitoxin wird in der vorl. Verss. bzgl. dieses Einflusses auf Amboceptorbildung berichtet. Auch hier wird fast mit allen Metallen (Ausnahme Al) Förderung festgestellt u. eine gewisse Abhängigkeit der Intensität dieser Wrkg. zum At.-Gew. gefunden. In der Mg-Gruppe sinkt die Intensität bis Zn, steigt dann wieder bei Cd u. Hg, in der Ca-Gruppe sinkt sie wieder, in der Ag-Gruppe umgekehrt. Mn wirkt wesentlich stärker als Co u. Cu, stärker als Pt. Wie bei der B. von Agglutinin, scheinen auch hier 0,001% Agg. am günstigsten zu wirken. (Ztschr. f. Immunitätsforsch. u. exper. Med. 1. 42. 32—43. Kopenhagen, Statens Seruminst.) SPIEGEL.

M. O. Moor, „Über Urochromogen“ usw. *Ergänzung zur früheren Mitteilung*. (Ztschr. 1. 399.) Nach jetzt erst erfolgter Kenntnisnahme von der Folinschen Methode zur Best. von Harnsäure, zu der er einige histor. Anmerkungen macht, hält Vf. die Folinsche Methode aufrecht, daß der U-Stoff die wesentlichste Ursache des Reduktionsvermögens des Harns, mithin der blauen W- u. der Berlinerblau- ist. Nach Ausfällung der Harnsäure (u. des Urochroms) durch Phosphorwolframsäure (vgl. SCHÖNDORFF, Ztschr. Arch. d. Physiol. 1895) ist das Reduktionsvermögen des Filtrats gegenüber dem des ursprünglichen Harns nur wenig vermindert. Die Intensität der Reaktion ist derjenigen der Berlinerblau- genau proportional. (Biochem. Ztschr. 151. 36. 1924.) SPIEGEL.

Sabrazès, P. Flye Sainte Marie und R. de Grailly, *Die Rückenmarksensibilität bei Tetanus. Vermehrung des Zuckers ohne solche von Albumin und Harnstoff*. (C. r. soc. de biologie 91. 1407—10. 1924. Bordeaux.) SPIEGEL.

Maignon und L. Jung, *Beziehung zwischen dem Einfluß der Jahreszeiten auf die Sensibilität des Organismus für Stickstoffvergiftung und der Fähigkeit dieses Organismus, die Eiweißstoffe in Fette umzuwandeln*. (Vgl. MAIGNON, C. r. d. l'Acad. des sciences 168. 626; C. 1919. III. 105.) Den jahreszeitlichen Schwankungen der Sensibilität des Organismus für Stickstoffvergiftung und der Fähigkeit dieses Organismus, die Eiweißstoffe in Fette umzuwandeln, stehen die jahreszeitlichen Schwankungen der

Sterblichkeit von nur mit Eiereiweiß ernährten Ratten (vgl. MAIGNON, C. l'Acad. des sciences **166.** 919; C. **1918.** II. 744) entsprechen Veränderungen in Reserven an Fett in der Leber. Diese erleiden Verminderung im Frühjahr Herbst, beträchtliche Vermehrung im Sommer u. Winter. (C. r. soc. de bio **91.** 1390—93. 1924.) SPIEGEL

H. Labbé und **Lavagna**, *Die Wirkung der Acetessigsäure auf die Stickernährung.* Die Zufuhr kleiner Mengen *Acetessigester* per os unter gemäßigter Nahrung führte beim Hunde zu keiner nennenswerten Änderung des Körpergewichtes oder des gesamten N-Stoffwechsels, aber zu einem leicht acidot. Zustand, besonders durch die vermehrte Ausscheidung von NH_3 im Harn u. entsprechende vermehrte aktuelle Acidität desselben charakterisiert. *Acetessigsäure* war im Urin zuerst am 5. Tage nach der 1. Darreichung nachweisbar u. wurde weiterhin ziemlich unregelmäßig u. stets nur in Spuren ausgeschieden. (C. r. d. l'Acad. des sciences **179.** 1442—45. 1924.) SPIEGEL

H. Steenbock und **A. Black**, *Fettlösliche Vitamine. XVII. Die Übertragung von Wachstumsfördernder und verkalkungsfördernder Eigenschaften auf eine Nahrung durch Bestrahlung mit ultraviolettem Licht.* Ausführlichere Angaben zum bereits S. 1221 referierten Inhalt. (Journ. Biol. Chem. **61.** 405—22. 1924. Madison-Wisconsin Univ.) ARND

Carlo Setti, *Das „Exaltin“ der Avitaminose in vitro.* (Vgl. Biochim. e terap. sperim. **10.** 187; C. **1924.** I. 1942.) Auch das Dialysat der Reisbouillon zeigte noch virulenzsteigernde Wrkg. auf Milzbrandbakterien. Auch nach längerem Aufenthalte des Dialysats im Autoklaven bei 130° sowie nach Veraschung mit H_2O_2 die Wrkg. erhalten. (Biochim. e terap. sperim. **11.** 234—40. Modena, Univ.; Ges. Physiol. **28.** 470—71. 1924. Ref. LAQUER.) SPIEGEL

Marcel Labbé und **Mouzaffer**, *Die Aminoacidurie und die Störungen des Stickstoffstoffwechsels bei Krebskranken.* Unterss. bei Krebsgeschwülsten an verschiedenen Stellen zeigen keine Überschreitung der Norm bezgl. Ausscheidung von Aminosäuren u. Kolloid-N bei solchen außerhalb u. nur ausnahmsweise bei solchen innerhalb des Verdauungskanales, dagegen starke bei solchen der Leber. Die Störungen des N-Stoffwechsels können daher kaum einer allgemeinen Unterernährung unter dem Einfluß des Krebses noch einem schnellen Zerfall der Krebszellen selbst zugeschrieben werden. Wahrscheinlich sind sie einer funktionellen Störung der Leber zuzuschreiben. (C. r. soc. de biologie **91.** 1029—30. 1924.) SPIEGEL

Leon Asher, *Beiträge zur Physiologie der Drüsen.* Nr. 70. **Kiichi Takahashi**, *Über experimentelle Kohlenhydratverarmung und den Kohlenhydratstoffwechsel im Gehirn.* (69. vgl. S. 684.) Äußerste Kohlenhydratverarmung des Organismus durch Hypoglykämie wurden bei Ratten durch Fütterung mit Pepton, dann Schilddrüsenpräparaten, Phlorrhizininjektionen u. eventuell noch Muskeltätigkeit hervorgerufen. Leber u. Muskeln sind dann prakt. fast kohlenhydratfrei, der Blutzucker in der Größenordnung wie nach Insulin. Im Gehirn fand sich n. ein kleiner, aber bestimmter Gehalt an Glykogen u. anderen Kohlenhydraten, der unter obiger Behandlung unvergleichlich weniger abnahm als in Leber, Muskeln u. Blut. In der *Insulinwrkg.*, die bzgl. der letztgenannten wie die erwähnte Behandlung sich kundgab, richtete sich die Änderung im Gehirn nach dem Allgemeinzustande. Viel stärker als diese Maßnahmen wirkte hier vorsichtige Injektion von *Strychnin*. Auch im Gehirn des Kaninchens bewirkte *Insulin* nur dann sehr große Abnahme der Kohlenhydrate, wenn heftige Krämpfe sich einstellten, noch resistenter, teilweise gar erheblich zunehmend erwiesen sich dabei die Kohlenhydrate des Herzens. In der *Pikrotoxin*, das heftige, symptomat. aber von den Insulinkrämpfen verschiedene Krämpfe hervorrief, zeigte sich im Gehirn starke Abnahme der Kohlenhydrate, besonders des Glykogens, im Herzen wieder Zunahme, auch im Blute erhalten.

- gehalt u. in der Leber geringere Abnahme als bei der künstlichen Kohlenhydratverarmung. (Biochem. Ztschr. **154**. 444—75. 1924. Bern, Univ.) SPIEGEL.
- Rona, E. Mislowitzer und S. Seidenberg**, *Untersuchung über Autolyse*. IV. (vgl. Biochem. Ztschr. **146**. 26; C. 1924. II. 206.) Während selbst länger andauernder Autolyse (bis 8 Tage) von Meerschweinchenleber erleidet die Gesamtheit der höheren Fettsäuren (Neutralfett + freie Fettsäure) nur eine geringfügige (etwa 20%ig.) Abnahme; meist — namentlich bei den Fettlebern — ist eine Senkung der Fettsäurewerte überhaupt nicht zu beobachten. Unter vergleichbaren Bedingungen wurde der Einfluß pharmakolog. wichtiger Verbb. (*Na-Salicylat*, *Atoxyl*, *Mercurchlorid*, As_2O_5 , As_2O_3) auf die autolyt. Eiweißspaltung untersucht. *Na-Salicylat* wirkt in den angewandten Konzz. fördernd, Chinin, As_2O_3 , As_2O_5 förderten nicht, hemmten in größeren Konzz. die Autolyse. *Atoxyl* hemmte stets. (Biochem. Ztschr. **154**. 290—309. 1924. Berlin, Charité.) WOLFF.
- Solomon, Solomon und Oury**, *Wirkung der Röntgenstrahlen auf den Magensaft*. Eine einzelne Dosis von 500 R bedingte am Menschen nur in $\frac{1}{3}$ der Fälle eine Wiederholung der Dosis dieser Stärke in der Mehrzahl Verminderung der Acidität, Senkung u. anhaltender der Menge freier HCl. Verminderung des Pepsingehaltes erfolgte langsamer, aber regelmäßiger. Gewöhnung wurde in wenigen Fällen beobachtet. (C. r. soc. de biologie **91**. 1364—65. 1924.) SPIEGEL.
- Lesné, R. Turpin und P. Zizine**, *Über den Einfluß der Lichtbestrahlungen auf den Calciumgehalt eines normalen Organismus beim Wachstum*. Bestrahlung lebender Ratten mit Licht der Quarzquecksilberlampe führte zu Erhöhung des Gesamt-Ca im Organismus. (C. r. soc. de biologie **91**. 1378—79. 1924.) SPIEGEL.
- Delas**, *Über die Einwirkung einiger Bromide auf das isolierte Herz*. Verss. an isolierten Kaninchenherzen mit den in Ringer-Lockescher Lsg. gel. Salzen ergaben, daß Br' nicht reagiert u. das Kation die Wrkg. bedingt, wenn dieses eine ausgesprochene Wrkg. auf das Myokard besitzt. So hat *KBr* herabsetzende Wrkg. gleich anderen K-Salzen, NH_4Br kontrahierenden analog NH_4Cl , $CaBr_2$ fördernden auf Vorhof u. Ventrikel. Ist aber das Kation wenig wirksam (wie auch noch *Sr*), so entfaltet das Br' anregende Wrkg. (C. r. soc. de biologie **91**. 193—96. 1924.) SPIEGEL.
- Annamour und P. Delore**, *Über die Ausscheidung verschiedener Jodprodukte durch den Harn*. Mit Milch eingeführtes J wird sehr schnell ausgeschieden, in Wasser eingeführtes langsamer, kolloidales J in Öllsg., intramuskulär gegeben, noch langsamer, die Ausscheidung von J in Lipiodol, einem jodierten Öl (0,54 g J in 100 g Öl) zieht sich lange hin. Tierverss. mit subcutaner Beibringung der verschiedenen Jodverbindungen fielen im gleichen Sinne aus. (C. r. soc. de biologie **91**. 1415—17. 1924. Paris, Fac. de méd.) SPIEGEL.
- Petzetakis**, *Pharmakodynamische Wirkung und therapeutische Anwendungen von Natriumnitrit in intravenösen Injektionen*. Bei n. Menschen bewirkten 0,01 u. 0,02 g $NaNO_2$ unmittelbar nach der Injektion eine geringe Drucksteigerung u. Senkung der Pulsweite (Verstärkung der Herzsystole), dann Drucksenkung, die 2—3 min. anhält. Es wird dann über Erfolge bei verschiedenen mit Druckerhöhung zusammenhängenden Krankheitserscheinungen berichtet. (C. r. soc. de biologie **91**. 1739—40. 1924.) SPIEGEL.
- W. H. Weitz**, *Über den Einfluß des Zuckers auf die Magensekretion*. Die für eine empfohlene Anwendung von Zucker zur Bekämpfung von Hyperacidität bei dem Vf. auf Grund klin. Beobachtungen zweifelhaft. Verss. ergaben, daß Zucker nach schwächeren als nach stärkeren Zuckerlsgg. im Magensaft ein ebenso hoher Säurewert erreicht wird wie nach W., nur bei sehr hohen Konzz. zuweilen niedrigerer. Mit zunehmender Konz. der Zuckerlsg. wird der höchste Säurewert später erreicht, steigt aber im allgemeinen die Nachsekretion. Trockener

Zucker in nicht zu großer Menge wirkt deutlich anregend auf die Säureproduktion u. unterdrückt sie auch in sehr großen Mengen vorübergehend. (Klin. Wechschr. 162—64. Tübingen, Med. Poliklin.) SPIEG.

I. I. Nitzescu und G. Nicolau, *Die Wirkung der Mono- und Disaccharide intravenöser Injektion auf die Zusammensetzung der Milch*. Quantität u. Fettgehalt der Milch zeigen bei den einzelnen Gemelken die gleichen Variationen an Injektionstagen wie an anderen. Der Lactosegehalt erfährt selbst bei starker Hyperglykämie u. auch bei Injektion starker Lactosegaben in das Blut nur unbedeutende Veränderungen. (C. r. soc. de biologie 91. 1464. 1924. Cluj [Rumänien], Fac. de méd.) SPIEG.

R. Benteli, *Studien über antagonistische Nerven*. Nr. 25. *Über die sympathischen und parasympathischen Gifte als Beeinflusser physikalisch-chemischer Zeitreaktionen und Untersuchungen am Muskel*. Mittels einer Methode, welche die Zeitdauer der Erregung des Muskels erforderlichen Stromstoßes zu messen gestattet, wurde Sartoriusmuskel folgendes festgestellt: *Atropin* verlängert die minimale Zeitdauer sowohl an der Nerveneintrittsstelle als auch am nervenfreien Beckenende, auch Vorbehandlung mit Ca-freier NaCl-Lsg. *Physostigmin* verkürzt die Zeitdauer an beiden Stellen, nach der obigen Vorbehandlung aber nicht. *Pilocarpin* wirkt bei schwachen Konzz. wie das vorige, macht aber in starken den Muskel für Stromstöße unerregbar. Alle diese Wrkgg. sind reversibel. (Ztschr. f. Biologie 311—25. Bern. Univ.) SPIEG.

Vilém Laufberger, *Theorie der Insulinwirkung*. II. Mitt. (I. vgl. Ztschr. d. ges. exp. Medizin 42. 570; C. 1924. II. 2185.) In Analogie mit den Bewegungsverss. an Kaninchen verlaufen Verss. an Fröschen bei verschiedenen Tempp. Tod tritt unter Insulin bei erhöhter Außentemp., die Erhöhung des Stoffwechsels damit auch schnelleren Verbrauch der Kohlenhydrate bedingt, in wenig Tagen ein, sonst nicht. Die von BRIGGS, KOECHIG, DOISY u. WEBER angegebene Erhöhung des Milchsäuregehaltes im Blute nach Insulin konnte Vf. nur dann bestätigen, wenn das Tier Muskulararbeit leistete, sie ist nur durch diese bedingt. Von einer großen Anzahl darauf untersuchter Stoffe vermochte nur *Dioxyaceton* die Glucose im Insulinanfall zu ersetzen. Es verhielt sich auch im Respirationsvers. dem Zucker analog. Respirationsverss. an Kaninchen mit gleichzeitigen Gaben von Glucose u. A. zeigten, daß Insulin den Respirationsquotienten nicht beeinflusst. Vf. kam nach mehrfachen Erörterungen zu dem Schlusse, daß Insulin keinen direkten Einfluß auf den Zerfall der Kohlenhydrate besitzt, aber in die Neubildung solcher Nichtkohlenhydraten hemmend eingreift. (Klin. Wechschr. 4. 151—54. Budapest. MASARYK-Univ.) SPIEG.

I. I. Nitzescu und G. Nicolau, *Die Wirkung des Insulins auf die Milchsekrete*. (Vgl. NITZESCU u. MANGIUCA, C. r. soc. de biologie 90. 1347; C. 1925. I. 1347.) Die von Vf. an Schafen festgestellten Veränderungen der Milch nach Insulin stimmen im allgemeinen mit den von GIUSTI u. RIETTI (C. r. d. l'Acad. des sciences 190. 252; C. 1924. II. 2384) bei Ziegen ermittelten überein. (C. r. soc. de biologie 91. 1462—63. 1924. Cluj [Rumänien], Fac. de méd.) SPIEG.

Sophie Kolodziejska und Casimir Funk, *Über die Rolle der Phosphorsäure bei der Insulinwirkung*. Gewisse Unregelmäßigkeiten in der Wrk. des Insulins auf den Blutzucker von Kaninchen gaben Anlaß zu Unterss. über den Einfluß gleichzeitiger Injektion von Phosphat; diese ergaben Verminderung der Wrk. bei kleinen Dosen u. anscheinend Verstärkung bei größeren Insulingaben u. steigerten die Giftwirkung. Bestgl. des anorgan. u. organ. P u. des Zuckers bei sehr ungleich auf Insulin reagierenden Kaninchen ergaben als einziges Resultat, daß Insulin die P-Verbindung mobilisiert. Die Ergebnisse wechselten aber sehr je nach dem Stadium der Reaktion zum Augenblick der Blutentnahme. Einige Tiere schienen sich gerade in der Synthese

exosediphosphorsäure zu befinden, 'andere bei dessen sekundärer Zers. unter
 achung von H_3PO_4 . Bei durch Insulin schon ermüdeten Tieren ist vielleicht
 mobilisierung des P erschwert. (C. r. soc. de biologie 91. 1477—78. 1924.
 hau, Ecole d'hyg. de l'Etat.)

SPIEGEL.

arl Waltner, *Insulin und galvanische Erregbarkeit*. Mit der Senkung des
 ckers durch Insulin geht eine Erhöhung der galvan. Erregbarkeit u. der
 n. Erregbarkeit im allgemeinen parallel, wenn auch später einsetzend u. länger
 ernd. Scheinbar wird auch der Ca-Gehalt des Blutes oder Serums herab-
 e. Der Amylasegehalt des Harnes stieg. (Klin. Wchschr. 4. 168. Szeged,

SPIEGEL.

lfred Schwartz und M. Bricka, *Die Einwirkung des Insulins auf die Gly-*
den allgemeinen Zustand und das Leberglykogen der Frösche. Vff. fanden bei
 Vaterfröschen (*Rana temporaria*) in fließendem W. bei 10—15° den Blutzucker-
 n zu 0,2—0,3‰, bei 30° 0,4—1,5‰. Insulin zu $\frac{1}{50}$ — $\frac{1}{100}$ Einheit erniedrigte
 ts beträchtlich, sehr häufig auf 0. Diese Senkung macht sich nach ca. 4 bis
 tr. geltend u. hält mehrere Tage an. Im Allgemeinbefinden macht sich das
 u durch Atonie u. Asthenie geltend. Diese Erscheinungen sind unabhängig
 er Höhe der Insulingabe, treten bei 30° schneller ein als bei 10°. Einigemal
 auch Tetanus beobachtet. Der Glykogengehalt der Leber erleidet keine
 dng. (C. r. soc. de biologie 91. 1428—30. 1924. Straßburg, Fac. de méd.) SP.

Popoviciu, *Die Wirkung des Schilddrüsenextraktes auf das isolierte Frosch-*
eine Beziehungen zu den K- und Ca-Ionen. Die Verss. zeigen, daß die Wrkg.
 childdrüsenextraktes durch Ca gehemmt, durch K gefördert wird. Vf. glaubt,
 eser Antagonismus auf einer Kolloidalwrkg. beruht, u. erörtert die Beziehungen
 en vegetativen Nerven, Hormonen u. Ionen. (C. r. soc. de biologie 91.
 274. 1924. Cluj [Rumänien], Inst. f. Pharmakol. u. Pharmakogn.) SPIEGEL.

C. Troteano, *Experimentelle Untersuchungen über die durch Sekretin be-*
urten Veränderungen der Glykämie. Aus einschlägigen Verss. wird mit einer
 ien Zurückhaltung geschlossen, daß längere Wrkg. von Sekretin, intravenös
 ulti, beim n. Hunde eine vorübergehende Hypoglykämie hervorruft, vielleicht
 e Erregung des Inselapp. im Pankreas. (C. r. soc. de biologie 91. 1368—69.
 4 Paris, Fac. de méd.)

SPIEGEL.

inesty, Lassalle und P. Mériel, *Modifikationen des Blutchemismus bei der*
guinnarkose durch Somnifen. Harnstoff, Rest-N, Kreatinin, [H] blieben un-
 ert, Cholesterin zeigte eine merkliche Verminderung, um so stärker, je höher
 halt des Blutes zu Anfang war. Albuminurie wurde nie beobachtet. (C. r.
 e biologie 91. 1399—1400. 1924.)

SPIEGEL.

uigi Tocco-Tocco, *Die pharmakodynamische Wirkung des Santonins auf die*
aden. (Vergleichend-pharmakologische Untersuchungen an Arthropoden und
 ibern.) Sowohl bei Arthropoden als bei Würmern ist, abgesehen von Unter-
 ien der Resistenz u. der Resorptionsverhältnisse, das Vergiftungsbild das gleiche:
 törungen der Fortbewegung mit mehr oder weniger gleichzeitigen Koordi-
 nstörungen, dann klon.-ton. Krämpfe, schließlich Lähmung. Das 1. Stadium
 urch Einw. auf die oesophagealen Ganglien bedingt, das 2. durch solche
 e ventralen Thoraxganglien. Bei Würmern ist ferner Schleimabsonderung,
 kzung u. Verbreiterung zu erkennen. Wurde das Santonin ihnen auf-
 ert, so gehen die Vergiftungserscheinungen bei Einbringen in W. zurück.
 gefensterten Darm beobachtete Ascariden zeigten zunächst Zunahme der vorher
 r langsamen Bewegungen, später Lähmung, die bei Ersatz des Darminhaltes
 üng. Unter therapeut. Bedingungen dürfte es nie zu Lähmung kommen,
 n zu Abwanderung in den Dickdarm, von dem die Tiere mit den Fäces

lebend entleert werden. (Arch. internat. de pharmacodyn. et de therap. **29**, 85 Messina, Univ.; Ber. ges. Physiol. **28**, 487—88. 1924. Ref. RENNER.) SPIE

C. P. Waldorp, *Wirkungen der Verbindung von Chinidinsulfat und K chlorid beim experimentellen Vorhofflimmern*. KCl für sich erschwerte die elementelle Erzeugung des Flimmerns, verhinderte sie aber selbst in beinahe tödlichen Dosen nicht ganz. Es verstärkt ein wenig die Wrkg. des Chinidins, kann aber bei hoher Gabe eine Tachystolie hervorrufen, die durch Chinidin verlangsamt werden kann. Chinidin ist für sich weit wirksamer als KCl. (C. r. soc. de biologie **1044**—45. 1924. Buenos Aires, Fac. de méd.) SPIE

P. Fraenckel, *Zwei plötzliche Todesfälle nach intravenöser Wismutinjektion*. Der eine Fall nach Wismulen ist bereits von MAGNUS (Klin. Wchschr. **3**, C. **1924**, II. 861) mitgeteilt, der andere ereignete sich nach intravenöser Einspritzung von Solvitren. Hier werden die Obduktionsbefunde mitgeteilt u. besprochen. Die eigentliche Bi-Vergiftung erscheint in beiden Fällen ausgeschlossen. Es sind jedenfalls persönliche Überempfindlichkeiten mit im Spiele sein. Intravenöse Verabreichung von Metall- u. Metalloidverb. muß in gewissen Fällen als sehr gefährlich gelten. (Dtsch. Ztschr. f. d. ges. gerichtl. Medizin **5**, 5—11. Berlin.) SPIE

L. Rosenthaler, *Über ein Pfeilgift aus Borneo*. Das Pfeilgift bestand aus 4 g braunen kantigen Stückchen nebst Pulver. Es gab keine Rkk. auf Alkali, wohl aber auf Glucoside. Die wichtigsten Bestandteile des Pfeilgiftes waren diejenigen des Milchsafte von *Antiaris toxicaria* Lesch. ident. Das in dem Glucosid erwies sich auch nach dem pharmakolog. Befund als Antiarin. (Pharm. Zentralhalle **66**, 20—22. Bern.) DIE

G. Analyse. Laboratorium.

Isaac Bencowitz und **Henry T. Hotchkiss, jr.**, *Konstantes Niveau für Wasserbad*. Der App. besteht aus einem Überlauf nach Art der kommunizierenden Röhren. Die Einrichtung zeigt die Figur des Originals. (Ind. and Engin. Chem. **16**, 1193. 1924. New York [N. Y.]) GRIM

E. Avery Roff, *Verbesserte Waschflasche*. Das Einblasrohr der Spritzflasche enthält am unteren Ende ein Glasventil, damit die eingeblasene Luft nicht zu leicht weichen kann. Das Spritzrohr enthält ebenfalls am unteren Ende ein solches Ventil, damit es stets mit W. gefüllt bleibt, wodurch ein Sprudeln u. Spritzen des Strahles vermieden wird. Ein drittes Rohr wird während des Blasens mit dem Daumen verschlossen u. zur Unterbrechung des Strahles geöffnet. Vgl. ziehe die kegelförmige Waschflasche der gewöhnlichen runden vor, da sie nicht so leicht zerbrechen wird. (Chemistry and Ind. **44**, 5.) WAGN

F. Mayer, *Nutsche aus Porzellan für warm und kalt zu haltendes Filtrieren*. (Österr. Chem.-Ztg. **28**, 11. — C. **1925**, I. 551.) JÜG

K. Würth, *Apparate für Siedeanalysen*. Nach Besprechung der den gewöhnlichen App. zugrunde liegenden Prinzipien wird eine Kombination des Youngs mit dem Aufsatzes mit dem Hempelschen empfohlen, die sich auch für fraktionierte Destillation im Vakuum bewährt hat. (Farben-Ztg. **30**, 683—84. 1924.) SÜV

W. H. Bahlke und **Robert E. Wilson**, *Eine Siedepunktkorrekturtafel für Normalflüssigkeiten. Anwendung auf Petroleumprodukte*. Die Einrichtung der Ta. ergibt sich aus dem Originalen. (Ind. and Engin. Chem. **16**, 1131—32. 1924. Whiting [Ind.]) GRIM

Charles E. Sando, *Apparat zur kontinuierlichen Extraktion von großen Mengen pflanzlichen Materials*. Der App. besteht in der Hauptsache aus einer unter einem Tubus versehenen Glasflasche, deren Hals in einem doppelt durchbohrten Spindel mit dem Kühler und ein Zuleitungsrohr für das verdampfte Lösungsmittel trägt. Die Verdampfung findet in einem tiefer angeordneten Kolben statt. Die Dämpfe

ien sich im Kühler, fallen auf das Extraktionsgut, durchdringen es u. werden
Beladung durch einen im Tubus montierten Heber in den Verdampfungs-
zurückgeleitet. (Journ. Ind. and Engin. Chem. 16. 1125. 1924. Washington
GRIMME.

E. Öman, *Destillation von Flüssigkeitsgemischen*. Vf. beschränkt sich auf die
von Gemischen zweier Fl. Unter „Destillationskurve“ versteht man die
aus Punkten mit dem %-Gehalt der einen Komponente in der Fl. als
Abszisse, dem %-Gehalt derselben Komponente im Dampf als Ordinate, jeweils
Gleichgewicht zwischen Fl. u. Dampf, natürlich bei verschiedenen Temp.,
während die jeweiligen Kpp. des Gemisches. Für 0% u. 100% sind natürlich
Abszisse u. Ordinate gleich, nämlich 0 bzw. 100; je stärker sie im übrigen ver-
schieden sind, desto leichter läßt sich das Gemisch durch Dest. trennen; liegt ein
Punkt der Destillationskurve auf der Graden zwischen 0 u. 100, so liegt bei diesem
Punkte ein konstant siedendes, durch Dest. nicht trennbares Gemisch vor. Durch
Analyse der Phasen läßt sich die Destillationskurve experimentell ermitteln; das
Problem ist ihre Vorausberechnung bei bekannter Siedepunktskurve, besonders in
Fällen, wo die Analyse der Phasen schwer möglich, z. B. bei Gemischen von
V. Stoffen.

Nach einer Formel von BROWN ist $x_1/x_2 = c \cdot w_1/w_2$, wo x_1 u. x_2 die Mengen
der Komponenten 1 u. 2 im Dampf, w_1 u. w_2 die in der Fl. bedeuten, u. c der
„Destillationsfaktor“ genannt wird. Rechnet man statt mit dem Mengenverhältnis
mit dem %-Gehalt p der einen Komponente, so wird für die Abszisse p die Ordinate
der Destillationskurve $k \cdot p$; auch k wird von Vf. als „Destillationsfaktor“ bezeichnet.
Der Destillationsfaktor c oder k ist jedoch, im Gegensatz zu BROWN, keineswegs
konstant, sondern schwankt in weitesten Grenzen bei ein- u. demselben System.
MURIE nahm an, daß $P = [p \cdot P_a + (100 - p) \cdot P_b]/100$, wo P den Totaldampf-
druck des Gemisches, P_a u. P_b die Dampfdrucke der reinen Komponenten a u. b
bei bestimmter, gegebener Temp.), u. p den molekularen %-Gehalt von a in
der Fl. bedeutet. Hier wird also vorausgesetzt, daß das Henry-Daltonsche Gesetz
(Verteilungssatz) gilt, d. h. daß bei gegebener Temp. der Partialdruck jeder Kom-
ponente proportional mit ihrer molekularen Konz. in der Fl. ist. Dasselbe nimmt
M. NERNST an für den Fall, daß der molekulare Zustand in beiden Phasen der-
selbe ist; dann soll also $n/(N + n) = k \cdot p$ sein, wo n u. N die molekularen %
in der Fl., p der Partialdruck des Dampfes ist; die Behauptung der Konstanz von
 k läßt auf das gleiche hinaus wie die der Konstanz des Destillationsfaktors u.
ist in derselben Weise in Widerspruch mit den Tatsachen. Auch alle Formeln
anderer Autoren zur funktionellen Wiedergabe der Destillationskurve (Diskussion
im Original) geben nicht die durch Analyse gefundenen Werte. Die Voraus-
setzung der Destillationskurve ist aber von großer prakt. Bedeutung für die
Verteilung der Wirksamkeit von Rektifizierapparaten, wie Vf. an Beispielen zeigt.
Im folgenden bezeichnet Vf. die schwerer flüchtige Komponente als „Lösungs-
mittel“, die leichter flüchtige als „gelösten Stoff“. Vf. gibt nun eine Methode, um
die Destillationskurve zu berechnen, wenn die Siedepunktskurve des Systems
als Funktion des %-Gehaltes an gel. Stoff in der Fl.) u. die Dampfspannungs-
kurve des reinen Lösungsm. bekannt ist; diese Berechnung gibt bei den vom Vf.
untersuchten Systemen gute Übereinstimmung mit den durch Phasenanalyse gefun-
denen Werten. Vf. rechnet die jeweiligen Gewichtsprozent der Fl. in molekulare
%-Gehalte um, multipliziert dann die Dampfspannung des reinen Lösungsm. bei
den betreffenden Kp.₇₆₀ mit dem (durch 100 dividierten) molekularen %-Gehalt an
gel. Lösungsm. u. nimmt an, daß der erhaltene Wert der Partialdruck des
Lösungsmitteldampfes in der Gleichgewichtsphase beim Sieden unter 760 mm ist,
also für das Lösungsm. also das Henrysche Gesetz gilt. Die Differenz dieses

Partialdruckes gegen den Gesamtdruck von 760 mm wird dann als Partialdruck des gel. Stoffes in der Gasphase betrachtet. Das Verhältnis der so erhaltenen mit den Mol.-Geww. multiplizierten Partialdrucke gibt das Gewichtsverhältnis der Komponenten in der Gasphase; dieses durch das in der Fl. dividiert gibt den Destillationsfaktor. Als erstes Beispiel dient das System 10% Methylalkohol, 90% Wasser, der $K_{p,760}$ ist 90,9°, der Partialdruck des W. berechnet sich daraus zu 511,5 mm; der CH_3OH also zu 248,5 mm. Berechnet man aber letzteren Partialdruck aus der bekannten Dampftension des reinen CH_3OH bei 90,9° von 1960 mm u. dem mol. kularen %-Gehalt der Fl. an CH_3OH , so ergibt er sich zu 115,4 mm, also viel niedriger, sodaß der tatsächliche Gesamtdruck nicht erreicht wird; dasselbe gilt für allen anderen %-Gehalten; man kann also nicht beide Partialdrucke auf diese Weise berechnen, sondern nur den des Lösungsm.; über letztere Annahme siehe unten. Eine Tabelle für %-Gehalte der Fl. an CH_3OH von 1% bis 90% stellt nach Vfs. Methode berechneten %-Gehalte des Dampfes an CH_3OH mit den nach BERGSTRÖM gefundenen zusammen; die Übereinstimmung ist gut, in Anbetracht der unvermeidlichen Fehler in der Best. des Kp. bei niederem %-Gehalt an CH_3OH .

Von der Guthrieschen Rechnung (siehe oben) unterscheidet sich die vorliegende dadurch, daß der Totaldampfdruck P des Gemisches als gegeben, nämlich 760 mm betrachtet wird, u. der effektive Dampfdruck P_a des reinen gel. Stoffes (im Mischungs- zustande!) als Unbekannte aus p u. P_a nach der Formel berechnet wird. Für 5%-igen CH_3OH , $K_{p,760}$ 95,1°, ergibt sich P_a zu 4950 mm, während der Vers. des reinen CH_3OH bei 95,1° 2250 mm ergibt. Demnach erhöht die Anwesenheit des Lösungsm. den Dampfdruck des gel. Stoffes weit über den nach dem Henry-Daltonschen Gesetz zu erwartenden Wert, u. dies um so mehr, je mehr Lösungsm. zugegen ist (siehe unten); der Dampf des gel. Stoffes wird gleichsam in der Lösungsm. weniger absorbiert als in seiner eigenen fl. Phase. In einer weiteren Tabelle werden, für 2—70% CH_3OH , die wie oben berechneten Dampfdrucke mit der sich zunächst auf verschiedene Tempp. (nämlich die jeweiligen $K_{p,760}$) beziehen auf den Kp. des reinen CH_3OH , d. h. 65,0°, umgerechnet, um vergleichbare Werte zu erhalten; hierfür wird das Verhältnis der P_a bei beiden Tempp. gleich dem Verhältnis der empir. Dampfdrucke des reinen CH_3OH bei diesen Tempp. gesetzt u. der umgerechnete P_a in at ausgedrückt. Statt 1 at ergibt er sich für 2% CH_3OH zu 2,45 at, für 90% CH_3OH zu 1,05 at. — Entsprechende Tabellen für die Destillationskurve u. für die umgerechneten P_a gibt Vf. für folgende Systeme: Aceton + Wasser; Aceton + CH_3OH ; Benzin + A., CCl_4 + A. Die berechneten u. von anderen Autoren (BERGSTRÖM, HAUSBRAND u. a.) gefundenen Destillationsfaktoren werden graph. als Destillationskurve dargestellt. Die Übereinstimmung in der Dampf-%-Gehalten ist für niedere % meist sehr gut, für höhere innerhalb 1% ca. 5%, was als Versuchsfehler der Analyse gelten kann; der berechnete Wert ist fast stets höher als der gefundene, sodaß das rechte Ende der berechneten Kurve über der gefundenen liegt, aber im ganzen gleiche Form hat. Der auf den Partialdruck des reinen Lösungsm. umgerechnete effektive Dampfdruck P_a beträgt bis zu 8,5 at (bei 1% Aceton in W.).

Anders als diese Systeme verhält sich ein sd. Gemisch von fl. O_2 u. fl. N_2 . Hier ist der Partialdruck jeder Komponente proportional ihrer relativen Menge in der Fl.; berechnet man beide Partialdrucke beim $K_{p,760}$, hiernach, so ist ihre Summe sehr nahe gleich 760 mm (Tabelle von 10—90%). Solche Systeme, wo also die Guthriesche Formel gilt, nennt Vf. „Flüssigkeitsgemische“; Systeme der ersten Art dagegen, in denen der effektive Partialdruck des gel. Stoffes über den nach dem Henry-Daltonschen Gesetz zu erwartenden erhöht ist, bezeichnet Vf. als „Flüssigkeitslösungen“. Vf. erörtert die Frage, ob nicht auch der Partialdruck des gel. Lösungsm. durch die Anwesenheit des gel. Stoffes erhöht werden müsse, nicht

auf Grund der brauchbaren Werte an, daß diese Erhöhung innerhalb der Grenzen liege.

Die Möglichkeit zur Trennung der Komponenten durch Dest. hängt bei „Erscheinen“ nur von der Differenz der Dampfdrucke ab; sind beide gleich, so ist Trennung möglich. Bei „Lösungen“ spielt, außer der Differenz des Dampfdruckes der Lsg. gegen den des reinen Lösungsm., auch das Mol.-Gew. der Stoffe eine Rolle. Vf. berechnet für eine Kp.-Differenz von $0,2^\circ$ an einem allgemeinen Beispiel den Destillationsfaktor zu 1,006. Bei einer Kolonne von z Böden wird die Erhöhung 1,006 ^{z} , bei 100 Böden also 2,0. Vf. hält es danach für denkbar, „Erscheine“ oder „Lösungen“ von Isotopen durch Dest. zu trennen. (Svensk Kem. Tidn. **36**. 223—43. 1924.)

ARNDT.

to Rothe, *Laboratoriumsapparate*. II. *Rationelle volumetrische Analyse und volumetrische Pipetten für Serienanalysen von Mangan- und Eisenerzen*. (Vgl. S. 724.) Bei Serienanalysen von Mn-Erzen ohne Rechnung machen zu können (bei 5 g Eisen) benutzt Vf. automat. Pipetten (mit Überlaufvorrichtung) von genau 8,240 ccm. Bei 5 g Erz werden zu 250 g aufgelöst, titriert man 8,24 ccm der Lsg. mit KMnO_4 , so gibt die Ablesung direkt den Prozentgehalt an Mn an. Kleine Mengen vom Normalgewicht 5 g werden durch Benutzung einer feinen Teilung des äußeren Teil der Bürette kompensiert. — Ähnlich werden für die Fe-Best. in Eisen besondere Pipetten angegeben (verschiedene Größen, da der Fe-Gehalt der Eisen in weiten Grenzen schwankt). Arbeitet man nach ZIMMERMANN-REINHARDT, so kann man zur Best. von Fe u. von Mn die gleichen Lsgg. benutzen. (O Brasil. Rev. **1**. 206—214. 1924. Bello Horizonte Escola en Engenharia. Sep.) W.A. ROTH.

Mund, *Über eine Technik, eine beliebige Flüssigkeit der Wirkung von Röntgenstrahlen auszusetzen*. Ein dickwandiges Glasrohr, 150 mm lang, von 15 mm Durchmesser, wird nach Einführung eines kurzen Glasstabes von 10 mm Durchmesser an beiden Enden zugeschmolzen. Es trägt 2 seitlich angesetzte Röhrchen so, daß die Verlängerung des anderen bildet, von 7—9 mm Durchmesser, von denen das eine bald zugeschmolzen wird. Durch das offen gebliebene führt man mittels einer die zu bestrahlende Fl. ein, dann ein dünnwandiges Capillarröhrchen von 10 mm Länge, das die gewünschte Menge Radon enthält u. an beiden Enden zu verschließen ist, so daß sein mittlerer Teil das Außenrohr durchschneidet. Nachdem das noch offene Rohrende zugeschm. ist, bringt man durch Neigen des Rohres das Glasstäbchen so gegen die Capillare, daß diese zerbricht. (Compt. rend. **191**. 1448—49. 1924. Louvain, Lab. de chim. phys.) SPIEGEL.

Elemente und anorganische Verbindungen.

von A. Congdon, W. B. Crabtree, H. W. Coles, L. L. Smith und M. L. Huggins, *Kritische Studien über Analysenmethoden*. XIV. *Chlor*. (XIII. vgl. S. 414.) Nach einem Überblick über die Literatur. Ihre Nachprüfung von 6 Verff. ergab folgende Reihenfolge der Genauigkeit: 1. gravimetr. Best. von AgCl , 2. Mohrsche Titration in Abwesenheit störender Salze, Säuren usw., 3. Volhards NH_4CN -Methode mit Abfiltrieren des AgCl vor Rücktitration des AgNO_3 mit Fe^{3+} , 4. dieselbe ohne Filtration vom AgCl , 5. Mohrs Methode in Ggw. von H_2S -Salzen, 6. gravimetr. als HgCl_2 nach LINOSSIER u. LIGNON (Chem. News **11** [1889]). Die sonst sehr genaue Methode von MOHR ergab bei Ggw. von H_2S stets zu hohe Werte. Filtrierte man bei der Best. nach VOLHARD das AgCl ab, so erhielt man erheblich zu niedrige Resultate. (Chem. News **129**. 302—304. 317—20. 334—37. 1924. Syracuse, Univ.)

HERTER.

Arthur A. Noyes und William C. Bray, *Der systematische Nachweis der chemischen Elemente*. (Vgl. Journ. Americ. Chem. Soc. **29**. 137 [1907]. **30**.

481 [1908.] Vff. geben zur Analyse einer Substanz, welche seltene Elemente hält, folgenden Gang an:

Aufschließen der Substanz mit HBr u. Br_2 , dann Abdestillieren der Lsg.

Destillat: Se-Gruppe. Se, As, Ge als Bromide.	Lsg. u. Rückstand. Hinzufügen von HNO_3 u. HClO_4 , dann dest., Erhitzen bis weiße Dämpfe aufsteigen, W. zusetzen filtrieren.
Destillat: Os-Gruppe. Os, Ru als Tetroxyde.	Lsg. Rückstand: SiO_2 , W-Ta-Gruppe als AgBr , nicht aufgeschlossenes Material. HF digerieren, dann HClO_4 zusetzen, erhitzen bis weiße Dämpfe aufsteigen. Lsg. u. Rückstand.
Beides vereinigen, eindampfen, 12n. HCOOH zusetzen, kochen, filtrieren.	

Lsg.: Analyse der anderen Elemente.	Rückstand: W-Ta-Gruppe als Oxyde, Au-Gruppe als Metall. AgBr , unzers. Material. Mit HF digerieren, verd., filtrieren.
-------------------------------------	---

Lsg. mit H_2SO_4 eindampfen. NH_4OH u. $(\text{NH}_4)_2\text{S}$ zufügen, filtrieren.		Rückstand: Au-Gruppe als Metalle, AgBr , PbSO_4 zers. Material. Mit HCl u. HNO_3 erhitzen, eindampfen, verd. HCl zusetzen, filtrieren.	
Lsg.: W-Gruppe. Sb, Sn, W, Mo, Te, V.	Nd.: Ta-Gruppe. Ta, Nb, Ti, Zr.	Lsg.: Au-Gruppe. Au, Pd, Pt, Hg als Chloride.	Rückstand: AgCl , PbSO_4 , unzers. Material. Mit NH_4OH u. $\text{NH}_4\text{C}_2\text{H}_3\text{O}_2$ digerieren, filtrieren.
		Lsg.: Ag, Pb	Rückstand unzers. Material. Nicht metall.: BaSO_4 , SrSO_4 , Al_2O_3 , $\text{FeO} \cdot \text{Cr}_2\text{O}_3$, SnO_2 , etc.

$\text{ZrO}_2 \cdot \text{SiO}_2$, Silicate, Phosphate der seltenen Erden, ThF_4 , C, SiO , MoS_2 . Mit HNO_3 u. KNO_3 aufschließen. Metall.: Pt-Elemente, Legierungen von Fe, Ni, Cr. Na_2O aufschließen.

Die HClO_4 -saure Lsg., welche zur Analyse der übrigen Elemente aufgehoben wird wie folgt verarbeitet: Lsg., aus welcher die Se-, Os-, W-, Au- u. Ta-Gruppen bereits entfernt wurden, wird mit NH_4Br versetzt u. filtriert:

Nd.: Ag-Gruppe. Ag, Tl, Pb als Bromide.	Lsg. mit H_2S gesätt. u. filtriert.		
	Nd.: Cu-Gruppe. Pb, Bi, Cu, Cd, Te, Mo, Ir, Rh als Sulfide.	Lsg. mit NH_4OH u. $(\text{NH}_4)_2\text{S}$ versetzt u. filtriert.	Lsg. $(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3$ zusetzen u. filtrieren.
		Nd. gel., mit NaOH u. Na_2O gekocht, filtriert.	

Nd. mit HF erhitzt, filtriert.	Lsg.: Al-Gruppe. Al, Zn, Cr, U, Be, V, In.	Nd.: Erdalkali- gruppe. Ba, Sr, Ca, Mg.	Lsg.: Alkaligruppen. Na, K, Li, Rb, Cs.
Nd.: Seltene Erden. Sc, Th, Ce.	Lsg.: Fe-Gruppe. Mn, Fe, Ni, Co, Zr, Ti, In.		

Die weitere Trennung der einzelnen Gruppen wird nach bekannten Methoden vorgenommen. (Chem. Rev. 1. 277—91. 1924. Pasadena, Inst. of Techn.; Berkeley Univ. [Cal.])

J. M. McCandless und J. Q. Burton, Fehlerquellen bei der Bestimmung der Phosphorsäure nach der Molybdat-Magnesia-Methode Bei hochprozentigen Phosphaten treten oftmals große Differenzen in den Resultaten verschiedener Chemiker.

Nach Verss. der Vf. liegt dies darin, daß die Unters.-Methoden nicht genau angegeben sind, sodaß manche gravierenden Zusätze dem persönl. Empfinden des Analytikers anheim gestellt sind. Die Hauptfehlerquelle liegt im Zusatz von HCl zur Neutralisation der Lsg. des gelben Mo-Nd. in NH_3 . Man sollte immer ein empfindliches Lackmuspapier genau neutralisieren. HCl im Überschuß ergibt Fehler, NH_3 im Überschuß dagegen Minusfehler. (Ind. and Engin. Chem. 16. 26—70. 1924. Atlanta [Ga.])

GRIMME.

Helmut Mosaner, *Die Prüfung der Zinkschicht auf verzinkten Eisenswaren*. Gibt eine eingehende krit. Darst. der bisher bekannten Verff. zur mechan. u. chem. Unters. der Zn-Überzüge feuerverzinkter, elektroverzinkter u. sherardisierter Drahtgitter, Graphendrähte u. anderer Werkstoffe im In- u. Auslande unter Berücksichtigung der Vorschriften. (Zentralbl. d. Hütten u. Walzw. 28. 113—16. 131—33. 143—45. 1924. 56. 1924.)

NEUFELD.

H. M.-P. Brinton und R. B. Ellestad, *Eine verbesserte Methode zur Bestimmung von Uran in Carnotit*. Einwage (entsprechend 0,1—0,2 g U_3O_8) mit 10 ccm HNO_3 (1:1) zur Trockne verdampfen. Rückstand in 10 ccm konz. HNO_3 (1:1) ccm W. aufnehmen u. kochen, mit NH_3 neutralisieren, zugeben von 1 g PbNO_3 u. mit überschüssigen $(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3$ versetzen. Zugeben von 25 ccm konz. NH_3 u. nach Verschluß kräftig schütteln. Innerhalb 5 Minuten auf 80° erwärmen unter Rühren, abfiltrieren u. Nd. mit $(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3$ -haltigem W. auswaschen, mit 0,5 ccm konz. $(\text{NH}_4)_2\text{S}$ u. einigen ccm Ä. versetzen, erwärmen bis zum guten Ausflocken des PbS , filtrieren. Filtrat $(\text{NH}_4)_2\text{S}$ -frei kochen, mit HCl ansäuern u. CO_2 weggeben. Ausgeschiedenen Schwefel mit HNO_3 oxydieren. Neutralisieren mit NH_3 , ansäuern mit einigen ccm HNO_3 , aufkochen u. U mit 3% ig. NH_3 ausfällen. Nd. mit 10% ig. NH_4NO_3 -Lsg. auswaschen, trocknen, glühen u. wägen als U_3O_8 . Nach Wägen lösen in h. HNO_3 , etwas verd. u. mit überschüssigem $(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3$ neutralisieren. Nd. = $\text{Al}(\text{OH})_3$, abfiltrieren, glühen u. wägen als Al_2O_3 . Gewicht von U_3O_8 abziehen. (Ind. and Engin. Chem. 16. 1191—92. 1924. Minneapolis [Minn.])

GRIMME.

schiffner, *Österreichische Normen der chemischen Analyse von Metallen*. Vf. bezieht über die Entwürfe des „U. A.“ zur Analyse von Raffinade- u. Konverter-Cu. (Ber. Chem.-Ztg. 28. 9—11.)

JUNG.

Organische Substanzen.

V. S. Calcott, F. L. English und F. B. Downing, *Untersuchung von Naphthalinsulfosäuren und Naphthalin*. *Ergänzende Mitteilung*. (Vgl. Ind. and Engin. Chem. 16. 27; C. 1924. I. 1696.) Best. von Naphthalin-C. (C_{10}): Man kocht ein St. in saurer Lsg. zur Entfernung von SO_2 , gibt dann 25 ccm = 0,25—0,30 g Naphthalinsulfosäure in einen 200 ccm Erlenmeyer u. versetzt bei Zimmertemp. mit 10 ccm Vanadinreagens (63 g NH_4VO_3 gel. in 220 ccm W. u. unter Rühren zugeben von 80 ccm konz. H_2SO_4) u. erhitzt innerhalb 10 Minuten auf 120° . $\frac{1}{4}$ Stde. auf dieser Temp. halten, eingießen der Fl. in 200 ccm k. W. u. mit W. auf 500 ccm auffüllen. 150 ccm nach Verdünnen mit 200 ccm W. bei 70 — 80° mit $\frac{1}{10}$ n. KMnO_4 -Lsg. titrieren bis zum Farbenumschlag gelb in rot. Blinder Vers. muß angestellt werden. Berechnung:

$$\frac{(\text{ccm KMnO}_4 - \text{blinder Vers.}) \times \text{Titer} \times 0,667}{\text{Einwage der titrierten Menge}} = \% \text{ C}_{10}.$$

Best. von Sulfonsäureschwefel: Weitere 100 ccm der sauren Lsg. werden mit Zusatz von 400 ccm h. W. u. 5 g BaCO_3 30—40 Minuten gekocht, abfiltrieren u. mit k. W. auswaschen. Filtrat auf 800 ccm verd. u. gel. Ba durch Kochen mit 10 ccm 5% ig. H_2SO_4 fällen. Blinder Vers. durch Auskochen von 5 g BaCO_3 mit 100 ccm W. Berechnung:

$$\frac{(\text{BaSO}_4 - \text{blinder Vers.}) \times 27,47}{\text{Einwage}} = \text{Sulfonsäureschwefel.}$$

Den Grad der Sulfonierung erhält man nach der Gleichung:

$$\frac{3,745 \times \text{Sulfonsäureschwefel}}{\% \text{ C}_{10}} = \text{Sulfonierungsgrad,}$$

wobei 1,00 = Mono-, 2,00 = Di- u. 3,00 = vollständige Trisulfonierung. and Engin. Chem. **16**. 1190. 1924. Wilmington [Del.]) GRIMM

Harry F. Lewis, *Quantitative Bestimmung von Anthracen in Anthracen* 2 g der Probe werden in einem $15,2 \times 2,5$ cm Hartglasprobierrohre mit 25 c 10% ig. H_2SO_4 unter Aufsatz eines mit Kapillarrohr u. Thermometer versehen Stopfens 5 Minuten auf 150° erhitzt. Fl. in 500 ccm W. eingießen unter beständ Rühren, abfiltrieren u. colorimetrisch vergleichen mit eingestellten Farblsgg $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ u. CoCl_3 . (Ind. and Engin. Chem. **16**. 1184. 1924. Vernon [Ja.]) GRIMM

I. M. Kolthoff, *Eine Farbenreaktion auf Glycerin*. Anschließend an v von LA WALL gemachte Beobachtung, daß Glycerin beim Nachweise von CH_3 stört, wurde gefunden, daß gegen fuchsinschweflige Säure bei vorausgegangen Oxydation mit KMnO_4 (vgl. Pharm. Weekblad. **59**. 1268; C. **1923**. II. 267) Glycerin sich qualitativ genau wie CH_3OH verhält. Noch 0,04% Glycerin geben deutl. Rk.; Essigsäure, Milchsäure, Citronensäure, Weinsäure stören nicht. CH_3OH ist vorher verdampft. Zum Nachweis von Glyceriden werden diese zunächst verdampft dann angesäuert u. geprüft. (Pharm. Weekblad **61**. 1497—98. 1924. Utrecht Univ.) GROSZFEIL

H. D. Murray, *Farbnachweis für Anilin und Toluidine*. Drei Tropfen Aminoamine werden in 2 ccm 50% ig. H_2SO_4 gel. u. die Lsg. auf $60-70^\circ$ erwärmt. H. z. fügt man 3 Tropfen einer gesätt. $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ -Lsg. u. schüttelt bis zur bleibenden Färbung. In 800 ccm W. gießen u. mit NH_3 alkal. machen. — Hierbei tritt bei Anilin eine purpurrote Farbe auf, die beim Gießen in W. bestehen bleibt u. beim Alkalisieren wenig nachdunkelt. — *o-Toluidin* ist zunächst beim Bichromatzusatz blau gefärbt dann in W. purpurrot, alkal. tiefblau. — *m-Toluidin*, mit Bichromat grün, blau in W., dunkelpurpurrot beim NH_3 -Zusatz. — *p-Toluidin*, rotbraun mit Bichromat strohgelb in W. u. später dunkler mit NH_3 . Ähnlich verhalten sich die monosubstituierten Methyl- u. Äthyl-derivv. (Chem. News **130**. 23. London, College Science.) HORRIG

Maurice François und Charles Lormand, *Die Bestimmung der Weinsäure durch Wägung des Calciumtartrates in den Tartraten des Codex*. (Ann. des Epiphyt. **17**. 468—73. 1924. — C. **1925**. I. 137.) RÜHL

Yuzuru Okuda, *Eine Methode zur Bestimmung von Cystin*. Die von F. MANN (Beitr. z. chem. Physiol. u. Pathol. **3**. 1; C. **1902**. II. 1360) beobachtete Oxydation von Cystin zu Cysteinsäure durch Br wird für die Best. von jenem benutzt, indem die saure Lsg. in Ggw. von NaBr mit KBrO_3 titriert wird. 1 g Cystin erfordert 10 Atome Br. Bei Anwendung von $\frac{1}{20}$ -n. KBrO_3 -Lsg. (8,35 g/l) entspricht daher 1 ccm 0,00721 g Cystin. Die Konz. an diesem u. an Säure hat prakt. ohne Einfluß. Statt KBrO_3 -Lsg. kann auch Bromwasser benutzt werden. Als Endpunkt dient das Bestehenbleiben einer Gelbfärbung während 1 Min. Histidin ist die einzige andere der durch Phosphorwolframsäure fällbaren Aminosäuren, die nicht absorbiert, tut dies viel langsamer, so daß bei Einhaltung der 1 Min.-Grenze ein Ggw. nicht stört. Tyrosin wird mit Cystin gleichzeitig titriert, absorbiert aber nur Mol. nur 2 Atome Br. Wird nach Titration eines Gemisches beider das Cystin noch durch Ermittlung des S-Gehaltes nach KOCH u. UPSON (Journ. Americ. Chem. Soc. **31**. 1355; C. **1910**. I. 1381) oder nach DENIS (Journ. Biol. Chem. **12**. 3 [1912]) bestimmt, so errechnet sich danach die Menge des Tyrosins. (Journ. Agric. Tokyo **7**. 69—76. 1919.) SPIEGEL

7. S. Calcott, F. L. English und F. B. Downing, *Die Analyse der Xanthate.* Xanthate (K- u. Na-Salz des Xanthogensäureäthylesters) werden als Cu-Salze kal. CuSO_4 -Natriumtartratlg. bei 0° gefällt, durch einen Goochtiigel filtriert, W. gewaschen u. in 30 ccm HNO_3 (2 T. HNO_3 + 1 T. W.) gelöst. Zu dieser werden 15 ccm konz. H_2SO_4 gegeben u. bis zum Entweichen von SO_3 -Dämpfen gelampft. Nach dem Abkühlen werden 100—125 ccm W. zugegeben u. so lange konz. NH_4OH versetzt bis alles Cu mit tiefblauer Farbe in Lsg. gegangen ist. überschüssige NH_3 wird weggekocht u. die Lsg. mit 7 ccm Eg. u. KJ-Lsg. versetzt u. mit 10-n. $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ titriert. Die Anwesenheit von Sulfiden u. Thiothiaten läßt die Ergebnisse zu hoch ausfallen. Auf Sulfide wird qualitativ Nitroprussidnatrium (rotviolette Färbung) u. auf Thiocarbonate mit 10% Blei-lsg. geprüft (brauner oder roter Nd.). (Engin. Mining Journ.-Press **118.** 980 1. 1924.)

ENSZLIN.

Bestandteile von Pflanzen und Tieren.

h. v. Fellenberg, *Untersuchungen über das Vorkommen von Jod in der Natur. Bestimmung kleinster Jodmengen.* (I. vgl. Biochem. Ztschr. **139.** 371; C. **1924.** 1. 1.) Die früher angegebenen Methoden wurden etwas vereinfacht u. verbessert, prinzipiell aber nicht verändert. Das Verf. gibt bei Unters. von W., geblühtem, nicht jodiertem NaCl , von Gesteinen u. Erden, pflanzlichen u. tier. Materialien, Schilddrüsen u. Harn gute Resultate. (Biochem. Ztschr. **152.** 116—27; Mitt. Lebensmittelunters. u. Hyg. **15.** 234—45. 1924. Eidgenöss. Gesundheitsat.)

WOLFF.

h. v. Fellenberg, *Untersuchungen über das Vorkommen von Jod in der Natur. Jodbestimmungen in Lebensmitteln, Düngemitteln, schweizerischen Mineralwässern.* (I. vorst. Ref.) In Tabellen wird der Jodgehalt einer großen Zahl von Lebensmitteln, künstlichen Düngemitteln u. einiger schweizer. Mineralwässer angegeben. (Biochem. Ztschr. **152.** 128—31; Mitt. Lebensmittelunters. u. Hyg. **15.** 245—48. 1924.)

WOLFF.

Thomas und C. Berariu, *Der Nachweis kombinierter Pentosen in den Nucleoproteinen.* Wenn man ca. 1 ccm der zu untersuchenden Lsg. auf eine 0,3% ig. Lsg. von N-Naphthol in konz. H_2SO_4 gibt u. leicht rotierend bewegt, erhält man bei Gegenwart von Pentosen in freier oder gebundener Form einen blauen Ring an der Oberfläche, u. die blaue Farbe diffundiert allmählich in die H_2SO_4 . Von den untersuchten Nucleoproteiden gab dasjenige des Pankreas einen grünen Ring, der allmählich überging, aber schnell Blaufärbung in die Säure übergehen ließ. Die Nucleine von Leber, Milz u. Milchdrüse lieferten einen blauen, bald durch tiefbraunen überdeckten u. bald verdeckten Ring mit wenig intensiver Blaufärbung der Oberfläche, dasjenige aus Thymus nur einen rotbraunen Ring. (C. r. soc. de biologie **91.** 70—71. 1924. Cluj [Rumänien], Univ.)

SPIEGEL.

Yukichi Amaki, *Zur Frage des lipolytischen Vermögens des Serums und der Extrakte, mit besonderer Berücksichtigung seiner Bestimmungsmethoden.* Bei der Extraktion von Eiweißabbauprodukten wird stets sehr viel mehr Alkali verbraucht, als den freien Fettsäuren entspricht, wenn man nach KANITZ die Verdauungsmischung direkt unter Zusatz von A. gegen Phenolphthalein titriert. Wird die vorherige Extraktion vermieden, so zeigen sich die Extrakte von Organen u. von Pankreas sehr schwach lipolyt. wirksam, Blutsrum gar nicht. Die Verdauungskörper fördern auch bei einwandfreier Methodik nachweisbar die Pankreasaktivität, wohl infolge ihrer Fähigkeit Trypsin abzulassen. (Tôhoku, Journ. of exp. med. **5.** 13—28. Sendai, Tôhoku Univ.; Ber. ges. Physiol. **28.** 465. 1924. Ref.)

SPIEGEL.

V. Balthazard, *Spektrometrische Bestimmung des Vergiftungskoeffizienten der Vergiftung mit Kohlenoxyd*. Der Vergiftungskoeffizient bei der CO-Vergiftung Ψ , ist das Verhältnis des mit CO verbundenen zum gesamten Hämoglobin im Blutes. Da das Absaugen aus dem Blut u. die Bestimmung des CO umständlich u. oft unsicher ist, schlägt Vf. vor, den Ψ spektroskop. zu messen. Das mit CO gesätt. Blut wurde in verschiedenen Verhältnissen mit an O₂ gesätt. Blut gemischt u. der Schwerpunkt, λ_m , der Absorptionsbande im Gelbgrün mittels eines Spektrophotometers von YVON bestimmt:

Ψ	0,00	0,23	0,32	0,43	0,53	0,66	0,78	1,00
λ_m	577,0	576,0	575,0	574,0	573,0	572,0	571,0	570,0

Bei Blutunters. wird ein Tropfen Blut mit luftfreiem W. verd. u. sein Absorptionsspektrum unter einer Toluolschicht im Spektrometer bestimmt. Aus der Lage des λ_m findet man Ψ nach der obigen Tabelle. (Bull. Soc. Chim. Biochim. 817—28. 1924.)

BIKERMA

H. Angewandte Chemie.

V. Anorganische Industrie.

Heinrich Molitor, *Die Fabrikation der anorganischen Bromsalze und der Bromwasserstoffsäure*. (Metallbörse **14**. 2269. 2317—18. 2389—90. 2417—18. 2442. 2465—66. 2489—90. **15**. 81.)

BEHRM

J. M. Braham, *Verlauf der Entwicklung des Stickstoffproblems*. Umfassender Bericht über N-Fixierung u. N-Verbrauch in den wichtigsten Kulturländern. (Ind. and Engin. Chem. **16**. 1277—80. 1924. Washington [DC].)

GRIMM

Wilhelm Moldenhauer, *Über die Ammoniaksynthese bei hohen Drucken*. (I. vgl. Chem.-Ztg. **48**. 233; C. **1924**. II. 104.) Die Resultate CLAUDES (C. R. l'Acad. des sciences **169**. 1039; C. **1920**. II. 637) werden durch die Unterss. von LARSON (Journ. Americ. Chem. Soc. **45**. 2918; C. **1924**. I. 868) bestätigt; bei sehr niedrigen Temp. ist das Anwachsen der Ammoniakgleichgewichtskonstante mit zunehmendem Druck noch weit stärker. Offen bleibt die Frage, ob die Konstante bei hohen Temp. wieder unabhängig vom Druck wird. (Chem.-Ztg. **48**. 65—66. Darmstadt, Techn. Hochschule.)

JUN

Jerome Alexander, *Bentonit*. Bentonit ist eine vielerorts in Amerika vorkommende tonähnliche Erde mit 5—10% Oxyden der Alkalien u. alkal. Erden, feinpulvrig, von hoher Absorptionskraft u. ausgezeichneten kolloidalen Eigenschaften. Es besteht aus 54—60,64% SiO₂, 11,84—23,26% Al₂O₃, 3,92—3,97% Fe₂O₃, 0,59—4,94% CaO, 2,19—3,24% MgO, 0,66—4,33% Na₂O. Es eignet sich zu medizin. Packungen, zu keramischen Zwecken, als Bodenverbesserer für leichte Sandböden, als Füllmaterial bei der Papierfabrikation u. in der Textilbranche, zum Weichmachen von W. u. als Filtermaterial. (Ind. and Engin. Chem. **16**. 1140—42. 1924. New York [N. Y.].)

GRIMM

Ralph H. McKee und **Paul M. Horton**, *Adsorptionskohlen für viele Industrieprodukte*. Literaturübersicht. (Chem. Metallurg. Engineering **32**. 13—16. New York, Columbia Univ.)

JUN

Victor Lenher, **George Kemmerer** und **Earl Whitford**, *Extraktion von Caesium aus Pollucit*. 5 kg Pollucit fein gemahlen wurden in konz. HCl gelöst, SiO₂ durch Abdampfen u. Erhitzen auf 110° abgeschieden, der Rückstand mit konz. HCl ausgezogen u. die Lsg. zur beginnenden Krystallisation eingengt. Es wurde fraktionell frakt. destilliert das Doppelsalz 3CsCl·2SbCl₃, welches durch Hydrolyse durch Kochen mit W. Sb-frei gemacht u. durch Behandeln mit HNO₃ in das Nitrat übergeführt wird. Nitrat mit der doppelten Menge Oxalsäure durch Glühen in Carbonat übergeführt, letzteres durch Lsg. in W. u. Filtrieren von mitgerissenem Fe, Al, Sb

- u. krystallisieren. (Ind. and Engin. Chem. **16**. 1280. 1924. Madison GRIMME.)
- 1. Lehmann**, *Die mechanischen Chlorkalkkammern „System Backman.“* Nach Anordnungen BACKMANS muß die Temp. gesenkt werden in dem Maße, wie der Gehalt des Chlorkalks bei der Herst. zunimmt. Die Chlorkalkkammern sind nach dem Prinzip der Kiesröstöfen gebaut; in jeden Etagenboden sind Kühlschlangen eingebaut. Die Kühlung ermöglicht die Verwendung unverdünnten Cl-Gases. (Chem.-Ztg. **75**—76.) JUNG.
- (E. Walker**, *Verminderung der Kosten durch Dauerbetrieb.* Es wird an Hand der Erst. von $Al_2(SO_4)_3$ aus Bauxit gezeigt, (Abbildungen) wie durch Anwendung des beschriebenen Verff. eine Vereinfachung u. Verbilligung des Betriebes u. eine Verringerung des Endprod. erreicht werden kann. (Chem. Metallurg. Engineering **31**. 1924.) RÜHLE.

Libert Rother, Griesheim a. M. und **Otto Ladner**, Nied a. M., *Entwicklung des Schwefelwasserstoff* aus FeS u. Säure, dad. gek., daß das FeS in Plattenform in einem Entwicklungsgefäß aufgehängt wird. (D. R. P. **408060** Kl. 12i vom 7/3. 1924, ausg. 8/1. 1925.) KAUSCH.

Fabrique Nationale de Produits Chimiques et d'Explosifs-Anciens Établissements Ghinigonet et Delattre Soc. an., Ougrée, Belgien, *Gewinnen von Ammoniak.* Alkali- oder Erdalkalicyanamide werden mit zellstoffhaltigen MM., wie Torf, Torf, Braunkohle, ausgelaugten Rübenschnitzeln bezw. Fichtenrinde, Säureabfälle oder Ölkuchen, gemischt u. die Mischungen trocken dest. Stickstoffhaltige Pflanzenteile werden zweckmäßig vor dem Mischen mit dem Cyanamid mit einer Lsg. von Ätzalkali befeuchtet. Der nach dem Austreiben des NH_3 verbleibende, aus $CaCO_3$ u. Kohle bestehende Rückstand kann als Rohstoff zur Carbidherstellung dienen. (E. P. **223919** vom 22/10. 1924, Auszug veröff. 24/12. 1924. 23/10. 1923.) KÜHLING.

Albert Du Bois, Peseux, Schweiz, *Gewinnung von Ammoniak aus Schmelzrückständen des Rhodanammoniums* wie Melam, Melem, Mellon, dad. gek., daß diese Rückstände mit Wasserdampf bei erhöhter Temp. behandelt werden. — Die Überführung des in den Rückständen enthaltenen N_2 in NH_3 ist prakt. vollständig. (D. R. P. **407665** Kl. 12k vom 10/11. 1923, ausg. 19/12. 1924.) KÜHLING.

Arr-Company, New York, *Kautsizieren von Soda.* (D. R. P. **408061** Kl. 121 vom 1. 1923, ausg. 10/1. 1925. — C. 1924. II. 2783.) KAUSCH.

Chemischen-Gesellschaft für Anilin-Fabrikation, Berlin-Treptow (Erfinder: **Heinrich Meimann**, Dessau, Anh. und **Fritz Ackermann**, Wolfen), *Verfahren zur Gewinnung der Nitrate des Kaliums, Bariums und Strontiums*, gemäß D. R. P. 406412, dad. gek., daß man das dort verwendete $Mg(NO_3)_2$ zum Teil durch $MgCl_2$ oder $AlCl_3$ ersetzt. (D. R. P. **408116** Kl. 121 vom 26/6. 1923, ausg. 13/1. 1925. Zus. zu D. R. P. 406412; C. 1925. I. 426.) KAUSCH.

Institut für elektrochemische Industrie G. m. b. H., München (Erfinder: **Heinrich Deutsch**, München), *Verfahren zur Darstellung wasserfreier Chloride aus Salzen.* (D. R. P. **408171** Kl. 12g vom 12/3. 1921, ausg. 12/1. 1925. — C. 1922. 12. 1925. I. 564.) KAUSCH.

VIII. Metallurgie; Metallographie; Metallverarbeitung.

Kurnakow, *Anwendung der physikalisch-chemischen Methoden auf die Erkennung und Ausnutzung der Bodenschätze.* Prakt. Vorschläge in bezug auf russ. Bodenschätze. (Annales de l'institut d'analyse physico-chimique **2**. 473—78. 1924. 1. Sep.) BIKERMAN.

R. T. Haslam und L. E. Carlsmith, *Die Zementierung von Eisen durch Silicium*. Die Zementierung von Fe durch Si hängt ab von der Arbeitstemp., der Dauer der Erhitzung, der Zus. des Si, der Zus. des Metalls u. von der Gasfüllung des Zementierungsgefäßes. Vff. bringen von den experimentell ermittelten Daten graph. Zahlentabellen u. erläutern den Zementierungsverlauf an mkr. Bildern. (Ing. u. Arch. Engin. Chem. **16**. 1110—13. 1924. Cambridge [Mass.].) GRINE

A. Sulfrian, *Über die Darstellung von kohlenstoffarmem Ferrochrom*. (Metallbörse **14**. 2394—95. 2446. 1924.) BEHNE

W. Kuntze, *Spannungsverteilung im Fließkegel*. Vf. bestimmt die Spannungsverteilungskurven im Bruchquerschnitt u. Fließkegel bei *Flußstahlstäben*, welche einer verschiedenen Vorbehandlung unterworfen worden waren. Die Ergebnisse sind in Diagrammen wiedergegeben. (Mitt. Materialprüfungsamt Berlin-Dahle **4**. 1—4. 1924.) BECKER

Richard Thews, *Die Reaktionen im Bleischachtofen*. (Metallbörse **14**. 2441—2494. 1924.) BEHNE

K. Heßner, *Untersuchungen über die Ursachen der Silberverluste bei der oxydierenden Röstung*. Es wird der Einfluß der Temp., Zeit, Korngröße u. Schichtdicke auf die Ag-Verluste beim oxydierenden Rösten Ag-haltiger Erze untersucht. Vf. stellte fest, daß das Ag als Ag_2O flüchtig ist, welches sich aus Ag unter dem Einfluß von Katalysatoren bildet, an den kälteren Stellen durch rasches Abkühlen niedergeschlagen wird u. als Ag_2O erhalten bleibt. Als Sauerstoffüberträger kommen in Betracht Pt, Pd, Jr, Fe, Ni, Co, die Oxyde von Mo, W, Cr, Ur, Mn, Fe, Co, Vd, Cu, Pb, Zn, Cd, Si, Ti, Sn, Zr u. Lanthanoxalat. — Für die Praxis gilt, daß sich, nur dann zu rösten, wenn es unbedingt nötig ist u. bei möglichst niedriger Temp. in möglichst kurzer Zeit. Die Schichtdicke darf nicht zu klein sein u. muß mit steigender Korngröße zunehmen. (Metall u. Erz **21**. 565—81. 1924. Freiberg. Bergakademie.) ENSZ

O. Bauer und W. Heidenhain, *Volumenunbeständigkeit der Aluminium-Legierungen*. (Vgl. S. 765.) Gußstäbe aus Al-Zn-Legierungen, welche 0,75—8% Zn enthalten, verkürzen sich nach längerem Lagern, da die Al_2Zn_3 -Verb. sich unter Volumverminderung in die α - u. γ -Endmischkristalle aufspaltet. Infolgedessen ist Al kein geeigneter Bestandteil für Zn-Spritzgußlegierungen, da sich die Al-haltigen Spritzgußstücke leicht verkrümmen u. verziehen, wenn nicht mindestens 83% Al vorhanden sind. (Mitt. Materialprüfungsamt Berlin-Dahle **42**. 11—12.) BECKER

S. Shemtschushny, S. Pogodin und W. Finkeisen, *Über die Legierungen mit hohem elektrischen Widerstand*. Zusammenfassender Bericht. (Annales de l'institut d'analyse physico-chimique **2**. 405—49. 1924. [Russ.] Sep.) BIKERMAN

S. Shemtschushny und W. Nemilow, *Untersuchungen über den spezifischen Widerstand und den Temperaturkoeffizienten der Legierungen der Manganreihe*. Die Zus. der Manganine durch die Formel $4\% \text{ Ni}, (100 - x)\% \text{ Cu}$ u. $x\% \text{ Mn}$ wiedergegeben, so wächst der spezif. Widerstand (ρ) der Legierung, wenn x wächst ($x = 9,3$ bis $x = 14,4$). Ein 6-stünd. Anlassen bei 180° verringert den ρ u. den Temperaturkoeffizienten (α) des ρ wird zwischen 5 u. 25° Null, zwischen 25 u. 100° sehr gering u. negativ. Ein neues Anlassen bei 600° (48 Stdn.) setzt ρ wieder herab, erhöht aber den α u. ändert sein Vorzeichen. — Statt Mn u. Ni durch Fe zuzusetzen, kann man aus Cu u. Ferromangan ähnliche „Ferromanganine“ herstellen; ihre ρ ist unwesentlich höher als ρ entsprechender Manganine, der α ist ungefähr dieselbe Größe, die thermoelektr. Spannung gegen Cu geringer. Bei einer Legierung von $80,8\% \text{ Cu}, 16,2\% \text{ Mn}, 2,5\% \text{ Fe}, 0,35\% \text{ Si}$ hat bei $20^\circ \rho \cdot 10^6 = 60,28$, bei $25^\circ 60,28$, bei $100^\circ 59,769$; nach dem Anlassen bei $600^\circ 59,203$ (5°), $59,203$ (25°), $59,130$ (100°), nach dem Anlassen bei 600° : $37,52$.

7, 4 (25^o) u. 39,054 (100^o). (Annales de l'institut d'analyse physico-chimique 2. 56-63. 1924. [Russ.] Sep.) BIKERMAN.

3. **Shemtschushny und S. Pogodin**, Über den Temperaturkoeffizienten des elektrischen Widerstandes des Manganins und des Konstantans. (Vgl. vorst. Ref.) Der Temperaturkoeffizient α des Widerstandes (ρ) einer Metallprobe wird einfach aus der Beziehung $\alpha = (\rho_{t_2} - \rho_{t_1}) / \rho_{t_1} (t_2 - t_1)$ ermittelt, ohne die Ausdehnung der Probe zu berücksichtigen. Will man aber den spezif. Widerstand haben, so ist der wahre Temperaturkoeffizient $\alpha_1 = \alpha + [1 + \alpha (t_2 - t_1)] \beta$, wenn β den linearen Ausdehnungskoeffizienten bedeutet. Die Korrektur ist von der Größenordnung des α . In dem experimentellen Teil werden Verss. über die Wrkg. des Anlassens auf ρ u. α der Manganine u. Konstantane geschildert. Die Konstantane erweisen sich viel empfindlicher gegen das Anlassen, als die Manganine. (Annales de l'institut d'analyse physico-chimique 2. 464-72. 1924. [Russ.] Sep.) BIKERMAN.

2. **Schmidt**, Neckarsulm, Abscheiden von Metallen. Gemische von Metallen u. Metalloxyden werden unter Anwendung solchen Drucks vermahlen, daß nur die Metalle aber nicht die Metalle gepulvert werden. Das Oxydpulver wird dann durch Zentrifugation entfernt. (E. P. 223969 vom 26/7. 1923, ausg. 27/11. 1924.) KÜHL.

Alexander Nathansohn und Felix Leyser, Oker a. Harz, Laugung gerösteter Erze. In altger. Erze und Steine mit Chloridlsgg., dad. gek., daß man die Laugung mit Chloridlsgg. in einer Konz. von über 200 g Cl₂ je l unter Zusatz von Säure u. Erhitzen auf über 60° derart vornimmt, daß das Fe₂O₃ des Röstgutes als Chlorid in Lösung geht u. dabei gleichzeitig das als Ferrit im Röstgut enthaltene Zn aufgeschlossen wird. — Als Ausgangsstoffe für die hochkonz. Chloridlsgg. kommen nur CaCl₂ u. HCl in Frage. (D. R. P. 407638 Kl. 40a vom 29/7. 1922, ausg. 20/12. 1924.) KÜH.

Compagnie Générale des Produits Chimiques de Louvres, Louvres, Frankreich, Rösten von Schwefelerzen. Das Rösten der Erze, Pyrit, Zinkblende, Grauwacken u. dgl. erfolgt in hohen Öfen, in deren Mitte sich eine senkrecht angeordnete Säule befindet. Das zerkleinerte Erz u. ein gegebenenfalls erhitzter Luftstrom werden im oberen Teil des Ofens, z. B. von der Seite her, so zugeführt, daß die Erzteilchen während des Röstens um die Säule herumgewirbelt werden. Die Gase werden in einer dem Ofen benachbarten Kammer mit versetzten Querströmen vom Erzstaub befreit. (E. P. 224235 vom 29/10. 1924, Auszug veröff. 1/1. 1924. Prior. 30/10. 1923.) KÜHLING.

Georges Constant und André Bruzac, Frankreich, Reduktion oxydischer Erze. Bei Verf. gemäß dem Hauptpatent werden Generatoren verwendet, in denen die Erze geschmolzen wird. Die Zuleitungsrohre für vorgewärmte Verbrennungsluft u. die vom Reduktionsraum zurückgeführten Gase werden in einem solchen Abstrich voneinander angeordnet, daß die zwischen ihren Mündungen liegende Koks- oder Kohlen zur Red. des in den zurückgeführten Gasen enthaltenen CO₂ zu CO ausgenutzt wird. Zur Einleitung der Red. kann statt Generatorgas reines CO verwendet werden, das aus einem Gasometer zugeführt wird. — Bei einer anderen Ausführungsform wird ohne Generatorgas gearbeitet, der Brennstoff in mehrere geschlossene Gefäße gebracht, in denen er mittels hochoerhitzter indifferenten z. B. Wasserdampf- oder Kohlenoxydgase auf die für die Rk. CO₂ + C = 2CO erforderliche Temp. erhitzt wird, wobei die Erhitzung in einem der Gefäße stattfindet, während in den anderen das CO₂ enthaltende Gas reduziert wird. (F. PP. 27770 vom 27/1. 1923 u. 27771 vom 21/2. 1923, ausg. 18/8. 1924. Zus. zu F. P. 566445; C. 1924. I. 2904.) KÜ.

Metallbolaget Ferrolegeringar, Schweden, Metalle und Legierungen. Metall- oder Erze enthaltende Erze oder Schlacken werden, gegebenenfalls auf einem Bade mit Fe geschmolzen u. mit reinem Si oder einer siliciumreichen, zweckmäßig VII. 1.

mehr als 40% Si enthaltenden Legierung u. einem Flußmittel behandelt. Mengenverhältnisse werden dabei so gewählt, daß das vorhandene Metalloxyd ausreicht, um das gesamte Si zu oxydieren. Es entsteht eine an Metalloxyd arme Schlacke u. eine prakt. kohlenstofffreie Metallsiliciumlegierung. Letztere wird mit einem Überschuß an metalloxydhaltigem Rohstoff verschmolzen, wobei ein metalloxydreiche Schlacke entsteht, welche in den Vorgang zurückgeleitet werden kann, u. ein kohlenstoff- u. siliciumarmes Metall. Das Verf. kann z. B. zur Herstellung von *Ferrochrom* oder *Ferromangan* aus Chromeisenstein bzw. oxyd. Eisenmangelerzen dienen. (F. P. 575642 vom 10/1. 1924, ausg. 2/8. 1924. Schwed. Pat. 11/1. 1923.) KÜHLING

Electrolytic Iron, Inc., Dover, V. St. A., übert. von: **Auguste Bouchay**, Grenoble, *Elektrolyteisen*. Eine wss. Lsg. eines oder mehrerer Eisenoxydulsalze wird solange mit einem Luftstrom behandelt, bis sie eine glänzend braune Färbung angenommen hat u. nicht mehr schäumt. Sie wird dann mit unl. Anoden elektrolysiert, während der Elektrolyse mit großer Geschwindigkeit um die Anode herumgeführt u. es wird die Kathode während der Elektrolyse gedreht. Temp. des Elektrolyten u. Geschwindigkeit der Drehung der Kathode steigen mit der Stromstärke. Bei einer Stromdichte von 800—1000 A. je qm soll die Temp. des Elektrolyten etwa 75—77°, die Geschwindigkeit der Drehung etwa 120 m je Min. betragen. Es werden dichte, glatte u. gleichmäßige Erzeugnisse erhalten. (A. P. 1516326 vom 12/10. 1921, ausg. 18/11. 1924.) KÜHLING

Franz Juretzka, Breslau, u. Elektrothermische Metallgesellschaft m. b. H., Charlottenburg, *Kondensation elektrothermisch erzeugten Zinks*, 1. dad. gek., daß die Vorkondensation in einem Erzfilter stattfindet, welches in einem Maletra-, Kessel- oder ähnlichem Ofen untergebracht ist, wobei das Erz zweckmäßig von gleicher Beschaffenheit ist wie die Beschickung. — 2. dad. gek., daß das Filter beim Ein- u. Austragen u. gegebenenfalls auch während des Betriebes aufgelockert wird. Die Beschickung wird vorgewärmt, u. vorgetrocknet u. es werden die schädlichen Gase entfernt, so daß die Behandlung während der Hauptkondensation auf ein Mindestmaß beschränkt ist. (D. R. P. 407799 Kl. 40c vom 30/12. 1922, ausg. 24/12. 1924.) KÜHLING

Philip W. Davis, Cambridge, V. St. A., *Reinigen von Zinn*. Fe enthaltendes Sn wird geschmolzen u. die Schmelze solange mit einem Strom von O₂ oder Luft behandelt, bis das Fe ganz oder größtenteils oxydiert ist. (A. P. 1514443 vom 4/1. 1922, ausg. 4/11. 1924.) KÜHLING

Siemens & Halske, A.-G., Berlin, übert. von: **Hans Gerdien, Berlin-Grünwald,** *Schmelzen von Leichtmetallen, besonders Aluminium*. Das Schmelzen erfolgt innerhalb eines U-förmigen, in der Mitte erweiterten Gefäßes aus feuerfestem Stoff z. B. Al₂O₃, dessen hohle Wände mit MgO o. dgl. gefüllt sind. Das zu schmelzende Metall wird von der Mündung des einen Schenkels aus eingefüllt u. an der Mündung des höher erhitzten zweiten Schenkels in dünnfl. Zustand abgezogen, z. B. mittels eines pipettenartigen vorerhitzten Gefäßes, in welches das fl. Metall eingesaugt am Ausfließen durch einen Kugelschluß aus Korund gehindert wird. Zweck der Vermeidung von Oxydation wird die Entnahmemündung unter der Atm. eines mit einem anderen Gas gehalten. Schwerere Verunreinigungen, wie Nitride oder Oxyde, setzen sich in dem erweiterten Teil des U-Rohres ab. (A. P. 1514151 vom 5/2. 1922, ausg. 4/11. 1924.) KÜHLING

G. D. Bengough und J. M. Stuart, London, *Überzüge auf Aluminium und Aluminiumlegierungen*. Die zu überziehenden Gegenstände werden nach sorgfältigem Entfetten u. Waschen als Anode in einer wss. Lsg. verwendet, welche CrO₃ oder anod. CrO₃ bildende Stoffe enthält, z. B. einer 3%ig., keine H₂SO₄ oder Sulfate enthaltenden Lsg. von CrO₃. Als Kathode kann Kohle dienen. Elektro-

wird bei 40°, die Spannung wird allmählich auf 40 V. gesteigert, einige Zeit auf dieser Höhe erhalten u. dann auf 50 V. erhöht. Das Metall wird dann gewaschen, getrocknet u. mit gel. oder emulgiertem Lanolin oder einem Öl behandelt und gefärbt. Zwecks Färbung wird es möglichst bald nach beendeter Elektrolyse in eine wss. Farbstofflsg., z. B. eine Lsg. von Anthracenblau, Anthrachinonblau oder Alizarin getaucht. (E. PP. 223994 u. 223995 vom 2/8. 1923, ausg. 27/11. 1924.)

KÜHLING.

Dow Chemical Company, Midland, übert. von: **William R. Veazey**, Cleveland, V. St. A., *Legierung*. Eine Halogenverb. des Be, vorzugsweise $\text{BeF}_2 \cdot 2\text{NaF}$ in geschmolzenes, mit NaCl bedecktes Mg oder es wird metall. Mg in geschmolzenes $\text{BeF}_2 \cdot 2\text{NaF}$ eingetragen. Das Mg reduziert die Berylliumverb. zu metall. Be, welches sich mit überschüssigem Mg legiert. Die Legierung überzieht im Gegensatz zu berylliumfreiem Mg leicht Fe. Das Überziehen des letzteren kann mit der Herst. der Legierung verbunden werden. (A. P. 1515082 vom 8/5. 1922, ausg. 11/11. 1924.)

KÜHLING.

Phile Exploration Company, übert. von: **Colin G. Fink**, New York, *Legierungen*, bestehend aus Co u. Si bzw. Co, Si u. Mn oder Cr oder einem anderen Metall der Chromgruppe bzw. Co, Si, Mn u. Cr oder einem anderen Metall der Chromgruppe u. gegebenenfalls geringen Mengen C. Die Legierungen sind säurebeständig. Besonders günstige Eigenschaften besitzen Legierungen, welche neben Co 11–13% Si, 4–6% Cr, 4–6% Mn u. 0,8–1,2% C enthalten. (A. P. 1513806 vom 26/1. 1921, ausg. 4/11. 1924.)

KÜHLING.

Chemists Supply Company, New York, übert. von: **Charles Dietz**, York, V. St. A., *Legierungen*, bestehend aus Pt, Au u. Pd, wobei die Menge des Pt erheblich größer ist als die Summe des Au u. Pd u. diese nicht mehr als 30% der Gesamtlegierung betragen darf. Der Gehalt an Au soll zwischen 7% u. 20%, der an Pt zwischen 7% u. 10% schwanken. Besonders günstige, denen einer Legierung mit 35% Pt u. 15% Ir gleichwertige Eigenschaften besitzt eine Mischung von 5% Pt, 8% Pd u. 7,5% Au. Alle derartigen Legierungen zeichnen sich durch große Härte u. Duktilität aus. (A. P. 1515464 vom 14/12. 1920, ausg. 11/11. 1924.)

KÜHLING.

Carlmann, Adhémar & Moillic, Frankreich, *Legierung*, bestehend aus etwa 3% Al, 3,4% Cu, 1% Ni, 1,78% Zn u. 0,5% Mg. Zur Herst. bereitet man zunächst eine Legierung von 54,5% Cu, 16,5% Ni u. 29% Zn, desoxydiert diese und fügt nach dem Zusatz von 2% BaO, gibt von dieser M. 6,5 kg in geschmolzenem Zustand zu geschmolzenem Al u. fügt 0,5 kg Mg u. 2 kg getrocknetes NaOH hinzu. Die Schmelze wird bei etwa 700° gegossen u. das Erzeugnis durch längeres Erhitzen auf 530° u. rasches Abschrecken gehärtet. Die Legierung zeichnet sich durch Leichtigkeit u. Festigkeit aus. (F. P. 576225 vom 23/1. 1924, ausg. 13/8. 1924.)

KÜHLING.

Wessler & Hasslacher Chemical Co., New York, übert. von: **Christian Wernlund**, Tottenville, V. St. A., *Verzinken von Eisen*. Das elektrol. Verfahren von Fe wird ausgeführt unter Verwendung einer sauren Lsg. von ZnCl_2 in H_2SO_4 als Elektrolyt u. einer aus mit einer kleinen Menge ($\frac{1}{4}$ –1%) Hg verunreinigt legiertem Zn hergestellten Anode. Die Elektrolyse verläuft ohne B. einiger Erzeugnisse auf der Anode, welche auch den Elektrolyten verunreinigen, und überzüge auf dem als Kathode geschalteten Fe haften besser als bei Verwendung weichesilberfreier Anoden, weil die zunächst niedergeschlagene hauchdünne Schicht von Hg die Entw. von H_2 verringert u. die Überzüge sind wetterbeständiger als die in bekannter Weise hergestellten. (A. P. 1515712 vom 5/1. 1924, ausg. 18/11. 1924.)

KÜHLING.

Gerard Albert Muntz, Stratford-on-Avon, Warwickshire, Engl., *Verfahren, Gegenstände aus Kupfer oder dessen Legierungen vor Oxydation und Korrosion zu schützen*. Man überzieht die Gegenstände oder deren zu schützenden Teile einer Al-Schicht u. erhitzt sie dann, wodurch der Überzug in Kupferaluminiumoxyd umgewandelt wird. (E. P. 200944 vom 29/4. 1922, ausg. 16/8. 1923.) OELK

IX. Organische Präparate.

Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning, Höchst a. M., *Herstellung Äthylchlorid*. Man läßt HCl, SO₂ u. Äthylen oder dieses enthaltende Gasgemisch in Ggw. oder Abwesenheit von Katalysatoren, mit oder ohne Anwendung von Druck, bei gewöhnlicher oder erhöhter Temp., aufeinander einwirken. — Die Umsetzung erfolgt über das Chlorid der äthylschwefligen Säure, C₂H₅O·SO·Cl, welches sich bei niedrigeren Reaktionstemp. abscheiden läßt, während es bei höheren Temp. in C₂H₅Cl u. SO₂ zers. wird. Als Katalysatoren eignen sich akt. Kohle, Bauxit, Kiesabbrände oder Terracottasteine. Das Verf. ermöglicht die leichte glatte Abscheidung C₂H₄ des aus Gasgemischen unter Gewinnung von techn. wertvollen Umsetzungsprodd. Beispiele sind angegeben für die Herst. des Chlorids der äthylschwefligen Säure aus C₂H₄, HCl u. SO₂ durch Überleiten über akt. Kohle bei 100° u. nachfolgende Kondensation in der Kälte, — sowie von Äthylchlorid aus diesen Komponenten bei 170°, — bzw. durch Stehenlassen gleicher Voll. der Gase in einem Gasometer während einiger Tage, — bzw. durch Erhitzen von C₂H₄, HCl u. SO₂ ohne Katalysator unter 30 at Druck auf 150°. (E. P. 216368 vom 21/12. 1923, ausg. 19/6. 1924. F. P. 566041 vom 11/5. 1923, ausg. 8/2. 1924. D. Prior. 3/6. 1922. Schwz. P. 104789 vom 15/5. 1923, ausg. 16/6. 1924. D. Prior. 1922.) SCHOTTLÄNDER

Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning, Höchst a. M., *Verfahren zur Überführung von halogensubstituierten Kohlenwasserstoffen in Kohlenwasserstoffe oder Halogenkohlenwasserstoffe mit einer höheren Anzahl von Kohlenstoffatomen*. Man leitet Halogensubstitutionsprodd. von KW-stoffen oder deren Gemische in Ggw. von W. u. bei 400° nicht übersteigenden Temp. über katalyt. wirkende Metalle oder Metalloide oder deren Verb., die auf indifferenten porösen Trägern niedergeschlagen sind. — Als poröser Träger eignet sich besonders hochakt. Kohle, als Katalysator Pt, Holzkohle, ThO₂, ZrCl₄, Bi₂O₃, SnCl₄, ZnCl₂. Die Rk. erfolgt unter Abspaltung von Halogenwasserstoff. Folgende Beispiele sind angegeben: Spurenhaltiges W. enthaltendes Methylchlorid werden bei 275° durch ein mit platinisiertem Asbest beschicktes Rohr geleitet, wobei es zum Teil in Äthylchlorid u. HCl umgewandelt wird. Die austretenden Gase werden durch Auswaschen mit W. von der HCl befreit u. CH₃Cl u. C₂H₅Cl entweder durch Absorption mit hochakt. Kohle oder durch fraktionierte Dest. getrennt. Das CH₃Cl wird erneut dem Verf. zugeführt. — Bei Verwendung von mit BiCl₃ oder ZrCl₄ imprägnierter hochakt. Kohle als Katalysator u. bei 200° wird die Ausbeute an C₂H₅Cl wesentlich erhöht. — Leitet man ein feuchtes Gemisch von Methylchlorid u. Methylenchlorid (letztere im Überschuß) über mit BiCl₃ getränkte akt. Kohle bei 280°, so entsteht, neben den unveränderten Ausgangsstoffen u. etwas Methylal, hauptsächlich Äthylidenchlorid, das durch Abkühlung auf tiefe Temp. abgeschieden u. durch fraktionierte Dest. von CH₂Cl₂ getrennt werden kann. — Beim Überleiten von feuchtem Methylchlorid über akt. Kohle niedergeschlagenem Bi₂O₃ bei 240° entsteht Äthylen, das vom unveränderten CH₃Cl durch Absorption mit hochakt. Kohle getrennt wird. (P. 196272 vom 5/4. 1924, ausg. 6/6. 1923. D. Prior. 15/4. 1922. F. P. 564641 vom 3/4. 1923, ausg. 7/1. 1924. D. Prior. 15/4. 1922. Schwz. P. 104565 vom 1/4. 1923, ausg. 1/5. 1924. D. Prior. 15/4. 1922.) SCHOTTLÄNDER

Giuseppe Bruni, Mailand, Italien, *Darstellung organischer Dithiosäuren* der

gemeinen Formel: $R \cdot CS \cdot SH$ (wobei R ein einwertiges organ. Radikal bedeutet),
 ein bestehend, daß man auf die entsprechenden *Aldehyde Ammoniumpolysulfid* ein-
 wirken läßt (hierzu vgl. auch BRUNI u. LEVI, Atti R. Accad. dei Lincei, Roma [5]
 S. I. 5; C. 1923. III. 1642 u. Gazz. chim. ital. 54. 389; C. 1924. II. 1077).
 (R. P. 403123 Kl. 12o vom 22/12. 1922, ausg. 25/9. 1924. It. Prior. 22/11.
 1924.)

SCHOTTLÄNDER.

Canadian Elektro Products Company, Limited, Montreal, Quebec, Canada,
 vert. von: **Hugh Simpson Reid** und **Waldo Clyde Hovey**, Shawinigan Falls,
 Quebec, Canada, *Herstellung von Acetaldehyd aus Acetylen*. Man leitet durch wss.
 ISO_4 in einer Konz. von 3—40% in Ggw. eines Hg-Katalysators bei einer unter-
 b des Kp. der sauren Fl. liegenden Temp. C_2H_2 in einer Menge, die mindestens
 30% höher ist, als die sich mit dem W. theoret. verbindende. — Es wird hier-
 durch erreicht, daß der Katalysator dauernd in der Reaktionsflüssigkeit in Suspension
 gehalten wird, während des Durchleitens des C_2H_2 , u. daß die Ausbeute an *Acet-*
aldehyd der theor. möglichen nahezu gleichkommt. Ein Beispiel für die Herst.
 d. *Acetaldehyds* unter Verwendung einer 20% ig. wss. H_2SO_4 u. Hg_2SO_4 als
 Katalysator, bei 50—85°, ist angegeben. Die Weiterverarbeitung des Reaktionsprod.
 u. Regenerierung des Katalysators ist die übliche. (E. P. 208689 vom 15/8. 1923,
 a. g. 13/2. 1924. A. Prior. 21/12. 1922.)

SCHOTTLÄNDER.

Hélène Billon, Paris, *Herstellung von N-Dialkylaminoketonen*. Man läßt *Tri-*
methylenchlorobromid auf die mit Hilfe von $Na \cdot NH_2$ aus *aliph.* Ketonen erhaltlichen
 N-Verbb. einwirken u. behandelt die entstandenen *Chlorketone* $R \cdot CO \cdot R^1 \cdot CH_2 \cdot CH_2 \cdot$
 $C_2 \cdot Cl$ mit *Dialkylaminen*. — Z. B. wird *i*-Butylketon $(CH_3)_3 \cdot CH \cdot CO \cdot CH(CH_3)_2$ mit
 NNH_2 in äth. Lsg. in die Na-Verb. übergeführt u. zu der k. Lsg. $Br \cdot CH_2 \cdot CH_2 \cdot CH_2 \cdot Cl$
 gegeben, wobei sich sofort NaBr ausscheidet. Zur Vervollständigung der Rk. wird
 u. h. 5—6 Stdn. erhitzt, die äth. Lsg. mit W. zers., die äth. Schicht abgehoben,
 graschen u. getrocknet. Durch fraktionierte Dest. erhält man das *Chlorketon*
 $(CH_3)_3 \cdot CH \cdot CO \cdot C(CH_3)_2 \cdot CH_2 \cdot CH_2 \cdot CH_2 \cdot Cl$, farblose Fl., Kp.₂₀ 120—122°. Aus diesem
 leitet sich durch Umsetzung mit *Dimethylamin* bezw. *Diäthylamin* die beiden
N-Dialkylaminoketone $(CH_3)_3 \cdot CH \cdot CO \cdot C(CH_3)_2 \cdot CH_2 \cdot CH_2 \cdot CH_2 \cdot N(CH_3)_2$, Kp.₂₂ 120 bis
 112°, u. $(CH_3)_3 \cdot CH \cdot CO \cdot C(CH_3)_2 \cdot CH_2 \cdot CH_2 \cdot CH_2 \cdot N(C_2H_5)_2$, Kp.₂₀ 125—128°, gewinnen.
 Analog gibt die Na-Verb. des *Dimethylpinacolins* mit *Trimethylenchlorobromid* in
 absol. Lsg. das *Chlorketon* $(CH_3)_3 \cdot C \cdot CO \cdot C(CH_3)_2 \cdot CH_2 \cdot CH_2 \cdot CH_2 \cdot Cl$, farblose Fl.,
 Kp.₁₂ 110—112°, u. dieses mit *Dimethylamin* das *N-Dimethylaminoketon* $(CH_3)_3 \cdot C \cdot$
 $CO \cdot C(CH_3)_2 \cdot CH_2 \cdot CH_2 \cdot CH_2 \cdot N(CH_3)_2$, Kp.₂₀ 136—138°. — Aus dem *Tetramethyldiäthyl-*
keton $(CH_3)_2(C_2H_5) \cdot C \cdot CO \cdot C(CH_3)_2(C_2H_5)$ erhält man das *Chlorketon* $(C_2H_5) \cdot (CH_3)_2 \cdot C \cdot$
 $CO \cdot C(CH_3)_2 \cdot CH_2 \cdot CH_2 \cdot CH_2 \cdot Cl$, Kp.₁₆ 124°, u. aus diesem beim Erhitzen mit *Dimethyl-*
amin unter Druck auf 200° das *Dimethylaminoketon* $(C_2H_5) \cdot (CH_3)_2 \cdot C \cdot CO \cdot C(CH_3)_2 \cdot$
 $CH_2 \cdot CH_2 \cdot N(CH_3)_2$, Kp.₂₀ 138—140°. Die N-dialkylierten Ketone sind farblose
 u. von starkem Geruch, aus der Luft CO_2 anziehend u. mit HCl in Ä. unl. stark
 mikroskop. Chlorhydrate liefernd. (F. P. 563766 vom 24/6. 1922, ausg. 13/12.
 1923.)

SCHOTTLÄNDER.

Consortium für elektrochemische Industrie G. m. b. H. (Erfinder: **Rudolf**
Mugast und **Martin Mugdan**), München, *Darstellung von Acetylperoxyden*, 1. dad.
 ge, daß *Acetaldehyd* bei Abwesenheit schädlicher Verunreinigungen in Ggw. von
 Aldehyden, vorzugsweise *Essigsäureanhydrid*, mit O_2 oder O_2 -haltigen Gasen bei
 r 40° nicht übersteigenden Temp. oxydiert wird. — 2. dad. gek., daß der Aldehyd
 n nach Maßgabe seines Verbrauches zugegeben wird u. dadurch während des
 zesses eine niedrige Aldehyd-Konz. aufrecht erhalten wird. — 3. dad. gek., daß
 Katalysatoren angewandt werden, die die O_2 -Absorption beschleunigen. — 4. dad.
 ge, daß zur Beschleunigung der Umsetzung zwischen der prim. gebildeten Per-
 äe mit dem Anhydrid tert. Basen, z. B. Pyridin, als Katalysatoren angewandt

werden. — Man versetzt z. B. reines Essigsäureanhydrid mit in wenig CH_3CO gel. Co-Acetet u. etwas reinem CH_3CHO u. leitet unter andauerndem Kühlen um 10° reinen O_2 ein. Bei Verringerung der O_2 -Aufnahme gibt man neue Mengen CH_3CHO zu u. stellt zeitweise durch Zugabe von KJ zu herausgenommenen Proben die Menge der anwesenden *Peressigsäure* fest, die durch sofortige Ausscheidung von J erkennbar ist (bei Acetylperoxyd tritt diese erst durch Erhitzen der mit W. verd. von Lsg. mit etwas H_2SO_4 ein). Gegebenenfalls verlangsamt man die Zugabe von CH_3CHO . Nach Zusatz von insgesamt 1 Mol. Aldehyd pro 1 Mol. Anhydrid aufhören der O_2 -Aufnahme liegt als Reaktionsprod. eine annähernd äquimolekulare Mischung von *Acetylperoxyd* u. *Essigsäure* vor. — Ein weiteres Beispiel betrifft die Herst. desselben Reaktionsprod. unter Verwendung von Ni-Acetat u. Pyridin als Katalysatoren. — Die Oxydation läßt sich durch Bestrahlung beschleunigen. Aus der erhaltenen Fl. läßt sich das *Acetylperoxyd* durch Ausschütteln, Ausfrieren oder durch Dest. im Vakuum oder mittels eines indifferenten Gasstromes abscheiden. Durch Kochen mit W. unter Zusatz von etwas Säure geht das Peroxyd in Persäure u. schließlich in H_2O_2 u. $\text{CH}_3\text{CO}_2\text{H}$ über. Das Acetylperoxyd kann zu *Bleichmitteln* als *Sprengmittel*, sowie zur Herst. anderer Verbb. dienen. Verwendet man an Stelle von Essigsäureanhydrid äquivalente Mengen *Buttersäure-* oder *Propionsäureanhydrid* so verläuft die Rk. analog unter B. der entsprechenden *gemischten Peroxyd* (D. R. P. 403052 Kl. 12o vom 13/12. 1921. ausg. 19/9. 1924.) SCHOTTLÄNDER

Badische Anilin- & Soda-Fabrik, Deutschland, *Blausäure*. Formamidsäure, Ammoniumformiat, Gemische von beiden u. gegebenenfalls Ameisensäure oder letztere allein werden in feiner Verteilung mittels eines Stromes von NH_3 oder NH_3 enthaltenden Gasen bei $200\text{--}400^\circ$ über Katalysatoren, vorzugsweise Kupfer, hydrierende, geleitet. Bei Verwendung von Formamid oder Ammoniumformiat können auch ammoniakfreie Gase verwendet werden. Die Gase werden mit einem Kp. des Formamids, Ammoniumformiats usw. übersteigenden Temp. über die geleitet, wobei Verflüchtigung u. innige Mischung eintritt. (F. P. 576392 vom 28/1. 1924, ausg. 20/8. 1924. D. Priorr. 1/3., 3/4. u. 19/10. 1923.) KÜHLING

Hermann Staudinger, Zürich, Schweiz, *Darstellung von ungesättigten Derivaten des Cyanamids*, dad. gek., daß man ungesätt. aliph. oder aromat.-aliph. Halogenide mit Salzen des $\text{CN}\cdot\text{NH}_2$ bei Ggw. von W. in der Kälte oder unter Erwärmen eine Rk. bringt. — Z. B. wird eine Lsg. von *Na-Cyanamid* in W. mit *Allylbromid* 48 Stdn. geschüttelt oder turbiniert unter anfänglicher Kühlung. Die ölige schwimmende Schicht wird abgehoben u. bildet das *Diallylcyanamid*, farblose Fl. Kp.₉ 95° . Bei Verwendung von *Allylchlorid* muß auf 40° erwärmt werden. — Analog wird aus *Na-Cyanamid* u. *Dimethylallylbromid* das *Tetramethyldiallylcyanamid*, farblose Fl. Kp.₁₃ $141,5\text{--}142^\circ$ — u. aus *Styrylbromid* das *Distyrylcyanamid*, Krystalle, F. 82° erhalten. Die Prodd. dienen als Ausgangsstoffe für die Herst. von *Heilmitteln*. (D. R. P. 404174 Kl. 12o vom 16/4. 1922, ausg. 14/10. 1924.) SCHWZ. P. 104101 vom 9/4. 1923, ausg. 1/5. 1924.) SCHOTTLÄNDER

Nobel Industries Limited, London, übert. von: **E. J. du Pont de Nemours & Company**, Wilmington, Delaware, V. St. A., *Tetrasubstituierte Harnstoffe*. Man läßt COCl_2 auf in geeigneten organ. Lösungsm., wie Bzl., Toluol, Xylol, Solventnaphtha oder CCl_4 , gel., sek. Alkylarylamine in Ggw. von tert. Aminen als fl. bindendem Mittel einwirken. — Zweckmäßig verwendet man hierbei das bei der Methylierung von Anilin entstehende Gemisch von sek. u. tert. Base u. erreicht gleichzeitig in einfacher u. glatter Weise eine *Trennung* dieser Amine. Z. B. wird ein Gemisch aus 100 Teilen *Monomethylanilin* u. 112 Teilen *Dimethylanilin* in Bzl. gel., auf 60° erwärmt u. COCl_2 bis zur Beendigung der HCl-Entw. in die Lsg. eingeleitet. Nach Abdestillieren des Bzl. wird der Rückstand zur völligen Entfernung des *Dimethylanilins* mit verd. HCl behandelt. Der in der verd. Säure lösliche

Dimethyldiphenylharnstoff wird abfiltriert, mit W. säurefrei gewaschen u. aus dem geeigneten Lösungsm. umkristallisiert. (Hierzu vgl. auch E. J. DU PONT DE NEMOURS & Co., TANBERG u. WINKEL, A. P. 1477087; S. 898.) (E. P. 211245 vom 11. 11. 1922, ausg. 13/3. 1924.)

SCHOTTLÄNDER.

Chemische Fabrik Flora, Dübendorf (Zürich, Schweiz), *Darstellung von β,3,4-Oxyphenyläthylamin*, dad. gek., daß man β,*p*-Oxyphenyläthylamin (Tyramin) nitriert, entstandene Nitrotyramin reduziert, das so erhaltene Aminotyramin diazotiert mit Hilfe einer konz. sd. CuSO₄-Lsg. verkocht. — Durch die Einführung einer zweiten OH-Gruppe in das einwertige *p*-Oxyphenyläthylamin gelangt man zu einer für die Erzielung einer adrenalinähnlichen Wrkg. unerläßliche Brenzcatechin-ppierung enthaltenden Verb. β-3,4-Dioxyphenyläthylamin kurze, farblose, an der Luft sich rasch grau u. schwarz färbende Prismen. MILLONS Reagens erzeugt starke Rotfärbung, FeCl₃ tiefe Grünfärbung; ammoniakal. Ag-Lsg. wird schon in der Kälte, Fehlingsche Lsg. in der Hitze reduziert. (Schwz. P. 100805 vom 13/11. 1922, ausg. 17/12. 1923.)

SCHOTTLÄNDER.

Chemische Fabrik Flora, Dübendorf (Schweiz), *Herstellung von p-Oxyamylphenylmethylamin*, dad. gek., daß man das Kondensationsprod. aus Leucinäthylester u. Anisaldehyd mit Na-Amalgam reduziert, völlig verseift, mit Mineralsäure die *p*-Methoxybenzyl-α-aminobutylessigsäure ausfällt, diese durch Erhitzen in das *p*-Methoxyamylphenylmethylamin überführt u. aus letzterem die CH₃-Gruppe durch Kochen in HBr abspaltet. — Z. B. wird das Kondensationsprod. aus Leucinäthylester u. Anisaldehyd in alkoh. Lsg. mit Na-Amalgam reduziert, hierauf nach 1/2 Stde. auf 100° erhitzt u. genau mit Mineralsäure neutralisiert. Die *p*-Methoxybenzyl-α-aminobutylessigsäure von der Zus. C₆H₄(O·CH₃)⁴·(CH₂·NH·CH[CO₂H]·CH₂·CH[CH₃])¹ gibt Erbk. auf ca. 200° erhitzt das *p*-Methoxyamylphenylmethylamin. Durch 3std. Erhitzen mit konz. HBr wird die CH₃-Gruppe aus dem Methoxylrest abgespalten. Bei Erkalten erstarrt die Lsg. zu einem Krystallbrei, der abfiltriert u. aus W. umkristallisiert wird. Das Bromhydrat des *p*-Oxyamylphenylmethylamins, F. 152°, lösl. in W. gel. u. mit NH₃ versetzt, wobei die freie Base von der Zus. C₆H₄(OH)⁴·C₁₀H₁₇NH₂¹ ausfällt; aus Bzl.-Essigester, Blättchen, F. 73—74°, unl. in W., sl. in A. u. Essigester. Das Prod. findet therapeut. Verwendung. (Schwz. P. 100877 vom 24/3. 1923, ausg. 1/5. 1924.)

SCHOTTLÄNDER.

Chemische Fabrik Flora, Dübendorf b. Zürich, Schweiz, *Dihalogensubstitutionsprodukte des p-Oxyphenyläthylamins*. Man behandelt in Eg. gel. *p*-Oxyphenyläthylamin mit in Eg. gel. Br, bezw. leitet Cl₂ in die Lsg. der Base bis zur Sättigung. — Es wird so das 3,5-Dibrom-4-oxyphenyläthylamin, aus W. oder A. flache Stäbchen, wl. in W. u. A., F. 210°; Hydrobromid, aus h. CH₃OH 6teilige Prismen, F. 270°, — bezw. das 3,5-Dichlor-4-oxyphenyläthylamin, sechsseitige Täfelchen, F. 219—222°, erhalten. Die Prodd. finden therapeut. Verwendung. (Schwz. PP. 100876 u. 100877 vom 5/4. 1922, ausg. 1/5. 1923. Zuss. zu Schwz. P. 95300; C. 1923. IV. 663.)

SCHOTTLÄNDER.

Rheinische Kampferfabrik G. m. b. H. (Erfinder: Karl Schöllkopf), Düsseldorf-Oberkassel, *Herstellung aromatischer Sulfosäuren* durch Enthalogenisierung aus halogenierten Sulfosäuren, dad. gek., daß man diese, z. B. 2-Halogen-*p*-cymolsulfosäuren, in alkal. wss. Lsg. bei Ggw. von Katalysatoren mit H₂, ohne oder mit Druck, bei 20—300° behandelt. — Als Katalysatoren eignen sich Ni, Co, Cu, Fe, Pd, die in kolloidaler Form auf indifferenten Stoffen, wie Kieselgur oder CaCO₃, ausgeschieden sein können. Es lassen sich ein oder mehrere Halogenatome gegen H austauschen. Die Rk. wird durch die gleichzeitige Ggw. anderer Kernt. Subst., wie Alkyl-, OH-, NO₂- u. NH₂-Gruppen, nicht behindert, auch läßt sich auf andere Ringsysteme als das Bzl., wie des Naphthalins oder Anthracens

übertragen. Durch Alkali- u. Erdalkalihydroxyde, sowie -carbonate wird die alk. Rk. der zu reduzierenden Stoffe bewirkt. Beispiele sind angegeben für die Herd. des Na-Salzes der *Benzolsulfosäure* aus *p*-brombenzolsulfosaurem Na in Ggw. ein. Ni-Katalysators bei 100° unter 10 at H₂-Druck; — des Na-Salzes der *1-Methyl-4-isopropylbenzol-3-sulfosäure* aus *2-Chlor-1-methyl-4-isopropylbenzol-3-sulfosäure* NaOH in Ggw. eines Ni-Katalysators bei 180—200° unter 30 at H₂-Druck; — sowie des Na- u. K-Salzes der *1-Methyl-4-isopropylbenzol-3-sulfosäure* aus den entsprechenden Salzen der *2-Brom-1-methyl-4-isopropylbenzol-3-sulfosäure* in Ggw. eines Ni-Katalysators bei 100° unter 10 at H₂-Druck, bezw. unter Durchleiten von H₂ bei gewöhnlichem Druck. (D. R. P. 408182 Kl. 12o vom 24/8. 1922, ausg. 13/1. 1925. E. P. 5694 vom 3/8. 1923, ausg. 17/10. 1923. D. Prior. 23/8. 1922. F. P. 5694 vom 30/7. 1923, ausg. 11/4. 1924. D. Prior. 23/8. 1922.) SCHOTTLÄNDER

Société de Produits Chimiques Industriels et Viticoles und **Ferdinand Levallois**, Frankreich (Seine), *Gewinnung von Tannin in fester Form aus Lösung* Wss., alkoh. oder äth. Rohtanninlsgg. werden konz. u. hierauf stark abgekühlt. Es gelingt auf diese Weise *Tannine* verschiedenartiger Beschaffenheit aus derselben Lsg. fraktioniert abzuscheiden. Z. B. wird eine wss. Tanninlsg. bis auf 10° Bé. konz. u. dann bis zur vollständigen Klärung auf 0° abgekühlt. Man trennt das ausgeschiedene unreine Prod. ab u. erhält eine reine Lsg. von höherem Tannin-gehalt. — Kühlt man nacheinander eine Rohtanninlsg. auf +5°, 0° u. —5° ab, dekantiert oder schleudert die Lsg. jedesmal ab, so werden 3 bzgl. Färbung Titer an wahren Tannin verschiedenartige Prodd. erhalten. (F. P. 548811 vom 13/3. 1922, ausg. 26/1. 1923.) SCHOTTLÄNDER


Chemische Fabrik Flora, Dübendorf (Zürich, Schweiz), *Verfahren zur Hydrierung von Tyrosin*, dad. gek., daß man reines Tyrosin in wss. Suspension oder in verd. salzsaurer Lsg. mit höchst akt., O₂-beladenen Pt-Schwarz in einer H₂-Atmosphäre bei gewöhnlicher Temp. schüttelt. — Man erhält so *Hexahydrotyrosin*, C₉H₁₇O₃N, Krystalle, F. 240°, reagiert in sodaalkal. Lsg. gegen KMnO₄ völlig gesätt., zeigt keine Millonsche Rk. mehr, Tyrosinaserk. ebenfalls negativ; *Pt-Doppelsalz* aus W. hellgelbe Nadelchen, F. 208—209° unter Zers., enthält 3 Mol. H₂O; *Monobenzoylverb.* aus wss. A. Blättchen, in W. swl., F. 188 bis 189°; *Chlorhydrat* aus W. silberglänzende Blättchen, aus A. Nadelchen, F. ca. 210° unter Zers., wird durch Kochen mit frisch gefälltem PbO in freies Hexahydrotyrosin übergeführt. Das aus natürlichem l-Tyrosin gewonnene *l*-Hexahydrotyrosin dreht nach rechts $[\alpha] = +12^\circ$ (aus 9%ig. HCl-Lsg.). Das wesentlich leichter lösliche Tyrosin l. Prod. dient zur Herst. von Arzneimitteln. (Schwz. P. 101401 vom 15/11. 1922, ausg. 17/12. 1928.) SCHOTTLÄNDER

Gesellschaft für Chemische Industrie in Basel, übert. von: **Fritz Sträub**, Basel, und **Hermann Schneider**, Riehen b. Basel, Basel (Schweiz), *Herstellung von 1-Oxynaphthalin-8-sulfamid*. Kurzes Ref. nach E. P. 207162; C. 1924. I. 117. Nachzutragen ist folgendes: Das durch Einw. von konz. NH₃ oder wss. (NH₄)₂O₈ auf 1,8-Naphtholsulton bei 15° oder mäßig erhöhter Temp. erhaltliche 1-Oxynaphthalin-8-sulfamid wird aus dem Reaktionsgemisch auf Grund seiner Unlöslichkeit in verd. NH₃, Alkalicarbonaten, W. u. verd. Säuren abgeschieden. Es bildet ein farbloses, in verd. NaOH u. konz. wss. NH₃ ll. Pulver, zwl. in Aceton, A. u. CH₃OH, aus letzterem umgel. schm. es bei raschem Erhitzen bei ca. 222° unter Zers. (A. P. 1503172 vom 18/10. 1923, ausg. 29/7. 1924. D. B. P. 407003 Kl. 12o vom 16/10. 1923, ausg. 3/12. 1924. Schw. Prior. 18/11. 1922. Schwz. P. 102400 vom 8/11. 1922, ausg. 2/1. 1924. F. P. 570995 vom 22/9. 1923, ausg. 9/5. 1924. Schwz. Prior. 18/11. 1922.) SCHOTTLÄNDER

Société d'Études des Colorantes Solides, Paris, *Herstellung von Anthrachinon*. Man oxydiert Anthracen mit einem Gemisch aus NaHSO₄ u. NaNO₃. — Z. B. red.

epulvertes Anthracen mit NaHSO_4 u. NaNO_3 innig gemischt u. 2 Stdn. auf 40° erhitzt, die Schmelze mit W. versetzt, der feste Rückstand abfiltriert, mit W. u. dann mit h. verd. Alkali gewaschen u. getrocknet. Nach dem Umkristallisieren aus Aceton oder durch Sublimation erhält man reines *Anthrachinon* in einer Ausbeute von ca. 81%. (F. P. 550363 vom 25/8. 1921, ausg. 5/3. 1923. Pat. P. 100942 vom 18/8. 1922, ausg. 16/8. 1923. F. Prior. 25/8. 1921.) SCHOTTL. Badische Anilin- & Soda-Fabrik, Ludwigshafen a. Rh. (Erfinder: Arthur Ringhaus, Hugo Wolff, Mannheim, und Heinrich Neresheimer, Ludwigs- a. Rh.), Darstellung von Kondensationsprodukten der Benzanthronreihe, darin bestehend, daß man Benzanthron oder seine Derivv. u. Analogen unter gemäßigten, u. von Küpenfarbstoffen ausschließenden oder beschränkenden Bedingungen mit

alkal. Kondensationsmitteln behandelt u. etwa gleichzeitig entstandene Farbstoffe entfernt. — Beispiele sind gegeben für die Herst. der Kondensationsprodd. aus Benzanthron, aus hochsd. Lösungsmm. gelbe, über 300° schm. Nadelchen, wl. in Eg., Bzl., Aceton, in Nitrobenzol u. Trichlorbenzol ll. mit gelber Farbe, in konz. H_2SO_4 tiefrot l. durch Erhitzen mit KOH u. A. bei 100°, bezw. mit KOH u. Chlorbenzol unter Rückfluß bezw. mit Anilinnatrium bei 45°, bezw. mit Monomethylanilinnatrium auf 75–80°, sowie aus 6-Methylbenzanthron aus Chlorbenzol teils gelbe Nadeln, teils bräunliche Gebilde, F. über 350°. Der gleichzeitig entstandene Küpenfarbstoff (bei Verwendung von Benzanthron erhält man das blauviolette Dibenzanthron) wird durch Behandeln der Rohprodd. mit h. alkal. $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_4$ -Lsg. entfernt. Benzanthronchinoline u. Benznaphthanthrone lassen sich analog dem Benzanthron verwenden. Nach Analyse u. Rkk. liegen



während weiterer 4 oder 5 Stdn. Wasserdampf in den sich drehenden Autokla läßt hierauf den Dampf in einen Kondensator ab u. behandelt den Autokla inhalt bei gewöhnlichem Druck mit Wasserdampf nach. Der kondensierte Dampf enthält ca. 5—6% *Furfur*ol. Die Fl. wird dann zur Neutralisation der H_2SO_4 $\text{Ca}(\text{OH})_2$ oder einem anderen alkal. Mittel versetzt u. zur Abscheidung des *Furfur* das in einer Ausbeute von 10% der angewandten Menge der Haferschalen gewonnen wird, dest. (**E. P. 203691** vom 4/9. 1923, ausg. 7/11. 1923. A. Prior. 7/9. 1923. **F. P. 570531** vom 4/9. 1923, ausg. 2/5. 1924. A. Prior. 7/9. 1922.) SCHOTT

Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Leverkusen bei Köln a. Rh. (Erfinder: **Wilhelm Bauer**, Opladen, **Joseph Haller**, Wiesdorf, und **Alfred Haller**, Opladen), *Darstellung von 5,6-Benzo-7-halogen-3-ketodihydro-1-thionaphthenen*, bestehend, daß man 1-Halogennaphthyl-2-thioglykolsäurechloride mit HCl abspalten Kondensationsmitteln, wie wasserfreiem AlCl_3 , behandelt. — Z. B. wird 1-Chlor-naphthyl-2-thioglykolsäure, erhältlich durch Ersatz der NH_2 -Gruppe durch $\text{S}\cdot\text{CH}_2\cdot\text{CO}_2\text{H}$ -Rest im 1-Chlor-2-aminonaphthalin oder durch vorsichtiges Chlorieren der β -Naphthylthioglykolsäure, Na-Salz Blättchen, freie Säure aus A. Nadeln, F. 149—150°, gibt durch Oxydation mit $\text{K}_3\text{Fe}(\text{CN})_6$ einen rotstichig blauen Farbstoff, *Indigo*. *Isatin- α -deriv.* kuppeln zu klaren blauen, *Naphthisatin- α -deriv.* zu leuchtend schwarzen Farbstoffen, *Oxythionaphthen- α -arylide* zu einem klaren Rotviolett. *Indirubine* sind violett. — Analog erhält man aus 1-Bromnaphthyl-2-thioglykolsäure F. 148°, das sehr ähnliche 7-Brom-5,6-benzo-3-ketodihydro-1-thionaphthen. (**D. 1. 403053** Kl. 12o vom 3/6. 1922, ausg. 20/9. 1924.) SCHOTT

F. Hoffmann-La Roche & Co. Akt.-Ges., Basel, Schweiz, *Darstellung von O,O-Diacidylderivaten des Diphenolisatins und seiner im Phenol- oder Isatinrest substituierten Abkömmlinge*, darin bestehend, daß man Diphenolisatin oder dessen isomere Substitutionsprodd. unter milden Bedingungen, d. h. bei Temp. unter 100°, gegebenenfalls unter Zusatz indifferenten Verdünnungsmittel, mit Acylierungsmitteln behandelt. — Beispiele sind angegeben für die Herst. folgender O,O-Diacidylderiv.: *Diacidyl-diphenolisatin* aus *Diphenolisatin* u. Essigsäureanhydrid, mit oder ohne Zusatz von Bzl. u. H_2SO_4 , bezw. Eg. u. POCl_3 in Ggw. von Bzl., bezw. CH_3COCl in Ggw. von Pyridin; aus Eg. Krystalle, F. 242°, unl. in W. u. k. verd. NaOH, w. NaOH verseift bei längerer Einw. zum *Diphenolisatin*, wl. bis unl. in den üblichen organischen Lösungsmitteln. — *O,O-Dibenzoyldiphenolisatin* durch Einw. von Benzoylchlorid auf *Diphenolisatin* in alkal. Lsg. erhalten; aus A. derbe Prismen, F. 221—222°, zw. 200° u. 250° A., leichter l. in Eg., ll. in Pyridin, unl. in W. u. k. verd. NaOH, alkoh. Lsg. verseift beim Kochen. — *O,O-Ditoluolsulfonyldiphenolisatin* aus Toluolsulfochlorid u. *Diphenolisatin* in alkal. Lsg., aus Bzl. bezw. 60%ig. A. Krystalle, F. 219—220°, ll. in A. u. Eg., wl. in Bzl., unl. in W. u. k. verd. NaOH. — *Dicarbäthoxydiphenolisatin* aus Chlorameisensäureester u. *Diphenolisatin* in alkal. Lsg. bei 0°; unl. in W. u. k. verd. NaOH, 45%ig. A. Nadeln, F. 156—157°, ll. in A., Bzl. u. Eg., unl. in W., mit k. verd. NaOH-Lauge tritt langsam Verseifung ein, rascher in der Wärme. — *Bisphenylacetyldiguajacolisatin* wird durch Einw. von Phenyllessigsäure u. POCl_3 in Ggw. von Bzl. bei 100° auf *Diguajacolisatin*, aus Guajacol u. Isatin (hierzu vgl. v. BAeyer u. LAZARUS, Ber. Dtsch. Chem. Ges. **18**. [1885]. 2637) erhalten, F. 250—251°, zw. 200° u. 250° A. wonnen; aus Bzl. u. A. Krystalle, F. 169—170°, unl. in W., zl. in h. A. u. k. verd. NaOH wird durch w. alkoh. NaOH zu *Diguajacolisatin* verseift, das in alkal. Lsg. mit $\text{K}_3\text{Fe}(\text{CN})_6$ eine indigoblaue Färbung gibt. — *Dicinnamoyldiguajacolisatin* aus Isatin u. Cinnamoylsäurechlorid u. *Diguajacolisatin* in alkal. Lsg. bei 0°; aus Eg. Krystalle, F. 13

is 31°, l. in A. u. Eg., unl. in W. u. k. verd. NaOH. — *Dicarbäthoxydiguajacolat* aus Chlorameisensäureester u. Diguajacolisatin in alkal. Lsg. bei 0°: aus 90° g. A. Nadelchen, F. 119—120°, ll. in A., Bzl. u. Eg., unl. in W., k. verd. fast verseift kaum, w. wss. Lauge löst unter Verseifung. — *Dibenzoyldi-o-kresolisatin* aus *Di-o-kresolchlorisatin*, dargestellt durch Kondensation von 4-Chlorisatin mit o-Kresol, u. Benzoylchlorid in alkal. Lsg., aus A. u. Eg. Krystalle, F. 210—211°, ll. in A., etwas schwerer l. in Eg., unl. in W. u. wss. Alkali, durch Erhitzen mit alkoh. Alkali erfolgt Verseifung. — *O,O-Diacetyldi-o-kresolisatin* aus *Di-o-kresolisatin*, dargestellt durch Kondensation von o-Kresol mit Isatin in Ggw. von Mineralsäuren, F. 246—247°, gibt in alkal. Lsg. mit $K_3Fe(CN)_6$ eine rotviolette Färbung, u. Essigsäureanhydrid in Ggw. von etwas konz. H_2SO_4 bei 90°, aus 45% ig. Krystalle, F. 180—181°, ll. in A. u. Eg., unl. in W., wird beim Erwärmen mit wss. Lauge unter B. von *Di-o-kresolisatin* gel. Die sehr geringe Giftigkeit aufzuheben, eine purgierende Wrkg. besitzenden Prodd. finden therapeut. Verwendung. — **P. 406210** Kl. 12p vom 26/6. 1923, ausg. 18/11. 1924. Schwz. Priorr. 27/11. 1922 u. 15/6. 1923. **Schwz. P. 100806** vom 27/11. 1922, ausg. 17/12. 1923 u. 15/6. 1924. **PP. 104250, 104251, 104252, 104253** [Zus.-Patt.] vom 15/6. 1923, ausg. 17/12. 1924. **E. P. 221976** vom 25/10. 1923, ausg. 16/10. 1924.) SCHOTTLÄNDER.

Ladarski Skita, Kiel, *Darstellung von teilweise hydrierten Alkaloiden der Chinin-Gruppe und deren Derivaten*, dad. gek., daß man Chinaalkaloide oder deren Dihydroderivate der katalyt. Hydrierung mit H_2 u. kolloiden Metallen der Pt-Gruppe in wss. Lsg. unterwirft u. die H_2 -Einw. nach der Aufnahme von 6 bzw. 4 Atomen H unterrichtet. — Z. B. wird *Chininsulfat* in Ggw. einer kolloiden Pt-Lsg., enthaltend 1% HCl D. 1,16, bei 1½ at Überdruck mit H_2 behandelt. Nach Aufnahme der 6 B. von *Dihydrochinin* berechneten Menge H_2 wird noch weitere kolloide Pt-Lsg., enthaltend Pt u. Gummi arabicum, hinzugefügt, das Gemisch auf 40—45° erwärmt u. ca. 2½ Stdn. H_2 eingeleitet. Nach Fällung des Pt mit HCl in der Wärme, Filtration u. Fällung der Base mit NaOH unter Eiskühlung wird im Vakuum getrocknet. Das *Hexahydrochinin*, hellgelbes Pulver, aus CH_3OH -A. oder Äther Blättchen, F. 94°, bildet hygroskop. Salze mit Säuren; *Pikrat* Krystalle, F. 146—149°; *Phenylharnstoffphenylcarbaminsäureester*, F. 75—76°. — Behandelt man *Dihydrochinin* mit H_2 in Ggw. von kolloider Pt-Lsg. bei 40 bis 50° Stdn. mit H_2 , so wird das *Hexahydrocuprein*, aus CCl_4 Krystalle, F. 146°, erhalten. F. 175°, *Phenylharnstoffdiphenylcarbaminsäureester* F. 132°, erhalten. — Behandelt man in wss. HCl gel. *Chinidin* in Ggw. von H_2PtCl_6 u. kolloider Pt-Lsg. mit H_2 bis zur Aufnahme von 3 Mol. H_2 , so geht es in *Hexahydrochinidin*, glasige Prismen, F. 125—126°, *Pikrat* F. 148—149°, über. Die *Hexahydrochininderivate* unterscheiden sich von den natürlichen Chinaalkaloiden durch die Wahl der Thalleiochiralk. u. durch eine sehr kräftige Thallinrk. mit grünem Dichroismus. Das *Hexahydrochinin* zeigt eine sehr starke Abnahme der optischen Drehung gegenüber dem Chinin, ebenso weist das *Hexahydrochinidin* eine viel geringere Rechtsdrehung auf als das Chinidin. Die Verbb. zeigen ferner starkes Reduktionsvermögen, z. B. macht *Hexahydrochinidin* aus Ag- oder Pt-Salzen das Metall frei, u. eine leichte Oxydationsfähigkeit. Sie bilden ferner in W. mit neuartigen l. u. für Injektionszwecke geeignetere Salze, als die im Pyridinkern enthaltenen Chinaalkaloide, wie Chinin, Cinchonin, Cuprein oder deren Dihydroderivate, deren l. Salze in der Regel stark saure Rk. aufweisen. (**D. R. P. 407118** vom 16/5. 1922, ausg. 9/12. 1924. **Schwz. P. 106333** vom 14/5. 1923, ausg. 6/8. 1924. D. Prior. 15/5. 1922.) SCHOTTLÄNDER.

Alco-Gesellschaft A.-G. Bern, Bern (Schweiz), *Darstellung jod- und brom- und eiweißverbindungen*, dad. gek., daß man *Eiweißfarbstoffverbindungen*, welche durch Fällung von Eiweißkörpern mit solchen organ. Farbstoffen entstanden sind,

die ein leicht austauschbares Cl-Atom enthalten, in wss. Suspension mit Lsgg. jod- oder bromwasserstoffsäuren Salzen behandelt. — Als Farbstoffeieweißen kommen besonders in Betracht die Kombinationen von Hefe, Nucleinen Nucleinsäuren mit Triphenylmethan-, Ketonimin-, Thiazin-, Safranin-Acridin, stoffen bzw. deren Chlorhydraten u. Azoniumchloriden. Z. B. wird entbitterte mit W. gequollen u. mit einer h. wss. Lsg. von 3,6-Diamino-10-methylacridinchlorid solange auf 90—100° erhitzt bis eine Probe zeigt, daß der Farbstoff an Eiweiß gebunden ist. Auf Zugabe einer wss. Lsg. von NaJ zu dem Reaktionsprod. erfolgt Umsetzung in das Jodderiv., gelbes Pulver. Analog ent die entsprechende Bromverb. mit NaBr. — Erwärmt man Rohhefebrei mit einer Methylenblaulsg. auf 90—100°, so wird der Farbstoff durch die Hefe reduziert als Leukverb. gebunden. Durch weiteres Erhitzen der Leukomethylenblauhefe mit wss. NaBr-Lsg. während ½ Stde., Filtrieren, Waschen u. Trocknen wird bromierte Verb. des Leukomethylenblaus mit der Hefe unter der Einw. des O₂ Luft zu der tiefblau gefärbten Brommethylenblau-Hefeverb. oxydiert. — Das d Umsetzung von nucleinsäurem Na (aus Hefe) mit 3,6-Diamino-10-methylacridinchlorid in wss. Lsg. entstehende gelb gefärbte Prod. gibt bei der Einw. einer NaJ-Lsg. ein in W. unl., tiefbraun gefärbtes Jodderiv. — Das aus Hefe, einer Methylviolett (Pyocetanin)-Lsg. u. NaJ-Lsg. bei 100° erhältliche Jodderiv. ist ein violett gefärbtes, in W. unl. Pulver. — Auramin gibt mit Nuclein (aus Bierhefe) NaJ ebenfalls ein Jodderiv. — Die aus frischer Hefe, Safranin u. NaJ analog oben erhältliche Jodverb. ist ein in W. unl. rot gefärbtes Pulver. Die stark tericid wirkenden Prodd. finden therapeut. Verwendung. (D. R. P. 407486 Kl vom 4/1. 1923, ausg. 15/12. 1924. Schwz. Prior. 20/12. 1922. Schwz. P. 10310 Schwz. PP. 103380, 103381 [Zus.-Pat.] vom 20/12. 1922, ausg. 2/6. 1924.) SCH

X. Farben; Färberei; Druckerei.

P. Martell, Zur Geschichte der Färberei in Westfalen. Mitteilungen aus. Anfang des 17. Jahrhunderts lassen starkes Eingreifen städt. Behörden erken (Melliands Textilber. 6. 32—34.) SÜVEN

N. Orlow und **L. Shebunew**, Über die Fixierung der Tonerdebeizen an Pfla fasern. Es wurden 4 bas. Aluminiumsulfatlsgg. dargestellt; sie enthielten 10 ccm 0,2868 g Al₂O₃ u. 0,4519 g SO₃, bzw. 0,2843 g Al₂O₃ u. 0,2267 g bzw. 0,1841 u. 0,3603, bzw. 0,1811 u. 0,1927. Mit diesen Lsgg. wurden Stoffe aus „gekochtem Mitkal“ getränkt; eine Hälfte der Streifen war vorerst mit 10 Alizarinöl durchgetränkt, die zweite nicht. Eine Wägung der abgepreßten Stoffe ergab die aufgenommene Menge Lsg., eine nach zweitägigem Trocknen bei Zimmertemp. ausgeführte Wägung lieferte das Gewicht des aufgenommenen Salzes. In wurde eine Hälfte der Streifen 3 Min. lang mit einer Kreidesuspension bei 40°C behandelt u. mit W. ausgewaschen; die zweite Hälfte mit W. ohne vorherige Behandlung gewaschen. Die neue Wägung des getrockneten Stoffes zeigte die adsorbierte Menge der Beize, eine Ascheanalyse ergab schließlich ihre Zus. — Die adsorbierte Al₂O₃-Menge (auf die verwendete Menge bezogen) nahm mit Verhältnis Al₂O₃:SO₃ der Lsg. u. mit der Verd. derselben zu; sie war größer an Stoffen, die mit Alizarinöl durchgetränkten u. mit CaCO₃ bearbeiteten Streifen. Der Aufnahm von SO₃ ist das Verdünnen der Lsg. u. die CaCO₃-Behandlung ungünstig. Der Stoff, der mit Alizarinöl getränkte Gewebe hält mehr SO₃ fest als das nicht getränkte Gewebe. Die Differenz ist besonders groß bei mit CaCO₃ nicht behandelten Streifen u. im Vergleich der Beizen mit niedrigem Verhältnis Al₂O₃:SO₃. — Versucht man, für die adsorbierte Substanz eine stöchiometr. Formel zu finden, so gelangt man zu zwei Al₂O₃·(SO₃)₂ u. (Al₂O₃)₆₄·SO₃ schwankenden Zuss. (Nachrichten der Textilindustrie [Russ.] 2. 45—49. 1924. Sep. Kiew, Polytechn. Inst.) BIKERM.

Fritz Junge, *Das Tannieren*. Hinweise für die zweckmäßigste Art des Beizens. (r. f. ges. Textilind. **27**. 578—79. 1924.) SÜVERN.

Karl Volz, *Blankit I der B. A. S. F.* Das Bleichmittel Blankit I übt eine aufhellende Wrkg. aus; sein Vorteil beruht vor allem darauf, daß es Eisen auflöst. (Ztschr. f. ges. Textilind. **28**. 40.) JUNG.

I. Tschilikin, *Ein neues Verfahren der Küpfenfärbung*. Indigo wird in einem anderen Gefäß mit h. NaOH u. Glucose oder Maltose reduziert u. nach Abkühlung in die Kufe eingeführt; die Lsg. kann, um die Luftoxydation zu vermeiden, mit einem beliebigen Reduktionsmittel versetzt werden. (Nachrichten der Textilindustrie [Russ.] **2**. 40—44. 1924. Sep.) BIKERMAN.

J. Bock, *Altes und Neues vom Berliner Blau*. Man verarbeitet jetzt Gasmassen vom Gehalt an nutzbarem Cyan, der früher nicht lohnend erschien. Angaben über die Herst. der verschiedenen Eisencyanfarben, 1. Blau, Oxydation von FeCl₂ mit H₂, u. über das Fabrikationswasser. (Farben-Ztg. **30**. 680—82. 1924.) SÜVERN.

I. Filippow, *Über die Farbstoffe der Ellerrinde*. Die Ellerrinde enthält zwei Farbstoffe, die man auf zweifache Weise trennen kann. 1. Der wss. Auszug wird durch Bleiacetat gefällt, wobei die beiden Farbstoffe in den Nd. fallen; der Nd. wird mit H₂S zers., das Filtrat eingedampft, der Rückstand in H₂O gel. u. das Lösungsm. abgedampft. Nun werden die Farbstoffe mit sd. HCl digeriert; einer von ihnen wird mit fuchsinroter Farbe aufgenommen u. durch Verd. der HCl mit k. W. gefällt. Dieser Farbstoff färbt rohe u. mit Eisen-Verb. gebeizte Wolle in eine gelbgraue Farbe, die nach Behandlung mit Na₂Cr₂O₇ in Braun wird. In Lsgg. des zweiten Farbstoffs erhält die Wolle eine dunkelbraune Farbe, die das Na₂Cr₂O₇ heller macht. 2. Das zweite Trennungsverf. beruht auf der Löslichkeit der Fe-Verb. des zweiten u. der Unlöslichkeit der Fe-Verb. des ersten Farbstoffes. Fe⁺⁺ wird als Acetat zugesetzt. Die Lsgg. der Fe-Verb. des zweiten Farbstoffes haben ein tintenartiges Aussehen. — Die durch den wss. Auszug gegebene Färbung ist, was die Licht-, Alkali- u. Säurebeständigkeit betrifft, der von Campechoholz herrührenden Färbung mindestens ebenbürtig. (Nachrichten der Textilindustrie [Russ.] **2**. 49—52. 1924. Sep.) BIKERMAN.

Lugo Kauffmann, *Die Perechtigkeit gefärbter und bedruckter Baumwolle bei der Echtheitsprüfung*. Die Echtheit einer großen Anzahl Teerfarbstoffe gegen Perverbb. u. Hypochlorit ist in Tabellen wiedergegeben. (Melliands Textilber. **6**. 17—23. Reutlingen. 1924.) SÜVERN.

J. Zänker und W. Steinhoff, *Färbungen durch Einwirkung der Zwischenprodukte aus Tetrazodiphenylen auf Griesheimer Naphtholgrund*. Es wurden Zwischenprodukte aus tetrazotiertem Dianisidin u. einer Azokomponente hergestellt u. mit Griesheimer Naphtholen gekuppelt. Der Einfluß des an zweiter Stelle gekuppelten Naphthols überwiegt sehr. Angaben über Echtheit einiger derartiger Färbungen. (Der Textilchemiker u. Colorist **1924**. 4 Seiten. Sep. Barmen, Reichschule.) SÜVERN.

J. Zänker und Kurt Strunk, *Erhöhung der Lichtechtheit von mit Griesheimer Naphtholen entwickelten Primulinfärbungen durch Metallsalze*. Nach mitgeteilten Versuchsbedingungen wird die Herst. echter Färbungen durch Diazotieren von Primulinfärbungen in Kupeln mit Griesheimer Naphtholen unter Zusatz ammoniakal. Cu-Lsg. u. Tetrazodiphenylen empfohlen, namentlich da, wo von der Verwendung der Indanthrenfarbstoffe abgesehen werden muß. Man gelangt auf einfache u. billige Weise zu lichtechten Färbungen. (Der Textilchemiker und Colorist **1924**. 4 Seiten. Sep. Barmen, Reichschule.) SÜVERN.

J. Zänker und Ernst Zurlinden, *Mit Griesheimer Naphtholen hergestellte blaue Färbungen*. Genaue Vorschriften für Erzeugung blauer bis schwarzblauer Färbungen.

Färbungen. (Der Textilchemiker und Colorist 1924. 4 Seiten. Sep. Bar. Färbereischule.) SÜVEI.

W. Zänker und H. Grosse, *Untersuchungen über die Buntbäuche von Indanthrenschwarz*. Die durch Kuppeln von Indanthrenschwarzfärbungen mit Naphthol auf der Faser erhaltene Färbung weist gegenüber den auf andere Art veränderten Indanthrenschwarzfärbungen bemerkenswerte Eigenschaften auf. Gegenüber anderen Färbungen ist der Ton ein viel volleres, schöneres u. tieferes Schwarz. Die Widerstandsfähigkeit gegen k. alkal. Hydrosulfitlsg. ist bei der Naphtholkuppelung etwas größer als bei dem nicht nachbehandelten u. dem gechlorten Schwarz. Bei der Prüfung auf Bäuchechtheit blutete die mit weißer Baumwolle verflochtene Färbung des mit Naphthol AS-G gekuppelten Indanthrenschwarz BB nur an den Berührungsstellen spurweis in das mitgekochte Weiß u. zeigte bezüglich des Tonwertes keinerlei Veränderungen. (Textilchemiker u. Colorist 1924. 8 Seiten. Sep. Bar. Färbereischule.) SÜVEI.

Heinz Perndanner, *Über den Einfluß von salpetriger Säure auf die Oxydation von Leukoverbindungen von Küpenfarbstoffen*. Verss., Nitrit direkt den Druckfarbstoffen zuzusetzen, sie zu dämpfen u. in verd. HCl zu entwickeln, zeigten, daß es sich lohnt, die NaNO₂-Menge genau festzulegen. Vorteilhafter ist es, nach dem Dämpfen eine schwache k. Passage mit NaNO₂ u. H₂SO₄ zu geben. Die Oxydation mit NaClO₂ beeinträchtigt die Tiefe u. Reinheit der Farbtöne nicht ungünstig, nur Indanthrenblau marken schlagen nach Grün um. (Melliands Textilber. 6. 32.) SÜVEI.

P. H. Walker und E. F. Hickson, *Widerstandsfähigkeit von Farben gegen Sulfiddämpfe*. (NH₄)₂S beeinträchtigt bedeutend stärker Farbanstriche als H₂S. Die Laboratoriumsanstriche eignen sich am besten Lithoponfarben mit Co-Troch. Dunklere Färbungen sollen durch Zusatz von Ocker u. anderen Fe₂O₃-Farben erzielt werden. Für Außenanstriche werden Ti-ZnO-Farben empfohlen. (Ind. Engin. Chem. 16. 1142—43. 1924. Washington [DC.]) GRIMM.

Robert Kuhn, *Die Chromolfarben und Chromolpräparate in kritischer Beleuchtung*. Die unter Verwendung chromierten Leinöls hergestellten Chromolfarben sind nicht besser als Ölfarben. Die Eigenschaften des Leinöls werden durch die Chromieren in keiner Weise verbessert. Die verschiedenen Arten Chromolfarben werden krit. besprochen. (Chem.-Ztg. 48. 942—43. 1924. Troppau.) SÜVEI.

K. Koelsch, *Farbennormung auf mathematischer Grundlage*. Die Vorteile der Normung auf mathemat. Grundlage werden auseinandergesetzt. (Melliands Textilber. 6. 26—30.) SÜVEI.

L. Gerstacker, *Gründe für die Ablehnung der Ostwaldschen Vorschläge zur Bestimmung der Deckfähigkeit und Normung des Farbtönen durch den Normenausschuß für das graphische Gewerbe*. Die Berechnungsweise der Deutschen Werkstoff-Farbkunde wird kritisiert, Unstimmigkeiten bei verschiedenen Bestst. werden besprochen. (Farben-Ztg. 30. 452—53. 1924.) SÜVEI.

Robert Fischer, *Bemerkungen zu den Ausführungen Dr. Gerstackers über die Gründe für die Ablehnung der Ostwaldschen Vorschläge zur Bestimmung der Deckfähigkeit und Normung des Farbtönen*. (Vgl. vorst. Ref.) Bei den Schwierigkeiten einer Farbtönnormung wird erneute Durcharbeitung in einem besonderen Ausschusse empfohlen. (Farben-Ztg. 30. 677—79. 1924.) SÜVEI.

W. Zänker, Hans Schreiber und Edmund Rohs, *Eine Reaktion zur Erkennung der mit Antimon fixierten, basischen Färbungen auf Baumwolle*. Als schriftl. Probe wird empfohlen, ein amalgamiertes, mit Fe-Draht umwickeltes Cu-Stück mit der zu untersuchenden Probe u. verd. HCl zu erhitzen. Ist eine mit Sb-Selen gebeizte Färbung vorhanden, so wird das Cu-Amalgam schon sehr bald an den Berührungsstellen des Fe-Drahtes braun oder schwarz. Einzelheiten über us

rg der Probe. (Textilchemiker und Colorist 1924. 2 Seiten. Sep. Barmen, Reichschule.)

SÜVERN.

Raymond Vidal, Seine, Frankreich, *Färbeverfahren*. Beim Behandeln der mit $K_2Cr_2O_7$ kann der Anteil an H_2SO_4 66° Bé auf 3—4%, an NaCl auf 20% werden. Wolle oder Pelze können vor dem Färben mit einem wss. Pankreas- u. phenol-, kresol- usw. -haltigen Seifenlsgg. behandelt werden. Das Färben Diaminen kann unter Fortlassen des Alkalies, unter Zusatz von 15% NaCl oder Mineralsäure oder organ. Säure erfolgen. Man kann auch mit arom. Diaminen allein ohne Zusatz von arom. m-Diaminen färben, u. die HNO_3 durch Ameisensäure ersetzen. (F. P. 27778 vom 14/2. 1923, ausg. 18/8. 1924, F. P. 566407. — C. 1924. I. 2639.)

FRANZ.

Popold Cassella & Co., G. m. b. H., Frankfurt a. M., *Herstellung von Effekt- aus pflanzlicher Faser*. Man behandelt die pflanzliche Faser in Ggw. von feineren Salzen von sulfonierten Fettsäuren mit Alkalien u. dann mit dem Säure- einer arom. Carbon- oder Sulfonsäure. (E. P. 224502 vom 21/7. 1924, ausg. veröff. 7/1. 1925. Prior. 5/11. 1923.)

FRANZ.

The Quaker Oats Company, V. St. A., *Herstellung gefärbter plastischer Massen* färben von plastischen Massen, Holz usw. Beim Erwärmen von Furfurol in wässriger Säure erhält man schwarze Farbstoffe. Mischt man daher Phenol mit Selenchlorür u. Furfurol, so erhält man schwarze MM., die geformt werden können. In ähnlicher Weise kann man andere plast. MM., Lacke usw. schwarz färben. Holz tränkt man mit Furfurol, dem eine geringe Menge Säure zugesetzt wird; man erwärmt; man kann das Holz auch erst mit Furfurol tränken u. dann mit chl. oder gasförmigen Säure behandeln. Stoffe, die beim Erhitzen zerstört werden, färbt man mit Furfurol unter Zusatz von Anilin; ebenso kann man Kunst- ze Harze, Firnisse usw. mit Furfurol färben. (F. P. 575942 vom 17/1. 1924, ausg. 8/8. 1924.)

FRANZ.

Tsubata, Kanagawa, Japan, *Farbstoffbehandlung*. Deckfarbstoffe, wie Carmin, Zink-, Bleiweiß, Goldschwefel, Ruß u. dgl. werden mit einer Emulsion angeteilt, welche die wss. Lsg. eines Kolloids, wie Gelatine, Casein oder Leim, gegebenenfalls in Gasolin oder Terpentin gel. trocknendes oder nicht trocknendes A. Formalin enthält. Die Farbstoffteilchen bedecken sich hierbei mit einer gequältem Kolloid bestehenden Schutzschicht; die Erzeugnisse werden ge- trocknet, getrocknet u. gepulvert u. können unmittelbar mit Öl oder Gelatinelsg. weiter verarbeitet werden. Sie können aber auch erneut mit einer Emulsion angeteilt werden, welche im übrigen wie die zuerst verwendete zusammengesetzt, formalinfrei ist. (E. P. 224273 vom 30/7. 1923, ausg. 4/12. 1924.) KÜHLING.

Thomas Carbon Black Company, übert. von: **Edward H. Thomas**, East V. St. A., *Ruß*. Petroleum wird durch Aufsprühen auf Ziegel ge- crackt, bis auf etwa 760° erhitzt worden sind. Es entsteht ein Gemisch von gas- förmig bzw. niedrig sd. gesätt. u. ungesätt. KW-stoffen der aliphat. Reihe. Das Gemisch wird mit unzureichenden Luftmengen verbrannt u. die Flammen in- nen in hohle Metallplatten geleitet, welche mittels durchgeleiteten Dampfes auf Temp. von höchstens 260° gehalten werden. Der entstehende Ruß enthält ge- w. Öl; will man ihn von diesem befreien, so zieht man ihn mit Aceton aus. (F. P. 514638 vom 17/1. 1923, ausg. 11/11. 1924.)

KÜHLING.

William H. Davis, übert. von: **Alexander Bonnington**, Charleston, V. St. A., *brennbare Gase oder brennbare Bestandteile enthaltende Gasgemische* wie Leuchtgas, Ölgas, carburiertes Wassergas o. dgl., werden mit $\frac{1}{10}$ bis 3% Dampf oder entsprechenden Mengen der Dämpfe einer anderen nicht brenn- baren Substanz, wie $C_2H_2Cl_4$, $SiCl_4$ o. dgl. gemischt, die Mischungen verbrannt

u. die Flammen gegen Metallflächen geleitet. Die Rußausbeute soll durch den Zusatz des nicht brennbaren Stoffes erheblich vergrößert werden. (A. P. 151 vom 25/8. 1922, ausg. 11/11. 1924.) KÜHLI

Joseph Blumenfeld, England, *Titanfarbstoffe*. Durch Hydrolyse von Titansulfat gewonnene Titansäure wird mit kleinen Mengen einer Säure, eines Titansalzes oder eines anderen Stoffes behandelt, welche die Oberflächenspannung der fl. Phase vermindert. Die Korngröße der Titansäure wird dadurch stark vermindert, es entsteht, gegebenenfalls nach wiederholter Behandlung, eine Titansäure, welche beim Anreiben mit Öl Farben von hoher Deckkraft liefert. (F. P. 575615 vom 9/1. 1924, ausg. 2/8. 1924.) KÜHLI

XVIII. Faser- und Spinnstoffe; Papier; Cellulose; Kunststoffe.

Carl G. Schwalbe und **Kurt Berndt**, *Oxydierbarkeit von Magnesium- und Calciumbisulfitaugen und deren Verhalten bei der Druckerhitzung*. Bei der Oxydation von Bisulfitlaugen besteht von der Flüssigkeitsoberfläche nach dem I. eine stete Abnahme des SO₃-Gehalts, da die an der Berührungsfläche von Luft gebildeten Sulfatmoleküle nur sehr langsam in tiefere Schichten vordringen. Da bei den Vorratsbottichen die der Oxydation ausgesetzte Laugenoberfläche im Verhältnis zum Inhalt klein ist, ist für die Praxis die Oxydation einer Mg(HSO₃)₂-Lauge annähernd die gleiche wie die einer Ca(HSO₃)₂-Lauge, die sich beim Erhitzen mit einer CaSO₄-Kruste bedeckt. Bei Druckerhitzung tritt bei Mg(HSO₃)₂-Lauge keine Sulfitausscheidung im Gegensatz zur Ca(HSO₃)₂-Lauge ein. Bei Mischung mit äquimolekularer Basenzus. ist die ausgefällte Kalkmenge bedeutend geringer als bei reiner Ca(HSO₃)₂-Lauge u. die Krystallisation beginnt erst bei höherer Temperatur. Bei MgCl₂-haltigen Ca(HSO₃)₂-Laugen ist die ausgeschiedene Basenmenge geringer als bei reiner Ca(HSO₃)₂-Lauge, da teilweise Mg(HSO₃)₂- u. CaCl₂-B. eintritt. Erhält die Lauge eine dem CaO äquivalente Menge MgCl₂, so ist die ausgeschiedene Sulfitmenge größer als bei einer äquimolekularen Mischlauge. Die Temp. der beginnenden Krystallisation liegt dann zwischen der einer reinen Ca(HSO₃)₂-Lauge und der Mischlauge. (Papierfabr. 23. Verein der Zellstoff u. Papier-Chemiker-Ingenieure. 1—6. Eberswalde.) SÜVIN

Katsumoto Atsuki *Die Nitrate von Oxycellulosen, Hydrocellulosen und Hydrocellulosen und ihre Beziehungen zu den Eigenschaften von Nitrocellulose und Cellulose*. Die im Original in zahlreichen Tabellen u. Kurven dargestellten Versuchsergebnisse lassen sich folgendermaßen zusammenfassen: die chem. Veränderung, die die Cellulose beim Nitrieren erfährt, kann festgestellt werden durch Best. der Cu-Zahl aus der Nitrocellulose regenerierten Cellulose. Diese Regenerierung erfolgt am besten, indem die Nitrocellulose mit dem 100-fachen Gewicht einer ca. 16%ig. wss. N-S-Lsg. 6—10 Stdn. bei 25—30° digeriert u. danach mit verd. Chlorkalklsg., N-S-Lsg. u. W. gewaschen wird. Hydrolyse oder Oxydation der Cellulose tritt bei diesem Verf. nicht ein; ein N-Gehalt von etwa 0,02% in der regenerierten Cellulose ist bedeutungslos. — Enthält eine Nitrocellulose einen dem Mononitrat entsprechenden oder einen höheren N-Gehalt, so löst sie sich in Fehlingscher Lsg. gibt die durchschnittliche Cu-Zahl 30; sinkt der N-Gehalt unter den genannten, bleibt etwas unl., nicht nitrierte Cellulose zurück, die Cu-Zahl der Nitrocellulose fällt. Die aus verschiedenen Nitrocellulosen regenerierte Cellulose zeigt in Vergleich mit der ursprünglichen Cellulose eine höhere Cu-Zahl, u. zwar ist der Unterschied um so größer, je größer der W.-Gehalt im Nitriergemisch, je größer der H₂SO₄-Gehalt, je höher die Nitrierungstemp. oder Nitrierungsdauer u. schließlich je höher die Cu-Zahl der Ausgangscellulose ist. Während der Nitrierung muß die Cellulose demnach

part werden u. zwar hauptsächlich zu *Hydrocellulose*, wodurch Abnahme der Viscosität u. Abnahme der Löslichkeit bedingt werden. Demgemäß ist auch die zur *Celluloid*-herstellung benutzte Nitrocellulose kein Nitrat der n., sondern wahrscheinlich ein Gemisch der Nitrats von Hydro- u. Oxycellulose. — Beim Nitrieren verschiedener n. unter wechselnden Bedingungen mittels CaOCl_2 erhaltener *Oxycellulosen* ergibt sich, daß mit höherer Cu-Zahl der Oxycellulose die Ausbeute an Nitroderiv., ebenso der N-Gehalt u. Viscosität abnehmen, die Löslichkeit des Nitroderiv., sowie die Cu-Zahl der regenerierten Cellulose zunehmen. Erreicht die Cu-Zahl der Oxycellulose den Wert ca. 10, so zeigt sich eine stärkere Abnahme des N-Gehaltes, die übrigen sonstigen genannten Eigenschaften treten noch deutlicher hervor. Die Oxydation der Oxycellulose scheint hiernach in zwei Stufen zu verlaufen; in der ersten herrscht vornehmlich die Oxydation von OH- zu CHO- u. CO-Gruppen sowie die Spaltung der Cellulosekomplexes in kleinere Einheiten (C_6) vor, in der zweiten Stufe erfolgt dann der Übergang der CHO- u. CO-Gruppen in COOH u. Spaltung der Cellulose in Zuckerkomplexe mit weniger als 6 C. — Die Beständigkeit verschiedener *Oxycellulosen* bei verschiedenen langem Erhitzen auf 60—65° wechselt, u. zwar sind die Oxycellulosen mit der höchsten Cu-Zahl am unbeständigsten, die am weitesten oxydiert worden sind, u. die infolgedessen den größten Gehalt an H_2SO_4 besitzen. Wird H_2SO_4 durch andauerndes Erhitzen mit W. oder durch sd. W. auf einen möglichst niedrigen Betrag gebracht, so ist die Stabilität dieser Oxycellulosenitrats fast die gleiche, ausgenommen in den Fällen, in denen eine in der zweiten Oxydationsstufe gewonnene Oxynitrocellulose untersucht wurde; diese letzteren Prodd. sind gegen Hitze stets ziemlich unbeständig. Celluloidfilms, die aus diesen Nitrocellulosen bereitet wurden, waren gleichfalls sehr unbeständig u. zerbrechlich. — Ein Gemisch von n. u. Oxycellulosenitraten kann von letzteren befreit werden durch Kochen mit Na_2SO_3 -Lsg. (NaOH verseift sich). — *Nitrocellulose aus mercerisierter Baumwolle* gibt beim Regenerieren der Cellulose ein Prod. mit niedrigerer Viscosität, höherer Löslichkeit, höherem H_2SO_4 -Gehalt u. höherer Cu-Zahl als n. Cellulose sie hat, obwohl diese u. die mercerisierte Baumwolle dieselbe Cu-Zahl besitzen. Aus der mercerisierten Nitrocellulose kann H_2SO_4 leicht durch Kochen mit W. entfernt werden, woraus zu schließen ist, daß die Beständigkeit durch die Mercerisation stark beeinflußt wird u. daß Hydratcellulose während der Nitrierung stärker hydrolysiert wird als n. Cellulose. (Journ. Faculty of Engineering Tokyo Imp. Univ. 15. 55—108. 1924.) HABERLAND.

Matsumoto Atsuki, *Die Stärke von Films aus plastischen Cellulosenitraten*. (Vgl. vorst. Ref.) Films, die aus n. oder Oxycellulosenitraten in Aceton mit oder ohne Zusatz hergestellt wurden, wurden bzgl. ihrer Bruchigkeit mittels der Schopper-Stempelmaschine untersucht. Die aus n. Nitrocellulose (11% N) hergestellten Lsgg. zeigten eine mittlere Viscosität u. gaben die stärksten Films; Lsgg. von Oxycellulosenitraten zeigten geringere Viscosität u. geringere Stärke; je höher der N-Gehalt war, desto höher die Viscosität, aber um so niedriger war die Stärke der Films. Der Zusatz von Campher erhöht die Stärke der Films bedeutend; ein Zusatz von 15% ist am vorteilhaftesten. (Journ. Fakultät of Engineering Tokyo Imp. Univ. 15. 9—16. 1924.) HABERLAND.

Matsumoto Atsuki, *Holznitrocellulose als Celluloidmaterial*. (Vgl. vorst. Ref.) Eine geeignete Methode zur Charakterisierung von Cellulose bzw. α -Cellulose ist im Verlauf der vorliegenden Unters. erhaltenen Prodd. ausfindig zu machen, um das Holz von *Picea Ajanensis* verarbeitet nach folgenden Verff.: a) nach der Methode von BEVAN (Cellulose 1916. 95) durch Aufschließen mit 1% ig. sd. NaOH u. nachfolgender Chlorierung, b) nach JOHNSEN u. HOVEY (Paper 1918. 36) durch Aufschließen mit einem Gemisch von Eg. + Glycerin u. nachfolgende Chlorierung, c) nach RENKER (Über Bestimmungsmethoden der Cellulose, Berlin 1910) durch direkte Chlorierung. Ausbeuten an Cellulose u. α -Cellulose, sowie Cu-Zahl wurden

bestimmt. Ein Vergleich der drei Methoden ergab folgendes: Nach a) u. b) v. beim Mercerisieren der Cellulose eine geringere Ausbeute an α -Cellulose als nach erhalten, die Cu-Zahl der aus a) u. b) erhaltenen α -Cellulose ist niedriger als der aus c) erhaltenen. Die nach c) dargestellte Cellulose enthielt wahrscheinlich da ein Aufschluß fehlte, Cl_2 infolgedessen nicht weit genug einwirken konnte, n. etwas unveränderte β -Cellulose. Die mit den Verff. a) u. b) erhaltenen Resultate sind gleichwertig, Methode a) ist wegen des einfachen Arbeitens vorzuziehen. Mit einem Gemisch von 54,69% H_2SO_4 , 26,87% HNO_3 u. 18,44% H_2O wurde 1 Stde. lang folgende Prodd. nitriert: *ungebleichte u. gebleichte Sulfitpülp*, *gebleichte u. gebleichte Natronpülp*, *Schilfrohr-*, *Reisstroh-*, *Bambusrohrpülp*, *Baumwolle* u. aus Lumpen hergestelltes *Leinenpapier*. Alle Nitroderiv. waren in 10% alkoh. Campherlsg. klar l. Bzgl. ihrer sonstigen Eigenschaften ergibt sich aus Tabelle des Originals folgendes: Je größer in dem zu nitrierenden Prod. der Gehalt an α -Cellulose u. je niedriger die Cu-Zahl dieser α -Cellulose ist, ferner je geringer der Gehalt an Nichtcellulosestoffen u. β - u. γ -Cellulose ist, um so höher sind der N-Gehalt, Ausbeute, Stabilität u. Viscosität (in alkoh. Campherlsg.), so kleiner die Löslichkeit in A. u. um so heller gefärbt ist das Nitroderiv. Die geringste Ausbeute (142%) gab gebleichte Reisstrohpülpe beim Nitrieren, das Produkt zeigte geringe Stabilität u. Viscosität, die damit hergestellten Filme waren sehr zerbrechlich. Die übrigen Nitroderiv. ergaben beim Lösen in alkoh. Campherlsg. zur Herst. von Celluloid geeignete Lsg., jedoch zeigten sich auch hier Unterschiede besonders bzgl. der Stabilität u. der Viscosität. Nitroderiv. aus gebleichten Sulfitpülp waren von mittlerer Viscosität u. Stabilität u. waren schwach gelblich gefärbt, die aus Schilfrohr- u. Bambuspülp dargestellten waren weniger viscos beständig, die aus ungebleichter Sulfitpülpe erhaltenen Prodd. hatten hohe Viscosität u. niedrigere Stabilität, die Nitroderiv. aus Natronpülpe hatten geringe Viscosität. Die Viscosität von Nitrocelluloselsgg. wird hauptsächlich bedingt durch Veränderungen, die die α -Cellulose (Cu-Zahl) erleidet; je höher die Cu-Zahl ist, um so weniger Viscosität besitzt die Lsg.; die Stabilität einer Nitrocellulose (Abstand Erhitzungsvers. u. Best. der Entzündungstemp.), sowie ihre Farbe werden hauptsächlich durch Beimengungen bedingt, erstere besonders (bei Sulfitpülp) durch die Ggw. von hartnäckig anhaftender H_2SO_4 oder deren Estern, sowie von nitrierten Holzgummi u. Harzstoffen; die die Färbung bedingenden Beimengungen sind seiner Natur, sie können durch Kochen mit W. größtenteils entfernt werden. — Die α -Cellulose bei der Celluloiddarst. einzig in Betracht gezogen werden kann, wird sie aus den verschiedenen Pülp u. Zellstoffen isoliert u. nitriert; dabei ergab es sich, daß die aus ungebleichter Sulfitpülpe erhaltene α -Cellulose fast dieselbe Cu-Zahl hatte wie Baumwolle; Lsgg. dieser nitrierten α -Cellulose hatten jedoch eine geringere Viscosität als die durch Nitrieren von Baumwolle erhaltenen Lsgg.; zurückzuführen ist dies darauf, daß α -Cellulose bei ihrer Darst. in Hydratcellulose tiefer geführt wird, wie die Best. der Cellulose- u. Hydrolysezahl zeigt; das Nitroderiv. ist trotzdem beständig genug u. gibt auch genügend viscos Lsgg., um ein Celluloid mit guten mechan. Eigenschaften zu liefern. Die Stabilität dieses Nitroderiv. wird durch aufeinanderfolgende Behandlung mit Ä., A., Cl_2 , verd. Alkali u. sd. W. etwas verbessert werden. Bei der Nitrierung zeigt die aus ungebleichter Sulfitpülpe dargestellte α -Cellulose gegenüber Baumwolle keinen Unterschied, bei der Acetylierung ist bei ersterer jedoch mehr Katalysator (H_2SO_4) erforderlich als bei letzterer. β -Cellulose zeigt in ihrem Verh. große Ähnlichkeit mit aus Baumwolle dargestellter Oxycellulose, die Nitrate gleichen sich ebenfalls sehr; β -Nitrocellulosen zeigen jedoch weniger gute Eigenschaften infolge Ggw. von Beimengungen (Xylane, Holzgummi, dargestellt durch Extraktion des Holzes von *Picea Ajanensis* mit 5% NaOH bei gewöhnlicher Temp., Neutralisieren u. schließlich Ansäuern mit 10%

ein in Aceton u. alkoh. Campherlsg. unl. Nitroderiv., das wenig stabil war. Nitrierung des Ä.-A.-Extraktes aus demselben Holz führte teilweise zu Oxydation, Uebersetzung zu einem Nitroderiv., das wenig beständig war u. eine Lsg. von niedriger Viskosität lieferte.

Um ein möglichst geeignetes Material zur Herst. von Celluloid aus Holz zu erhalten, wurden 5 Proben einer ungebleichten Sulfitpülpe behandelt: 1. mit NaOH (Mercerisation), 2. mit Cl₂, 3. mit Cl₂ + NaOH, 4. extrahiert (mit Ä.-A.), chloriert, mercerisiert, 5. extrahiert, chloriert, mercerisiert u. gebleicht; die erhaltenen Proben wurden unter gleichen Bedingungen nitriert u. bzgl. ihrer Eigenschaften u. ihrer Geeignetheit zur Herst. von Celluloid untersucht. Es ergab sich, daß die Proben 3. u. 4. genannten Verff. einer zur Darst. einer zur Herst. von Celluloid geeigneten Cellulose vollständig genügen. Das aus dieser Cellulose erhaltene Nitroderiv. ist derselben Qualität wie das aus Leinenpapier erhaltene. Zur Nitrierung wird meistens ein Gemisch von 41% H₂SO₄, 41% HNO₃ u. 18% H₂O bei gewöhnlicher Temp. benutzt. Da eine möglichst ungefärbte Cellulose zur Celluloidherst. erforderlich ist, wurde α -Cellulose vorher gebleicht u. dann nitriert, eine andere Probe wurde nitriert u. dann gebleicht (mit CaOCl₂); es ergab sich, daß im letzteren Falle ein Cl₂ u. eine längere Einw. erforderlich war, als in ersterem, wahrscheinlich weil hier noch Verunreinigungen beigemengt waren, die gleichfalls nitriert worden waren u. der Einw. von Cl₂ widerstanden. Bleichen von Nitrocellulose gibt ein unansehnliches Prod., die Lsg. zeigt keine Viscositätsabnahme; gebleichte Cellulose liefert ein Nitroderiv., dessen Lsg. geringe Viscosität zeigt. Wird eine Nitrocellulose mit einer COCl₂-Lsg. (1,8 g Cl₂ pro 100 ccm Lsg.) gebleicht, so erstarrt die danach hergestellte Acetonlsg. rasch gelartig, das Prod. ist sehr unbeständig. Wird dieses Nitroderiv. mit 1%ig. HNO₃ (10 Std.) gekocht, so zeigt es wieder dieselbe Viscosität der Lsg. u. die gleiche Stabilität wie vor dem Bleichen; aus der stark Cl₂-angereicherten Lsg. hat die Nitrocellulose Cl adsorbiert oder substituiert, u. dieses Cl bewirkt die Veränderung der Eigenschaften; durch Waschen mit k. W. oder H₂SO₄ wird es nicht entfernb. sondern nur durch sd. 1%ig. HNO₃. Gegen die oxydierende Einw. von CaOCl₂ scheint Nitrocellulose widerstandsfähiger zu sein als Cellulose. Bei der COCl₂-Lsg. kann zum Bleichen von Nitrocellulose auch KMnO₄ vorteilhaft benutzt werden, das in diesem Falle erhaltene Prod. ist stabil, die Entfernung der Nitroerb. ist jedoch schwierig. (Journ. Faculty of Engineering Tokyo Imp. Univ. 1924. 7—92. Tokio, Kaiserl. Univ.)

HABERLAND.

Leiter Berta Mesenholl, *Physikalische Daten über verschiedene Kunstseidenarten*. Je höher die Dehnung, desto fehlerfreier im Aussehen ist die Ware. Eine Versuchsmeinung zeigt, daß bei einer Anzahl untersuchter Proben die ausländ. Kunstseiden den deutschen an Dehnung u. Festigkeit überlegen waren. (MELLIANDS Textilber. 6. 24—25.)

SÜVERN.

Kustav Durst und Hans Roth, *Beobachtungen beim Chloren schlichtehaltiger Baumwollgewebe*. Eine Methode zur Best. sehr geringer Mengen Cl₂ in Geweben wird mitgeteilt. Eine Bindung von Cl₂ durch Stärke ist zu erwarten, das gebundene Cl₂ kann zu Schäden bei der Lagerung u. Weiterbehandlung der Ware führen. (MELLIANDS Textilber. 6. 23—24.)

SÜVERN.

B. Corey und H. Le B. Gray, *Mitteilung über die Herstellung von Standardcellulose*. II. (I. Mitt. vgl. Ind. and Engin. Chem. 16. 853; C. 1924. II. 1991.) Der Gehalt von Standardcellulose läßt sich durch Waschen mit 1%ig. Essigsäure bedeutend herabdrücken. (Ind. and Engin. Chem. 16. 1130. 1924. Rochester N. Y.)

GRIMME.

Wie unterscheidet man Seide von Kunstseide und mercerisierter Baumwolle? Angaben über äußere Unterscheidungsmerkmale u. einige Farbrk. (Ztschr. f. ges. Textilind. 27. 593—94. 1924.)

SÜVERN.

Auguste Seynave, Belgien, *Verfahren zum Konservieren von Pelzen und Fellen gegen das Ausfallen der Haare und gegen Mottenfraß*. Feingeschnittene wasserhaltige Seife wird mit einer wss. Lsg. von *K-Ditartrat* bei gelinder Hitze zusammen geschmolzen. Zu der wss. Seifenlsg. wird feingemahlenes $\text{Bi}(\text{NO}_3)_3$ (Spanisch Weis) zugesetzt u. noch kurze Zeit vorsichtig weiter erhitzt. Nach Zugabe größerer Mengen As_2O_3 wird nochmals kurz erwärmt. Die M. wird dann einige Tage an der Luft stehengelassen. — Zum Gebrauch wird das Mittel mit Regenwasser zu einer dünn streichfähigen Paste angerührt u. mit einer Bürste auf die Fleischseite des Fells oder des werks oder der Felle aufgetragen. Es dringt dann leicht in die Haut ein, greift hierbei die Haarwurzeln an u. sterilisiert diese vollkommen. (F. P. 545930 vom 14/1. 1922, ausg. 24/10. 1922. Blg. Prior. 14/1. 1921.) SCHOTTLÄNDER

Marcel Rogé, Seine, Frankreich, *Metallisieren von Stoffen*. Die für das Überziehen von Metallen, Eisen usw. bekannten Verff. durch Aufbringen mittels einer Stäubungsvorr. werden zum Metallisieren von pflanzlichen, tier. oder künstlichen Fasern benutzt. (F. P. 576241 vom 24/1. 1924, ausg. 13/8. 1924.) FRANZ

Hubert J. Boeken, Salatiga, Java, *Verfahren und Vorrichtung zur Fasergewinnung aus Pflanzenstengeln*. 1. Verf. zur Fasergewinnung aus den Stengeln der Ramiapflanze u. anderen holzigen Pflanzenstengeln, dad. gek., daß die Stengel mit Fl. getränkt, dann mechan. flachgedrückt, vorgeknickt u. durch Schaben von der äußeren, firnisartigen Rindenschicht befreit u. gebrochen werden u. daß schließlich durch mechan. Schütteln oder Schlagen die nun freigelegten Fasern von den gebrochenen Holz- u. Markteilen befreit werden. — 2. Vorrr., gek. durch ein Paar in den Stengel flachdrückende, vorknickende u. ihre firnisartige Rindenschicht abschabende Vorschubwalzen, ein Paar ihnen folgende, mit größerer Umfangsgeschwindigkeit als die Vorschubwalzen umlaufende Zugwalzen, zwei einen Führungsspalt für den von den Zugwalzen kommenden Stengel bildende Lippen, zwei hinter den Lippen schwingende Brechleisten u. eine um die Brechleistenachse schwingende oder drehende Schüttelschlagvorr. — 3. dad. gek., daß dem Walzenpaar ein die Stengel flachdrückendes Walzenpaar angeordnet ist. (D. R. P. 408195 Kl. 29a vom 28. 12. 1923, ausg. 9/1. 1925.) KAUSCH

Zellstoffabrik Waldhof und Franz Siegmund, Mannheim-Waldhof, und **Adolf Schneider**, Kelheim a. Donau, *Zellstoffkochverfahren* nach Pat. 406445, 1. dad. gek., daß die die Lauge enthaltenden Wärmespeicher mit W. enthaltenden Wärmespeichern unter Verwendung von Dampfmengenregelorganen so zusammengeschaltet werden, daß die Dampfverbrauchsschwankungen von dem Laugewärmespeicher mit dem Wasserpärmespeicher oder von beiden aufgenommen u. ausgeglichen werden. — 2. dad. gek., daß die beim Entspannen der Laugebehälter entwichene Menge O₂ durch Einpressen von SO₂ wieder zugeführt wird. — Die Frischlauge kann in kürzerer Zeit als es nach dem Hauptpat. möglich ist, angeheizt werden. (D. R. P. 407278 Kl. 55b vom 13/6. 1922, ausg. 10/12. 1924. Zus. zu D. R. P. 406445; C. 151. 798) OELKE

Akt.-Ges. für Anilin-Fabrikation, Berlin-Treptow, (übert. von: **W. Bolz** in Schlachtensee b. Berlin), *Kunstseide*. Zur Herst. von Kunstseide von 2,5–6 Dens aus Viscoselsgg. wird ein Fällbad mit 110–160 g H_2SO_4 auf den l u. einem al. (Na_2SO_4) in solcher Menge angewendet, daß die D. 1,32–1,42 beträgt. (F. P. 224885 vom 7/11. 1924, Ausg. veröff. 14/1. 1925. Prior. 14/11. 1923.) KAUSCH

Société Française des Crins Artificiels, Paris, Frankreich, *Erhalten der Wassergehaltes von Häutchen aus Cellulosehydrat*. Man trinkt die Cellulosehäutchen mit einer 40%ig. Lsg. von MgCl_2 u. spült, die Häutchen können aufbewahrt werden ohne daß sie schrumpfen oder faulen; vor dem Gebrauch, z. B. als Flaschenverschlüsse werden die Cellulosehäutchen zur Entfernung des MgCl_2 in W. gelegt. Anstelle

MgCl₂ können andere gleichwirkende Stoffe verwendet werden. (E. P. 224487 vom 14/12. 1923, ausg. 7/1. 1924. F. Prior. 8/11. 1923.) FRANZ.

Société des Etablissements Wanner, Seine, Frankreich, *Korkmassen*. Fein geleinertes Kork wird in beheizten drehbaren Trommeln mit den Bindemitteln, die in die Trommel in festem, fein pulverisiertem Zustand eingeblasen werden, gemischt; die erhaltene gleichmäßig mit dem Bindemittel imprägnierte Korkpulver wird dann in Matten usw. gepreßt. Vor dem Mischen mit dem geschmolzenen Bindemittel hat das Verf. den Vorzug der Ersparnis an Bindemittel u. Wärme, außerdem besitzt die Prod. ein erhöhtes Isoliervermögen gegen Wärme. (F. P. 575737 vom 11/1. 1923, ausg. 5/8. 1924. Schwz. Prior. 28/7. 1923.) FRANZ.

K. Brennstoffe; Teerdestillation; Beleuchtung; Heizung.

Matthijs Miechielsen und Jürgen Max Herbert Spiesen, Rotterdam, *Herstellung von hochwertigen Brennstoffen*. Torf wird nach einer Erwärmung auf etwa 100° mit Öl unter Druck getränkt u. dann einer schwachen Verkokung unterworfen. (E. P. 6693 vom 13/3. 1920, ausg. 15/7. 1922. D. Prior. 12/12. 1919.) OELKER.

André Manéa, Rumänien, *Herstellung bitumenähnlicher Stoffe*. Rohpetroleumöle werden durch Dest. bis 274° unter Zusatz von fein pulverisierten CaCO₃ von niedrig siedenden KW-stoffen befreit u. dann mit Schwefel auf 150° erhitzt. (F. P. 25267 vom 17/1. 1921, ausg. 23/1. 1923. Zus. zu F. P. 527311.) FRANZ.

Jules Joseph Marié, Seine-et-Oise, Frankreich, *Ununterbrochene Destillation von Erdöl-, asphalt- oder bitumenhaltigen Gesteinen oder freien Bitumen*. Man bringt bitumenhaltigen Stoffe von oben in einen vertikalen, cylindr., gemauerten Ofen, dessen Mitte etwas verengt ist. Die für die Dest. erforderliche Wärme wird in der verengten Mitte des Ofens durch Verbrennen der in dem Gestein enthaltenen brennbaren Stoffe erzeugt, die Temp. wird, nötigenfalls durch Verdünnen mit Verbrennungsgasen, so niedrig gehalten, daß ein Spalten der abdestillierenden KW-stoffe nicht eintritt. (F. P. 561450 vom 26/1. 1923, ausg. 22/10. 1923.) FRANZ.

Fred E. Hosmer, Shreveport, Louisiana, *Gewinnung von Gasolin*. Das zum Abrieren natürlicher Gase benutzte Öl wird stufenweise bei allmählich abnehmendem Druck in feinen Schichten ausgebreitet, indem man es z. B. in geeigneten Vorr. über geneigt angeordnete Platten rieseln läßt. Die in der ersten Stufe entwickelten Gase werden dabei dem in einer späteren Stufe behandelten Öl zugegeben u. dann zusammen mit den in dieser späteren Stufe entwickelten Gasen einem Kondensationsapp. zugeführt. (A. P. 1510434 vom 6/6. 1923, ausg. 10/1. 1924.) OELKER.

Hans Goldschmidt, Berlin, und **Oskar Neuss**, Charlottenburg-Westend, *Verfahren zur Gewinnung von benzinartigen Kohlenwasserstoffgemischen*, dad. gek., daß man niedermolekulare, im besonderen durch pyrogene Spaltung erhaltene, ungesättigte KW-stoffe mit trockenem HCl bei Temp., die eine Zers. der KW-stoffe u. die B. wesentlicher Mengen von Cl-Verbb. ausschließen, über Fe oder ähnlich wirkende Metalle leitet. — Man leitet z. B. über Fe-Drehspäne oder Fe-Drahtnetz, die in einem elektr. auf 270—350° erhitzten Rohr ausgebreitet sind, gleichzeitig die Dämpfe eines sogenannten *Crackingnaphtha*, Kp. 60—150°, Jodzahl 7,873, u. HCl-Gas in einem Strom. Die entweichenden Dämpfe werden in einem Kühler kondensiert, der Kondensat in einem Sammelgefäß aufgefangen, während die überschüssigen KW-Gase wieder in den Kreislauf zurückgeführt werden. Man erhält nach der Reifekation des Kondensats eine farblose Fl., Kp. bis zu 150°, mit den physikal. Eigenschaften von *Benzinen*. An Stelle von Fe kann man auch Ni, Co, sowie Zn als Katalysatoren verwenden. Das Verf. erschließt ein neues Verwendungsgebiet für das oft als Nebenprod. abfallende HCl-Gas. (D. R. P. 402991 Kl. 12o vom 14/1. 1920, ausg. 19/9. 1924.) SCHOTTLÄNDER.

Alfred George Saunders, Adelaide, Süd-Australien, *Künstlicher Asphalt* welcher durch Vermischen von fein zerteiltem u. mit W. befeuchtem CaCO_3 , einer Harz, Bitumen, Teer u. Mineralöl enthaltenden Fl. erhalten wird. (Austr. 11370 vom 6/3. 1923, ausg. 26/6. 1923.) OELKE

A. V. Lipinsky, Zürich, Schweiz, *Gewinnung von Ölgas mittels trock. Destillation von Ölen, insbesondere dickflüssiger Mineralrückstände*. (D. R. P. 405 Kl. 26a vom 17/8. 1920, ausg. 31/10. 1924. — C. 1922. IV. 1151.) OELKE

Leopold Siederer, Wien, *Herstellung einer einweißhaltigen Imprägnierflüssigkeit für die Behandlung der Oberfläche zu prägender Hölzer*, 1. dad. gek., Casein, MgO , Na_2CO_3 , $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7$ u. W. miteinander vermenzt werden. — 2. dad. bestehend, daß das Gemenge aus 10 Teilen Casein, 10 Teilen MgO , 5 Teilen $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7$ u. 100 Teilen W. hergestellt wird. — Bei Anwendung der Imprägnierungsfl. hat die Prägung des Holzes, auch wenn bei höherer Temp. gearbeitet wird, keine Dunkelfärbung der Oberfläche zur Folge. Das Holz wird der Prägung auf der zu bearbeitenden Seite mit der Fl. bestrichen u. hierauf der Luft gut getrocknet. Hierauf wird es durch eine Prägevorr. bekannter bei ca. 160° durchgezogen. Die durch die Imprägnierung dem Holze einverleibte Stoffe bewirken, daß das Holz, ohne rissig zu werden, dem Drucke nachgibt u. die Vertiefungen des Prägestempels eindringt u. durch die große Hitze beim Pressen weder versengt wird, noch an seiner Farbe leidet, so daß die geprägten Holzglanz annehmen, aber ihre Naturfarbe behalten. (Oe. P. 96684 vom 29/11. 1924, ausg. 25/4. 1924.) SCHOTTLÄNDER

J. D. Riedel Akt.-Ges., Berlin-Britz, *Brennstoff für Explosionsmotoren* gemäß Pat. 367128, dad. gek., daß der Brennstoff aus Gemischen von Methyl- u. Dimethylcyclohexanen u. anderen an sich bekannten Motorenbetriebsstoffen besteht. — Es können auch im Gemisch mit den besagten Cyclohexanen solche organ. Stoffe als Betriebsstoffe verwendbar werden, welche ihrer hohen Siedegrenzen halber bisher weiteres heute im Explosionsmotor nicht benutzt werden können, wie z. B. Petrolnaphtha, Amylalkohol, Cyclohexanole etc. (D. R. P. 405750 Kl. 46d vom 3/2. 1923, ausg. 6/11. 1924. Zus. zu D. R. P. 367128; C. 1923. IV. 306.) OELKE

Paul Kestner, Frankreich, *Herstellung eines aus Alkohol und Äther bestehenden Gemisches*. Man unterwirft Alkoholdämpfe einer unvollständigen katalyt. Zersetzung, rektifiziert diese Dämpfe zwecks Entfernung des W. — Man dest. z. B. entwässerten Handelsalkohol u. leitet die Dämpfe zunächst über eine Al_2O_3 enthaltende Katalysatormasse u. dann durch einen Kühler u. eine Rektifizierkolonne, oder setzt den Katalysator unmittelbar am Austritt der Destillierkolonne zwischen dieser u. der Rektifizierkolonne bei der Herst. des A. selbst ein. Das bei der Rk. gebildete W. wird beim Rektifizieren kondensiert, während das A.-Ä.-Gemisch entweicht u. als solches oder im Gemisch mit KW-stoffen u. anderen flüchtigen brennbaren Prodd. als *Motortreibmittel* oder als *Ersatz für Brennstoffe* Verwendung. Die bisher erforderliche, unwirtschaftliche besondere Zumischung von fertigem Ä. zu dem A. wird so vermieden. (F. P. 556184 vom 14/12. 1921, ausg. 13/7. 1923.) SCHOTTLÄNDER

Établissements Eugène Maréchal et Fils, Rhône, Frankreich, *Herstellung eines Motortreibmittels und eines Terpentinersatzes*. Man vermischt Petroleum, Terpentinöl, Schieferöl usw. mit A. u. H_2 in Ggw. von Katalysatoren, Ni, Cu usw., die entstehenden Dämpfe werden über Kalk, CaC_2 usw. u. dann durch ein Feinfilter, Bimsstein, Holzkohle usw. geleitet. (F. P. 556395 vom 31/12. 1921, ausg. 1/7. 1923.) FRANZ

Bernhard Trachtenberg, Seine, Frankreich, *Motortreibmittel*. Man vermischt Steinkohlenteeröle, Kp. $180-300^\circ$, die das gesamte Naphthalin enthalten können

gereinigtem Mineralöl oder A. oder Bzl. (F. P. 567 652 vom 20/6. 1923, ausg. 1/3 1924.) FRANZ.

Explosions-Turbine Studiengesellschaft m. b. H., Berlin-Wilmersdorf, *Motor* mittel. Man emulgiert einen fl. KW-stoff in W. mittels Seife u. einem anderen Emulgiermittel mit Ausnahme von A. (Holl. P. 10330 vom 14/4. 1914, Auszug erf. 15/4. 1924. D. Prior. 15/4. 1913.) FRANZ.

Hudson Maxim, Hopatcong Borough, N. J., V. St. A., *Flüssiger Brennstoff* zu Treiben von Torpedos, welcher aus einer Lsg. von NH_4NO_3 u. einem geeigneten Brennstoff, wie z. B. A. oder einer Mischung von NH_4NO_3 , W., A. u. Dinitro-*pyrin*, besteht. (A. P. 1512354 vom 23/2. 1921, ausg. 21/10. 1924.) OELKER.

James Reuben Rose, Edgeworth, Pa., und **John Harris**, Lakewood, Ohio, V. St. A., *Gasförmiger Brennstoff*, welcher für Sauerstoffgebläse Verwendung finden soll, aus einem Gemisch von H_2 mit einem KW-stoff oder einem KW-stoff-Deriv. besteht, in dem der Gehalt an letzteren nicht weniger als 5 u. nicht wesentlich mehr als 15% beträgt. (E. P. 205543 vom 12/7. 1922, ausg. 15/11. 1923.) OELKER.

Hans Bähr, Bochum i. Westf., *Einrichtung zur Untersuchung der Brennstoffeigenschaften, bestehend aus einem mit Wärmemesser ausgestatteten Verbrennungs-Ofen* und Vorrichtungen zur Analyse der Verbrennungsprodukte, dad. gek., daß der Verbrennungs-Ofen 3 oder mehr Quarzrohre aufweist, von denen eins den Wärmemesser, z. B. ein Thermoelement, u. die übrigen die zu untersuchenden Stoffe aufnehmen u. mit den die einzelnen Gasbestandteile des Verbrennungsprod. (z. B. CO , CO_2 usw.) analysierenden Vorr. durch Rohrleitungen in Verb. stehen. (D. R. P. 304 50 Kl. 42i vom 18/11. 1923, ausg. 18/9. 1924.) KÜHLING.

XXI. Leder; Gerbstoffe.

P. Pawlowitsch, *Über die Verwendung der ausgelaugten Holzspäne der Extraktfabriken*. Wärmetechn. Studie, in der rechnerisch gezeigt wird, daß es am besten ist, die mit etwa 60% W. aus der h. Extraktion anfallenden Eichen- u. Kastanienholzspäne nicht vor der Verfeuerung zu trocknen, sondern auf einem vom Verf. ers. konstruierten Rost unter dem Dampfkessel zu verbrennen. (Collegium 1922 274—81. Taganrock [Rußland].) GERNGROSZ.

J. van der Hoeven, *Untersuchungen der mit einigen synthetischen Gerbstoffen hergestellten Leder, mit besonderer Berücksichtigung der Bestimmung freier Schwefelsäure*. (Vgl. Collegium 1924. 251; C. 1924. II. 1651.) Ebenso wie beim Neradol D-*erbstoff* ergab die Unters. von Neradol ND-, Ordoval G- u. Gerbstoff F-Ledern Abwesenheit von freier H_2SO_4 u. Na_2SO_4 . Hingegen war in dem mit W. ausge-*gogen* Leder u. im dabei erhaltenen wss. Auszug auf SO_3 berechnet enthalten:

Leder	Sulfosaures Salz	freie Sulfosäure
Neradol ND-Leder	0,54% SO_3	4,87% SO_3
Ordoval G-Leder	0,02 „ „	1,74 „ „
Gerbstoff F-Leder	0,23 „ „	2,69 „ „

Wässeriger Auszug	Sulfosaures Salz	freie Sulfosäure
Neradol ND-Leder	0,42% SO_3	1,33% SO_3
Ordoval G-Leder	0,73 „ „	1,15 „ „
Gerbstoff F-Leder	0,90 „ „	1,15 „ „

Collegium 1924. 281—84. Walwijk [Holland], Reichsvers.-Anst. f. Lederind.) GERN.

C. Smoot, *Bemerkungen über das Blackadder Colorimeter*. Das von BLACKADDER angegebene Colorimeter zur Best. der Farben aller Gerbereifl. wird auf der 21. Jahresversammlung der Amer. Leather Chem. Assoc. in Springlake, N. J.,

Juli 1924 als gut brauchbar bezeichnet. (Journ. Amer. Leather Chem. Assoc. 571—73. 1924.)

GERNGROS

Ahmed Labib el Batanouni, Bordeaux, Frankreich, *Weichen von Schaffellen*. Beim Weichen von Schaffellen mit W. wird diesem Cl_2 als Hypochlorit oder irgend einer anderen Form zugesetzt. Hierdurch werden die Häute gegen Fäulnis geschützt u. weichgemacht, sowie gleichzeitig die Wolle gebleicht. (F. P. 556 vom 24/7. 1922, ausg. 23/7. 1923.)

SCHOTTLÄNDER

Alfred Ehrenreich und **Kristian Bendixen**, Paris, Frankreich, *Gerben von Fischhäuten, insbesondere von Haifischhäuten*. Man behandelt die mit der stacheligen Oberhaut versehenen rohen Fischhäute mit *vegetabil. Gerbextrakten*. Die vollständig durchgerbten Häute werden hierauf im rotierenden Gerbfaß mit HCl 18 B. gehandelt. Hierdurch werden die Stacheln der Oberschicht derart gelockert, daß sie leicht auf mechan. Wege, z. B. durch mehrmaliges Auswaschen mit w. W., zuletzt $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7$ zugesetzt wird, im rotierenden Faß, entfernen kann. Hierauf wird das Leder auf der Oberseite nach Bedarf mit organ. Farbstoffen gefärbt, abgetrocknet u. getrocknet. — Man kann die Stacheln auch vor der Gerbung entfernen, was einen Vorteil bietet, daß man alsdann auch andere Gerbmittel verwenden kann. Hier werden die geweichten Häute mit $\text{Ca}(\text{OH})_2$ u. alsdann mit einem Gemisch aus Na_2CO_3 -Lsg. u. HCO_2H oder einer anderen verd. organ. Säure behandelt. Nach genügender Lockerung der Hautstacheln, werden die Häute mit Salzlauge versetzt, bis zur Entfernung der Stacheln in einer Trommel mit w. W. behandelt u. schließlich mit Na_2CO_3 -Lsg. neutralisiert. Die Gerbung erfolgt dann in beliebiger Weise. (H. P. 573921 vom 29/11. 1923, ausg. 2/7. 1924.)

SCHOTTLÄNDER

Josef Häusler, Wien, *Herstellung fester Gerbextrakte* durch Einw. eines erwärmten Luftstromes auf die zerstäubte gerbstoffhaltige Fl., dad. gek., daß ein stetig erneuter Luftstrom den in fortschreitender Richtung ziehenden Nebelschwaden mit einer die Geschwindigkeit dieses Schwadens übersteigenden Geschwindigkeit durchzieht, wobei die Temp. während der Trocknung auf 25—40° gehalten wird. — Z. B. wird eine in bekannter Weise durch Auslaugen von Eichenrinde aus Eichenlohe hergestellte 9,12% Gerbstoff, 6,99% Nichtgerbstoff, 83,45% W. u. 0,4% unl. enthaltende Brühe bei 15° u. n. Außentemp. bei relativer Luftfeuchtigkeit von 90% in einer Kammer versprüht, zweckmäßig durch Zerstäubung mit Preßluft auf den versprühten Brühenstaub Trockenluft von ca. 30° unter ständiger Erneuerung des Trockenluftstroms zur Einw. gebracht, wobei der Wassergehalt des Brühenstaubes ständig verdunstet u. aus der Kammer abgeführt wird, während die festen Bestandteile der Brühe sich als mehlartiges Pulver am Boden der Kammer absetzen u. von dort entleert werden können. Der eine helle, gelbe Farbe besitzende Festextrakt enthält dann nur 7,58% W., dagegen 50,54% Gerbstoffe, 39,9% Nichtgerbstoffe u. 1,97% unl. Prodd. Gegenüber den üblichen Eindampfverfahren der Luft oder im Vakuum wird so eine Oxydation der wertvollen Gerbstoffe durch O_2 , sowie die sonst erforderliche Zerkleinerung der steinharten trockenen Massen in Desintegratoren vermieden. (Oe. P. 97386 vom 18/12. 1918, ausg. 1/1. 1924.)

SCHOTTLÄNDER

James S. Marrs und **Robert M. Morris**, St. Louis, Missouri, U. S. A., *Verfahren zum Ausbessern von Ledergegenständen*, bestehend aus Carnautawachs, Bienenwachs, Schellackwachs, Ceresinwachs, Schellack, Terpentin u. Farben, die M. während des erwärmten Zustandes auf die schadhaften Stellen des Leders aufgetragen u. abgerieben. (A. P. 1506983 vom 28/3. 1921, ausg. 2/9. 1924.)

FRAN

James Hardie & Company Proprietary Limited, Melbourne Victoria, Australien (Erfinder: **David Brendon Doyle**, Brighton, u. **Percy Evans**, Kew, Victoria)

Koholyt-Akt.-Ges., Berlin, Herstellung wasserlöslicher Produkte aus Säureharzen, (d. gek., daß die aus der Reinigungsschwefelsäure durch Verblasen mit Wasser auf erhaltene schwarze Substanz mit naszierendem Cl_2 behandelt wird. — 2. dadurch daß die unter Vermeidung einer Temperaturerhöhung aus der Säure abgehilene organ. Substanz nacheinander mit H_2SO_4 u. Cl_2 behandelt wird. — Z. B. ein Säureharz aus der bei der Benzolreinigung abfallenden H_2SO_4 in 20%ig. HCl suspendiert u. sd. h. mit KClO_3 versetzt, — oder das Harz wird zunächst mit roher H_2SO_4 auf 160—170° erhitzt, wobei unter starker SO_2 -Entw. u. Aufschäumen heftige Reaktionsintritt u. eine trockene, krümelige M. entsteht, die nach Waschen mit W. gepulvert, vermahlen u. mit HCl u. KClO_3 behandelt wird. Das mit verd. HCl gewasene, dunkelbraun gefärbte Reaktionsprod. ist nach dem Trocknen bei 100° in k. W. u. enthält ca. 20% Cl . — Erwärmt man das Säureharz einige Stdn. in 20%ig. Oleum auf 40—50°, gießt die Lsg. auf Eis u. chloriert in der Hitze mit Cl_3 u. NaCl , so entsteht ein braunes in W. l. Prod. mit 27,7%, das gute Emulsion zeigt. Die wss. Lsgg. der Prodd. finden zur Herst. von Gerbstoffen u. Farbstoffen techn. Verwendung. (D. R. P. 403647 Kl. 12o vom 22/2. 1921, ausg. 1/91924.)

SCHOTTLÄNDER.

Raymond Hertwig, *Bestimmung von Zink und Kupfer in Gelatine und Leim*.
 Unversetzt 20 g, nimmt mit wenig HCl auf, fällt Fe u. Al mit NH_3 , im Filtrat
 Cu in salzsaurer Lsg. mit H_2S , u. im essigsauer gemachten Filtrate hiervon
 mit H_2S . Das Verf. ist schnell ausführbar u. gibt mit den bisher dazu ge-
 machten umständlichen Verff. übereinstimmende Werte. (Journ. Assoc. Official
 Analysts Chemists 7. 41—43. 1923. San Francisco [Cal.]) RÜHLE.

skar Bornhauser, Frankfurt a. M., Herstellung eines wasserfesten Leimes aus Albuminoiden z. B. gehärtetem Leim, koaguliertem Casein oder Eiweiß, dad. gek., dann das Albuminoid in geringen Mengen wasserfreier, leicht schmelzbarer Säure auflöst, gegebenenfalls unter gleichzeitiger Auflösung von isolierfähigen Stoffen, z. B. Harzen, oder von elast. Stoffen, z. B. Kautschuk, oder von wasserfesten Stoffen, z. B. Paraffin. — Die so hergestellten Lsgg. sind selbst in der Konz. noch genügend dünnflüssig, so daß die damit hergestellten Bindungen keine erhebliche Schwindung zeigen. (D. R. P. 405532 Kl. 22i vom 3/1. 1923, ausl. Pat. 11 (1924).) OELKER.

E. de Haën, Chemische Fabrik „List“ G. m. b. H., Seelze b. Hannover, Friedrich Harbach, Offenbach a. M., Herstellung von leuchtendem Insektenleim. 1. dad. gek., daß ein *Chlorparaffin* als wesentlichen Bestandteil enthaltender Leim in an sich bekannter Weise mit Leuchtfarbe gemischt oder getrennt von derselben in beliebigem Wechsel mit ihr streifen- oder felderförmig auf Träger aller Art aufgebracht wird. — 2. dad. gek., daß ein derart zusammengesetzter Leim auf eine mit Leuchtfarbe bestrichene Fläche beliebiger Form gezogen wird. — Die mittleren chlorierten Paraffine mit etwa 40% Cl-Gehalt zeigen gute Klebkraft, vorzügliche, fast farblose Durchsichtigkeit u. besitzen gegenüber den Leinölen die Eigenschaft niemals zu trocknen. Gegenüber den hochempfindlichen Leuchtfarben, wie den Erdalkalisulfiden, verhalten sie sich vollständig indifferent. Ein Leim wird 44% Cl enthaltendes Chlorparaffin mit wenigen Tropfen Benzoylbutyrat versetzt u. mit einer blauen Leuchtfarbe bei 50° gründlich durchmischt, worauf der Leim gebrauchsfertig ist. Der Leuchtmasse können auch Natur- u. Kunstharzsaure Alkalien, sowie die Kondensationsprodd. aus Phenolen u. Aldehyden zugesetzt werden, soweit sie nicht ein schnelleres Auftrocknen bewirken, zugesetzt werden. (D. R. P. 400225 Kl. 451 vom 21/12. 1921, ausg. 4/8. 1924.) SCHOTTLÄNDER

Erich Schmidt, Charlottenburg, Herstellung von Präparaten tierischer Gewebesubstanzen. Zu dem Ref. nach E. P. 189742; C. 1923. II. 934 (vgl. auch Schmidt u. Braunsdorf, Ber. Dtsch. Chem. Ges. 55. 1529; C. 1922. III. 520) ist folgendes nachzutragen: Die Behandlung der tier. Gewebe mit $\text{ClO}_2 + \text{CH}_3\text{CO}_2\text{H}$ ermöglicht eine genauere Unterscheidung der einzelnen Gerüstbestandteile, wie Muskelfaser, Nerven, bei Betrachtungen u. Mk. Insbesondere tritt hierdurch niemals eine Ablagerung u. dadurch Unkenntlichmachung der behandelten Teile ein. — Das Verfahren eignet sich ferner zur Entfärbung u. Reinigung von *Albuminoiden*, insbesondere von *Gelatine* u. *Leim*. An Stelle von $\text{ClO}_2 + \text{CH}_3\text{CO}_2\text{H}$ kann man auch eine wässrige Lösung von *Chlordioxyd* oder Lsgg. des ClO_2 in substituierten Essigsäuren oder anderen organ. Säuren u. deren Substitutionsprodd. verwenden. Auch Gemische mehrerer Säuren in verd. oder konz. Zustand sind als Lösungsmittel geeignet, z. B. 40 Teile $\text{CH}_3\text{CO}_2\text{H}$, 10 Teile $\text{Cl} \cdot \text{CH}_2 \cdot \text{CO}_2\text{H}$ u. 50 Teile W. (D. R. P. 400224 Kl. 451 vom 2/12. 1921, ausg. 2/8. 1924. F. P. 550213 vom 14/4. 1922, ausg. 1/3. 1923. D. P. 400211 vom 1/12. 1921 u. 6/2. 1922.) SCHOTTLÄNDER

Fred Curtis Thornley, Frank Ford Tapping, Knightsbridge, London, Otto Reynard, London, Klebmittel aus Seetang. Der frisch geschnittene Seetang wird durch Mazerieren u. Mahlen in einen Zustand kolloidaler Feinheit übergeführt u. dann mit einer Alkaliverb. behandelt, um die Alginsäure in ein Alginat zu verwandeln. (A. P. 1509035 vom 10/12. 1923, ausg. 16/9. 1924.) OELKAMP

Oskar Svensson, Daglös, Schweden, Klebmittel, welches insbesondere zum Zusammenkleben von Leder-, Holz- u. Porzellanwaren dienen soll, bestehend aus einer Auflsg. von Nitrocellulose u. Ammoniakgummi in Aceton. (Dän. P. 350211 vom 7/5. 1923, ausg. 5/5. 1924.) OELKAMP

Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Leverkusen b. Köln a. Rh. (Erfinder: Hermann Weyland, Elberfeld), Kitten für technische Zwecke, besonders auch für die keram. Industrie, bestehend aus den gemäß den Verff. des Pat. 385049 (C. 1924. I. 1973) u. Zusatzpat. 396049 (C. 1924. II. 1369) herstellbaren Silicazementen u. gemischten Silicatphosphatzementen. (D. R. P. 403214 Kl. 221 vom 23/2. 1919, ausg. 25/9. 1924.) OELKAMP

Max Samec, Ljubljana, Jugoslawien, Darstellung von Gallerten aus hochmolekularen Polysacchariden, 1. dad. gek., daß diese mit durch W. zersetzlichen Polysacchariden von mehrbas. Säuren unter Kühlung behandelt werden. — 2. dad. gek., daß die Einw. der Säurechloride in Ggw. von Zusätzen (wie Carbonaten) bewirkt wird.

in Sauerwerden des Reaktionsgemisches verhindern. — 3. dad. gek., daß die des Chlorides durch Verwendung eines in W. nicht oder wenig l. Lösungsm. eig. gehalten wird. — Die Prodd. sollen als Klebmittel, Verdickungsmittel für rufarben in der Zeugdruckerei etc. Verwendung finden. (D. R. P. 402644 l. 2i vom 18/2. 1922, ausg. 18/9. 1924. Oe. Prior. 30/6. 1921.) OELKER.

XXIII. Tinte; Wichse; Bohnermassen usw.

George K. Burgess, *Amtliche Vorschriften der Vereinigten Staaten für Urkunden- und Schreibtinte*. Vorschrift für Herst. einer Fe-Gallustinte u. ihre Prüfung. Department of commerce. Circular of the bureau of standards, 1924. No. 182. (Sen. Sep.) SÜVERN.

George K. Burgess, *Amtliche Richtlinien der Vereinigten Staaten für Schreib- und Drucktinte*. Vorschrift für die Herst. der Tinte u. Hinweise für Probenahme u. Prüfung. Department of commerce. Circular of the bureau of standards, 1924. No. 183. (Sen. Sep.) SÜVERN.

George K. Burgess, *Amtliche Vorschriften der Vereinigten Staaten für Stempel- und Druckfarbe*. Vorschrift für verschiedene Farben u. ihre Prüfung. (Department of commerce. Circular of the bureau of standards, 1924. No. 185. 3 Seiten.) SÜVERN.

George K. Burgess, *Amtliche Vorschriften der Vereinigten Staaten für Schreib- und Druckmaschinenbänder*. Vorschriften für verschiedene Arten von Schreibmaschinenbändern u. die dafür verwendeten Farben u. Angaben über ihre Beurteilung. Department of commerce. Circular of the bureau of standards, 1924. No. 186. (Sen. Sep.) SÜVERN.

George K. Burgess, *Amtliche Vorschriften der Vereinigten Staaten für Bänder und Registriermaschinen*. Angaben über Herst. der Bänder u. ihre Prüfung. (Department of commerce. Circular of the bureau of standards, 1924. No. 187. 8. 4 Seiten, Sep.) SÜVERN.

Runo Walther, *Ein Beitrag zur Tintenfabrikation*. Die Richtlinien für die Herstellung von Tinten sind veraltet. Auch Tinten, die nicht zu den Eisengallusprodd. gehören, können hervorragende Echtheit aufweisen. Bei Aufstellung neuer Richtlinien ist folgendes zu berücksichtigen: 1. Fortfall der chem. Prüfung. 2. Prüfung der Tinte auf Qualität, an die die physikal. Anforderung der Urkundentinte zu stellen ist. Daneben muß eine Prüfung der Schreibfedern eingeführt werden. (Chem. Ztg. 19. 17—18. Köln.) JUNG.

M. Davidson, New York, *Tinte*. Man mischt A., ein Alaun bildendes Salz $\text{Cr}_2[\text{SO}_4]_3$, $\text{Fe}_2[\text{SO}_4]_3$, eine organ. Säure (Oxalsäure) u. einen bas. Teerfarbstoff (Anilinpurpur, Anilin- oder Methylenblau). Der Tinte können Verdickungsmittel wie eine Gummi arabicumslsg. zugesetzt werden. (E. P. 217053 vom 18/6. 1923, ausg. 3/7. 1924.) KAUSCH.

Federikke Jørgensen, Soeby, Dänemark, *Bohnermasse*, bestehend aus einem Gemisch von Wachs, Paraffin, Stearin, Kartoffelmehl, Salz u. Bzn. (Dän. P. 31654 vom 3/6. 1922, ausg. 7/5. 1923.) FRANZ.

Aggo Valdemar Andresen, Kopenhagen, *Herstellung eines Härte- und Schleifmittels für Gegenstände aus Elfenbein und anderen Knochenmassen*. (D. R. P. 388330 Kl. 39b vom 1/3. 1921, ausg. 11/1. 1924. Dän. Prior. 11/11. 1920. D. R. P. 386339; C. 1924. I. 2614. — C. 1924. I. 2614.) FRANZ.

Hermann Koelsch, Nürnberg, *Herstellung eines mit Wasser anzurührenden Schleifmittels* das ein Schleifmittel, z. B. Kieselkreide, u. ein Emulgierungsmittel, z. B. Seife enthält, dad. gek., daß dem Emulgierungsmittel ein Stoff zugesetzt wird,

der die Löslichkeit des Emulgierungsmittels in W. befördert. — Beispielsweise werden etwa 5 Teile *Methylhexalin* u. etwa 5 Teile *Ölsäure* gemischt, mit 1 NaOH verseift u. mit etwa 90 Teilen Kieselkreide verrieben. (D. R. P. 39 Kl. 22g vom 26/11. 1922; ausg. 29/3. 1924.)

Joseph Lalonde, Ottawa, Canada, *Poliermittel*, welches aus einer Mischung von Leinöl, $\text{CH}_3\cdot\text{COOH}$, CH_3O_2 , Antimonbutter, Weinessig u. Tripel besteht. (Can. P. 238035 vom 23/4. 1923, ausg. 26/2. 1924.)

Cora L. Olsen, Los Angeles, California, V. St. A., *Poliermittel* bestehend aus $\frac{2}{3}$ Kreide u. $\frac{1}{3}$ Na_3PO_4 . (Can. P. 238679 vom 13/3. 1923, ausg. 18/3. 1924.)

XXIV. Photographie.

Rotopulsor A.-G., Schaffhausen, Schweiz, und **Raphael Liesegang**, Frankfurt a. M., *Herstellung matter und halbmatter Gelatineschichten*, gek. durch Zusatz von Kautschuklatex zu der zu vergießenden Gelatineslg. — Das Glänzen der Lichtbilder wird vermieden, ohne daß die Kraft des Bildes leidet. (D. R. P. 402767 Kl. 57b vom 27/10. 1923, ausg. 18/9. 1924.)

Jens Herman Christensen, Holte, Dänemark, *Herstellung wasserunlöslicher Mehrfarbenraster* unter Benutzung von in Alkoholen oder NH_3 gel. Verb. d. Farbstoffe mit Gerbsäure oder Molybdän-, Wolfram- oder Phosphorwolframsäure. — dad. gek., daß die Emulsionierung in einer neutralen dicken Fl., z. B. in Kautschuklsg., der auch eine Harzlsg. zugesetzt werden kann, vorgenommen wird, worauf die Farbkörperchen auf eine neutrale Unterlage, wie Glas, Nitrocellulose u. dgl. aufgebracht u. eingetrocknet werden. — Durch die Verwendung neutraler Unterlagen wird die Herst. der Raster gegenüber den bekannten Verff. sehr vereinfacht. (D. R. P. 403590 Kl. 57b vom 2/6. 1923, ausg. 29/9. 1924.)

Polygraphische Gesellschaft, Laupen, Schweiz, *Herstellung von Negativen* von Originalen, die ein Durchlichten nicht gestatten, unter Verwendung von Kollodialsilberemulsion, dad. gek., daß die von der Rückseite belichteten u. entwickelten Silberhaloidnegative von dem Schichtträger auf unpräpariertes d. scheinendes Papier ohne Verwendung eines Klebmittels abgezogen werden. — Dadurch erhältlichen Negative lassen sich bei kurzer Belichtungszeit auf einen Druckträger kopieren u. gewährleisten getreue Wiedergabe. (D. R. P. 403639 Kl. 57b vom 14/6. 1923, ausg. 2/10. 1924.)

Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg, A.-G., Augsburg, *Abziehen der Bildschicht von Negativfolien*, 1. dad. gek., daß die Bildschicht durch 2 dünne Kollodiumschichten versteift wird, die durch die Bildschicht oder durch eine Kautschukschicht voneinander getrennt sind. — 2. dad. gek., daß auf eine Glasplatte zunächst eine dünne Kollodiumschicht, dann eine Kautschukschicht u. hierauf wieder eine dicke Kollodiumschicht aufgetragen wird, worauf die so gebildete Haut mit einem Ablösemittel behandelt u. die ebenfalls mit einem Ablösemittel behandelte Bildschicht von ihrer Unterlage abgezogen u. auf die Kollodiumschicht aufgequetscht wird, worauf umgekehrt. — Man kann auch auf 2 Glasplatten je eine Kollodiumschicht erzeugen, die von der Unterlage gel. Bildschicht auf eine der beiden Schichten u. die zweite Kollodiumschicht auf die Bildschicht aufbringen. (D. R. P. 402765 Kl. 57b vom 22/12. 1922, ausg. 18/9. 1924.)

Daylight Film Corporation, übert. von: **Robert John**, New York, *Methode zum gleichzeitigen Entwickeln und Härten belichteter Emulsionen*. Durch den gleichzeitigen Träger hindurch unter einem Negativ belichtete Emulsionen werden mit einer Entwicklerlsg. behandelt, welcher KJ u. gegebenenfalls etwas Na_2SO_3 zugesetzt ist, z. B. einer wss. Lsg., welche Pyrogallol, Metol, KJ, KBr, Na_2CO_3 u. Na_2SO_3 enthält. Es werden zu scharfe Kontraste vermieden. (A. P. 1482613 vom 2/10. 1919, ausg. 5/2. 1924.)

Daylight Film Corporation, übert. von: **Robert John**, New York, *Behandeln belichteter Silbersalzemulsionen*. Die auf einem durchsichtigen Träger angeordnete Emulsion wird unter einem Negativ belichtet, mit einer Lsg., welche keine härtenden Stoffe enthält, entwickelt, erschöpfend ausgewaschen u. von neuem, zweckmäßig auf der Rückseite belichtet. Das Erzeugnis wird dann mit einer Lsg. behandelt, welche außer einem Entwickler ein Härtungsmittel, z. B. Pyrogallol, u. einen die Härtung verzögernden Stoff, z. B. Na_2SO_3 , enthält, so daß bei rechtzeitiger Unterbrechung des Vorgangs nur die dem metall. Ag benachbarten Teile der Emulsion belichtet worden. Nach Entfernen der nicht gehärteten Teile ergibt sich ein Erzeugnis, das innerhalb weniger Sekk. Farbstoffe aufnimmt u. diese sofort auf Druck-, Brelatineplatten überträgt. (A. P. 1482615 vom 2/10. 1919, ausg. 5/2. 1924.) KÜ.

Daylight Film Corporation, übert. von: **Robert John**, New York, *Behandeln belichteter Silbersalzemulsionen*. Die belichtete Emulsion wird mit einem Entwickler behandelt, der keine härtenden Bestandteile enthält, fixiert u. dann mit einer Lsg., z. B. einer wss. Lsg., die $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ u. HCl enthält, übergossen, welche das metall. Ag in ein lichtempfindliches Silbersalz zurückverwandelt. Hierauf wird neuem belichtet u. mit einer Lsg. behandelt, welche neben einem Härtungsmittel einen Stoff enthält, der die Härtung verzögert. (A. P. 1482616 vom 10/11. 1919, ausg. 5/2. 1924.) KÜHLING.

Papierfabriken Julius Glatz, Neidenfels, Rheinpfalz, *Kopierverfahren für Kopiermaschinen mit Wasserbad*, dad. gek., daß ein nach Art der Trockenkopierpapiere getränktes Kopierpapier verwendet wird. — Das Verf. bietet gegenüber dem reinen Wasserbadverf. den Vorteil der besseren Kopierfähigkeit des vorgefeuchteten Papiers, gegenüber dem sogenannten Trockenkopierverf. den Vorteil, daß das vorgefeuchtete Papier nicht wertlos wird. (D. R. P. 403491 Kl. 15b vom 2/11. 1921, ausg. 27/9. 1924.) KÜHLING.

Ullmann G. m. b. H., Zwickau i. Sa., *Herstellung von Chromatnegativen als Vorvorlage durch Reproduktion der Vorlagen im photographischen App. auf Chromat-Kolloidschichten*, dad. gek., daß die lichtempfindliche Chromat-Kolloidschicht mit stark diffus reflektierenden Unterlagen hinterlegt wird. — Das Verf. gestattet, ohne Verwendung von Halogensilber Kopien in beliebiger Größe auf Metallplatten herzustellen. (D. R. P. 404253 Kl. 57b vom 25/2. 1923, ausg. 14/10. 1924.) KÜHLING.

Carl Winkler, Bern, *Herstellung von Trägern mit lichtempfindlicher Schicht für Reflexkopien*, dad. gek., daß als Träger der lichtempfindlichen Schicht eine Folie verwendet wird, auf welche ein Gemisch aus verflüssigter Gelatine (Gummi arabicum) mit citronensaurem Eisenoxydammon, FeSO_4 , FeCl_3 , oxalsaurem Eisenoxydammon, Mangan- oder Uransalzen in Verb. mit $\text{Fe}(\text{CN})_6\text{K}_3$ oder $\text{Fe}(\text{CN})_6\text{K}_4$ aufgetragen wird. — Die Folien werden aus Celluloid, Gelatine o. dgl. hergestellt. (D. R. P. 404832 Kl. 57b vom 14/2. 1922, ausg. 21/10. 1924.) KÜ.

Friedrich Nagel, Düren, Rhld., *Verbesserung photographischer Kopien durch Auf die Glasseite des Negatives gelegtes Diapositiv*, dad. gek., daß für die Kopie, welche zum Ausgleichen von übermäßigen Kontrasten aufweisenden Originalen dienen, möglichst strukturloses Papier mit einer solchen Präparation verwendet wird, welche nur eine begrenzte Deckung ermöglicht. — Das Papier wird dabei als Mattscheibe. (D. R. P. 405764 Kl. 57b vom 12/2. 1924, ausg. 7/11. 1924.) KÜHLING.

Ernst Doelker, Zürich, *Photographisches Reproduktionsverfahren*. Die alkohol. Lösungen in Alkali l. Harzes wird, z. B. mittels Chromate, gegebenenfalls unter Einwirkung reduzierender Säuren oder Salze sensibilisiert, auf den Träger, z. B. eine Metallplatte aufgebracht u. unter einem Negativ so lange (einige Minn.) belichtet, bis

die vom Licht getroffenen Stellen in verd. wss. bzw. alkoh. Alkalien unl. worden sind. Hierauf wird mittels verd. Alkalien, Erdalkalien, KCN, Na₂S o. entwickelt u. die Unterlage entweder geätzt oder unmittelbar zum Druck verwe (Oe. P. 97688 vom 19/6. 1922, ausg. 25/8. 1924. D. Prior. 29/7. 1921.) KÜHL

Eugen Albert, München, *Photographisches Reproduktionsverfahren*, dad. daß einem in einem Entwickler nicht l. Vehikerkörper ein zweiter, im Entw. ll. Farbkörper zugeführt wird, der durch Beize u. Licht seine leichte Lösli. im Entwickler verliert. — Außer für Kopierzwecke ist das Verf. auch für au. photograph. Zwecke, z. B. direkte Aufnahmen, verwendbar. (D. R. P. 40 Kl. 57b vom 9/5. 1923, ausg. 21/10. 1924.) KÜHL

Oliver King, London, *Herstellung von Zinnchloriddoppelverbindungen 2,4-Diamino-1-oxybenzols*. 2,4-Dinitro-1-oxybenzol wird mit Fe-freier HCl u. S. handelt. Nach Beendigung der heftigen Rk. wird noch kurze Zeit bis zur völl. Lsg. des Sn erhitzt. Nach dem Abkühlen wird die Lsg. filtriert u. mit konz. versetzt, wobei das SnCl₂-Doppelsalz des 2,4-Diamino-1-oxybenzols ausfällt; filtriert den Nd. ab, wäscht mit HCl aus, löst in möglichst wenig W., leitet schüssiges SO₂ in die Lsg. u. erwärmt kurze Zeit. Auf Zugabe von konz. fällt aus der Lsg. ein aus dem Chlorhydrat, Sulfit u. SnCl₂-Doppelsalz des 2,4-Diamino-1-oxybenzols bestehendes Gemisch als schneeweißes Pulver aus. Das findet als photograph. Entwickler. techn. Verwendung. (E. P. 196672 vom 1922, ausg. 24/5. 1923.) SCHOTTLÄND

Daylight Film Corporation, übert. von: **Robert John**. New York, *Belichtung von Negativen für Druckzwecke*. Die belichtete Emulsion, vorzugsweise durch den Träger hindurch belichtete Silberemulsion, wird mit einem nicht härtenden Mittel entwickelt u. fixiert. Die Schicht wird dann mit der Mischung eines härtenden u. eines die härtende Wirkung des ersteren verzögernden Mittels behandelt, z. B. einer Mischung von Lsgg. von K₂Cr₂O₇ u. H₂SO₄. Hierdurch geht es den Vorgang so zu beeinflussen, daß nur die dem metall. Ag benachbarten Teile der Emulsion unl. gemacht werden. Die l. gebliebenen Teile werden darauf üblicher Weise, z. B. mittels sd. W. entfernt. Die Erzeugnisse lassen sich rasch färben. (A. P. 1482612 vom 2/10. 1919, ausg. 5/2. 1924.) KÜHL

Raphael Eduard Liesegang, Frankfurt a. M., *Herstellung entwicklerhafter Silberhaloidschichten*, bei welchen die B. gerbend wirkender Oxydationsprodukte des Entwicklersubstanzen bei genügender Haltbarkeit der Schichten ermöglicht wird. dad. gek., daß die Schichten mit Mischungen von Entwicklungssubstanzen u. Silber- oder sauren Salzen, mit Ausnahme jener der SO₂, durchsetzt werden. — Als Z. kann z. B. eine Lsg. von Brenzcatechin in verd. Weinsäure dienen. (D. P. 403585 Kl. 57b vom 20/11. 1923, ausg. 29/9. 1924.) KÜHL

Graphikus-Gesellschaft m. b. H., Hamburg, *Selentonbad für photographische Silberbilder*, bestehend aus in BaS-Lsgg. gel. Se. — 2. Herst. des Bades nach Anspruch 1, dad. gek., daß ein Gemenge von BaS u. Se durch wiederholtes Schmelzen oder Kochen in W. gel. wird. — 3. dad. gek., daß den Bädern NH₃ zugegeben wird. — Die Bäder sind nicht zersetzlich, ätzen nicht u. sind fast geruchlos. (D. R. P. 403588 Kl. 57b vom 15/2. 1924, ausg. 30/9. 1924.) KÜHL

Ludwig Preiß, München, *Herstellung von in der Aufsicht sichtbaren Photographien in natürlichen Farben nach dem Dreifarbenverfahren* auf Papier oder and. Bildträgern, 1. dad. gek., daß die Teilnegative auf Celluloid-, Acetylcellulose- od. dgl. -filme kopiert, in ein anderes anfärbbares Metallbild umgewandelt u. in a. rot u. gelb eingefärbt werden u. daß die Teilbilder dann nacheinander auf einer gewachsten Papierunterlage übertragen werden, wobei bei jedem einzelnen Bild u. Übertragung die Celluloidschicht durch Lösungsmittel gelöst, die Gelatineschicht

er Oberfläche aufgelockert wird u. endlich die 3 Bilder erwärmt werden, so
 ie, ohne zu schmelzen, fest aneinander u. auf der Unterlage haften. — 2. dad.
 daß zur Verb. der Gelatineschichten Alkalisilicatlgg. unter eventueller Zu-
 b von pflanzlichem oder tier. Leim verwendet werden. — Da die Celluloid-
 w-schicht durchsichtig ist, lassen sich die Teilbilder sehr genau übereinander
 (D. R. PP. 406707 vom 8/12. 1923 u. 406708 [Zus. Pat.] Kl. 57b vom
 1924, ausg. 25/11. 1924.)

KÜHLING.

duard Sueß und Franz Lejeune, Wien, *Photographisches Dreifarbenverfahren*,
 ondere für *Kinematographie*, 1. dad. gek., daß die Teilbilder hinter jeweils
 1/3 des Spektrums verschluckenden Lichtbildern (bläulichrot, gelb, grünlich-
 gewonnen u. die danach hergestellten Positivkopien derart projiziert werden,
 ie Lichter weiß, die Schatten in der Gegenfarbe der Farbe des Aufnahme-
 jeweils erscheinen. — 2. dad. gek., daß die bildbildende Substanz der Dia-
 sive jeweils die Gegenfarbe des betreffenden Aufnahmefilters aufweist. —
 d. gek., daß die schwarzweißen Diapositive mit weißem Licht projiziert
 n u. gleichzeitig der Projektionsschirm mit Licht in der Gegenfarbe des Auf-
 nfilters beleuchtet wird. — 4. Vorr. zur Projektion der Teilbilder nach An-
 3, dad. gek., daß von der Projektionslichtquelle seitlich ein Lichtbündel
 geweißt u. mittels eines Spiegels auf den Projektionsschirm geworfen wird,
 b in den Weg des Lichtkegels eine mit Lichtfiltersektoren versehene Dreh-
 ne eingeschaltet ist, die von der Verdunklungsblende mit dem dritten Teil der
 elahl der letzteren angetrieben wird. (D. R. P. 403591 Kl. 57b vom 19/6.
 23. ausg. 4/10. 1924. Oe. Prior. 12/12. 1922.)

KÜHLING.

ariano de Sperati, Turin, *Behandlung von Druckplatten*. Halogensilber-
 lateplatten werden belichtet, entwickelt u. fixiert, gegebenenfalls mit NH_3 u.
 C behandelt, wobei das Ag ganz oder teilweise durch Hg ersetzt wird, mit
 bichromatlgg. sensibilisiert, von der Rückseite belichtet, ausgewaschen u.
 mit Stoffen, vorzugsweise einer Lsg. von J in KJ behandelt, welche das Ag
 v Hg in hell gefärbte Verbb. — AgJ bezw. HgJ — verwandeln. Das Auf-
 g der Fettfarbe auf diese Platte in dem Zweck angepaßten Mengen wird durch
 lle Färbung der Bilder sehr erleichtert. (A. P. 1508089 vom 2/11. 1922,
 9/9. 1924.)

KÜHLING.

mpagnie d'Exploitation des Procédés de Photographie en Couleurs
 u Dufay, Versailles, *Herstellung von farbigen photographischen Aufsichtsbildern*.
 IP. 405154 Kl. 57b vom 26/11. 1922, ausg. 27/10. 1924. F. Prior. 19/5. 1922.
 (1924. I. 1616.)

KÜHLING.

rewster Film Corporation, New York, *Umwandlung von Silberbildern in*
offbilder. (D. R. P. 405962 Kl. 57b vom 25/2. 1916, ausg. 11/11. 1924.
 P. 26/2. 1915. — C. 1924. I. 1616.)

KÜHLING.

ranz Rolan, Hannover, *Photographische Herstellung naturfarbiger Bilder*,
 l. gek., daß eine Aufnahme auf 2 vereinigten lichtempfindlichen Schichten, von
 ne die erste ihre Höchstempfindlichkeit im gelben Teil des Spektrums, die
 ei ihre Höchstempfindlichkeit im blauen Teil des Spektrums hat, benutzt wird,
 e dritte Grundfarbdeckung zu erhalten u. daß im Positivprozeß durch
 mnation je zweier Grundfarbdeckungen immer die dritte natürliche Farbe
 pic wird. (D. R. P. 406174 Kl. 57b vom 8/4. 1924, ausg. 17/11. 1924.) KÜ.

illy Vorbach, Berlin, *Verfahren, im Licht gehärtete Kolloidschichten für be-*
me Anilinfarbstoffe empfänglich zu machen, die sonst diese nicht anfärben,
eci Herstellung von ein- und mehrfarbigen Papierbildern und Diapositiven. Einer
 tromaten lichtempfindlich zu machenden Kolloidschicht werden nichtlösliche,
 n erteilte Stoffe, wie Koble, Schlemmkreide, Harze usw. zugesetzt. (Schwz. P.
 417 vom 26/2. 1923, ausg. 1/4. 1924. D. Prior. 16/3. 1922.)

OELKER.

Uvachrom-Akt.-Ges. für Farbenphotographie, München, *Herstellung von Farbstoffbildern aus Kupferbildern.* (D. R. P. 403428 Kl. 57b vom 4/12. 1923, ausg. 27/9. 1924. — C. 1921. IV. 1052. [F. P. 520111].) KÜHLIN.

Goerz Photochemische Werke G. m. b. H., Zehlendorf, Wanseebahn (Erf. 13/10. 1924), **Hans Tappen und Rudolf Oertel**, Berlin-Lichterfelde, *Unterlage für photographische Filme*, 1. bestehend aus zwei verschiedenen fest miteinander verschmolzenen Nitrocellulosefolien, von denen die eine insofern eine wesentlich andere Zus. als die andere hat, als die Art u. die Menge den verschiedenen Folien zugesetzten Wachsmachungsmittels verschieden ist; 2. dad. gek., daß zur Herst. der die Unterlage bildenden beiden Folien zwei verschiedenartige Nitrocellulosen verwendet werden, von denen die eine eine wesentlich geringere Viscosität (z. B. entsprechend einer 30% kleineren Viscositätssekundenzahl) besitzt als die andere; 3. daß die Nitrocellulose höherer Viscosität, aus welcher die eine Folie gebildet wird, eine Viscosität besitzt, welche durch eine Viscositätssekundenzahl gekennzeichnet ist, die bezogen auf eine 15%ig. Lsg. in Ä.-A. 1:1 in 20 mm Viscosimeterrohr nach Cooch bei 18°, nicht unter 30 liegt. — Man erspart an Campher u. Lösungsm., falls man die elektr. Erregbarkeit vermindert. (D. R. P. 404108 Kl. 39b vom 15/12. 1923, ausg. 13/10. 1924.) FRAL.

Hans Stallhofer, Berlin-Wilmersdorf, *Verfahren, Emulsionsschichten unbrauchbar gewordener Filme und photographischer Platten wieder aufnahmefähig zu machen*, dad. gek., daß die Emulsionsschichten zuerst in HNO₃ gebadet, dann gewaschen u. danach mit KBr-Lsg. behandelt werden. — Das Verf. ist verwendbar für Filme u. Platten, die belichtet u. gegebenenfalls entwickelt, aber nicht fixiert sind. (D. R. P. 403824 Kl. 57b vom 5/7. 1923, ausg. 4/10. 1924.) KÜHLIN.

Maurice Leboucher, Frankreich, *Rasche Herstellung von Lichtbildern.* Negativ wird in üblicher Weise entwickelt, u. in ein Säurebad, z. B. 2%ig. Essigsäure getaucht. In dasselbe Bad wird der zur Herst. des Positivs dienende empfindliche Stoff getaucht u. danach mit der Schichtseite nach oben auf eine Platte gelegt. Hierauf legt man das entwickelte feuchte Negativ mit der Schichtseite nach unten darüber, rollt Luftblasen aus, belichtet kurze Zeit mit Sonnen- oder künstlichem Licht, fixiert u. taucht schließlich in ein Alaunbad. (F. P. 5745 vom 7/3. 1923, ausg. 17/7. 1924.) KÜHLIN.

Chemisches Zentralblatt.

925 Band I.

Nr. 10.

11. März.

A. Allgemeine und physikalische Chemie.

Max Planck, *Vom Relativen zum Absoluten*. Vortrag. An der geschichtlichen Entwicklung der Begriffe At.-Gew., Energie, Entropie wird gezeigt, wie die anfangs relativen Werte absolute Bedeutung erhalten haben. (Naturwissenschaften 13. 1919. Berlin.) JOSEPHY.

E. B. R. Prideaux, *Koordination und Konjugation*. Die gemischte Bindung, Definitionen und Regeln. Für die gemischte Bindung, der eine große Bedeutung in der Erklärung großer Klassen von Verbb. zukommt, wird folgendes Symbol . . . $\rightarrow$ vorgeschlagen, der Pfeil zeigt in der Richtung + zu -. Die koordinierten Verbb. werden definiert als Verbb., die, in Übereinstimmung mit den Postulaten der Elektronentheorie der chem. Bindung geschrieben, eine oder mehrere gemischte Bindungen enthalten. Ihre Struktur wird an einer Reihe von Verbb. beschrieben, die mehr Atome binden, als bei kovalenter Bindung zur B. stabiler Hüllen notwendig ist (Verbb. der elektronegativen Elemente der höheren Gruppen untereinander), die b) nicht genügend Valenzelektronen enthalten, um durch einfache kovalente Bindung ihre Hülle zu vervollständigen. Für die Berechnung der dem Zentralatom zugehörigen Elektronen werden Regeln aufgestellt, wobei es zweckmäßiger ist, vom unvalenzierten Atom u. nicht vom Ion auszugehen. Konjugierte Verbb. werden definiert als solche, in denen ein Metall mit zwei Atomen durch abwechselnde Valenzen u. gemischte Bindungen zu einem Ring oder durch abwechselnde Mehrvalenzen ohne Ringbildung im gewöhnlichen Sinne verbunden ist. Abgleichung der Polaritäten um den Ring herum oder längs der Kette ist nicht notwendig. (Chemistry and Ind. 44. 25—28.) ZANDER.

L. V. Williamson und J. H. Mathews, *Verlauf der Absorption und des Gleichgewichts von Kohlendioxyd in alkalischen Lösungen*. Der Absorptionsverlauf von CO_2 durch K_2CO_3 -Lsg. ist prakt. unabhängig von der Konz. der Absorptionslsg. Die Absorption wächst mit dem Steigen der Temp. bis zum Optimum von 70—75°, um dann wieder zu fallen. Bei den Verss. der Vf. ergab sich bei 70° eine Steigerung von 8% gegenüber 25° dem Gewichte nach, von 26% der Zeiteinheit nach, wenn die Sättigung bei 65% der möglichen Stärke abgebrochen wurde. Das Gleichgewicht zwischen K_2CO_3 , KHCO_3 u. CO_2 berechnet sich am besten nach der Formel
$$\frac{P_{\text{CO}_2} \times P_{\text{CO}_2}}{(\text{KHCO}_3)^2} = K$$
, wobei P_{CO_2} = Partialdruck von CO_2 in der Gasphase. (Engin. Chem. 16. 1157—61. 1924. Madison [Wis.].) GRIMME.

Bernhard Neumann und Kurt Jacob, *Die Gleichgewichtsverhältnisse bei der Neubildung aus Kohlenoxyd und Wasserstoff, bzw. Kohlendioxyd und Wasserstoff*. Die Gleichgewichte $\text{CO} + 3\text{H}_2 \rightleftharpoons \text{CH}_4 + \text{H}_2\text{O}$ u. $\text{CO}_2 + 4\text{H}_2 \rightleftharpoons \text{CH}_4 + 2\text{H}_2\text{O}$ wurden untersucht. Als Katalysator diente fein verteiltes red. Ni. Die Gase wurden in der nötigen Reinheit folgendermaßen erhalten: Bomben- H_2 wurde von O_2 durch alkal. Pyrogallol befreit, ebenso das aus H_2SO_4 u. Ameisensäure entw. CO . Beide wurden im Gasometer über alkal. Pyrogallol aufbewahrt. Bomben- CO_2 , durch glühendes Cu von O_2 gereinigt, wurde über konz. NaCl-Lsg., die mit Paraffinöl bedeckt war, aufgefangen. So ließ sich das Verhältnis $\text{CO}_2 : 4\text{H}_2$

konstant halten. CH_4 wurde mit 90,9% Reinheit aus Zinkmethyl dargestellt, Bromwasser von C_nH_{2n} , durch NaOH von CO_2 u. durch CuO bei 220° von H_2 freit. Bei Verwendung von Asbest oder Bimsstein als Trägersubstanz wurde Ni-Katalysator bald unwirksam, wahrscheinlich infolge B. von Ni-Silicat. B. bewährten sich für niedrigere Tempp. poröse Tonscherben, für höhere Temperatur Magnesiumrohre. Die Strömungsgeschwindigkeit der Gase war stets ziemlich gleichmäßig. — I. Die Rk. $\text{CO} + 3\text{H}_2 = \text{CH}_4 + \text{H}_2\text{O}$ setzt bei ca. 180° ein, ist bei 288° quantitativ, die Methanausbeute bleibt bis 303° bei 100% konstant, sinkt dann ab und bei 1050° fast 0 zu werden. Zwischen 450 u. 780° enthält das Endgas infolge Nebenrkk. ($\text{CO} + \text{H}_2\text{O} = \text{CO}_2 + \text{H}_2$, $2\text{CO} = \text{CO}_2 + \text{C}$) CO_2 in Mengen von bis 4,4%. Die von MAYER u. HENSELING (Journ. f. Gasbeleuchtung 52. 166. 326 [1919]) für 195° angegebenen Zahlen können, wie sich schon aus den N_2 -Werten ergibt, nicht richtig sein. II. Die Rk. $\text{CO}_2 + 4\text{H}_2 = \text{CH}_4 + 3\text{H}_2\text{O}$ setzt bei 200° ein, die Methanausbeute erreicht bei 328° 95,3%, sinkt oberhalb 400° wieder ab u. ist bei 1020° vollkommen verschwunden. Auffallend ist, daß oberhalb 400° im Endgas CO auftritt, bei 840° zu 15,8% neben nur 7,1% CO_2 . Das CO entsteht durch umgekehrten Verlauf der oben angegebenen Nebenrkk. entstehen, außerdem nach $\text{Ni} + \text{CO}_2 = \text{NiO} + \text{CO}$. Es zeigte sich nämlich, daß das Ni oberflächlich oxidiert war, trotz völliger Abwesenheit von O_2 im Ausgangsgas. — III. Die Rk. $\text{CH}_4 + \text{H}_2\text{O} = \text{CO} + 3\text{H}_2$ konnte oberhalb 330° verfolgt werden; sie war ziemlich genau die Umkehrung von I. — IV. Dagegen ließ sich die Rk. $\text{CH}_4 + 2\text{H}_2\text{O} = \text{CO} + 4\text{H}_2$ nicht verifizieren, es entstanden größere Mengen CO neben sehr wenig CO_2 , es trat also wieder die Rk. III. vor. — Ein ausführlicher rechner. Teil beschäftigt sich mit der Ableitung der Rk.-Gleichgewichte aus den Bildungswärmen unter Berücksichtigung der Nebenrkk. Neben den eigenen Verss. werden auch solche von MAYER u. HENSELING (l. c.) über die Rk. II. thermodynam. ausgewertet. Auf näheres Eingehen auf den über 7 Seiten umfassenden theoret. Teil muß verzichtet werden. (Ztschr. f. Elektrochem. 30. 557—76. 1924. Breslau, Techn. Hochschule.)

W. Reinders und S. I. Vles, Reaktionsgeschwindigkeit zwischen Sauerstoff und den Lösungen einiger anorganischer Salze. I. Die Oxydation von Nitriten. Messungen der Oxydationsgeschwindigkeit sind nur dann verwertbar, wenn die Geschwindigkeit, mit der der Sauerstoff ersetzt wird, groß ist im Verhältnis zur Geschwindigkeit des eigentlichen Verbrauchs bei der Rk. Die Versuchsanordnung war entsprechend gemäß von den Vff. ausgearbeitet worden. Das zunächst als wahrscheinlichste geleitete Reaktionsschema:



erwies sich nach Berücksichtigung des Einflusses der O_2 -Konz. in dieser Form nicht hinreichend. Vielmehr führten weitere Beobachtungen zu der Annahme, daß 1. eine Zers. der HNO_2 in wss. Lsg. statthat, die mit einer B. von NO verbunden ist, 2. eine Oxydation von NO zu NO_2 bzw. N_2O_3 , 3. eine Rk. von NO_2 mit NaNO_2 . Letztere Rk. $3\text{NO}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons 2\text{HNO}_3 + \text{NO}$ verläuft ungemein rasch, so daß die Geschwindigkeit durch die Oxydation des NO reguliert wird. HNO_3 reagiert dann mit NaNO_2 gemäß $2\text{HNO}_3 + 2\text{NaNO}_2 \longrightarrow 2\text{HNO}_2 + 2\text{NaNO}_3$. Je nach der Konz. der vorhandenen Komponenten bzw. der Geschwindigkeit des zugeführten O_2 setzt dann der Rk.-Mechanismus mit der Zers. von:



wieder ein u. so fort wie oben bereits ausgeführt wurde. Diese erste Rk. ist die langsamste u. bestimmt die Geschwindigkeit des Gesamtverlaufs. Auch die zweite, die Oxydation von NO zu NO_2 , ist meßbar, jedoch schon sehr rasch, während die beiden nächsten Rk.-Stufen unmeßbar rasch ablaufen. — Für die Rk.-Geschwindigkeit kommt in erster Linie die Gleichung der ersten Rk.: $V = K_1 \cdot C^2_{\text{HNO}_2}$ in Betracht. Die O_2 -Konz. übt darauf einen nur unbedeutenden Einfluß aus. Der

der Temp. äußert sich, bedingt durch die veränderte Löslichkeit des Sauerstoffs in der Weise, daß 10° Erhöhung der Temp. eine Erhöhung der Reaktionsgeschwindigkeit im Verhältnis 1:1,8 bewirken. Anorgan. Salze mit Ausnahme von Fe- u. Al-Salzen erwiesen sich nicht als katalyt. Reaktionsbeschleuniger. Es wurden Verss. mit NaCl, AgNO₃, CuSO₄, Au-Sol, Na₂SO₄ u. NaNO₃ unternommen. Bei Fe- u. Al-Salzen dürfte die Katalyse durch die Hydrolyse dieser Salze hervorgerufen sein. (Rec. trav. chim. Pays-Bas 44. 1—28. Delft, Univ.) HORST.

J. Reinders und S. I. Vles, *Reaktionsgeschwindigkeit zwischen Sauerstoff und Lösungen einiger anorganischer Salze*. II. *Die katalytische Oxydation von Arseniten*. (I. vgl. vorst. Ref.) Eine Oxydation von Arseniten findet ohne die Hilfe eines Katalysators nicht statt. In Ggw. von Alkalien sind Cu-Salze geeignet, die O₂-Absorption zu beschleunigen, indem ein seiner Zws. nach nicht aufgelöster Komplex das Zwischenglied bildet. Die Verss. der Vff. erstreckten sich hauptsächlich auf die Unters. folgender die Oxydationsgeschwindigkeit beeinflussender Faktoren: 1. Konz. der Arsenite, 2. Menge des Katalysators, 3. Alkalität (H-Ionenkonz.), 4. Sauerstoffdruck u. 5. die Temp. — Die Reaktionsgeschwindigkeit ist bei einem Überschuß an KOH der Arsenitkonz. proportional u. wächst in mehr als dem proportionalen Verhältnis mit der Cu-Konz. Die Abhängigkeit von der OH'-Konz. ist sehr groß (in neutraler Lsg. unmeßbar klein) u. erreicht bei 0,5-n. ein Maximum. Bei weiterer Zusatz von KOH vermindert dann wieder die Reaktionsgeschwindigkeit. Innerhalb gewisser Grenzen ist die Geschwindigkeit vom O₂-Druck unabhängig. Der letztere Umstand spricht für einen Reaktionsverlauf in mehreren Stufen über ein Zwischenglied. Zunächst wird der blaue Cuprikomplex in sehr rascher Rk. in einen farblosen Cuprokomplex umgewandelt. Wird O₂ weiter zugeleitet, so tritt der umgekehrte Vorgang, die B. der blauen Komplexverb. wieder ein; bei einem raschen Sauerstoffstrom wird die Verb. wieder farblos. Der Übergang des blauen Komplexes in Cuprooxyd wird oft erst nach 12—24 Std. bemerkbar, beim Kochen sofort. Zusatz von Gelatine oder Glycerin verzögert oder verhindert die Bildung der blauen Komplexverb.

Der Reaktionsmechanismus wird durch die beiden Gleichungen verständlich:



Die Geschwindigkeit der Rk. 1 ist für den Gesamtverlauf bestimmend, die Geschwindigkeit der Rk. 2 ist sehr groß u. unter den gewöhnlichen Bedingungen nicht meßbar zu machen. Die Messung ist bei Vermeidung des Luftzutritts u. durch Zusatz von Glycerin möglich, welches letzteres verhindert, daß der gebildete Cuprikomplex durch Sauerstoff wieder zurückreduziert werden kann. Glycerin selbst ist ohne Einfluß auf die Oxydation. Die Oxydation ist mit einem O₂-Druck von 1/5 at. bei 15° in 10 Minuten beendet. In normaler O₂-Atmosphäre u. bei Zimmertemp. ist die Rk. von höherer Größenordnung.

Mit Kohle als Katalysator wird die Oxydation der Arsenite ebenfalls stark beschleunigt. Die Messungen sind nur in alkal. Lsg. möglich. Die Beziehungen sind dieselben wie bei Cu, doch ist die starke Abhängigkeit von der OH'-Konz. verschieden von der bei Cu-Salzen. Ein Maximum wie bei den Cu-Salzen wird hier nicht erreicht. Der Reaktionsmechanismus wird durch die Gleichungen dargestellt:



a) verläuft unmeßbar rasch, hingegen b) ist meßbar u. bestimmend für die Gesamtgeschwindigkeit. Mit der Temp. wächst die Geschwindigkeit zwischen 0 u. 100° rasch, bei höheren Temp. etwas rascher. Dies kann mit der bei verschiedenen Temp. wechselnden Absorptionskapazität der Kohle in Zusammenhang


gebracht werden. — Verss. mit anderen Katalysatoren, wie Ferri-, Cobalto-, Nio Mercuri-, Stanni- u. Silbersalzen in Ggw. von Alkali waren negativ. Diese ermöglichen nicht die B. eines reduzierbaren Komplexes bei einer für die Ar eben noch günstigen Alkalität. (Rec. trav. chim. Pay-Bas 44. 29—46. Univ.)

Charles Moureu und Charles Dufraisie, *Autoxydation und antioxygene Wirkung*. XIII. *Untersuchungen über die Inaktivierung von Acrolein durch Hydro Versuche im Licht: die inaktivierende Wirkung des Hydrochinons genügt nicht, antioxygene Wirkung zu erklären*. (XII. vgl. S. 603.) Der Inhalt der vorliege u. der beiden nachstehend referierten Arbeiten deckt sich teilweise mit der gemachten Angaben (vgl. auch das dort angegebene Reaktionsschema). Nachzut ist folgendes: *Hydrochinon* verlangsamt (in Abwesenheit von O_2) auch im I die Kondensation von *Acrolein* in *Disacryl* (*D*). Daß die antioxygene Wrkg *Hydrochinons* auf *Acrolein* nicht allein darauf zurückgeführt werden kann, da akt. Form des *Acroleins* (A') wieder in die inakt. (A) (vgl. Schema, l. c.) verwa wird, ergibt sich aus folgendem: wird durch eine bestimmte Menge (X) *H chinon* die B. von *D* um das n -fache vermindert, so muß mit derselben *M Hydrochinon*, falls A' in A zurückverwandelt wird, auch die *Autoxydation* (*B A O*) n -mal geringer werden; eine Forderung, die durch das Experiment nie füllt wurde: in Ggw. von $\frac{1}{1000}$ *Hydrochinon* wurde die Rk. $A \rightarrow D$ um 40fache, die Rk. $A \rightarrow AO$ aber um das 500fache vermindert. (Bull. Soc. de France [4] 35. 1564—72. 1924.)

Charles Moureu, Charles Dufraisie und Marius Badoche, *Autoxydation, antioxygene Wirkung*. XIV. *Untersuchungen über die Aktivierung des Acroleins Licht*. (XIII. vgl. vorst. Ref.) Es ist schon früher (l. c.) gezeigt worden, da Abwesenheit von *Hydrochinon*) die *Autoxydation* des *Acroleins* durch Licht de aber nicht sehr erheblich beschleunigt wird. Die jetzt angestellten Verss. sowie Kurven vgl. Original) ergaben, daß die B. von *AO* durch Sonnenlicht etwa doppelt so rasch als durch schwaches künstliches Licht erfolgt. Werde Gefäße zeitweise verdunkelt, so wird auch die *Autoxydation* geringer, jedoc die *Oxydationsgeschwindigkeit* im Licht gegenüber der im Dunkeln nur etwa 4fache. Unter der Annahme, daß das Licht die Rk. $A \rightarrow A'$ um diesen beschleunigt, ergibt sich, da für die Rk. $A \rightarrow D$ der entsprechende Faktor 50 ist, für die Umwandlung $A' \rightarrow D$ eine Beschleunigung von rund 10000 Proben von *Acrolein*, die einige Sekunden belichtet worden waren u. dann ins Dunkel kamen, zeigten gegenüber unbelichteten Proben nur eine geringe Beschleunigung der *Autoxydation*. — Unterss. in verschiedenen Spektralbereichen zeigten, daß die Rk. $A \rightarrow D$ durch die am stärksten gebrochenen Strahlen bei wird u. daß *Acrolein* in diesen Gebieten die stärkste Absorption zeigt. Im Geges hierzu wird die Rk. $A \rightarrow AO$ durch bestimmte Strahlungen nicht oder nur unbedeutend beeinflusst. Hieraus ist zu schließen, daß Licht an u. für sich die Aktivierung des *Acroleins* ($A \rightarrow A'$) nur in geringem Maße beeinflusst. (Bull. Soc. Chim. de France [4] 35. 1572—91. 1924.)

Charles Moureu, Charles Dufraisie und Marius Badoche, *Autoxydation, antioxygene Wirkung*. XV. *Untersuchungen über die Aktivierung von Acrolein u Sauerstoff und Licht und seine Inaktivierung durch Hydrochinon hinsichtlich der Kondensation zu Disacryl*. (XIV. vgl. vorst. Ref.) Da reines *Acrolein* sich im Dunkeln in Abwesenheit jeder Spur O_2 ein Jahr lang unverändert aufbewahren läßt, sollte versucht werden, die geringste Menge O_2 festzustellen, die die Bv *Disacryl* veranlaßt. Aus den im Original tabellar. zusammengestellten Versuchsergebnissen ist mit großer Wahrscheinlichkeit zu schließen, daß $\frac{1}{100\,000}$ O_2 die B. von *Disacryl* im Dunkeln hervorruft. Da Licht ebenfalls die B. von *D*

einigt, war anzunehmen, daß beide Faktoren gemeinsam ihre Wrkg. verstärken. Die Verss. haben diese Annahme jedoch nicht bestätigt, sondern es zeigte sich eher eine antagonist. Wrkg. der beiden Faktoren, u. Vff. glauben aus den angeführten Verss. schließen zu müssen, daß O_2 dem Einfluß des Lichtes entgegenwirkt. — In Ggw. von Licht, O_2 u. Hydrochinon wird die B. von Disacryl um so geringer, je mehr O_2 vorhanden ist. Da jedoch Licht u. O_2 allein Disacryl bilden, nehmen Vff. an, daß das durch Licht gebildete Dicacryl (D_1) sich von dem durch O_2 gebildeten (D_0) unterscheidet u. ändern das




vor gegebene Schema um nach dem nebenstehenden. (Bull. Soc. Chim. de France 5. 1591—1607. 1924. Paris, Collège de France.)

HABERLAND.

Charles A. Kraus und **Herman F. Kurtz**, *Die Reduktion von Metallen aus Salzen mittels anderer Metalle in Lösung von flüssigem Ammoniak*. Die Theorie der Red. eines Metalls aus seinen Salzen durch elektropositivere Metalle in fl. NH_3 ist entwickelt. Die in fl. NH_3 l. Alkali- u. Erdalkalimetalle sind in der Lsg. als B. positiver Metallionen u. negativer Elektronen ionisiert. Wird das Salz M durch ein Metall N der positiven Wertigkeit n red., dann sind in der Lsg. die Ionen M^{m+} , N^{n+} , X^- u. e^- . Die Gleichungen für die herrschenden Gleichgewichte sind demnach: $(M^{m+})(X^-)^m = (K_1)(MX_m)$; $(N^{n+})(X^-)^n = (K_2)(NX_n)$; $(M^+)(e^-)^m = (K_3)(Me_m)$; $(N^{n+})(e^-)^n = (K_4)(Ne_n)$. Dabei sind K_1 , K_2 , K_3 u. K_4 die Funktionen des Massenwirkungsgesetzes, u. die Rk. hängt sowohl von ihnen als auch von den Löslichkeitsprodd. MX_m , NX_n , Me_m u. Ne_n ab. 7 verschiedene Fälle werden unterschieden. 1. Die Massenwirkungsfunktionen haben für alle Reaktionsteilnehmer annähernd den gleichen Wert, u. die Löslichkeit der Reaktionspartner ist hoch u. von derselben Größenordnung. In diesem Fall findet zwar keine Fällung statt. Beispiel: $NaJ + K$. 2. Die Massenwirkungsfunktionen sind von derselben Größenordnung, aber das Löslichkeitsprod. von NX_n ist sehr gering. In diesem Fall wird NX_n ausgefällt, u. die Lsg. enthält eine äquivalente Menge Me_m , Beispiel: $KNH_2 + Na$ u. K-Halogenide $+ Ca$. 3. Das Löslichkeitsprod. des reduzierenden Metalls Ne_n ist niedrig, u. das Löslichkeitsprod. des Salzes MX_m auch. Wenn das Löslichkeitsprod. von NX_n klein genug ist, findet Red. statt. Beispiel: Na-Salze $+ Mg$. 4. Das Löslichkeitsprod. von Ne_n ist sehr gering, u. die Ionen X^- werden durch Rk. der Ionen M^{m+} mit dem Salz NX_n aus der Lsg. entfernt. Diese Bedingungen werden am besten durch die Red. von KNH_2 durch metall. Al erläutert. Der Rk.: $Al^{+++} + 3NH_2^- = Al(NH_2)_3$ folgt sekundär die Rk. $Al(NH_2)_3 + KNH_2 = Al(NH_2)_2NHK \cdot NH_3$. Diese Rk. wird im einzelnen in einer späteren Arbeit von BERGSTROM behandelt werden. 5. Das Löslichkeitsprod. des red. Metalls Me_m ist niedrig, u. dieses ist nicht fähig als Anion zu existieren. Die Vollständigkeit der Ausfällung von Me_m hängt dann nur von seinem Löslichkeitsprod. ab. Beispiel: Red. von Ag-Salzen durch Na. 6. Das red. Metall kann mit einem negativen Elektron ein stabiles Anion bilden. Beispiel: Red. von Sb(III)-Salzen durch Na. 7. Das red. Metall bildet ein komplexes Anion. Hier verläuft die Rk. nach der Löslichkeit des komplexen Anions.

Experimentelles. Red. von Hg-Salzen durch Na. Die Verss. wurden mit Hg , $Hg(CN)_2$ u. HJ ausgeführt. Anfangs wird $NaHg$ gefällt, das aber in NH_3 unlöslich ist, u. sich unter B. von $NaHg_2$ zers.; durch Ca wurden die Hg-Salze zu a_2Hg_2 red. Bei der Red. von Cd-Salzen durch Na wird wahrscheinlich $NaCd$ gebildet. Die Verss. bereiteten wegen der geringen Löslichkeit von CdJ_2 u. $Cd(CN)_2$ Schwierigkeiten. Bei der Red. von $Zn(CN)_2$ durch Na wurde eine Verb. der Formel Na_4 erhalten, mit Ca entstand Ca_7Zn . Bei der Red. von Sn-Salzen schlägt die Farbe der NH_3 -Lsg. langsam von blau (charakterist. für das freie Alkalimetall) über

grün in rot um, so daß der Endpunkt der Rk. nicht scharf beobachtet werden konnte. Das Verhältnis Na/Sn bis zur roten Färbung entspricht der Formel Na_2Sn . Wird ein Überschuß an SnJ_2 zugesetzt, so wird die rote Farbe erst intensiv, dann scheidet sich metall. Sn aus, u. die Lsg. wird farblos. Die bei der Red. von Ca entstehende Verb. entspricht der Formel Ca_5Sn . Bei der Red. von Pb-Salzen durch Na geht die Farbe der NH_3 -Lsg. langsam von blau in grün über, wahrscheinlich wird anfangs n. Natriumplumbid Na_4Pb gebildet, welches sich in unter B. einer Pb-reicheren Verb. zers. Durch Red. mit Ca entstand eine Verb. Formel Ca_2Pb_3 . Die Red. von *Sb-* u. *Bi-Salzen* lieferte keine scharfen Endpunkte. Das Verhältnis Na/Sb lag bei 4,8, Na/Bi bei 3,3, beide Werte sind zu hoch. *Tl* wurde eine Verb. Na_3Tl_2 erhalten. *Ag* bildete mit Na keine Verb., bei der Red. mit Ca entstand CaAg , eine bisher unbekannte Verb. — Bei der Red. von *Ä. mercurichlorid* durch Na betrug bei der Entfärbung der Lsg. das Verhältnis Na/Hg ungefähr 2, abgesehen von der Na-Menge, die mit dem gesamten Cl NaCl bildet. Und zwar wird alles Hg des $\text{C}_2\text{H}_5\text{HgCl}$ durch Na als Hydrargid gefällt, u. C_2H_5 wird frei, was nur durch die Teilnahme von NH_3 an der Rk. zu erklären ist. Folgende Gleichung kann den Reduktionsprozeß veranschaulichen:



NaHg zers. sich wie oben beschrieben. (Journ. Americ. Chem. Soc. **47**. 43—44. 1925. Providence [Rhode Island], Brown Univ.)

JOSEPH

P. W. Bridgman, *Einige Eigenschaften einzelner Metallkrystalle*. Vf. gibt eine kurze Zusammenfassung seiner Messungen der physikal. Eigenschaften einzelner Metallkrystalle von *Zn*, *Cd*, *Bi*, *Sb*, *Te* u. *Sn*. Das in 5 Tabellen geordnete Zahlenmaterial bezieht sich auf elast. Konstanten bei Zimmertemp., lineare Kompressibilität bei 30 u. 75° unter Drucken bis zu 12000 kg/qcm, therm. Ausdehnung, spezif. elektr. Widerstand, Temperaturkoeffizient des Widerstandes u. Einfluß des Druckes auf den Widerstand bei verschiedenen Temp. (Proc. National Acad. Sc. Washington **10**. 411—15. 1924. HARVARD-UNIV.)

K. WOI

A. L. Clark, *Die Viscosität des Äthyläthers in der Nähe des kritischen Punktes*. Berichtigung früherer Unterss. (vgl. Proc. Trans. Roy. Soc. Canada [3] **9**. 43). Die Viscosität des Ä. ändert sich in der Nähe des krit. Punktes nicht in der da oben beschriebenen Weise; vielmehr ist das logarithm. Dekrement eine geradlinige Funktion der Temp. (Proc. Trans. Roy. Soc. Canada [3] **18**. Sekt. III. 329—38. 1924. Kingston, Ont., Queen's Univ.)

ZANDE

Ernst Cohen, Wihelma A. T. de Meester und A. L. Th. Moesveld, *Einfluß von Druck auf die Löslichkeit von Stoffen. V. Das System Naphthalin-Tetrachloräthan*. (Vgl. S. 462.) Vff. untersuchten die Löslichkeit von Naphthalin in CHCl_3 u. CH_2Cl_2 bei 30,00° u. Drucken zwischen 0—1000 at. Ein Minimum in der Löslichkeitskurve, das auf Grund analoger Unterss. möglich erschien, konnte in diesem Druckintervall auch bei diesem System nicht festgestellt werden. (Koninkl. Akad. van Wetensch. Amsterdam, Wisk. en Natk. Afd. **33**. 783—94. 1924. Utrecht. VAN'T HOFF-Lab.)

K. WOI

W. F. Seyer und Alan F. Gill, *Die gegenseitigen Löslichkeiten von Schwefeldioxyd und n-Hexan*. Der Gehalt an SO_2 betrug in den Gemischen der beiden Komponenten SO_2 u. *n-Hexan* bei: —31° 11,2%, —19° 15,9%, —3,2° 24,1%, 3° 30,7%, 7° 38,5%, 10° 59,0%, 9,8° 81,5%, 8,6° 92,7%, —20° 96,7%, —61° 99,0%. Der E. von reinem *n-Hexan* ist —93,7°, der des Eutekticums —96°, der von reinem SO_2 —72,8°. (Proc. Trans. Roy. Soc. Canada [3] **18**. Sekt. III. 209—11. 1924.)

Arrigo Mazzucchelli, *Das Perchloration als Katalysator bei der elektrolytischen Darstellung der Perschwefelsäure*. Die Ausbeuten bei der elektrolyt. Darst. der Perschwefelsäure werden in Ggw. der Perchlorsäure oder ihrer Salze erheblich gesteigert. Red. zu HCl findet nicht statt; es handelt sich demnach um eine katalyt.

KClO₄ u. NH₄ClO₄ wirken in annähernd gleichem Maße. (Gazz. chim. ital. 10—13. 1924. Rom, Univ.) ZANDER.

M. C. Boswell und C. H. Bayley, Über den Mechanismus der Verhinderung katalytischen Wirkung von Platinschwarz und teilweise reduziertem Nickeloxyd. Chlor. Verss. über Vergiftung durch Cl₂ bestätigen die von BOSWELL u. BAYLEY (vgl. Proc. Trans. Roy. Soc. Canada [3] 17. Sekt. III. 1; C. 1924. II. 425). entwickelten Vorstellungen über den molekularen Bau u. die Wirkungsweise von NiO-Katalysatoren. Wird teilweise reduziertes NiO mit Cl₂ behandelt, so wird dieses unter Verdrängung der äquivalenten Menge H' u. OH' adsorbiert, u. die Verletzung der Oberflächenhaut der im Innern gebundene O freigelegt. Einl. von H₂ entstehen jetzt merkliche Mengen W., die vom Katalysator teilweise zur Regeneration der Oberflächenhaut festgehalten werden. Diese wird jedoch durch die gleichzeitig gebildete HCl wiederum verletzt, muß von neuem erneuert werden usf. Die Menge des verbrauchten H₂ steigt daher bei wiederholtem Erhitzen dauernd, bis so viel O aus dem Innern entfernt ist, daß die zerstörende Wirkung der HCl die Geschwindigkeit der Regeneration überwiegt; die Oberflächenhaut verschwindet dann plötzlich unter erheblicher B. von W. Pt-Schwarz verhält sich ähnlich. Vff. erklären allgemein Vergiftung O-haltiger Katalysatoren dadurch, daß die durch sehr geringe Mengen des Katalysatorgiftes eingeleitete Zerstörung der wirksamen Oberflächenschicht durch seine Umsetzungsprodukte so lange fortgesetzt wird, bis auch der für die Ergänzung der Oberflächenschicht wesentliche O-atomaren Kern verbraucht ist. (Journ. Physical Chem. 29. 11—19. KRÜGER.

A₁. Atomstruktur. Radiochemie. Photochemie.

E. Gehrke, Die Umwandlung von Quecksilber in Gold. Vff. legt dar, wie sich von Standpunkt der heutigen Atomtheorie aus eine Umwandlung von Hg in Au bez. Ag (vgl. MIETHE u. STAMMREICH, Ztschr. f. angew. Ch. 38. 81 [1925]) erklären lassen. (Umschau 29. 61—63. Berlin, Physikal.-Techn. Reichsanst.) BEHRLE.

J. Davisson und L. H. Germer, Die thermionische Arbeitsfunktion von mit Platin überzogenem Platin. (Vgl. Physical Review [2] 20. 300; C. 1923. III. 1376.) Messungen der thermion. Arbeitsfunktion an reinem Pt, überzogen mit Oxyden von Ba. Sr wurden nach zwei Methoden u. der früheren Versuchsanordnung für W. durchgeführt. Nach der calorimetr. Methode ergab sich bei 1064° K die Arbeitsfunktion ϕ zu $1,79 \pm 0,3$ V. Nach der Temperaturvariationsmethode ergab sich bei 1064° K bzw. 911° K für ϕ 1,79 bzw. 1,60 V. Die Messungen sind aber nicht genau genug um darüber zu entscheiden, ob ein Elektron im Innern des Metalls thermale Energie $3 kT/2$ besitzt. Vff. diskutieren die verschiedenen Korrekturen u. möglichen Fehlerquellen. 2 Tabellen nebst entsprechenden graph. Darst. Einzelmeßergebnisse ergänzen den Text. (Physical Review [2] 24. 666—82. 1924.) K. WOLF.

Leigh Page, Die Bewegungsgleichung des Elektrons invariant unter der Lorentz'schen Transformation. Mathematisch. (Physical Review [2] 24. 627—30. 1924. Univ. of Chicago.) K. WOLF.

A. Vibert Douglas, Mitteilung über Ionisationswolken in einer Expansionskammer. An einigen photograph. Aufnahmen wird die Ionisationswrkg. in einer Expansionskammer beschrieben. Die Entladungen wurden durch LEYDENER Flaschen und eine Wimshurstmaschine herbeigeführt. (Proc. Trans. Roy. Soc. Canada [3] 18 Sekt. 3. 133—36. 1924.) ZANDER.

K. T. Compton, Louis A. Turner und W. H. McCurdy, Theorie und Versuche über die kannelierte Glühentladung in Quecksilberdampf. 1. Theorie der Glühentladung in einem einatomigen Gas. Es wird gezeigt, daß im Falle paralleler ebener Elektroden mit einer heißen Kathode als Elektronenquelle, die

Spannungsverteilung u. Ionenkonz. in Crookeschem Dunkelraum, negativem Glühe Faradayschem Dunkelraum u. positiver Säule, sich voraussagen lassen auf Grund der Raumladung, Ionisation u. Anregung des Gases. In der positiven Säule sind Feld u. Konz. so lange gleichförmig, als durch Elektronenstoß angeregte Atome gewissen Schichten an der Diffusion zwischen den Schichten verhindert werden während Kannelierungen durch period. Änderungen des Feldes u. der Konz. gehalten werden können. Die Theorie der Bogenentladung ist wesentlich die gleiche da der Bogen nur das negative Glühen der längeren Glühentladung ist. 2. Glühentladung in Hg-Dampf. Vf. verifizierten eine Reihe von Aussagen obiger Theorie durch Verss. mit Hg-Dampf in Vakuumröhren mit heißen Kathoden. Die Spannungsverteilung u. Ionenkonz. wurden nach der Langmuirschen Methode untersucht; die Konz. der positiven Ionen in der positiven Säule erscheint zu groß. Dieses Resultat weist auf die Ggw. negativer Hg-Ionen hin. Die Verteilung der Elektronengeschwindigkeiten gehorcht dem Maxwellschen Gesetz, ausgenommen zwischen den Kannelierungen. Die Lichtemission scheint mehr mit der Anregung durch Elektronenstoß als mit Ionisation u. Rekombination zusammen zu hängen. Kannelierungen treten nicht auf in reinem Hg-Dampf, dagegen bei geringer Stromstärke oder wenn ein Stoff wie H₂ eingeführt wird, zwecks Entfernung der angeregten Atome. Angeregte Atome existieren in Kannelierungen, aber nicht in den Gebieten dazwischen und sind zahlreicher, wenn die Menge H₂-Verunreinigung reduziert wird. Das Bandenspektrum von HgH steht in Zusammenhang mit der Wrkg. angeregter Hg-Atome auf H₂ u. wird als Folge unelast. Stöße in Kannelierungen emittiert. Skizzen einiger Versuchsanordnungen u. Kurvenbilder erläutern den Text. (Physical Review [2] **24**. 597—615. 1924. Princeton Univ.) K. WOLF.

Henry A. Erikson, *Die Ionenbeweglichkeit aktiver Niederschläge von Aktinium*. Die von Vf. früher benutzte Methode für CO₂ u. Luft (vgl. Physical Review [2] **24** S. 333) ergab für die Ionenbeweglichkeit in dem aktiven Nd. von Ac folgende Werte. Es sind 2 positive Ionen vorhanden, mit einer Beweglichkeit von 4,35 cm/Sek/V bzw. 1,55. Die erste ist größer als die monomolekularen Luftionen u. die zweite größer als die bimolekularen Luftionen. Diese Erscheinung wird dadurch erklärt, daß die rascheren Ionen Ac-Atome A u. B sind, u. daß das langsamere Ion C gebildet wird, sobald das raschere Ion sich mit einem neutralen Mol. (wahrscheinlich Luft) verbindet. Ein Vergleich dieser Ergebnisse bei schweren Ionen mit denen für Luft- u. CO₂-Ionen zeigt, daß die Beweglichkeit eines Ions praktisch unabhängig ist von dessen Masse. (Physical Review [2] **24**. 622—26. 1924. Univ. Minnesota.) K. WOLF.

H. M. Terrill, *Absorption von Kathodenstrahlen in Aluminiumfolie*. Vf. überprüft die Messungen von WHIDDINGTON u. SCHONLAND (Proc. Royal Soc. London Serie A. **104**. 235; C. **1924**. I. 1147.) Homogene Strahlen von genau bekannter Geschwindigkeit wurden erzeugt, indem eine Coolidgekathode in einer Hochvakuumröhre montiert u. hochgespannter Gleichstrom angewandt wurde. Der Elektronenstrom passiert die Folie u. gelangt in einen Faradayzylinder, der mit einem Geigerzählrohr verbunden ist. Ein bis drei Al-Folien von 0,00031 cm Dicke wurden mit Spannungen von 18—52 kV untersucht. Die Gültigkeit der Lenardschen Gleichung $I/I_0 = e^{-\alpha x}$, worin x = Dicke, wurde bestätigt. Innerhalb des Geschwindigkeitsbereiches von 8,09—12,23 · 10⁹ cm/Sek, befriedigt α die von THOMSON abgeleitete angenäherte Beziehung $\alpha v^4 = 0,268 (10^{44})$, worin v die mittlere Geschwindigkeit vor u. nach Durchdringung der Folie. (Physical Review [2] **24**. 616—21. 1924. Columbia Univ.) K. WOLF.

A. Larsson, M. Siegbahn und I. Waller, *Der experimentelle Nachweis der Brechung von Röntgenstrahlen. Vorläufige Notiz*. Vf. weisen eine ganz reguläre

ung der Röntgenstrahlen in einem Prisma (amorphen oder krystallinen) experimentell nach. Bei der Anordnung u. Durchführung dieses Vers. von LARSSON SGBAHN, diente als Unterlage eine Überschlagsrechnung von WALLER, dahin gehend, daß bei genügend kleinen Inzidenzwinkeln eine nachweisbare Ablenkung zu erreichen wäre. Bei Benutzung monochromat. Strahlungen ergibt sich dicht neben dem direkten Strahl ein Spektrum mit sehr scharfen Spektrallinien. Als Lichtquelle diente eine Antikathode mit Cu u. Fe. Die Linien Cu-K- α u. - β Fe-K- α u. - β sind getrennt zu sehen. Auch der an der Vorderfläche des Prismas totalreflektierte Strahl ist scharf abgebildet. Das hier benutzte Verfahren gestattet die anomale Dispersion messend zu verfolgen, wodurch eine Methode zur Bestimmung der Elektronenbesetzungszahlen der verschiedenen Niveaus gewonnen wird. (Ann. d. Naturwissenschaften **12**. 1212—13. 1924. Upsala.) K. WOLF.

.. Sommerfeld, *Über die Intensität der Röntgenlinien*. Die Anwendung der „Summenregeln“ von BURGER u. DORGELO auf zusammengesetzte Dubletten ermöglicht es, aus den einzelnen Niveaus die Intensität der Röntgenspektrallinien zu berechnen. Für die K-Serie ergibt sich $\alpha_1 : \alpha_2 = 2 : 1$. Für die L-Serie $\beta_1 : \beta_2 = 9 : 1 : 5$, $l : \eta = 2 : 1$, $\beta_3 : \beta_4 = 2 : 1$. Soweit diese Intensitätsverhältnisse experimentell gemessen sind, ergibt sich eine gute Übereinstimmung mit den aus der Summenregel berechneten Werten. (Ann. der Physik [4] **76**. 434—441.) BECKER.

.. Jordan, *Zur Theorie der Quantenstrahlung*. Mathematisch. Vf. sucht den Nachweis zu führen, daß die Annahme von Rückstößen strahlender Atome zur Abweichung eines therm. Gleichgewichts nicht notwendig ist. (Ztschr. f. Physik **30**. 317—319. 1924. Göttingen.) BECKER.

.. Runge, *Zum Paschen-Backeffekt*. Mathemat. Ableitung, aus welcher geschlossen wird, daß die Abweichung der Sommerfeldschen Darstellung des Paschen-Backeffektes von VOIGTS Formeln nicht den Tatsachen entspricht u. daß in der Berechnung KENTS (Astrophys. Journ. **40**. 337 [1914]) der magnet. Aufspaltung der Linie 6708 Å des Verh. der Komponente 7 mit den Anschauungen der Termenergie der Spektrallinien nicht vereinbar ist. (Ann. der Physik [4] **76**. 266—272.) BECKER.

.. Landé, *Über den quadratischen Zeemaneffekt*. Mathemat. Ableitung der in der Feldstärke quadrat. Glieder der magnet. Termenergie. Es zeigt sich Übereinstimmung dieser Berechnungen mit der Erfahrung an den a. Störungen der Spektrentypen in stärkeren Feldern. (Ztschr. f. Physik **30**. 329—40. 1924. Göttingen.) BECKER.

.. Landé, *Zeemaneffekt bei Multipletts höherer Stufe*. (Vgl. vorst. Ref.) Vf. zeigt einige empir. Gesetzmäßigkeiten der Aufspaltungsfaktoren sowie zwei Methoden zur Berechnung an. Es hat den Anschein, als ob ein einfaches u. einheitliches Schema die Struktur u. den Zeemaneffekt der Multipletts höherer Ordnung beschreibt. (Ann. d. Physik [4] **76**. 273—83.) BECKER.

.. Back, *Über den Zeemaneffekt des Neons*. Vf. benutzt als Lichtquelle eine Gasentladung ohne Geißlerrohr, welche parallel zu den magnet. Kraftlinien gerichtet war. Der Gasdruck betrug 2—3 cm, die Feldstärke 38,580 Gauß, die Feldstärke der Lichtbogenentladung 300 Milliampère. Der verwendete Spektroapparat gestattet eine Dispersion von 1,3 Å pro mm. Zur Vereinfachung der Termenergie sind die vorkommenden verschiedenen Linienaufspaltungen nach ihren charakteristischen Merkmalen in charakterist. Grundtypen geordnet. Die Meßergebnisse, sowie die daraus berechneten Term- und Aufspaltungsfaktoren u. inneren Quantenzahlen sind ausführlich in Tabellen angeführt. Es ergibt sich daraus, daß die Theorie der rationalen Term- und Aufspaltungsfaktor-Summen exakt bestätigt wird, u. daß über das hinaus auch die Term- und Aufspaltungsfaktoren der einzelnen Terme selbst sich

mit großer Wahrscheinlichkeit als rational ergeben. (Ann. der Physik [4] 317—32.)

Harry Julius Emeléus und **William Eric Downey**, *Eine spektroskopische Untersuchung der leuchtenden Oxydation des Phosphors*. In einer Atmosphäre von ca. 80% O₂ u. 20% N₂ mit einer Flammentemp. von 800° zeigt brennender Phosphor ultraviolette Banden bei 2390, 2475, 2530, 2630 u. 3275 Å. Unter vermindertem Druck bei 125° emittiert er dieselben Banden, aber in schmalere Banden aufgelöst. Das Glimmspektrum entspricht dem Tieftemp.-Spektrum. Die breiten Banden des Glimmspektrums von PETRIKALN (Ztschr. f. Physik **22**. 119; C. **1924**. I. 22) wurden nicht beobachtet, die Befunde stimmen mit den Messungen des Glimmspektrums von CENTNERSZWER u. PETRIKALN (Ztschr. f. physik. Ch. **80**. 2; C. **1912**. II. 580) überein. (Journ. Chem. Soc. London **125**. 2491—95. 1924.) HERTZ.

Hermann Schüler, *Über Feinstrukturen im ersten Li-Funkenspektrum*. Vf. vermehrt das Funkenspektrum des Li. An den Linien 5485, 3714 u. 2934 Å des I⁺ läßt sich eine Feinstruktur nachweisen, welche teilweise in das Serienschema des Li⁺ eingeordnet werden kann. Die Feinstruktur ist sehr mannigfaltig, so daß das Atommodell des Li⁺ keine befriedigende Deutung zuläßt. (Ann. der Physik [4] **292**—98. Potsdam.)


S. Goudsmit, *Termbestimmungen im Lanthanspektrum*. (Koninkl. Akad. v. Wetensch. Amsterdam, Wisk. en Natk. Afd. **33**. 774—82. — C. **1924**. II. 2384.) K.

R. J. Lang, *Die ultravioletten Funkenspektren einiger Elemente*. Vf. nimmt mittels eines Rowlandschen Gitters von 6273 Strich pro cm die Ultraviolettfunkenpektren zwischen 2000 u. 200 Å von C, Ca, Ti, V, Cr, Mn, Co, As, Mo, Cd, Sb, Te, Ce, Pt, Au, Th, Pb, Bi, U auf. Die Ergebnisse sind in Tabellen vollständig wiedergegeben. (Philos. Transact. Roy. Soc. London. Serie A. **224**. 371—418. 1924. Univ. of Alberta.)



E. Kepianka und **L. Marchlewski**, *Die Absorption violetten Lichtes durch organische Substanzen*. V. (IV. vgl. MARCHLEWSKI u. MOROZ, Bull. Soc. Chim. de France [4] **35**. 705; C. **1924**. II. 1157.) Es wurden die Extinktionskoeffizienten in wss. Lsgg. von Benzoesäure, Phenol u. Gemischen von beiden im Ultraviolett bestimmt. Ergebnisse tabellar. u. graph. im Original. (Bull. Soc. Chim. de France [4] **35**. 1613—18. 1924. Krakau, Univ.)

G. Berger, *Über den photokatalytischen Effekt der Neutralsalze*. Der katal. Einfluß auf die photochem. Reaktionsgeschwindigkeit wurde bei Lichtrrk. untersucht, die in elektr. Hinsicht weit auseinanderliegen, so die Zers. des Uranylformiat, eine reine Ionenrk., ferner die Umwandlung des o-Nitrobenzaldehyds in o-Nitrobenzoesäure, eine einfache intramolekulare Umlagerung in einem ungeladenen System u. vor allem die Photolyse der komplexen Kobaltsalze, wobei durch geringe Änderung der Konst. der Wertigkeitstyp stark geändert werden konnte. Der große Salzeffekt war bei Ionenrrk., hingegen ein kleiner bei neutralen Komponenten beobachtet worden. Bei Uranylformiat genügt eine Chloridkonz. von 0,03 g Äqu., um etwa 75%ig. Reaktionsverminderung hervorzurufen. Bei den Kobaltreaktionen wird auch durch die hundertfache Konz. kaum 25% des Effekts erreicht; noch weniger beim o-Nitrobenzaldehyd. Zwischen Uranylformiat u. Ederscher Lsg. besteht große Analogie. Der Unterschied des Effekts muß durch eine Verschiedenheit im elektr. Charakter der lichtempfindlichen Systeme begründet sein. Da BRÖNSTED für die Neutralsalzwirkg. bei Dunkelrrk. auf Grund der Aktivitätstheorie ähnliche Beziehungen nachgewiesen hat, liegt es nahe, daß beide Effekte ident. sind. Es wird dabei für Lichtrrk. die Annahme gemacht, daß auch hier der geschwindigkeitsbestimmende Vorgang in der B. eines labilen krit. Komplexes besteht, was auf Grund der quantentheoret. Betrachtungen EINSTEINS in der Photochemie durchaus nicht unwahrscheinlich ist.

Die Zers. des Uranylformiats entspricht stöchiometr. der Gleichung:



verläuft aber wahrscheinlich in 2 Stufen:



von der erste geschwindigkeitsbestimmend ist. Die Ionen $\text{UO}_2^{++} + \text{H}^+ + 3(\text{HCOO})^- \rightarrow$ bilden wie bei der Ederschen Lsg. einen ungeladenen krit. Komplex. — Bei Lichttrk. mit kleiner Salzwirkg., wie der Umwandlung des *o*-Nitrobenzaldehyds, findet Lichttrk. zwischen ungeladenen Komponenten statt. Für die Kobaltlake gilt ähnliches, doch liegen die Verhältnisse hier komplizierter. Bei den geladenen Komplexen sind nicht der Komplex als Ganzes, sondern nur die ungeladenen Teile als reagierende Komponente anzusehen. Quantitative Vergleiche sind hier nicht möglich. Dies trifft besonders für die Erklärung des Effektes bei höherer Salzkonz. u. der Verschiedenheiten bei den einzelnen Salztypen zu. Auch die Brönstedtsche Formel ist für Dunkeltrk. nur bis zu einer Salzkonz. von ca. 0,2-n. zureichend. Das Minimum, dem die Aktivitätskoeffizienten mit wachsender Konz. zustreben, liegt bei den einwertigen Elektrolyten zwischen 0,5- u. 1-n.; bei zweiwertigen jedoch ist es bei 3-n. Konz. noch nicht erreicht. Auch innerhalb derselben Salztypen werden große individuelle Abweichungen beobachtet. Außer dem Aktivitätsverlangsamen Aktivitätseffekt wurde bei höherer Salzkonz. noch ein weiterer Elektrolytwirkg. nachgewiesen, welche sich dem allgemeinen Effekt überlagert. Wie die Lichttrk. als eine Erhebung der einen Komponente (Elektronengeber) zu einem energiereicheren Quantenzustand u. als ein Übergang des angeregten Elektrons zu anderen reagierenden Komponente aufgefaßt, dann ist sie abhängig von der elektr. Beschaffenheit des Mediums. Bringt man zu einer Lsg. eines nicht-angeregten lichtempfindlichen Stoffes einen starken Elektrolyten, dann wird die Reaktionsgeschwindigkeit des Elektrons im angeregten Zustand herabgesetzt u. die Reaktionsgeschwindigkeit wird im allgemeinen verringert. Ist die lichtempfindliche Substanz selbst ionisiert, so wird bei positiven Komplexen eine Verminderung, bei negativen eine Vergrößerung der Reaktionsgeschwindigkeit hervorgerufen. Diese sekundären Effekte liegen in der Richtung der beobachteten Abweichungen bei geladenen Komplexen. Auf die Bedeutung der Brönstedtschen Aktivitätstheorie u. die Übertragung auf Lichttrk. wird mit Hinsicht auf die Erforschung des Zusammenhangs zwischen chem. Reaktionsgeschwindigkeit u. Strahlung aufmerksam gemacht. (Rec. trav. chim. Pays-Bas 44. 47—67. Wageningen, Landw. Hochschule.)

HORST.

A₂. Elektrochemie. Thermochemie.

J. Heyrovsky, *Anwendungen der Elektrolyse mit Quecksilber-Tropfkathoden*. (V. Trans. Faraday Soc. 19. 692; C. 1924. II. 1775 u. S. 936.) Abscheidungs-potential von *Tl* an Hg-Tropfkathode aus n. *Tl*-Lsgg. beträgt — 0,151 V, woraus sich die freie Energie der Amalgambildung zu 0,462 (V × Äquivalentladung) ergibt; für dreiwertiges *Jn* sind die Werte — 0,504 u. 0,156. Der übrige Inhalt ist schon in früheren Ref. wiedergegeben. (C. r. d. l'Acad. des sciences 179. 1267—68. 19.)

BIKERMANN.

F. v. Rautenfeld, *Berichtigung und Nachtrag zu meiner Abhandlung „Zur Leitfähigkeitsleitung in Kristallen“*. Die früheren (Ann. der Physik [4] 72. 617; C. 924. I. 2498) Zahlenwerte werden korrigiert. Aus den neueren (S. 822) ergibt sich, daß die Leitfähigkeit von *NaCl*-Kristallen in allen Richtungen die nämliche ist. (Ann. der Physik [4] 75. 848—50. 1924. Würzburg, Univ.)

BIKERMANN.

Fred Fairbrother, *Untersuchungen über Elektromose*. Teil II. (I. vgl. Fairbrother u. Mastin, S. 1167). Die in der I. Mitteilung erwähnte Zusatzleit-

fähigkeit in Diaphragmen auf Grund der Oberflächenströme wurde weiter untersucht. Als Diaphragmen dienten Carborundum u. gepulvertes Jenaer Gerätglas. In Glas betrug die Zusatzleitfähigkeit oft mehrere %, war am größten in verd. Lsgg., am schwächsten in Lsgg. starker Säuren. Auch die früher als Norm angenommene $\frac{1}{10}$ -n.-KCl-Lsg. zeigt noch merkliche Zusatzleitfähigkeit, in $\frac{1}{100}$ -n. H_2SO_4 kann sie = 0 gesetzt werden. Der Wechselstromwiderstand von Carborundum-Elektrolyt-Gemischen hing von der Leitfähigkeit des Elektrolyten ab. In verd. Lsgg. war er von der Größenordnung des Carborundumwiderstandes. Der spezif. Widerstand von Carborundum wurde zu ca. $4 \times 10^4 \Omega$ gefunden. Auffällig war die sehr hohe Kapazität der Carborundumdiaphragmen, die auf eine „Diaphragmenpolarisation“ zurückzuführen ist. Dieses Phänomen wurde auch bei SiO_2 , Graphit u. Metallen beobachtet. (Journ. Chem. Soc. London **125**. 2495 b. 2501. 1924. Manchester, Univ.)

HERTER.

A. J. Sorensen, *Magnetische Eigenschaften dünner, durch Verdampfung erzeugter Häutchen aus ferromagnetischen Metallen*. Vf. untersuchte die magnet. Eigenschaften dünner Häutchen aus Fe, Ni, Co. Unter Anwendung der Verdampfungsmethode von STEINBERG (Physical Review [2] **21**. 22. [1923]) wurden die Häutchen auf Sn- oder Al-Folie niedergeschlagen. Die Dicke der Häutchen variierte zwischen 20–300 $\mu\mu$. Die magnet. Eigenschaften wurden für Felder bis zu 139 Gauß untersucht. In Zusammenfassung ergibt sich: Das Maximum der Intensität der Magnetisierung ist von derselben Größenordnung wie die für das massive Metall. Die Magnetisierung ist unabhängig von der Krystallgröße u. der Schichtdicke. Für Fe u. Co ergibt sich eine hohe Remanenz; Ni ergab einen niedrigen Wert, der der Oxydation zugeschrieben wird. Dagegen hängt die Remanenz von der Krystallgröße aber nicht von der Schichtdicke ab. Die Coercitivität ist groß für alle 3 Metalle u. sinkt plötzlich auf niedrige Werte, wenn die Dicke einen krit. Wert überschreitet, der für Fe, Co u. Ni ca. 55, 70 bzw. 200 $\mu\mu$ beträgt. Diese Ergebnisse scheinen der Kundtschen Folgerung zu widersprechen, daß die Hallspannung EK. der Intensität der Magnetisierung proportional ist. Das Zahlenmaterial ist aus 2 Tabellen zu entnehmen. (Physical Review [2] **24**. 658–65. 1924. Univ. of Iowa.)

K. WOLF.

Walther Gerlach, *Über die Richtungsquantelung im Magnetfeld*. II. Experimentelle Untersuchungen über das Verhalten normaler Atome unter magnetischer Kraftwirkung. (Vgl. S. 938.) Vf. beschreibt eine neue Versuchsanordnung zum Nachweis der Richtungsquantelung im Magnetfeld. Im Prinzip beruht sie darauf, daß ein Öfchen als Strahlenquelle auf bestimmte Temp. erhitzt wird u. durch eine Öffnung den Atomstrahl austreten läßt. Dieser passiert zwei enge Blenden, wodurch er annähernd parallel gerichtet wird u. gelangt dann durch ein inhomogenes magnet. Feld, welches von den Polschuhen zweier Magneten gebildet wird. Am Ende des Feldes befindet sich eine Platte zum Auffangen des Atomstrahls. Die ganze Versuchsanordnung wird in ein evakuierbares Gefäß eingeschlossen. Schwierigkeiten macht bei manchen Metallen die Entw. der unsichtbaren Ndd. auf der Auffangplatte. Am leichtesten gelang dies bei Ag, Au, Cu. Diese wurden in einer Lsg. entwickelt, welche auf 60–80 ccm einer 1%ig. Hydrochinonlsg. eine genügende Menge Gummiarabikum u. 1 ccm einer 1%ig. AgNO_3 -Lsg. enthielt. Dabei mußte auf peinlichste Sauberkeit des dest. W. geachtet werden, da sonst die Entw. ausblieb. Sn u. Ni lassen sich auf dieselbe Weise entwickeln. Dagegen gelingt dies bei Bi, Sb, Fe, Pb u. Tl schon schwieriger. Dies ist darauf zurückzuführen, daß die Atomstrahlen dieser Elemente an stark gekühlten Flächen niedergeschlagen werden müssen, wodurch sich auch Verunreinigungen mit kondensierten unsichtbaren Tl-Ndd. lassen sich schon nicht mehr so entwickeln, daß der Ag-Ndd. nur die Fläche des Tl-Nd. einnimmt. Sb u. Pb zeigten bei der Entw. Unrege-

igkeiten, so daß bei diesen Metallen der Vers. solange andauern mußte, bis die Schichtdicken von Atomstrahl niedergeschlagen waren. — Aus der Aufspaltung des Atomstrahles im Magnetfeld s , welche mkr. gemessen werden konnten, der Länge l des Feldes, dem Mol.-Gew. M , der abs. Temp. T des strahlenden Raumes u. der Inhomogenität des Feldes $\partial \mathfrak{H} / \partial s$ in Gauß-cm⁻¹ ergibt sich das magnet. Moment:

$$M^1 = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{s} \cdot \left(\frac{\partial \mathfrak{H}}{\partial s} \right)_0 \cdot \frac{l^2}{3,5 RT} \left[1 + \frac{1}{12} \frac{\left(\frac{\partial \mathfrak{H}}{\partial s} \right)_1}{s} - \frac{\left(\frac{\partial \mathfrak{H}}{\partial s} \right)_0}{s} \cdot \frac{M l^2}{3,5 RT} \right].$$

Eindeutiges Resultat ergab sich bei Ag, Cu, Au, welche übereinstimmend das Moment zeigten, welches die Richtungsquantelungstheorie von Atomen mit dem scheinbaren Moment von einem Magneton verlangt. Da diese Dämpfe einatomig sind, entspricht das Moment zum Normalzustand. Tl zeigt eine geringe magnet. Beeinflussung, welche mit den Aussagen der erweiterten Richtungsquantelungstheorie u. dem bekannten Normalzustand übereinstimmt. Pb u. Sn erleiden mit Sicherheit keine Aufspaltung im Magnetfeld. Beide Atome sind im Normalzustand unmagnet. Bi u. Sb-Dampf ist nicht mehr einatomig, sondern enthält auch Moll. Die Ergebnisse können in diesen beiden Fällen daher nicht einwandfrei gedeutet werden. Ni-Dampf ist wieder einatomig. Das Ni-Atom hat ein Moment von mehreren Einheiten. Es sind hier Aufspaltungen sicher nachgewiesen, welche 0 u. $\pm i$ Magnetonen (i etwa gleich 2) entsprechen. Es ist also in diesem Falle ein Multiplett aus Atomstrahlvers. nachgewiesen. Das Fe-Atom ist im Normalzustand unmagnet. Von Tl wurden keine eindeutigen Resultate erhalten. (Ann. der Physik 1916. 163—97. Frankfurt a. M., Univ.)

BECKER.

P. E. Verkade, H. Hartman und J. Coops Jr., Über die molekulare Verbrennungswärme der einander folgenden Glieder homologer Reihen. (Vgl. Rec. trav. chim. Pays-Bas. 43. 561; C. 1924. II. 1244.) Vff. deuten in dieser vorläufigen Mitteilung die Hauptlinien ihres Arbeitsprogrammes auf dem Gebiete der Verbrennungswärmen n. Glieder homologer Reihen an. Die Überprüfung der Verss. von STOHMANN u. seinen Mitarbeitern über die Verbrennungswärmen der Oxalsäurereihe (C₂ bis einschließlich C₁₀), die Vff. bis einschließlich die C₁₃-Säure fortsetzten, ergab folgende Resultate: Oxalsäure 60,2 (molekulare Verbrennungswärmen in al₁₅), Malonsäure 206,5, Bernsteinsäure 357,1, Glutarsäure 514,9, Adipinsäure 661,6, Pimelinsäure 827,7, Korksäure 983,4, Azelainsäure 1141,7, Sebacinsäure 1297,3, Undecarbonsäure 1455,6, Dekamethylendicarbonsäure 1610,7, Brassylsäure 1768,6. Fortgehende Verbrennungswärmen sind für eine isotherm. Rk. bei ca. 19,5° gültig. Die Verss. bestätigen die Schlußfolgerungen von STOHMANN. — Oxalsäure u. Malonsäure nehmen eine Sonderstellung ein. Anfangend bei Bernsteinsäure zeigt sich, wie eine große u. eine kleine Zunahme der Verbrennungswärme einander regelmäßig abwechseln. Der Mittelwert dieser Zunahme beträgt 158,2 bzw. 155,1 Cal₁₅. Beachtet man jedoch die geraden u. ungeraden Glieder als Reihen für sich, so ändern sich die Zunahmen der Verbrennungswärme in beiden Reihen nur wenig; die Mittelwerte sind 2156,7 bzw. 2156,7 Cal₁₅. Man kann also hier tatsächlich von 2 therm. homologen Reihen, die der Säuren mit gerader u. mit ungerader Gliednummer sprechen. Die eine Reihe ist um etwa 1,5 Cal₁₅ gegen die andere gehoben. Vff. heben ausdrücklich hervor, daß obige Mittelwerte der Zunahmen der Verbrennungswärme nur angegeben wurden zwecks Verdeutlichung der beobachteten Erscheinungen. Wenn auch in vielen Fällen eine äußerst merkwürdige Regelmäßigkeit in der Größe der Verbrennungswärmen organ. Verbb. beobachtet wird, eine additive Größe ist die Verbrennungswärme selbstredend nicht. (Koninkl. Akad. van Wetensch. Amsterdam, Wisk. en Natk. Afd. 33. 766—73. 1924. Rotterdam.)

K. WOLF.

O. Maass und L. J. Waldbauer, *Die spezifischen Wärmen und latenten Schmelzwärmen von Eis und einigen organischen Verbindungen*. Vff. messen die spezifischen Wärmen u. latenten Verdampfungswärmen zwischen -180 u. 0° nach folgender Methode: 25 g der zu untersuchenden Verb. wurden in einen Platinbehälter von 20 cem Inhalt eingeschlossen. Mit Hilfe von Bädern, die auf eine beliebige Temperatur des genannten Intervalls konstant gehalten werden konnten, wurde der Behälter mit Inhalt auf die gewünschte Temp. abgekühlt, dann schnell in ein adiab. Calorimeter gebracht u. in üblicher Weise die Gesamtwärmemenge gemessen, die von der Anfangstemp. bis zur Endtemp. ($16,5^{\circ}$) aufgenommen wurde. Dieselben Messungen wurden an dem leeren Platingefäß ausgeführt u. durch Subtraktion wurde der Wärmegehalt pro g Substanz gefunden. Die Anfangstemp. wurden variiert u. die Ergebnisse in einer Kurve aufgetragen, deren 1. Ableitung die spezif. Wärmen ergibt. Wenn die Verb. unterhalb von $16,5^{\circ}$ schmilzt, liefert die Kurve direkt die latente Schmelzwärme. Die Messungen wurden ausgeführt an *W., Bzl., Methanol, Aceton, Phenol, p-Xylol, Naphthalin* u. *Benzophenon*. Für Eis wird die Abhängigkeit der spezif. Wärme c von der Temp. durch die empir. Gleichung $c = 0,485 + 0,000914 t - 0,00000546 t^2$ für tiefe Temp. (von $-41,8^{\circ}$ an abwärts) wiedergegeben. Die berechneten Werte werden mit denen anderer Forscher verglichen. Vff. erhalten für 0° den Wert 0,485 während er von NERNST zu 0,2 berechnet wurde, die extrem hohen Werte von NERNST in der Nähe des F. führen die Vff. auf Spuren von Verunreinigungen zurück. Die latente Schmelzwärme des Eises wird zu 79,42 cal. berechnet. Die latente Schmelzwärme von Methanol (F. -97°) ergab sich zu 16,40 cal., von Bzl. (F. $5,49^{\circ}$) 30,56 cal., die Gefrierpunktskonstante (molekulare Gefrierpunkterniedrigung $\times 100$) 5025,5 (nach NERNST 4900). Die latente Schmelzwärme von Aceton (F. $-94,6^{\circ}$) ist 19,60 cal. Die spezif. Wärmen dieser Verb. bei verschiedenen Temp. sind in Tabellen und Kurven wiedergegeben. Die mittleren spezif. Wärmen im Temperaturintervall $-183,6$ bis $-78,2^{\circ}$ sind von p-Xylol 0,201, Phenol 0,167, Benzophenon 0,140, Naphthalin 0,140. Ein Vergleich der Molekularwärmen der organ. Verb. zeigt deutlich eine Abhängigkeit von der Konst. (Journ. Americ. Chem. Soc. 47. 1—9. Montreal [Can.] Mc GILL Univ.)

JOSEPHY.

M. Czerny und G. Hettner, *Messungen der thermischen Gleitung von Gasen*. Vff. erbringen den Nachweis für die Existenz einer therm. Gleitung in Gasen, indem sie ein Gas zwischen zwei parallelen Metallplatten durchströmen lassen. Eine der Platten befindet sich auf konstanter Temp., während an der anderen in der Strömungsrichtung des Gases ein Temperaturgefälle besteht. Es entsteht dann eine therm. Gleitströmung parallel zu den Platten. Durch das Temperaturgefälle der einen Platte hat die Strömung ihre größte Geschwindigkeit an der Oberfläche dieser Platte, wodurch diese einen Impuls entgegen der Stromrichtung erhält. Nach der Platte mit konstanter Temp. nimmt die Strömungsgeschwindigkeit ab u. überträgt auf diese einen Impuls in der Stromrichtung. Die auf die Platten ausgeübten Tangentialkräfte sind aus den Konstanten des Gases, der Temp. u. dem Abstand der beiden Platten zu berechnen. Andererseits wurde die Tangentialkraft mittels einer von den Vff. angegebenen Versuchsanordnung an *Luft, He* u. *H₂* gemessen. Es ergab sich in der Größenordnung eine Übereinstimmung zwischen den gemessenen u. berechneten Werten. Dem Absolutwert nach waren die beobachteten Werte zu hoch. Die Messungen ergeben eine strenge Proportionalität zwischen dem Radiometereffekt (der Tangentialkraft) u. dem Gasdruck. (Ztschr. f. Physik 30. 258—67. 1924. Berlin.)

BECKER.

A₂. Kolloidchemie. Capillarchemie.

H. R. Kruyt und Conmar Robinson, *Lyophile Kolloide und das Gesetz von*

ville. Vff. gelangen nach Diskussion der Arbeiten von HESS, FREUNDLICH, HALEK, SZEGVARI, OSTWALD, u. auf Grund ihrer Verss. mit $\frac{1}{4}\%$ ig. *Gelatinisol* einem abgeänderten Viscosimeter von HESS, zur Schlußfolgerung, daß aus reinen Teilchen bestehende Sole immer dem Poisseuilleschen Gesetz gehorchen, daß Abweichungen erst auftreten, wenn die primären Teilchen sich zu größeren aggregierten vereinigt haben, — sei es infolge einer Temperaturgelatinierung, sei infolge langsamer oder rascher Ausflockung. Während das frische V_2O_5 -Sol dem Poisseuilleschen Gesetz gehorcht, zeigen alte Sole erhebliche Abweichungen. Diesen Solen, die Doppelbrechung aufweisen, (wie die von Na-Stearat) sind sehr nadelförmige Teilchen. Vff. stellen daher die Tatsache fest, daß die Abweichungen vom Poisseuilleschen Gesetz erst in Erscheinung treten in Ggw. zu unengesetzter Teilchen. Über die diesbezügliche Erklärung kann man verschiedener Ansicht sein. (Koninkl. Akad. van Wetensch. Amsterdam, Wisk. en Natk. 33. 735—40. 1924. Utrecht, van't Hoff-Labor.) K. WOLF.

L. Dede und Th. Walther, *Die Darstellung kolloidaler Elemente durch photochemische Zersetzung ihrer gasförmigen Hydride. I. Die Darstellung des kolloiden Arsens.* Wird Arsenwasserstoff durch Einw. von kurzweiligen Strahlen unter W. zerlegt, so entsteht kolloides Arsen. Verd. Lsgg. sind gelb, konzentriertere rot bis schwarz, stärker konz. blau bis blauviolett. Nur die blauen Lsgg. sind schlechter, verd. Lsgg. halten sich einige Monate. Mit der Zeit tritt eine Aufhellung durch Oxydation des kolloiden As zu As_2O_3 ein. Gegen Zusatz von Elektrolyten zeigen die Lsgg. in der Kälte unempfindlich. Die salzsaure Lsg. scheidet beim Erhitzen As aus, die alkal. zeigt Aufhellung durch Oxydation. Der aus reinem AsH_3 mit 3-n. HCl entwickelte AsH_3 , wird durch mit W. gefüllte Quarzzyylinder geleitet, die mittels Quarzlampe bestrahlt werden. Nach 10 Minuten tritt Gelbfärbung ein, die bei längerer Bestrahlung intensiver wird. Konz. der blauen Lsgg. 0,37%, der roten 0,22% der gelben 0,09% As. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58. 102. Naheim, Inst. f. Quellenforsch.) LASCH.

E. Freundlich und F. Oppenheimer, *Über die Krystallisationsgeschwindigkeit in wässriger Sole.* Die Krystallisationsgeschwindigkeit des W. wird durch kolloid gel. Stoffe, deren Teilchen nicht kugelig sind, erhöht, während kugelige Teilchen ebenso wie echt gel. Stoffe die Krystallisationsgeschwindigkeit erniedrigen. Dies wurde von BRAUN (Journ. Americ. Chem. Soc. 40. 1168; WALTON u. BRAUN 18. 1161; C. 1919. I. 75. 1917. I. 363) für Fe_2O_3 -Sole eine Erhöhung der Krystallisationsgeschwindigkeit festgestellt. Dieses Sol hat blättchenförmige Teilchen. V_2O_5 -Sole haben stäbchenförmige Teilchen, die im frischen Sol noch nicht gerundet sind. Dem entsprechend nimmt die Erhöhung der Krystallisationsgeschwindigkeit mit dem Alter des Soles zu. Im Ganzen wurden 22 Sole bzw. Suspensionen u. Suspensionen bei Temp. zwischen -3 u. -7° untersucht u. obige Gesetzmäßigkeit festgestellt. Andere Eigenschaften der Sole, wie Größe der Teilchen, hydrophober oder hydrophiler Charakter haben auf die Krystallisationsgeschwindigkeit keinen Einfluß. Die Erhöhung der Krystallisationsgeschwindigkeit beruht sich wahrscheinlich daraus, daß die den kugeligen Teilchen benachbarten Wassermoleküle sich an diesen mit bevorzugter Richtung anlagern u. sich die Krystallisation an diesen gerichteten Molekülen rascher fortpflanzt als an ungerichteten. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58. 143—48. Berlin-Dahlem, Kaiser WILHELM-Institut f. physikal. Chemie.) LASCH.

N. K. Adam, *Die Struktur von Oberflächenhäuten auf Wasser.* Vff. bespricht die aus den experimentellen Ergebnissen früherer Arbeiten (vgl. Proc. Royal Soc. London. Serie A. 103. 687; C. 1923. III. 1294) gewonnenen Vorstellungen über die Anordnung u. die Kraftfelder der Molekeln in dünnen Oberflächenhäuten auf W. Die KW-stoffketten stehen untereinander parallel u. senkrecht zur W.-Oberfläche,

u. die polare Endgruppe ist gegen das W. gerichtet; die Dicke des Häutchen (26 Å.) entspricht bei Stearinsäure der röntgenometr. ermittelten Länge der Molekel. Bei kleinen seitlich ausgeübten Drucken sind die Endgruppen dicht gepackt, die KW-stoffketten berühren sich nicht; die unteren Teile der Kompressionskurve sind daher für jede Körperklasse charakterist. u. von dem Querschnitt der betreffenden Endgruppen abhängig. Bei größeren Drucken passen sich die Endgruppen in Einbuchtungen der KW-stoffketten ein, die sich unmittelbar aneinander anschließen. Der obere Teil der Kompressionskurve ist daher für die höheren Glieder verschiedener homologer Reihen gleich u. entspricht der Kompressibilität u. dem Querschnitt (20,7 Å.) dicht gepackter KW-stoffketten; der Packungswechsel bei Druckänderung ist reversibel. Bei Körpern, deren Endgruppen zu groß oder unsymmetr. sind, um sich in die KW-stoffketten einpassen zu können (Nicht- α -Bromfettsäuren u. a.), ist die molekulare Anordnung druckbeständig. Bei Phenolen mit langen Seitenketten z. B. sind wahrscheinlich die Bzl.-Ringe dicht in einer Ebene gepackt u. die Seitenketten vertikal nach oben, die OH-Gruppen gegen das W. gerichtet; der unter dieser Annahme berechnete Ringquerschnitt des Häutchen (23,8 Å.) stimmt mit dem röntgenometr. ermittelten (23,3 Å.) überein. Die Erhöhung des Endgruppenquerschnitts durch Einführung einer Doppelbindung an der α -Stelle zur COOH-Gruppe beruht anscheinend auf einer Knickung der Kette, die die Packung erschwert. Substituierte Harnstoffe (z. B. Octadecylharnstoff, Hexadecylacetanilid) existieren in zwei Packungen mit bestimmten Übergangszuständen.

Die Anziehungskräfte zwischen den polaren Endgruppen u. der Wasseroberfläche sind sehr erheblich, da sich manche Häute auf 30 dyn/cm zusammenpressen lassen; Substitutionen, die die Anziehungskraft vermindern (Methylierung von *p*-Octadecylphenol), setzen die Stabilität des Häutchen herab. Bei genügender Verdünnung falten sich nebeneinanderliegende Molekeln zu Doppelschichten auf, in denen die KW-stoffketten nebeneinander u. die polaren Endgruppen sich gegenüberliegen; aus derartigen Doppelschichten bestehen wahrscheinlich auch die Schichten, in denen diese Verbb. krystallisieren. Die Struktur gedehnter Häutchen ähnelt derjenigen zweidimensionaler Gase. Die Molekeln sind gleichfalls senkrecht zur Wasseroberfläche orientiert; die seitliche Anziehung wächst mit steigender Kettenlänge, wird durch Doppelbindungen vom Typus der Oleinsäure stärker erniedrigt u. durch solche der Elaidinsäure.

Vf. erklärt mit seiner Auffassung einige bekannte Phänomene. Der Querschnitt eines einwertigen Metallatoms ist größer als der einer KW-stoffkette, derjenige eines zweiwertigen Metallatoms kleiner als der Querschnitt zweier Ketten. Die durch Aneinanderlagerung mehrerer Molekeln fettsaurer Salze gebildeten Aggregate sind bei den Alkaliseifen an der polaren, wasseranziehenden Seite, bei den Ca-Seifen an der KW-stoffseite, die KW-stoffverbb. anzieht, konvex, schmiegen sich also im ersten Falle der Oberfläche von Öltröpfen in W., im zweiten derjenigen von Wassertropfen in Öl an, unter jeweiliger Erhöhung der Stabilität der Emulsionen. Daraus folgt auch die Neigung der Alkaliseifen zur B. kolloidaler Lsgg. in W., u. die Möglichkeit der B. kolloidaler Lsgg. der Ca-Seifen in B. Öl. Die reinigende Wrkg. der Seifen kommt dadurch zustande, daß die Schmutzmolekeln an der KW-stoffseite die Schmutzteile, an der polaren Seite Wassermolekeln festhalten u. so eine Anziehung zwischen Schmutzstoff u. W. vermitteln. (Journ. Physical Chem. 29. 87—101. Sheffield, Univ.)

Rames C. Ray, Die Adsorption von Stickstoffdioxid durch Silicagel. Die Fähigkeit, ob bei Adsorptionen durch Silicagel chem. Rkk. mit dem im Gel enthaltenen Wasser maßgebend sind, wird durch Verss. an N_2O_4 geprüft. Die Darst. von reinem N_2O_4 aus H_2SO_4 , HNO_3 u. As_2O_3 wird beschrieben; F. $-10,2^\circ$, Kp. $22,4^\circ$. Das Silicagel wurde durch dreistünd. Erhitzen auf 200° unter Luftdurchleiten aktiviert u. gegeben.

durch stärkeres Erhitzen entwässert. Die Adsorptionsisothermen bei 15, 57, 80° u. bei N₂O₄-Drucken von 11–49 mm Hg befriedigen außer bei Annäherung an die Sättigungsdrucke die Gleichung von FREUNDLICH u. sind für Gele mit 34,7% W. prakt. gleich; bei höher erhitzten, wasserärmeren Gelen ist die N₂O₄-Abnahme infolge Abnahme des Porenvol. durch teilweises Schmelzen geringer. Bei Adsorption des N₂O₄ gehen ca. 18% des im Gel enthaltenen W. in HNO₃ über, die Adsorptionsfähigkeit erleidet dabei keine wesentliche Einbuße. Das nicht in HNO₃ übergeführte N₂O₄ kann aus dem Gel durch h. Luft wieder ausgetrieben werden. (Journ. Physical Chem. 29. 74–86. London, Univ.) KRÜGER.

W. A. Patrick und D. C. Jones, *Studien über Adsorption aus Lösungen vom Gesichtspunkt der Capillarität*. I. Vf. untersuchen die Adsorption organ. Fl. aus wässrigen Lösungen durch *Silicagel* an folgenden Systemen: *Ameisensäure* aus Nitrobenzol, Toluol; *Essigsäure* aus CS₂, CCl₄, Toluol, Nitrobenzol, (F = 60–70°), Petroleum; (F = 270–290°) *n*-*Buttersäure* aus PAe., Petroleum, Toluol; *Bzl.* aus Petroleum; *Nitrobenzol* aus Petroleum; *Benzoessäure* aus Bzl., Chlf., CCl₄, Petroleum; *J* aus CCl₄ bzw. Petroleum. Die Ergebnisse können nach der Gibbs'schen Theorie nicht erklärt werden. Die Adsorption ist trotz der geringen Oberflächenspannung der Lösungsm. erheblich — bis 35% des Gelgewichts, — u. die adsorbierten Mengen eines Stoffes stehen in keiner Beziehung zu der Oberflächenabmessung des Lösungsm. Dagegen steigt die Adsorption aus verschiedenen Lösungsm. durchweg in der Reihenfolge, wie die Löslichkeit des gel. Stoffes abnimmt. Die Adsorptionsisotherme für das System Bzl.-Petroleum weist auf eine lineare Abh. zwischen Bzl. u. Silicagel. Vf. nehmen folgenden Verlauf des Adsorptionsvorganges an: vorzugsweise Benetzung des Gels durch geringe Mengen in der beiden Fl. unter B. stark konkaver Oberflächen verminderten Dampfdruck u. verminderter Löslichkeit in den V-förmigen Capillarräumen des Gels; die weitere Entmischung, bis die in der Lsg. vorhandene Menge der durch die Oberflächenkrümmung gegebenen Löslichkeit entspricht. Die gegenseitige Mischbarkeit zweier Fl. hängt also von der Gestalt der Grenzfläche ab. (Journ. Physical Chem. 29. 1–10. John Hopkins Univ.) KRÜGER.

Wilder D. Bancroft, *Entfernung von Gashäuten*. Vf. stellt verschiedene Phänomene zusammen, bei denen adsorbierte W.- u. Gashäute eine Rolle spielen. Die Tropfen zerstäubter Flüssigkeitsstrahlen vereinigen sich bei Wrkg. schwacher elektr. Ladungen, da durch auftretende Ladungsdifferenzen ein Ladungsaustausch zwischen den Teilchen unter Durchbrechung einer auf ihrer Oberfläche verdichteten Gashaut Vereinigung hindernden Lufthaut stattfindet; bei stärkerer Elektrisierung dagegen tritt infolge der gegenseitigen Abstoßung gleicher Ladungen Zerstreuung der Teilchen ein. Ähnliche Beobachtungen machte Vf. beim Eintritt von Dampfpartikeln in kalte Luft. Sind die Dampfpartikeln elektr. geladen, so erfolgt die Kondensation in wesentlich dichter Form (Vermehrung der Teilchenzahl unter Abnahme der Teilchengröße wegen der elektr. Abstoßung); die „dichte Kondensation“ tritt auch bei Erniedrigung der Lufttemp. unter ca. 10° auf. Vf. nimmt an, daß die V-Tröpfchen von einer Haut verdichteter Luft umgeben sind, die eine Berührung beim Zusammenstoß verhindert u. bei Steigerung der Temp. durch die obfte Bewegung von W.-Molekeln im Dampfzustand zerstört wird; oberhalb einer gewissen Temp. (ca. 70°) ist daher keine Zerstreuung von W.-Strahlen durch Elektrisierung möglich. Die bei Entladungen aus metall. Spitzen bisweilen beobachteten Verzögerungserscheinungen, die beim Stromdurchgang durch halbkugelförmige, aus den Enden feiner Röhren hervorragende W.-Tröpfchen allgemein auftreten, sind gleichfalls auf das Vorhandensein schlechtleitender Oberflächenschichten aus W.- bzw. Gasmolekeln zurückzuführen. (Journ. Physical Chem. 29. 20–33. Cornell Univ.) KRÜGER.

B. Anorganische Chemie.

A. Gutbier, *Aus der älteren Literatur über Ruthenium*. Vf. gibt eine Zusammenstellung der Rkk. des Ru, wie sie sich bei C. CLAUS in den „Beiträgen zur Chemie der Platinmetalle“ befindet. (Dorpat [1854] Verlag von E. I. KAROW.) (Ztschr. anorg. u. allg. Ch. **141**. 309—11. 1924. Jena, Univ.) JOSEPHY.

J. W. Bain, *Die Doppelsalze aus Kalium- und Natriumcarbonat*. Aus Analyse zweier gesätt. Lsgg. von K_2CO_3 u. Na_2CO_3 ergab sich für die feste Phase anscheinend die Zus. $14Na_2CO_3$ zu $1K_2CO_3$. Aus den Schwierigkeiten, das Gleichgewicht zwischen der festen Phase u. der Lsg. zu erreichen, schließt Vf. jedoch, daß ein Doppelsalz wahrscheinlich überhaupt nicht existiert. (Proc. Trans. R. Soc. Canada [3] **18**. Sekt. III. 273—74. 1924.) ZANDER.

Charles R. Bury, *Das System Zinksulfat-Wasser*. $ZnSO_4$ wurde mit W. V-förmigen Gefäßen eingeschmolzen, im Thermostaten erst maschinell, dann vorsichtig mit der Hand gerührt, so daß die feste Phase ganz in dem einen Schenkel sich befand. Sie wurde im Dampfbad gewichtskonstant getrocknet u. als $ZnSO_4 \cdot H_2O$ gewogen. Die Löslichkeit des Hexahydrats wurde von $11-61^\circ$ bestimmt. Zwischen 40 u. 50° besteht Übereinstimmung mit den Werten von CALLENDAR u. BARNES (Proc. Royal Soc. London **62**. 147 [1897]), zwischen 25 u. 39° mit denen von COHEN (Ztschr. f. physik. Ch. **34**. 179 [1900]). Unterhalb 25° hat dieser Autor augenscheinlich das Heptahydrat in den Händen gehabt. Das Hexahydrat geht unterhalb 11° spontan u. irreversibel in das monokline Heptahydrat über, bei ca. 60° ein anderes Hydrat, wahrscheinlich das Monohydrat; ein großer Teil davon bleibt in milchiger Suspension, die sich nur sehr schwer absetzt. Das monokline Heptahydrat entsteht am besten durch Krystallisation der übersätt. Lsg. bei -10° . Die Löslichkeit bei $7-23^\circ$ entspricht den von COHEN für das Hexahydrat angegebenen Werten. Es ist bei allen Temp. gegen die rhomb. Form instabil; ein Übergangspunkt liegt bei $24,8 \pm 0,3^\circ$, wo es im Gleichgewicht mit dem Hexahydrat liegt. (Journ. Chem. Soc. London **125**. 2538—41. 1924. Aberystwyth, Univ.) HERTER.

Kuverji Gosai Naik und **Mahadeo Dattatraya Avasare**, *Absorption von Halogenen durch Mercurosalze*. Teil I. *Bildung und Eigenschaften einiger Komplexeverbindungen des Quecksilbers*. Kurzes Referat bereits nach Journ. Americ. Chem. Soc. **45**. 2769; C. **1924**. I. 2677. In vorliegender Arbeit sind die Darstellungsweisen u. Eigenschaften der komplexen Halogenoquecksilberverbind. ausführlich beschrieben. (Quarterly Journ. Indian Chem.-Soc. **1**. 75—80. 1924. Baroda [Indien, Coll.]) JOSEPHY.

Alfred Stansfield und **W. V. Faith**, *Die Konstitution von Nickel-Kupfer-Sulfiden*. In Schmelzen von Gemischen von Ni u. Cu wurde S bis zur Sättigung eingetragen. Die Analysen der so erhaltenen Sulfide sind in Tabellen zusammengestellt; aus ihnen ist zu ersehen, daß stets soviel S aufgenommen ist, als zur Bildung der Sulfide Cu_2S u. Ni_3S_2 notwendig war. Die Sulfide bilden eine gegenseitig unlsg. u. trennen sich beim Erstarren; das eutekt. Gemisch enthält ca. $22,5\%$ Cu. Beim Abkühlen der Schmelzen findet bei ca. 545° (mit Ausnahme von reinem Cu) eine Wärmeentwicklung statt, was einer Umwandlung des Ni_3S_2 entspricht. Das Eutektikum hat F. 745° . (Proc. Trans. Roy. Soc. Canada [3] **18**. Sekt. 3. 325—4. 1924. Montreal, Mc GILL-Univ.) ZANDER.

A. Gutbier und **W. Niemann**, *Zur Frage der „isomeren Kaliumpentachlororutheniate“*. Vf. haben das von HOWE (Journ. Americ. Chem. Soc. **26**. 547 [1904]) beschriebene Kaliumaquo-chlororuthenat dargestellt u. es durch Erwärmen auf 100° bis 200° in die wasserfreie Verb. $K_2[RuCl_5]$ übergeführt, die von AOYAMA (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. **138**. 249; C. **1924**. II. 2134) „ β -Kaliumpentachlororuthenat“ genannt worden ist; doch wichen die Eigenschaften des von Vf. dargestellten

rates vollständig von denen ab, die AOYAMA dem β -Salz zuschreibt, sie stimmten mehr mit denen überein, die AOYAMA dem „ γ -Kaliumpentachlororuthenit“ zuschreibt. Die Lsg. des entwässerten Salzes reagiert nur dann wie das Howesche Salz, wenn jenes mehrere Stdn. lang unter der Einw. von HCl gestanden hat, wenn seine Lsg. in verd. HCl aufgekocht worden ist. Vf. sieht keine Gründe für die Existenz eines γ -Salzes. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. **141**. 312—16. 1924. Univ.)

JOSEPHY.

D. Organische Chemie.

iffeneau und A. Orehow, Über die Wanderungsfähigkeit organischer Radikale.

Einführung. (Vgl. S. 381.) Von allen organ. Rkk., bei denen Umlagerungs- und Wanderungserscheinungen festgestellt worden sind, eignen sich die Pinacolin- und Pinopinacolinumlagerungen am besten dazu, die Wanderungsfähigkeit organischer Radikale zu prüfen. Aus den in der chem. Literatur veröffentlichten experimentellen Ergebnissen lassen sich bzgl. der Wanderungsfähigkeit vorerst nur wenige Tatsachen verwerten. Von aromat. Radikalen läßt sich folgende Reihenfolge der Wanderungsfähigkeit aufstellen: $p\text{-CH}_3\text{-C}_6\text{H}_4$ u. $p\text{-CH}_3\text{O-C}_6\text{H}_4 > \text{C}_6\text{H}_5 > p\text{-C}_6\text{H}_4\text{Br} > p\text{-C}_6\text{H}_4\text{Cl} > o\text{-(m)-C}_6\text{H}_4\text{Cl}$ u. $o\text{-(m)-C}_6\text{H}_4\text{Br}$; bei aliph. Radikalen ergibt sich die Reihenfolge C_4H_9 u. $\text{C}_2\text{H}_5 > \text{CH}_3 > \text{C}_3\text{H}_7$; ob in diesen Fällen die Radikale mit einer geraden Anzahl von C-Atomen stets größere Wanderungsfähigkeit besitzen als mit ungeraden C-Atomen müssen weitere Unters. zeigen. Bzgl. der Wanderungsfähigkeit gemischter Radikale (z. B. $\text{C}_6\text{H}_5\text{-CH}_2$) läßt sich feststellen, daß die Reihenfolge $\text{Ar} > \text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_2 > \text{C}_n\text{H}_{2n+1}$ gilt. Die Ursachen der verschiedenen Wanderungsfähigkeit der Radikale sind noch nicht klar erkannt. Größeres oder kleineres Mol.-Gew. des Radikals steht in keiner festen Beziehung zur Wanderungsfähigkeit. Versucht man die Haftfestigkeit der Radikale zur Wanderungsfähigkeit in Beziehung zu bringen, so ergibt sich, daß die am festesten sitzenden cycl. Radikale am leichtesten wandern. Beim Vergleich der cycl. Radikale unter sich findet man ebenfalls die auffällige Tatsache, daß die Radikale, die die größte Haftfestigkeit besitzen auch die wanderungsfähigsten sind. Bzgl. der aliph. u. gemischten Radikale kann man feststellen, daß die Wanderungsfähigkeit der Haftfestigkeit umgekehrt proportional ist; für letztere gilt die Reihenfolge (vgl. oben) $\text{CH}_3 > \text{C}_3\text{H}_7 > \text{C}_4\text{H}_9 > \text{C}_6\text{H}_5\text{-CH}_2$, woraus sich ergibt, daß CH_3 u. C_3H_7 aus der Reihe der cycl. Radikale (Bull. Soc. Chim. de France [4] **35**. 1639—53. 1924. Hôpital Boucicaut.) HAB.

Warts, Die organischen Fluorverbindungen. Zusammenfassender Vortrag. (Bull. Soc. Chim. de France [4] **35**. 1533—63. 1924. Gent.) HABERLAND.

Ussol, Elektrolytische Darstellung von Dijodacetylen und Dijodoform. Die Darstellung der Verb. geschieht auf folgende Weise: 10 g KJ + 300 ccm mit Acetylen gesätt. W. werden in einem mit Zu- u. Ableitungsrohr für C_2H_2 versehenen Gefäß (wie im Original) mittels Pt-Elektroden 4 Stdn. mit 0,5 Amp. elektrolysiert. Die Elektrolyse befindet sich in einer am Boden durchlöchernten oder mit Pergamentpapier ausgelegten porösen Zelle; das sich abscheidende Dijodacetylen, JC:CJ , ist weiß, hat einen erdähnlichen Geruch, F. ca. 80°. Zur Gewinnung von Dijodoform, $\text{J}_2\text{C:CJ}_2$, wird das vorige nicht isoliert, sondern durch Zugabe von HCl zum Elektrolyten so gemacht, daß während der Elektrolyse nach: $3\text{NaOJ} = 2\text{NaJ} + \text{NaJO}_3$ gebildeten NaJO_3 zersetzt, die sich ihrerseits umsetzen nach: $\text{JO}_3\text{H} + 5\text{HJ} = 3\text{H}_2\text{O} + 3\text{J}_2$; das sich gebildete J_2 bildet mit vorigem Dijodoform, F. 190—191°. Stromausbeute ca. 10%. Diese Verb. bildet sich sogleich, wenn eine J-KJ-Lsg. zur Elektrolyse angewendet wird. (Bull. Soc. Chim. de France [4] **35**. 1618—29. 1924. Toulouse, Fac. des Sciences.)

HABERLAND.

lex. McKenzie und Thomas Martin Aitken Tudhope, Versuche über die alkalische Umkehrung. Teil XI. Substitution der Hydroxylgruppe bei den sekun-

düren Octylalkoholen durch Halogen. (X. vgl. MC KENZIE u. WALKER, Journ. Chem. Soc. London **107**. 1685; C. **1916**. I. 361.) Veranlaßt durch die Mitteilung von LEVE u. MIKESKA (Journ. Biol. Chem. **59**. 473; C. **1924**. II. 1172), teilen Vf. die Ergebnisse ihrer bisherigen Verss. mit. Die von jenen beobachtete Drehungsänderung Einw. von SOCl_2 auf opt.-akt. sek. Octylalkohole wird bestätigt u. auch mit SO_2 erhalten, wie sie auch von PICKARD u. KENYON (Ber. Dtsch. Chem. Ges. **45**. 15 C. **1912**. II. 113) mit HCl oder HBr festgestellt ist. d-2-Chloroctan wurde höherem Drehungsvermögen, $[\alpha]_D^{20} = +33,7^\circ$, erhalten als von den bisherigen Untersuchern, ohne daß schon Gewähr für opt. Reinheit gegeben ist, die Br-Verf. dagegen von niedrigerem als bei PICKARD u. KENYON. Einw. von Ag-Acetat auf das d-Chloroctan lieferte einen linksdrehenden, offenbar aber teilweise racemisierten Essigsäureester. (Journ. Biol. Chem. **62**. 551—56. 1924. Dundee [Schottland], University of St. Andrews.) SPIEGEL

A. Verley, Über die Konstitution des natürlichen Methylheptenons. (Antwort an Herrn V. Grignard.) Bzgl. des Befundes von GRIGNARD, DOEUVRE u. ESCOURBIEU (C. r. d. l'Acad. des sciences **177**. 669; C. **1924**. I. 750) daß das aus Citral erhaltene Methylheptenon hauptsächlich aus der β -Form besteht, bemerkt Vf., daß die die Ansicht bedingenden unterschiedlichen experimentellen Ergebnisse wahrscheinlich darauf zurückzuführen sind, daß GRIGNARD mit einem Citral anderen Ursprungs gearbeitet hat. (Bull. Soc. Chim. de France [4] **35**. 1653—55. 1924.) HABERLAND

E. G. R. Ardagh, **A. D. Barbour**, **G. E. McClellan** und **E. W. McBride**, Destillation von Calciumacetat. Die B. von Aceton durch Erhitzen von Ca-Acetat findet erst oberhalb 400° statt. Die besten Ausbeuten erhält man von 430 — 440° , wenn stets dafür Sorge getragen wird, daß das gebildete Aceton sofort fortgeführt wird. Je höher die Temp., desto größer der Acetonverlust beim Verbleiben desselben in der Retorte. Wahrscheinlich tritt Polymerisation ein. Zum Abtrennen der Acetondämpfe benutzt man mit Vorteil N oder CO_2 , Luft ist ungeeignet. Reines, wasserfreies Ca-Acetat stellt man her durch Sättigung von reiner Essigsäure mit CaCO_3 u. Erhitzen des Prod. auf 150° 24 Stdn. lang in einem Strome von trockenem N. (Ind. and Engin. Chem. **16**. 1133—39. 1924. Toronto [Can.]) GRIGG

W. H. Hatcher und **G. W. Holden**, Wasserstoffperoxyd als Oxydationsmittel in saurer Lösung. II. (Vgl. HATCHER, Proc. Trans. Roy. Soc. Canada [3] I. Sekt. 3. 119; C. **1924**. II. 457.) Bei der Rk. zwischen Oxalsäure u. H_2O_2 bildet sich nur CO_2 u. W., kein CO; die Rk. ist monomolekular. Der Verlauf der Rk. wird bei verschiedenen Temp. u. unter Zusatz von Mineralsäuren gemessen. — Na-Formiat wird durch H_2O_2 in neutraler Lsg. nicht angegriffen, wirkt aber zersetzend auf H_2O_2 -Lsgg. Bei der Oxydation der Ameisensäure mit H_2O_2 bildet sich anscheinend Perameisensäure HCOOOH . Der Verlauf der Rk. wird wie bei Oxalsäure (Einfluß der Temp., der Konz. u. des Zusatzes von Mineralsäuren) untersucht. Die Rk. ist monomolekular. (Proc. Trans. Roy. Soc. Canada [3] **18**. Sekt. III. 231—46. 1924. Montreal, MC GILL-UNIV.) ZANDER

P. Karrer und **B. Joos**, Polysaccharide. XXX. Zur Kenntnis des „Isolichenin“. (XXIX. vgl. S. 656.) Entgegen der Angabe von PRINGSHEIM (Ber. Dtsch. Chem. Ges. **57**. 1581; C. **1924**. II. 2245), wonach das Isolichenin quantitativ zu Maltose aufgespalten werden konnte, wird nachgewiesen, daß dieses Polysaccharid ein Gemisch verschiedener Kohlenhydrate ist. Durch Fehlingsche Lsg. bei alkal. Rk. gelingt die Trennung in eine unl. Cu-Verb. (A) u. eine l. (B). Die Reinigung von A u. B erfolgt durch Umfällen in wss. salzsaure Lsg. mit A. A ist in w. W. unl., reduziert Fehlingsche Lsg. nicht, gibt mit J keine Stärkerk. $[\alpha]_D = +88^\circ$. Die Unters. der mit 5%ig. HCl erhaltenen Hydrolyseprodd. von A ergab die Anwesenheit von etwa 21% Mannose, 35% Galaktose, 45% andere Kohlenhydrate, hauptsächlich Glucose. Fraktion B: ll. in k. W., reduziert Fehlingsche Lsg. spurenweise

ärbt sich mit J-Lsg. schwach blau. $[\alpha]_D = +148^\circ$. Die Substanz ist nicht einheitlich. Nach 2-std. Hydrolyse mit 5%ig. HCl ließ sich titrimetr. die Anwesenheit von 90,2% Galaktose feststellen. Beim Abbau des *Glykogens* mit Glycerin bei 9 konnte das von PRINGSHEIM (l. c.) beschriebene *Trihexosan* nicht nachgewiesen werden. Ferner wird darauf hingewiesen, daß die als Abbauprodukt der Stärke beschriebene *Triamyllose* (vgl. PRINGSHEIM, Die Polysaccharide, II. Aufl., 168 [1923]) ident. ist mit der β -Hexamyllose (vgl. hierzu KARRER u. Mitarbeiter, Helv. chim. Act. 5. 181; C. 1922. III. 601). (Ztschr. f. physiol. Ch. 141. 311—15. 1924. Zürich, GUGGENHEIM.)

K. Hess, *Neue Ergebnisse der Celluloseforschung*. X. Mitteilung über *Cellulose*. (vgl. WELTZIEN u. NAKAMURA, S. 949.) Der hauptsächlichste Inhalt des Vortrags ist bereits früher referiert worden (vgl. HESS, WELTZIEN u. MESSMER, Ber. Dtsch. Chem. Ges. Ann. 435. 1; C. 1924. I. 751); die Drehwerte verschiedener Cellulosen in Kupferamminlsg. ermöglichen nach der letztgenannten Arbeit eine Entscheidung darüber, ob diese Cellulosen ident. sind oder nicht. Als Ergänzung der früheren Untersuchungen wurden Holz- u. Baumwollcelluloselsgg. untersucht u. dabei festgestellt, daß diese Cellulosearten chem. ident. sind. Desgleichen wurden verschiedene *Cellulosefraktionen* (Tabelle im Original) nach dem Verseifen in SCHWEIZERS Reagens bzgl. ihrer Drehung untersucht; die erhaltenen Werte zeigen geringfügige Abweichungen, die die Annahme einer grundsätzlichen Verschiedenheit der Präparate nicht zulassen. Durch besondere Reinigungsmethoden gelingt es, die Unterschiede gut auszugleichen. Reine Acetylcellulose bildet mit $C_2H_2Cl_4$ eine gut kristallisierende Doppelverb. (Abb. im Original), die alle Eigenschaften der Acetylcellulose zeigt; Zers. bei 250° bei 260° , $\alpha = 20^\circ$ (in Chlf. oder $C_2H_2Cl_4$); diese Doppelverb. mit ident. Eigenschaften bildet sich aus allen Acetylcellulosen verschiedenster Herkunft; Unterschiede, die die ursprünglichen Acetylcellulosen zeigen, müssen auf geringfügige Verunreinigungen zurückgeführt werden. — Die Tatsache, daß aus verschiedenen Cellulosen nach Auflösen in Kupferamminlsg. u. Ausfällen Präparate erhalten werden, die kein einheitliches Verh. bzgl. ihrer Löslichkeit zeigen, daß verseifte Acetylcellulosen sich ebenso verhalten, u. daß diese verschiedenen Cellulosen mit Kupferamminlsg. molekular durchreagieren (die Lsgg. sind keine echten Lsgg.) liefert eine Erklärung in dem gleichartigen Verh. gewisser Silikate. Die unl. Alkalialuminiumsilikate (künstliche Permutite, natürliche Zeolithe) vermögen sich trotz ihres festen Zustandes mit der in den sie umgebenden Lsgg. befindlichen Kationenart im Gleichgewicht zu setzen (vgl. FREUNDLICH, Kolloidchemie u. Biologie 1924. S. 1), die Verbb. reagieren so, als ob sie vollkommen gel. sind. Man kann nun die kolloidal in Schweizer-Lsg. gel. Cellulose als kolloidal gel. Permutoid auffassen, die unabhängig vom Dispersitätsgrad mit Cu molekular stets nach der gleichen Messenwirkungsbeziehung durchreagiert. Die Kräfte, die zwischen den $C_6H_{10}O_5$ -Molekülen wirksam sind, müssen auf eine Art Gitterkräfte zurückgeführt werden, die durch geringfügige Verunreinigungen, die auch durch Drehwertsbest. nicht erkennbar sind, beeinflußt werden u. Unlöslichkeit oder Krystallisationsvermögen bedingen.

Hydrocellulose u. *Oxycellulose* liefern Cu-Zahlen, die der von Cellulose A gleichkommen; der überwiegend größte Teil der sogenannten Oxycellulose ist durch Sauerwrgk. entstandene Cellulose A. — Zwecks Prüfung der von KARRER vertretenen Ansicht über die Identität von *Lichenin* mit Cellulose bzw. Hydrocellulose wurde mittels Cl_2 u. Na_2SO_3 aus *Cetraria islandica* Lichenin dargestellt; das erhaltene Produkt war prakt. frei von Asche u. SiO_2 u. hatte in Schweizer-Lsg. $\alpha^{22} = 2,34^\circ \pm 0,01$ (äquivalente $C_6H_{10}O_5 + 10$ Mol $Cu(OH)_2$). Die Drehwertkurven (Abb. im Original) zeigen, daß Lichenin u. Cellulose nicht struktident. sind. Lichenin läßt sich, wie schon KARRER gezeigt hat, in Cellobiose überführen. Die von KARRER festgestellte

Übereinstimmung des Drehwerts von *Licheninacetat* ($[\alpha]_D - 23,8^\circ$) mit *Celluloseacetat* ($[\alpha]_D - 24^\circ$) läßt sich nach den Unterss. des Vf. nicht aufrecht erhalten. Die reinsten *Licheninacetat*-Präparate des Vf. hatten $[\alpha]_D - 32^\circ$, u. die Verseifungsprodukte erwiesen sich noch als erheblich verunreinigt. Vf. ist der Ansicht, daß nach Verlauf der Drehwertskurven in Schweizer-Lsg. *Lichenin* möglicherweise ein Gemisch mehrerer Komponenten ist. (Ztschr. f. angew. Ch. **37**, 993—1003 Berlin-Dahlem.)

HABERL.


J. W. Bain und **G. F. Kay**, *Die Einwirkung von Hitze auf Cellulose*. Dem trockenen Erhitzen war die *Cellulose* (Baumwolle) gelb bis braun gefärbt nach der Temp. u. der Dauer des Erhitzens. Nach dem Auskochen mit W. wurde der Extrakt auf dem Wasserbade bis zu einem dicken Sirup eingedampft. Verd. mit W. blieb ein unl. Rückstand zurück, nach dem Wiederverdampfen wurde ein schwach saurer dunkelbrauner Sirup erhalten. Mit Phenylhydrazin wurde gelbes Osazon (F. 202—203°) erhalten (Nadeln), das offenbar mit *Glucosazon* (F. 192—193°) ident. war. Die extrahierte Cellulose kann von neuem erhitzt werden u. liefert dann wieder den gleichen Extrakt, 30 g Cellulose gaben nach 3 Stdn. bei 1,31% Extrakt, beim zweiten Male (1 Stde. bei 230°) 1,8%. — Beim mehrmaligen Erhitzen mit W. unter Druck auf 190—200° (cr. 6 Stdn.) wurde wieder ein dicker Sirup erhalten, der Fehlingsche Lsg. stark reduzierte; ein Osazon konnte jedoch nicht erhalten werden. (Proc. Trans. Roy. Soc. Canada [3] **18**, Sekt. III. 269—270 1924.)

ZANDER.

B. Flürscheim, *Theorie der Substitution in aromatischen Verbindungen*. Polarkritik gegen die letzten Publikationen von LAPWORTH u. ROBINSON. Die „negativen“ Atome substituieren in aromat. Aminen u. Phenolen nie in m-Stellung; die induzierten Polaritäten haben demnach nichts mit dem Substitutionsprozeß zu tun. (Chemistry and Ind. **44**, 33—34.)

ZANDER.

G. Stafford Whitby und **G. Laurence Matheson**, *Einige Schwermetallsalze von disubstituierten Dithiocarbaminsäuren*. Im Gegensatz zu den Salzen der monosubstituierten Dithiocarbaminsäuren zeichnen sich die Schwermetallsalze der disubstituierten durch große Beständigkeit aus. Parallel damit geht ihre Einwirkung auf die Vulkanisation des Kautschuks; der letzteren Klasse von Verbb. gehört eine ganze Reihe der wirksamsten bekannten Vulkanisationsbeschleuniger an. Die Salze wurden durch Einw. von wasserl. Schwermetallsalzen (Acetaten) auf die Kondensationsprodd. von CS_2 mit Aminen gewonnen. — Von den wasserunl. Es wurden die NH_4 -Dithiocarbamate (Amin + CS_2 in ammoniakal. A.) mit Schwermetallsalzen umgesetzt. Die disubstituierten NH_4 -Salze der Dithiocarbaminsäuren werden aus 1 Mol. CS_2 u. 2 Mol. Amin in äth. Lsg. erhalten:



Pentamethylendithiocarbaminsäure, $C_5H_{10}N \cdot CSSH$, Zn-Salz F. 232°, Cd-Salz F. 257°, Ni-Salz F. 295,5°. — *Diäthylthiocarbaminsäure*, $(C_2H_5)_2N \cdot CSSH$, Zn-Salz F. 180°, Cd-Salz F. 251° (Zers.), Ni-Salz F. 236°. — *Dipropylthiocarbaminsäure*, $(C_3H_7)_2N \cdot CSSH$, Zn-Salz F. 114°, Cd-Salz F. 160,5°, Ni-Salz F. 135,5°. — *Phenylmethylthiocarbaminsäure*, $(C_6H_5)(CH_3)N \cdot CSSH$, Zn-Salz F. 254°, Cd-Salz F. 279° (Zers.), Ni-Salz F. ca. 300° (Zers.). — *Phenyläthylthiocarbaminsäure*, $(C_6H_5)(C_2H_5)N \cdot CSSH$, Zn-Salz F. 208°, Cd-Salz F. 281°, Ni-Salz F. 271°. — *Phenyl-i-amylthiocarbaminsäure*, $(C_6H_5)(C_5H_{11})N \cdot CSSH$, Zn-Salz F. 247°, Cd-Salz F. 222°, Ni-Salz F. 196°. (Proc. Trans. Roy. Soc. Canada [3] **18**, Sekt. 3. 111—14. 1924. Montreal.)

Mc GILL-Univ.)

ZANDER.

G. Charrier und **A. Berretta**, *Oxydation von o-Chinonen*. Die Oxydation von *o-Chinone* durch verd. alkal. Lsgg. von $KMnO_4$ wird als Additionsrk., analog derjenigen an Äthylenbindungen, aufgefaßt.

$n_D^{17} = 1,448$; aus ersterem wird durch Erhitzen in A. mit Zn-Staub γ -Heptin C_7H_{14} , erhalten, Kp. 97—98°, $D_4^{17} 0,690$, $n_D^{17} = 1,393$. — Aus Önanthol + wurden erhalten: Heptin, Ag-Verb. $C_7H_{11}Ag$, $AgNO_3$, u. die l. c. angegebene Chloride. — Aus Acetophenon + PCl_5 wurde das Monochlorid neben wenig Chlorid erhalten; aus Propiophenon + PCl_5 wurden isoliert; das Monochlorid, Kp. bis 91°, wenig Dichlorid, Kp. 120° u. Kp. 75—80° eine flüchtige styrolartig riechende Verb., die kein Hg-Deriv. lieferte. (Bull. Soc. Chim. de France [4] 35. 1629. 1924. École n. sup.)

HABERLAN.

Charles De Witt Hurd und **Henry J. Brownstein**, Umlagerung von Diphenyl-p-tolylacethydroxamsäure. (Vgl. HURD, Journ. Americ. Chem. Soc. 45. 1. C. 1923. III. 1458.) Die genannte Säure bzw. ihre Deriv. lagern sich in phenyl-p-tolylmethyl-i-cyanat, $CH_3 \cdot C_6H_4 \cdot C(C_6H_5)_2NCO$, um. Die B. dieses i-Cyanats ist ein weiterer Beweis für die früher (vgl. JONES u. HURD, Journ. Americ. Chem. Soc. 43. 2422; C. 1922. III. 509) aufgestellte Hypothese, daß die Umlagerung um so leichter erfolgt, wenn das in der Hydroxamsäure befindliche Radikal in diesem Falle p-Tolyldiphenylmethyl in freiem Zustande (vgl. GOMBERG, Ber. Dt. Chem. Ges. 37. 1633 [1904]) existenzfähig ist.

Versuche. Diphenyl-p-tolylacetylchlorid, aus der Säure + $SOCl_2$, F. 89—90°. Diphenyl-p-tolylacethydroxamsäure, $C_{21}H_{19}O_2N$, aus voriger in PAe. durch Zugabe von NH_2OH ; wird von unverändertem NH_2OH u. dessen Chlorhydrat durch Lösen in CCl_4 getrennt; hieraus weiße Krystalle, F. 146,5°, l. in Ä., Essigester, Chlf., A. u. Bzl., unl. in W. u. Lg.; alkoh. Lsg. + $FeCl_3$ gibt Rotfärbung. Acetyler, $C_{23}H_{21}O_3N$, aus Lg.-Bzl. F. 135°, wl. in Lg. u. W., sonst ll. in org. Mitteln; wird eine alkoh. Lsg. dieses Esters mit alkoh. KOH u. danach mit H_2SO_4 Lsg. versetzt, so fällt eine geringe Menge des K-Salzes des Esters gelatinös aus; das Filtrat wird durch Eindampfen ein Gemisch des unten genannten Uretans u. i-Cyanats erhalten. — Das Na-Salz des Acetylers, dargestellt durch Mischen alkoh. Lsgg. des Esters mit C_2H_5ONa u. Zugabe von Ä. — PAe. fällt ebenfalls gelatinös aus; wird der Nd. in wenig W. gel., so entsteht unter Gasentw. ein Öl, das nach einiger Zeit erstarrt, F. 60—68°, u. das vielleicht das i-Cyanat ist; dieses Öl gibt in konz. H_2SO_4 eine gelbe Lsg., aus der durch W.-Zusatz ein weißer Nd. ausfällt. — Das nach Entfernen des gelatinösen Nd. erhaltene Filtrat wird eingedampft u. der Rückstand mit Ä. behandelt; hierin unl. war Diphenyl-p-tolylmethyluretan, $C_{23}H_{23}O_2N$, F. 116—118°, Erweichen bei 114°; die äth. Lsg. enthält Diphenyl-p-tolylmethyl-i-cyanat, identifiziert durch Umsetzen mit $C_6H_5NH_2$ zu Phenyldiphenyl-p-tolylmethylharnstoff, $CH_3 \cdot C_6H_4 \cdot C(C_6H_5)_2NH \cdot CO \cdot NH \cdot C_6H_5$, aus Ä. F. 213—214°, unl. in W. u. Lg., wl. in Ä., A. u. Bzl., ll. in Essigester. (Journ. Americ. Chem. Soc. 47. 174—78. Evanston [Ill.], Univ.)


HABERLAN.

Marcel Delépine, Strukturbeziehungen zwischen den Pinenen und den daraus hervorgehenden Terpeneolen und Limonenen. (Bull. Soc. Chim. de France [4] 5. 1655—58. 1924. — C. 1925. I. 373.)

HABERLAN.

H. Rupe, Untersuchungen über den Einfluß der Konstitution auf das Drehungsvermögen optisch aktiver Substanzen. XVII. **E. Kopp**, Die anomale Rotationsdispersion bei Ketonen. (XVI. vgl. RUPE u. GLENZ, LIEBIGS Ann. 436. 14. C. 1924. I. 2688.) Bornylencarbonsäure (I) u. Methylencamphercarbonsäure (II) zeigen n. Rotationsdispersion; die $[\alpha]_D$ -Werte von II sind infolge der opt. wirksamen Konjugation der Doppelbindung höher als die von I. Das Reduktionsprodukt von I, Camphancarbonsäure (III), dreht infolge Verschwindens der Doppelbindung bedeutend schwächer; bei III ist durch die Red. in α -Stellung ein neues a. C-Atom entstanden; bezeichnet man dieses mit B. u. den ursprünglichen opt.-akt. Komplex mit A, so können die Formen (+ A + B) u. (+ A—B) auftreten; auf letztere kann die Abnahme der Rotation ebenfalls zurückzuführen sein. — Borneolcarbonsäure

u. ihre Ester zeigen n. Rotationsdispersion. *Methyl- u. Äthylbornylenketon* ($R = CH_3$ bzw. C_2H_5) haben (in Substanz geprüft) fast dieselben $[\alpha]_D$ -Werte; Ketone haben anomale Rotationsdispersion, die beim Methylketon besonders ausgeprägt ist. Bei den entsprechenden *Camphanketonen* zeigt das Methylketon totale Anomalie der Rotationsdispersion, das Äthylketon starke anomale Dispersion; es zeigt sich auch hier (vgl. RUPE u. JÄGGI, LIEBIGS Ann. 428. 164; 1922. III. 1039), daß der Einfluß von CH_3 in Verbindung mit einer Ketogruppe so stark ist wie C_6H_5 . Die starke Beeinflussung des a. C-Atoms würde, da die CH_3 -Gruppe von dem C, mit dem sie verbunden ist, mehr Valenz beansprucht als eine C_2H_5 -Gruppe, bedingt sein durch einen Affinitätsmangel am C-Atom der Ketogruppe, so daß zur Bindung des O-Atoms weniger Valenz vorhanden ist, statt dessen aber das O-Atom noch über Restaffinitäten verfügt. Bei den bisher untersuchten Ketonen (Tabellen im Original) gibt es mehr Verbb. von anomaler als von normaler Rotationsdispersion; der Einfluß, den die $R \cdot CO$ -Gruppe ausübt, tritt deutlich hervor, u. zwar nicht nur dann, wenn diese Gruppe zu einer der vier am a. C-Atom verbundenen Gruppen gehört, sondern auch z. B. bei IV; das Verschwinden der Doppelbindung hierin bedingt nur eine Abnahme der anomalen Dispersion. Zur Erklärung des opt. Verh. der Ketone ziehen Vff. zwei Faktoren heran: bei den Verbb. mit mehreren a. C-Atomen können 2 verschiedene Formen entstehen, die entgegengesetztes Vorzeichen u. verschieden verlaufende Dispersionskurven haben; die Resultante aus diesen Kurven ist die experimentell ermittelte Kurve, die unter bestimmten Umständen eine Anomalie besitzen kann; als zweiter Faktor kommt die spez. Wrkg. der $CO \cdot CH_3$ -u. COC_6H_5 -Gruppe (bisweilen auch der COC_2H_5 -Gruppe) in Betracht. Daß zur Entstehung einer anomal dispergierenden Substanz beide Faktoren erforderlich sind, beweist das Beispiel des *Methylcamphanketons* (vgl. Tabelle im Original), bei dem vollkommen n. u. anomale Dispersion festgestellt wurde. — Die *Benzylidenderivv.* V u. VI zeigen n. Rotationsdispersion; die von beiden Formen der Methylcamphanketone abgeleiteten Benzylidenverbb. (VI) sind chem. u. opt. ident. geworden. Für das opt. Verh. der Benzylidenderivv. läßt sich eine Erklärung daraus ergeben, daß z. B. in V eine fortlaufende Konjugation von Doppelbindungen vorliegt u. daß infolge Absättigung der Partialketten die spez. Wrkg. der $COCH_3$ -Gruppe verschwindet. Zur Erklärung der Gleichförmigkeit von VI muß man außerdem noch annehmen, daß in dem vorher beschriebenen System $(+ A + B)$ u. $(+ A - B)$ durch Einw. der bei der Kondensation benutzten Alkalilauge $(+ A - B)$ in $(+ A + B)$ übergeht, ein Fall, der jedoch nicht immer eintreten muß.



Versuche. *cis-trans-Borneolcarbonsäure*, Darst. durch elektrolyt. Red. von *Cephocarbonsäure* nach BREDT (LIEBIGS Ann. 366. 1 [1909], F. 171^o, $[\alpha]_D^{20} = 45.9$ (1 = 1, 10%ig. alkoh. Lsg., weitere Werte, wie auch für die nachgenannten Subst. vgl. Original); *Äthylester*, $C_{13}H_{22}O_3$, zähe Fl., die nach längerem Stehen zu *Campher* M. erstarrt u. oberhalb 30^o wieder fest wird; D.₄²⁰ 1,0578, $[\alpha]_D^{20} = 44,88$ (1 = 0,5; unterkühlte Substanz). — *Bornylen-carbonsäure* (I), aus *Borneolcarbonsäure* durch Kochen mit Acetanhydrid erhaltenes Anhydrid von I wird mit alkoh. K I verseift; $[\alpha]_D^{20} = 139,89$ in 10%ig. alkoh. Lsg., in 10%ig. benzol. Lsg. 1454^o (1 = 1); *Äthylester*, D.₄²⁰ 0,9834, $[\alpha]_D^{20} = 118,09$ (in Substanz). — α -*Bor*

nylenäthylketon, (3-Propionylbornylen) $C_{13}H_{20}O$ (IV, $R = C_2H_5$), durch Zugabe 54 g Bornylencarbonsäurechlorid in 56 cem Bzl. zu 18 g Zinkäthyl in 50 cem (CO_2 -Atmosphäre, nach Einsetzen der Rk. Kühlung durch Kältemischung); $\frac{1}{2}$ -std. Stehen wird auf Eis gegossen u. die mit Ä. verd. Benzolschicht Waschen mit W. u. Na_2CO_3 mit Wasserdampf dest.; Reinigung durch Wasserdampfdest. des Semicarbazons in Ggw. von Oxalsäure; leichtbewegliches Öl, Gerinnert an Campher u. Bornylacetat, Kp_{10} 112,5°, D_{20}^{20} 0,9501, $[\alpha]_D^{20} = 148$, Substanz, $l = 0,5$); Semicarbazon, $C_{14}H_{23}ON_3$, aus A. weißes Pulver, F. 207—Oxim, $C_{13}H_{21}ON$, aus A. Nadelchen, F. 107°, mit Wasserdampf etwas flüchtig; α -Bornylenmethylketon (3-Acetylbornylen), $C_{12}H_{18}O$ (IV, $R = CH_3$), Kp_{11} 103° (Reinigung über das Semicarbazon), färbt sich nach einigen Wochen schwach lich, Geruch stärker campherartig als Äthylderiv., D_{20}^{20} 0,9561, $[\alpha]_D^{20} = 148,6$ Substanz, $l = 0,5$); Hydrobromid, $C_{12}H_{19}OBr$, nach zweimaliger Dest. bei Kp bis 94° erhaltenes Prod. bildet aus A. weiße Nadeln, F. 63,5°; bei längerem bewahren allmähliche Zers.; Semicarbazon, $C_{13}H_{21}ON_3$, aus A. weiße prismat. Na F. 217°; Oxim, $C_{12}H_{19}ON$, aus A. weiße Blättchen oder prismat. Nadeln, F. Phenylhydrazon aus A. gelbe Nadeln, F. 99°, nach kurzer Zeit zu brauner M. fließend; Benzalverb. $C_{19}H_{22}O$ (V), $Kp_{11,5}$ 216—218°, erstarrt erst nach langem Ste aus A. gelbliche Nadelchen, bei langsamem Krystallisieren hellgelbe, stark l brechende Krystalle, F. 77,5°, $[\alpha]_D^{20} = 175,50$ ($l = 1$, 9,9509%ig. alkoh. Lsg. Bei Darst. der Ketone IV werden anscheinend dimolekulare Nebenprodd. erhalten die mit Wasserdampf nicht flüchtig sind; gelbbraune klebrige M., Kp_{12} 214— Das aus dem Methylketon stammende Prod. liefert mit Phenylhydrazin weiße H chen, F. 185°, das aus dem Äthylketon stammende Prod., analog behandelt, F. Lsg. der Substanzen in Chlf. mit Br_2 behandelt, nimmt 1 Mol. Br auf. — 3-Camp carbonsäure (III), Darst. nach RUPE u. BRIN (Helv. chim. Acta 7. 546; C. 12 II. 33); $[\alpha]_D^{20} = 56,00$ ($p = 8,065\%$, in A., $l = 1$); Äthylester, Kp_{10} 110°, 0,9875, $[\alpha]_D^{20} = 58,92$ (in Substanz, $l = 0,5$), $[\alpha]_D^{20} = 59,03$ (in Bzl., $p = 9,0$, $l = 1$). — α -Camphyläthylketon (3-Propionylcamphan), $C_{13}H_{22}O$, Darst. analog. Kp_{11} 113°, Geruch cineol- oder campherartig, an faulende Pilze erinnernd; 0,9448, $[\alpha]_D^{20} = 39,86$ (in Substanz, $l = 0,5$); Semicarbazon $C_{14}H_{25}ON_3$, au (worin wl.) weißes Pulver, F. 222°; Oxim, $C_{13}H_{23}ON$, aus A. Prismen, F. 92,5. α -Camphylmethylketon (3-Acetylcamphan), $C_{12}H_{20}O$, Darst. analog vorigem me Zinkmethyl; nach Wasserdampfdest. Kp_{10} 100—100,5°, Geruch ähnlich aber stär als voriges; das dünnflüssige Öl erstarrt in der Kälte allmählich zu Nadel aus A. + W. (durch Kältemischung gekühlt) Nadeln, F. 23—24°; läßt sich au2 unterkühlen, hierbei D_{20}^{20} 0,9493, $[\alpha]_D^{20} = 9,89$ ($l = 0,5$); auf Grund polarimet Messungen bei verschiedenen Wellenlängen berechnen Vff., daß das nur de Dest. gereinigte Keton ein Gemisch von 28,6% der Form (+ A + B) u. 71% (+ A—B) ist. — Semicarbazon, $C_{13}H_{23}ON_3$, aus sd. A. weißes Pulver, F. 236°, u Eg. F. 233° (wohl infolge teilweiser Verseifung); Oxim, $C_{12}H_{21}ON$, aus A. wi Blättchen, F. 95,5°. Durch Hydrieren von IV ($R = CH_3$) in A. in Ggw. von N Katalysator erhaltenes Keton hat Kp_{10} 97—103°, bei ca. —14° zu derben Nadel oder Platten erstarrend; nach Umkrystallisieren aus verd. A. Kp_{10} 100,5—107° F. 25°, D_{20}^{20} 0,9539, $[\alpha]_D^{20} = 82,14$ ($l = 0,5$); Semicarbazon, $C_{13}H_{23}ON_3$, we Pulver, F. 228°; Oxim, $C_{12}H_{21}ON$, aus A. weiße Blättchen, F. 112—113°; das Keton ist ein Gemisch von 67,09% (+ A + B) u. 32,91% (+ A—B); ausle Mutterlauge dieses Ketons wurde ein nach der Vakuumdest. bei tieferer Temper starrendes Keton erhalten, das bei Zimmertemp. fl. blieb: D_{20}^{20} 0,954; $[\alpha]_D^{20} = 58$ ($l = 0,2$); Benzylidenverb. der Camphanmethylketone, $C_{19}H_{24}O$ (VI), aus den re beiden Methoden erhaltenen Ketonen dargestellt; aus verd. A. weiße, zugespzt Blättchen, F. 100°; $[\alpha]_D^{20} = 78$ (aus dem mit Zinkmethyl erhaltenen Keton i

$p = 10$, $l = 1$); $[\alpha]_D^{20} = 77,59^\circ$ (aus dem durch Red. von IV erhaltenen Öl; in Bzl., $p = 10\%$, $l = 1$).

Als Ergänzung zu einer früheren Arbeit von RUPE u. BRIN (l. c.) werden an-
 gewise die opt. Daten für *Camphancarbinol* u. *Methylenecamphan* gegeben: ersteres:
 $[\alpha]_D^{20} = 0,9601$, $[\alpha]_C^{20} = 15,66^\circ$, $[\alpha]_D^{20} = 19,73^\circ$, $[\alpha]_{Hg}^{20} = 23,21$, $[\alpha]_F^{20} = 29,86^\circ$ (in
 stanz, $l = 0,5$); letzteres $\alpha_C^{20} = -0,08$, $\alpha_D^{20} = 0,11$, $\alpha_{Hg}^{20} = -0,10$, $\alpha_F^{20} =$
 15. (LIEBIGS Ann. **440**. 215—41. 1924.) HABERLAND.

A. Douglas Macallum und **G. Stafford Whitby**, *Bemerkung über die Molekular-
 reaktion von natürlichem und von Methylkautschuk*. Eine äth. Lsg. von Kautschuk
 wurde auf eine mit einer Zuckerschicht bedeckte Metallfolie getropft, bis ein Film
 genügender Dicke entstanden war, der auf ein Drahtgestell aufgespannt
 wurde. Nachdem der Zucker herausgelöst war, wurde die Platte zuerst einige
 St. an der Luft, dann im Vakuumexsiccator über H_2SO_4 getrocknet. Die Mol-
 refr. wurde mit dem Abbéschen Refraktometer bestimmt. Die Messungen wurden
 an gereinigtem Kautschuk (Extraktion mit Aceton, Fällung mit A. aus benzol.
 u. b) an smoked sheet vorgenommen.

	n_D^{20}	D_{20}^{20}	M_D	V_m^{20}
a)	1,5219	0,9237	22,46	
b)	1,5208	0,9217	22,44	73,8

Die Mol.-Refr. für C_5H_8 mit einer doppelten Bindung berechnet sich zu 22,6;
 aus den vorliegenden Ergebnissen ist demnach im Kautschuk pro C_5H_8 -Einheit
 eine doppelte Bindung enthalten. — Dieselben Messungen wurden am synthet.
 Methylkautschuk vorgenommen. *Dimethylbutadien* (Kp. $69-70^\circ$, $n_D^{20} = 1,4376$) wurde
 durch zweiwöchiges Erhitzen auf 100° polymerisiert; der Kautschuk wurde mit A.
 aus der benzol. Lsg. gefällt u. im Vakuumexsiccator getrocknet. Die erhaltenen
 Werte waren: $n_D^{20} = 1,525$, $D_{20}^{20} = 0,9292$, $M_D = 27,03$, $V_m^{20} = 88,23$. Berechnet
 für die Mol.-Refr. für C_6H_{10} mit einer doppelten Bindung zu 27,2. (Proc. Trans.
 Soc. Canada [3] **18**. Sekt. 3. 191—93. 1924. Montreal, MC GILL-UNIV.) ZANDER.

J. Böeseken und **J. S. Petrus Blumberger**, *Die Einwirkung von Jod in
 Chloroformlösung auf einige Kohlenwasserstoffe der Äthylenreihe*. (Vgl. BÖESEKEN u.
 GLISSEN, S. 47.) Bei längerem Stehen verbindet sich das J in Lsg. von Chlf.
 an der Doppelbindung eines ungesätt. KW-stoffs, wie an der Erniedrigung des
 Trs der J-Lsg. beobachtet worden war. Während der kurzen Dauer einer
 Titration kommt eine Korrektur kaum in Frage. Zur Erklärung dieses Vorgangs
 nahmen Vff. an, daß J auf Chlf. im Sinne der Gleichung $CHCl_3 + J_2 \rightarrow CHCl_2J +$
 $CHClJ$ unter B. von Chlorjod einwirkt, das dann weiterhin an δ -Phenyl- β -butylen
 angelagert wird: $C_6H_5 \cdot CH_2 \cdot CH = CH \cdot CH_3 + ClJ \rightarrow C_6H_5 \cdot CH_2 \cdot CHJ \cdot CHCl \cdot CH_3$.
 Auch ist mit der Möglichkeit zu rechnen, daß schon geringe Mengen des in 1. Rk.
 gebildeten ClJ katalyt. auf die Jodierung des ungesätt. KW-stoffs wirken. An den
 Beispielen des *Styrols*, *Allylbenzols*, α -, β - u. γ -Phenylbutylens u. *Stilbens* wurden
 vergleichende Messungen der Geschwindigkeit der Jodierung vorgenommen. Die
 Rate des Benzolkerns mindert die Geschwindigkeit, so daß Stilben nicht mehr
 jodiert wird. Demnach müssen auch die gebildeten Mengen ClJ nach der ersten
 Rk. nur sehr gering sein u. dürften wesentlich nur katalyt. einwirken. (Rec. trav.
 ch. Pays-Bas. **44**. 96—98. Delft, Techn. Hochschule.) HORST.

K. Brand, *Zur Kenntnis der Halochromie bei Triphenylmethan- und Azoverbin-
 dungen*. Gleichzeitig X. Mitt.: *Über Thiophenole und die farbvertiefende Wirkung
 der Alkylmercaptogruppen*. (Nach Versuchen mit: **O. Stallmann**, **W. Groebe** und
E. Stein). (IX. vgl. BRAND u. STEIN, Journ. f. prakt. Ch. **108**. 19; C. **1924**. II.
 19.) Um die farbvertiefende Wrkg. der Methylmercaptogruppe mit der der OCH_3 -
 u. $N(CH_3)_2$ -Gruppen zu vergleichen, wurden die Molarextinktionen der halochromen
 Szlsgg. nachstehend genannter Verbb. spektroph. bestimmt. Die Ergebnisse

sind graph. im Original veröffentlicht, u. es ergibt sich hieraus folgendes: bei *p*-Nitrophenylmethylsulfid tritt die bathochrome Wrkg. der SCH_3 -Gruppe gegen der OCH_3 -Gruppe in den entsprechenden Anisolen deutlich hervor; die Lsgg. Nitroanisele sowohl als auch die der Nitrophenylmethylsulfide in Eg. oder A. g auf Zusatz von konz. HCl oder H_2SO_4 halochrome Lsgg. — Bei den Azoxyani. u. Azoxyphenylmethylsulfiden bewirkt die Anwesenheit von SCH_3 in letzteren gl falls eine tiefere Färbung; Halochromie konnte bei beiden Azoxyderivv. nicht gestellt werden, sie scheinen durch Eg.- H_2SO_4 oder HCl chem. verändert zu we indem die entsprechenden Azoverbb. entstehen. — Bei Azoanisolen u. Azoph methylsulfiden kommt die auxochrome Wrkg. der OCH_3 u. SCH_3 -Gruppe in halochromen Salzlsgg. gegenüber Azobenzol sehr deutlich zum Ausdruck. Das sorptionsmaximum des letzteren in Eg.-HCl liegt im Ultraviolett, das von *o,o'*-A liegt bei λ 490, das des *p,p'*-Deriv. bei λ 500; entsprechend der stärker farbbe fenden Wrkg. der SCH_3 -Gruppe liegen die Absorptionsmaxima der analogen S Derivv. in Eg.-HCl bei λ 620 bzw. λ 577. Die Molarextinktion wird bei o-substituierten Derivv. weniger als bei den p-substituierten erhöht; die F wird durch o-Substitution mehr als durch p-Substitution vertieft. — Bei *o*-Meth triphenylcarboniumsalzen genügt der Eintritt einer zum zentralen C o-ständ OCH_3 -Gruppe, um ein Absorptionsmaximum im sichtbaren Spektrum hervorzur (alle Unterss. in Eg.-HCl); tritt eine weitere OCH_3 -Gruppe o-ständig in e zweiten Ring, so bewirkt dies erhebliche Steigerung der Molarextinktion u. ern Farbertiefung: *o,o'*-Dimethoxytriphenylcarboniumchlorid besitzt zwei Absorpti maxima: bei λ 577 u. 495. Wird schließlich auch die dritte C_6H_5 -Gruppe o-stäl durch OCH_3 substituiert, so steigt die Mol.-Extinktion nicht mehr, jedoch wird vorige Maximum bei λ 495 nach dem von 577 hin verschoben; das Maximum ist entweder nach Ultrarot gewandert, oder hat sich mit dem zweiten vereig Erheblich stärker bathochrom wird Substitution durch die SCH_3 -Gruppe auc allen diesen Fällen (Einzelheiten vgl. Original). — 2-Methylmercapto-5-chlor-, *2,2'*-Dimethyldimercapto-5,5'-dichlor- u. *2,2',2''*-Trimethyltrimercapto-5,5',5''-tric triphenylcarboniumperchloratlsgg. zeigten Absorptionskurven, die denen der n sprechenden Cl-freien Verbb. nahezu gleich waren; die Molarextinktion ist bei Cl-haltigen Derivv. geringer, die Farbtintensität geht mit der Zahl der Cl-Atm zurück. Die hyperchrome Wrkg. eines zum zentralen C-Atom m-ständigen Ci größer als die hyperchrome Wrkg. einer o-ständigen SCH_3 -Gruppe. Die I folgen dem Beerschen Gesetz. — Die Farbtintensität von Lsgg. der *o*-Äthylmerc triphenylcarboniumsulfate ist bedeutend geringer als die der entsprechenden Mety mercaptoderivv. — Die Molarextinktionen der *p*-Methoxy- u. *p*-Methylmercap triphenylcarboniumchloride sind mehrfach größer als die der entsprechenden o-Ver diese übertreffen die p-Derivv. aber an Farbtiefe. Die bathochrome Wrkg. le SCH_3 -Gruppe entspricht der der $\text{N}(\text{CH}_3)_2$ -Gruppe, bei beiden ist sie größer als OCH_3 . Malachitgrün u. Krystallviolett unterscheiden sich von den analog korti tuierten Methylmercaptoverbb. sowohl bzgl. der Absorptionskurven als auch Molarerxtinktion nur wenig. Weitgehende Übereinstimmung mit den $\text{N}(\text{CH}_3)_2$ -Der zeigen auch die entsprechenden p-Methoxytriphenylcarboniumsalze bzgl. der b sorptionskurven. Es zeigt sich demnach eine enge opt. Verwandtschaft zwiscn echten bas. Triphenylmethanfarbstoffen u. Triphenylcarboniumsalzen ohne eigtl liche Farbstoffeigenschaften.

Betrachtet man die Änderungen, die im Triphenylcarboniumchlorid durch n führung auxochromer Gruppen entstehen, so ergibt sich, daß diese nicht sprunghf sondern stetig eintreten; aus diesem Grunde kann man annehmen, daß vom ri phenylcarboniumchlorid bis hinauf zum Krystallviolett die farbigen Triphenylmethn derivv. alle ein gleiches Chromogen u. demnach auch gleiche Konst. besitzu

die Konst. wird am besten ausgedrückt durch die einfache Komplexformel $[Ar_3C]X$; alle Triphenylcarboniumsalze haben das gleiche Chromogen $[Ar_3C]$, das nach Art, Zahl u. Stellung eintretender Gruppen beeinflusst wird; Verss. die Struktur des Komplexes $[Ar_3C]$ aufzulösen, sind einstweilen noch überflüssig, da Einzelheiten bzgl. der Beziehungen zwischen opt. Eigenschaften u. Molekülbau heute noch unbekannt sind. Den opt. Eigenschaften der halochromen Salze der Azoverbb. entspricht ebenfalls die Komplexformel (z. B. I) am besten. — Es wurde schließlich noch die Beständigkeit der Triarylcarboniumsalze


$$\left[\begin{array}{c} CH_3S \cdot C_6H_4N \\ CH_3S \cdot C_6H_4N \end{array} \parallel H \right] Cl$$
 durch Hydrolyse (durch A.) nach dem Verf. von BAEYER u. VILLIGER (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 35. 3013 [1902]) festgestellt. Untersucht wurden; a) *o*-Methylmercaptotriphenylcarboniumchloride, -Sulfate, u. -Perchlorate, b) *o*-Methoxytriphenylcarboniumchloride, c) *o*-Äthylmercaptotriphenylcarboniumchloride u. Sulfate, d) 2-Methylmercaptotriphenylcarboniumsulfate u. -Perchlorate. Die für die Verbb. a–c gefundenen Werte stimmen mit den nach dem Baeyerschen Potenzgesetz berechneten leidlich überein; die Beständigkeit steigt in der Reihenfolge: $SC_2H_5 < SCH_3 < OCH_3$ (Tellen im Original); bei d) versagt das Potenzgesetz vollständig; die Beständigkeit sinkt mit steigender Zahl der Cl-Atome u. liegt zum Teil erheblich unter der nicht substituierten Triphenylcarboniumsalzes. Bei e) *p*-Methylmercaptotriphenylcarboniumchloriden weichen die nach dem Potenzgesetz berechneten von den gefundenen Beständigkeitswerten ebenfalls ab; setzt man die Beständigkeit des Triphenylcarboniumchlorids = 1, so ergibt sich für die ein-, zwei- u. dreifachen *p*- SC_2H_5 -substituierten Derivv. e) folgende Beständigkeitsreihe: $(1+n)$, $(1+n)^2$, $(1+n)^{2^2}$, analog für die *f*-Verbb. $(1+n)$, $(1+n)^5$ u. $(1+n)^{5^2}$. Die SCH_3 -Verbb. sind auch in diesem Falle weniger beständig als die OCH_3 -Derivv. — Opt. Eigenschaften u. Beständigkeit gegen Hydrolyse stehen bei den untersuchten Triphenylcarboniumsalzen in keinem unmittelbaren Zusammenhang, innerhalb der meisten Reihen gleich substituierter Triphenylcarboniumsalze laufen Farbtiefe u. Beständigkeit gegen Hydrolyse parallel. Die Beständigkeit der komplexen Triarylcarboniumsalze wird wesentlich von den um das Zentralatom gruppierten Arylresten u. deren Substituenten bestimmt; Halogen setzt die Beständigkeit herab, durch SCH_3 , OCH_3 u. $N(CH_3)_2$ wird sie in eben genannter Reihenfolge vergrößert; in *p*-Stellung ist die Wrkg. größer als in *o*-Stellung. Auch die Ergebnisse der Unters. der Triphenylcarboniumsalze bzgl. ihrer Hydrolysebeständigkeit erlauben nicht, Derivv. wie z. B. Malachitgrün oder Krystallviolett von den anderen Verbb. abweichende Konst. zu erteilen. (Journ. f. prakt. Ch. 1904. 1–40. Gießen, Univ.)

HABERLAND.

R. D. Desai, Jod als Katalysator für Reaktionen, die sich unter Eliminierung von Halogenwasserstoff vollziehen. Auf die Beobachtung hin, daß CCl_4 mit $(C_6H_5)_2NH$ ohne weiteres nicht reagiert, während in Ggw. von Spuren Jod Anilinblau gebildet wird, hat Vf. eine systemat. Unters. über die katalyt. Wrkg. des J in Angriff genommen.

Werden 2 Mol. Anilin u. 1 Mol. Benzylchlorid miteinander erwärmt u. dann in üblicher Weise aufgearbeitet, so erhält man Benzylanilin. Die Wrkg. von J ist schon recht bemerkbar, denn ohne J betrug z. B. bei 10 Min. langem Erwärmen bei 50° die Ausbeute 27%, mit J (1% vom Anilin) dagegen 49%. — Bei der Darst. von Dibenzylanilin aus 1 Mol. Anilin u. 2 Mol. $C_6H_5CH_2Cl$ ist Zusatz von 2 Mol. wasserfreiem Na-Acetat von Vorteil; es ist nicht durch Alkalicarbonat ersetzbar. Die katalyt. Wrkg. des J (1% vom Anilin) ist erheblich, denn beim Erhitzen auf 90° war die Ausbeute mit J schon in 3 Stdn. völlig, ohne J erst in 7 Stdn. annähernd quantitativ. Unter anderen Bedingungen bildet sich mehr oder weniger Benzylanilin, das vom Dibenzylanilin am besten durch Überführung in die NO-Verb.

getrennt wird. — *Diphenylamin* u. $C_6H_5CH_2Cl$ (mol. Mengen) reagieren bei 105—110° miteinander, denn nach 8 Stdn. beträgt die Ausbeute an *Benzyl*diphenylamin, $C_{19}H_{17}N$, erst 30%. Vorteilhaft ist auch hier der Zusatz von 1 Mol. Na-Ac. Fügt man außerdem J (0,5% vom $(C_6H_5)_2NH$ hinzu, so erzielt man in 8—10 Stdn. 90—94% Ausbeute (Rohprod.). Nadeln aus A., F. 88—88,5°, unl. in k. A., sonst ll. Färbt sich an der Luft grün, in konz. H_2SO_4 mit einem Tropfen H₂O oder HNO_3 blutrot. Chlorhydrat, $C_{19}H_{17}N$, HCl , mit HCl -Gas in PAe., Na-Ac. hyroskop. Chlorplatinat, $2C_{19}H_{17}N$, H_2PtCl_6 , orangegelber Nd. aus A. — *p-Nitrobenzyl*verb., $C_6H_5 \cdot CH_2 \cdot N(C_6H_5) \cdot C_6H_4 \cdot NO_2$. Mit HNO_3 (D. 1,52) in Eg. bei 15—20°. Nadeln aus A. Extraktion mit k. Aceton gelbe Nadeln aus Aceton, F. 163°. Die Stellung des Nitro ergibt sich aus dem folgenden. — Das isomere [*p-Nitrobenzyl*]-diphenylamin, $N(C_6H_5)_2 \cdot CH_2 \cdot N(C_6H_5)_2$, entsteht aus $(C_6H_5)_2NH$, *p*-Nitrobenzylchlorid, Na-Acetat (1 Mol. Mengen) u. einer Spur J (95—100°, 12 Stdn.). Gelbe Platten aus A., F. 93,5°, unl. außer in PAe. — [*p-Aminobenzyl*]-diphenylamin, $C_{19}H_{18}N_2$. Mit Zn-Staub u. all. HCl. Viscoses Öl. — *Acetyl*verb., $C_{21}H_{20}ON_2$. Nadeln aus 50%ig. A., F. 165—166°. — *Benzoyl*verb., $C_{26}H_{22}ON_2$. Nadeln aus A., F. 136—137°. — *Benzylphenyl*-*p*-phenyldiamin, $C_6H_5 \cdot CH_2 \cdot N(C_6H_5) \cdot C_6H_4 \cdot NH_2$. Aus obiger NO_2 -Verb. (F. 163°) mit Zn-Staub u. sd. alkoh. HCl über das Zn-Doppelsalz (Nadeln, F. 215—220°). Mkr. bräunliche Platten, F. 100—101°. Das Chlorhydrat färbt sich mit $FeCl_3$ grün, mit $K_2Cr_2O_7$ in H_2SO_4 purpurrot. — *Acetyl*verb., $C_{21}H_{20}ON_2$. Nadeln aus Ä. oder verd. A., F. 215—216°. — *Benzoyl*verb., $C_{26}H_{22}ON_2$. Mkr. Nadeln aus A., F. 245—246°. — Durch Erhitzen mit konz. HCl (Rohr, 170—175°, 6 Stdn.) wird die Base gespalten in $C_6H_5CH_2Cl$ u. *p-Aminodiphenylamin*, das durch seine *Acetyl*verb., F. 158°, identifiziert wurde.



Benzylthiodiphenylamin, $C_{19}H_{15}NS$ (nebenst.). Aus 1 Mol. *Benzyl*diphenylamin u. 2,5 Atomen S (220—225°, 8 Stdn.). Das mit 90%ig. A. extrahierte Prod. bildet mkr. gelbe Platten, F. 90,5—91°, ll. H_2SO_4 -Lsg. rotbraun, Färbung mit $FeCl_3$ in alkoh. Lsg. blaßrot. — *Sulfon*, $C_{19}H_{15}O_2NS$. Mit $KMnO_4$ in Aceton + Eg. Nadeln aus A., F. 211—212°, unl. in PAe. Wird auch durch Benzylieren von Thiodiphenylamin in Toluol u. nachfolgende Oxydation erhalten.

Werden mol. Mengen CCl_4 u. $(C_6H_5)_2NH$ mehrere Stdn. auf 100—105° erhitzt, so tritt keine Rk. ein, während sich in Ggw. von 0,1% J *Triphenylpararosanilin* bildet. Immerhin betrug die Ausbeute bei 20-std. Erhitzen auf 97° mit 0,2% J u. 9% CCl_4 9%. — $C_6H_5CH_2Cl$ u. $C_6H_5N(C_6H_5)_2$ reagieren bei 100° in Ggw. von Na-Acetat miteinander, bei 150—160° bildet sich Benzylacetat. Daher wurden 2 Mol. $C_6H_5N(C_6H_5)_2$ u. 1 Mol. $C_6H_5CH_2Cl$ mit J (1% vom $C_6H_5N(C_6H_5)_2$) 20 Stdn. auf 150° erhitzt u. das bei der Aufarbeitung resultierende Basengemisch der fraktionierten Vakuumdest. unterworfen. Hauptprod. ist *Äthylbenzylanilin*, $C_6H_5 \cdot N(C_2H_5) \cdot CH_2 \cdot C_6H_5$, Kp.₆ 163—164°. Chlorplatinat, mkr. orangefarbene Platten. Pikrat, gelbe Prismen, F. 113—114°. (Letzteres wurde in seinen kristallograph. Eigenschaften mit Vergleichssubstanz identifiziert.) — Mit $C_6H_5N(CH_3)_2$ entsteht analog *Methylbenzylanilin*, Kp.₈ 162—163°, D.₂₅^{26,5} 1,0421, $n_D^{29,5}$ = 1,6006. Pikrat, F. 20 bis 22,5° (nicht 103—103,5° oder 109°, wie in der Literatur angegeben). — Halogenbenzole u. Anilin bzw. Acetanilid reagieren in Ggw. von J bei 135—255° miteinander. (Journ. of the Indian Inst. of Science 7. 235—51. Bangalore, Indian Institute of Science.)

LINDENBAUM

Walter C. Holmes und Edward F. Snyder, Die spektrophotometrische Bestimmung der Wasserstoffionenkonzentration und der scheinbaren Dissoziationskonstanten von Indikatoren. II. Thymolblau. (I. vgl. HOLMES, Journ. Americ. Chem. Soc. 46. 627; C. 1924. I. 2454.) Aus den im Original veröffentlichten Tabellen ergibt sich für den Indicator in alkal. bzw. saurer Lsg. $K = 8,91$ bzw. 1,5. Im alkal. Bereich verläuft die Dissoziation gleichmäßig, im sauren Bereich ist sie

die „Mittelform“ (gelb) besteht (p_H 4,5—6), bei stärker sauren Lsgg. tritt merkliche Verzögerung der Dissoziation ein. Bzgl. der Best. von p_H aus den spektrophotometr. Messungen, s. Tabellen im Original. (Journ. Americ. Chem. Soc. **47**. 21—26.) HABERLAND.


Walter C. Holmes und Edward F. Snyder, Die spektrophotometrische Bestimmung der Wasserstoffionenkonzentration und der scheinbaren Dissoziationskonstanten von Indikatoren. III. Bromkresolgrün. (II. vgl. vorst. Ref.) Eine reine Probe von Bromkresolgrün (Tetrabrom-*m*-kresolsulfon-phthalein) hatte in alkal. Lsg. p_H 4,68, berechnet auf Grund spektrophotometr. Unterss. (Tabellen im Original). (Journ. Americ. Chem. Soc. **47**. 226—29. Washington, U. S. Dep. of Agriculture.) HA.

W. B. Orndorff und C. Wang, Pyrogallolbenzein und sein Chlorhydrat. (Vorl. Mitteilung.) Der zuerst von DOEBNER u. FÖRSTER (LIEBIGS Ann. **257**. 61. [1890]) durch Erhitzen von Pyrogallol + Benzotrichlorid dargestellte Farbstoff entspricht der Formel $C_{38}H_{24}O_{11} + 5H_2O$, sondern der Zus. $C_{19}H_{12}O_5$. Darst.: 2 Mol. Pyrogallol + 1 Mol. Benzotrichlorid werden auf sd. Wasserbad bis zu beendeter Entw. erhitzt, danach wird bei derselben Temp. das mit einer Vakuumpumpe entfernte Gefäß weitere 4 Stdn. erhitzt. Nach Zugabe von W. wird das gebildete Chlorhydrat des Farbstoffs durch Kochen mit W. hydrolysiert u. Pyrogallolbenzein aus A. u. Bzl. umkrystallisiert; dunkelgrüne Krystalle, die bei ca. 200° beginnen sich zu zersetzen. Beim Umkrystallisieren aus CH_3OH werden Krystalle in $3H_2O$ erhalten, die Krystallwasser bei 120° abgeben. Chlorhydrat aus CH_3OH umkrystallisiert: $C_{19}H_{12}O_5 + HCl + 3H_2O$, das Krystallwasser (u. etwas HCl) wird bei 10° abgegeben. Wasserfrei wird das Chlorhydrat erhalten durch Einleiten von HCl in eine A.-Bzl.-Lsg. des Farbstoffs; es ist sehr hygroskop.; kein F. bis 100° (Journ. Americ. Chem. Soc. **47**. 290—92. Ithaca [N. Y.], Cornell-Univ.) HA.

L. Elion, Die Einwirkung von Salpetersäure auf Benzophenonderivate. Wie aus dem Vers. der Nitrierung von 4-Amino-3,5-dibrombenzophenon, der zu 4-Nitro-3,5-dibromphenylnitramin führte (vgl. S. 63), hervorgeht, sind die Br-Atome an der Seiten Spaltung des Mol. verantwortlich. Eine Bestätigung dieser Anschauung ergibt der vorliegende Vers. der Einw. von HNO_3 auf *N,N'*-Tetramethyl-diamino-4,4'-tetrabrom-3,5,3',5'-benzophenon (bromiertes Michlers Keton), das bedeutend energischer von HNO_3 angegriffen wird als das nicht bromierte Michlersche Keton. Kocht man dieses kurze Zeit mit konz. HNO_3 , so entstehen unter Abspaltung von CO_2 aus 1 Mol. des bromierten Ketons 2 Moll. Nitro-4-dibrom-2,6-phenylmethylnitramin. Bei gewöhnlicher Temp. tritt keine Spaltung ein; es bildet sich dann nur *N,N'*-Diethyldinitramino-4,4'-tetrabrom-3,5,3',5'-benzophenon, wohl das Zwischenprod. der ersten Spaltungsrk., wenn man mit konz. HNO_3 kocht. — *N,N'*-Tetramethyldiamino-4,4'-tetrabrombenzophenon, $C_{17}H_{16}ON_2Br_4$, aus Michlers Keton in konz. HCl gel. mit berechneter Menge Bromwasser; Nd. aus Eg. umkrystallisieren, schwach gelbe Blättchen vom F. 165°. — Nitro-4-dibrom-2,6-phenylmethylnitramin, $C_7H_5O_4N_3Br_2$, aus A. Blättchen vom F. 91°. — *N,N'*-Dimethyldinitramino-4,4'-tetrabrom-3,5,3',5'-benzophenon, $C_{15}H_{10}O_5N_4Br_4$, aus HNO_3 umkrystallisiert Zers. 235°, unl. in Ä. u. Pz., l. in Bzl. u. Chlf. (Rec. trav. chim. Pays-Bas. **44**. 99—102. Utrecht.) HORST.


Arthur Lachmann, Die Beckmannsche Umlagerung. II. (I. vgl. Journ. Americ. Chem. Soc. **46**. 1477; C. 1924. II. 1188.) Bei der B. von Benzophenonoxim bestanden im Reaktionsgemisch die beiden Gleichgewichte 1. u. 2., u. zwar wird bei Zugabe von HCl das Gleichgewicht in 1. nach links, in alkal. Medium dagegen nach rechts verschoben; da, wie l. c. gezeigt worden ist, freies Benzophenonoxim keine Beckmannsche Umlagerung erleidet, andererseits der Umlagerung auch keine Hydratation vorausgeht, muß ein System, das die Komponenten von 1. enthält, auch in Ggw. von W. Benzanilid bilden; die Verss. des Vfs. haben dies bestätigt.

(Tabelle des prozentual gebildeten Anilids unter verschiedenen Bedingungen Original.) Da Benzanilid jedoch auch hydrolysiert wird, finden sich unter schließlichem Reaktionsprodd. *Anilin* u. *Benzoessäure*, denen vielfach noch *P* beigemischt ist. Dieses bildet sich dadurch, daß Hydroxylamin teilweise in *F* zers. wird u. HNO_2 sich mit Anilin zu $\text{C}_6\text{H}_5\text{OH}$ umsetzt. — Vf. ist der Ansicht, daß die von KUHARA (Mem. Coll. Sci. Imp. Kyoto Univ. **3**. 1. [1917]) gegebene Erklärung, wonach die Umlagerung durch eine Schwächung der Bindung zwischen N u. OH bedingt wird, den Tatsachen am besten entspricht. — Die Umlagerung findet auch bei niedrigen Temp. (95°) statt. — Benzoessäure bildet sich nicht bei der Hydrolyse von Benzophenon mit Säuren.



(Journ. Americ. Chem. Soc. **47**. 260—65. Berkeley [Calif.], Univ.) HABERLAN.



Remo de Fazi, Studien über die Indone. VI. u. VII. Mitt. VI. Über die Darstellungsmethoden der Indone. (V. vgl. Gazz. chim. ital. **54**. 85; C. **192**. 2356.) Nach Besprechung der schon bekannten Darstellungsmethoden der Indone beschreibt Vf. eine neue, die auf der Einw. von konz. H_2SO_4 auf substituierte β -Phenylmilchsäureester beruht. Letztere werden nach SCHROETER u. WÜLLENBACH (vgl. Ber. Dtsch. Chem. Ges. **37**. 1090; C. **1904**. I. 1261) dargestellt.



α -Methyl- β -phenylindon, aus α -Methyl- β -diphenylmilchsäureäthylester u. in H_2SO_4 in der Kälte, orangefarbene Krystalle aus A., F. $87-87,5^\circ$, Ausbeute 30% nach der Theorie. — α -Äthyl- β -phenylindon, aus α -Äthyl- β -diphenylmilchsäureester. Diese Methode ist auf alle α -substituierten β -Phenylmilchsäureester anwendbar, während sich die α -nichts substituierten Ester in Truxone (vgl. Gazz. chim. ital. **49**. 53; C. **1920**. III. 244) umwandeln. α,β -Diphenylindon, aus α,β -Triphenylmilchsäureäthylester.

VII. Konstitution und Synthesen der Truxone. Aus dem α -Methyl- β -phenylindon entstehen bei Bestrahlung mit Sonnenlicht zwei Dimethyldiphenyltruxone; bei Bestrahlung mit ultravioletten Strahlen einer Quecksilberdampfquarzlampe ebenfalls zwei Dimethyldiphenyltruxone, von denen jedoch nur eins mit einem der ersten beiden identisch ist. Insgesamt treten also drei isomere Formen auf; theoretisch sind vier möglich. Ebenso sind von Diphenyltruxon (vgl. Gazz. chim. ital. **49**. I. 242; C. **1919**. III. 952) vier stereoisomere Formen möglich. Bei $251-252^\circ$ schm. Isomere verwandelt sich bei Bestrahlung mit ultravioletten Strahlen in eine gelbe Verb. (F. $184-185^\circ$), die auch die Eigenschaften der Truxone besitzt. Das andere Isomere schm. bei 224° . Nach den bisherigen Untersuchungen ist es wahrscheinlich, daß die Indone, die nur einen Substituenten in α - oder β -Stellung enthalten, leicht in die entsprechenden Truxone übergehen, während die zwei Aryl- oder Phenylgruppen in α - u. β -Stellung enthaltenden Indone einen gewissen Widerstand gegen die Truxonbildung aufweisen. Durch konz. H_2SO_4 werden letztere leicht in die entsprechenden Indone zurückgespalten, während sich die erstere in diesem Falle indifferent verhalten. Dementsprechend verhalten sich auch die Indone, die nicht in beiden Stellungen substituiert sind so wenig stabil, daß sie schon bei ihrer B. in die entsprechenden Truxone umwandeln, die dann auch gegen H_2SO_4 beständig sind. Durch Festlegung der Ketogruppe durch Überführung in Oxime oder Phenylhydrazone verschwindet die Fähigkeit der Truxonbildung durch Bestrahlung mit ultraviolettem Licht.

Versuche. α -Methyl- β -phenylindon (vgl. VI. Mitteilung) wurde mehrere Tage täglich 4—6 Stdn. der Einw. ultravioletter Strahlen ausgesetzt. Die sich auscheidenden gelben Krystalle wurden schließlich aus A. u. Bzl. umkrystallisiert, dabei wurden weiße Krystalle, F. 307—308°, erhalten, aus dem Filtrat unverändertes Ausgangsmaterial u. das andere Isomere, die durch A. getrennt wurden; letztes Isomere, kanariengelbe Nadeln, F. 259—260°. Die Analyse ergab für beide $C_{17}H_{14}O_2$; die eine Verb. ist demnach das α, α' -Dimethyl- β, β' -diphenyltruxon (I.), die andere das α, α' -Dimethyl- β, β' -diphenyl-i-truxon (II.); bisher steht jedoch noch nicht



es welches das n. u. welches das i-Deriv. ist. Cl u. Br werden nicht mehr addiert, in konz. H_2SO_4 erfolgt Rückbildung des α -Methyl- β -phenylindons. Die farblose Verb. (F. 307°) wird durch 6-std. Bestrahlung mit Sonnenlicht gelb gefärbt, beim Aufbewahren im Dunkeln geht die Färbung wieder stark zurück, durch wenige Minuten dauerndes Erhitzen auf 150° wird sie wieder vollständig farblos. Bei längerem Erhitzen bis zum F. erfolgt Spaltung zum α -Methyl- β -phenylindon. Durch ultraviolettes Licht erfolgt nach wenigen Min. Gelbfärbung, die aber nach 24 Stdn. im Sonnenlicht wieder verschwindet. Dieselbe Verb. (F. 307—308°) wurde auch aus α -Methyl- β -phenylindon durch Einw. von Sonnenlicht (10 Tage) erhalten; daneben bildete sich eine andere gelbe Verb., F. 174—176°, die möglicherweise ein drittes Isomeres der Dimethyldiphenyltruxone darstellt. — Das α -Methyl- β -phenylindonoxim, F. 198—200°, wird durch ultraviolette Strahlen nicht verändert, beim α -Methyl-phenylindonphenylhydrazon erfolgt auch keine Truxonbildung, aber anscheinend Uagerung zum i-Phenylhydrazon. — Das β, β' -Diphenyltruxon, $C_{30}H_{20}O_2$, F. 251 bis 252°, wurde durch Einw. von konz. H_2SO_4 auf β -Diphenylmilchsäureäthylester dargestellt. Durch Einw. von ultravioletten Strahlen auf dieses Truxon wurde ein neues Isomeres, F. 184—185°, dargestellt, gelbe Nadeln aus A. + W., ll. in Bzl., Cl. u. A., l. in konz. H_2SO_4 mit rotbrauner Farbe. (Gazz. chim. ital. **54**. 996 bis 1000—9. 1924. Rom, Scuola Ingegneria.) ZANDER.


C. S. Marvel, F. L. Kingsbury und F. E. Smith, Identifizierung von Aminen. II. *n*-Nitrobenzolsulfonamide. (I. vgl. MARVEL u. SMITH, Journ. Americ. Chem. Soc. **45**. 2696; C. 1924. I. 1915.) Die nachstehend beschriebenen Sulfonamide wurden dargestellt durch Umsetzen von *m*-Nitrobenzolsulfonylchlorid mit den entsprechenden Aminen. Da die aus den primären Aminen erhaltenen Derivv. l. in Alkali sind, eignen sich die Derivv. zur Trennung primärer von sek. Aminen. Dargestellt wurden folgende *m*-Nitrobenzolsulfonamide aus: Diäthylamin, F. 66°. — *n*-Butylamin, F. 61°. — Methylanilin, F. 100°. — Äthylanilin, F. 100,5°. — *n*-Propylanilin, F. 111,5°. — *n*-Butylanilin, F. 78,5°. — α -Naphthylamin, F. 166,5°. — β -Naphthylamin, F. 165,5°. — *o*-Chloranilin, F. 153°. — *p*-Chloranilin, F. 119,5°. — *p*-Tolanilin, F. 120,5°. (Journ. Americ. Chem. Soc. **47**. 166—57. Urbana [Ill.], Univ.) HABERLAND.

Leonard H. Cretcher und W. H. Pittenger, Synthesen mit β, β' -Dichlordiäthyläther. Einw. von Alkoholaten auf genannten Dichloräther führt zu Äthern $ROCH_2 \cdot CH_2 \cdot O \cdot CH_2 \cdot CH_2Cl$ bzw. $(ROCH_2 \cdot CH_2)_2O$; mit primären arom. Aminen erhalten Morpholine $RN(CH_2 \cdot CH_2)_2O$, mit den Na-Salzen organ. Säuren die Ester $ROCO \cdot CH_2 \cdot CH_2 \cdot O \cdot CH_2 \cdot CH_2Cl$ bzw. $(ROCOCH_2CH_2)_2O$. — Folgende Verbb. wurden dargestellt: β -Chlor- β' -methoxydiäthyläther, $C_5H_{11}O_2Cl$, Kp.₇₄₄ 169° (korr.), VII. 1.

D.¹⁵₁₅ 1,0562, l. in A. u. Ä., wl. in W. — *Bis*-(β -methoxy)-diäthyläther, C₈H₁₈O₃, Kp.₇₃₆ 161,5°, D.¹⁵₁₅ 0,9514. — *Bis*-(β -äthoxy)-diäthyläther, C₈H₁₈O₃, Kp.₇₃₆ 187°, D.¹⁵₁₅ 0,9149. — *Bis*-(β -propoxy)-diäthyläther, C₁₀H₂₂O₃, Kp.₇₃₇ 218°, D.¹⁵₁₅ 0,8877. — *Bis*-(β -butoxy)-diäthyläther, C₁₂H₂₆O₃, Kp.₇₄₁ 250—252°, D.¹⁵₁₅ 0,8877. Die vier letztgenannten Äther sind l. in A. u. Ä., die Löslichkeit in W. nimmt mit steigendem Mol.-Gew. ab, die Verbb. sind in k. W. leichter l. als in h. W. — *4-p-Tolylmorpholin*, C₁₁H₁₅ON, Kp.₃₀ 167° (korr.), F. 51° (aus A.). — *4- β -Naphthylmorpholin*, C₁₄H₁₅ON, Kp.₃₀ 239° (korr.), F. 90°. — *4- α -Naphthylmorpholin*, C₁₄H₁₅ON, F. 83°, sublimiert beim Erhitzen. — Die Darst. der nachfolgend genannten Äther geschieht am besten durch Zugabe von wenig Diäthylamin zu dem Gemisch, im Ölbad unter Rühren auf 190° (7 Stdn.), 140° (3 Stdn.) bzw. 200° (5 Stdn.) erhitzt wird. — *Bis*-(β -acetoxy)-diäthyläther, C₈H₁₄O₅, Kp.₂₆ 148° (korr.), D.¹⁵₁₅ 1,111. — *β -Chlor- β' -benzoxidiäthyläther*, C₁₁H₁₃O₃Cl, Kp.₂₅ 191° (korr.), D.¹⁵₁₅ 1,1841. — *Bis*-(β -benzoxo)-diäthyläther, C₁₈H₁₈O₅, Kp.₂₄ 279—281°, D.¹⁵₁₅ 1,1701. (Journ. Americ. Chem. Soc. 47. 163—66. Pittsburgh, Univ.) HABERLAN

Phuldeo Sahay Varma und Dattatrey Anant Kulkarni, Nitrierung einer Mischung von Nitrosulfon- und rauchender Salpetersäure. Durch Einleiten von SO₂ in rauchende HNO₃ (D. 1,502) wurde eine 40—50%ig. Nitrosulfonsäure hergestellt u. die Mischung (in den meisten Fällen bei 30°) zur Nitrierung benutzt, wobei sich ergab, daß dieses Gemisch, da es sehr gut dehydratisierend wirkt, zur Nitrierung besser eignet als HNO₃ + H₂SO₄. Als Reaktionsprodd. wurden erhalten: aus Bzl. Nitrobenzol; Krystalle von Nitrosulfonsäure sind ohne Weiteres auf Bzl.; die beste Ausbeute an Nitrobenzol wird erhalten, wenn 1 Teil Bzl. auf ca. 4 Teilen des Gemischs behandelt wird; bei gelindem Erwärmen wird Nitrobenzol gebildet; die B. des Dinitroderiv. wird durch Ggw. von wenig Jodbenzol günstig. — Aus 25 g Toluol wurden erhalten: 12 g o-, 10 g o + m- u. 5 g p-Nitrotoluol. — m-Xylol lieferte 4-Nitro-m-xylol, Kp. 235—238°. — Aus Mesitylen: Nitro-mesitylen; aus Naphthalin: α -Nitronaphthalin; Anthracen verkohlte u. gab geringe Menge Anthrachinon; Chlor-, Brom- u. Jodbenzol gaben die entsprechenden p-Nitroderiv. Aus 7 g o-Nitrophenol + 12 g Nitriergemisch wurde 2,5-Dinitrophenol, C₆H₄O₅N₂, F. 103—104°, erhalten; aus 9 g o-Nitrophenol + 36 g Nitriergemisch wurde ein Gemisch von 2,5-Dinitrophenol, 2,4,5-Trinitrophenol, C₆H₃O₇N₃, F. 94—96°, u. noch nicht identifizierten Prodd. mit F. 85—86° u. 78—82° (aus A.) erhalten. Phenol selbst wird sofort verkohlt. — Aus p-Nitroanilin (in Aceton) u. dem Nitriergemisch wurden erhalten: 2,4-Dinitroanilin u. 2,4,6-Trinitroanilin, F. 186—188°; u. Benzaldehyd (5 g) + 7 g Nitriergemisch: Benzoesäure, mit 20 g Nitriergemisch: m-Nitrobenzoesäure; aus Salicylsäure: 5-Nitrosalicylsäure, F. 224—225°; u. m-Kresotinsäure: 6-Nitro-m-kresotinsäure, F. 216—217°; aus p-Kresotinsäure (in Aceton): 3-Nitro-p-kresotinsäure; aus o-Kresotinsäure (in Aceton): 5-Nitro-o-kresotinsäure, F. 195—198°; aus Benzanilid (in Aceton): Nitrobenzanilid, F. 156°. Anilin, Mono- u. Dimethylanilin (auch in Ggw. von Lösungsmitteln) wurden verkohlt. (Journ. Americ. Chem. Soc. 47. 143—47. Benares [Ind.], Hindu-Univ.) HABERLAN





D. Iwanow, Kondensation von Furfurol mit aliphatischen Aldehyden. Die Kondensation des Furfurols mit aliphatischen Aldehyden der allgemeinen Form R·CH₂·CHO findet nach folgendem Schema statt:



Die Umsetzungen wurden durchgeführt, indem 1½ Mol. Furfurol + 20 g Aldehyd + 30 g (NaOH 20%ig. Lsg.) unter allmählicher Zugabe von 1 kg Essigsäure 5 Stdn. geschüttelt wurden; danach wird mit Essigsäure (nicht mit Mineralsäure) versetzt.

den Furfurölring öffnen) neutralisiert u. das Kondensationsprod. mit Ä. extra-
 dargestellt wurden: α -Furfurylidenäthanal (I, R = H), weiße Krystalle,
 1,5°, Kp.₁₀ 97°, Geruch zimmtartig; Semicarbazon, weiße Krystalle, F. 219,5° (Block
 uenne), 0,588 g sind l. in 100 ccm A. (22°); Oxim, C₇H₄O₂N, weiße Nadeln,
 10—111°; Phenylhydrazon, C₁₃H₁₂ON₂, goldgelbe Krystalle, F. 125—126°; der
 Hyd gibt eine feste Disulfitverb.; Hydrierung in äth. Lsg. (Pt-Mohr) führt zu
 in unangenehm riechenden Alkohol. — 1-(α -Furfuryliden)-propanal, C₈H₆O₂ (I,
 CH₃), gelbes, stark lichtbrechendes Öl, Kp. 227—228° (korr.), Kp.₁₁ 100°, Kp. 155°,
 1,1022, n_D^{13.5} = 1,613; Semicarbazon, C₉H₁₁O₂N₃, weiße Krystalle, F. 250,5—251,5°
 14 g sind l. in 100 ccm A. (22°); Oxim, C₈H₆O₂N, weiße Blättchen, F. 108—109°;
 Phenylhydrazon, C₁₄H₁₄O₂N₂, gelbe Nadelchen, F. 143—144°. — 1-(α -Furfuryliden)-
 nal, C₉H₁₀O₂ (I, R = C₂H₅), gelbes Öl, Kp. 234—235° (korr.), Kp.₁₄ 112—113°,
 1,065, n_D¹⁶ = 1,595; Semicarbazon, C₁₀H₁₃O₂N₃, weiße Krystalle, F. 220—221°;
 7 g sind l. in 100 ccm A. (22°); Oxim, C₉H₁₁O₂N, anfangs ölig, nach einigen
 Ven erstarrend, F. 67—68°; Phenylhydrazon, C₁₅H₁₆ON₂, gelbe Nadeln, F. 97
 17,5°; eine Disulfitverb. konnte aus diesem Aldehyd nicht erhalten werden. —
 (Furfuryliden)pentanal, C₁₀H₁₂O₂ (I, R = C₃H₇), Farbe u. Geruch wie die
 en Derivv.; Kp. 245—246° (korr.), Kp.₁₄ 120—121°, D.₄²³ 1,0299, n_D²³ = 1,5744;
 carbazon, C₁₁H₁₅O₂N₃, weiße Krystalle, F. 176—177°; 2,504 g sind l. in 100 ccm
 22°); Oxim, C₁₀H₁₃O₂N, aus PAe. weiße Nadeln, F. 75,5—77°; Phenylhydrazon,
 gelbe Nadeln, F. 81—82°, leicht zersetzlich; 2,4-Dinitrophenylhydrazon, F. 147°;
 Disulfitverb. entstand nicht. — 1-(α -Furfuryliden)heptanal, C₁₂H₁₆O (I, R =
 CH₂), Kp. 275—276° (korr.), Kp.₁₁ 135—136,5°, D.₄¹⁴ 0,9761, n_D¹⁴ = 1,534;
 carbazon, C₁₃H₁₉O₂N₃, weiße Krystalle, F. 134°; 4,014 g sind l. in 100 ccm A.
 22°); Oxim, ölig; Phenylhydrazon, gelbe Krystalle, wenig beständig, an Luft schwarz
 end, F. 80—81,5°; eine Disulfitverb. bildet sich nicht. (Bull. Soc. Chim. de
 reice [4] 35. 1658—65. 1924. Nancy, Fac. des Sc.) HABERLAND.

Lucius A. Bigelow, Die Reaktion zwischen Benzalanilin und Schwefelkohlenstoff
 bei hoher Temperatur und hohem Druck. In einem Eisenautoklaven wurden 100 g
 Benzalanilin + 100 g CS₂ auf 230° erhitzt; die Feststellung der Druck-Temp.-Kurve
 ergab, daß eine Rk. zwischen beiden Komponenten bei 170° u. 19° beginnt. 2-std.
 Beizen des Gemisches unter diesen Bedingungen führte zur B. folgender Reaktions-
 prod.: Phenylsenföl, Thiocarbanilid, Stilben, Thiobenzanilid, aus A. gelbe Tafeln,
 15—97° erweichend, F. 98°, u. Tetraphenylthiophen, aus Bzl. weißes Krystall-
 pulver, F. 183—184°. Die B. dieser Verbb. hat vermutlich nach folgenden Rkk.
 stattgefunden:



Journ. Americ. Chem. Soc. 47. 193—98. Providence, BROWN Univ.) HABERLAND.

Henry Gilman und Russell M. Pickens, Die Beziehung einiger aromatischer
 Tyn zur physiologischen Wirkung. Lokalanästhetica, die den Furan-, Thiophen-
 Pyrrolkern enthalten. Auf Grund der anästhesierenden Wrkg. von Novocain
 - β -Diäthylaminoäthylester der p-Aminobenzoesäure) u. der arom. Eigenschaften,
 die die drei genannten heterocycl. Ringe zeigen, haben Vff. die β -Diäthylamino-

äthylester der 2-Furan-, 2-Thiophen- u. 2-Pyrrolcarbonsäure, sowie der 2-Furan- u. 2-Thiophen- u. 2-Pyrrolcarbonsäure synthetisiert u. bzgl. ihrer physiol. Eigenschaften (u. n.) geprüft. Die entsprechenden Ester der Benzolsulfon- u. Benzolsulfinsäure konnten nicht dargestellt werden; beim Vers. zur Darst. des Diäthylaminoäthylesters der letzteren Säure wurden erhalten Phenyldisulfid u. s. Äthylendiphenylsulfon, $(C_6H_5SO_2CH_2)_2$, indem der Sulfinsäureester, $C_6H_5SO_2CH_2 \cdot CH_2N(C_2H_5)_2$, w. schleichlich Zers. erlitt.


Versuche. a) Chlorhydrat des β -Diäthylaminoäthylesters der 2-Furan- u. 2-Thiophen- u. 2-Pyrrolcarbonsäure, $C_{11}H_{18}O_3NCl$, aus Brenzschleimsäurechlorid in Bzl. + β -Diäthylaminoäthylalkohol; aus h. A. Prismen, F. 127°. — b) Chlorhydrat des β -Diäthylaminoäthylesters der 2-Thiophencarbonsäure, $C_{11}H_{18}O_2NSCl$, F. 106°. — β -Diäthylaminoäthylester der 2-Pyrrolcarbonsäure, hellgelbes, aminartig riechendes Öl, das beim Stehen wird; Kp., 165—167°; c) Chlorhydrat, $C_{11}H_{18}O_2N_2Cl$, aus h. A. schwach feinfarbene Krystalle, F. 129°. — d) Chlorhydrat des β -Diäthylaminoäthylesters der 2-Furanacrylsäure, $C_{13}H_{20}O_3NCl$, aus h. A. gelbliche Nadeln, F. 137—138°. — e) Chlorhydrat des β -Diäthylaminoäthylesters der Phenylpropionsäure, $C_{15}H_{20}O_2NCl$, aus h. A. F. 163°. — Durch Einw. des substituierten Aminoalkohols auf Benzolsulfonylchlorid wurde in einigen Fällen eine aus A. in Blättchen krystallisierende weiße Verb. mit F. 275° erhalten, die nicht weiter untersucht wurde. Einw. von Diäthylamin auf den β -Chloräthylester der Benzolsulfonsäure führte zu s. T. Äthyläthylaminoäthan, synthet. darstellbar aus Äthylbromid + Diäthylamin; Chlorhydrat, $C_{10}H_{26}N_2Cl_2$, F. 187°; Chloroplatinat, $C_{10}H_{26}N_2PtCl_6$, F. 234°; Chloraurat, F. 198°. — Benzylester der 2-Furan- u. 2-Thiophen- u. 2-Pyrrolcarbonsäure, $C_{12}H_{10}O_3$, hellgelbes Öl, Kp., 181 bis 181°, $n_D^{20} = 1,5550$, $D_4^{20} = 1,1632$. — Benzylester der 2-Furanacrylsäure, $C_{14}H_{18}O_3$, hellgelb, F. 42—43°, Kp., 201—203°, l. in Ä., Bzl., Aceton u. h. A.

Bzgl. der physiol. Wrkg. ergab sich folgendes: Bezeichnet man die anästhetisierende Wrkg. einer Cocainchlorhydratlsg. mit 10, so entspricht eine gleich starke Lsg. von d dem Werte 3, von c = 2, von b = 1, a hat noch eben merkbare Wrkg. u. Diäthylaminoäthylacetat ist ohne Wrkg. Im Gegensatz hierzu wirkt eine Lsg. die 0,001 g e enthält, nicht anästhesierend, sondern bewirkt einen etwa 15 min lang anhaltenden bienenstichartigen Schmerz. Die beiden letztgenannten Benzylester sind anscheinend ohne Wrkg. (Journ. Americ. Chem. Soc. 47. 245—54. 1925 [Iowa].)

HABERLAN.


William Robson, Der Tryptophanstoffwechsel. I. Die Synthese des racemischen *Bz-3-Methyltryptophans*. Das Prod., das zu Verss. über die B. von Kynurenin im Organismus dienen soll, wurde aus 5-Methylindol (I.) hergestellt. Für die Darstellung dieser Verb. nach RASCHEN (LIEBIGS Ann. 239. 223 [1887]) ergaben sich einige Verbesserungen. Es ist unnötig, zur Darst. des 5-Methylindol-2-carbonsäureesters den Ester des Brenztraubensäure-p-tolylhydrazons für sich herzustellen u. dann mit $ZnCl_2$ zu erhitzen, es genügt vielmehr, in die absol.-alkoh. Lsg. des genannten Hydrazons bei 65—70° trockenen HCl schnell einzuleiten, wobei Veresterung u. Schließung des Indolringes unter B. von NH_4Cl gleichzeitig erfolgen. Für die Überführung von 5-Methylindol-2-carbonsäure in das Methylindol wurden besser als Ausbeuten (57% der Theorie) als bei Anwendung der freien Säure durch Erhitzen des NH_4 -Salzes (vgl. KERMACK, PERKIN u. ROBINSON, Journ. Chem. Soc. London 121. 1879; C. 1923. I. 1173) erhalten. Die weitere Synthese ging über den 5-Methylindol-3-aldehyd (II.), der nach verschiedenen anderen Verss., analog dem Verf. von ELLINGER u. FLAMAND (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 40. 3029; C. 1907. II. 702) erhalten wurde. Verss., diesen mit Hippursäure zu kondensieren, führten in der stärker Teerbildung zu keinem befriedigenden Resultat. Dagegen wurde mit Hydrantoin analog dem Vorgehen von MAJIMA u. KOTAKE (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 55. 3859; C. 1923. I. 322) das 5-Methylindolaldehydhydrantoin (III.) gewonnen, dann

2. 1/2 g. Na-Amalgam zu 5-Methylindolylhydantylmethan (IV.) reduziert wurde; dieses bei Spaltung mit Ba(OH)₂ das gewünschte Methyltryptophan (V.).



Versuchsteil. *p*-Tolylhydrazin. In allen Stadien der Herst. ist starkes R. u. Temp. von 0—2° für gute Ausbeuten erforderlich. — Brenztraubensäure-*p*-tolylhydrazon hatte F. 159°. — 2-Carbäthoxy-5-methylindol, F. 163°, Kp. 236°. — 5-Methylindol (I). Die bei Verseifung des vorigen u. Ansäuern erhaltene Mischung wurde mit Ä. extrahiert, in die mit Na₂SO₄ getrocknete äth. Lsg. trockenes NH₃ in aschem Strome eingeleitet, das ausgeschiedene NH₄-Salz der 5-Methylindol-2-carbonsäure am Luftkühler 30 Min. auf 230—240° erhitzt, schließlich mit W.-Dampf dest. — 5-Methylindol-3-aldehyd, C₁₀H₉ON (II.), F. 151°, sll. in h. PAE. (Kp. 110 bis 120°). — 3-Chlor-6-methylchinolin, C₁₀H₈NCl, Nebenprod. bei Darst. des vorigen als Chlf. u. KOH, Nadeln, F. 85,5°, von fiederartigem Geruch. — 2-Carbäthoxy-5-methylindol-3-aldehyd, C₁₃N₁₃O₃N, aus 2-Carbäthoxy-5-methylindol nach dem Verf. v. ADAMS u. LEVINE (Journ. Americ. Chem. Soc. 45. 2373; C. 1924. I. 1186), Telchen (aus h. Xylol), F. 189°, ll. in absol. A. u. Ä. — 2-Carboxy-5-methylindol-3-aldehyd, C₁₁H₉O₃N, Nadelbüschel (aus CH₄O bei schneller Kühlung) oder würfelförmliche Kryställchen (aus Xylol), Braunfärbung 235°, F. 254—255° (Zers.), l. in den üblichen Lösungsm. Gibt im Vakuum bei 220° ein Sublimat vom F. 148°, wahrscheinlich 5-Methylindol-3-aldehyd. — 5-Methylindolaldehydantoin, C₁₃C₁₁O₂N₃ (III.), gelbe Krystalle (aus Eg.), F. 295—298°, swl. in Ä., Butylalkohol, Essigester u. Xol. — 5-Methylindolylhydantylmethan, C₁₃H₁₃O₂N₃ (IV.), Nadeln (aus h. W.), F. 206—207°, sll. in Ä. u. A., wl. in h. Bzl. — Bz-3-Methyltryptophan, C₁₂H₁₄O₂N₂ (V.), Telchen (aus W. durch absol. A.), F. 259—263°, ll. in W., von sehr bitterem Geschmack. Gibt mit dem Reagens von HOPKINS u. COLE schöne Purpurfärbung, in verd., k. gehaltener Lsg. ziemlich lange haltbar, mit Br.-W. Purpurfärbung, die in Bylalkohol übergeht, u. bei sorgfältiger Neutralisation starke Rk. mit Triketohydrindenhydrat. (Journ. Biol. Chem. 62. 495—514. 1924. Edinburgh, Univ.) Sp.

Dorothy A. Hahn und Alice G. Renfrew, *Synthese des Polypeptidhydantoinen*: *N*-Methyltyrosylhydantoin-3-essigsäure. (Vgl. HAHN, KELLEY u. SCHAEFFER, Journ. Americ. Chem. Soc. 45. 843; C. 1923. III. 54.) *N*-1-Methylanisaldehydantoin (I) läßt sich durch Behandeln seines Na-Salzes mit Chloressigester in *N*-1-Methyl-4-anisaldehydantoin-3-essigester (IIa, F. 107—108°) überführen. Ein isomerer Ester (IIb, F. 27—128°) wird durch Verestern von IIIa oder b erhalten. Diesen Estern entsprechen die beiden isomeren Säuren III (a, F. 168—169°, b F. 203—205°). Durch Hydrolyse von IIa mit HCl oder HBr, entsteht ein Gemisch von IIIa u. b, alkal. Hydrolyse führt zu IIIa. Behandlung von IIa u. b oder IIIa u. b mit HJ in Gv. von rotem P führt zu *N*-1-Methyl-4-oxymethylhydantoin-3-essigsäure (*N*-1-Methyltyrosylhydantoin-3-essigsäure) (VI), die auch aus V mittels HJ darstellbar ist. Der Äylester dieser Säure (VII) kann aus VI mittels A. + HCl, aus IIIa oder b + H u. Eindampfen mit A. oder aus IIa u. b erhalten werden. Hydrolyse von VI w mittels Säuren nicht durchführbar; mit Ba(OH)₂ fand jedoch Aufspaltung von V statt: unter Entw. von CO₂ u. Methylamin entstand das Ba-Salz VIIIa oder b, aus dem sich der Diäylester leicht gewinnen ließ; die freie Säure wird später beschrieben werden.



Versuche. *N*-1-Methylanisalhydanthoin (I), Darst. nach JOHNSON u. NICOLSON (Journ. Americ. Chem. Soc. **34**, 469 [1912]), aus A. (worin wl.) weiße Nadeln oder Tafeln, F. 214—216°, ll. in sd. Eg. — *N*-1-Methylanisylhydanthoin, $\text{C}_{12}\text{H}_{14}\text{O}_3\text{N}_2$ (IV), I mittels Sn + alkoh. HCl (72 Stdn. auf sd. Wasserbad); aus A. + W. weiße Nadeln oder Tafeln, F. 116—118°. — *N*-1-Methyl-4-onisalhydanthoin-3-essigester, $\text{C}_{16}\text{H}_{18}\text{O}_5\text{N}_2$ (IIa), durch 18-std. Erhitzen von I mit $\text{C}_2\text{H}_5\text{ONa}$ in A. wird das Na-Salz verdampft, das durch 4-tägiges Kochen mit Chloressigester in Gemisch von IIa und I, F. 115—170°, übergeführt wird; Abtrennung von IIa durch Behandeln des Gemisches mit sd. A., worin IIa ll.; nach viermaligem Umkrystallisieren aus sd. A., F. 107—108° (Prismen); wl. in k. A. u. Ä.; läßt sich durch Erhitzen auf 130—140° nicht in IIb überführen. — *N*-1-Methylanisalhydanthoin-3-essigsäure, $\text{C}_{14}\text{H}_{14}\text{O}_5\text{N}_2$ (IIIb), durch 3-std. Kochen von IIa mit konz. HCl oder HBr entsteht ein Gemisch von IIIa u. b; dieses wird in sd. Eg. gel., beim Erkalten ausfallender Nd. wird mit Ä. extrahiert; in Ä. unl. Rückstand ist IIIb, F. 203—205°; aus Eg. gelbe Nadeln oder Tafeln. — *N*-1-Methylanisalhydanthoin-3-essigester, $\text{C}_{16}\text{H}_{18}\text{O}_5\text{N}_2$ (IIb), durch Einleiten von HCl in alkoh. Lsg. von IIIb; aus sd. A. weiße Krystalle, F. 127—128°, wl. in h. W.; wird durch sd. konz. HCl verseift zu Gemisch von IIIa u. b; IIb ist auch darstellbar durch Verestern von IIIa. — *N*-1-Methylanisalhydanthoin-3-essigsäure, $\text{C}_{14}\text{H}_{14}\text{O}_5\text{N}_2$ (IIIa), aus dem bei Darst. von IIIb erhaltenen Eg.-Filtrat durch Zugabe von W. oder aus IIa durch Verseifen mit NaOH; aus Aceton durch W. gefällt, F. 168—169°, ll. in sd. A., swl. in h., unl. in k. W., l. in h. Essigsäure; geht durch Verestern quantitativ in IIa (F. 107—108°) über; läßt sich durch Erhitzen nicht zu IIIb isomerisieren. — Na-Salz der *N*-1-Methylanisalhydanthoin-3-essigsäure, $\text{C}_{14}\text{H}_{13}\text{O}_5\text{N}_2\text{Na}$, aus IIa durch Verseifen mit wss.-alkoh. NaOH; aus dem danach aus W. umkrystallisiert, enthält die Verb. $5\text{H}_2\text{O}$ u. hat F. 110°, w. Krystallwasser abgegeben wird; die Schmelze erstarrt danach wieder u. hat F. 100° unter Zers. u. Verkohlen; geht beim Verestern mit A. u. HCl wieder in IIa über. — *N*-1-Methylanisylhydanthoin-3-essigester, $\text{C}_{16}\text{H}_{20}\text{O}_5\text{N}_2$ (V), aus dem Na-Salz von IIa + Chloressigester, oder aus IIa durch Hydrierung in alkoh. Lsg. (Pd-Katalysator) aus A., F. 75,5—77°, ll. in h. A. u. h. W., hieraus Prismen. — *N*-1-Methyl-4-oxybenzylhydanthoin-3-essigsäure, $\text{C}_{13}\text{H}_{14}\text{O}_5\text{N}_2$ (VI), aus sd. W. Prismen, F. 167—168°, ll. in W. u. Ä.; wss. Lsg. gibt mit Millonschem Reagens weißen Nd., der sich dunkelrot wird. — *N*-1-Methyl-4-oxybenzylhydanthoin-3-essigester, $\text{C}_{15}\text{H}_{18}\text{O}_5\text{N}_2$ (VII), aus h. A. weiße Blättchen, F. 145—146°. — Verb. $\text{C}_{11}\text{H}_{12}\text{O}_5\text{Nba}$ (VIIIa bezw. b) wurde erhalten beim Verseifen von VII mit $\text{Ba}(\text{OH})_2$; nach Entfernen von Met

wird der Rückstand mit CO_2 behandelt, BaCO_3 entfernt u. konz.; auf Zusatz Essigsäure Abscheidung von VIII, aus W. mit $3\text{H}_2\text{O}$ krystallisierend; Krystallwasser wird bei 110° unter Schmelzen abgegeben; danach wieder erstarrte Schmelze F. $250\text{--}260^\circ$; wss. Lsg. + Millonsches Reagens gibt weißen, rasch rot werdenden Niederschlag, die Lsg. färbt sich allmählich rot. — Verb. $\text{C}_{11}\text{H}_{11}\text{O}_5\text{NBa}$ (IX), wurde beim Erhitzen von VII mit $\text{Ba}(\text{OH})_2$ ohne nachfolgendes Ansäuern erhalten; aus W. Nadeln, F. $280\text{--}290^\circ$. — Verb. $\text{C}_{15}\text{H}_{21}\text{O}_5\text{N}$, Diäthylester der VIII entsprechenden Säure; aus A. Prismen, F. $84\text{--}85,5^\circ$. Nebenbei entsteht bei der Darst. des Esters auch ein Salz A. + HCl eine geringe Menge Chlorhydrat des Esters; aus A. weiße Nadeln. (Journ. Americ. Chem. Soc. 47. 147—63. South Hadley [Mass.], Mount Holyoke Coll.) HABERLAND.


Robert D. Coghill und Treat B. Johnson, Untersuchungen über Hydantoino. Mitt. Die Synthese von Hydantoinen, die im Glyoxalinring Phenolgruppen enthalten. Vgl. JOHNSON u. HAHN, Journ. Americ. Chem. Soc. 39. 1255; C. 1921. III. Die nachstehend beschriebenen *p*-Oxyphenyl- u. Di-*p*-oxyphenylhydantoino werden am vorteilhaftesten dargestellt, indem die entsprechenden *p*-Methoxyphenyl- u. Di-*p*-oxyphenylhydantoino synthetisiert wurden; durch Digerieren mit Chloressigsäure ließen sich hieraus die *p*-Methoxyphenylhydantoino u. aus diesen durch HBr die *p*-Oxyphenylhydantoino bereiten.

Versuche. *p*-Methoxyphenyl-*i*-thiocyanat, 50 g konz. NH_4OH (eiskühlt) unter Rühren versetzt mit 37 g CS_2 + 37 g *p*-Anisidin in A.; nach $\frac{1}{2}$ -std. Rühren u. 2-d. Stehen wird das unl. NH_4 -Salz der *p*-Anisyldithiocarbaminsäure in W. gel., die Lsg. mit $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$ versetzt u. das Pb -Salz, $(\text{CH}_3\text{OC}_6\text{H}_4\text{NHCSS})_2\text{Pb}$, mit Wasserdampf dest., wobei das *i*-Thiocyanat übergeht; aus Ä. F. 18° . — *p*-Äthoxyphenyl-*i*-thiocyanat, Darst. analog voriger aus *p*-Phenetidin, F. $62,5^\circ$. — *p*-Nitrophenyl-*i*-thiocyanat, aus 20 g *p*-Nitroanilin in Toluol + 20 g Thiophosgen; nach Entfernung des abgeschiedenen *p*-Nitroanilinchlorhydrats wird aus der eingedampften Lösung das *i*-Thiocyanat erhalten, F. 112° , Ausbeute 70%. — 3-*p*-Methoxyphenyl-2-thiohydantoin, $\text{CH}_3\text{O}\cdot\text{C}_6\text{H}_4\text{N}\cdot\text{CS}\cdot\text{NH}\cdot\text{CH}_2\cdot\text{CO}$, aus dem erstgenannten *i*-Thiocyanat in A. + Aminoessigsäureester in Ggw. von KOH ; nach $\frac{1}{2}$ -std. Erwärmen wird A. verdunstet, Rückstand mit HCl erwärmt; aus A. Nadeln, F. 214° . — 3-*p*-Methoxyphenyl-2-thiohydantoin, aus voriger in W. durch Digerieren mit Chloressigsäure; aus h. W. Nadeln, F. 208° . — 3-*p*-Oxyphenyl-2-thiohydantoin, $\text{C}_6\text{H}_5\text{O}_3\text{N}_2$, aus h. W. Nadeln, F. 267° , l. in A. u. Eg., unl. in Bzl., Toluol, Ä., Chlf.; gibt mit Millonschem Reagens starke Färbung. — 3-*p*-Äthoxyphenyl-2-thiohydantoin, $\text{C}_{11}\text{H}_{12}\text{O}_2\text{N}_2\text{S}$, stabile Form: dargestellt wie *p*-Methoxyderiv.; aus h. A. Tafeln, F. 197° , l. in Aceton, sd. A., h. W., unl. in Bzl., Ä., Toluol; instabile Form: aus 9 g *p*-Äthoxyphenyl-*i*-thiocyanat + 7 g Aminoessigesterechlorhydrat in A. + 6 g KOH (konz. Lsg.) durch 2-std. Erhitzen; das nach Konzentrieren u. Abkühlen sich abscheidende K-Salz der *p*-äthoxyphenylthiohydantoinensäure wird in W. gel., angesäuert (HCl) u. gekocht; hieraus goldgelbe bootförmige Krystalle, F. 197° , die durch sd. HCl -haltigen A. in die stabile Form (Tafeln) übergehen. — 3-*p*-Äthoxyphenylthiohydantoinensäure, $(\text{C}_6\text{H}_5\text{O}_3\text{N}_2\text{S} = \text{C}_2\text{H}_5\text{OC}_6\text{H}_4\cdot\text{NH}\cdot\text{CS}\cdot\text{NH}\cdot\text{CH}_2\cdot\text{COOH})$, aus dem alkoh. Filtrat der Erst. der instabilen Form des vorigen durch Zugabe von W. u. Ansäuern; Nadeln, F. 128° (Zers.); beim Vers. die Verb. umzukrystallisieren tritt teilweise Ickbildung des Thiohydantoin ein. — 3-*p*-Äthoxyphenyl-2-thiohydantoin, $\text{C}_{11}\text{H}_{12}\text{O}_3\text{N}_2$, aus h. W. Nadeln, F. 203° , l. in h. W. u. sd. A., unl. in Bzl. u. Ä. Die Überführung in das *p*-Oxyphenylderiv. durch Erhitzen mit HBr gelang nicht. — 3-*p*-Nitrophenyl-2-thiohydantoin, $\text{C}_6\text{H}_7\text{O}_3\text{N}_3\text{S}$, aus A. gelbe Nadeln, Zers. bei $170\text{--}172^\circ$, l. in h. A., Aceton, Eg., unl. in W., Ä. u. Bzl. — *p*-Methoxyphenylglycin, $\text{C}_9\text{H}_{11}\text{O}_3\text{N}$; Darst. nach VATER (Journ. f. prakt. Ch. [2] 29. 294 [1884]), aus W. Nadeln, F. 146° . —

p-Methoxyphenylharnstoff, $C_8H_{10}O_2N_2$, aus wss. Lsg. von $KCNO +$ Anis chlorhydrat; aus h. W. Tafeln, F. 168°. — 1-*p*-Methoxyphenylhydantoin, $NH \cdot CO \cdot N(C_6H_4OCH_3) \cdot CH_2 \cdot CO$, aus 15 g *p*-Methoxyphenylglycin in NaOH + $KCNO$ durch 10 Min. langes Kochen, danach Ansäuern mit HCl u. 2 Stdn. koe Prismen, F. 196°. — 1-*p*-Oxyphenylhydantoin, $C_6H_5O_3N_2$, aus Essigsäure Prismen bei 280° Zers.; unl. in h. W., w. A., Eg., Bzl., Toluol. Chlf. u. Ä., l. in Alkalien mit MILLONS Reagens starke Färbung. — α -Amino-*p*-methoxyphenylelessigsäure, $NaCN + 160$ g NH_4Cl in 500 ccm W. werden 3 Stdn. gerührt mit 136 g CH_3CHO aldehyd in 400 ccm A.; durch Zugabe von 1 l W. wird das Nitril der Säure teilweise ausgefällt; der Rest des Nitrils wird der Lsg. durch Bzl. entzogen; durch Schütteln mit HCl wird das Chlorhydrat der Säure, $C_9H_{12}O_3NCl$, erhalten, F. bei 204°; l. in h. W. u. A. — 1-Acetyl-5-*p*-methoxyphenyl-2-thiohydantoin, $C_{12}H_{12}O_4S$, aus 9,5 g der vorigen Säure in 5 ccm Eg. + 45 ccm Acetanhydrid + 4 g NH_4CNS durch $\frac{1}{4}$ -std. Erhitzen auf dem Wasserbad; gelbe Prismen, F. 165°, l. in h. W., unl. in W. — 5-*p*-Methoxyphenyl-2-thiohydantoin, $C_{10}H_{10}O_2N_2S$, aus vorigem durch Digerieren mit HCl; aus h. A. Nadeln, bei 130° rot werdend, F. 200° (Zers.); wl. in W. u. A. — 5-*p*-Methoxyphenylhydantoin, aus h. W. F. 188°. — 5-*p*-Oxyphenylhydantoin, $C_9H_8O_3N_2$, F. 262°, swl. in Eg., unl. in übrigen Mitteln, starke Färbung mit Millonschem Reagens. — 1,3-Di-(*p*-methoxyphenyl)-2-thiohydantoin, $C_{17}H_{16}O_3N_2S = CH_3O \cdot C_6H_4 \cdot N \cdot CS \cdot N(C_6H_4OCH_3) \cdot CH_2 \cdot CO$, Darst. durch 2-std. Erhitzen von 9,6 g α -Amino-*p*-methoxyphenylelessigsäure + 9,6 g *p*-Methoxyphenyl-*i*-thiocyanat auf 140–160°; nach 1-std. Digerieren mit W. wird das Dimethoxyhydantoin mit Wasserdampf übergetrieben; aus A. Nadeln, F. 185°, unl. in Alkalien, w. in organ. Mitteln. — 1,3-Di-(*p*-methoxyphenyl)-hydantoin, $C_{17}H_{16}O_4N_2$, krystallisiert aus der $CH_2ClCOOH$ -haltigen wss. Lsg. in Prismen u. Nadeln, letztere in Eg. gelblich, krystallisiert wieder als Prismen; F. 157°, unl. in Alkalien; l. in Aceton, h. W. u. Essigsäure. — 1,3-Di-(*p*-oxyphenyl)-hydantoin, $C_{15}H_{12}O_4N_2$, aus Essigsäure Tafeln, F. 242°, l. in Alkalien, Färbung mit MILLONS Reagens. — 5,5-Di-(*p*-oxyphenyl)-hydantoin, $C_{15}H_{12}O_4N_2$, Darst. aus der früher von BILTZ (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 42. 1800 [1909]) beschriebenen Dimethoxyverb.; aus alkoh. Lsg. durch Eingießen in Toluol Nadeln ohne F. bis 280°; Färbung mit Millonschem Reagens. — 3,5-Di-(*p*-methoxyphenyl)-2-thiohydantoin, $C_{17}H_{16}O_3N_2S$, aus Anisyl-*i*-thiocyanat + α -Amino-*p*-methoxyphenylelessigsäure in Ggw. von KOH; aus h. A. Tafeln, F. 193°, unl. in Aceton, A. u. Alkali, unl. in Ä., Bzl. u. Toluol. — 3,5-Di-(*p*-methoxyphenyl)-hydantoin, $C_{17}H_{16}O_4N_2$, aus h. W. Nadeln, F. 170°, wl. in h. W., A. u. Eg., unl. in Bzl., Toluol, Alkalien. — 3,5-Di-(*p*-oxyphenyl)-hydantoin, $C_{15}H_{12}O_4N_2$, wird ölig erhalten; erstarrt beim Abkühlen; Färbung mit Millonschem Reagens; ll. in A., Eg., Aceton, unl. in Alkalien, unl. in W. u. Bzl. (Journ. Americ. Chem. Soc. 47. 184–93.) HABERLAND.


Robert D. Coghill, Untersuchungen über Hydantoin. 42. Mitt. Eine Methode zur Synthese von 1,5-Diarylhydantoinen: 1,5-Di-(*p*-oxyphenyl)hydantoin. (41. Mitt. vorst. Ref.) Die Synthese des genannten Dioxyphenylhydantoin (V.) gelang auf folgendem Wege: *p*-Anisalanisidin (I) geht durch Addition von HCN in das Nitril (II) über; durch Addition von HCNO entsteht hieraus das Harnstoffderiv. III, das durch Hydrolyse in das Dimethoxyphenylhydantoin IV. übergeführt werden kann. Durch Behandlung mit HBr entsteht hieraus V.

Versuche. *p*-Anisalanisidin, $C_{15}H_{15}O_2N$ (I), durch Kondensation von Anisaldehyd mit Anisidin oder durch Erhitzen einer alkoh. Lsg. von *p*-Anisalddehyd mit Cyanhydrin mit *p*-Anisidin; in diesem Falle entsteht ein Gemisch von I. u. II., trennbar durch fraktionierte Krystallisation aus A., wobei I. zuerst ausfällt; h. W. mondförmige Prismen, F. 146°. — (*p*-Methoxyphenylamino)methoxyphenylacetonitril, $C_{16}H_{16}O_2N_2$ (II), Nadeln, F. 90°; beim Umkrystallisieren findet teilweise Zers. zu I.




die Verb. kann auch dargestellt werden durch Addition von HCN an I (vgl. ANN u. PIEST, Ber. Dtsch. Chem. Ges. 15. 2028 [1882]). Die Hydrolyse von ar entsprechenden Säure ließ sich nicht durchführen, da das Nitril leicht in I. CN dissoziierte. — Verb. $\text{C}_{17}\text{H}_{17}\text{O}_3\text{N}_3$ (III.), Darst. aus II. in Eg. + KCNO in 10-std. Stehen bei gewöhnlicher Temp.; aus A. hellgelbe Prismen, F. 131°, in Alkali. — 1,5-Di-(p-methoxyphenyl)hydantoin, $\text{C}_{17}\text{H}_{16}\text{O}_4\text{N}_2$ (IV.), aus A. Prismen, F. 190°, l. in verd. Alkalien. — 1,5-Di-(p-oxyphenyl)hydantoin, $\text{C}_{15}\text{H}_{12}\text{O}_4\text{N}_2$ (V.), in alkoh. Lsg. durch Eingießen in Bzl. Nadeln; aus sd. W. F. 160°, unl. in A., in Alkalien, unl. in Bzl. u. Toluol; starke Färbung mit Millonschem Reagens. Sowohl V. als auch die in vorst. Ref. genannten Oxyphenyl- u. Di(oxyphenyl)-hydantoin wurden bzgl. ihrer baktericiden Wrkg. auf Bacillus typhosus untersucht, wori sich ergab, daß eine antisept. Wrkg. (größtenteils wegen zu geringer Löslichkeit in W.) gegenüber der von Phenol überhaupt nicht festgestellt werden konnte. (Conn. Americ. Chem. Soc. 47. 216—21. New Haven [Conn.], Yale Univ.) HAB.

Treat B. Johnson und Alice G. Renfrew, Untersuchungen über Hydantoin. Mitt. *Synthese des Polypeptidhydantoin*: „Hydantoin-3-essigsäure“. (42. vgl. vor. Ref.) Die Verb. (IV) wurde folgendermaßen synthetisiert: *i*-Thiocyanessigsäureäthylester (I) + Aminoessigester bilden das Thioharnstoffderiv. II, das durch Erhitzen mit HCl in das 2-Thiohydantoinderiv. III übergeht; durch CH_3ClCOOH wird hieraus *Hydantoin-3-essigsäure* (IV) erhalten.



Versuche. Carbäthoxylaminoessigesterdithiocarbamat (V), Darst. nach JOHNSON u. TICKNOR (Proc. National Acad. Sc. Washington 3. 303 [1917]); zerfällt bei Vakuumdest. nach a u. b. — Carbäthoxylaminoessigsäureäthylester, $\text{C}_7\text{H}_{13}\text{O}_4\text{N}$ (I) wurde aus der Fraktion Kp.₉ 134—136° bei der Dest. von V erhalten; Kp.₅ 117°. — Eigenschaften von I vgl. JOHNSON u. TICKNOR, l. c. — Äthylacetat des Thioncarbaminsäureäthylesters, $\text{C}_7\text{H}_{13}\text{O}_3\text{NS} = \text{C}_2\text{H}_5\text{OOC} \cdot \text{CH}_2 \cdot \text{NH} \cdot \text{CS} \cdot \text{OC}_2\text{H}_5$, durch Erhitzen von 1 Mol. I mit 3 Mol. $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ (einige Stdn. auf sd. Wasserbad, nach 9 Stdn. auf 125°); Kp.₁₀ 135—140°, bei der Dest. langsame Zers. unter Abg. von H_2S . — s. Diäthylidiacetat des Thioharnstoffs, $\text{C}_9\text{H}_{16}\text{O}_4\text{N}_2\text{S}$ (II), Darst. in h. Lsg.; aus Essigsäure umkrystallisiert, F. 85—87°, ll. in A. u. h. W. — Monoäthylidiacetat des Thioharnstoffs, $\text{C}_7\text{H}_{12}\text{O}_4\text{N}_2\text{S}$, erhalten durch Eindampfen der H_2O -Mutterlauge von II; aus Essigsäure gelbe Nadelrosetten, F. 90°. — 2-Thiohydantoin-3-essigsäure, $\text{C}_5\text{H}_6\text{O}_3\text{N}_2\text{S}$ (III), aus beiden vorigen durch Erhitzen mit konz. HCl; aus Eg. gelbe Tafeln, F. 210—212°, ll. in A. u. W., gibt mit Alkalien

rat (II) hydrolysiert wird; ist jedoch kein W. vorhanden, so lagert I sich um e beiden isomeren Verbb. III u. V; wird das Reaktionsgemisch in diesem am hydrolysiert, so entstehen die beiden *Dioxybenzophenone* IV u. VI; ist Hydrolyse nicht möglich, so kondensieren III u. V sich mit einem dritten C_6H_5OH zu VII, IX u. XI. Aus VII entsteht durch Abspaltung von HCl (VIII), aus IX analog X, u. aus XI durch Abspaltung von H_2O *p*-Oxy-*keanthenolchlorid* (XII). Durch Abspaltung von H_2 kann IX aber auch in die tändige Verb. XIII übergehen, aus der sich leicht *p*-Oxyphenylfluoron (XIV) Der aus IX frei gewordene H_2 wirkt reduzierend auf VII u. XII, wodurch aurin (XV) u. *p*-Oxyphenylxanthan (XVI) gebildet werden. Als Durchschnitts-uten ergaben sich bei 10 Verss., in denen jedesmal 154 g CCl_4 , 330 g C_6H_5OH 5 Mol.) u. 50 g $ZnCl_2$ unter sorgfältigem Ausschluß von Feuchtigkeit kondensiert en, folgende: 90–94 g Aurin, 25 g *p*-Oxyphenylfluoron (XIV), 15 g *o,p',p''*-Tri-



oxytriphenylcarbinol (X), 20 g Leukoaurin (XV), 7 g *p*-Oxyphenylcanthan (XV). Spuren der Ketone IV u. VI, sowie von II.

Versuche. Diphenylcarbonat (II), 94 g Phenol (1 Mol.) + 10 g ZnCl_2 + CCl_4 (0,55 Mol.) + 41 g ZnO (0,5 Mol.) werden unter Rückfluß auf 120° erhitzt; HCl-Entw. beendet (ca. 24 Stdn.), überschüssiges CCl_4 u. $\text{C}_6\text{H}_5\text{OH}$ werden durch Wasserdampf entfernt, der Kolbenrückstand unter gutem Rühren in Wasser gegossen; unl. II nach Digerieren mit 5%ig. NaOH aus A. umkrystallisiert; Ausf. (auf $\text{C}_6\text{H}_5\text{OH}$ bezogen) 50%. — *p,p'*- u. *o,p'*-Dioxybenzophenon (IV u. VI), analog II ohne ZnO mit 50 g ZnCl_2 ; Isolierung wie vorher; die alkal. Waschwasser werden zur Ausfällung von III u. VI mit SO_2 behandelt; beide Verbb. sind trennbar durch Lösen in h. Bzl., worin VI leichter l. ist. — Aurin (4,4'-Dioxydiphenylmethan). $\text{C}_{18}\text{H}_{14}\text{O}_6$ (VIII), 350 g Phenol (geschmolzen) + 50 g ZnCl_2 werden unter Ausschluß von Feuchtigkeit unter allmählicher Zugabe von 154 g CCl_4 18 Stdn. 135° erhitzt; nach Wasserdampfdest. wird der Kolbenrückstand unter Rühren in 2 l W. + 60 ccm HCl gegossen, Nd. zur Entfernung von VIII u. IV, sowie von VI mit 1,5%ig. NH_4OH extrahiert, ammoniakal. Filtrat bei $70\text{--}80^\circ$ langsam mit Essigsäure versetzt; nach Waschen des Nd. mit W., Essigsäure u. wieder mit W. wird zur Entfernung der letzten Reste IV u. VI das Prod. mit Ä. digeriert; HCl-Entw. beendet; stand aus sd. Eg. granatrote Krystalle, F. $295\text{--}300^\circ$ (unter Abspaltung von Phenol). Wird eine k. gesätt. Eg.-Lsg. von Aurin mit Bzl. versetzt, so erhält man eine k. gesätt. Lsg. $2(\text{C}_{19}\text{H}_{14}\text{O}_3) \cdot 2(\text{C}_2\text{H}_4\text{O}_2) \cdot \text{C}_6\text{H}_6$ als stahlblau glänzende Nadeln; aus Essigsäure umkrystallisiert Verb. $\text{C}_{19}\text{H}_{14}\text{O}_3 \cdot 1\frac{1}{2}(\text{C}_2\text{H}_4\text{O}_2) \cdot \text{H}_2\text{O}$, aus Aceton Verb. $2(\text{C}_{19}\text{H}_{14}\text{O}_3) \cdot 3(\text{C}_3\text{H}_6\text{O})$, aus Methyläthylketon Verb. $\text{C}_{19}\text{H}_{14}\text{O}_3 \cdot \text{C}_4\text{H}_8\text{O}$, aus Ä. Verb. $\text{C}_{19}\text{H}_{14}\text{O}_3 \cdot \text{C}_4\text{H}_{10}\text{O}$. — Aurinchlorhydrat, $\text{C}_{19}\text{H}_{15}\text{O}_3\text{Cl}$, krystallisiert aus mit HCl gesätt. A. 1 Mol. A., in Eg.-Lsg. dargestellt, werden 2 Mol. CH_3COOH aufgenommen, die Lsg. auf 100° wieder abgegeben werden; wird VIII aus h. verd. HCl umkrystallisiert, so erhält man braune Nadeln: Hydrat des Chlorhydrats, $\text{C}_{19}\text{H}_{15}\text{O}_3\text{Cl} \cdot 2\text{H}_2\text{O}$; das Hydrat in Wasser wird bei 120° abgegeben. — Daß Aurin nicht nur die Fuchsonkonst. I besitzt, sondern auch als hydratisiertes chinoides Carbinol (VIIIa) existieren kann, ergibt sich aus folgendem: wird eine auf $60\text{--}70^\circ$ erwärmte Lsg. von VIII in NE. langsam unter Rühren mit verd. HCl (1 : 4) versetzt, so scheidet sich beim Neufällen punkt das rote Fuchson VIII ab; wird ein geringer Überschuß an Säure zugegeben, so u. die w. Lsg. 15 Min. gerührt, so wird der rote Nd. allmählich purpurrot, es scheidet sich VIIIa, das beim Erhitzen im Luftstrom auf 100° rasch 1 Mol. H_2O abgibt, während das 2. Mol. H_2O erst nach mehreren Tagen vollständig entfernt wird. — Triacetylaurin (Tri-*p*-acetoxytriphenylcarbinol), $\text{HOC}(\text{C}_6\text{H}_4\text{OOCCH}_3)_3$, aus A. farblose Krystalle, F. $172\text{--}173^\circ$. — Triacetylaurinchlorid (Tri-*p*-acetoxytriphenylchlormethan), $\text{C}_{25}\text{H}_{21}\text{O}_6\text{Cl}$, aus voriger in h. Bzl. + CH_3COCl werden Krystalle, die 1 Mol. H_2O enthalten, gebildet, Krystallbzl. wird im Vakuum bei 78° durch einen Luftstrom oder P_2O_5 entfernt; wird beim Erhitzen gelb, erweicht bei 168° , F. 174° zu rot. Fl. unter Abspaltung von CH_3COCl ; dieses wird auch schon bei 120° (rascheb.) bei 160° abgegeben, indem wahrscheinlich Diacetylaurin entsteht. — Triacetylaurin-oxyd (Tri-*p*-acetoxytriphenylmethylperoxyd), $\text{C}_{50}\text{H}_{42}\text{O}_{14} = (\text{CH}_3\text{COOC}_6\text{H}_4)_3\text{CC}(\text{C}_6\text{H}_4\text{OOCCH}_3)_3$, durch Schütteln einer Lsg. des Triacetylaurinchlorids in Benzol mit Ag in Ggw. von O_2 ; aus Methyläthylketon F. $184\text{--}185^\circ$ zu roter F. — Tribenzoylaurin (Tri-*p*-benzoxytriphenylcarbinol), $\text{C}_{40}\text{H}_{28}\text{O}_7$, Darst. in Dimethyläthylketon lsg. mittels $\text{C}_6\text{H}_5\text{COCl}$; aus Bzl. F. $190\text{--}191^\circ$, weiß; aus Bzl. umkrystallisiert man erhält Verb. $2\text{C}_{40}\text{H}_{28}\text{O}_7 \cdot 3\text{C}_6\text{H}_6$, aus Essigsäure Verb. $\text{C}_{40}\text{H}_{28}\text{O}_7 \cdot \text{C}_2\text{H}_4\text{O}_2$, aus A. Verb. $\text{C}_{40}\text{H}_{28}\text{O}_7 \cdot \text{C}_2\text{H}_6\text{O}$, aus CCl_4 Verb. $\text{C}_{40}\text{H}_{28}\text{O}_7 \cdot \text{CCl}_4$, aus Aceton Verb. $\text{C}_{40}\text{H}_{28}\text{O}_7 \cdot \text{C}_3\text{H}_8\text{O}$, aus Methyläthylketon Verb. $2\text{C}_{40}\text{H}_{28}\text{O}_7 \cdot \text{CH}_3\text{COC}_2\text{H}_5$, aus Methylpropylketon Verb. $2\text{C}_{40}\text{H}_{28}\text{O}_7 \cdot \text{CH}_3 \cdot \text{CO} \cdot \text{C}_3\text{H}_7$. — Tribenzoylaurinchlorid, $\text{C}_{40}\text{H}_{27}\text{O}_6\text{Cl}$, krystallisiert aus Bzl. mit 1 Mol. C_6H_6 , das bei ca. 80° abgegeben wird, F. $172\text{--}174^\circ$ zu roter F.

ribenzoylaurinperoxyd, $C_{80}H_{54}O_{14}$, aus Chlf. Krystalle mit $4CHCl_3$, die bei 100° schmelzen, F. 218° zu roter Fl. — Werden 10 g VIII in 200 ccm 5%ig. NaOH gelöst, durch die Lsg. 72 Stdn. lang Luft geleitet, so scheidet sich auf Zusatz von Essigsäure IV ab. — *Leukoaurin* (XV), wird aus dem bei Darst. von VIII erhaltenen, verd. NH_4OH unl. Rückstand durch Extrahieren mit Ä. isoliert; die äth. Lsg. wird mit HCl gesätt., Ä. vom Nd. dekantiert u. eingedampft, wobei außer XV noch ein Prod. unbekannter Konst. erhalten wird; beide trennbar durch Umkrystallisieren aus Chlf.-Bzl., worin XV weniger l. ist; XV erweicht bei 235° , F. 240° . — *p,p',p''-Trimethoxytriphenylcarbinol* (X), wird bei Isolierung des vorigen nach Behandeln mit äth. Lsg. mit HCl als Nd. [Carbinolchlorid (IX)] erhalten, das mit Alkali in X übergeht; konnte — ebensowenig wie seine Derivv. — in reinem Zustande isoliert werden; durch Red. mit Zn-Staub + Eg. u. Methylieren wurde ein mit nachherigem Triphenylmethan ident. Prod. erhalten. — *o,p',p''-Trimethoxytriphenylmethanol*, aus Anisol-MgJ + Di-p-methoxybenzophenon; aus Bzl. + PAe. F. 124° bis 25° ; hieraus durch Red. mit Zn bei 80° *o,p',p''-Trimethoxytriphenylmethan*, aus PAe. F. $113-114^\circ$. — *p-Oxyphenylxanthen*, $C_{19}H_{14}O_2$ (XVI), wird zusammen mit II bei Darst. von VIII als in NH_4OH u. k. verd. NaOH unl., in Ä. l. Prod. erhalten, Trennung von II dadurch, daß das Na-Salz von XVI in h. verd. NaOH l. ist; aus PAe. F. $148-150^\circ$ (Zers.); *p-Methoxyderiv.* F. $112-113^\circ$. — *p-Oxyphenylfluoron*, $C_{12}O_3$ (XIV), isoliert aus dem Reaktionsgemisch von VIII auf Grund seiner Unlöslichkeit in verd. NH_4OH u. Ä.; zur Entfernung von wenig X wird mit 50%ig. Aceton gewaschen, l. in Essigsäure, hieraus orangerote Krystalle, F. $285-295^\circ$, nach Abspaltung von C_6H_5OH ; gibt mit Alkali rote bis orange Färbung. — *p-Acetoxyphenylfluoron*, $C_{21}H_{14}O_4$, aus Bzl. mit Ä. gefällt, F. $204-205^\circ$. — *p-Acetoxyphenylmethoxyxanthenol*, $C_{23}H_{18}O_6$, aus Bzl. mit CS_2 gefällt, F. $138-140^\circ$. — *p-Methoxyphenylfluoron*, $C_{20}H_{14}O_3$, aus XIV in 4%ig. NaOH + $(CH_3)_2SO_4$; aus Bzl.-Aceton gefärbene Krystalle, F. $206-208^\circ$. — *p-Methoxyphenyl-3-methoxyxanthenol*, $C_{21}H_{18}O_4$, durch Methylieren von XIV in 50%ig. Acetonlsg.; aus A., danach aus Bzl. F. $112-114^\circ$. — Durchleiten von Luft durch eine Lsg. von XIV in 5%ig. NaH führt zur B. von *o,p'-Dioxybenzophenon* (VI), aus Bzl., F. $150-151^\circ$; *Acetylderiv.*, F. $89-90^\circ$. — Bei der Darst. von VIII nach dem Verf. von ZULKOWSKI (Monatsh. f. Chemie 16. 358 [1895]) durch Verschmelzen von C_6H_5OH mit Oxalaldehyd werden die Nebenprodd. in gleicher Menge wie nach dem eben beschriebenen Verfahren erhalten. Handelsproben von Aurin, von deutschen u. amerikanischen Firmen bezogen, enthielten 35–55% reines Aurin. (Journ. Americ. Chem. Soc. 47. 198–211. Ann Arbor [Mich.], Univ.)

HABERLAND.

J. Tröger und E. Dunker, Über die Kondensation von Oxy- und Methoxychinaldinen sowie α -Oxylepidin mit aromatischen Aldehyden. Die Verss. hatten den Zweck, durch Kondensation der genannten Chinolinderivv. mit aromat. Aldehyden nachfolgender Hydrierung der CH:CH-Bindung in den Kondensationsprodd. die Kryst. des inzwischen von SPÄTH u. EBERSTÄLER (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 57. 16; C. 1924. II. 2404) synthetisierten Galipins bzw. Cusparins durch die Synthese sicherzustellen. γ -Methoxychinaldin gibt mit Aldehyden zur Salzbildung befähigte Kondensationsprodd.; mit α -Methoxyepidin trat jedoch bei Einw. der Aldehyde ein Entmethylierung der Methoxybase ein. Bei Anwendung nicht methylierter Chinaldinderivv. oder von Oxyaldehyden tritt eine Kondensation nicht oder nur sehr schwierig ein; Verss. die CH:CH-Bindung zu reduzieren, sind den Vff. nicht gelungen.

Versuche. *Benzyliden- α -oxylepidin*, $(\alpha) OH \cdot C_6H_5N(CH:CHC_6H_5)(\gamma)$, aus den Komponenten durch 5-std. Erhitzen auf 230° in Ggw. von $ZnCl_2$; nach wiederholtem Umkrystallisieren aus HCl-haltigem A. u. Digerieren mit NH_4OH als braunes Pulver erhalten, F. 130° , unl. in HCl, l. in Eg.; Perchlorat ebenfalls amorph. — *o-Oxy-*

benzyliden- α -oxylepidin aus Salicylaldehyd; gelbes Pulver, unl. in A. u. Ä., w. Eg., kein F. bis 360°. — *p-Methoxybenzyliden- α -oxylepidin*, aus Anisaldehyd; harartiges Pulver, beim Reiben elektr. werdend, kein F. bis 360°. — Kondensat vers. mit Protocatechualdehyd führten zu weitgehender Zers. — *3-Methoxy-4-benzyliden- α -oxylepidin*, aus Vanillin; schokoladenbraunes Pulver, unl. in o. Mitteln, bildet ebensowenig wie die vorigen krystallisierte Salze. — *β -Oxychinaldinjodmethylat*, nach wiederholtem Umkrystallisieren aus W. gelbliche stumpfe N. F. 235–240°. — *β -Oxychinaldinmethyllammoniumsalz der Platinchlorwasserstoffsäure*, $[(\text{OH})\text{C}_9\text{H}_5(\text{CH}_3)\text{NCH}_3]_2\text{PtCl}_6 + 3\text{H}_2\text{O}$, durch Schütteln der vorigen in W. mit Jod entsteht eine Lsg. der quaternären Ammoniumbase, $(\text{OH})\text{C}_9\text{H}_5(\text{CH}_3)\text{NCH}_3\text{OH}$, hierauf durch Zugabe von HCl Nadeln des Chlorhydrats u. aus diesen das Pt-Salz: gelbliche Nadeln. — *β -Methoxychinaldin*, $(\text{OCH}_3)\text{C}_9\text{H}_5\text{N}(\text{CH}_3)$, durch 4-std. Erhitzen von *β -Oxychinaldin* mit CH_3J in alkoh. KOH auf 100° (Druckflasche); das Reaktionsprodukt wird nach Eindampfen mit Ä. extrahiert, hieraus erhaltenes Öl mit Wasserdestillat., übergehendes Methoxychinaldin bildet beim Abkühlen lange weiße Nadeln, F. 31° zu gelber Fl., die nach Stehen an Luft teilweise in Prismen krystallisiert (Hydratb.); Chlorhydrat u. Perchlorat (aus Ä. weiße Nadeln) sind an Luft zerflüchtig; Chloroplatinat, $[(\text{OCH}_3)\text{C}_9\text{H}_5(\text{CH}_3)\text{N}]_2\text{H}_2\text{PtCl}_6 + \text{H}_2\text{O}$, aus verd. Lsg. gelbe Nadeln; Zinndoppelsalz, $[(\text{OCH}_3)\text{C}_9\text{H}_5(\text{CH}_3)\text{N}]\text{H}_2\text{SnCl}_6$, aus salzsaurer Lsg. Methoxychinaldins + konz. SnCl_2 -Lsg.; aus verd. HCl farnblattartige Krystalle, 2½–3 Mol. H_2O enthalten. — *Jodmethylat des β -Methoxychinaldins*, $(\text{OCH}_3)\text{C}_9\text{H}_5\text{N}(\text{CH}_3)\text{CH}_3\text{J}$, aus W. braune Prismen (Drusen), F. 196°; daneben erhält man glänzende Nadelchen, die 2–3% weniger J enthalten, F. 84°, Sintern ab 77°. — *β -Äthoxychinaldinjodmethylat*, $(\text{OC}_2\text{H}_5)\text{C}_9\text{H}_5(\text{CH}_3)\text{N}(\text{CH}_3)\text{J} + 1,5\text{H}_2\text{O}$, aus W. blaßgelbe Nadeln, F. 207°; scheint zu einer Chinaldonumlagerung nicht fähig zu sein. — *Benzyliden- β -oxychinaldin*, $(\text{OH})\text{C}_9\text{H}_5\text{N}(\text{CH}:\text{CHC}_6\text{H}_5)$, Darst. bei 180° (7 std. Erhitzen) in C_6H_6 von ZnCl_2 ; aus Aceton mit W. gefällt amorphes hellgelbes Pulver, F. 130°, Sintern bei 110°; Chlorhydrat, Chloroplatinat u. Jodmethylat amorph, letzteres kaffeebraun. — *o-Oxybenzyliden- β -oxychinaldin*, $(\text{OH})\text{C}_9\text{H}_5\text{N}(\text{CH}:\text{CH}\cdot\text{C}_6\text{H}_4\text{OH})$, aus Aceton wenig A. durch W. gefällt fleischfarbenes Pulver, F. 220° nach vorherigem Sintern in NH_4OH . — *p-Methoxybenzyliden- β -oxychinaldin*, $(\text{OH})\text{C}_9\text{H}_5\text{N}(\text{CH}:\text{CHC}_6\text{H}_4\text{OCH}_3)$, aus alkoh. HCl nach Digestion mit NH_4OH bräunlichgelbes Pulver, F. 225°, w. Eg., unl. in wss. HCl u. NaOH; Salze amorph. — *Benzyliden- γ -oxychinaldin*, $(\text{OH})\text{C}_9\text{H}_5\text{N}(\text{CH}:\text{CHC}_6\text{H}_5)$, aus h. Anilin durch Versetzen mit A. gelblichweiße Blättchen, F. 279°; Chlorhydrat, $\text{C}_{17}\text{H}_{18}\text{ON}\cdot\text{HCl}$, aus A. citronengelbe Nadeln; Chloroplatinat, $(\text{C}_{17}\text{H}_{18}\text{ON})_2\text{H}_2\text{PtCl}_6$, aus alkoh. HCl blaßgelbe Nadelchen, wahrscheinlich mit $3\frac{1}{2}\text{H}_2\text{O}$. — *o-Oxybenzyliden- γ -oxychinaldin*, $(\text{OH})\text{C}_9\text{H}_5\text{N}(\text{CH}:\text{CH}\cdot\text{C}_6\text{H}_4\text{OH})$, aus NaOH nach Füllen mit HCl u. Waschen mit W. u. A. hellgelbes Pulver, bei 260° stahlgrau werdend, kein F. bis 300°, l. in Anilin u. Eg., sonst unl. in organ. Mitteln; krystallisierte Salze konnten nicht erhalten werden. — Kondensation von γ -Oxychinaldin mit Piperonal gelang nicht. — *o-Methoxybenzyliden- γ -methoxychinaldin*, $(\text{OCH}_3)\text{C}_9\text{H}_5\text{N}(\text{CH}:\text{CHC}_6\text{H}_4\text{OCH}_3)$, aus der Na-Verb. des vorigen + CH_3J in A., gelbes Pulver, kein F. bis 300°, ll. in Eg. u. Anilin, unl. in alkoh. HCl, unl. in NaOH; Perchlorat amorph. — *o-Benzoyloxybenzyliden- γ -benzoyloxychinaldin*, $(\text{C}_7\text{H}_7\text{O})\text{C}_9\text{H}_5\text{N}(\text{CH}:\text{CHC}_6\text{H}_4\text{OC}_6\text{H}_7)$, braungelbes Pulver, unl. in NaOH; Perchlorat amorph. — *p-Methoxybenzyliden- γ -oxychinaldin*, $(\text{OH})\text{C}_9\text{H}_5\text{N}(\text{CH}:\text{CH}\cdot\text{C}_6\text{H}_4\cdot\text{OCH}_3)$, durch 20 std. Erhitzen von Anisaldehyd + Oxychinaldin auf 190–200°, graugrünes Pulver, F. 266°, l. in konz. HCl, A. u. Eg.; Perchlorat, $\text{C}_{18}\text{H}_{15}\text{O}_2\text{N}\cdot\text{HClO}_4$, aus Ä. gelbe Prismen. — *p-Methoxybenzyliden- γ -oxychinaldinalkin*, $(\text{OH})\text{C}_9\text{H}_5\text{N}(\text{CH}_2\cdot\text{CH}(\text{C}_6\text{H}_4[\text{OCH}_3]))$, durch 9 std. Erhitzen von Anisaldehyd + Oxychinaldin auf 190–200°, Chloroplatinat, $(\text{C}_{18}\text{H}_{17}\text{O}_3\text{N})_2\text{H}_2\text{PtCl}_6$, gelbes Pulver; Goldsalz, $\text{C}_{18}\text{H}_{17}\text{O}_3\text{N}\cdot\text{HAuCl}_4$, braunes Pulver. — *Benzyliden- γ -methoxychinaldin*, $(\text{OCH}_3)\text{C}_9\text{H}_5\text{N}(\text{CH}:\text{CHC}_6\text{H}_5)$, unl.


gelbe Nadelchen, die beim Trocknen in Prismen übergehen, F. 297°; Chlorhydrat blaßgelbe Nadelchen. — *o*-Oxybenzyliden- γ -methoxychinaldin, $(\text{OCH}_3)_9\text{C}_9\text{H}_5\text{N} \cdot \text{CH}(\text{CH}_2 \cdot \text{CH}(\text{OH})\text{C}_6\text{H}_5)_2$, dunkelgelbes Pulver. — *p*-Methoxybenzyliden- γ -methoxychinaldin, $(\text{OCH}_3)_9\text{C}_9\text{H}_5\text{N}(\text{CH} : \text{CH} \cdot \text{C}_6\text{H}_4\text{OCH}_3)_2$, gelblichweißes Pulver; Chlorhydrat $\text{C}_{19}\text{H}_{17} \cdot \text{O}_3\text{N}$, gelbe Nadelchen, Sintern bei 120°, F. 165°; Jodmethylat, $\text{C}_{19}\text{H}_{17} \cdot \text{O}_2\text{N} \cdot \text{CH}_3\text{J}$, gelbe Nadelchen, F. 168° unter Aufschäumen, danach F. 140° (Chinaldinaldehyd?). — *m*-Methoxybenzyliden- γ -methoxychinaldin, $(\text{OCH}_3)_9\text{C}_9\text{H}_5\text{N}(\text{CH} : \text{CH} \cdot \text{C}_6\text{H}_4\text{OCH}_3)_2$, aus A. hellgelbe Blättchen, die bisher noch nicht ganz rein (frei von Chlorhydrat) erhalten werden konnten, F. 134,5°; Chlorhydrat aus verd. HCl citronengelbe Blättchen. — *3-Methoxy-4-oxybenzyliden- γ -oxychinaldin*, $(\text{OCH}_3)_9\text{C}_9\text{H}_5\text{N}(\text{CH} : \text{CH} \cdot \text{C}_6\text{H}_3\text{OCH}_3)_2$, aus dem Chlorhydrat durch Digestion mit NH_4OH fast schwarzes Pulver; Chlorhydrat, $\text{C}_{19}\text{H}_{17} \cdot \text{O}_3\text{N} \cdot \text{HCl} + 3\text{H}_2\text{O}$, aus HCl-haltigem W. eigelbe Blättchen; Krystallwasser wird bei 105° abgegeben, das Salz danach rotgelb. — *Benzylden-o-methoxychinaldin*, $(\text{OCH}_3)_9\text{C}_9\text{H}_5\text{N}(\text{CH} : \text{CH} \cdot \text{C}_6\text{H}_5)_2$, Darst. durch 10std. Erhitzen der Komponenten (in Ggw. von ZnCl_2) auf 150—160°; schmutziggelbes Pulver; Chlorhydrat aus konz. HCl gelbe Blättchen. — *Benzylden-o-methoxychinaldinalkin*, $(\text{OCH}_3)_9\text{C}_9\text{H}_5\text{N}(\text{CH}_2 \cdot \text{CH}(\text{OH})\text{C}_6\text{H}_5)_2$, Darst. analog vorigem ohne ZnCl_2 (7—8std. Erhitzen); aus A. gelblichweiße Nadelchen, F. 103°; Chlorhydrat, $\text{C}_{18}\text{H}_{15} \cdot \text{O}_2\text{N} \cdot \text{HCl}$, aus konz. HCl gelbe Blättchen, bei 105° HCl unter Zers. abgebend; Chloroplatinat, $(\text{C}_{18}\text{H}_{15} \cdot \text{O}_2\text{N})_2\text{H}_2\text{PtCl}_6$, aus alkoh. HCl gelbe kub. Blättchen, beim Verbrennen dehydrierend; Goldsalz, $\text{C}_{18}\text{H}_{15} \cdot \text{O}_2\text{N} \cdot \text{HAuCl}_4$, aus alkoh. HCl goldgelbe Nadelchen (1/2—3/4 H₂O). — *o*-Oxybenzyliden-*o*-methoxychinaldin, $(\text{OCH}_3)_9\text{C}_9\text{H}_5\text{N}(\text{CH} : \text{CH} \cdot \text{C}_6\text{H}_4\text{OCH}_3)_2$, gelbliches Pulver; Perchlorat, $\text{C}_{18}\text{H}_{15} \cdot \text{O}_2\text{N} \cdot \text{HClO}_4$, aus W. goldgelbe Nadelchen. — *o*-Oxybenzyliden-*o*-methoxychinaldinalkin, $(\text{OCH}_3)_9\text{C}_9\text{H}_5\text{N}(\text{CH}_2 \cdot \text{CH}(\text{OH})\text{C}_6\text{H}_4\text{OCH}_3)_2$, fleischfarbenes Pulver; Diacetylderiv., aus Eg.-W. gelblichweiße Nadelchen, F. 110°. — *p*-Methoxybenzyliden-*o*-methoxychinaldin, $(\text{OCH}_3)_9\text{C}_9\text{H}_5\text{N}(\text{CH} : \text{CH} \cdot \text{C}_6\text{H}_4\text{OCH}_3)_2$; Chlorhydrat orangefarbige Nadeln; Chloroplatinat, $(\text{C}_{19}\text{H}_{17} \cdot \text{O}_3\text{N})_2\text{H}_2\text{PtCl}_6$, aus h. HCl orangefarbene Nadelchen. — *p*-Methoxybenzyliden-*o*-methoxychinaldinalkin, $(\text{OCH}_3)_9\text{C}_9\text{H}_5\text{N}(\text{CH}_2 \cdot \text{CH}(\text{OH})\text{C}_6\text{H}_4\text{OCH}_3)_2$, aus dem Chlorhydrat durch NH_4OH anfangs rot, danach fest werdend, F. 112°; Chlorhydrat, $\text{C}_{19}\text{H}_{19} \cdot \text{O}_3\text{N}$, HCl, aus konz. HCl gelbe Nadeln; Chloroplatinat, $(\text{C}_{19}\text{H}_{19} \cdot \text{O}_3\text{N})_2\text{H}_2\text{PtCl}_6$, aus alkoh. HCl gelbe Prismen mit abgeschrägten Enden; Goldsalz, $\text{C}_{19}\text{H}_{19} \cdot \text{O}_3\text{N}$, HAuCl_4 , aus A. bräunliche Krystallnadeln, anscheinend mit 2 1/2 H₂O. — *3,4-Dioxybenzyliden-*o*-methoxychinaldin*, $(\text{OCH}_3)_9\text{C}_9\text{H}_5\text{N}(\text{CH} : \text{CH} \cdot \text{C}_6\text{H}_3[\text{OH}]_2)_2$, braunes, amorphes Pulver; Perchlorat, $\text{C}_{18}\text{H}_{15} \cdot \text{O}_3\text{N}$, HCl, aus A. durch Zugabe von Eg. braune, flache Kryställchen. — *3-Methoxybenzyliden-*o*-methoxychinaldin*, $(\text{OCH}_3)_9\text{C}_9\text{H}_5\text{N}(\text{CH} : \text{CH} \cdot \text{C}_6\text{H}_3[\text{OCH}_3][\text{OH}])_2$, dunkelgelbe Blättchen, ll. in A., unl. in Ä.; Perchlorat, $\text{C}_{19}\text{H}_{17} \cdot \text{O}_3\text{N}$, HClO_4 , aus Eg. rote Nadelchen; Chlorhydrat, $\text{C}_{19}\text{H}_{17} \cdot \text{O}_3\text{N}$, H_2SO_4 , aus A. gelbe Nadelbüschel. Kondensation von *o*-Methoxychinaldin mit Piperonal in Ggw. von ZnCl_2 (1 1/2 Stdn. bei 135°) u. Lösen des Reaktionsprod. in konz. HCl gab ein krystallin. orangefarbenes Chlorhydrat; das Salz katalyt. noch mit Zn oder Sn + HCl reduziert werden konnte. (Journ. f. prakt. Chem. 109. 88—123. Braunschweig, Techn. Hochschule.)

HABERLAND.

Dr. Otto Fischer, Emil Diepolder† und Edgar Wölfel, Zur Kenntnis substituirter γ -Aminochinoline. Die Abspaltung von Halogenwasserstoff aus γ -Aminochinoliniumsalzen (I) kann sowohl zur B. einer Imin- (II) als auch einer Methylenbasen (III) führen. Da Verbb. vom Typ III auch aus unsubstituierten Chinaldiniumsalzen entstehen, da ferner das aus γ -Chlorchinaldiniumjodid + Monomethylanilin erhaltene Prod. IV bei Behandlung mit KOH eine ätherlösliche Base gibt, die nicht durch Wanderung des am Anilin-N sitzenden CH_3 (V) entstanden sein kann, so ist an Konst. VI haben muß, nehmen Vff. an, daß sich stets Methylenbasen (III) bei diesen Rkk. bilden.

Versuche. γ -Chlorchinaldin, Darst. nach CONRAD u. LIMPACH (Ber. Dtsch.

see
derivats
V. 96
P 3204




Chem. Ges. **20**. 944 [1887]) als Chlorhydrat durch Erhitzen von Oxychinaldin PCl_5 auf $110-115^\circ$ (nicht wie l. c. angegeben). — γ -Phenylaminochinaldin vorigem + Anilin bei 120° wird das Chlorhydrat erhalten, hieraus freie Base $\text{Ä.} + \text{Bzl.}$ vierkantige Prismen, F. $153-154^\circ$ (zu gelber Fl.); Chlorhydrat, $\text{C}_{16}\text{H}_{15}\text{N}_2$, aus h. verd. HCl gelbliche Nadelchen, bei 168° erweichend, F. ca. 252° (Zers.); Pikrat, $\text{C}_{22}\text{H}_{17}\text{N}_5\text{O}_7$, aus A. hellgelbe Nadelbüschel, F. 210° (Zers.); Jodmet. $\text{C}_{17}\text{H}_{17}\text{N}_2\text{J}$, aus h. W. gelbe Nadeln, ab 240° Bräunung, F. ca. 254° (dunkelb. Schmelze). — Verb. $\text{C}_{17}\text{H}_{16}\text{N}_2$ (wahrscheinlich: *N*-Methyl-2-methylen-4-anilindodichinolin), aus dem Jodmethylat der vorigen in w. W. + NaOH; aus PAe. kanariengelbe quadrat. Tafeln, F. 162° (rotbraune Schmelze); Pikrat, $\text{C}_{23}\text{H}_{18}\text{N}_5\text{O}_7$, aus A. grüngelbe Prismen, in auf 130° vorgewärmtem Bad F. 135° (rotbraun). — γ -Methylanilidochinaldin, $\text{C}_{17}\text{H}_{16}\text{N}_2$ (entsprechend IV), Darst. durch 2-stünd. Erhitzen der Komponenten im Rohr auf $180-190^\circ$; aus PAe. + wenig Ä. kristalline Kryställchen, F. 76° (Schmelze schwach gelb), ll. in A., Ä., Bzl.; Jodmethylat, $\text{C}_{18}\text{H}_{19}\text{N}_2\text{J}$ (IV), aus h. W. gelbe Nadeln, ab 215° Bräunung, F. 235° (Zers.); steht außer aus vorigem auch aus Monomethylanilin + γ -Chlorchinaldinjodmet. Pikrat des Jodmethylats, aus h. W. hellgelbe Nadelchen, Zers. bei ca. 159° . — wird anscheinend auch aus der vorher genannten Methylenbase $\text{C}_{17}\text{H}_{16}\text{N}_2$ + Jodmethylat gebildet. — Verb. $\text{C}_{18}\text{H}_{20}\text{N}_3\text{Cl}$, aus γ -Chlorchinaldin + a. Dimethylphenylendin aus sd. W. in durchfallendem Licht goldgelbe, in auffallendem Licht rotbraune Prismen; die goldgelbe Lsg. dieses Chlorhydrats wird durch HCl entfärbt; freie Base, Verb. $\text{C}_{18}\text{H}_{19}\text{N}_3$, aus s. Amylalkohol gelbliche Prismen, wl. in Ä., Lg. u. Bzl. bei 250° bräunlich werdend, F. 268° (Schmelze rotbraun). — γ -Chlorchinaldinjodmethylat, $\text{C}_{11}\text{H}_{11}\text{NClJ}$, aus γ -Chlorchinaldin durch Addition von CH_3J (l. c.) in Stehen im Dunkeln, danach 15 Min. auf 50° erwärmt; aus h. W. gelbe, röhrenförmige Nadeln, bei 200° bläulich werdend, bei 212° unter Aufschäumen in schwarze M. übergehend; ll. in A. Lsg. in verd. A. mit Na_2CO_3 oder Na_2S versetzt gibt intensive Violettfärbung, bald danach Abscheidung von $\text{C}_{22}\text{H}_{20}\text{N}_2\text{JCl}$, stahlblaue Nadeln, die i-cyaninartiges Verh. zeigen (vgl. nachst. Journ. f. prakt. Ch. **109**. 59–68.)

HABERLAND

Otto Fischer, Alfred Müller und Anton Vilsmeier, Über die Einwirkung von Phosphoroxchlorid auf Methyl-(Äthyl)-acetanilid. Synthesen von γ -Chlorchinaldincyaninen. (Vgl. vorst. Ref.) Der von FRIEDEL (Bull. Soc. Chim. Paris [2] **1028** [1896]) durch Einw. von POCl_3 auf Methylacetanilid bei 120° erhaltene Farbstoff $\text{C}_{20}\text{H}_{20}\text{N}_2\text{Cl}_2$ entspricht nicht dieser Zus., sondern, wie Vff. gefunden haben, der Formel $\text{C}_{23}\text{H}_{20}\text{N}_2\text{Cl}_2$; das Jodid dieses Farbstoffs ist mit dem aus γ -Chlorchinaldinjodmethylat + NH_4OH in vorst. Ref. beschriebenen Farbstoff (III) identisch. Seine Entstehung kann man in letzterem Falle folgendermaßen erklären: un-

Altung von HJ aus γ -Chlorchinaldinjodmethylat (I) entsteht zunächst die
 ylenbase II, die mit einem weiteren Mol des Jodmethylats unter Abspaltung
 ICl das Chlor-i-cyanin (III) bildet. Die B. des Farbstoffs nach dem Friedel-
 Verf. verläuft in 2 Phasen: es bildet sich zunächst in der Schmelze γ -Chlor-
 aldinchloromethylat (VI). Die B. von VI kann dadurch zustande kommen, daß
 aus Methylacetanilid + POCl_3 gebildete Chlorid IV sich mit einem zweiten
 zu V kondensiert, aus dem durch Abspaltung von Monomethylanilinchlorhydrat
 Jagschluß sich VI bildet. Methylanilin wurde unter den Reaktionsprodd. auch
 stellt, aber nur in geringer Menge, da es sowohl mit VI als auch mit IV
 rt. Die zweite Phase der B. des Farbstoffs besteht darin, daß VI in Ggw.
 Na_2CO_3 oder NH_4OH analog wie vorher unter Abspaltung von HCl das Chlor-
 ynin bildet.



Versuche. Verb. $\text{C}_{22}\text{H}_{20}\text{N}_2\text{Cl}_3$ (Chlorid des i-Cyaninfarbstoffs, entsprechend I Cl statt J), Darst. nach FRIEDEL (l. c. vgl. auch BEILSTEIN, IV, 1046), aus
 A. dunkelrote, metallglänzende Nadeln, ll. in W. — Jodid des Farbstoffs,
 $\text{C}_{22}\text{H}_{20}\text{N}_2\text{IJ}$ (III), aus vorigem + KJ; aus h. W. oder A. dunkle, bläulichglänzende
 acn. — Pikrat des i-Cyanins, $\text{C}_{28}\text{H}_{22}\text{O}_7\text{N}_5\text{Cl}$, aus h. A. olivgrüne Nadelchen,
 bei 193° zu blauschwarzer Schmelze; swl. in W., wl. in A., ll. in Pyridin
 ter Farbe. — Platinchlorwasserstoffsaurer Salz, $\text{C}_{22}\text{H}_{21}\text{N}_2\text{Cl}_4\text{Pt}$, aus verd. HCl
 l. Krystalle, bei längerem Stehen oder beim Erwärmen unter Abspaltung von
 allmählich rot werdend. Das γ -ständige Cl in III ist sehr reaktionsfähig, es
 an gegen Anilin-etc.-Reste ausgetauscht werden u. bildet hiermit rote bis violette
 arstoffe. — N-Methyl- γ -chlorchinolon, $\text{C}_{10}\text{H}_8\text{ONCl}$, aus III in W. durch Zutropfen-
 ss von 3%ig. KMnO_4 -Lsg. (CO_2 -Atmosphäre, Eiskühlung); Filtrat ausgeäthert;
 th. Lsg. erhaltener Rückstand aus Bzl.-PAe. umkrystallisiert weiße Nadeln,
 13° . Die nach dem Ausäthern zurückbleibende gelbe Lsg. der Oxydations-
 rot. wird beim Eindampfen blauviolett. — Das im Verlaufe der Friedelschen
 k. eben VI gebildete Methylanilin wirkt auf VI ein unter B. von γ -Methyl-
 aldinchlorid (IV des vorst. Ref., Cl statt J), identifiziert als Pikrat,
 $\text{C}_{24}\text{H}_{18}\text{O}_7\text{N}_5$, aus A. grünstichig-gelbe Prismen, bei 148 – 150° dunkel werdend, bei
 30° zu dunkler Fl. schm. — Zur Identifizierung der bei dem Friedelschen Verf.
 gebildeten Prodd. wurde die aus 100 g Methylacetanilid + 70 g POCl_3
 7-std. Erhitzen (120 – 125°) erhaltene Schmelze in 500 ccm W. gel. u. all-
 mählich mit 25 g KJ-Lsg. versetzt; nach 12-std. Stehen schieden sich hieraus
 lähen ab, die mit Na_2CO_3 oder NH_4OH eine in Ä. u. Bzl. l. Base (Amidinium-

verb., vgl. unten) gaben. Die Mutterlauge hiervon gab auf Zusatz von weit 30 g KJ einen harzigen Nd., der nach Trocknen mit Aceton extrahiert wurde, wobei das Amidiniumjodid gel. wird, während γ -Chlorchinaldiniumjodid, $C_{11}H_{11}N$ zurückbleibt, aus W. gelbe, grünlich glänzende Prismen, beim Trocknen H_2SO_4 graugelb werdend; bei 200° Dunkelfärbung, F. 212—213° zu blauschwarz. M. — γ -Anilidochinaldinjodmethylat, $C_{17}H_{17}N_2J$, aus vorigem durch Zugabe Anilin + wenig Eg.; aus A. + wenig Eg. hellgelbe Nadeln, Zers. bei 255° — *Athenyldiphenyldimethylamidiniumjodid*, $C_{16}H_{19}N_2J$ (entsprechend VII), wird dem bei dem Friedelschen Verf. aus Methylanilin + IV erhaltenen Chlorid durch Umsetzen mit KJ erhalten; scheidet sich aus konz. wss. Lsg. ölig ab, wird allmählich fest; F. 187—188°; Pikrat, $C_{22}H_{22}O_2N_5$, aus A. gelbe Kryst. Platinchlorwasserstoffsäures Salz, $C_{32}H_{33}N_4Cl_6Pt$, dargestellt aus der Base, die dem Jodid mittels Alkali ölig (l. in Ä.) erhalten wurde; aus 50%ig. A. rote Prismen, ab 180° Dunkelfärbung, Zers. bei etwa 195°. Die eben genannte Base keine echte Ammoniumbase, sondern eine Pseudobase, die bei der Dest. in *Methylanilin* u. *Acetmonomethylanilin*, Tafeln, F. 101°, zerfällt. Das VII entsprechende Jodid läßt sich (ohne B. des Farbstoffs) darstellen, indem 30 g Methylacetanilid + 30 g Methylanilin + 20 g $POCl_3$ zunächst auf 120—125°, dann kurze Zeit auf 140° (im ganzen 2 Stdn.) erhitzt werden, die Schmelze danach in W. gel. u. mit H_2O versetzt wird. — *Verb.* $C_{24}H_{24}N_2Cl_2$, wird analog III erhalten durch Erhitzen Äthylacetanilid mit $POCl_3$ auf 125—130°; nach beendeter HCl-Entw. wird die Schmelze in NaCl-haltiges W. gegossen; die sich auf Zusatz von Na_2CO_3 abscheidende Schicht wird mit h. Bzl. gewaschen u. aus h. W. umkrystallisiert; hieraus gelbe oder bronzeglänzende Nadeln, Zers. bei ca. 185°; wss. Lsg. rotviolett; l. in A., schwerer in Bzl. u. Ä. Hieraus durch KJ das Jodid, *Verb.* $C_{24}H_{24}N_2ClJ$, aus sd. Ä. gelbe schillernde Blättchen, F. ca. 270° unter Zers. u. vorherigem Sintern. Wird ein Überschuß an KJ angewandt u. längere Zeit gekocht, so erhält man außerdem Jodid eine blaue Lsg., aus der sich rote Tafeln (unbekannter Konst.) abscheiden. Pikrat, $C_{30}H_{26}O_7N_5Cl$, aus verd. Pyridin grünglänzende Nadeln, F. 210° (Zers.). *Chloroplatinat*, $C_{24}H_{25}N_2Cl_2Pt$, aus verd. HCl gelbes Pulver, nach u. nach rot werdend; bei 240° Dunkelfärbung, bei 260° schwarzblau, kein F. bis 300°. *N-Äthyl- γ -chlorchinaldin*, $C_{11}H_{10}ONCl$, durch Oxydation des Farbstoffs erhalten als PAe. weiße Prismen, F. 64,5°. (Journ. f. prakt. Ch. 109. 69—87. Erlangen Univ.)


HABERLAND.

William Murdoch Cumming, *Die Hydroferrocyanide und Hydroferricyanide der organischen Basen*. Teil IV. (III. vgl. Journ. Chem. Soc. London 125. 100 C. 1924. II. 458.) In neutraler Lsg. wurden folgende *Hydroferrocyanide* dargestellt (A = Base, B = $H_4Fe(CN)_6$, C = Krystallalkohol, s = l. in W., ss in A.): *Monomethylanilin* A_3, B , weiße Tafeln, s, *Dimethylanilin* $A_2, B, 2C$, to *p*-*Bromdimethylanilin* $A_2, B, 2C$, weiße Nadeln, *p*-*Nitrosodimethylanilin* $A_4, B, 2C$, violette Tafeln, u. $A, B, 7C$, violette Tafeln, s, *o*-*Dianisidin* $A_3, B, 4C$, blaßgelbe Tafeln. *Benzylamin* u. *Methyldiphenylamin* bildeten keine Salze. — Zur Darstellung der *Hydroferricyaniden* wurden die in A. gel. Komponenten nötigenfalls bei —18° mischt; manchmal mußte die alkoh. Säure direkt zur Base gegeben werden u. Oxydation zu vermeiden. Selbst bei —18° trat Oxydation ein bei *p*-*Phenylendiamin*, α -*Naphthylamin*, *Diphenylamin*, *Methyldiphenylamin* u. *Diaminodiphenylamin*. Im letzten Falle war u. Mk. B. eines Salzes zu beobachten. Die erhaltenen Salze sind den früher beschriebenen ähnlich, aber leichter l. in W. als die aus saurer oder neutraler Lsg. gefällten. Dargestellt wurden [B = $H_3Fe(CN)_6$]: *Anilin* A_3, B , weiße Tafeln, s, *o*-*Toluidin*, $A_3, B, 1/2 C$, citronengelbe vierseitige Tafeln, s, ss, *p*-*Toluidin* $A_3, B, 1/2 C$, hellgrüne Tafeln, s, *p*-*Toluidin* $A_2, B, 1 1/2 C$, grüne Tafeln, s, *o*-*Phenylendiamin* $A_3, B, 2 1/2 C$, braune Tafeln, *m*-*Phenylendiamin* $A_2, B, 1 1/2 C$, grün

ln, Monomethylanilin A_3, B , hellgrüne Tafeln, s , Dimethylanilin A_2, B, C , hellgrüne Tafeln, s , p -Bromdimethylanilin A_2, B, C , grüne kub. Prismen, s , p -Nitrosodimethylanilin A_2, B, C , rot, amorph, s , Pyridin $A_3, B, \frac{1}{2}C$, grüne Nadeln, s , ss , Chinolin $A_3, B, \frac{1}{2}C$, braun, amorph, s , ss , i -Chinolin $A_3, B, \frac{1}{2}C$, gelb, amorph, s , p -Naphthylamin $A_3, B, 2C$, grauweiße Tafeln, Piperazin A_3, B, C , grüne Tafeln, s , Benzylamin $A_3, B, \frac{1}{2}C$, silberige Tafeln, s , Trimethylentetramin $A_3, B, 1\frac{1}{2}C$, grün, amorph, s , o -Anisidin $A_4, B, 2C$, grüne Nadeln, s , p -Xylidin $A_3, B, 3C$, grüne Tafeln, s , ss , Dimethylaminoazobenzol $A_2, B, 2C$, gelbe Tafeln. Die verschiedene Löslichkeit der Hydroferrieyanide in A. gestattet die Trennung von o - u. p -Toluidin u. von Chinolin u. i -Chinolin. Die Salze des Pyridins u. β -Naphthylamins sind l. im Überschuß der alkoh. Säure, letzteres zersetzt beim Erhitzen ein gelbes Sublimat vom F. 284^0 . — Aus einer gesätt. Lsg. von Hydrazobenzol wurde erhalten $(C_6H_5 \cdot NH_2 : N \cdot C_6H_5)_2 \cdot \frac{1}{2}H_3Fe(CN)_6 \cdot 4C_2H_6O$, weiße Nadeln mit bläulichem Schimmer, l. im Überschuß der Säure, unl. in sd. W., sd. in bl. A., k. HCl, l. in h. HCl unter Benzidinumlagerung. Das Salz mit o -Hydrazobenzol scheidet sich nur auf Zusatz von etwas Ä. in der Zus. $(CH_3 \cdot C_6H_4 \cdot NH_2 : N \cdot C_6H_5)_2 \cdot \frac{1}{2}H_3Fe(CN)_6 \cdot C_2H_6O$ ab. Eigenschaften dem vorigen ähnlich. (Journ. Chem. Soc. London 125. 2541—42. 1924. Glasgow, Royal Technical Coll.) HERTER.

Kurt Hess und Reinhold Grau, Neue Umwandlungen von Conhydrin und Methyl- i -pelletierin. (V. Mitteilung zur Frage des asymmetrischen dreiwertigen Stickstoffs.) (IV. vgl. Ber. Dtsch. Chem. Ges. 53. 139; C. 1920. I. 503.) Frühere Arbeiten hatten ergeben, daß Methyl- i -pelletierin (I) u. Methylconhydrinon (II) die gleiche Struktur besitzen, u. daß die Verschiedenheit beider Basen nur durch die Anahme eines as. tertiären N-Atoms erklärt werden kann. Die ablehnende Stellungnahme MEISENHEIMERS (vgl. MEISENHEIMER, ANGERMANN, FINN u. VIEWEG, Ber. Dtsch. Chem. Ges. 57. 1744; C. 1924. II. 2402) zur Frage des as. dreiwertigen Stickstoffs veranlaßte Vff., neues Material für ihre Ansicht zu sammeln. — Die Racemisierung von Conhydrins durch Wärme, Alkali oder Säure gelingt nicht. Man muß mindestens ein as. C-Atom vorübergehend zum Verschwinden bringen, am besten durch partielle Dehydrierung des Pyridinkerns mittels Pt oder Pd u. nachfolgende Reduktion mit Na u. A. Das so gewonnene opt. inakt. Conhydrin ist ident. mit der β -Form des Conhydrins. 1-(α -Piperidylpropan)-1-ol (III). Durch vollständige Dehydrierung des Conhydrins mittels Pd wurden 1-(α -Pyridylpropan)-1-on (IV) u. 1-(α -Pyridylpropan)-1-ol (V) dargestellt. In einer Anmerkung widerlegen Vff. die Einwände WOLFFENBUTTERS (Die Pflanzenalkaloide, 3. Auflage) gegen die Strukturidentität von I u. II und besonders unter Hinweis darauf, daß die β -Form des 1-(α -Piperidyl)-propan-1-ol (III) ebenso wie Conhydrin, aber im Gegensatz zu 1-(α -Piperidyl)-propan-1-on (VI) von Na u. A. nicht reduziert wird. Die Red. von VI durch dieses Agens zu Conhydrin erfolgt also offenbar nicht über den Alkohol. — i -Pelletierin u. Dihydro- i -pelletierin liegen bei der Dehydrierung mit Pd α -Propylpyridin (Congrin) u. α -Picolin, mit Pt in geringer Ausbeute 1-(α -Piperidylpropan)-1-on (IV). Da IV bereits in Methylconhydrinon umgewandelt worden ist, so ist die Isomerisierung von Methyl- i -pelletierin zu Methylconhydrin durch eine Reihe eindeutiger Rkk. durchführbar. Da die Isomerie dieser beiden Basenreihen verschwindet, wenn das O aus der Seitenkette entfernt wird, nahmen Vff. eine Valenzbeziehung zwischen der N-Gruppe u. der O-Gruppe der Seitenkette an. Für eine stärkere Beeinflussung dieser beiden Gruppen untereinander bei den Abkömmlingen des Conhydrins sprechen folgende Beobachtungen: 1. Die Exaltationen der Molrefraktionen des Conhydrinons ($E_d = +0,65$, $E_M = +0,69$, $E_M = +0,74$) sind größer als beim i -Pelletierin ($+0,46$ bzw. $+0,47$, bzw. $0,53$). Derselbe Unterschied besteht auch bei dem Paar Methylconhydrinon-Methyl- i -pelletierin. — 2. Methylconhydrinon reagiert schwer oder gar nicht mit Semicarbazid, Hydroxylamin, Hydrazin; Methyl- i -pelletierin dagegen

leicht u. quantitativ. — 3. Die CO-Gruppe vom *Conhydrinon* läßt sich mit



Amalgam nicht reduzieren, wohl aber die des *i-pelletierins*. — 4. Der verschiedene Verlauf der Hydrierung. — Also auch die neuen Ergebnisse stehen durchaus im Einklang mit der eingangs angeführten Auffassung. Die Annahme verschiedener Atomlagen im Piperidinring vermag dagegen diese Isomere nicht zu erklären.



Versuche. α -(-)-*Methylconhydrin*, aus *Conhydrin* mit CH_2O u. HCOOH gestellt, zeigt folgende opt. Konstanten. $n_D = 1,46809$, $n_D = 1,47076$, $n_B = 1,48$, $n_\gamma = 1,48297$, $M_\alpha = 46,48$, $M_D = 46,71$, $M_B = 47,64$, $M_\gamma = 47,73$, $E M_\alpha = -$, $E M_D = -0,31$, $E M_B = +0,04$, $E M_\gamma = -0,33$. Das Präparat enthielt noch geringe Mengen *Conhydrin*, die durch fraktionierte Dest. nicht abgetrennt werden konnten, u. erst bei der Oxydation, wobei sie nicht angegriffen werden, in Erscheinung treten. Die Oxydation des *Methylconhydrins* mit CrO_3 u. Eg. verläuft nicht eindeutig. Man erhält entweder *Methylconhydrinon* oder *Conhydrinon* als Gemische beider Basen, ohne daß sich der Rk.-Verlauf in irgendeiner Weise regeln läßt. Zur Beurteilung der Zus. des Reaktionsprod. dient am besten die Drehung, Analysenzahlen u. Kpp. sind nicht zuverlässig. Um in jedem Fall zum reinen *Conhydrinon* zu gelangen, muß das Oxydationsprod. mit Azodicarbonyldiäthylester behandelt werden. — *d-Methylconhydrinon*, Kp.₁₂ 85–87°, D.₄²⁰ 0,94, $n_D = 1,45868$, $n_D = 1,46105$, $n_B = 1,47243$, $n_\gamma = 1,47343$, $M_\alpha = 43$, $M_D = 45,57$, $M_B = 46,53$, $M_\gamma = 46,62$, $E M_\alpha = +0,09$, $E M_D = +$, $E M_B = +0,45$, $E M_\gamma = +0,08$. Pikrat F. 86–87°. Bromhydrat, aus Aceton F. 152–153°. Oxim, Kp.₁₀ 135° (Bad 150–155°). Pikrat des Oxims, aus A. F. 107–108°. Jodmethylat, F. 112°. Ein längere Zeit aufbewahrtes Präparat desselben zeigt den F. 212°, möglicherweise infolge Umwandlung in das Jodmethylat des *Methylpyrrolidylbutan-2-ons*. Bei der Einw. von *Hydrazinhydrat* in sd. CH_3OH aus *d-Methylconhydrinon* entsteht neben dem *Hydrazon* desselben vom Kp.₁₂ 126–127° das *d-Methylconhydrin*. — α -(-)-*Conhydrinon*, Kp.₁₀ 85–87°, D.₄²⁰ 0,9380, $n_D = 1,46215$, $n_B = 1,47312$, $n_\gamma = 1,47432$, $M_\alpha = 41,03$, $M_D = 41,25$, $M_B = 40$, $M_\gamma = 42,18$. $[\alpha]_D^{19} = -10,58^\circ$ (unverd.), Bromhydrat, F. 146°. Pikrat, F. 107–108° (früher 91–92°). — *d-Conhydrinon* u. *Methylconhydrinon* werden von sd. N. Alkoholatlg. bzw. wss. NaOH nicht merklich racemisiert. Gegenüber der leichten Racemisierbarkeit des *Methyl-i-pelletierins* kann auch dieser Punkt im Sinne einer stärkeren Beziehung zwischen N- u. O-Gruppe im *Methylconhydrinon* gedeutet werden. Mit Acetanhydrid in Bzl. liefert *d-Conhydrinon* bei 100° das *d-Methylconhydrinon* seiner Enolform, $\text{C}_{10}\text{H}_{17}\text{O}_2\text{N}$, vom Kp.₁₀ 96–97°, das bereits von verd. K_2CO_3 bei Zimmertemp. gespalten wird u. *d-Conhydrinon* liefert. In gleicher Weise wurde das *Acetat des d-Methylconhydrinons*, $\text{C}_{11}\text{H}_{19}\text{O}_2\text{N}$, vom Kp.₉ 96–97°, D.₄²⁰ 0,9580, erhalten, das schon durch W. verseift wird. In beiden Fällen tritt also keine Racemisierung ein. Die Enolisierung findet daher unter Beteiligung der CH_2 -Gruppe, nicht aber des α -C-Atoms des Pyridinkerns statt. Dagegen tritt beim Lagern, insbesondere des Pikrats des *d-Methylconhydrinons* Racemisierung ein. — *d,l-Conhydrinon*, Kp.₁₁ 90–92°, D.₄²⁰ 0,9380. Die Brechungsindices sind die gleichen wie beim *d-Conhydrinon*. Pikrat, $\text{C}_{14}\text{H}_{18}\text{O}_8\text{N}_4$, aus A. F. 107–108°. Bromhydrat, $\text{C}_8\text{H}_{16}\text{ONBr}$, aus Aceton Krystalle vom F. 151–152°, Jodmethylat, A. F. 118–119°. Die gleiche Base wurde durch Entmethylierung des 1-(α -N-Methylpiperidyl)-propan-1-on mit Azodicarbonyldiäthylester erhalten. — Die Dehydrierung dieser Basen wurde in einem Verbrennungsröhr mit 40–50 cm langer Katalysatorschicht in H_2 -Atm. ausgeführt. Die Basen wurden in Porzellanschiffchen in den vorderen leeren Raum des Rohres eingeführt. Die Rk. beginnt bei 190–200°

optimal bei 240—250°. Bei Anwendung von Pt haben die Reaktionsprodd. aus Conhydrin die nahezu konstante Zus. entsprechend der Formel $C_8H_{11}ON$, Kp._{12/14} 85—115°. Sie entfärben saure $KMnO_4$ -Lsg. momentan. Es liegen also nur teilweise dehydrierte Abkömmlinge des Conhydrins vor. Zur völligen Dehydrierung wird in alkoh. Lsg. unter Eiskühlung mit N_2O_3 behandelt. Die dabei anfallenden Basen lassen sich in 2 Fraktionen trennen: 1. Kp.₁₀ 86—110°; 2. Kp.₁₀ 138—156°. Die 2. Fraktion besteht aus Nitrosokörpern (Liebermannsche Rk. positiv), die bei Red. mit Zn u. 15%ig. HCl bei Zimmertemp. ein gegen saure $KMnO_4$ -Lsg. empfindliches Öl vom Kp.₁₁ 105—150° liefert. Daraus entsteht mit Na u. A. die β -Form des 1- α -Piperidyläthylalkins = β -d,l-Conhydrin. Conhydrin wird von N_2O_3 unter den gleichen Bedingungen nicht verändert. — Die 1. Fraktion liefert nach nochmaliger Behandlung mit N_2O_3 direkt das auskristallisierende Nitrat des 1-(Pyridyl)-propan-1-ols (IV) neben 1-(α -Pyridyl)-propan-1-ol (V). IV, C_8H_9ON , Kp.₁₃ 91—92°, D.₄²⁰ 1,0530, $n_D = 1,50802$, $n_D = 1,51266$, $n_\beta = 1,52529$, $n_\gamma = 1,53526$, $M_\alpha = 38,24$, $M_D = 38,53$, $M_\beta = 39,33$, $M_\gamma = 39,95$, $E M_\alpha = -0,95$, $E M_D = -0,87$, $E M_\beta = -0,96$, $E M_\gamma = -0,82$. Nitrat, $C_8H_{10}O_4N_2$, aus A. mkr. blättrige Nadeln bei F. 105—106°. Pikrat, $C_{14}H_{12}O_8N_4$, aus A. F. 125°. Diese Base ist schon in der Dehydrierungsprod. vor der Behandlung mit N_2O_3 enthalten u. konnte als Nitrat daraus abgeschieden werden. Von Hydrazinhydrat in sd. A. wird IV zu V reduziert. — V, $C_8H_{11}ON$, aus den Mutterlaugen des Nitrats von IV als Pikrat abgetrennt. Kp.₁₃ 112—113°, D.₄²⁰ 1,0501, $n_D = 1,51506$, $n_D = 1,51974$, $n_\beta = 1,53187$, $n_\gamma = 1,53962$, $M_\alpha = 39,35$, $M_D = 39,65$, $M_\beta = 40,43$, $M_\gamma = 40,91$, $E M_\alpha = -1,36$, $E M_D = -1,36$, $E M_\beta = -1,28$, $E M_\gamma = -1,38$. Pikrat, aus A. F. 94—95°. Die Red. von V durch Red. von IV mit Zn-Staub in A. gelingt erst, wenn man Hg zusetzt, dann aber quantitativ. Die durch Dehydrierung des Conhydrins erhaltene Base V ist opt. inaktiv. Es ist also auch die CHOH-Gruppe racemisiert worden. Die Dehydrierung des Conhydrins mit Pd-Asbest ist energischer als mit Pt-Asbest, führt aber zu den gleichen Prodd. — Das Methyl-i-pelletierin wurde nach früher beschriebenen Verf. aus Wurzelrindenextrakt dargestellt. Trennung der Base als Bromhydrate. Es zeigte sich, daß nicht nur der Gesamtgehalt der Alkaloide, sondern auch das Mengenverhältnis der einzelnen Basen: Pelletierin, Methyl-i-pelletierin u. Methyl-i-pelletierin großen Schwankungen unterworfen ist. — Methyl-i-pelletierin, Kp.₁₀ 91,5°, D.₄²⁰ 0,9488, $n_D = 1,46454$, $n_D = 1,46632$, $n_\beta = 1,47852$, $n_\gamma = 1,47993$, $M_\alpha = 45,18$, $M_D = 45,33$, $M_\beta = 46,34$, $M_\gamma = 46,46$, $E M_\alpha = -0,10$, $E M_D = -0,17$, $E M_\beta = +0,26$, $E M_\gamma = -0,10$, $[\alpha]_D^{18,5} = +0,22^\circ$ (in 1% Lösungsmm.), in W. wurde keine Drehung beobachtet. — Isopelletierin, Kp. 95—97°, D.₄²⁰ 0,9589, $n_D = 1,46523$, $n_D = 1,46789$, $n_\beta = 1,47902$, $n_\gamma = 1,48023$, $M_\alpha = 40,78$, $M_D = 40,98$, $M_\beta = 41,81$, $M_\gamma = 41,90$, $E M_\alpha = +0,42$, $E M_D = +0,43$, $E M_\beta = +0,77$, $E M_\gamma = +0,46$. — Dihydro-i-pelletierin, $C_8H_{17}ON$, durch Red. von i-Pelletierin mit 2½%ig. Na-Amalgam in W. bei Zimmertemp. Es tritt in 2 Racemformen auf, die indessen zur Dehydrierung nicht getrennt werden. Die Dehydrierung des i-Pelletierins bzw. des Dihydro-i-pelletierins wurde in der beim Conhydrin beschriebenen Weise ausgeführt. Die B. von Nitrosopelletierin nach Behandlung des Dehydrierungsprod. mit N_2O_3 wurde hier jedoch nicht beobachtet. — In einem Nachtrag erörtert HESS das V. der opt.-akt. Alkaloide in der Pflanze. Er hält die von G. TANRET (C. r. d. l'Acad. des sciences 170. 1118; C. 120. III. 193) aus Punica granatum isolierten opt.-akt. Basen auf Grund der bisher veröffentlichten Daten nicht für strukturident. mit den von ihm u. seinen Mitarbeitern untersuchten Verbb. (LIEBIGS Ann. 441. 101—37. Berlin-Dahlem, 1893.)

OHLE.

Kurt Hess und Rudolf Bappert, Über den Abbau des Cuskhygrins zu Undecan- und Undecanol-(6) (V. Mitteilung über Hygrinalkaloide) (IV. vgl. Ber. Dtsch.

Chem. Ges. 54. 2310; C. 1921. III. 1469.) Das Jodmethylat des Cuskygrins s. verharzt beim Hofmannschen Abbau, ohne daß es gelingt, ein definiertes Rk.-I. zu fassen. — Bei der Red. des Cuskygrins mit Na-Amalgam oder Na u. A. stehen 2 isomere Dihydrocuskygrine (α - u. β -), die beide mit CrO_3 u. Eg. Cuskygrin regenerieren, also noch das gleiche C-Skelett enthalten. Beide Dihydrocuskygrine lassen sich glatt nach HOFMANN abbauen, wobei neben gesättigten Alkoholen noch ungesättigte Verb. entstehen. Nach Hydrierung der letzteren Wiederholung des Abbaus wurden *n*-Undecan u. *n*-Undecanol-(6) erhalten. Das Ergebnis würde für die Liebermannsche Cuskygrinformel I. sprechen, im Gegensatz zu der früher von HESS u. FINK auf Grund des Abbaus mit N_2O_3 abgeleiteten Formel II., wenn nicht mit der Wanderung eines Pyrrolidinringes gerechnet werden müßte. In welchem der beiden Fälle eine derartige Umlagerung eintritt, läßt sich vorläufig noch nicht entscheiden.



Versuche. Cuskygrin, Kp.₁₄ 152°, Kp.₁₆ 156°, D.₁₆⁴ 0,9782, n_D^{18,4} = 1,455 Jodmethylat, C₁₅H₃₀ON₂J₂, F. 244°, Bromhydrat, C₁₃H₂₄ON₂·2HBr, aus A., F. 4 Nitrat, C₁₃H₂₄ON₂·2HNO₃, aus A. lange Nadeln vom F. 209° (Zers.). — Bei der Red. des Cuskygrins, am besten mit Na in sd. A. entsteht ein Gemisch von α - u. β -Dihydrocuskygrin vom Kp.₂₅ 179—183°. Trennung durch fraktionierte Kristallisation der Pikrate aus CH₃OH, wobei zuerst vorwiegend das Pikrat der β -Form auskristallisiert. Weitere Reinigung durch Verreiben mit Aceton, worin das Pikrat der α -Form II. ist. Aus den methyllalkoh. Mutterlaugen der β -Form scheidet sich beim Einengen auf $\frac{2}{3}$ Vol. fast reine α -Form ab. Die weitere Fraktionierung ist durch die B. von Mischkrystallen sehr erschwert. α - u. β -Form entstehen bei der Red. in etwa gleicher Menge. Eine 3. Substanz bildet sich dabei nicht. — α -Dihydrocuskygrin, C₁₃H₂₆ON₂, Kp.₁₄ 156—157°, Kp.₁₆ 160°, D.₁₆⁴ 0,9750, n_D¹⁶ = 1,470 M_D = 67,09 (ber. 67,24), H _{β} —H _{α} = 1,135 (ber. 1,189), H _{γ} —H _{α} = 2,190 (ber. 1,170) Pikrat, C₂₅H₃₂O₁₅N₈, aus CH₃OH Prismen vom F. 127°, ll. in Aceton. Jodmethylat, C₁₅H₃₂ON₂J₂, aus CH₃OH in krystallinen Drusen vom F. 261—262°. Na-Nachvers., C₁₃H₂₆ON₂·2HNO₃, aus A. Prismen vom F. 176—177°. Bromhydrat, C₁₃H₂₆ON₂·2HBr, aus A. F. 210°. Chlorhydrat, C₁₃H₂₆ON₂·2HCl, aus A. F. 222° (Zers.). Pikrat, Benzoylderiv., C₃₂H₃₆N₈O₁₆, aus gleichen Teilen Aceton u. CH₃OH, F. 206° — β -Dihydrocuskygrin, C₁₃H₂₆ON₂, Kp.₁₆ 160—161°, D.₁₅⁴ 0,9792, n_D^{16,5} = 1,474 H _{β} —H _{α} = 1,19 (ber. 1,19), H _{γ} —H _{α} = 1,87 (ber. 1,87). Pikrat, C₂₅H₃₂O₁₅N₈, aus A. Nadelchen vom F. 215° (Zers.) sonst durchweg wl. Jodmethylat, C₁₅H₃₂OJ₂, aus CH₃OH Krystallpulver vom F. 266°. Nitrat, C₁₃H₂₆ON₂·2HNO₃, aus A. Nadeln vom F. 209° (Zers.). Bromhydrat, C₁₃H₂₆ON₂·2HBr, aus A. Nadeln vom F. 7 Chlorhydrat, C₁₃H₂₆ON₂·2HCl, aus A. mit Ä. hygroskop. Pulver vom F. 230° (Zs.). Zum Hofmannschen Abbau wurde das Gemisch der α - u. β -Verb. benutzt, das in die Jodmethylate u. mit Ag₂O in die quartären Basen übergeführt u. dieses bei 16 mm Dest. Das getrocknete Destillat zeigte Kp.₁₇ 183—192°. Bei der Hydrierung mit kolloidalem Pt in 50%ig. Essigsäure bei Zimmertemp. nahm dieses Prod. etwa mehr H auf, als der Anlagerung an 2 Doppelbindungen entspricht. Dieser erhöhte H-Verbrauch wird dadurch erklärt, daß entweder die CHOH direkt teilweise in H-Verb. reduziert wird, oder daß aus ihr schon beim Hofmannschen Abbau W. abgespalten worden ist unter B. einer 3. Doppelbindung. Das reduzierte Prod. wurde nachher der gleichen Behandlung unterworfen, u. lieferte dann neben einem N-freien Anteil vom Kp.₁₅ 60—110° einen noch immer N-haltigen Anteil vom Kp.₁₅ 117—160°.

bei nochmaliger Wiederholung obiger Behandlung zum größten Teil N-frei wird. — *n*-Undecan, $C_{11}H_{24}$, Kp_{12} 73°, Kp_{16} 79°, Kp_{750} 194° (korr.), $D_{16.3}^{16.3}$ 0,7455, $n_D^{16.3} = 1,41842$, $M_D = 53,014$ (ber. 52,996), $H_\beta - H_\alpha = 0,814$ (ber. 0,821), $H_\gamma - H_\alpha = 1,314$ (ber. 1,314). — *n*-Undecanol, $C_{11}H_{24}O$, F. 16°, Kp_{12} 111°, Kp_{16} 117°, $D_{20.4}^{20.4}$ 0,8334, $n_D^{20.4} = 1,43740$, $M_D = 54,192$ (ber. 54,519), $H_\beta - H_\alpha = 0,820$ (ber. 0,827), $H_\gamma - H_\alpha = 1,318$ (ber. 1,318). Riecht ananasähnlich. — (N-Methyl- α -pyrrolidyl)-essigester läßt sich nach CLAISEN nicht kondensieren. (LIEBIGS Ann. 441. 137—50.) OHLE.

Kurt Hess und Rudolf Bappert, *Synthesen in der Undecanreihe*. (Vgl. vorst.) *n*-Undecan wurde sowohl aus Capron, wie auch aus Methylnonylketon durch mit amalgamiertem Zn in sd. HCl (1:1) dargestellt. Kp_{16} 79°, Kp_{752} 194 bis 195°, $D_{19.8}^{19.8}$ 0,7418, $n_D^{19.8} = 1,41862$, $M_D = 53,070$ (ber. 52,996), $H_\beta - H_\alpha = 0,821$ (ber. 0,821), $H_\gamma - H_\alpha = 1,292$ (ber. 1,314). — Undecanol-(6), $C_{11}H_{24}O$, aus Capron mit Na u. A., F. 16°, Kp_{16} 117—118°, Kp_{754} 235° (korr.), $D_{21.8}^{21.8}$ 0,8272, $n_D^{21.8} = 1,4700$, $M_D = 54,55$ (ber. 54,52), $H_\beta - H_\alpha = 0,818$ (ber. 0,827), $H_\gamma - H_\alpha = 1,304$ (ber. 1,318). — Zur Synthese von ϵ -Äthylnonan gingen Vff. vom Dibutylacetessigester aus, der auf folgendem Wege bereitet wurde. Aus Acetessigester, *n*-Butylbromid u. Na in sd. A. (bis zur ganz schwach alkal. Rk. gekocht; ca. 3 Stdn.) entsteht neben Capronsäureäthylester u. Dibutylacetessigester als Hauptprod. *n*-Butylacetessigester, $C_{10}H_{18}O_3$, der jedoch nur durch wiederholte Dest. rein zu gewinnen ist Kp_{17} 114—115°. — Capronsäureäthylester, $C_8H_{16}O_2$, Kp_{16} 61—63°, $D_{19.4}^{19.4}$ 0,8733, $n_D^{19.4} = 1,40785$, $M_D = 40,734$ (ber. 40,796), $H_\beta - H_\alpha = 0,631$ (ber. 0,633), $H_\gamma - H_\alpha = 1,102$ (ber. 1,011). — Bei der Darst. von Di-(*n*-butyl)-acetessigester, $C_{14}H_{26}O_3$, müssen folgende Bedingungen genau innegehalten werden, da sonst weitgehende Säurespaltung eintritt. 10 g Butylacetessigester u. 8 g Butylbromid werden portionsweise mit 1 g Natrium 25 ccm A. versetzt. Nach jeder Zugabe wird solange gekocht bis die Fl. nur noch schwach alkal. reagiert. Dauer 4 Stdn. Aufarbeitung wie üblich. Kp_{15} 135,5°, $D_{20.4}^{20.4}$ 0,9320, $n_D^{20.4} = 1,44042$, $M_D = 68,57$ (ber. 68,51), $H_\beta - H_\alpha = 1,101$ (ber. 1,068), $H_\gamma - H_\alpha = 1,728$ (ber. 1,717). — Gibt man bei obigem Ansatz von Anfang an die gesamte Menge Na zu, so erhält man als Hauptprod. Di-(*n*-butyl)-acetessigester, $C_{12}H_{24}O_2$, Kp_{16} 104°, $D_{20.4}^{20.4}$ 0,8636, $n_D^{20.4} = 1,42223$, $M_D = 59,014$ (ber. 59,50), $H_\beta - H_\alpha = 0,900$ (ber. 0,909), $H_\gamma - H_\alpha = 1,455$ (ber. 1,464). Daneben beträchtliche Mengen Capronsäureäthylester u. Methylamylketon, Di-(*n*-butyl)-acetessigester nur in ganz untergeordneter Menge. — ϵ -Acetylnonan, $C_{11}H_{22}O$, aus Dibutylacetessigester mit sd. 10%ig. wss.-alkoh. KOH. Kp_{16} 96—97°, $D_{18.4}^{18.4}$ 0,8299, $n_D^{18.4} = 1,42795$, $M_D = 52,77$ (ber. 53,01), $H_\beta - H_\alpha = 0,822$ (ber. 0,833), $H_\gamma - H_\alpha = 1,314$ (ber. 1,334). — Di-*n*-butylelessigsäure, $C_{10}H_{20}O_2$, Kp_{16} 139—140°, $D_{18.4}^{18.4}$ 0,8978, $n_D^{18.4} = 1,43448$, $M_D = 49,95$ (ber. 49,91), $H_\beta - H_\alpha = 0,765$ (ber. 0,768), $H_\gamma - H_\alpha = 1,313$ (ber. 1,223). — ϵ -(1-Oxäthyl)-nonan = ϵ -Nonylmethylcarbinol, $C_{11}H_{24}O$, aus ϵ -Äthylnonan mit Na u. A. Kp_{16} 108—109°, $D_{17.9}^{17.9}$ 0,8392, $n_D^{18.2} = 1,44042$, $M_D = 54,15$ (ber. 54,52), $H_\beta - H_\alpha = 0,806$ (ber. 0,827), $H_\gamma - H_\alpha = 1,221$ (ber. 1,218). Riecht sehr angenehm, ähnlich wie Kaffeeöl. — ϵ -Äthylnonan, $C_{11}H_{24}$, aus ϵ -Acetylnonan durch Red. nach CLEMMENSEN. Kp_{16} 71°, $D_{19.2}^{19.2}$ 0,7513, $n_D^{19.5} = 1,42092$, $M_D = 52,75$ (ber. 52,99), $H_\beta - H_\alpha = 0,811$ (ber. 0,821), $H_\gamma - H_\alpha = 1,270$ (ber. 1,314). (LIEBIGS Ann. 441. 151—56. Berlin-Dahlem, Kaiser WILHELM-Inst. f. Chemie.) OHLE.

E. Doumer und L. Fourrier, *Die Darstellungen des Hämoglobinspektrums*. VI fanden deutliche Unterschiede zwischen ihren eigenen u. den Rolletschen Wergaben. Sie bezeichnen als „Lücken“ (lacunes) die Zwischenräume zwischen den Zonen der Lichtabsorption u. behalten für diese, wenn sie beiderseits durch Linienränder begrenzt sind, den Namen „Banden“. Als Charakteristika der verschiedenen Erscheinungen im Spektrum bezeichnen sie die Wellenlängen an ihrem Ende (a) u. das Verhältnis (b) der für das Auftreten der Banden oder das Verschwinden der Lücken nötigen Menge Farbstoff zu derjenigen, die für das Auf-


treten der charakterist. Bande II des Oxyhämoglobins erforderlich ist. Diese charakteristika sind für *Oxyhämoglobin* Bande I a 590, b 2, Bande II a 565, b 1, Lücke a 625, b 260, Lücke II a 580, b 25, Lücke III a 546, b 40; für *Hämoglobin* Stockes Bande a 580, b 10, Lücke I a 620, b 175, Lücke II a 539, b 50. Die kleine zählige Bande, die in Lücke I des Oxyhämoglobins bei λ ca. 615 auftritt, gehört Wirklichkeit nicht diesem zu, sondern dem neutralen *Methämoglobin*, dessen B. Messungen von etwas langer Dauer in glycerinhaltigen Lsgg., die Vff. benutzten, kaum zu vermeiden ist. (C. r. soc. de biologie 92. 105—7. Lille.) SPIEGEL

Hans Friedli, *Absorption der ultravioletten Strahlen durch Hämoglobinderivate. Beitrag zum Studium der chemischen Konstitution der Farbstoffe des Blutes.* (Eine Reihe von Hämoglobinderiv. sowie vom Indol u. seinen Methylverb. wurden die ultravioletten Absorptionsspektren quantitativ untersucht. Aus der Struktur der Spektren werden Rückschlüsse auf die chem. Konst. getan. — Das Spektrum des Pyrrols (Hexan als Lösungsm.), des Hauptkernes der Blutfarbstoffe, besteht aus einer Serie von 6 schmalen Banden im mittleren u. 3 breiten Banden im äußeren Ultraviolett. Die schmalen Banden sind auf die beiden Äthylenbindungen des Pyrrols zurückzuführen. Bande 1. λ 2743 Å, ϵ 4,5; 2. λ 2723,5, ϵ 4,9; 3. λ 2631, ϵ 8,0; 4. λ 2633, ϵ 7,1; 5. 2619, ϵ 8,0; 6. λ 2596, ϵ 8,2. Aus den Frequenzen ergeben sich die Differenzen $\Delta 1/\lambda$ zu 260 cm^{-1} oder einem ganzen Vielfachen davon. Die stärkste der 3 breiten Banden ist auf die Konjugation der beiden Äthylenbindungen zurückzuführen. Bande 1. λ 3333 Å, ϵ 0,45, 2. λ 2350, ϵ 0,3, 3. λ 2100, ϵ 16000. — Das Spektrum des Indols (Hexan als Lösungsm.) ist von dem des Bzl. u. Pyrrols ganz verschieden; nur im äußeren Ultraviolett besteht ein vollständiger Parallelismus mit der Kurve des Pyrrols. Die 3 schmalen Banden im mittleren Ultraviolett stammen vom Benzoerest her (Bzl. hat an dieser Stelle 8 Banden); durch die Einführung des Pyrrolrestes ist ihre Zahl vermindert; sie sind nach dem Rot zu verschoben, Bande 1. λ 2825 Å, ϵ 3200; 2. λ 2712, ϵ 5000; 3. λ 2631, ϵ 5300. Außerdem: λ 2869, ϵ 3800; λ 2806, ϵ 4040; λ 2788, ϵ 4060; λ 2631, ϵ 4140; λ 2650, ϵ 6290; λ ca. 2170, ϵ 25200. — Die Einführung einer CH_3 -Gruppe in den Pyrrolkern des Indols bewirkt nur eine kleine Verschiebung aller Banden nach dem Rot zu u. die Verminderung der Zahl der schmalen Banden im mittleren Ultraviolett. Beim α -Deriv. Verschiebung aller Banden um 15 Å, beim β -Deriv. um 25 Å; beim α -Deriv. Verschmelzen der 3 schmalen Banden zu 2, beim β -Deriv. zu 1 Bande. — α -Methylindol (Lösungsm. Hexan), Bande 1. λ 2881 Å, ϵ 4000; 2. λ 2813, ϵ 4060; 3. λ 2775, ϵ 4170; 4. λ ca. 2666, ϵ 6460. — β -Methylindol (Lösungsm. Hexan), Bande 1. λ 2905 Å; 2. λ 2836; 3. λ 2750; 4. λ 2200. — Die aus Indol-Pyrrolkernen bestehenden Hämoglobinderiv. zeigen im ganzen Ultraviolett eine starke Absorption, die den vier Pyrrolkernen zuzuschreiben ist. Durch Cl u. Br wird das Spektrum des Hämins nur wenig verändert. Die beiden Hämine (α u. β), die sich chem. nicht unterscheiden, zeigen in ihren Spektren markante Unterschiede. Das β -Bromhämin hat eine 2—3 mal schwächere Absorption als das α -Bromhämin. — α -Chlorhämin (Lösungsm. 25 Teile W. + 75 Teile A.), λ 4005 Å, ϵ 90000; λ 3947, ϵ 44000; λ 2780, ϵ 12000. — α -Bromhämin (Lösungsm. W. + A.), λ 3947 Å, ϵ 96000; λ 4255, ϵ 20000; λ 3225, ϵ 27000; λ 2700, ϵ 12000. — β -Bromhämin (Lösungsm. W. + A.), λ 4000 Å, ϵ 35000; λ 4348, ϵ 12000; λ 3343, ϵ 17000; λ 2778, ϵ 12000. — α -Hämatin (in alkal. Lsg.), λ 3921 Å, ϵ 90000; λ 4167, ϵ 32000; λ 3571, ϵ 46000; λ 2830, ϵ 11500; (in alkoh. HCl), λ 4000, ϵ 130000; λ 3614, ϵ 40000; λ 3077, ϵ 10000. — Das Mesoporphyrin hat eine viel schwächere Absorption als das Hämatoporphyrin; ersteres enthält demnach wahrscheinlich weniger ungesätt. Bindungen. — Dimethyläther des Hämatoporphyrins (Lösungsm. absol. A.), λ 3936 Å, ϵ 105000; λ 4000, ϵ 10000; λ 2564, ϵ 3200; λ 2100, ϵ 6600. — Mesoporphyrinchlorhydrat (Lösungsm. absol. A.), λ 4000 Å, ϵ 48000; λ 2630, ϵ 2500; λ 2100, ϵ 5000. Durch den Aurtit



Fe aus dem Hämatinmol. verschwindet also eine Bande, die sich bei dem Fe-agen Derivv. in der Gegend zwischen 3226 u. 3615 Å bewegte; gleichzeitig wird dieorption im extremen Ultraviolett geringer (ϵ sinkt von 12000 auf 2500). — Beim der *Hämatinsäure* (Lösungsm. Ä.) ist im mittleren Ultraviolett nur eine breite ale, die der COOH-Gruppe zuzuschreiben ist; im extremen Ultraviolett ist eine el starke Bande, hier läuft die Kurve mit der des Pyrrols parallel. λ 2780 Å, 6); λ 2532, ϵ 420; λ 2273, ϵ 24000. — Das *Anhydrid der Hämatinsäure* (Lösungs- id Å.) besitzt eine breite Bande im mittleren Ultraviolett, 280 Å weiter nach el Ultraviolett als die entsprechende Bande des Imids; im extremen Ultraviolett el starke Absorption, ganz anders als beim Imid. λ 2500 Å, ϵ 3500; λ 2941, 1); λ 2273, ϵ 2100; λ 2120, ϵ 10500. (Bull. Soc. Chim. Biol. 6. 908—34. 1924. üth, Univ.)

ZANDER.




William Küster, *Über Porphyrine*. 8. Mitt. *Über die Porphyrinbildung aus in.* Nach Verss. von **R. Huttenlocher**. (7. vgl. KÜSTER u. OESTERLIN, Ztschr. iysiol. Ch. 136. 235; C. 1924. II. 2485.) Die unter der Einw. von Alkalien rtigende Umwandlung des Nitroprussidnatriums in ein Ferrosalz:



ilt ein Analogon zu der *Umwandlung des Hämins in Hämochromogen* unter der iv. von Pyridin, $\text{H}_2\text{N}\cdot\text{NH}_2$, $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_4$, u. TAKAYAMAS Reagens. Auch das Hämin i bei der Umwandlung aus einem inneren komplexen Salz (I) in ein ionisiertes a (II), welches das Fe im Anion enthält, verwandelt. Die spezielle Wrkg. des ydins (Py) besteht darin, daß das Cl durch dessen Zwischenlagerung von Fe ab- eunt wird (III). Der positive Rest eines als Pyridiniumhydroxyd wirkenden ol. gesellt sich zum Kation, während dessen OH zum Anion tritt, eine labile wchenstufe erzeugend (IV), bei welcher sich der H des eingetretenen Hydroxyls indem am Py haftenden Cl ablöst, wobei zweiwertiges Fe entsteht (V). Unter ie Einfluß von Py findet also Red. am Fe u. Oxydation am organ. Teil des t statt, eine Vorstellung, die sich aufrecht erhalten läßt, wenn man mit dem Vf. e Hämin einen ungesätt. Charakter zuschreibt, der in den Formeln I—V an eir die Pyrrolkerne verbindenden Methingruppe zum Ausdruck gebracht wird. eder Red. des *Monomethyl(chlor)hämins* durch Pd + H oder durch Zn + Eg. vechwindet die ungesätt. Natur u. damit auch die komplexe Bindung des Fe unter B. iner ungefärbten Verb. (VI), die sich durch Oxydation nachträglich wieder in ein gefärbte (VII) verwandeln läßt. Danach erfolgt die Umlagerung von Hämin in *lesoporphyrin* unter Anlagerung von H nach der Gleichung:



während umgekehrt die Umwandlung des Mesoporphyrins in Hämin unter H-Strömung vor sich gehen müßte.



Monomethyl(chlor)hämin. Je

Hämin werden in 20 ccm Chlf. u. 6 ccm Eg. gel., in 100 ccm sd. CH_3OI 10 ccm 40%ig. HCl eingetragen u. in der Kälte sich abscheidenden stalle abgesaugt. Ausbeute 7,5 g 5 Verss. Feine Spindeln aus h. l. in Chlf., Aceton, Essigester, Bzl., in angesäuertem A. u. in 5%ig. Sodalsg. Beim Erhitzen mit Zn in Eg.-Lsg. H_2 -Strom wird die Lsg. schwach rotgrün u. färbt sich bei Luftzutritt wieder rot. Aus der filtrierten u. mit W. verd. Lsg. läßt sich der rote Farbstoff mit extrahieren. Die Chlf.-Lsg. hinterläßt ein rotbraunes Harz, l. in Eg., unl. in u. verd. Säuren, l. in 50%ig. H_2SO_4 . Die Substanz gibt das Porphyrinspektrum enthält 8,69% Fe. Sie ist nahezu Cl-frei. Nach Oxydation des reduzierten Me hämins mit CrO_3 konnte *Hämatinsäure*, jedoch kein Methyläthylmaleinimid n. gewiesen werden. Die katalyt. Red. des Methylhämins erfolgt in Eg.-Lsg. mit das auf BaSO_4 niedergeschlagen war. Der Eg. wurde im H-Strom abdest. Rückstand in Chlf.- u. dann in methylalkoh. Lsg. übergeführt. In letzterem u. unverändertes Methylhämin ungel. Die methylalkoh. Lsg. wurde mit W. v. wobei sich ein roter amorpher Nd. abschied, l. in Chlf., CH_3OH u. Eg., un PAe. u. Soda. Fe-Gehalt = 8,26%. Porphyrinspektrum. (Ztschr. f. physiol. 141. 282—90. 1924.)

GUGGENHEIM

William Küster, Über ein Additionsprodukt von Chlor an ein Monomethyl(chlor)hämin. Nach Verss. von **R. Huttenlocher**. (Vgl. vorst. Ref.) Bei Anlagerung von Cl an Monomethyl(chlor)hämin (vgl. KÜSTER u. OESTERLIN, Ztschr. f. physiol. Ch. 136. 235; C. 1924. II. 2485) treten 5 Cl-Atome ein unter B. ein Pentachlormonomethyl(chlor)hämins. Da die Vinylgruppen nur 4 Cl aufzunehmen vermögen, liegt darin ein Beweis für die ungesätt. Natur des Häminmoleküls. Bei Kochen mit CH_3OH tritt ein Cl aus, ohne durch eine andere Gruppe ersetzt werden, ebenso mit $\text{HBr} + \text{Eg}$, wobei wieder ein krystallisiertes Hämin entsteht. Durch CH_3OH werden 2 weitere Cl-Atome ersetzt, eines durch CH_3O , das andere wahrscheinlich durch OH. Bei Ggw. von NaHCO_3 in äth. Lsg. verliert das Pentachlormonomethyl(chlor)hämin Cl unter B. eines Prod. mit 3—4 Cl-Atomen. Mit Soda werden 2 Cl-Atome abgegeben. Läßt man auf das durch $\text{HBr} + \text{Eg}$ erhaltene Cl-Atoms beraubte Pentachlormethylchlorhämin nach Entfernung des Lösungsmittels mit NaOH einwirken, so werden 2 weitere Atome Cl durch OH ersetzt unter gleichzeitiger B. eines l. K-Salzes. Beim Ansäuern von dessen alkal. methylalkohol. Lsg. scheidet sich eine krystallisierte Verb. von der Zus. eines Trichlormonooxyhydroxyhämins $\text{C}_{35}\text{H}_{33}\text{O}_6\text{N}_4\text{FeCl}_3$ ab. — Pentachlormonomethylchlorhämin $\text{C}_{35}\text{H}_{33}\text{O}_4\text{N}_4\text{FeCl}_5$ B. durch Einw. von Cl auf das in Chlf. gel. Monomethylhämin. Bei Zugabe von PAe. erfolgt Abscheidung des Farbstoffs. Krystallisiert aus Eg., l. in CH_3OI u. Aceton. — Trichloroxyhydroxyhämin $\text{C}_{35}\text{H}_{35}\text{O}_6\text{N}_4\text{FeCl}_3$, tetraedr. Krystalle, l. in Chlf.

CH, Aceton u. Eg, unl. in Soda. (Ztschr. f. physiol. Ch. **141**. 291—96. 1924. GUGGENHEIM.)
 (gart, Techn. Hochsch.)

William Küster und **Richard Haas**, *Über die Aufarbeitung von Rinder-
 steinen*. 16. Mitt. *Über Gallenfarbstoffe*. (15. vgl. S. 850.) Die früher (Ztschr.
 f. physiol. Ch. **121**. 80; C. **1922**. III. 1050) erwähnte Extraktion des *Bilirubins*,
 aus O_6N_4 , mit $\text{CH}_3\text{OH} + \text{NH}_3$ wird am zweckmäßigsten folgendermaßen aus-
 geführt: Man leitet NH_3 durch eine 3fach tubulierte Waschflasche mit absol. CH_3OH
 in einen Natronkalktrockenturm in den mit CH_3OH beschickten Extraktionskolben.
 Die Hülse mit dem zu extrahierenden Gallensteinpulver findet sich in einer Ex-
 traktionsröhre, welche durch eine zweite Bohrung des den Extraktionskolben ab-
 schließenden Stopfens eingeführt wird. Auf das Extraktionsrohr ist ein Rückfluß-
 apparat gesetzt, der mit einem Ableitungsrohr das überschüssige NH_3 durch eine
 Natronkalkröhre in ein Absorptionsgefäß mit W. leitet. Vor der Extraktion wird
 der App. mit NH_3 gefüllt, was eine Oxydation des Bilirubins ausschließt. Aus dem
 Extrakt, einen nicht grünlichigen Extrakt krystallisiert nach beendeter Extraktion bei
 -10° Stdn. im Kältegemisch das Bilirubin- NH_3 aus. Man filtriert u. wäscht
 mit CH_3OH . Aus den mit Ä. versetzten Mutterlaugen gewinnt man krystallines
 Bilirubin durch Abdest. des Ä. Das Bilirubin- NH_3 verwandelt sich in Bilirubin
 bei Übergießen mit sd. CH_3OH . (Ztschr. f. physiol. Ch. **141**. 279—81. 1924.
 GUGGENHEIM.)
 (gart, Techn. Hochsch.)

E. Biochemie.

E₁. Enzymchemie.

L. Ambard, *Wirkungsgesetze der Fermente*. (Vgl. Bull. Soc. Chim. Biol. **5**. 693;
 C. **1924**. II. 478.) Fermente ohne Cofermente, die auch eine gewisse Spezifität
 haben, sind unwirksam. Die Geschwindigkeit der Fermentwrkg. hängt von der
 Menge des am Substrat fixierten Enzyms ab, der Grad dieser Bindung von der
 Menge des Coferments. Sind Substrat- u. Cofermentmenge konstant, so ist die Ge-
 schwindigkeit der Wrkg. der Fermentmenge proportional, wodurch aber nichts
 über das Verhältnis der jedesmal wirksamen Fermentwrkgg. ausgesagt wird. (Presse
 nat. **32**. 657—58; Ber. ges. Physiol. **29**. 134. 1924. Ref. JACOBY.) SPIEGEL.

Adolf Joszt, *Über die Amylokoagulase*. I. In unreifen Samen von Weizen,
 Roggen u. Erbsen, in reifen von den beiden ersten sowie von Gerste u. Hafer,
 aber in Merckscher „Diastase absol.“ wurde die Amylokoagulase von FERNBACH
 u. WOLFF gefunden, in unreifen Weizensamen viel reichlicher als in reifen, in
 Roggenmehl nicht. Sie wird bei 63° in 6 Min. vernichtet. Die Menge des Nd. ist
 proportional der Stärkekonz., umgekehrt proportional der Temp., bei der die Stärke-
 extrakt bereitet wurden. Auf genau nach Angabe von FERNBACH u. WOLFF präpa-
 rierte Stärke wirkt das Enzym nicht. (Roczniki Nauk Rolniczych **10**. 617—49. 1923;
 Ber. ges. Physiol. **29**. 66. 1924. Ref. KOPEĆ.) SPIEGEL.

Adolf Joszt, *Über die Amylokoagulase*. II. *Das Verhältnis der Amylokoagulase
 zu stärkeverzuckernden Enzymen*. (I. vgl. vorst. Ref.) Das stärkeverzuckernde Vermögen
 der Gerstenauszüge steigt mit der Extraktionsdauer, ferner, wenn zum Ausziehen
 der Extrakt aus Merckschem Papain verwendet wird. Schnelles Erwärmen auf
 61-67° oder längeres (33 Stdn. bis 44 Tage) Erwärmen bis 54° vermindert das Ver-
 zuckerungsvermögen der Auszüge; dabei steigt die Menge der ausgefallenen Stärke
 zunächst bis zu einem Maximum, um dann bis 0 zu sinken. Das ausfallende Enzym
 ist von dem verzuckernden streng zu unterscheiden. (Roczniki Nauk Rolniczych
11 468—80. Dublany, Inst. f. landwirtschaftl. Technol.: Ber. ges. Physiol. **29**. 66.
 1924. Ref. KOPEĆ.) SPIEGEL.

Alessandro Bernardi, *Über eine Amylase und eine Invertase, die sich im Kropf der Hühner finden.* (Vgl. BERNARDI u. ROSSI, Biochim. e terap. sperim. **10**. 290; C. 1. I. 1944.) Die Fermente wurden im Glycerinauszug des Kropfes nachgewiesen. Invertasewrkg. kommt in neutraler Lsg. bald zum Stillstand, sie ist um so schwächer je stärker die Saccharoselsg. ist, auch in hoher Fermentkonz. geschwächt. Daß steigert sich die Wrkg. der Amylase mit ihrer Konz. Alkal. Lsg. hebt die Fermentwrkg. schnell auf, auch in HCl-Lsg. ist sie schwach oder gar nicht vorhanden. (Biochim. e terap. sperim. **11**. 227—33. Bologna, Univ.; Ber. ges. Physiol. **28**. 465. 1924. Ref. SCHMITZ.)

SPIEGEL

Shin Sawamura, *Die Wirkung von Takadiastase auf das Verdauungsvermögen des gesunden Tieres.* An Fütterungsverss. gesunder Merinoschafe wird gezeigt, kleine Mengen von eingegebener Takadiastase ohne Einfluß auf die Verdauung. Erst bei einer Gabe von $\frac{40}{1000}$ des Lebendgewichtes wird die Stärke- u. Eiweißverdauung ein wenig beschleunigt. (Journ. Coll. Agric. Tokyo **5**. 271—91. 1924. Tokyo, Agricultural College.)

HESS

A. V. Marx, *Über die Lactase im Darm des Erwachsenen.* Bei genügend langer Digestion der Proben (20 Std.) bei schwach alkal. Rk. konnte in allen untersuchten Stühlen, von Säuglingen u. von Erwachsenen, Lactase nach der Methode von ORBAN (Prager med. Wchschr. 1899) nachgewiesen werden. (Arch. f. Verdauungskrankh. **33**. 77—86. Frankfurt a. M., Univ.; Ber. ges. Physiol. **29**. 136. 1924. Ref. BEHRENDT.)

SPIEGEL

Kuhei Okubo, *Beiträge zur Kenntnis der Serumprotease.* IV.—VI. Mitteilung. IV. *Einfluß der Verdünnungsflüssigkeiten und Substratmengen auf die proteolytische Wirkung des Serums.* (Vgl. S. 97.) Verd. mit dest. W. begünstigt die Proteolyse etwas, solche mit NaCl-Lsg. beeinträchtigt erheblich die Proteolyse des unbehandelten Serums, an dessen Antienzymat. Kraft dieser Einfluß angreift. Mit steigender Menge Substrat wächst die Wrkg. der Serumprotease. — V. *Über die Wahl der Antiseptica für Proteolyse durch behandeltes und unbehandeltes Serum.* Verwendung von genuinem Serum muß man als Antisepticum Chlf. oder besser dieses mit Toluol zusammen benutzen. Bei mit einem Aktivator wie Aceton behandeltem Serum ist dagegen Chlf. eher schädlich u. Toluol allein, im ersten Falle fast unwirksam, anzuwenden. Bei Schwankungen der Bruttemp. haben verschiedene Antiseptica verschiedenen Einfluß auf die Serumproteolyse. — VI. *Optimale Reaktion und Temperatur der Serumproteasewirkung.* Serumproteasen von Menschen u. verschiedenen Tieren wirken am besten in neutraler oder besser noch in gegen Laktamus schwach alkal. Lsg. Gegen Säure ist sie sehr empfindlich, gegen alkal. wenn nicht zu stark, resistent. (Tôhoku Journ. of exp. med. **5**. 71—87. 89—103—110; Ber. ges. Physiol. **28**. 467—68. 1924. Ref. JACOBY.)

SPIEGEL

Werner Gottstein, *Zur Kenntnis der Frauenmilchlipase.* Das Ferment greift das Fett der Milch erst nach längerer Zeit an, wird durch Schütteln aktiviert, geht die Molke über, ist resistent gegen Gifte, wie Chinin u. Atoxyl. Magensaft zerstört es. (Jahrb. f. Kinderheilk. **106**. 97—108. Berlin, Univ.; Ber. ges. Physiol. **28**. 465. 1924. Ref. GOTTSTEIN.)

SPIEGEL

E₂. Pflanzenchemie.

Yuzuru Okuda und Toku Eto, *Über die Form des Jods in Meeresalgen.* In allen von Vff. untersuchten Algen wurde in Übereinstimmung mit ESCHLE (Ztschr. f. physiol. Ch. **23**. 30; C. **97**. I. 866) die Hauptmenge des J in organ. Bindung gefunden, kein Jodat oder Perjodat, aber kleine Mengen oder auch nur Spuren von Jodid. Die hauptsächlichliche organ. J-Verb. ist I. in W., konz. A., verd. Alkali- oder Säuren, verschieden von Eiweiß. Diese Verb. enthält beispielsweise *Ecklonia bicyclis* 90% des Gesamt-J. Die Alge enthält kein sie spaltendes Enzym.

wird die Verb. durch gewisse Mikroorganismen allmählich gespalten. Die Vergung wird ferner bewirkt durch verd. Lsgg. von NaCl , CaCl_2 , HCl , auch etwas Chlf . Im Gegensatz zu verd. Lsgg. zers. konz. Lsgg. von H_2SO_4 u. NaOH organ. Verb. vollständig. Erhitzen der Alge mit Formalin ändert die Form des u. vermindert seine Menge. Die organ. Verb. wird durch naszierenden H nicht u. durch Phosphorwolframsäure nicht gefällt. — Alte Algen enthalten mehr a. junge, im offenen Meer mehr als in Binnenseen. Aus toten Algen diffundiert e. Hauptmenge in W . (Journ. Coll. Agric. Tokyo 5. 341—53. 1916.) SPIEGEL.

Hidesaburo Matsui, *Chemische Untersuchungen über einige Meeresalgen, das Material von „Kanten“*. „Kanten“ ist der japan. Agar-Agar. Das Hauptmaterial ist „Tengusa“ (*Gelidium*), nebenbei werden „Yegonori“ (*Camphylaphora yagoides*) u. „Ogonori“ (*Gracilaria*) verwendet. Sie enthalten sämtlich Hexosane (u. Ketose), Pentosan u. Methylpentosan, weder Stärke, Mannit noch reduzierende Zucker (Yegonori enthält J). Asche, N, Rohfaser, Galaktan, Pentosan, Methylpentosan u. reduzierende Zucker nach Hydrolyse wurden quantitativ bestimmt. (Journ. Coll. Agric. Tokyo 5. 413—17. 1916.) SPIEGEL.

Konrad Amberger und J. Bauch, *Die Glyceride des Kakaofettes*. Es wurden Kakaofette mit folgenden mittleren Kennzahlen untersucht: F. 31,7°, VZ. 193,8, Jodzahl 38,6. — Gesamtmenge der Fettsäuren 96,52%, deren F. 51°, mittleres Mol.-Gew. 275,5, Jodzahl 39,05, Reichert-Meißlsche Zahl 0,76, Polenskesche Zahl 0,68. Trennung der gesätt. u. ungesätt. Fettsäuren ergab, daß Kakaofett rund 53% gesätt. u. 43% letzterer u. 4% Glycerin enthält. Bei der Trennung der gesätt. Fettsäuren durch A. wurde außer Stearinsäure nur noch Palmitinsäure gefunden. Die ungesätt. Säuren fast reine Ölsäure darstellen. Zus. der Gesamtfettsäuren: ca. 44% Ölsäure, 32% Stearinsäure, 24% Palmitinsäure. — Zur Unters. der Glyceride wurde das Fett wie folgt in 3 Gruppen aufgeteilt: je 100—200 g Fett in 3 l h. absol. A. gel., zuerst der bei Zimmertemp. (12—17°) (I), dann der bei Schmelztemp. (2—5°) ausgefallene (II), schließlich aus der Mutterlauge der Gruppe I wurde zuerst untersucht. F. 33—33,5°. Fraktionierte Krystallisation aus Ä., schließlich Umfällen aus Ä. + A. lieferte reines Oleopalmitostearin, F. 34,5°. — Zwischen 32 u. 37°. Nach vielfachen Krystallisationen aus Ä., schließlich aus A. wurden reines Oleodistearin, F. 43,5°, u. Oleopalmitostearin abgeschieden. In dem aber auch Glyceride vom F. über 66° vorhanden. — III. Bei Zimmertemp. gelblich, bei 5—7° zu einer salbenartigen M. erstarrend. Durch Lösen in Ä. u. Abkühlen werden wl. feste Glyceride abgetrennt, der wiedergewonnene Rest in wenig w. Aceton gel. Beim Abkühlen auf 5—7° bilden sich 2 Schichten. Die Lsgg. scheiden bei ca. 3° immer noch feste Teile aus. Durch Wiederholung festgestellt schließlich eine Lsg., die keine Krystalle mehr absetzt. Das aus ihr bleibende Glycerid ist Palmitodiolein, während die aus den Acetonlsgg. sich abcheidenden festen Glyceride wesentlich aus Oleopalmitostearin bestehen. Palmitodiolein verändert sich schon in kurzer Zeit, erkennbar an der Erniedrigung der Jodzahl u. Erhöhung der VZ. Daraus haben scheinbar frühere Bearbeiter die Gg. niedermol. Säuren im Kakaofett gefolgert. — Wurde III bei Zimmertemp. ca. 4 Tage sich selbst überlassen, so schieden sich Krystalle aus. F. erst um 67—69°; aus Ä. + A., dann Ä., F. 68,2°. Ist β -Palmito- α,α' -distearin. Die Fett lieferten jedoch nur 0,48 g. — In den in h. A. wl. Glyceriden wurde auch Tristearin, F. 72°, festgestellt. Aus 3 kg Fett wurden 0,65 g erhalten.

Zur weiteren Aufklärung wurde sodann gehärtetes (mit Pd oder Ni) Kakaofett untersucht. Es hatte noch eine Jodzahl von 5,9 (= 6,55% Ölsäure); ferner VZ 192,7, F. 60,5° (der Fettsäuren 63%), mittleres Mol.-Gew. 280, Stearinsäuregehalt der Fettsäuren 71,1%. Durch fraktionierte Krystallisation, wobei sich zur

Entfernung der wl. Anteile Chlf. als geeignet erwies, wurde — unter Berücksichtigung des Teils, der sich der Härtung entzogen hatte — folgende Zusammensetzung ermittelt: 25% *Tristearin*, 20% β -*Palmito- α , α' -distearin*, 55% α -*Palmito- α , β -distearin* (F. 63,5%). Diese Glyceride müssen in entsprechender Reihenfolge folgenden Ceriden des ursprünglichen Kakaofettes entstammen: Oleodistearin, Oleopalmitin, Palmitodiolein, da letzteres den Hauptbestandteil des Fettes bildet. Daraus ergibt sich schließlich folgende (annähernde) Zus. des Kakaofettes: 0,02% *stearin*, 0,03% β -*Palmito- α , α' -distearin*, 24,92% α -*Oleo- α' , β -distearin*, 20,29% α - *β -palmito- α' -stearin*, 54,74% α -*Palmito- α' , β -diolein*. — Die gemischten Glyceride des Kakaofettes stimmen in ihren Eigenschaften mit den synthet. dargestellten überein (vgl. AMBERGER u. BROMIG, Biochem. Ztschr. 130. 252; C. 1923. I. (Ztschr. f. Unters. Nahrsg.- u. Genußmittel 48. 371—90. 1924. München, Deutscher Forschungsanst. f. Lebensmittelchemie.)

Heinrich Lüers und **Georg Nowak**, *Das Hefe-Cymocasein*. Casein u. Vitellin sind frei von Glykokoll, Legumin enthält nur wenig davon, Cymocasein dagegen eine beträchtliche Menge. Alanin, Tyrosin, Tryptophan u. Arginin ist bei diesen Proteinen in etwa gleicher Menge vorhanden. Kleine Abweichungen zeigen Phenylalanin, Prolin, Histidin, Cystin. Charakterist. u. ausschlaggebend für die Eigenart des Cymocaseins ist sein hoher Gehalt an Glutaminsäure u. NH_3 ; das Casein kann in Säureamidform im Cymocaseinmol., gebunden an Glutaminsäure, genommen werden. Dem Casein u. Cymocasein fehlt das *i*-Leucin, letzterem noch das Valin. Dagegen ist es besonders reich an Lysin. Cymocasein gehört also zu den Phosphorproteinen. Es steht bzgl. seiner physikal.-chem. Eigenschaften wie in der Zus. dem tier. Casein näher als dem Vitellin oder dem pflanzl. Legumin. Durch seinen charakterist. Gehalt an Glutaminsäure-, Lysin-, Glykokoll u. NH_3 -N erweist es sich jedoch als ein selbständiges, für die Hefe charakterist. Protein. (Biochem. Ztschr. 154. 310—20. 1924. München, Techn. Hochschule.) W. C.

N. Wattiez, Über die Gegenwart von Methylglucosid β in den Blättern von *Scabiosa Succisa* L. (Dipsaceae). Aus den Blättern der Dipsacee *Scabiosa Succisa* L. konnte in kristallin. Zustande ein Glucosid erhalten werden, das sich als ident. mit dem bisher nur als synthet. Prod. bekannten Methylglucosid β als ident. erwies sowie ein amorphes, mit dem Scabiosin von BOURQUELOT u. BRIDEL ident. Glucosid. Nach der biochem. Prüfung scheinen die Blätter Saccharose zu enthalten. (Journ. Pharm. de Belgique 7. 81—85. Brüssel-Solbosch, Univ.) DIETZ.

N. F. Fisher und **Earl B. McKinley**, Die Anwesenheit von toxischen insulinähnlichen Substanzen in Orangen, Grapefruit und Citronen. In Saft u. in gepresster Form genannter Früchte fanden sich stets Substanzen, die den Blutzucker erhöhen, solche, die ihn erniedrigen, durch Reinigungsmethoden voneinander trennbar. Das erniedrigende Prinzip ist dem Insulin ähnlich. Bei Vorwiegen der erhöhenden Substanz trat anfängliche Erhöhung des Blutzuckergehaltes mit folgendem Abfall unter die Norm ein. (Proc. of the soc. f. exp. biol. and med. 21. 248—49. Dallas [Texas], BAYLOR Univ. coll. of med.; Ber. ges. Physiol. 29. 75. 1924. Ref. KLIN. MANN.) SPIEGEL.

Arthur Wormald, Die Bestandteile des Saftes der Weinrebe *Vitis vinifera* L. Der Saft, der aus der geschnittenen Rebe quillt, enthält in 1 l 1,56 g Trockensubstanz, wovon ca. $\frac{1}{3}$ anorgan., der Rest organ. ist. Die organ. Substanzen sind hauptsächlich Zucker (Glucose, Fructose, sehr wenig Saccharose) u. mehr noch Säuren (Oxalsäure, Weinsäure, Äpfelsäure, Bernsteinsäure u. wenig einer nicht identifizierten Säure vom F. 161—162°). An anorgan. Stoffen wurden Cl, SO_4 , NO_2 , NO_3 , SiO_3 , O_2 , Na, K, Ca, Fe, Mg, in geringer Menge auch Mn u. Al gefunden; das Fe in leicht diffundierbarer Form vorhanden. Organ. N findet sich nur in sehr kleiner Menge, vielleicht nur in Form der Enzyme. Von solchen wurden Diastase, etc.

ase u. in geringer Menge *Katalase* nachgewiesen; *Maltase*, *Invertase*, *Lipase*, *Glycerophosphatase* u. *Labferment* fehlten. Nur eine Spur fettartiger *Anz* wurde erhalten, die nur Löslichkeits- u. Färbungsproben gestattete u. da- ein Gemenge von Neutralfett u. freien Fettsäuren zu sein schien. (*Bio- eical Journ.* 18. 1187—1202. 1924. Leeds, Univ.) SPIEGEL.

3. Eder, *Neue Untersuchungen über das Chrysarobin*. Zusammen mit F. HAUSER nen Unterss. des Chrysarobins unternommen u. in 3 Chrysarobinmustern wurden einzelnen Bestandteile festgestellt. Die autoxydablen Substanzen, auf denen Vrkg. des Chrysarobins bei Hautkrankheiten allein beruht, sind bisher immer anthranole aufgefaßt worden; die neuen Unterss. ergaben, daß es sich um throne handelt. Red.-Prodd. des Emodins konnten im Chrysarobin nicht ge- n werden. Der *Dihydroemodinantranolmonomethyläther*, dessen Anwesenheit O. HESSE bezweifelt wurde, konnte durch PAe.-Extraktion direkt isoliert ren. In 2 Chysarobinmustern wurde auch das von TUTIN u. CLEWER zuerst sriebene *Ararobinol* aufgefunden. Beide Körper sind ähnlich nahe verwandt elie Anthrone der Chrysophansäure u. des Emodinmonomethyläthers; es sind alschließlich Dihydrodianthranderivate. (Schweiz. Apoth.-Ztg. Sonderbeilage enber 1924. 14—15. Zürich.) DIETZE.

E₃. Pflanzenphysiologie. Bakteriologie.

Hilbert J. Fowler und Talwar Dinanath, *Die Biogenesis des Mahuöls*. g Journ. of the Indian Inst. of Science 6. 131; C. 1923. III. 1579.) Früchte n *Bassia longifolia* wurden von Woche zu Woche entnommen u. mikrochem. iechem. u. enzymat. untersucht. Die Ergebnisse sprechen im allgemeinen für e anschauungen von RACHENBERG (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 14. 2216) u. IWANOW, afn Kohlenhydraten zunächst freie Fettsäuren entstehen, die dann zu Glyceriden ertert werden, u. daß von jenen zuerst die gesätt. gebildet werden, dann viel- die hochungesätt. Linolensäure, die weiterhin zu Ölsäure, vielleicht auch ier etwas Stearinsäure zurückreduziert wird. (Journ. of the Indian Inst. of ience 7. 273—84. 3 Tafeln: Bangalore.) SPIEGEL.

D. R. Nanji und W. S. Shaw, *Die Rolle der Kieselerde im Pflanzenwachstum: r Assimilation und physiologische Beziehung zur Phosphorsäure*. Vf. analysiert rchiedenes Stroh auf seinen Gehalt an SiO₂ u. P₂O₅ u. bestätigt die Unterss. or LEMMERMANN u. WIESSMANN bzgl. der Ersetzbarkeit der Phosphorsäure durch oldale Kieselerde. (Journ. Soc. Chem. Ind. 44. T 1—6.) TRÉNEL.

Hideo Komuro, *Untersuchungen über die Einwirkung von Röntgenstrahlen auf ie Entwicklung von vicia faba*. Bestrahlungen von der Stärke 7—15 H ergaben bei aflocknen Samen mit 10,5% W. keine Beschleunigung der Keimung. Die Einw. r Röntgenstrahlen hängt vom Wassergehalt der Samen ab. Keimung u. Blüte ran verspätet ein bei lufttrocknen Samen mit 14% W. durch eine Dosierung von 0, bei gequollenen Samen mit 57% W. durch 10 H; eine ernsthafte Schädigung it bei letzteren durch Intensitäten höher als 20 H ein. (Journ. Coll. Agric. ol 8. 253—89. 1923.) TRÉNEL.

E. C. C. Baly und Elizabeth S. Semmens, *Die selektive photochemische Wir- un von polarisiertem Licht*. I. *Die Stärkehydrolyse*. Anläßlich von Beobachtungen ü die Beschleunigung der Samenkeimung u. Blütenbildung durch geradlinig olisiertes Licht u. über Stärkeverzuckerung im lebenden Blatt gegen Abend, wea das Himmelslicht teilweise polarisiert ist, untersuchen Vff. mikroskop. die photochem. Hydrolyse von Kartoffel- u. Maisstärke in schwacher Diastaselsg. u. vo frischer Weizenstärke bei Einw. von gewöhnl. u. polarisiertem Tageslicht u. ele. Licht. Im polarisierten Licht waren nach einigen Stdn. die Stärkekörner zu großen Teil zerfallen, während sie im gewöhnlichen Licht ziemlich, im Dunklen

ganz unverändert blieben. Auf die Hydrolyse in starken Enzymlsgg. oder du Säuren übt polarisiertes Licht keine selektive Wrkg. (Proc. Royal Soc. Lond. Serie B 97. 250—53. 1924. Liverpool, Bedford College.)

Gilbert J. Fowler und R. K. Christie, *Untersuchungen über die Sym von Samen und Bakterien*. Unterss. an verschiedenen Samenarten zeigten jede besonderen Bakterien vergesellschaftet, die entweder innerhalb des Samens (Mo oder innerhalb der Hülse (Reis) oder auf der Samenschale (Indigo) hausen, weise (Cassia tora) durch die Schleimhülle an den Samen kleben. Außer Mo samen wurden nur noch Gerstensamen im Innern bakterienhaltig gefunden. der Gärung der Indigosamen ist die Mitwrkg. der Bakterien erforderlich. Für Keimung sind sie nicht notwendig, aber sie fördern das Wachstum der Saa indem sie Eiweißstoffe in einfachere, für die Pflanzen assimilierbare Stoffe wandeln. Die Samenextrakte wirken nicht immer antisept., in kleinen Mengen so wachstumsfördernd. Ein Anhang behandelt die Durchlässigkeit verschiedener Samen für Antiseptica. (Journ. of the Indian Inst. of Science 7. 253—72. 1 Te Bangalore.)

Wolfgang Weichardt, *Aktivierung von pathogenen Mikoorganismen d abiurete Körpereextrakte*. Vf. hat gefunden, daß durch Extraktion von nach 24 Autolyse fein zerhackten Kaninchenkörpern mit A., dann nach Verdunsten die Lösungsm. mit W. gewonnene Extrakte das Wachstum von Bakterien auf gewis synthet. Nährböden steigern u. dabei besonders einzelne Fermentleistungen a vieren. Die vorliegenden Unterss. wurden hauptsächlich an Diphtheriebacillen r gestellt. Daß die betreffenden „Wuchsstoffe“ in sterilen Organen durch Autol Behandlung mit Milchsäure usw. vermehrt werden, wurde durch besondere Ves festgestellt. Die Aktivierung ist an eine optimale Verteilung der wirksamen Spt prodd. im System gebunden. Sie äußert sich u. a. darin, daß bestimmte Grup die sonst durch bestimmte Parasiten nicht verwertet werden, beispielsweise Aspara säure durch Diphtheriebacillen, bei Ggw. minimaler Mengen der Extrakte verwea werden können. Die einzelnen Fermentfunktionen der Parasiten werden elei beeinflusst. So wurde die B. von Toxin durch Diphtheriebacillen geschädigt. (Zts f. Hyg. u. Infekt.-Krankh. 104. 145—56. Erlangen, Bakteriolog. Unters.-Anst.) S

Joh. Fromm, *Züchtung und Wachstum von Schimmelpilzen und Hefen u Berücksichtigung in der Bakteriologie üblicher Nährböden*. Zur Züchtung Schimmelpilzen u. Hefen zeigten sich die in der Bakteriologie üblichen Nährbö auch dann hinreichend geeignet, wenn es auf schnelles Wachstum ankam. Traubenzuckeragar war den besonders empfohlenen Spezialnährböden stets e bürdig. Zur Züchtung von *Aspergillus* empfiehlt sich bei 37° Milhzucker-, e Zimmertemp. wieder mehr der Traubenzuckeragar. Für Züchtung dieser Pilz von *Mucor* ist höhere Temp. zu empfehlen, während *Penicillium* nur bei Zimr temp. wächst. Für Einzelheiten, besonders Farbenveränderungen u. Wachstus formen wird auf die Dissertation des Vfs. (Hannover 1924) verwiesen. (Dtsch. tr ärztl. Wechr. 33. 70—71. Hannover, Tierärztl. Hochschule.)

A. Lacassagne und A. Paulin, *Verschiedene Empfindlichkeit der aeroben i krogen gegen β -Strahlung*. Auf Agarkulturen einer Anzahl von Mikrobenarten u der infolge der Bestrahlung wachstumsfrei bleibende Raum von verschieden Umfang. Die Wrkg. scheint eine direkte, nicht durch Modifikation des Nährbod bedingte zu sein. Immerhin konnte durch sehr intensive β -Strahlen in unmittelbarer Nähe der Strahlenquelle eine gewisse proteolyt. Wrkg. auf den Agar ft gestellt werden. (C. r. soc. de biologie 92. 61—62. Paris, Inst. du radium.) S

A. Doskocil, *Die Wirkung des Rivanols auf die Streptokokken*. Rivanol 1:100000 hindert schon die Entw. des Streptococcus u. Lsg. 1:40000 tötet a üppige Kultur dieses Keimes. Bei experimenteller Streptokokkenperitonitis

hemmt das Rivanol die Entw. von Septikämie u. verhindert es den Tod, nur, wenn es innerhalb der ersten 3 Stdn. nach der Infektion intraperitoneal gegeben wird (Lokalwrkg.?), bei Phlegmone der Bauchwand wurde Heilwrkg. nur beobachtet, wenn die infizierenden Streptokokken von schwacher Virulenz waren. Streptokokkenangina im Gefolge von Scharlach beim Menschen wurden keine ähnlichen Erfolge gesehen. (C. r. soc. de biologie 92. 74—75. Paris, Inst. PASTEUR.) SPIEGEL.

L. Rosenthal, *Bakteriolytische Mikroben (Lysobakterien)*. Vf. fand, daß die Tyrothrixarten imstande sind, andere Bakterien, lebend oder durch Hitze abgetötet, in Lsg. zu bringen. Dieses Vermögen wurde bisher festgestellt gegenüber *Enterovibrio*, *Bac. typhi*, *B. coli*, *Proteus*, *Staphylokokken* u. *Diplococcus*. Das bakteriolyt. Vermögen sinkt in der Reihenfolge der Tyrothrixstämme *scaber*, *tenuis*, *minutus*, *filiformis*, *distortus*, *geniculatus*. (C. r. soc. de biologie 92. 78—79. Paris, Inst. PASTEUR.) SPIEGEL.

J. Kasarnowsky und R. Tiomkin-Schukow, *Über die antigenen Eigenschaften bakteriophagen Lysins*. Ein polyvalent auf verschiedene Bakterienunterarten wirksames Lysin, das sich je nach Art der zu den Passagen verwendeten Bakterien in seinen lyt. Eigenschaften verändern läßt, ließ sich dadurch auch in seinen antigenen Eigenschaften beeinflussen. Es zeigte sich ferner bei der Immunisierung von Mäusen, daß das Antigen in der Lysinbouillon komplex gebaut (verschiedene Virulenz bei der antilyt. u. agglutinator. Wrkg. des Antiserums) u. von dem bakteriellen Agglutinin verschieden war. (Ztschr. f. Hyg. u. Infekt.-Krankh. 104. 18—27. Inst. f. Infektionskrankh. „ROBERT KOCH“.) SPIEGEL.

N. C. Beetlestone, *Über den Wassergehalt der Hefezelle*. Man muß annehmen, daß sich der Gehalt der Hefemassee an W. aus 2 Anteilen zusammensetzt: 1. dem freien W. der Zelle selbst u. 2. dem anhaftenden W. in den Zwischenräumen zwischen den Zellen. Den Gesamtgehalt einer Hefemassee an W. kann man leicht bestimmen; bestimmt man dann noch die anhaftende Feuchtigkeit, so erhält man aus dem Unterschied beider Werte den Gehalt an W. der Hefezelle selbst. Hierzu misst Vf. die Hefemassee (50 g) mit einer gemessenen Menge (100 cem) einer Lsg. von Stärke (annähernd 10% Maltodextrin), deren D. bekannt ist, filtriert ab u. bestimmt die D. von neuem. Aus der Änderung der D. ist die Menge der mit der Hefe zugebrachten Fl. leicht zu berechnen. Die zu prüfende Hefe wird zuvor mit ihrer drei- bis vierfachen Menge von destilliertem W. einige Minuten quellen lassen, dann schnell durch einen Buchnerschen Trichter filtriert, die Hefe zwischen Fließpapier abgepreßt u. dann wie oben angegeben, weiter verarbeitet. Es zeigte sich, daß der hiernach bestimmte Wassergehalt der Hefezelle nach Verss. mit einer Anzahl verschiedener Hefeproben nur innerhalb sehr enger Grenzen, nämlich zwischen 52,7 u. 45,8%, schwankt, u. im Mittel 50,8% beträgt. (Journ. Inst. Brewing 30. 987. 1924. Wechschr. f. Brauerei 41. 267—68. 1924.) RÜHLE.

Hans v. Euler und Karl Myrbäck, *Beschleunigung der Gärtätigkeit frischer Hefe durch den Biokatalysator Z*. Der Biokatalysator Z (vgl. EULER u. SWARTZ, Ztschr. f. physiol. Ch. 140. 146; C. 1924. II. 2769) unterscheidet sich von der Cozymase dadurch, daß die Gärungsgeschwindigkeit ausgewaschener Trockenhefe durch Z, wohl aber diejenige frischer Hefe beschleunigt wird. Die Gärungsbeschleunigung macht sich geltend, ohne daß innerhalb der beobachteten Gärungszeit eine Zunahme der Zellenzahl stattfindet, wodurch sich die Substanz Z von den Wachstumsfaktoren, speziell von der Substanz D_m kennzeichnet. Doch ist es möglich, daß D_m u. Z eine gemeinsame Komponente enthalten. Die Gärungsbeschleunigung beruht nicht auf Aciditätsverschiebungen u. kann bedeutend größer sein, als die durch Zymophosphat- oder Formiatzusatz hervorgerufene. Ein annäherndes Maß für den Gehalt an Z liegt in der beschleunigten B. von Gärungs-

CO₂. Wird durch Zusatz von a g eines Z-haltigen Hefeextraktes in einer bestimmten Gär Mischung (0,05 g frischer 25%ig. Oberhefe R, 0,10 g Glukose, x Hefeextrakt, $2-x$ ccm W.) b ccm CO₂ pro Stde. entwickelt, während die Hefe Z dagegen nur b' ccm gibt, so sind in den a g $b - b'$ Z-Einheiten enthalten. Der Reinheitsgrad AZ des Präparates läßt sich bezeichnen durch $(b - b')/a$. Ist von der Heferasse u. unter sonst konstanten Bedingungen von dem Zusatz der Hefe abhängig. Die Gärungsgeschwindigkeit kann durch Zusatz von Z auf das 6fache erhöht werden. Die Vergrößerung ist anfangs der Z -Menge proportional u. erreicht bei einem bestimmten Zusatz ein Maximum, das nicht überschritten wird. Bei konstanter Z -Menge wächst die absol. Aktivierung mit der Hefemenge. Während die Co-Zymase durch 1std. Erhitzen des Extraktes zerstört wird, bleibt die Aktivität von Z nach 2std. Erhitzen unverändert. Auch in saurer Lsg. ($p_H < 1$) u. in stark alkal. Lsg. ($p_H > 12$) ist die Stabilität von Z beträchtlich. Auch langdauernde Autolyse der Hefe unter Toluol schädigt Z nicht. Als Ausgangsmaterial für Z läßt sich das Hefepreparat Marmite verwenden, welches AZ 430 beträgt, d. h. ebenso viel wie bei einem frisch bereiteten Hefeextrakt. Marmite enthält keine Co-Zymase. Durch Bleiacetatfällung bei p_H 5–6 wird aus Hefe eine Z -Lsg. gewonnen, bei der AZ 670 betrug. (Ztschr. f. physiol. 141. 297–308. 1924. Stockholm, Hochsch.) GUGGENHEIM

Kanroku Kuroki, Über die Bedeutung des Oryzanins für die Ernährungsgärungsorganismen. I. Das von SUZUKI, SHIMAMURA u. OTAKE (Biochem. Ztschr. 89; C. 1912. II. 1675) aus Reiskleie mit A. extrahierte Oryzanin, welches eine Schutzwirkung gegen beriberiähnliche Krankheiten ausübt, wirkt stark fördernd auf das Wachstum von Hefe. Hefen, welche in Kojiextrakt schlechter als in Würze wachsen, wachsen auf Zugabe von 0,01–0,1% Oryzanin in Koji ebenso kräftig in Würze. Andere wachstumsfördernde Substanzen, wie Pepton, Asparagin u. stehen in der Wrkg. weit hinter Oryzanin zurück. — Das nach SUZUKI (l. c.) gereinigte Präparat wirkt bedeutend stärker als der rohe alkoh. Auszug. — Die Gärung von Rohrzucker oder Rübenzuckermelasse wird nach Oryzaninzugabe kräftiger; der geringe N-Gehalt der Melassen muß dabei durch Zugabe von H. Salzen oder Pepton ausgeglichen werden. — Vf. glaubt, daß auch die gärungsfördernde Wrkg. von Malzkeimen, Kleie usw. auf ihrem Gehalt an Oryzanin beruht, da die Wrkg. nach Extraktion mit h. A. verschwindet. — Oryzanin übt auch auf das Wachstum von Bakterien einen deutlichen Einfluß, obgleich erst die Ernährung der Batterien nicht unbedingt notwendig ist. (Journ. Coll. Agric. Tokyo 5. 305–24. 1915.) HESS

E₅. Tierphysiologie.

P. Rona, H. Petow und E. Wittkower, Beitrag zur Ionenverteilung im Blut. III. (II. vgl. RONA, HAUROWITZ u. PETOW, Biochem. Ztschr. 149. 393; C. 1924. II. 1700.) Es wird der Einfluß des Hämoglobins auf die Diffusibilität der wichtigsten Kationen des Blutes bei verschiedener $[H^+]$ untersucht. Bei Na⁺ findet sich Übereinstimmung mit der Theorie von DONNAN. Auch bei Ca⁺⁺ stellt sich ein Donnan-Gleichgewicht ein, doch ist die Bindungsfähigkeit des Hämoglobins für Ca⁺⁺ im leicht alkal. Gebiet sehr gering. Die Verteilung des K⁺ wird in der vorhandenen Konz. vom Hämoglobin nur in stark saurer Lsg. beeinflusst. Die Verteilung von Ca⁺⁺ zwischen einer Hämoglobinlsg. u. Serum wird von den Eigenschaften beider Komponenten des Systems beeinflusst, u. zwar so, daß im Serum viel mehr Ca⁺⁺ als in der Hämoglobinlsg. Das Verteilungsverhältnis liegt zwischen $\frac{1}{2}$ u. $\frac{1}{3}$. (Biochem. Ztschr. 150. 468–75. 1924. Berlin, Charité.) WOLFE

P. György, Beitrag zum Permeabilitätsproblem. Durch Verss. in ganz ähnlicher Anordnung wie diejenigen von RONA, PETOW u. WITTKOWER (vgl. vorst. Ref.)

bereinstimmend mit ihnen zu dem Schlusse gelangt, daß Annahme einer für durchdringlichen Zellmembran nicht unbedingt für Erklärung der Tatsache erforderlich ist, daß sich in den Blutkörperchen so viel weniger Ca als im Serum findet. Die gleiche Schlußfolgerung ist für den anorgan. P zulässig. Die Ergebnisse von Verss. unter Verd. von Serum u. Blutkörperchenbrei legen den Schluß nahe, daß für das Zustandekommen des Donnanschen Gleichgewichtes, das die Ionenkonz. bestimmt, neben physikal.-chem. Verschiedenheit der Zell- u. Serumkörper auch der Trockensubstanzgehalt beider Phasen zu berücksichtigen ist. (Biochem. Ztschr. **152**. 281—83. 1924. Heidelberg, Kinderklin.) SPIEGEL.

Jesné, Hazard und Langle, *Kreatiningehalt des Blutes beim normalen und kranken Kinde*. Bei n. Kindern ist der Gehalt im wesentlichen gleich dem von Erwachsenen u. nur geringen Schwankungen unterworfen. Auch bei Krankheiten sind die Schwankungen, abgesehen von chron. azotäm. Nephritis, wo stets hohe Werte auftreten, nicht sehr erheblich u. kaum diagnost. verwertbar. Selbst bei gastroenteritis zeigte sich keine Steigerung. Die höchsten Werte, die beobachtet wurden, betrafen Kinder mit schwerer Bronchopneumonie u. stellten hier wie bei Erwachsenen ein übles prognost. Symptom dar. (C. r. soc. de biologie **92**. 1924.) SPIEGEL.

Bernhard Stuber, *Untersuchungen zur Lehre von der Blutgerinnung*. X. **Sungyong** *Über den Nachweis des sogenannten Thrombins im Oxalatplasma*. (IX. vgl. STUBER u. TANNHAUSER, Biochem. Ztsch. **149**. 374; C. **1924**. II. 1699.) In Oxalatplasma läßt sich nach Entfernung des Oxalatzusatzes wirksames Thrombin nachweisen. Damit ist die artifizielle Natur des Thrombins u. die prinzipielle Verschiedenheit seines Wirkungsmechanismus von dem des nativen Serums erwiesen. (Biochem. Ztschr. **150**. 542—47. 1924. Freiburg i. B., Med. Klin.) WOLFF.

Julius Holló, *Zur Theorie der Ca-Ionisation in der Blutflüssigkeit*. Die Formel von RONA u. TAKAHASHI (Biochem. Ztschr. **49**. 370; C. **1913**. I. 1777) gilt nur für Ca, die im stabilen Gleichgewicht mit CaCO_3 als Bodenkörper sind; für das Ca, das dieser Beweis noch aus. Eine entsprechende Gleichung für Phosphate ist mathemat. nur dann formuliert werden, wenn die chem. Natur des entsprechenden Bodenkörpers bekannt ist. Die Gleichung von GYÖRGY ist mathemat. verwertbar. Eine Kombination der Formel von RONA mit einer analogen für Phosphate (BEHRENDT, Biochem. Ztschr. **146**. 318; C. **1924**. II. 379) ist nur erlaubt, wenn beide Bodenkörper vorhanden sind, was einstweilen unbewiesen ist. Sie ist nicht überflüssig, weil derselbe Ca-Wert wie aus der Ronaschen Formel herauszukommen muß. Die Wrkg. der Phosphatkonz. auf die Ca^{++} -Ionenkonz. im Serum ist nicht vorhandenem Calciumphosphatbodenkörper einstweilen unsicher. (Biochem. Ztschr. **150**. 496—500. 1924. Budapest, Univ.) WOLFF.

Kurt Schulz, *Über die Dissoziation des Calciums und Kaliums in gummiarabikumhaltigen Blutersatzflüssigkeiten*. Der Ca- u. K-Gehalt im rohen u. elektrolytisch gereinigten Gummi arabicum wurde nach KRAMER u. TISDALL (Journ. Biol. Chem. **46**. 339; C. **1921**. IV. 94) bestimmt. Unter Berücksichtigung des Donnanschen Gleichgewichtes wurde die Kompensationsdialyse ausgeführt u. festgestellt, daß Ca wie K im rohen u. im gereinigten Gummi arabicum als vollständig dissoziiert zu betrachten sind. Das Ca- u. K-Verhältnis ist im rohen Gummi arabicum beträchtlich, im gereinigten noch stärker im Vergleich zum Blute zugunsten des Ca verschoben. Die Gesamtmenge des Ca u. K übersteigt in einer rohen Gummiarabikumlg. sehr stark die im Blute, während sie im gereinigten fast die gleiche ist. (Beitr. z. Physiologie **2**. 251—56. 1924. Kaiser WILHELM-Inst. f. Arbeitsphysiol.) WOLFF.

Josef Csapó und Josef Faubl, *Calciumgehalt der Serumeiweißfraktionen*. Bei dem nach DE WAARD (Biochem. Ztschr. **97**. 176; C. **1919**. IV. 1032) enthält Fibrin

11,5 mg-% Ca, Globulin 37,38 mg-% Ca, Albumin 77,8 mg-% Ca. Je größer Dispersion der Eiweißkörper, desto kleiner der Ca-Gehalt. Citratfibrinogen enthält 31,01 mg-%. (Biochem. Ztschr. 150. 509—14. 1924. Budapest, Pázmány-Univ.)

Isidor Greenwald, Jerome Samet und Joseph Gross, Die Natur des Zuckers im normalen Harn. I. Ein Vergleich des Glucoseäquivalents verschiedener Zucker verschiedener Methoden zur Bestimmung der Glucose. Die Glucoseäquivalente von Xylose, Arabinose, Fructose, Galaktose, Mannose, Maltose, Lactose u. Glucose wurden für die Methoden von FOLIN u. WU, SHAFFER u. HARTMANN, MAC LEOD, BENEDICT u. OSTERBERG (mit Na_2CO_3 u. mit NaOH) u. SUMNER bestimmt. Die Ergebnisse bei den verschiedenen Cu-Methoden stimmen, außer für Mannose, untereinander gut überein u. geben niedrigere Werte als die wieder unter sich übereinstimmenden (abgesehen von Mannose u. Glucosamin) Pikrat- u. Dinitrosalicylatmethoden. Mit Glucosamin geben die Cu-Methode u. die Pikratmethode mit Na_2CO_3 ident. Werte, die Pikratmethode mit NaOH niedrigeren u. die Dinitrosalicylatmethode noch niedrigere. Ähnlich, aber weniger ausgesprochen sind die Verhältnisse innerhalb der 2. Gruppe für Mannose. Wie schon BENEDICT u. OSTERBERG fanden, beruht die Pikrat-Acetonmethode auf der Rk. zwischen Na-Pikrat, Aceton u. NaOH. Dies wurde dadurch bestätigt, daß aus Gemischen, wie sie für die Rk. verwendet werden, bei Wiederansäuern u. Behandlung mit Nitron kein Nd. erhalten wird. (Journ. Biol. Chem. 62. 397—99. 1924.)

SPIEGEL

Isidor Greenwald, Joseph Gross und Jerome Samet, Die Natur des Zuckers im normalen Harn. II. Die Zuckerausscheidung nach verschiedener Ernährung u. der Einfluß der Nahrung auf die Glucosetoleranz mit einigen Bemerkungen über die Natur der Insulinwirkung. (I. vgl. vorst. Ref.) Verss. an einem Menschen u. an Hunden zeigten, daß die Glucosetoleranz durch kohlenhydratfreie Ernährung herabgesetzt wird, in höherem Grade, wenn diese fettreich, als wenn sie eiweißreich ist, daß aber auch während der kohlenhydratfreien Kost die Ausscheidung reduzierender Substanzen so groß sein kann wie bei beträchtlicher Kohlenhydratzufuhr. In einem Falle, wo nach Zugabe von Glucose zu einer mit beträchtlicher Zuckerausscheidung verbundenen Nahrung diese Ausscheidung sich verminderte, zeigte sich dies weniger in den nach den Pikratmethoden als in den nach den Cu-Methoden ermittelten Werten. Zufuhr von Nucleinsäuren oder an solchen reichem Material vermehrte die Ausscheidung nicht. Verss. mit subcutaner Injektion von Terpenol ließen aus dem Vergleich mit den N-Ausscheidungswerten auch keinen Anhalt für Zusammenhang der vermehrten Zuckerausscheidung mit Zerfall von endogenem Nuclein gewinnen. Aus ihren Unterss. u. andern neueren Arbeiten folgern die Verf. Die in n. Harn ausgeschiedenen Zucker bestehen aus schwer oder nicht assimilierbaren Kohlenhydraten u. reduzierenden Substanzen, die vom Eiweiß der Nahrung u. aus endogenen Quellen stammen. Die Natur der ersten hängt von der Ernährung ab, darin können Lactose aus Milch, Pentosen aus Früchten u. karamellisierten Zucker u. Dextrine enthalten sein, alle nur in kleinen Mengen. Bei gewöhnlicher Kost stammt mindestens die Hälfte aus dem Nahrungseiweiß u. endogenen Quellen; dies sind vielleicht Pentosen. — Bekanntlich ist die Oxydation von Acetessigsäure an diejenige von Glucose gebunden, die ihrerseits die Ggw. von Insulin erfordert. Verf. nehmen an, daß die Funktion des Insulins darin besteht, die Glucose mit oder ohne vorangehende Veränderung mit einer anderen Substanz, anscheinend Phosphat, zu verbinden, zu einem als „Glucose:X“ bezeichneten Komplex, dessen B. für die Oxydation der Glucose u. ihre Umwandlung in Glykogen oder Fett als notwendig erachtet wird. Durch Verb. dieses Komplexes mit Acetessigsäure soll auch deren Umwandlung herbeigeführt werden. Das weitere Schicksal von Glucose:X hängt von den Bedingungen im Organismus ab, besonders von der Glucosekonz. des Blutes, der Insulinkonz. u. dem Energiebedarf.

Körpers. Bei Vorliegen eines Energiebedarfs (schwerer Diabetes) wird Glucose: X oxydiert, wofür wieder Ggw. von Insulin notwendig erscheint; bei Fehlen des Energiebedarf u. nicht übermäßiger Insulinkonz. wird es in Glykogen verwandelt. Ein niedrigem Blutzucker wird Glucose: X oder Glykogen n. in Glucose verwandelt, um deren Konz. in den n. Grenzen zu halten, bei viel Insulin wird aber das Gleichgewicht gestört u. die Rk. in Richtung der Fettbildung verschoben. (n. Biol. Chem. 62. 401—34. 1924. New York, ROOSEVELT Hosp.) SPIEGEL.

H. Dorlencourt und E. Palfy, *Untersuchungen über die physiologischen Schwankungen des Cholesteringehaltes im menschlichen Colostrum*. Cholesterin findet sich konstant im Colostrum nach der Geburt. Die in 77 Proben ermittelten Werte schwanken von 0,161—0,908 g in 1000 ccm, lagern zumeist zwischen 0,22 u. 0,50 g. zusammen mit dem Alter der Frauen zu steigen, doch finden sich häufig Ausnahmen. Die Zahl früherer Schwangerschaften scheint ohne Einfluß. Es können auch bei derselben Frau nicht unerhebliche Schwankungen von einem Tage zum andern finden. Die Milchentnahme erhöhte zuweilen, verminderte aber meist den Cholesteringehalt. Im Gegensatz zum Fettgehalt ist der Cholesteringehalt im Colostrum höher als in der Milch. Er vermindert sich meist regelmäßig vom Tage der Entbindung bis zum Tage, wo die Milch aufsteigt, erhöht sich aber an diesem Tage erheblich beträchtlich. (C. r. soc. de biologie 92. 70—71. Paris, Lab. de la biologie d'hyg. et de clin. de la 1^{re} enfance.) SPIEGEL.

Ernst Gellhorn, *Befruchtungsstudien*. IV. Mitteilung. *Über den Einfluß von Elektrolyten auf die Permeabilität der Spermatozoen*. Die Permeabilität der Spermatozoen von *Rana temporaria* für K, Rb, NH₄ u. Citrat wird durch Aminosäuren (Glykokoll, l-Leucin, Tryptophan, Histidin, Oxyprolin) u. Kohlenhydrate (Rohrzucker, Glucose, Lävulose) herabgesetzt, so daß selbst nach längerer Einwirkungsdauer dieser Ionen noch hohe Befruchtungsziffern festgestellt werden, während in der Kontrollverss., die keine Nichtleiter enthalten, der Befruchtungserfolg sehr niedrig oder völlig aufgehoben ist. Die gleiche Wrkg. üben Aminosäuren u. Kohlenhydrate auch auf die Permeabilität der Spermatozoen für Methylblau aus. Jedoch handelt es sich bei dem Nichtleiterzusatz nicht etwa um eine völlige Hemmung der Durchlässigkeit, sondern nur um eine Herabsetzung der Permeabilität, wie die weitere Entw. der Embryonen zeigt (Mißbildungen). Die Permeabilität der Froschspermatozoen für K, Rb, NH₄ u. Methylblau wird durch Harnstoff nicht verändert. Durch das Befruchtungsexperiment u. die Beobachtung von Warmblüterspermatozoen wird die Geltung des photodynam. Effektes an Spermatozoen für die Farbstoffe Eosin, Erythrosin, Fluorescein, Neutralrot sowie für Chinin u. Chinidin ermittelt. Die Steigerung der Permeabilität, die die Zellgrenzschichten bei Belichtung in Folge dieser Farbstoffe erfahren, kann durch Aminosäuren u. Kohlenhydrate vermindert werden. Harnstoff wirkt für die Meerschweinchenspermatozoen ebenfalls die Permeabilität herabsetzend, bei denen des Frosches dagegen sie erhöhend. Acetylcholin u. Adrenalin sind hier ohne Einfluß. Es kommt also bestimmten Nichtleitern nicht eine allgemeine Wrkg. auf die zelluläre Permeabilität zu, sondern sie üben je nach der untersuchten Zellart u. der Natur der permeierenden Stoffe einen verschiedenartigen Einfluß auf die Durchlässigkeit der Zellgrenzschichten aus. Elektrolyte u. Nichtleiter sind neben den Inkreten als chem. Regulatoren der zellulären Permeabilität anzusehen. (PFLÜGERS Arch. d. Physiol. 206. 250—67. 1919. Halle, Univ.) WOLFF.

Emil Abderhalden und Ernst Wertheimer, *Studien über den Einfluß der Ernährung auf die Wirkung bestimmter Inkretstoffe*. IV. (III. vgl. S. 547.) Bei gleichzeitiger Einw. von Insulin u. Adrenalin kommt beim sauer ernährten Kaninchen vorwiegend die Adrenalinwrkg. zur Geltung, beim alkal. ernährten Tier vorwiegend die Insulinwrkg. Durch Veränderung des Verhältnisses Insulin: Adrenalin können

alle Möglichkeiten der kombinierten Insulin-Adrenalinwrkg. von der alleinigen Insulinwrkg. bis zur alleinigen ausgesprochenen Adrenalinwrkg. gezeigt wird. Durch Veränderung des Säurebasengleichgewichtes mittels der Ernährung kann man die Wrkg. innerhalb beider Extreme variieren. Dementsprechend verläuft auch die experimentelle Hyperglykämie durch subcutane Traubenzuckerzufuhr ganz verschieden. *Lävulose-* u. *Galactose*zufuhr hingegen ergaben bei Tieren beider Ernährungsgattungen die gleichen Blutzuckerkurven. (PFLÜGERS Arch. d. Physiol. 241: 451—59. 1924. Halle, Univ.) WOLFF

E. B. Hart, H. Steenbock, G. C. Humphrey und R. S. Hulce, *Neue Beobachtungen und eine neue Auslegung alter Beobachtungen über den Nährwert der Weizenpflanze*. Die früheren ungünstigen Ergebnisse bei Ernährung mit Weizen (vgl. MC COLLUM, SIMMONDS u. PITZ, Journ. Biol. Chem. 28. 211; C. 1917. I. 8) ließen sich auf Grund der neueren Forschungen durch Mangel an Vitamin A u. B erklären. In der Tat wurden jetzt mit entsprechenden Zulagen (Knochenmehl, Lebertran) bei Kühen mit Weizennahrung durchaus n. Ergebnisse erreicht. Irgendeine frühere Annahme einer tox. Substanz im Weizensamen wird damit hinfällig. (Journ. Biol. Chem. 62. 315—22. 1924. Madison, Univ. of Wisconsin.) SPIEGEL

G. Bohstedt, *Der Vitamingehalt von Fischmehl, Schlachthausabfällen und Blutmehl*. Bei Fütterungsverss. an Ratten mit Fischmehl, Schlachthausabfällen u. Blutmehl war der Gehalt an Vitamin A u. B. nicht ausreichend, wenn deren Menge bezw. 1,4 u. 8% der Fütterung ausmachte. (Ohio Sta. Mo. Bul. 8. 167—69. 1924. Exp. Stat. Rec. 50. 573.) BERJUS

P. Rona und H. Kleinmann, *Nephelometrische Untersuchungen über fermentative Eiweißspaltung*. II. Mitteilung. *Der Einfluß von Ionen auf die peptische Verdauung*. (I. vgl. Biochem. Ztschr. 140. 478; C. 1924. I. 68.) Das Optimum der H-Ionen für die pept. Verdauung liegt gewöhnlich bei $p_H = 2,1-2,2$; der Abfall der p_H -Wrkg. darstellenden Kurve nach der sauren Seite ist ein allmählicher, nach der alkal. Seite ein steiler. Die Wrkg. von Na^+ , K^+ , Ca^{++} , Al^{+++} , Cl^- , NO_3^- , SO_4^{--} in äquivalenten Mengen wird bei verschiedener Konz. der angewandten Salze ($\frac{1}{2}$ -n. bis $\frac{1}{200}$ -n.) u. verschiedenem p_H der Lsg. (1; 2,1; 2,6; 4—4,5) studiert. Auf der sauren Seite des Optimums u. im Optimum selbst zeigen Ionen in schwacher Konz. keinen meßbaren, in stärkerer Konz. einen hemmenden Einfluß, auf der alkal. Seite des Optimums fördern sie in geringerer Konz. u. gehen bei steigender Konz. wieder in hemmende Wrkg. über. Alle untersuchten Ionen wirken qualitativ gleichartig u. nur quantitativ verschieden. Von den Kationen ist am stärksten das H-Ion, dann das Na^+ , Ca^{++} u. K^+ -Ion wirksam. Für die Richtung der Wrkg. ist es gleichgültig, ob das Kation als Chlorid, Nitrat oder Sulfat angewandt wird. Bei Beurteilung der optimalen Ionenverhältnisse muß die Gesamtheit der anwesenden Ionenarten berücksichtigt werden. (Biochem. Ztschr. 150. 444—67. 1924. Berlin, Charité.) WOLFF

René Fabre und R. Frossard, *Einfluß der Reaktion des Mediums auf die Verdauung durch Papain*. Die Wrkg. des Papains erfolgt am besten bei $p_H = 7$. Sowohl leichte Acidität als auch leichte Alkalität schwächen sie. (C. r. soc. de biologie 92. 59—60.) SPIEGEL

Artur Abraham und Paul Kahn, *Über die Bedeutung von Ionen für die Muskelfunktion*. V. Mitt. *Die Beeinflussung von Ionenwirkungen auf den Lactacidogenwechsel durch Alterung*. (IV. vgl. EMBDEN u. HAYMANN, Ztschr. f. physiol. Ch. 14. 154; C. 1924. II. 1225.) Die Fähigkeit des Muskelbreis u. des Muskelpreßsafs, unter der Einw. von NaF H_3PO_4 in Lactacidogen überzuführen, wird außerordentlich stark abgeschwächt, wenn die zerschnittene Muskulatur vor dem Vers. wenig Stunden bei niedriger Temp. (13—19°) aufbewahrt wird. Zusatz von Glykogen oder $NaHCO_3$ bedingt keine Veränderung dieses abweichenden Verh., welches demnach

durch die während des Aufbewahrens eintretende Glykogenverarmung oder des Muskelbreis zu erklären ist. In ähnlicher Weise schwindet an der Muskulatur auch der die Lactacidogensynthese begünstigende Einfluß von . Diese Erscheinungen erklären sich eindeutig durch die Annahme, daß jene ide, an welchen im frischen Zustande die synthesebegünstigende Wrkg. des oder des F' angreift, beim Altern eine Veränderung erleiden, die zu Unidlichkeit führt, woraus man schließen kann, daß im lebenden Muskel diese ide noch stärker auf die Ionenschwankungen reagieren. (Ztschr. f. physiol. Ch. **141**. 161—80. 1924. Frankfurt, Univ.) GUGGENHEIM.

Hermann Lange und **Martin Erich Mayer**, *Über die Bedeutung von Ionen für die Muskelfunktion*. VI. *Die Wirkung verschiedener Anionen auf die Phosphorylierung im überlebenden Froschmuskel*. (V. vgl. vorst. Ref.) Der charakterist. Einfluß der Salzsgg. auf den Lactacidogenwechsel zeigte sich ebenso wie am Muskelbrei u. -preßsaft an den isolierten intakten lebensfrischen Muskeln. Die hemmenden *Fluor*-, *Citrat*- u. *Tartrat*-Ionen bewirkten Verschwinden von Ca^{++} u. zwar sind die Ausschläge für das Citrat u. Tartrat an der intakten Muskulatur wesentlich stärker als am Muskelbrei. $NaCNS$ bewirkte starke Abhängigkeit von H_3PO_4 . NaJ verursachte jedoch im Gegensatz zu den Verss. von **LEHNARTZ** (Ztschr. f. physiol. Ch. **134**. 243; C. **1924**. II. 206) keine Lactacidogenspaltung. (Ztschr. f. physiol. Ch. **141**. 181—95. 1924. Frankfurt, Univ.) GUGGENHEIM.

Klaus Joachim Deuticke, *Über die Bedeutung von Ionen für die Muskelfunktion*. VII. *Die Wirkung verschiedener organischer Anionen auf den Lactacidogenwechsel*. (V. vgl. vorst. Ref.) Auch die Na-Salze organ. Säuren beeinflussen den Lactacidogenwechsel in hohem Maße. Ein Zusammenhang mit der chem. Konst. des Anions ist dabei nicht erkennen, wohl aber eine Abhängigkeit von der Konz., indem mit der Verd. die Synthese oder der Abbau des Lactacidogens begünstigt wurde. *Butter*-, *Capron*-, *Capryl*- u. *Caprinsäure* bewirken in stärkerer Konz. eine Hemmung der Lactacidogensynthese, in den nächsten Gliedern der homologen Reihe nur noch eine geringe Konz. der zugesetzten Salzsg. abnehmende Spaltungshemmung. *Fettsäuren* mit gerader C-Zahl: *Aceten*-, *Propion*-, *n-Valerian*- u. *i-Valeriansäure* fördern in steigender Konz. die Lactacidogensynthese, verd. Lsgg. hemmen. $NaOOCH$ wirkt nur wenig hemmend. *Oxalsäure* wirkt stark synthesebegünstigend, weniger stark *Malon*-, *Bernstein*-, *Fumar*- u. *Maleinsäure*. *Glykol*- u. *d,l-β-Oxybuttersäure* wirken in starker Konz. anorgan. H_3PO_4 zum Verschwinden, schwächere Lsgg. spaltungshemmend. *d,l-Milchsäure* wirkt auch synthesebegünstigend in steigender Konz., wie sie bei der Muskelkontraktion entstehen können. *Brenztrauben*- u. *Äpfelsäure* wirken wie die Oxysäuren synthesebegünstigend oder spaltungshemmend. Die unter dem Einfluß der organ. Anionen stattfindende Lactacidogensynthese wird begünstigt durch Zusatz von Polysacchariden (Glykogen, Stärke) oder 1%ig. $NaHCO_3$ -Lsg. In m/9-d,l-Na-Lactatlsg. erfolgt das Optimum der Lactacidogensynthese nach 30 Min., worauf die anorg. H_3PO_4 wieder abgespalten wird. In m/243-Lactatlsgg. dauert die Synthese nach 10 Stdn. noch fort. Gealtertes Material reagiert gegenüber Oxalat weniger empfindlich als frisches. (Ztschr. f. physiol. Ch. **141**. 193—224. 1924. Frankfurt, Univ.) GUGGENHEIM.

Kurt Emmrich und **Hermann Lange**, *Über die Wirkung des Calciums und seiner Antagonisten auf den Lactacidogenwechsel im Muskelbrei*. Die Hemmung der frischen Froschmuskelbrei durch Zusatz von m/50- $CaCl_2$ -Lsg. verursachte eine Überführung von anorgan. H_3PO_4 in Lactacidogen kann durch $NaCl$, KCl , NH_4Cl u. $MgCl_2$ mehr oder weniger vollständig gehemmt werden. Am wirksamsten erweist sich $MgCl_2$, das noch in Lsg. von m/243 eine Synthesehemmung herbeiführt u. eine maximale Wrkg. bei m/27 besitzt. KCl ist etwas wirksamer als NH_4Cl , $NaCl$ ist

am schwächsten wirksam. Beim $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ u. bei $(\text{Na})_2\text{SO}_4$ fehlt die antagon. Wrkg., bei K_2SO_4 ist sie gegenüber KCl abgeschwächt, bei MgSO_4 in unverändert. Maße erhalten. Offenbar ist bei der antagonist. Wrkg. von NaCl u. NH_4Cl hauptsächlich das Anion mitbeteiligt. (Ztschr. f. physiol. Ch. **141**. 242—53. 1924. Frankfurt Univ.)

GUGGENHEIM


Gustav Embden, Margarete Kahlert und Hermann Lange, Über Wirkung von Natriumchlorid und Natriumbromid auf die Lactacidogensynthese des Calciumionen. (Vgl. EMBDEN u. HAYMANN, Ztschr. f. physiol. Ch. **137**. 154; C. **1924**. II. 1225.) Zusatz von NaCl u. NaBr wirkt der unter dem Einfluß von wss. Ca-Lsg. im lebensfrischen Muskelbrei erfolgenden Lactacidogensynthese stark entgegen. Ein gesetzmäßiger Unterschied der beiden Salze war nicht erkennbar. Es wird vermutet, daß der Mangel an Gesetzmäßigkeit weniger in äußeren Verschiedenheiten als in Verschiedenheit des Muskelmaterials, insbesondere dessen Ionengehalt eine Erklärung findet. (Ztschr. f. physiol. Ch. **141**. 254—64. 1924. Frankfurt, Univ.)

GUGGENHEIM

Herbert Hentschel, Über das Tätigkeitsmilchsäuremaximum verschiedener Frostmuskeln. Das Maximum der Milchsäurebildung bei zur völligen Ermüdung führenden Einzelreizung — das Tätigkeitsmilchsäuremaximum — ist am Gastrocnemius von Feldfröschen, Wasserfröschen u. Kröten erheblich größer als am Semimembranosus des gleichen Tieres. Dieses Verh. steht im Einklang mit der Auffassung, daß die bei der Muskeltätigkeit gebildete Milchsäure zu einem wesentlichen Teile vom Sarkoplasma aufgenommen wird, u. mit der früheren (BEHRENDT, Ztschr. f. physiol. Ch. **118**. 123; C. **1922**. I. 593) Angabe, daß der Gastrocnemius sarkoplasmareicher ist als der Semimembranosus. Die Unterschiede treten an pankreasextirpierten Tieren noch deutlicher hervor als an n., weil der Semimembranosus stärker geschädigt wird als der Gastrocnemius. (Ztschr. f. physiol. Ch. **141**. 5 bis 278. 1924. Frankfurt, Univ.)

GUGGENHEIM

Sanford M. Rosenthal und Edwin C. White, Studien zur Leberfunktion. I. A. Das pharmakologische Verhalten einiger Phthaleinfarbstoffe. B. Der Wert ausgewählter Phthaleinverbindungen zur Bestimmung der Leberfunktion. (Vgl. ROSENTHAL, Proc. of the soc. f. exp. biol. and med. **21**. 72. Journ. Pharm. and Exp. Therapeutics **23**. 385; C. **1924**. II. 1002. 2686.) Untersucht wurden: Phenoltetrachlorphthalein (I.), o-Kresoltetrachlorphthalein, Dibromkresoltetrachlorphthalein, Chlorsulfphthalein (Phenoltetrachlorphthaleinsulfonsaures Na), Brom- u. Jodsulfphthalein, o-Kresoltetrachlorphthaleinsulfonsaures Na, Tetrabromphenolphthalein (II.), Tetraiodphenolphthalein, Tetrachlorfluorescein, Tetraiodtetrachlorfluorescein, Hydroxymercurifluorescein, Dibromoxymercurifluorescein.



Alle diese Verbb. wirken auf *Bacillus typhosus* u. *Staphylococcus albus* baktericid. Die Verbb. der Gruppe der Phenoltetrahalogenphthaleinsulfonfarbstoffe werden zu 60—90% in 1 Stde. nach intravenöser Injektion von 5 mg/kg m. Kaninchen in die Leber ausgeschieden. Nach künstlicher Leberschädigung durch Abbinden von etwa 80% der Kaninchenleber wurde die Wirksamkeit einiger dieser Farbstoffe zur Kennzeichnung von Leberschädigungen, beruhend auf ihrer Entfernung aus der Blutbahn, bestimmt. Bromsulfphthalein erscheint hierfür am e-

sten, da es sehr langsam die Blutbahn verläßt. *Mercurchrom* wird zu 30—55% in Leber in 2 Stdn. ausgeschieden; derartige vorbereitete Galle wirkt stark krebserregend auf die genannten Erreger. (Journ. Pharm. and. Exp. Therapeutics **24**, 588. 1924.)

WOLFF.

Mizutani Mita, Zur Pharmakologie der Ätheroxydationsprodukte. Mittels der Sauerstoffmethode lassen sich in alten Ätherproben in W. l., stark giftige Substanzen nachweisen u. auch ihre Entstehung im Ä. — durch Autoxydation bei Aufbewahrung unter Luft- u. Lichtzutritt — quantitativ verfolgen. Sie besitzen neben ihrer Reiz- u. Ätzwirkg. resorptive Wirkg. auf Blut, Herz u. Zentralnervensystem. Das Herz wird in maximaler Kontraktur stillgestellt. Am isolierten Herzen können nur sehr geringe Verunreinigungen des Ä., die am ganzen Tier keine Symptome hervorzubringen machen, festgestellt werden. Aus stark giftigem Ä. ließ sich *Dioxyäthylperoxyd* (V. LAND, LIEBIGS Ann. **431**. 301; C. **1923**. III. 826) als das giftige Prinzip isolieren. Die kontrakturierende Wirkg. der leicht Aldehyd abgespaltenden Substanz beruht auf einer Aldehydfunktion. Die B. der Giftsubstanz in Ä. läßt sich durch Aluminiumhydroxyd verhindern. (Arch. f. exp. Pathol. u. Pharmak. **104**. 276—88. 1924. München. Pharmakol. Inst.)

WOLFF.

Alf. Miguel Ozorio de Almeida, Vergleich der Wirkung von Nicotin und Adrenalin auf die Wärmepolypnoë. Bei durch Wärme polypnöisch gemachten Tieren bewirkte Adrenalin entgegen seiner sonstigen Wirkungsart Beschleunigung des Rhythmus der Atmung. (C. r. soc. de biologie **92**. 79—81.)

SPIEGEL.

Emil Abderhalden, Fortgesetzte Studien über die Beeinflussung der Entwicklung von Kaulquappen durch Verbindungen mit bekannter Struktur. (Vgl. PFLÜGERS Arch. f. Physiol. **201**. 432; C. **1924**. I. 789.) 3,5-Dijodtyrosin beeinflusst Wachstum u. Metamorphose noch in Dosen von 0,0015 g in 100 ccm W., u. zwar bei einmaliger Gabe. Zumeist zeigen Kaulquappen, die ohne besondere Nahrungszufuhr (Algen) gehalten werden, früher Erscheinungen als solche, denen Nahrung zur Verfügung steht. Bei Hunger bestand nicht, denn die Tiere wurden nicht steril gehalten). Die Metamorphose $C_{11}H_{14}O_3N_2$ (β -Bz-oxy-Pr-dihydroindolylalanin) (ABDERHALDEN u. SICKEL, Arch. f. physiol. Ch. **138**. 108; C. **1924**. II. 2054) beschleunigt die Metamorphose von Kaulquappen in analoger Weise wie 3,5-Dijodtyrosin u. Schilddrüse. Im vorerwähnten Zustande ist die Verb. bedeutend wirksamer, d. h. ihr Einfluß macht sich bedeutend früher geltend. *Insulin* bewirkt keine charakterist. Erscheinungen bzgl. Wachstum u. Entw. von Kaulquappen. Es hemmt beide; in nicht zu kleinen Dosen wirkt es schädigend. (PFLÜGERS Arch. d. Physiol. **206**. 467—72. 1924. Halle, 1924.)

WOLFF.

Juan Planelles, Resorption dampfförmiger Medikamente durch die Nasen-Rachenschleimhaut. In Leuchtgasatmosphäre hat Veronal F. 177°, Sublimation beginnt bei 71° unzersetzt, ebenso Dial (F. 135°), Salicylsäure u. Acetylsalicylsäure. Salol ist flüchtig, aber nicht unzersetzt wiederzugewinnen. Antipyrin sublimiert glatt bei 109° unzersetzt. Chinin, Hydrastinin u. Novocain werden zers. — Alle mit Leuchtgasstrom verflüchtigten Substanzen gehen auch in beträchtlichem Maße im Modellvers. in der Tabakrauch über. — Man läßt mit der betr. Substanz imprägnierten Tabak rauchen u. untersucht den Harn. Antipyrin u. Veronal konnten krystallin. aus dem Harn ausgeschiedelt werden, Salicylsäure u. Acetylsalicylsäure gaben im Harn die Fe₃-Rk. Von Veronal fand sich $\frac{1}{5}$ im Harn. Der Geschwindigkeit nach ist die Resorption von der Nasen-Rachenschleimhaut aus im Antipyrinvers. sehr günstig u. über vom Magen aus beträchtlich überlegen. (Arch. f. exp. Pathol. u. Pharmak. **100**. 272—75. 1924. München. Pharmakol. Inst.)

WOLFF.

C. Langton Hewer, Äthylennarkose, mit Beobachtungen über 120 Anwendungen. Bestätigung vorliegender Angaben über gewisse Vorzüge des Äthylens, besonders

für kleinere Operationen, bei denen N_2O nicht ausreicht. (Lancet 208. 1 bis 175.)

Hermann Lange und **Martin Erich Mayer**, *Untersuchungen über Narke* SPIEGEL
 III. Mitteilung. *Einfluß der Allgemeinnarkose auf den Chemismus des quergestreiften Froschmuskels*. (II. vgl. Ztschr. f. physiol. Ch. 124. 140; C. 1923. I. 985.) In der Äthernarkose von Fröschen wird der Lactacidogengehalt des Froschmuskels auf Kosten der anorgan. H_3PO_4 erhöht. Das Lactacidogen wird unter den Bedingungen der B-Best., d. h. der bei 37° leicht abspaltbaren H_3PO_4 nach vorangegangener Allgemeinnarkose weniger vollständig — wenn auch im Anfang rascher — als unter n. Verhältnissen — gespalten. Die beschriebenen Wrkgg. haben ihren Angriffspunkt wahrscheinlich an den Kolloiden der Muskulatur, wobei möglicherweise die bei der Allgemeinnarkose eintretenden Ionenverschiedenheit mitbeteiligt sind. (Ztschr. f. physiol. Ch. 141. 233—41. 1924. Frankfurt, Univ.) GUGGENHEIM

E. Starkenstein, *Über die Abhängigkeit der Diurese vom Salzgehalt und der Wasserstoffionenkonzentration des getrunkenen Wassers*. (Vgl. Arch. f. exp. Pathol. u. Pharmak. 92. 339; C. 1922. III. 189.) Nach früheren Unterss. wird vom getrunkenem W. um so mehr innerhalb 4 Stdn. im Harn ausgeschieden, je geringer der Salzgehalt ist, z. B. von 1 Liter dest. W. in 4 Stdn. der größte Teil, von 1 Liter physiol. NaCl-Lsg. in dieser Zeit nur der kleinere Teil. Dieses Retentionsvermögen des Organismus steigt parallel mit dem Salzgehalt bis zur Blutisotonie. Die diuret. Wrkg. von Mineralwässern ist nicht allein durch ihren Salzgehalt bedingt, sondern ist eine Komplexfolge ihres Salz- u. CO_2 -Gehaltes. Salz hemmt, CO_2 fördert die Ausscheidung aufgenommenen Wassers. Überschießende Diurese wurde bei den untersuchten Mineralwässern nie beobachtet. Es handelt sich hier somit ausschließlich um die Ausscheidungsgröße aufgenommenen Wassers bezogen auf dessen Deponierung im Organismus. Die diuresefördernde Wrkg. der CO_2 ist nicht unbeschränkt, sondern durch den Salzgehalt des betreffenden Wassers begrenzt; sie ist am deutlichsten bei halbisoton. Wässern. Diese Wrkg. der CO_2 beruht nicht auf einer resorptionsfördernden Wrkg. der CO_2 vom Magen aus, sondern sie ist prinzipiell durch die $[H^+]$ bedingt, welche ganz allgemein diuresefördernd wirkt. In Faktoren, welche die Ausscheidungsgröße des getrunkenen Wassers im 4 Stdn.-Versuch bestimmen, sind der Gehalt an H-Ionen in Mineralwässern, bedingt durch den Gehalt an CO_2 wie an HCO_3' , sowie die Äquivalentkonz. an Salzen u. das dadurch bestimmte Isotonieverhältnis. Im allgemeinen wirkt eine CO_2 -Lsg. ein wenig stärker diuret. als eine isohydr. Lsg. anderer Säuren. Die diuresehemmende Wrkg. der Salze ist ebenso wie die diuresefördernde der CO_2 bzw. der H-Ionen auf extrarenale Ursachen zurückzuführen. (Arch. f. exp. Pathol. u. Pharmak. 104. 6—22. 1924. Prag, Deutsche Univ.) WOLFF

Robert Bierich und **Axel Rosenbohm**, *Untersuchungen über die Biochemie der Krebsbildung*. Den Veränderungen beim experimentellen Teerkrebs liegen biochem. Vorgänge zugrunde. Diese Vorgänge beim Einwuchern der Krebszellen in das Bindegewebe lassen sich auf bestimmte physikal.-chem. Gesetzmäßigkeiten zurückführen. Der gesamte Vorgang bei der Krebsbildung verläuft kreislaufartig, indem die im Teer enthaltenen Substanzen, die den primären kapillarchem. Grenzflächenvorgang im Epithel der n. Haut auslösen, auch an den Vorgängen im angrenzenden Bindegewebe beteiligt sind. Bei dem gesteigerten Abbau der Kohlenhydratreserven durch die Krebszellen tritt Milchsäure auf, die vom Epithel her in das Bindegewebe eindiffundiert u. hier gepuffert wird. Durch die Milchsäure wird das Protein der kollagenen Fasern entionisiert u. weiter nach Abspaltung von Aminosäuren u. anderen Bausteinen in eine gelatineartige Substanz verwandelt. Diese Zustandsänderung des Bindegewebes ist die Vorbedingung für das Einwuchern der Krebszellen. Bestandteile der Abbauprodukte des Bindegewebes

gen wiederum eine wichtige Rolle beim Zustandekommen u. weiteren Verlauf
orgänge im Epithel. (Biochem. Ztschr. 152. 193—202. 1924. Hamburg-Eppendorf,
einst.) WOLFF.

Pierre Focsa, *Versuche zur Behandlung der Meerschweinchentuberkulose mit
Chlorid*. Die Verss., bei denen in verschiedenen Zeiträumen nach der In-
in 1%ig. CaCl_2 -Lsg. intraperitoneal gegeben wurde, zeigten keinen Erfolg.
soc. de biologie 92. 12—13. Paris, Inst. PASTEUR.) SPIEGEL.

I. F. Stephenson, *Mitteilungen über die Giftigkeit von Handelsabfällen*. Von
Reihe von Fabrikationsabfällen, die üblicher Weise in Flüsse geleitet werden,
die Giftigkeit für Fische untersucht; die Absorption von gel. O, bzw.
ed. von KMnO_4 können nicht als Maßstab für die Giftwrg. gelten. HCl u.
wirken in Konz. 1:5000 schädlich für Fische, bei NaOH ist die Konz.
000 für Fische noch 2 Stdn. verträglich. NH_3 , 1:100 000, schädlich; 1:250 000
schädlich. NH_4 -Sulfat, -Sulfid, -Carbonat u. -Chlorid wirken bei Konz. 1:1000
schädlich, CaO bei 1:2000 schädlich u. 1:10000 unschädlich. Von Farbstoffen
Nitroverbb. vom Typus der Pikrinsäure giftig; im übrigen sind große Schwan-
ren in der Giftwrg. der verschiedenen Gruppen von Farbstoffen zu beobachten.
es Cl (Bleichlaugen) wirkt in Konz. 1:150 000 giftig. Sulfat entzieht dem W.
hll den gel. O, Thiosulfat nur wenig, Konz.-Grenze 1:2000. Von den Gas-
bationsabfällen ist HCN am gefährlichsten, Giftwrg. noch bei 1:1 000 000;
el giftig bei 1:100 000; Thiocyanat ist weniger giftig, Karpfen lebten weiter,
dem sie vier Stdn. in Konz. 1:1000 gelassen waren. Anilin u. o-Toluidin sind
erd. 1:10 000 noch giftig; Pyridin bei dieser Verd. unschädlich; Naphthalin
100 unschädlich. CuSO_4 bei Konz. 1:1 000 000 giftig. As_2O_3 giftig bei 1:10 000.
s Lsgg. von CS_2 (1:1000) wirken in wenigen Min. tödlich. Für Alkaloide, die
im allgemeinen nicht in Abfällen auftreten, wurden die giftig wirkenden Konz.
stellt, Morphinhydrochlorid 1:500, Atropinsulfat 1:5000, Strychninsulfat
000. Ölschichten auf der Wasseroberfläche können als Lösungsm. für giftige
anzen wirken. — Die angegebenen Konz. gelten nur als rohe Annäherungs-
ei, da sich verschiedene Gattungen von Fischen verschieden widerstandsfähig
g. diese Gifte verhalten. (Chemistry and Ind. 44. 23—24.) ZANDER.

F. Pharmazie. Desinfektion.

I. Pabisch, *Josef Moeller* †. Am 4. Okt. 1924 starb in Graz der emeritierte
JOSEF MOELLER, Vertreter der mkr. Richtung der Pharmakognosie im 77. Lebens-
hl (Arch. der Pharm. 262. 549—52. 1924. Wien.) DIETZE.

M. Kolthoff und **O. Tomiček**, *Der Zustand des Silbers in Protargol und
Argol*. (Rec. trav. chim. Pays-Bas. 44. 103—12. — C. 1925. I. 258.) HORST.

Willy Wobbe, *Technische Mitteilungen*. Es werden Vorschriften zu Adhäsions-
tt anderen techn. Mitteln gegeben. (Arch. der Pharm. 262. 629—32. 1924.) DIETZE.

—, *Apparate zur rationellen Fabrikation steriler Injektions-Präparate in Ampullen*.
escriben werden die prakt. App. der Sauerstoff-Zentrale für medicin.
weke (Dr. E. SILTEN, Berlin NW 6). Die Leistungsfähigkeit des neuen Ampullen-
sweiders u. des Ampullen-Füllapparates ist sehr groß. (Chem.-Ztg. 49. 93—94. Dr.
h. Vischniac, *Über die Gegenwart von Schwefel in Jod*. Bei der Darst. von
inura Jodi blieben von 8 kg Jod. bisubl. 7,5 g unl. Rückstand. Der zum größten
eius S bestand. Dieses stammt davon, daß das NaNO_3 , aus welchem das J_2
s NaJO_3 gewonnen, mit NaHSO_3 behandelt wurde, um jenes in NaJ überzuführen.
u Sciences Pharmacol. 31. 635—36. 1924.) DIETZE.

W. Schönniger, *Gebrauchsfertige Pillenmasse „Cenomassa“ und deren Ver-
nung zur raschen Herstellung weichbleibender Pillen*. Cenomassa besteht aus

gereinigter, stark entbitterter, bei 120° getrockneter Bierhefe u. aus Hefeextrakt entsprechendem Verhältnis. Die Masse eignet sich vorzüglich als Ersatz für R u. Succ. Liquir. zum Anstoßen von Pillenmassen, besonders mit Glycerinw. (Apo Ztg. 40. 63. Erlangen.)

J. W. Le Heux, *Über die Haltbarkeit von Cholinlösungen in Ampullen.* Cholin wurde aus bei 127—128° fraktioniertem, mit K_2CO_3 von HCl befreit Äthylenchlorhydrin u. 25%ig. Lsg. von Trimethylamin in einem Verhältnis, auf 1 Gewichtsteil von letzterem 2 Gewichtsteile Chlorhydrin kommen, 24-std. Erhitzen des in zugeschmolzenen Röhren befindlichen Gemisches im Wasserbad, Waschen mit Ä., Kochen mit Chlf. u. Umkrystallisieren aus absol. dargestellt. Zur Prüfung der Haltbarkeit wurden 5%ig. Lsgg. des erhaltenen synthet. Cholin-HCl in Ampullen gefüllt, A mit Zusatz von HCl, sodaß die 1/1000-n. HCl enthält, in Jenaer braunes Violaxglas, B mit ebensoviel HCl, aber Ampullen von gewöhnlichem Glas, C ohne HCl in Violaxglas, D ohne HCl gewöhnliches Glas. Nach 1/2 Jahre waren A—C physiol. (Prüfung der Wrkg. Dünndarm von Kaninchen) u. chem. völlig unverändert, D zum Teil zurückgegangen. Nach 1 Jahre war nur Lsg. A völlig unverändert; C war wenig, B etwas u. deutlich verändert. Auf Grund des chem. Verh., der Wertbest. am isolierten Dünndarm u. der intravenösen Einspritzung läßt sich sagen, daß Lsgg. von Cholin-HCl mit einem Gehalte von 1/1000-n. HCl sich in Ampullen von braunem Jenaer Violaxglas sterilisiert 1 Jahr lang unverändert halten. Nach mehr als 3 Jahre hatte sich Lsg. C kaum merkbar verändert. (Arch. der Pharm. 262. 570—75. 1924. Utrecht, Reichsuniv.)

P. W. Danckwortt, *Die Haltbarkeit der Arzneimittel. II. Die Oxydation arsenigen Säure in Lösungen.* (I. vgl. Pharm. Ztg. 68. 895; C. 1924. I. 107.) Der Gehalt an As^{+++} geht in Lsgg. bei Zusätzen von organ. kolloiden Stoffen nach Monaten stark zurück, da ein Teil der As_2O_3 an das Kolloid adsorbiert wird. Der Zusatz von 3 g Kohle zu 100 g 1% K-Arsenitlg. ist nach 5 Monaten As_2O_3 nicht mehr nachzuweisen. 3 g Stärke oder 10 g NaCl oder 30 g Glycerin sind ohne jeden Einfluß. Fe-Lsgg. bewirken Rückgang des As^{+++} auf die Hälfte. Mit Zusatz überzogene Tabletten, z. B. Arsen-Chlorosan BÜRG, waren haltbar. (Arch. der Pharm. 262. 563—67. 1924.)

P. W. Danckwortt, *Die Haltbarkeit der Arzneimittel. III. Alkaloidsalzlösungen* (II. vgl. vorst. Ref.) STICH (Pharm. Zentralhalle 65. 1; C. 1924. I. 1414) hat empfohlen, den Alkaloidlsgg. $NaHCO_3$ zuzusetzen, weil dadurch die allmählich abgespaltene Base lipoidl. würde u. die so hergestellten Präparate wirksamer wirken als die reinen Salzlsgg. Vf. kommt aber zu der Überzeugung, daß vor der Annahme STICH vorgeschlagenen Rezeptkombination nicht dringend genug gewarnt werden muß, zumal es sich um Ampullen handelt, die zum Teil lange aufbewahrt werden. Je alkal. eine Alkaloidlsg. wird, desto weniger haltbar ist sie, weil die Eirkomplexe sich aggregieren u. schließlich ausflocken oder auskrystallisieren können. **F. v. Bruckhausen** bestätigt die Angaben DANKWORTTS. (Arch. der Pharm. 262. 567—69. 1924. Hannover, Tierärztl. Hochsch.)

Willy Wobbe, *Spezialitäten und Geheimmittel. Milchinjektion, Dr. Seibert* (Alpine Chem. A.-G., Kufstein-Schaftenau), bakterien- u. toxinfreie Kuhmilch für die parenterale Proteinkörpertherapie. — *Salluen* (IMHAUSEN & Co., Witten-Ruhr), „Adsorptionsverb. von Bi u. As mit organ. Kolloidkomplex nicht eiweißartiger Natur“, intramuskulär u. intravenös gegen Syphilis. — *Tuberkatin* (Pharm. Leipzig), gegen Tuberkulose hämatogenen Ursprungs u. bronchogene Tuberkulose. (Arch. der Pharm. 262. 619—29.)

J. Mindes, *Die Arzneimittel im abgelaufenen Dezennium. Jodthymintabletten*

RIND & REDLICH, Berlin), je 1 g frische Thymusdrüse u. 2,8 mg J₂, gegen Basedow-Krankheit. (Pharm. Presse 30. 15. Sep.) DIETZE.

The Medical Research Council of the National Institute for Medical Research und Harold Ward Dudley, London, *Herstellung von reinem Insulin.* Grobe Insulin wird in wss. Lsg. mit Pikrinsäure behandelt u. der unl. Nd. eine Mineralsäure zers. — Z. B. wird das bei der Extraktion von Pankreas mit A. erhältliche Insulin in möglichst wenig W. gel. u. die Lsg. durch Zentrifugieren von amorphen unl. Begleitstoffen befreit (beim Filtrieren, sogar durch Filtrieren, büßt das Insulin an Wirksamkeit ein). Man verd. dann die Lsg. durch Zugabe von W. auf eine Konz. von 1,5%, berechnet auf die angewandte Menge des Insulins u. stellt die pH auf ca. 5 ein. Zu dieser Lsg. wird die Hälfte des Volumens gesätt. wss. Pikrinsäurelsg. gegeben, wobei sofort ein flockiger, amorpher Nd. entsteht. Nach 1—2-tägigem Stehen bei 15° wird die überstehende klare Fl. abgeseigt, der am Gefäßboden haftende Nd. mit wenig W. aufgerührt u. mit soviel wss. Na₂CO₃-Lsg. in kleinen Anteilen versetzt, das eine klare gelbbraune Lsg. entsteht. Diese wird gegebenenfalls zentrifugiert oder filtriert, u. zwar möglichst schnell, zweckmäßig bei 10° nicht übersteigenden Temp. u. mit dest. W. verd. Nach Zugabe der berechneten Menge HCl fällt das *Insulinpikrat* wieder aus, wobei die Fällung durch Zusatz von 1/4 des Vol. gesätt. wss. Pikrinsäurelsg. vervollständigt wird. Man läßt stehen, dekantiert die überstehende Fl. ab oder saugt den Niederschlag ab, wäscht mit stark verd. wss. Pikrinsäurelsg. nach u. dann zur Entfernung des NaCl mit W., bringt den feuchten Nd. in ein Gefäß u. verrührt ihn mit wss. HCl bis sich die in öligen Tropfen ausscheidende Pikrinsäure vollständig gelöst u. eine trübe, dunkelgelbe Fl. entstanden ist. Schließlich wird solange mit Aceton versetzt, als noch ein Nd. entsteht, dieser abgesaugt, mit wenig Aceton zur vollständigen Entfernung der Pikrinsäure u. dann mit trockenem Ä. gewaschen. Nach dem Trocknen im Vakuumexsiccator über konz. H₂SO₄ wird das *Insulinhydrochlorid* als schneeweißes, in W. vollkommen zu einer farblosen Fl. 1. u. 2. erhalten. (E. P. 219978 vom 27/3. 1923, ausg. 24/9. 1924.) SCHOTTLÄNDER.

Burlock-Walford Co., Inc., Boston, Massachusetts, übert. von: Frank F. B. Sherman, Nashua, New Hampshire, V. St. A., *Zur Herstellung von Kataplasmen* Ein solches Gemisch bestehend aus gepulverter Bruchwurz oder Wasserdost (Eupatorium perfoliatum), einer Farnart (Comptonia asplenifolia), Leinsamen u. gemahlenden Eucalyptusblättern (eucalyptus globulus). — Zum Gebrauch wird das innige Gemisch in sd. W. eingetragen, gegebenenfalls unter Zusatz von Weizenstärke, u. zu einer Paste verarbeitet, die in der üblichen Weise als *Kataplasma* therapeut. Verwendung findet. (A. P. 1519755 vom 13/12. 1923, ausg. 16/12. 1924.) SCHOTTL.

J. H. Boehringer Sohn, Chemische Fabrik (Erfinder: Alfred Häubler), Biberach-Ingelheim a. Rh., *Herstellung wässriger Lösungen* von in Wasser unl. oder schwerlöslichen organ. Verbb. unter Ausschluß von Fetten, Eiweißkörpern u. Fette oder Eiweiß enthaltender Prodd., 1. gek. durch die Verwendung von *Dialkylamiden* niedriger Fettsäuren als Lösungsvermittler. — 2. dad. gek., daß als Lösungsvermittler *Acetaldialkylamid* verwendet wird. — Die Dialkylamide niedriger Fettsäuren übertreffen als Lösungsvermittler für unl. oder wl. organ. Verbb. die entsprechenden unsubstituierten Amide erheblich. Da sie ferner schwerer verseifbar sind, so lassen sie sich vorteilhaft bei der Herst. von unter Druck sterilisierbarer Lsgg. oder in den Fällen verwenden, bei denen die Ggw. oder B. von NH₄- oder Aminsalzen störend wirken kann. Die Dialkylamide der niedrigen Fettsäuren sind subcutan u. intravenös injizierbar u. ermöglichen insbesondere die Überführung von Heilmitteln, wie *Ca*- oder *Papaverinnitrit*, in konz., genau dosierbare wss. Lsgg. *n-Butyrdiäthylamid* u. *i-Butyrdiäthylamid* sind die Endglieder der als Lösungsvermittler brauch-

baren Reihe der Dialkylamide. Z. B. lösen 100 ccm einer wss. Lsg. von *Ameisensäurediäthylamid* 3,5 g *Bzl.*, 3,5 g *Caprylalkohol*, 1 g *Borneol* oder 3,5 g *Benzaldehyd* während wss. Formamidlsgg. gleicher Konz. nur Spuren dieser Stoffe lösen. 100 ccm einer wss. 50%ig. Lsg. von *Acetdimethylamid* oder *Acetdiäthylamid* lösen 5 g *Papaverinitrit*. Die Lsgg. sind ohne Abscheidung des Salzes mit W. unbegrenzt verdünnbar. Wss. Acetamidlsgg. gleicher Konz. lösen dagegen nur den dritten oder die Hälfte der gleichen Salzmenngen, wobei das Salz beim Verdünnen mit W. wieder ausgeschieden wird. — Weitere Beispiele betreffen die Herst. von Lsgg. von *Benzoessäure*, *Brenzschleimsäure*, *Cholsäuremethylester*, *Acetanilid* (mit *Campher* mit Hilfe einer 30%ig. wss. Lsg. von *Propionsäurediäthylamid*, — *Chinolin* bzw. *Campher* mit Hilfe von wss. *Butyrdimethylamidlsg.*, sowie von *Nitrobenzol*, *Menthol* oder *Cyclohexanol* mit Hilfe von wss. *i-Butyrdiäthylamid* (D. R. P. 403508 Kl. 12o vom 9/2. 1922, ausg. 26/9. 1924.) SCHOTTLÄNDER

Ivan Rahlejev, Belgrad, Jugoslavien, *Herstellung eines Heilmittels gegen Rheumatismus*. Auf Gelatineböden gezüchtete Kulturen von *bacillus subtilis*, *oid* *albicans* oder *Staphylokokken* werden getrocknet, mit physiolog. NaCl-Lsg. emulgiert u. bis zur B. von 3 Schichten zentrifugiert. Die leichteste Schicht wird abgetrennt u. mit CH_2O -Lsg. sterilisiert, um den Rest der noch lebenden Bakterien abzutöten. Mit diesem Prod. wird eine Fl. vermischt, die wie folgt gewonnen wird: neutrales Öl, wie Sesamöl wird mit FeCl_3 erhitzt, nach dem Abkühlen mit BaSO_4 versetzt, wieder zum Sieden erhitzt, abgekühlt u. 24 Stdn. bei 15° stehen gelassen. Man erhitzt dann unter allmählichem Zusatz von Li_2CO_3 zum Sieden, kühlt auf 15° ab u. gibt $\text{Sr}(\text{NO}_3)_2$ hinzu, das unter Erwärmen in Chlf. gelöst u. beim Abkühlen wieder krystallisierte. Die im Verhältnis 1:3 gemischten Bestandteile werden 48 Stdn. bei 15° stehen gelassen u. bilden dann eine hellgelbe Fl., die nach Bedarf mit neutralem Chlorophyll grün gefärbt werden kann. Zum Gebrauch wird das Mittel vorsichtig in die Haut der schmerzhaften Körperteile eingerieben. (E. P. 193024 vom 30/1. 1923, ausg. 11/4. 1923. Jugoslav. Prior. 11/2. 1922. Schwz. P. 103981 vom 9/2. 1923, ausg. 1/4. 1924. Jugoslav. Prior. 11/2. 1922.) SCHOTTLÄNDER

Howard S. Clemmer, übert. von: **Everett Brown Castleman**, Spokane, Washington, *Mittel zur Reinigung künstlicher Zähne oder Gebisse*. Man vermischt Weinsäure mit einer gesätt. wss. Lsg. von Na-Benzoeat, verd. mit W. u. färbt mit einer Lsg. mit einem roten vegetabil. Farbstoff. — Zum Gebrauch werden die zu reinigenden Teile mit dem Mittel abgebürstet oder abgerieben, wobei alle Bakterien u. Zersetzungsprodd. zerstört werden. (A. P. 1488315 vom 17/10. 1922, ausg. 25/5. 1924. Can. P. 238607 vom 22/1. 1923, ausg. 11/3. 1924.) SCHOTTLÄNDER

G. Analyse. Laboratorium.

Hase, *Das Pyrometer „Pyro“*. Beschreibung dieses neuen, äußerst einfachen Strahlenpyrometers u. seiner Arbeitsweise. (Sprechsaal 58. 29—30. Hannover.) Vgl. S. 124.

F. Henning, *Über die effektive Wellenlänge von Farbgläsern bei der optischen Pyrometrie*. (Vgl. S. 124.) Vf. stellt auf Grund theoret. Betrachtungen die effektive Wellenlänge eines Farbglases als Funktion der Farbtemp. des durch das Farbglas beobachteten Strahlers dar. Weiter wird eine Beziehung zwischen der effektiven Wellenlänge des Farbglases u. der effektiven Wellenlänge, die bei der Helligkeitsvergleichung zweier Strahlen verschiedener Farbtemp. anzunehmen ist, aufgestellt. Experimentell werden diese abgeleiteten Ausdrücke für die effektive Wellenlänge des Schottischen Rotglases F. 4512 bestätigt. (Ztschr. f. Physik 30. 285—96. 1924. Charlottenburg, Physikal. Techn. Reichsanstalt.) BECKER

I. M. Kolthoff und **B. D. Hartong**, *Die Antimonelektrode als Indikator für*

erstoffionen und ihre Anwendung für potentiometrische Titrationen von Säuren und Basen. Die Resultate werden besser, wenn man ein wenig Sb_2O_3 zusetzt, durch das konstante Potential rascher erreicht wird. Für gewöhnliche Titrationen ist nicht nötig, wie auch schon UHL u. KESTRANEK (vgl. Monatshefte f. Chemie 9; C. 1923. IV. 865) festgestellt haben, jedoch wenn man von der EK. auf H-Jonen-Exponenten schließen will. Während der Messung muß die Fl. gelassen werden. Nach 2 Min. ist meist der konstante Wert erreicht. Es wurden so Potentiale der Elektrode bei verschiedenen $[\text{H}^+]$ gemessen (Tabelle im Original). Die Beziehung zwischen EK. u. pH sind in alkal. u. saurer Lsg. voneinander verschieden. Theoret. ist dies vorläufig nicht zu erklären. — Für Neutralisationsrkk. ist die Antimonelektrode sehr gut bewährt. Es sind Verss. mit HCl , NaOH , H_2SO_4 , HNO_3 , HClO_4 , $\text{C}_2\text{H}_2\text{O}_4$ mit guten Resultaten gemacht worden. Die Antimonelektrode kann in vielen Fällen die H-Elektrode ersetzen. So können Alkaloidlösungen gut mit NaOH titriert werden. Auch in Fällen, wo die H-Elektrode nicht angewandt werden kann, wie in Ggw. stark oxydierender Substanzen (Dichromat , KMnO_4), wird die Antimonelektrode mit Erfolg benutzt werden können. (Rec. trav. Pays-Bas. 44. 113—20. Utrecht, Univ.)

HORST.

2. Gmelin, Über einige Anwendungen von Thermoelementen in der Meßtechnik der chemischen Großindustrie. Vf. beschreibt einen App. zur Registrierung des O_2 -Gehaltes in H_2 , N_2 u. H_2 - N_2 -Gemischen. An diesen App. werden folgende Anforderungen gestellt: 1. Selbsttätige Aufzeichnung des O_2 -Gehaltes in beliebiger Richtung. 2. Alarmanzeige beim Überschreiten eines gewissen O_2 -Gehaltes (etwa 10%). 3. Alarmanzeige bei auftretenden Störungen. 4. Brauchbarkeit des App. zur Messung des Gehaltes von Gas- u. Dampfgemischen an Bestandteilen, die miteinander reagieren können. — Das Prinzip der Versuchsanordnung besteht darin, daß die bei der Rk. auftretende Wärmetönung mittels eines Thermoelements gemessen wird. Zu diesem Zweck wird die Rk. (z. B. $2\text{H}_2 + \text{O}_2 = 2\text{H}_2\text{O}$) an einer bestimmten Stelle eines mit konstanter Geschwindigkeit strömenden Probegases durch Einleiten eines dieser Rk. beschleunigenden Katalysators eingeleitet u. die Erhitzung des Katalysators mittels Thermoelements gemessen u. registriert. Dabei müssen der Katalysator u. das Thermoelement so konstruiert sein, daß beide in stets wieder regenerierbarer Form erhalten werden. Vf. konstruiert nach diesem Prinzip einen App. zum Nachweis von Spuren von O_2 im Elektrolytwasserstoff, in N_2 - H_2 -Gemischen u. in N_2 , welcher nach dem Lindeverf. hergestellt wurde. Im letzten Fall wird zur Vermeidung des Eintritts der Knallgasrkk. dem Probegas vorher H_2 zugemischt. Als Katalysator wird reines Pt verwendet, welches auf die Lötstelle des Thermoelements aufgeschlagen ist. Die Messung erfolgt in der Weise, daß das Gas durch zwei Rohre geleitet wird, welche mittels eines elektr. Ofens auf dieselbe Temperatur gebracht sind. In dem einen dieser Rohre befindet sich ein Thermoelement mit Katalysator, in dem anderen ein zweites gleich empfindliches Thermoelement ohne Katalysator. Beide werden gegeneinander geschaltet, so daß bei Abwesenheit von O_2 keine Rk. gemessen werden kann. — Weiter wurde vom Vf. ein selbstregistrierender Heizwertmesser für brennbare Gemische konstruiert, bei dem ein Thermoelement die Wärmestrahlung, welche von dem in Luft brennenden Gasgemisch ausgesandt wird, mittels einer empfindlichen Thermosäule gemessen u. dadurch der Heizwert registriert wird. Durch eine Anzahl von Verss. wurde die Abhängigkeit der Gesamtstrahlung von der Zus. u. vom Heizwert des brennenden Gasgemisches untersucht. Dabei wurden Gase untersucht, wie sie in techn. Gasgemischen vorkommen, u. zwar H_2 , CO , Wassergas, sämtliche mit H_2 oder CO_2 verdünnt. In den meisten Fällen ergab sich eine Proportionalität zwischen Zus. des Gemisches u. Heizwert. Sendet jedoch die brennende Flamme eine selektive Strahlung aus, dann erweist sich die gemessene Gesamtstrahlung vom Heizwert unabhängig.

Um solche Unstimmigkeiten, welche von einer selektiven Strahlung der Flamme herrühren könnten, zu vermeiden, wird ein „Strahler“ von geringer Wärmekapazität wie etwa ein Porzellanröhrchen, in die Flamme gebracht u. dessen Wärmestrahlung gemessen. Dadurch wird außerdem die Empfindlichkeit der Methoden gesteigert. Methode wird an Heizwertbest. von Generatorgas, dem wechselnde Mengen Wassergas beigemischt worden waren, geprüft. (Ann. der Physik [4] **76**. 198—Oppau.)

BECK

Elemente und anorganische Verbindungen.

Fr. Kühl, *Ein Schnellverfahren zur Gehaltsbestimmung von Schwefel*. titrimetr. Verf. ist in wesentlich kürzerer Zeit durchführbar als das gebräuchl. mittels Fällungsmethode. Man kocht mit abgemessener Menge n-NaOH, wodurch eine Reihe verschiedener, höherer S-Verbb. gebildet wird (1 Stde.). Nach dem kühlen vorsichtiger Zusatz von 5 ccm Perhydrol, wodurch die S-Verbb. zu Na₂S oxydiert werden. Die unverbrauchte NaOH wird mit n-HCl zurücktitriert. Nach der Gesamtgleichung: $S + 2NaOH + 3H_2O_2 = Na_2SO_4 + 4H_2O$ entspricht 1 ccm n-NaOH 16 mg S. (Ztschr. f. anal. Ch. **65**. 185—86. 1924. Kopenhagen.)

—, *Pilztötende Ammoniumpolysulfide. Verfahren zur schnellen Analyse*. 20 NH₄-Polysulfid werden auf 1000 ccm mit frisch gekochtem, dest. W. verd.; NH₄-Sulfid-S werden wie gewöhnlich bestimmt, ersterer durch direkte Titration, letzterer jodometr. Der Polysulfid-S ist die Differenz zwischen Gesamt- u. Sulfid-S. Zur Best. des Gesamt-S eignet sich ammoniakal. H₂O₂. Das Verf. besteht im allgemeinen in der Best. des NH₃ im gebildeten (NH₄)₂SO₄. 25 ccm NH₄-Polysulfid werden zu einer Mischung von 20 ccm H₂O₂ (10 Vol.-%) u. 10 ccm NH₃ (0,880) zugesetzt; man läßt einige Min. stehen, bis die Gelbfärbung verschwindet. Die Mischung wird auf ein kleines Vol. konz., bis fast alles freie NH₃ ausgetrieben ist u. dann genau mit n-Säure neutralisiert, Methylrot als Indicator; das Vol. der Säure wird notiert. Dann werden 20 ccm n-NaOH zugesetzt, die Fl. wird auf ein kleines Vol. verdampft u. das Alkali mit Säure gemessen. Die Menge Säure, die anfangs verbraucht wird, entspricht den Spuren NH₃, die nach dem Kochen zurückbleiben. Die Differenz wird von der Alkalimenge abgezogen, die zur Zers. des (NH₄)₂SO₄ nötig ist. 1 ccm n-NaOH = 0,016 g S. (Chem. Trade Journ. **76**. 76. London, Leeds & Nottingham, MURPHY & SON, Ltd.)

DIETZ

Lemarchands, *Qualitative Trennung von Ni, Co, Zn, Mn*. (Vgl. Ann. d. Chem. anal. appl. [2] **3**. 86; C. **1921**. IV. 167.) Eine die Chloride der genannten Metalle enthaltende konz. Lsg. wird in der Kälte mit KOH oder NaOH versetzt (Gesamtalkalikonz. = ca. 20%); zur lauwarmen Lsg. wird allmählich festes NaBO₂ in Überschuß gegeben, wobei sich MnO₂ u. Peroxyde von Ni u. Co ausscheiden; nach Filtrieren u. Waschen des Rückstands mit sd. W. wird im Filtrat mittels H₂S Zn nachgewiesen. Der Filtrerrückstand wird mit 20%ig. HNO₃ auf 60° erhitzt, wodurch MnO₂ ungel. zurückbleibt, im Filtrat hiervon wird nach Neutralisieren mit KOH in einem mit Essigsäure angesäuerten Teil durch Zugabe von festem NaNO₂ Kobalt als Kobaltkaliumnitrit nachgewiesen; der andere Teil der Lsg. wird tropfenweise mit KCN-Lsg. versetzt, bis der Nd. sich wieder gel. hat, dann mit überschüssiger KOH u. Bromwasser versetzt; Abscheidung von schwarzem Ni(OH)₂. — Das in HNO₃ unl. MnO₂ wird durch Schmelzen mit KOH in Manganat übergeführt. (Bull. Soc. Chim. de France [4] **35**. 1666—68. 1924. Lyon, Fac. des Sciences.)

HABERLAN

C. Mayr, *Bestimmung von metallischem Blei in Bleiglätte*. Nach der Arbeitsvorschrift der österreich. u. deutschen Pharmakopoe werden bei der Best. von metall. Pb in Bleiglätte dadurch divergierende Resultate gefunden, daß wechselnde Mengen von Pb durch die angewandte Essigsäure mitgelöst werden. Bei

edung alkal. Lösungsm. liegt die Gefahr nahe, daß bei längerer Versuchsdauer etwas Pb in Lsg. geht. Dem wurde durch Zusatz mehrwertiger Alkohole (Mannit) entgegengewirkt, wodurch der Lösungsvorgang beschleunigt wird. Man löst das Pb-haltige Oxyd mit Mannit u. NaOH, bis sich das Oxyd gel. hat. Der unl. Rückstand wird mit 1%ig. NaOH gewaschen, dann in warmer HNO_3 gel. u. das Pb als Sulfat bestimmt. Auch das im Bleioxyd des Handels in geringen Mengen enthaltene Bleisuperoxyd wird nach diesem Verf. mitgelöst. Da Verunreinigungen wie Silikate u. BaSO_4 ungel. bleiben, ist es nötig, den unl. Rückstand mit warmer HNO_3 zu lösen u. darin das Pb zu bestimmen. Die Vorprobe ist bewährt. Mannit u. NaOH greifen das metall. Pb nicht an. (Ztschr. f. anal. Chem. 65. 254—57. 1924. Liesing bei Wien.)

HORST.

Bestandteile von Pflanzen und Tieren.

Fr. Müller, Die potentiometrische Bestimmung von Alkaloiden an der Wasserstoffelektrode. Es wird am Beispiel der Titration von NH_4Cl mit NaOH die Theorie der potentiometr. Best. der Salze schwacher Basen kurz entwickelt. Die bekannten Vff. zur Best. von Alkaloiden werden krit. gewürdigt u. eigene Verss. über die Best. von Alkaloiden an der H_2 -Elektrode angegeben. Untersucht wurde das Verh. von Atropin, Cocain, Veratrin, Narcotin, Narcein, Theobromin, Morphinchlorid, Picarpinchlorid, Isopilocarpinchlorid, Kodeinphosphat, Emetinbromid u. Arecolinbromid. Aus den Potentialkurven wurde der ungefähre Wert der Dissoziationskonstanten (D. K.) abgeleitet u. zur Titration geeignete Farbstoffindikatoren (F. J.) ermittelt, mit denen Kontrolltitrationen ausgeführt wurden. Die erhaltenen Resultate sind (Gen. = Genauigkeit %):

(Gen. = Genauigkeit ‰).			
	Gen.	D. K.	F. J.
Atropin	0,6	$1,0 \times 10^{-4}$ (16,5°)	{ Azolithmin p-Nitrophenol Bromphenolblau Methylrot
Cocain	1,3	$2,5 \times 10^{-6}$ (24°)	
Veratrin	keine einheitl. Substanz		
Narcotin	1,3	$7,3 \times 10^{-9}$ (24°)	{ Methylorange Bromphenolblau
Narcein	} sehr schwache Basen; nicht titrierbar		
Theobromin	1,6 ¹⁾		Thymolphthalein
Morphinchlorid	1,4	$1,07 \times 10^{-7}$ (18°)	
Picarpinchlorid	0,7	$0,68 \times 10^{-7}$ (18°)	
Isolocarpinchlorid	1,4		
Kodeinphosphat	0,15	$0,81 \times 10^{-6}$ (16°)	Tropäolin 0 (?)
Arecolinbromid	0,9	$1,45 \times 10^{-7}$ (17,5°)	

¹⁾ Wegen Reduktionserscheinungen nicht an der H_2 -Elektrode titrierbar, wohl an glattem Pt.

(Ztschr. f. Elektrochem. 30. 587—600. 1924. Dresden, Techn. Hochsch.) HERTER.

O. Meyerhof, Bemerkung zu der Arbeit von Hirsch-Kauffmann „Zur Methodik der Milchsäurebestimmung in tierischen Organen“. Vf. weist darauf hin, daß das in Titel erwähnte Verf. (vgl. Ztschr. f. physiol. Ch. 140. 25; C. 1924. II. 2684) in allen wesentlichen Punkten mit dem früher von ihm (PFLÜGERS Arch. d. Physiol. 24. 295; C. 1924. II. 1220) beschriebenen übereinstimmt. (Ztschr. f. physiol. Ch. 1. 316. 1924.)

GUGGENHEIM.

Max Gilbert und Joseph C. Bock, Über die Bestimmung des Zuckers in geringen Mengen von Blut. Da sich gezeigt hat, daß die Verwendung von Mikropipetten verhältnismäßig beträchtliche Fehler verursachen kann, wird die Blut-

probe in einem vorher mit Mischung von NaF u. Thymol behandelten kleinen capillaren Röhrchen aufgefangen, das vorher u. nachher mittels Torsionswaage wogen wird, von da direkt in etwas W., das sich in einem kleinen Füllungsgefäß einem nach unten kon. zugespitzten Kölbchen, befindet, entleert. Die weitere Handlung erfolgt im wesentlichen nach FOLIN u. WU., die vielen Einzelheiten können hier nicht wiedergegeben werden. (Journ. Biol. Chem. **62**. 361—69. 1924. Milwaukee, MARQUETTE Univ. med. school.)

Benjamin Kramer und **I. Gittleman**, *Eine jodometrische Methode zur Bestimmung von Natrium in kleinen Mengen von Serum*. Der nach KRAMER u. TISDALL (Journ. Biol. Chem. **46**. 467; C. **1921**. IV. 229) abgeschiedene Nd. von Natrium pyroantimoniat wird zentrifugiert, einmal mit 30% ig. A. gewaschen, dann in H. gel., mit KJ-Lsg. behandelt u. das freigewordene J. mit $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ titriert. (Journ. Biol. Chem. **62**. 353—60. 1924. Baltimore, JOHNS HOPKINS-UNIV.)

G. Leendertz, *Beitrag zur Untersuchung der Serumweißkörper. Erwiderung auf die Arbeit von W. v. Frey*. (Vgl. Biochem. Ztschr. **148**. 53; C. **1924**. II. 88.) v. FREYS Einwürfe gegen die Feststellung des Vf. (vgl. Klin. Wchschr. **2**. 7. C. **1923**. II. 1237), daß durch Gerinnung von Plasma erhaltenes Serum mehr Eiweiß enthält als in üblicher Weise bei der Blutgerinnung gewonnenes Blutserum, sind nicht berechtigt. (Biochem. Ztschr. **150**. 494—95. 1924. Königsberg, M. Klin.)

Ed. Moreau, *Anwendung der Opacimetrie in der Eiweißdiagnose. Bestimmung des Eiweiß in den Serumflüssigkeiten*. Man bestimmt den Gesamteiweißgehalt eines Körperfl. opacimetr., indem man 1 ccm Fl. in ein bei 100 ccm geeichtes Glas gibt, ca. 2 g NaCl oder Na_2SO_4 zuzufügt, mit dest. W. auf 100 ccm verd., in einem Glas von demselben Durchmesser 2 ccm der ebenso behandelten Fl. verd. u. bis zum Sieden erhitzt, 0,2 ccm Trichloressigsäure (25%) zusetzt, mischt, 10 Min. absetzt, läßt u. die erhaltenen Trübungen Seite an Seite vergleicht, indem man die Gläser gegen ein beschriebenes Papier hält. Die Resultate werden mit denen von Lsg. mit bekanntem Eiweißgehalt verglichen. (Bull. Sciences Pharmacol. **31**. 632—633. 1924. Saint-Germain-en-Laye.)

A. Pfefferkorn, *Über die Lanzsche Indicatorenmethode zur Aciditätsbestimmung im Magensaft*. Vf. hat in seiner Dissertation (Halle 1922) die Ergebnisse nach der Lanzschen Methode (vgl. Arch. f. Verdauungskkrankh. **27**. 282; C. **1921**. IV. 88) an 100 Magensäften verglichen mit den Säurewerten, die sich nach den üblichen Titrationmethoden ergeben, u. versucht die betreffenden Werte mit der jeweiligen Pepsinverdauungsfähigkeit der einzelnen Säfte (Best. nach FULD) in Beziehung zu setzen. Diese Vergleiche führten zu folgenden Feststellungen: 1. Die aktuelle Acidität ist kleiner als die bei Titration gegen Phenolphthalein, im allgemeinen auch kleiner als die gegen Kongo bzw. nach TÖFFER bestimmte freie Acidität. 2. Die aus der Differenz von Gesamt- u. aktueller Acidität gewonnene potentielle Acidität ist bei den schwachen Säuren (Milchsäure) u. säurebindungsfähigen Substanzen (Eiweiß, Schleim u. a.) enthaltenden Säften relativ hoch. — 3. Die Werte von potentieller u. gebundener Acidität laufen annähernd parallel. — 4. Die nach der jodometr. Methode gewonnenen Werte sind im allgemeinen kleiner als die Phenolphthaleintitrationsergebnisse, größer als die Werte der aktuellen u. freien Acidität. — 5. Die Schwankungen der Gesamtsäure werden durch die pH -Zahlen nur in den größten Zügen wiedergegeben, indem sich im Bereiche von 80—30 Gesamtsäure vorherrschend pH -Werte von 1,5, bei 30—8 meist solche von 0,365 finden. Nach bei kongonegativen Säften steigt mit zunehmender Gesamtsäure von 0—41 auf die aktuelle Acidität von 0—0,0120% HCl ($\text{pH} = 7-3,5$) unabhängig von den zugehörigen Werten an fehlender Säure. — 6. Die Edestinwerte bewegen sich im Intervall $\text{pH} = 1,5-3,5$ unabhängig von der jeweiligen pH -Zahl. Die höchsten

bei $p_H = 1,5-2,0$, doch fehlte auch hierbei einigen Säften die Verdauungs- u. fand sich bei $2,0-3,5$ noch Eiweißverdauung, mehrfach mit höheren als bei jener „physiol.“ Acidität. Jenseits $p_H = 3,5$ waren alle Edestin negativ. — 7. Kongo schlägt bei geringerer $[H^+]$ um als TÖFFERS Reagens. Die Lantzsche Methode hat danach für die Diagnostik des patholog. Magendistonus keinen Fortschritt gebracht. Ihr überlegen ist die Indicatorenmethode MICHAELIS infolge der feiner abgestuften Säurewerte. Aber auch sie nützt mehr als die alten Titrationsmethoden, so lange entsprechende Krankheitsbilder klin. nicht bekannt sind. Eine Überfeinerung der Säurebestimmungsmethoden ist Vf. um so mehr ab, als Säuregehalt u. Pepsinwerte, wie gezeigt, nicht parallel gehen. Für prakt. Zwecke wird Beobachtung der Stärke des Farbenumschlages Kongo- u. rotem u. blauem Lackmuspapier als genügend erachtet. (Zentralblatt n. Med. 46. 73—77. Zwickau, Staatl. Krankenstift.) SPIEGEL.

James B. Sumner, unter Beihilfe von **Charles V. Noback**, *Die Bestimmung des Zuckers im diabetischen Harn unter Anwendung von Dinitrosalicylsäure*. Bei dem Verf. von SUMNER u. GRAHAM (Journ. Biol. Chem. 47. 5.; C. 1921. IV. 772) ist die Lsg. von O_2 im Reagens, der einen Teil des Zuckers zerstören kann, weitgehend verhindert durch Zugabe einer reichlichen Menge Seignettesalz, wodurch bei kleinen Zuckermengen auch die Intensität der Färbung erheblich gesteigert wird. Dinitrosalicylsäure (880 ccm 1%ig. Lsg.), NaOH (300 ccm 4,5%ig. Lsg., frei von Na_2CO_3) u. Seignettesalz (255 g) werden zu einem in gut verschlossenem Gefäße unbegrenzt haltbaren Reagens vereinigt, von dem 3 ccm mit dem Harn 5 Min. in sd. W. erwärmt werden. Als Dauerstandardlsg. dient Lsg. von Dinitrosalicylsäure mit Ferriammoniumalaun. (Journ. Biol. Chem. 62. 287—90. Ithaca, CORNELL Univ. med. coll.) SPIEGEL.

M. Caudière, *Einfache Technik für Imprägnierung der Bindegewebsfasern mit Silber*. Genaue Vorschrift für ein Verf., dessen einzelne Phasen in Kürze folgende sind: Befreien der entparaffinierten Paraffinschnitte von jeder Spur des Fixierungsmittels, gründliches Waschen mit W. (wenigstens 1 Stde.), Beizen mit Tanninlsg., Waschen (10—15 Min.) mit dest. W., Behandlung mit frisch bereiteter u. filtrierter ammoniakal. $AgNO_3$ -Lsg. 2—12 Stdn. im Dunkeln, Waschen mit dest. W. 10 Sekunden, Einlegen in Formollsg. 1:4, Waschen, Behandeln mit Cajalscher Viragefl. bis zu dunkelgrauer oder dunkelgrauer Färbung, dann 1 Minute mit 5%ig. $Na_2S_2O_3$ -Lsg., abschließendes Waschen, Entwässern usw. (C. r. soc. de biologie 92. 83—85. Marseille.) Sp.

Alfred Marchionini, *Die Schellackreaktion. Eine neue klinische Kolloidreaktion auf Liquor cerebrospinalis*. Abweichend von einer Angabe von URECHIA u. DANETZ wird als Stammlsg. ein nach 24-std. Einw. filtrierter Auszug von Schellack mit der 10fachen Menge absol. A. verwendet, von der zum Gebrauche auf 8 cm absol. A. 2 cm gegeben werden, worauf das Gemisch langsam in 40 ccm redest. W. eingedampft wird; nach 10 Min. Reifezeit ist diese Lsg. gebrauchsfertig u. hält sich in gutem Verschuß 4—6 Wochen. Sie wird zur Prüfung mit der gleichen Menge Liquor versetzt. Bei n. Liquor bleibt das Gemisch in der Durchsicht völlig klar, in der Aufsicht leicht opaleszierend, bei patholog. werden 4 Grade der Verdickung unterschieden, die auf Teilchenvergrößerung des elektronegativen Schellackkolloids durch positiv geladene (Euglobuline) bezogen werden. (Klin. Wchschr. 4. 21—12. Leipzig, Univ.) SPIEGEL.

Otto Warburg, *Verbesserte Methode zur Messung der Atmung und Glykolyse*. Bisher fehlt eine Methode zur manometr. Messung der Atmung bei Ggw. freier O_2 u. eine zur manometr. Messung der Glykolyse bei Ggw. von O_2 . Eine solche Methode wird beschrieben. Sie beruht auf der Tatsache, daß CO_2 in W. leichter löslich als O_2 , sowie auf der Anwendung der Gasgesetze u. des Henri'schen Ver-

teilungssatzes. (Biochem. Ztschr. **152**. 51—63. 1924. Berlin-Dahlem, Kaiser WILHELM Inst. f. Biol.)

J. Barnewitz, *Die Tuschkulturmethode als Verfahren zur Untersuchung der wicklungshemmender und entwicklungsfördernder Mittel*. Die von BURRI angegebene seitdem weiter ausgearbeitete (vgl. ADELMANN, Zentralblatt f. Bakter. u. Parasiten I. Abt. **88**. 401; C. **1923**. I. 609) Methode wurde benutzt, um Geschwindigkeit der Art des Vermehrungsvorganges von *Staphylokokken* u. *Bact. coli* zu untersuchen a) unter dem Einfluß hemmender Substanzen, b) unter dem Einfluß wachstumsfördernder Konzz. von A. u. K-Arsenit. Mit $HgCl_2$ konnte bei Konzz. von 1 : 500 000 bis 1 : 10 000 000 keine fördernde Wrkg. festgestellt werden. (Ztschr. Hyg. u. Infekt.-Krankh. **104**. 81—90. Kiel, Univ.)

Noel Fiessinger und **Castéran**, *Die direkte Diazoniumreaktion als Grundriss für die Klassifikation der Ikterusarten*. Die Verzögerung der Rk. hängt nach Verh. der Vff. viel mehr von der Eiweißkonz. u. der Temp. ab als vom Bilirubin-gehalt des Blutes. (C. r. soc. de biologie **92**. 71—73. Clin. méd. du Collège de France, Paris.)

A. Kircher und **F. v. Ruppert**, *Arsenbestimmungsmethode für Salvarsan und seine Abkömmlinge*. Das früher (Ber. Dtsch. Pharm. Ges. **30**. 419; C. **1921**. 684) gegebene Verf. zur Best. des As im Neosalvarsan wird vereinfacht. Der As-Gehalt im Salvarsan, Salvarsan-Na, Neosalvarsan u. Sulfoxyl-Salvarsan wird einfach ermittelt: 0,25—0,3 g Substanz bringt man durch Differenzwägung in einen Hartglasrundkolben, dem eingeschliffen ein spitzwinkelig abwärts gebogenes, mit etwas W. beschickte Kugelvorrage tragendes Kugelrohr angeschlossen ist, mineralisiert durch Kochen mit 20 ccm H_2SO_4 u. 15 g gepulvertem K_2SO_4 . Wenn die Fl. nach 2—3 Stdn. farblos geworden ist, läßt man erkalten, spült den Inhalt des Kugelrohres u. der Vorlage mit insgesamt 200 ccm W. in den Kolben zurück u. erhitzt 10 Min. lang zum Sieden, um SO_2 zu vertreiben. Nach dem Abkühlen wird die farblose Lsg. in einen Meßkolben (250 ccm) umgegossen u. unter NaOH-Spülen mit W. zur Marke ergänzt. 100 ccm davon werden mit 1 g $KBrO_3$ u. 1 Tropfen Methylorange (0,1%) versetzt u. nach GIÖRY mit $\frac{1}{10}$ -n. $KBrO_3$ -Lsg. (2,7837 g $KBrO_3$ im l) titriert, bis Rotfärbung eben verschwunden ist. Zweckmäßiger führt man nebenbei einen blinden Vers., d. h. ohne Salvarsan usw. aus, um sich von der As-Freiheit der H_2SO_4 u. des K_2SO_4 zu überzeugen; die event. verbrauchten Mengen $KBrO_3$ werden abgezogen. 1 ccm $\frac{1}{10}$ -n. $KBrO_3$ = 0,003748 g As. — Zur Ermittlung des As-Gehaltes im Silber- u. Neosilbersalvarsan werden zunächst, wie bei Salvarsan, 0,25—0,3 g mit 20 g H_2SO_4 u. 15 g K_2SO_4 mineralisiert; sobald die Lsg. farblos, spült man den Inhalt der Vorlage u. des Kugelrohres mit wenig W. und Abkühlung in den Kolben zurück, fügt 2 ccm n. HCl zu u. filtriert in einen Stehkolben von 500 ccm. Darauf spült man Rundkolben u. Filter mit W. nach, bis der Stehkolben etwa zur Hälfte gefüllt ist. Nunmehr wird die Fl. 10 Min. lang zum Sieden erhitzt u. in einen Meßkolben (250 ccm) umgegossen. Davon werden 100 ccm zur Titration mit $KBrO_3$ -Lsg. angewendet, wie bei Salvarsan angegeben. (Arch. der Pharm. **262**. 613—14. 1924. Höchst a. M., Labor. MEISTER LUCIUS & BRÜNING.)

Ph. Bretin und **A. Leulier**, *Versuche zur Erkennung von Drogen durch Fluorescenz*. Mit Hilfe einer Quarzlampe GEORGES, Modell GALLOIS, (Hg-Bogen 100 Ar), deren Licht durch 2 Pyrexglasplatten filtriert ist, kann man Guajakharz, Kolophon, Terpentine, Benzoe, Aloe, Rhabarber, Rhapontika, Faulbaumrinde, Sagradarinde, Chinarinde usw. erkennen. Die Unterschiede werden beschrieben. (Bull. Sciences Pharmacol. **31**. 630—31. 1924. Lyon, Faculté de Med. et de Pharm.)

H. Angewandte Chemie.

I. Allgemeine chemische Technologie.

—, *Rührwerksantrieb*. Die Zahnradübertragung läuft in einer geschlossenen Welle in Öl. (Chem. Metallurg. Engineering **31**. 589. 1924.) JUNG.

—, *Verbesserungen des Vakuumtrommeltrockners*. (Vgl. S. 420.) Bei dem Trockner die Fl. durch eine Rolle gegen die Trockentrommel gesprüht, wodurch sich die Dicke des entstehenden Häutchens genau einstellen läßt. Das getrocknete Material erhält eine höhere D. (Abbildung des App. im Original). (Chem. Metallurg. Engineering **31**. 589—90. 1924.) JUNG.

—, *Verbesserungen bei rotierenden Trockentrommeln und rotierenden Öfen*. Bei Dichtungsring Patent HAAS werden durch 3 Gleitflächen die Längenausdehnung, u. u. Abbewegungen u. Schlingerbewegungen ausgeglichen. (Chem.-Ztg. **49**. 77.) JU.

Wayne Tank & Pump Co., Fort Wayne, V. St. A., *Verfahren und Vorrichtung zur Zuführung von Flüssigkeiten* in im wesentlichen gleichförmigen Beschickungen, u. d. gek., daß an der Einlaufseite eines Kolbens in einem Kanal oder einer Kammer, durch die die Fl. strömt, abwechselnd eine Erhöhung bezw. Verringerung des Druckes hervorgerufen wird. — 2. bestehend aus einem senkrechten Zylinder, der einen lose eingepaßten, frei schwimmenden Kolben enthält, u. dessen Einlaß die Fl. sich unterhalb des Kolbens befindet, während eine Auslaßöffnung oberhalb des Kolbens angeordnet ist. (D. R. P. **408058** Kl. 12f vom 5/11. 1922, ausg. 1/1925.) KAUSCH.

Vesuvius Crucible Co., Swissvale, V. St. A., *Feuerfeste Gefäße*. Mindestens 5. Graphit u. mindestens 15% eines keram. Bindemittels enthaltende MM., z. B. Mischungen von 15—65 Teilen Graphit, 15—50 Teilen Ton u. 5—15 Teilen eines kohlhaltigen Stoffes, welche auch noch Al_2O_3 , SiC_2 , ZrO_2 u. Flußmittel wie Soda oder Magnesit enthalten können, werden geformt u. bei mehr als 1100° gebrannt. (E. P. **223986** vom 31/7. 1923, ausg. 27/11. 1924.) KÜHLING.

Continuous Centrifugal Separators Limited, Johannesburg, Südafrika, *Schleudertrommel mit zwei Schalen, die an ineinander verschieblichen Wellen befestigt sind*, u. d. gek., daß die Hohlwelle u. die innere Welle durch Kniegelenke verbunden sind, welche in gestrecktem Zustand die Schalen geschlossen halten, u. daß die Hohl- oder eine ähnliche Schubvorr. vorgesehen sind, welche die Wellen zusammen- u. auseinander bewegen u. nach dem Aufsetzen der Hohlwelle auf einen Anschlag o. dgl. die Kniegelenke mittels an den Knien angreifender Spreizhebel ausklicken. (D. R. P. **44983** Kl. 82b vom 19/9. 1919, ausg. 19/1. 1925. E. Priorr. 12/10. 1917 und 2/1918.) KAUSCH.

Robert Alexander Sturgeon, Chapeltown, Engl., *Trennschleuder, bei der ein rotierender Hilfsboden durch Flüssigkeitsdruck in Richtung der undurchbrochenen Trommelwand beweglich ist*, u. d. gek., daß die Fl. drucklos durch die Hohlwelle in den durch den Trommelboden u. Hilfsboden gebildeten Zwischenraum eingeleitet u. daß ein nachgiebig an der Trommelwand gelagerter Deckel am Ende des Hubes durch den Hilfsbodens durch Vorsprünge an ihm angehoben wird. Zwei weitere Ansprüche kennzeichnen Ausführungsformen der Trommelschleuder. (D. R. P. **408339** Kl. 82b vom 9/3. 1920, ausg. 15/1. 1925. E. Priorr. 23/10. 1923.) KAUSCH.

United Filters Corporation, New York, V. St. A., *Saugfilter mit auf einer rotierenden Welle aufgereihten Saugfilterscheiben*, u. d. gek., daß für jede Filterscheibe ein besonders leicht auswechselbarer Trog vorgesehen ist. — 2. u. d. gek., daß am äußeren Rande des Troges oberhalb des Flüssigkeitsspiegels zwei Schlitzrohre liegen,

die der Filterscheibe die zu filtrierende Fl. auf beiden Seiten zuführen. (D. R. P. 407770 Kl. 12d vom 27/6. 1920, ausg. 8/1. 1925. A. Prior. 24/5. 1917.) KAUSCH

Marvin Pipkin, Fort Meade, Florida, *Katalytische Gasreaktionen*. Man verwendet hierbei aktive Kohle u. höheren als atmosphär. Druck. Die aktive Kohle kann man auch mit einem Metall, Metalloxyd oder beiden überziehen. (A. P. 152043 vom 29/9. 1921, ausg. 23/12. 1924.) KAUSCH

G. Schmies, Immenstadt, Bodensee, und **Deutsche Luftfilter-Bauges.**, Berlin, *Filtrieren und Trocknen von Gasen*. (E. P. 216708 vom 26/6. 1923, ausg. 26/12. 1924. — C. 1923. IV. 570.) KAUSCH.

Nya Luth & Roséns Elektriska Aktiebolag, Stockholm, *Trockentrommelanlage*. Die Vorr. besteht aus mehreren gleichachsigen in einander angeordneten drehbaren Trommeln, in deren innere das Getreide eingeführt u. durch die Trommel im Zickzack geführt wird, u. zwar im Gegenstrom zu einem von einem Gebläs durch die Trommeln geführten u. von einem außerhalb liegenden Wärmeerzeuger erhitzten Luftstrom. Hierbei sind die in dem eigentlichen Trockenabteil befindlichen, für die Hindurchführung des Gutes bestimmten Trommeln mit zwischen ihnen liegenden Trommeln für das Durchströmen der trocknenden Luft versehen, welche nur für sich miteinander in Verb. stehen, so daß die Wärmeüberführung mittelbar durch die Wände der Trommeln erfolgt, ohne daß die Warmluft direkt mit dem Getreide in Berührung kommt. (D. R. P. 403632 Kl. 82a vom 20/12. 1922, ausg. 1/10. 1924.) OELKER.

François Noël Halary, Paris, *Trockenvorrichtung*. Um bei der Vorr. nach dem Hauptpat. eine leichte Regelung der Wärme in den Kammern oder Behältern die das Trockengut enthalten, zu ermöglichen, wird einerseits die Wärmequelle unter der unteren Saughaube des Zugrohres angeordnet u. mit einem Schieber versehen, mittels dessen die unmittelbare Verb. der Wärmequelle mit der Saughaube versperrt oder freigegeben werden kann. Andererseits ist die Wärmequelle mit einem Heizraum verbunden, der im unteren Teil der Trockenvorr. angeordnet ist u. unter der Saughaube mündet, so daß die Heizgase der Wärmequelle je nach der Stellung des Schiebers ganz oder teilweise in den Heizraum oder unmittelbar in das Zugrohr gelangen. (D. R. P. 406763 Kl. 82a vom 15/3. 1923, ausg. 1/12. 1924. Zus. 2 D. R. P. 379087; C. 1923. IV. 571.) OELKER.

Paulin Pasquet, Frankreich, *Destillation*. Man arbeitet in einem Kreislauf unter Verwendung einer Hilfsfl., deren Kompressionswärme die für die Dest. erforderliche Wärme liefert u. deren Expansionskälte zur Kondensation der Dämpfe dient. (F. P. 576584 vom 2/2. 1924, ausg. 22/8. 1924.) KAUSCH.

Maurice Charpentier und **Henri Louis Jules Tailleur**, Frankreich, *Destillation Reinigung-Rektifikation*. Man arbeitet unter Druck, um die Differenz der Dampfspannungen der zu trennenden Flüssigkeitsdämpfe (z. B. W. A., Aceton, Ä. usw.) zu erhöhen. (F. P. 576824 vom 6/2. 1924, ausg. 27/8. 1924.) KAUSCH.

Ernst Jung, Deutschland, *Vorrichtung zur Erzielung fester Körper aus Flüssigkeiten, wie Blut, Sirup, Mutterlaugen, Lösungen usw.* Man verwendet zur Verdampfung oder Abkühlung der Fl. Vorr., die durch Trennwände in einzelne Abteilungen geteilt sind. (F. P. 577014 vom 9/2. 1924, ausg. 29/8. 1924.) KAUSCH

Ernst Flammer und **L. Christian Kelber**, Heilbronn a. N., *Darstellung der Oxydationsprodukte von Kohlenwasserstoffen* aus diesen durch Behandlung mit u. oder sauerstoffhaltigen Gasen in Ggw. eines Katalysators bei erhöhter Temp., dadurch, daß Manganresinate als Katalysator dienen. — Es wird gegenüber der bekannten Verwendung von stearinsäurem Mn als Katalysator eine wesentliche Beschleunigung der Oxydation erzielt. (D. R. P. 406866 Kl. 12° vom 22/5. 1919, ausg. 29/11. 1924.) OELKER.

Arthur Beckett Lamb, V. St. A., *Katalysatoren*, bestehend aus Gemischen von Fe_2O_3 u. einer Anregersubstanz (Alkali-, Al- oder Si-Oxyd). (F. P. 576680 vom 29/1. 1924, ausg. 25/8. 1924.) KAUSCH.

Silica Gel Corporation, Baltimore, Maryland, übert. von: **Walter A. Patrick**, Baltimore, *Adsorptionsmaterial und katalytische Oxyde*. Man mischt unter Umrühren 1. Salz eines Metalls, dessen Hydroxyd unl. in W. ist (z. B. ein Fe-Salz) u. eine Lsg. eines l. Alkalis solcher Konz., daß das Gemisch schwach alkal. ist, hält es einer Temp. nicht über 10° , wäscht u. trocknet den gelatinösen Nd. (A. P. 120305 vom 1/7. 1921, ausg. 23/12. 1924.) KAUSCH.

III. Elektrotechnik.

C. Elliott, *Elektrolytische Darstellung von NaOH. Eine vergleichende Studie der Zellenmuster und Leistungsfähigkeit. II. Zellen vom Diaphragmatyp. III. Zellen in Quecksilber- und geschmolzenem Salztyp. IV. Die Hauptgesichtspunkte bei der Wahl der Zelle. V. Das Muster einer Diaphragmazellenanlage. VI. Die Verdampfung des Zellenausflusses.* (Forts. von Chem. Trade Journ. 75. 91; C. 1924. II. 1725.) (Chem. Trade Journ. 75. 123—24. 151—53. 211—13. 239—40. 327—28. 357—58. 47—88. 515—16. 671—72. 1924.) GOTTFRIED.

Walter Cordes, *Die Weitschirmisolatoren*. Entstehung, Überschlagswerte, Durchschlagsfestigkeit, Spannungsverteilung, mechan. Festigkeit, Stützhöhe, Abnutzung, Beschaffenheit des Porzellans, Temperatursturzprüfung, Wetterbeständigkeit, Reinigung der Isolatoren. (Keramos. 3. 559—67. 1924. KRONACH. Sep.) WE.

C. Woodburn, *Vergleich von aus verschiedenen Holzarten hergestellten Akkumulator-separatoren*. Untersucht wurden Separatoren aus verschiedenen Holzarten in ihrem Verh. gegen sd. 2%ig. NaOH; die Abnahme der Alkalität der Lsgg. wurde gemessen. Ferner wurde die Permeabilität der Separatoren für H_2SO_4 bestimmt. (Trans. Proc. Roy. Soc. Canada [3] 18. Sekt. III. 123—24. 1924.) ZANDER.

G. Frederick Smith und **C. E. Hollister**, *Ein neuer Stromunterbrecher für Laboratoriumsthermostaten*. Es handelt sich um ein prakt. elektr. Gerät mit Ag-Kontakten von möglicher Reinheit, um die B. von Ag_2O , welches schlecht leitet, auszuschalten. Einzelheiten ergeben die Bilder des Originals. (Ind. and Engin. Chem. 16. 1162—63. 1924. Urbana [Ill.]) GRIMME.

Emil Piffner, Budapest, *Herstellung von Metallüberzügen auf Dielektrika*, bei welcher AgNO_3 oder andere Metallsalze ($\text{Cu}[\text{NO}_3]_2$, $\text{Hg}[\text{NO}_3]_2$ usw.), z. B. in einer Mischung von W., A. u. Aceton auf den Dielektrikum haftbar aufgebracht sind, so daß, gek., daß das AgNO_3 bzw. die anderen Metallsalze durch Zusammenbringen mit einer Chloridlsg. in AgCl bzw. die andere Metallchloride übergeführt u. sodann durch Red. mit Zn oder die Metallsalze unmittelbar durch Red. mit Zn vorteilhaft in Walzenform in H_2SO_4 zu Metall reduziert werden. — 2. dad. gek., daß die Zinkwalzen in einem schwefelsauren Galvanisierungsbad (Cu , Ag , Ni usw.) an die Anode, das metallisierte Dielektrikum an die Kathode geschaltet werden, so daß weiteres Metall auf dem Dielektrikum niedergeschlagen wird. — Als Dielektrikum kann Cellon oder Celluloid verwendet werden. (D. R. P. 407888 Kl. 21g vom 25/4. 1923, ausg. 1/12. 1924.) KÜHLING.

André Marinot, Frankreich, *Als Detektoren für Radiozwecke geeignete Mischungen*. Ein gepulverter silberhaltiger oder mit Silber vermischter Bleiglanz wird mit Se, Te oder S u. einem Metall der Platingruppe, welches komplexe Blei- oder Silberselenide, Telluride oder -sulfide bildet, z. B. Rh, Ir, Pt, Pd, Os o. dgl. gemengt, mehrere Stdn. auf 1320° erhitzt u. dann so langsam abgekühlt, daß der Temperaturabfall je Stde. 10° beträgt. Besonders wirksam sind Mischungen, welche Os neben einem anderen

Metall der Platingruppe enthalten. (F. P. 576371 vom 26/1. 1924, ausg. 20/1924.) KÜHLING.

Deutsche Maschinenfabrik A.-G., Duisburg, *Vorrichtung zur Abdichtung der Elektroden von elektrischen Schmelzöfen*, die aus einem doppelwandigen Zylinder besteht, in dessen mit Kühlwasser gefüllten Ringraum eine dicht an der Elektrode befestigte Haube taucht, dad. gek., daß der obere Abfluß des Kühlwassers aus dem Ringraum des doppelwandigen Zylinders innerhalb der eingetauchten Abschlußhaube erfolgt. — Die bei bekannten ähnlichen Vorr. eintretende Verdampfung des Kühlwassers u. die dadurch bedingte Schädigung des Bades wird vermieden. (D. R. P. 407560 Kl. 21 h vom 21/3. 1924, ausg. 29/12. 1924.) KÜHLING.

Seizo Katatani, Yokohama, und **Kengo Idzumi**, Tokio, *Elektrische Widerstandsmasse*, dad. gek., daß Eisenlegierungen in Pulverform mit einem feuerfesten Bindemittel (Ton, Magnesit u. dgl.) gemischt u. zu geeigneter Form geknetet u. einer Temp. von 1500—1600° unterworfen werden. — Die Erzeugnisse sind zur Verwendung in elektr. Öfen, Blitzableitern u. dgl. geeignet. (D. R. P. 407880 Kl. 21 vom 24/4. 1923, ausg. 30/12. 1924.) KÜHLING.

Rütgerswerke-Aktiengesellschaft, Deutschland, *Kohlenelektroden*. Als Rohstoffe werden durch Schaumschwimmverf. gewonnene aschearme Anteile beliebiger Kohlen, wie geringwertiger Anthrazite, Schlamm von der Kohlenwäsche u. dgl. verwendet, diese mit einem Bindemittel gemischt, zu kleinen Stücken gepreßt, verkocht, dann zu Stücken von der bei der Herst. von Kohlelektroden üblichen GröÙ zerkleinert u. geformt. (F. P. 575641 vom 10/1. 1924, ausg. 2/8. 1924. D. Prior. 13/2. 1923.) KÜHLING.

Otto Kurz, Gelsenkirchen und **Elektrische Gasreinigungs-G. m. b. H.**, Charlottenburg, *Von hängenden Ketten getragene Sprühelektrode für elektrische Gasreinigungsanlagen*, dad. gek., daß zwischen den Ketten dünne Drähte gezogen sind. (D. R. P. 408341 Kl. 12e vom 1/2. 1922, ausg. 15/1. 1925.) KAUSCH.

Max Zeiler, Berlin-Treptow, *Trockenelement nach Patent 403060*, 1. dad. gek., daß der zur vorläufigen Aufnahme des pastenförmigen Elektrolyts bestimmte Raum in Gestalt eines in den Zinkzylinder des Elementes einpassenden, von ihm getrennten Zylinders aus beliebigem Material ausgebildet ist. — 2. dad. gek., daß der pastenförmige Elektrolyt in einem besonderen, von dem Zinkzylinder des Elementes getrennten u. in diesen hineinpassenden Zinkzylinder untergebracht wird, der zur Inbetriebsetzung des Elements in den Zinkzylinder des Elektrolyts hereingeschoben wird. — Der Nachteil der Vorr. gemäß dem Hauptpatent, eine größere als die übliche Länge des Zinkzylinders zu erfordern, wird vermieden. (D. R. PP. 406344 vom 7/12. 1921 u. 406344 vom 14/6. 1922, Kl. 21b, ausg. 22/11. 1924. Zuss. z. D. R. P. 403060; C. 1925. I. 745.) KÜHLING.

Louis de Montmorency Cattley, Llandaff, England, *Sammlerplatten*. PbSO₄ u. ein Bleioxyd, zweckmäßig PbO, z. B. in gleichen Mengen, werden mit etwa 20% gekochter u. gedämpfter Kartoffeln innig gemischt u. mittels H₂SO₄ von 1,2 D. zu steifem Brei angerührt. Dieser wird etwa 2—3 Wochen lang getrocknet, dann in Papier eingeschlagen, dicht in Ruß verpackt, innerhalb dreier Stdn. auf 100°, dann rascher auf 525—550° erhitzt, etwa 3 Stdn. bei dieser Temp. erhalten, dann allmählich abgekühlt u. gereinigt. Die Elektroden sollen sehr haltbar sein u. gute Stromausbeute geben. (A. P. 1516373 vom 31/12. 1921, ausg. 18/11. 1924.) KÜHLING.

Diamond State Fibre Company, übert. von: **John M. Taylor**, Bridgeport V. St. A., *Membranen für Fernsprecher u. dgl.* Zellstoffbrei wird mit etwa 30% Eisenfeilspänen gemischt, die M. zu einheitlichen Blättern geformt u. diese, gegebenenfalls als Zwischenlagen innerhalb eisenfreien Papiers angeordnet, das Erzeugnis pergamentiert, mit l. synthet. Harz getränkt u. letzteres durch Erhitzen unter Druck gehärtet. (A. P. 1514406 vom 23/1. 1924, ausg. 4/11. 1924.) KÜHLING.

V. Anorganische Industrie.

de Jussieu, *Entwicklung der Herstellung von Schwefelsäure nach dem Blei-
verfahren in den letzten Jahren.* Zusammenfassende Besprechung. Im vor-
den Teile wird an Hand statist. Angaben, die die Herkunft des erforderlichen
Rohschwefel u. in Pyriten u. Blenden enthaltener S, u. deren Aufarbeitung
(ang) erörtert. (Ind. chimique **11**. 530—33. 1924.) RÜHLE.

J. Stavorinus, *Das synthetische Ammoniak.* Es werden die Verfahren nach
R u. CLAUDE einander gegenübergestellt u. deren Vor- u. Nachteile besprochen.
Gas **45**. 17—23. Amsterdam.) K. WOLF.

J. M. Smith und G. E. Miller, *Einfluß von Quecksilber und anderen Ver-
unreinigungen auf den Verlauf der Oxydation von Arsentrioxyd durch Salpetersäure.*
Amumarseniat wird technisch aus CaO u. As_2O_3 unter Oxydation des letzteren
it INO_3 hergestellt. Hierbei treten nach Verss. der Vf. leicht Verluste ein, wenn
el. Verunreinigungen, vor allem Hg-Salze vorhanden sind, welche als negative
alysatoren wirken. Es genügen schon 0,01% Hg. Als Gegenmittel werden
erge Zusätze von HCl, HBr oder HJ empfohlen. (Ind. and Engin. Chem. **16**.
16—71. 1924. Washington [DC.]) GRIMME.

Lucien Maugé, *Die Stellung des Wasserstoffs in der neuzeitlichen Industrie.* Vf.
tört die Bedeutung des H für die Industrie der Ggw. u. die Umsetzungen, die
r it O, C u. N erfährt, an Hand einer graph. Darst., die die großen Zusammen-
hänge ihrer Art u. Menge nach anschaulich macht. (Ind. chimique **11**. 538—40.
92.) RÜHLE.

Ernst Kordes, *Untersuchungen über die Ursache der Rotfärbung des technischen
Magnesiums.* (Vgl. C. L. REIMER, Kali **6**. 533 [1912].) Farblose oder schwach
geliche Lauge von Magnesiumchlorid wird beim Erkalten oder erst später rot-
färbt oder ähnlich gefärbt. An der Luft verschwindet die Färbung nach längerem
Verweilen wieder. Durch Verss. stellt Vf. fest, daß der Wassergehalt, welcher durch
die Siedetemp. feststellbar ist, einen großen Einfluß auf das Auftreten der Färbung
hat. In jedem roten Salz läßt sich neben Fe^{+++} immer Fe^{++} nachweisen,
weshalb sich hier als äußerst beständig gegen verschiedene stärkere Oxydations-
mittel erweist. Eine weitere wichtige Rolle spielt die Anwesenheit von MgO. Es
gelängt Vf. unter Berücksichtigung des W.- u. MgO-Gehaltes die Färbung des
Salzes durch Umschmelzen beliebig zu verhindern oder hervorzurufen. Verss. des
Vf. die färbende Verb. zu isolieren zeigen, daß dieselbe aus Fe^{++} u. Fe^{+++} be-
steht; u. zwar irgendwie geschützt, u. daß, wie vermutet, Entfärbung keine Oxy-
dationserscheinung ist, sondern durch Wasseraufnahme bedingt wird. (Kali **19**.
24 28. 39—43. Neustadt, Salzbergwerk-Fabriklab.) ULMANN.

Chemische Fabrik Weissenstein, G. m. b. H., Weißenstein, Österr. (Erfinder:
G. Baum), *Perverbindungen.* (Schwed. P. 54905 vom 14/6. 1922, ausg. 29/8. 1923.
1. 1923. IV. 527.) KAUSCH.

Th. Goldschmidt A. G., Essen, Ruhr (Erfinder: **Hans Schrader**, Essen, Bredeney
und **Harold Schoeller**, Essen), *Herstellung dispersen Schwefels*, dad. gek., daß man
reinem oder durch ein anderes Gas verdünntem NH_3 S-Dämpfe dispergiert u.
das S aus dem entstehenden Rauch nach einer der bekannten Gasreinigungsmethoden
als nochdisperses Pulver gewinnt. (D. R. P. 408415 Kl. 12i vom 17/8. 1923, ausg.
15. 1925.) KAUSCH.

Hercules Powder Company, Wilmington, Delaware, übert. von: **James
H. Shapleigh**, Dover, New Jersey, *Schwefelsäure.* Man verbrennt S mit O_2 in
Anwesenheit inerte Gase, katalysiert die erhaltenen SO_2 -Gase zu SO_3 unter Hin-
durchleiten von O_2 durch den Kontaktraum; aus den entweichenden Gasen wird

das SO_3 durch Absorption entfernt u. die nicht umgesetzten Gase (SO_2 u. O_2) werden nochmals katalysiert. (A. P. 1520 093 vom 13/10. 1923, ausg. 23/12. 1924.) KAUSCH

Verein für Chemische und Metallurgische Produktion, Außig a. E., *Säure aus Chlor und Wasserstoff*. Man leitet H_2 u. Cl_2 durch oder über einen widerstandsfähigem Stoff bestehenden Wärmespeicher. (F. P. 577 546 vom 21. 1924, ausg. 6/9. 1924. Tschechoslowak. Prior. 20/2. 1923.) KAUSCH

American Bromine Company, Maywood, N. J., übert. von: **Henri Tol Hackensack**, N. J., *Apparat zur Bromgewinnung*. Der App. besteht aus einer Kammer (für die Br enthaltende Lauge u. ein Extraktionsöl) mit entgegenges. angeordneten Düsen. An diese Kammer schließen sich Absatzgefäße an. (A. P. 1519 642 vom 27/12. 1920, ausg. 16/12. 1924.) KAUSCH

Arthur B. Lamb, Cambridge, Mass. und **William C. Bray**, Berkeley, C. forn., *Jodsäure*. Man behandelt J mit einem Überschuß von HClO_3 :



(A. P. 1519 381 vom 17/7. 1922, ausg. 16/12. 1924.) KAUSCH

Badische Anilin- & Soda-Fabrik, Ludwigshafen a. Rh., *Elektrische Erhitzung von Gasen unter Druck bei der katalytischen Erzeugung von Ammoniak*. Man verwendet ein Rohr mit einem konzentr. Stab oder ein doppeltes Rohr u. verbinden den inneren metall. Körper mit dem äußeren am weitest von dem Einführungspunkt entfernten Körper. (E. P. 208 760 vom 20/9. 1922, ausg. 24/1. 1924.) KAUSCH

Theodore Nicholson, Willington, *Neutralisieren von Ammonsulfat*. Die sauren $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ -Krystalle werden mit einem Neutralisationsmittel (andere als NH_3 -Gase) in einem geschlossenen Behälter behandelt u. dann getrocknet. (E. P. 209 131 vom 24/11. 1922, ausg. 7/2. 1924.) KAUSCH

Louis Arnold Jordan, Suffolk, *Behandlung von Arsensulfid enthaltenen Schlammern*. Man behandelt den Schlamm mit einer organ. Substanz (Bzl., Petroleum, Paraffinöl, Mineralöl, Toluol, CS_2 , Kresole, CHCl_3 , Terpentin, Amylacetat, $\text{C}_6\text{H}_5\text{N}_3$ usw.), wodurch sich voneinander trennbare Schichten bilden, die man absetzen läßt, dekantiert oder filtriert. (E. P. 209 350 vom 10/4. 1923, ausg. 31/1. 1924.) KAUSCH

National Benzole Association, England, *Absorptionsstoffe*. Man hydrolysiert eine Si-Verb. (z. B. SiCl_4) in Abwesenheit einer l. Base u. trocknet das erhaltene SiO_2 -Gel bei erhöhter Temp. (F. P. 576 822 vom 6/2. 1924, ausg. 27/8. 1924. E. Prior. 23/2. 1923.) KAUSCH

Chemische Werke vorm. Auerges., **F. Sommer** und **J. d'Ans**, Berlin, *Titanoxyd*. (E. P. 214 483 vom 30/5. 1923, ausg. 13/5. 1924. — C. 1924. I. 230.) KAUSCH

Georg Schiller, Berlin, *Herstellung von Siliciumcarbid* aus SiO_2 u. Kohle durch Erhitzen, dad. gek., daß hierbei eine Heizvorr. verwendet wird, die das Reaktionsgemisch umschließt u. die Hitze allmählich gleichmäßig an dieses abgibt. (D. R. P. 408 355 Kl. 12i vom 25/1. 1923, ausg. 16/1. 1925.) KAUSCH

Elektrochemische Werke G. m. b. H., **Otto Dreibrodt**, **Hermann Esig** und **David Strauß**, Bitterfeld, *Herstellung von Borcarbid*, dad. gek., daß Borsäure oder andere B-Verbb. mit Dextrin, Holzkohle, Koks mit oder ohne Zusatz von l. im elektr. Ofen zusammengeschmolzen werden. (D. R. P. 408 354 Kl. 12i vom 15/5. 1923, ausg. 16/1. 1925.) KAUSCH

Rhenania Verein Chemischer Fabriken Act.-Ges., Aachen (Erfind.: **F. L. Schmidt**, Berlin-Lichterfelde, **C. Clar** und **Walter Prahl**, Hönningen a. R.), *Trennung von Natriumcarbonat und Kaliumcarbonat*, dad. gek., daß das K in Form von $\text{MgCO}_3 + \text{KHCO}_3 + 4\text{aq}$ zur Krystallisation gelangt, indem zunächst das K als NaHCO_3 gefällt, abfiltriert u. dann aus der Lsg. durch weiteres Einleiten von CO_2 das $\text{MgCO}_3 + \text{KHCO}_3 + 4\text{aq}$ gefällt wird. — 2. dad. gek., daß zunächst das Na in der Hauptsache als Krystallsoda auskrystallisiert wird, dann ein weiter

als NaHCO_3 u. darauf das K in Form des obigen Doppelsalzes gefällt wird. — d. gek., daß zunächst durch Zusatz der dem K-Gehalt äquivalenten Menge einer Mg-Verb. u. Einleiten von CO_2 das Magnesium-Kaliumbicarbonat gefällt, filtriert u. dann die Mutterlauge zur Gewinnung des Na eingedampft zur Krystallisation gebracht wird. (D. R. P. 408510 Kl. 121 vom 16/3. 1923, ausg. 19/1. 1924.) KAUSCH.

A/S de Norske Saltverker, Bergen, Norwegen, übert. von: **Henrik. J. Bull** in Bergen, *Magnesiumchlorid*. (Can. P. 234834 vom 8/6. 1922, ausg. 9/10. 1923. — C. 1923. IV. 580.) KAUSCH.

Norsk Hydro Elektrisk Kraelstofaktieselskab, Kristiania, übert. von: **Joachim Falck**, Nottoden und **Thor Mejdell**, Skoien b. Kristiania, *Tonerde Nitrate*. (A. P. 1507993 vom 27/2. 1922, ausg. 9/9. 1924. — C. 1923. IV. 581.) KAUSCH.

American Lurgi Corporation, New York, übert. von: **Heinrich Specketer** in Gustav Münch, Griesheim a. M. und **Fritz Rossteutscher**, Schwanheim a. M., *Tonerde*. (A. P. 1519880 vom 6/10. 1922, ausg. 16/12. 1924. — C. 1924. II. 582.) [H. SPECKETER]. KAUSCH.

Louis Gabriel Patrouilleau und **Société Anonyme Alumine et Dérivés**, Frankreich, *Aluminiumsulfat und reine Tonerde*. Man behandelt Ton oder Bauxit mit H_2SO_4 u. führt die erhaltenen l. Fe-Sulfate in unl. bas. Sulfate über, indem man die Lsgg. vollständig oxydiert. (F. P. 577422 vom 19/2. 1924, ausg. 5/9. 1925.) KAUSCH.

Gulf Refining Company, Pittsburgh, Pennsylvan., übert. von: **George Richard** und **Herbert Henderson**, Port Arthur, Texas, *Aluminiumchlorid*. Für AlCl_3 enthaltender Schlamm wird auf einem Bade von geschmolzenem Pb u. dgl. in dünner Schicht erhitzt u. die übergelenden AlCl_3 -Dämpfe werden verdichtet. (A. P. 1520080 vom 10/3. 1922, ausg. 23/12. 1924.) KAUSCH.

Manufacture des Glaces et Produits Chimiques de Saint Gobain, Chauny in Reims, Frankreich, *Eisenoxyde*. Man führt Fe mit HCl in FeCl_2 über u. zersetzt es in der Wärme mit einem Strom von Wasserdampf gegebenenfalls in Ggw. von Luft u. behandelt das erhaltene Fe_2O_3 mit k. oder h. Luft. (F. P. 577673 vom 30/4. 1923, ausg. 9/9. 1924.) KAUSCH.

Waterloo Chemical Works Limited, Sydney, Austr., übert. von: **Lionel George Brown**, Sydney, *Eisenhydroxyd*. (Aust. P. 6083 vom 15/3. 1922, ausg. 20/3. 1923. — C. 1923. IV. 239.) KAUSCH.

Chemische Fabrik Buckau, Magdeburg und **Theophil Silbermann**, Halle a. S., *Verarbeitung von Zinnchlorid*, beliebiger Herkunft auf reine l. Sn-Salze oder metall. Sn nach dem Verf. des D. R. P. 302497, 1. dad. gek., daß man in gleicher Weise wie bei dem Verf. nach Anspruch 1 des Hauptpatents aus der SnCl_4 -Lsg. mit Natrium oder H_2SO_4 unter Verd. mit W. reines Sn(OH)_4 ausfällt u. dieses durch Erhitzen mit Kohlenstoff zu Sn reduziert. — 2. dad. gek., daß man in gleicher Weise wie bei dem Verf. nach Anspruch 3 des Hauptpatents die SnCl_4 -Lsg. mit einem Metall, vorzugsweise Fe, reduziert, das Sn mittels alkal. reagierender Substanzen, vorzugsweise Carbonate, in Form von reinem SnO fraktioniert niederschlägt u. dieses in bekannter Weise weiter zu metall. Sn verarbeitet oder es in HCl zu reinem SnCl_2 auflöst. — 3. dad. gek., daß man die reduzierte Sn-Lsg. mit Wasser oder sehr verd. Sulfatlsg. oder sonstigen ähnlich wirkenden Stoffen versetzt u. die niedergeschlagene Zinnoxidchlorür in HCl zu reinem SnCl_2 auflöst. (D. R. P. 302497 Kl. 12n vom 7/10. 1917, ausg. 19/1. 1925. Zus. zu D. R. P. 302497; C. 1923. IV. 240.) KAUSCH.

VI. Glas; Keramik; Zement; Baustoffe.

A. Z., *Turmtrockner für keramische Erzeugnisse mit abwärts u. aufwärts laufender Kette, an der zur Aufnahme des Trockengutes passende Schüsseln hängen.* (Keram. Rdsch. **33**. 39—40.) WECKE

Alphons Schoblik, *Glasurfehler an Steingut. I. Die mikroskopische Erkennung übersättigter und unterfeuerter Glasuren. II. Die Beurteilung der verschiedenen Glasurfehler. I. Besprechungen der Krystallbildung in durch falsche Zus. übersättigten Glasuren. II. Kurze Zusammenfassung der Beurteilungsmöglichkeiten verschiedenen Glasurfehler.* (Keram. Rdsch. **33**. 7—9.) WECKE

K. G. Vershofen, *Über Flußmittel und ihre Wirkung auf die in der Feinkeramik verwendeten Rohstoffe.* Die Einw. folgender Flußmittel: die stark bas. Verb. v. Ca, Mg, Na, sowie die wasserl. Fluoride, auf die 4 Hauptrohstoffe der Feinkeramik: Ton, Kaolin, Feldspat, Quarz, bei Temp. bis zu 1000° wurde studiert. Die ersten beiden zeigten keinerlei Einw.; Feldspat verhielt sich zumeist auch indifferent; die hauptsächlichste Wrkg. zeigte sich bei Quarz, die jedoch abhängig ist von der Feinheit dessen Kornes. (Keramos **3**. 451. 1924. Sep.) WECKE

Walter Pohl, *Referat über den Vortrag „Neues über Tunnelöfen in der fekeramischen Industrie.“* (Sprechsaal **57**. 659—61. 1924. Dresden. — C. 1924. I. 883.) WECKE

Otto H. Keller und Richard Burghardt, *Die feuchte Ringofensohle. Diskussion über die Hoffmannsche Ringofenisolierung.* (Tonind.-Ztg. **48**. 1241—1242. 1924.) WECKE

Hermann Barth, *Ist eine Bodenkühlung bei Wannenöfen notwendig? Erörterung u. Veranschaulichung der Wrkg. der Bodenkühlung.* (Keram. Rdsch. **32**. 744—745. 1924. Hannover.) WECKE

E. S., *Die Glasschmelze an Oberflammen- u. Schlitzöfen.* (Sprechsaal **58**. 15—16. 1924. bis 47.) WECKE

E. Zschimmer, *Bemerkungen zu Keppelers Überblick über die Haltbarkeit von Alkali-Kalk-Gläsern.* (Vgl. S. 151.) Berichtigung eines Mißverständnisses KEPPELERS, daß sich auf die graph. Darst. des Kalkgehaltes in funktionalem Zusammenhange mit der Gesamtzus. des Glases bezieht. (Sprechsaal **57**. 678—80. 1924. Karlsruhe.) WECKE

Hugo Hermann, *Die Darstellung der Zusammensetzung von Gläsern und Glasuren.* Entglasungen geben Aufschluß über die im Glas enthaltenen Verbindungen; es ist deshalb natürlicher, eine Glaszus. nach Silicaten anzugeben anstatt nach Oxyden. (Sprechsaal **58**. 15—18.) WECKE

Herbert Schönborn, *Der thermische Ausdehnungskoeffizient von Gläsern bei höheren Temperaturen, die Ausbildung von Spannungen und der Kühlvorgang.* Bericht über Verss. mit Hilfe des photographisch registrierenden App. von HERAEUS, der für die Praxis mit genügender Genauigkeit arbeitet. (Keram. Rdsch. **33**. 17—18. 1924. Berlin.) WECKE

H. Thiene, *Jenaer Reflexionsglas „Maxos“.* Mitt. über vergleichende Verss. mit dem „Maxos“-Glas u. den bisher im Handel befindlichen Reflexionsgläsern; jenes ist diesen bei weitem überlegen. (Sprechsaal **58**. 45. Jena.) WECKE

R. Schmidt, *Über Straßgläser.* Begriffbeschreibung u. Schilderung der Entstehung der nach dem Wiener Juwelier STRASZER benannten stark bleihaltigen Gläser u. die Erzeugung künstlicher Diamanten. (Keram. Rdsch. **33**. 51—53.) WECKE

E. Kempcke, *Veränderungen in der Mikrostruktur des Porzellans und einige physikalische Eigenschaften desselben während des Brennprozesses im Tunnelofen.* Mitt. über Verss., den Verlauf der Porzellanbildung oberhalb einer Temp. von 1000°. die wechselseitige Einw. der Rohstoffe aufeinander u. die Veränderungen

struktur des Porzellans mit Hilfe des Mkr., neben der Unters. einiger phys. Eigenschaften während des Brennprozesses im Tunnelofen zu verfolgen. Zwischen 1160° entstanden steingutartige transparente Prodd.; bei 1180° traten Sinterungserscheinungen auf u. Porzellanbildung begann, die bei 1420° ihren Höhepunkt erreichte. 12 Bilder. (Keramos 3. 551—57. 1924. Sep.) WECKE.

Brunow, Über die Anwendung von Magneten zur Enteisung keramischer Massen. Beschreibung von Elektromagneten u. ihrer Anwendung für diesen Zweck. (Physikal. Zeitschrift 57. 678. 1924.) WECKE.

W. Hoppe, Die Bauxitlagerstätten des Vogelsberges. Beschreibung des Vorkommens, Entstehung u. Vergleich mit amerikan. u. französ. Bauxit in Hinblick auf die Verwertung. (Beton u. Eisen 24. 9—10. Darmstadt.) WECKE.

Walter Dyckerhoff, Über den Verlauf der Mineralbildung beim Erhitzen von Kalk, Kieselsäure und Tonerde. Beschreibung des vom Vf. bei seinen Arbeiten gebrauchten Verf. bei der Beobachtung der Mineralbildung, der Eigenschaften u. der Feststellung der hydraul. Eigenschaften. Besprechung der verschiedenen Komponenten des Systems, im Besondern des CaO; betreffs SiO₂ u. Al₂O₃ wird auf die Arbeiten FENNERS u. BOWENS verwiesen. (Zement 13. 681—83. 1924.) WECKE.

A. Kleinlogel, Die Lagerbeständigkeit von Zement. Zusammenfassender Bericht über die Verss. in Amerika, Spanien u. Deutschland mit der Feststellung, daß jeder Zement, der wie in der Baupraxis üblich gelagert wird, mit der Zeit an Güte verliert. Vorschläge für die sachgemäße Lagerung von Zement, die sich im Besondern auf die Erhaltung der Feuchtigkeit der Luft beziehen. (Zement 13. 642—46. 664—66. 1924. Darmstadt.) WECKE.

A. Hummel, Über hochwertigen Portlandzement. Mitt. einiger Daten über die Eigenschaften dieses Zements; im Besondern werden die Verss. von RÜTH u. von F. J. BERG berücksichtigt. (Gas- u. Wasserfach 68. 23—24. Karlsruhe.) WECKE.

F. Luftschitz, Kohlenaschenschemente. Überblick über den derzeitigen Stand der Verss. des Vf. zur Auswertung der Braunkohlenaschen. (Tonind.-Ztg. 48. 1240—41. 1924. Dresden.) WECKE.

Heinrich Luftschitz, Tonerde-Schmelzzement. Versuch einer Deutung seiner Eigenschaften — Magnesiaschmelzzement. Nach der Ansicht des Vf. ist ein solcher Portlandzement nicht widerstandsfähig, weil er zuviel Basen hat u. nicht einwandfrei entstanden ist, seine kleinsten Teilchen also beweglicher als beim Portlandzement sind. Der Tonerde-Schmelzzement ist dagegen widerstandsfähiger, weil er aus einem säurebildenden Element hergestellt wird. Des Weiteren vermutet der Vf., daß, wenn man im Portlandzement das CaO durch MgO ersetzt, dadurch die Widerstandsfähigkeit des Zements erzielt wird. (Tonind.-Ztg. 48. 1224 bis 1226. 1924.) WECKE.

Adolf Spengel, Zement im Druckstollenbau. Ein Beitrag zur Gipsfrage in der Baupraxis. Bericht über die Betonherst. beim Druckstollen des Rittmeyerwerks in der Schweiz, bei der Anmachew. von hohem Gipsgehalt u. gipshaltiger Sande. Verss. werden mitgeteilt u. über eine Rißbildung im Stollen, die aber nicht auf einen Mangel des Zements, sondern mechan. Einflüsse, Druckverschiebung im Gebirge, zurückgeführt wird. (Tonind.-Ztg. 48. 1207—8. 1924.) WECKE.

Wolfgang Kalk, Über die Raumvermehrung und Wasseraufnahme von hydraulischen Bindemitteln. Aus den Unterss. des Vf. ergibt sich folgendes: ein objektiver Vergleich der Raumvermehrung u. der Wasseraufnahme im abbindenden Zement ist durch die einfache spezifische Gewichtsbest. nicht möglich; es folgt jedoch aus der Divergenz der Ergebnisse der unmittelbaren Versuchsmethode u. der spezif. Gewichtsbest., daß der Wasserbindevorgang sich darstellt als Summe zweier Gruppen von miteinander verlaufender Vorgänge, nämlich 1. der rein chem. Hydratbildung u.

2. des rein physikal. Ad- u. Absorptionsvermögens der kolloidalen Zemente. Die günstige Verschmelzung der beiden Prozesse ist für die hydraul. Eigenschaften der Bindemittel von entscheidender Bedeutung. Die Auffassung vom Wachstum einzelner Körner des „Zementpulvers“ beim Aufnehmen von W. u. beim Erhitzen des „Zementsteines“ ist durch die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit bestätigt worden. (Zement **13**. 666—69. 679—81. 1924. Hannover.) WE

—, *Si-Stoff*. Si-Stoff ist ein mehrartig feines Silicat mit 30% verbindlichem SiO_2 . Dieses macht es in Verb. mit seiner Feinheit zur Veredelung von Bindemitteln für Mörtel geeignet. Die Eigenschaften des Stoffes u. seine Verwendg. auf Weißkalk, Zementkalk, dolomitische Kalke u. Zementkalke, sowie Portlandzemente werden beschrieben u. zahlenmäßig belegt. Si-Stoff kann Traß ersetzen. (Tonind.-Ztg. **48**. 1227—28. 1924.) WEC

Ernst Buss, *Über Wärmeisoleriersteine und -Massen aus Si-Stoff*. Bericht über diesen Zweig der Verwertung des Abfallstoffes der Tonerdesulfatfabrikation. (Keram. Rdsch. **32**. 741—44. 1924. Dresden.) WEC

H. Schilling, *Über den Silicastein und seine Herstellung*. Beschreibung der Herstellungsverf. (Chem.-Ztg. **49**. 6—7. Wirges, Westerwald.) PFLÜC

Amos, *Wasser-Aufnahme und -Wiedergabe bei Mauersteinen*. Schaulinienwiedergabe der Ergebnisse von Verss. mit Ziegeln u. Zement-Schlacken-Platten. Die ersteren nehmen nicht soviel W. auf wie die letzteren u. geben das aufgenommene W. auch leichter wieder ab. (Tonind.-Ztg. **48**. 1208—9. 1924. Hohen-Dölzchen.)

H. Burchartz, *Zur Bewertung und Verwendung des Trasses*. Vf. beschließt sich mit der Ansicht BACHS über die Bewertung des Trasses u. weist im Gegensatz zu diesem nach, daß der Hydratwassergehalt als Gütemaßstab für Traß in Frage kommt, da keinerlei gesetzmäßiger Zusammenhang zwischen Hydratwassergehalt u. Mörtelfestigkeit besteht. „Den Traß nach dem wahren Gehalt an mörteltechn. Substanz zu werten“, ist nicht möglich. (Tonind.-Ztg. **48**. 1221—22. 1924.) WEC

Hans Hirsch, *Der Erweichungsversuch und seine Möglichkeiten*. (Keram. Rdsch. **32**. 761—66. 1924. Berlin. — C. 1924. I. 1580.) WEC

—, *Vergleich der analytischen Verfahren für die Gipsuntersuchung*. (Spezialchem. **58**. 44—45.) WEC

Norton Company, Worcester, V. St. A., *Herstellung eines Schleifmittels*. Durch Schmelzen eines tonerdehaltigen Stoffes im elektr. Ofen, dad. gek., daß als tonerdehaltige Beschickung eine solche verwendet wird, die möglichst frei von SiO_2 ist, aber bis zu 15% Fe_2O_3 enthält. — Die Erzeugnisse besitzen die gleichen Eigenschaften wie reine geschmolzene Al_2O_3 , sind aber leichter herzustellen. (D. Pat. **407411** Kl. 80b vom 22/6. 1920, ausg. 12/12. 1924. A. Prior. 12/2. 1917.) KÜHL

Frédéric Michel Oppermann, Tschechoslovakei, *Behandeln von Glas*. Durch Erhitzen von Häfen geschmolzene u. geläuterte oder in Wannen geschmolzene u. in Häfen geläuterte Glasm. wird gleichmäßig auf die Temp. des Gießens oder Blasens abgekühlt, indem die mit der Schmelze gefüllten Häfen durch einen Kanal geleitet werden, der bei stetigem Betriebe nach einmaligem Anheizen keiner weiteren Heizung bedarf, da er durch die Abhitze der Glasm. genügt erwärmt wird. (D. Pat. **576341** vom 25/1. 1924, ausg. 14/8. 1924. Blg. Prior. 23/5. 1923.) KÜHL

Quartz & Silice, Paris, *Quarzglasgegenstände*. Sand, Bergkrystall oder Quarz von hohem Gehalt an SiO_2 wird durch Induktion mittels elektr. Ströme von 100 bis 1000 Wechselzahl geschmolzen. Das Schmelzen erfolgt innerhalb von Gefäßwänden aus feuerfestem leitendem Stoff, vorzugsweise Graphit, welche von Holzkohle, Ruß oder anderen Wärmeschutzmitteln umgeben sind. Das Ganze befindet sich innerhalb eines Behälters aus feuerfestem, nicht leitendem Stoff, um den ein von W. durch-

nes Kupferrohr gewunden ist, durch das der benutzte Wechselstrom geleitet
 in. Das Formen geschieht entweder in den Graphitbehältern selbst oder nach
 gegebenenfalls durch enge Öffnungen erfolgenden Herauspressen der Schmelze.

P. 224163 u. 224164 vom 5/5. 1924, Auszug veröff. 24/12. 1924. Prior. 2/11.

KÜHLING.

Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Leverkusen (Erfinder: **Adolf**
oring, Köln-Deutz), *Herstellung eines hochwertigen geschmolzenen Zements*, dad.
 daß die als Ausgangsstoffe dienenden Basen u. Säuren, welche SiO_2 , Fe_2O_3
 CaO bezw. CaO enthalten, im Verhältnis der Hälfte des hydraul. Moduls von

CAELIS
$$\frac{\text{CaO}}{\text{SiO}_2 + \text{Al}_2\text{O}_3 + \text{Fe}_2\text{O}_3} = 0,8 - 1,2$$
, zweckmäßig in der Zus.

($\text{SiO}_2 = 11-20\%$, $\text{Fe}_2\text{O}_3 = 16-33\%$, $\text{Al}_2\text{O}_3 = 8-16\%$ u. $\text{CaO} = 45-55\%$ innig
 ersch niedergeschmolzen werden oder daß die vorgenannten Stoffe mit ent-
 sprechenden Zuschlägen vermischt, auf diese Zus. gebracht u. niedergeschmolzen
 werden. — Das Verf. gestattet die Verwendung wertloser eisenhaltiger Stoffe, wie
 Eisenerz, stark eisenhaltiger Kalke, Tonschiefer o. dgl., sowie eisenreicher
 Abfallstoffe als Zuschläge. (**D. R. P. 407373** Kl. 80b vom 3/11. 1922, ausg.
 1/1. 1924.)

KÜHLING.

Dr. Kunze & Soller, Köln-Mülheim, *Herstellung von Zement aus Gips und*
Slacken, 1. dad. gek., daß in einem Sinterungs- oder Schmelzprozeß in eine
 schlackenartige M. soviel CaSO_4 einverleibt wird, daß das mehr oder weniger
 schnell gekühlte Brenngut nach dem Vermahlen ohne weiteren Zusatz einen selbst
 ständigen lagerbeständigen Mörtelbildner ergibt. — 2. dad. gek., daß Ton oder
 andere silicat. Stoffe mit CaSO_4 nach einem der üblichen Verf. so zu Zement um-
 gesetzt werden, daß ein der Hochofenschlacke entsprechender, bas. schwefelsaures
 Material in fester Lsg. enthaltender Mörtelbildner erhalten wird. — Es kann auch Hoch-
 ofenschlacke selbst in noch fl. oder in kaltem Zustande mit der erforderlichen
 Menge CaSO_4 versetzt u. erhitzt werden. (**D. R. P. 407659** Kl. 80b vom 26/2. 1922,
 aus 19/12. 1924.)

KÜHLING.

Aktiengesellschaft für Aschenchemie, Berlin, *Herstellung von Bausteinen*
aus unedlen geformten Gebilden aus Aschen aller Art, die zunächst einer Waschung
 unterworfen u. dann mit Zement oder CaO oder einem Gemisch
 verbunden u. eingeformt werden, dad. gek., daß die so geformten Gebilde mit
 verdünnter, bei der Waschung entfallender Lauge zwecks Wiederaufnahme der
 darin enthaltenen kolloidalen Bestandteile behandelt werden. — Es wird eine vor-
 zügliche Nachhärtung erzielt. Wird Waschwasser von Braunkohlenasche verwendet,
 so halten die Erzeugnisse eine Färbung, welche derjenigen der Ziegelsteine ent-
 spricht. (**D. R. P. 407364** Kl. 80b vom 15/4. 1924, ausg. 11/12. 1924.) KÜHLING.

J. E. Fournier, Royan, Frankreich, *Kunststeine*. Abfall kalkfreier Steine
 mit trockenem Zement gemischt, mit einer wss. Lsg. von ZnSiF_6 befeuchtet,
 in einem u. geschmolzenen Talg zugegeben u. die Mischung unter hohem Druck ge-
 formt. (**E. P. 223884** vom 16/9. 1924, Auszug veröff. 24/12. 1924. Prior. 24/10.

KÜHLING.

Heinrich Klein, Essen-Ruhr, *Herstellung eines Mörtelstoffes aus Hochofen-*
schlacke, 1. dad. gek., daß Schlacke von Halden durch frische, fl. Schlacke ein-
 geschmolzen u. gegläht wird. — 2. dad. gek., daß auf der Halde lagernde Schlacke
 gegläht u. die Schlackenbrocken mit einer Schicht glühender Schlacke überdeckt
 werden, worauf das Gemisch nach dem Erstarren vermahlen wird. — Alte u. fl.
 Schlacke können auch in einem Gefäß zusammengebracht, zur gegenseitigen Einw.
 gegläht u. nach dem Erstarren vermahlen werden. (**D. R. P. 407362** Kl. 80b
 vom 24/9. 1923, ausg. 11/12. 1924.)

KÜHLING.

Aktiengesellschaft für Aschenchemie, Berlin, *Erzeugung von luftdurchlässigen Baustoffen feinsten Körnung für die Herstellung von Fußböden, von Putz oder geformten Gebilden aller Art*, dad. gek., daß aus dem beim Waschen von Aschen besonders Braunkohlenaschen, entstehenden Salzslg. die feinen Schwebeteilchen abgesondert, getrocknet, gekörnt u. sodann in bekannter Weise mit einem Zement von Zement oder hydraul. CaO oder einem Gemisch beider versehen werden, worauf die M. in ebenfalls bekannter Weise geformt bzw. auf Flächen aufgetragen u. mit fein verteiltem W. oder mit Dampf nachbehandelt, getrocknet u. gegebenenfalls poliert wird. — Die mit den Stoffen hergestellten Fußböden erregen kein Kältegefühl. (**D. R. P. 407363** Kl. 80b vom 15/4. 1924, ausg. 11/12. 1924.) KÜHLI

Soc. d'Études des Agglomérés, Paris, *Bindemittel zum Verbinden von Gegenständen aus Zirkonerz mit feuerfesten Gegenständen aus gleichen oder anderen Stoffen*. Gemäß E. P. 223573 (S. 888) behandeltes Zirkonerz oder ZrO₂ wird gegebenenfalls unter Zusatz anderer feuerfester Stoffe, mit einem organ. u. anorgan. Bindemittel, z. B. Dextrin bzw. H₃BO₃ gemischt, die Mischung im elektr. Ofen bei 2500° erhitzt, in k. W. abgeschreckt u. vermahlen. (**E. P. 224214** vom 15/10. 1924, Auszug veröff. 24/12. 1924. Prior. 29/10. 1923.) KÜHLI

Lucien Liais, Frankreich, *Körnige oder pulverförmige Massen zum Straßenaufbau*. Petroleum- oder Teer anderer Herkunft wird in h. Zustand mit etwa 25% C₆₀ gegebenenenfalls auch noch etwas Mergel, Sand, CaO o. dgl. u. dann mit 5% NaHCO₃ versetzt, wobei die M. schaumig wird. In diesem Zustand wird sie in ein Gefäß mit ruhendem oder fließendem W. gegossen, wobei sie sich in Tröpfchen auflöst, die zu Körnern erstarren. Will man noch kleinere, pulverförmige Teilchen erzielen, so sprüht man während des Ausgießens W. gegen die M. (**F. P. 575798** vom 14/1. 1924, ausg. 6/8. 1924.) KÜHLI

IX. Organische Präparate.

E. Berl und A. Braune, *Über die Darstellung von Natriumcyanid aus Stickstoff, Soda und Kohle*. Nach einem ausführlichen geschichtlichen Überblick über die Entwicklung des Cyanidverf. zur Verwertung von N₂ aus Luft, wird Vff. auf die Bedeutung dieses Verf. für die Zukunft hin. — Durch Verss. 1 u. 2 Vff., daß man es beim Cyanidprozeß, $\text{Na}_2\text{CO}_3 + 4\text{C} + \text{N}_2 \rightleftharpoons 2\text{NaCN} + 4\text{CO}$ mit einer rasch verlaufenden Rk. zu tun hat, welche bei ungehinderter Gasdiffusion u. starker Herabsetzung des CO-Druckes fast quantitativ verläuft. Von Wichtigkeit ist ein Überschuß von C u. Fe (oder dessen Oxyde als wirksame Katalysatoren), wodurch innige Berührung der Komponenten u. Erleichterung der Gasdiffusion bewirkt wird. Gleichzeitig wird das Schmelzen der Masse verhindert, wodurch die Verschiebung des Gleichgewichtes nach links, verursacht durch die geringe Löslichkeit von Na₂CO₃ u. NaCN vermieden wird. Am geeignetsten erwies sich eine Mischung gleicher Teile Na₂CO₃, C u. Fe. Bei zu hohen N₂-Strömungsgeschwindigkeiten tritt metall. Na in wesentlichen Mengen auf, woraus Vff. schließen, daß dieses beim Cyanidprozeß stets intermediär gebildet wird. Bei größeren N₂-u. C-Zusatz unterbleibt die B. von Na naturgemäß. Die geeignetste Temp. liegt bei 950—1000°. Bei dem Prozeß tritt stets auch etwas Ferrocyanid auf, dessen Menge vom angewandten Katalysator abzuhängen scheint. — Soll das Cyanid zur NH₃-Darst. dienen, so wird es am günstigsten bei 150° im Autoklaven mit Wasserdampf verseift. Die Ausbeute an NH₃ u. HCOONa ist quantitativ. (Fortsetzung in Chem., Physik u. physik. Ch. 18. Heft 4. 1—36.) ULMANN

Johann Schneider, Dessau, *Herstellung von Formaldehydsulfoxylen*, dad. gek., daß schweflige Säure unter Zutropfen von Formaldehyd elektrolyt. zu Disulfoxydehydrosulfoxylsäure reduziert u. diese hierauf mit Basen oder kohlensauren Salzen

die *Formaldehydsulfoxylylate* übergeführt wird. — Man elektrolysiert z. B. bei einer Stromstärke von 1,1 Amp. eine gesätt. SO_2 -Lsg. im SO_2 -Strom unter Zutropfen einer CH_3O -Lsg. in dem Maße, daß die Katholytflüssigkeit eben farblos bleibt, bei ca. 20° . Der Katholyt enthält nach 6 Stdn. Stromdurchgang außer großen Mengen S_2 *Diformaldehydsulfoxylsäure*, $\text{H}_2\text{SO}_2 \cdot 2\text{CH}_2\text{O}$, als Hauptprod. u. *Formaldehydschwefelsäure* als Nebenprod., neben Spuren stark riechender Thioaldehyde. Zur Entfernung der SO_2 aus der Katholytflüssigkeit wird diese nach beendeter Elektrolyse unter Durchleiten eines gereinigten u. trockenen H_2 -Stromes im Vakuum dest., wobei sie vollständig entfärbt wird. Hierauf wird die Lsg. mit wasserfreiem Na_2CO_3 genau neutralisiert, im Vakuum im H_2 -Strom bei $35\text{--}40^\circ$ bis auf 30 ccm eingedunstet, u. im CaCl_2 -Vakuumsiccator mehrere Tage weiter eingedunstet, wobei sich eine farblose, klebrige, etwas lauchartig riechende, in W. klar l. M. abscheidet, die nach der jodometr.-acidimetr. Methode einen Gehalt von 25% $\text{NaHSO}_2 \cdot \text{CH}_2\text{O}$ u. einem solchen von 20% wasserfreiem $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ aufweist. (D. R. P. 403193 vom 12/1. 1923, ausg. 27/9. 1924.) SCHOTTLÄNDER.

Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Leverkusen bei Köln a. Rh., übert. von: **Hans Hahl** und **Hermann Weyland**, Elberfeld, *Silbernatriumsalz der Iodidglykolsäure*. Zu den Ref. nach Schwz. P. 105813; S. 1011) ist nachzutragen, daß das Prod. als *Antigonorrhoeicum* therapeut. Verwendung findet. (A. P. 1517 002 vom 22/6. 1923, ausg. 25/11. 1924.) SCHOTTLÄNDER.

The Grasselli Chemical Company, übert. von: **Henry Howard**, Cleveland, Ohio, V. St. A., *Konzentrierte Essigsäure aus Acetaten*. Man mischt eine starke Mineralsäure, ein essigsaures Salz u. verd. wss. $\text{CH}_3\text{CO}_2\text{H}$ miteinander, dest. das Gemisch u. fängt die zuerst übergehenden Fraktionen des Destillats besonders auf. — Z. B. wird *Ca-Acetat* in einer wss. Lsg. von HCl , ca. 22° Bé, oder in einer Lsg. von HCl in einer von einer früheren Dest. stammenden verd. $\text{CH}_3\text{CO}_2\text{H}$, enthaltend dieselben Mengen W. u. HCl wie die wss. HCl -Lsg. von 22° Bé gel. Die HCl -Lsg. enthält ca. 90—95% der dem *Ca-Acetat* chem. äquivalenten Menge HCl enthalten. Das Reaktionsgemisch kann auch durch Lösen von *Ca-Acetat* in einer verd. wss. $\text{CH}_3\text{CO}_2\text{H}$ u. Einleiten von HCl -Gas in die Lsg. oder umgekehrt durch Lösen von *Ca-Acetat* in einer mit HCl -Gas gesätt. wss. $\text{CH}_3\text{CO}_2\text{H}$ -Lsg. gewonnen werden. Das Reaktionsgemisch wird alsdann in eine mit Dampfmantel umkleidete eiserne Destillationsblase gefüllt u. soviel Wachs, Fett oder eines ähnlichen Stoffes, vorzugsweise Paraffinwachs, zugegeben, daß eine zusammenhängende Schicht auf der Oberfläche der Charge entstehen kann. An die Destilliervorr. ist ein Skrubber angeschlossen, der mit einer geeigneten Menge einer *Ca-Acetat*lsg. u. $\text{CH}_3\text{CO}_2\text{H}$ beschickt ist. Die Konz. dieser $\text{CH}_3\text{CO}_2\text{H}$ schwankt zwischen 50 u. 60% oder höher, je nach der Konz. der zu destillierenden $\text{CH}_3\text{CO}_2\text{H}$ -Lsg. Auch der Skrubberinhalt erhält einen Zusatz von Paraffinwachs in einer zur B. einer zusammenhängenden Schicht ausreichenden Menge. Das Paraffinwachs dient als Mittel zur Verhinderung des Schäumens der sd. Fl. in Destillierblase u. Skrubber. Diese werden unter verminderten Druck, zweckmäßig 120 mm Hg, gesetzt, die Skrubberflüssigkeit annähernd zum Sieden, u. die Charge im Destillierapp. auf ca. 90° , durch Erhitzen der Dampfheizung, erwärmt (höhere Temp. sind zweckmäßig zu vermeiden, andernfalls zu große Mengen HCl mit der $\text{CH}_3\text{CO}_2\text{H}$ überdest. würden). Die erdestillierende $\text{CH}_3\text{CO}_2\text{H}$ wird durch den Skrubber geleitet, hierauf kondensiert während der ersten Stufen der Dest. als Endprod. besonders gesammelt. Im Verlauf des Verf. wird die Konz. des Destillats immer niedriger. Geht keine $\text{CH}_3\text{CO}_2\text{H}$ mehr über, wird die Dest. unterbrochen u. das Destillat fraktioniert. Bei vollständigen Zers. das *Ca-Acetats* wird frische HCl zum Blaseninhalt gegeben, die Dest. weiter fortgesetzt, zum Schluß unter Einleiten von Dampf in die Fl. unter gewöhnlichem Druck, um die $\text{CH}_3\text{CO}_2\text{H}$ möglichst vollständig aus der Vorr.

auszutreiben. Diese letzten Fraktionen gehen zweckmäßig ebenfalls durch Skrubber, um die HCl möglichst zu entfernen u. einen Angriff der an den Skrubber angeschlossenen Apparatur zu verhindern, u. werden dann zur Herst. eines neuen Ansatzes der obigen Reaktionsmischung verwendet. Bei Unwirksamwerden der Skrubberflüssigkeit, kann diese zeitweise durch frische Lsg. ersetzt u. die erschöppte Fl. ebenfalls zur Herst. eines neuen Ansatzes des Reaktionsgemisches verwendet werden. In dieser Weise gelingt es ca. 80% oder mehr der $\text{CH}_3\text{CO}_2\text{H}$ -Komponente des Ca-Acetats als 50—60%ig. Essigsäure wieder zu gewinnen, wobei die Ausbeute auf das umgesetzte Ca-Acetat berechnet 90% u. mehr beträgt. Die farblose reine Säure enthält nur Spuren HCl. (A. P. 1463212 vom 15/12. 1922, ausg. 31/7. 1923. E. P. 221256 vom 30/5. 1923, ausg. 2/10. 1924. F. P. 567374 vom 15/12. 1923, ausg. 29/2. 1924.)

SCHOTTLÄNDER
The Grasselli Chemical Company, übert. von: John E. Haggennach
Cleveland, Ohio, V. St. A., Konzentrierte Essigsäure aus Acetaten. (A. P. 1463212 vom 16/12. 1922, ausg. 31/7. 1923. — vorst. Ref.)

SCHOTTLÄNDER
Forrest J. Rankin, St. Louis, Missouri, V. St. A., Herstellung von Oxalsäure durch Oxydation von Kohlenhydraten. Man behandelt Kohlenhydrate, wie Zuckerarten, Stärke, Cellulose, Holzfasern, Fruchtzucker, insbesondere Reishülsen, in feiner verteilter Zustände mit HNO_3 in Ggw. von O_2 oder O_2 -haltigen Gasen bei mäßig erhöhter Temp. unter Druck. — Z. B. werden fein zerkleinerte Reishülsen allmählich in einen Autoklaven eingeführt, der zu $\frac{2}{3}$ seines Vol. mit HNO_3 , D. 1,38—1,39 gefüllt ist. Der geschlossene Autoklav wird durch Dampf auf 60—80° erwärmt, wobei O_2 , Luft oder ein Gemisch aus N_2 u. O_2 eingeleitet, wobei der Druck erheblich steigt. Unter Red. der HNO_3 zu NO werden die Reishülsen zu Oxalsäure oxydiert (verwendet man Fructose enthaltende Kohlenhydrate so entstehen in der Hauptsache Glykolsäure u. Weinsäure). Ein Teil des NO wird hierbei zu N_2O_3 u. N_2O_4 oxidiert, demgemäß zu HNO_2 u. HNO_3 , regeneriert, während das in der Nähe der Oberfläche der Fl. befindliche NO zusammen mit höheren N-Oxyden, HNO_3 -Dampf, Luft u. Wasserdampf aus dem Autoklaven abgeleitet u. außerhalb in HNO_3 umgewandelt wird. Nach Beendigung der Rk. wird Luft oder Dampf durch den Autoklav geleitet, bis alle N_2 -haltigen Gase entfernt sind. Der Rückstand wird in einen Absatzbehälter abgelassen u. die Fl. von den unveränderten Ausgangsstoffen SiO_2 -haltigen Bestandteilen abdekantiert. Man filtriert u. läßt die Oxalsäure bei 10° absteigenden Kühler während 10 Stdn. auf 150—160°, so dest. W. u. überschüssigen Alkohol ab. Aus dem honigartigen Rückstand wird die Citronensäuretribenzylester mit A. extrahiert u. krystallisiert beim Erkalten der alkoh. Lsg. aus. Beim Abdestillieren des A. aus der Mutterlauge hinterbleibt ein hauptsächlich Citronensäuredibenzylesterenthaltendes Öl, das durch Ausziehen mit verd. NaOH, Ansäuern u.

SCHOTTLÄNDER
Werner Schilt, Zürich (Schweiz), Darstellung von Citronensäuretribenzylester. 1. dad. gek., daß man Citronensäure in Ggw. mindestens einer anorgan. oder organ. Base oder Gemischen dieser, mit oder ohne Zusatz von Lösungsm., mit Benzaldehyd u. Benzaldehydhalogeniden erhitzt. — 2. dad. gek., daß man Citronensäure mit Benzylalkohol, gegebenenfalls unter Abdestillieren des Reaktionswassers u. unter Zusatz von Katalysatoren, erhitzt. — Man erhitzt z. B. Citronensäure in wss.-alkal. Lsg. mit Benzylchlorid während 16 Stdn. am Rückflußkühler im Ölbad auf 115—120°, nimmt das Öl in Bzl. auf, trocknet die Lsg. u. dest. unter schwachen Vakuum bei 160—170°. Der erstarrte Rückstand wird aus A. umkrystallisiert. Der Citronensäuretribenzylester mkr. Nadeln, F. 51°, geruch- u. geschmacklos, findet therapeut. Verwendung. — Erhitzt man krystallisierte wasserhaltige Citronensäure mit Benzylalkohol an absteigenden Kühler während 10 Stdn. auf 150—160°, so dest. W. u. überschüssiger Alkohol ab. Aus dem honigartigen Rückstand wird die Citronensäuretribenzylester mit A. extrahiert u. krystallisiert beim Erkalten der alkoh. Lsg. aus. Beim Abdestillieren des A. aus der Mutterlauge hinterbleibt ein hauptsächlich Citronensäuredibenzylesterenthaltendes Öl, das durch Ausziehen mit verd. NaOH, Ansäuern u.

2,4 u. Ausäthern rein gewonnen werden kann; Na-Salz in W. l., F. 104°; Salz, F. 190°, in W. unl., läßt sich durch längeres Erhitzen mit Benzylalkohol, verhältnismäßig unter Zusatz von etwas Citronensäure als Katalysator, in den neutralen Citronensäuretribenzylester überführen. (Schwz. P. 100318 vom 23/1. 1922, ausg. 1/1. 1923 u. Schwz. P. 105863 [Zus.-Pat.] vom 9/1. 1923, ausg. 1/7. 1924.) SCHOTTL.

Werner Schilt, Zürich (Schweiz), *Herstellung von Carbonsäureestern*. Salze aliph., arom., aliph. u. alicycl. Carbonsäuren werden in Ggw. von Pyridin u. Chinolin mit Alkylhalogeniden erhitzt. — Beispiele sind angegeben für die Herst. von Benzylacetat aus Benzylchlorid u. K-Acetat in Ggw. von Pyridin bei 100–130°, — von Benzylformiat aus K-Formiat u. Benzylchlorid bei 140–150°, — von Citronensäuretribenzylester aus K-Citrat u. Benzylchlorid in Ggw. von Pyridin bei 160–165°, — von Zimtsäurebenzylester aus zimtsaurem Na u. Benzylchlorid in Ggw. von Chinolin bei 200–205° — u. von Camphersäurebenzylester aus camphersaurem K u. Benzylchlorid in Ggw. von Pyridin. Man verwendet die wasserfreien, gut getrockneten Alkalisalze, zweckmäßig die K-Salze, der Carbonsäuren. Durch den Zusatz von Pyridin u. Chinolin wird die Veresterung wesentlich beschleunigt u. die Ausbeute verbessert. (Schwz. P. 10385 vom 9/1. 1923, ausg. 17/3. 1924.) SCHOTTLÄNDER.

California Cyanide Company, Inc., übert. von: **Floyd J. Metzger**, New York, *Herstellung von Alkalicyaniden*. (A. P. 1498637 vom 25/3. 1924, ausg. 24/6. 1924. — 1923. IV. 660 [Can. P. 228238].) KÜHLING.

Carl Heinrich Borrmann, Essen, Ruhr, *Herstellung aromatischer Kohlenwasserstoffe aus Phenolen und Wasserstoff*, dad. gek., daß die Phenole durch eine oder mehrere in einem von oben beheizten Ofen angeordnete, aufrecht stehende Rohrschlangen in der Weise im Gegenstrom zu den Heizgasen geführt werden, daß sie im unteren Teile der Schlangen vorgewärmt u. verdampft u. im oberen Teil nach Beimischen von H₂ reduziert werden, wonach die aus den Schlangen austretenden Dämpfe gegebenenfalls unmittelbar in Kolonnen fraktioniert, kondensiert u. schließlich in Ölwäschern absorbiert werden. — Die Temp. der in den Kolonnen eintretenden Gase beträgt an der Eintrittsstelle ca. 800–900°. Die Phenoldämpfe werden im oberen Teil der Rohrschlange mit dem vorgewärmten H₂ gemischt u. dann auf einem verhältnismäßig langen Wege auf 750° erhitzt. Diese Temp. soll möglichst genau innegehalten werden. Die Ausbeute an KW-stoffen kann bis zu 2% gesteigert werden. Die den Hydrierungsöfen verlassenden Dämpfe werden bei Durchleiten durch die mit Rückflußkühlern versehenen Kolonnenapp. infolge des erzeugten Rückflusses ausgiebig gewaschen u. gereinigt, so daß alle schwereren Anteile in jeder Kolonne scharf abgeschieden werden u. nur reine Leichtöldämpfe nach der nächsten Kolonne übergehen. Leicht- u. Schwerbenzol laufen so getrennt ab u. gelangen durch Kühler in Lagerbehälter. Um die aus der letzten Kolonne austretenden Restgase von den in ihnen noch befindlichen Leichtbenzolanteilen zu befreien, werden sie durch einen Ölwäscher geführt. Das in diesem Wäscher anfallende Waschöl reichert sich mit Leichtbenzol an u. muß von diesem nach dem Austritt aus dem Wäscher wieder durch Dest. befreit werden. Das Verf. ermöglicht insbesondere die wirtschaftliche Verwertung von Urteerphenolen. (D. R. P. 4192 Kl. 12o vom 15/6. 1922, ausg. 25/9. 1924.) SCHOTTLÄNDER.

Établissements Poulenc Frères und Carl Oechslin, Paris, *Herstellung in wässriger Lösung löslicher Derivate des 3,3-Diamino-4,4-dioxyarsenobenzols*. Man läßt auf eine wässrige Suspension eines Mol. des Diaminodioxyarsenobenzols ein oder mehrere Mol. Natriumformaldehydsulfoxylsaures Na in Ggw. von Na₂CO₃ bei 15° einwirken. — Beispiele sind angegeben für die Herst. der N-Monoformaldehydsulfoxylsäure des Diaminodioxyarsenobenzols, die entweder durch Ansäuern der entstandenen Lsg. mit HCl

als freie Säure oder, nach Neutralisation der Lsg. mit $\text{CH}_3\text{CO}_2\text{H}$, durch Fällen mit A. als Na-Salz abgeschieden werden kann, — sowie der *N*-Diformaldehydsulfoxylsäure des Diaminodioxarsenobenzols. Das Verf. ermöglicht die Gewinnung auch des N-disubstituierten Deriv. ohne Anwendung von Wärme. (F. P. 5563 vom 30/12. 1921, ausg. 19/7. 1923. A. P. 1490 020 vom 11/2. 1922, ausg. 8. 1924.)

SCHOTTLÄNDER




Établissements Poulenc Frères und Marcel René Louis Pomaret, Frankreich, Herstellung von Derivaten des 4,4'-Dioxy-3,3'-diaminoarsenobenzols. Man behandelt die *N*-Mono- oder Diformaldehydsulfoxysäuren bzw. *N*-Mono- u. Diformaldehyddisulfitderiv. des Dioxydiaminoarsenobenzols in wss. Lsg. mit konz. wss. Lsgg. eines reduzierenden Zuckers. — Z. B. werden wss. Lsgg. des Na-Salzes der 4,4'-Dioxy-3,3'-diaminoarsenobenzolmonoformaldehydsulfoxylsäure u. einer 75% Glucoselsg. bei 15° unter Schütteln gel. Das in W. ll. Prod. wirkt infolge des Ggw. von freien Phenolhydroxylgruppen stark ätzend. Es findet als Ausgangsmaterial für die Herst. von Arzneimitteln, sowie infolge seiner stark reduzierenden Eigenschaften auch als photograph. Entwickler Verwendung. Die wss. Lsgg. des Prod. lassen sich ohne Zers. sterilisieren. (F. P. 556636 vom 28/12. 1921, ausg. 24. 1923. Schwz. P. 104209 vom 1/12. 1922, ausg. 1/5. 1924.)

SCHOTTLÄNDER

Établissements Poulenc Frères, Paris, und **Carl Oechslin**, Ablon, Frankreich, Oxyalkylarsinsäuren. Aliph., ein oder mehrere Male die Gruppe $\text{R}^1\text{CH}(\text{X})$, worin R^1 verschiedene Substituenten, X ein Halogenatom u. R^2 Wasserstoff oder einen anderen Substituenten bedeutet, im Mol. enthaltende Verbb. werden mit Na_3AsO_3 behandelt. — Der Substituent R^1 kann entweder den Rest CH_2OH , CO_2H -Gruppe oder den Rest $\text{CH}_2\cdot\text{AsO}(\text{OH})_2$ bedeuten. Z. B. wird Äthylendibromid mit wss. Na_3AsO_3 -Lsg. am Rückflußkühler bis zum Verschwinden des Bromids erhitzt, die Lsg. mit HCl neutralisiert, mit H_2O_2 die freie H_3AsO_3 zu H_3AsO_4 oxydiert, letztere mit Magnesiamischung ausgefällt u. aus der filtrierten Lsg. das Ba-Salz der Oxyäthylarsinsäure $\text{CH}_2(\text{OH})\cdot\text{CH}_2\cdot\text{AsO}(\text{OH})_2$ mit BaCl_2 abgeschieden (hierzu vgl. F. P. 556366; C. 1923. IV. 721). — Analog erhält man aus dem α,β -Dibrompropylalkohol $\text{CH}_2(\text{Br})\cdot\text{CH}(\text{Br})\cdot\text{CH}_2\text{OH}$ die Monoarsinsäure $\text{CH}_2(\text{OH})\cdot\text{CH}(\text{AsO}[\text{OH}]_2)\cdot\text{CH}_2\text{OH}$ u. aus der α,β -Dibrompropylmonoarsinsäure $\text{CH}_2(\text{Br})\cdot\text{CH}(\text{Br})\cdot\text{CH}_2\cdot\text{AsO}(\text{OH})_2$ die Diarsinsäure $\text{CH}_2(\text{AsO}[\text{OH}]_2)\cdot\text{CH}(\text{OH})\cdot\text{CH}_2\cdot\text{AsO}[\text{OH}]_2$. (F. P. 569541 vom 28/10. 1922, ausg. 14/4. 1924. E. P. 206143 vom 19/10. 1923, Auszug vom 19/12. 1923. F. Prior. 28/10. 1922. Schwz. P. 106897 vom 1/10. 1923, ausg. 16. 1924. F. Prior. 28/10. 1922.)

SCHOTTLÄNDER

Établissements Poulenc Frères, Paris, und **Carl Oechslin**, Ablon, Frankreich, Oxyalkylarsinsäuren. Man läßt Alkaliarsenite auf aliph. Verbb. der Zus. $\text{RCH}_2\text{CH}_2\text{OH}$, worin R entweder H, CH_3 , C_2H_5 , CO_2H oder CH_2OH bedeutet, einwirken. Z. B. wird Glycid (II.) mit einer wss. Lsg. von Na_3AsO_3 auf 80° erwärmt u. nach Beendigung der Rk. die Lsg. mit HCl neutralisiert. Zur Entfernung freier H_3AsO_3 wird diese mit H_2O_2 zu H_3AsO_4 oxydiert u. letztere mit $\text{Mg}(\text{OH})_2$ ausgefällt. Durch Zugabe von BaCl_2 zu der filtrierten Lsg. wird das Ba-Salz der Dioxypropylmonoarsinsäure, $\text{CH}_2(\text{OH})\cdot\text{CH}(\text{OH})\cdot\text{CH}_2\cdot\text{AsO}(\text{OH})_2$, ausgefällt. — Analog erhält man aus Äthylenoxydcarbonsäure (III.) u. Na_3AsO_3 das betreffende Salz der Arsinsäure, $\text{CH}(\text{CO}_2\text{H})\cdot(\text{OH})\cdot\text{CH}_2\cdot\text{AsO}(\text{OH})_2$. — Das Verf. des F. P. 556366 läßt sich auch weiterhin derart abändern, daß man das Na_3AsO_3 auf Halogenhydrine, die in derselben C-Kette bereits andere Gruppen substituiert enthalten, wie CO_2H , CN, Cl, $\text{AsO}(\text{OH})_2$, einwirken läßt. — Z. B. wird α -Oxy- β -chlorpropionsäurenitril mit wss. Na_3AsO_3 -Lsg. auf 80° erwärmt, die Lsg. neutralisiert, mit H_2O_2 oxydiert, die über-



wird diese mit H_2O_2 zu H_3AsO_4 oxydiert u. letztere mit $\text{Mg}(\text{OH})_2$ ausgefällt. Durch Zugabe von BaCl_2 zu der filtrierten Lsg. wird das Ba-Salz der Dioxypropylmonoarsinsäure, $\text{CH}_2(\text{OH})\cdot\text{CH}(\text{OH})\cdot\text{CH}_2\cdot\text{AsO}(\text{OH})_2$, ausgefällt. — Analog erhält man aus Äthylenoxydcarbonsäure (III.) u. Na_3AsO_3 das betreffende Salz der Arsinsäure, $\text{CH}(\text{CO}_2\text{H})\cdot(\text{OH})\cdot\text{CH}_2\cdot\text{AsO}(\text{OH})_2$. — Das Verf. des F. P. 556366 läßt sich auch weiterhin derart abändern, daß man das Na_3AsO_3 auf Halogenhydrine, die in derselben C-Kette bereits andere Gruppen substituiert enthalten, wie CO_2H , CN, Cl, $\text{AsO}(\text{OH})_2$, einwirken läßt. — Z. B. wird α -Oxy- β -chlorpropionsäurenitril mit wss. Na_3AsO_3 -Lsg. auf 80° erwärmt, die Lsg. neutralisiert, mit H_2O_2 oxydiert, die über-

ssige H₃AsO₄ mit sd. Mg(OH)₂-Suspension gefällt, filtriert u. aus dem Filtrat Ba-Salz der *Arsinsäure*, CO₂H·CH(OH)·CH₂·AsO(OH)₂, mit BaCl₂ ausgefällt. — tzt man das α -Oxy- β -chlorpropionsäurenitril durch die β -Oxy- α -chlorpropion-₂, so läßt sich analog die *isomere Arsinsäure*, CH₂(OH)·CH(AsO[OH]₂)·(CO₂H), nnen. (F. PP. 27329 u. 27330 vom 26/10. 1922, ausg. 6/6. 1924. Zuss. zu 556366; C. 1923. IV. 721. E. P. 206152 vom 24/10. 1923, Auszug veröff. 19/12. F. Prior. 26/10. 1922.)

SCHOTTLÄNDER.

Gelsenkirchener Bergwerks-Akt.-Ges. und Franz Schütz, Gelsenkirchen, *Herstellung von aromatischen Aldehyden* aus aromat. KW-stoffen u. ihren Substitutions-_d. mittels Kohlenoxyd u. Salzsäuregas bei Ggw. von AlCl₃, gek. durch die Mit-_{endung} aromat. Nitro-KW-stoffe als Lösungsm. — Man trägt z. B. in ein Ge-_h von Bzl. u. Nitrobenzol bzw. Nitrotoluol bei 15° gepulvertes sublimiertes₃ ein. In die klare rotgelbe Lsg. wird alsdann während 6—8 Stdn. bei 50—60°_{rockener} Gasstrom von CO u. HCl eingeleitet. Nach Zers. des Reaktionsprod._{Eiswasser} wird der Benzaldehyd mit unverbrauchtem Bzl. u. Nitrobenzol durch_{erdampf} abgetrieben u. über die Bisulfitverb. abgeschieden u. gereinigt. Die_{reute} beträgt über 90% des verbrauchten Bzl. — Analog erhält man aus Mono-_{benzol} in einer Ausbeute von 70% *p*-Chlorbenzaldehyd u. aus Toluol den *p*-Toluy-_{aldehyd}. Das Verf. führt zu vollkommen chlorfreien Aldehyden, die als Ausgangs-_{ce} für die Herst. von *Riechstoffen* u. *Konservierungsmitteln* dienen sollen. (D. R. P. 489 Kl. 12o vom 29/11. 1921, ausg. 29/9. 1924.)

SCHOTTLÄNDER.

Naamlooze Vennootschap Vereenigde Fabrieken van Chemische Pro-_{dukten}, Deventer, Niederlande, übert. von: **Vereinigte Chemische Werke Akt.-_{ge}**, Berlin-Charlottenburg, und **Thilo Kroeber**, Berlin-Westend, *Herstellung von_{organischen} Superoxyden in fein verteiltem Zustande*. Man bewirkt die Zerkleinerung_{e organ.} Superoxyde, insbesondere von Benzoylsuperoxyd, in Ggw. von Fll. —_{werden} Benzoylsuperoxyd u. W. in einem rotierenden Holzfaß, in dem sich_{ellankugeln} verschiedener Größen befinden, 4—6 Stdn. bei 50—60 Umdrehungen_{e Fasses} pro Minute vermahlen. Man erhält dann das Benzoylsuperoxyd als_{ite}, dünne, leicht absaugbare Paste, die bei Verlängerung der Mahldauer, nach_{abe} von W., stundenlang haltbare Suspensionen liefert. An Stelle von W._{ößen} beim Vermahlen Salzsgg. oder gegen Superoxyd indifferente organ. Fll.,_{ri Bzl.}, k. A., oder Gemische von organ. u. anorgan. Fll. verwendet werden. Das_{teroxyd} kann vor der eigentlichen Behandlung trocken zerkleinert werden, ferner_{an} die Vermahlung bei 15° oder tieferen Tempp. erfolgen. Außer durch Ab-_{afen} lassen sich das W. oder die anderen Fll. aus den vermahlenen Superoxyden_{nn} durch Überleiten von Gasen bei mäßigen Tempp. entfernen. In Ggw. von_{usw.} findet beim Vermahlen der Superoxyde keine Abspaltung von O₂ statt._{Di} fein verteilten Superoxyde finden zum *Bleichen fester Stoffe*, mit denen sie sich_{ent} vermischen lassen, Verwendung. (E. P. 200508 vom 3/7. 1923, ausg. 5/9.₉₁. D. Prior. 4/7. 1922. F. P. 568212 vom 19/6. 1923, ausg. 18/3. 1924. D. Prior.₁₉₂₂. Schwz. P. 104787 vom 12/6. 1923, ausg. 16/5. 1924. D. Prior. 4/7.₉₁.)

SCHOTTLÄNDER.

Howards & Sons Limited, Ilford, und **John William Blagden**, South Wood-_{fo}, Essex, Großbritannien, *Herstellung von krystallisiertem Menthol*. Zwecks Ver-_{größerung} der Ausbeute an opt.-inakt. krystallisiertem Menthol wird *Thymol* unter_{Zatz} des bei der Hydrierung als Nebenprod. entstehenden fl. *i*-Menthols erneut_{e Hydrierung} mit H₂ in Ggw. von Katalysatoren unterworfen. Das fl. *i*-Menthol_{ist} hierbei als Lösungsm. für das Thymol u. wird seinerseits allmählich in festes_{Menthol} umgewandelt. — Z. B. wird geschmolzenes Thymol mit Ni-Katalysator ver-_{set} u. in einem Autoklaven unter einem Druck von 2—5 kg pro qcm u. kräftigem_{Rhren} bei 130—160° mit H₂ behandelt, bis kein Gas mehr absorbiert wird. Man

trennt die h. Lsg. vom Katalysator u. kühlt sie langsam auf ca. 10° ab. Die ausgeschiedenen, ca. 30% des Thymols betragenden Krystalle werden entfernt u. das Fl. mit einer diesen Krystallen entsprechenden Menge frischen Thymols versetzt. Das Gemisch wird dann erneut hydriert u. weiter behandelt wie vorher, der i-Menthol wieder mit Thymol vermischt u. das Verf. beliebig oft wiederholt. — Kühlt man die h. Hydrierungsflüssigkeit nur auf 110—120° ab u. rührt sie bei dieser Temp. kräftig unter andauerndem Einleiten von H₂, läßt dann auf 10° abkühlen u. arbeitet weiter wie oben, so wird die Ausbeute an festem *Menthol* noch weiter erhöht. — Schließlich kann man das fl. i-Menthol mit Ni-Katalysator in einer H₂-Atmosphäre unter andauerndem Rühren während mehrerer Stdn. auf 110° erhitzen. Kühlt man dann auf 10° ab, so erhält man festes *Menthol* in einer Ausbeute von ca. 50% des fl. Ausgangsstoffes. (E. P. 213991 vom 12/1. 1923, ausg. 8/5. 1924. F. P. 575205 vom 3/1. 1924, ausg. 25/7. 1924. E. Prior. 12/1. 1923. Schvz. P. 107618 vom 31/12. 1923, ausg. 1/11. 1924. E. Prior. 12/1. 1923.) SCHOTT.

Badische Anilin- & Soda-Fabrik (Erfinder: **Alwin Mittasch** und **Mart Müller-Cunradi**), Ludwigshafen a. Rh., Herstellung chemischer Verbindungen aus gas- oder dampfförmigen Stoffen, dad. gek., daß in den Fällen, in denen bisher AlCl₃ benutzt wurde, metall. Al, zweckmäßig in aktivierter Form, oder Gemische oder Legierungen desselben in Ggw. von HCl verwendet werden. — Die Fkz. zwischen den gasförmigen organ. Verb., gasförmigem HCl u. metall. Al tritt, ohne Vorhandensein einer gasförmigen Phase, bereits bei einer weit niedrigeren Temp. ein als derjenigen, bei der Al allein mit HCl-Gas reagiert. Gegenüber den bisher mit AlCl₃ ausgeführten Synthesen werden vielfach bessere Ausbeuten erzielt. Die Aktivierung des Al kann durch Zugabe von wenig AlCl₃ oder durch kurzes Erhitzen des Metalles im Halogen- oder Halogenwasserstoffstrom erfolgen. Statt reinen Al kann man auch dieses enthaltende Metallabfälle u. Legierungen, z. B. eine solche aus 30% Zn u. 70% Al, verwenden. Beim Durchleiten von *Phosgen* durch ein ca. 40° h. Bzl. u. Führung des COCl₂-Bzl.-Dampfgemisches durch ein mit Al-Spänen die mit etwas AlCl₃ gemischt sind, beschicktes Rohr bei 50—60° wird z. B. *Benzol* erhalten, — während beim Überleiten eines Gemisches aus *Äthylen* u. H₂ bei 300—350° u. zuletzt bei 100° über Al-Späne *Äthylchlorid* gewonnen werden kann. (D. R. P. 403507 Kl. 12o vom 7/9. 1920, ausg. 26/9. 1924.) SCHOTTLÄNDER.

Chemosan Aktiengesellschaft, Wien, Darstellung von leicht löslichen Doppelsalzen aus Monomethyl-, Dimethyl- und Trimethylxanthinen, dad. gek., daß man anstatt die Ca-Verbb. der methylierten Xanthine im wss. Medium *Ca-Lactat* einwirken läßt, — Die ll. Doppelsalze zeigen die verstärkte Wrkg. aller 3 Komponenten, indem sie einerseits die blutdrucksenkende u. diuret. Wrkg. des Theobromins, Theophyllins u. Coffeins u. gleichzeitig die stypt. Wrkg. der Ca-Salze besitzen, ohne wie bisher durch schwer abzubauenen arom. Carbonsäuren belastet zu sein, da die Milchsäure im Organismus vollständig verbrannt wird. Die Ca-Verbb. der methylierten Xanthine, wie *Theobromincalcium*, *Theophyllincalcium*, *Paraxanthincalcium* u. *Coffeincalcium*, geben sowohl mit 2, als auch mit 1 Mol. *Ca-Lactat* in wss. ll. Doppelsalze. Ein Beispiel für die Herst. des Doppelsalzes *Theobromincalcium* + 2 Mol. *Ca-Lactat* ist angegeben. (D. R. P. 406211 Kl. 12p vom 14/2. 1922, ausg. 15/11. 1922. Oe. Prior. 3/2. 1922. Oe. P. 95241 vom 3/2. 1922, ausg. 10/12. 1923.) SCHOTTLÄNDER.

Établissements Poulenc Frères und **Auguste Béhal**, Paris, Herstellung von *Theobromin-1-essigsäure* und deren Homologen. Man behandelt *Theobromin* in alkalischer Lsg. mit aliphatischen Halogen-carbonsäuren. Z. B. wird eine Lsg. von *Theobromin* in wss. NaOH mit einer wss. von monochloressigsaurem Na 6 Stdn. unter Druck auf 115° erhitzt. Man filtriert, neutralisiert mit verd. HCl u. krystallisiert aus sd. W. um. Die *Theobromin-1-essigsäure* (Coffeincarbonsäure), C₇H₇O₂N₄·CH₂·CO₂H, F. 210° bis 260° ohne Zers., ist in wss. von 15° nur wl. (zu 0,342%), in sd. W. etwas leicht

Teile in 100 Teilen W.), ebenso in wss. HCl u. H₂SO₄, l. in sd. 95%ig. A. Salze sind in A. weniger l. als in W. Das Na-, NH₄-, K-, Ca- u. Mg-Salz sl. W., das Li-Salz weniger l. in W. Das K-Salz kann z. B. durch Lösen der e unter Zugabe von KHCO₃ u. Versetzen der Lsg. mit 96%ig. A. krystallin. lten werden. Die Salze mit organ. Basen sind in W. sl. Man erhält sie durch alisation der freien Basen, ihrer Hydrate oder Carbonate mit der Säure oder h Umsetzung des Ba-Salzes der Säure mit den Sulfaten der Basen. Das aus hen Mol. der Säure u. Chininhydrat gewonnene *Chininsalz* ist in 1 Teil, das *Dimethylentetraminsalz* in 2 Teilen W. l. (F. P. 556365 vom 29/12. 1921, ausg. 1923.)

SCHOTTLÄNDER.

Gesellschaft für Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, *Darstellung phosphorhaltigen Grundsubstanz des Milchcaseins in chemisch reiner Form*, dad. e. daß man die in bekannter Weise durch Verdauung von Milchcasein mit Pankreas- enten in schwach alkal. Medium erhaltene abfiltrierte Verdauungsflüssigkeit mit e vermetallsalzen ausfällt, die Schwermetallsalzfällung zwecks Entfernung des e vermetalls aus der organ. P-Verb. u. Trennung der letzteren von Mineralphosphor- ie mit Alkalicarbonatlsg. behandelt, die dadurch entstehende Lsg. der Alkali- al: der organ. P-Verb. einer zweiten Verdauung mit Pankreasfermenten während er Zeit aussetzt, mit A. versetzt, das abgeschiedene Alkalisalz der chem. reinen o. in W. löst, mit einem Schwermetallsalz ausfällt, die Fällung mit H₂S vom ull befreit, die so erhaltene Lsg. der freien Säure mit A. fällt u. die Fällung n Trockne bringt. — Ein Beispiel für die Herst. der Verb. durch Verdauung von hcasein in wss. Suspension unter Zusatz von Na₂CO₃ u. NaHCO₃ durch Trypsin a gw. von Toluol bei 40 bzw. 15° u. Abscheidung der P-Verb. über das Pb-Salz tangegeben. Die *freie Säure aus abgebautem Casein* läßt sich durch Trypsin it weiter abbauen u. durch Fraktionierung nicht weiter zerlegen. Das weiße, mphe Pulver ist in W. klar l., in A. u. anderen organ. Lösungsm. wl. bzw. in wss. Lsg. auf Kongorot neutral, auf Methylorange u. Lackmus sauer eierend. Zur Neutralisation auf Methylorange sind ca. 4 Äquivalente, zur Rosa- äung von Phenolphthalein genau 14 Äquivalente NaOH erforderlich. Die wss. e der Säure wird durch Magnesiamixtur auch nach längerem Stehen nicht ge- rit, Mo-Fl. ruft in konz. Lsg. der Säure einen rein weißen, in verd. Lsg. keinen N hervor, Cu-Acetat gibt einen hellblauen, Pb-Acetat u. Hg-Salze einen weißen, A₂O₃ u. FeCl₃ keinen Nd. Die mit NaOH neutralisierte Lsg. gibt dagegen mit A₂O₃ einen weißen, mit Fe-Salzen einen gelben Nd. Die Alkalisalze haben ein artiges Aussehen, Erdalkalisalze weiße, amorphe, in W. ll. Pulver (hierzu vgl. u D.R.P. 401272: C. 1925. I. 410). Biuretrk. schön rosa, Millonsche Xantho- rein- u. Molischsche Rk. völlig negativ. Gleichwohl scheint die Verb. eine Klenhydratgruppe zu besitzen. Kocht man sie einige Stdn. unter Rückfluß mit ccz. HCl u. dest. nachher die HCl ab, so geht gleichzeitig ein zwar mit Anilin- cat keine Furfurolrk. gebendes Prod. über, das jedoch mit Phlorglucin ein rotes Phloglucid ausfällt u. Fehlingsche Lsg. reduziert. Gegenüber Mineralsäuren in e Kälte, gegenüber NH₃ u. NaHCO₃ unter 40° ziemlich widerstandsfähig. KOH u. Ba(OH)₂ spalten bei 15° allmählich die Hälfte der H₃PO₄, sd. fast augenblicklich ättliche H₃PO₄ ab. Die als organ. P-Kern des Caseins anzusehende, 5,86% P ernaltende Verb. soll zur P-Therapie Verwendung finden. Die Verteilung des N in Mol. nach Hydrolyse mit 25%ig. H₂SO₄ ist = ca. 16% Amid-, 12% Basen- u. 72% Amin-N, so daß in der Verb. 4 Atome P u. 18 Atome N anzunehmen sind. (R. P. 406963 Kl. 12p vom 13/3. 1923, ausg. 3/12. 1924. Schwz. Prior. 25/1. 13. Schwz. P. 104336 vom 25/1. 1923, ausg. 16/4. 1924. E. P. 221716 vom 9/2. 1923, ausg. 9/10. 1924.)

SCHOTTLÄNDER.

X. Farben; Färberei; Druckerei.

Adrien Alphonse Guigon, Rhône, Frankreich, *Kleb- oder Appreturmittel*. M_z vermisch 10 Teile Kartoffelmehl mit 90 Teilen NaOH 1° Bé.; zum Gebrauch vermisch man die M. mit der 3—5-fachen Menge W. (F. P. 577385 vom 17/4. 1922, ausg. 4/9. 1924.) FRANZ.

Société pour la Fabrication de la Soie „Rhodiaseta“, Paris, übert. v. **Maurice Ernest Bouvier**, Lyon, Frankreich, *Färben von Celluloseacetat*. (A. P. 1489814 vom 25/4. 1922, ausg. 8/4. 1924. — C. 1923. IV. 209.) FRANZ.

Maurice Roger Raffin, Frankreich, *Deckfarbstoff*. Eisen u. Titan enthaltene Erze, wie Ilmenit, werden, wenn sie nicht bereits in Sandform vorliegen, grob zerkleinert, mit einem Reduktionsmittel, wie Kohle, u. einem schmelzbaren, neutrale nicht oder schwer reduzierbaren Salz, wie NaCl, gemischt u. in reduzierender Atmosphäre auf etwa Rotglut erhitzt, wobei aber das Erhitzen nicht soweit gesteigert werden darf, daß völlige Red. des Fe u. gegebenenfalls des Salzes oder Verflüchtigung des letzteren erfolgt. Das Erzeugnis wird dann vom Salz u. nicht verbrauchte Reduktionsmittel getrennt u. kann nun im Gegensatz zum Rohstoff leicht zu einem unfehlbaren Pulver von grauer Farbe vermahlen werden, das als Deckfarbstoff verwendet werden soll. (F. P. 575935 vom 17/1. 1924, ausg. 8/8. 1924.) KÜHLIN

Lionel Venn-Brown, Australien, *Eisenoxydpigment und Salzsäure*. Man mischt Fe(OH)₃ u. FeCl₂ u. zersetzt es bei einer niedrigeren als der gewöhnlichen Temperatur in Ggw. von Luft durch Erhitzen. (F. P. 577513 vom 21/2. 1924, ausg. 6/1. 1924.) KAUSCH.

Alexandre Pedemonte, Frankreich, *Aluminiumsulfat, Ammoniumsulfat und Preußisch-Blau aus Bauxit*. Man läßt auf Bauxit eine Säure (H₂SO₄) einwirken, filtriert von der SiO₂ ab, red. die Lsg. mit Zn, Fe oder Al, dann läßt man die durch die kalte Lsg. hindurchströmen u. calciniert den erhaltenen Ammoniakalau. (F. P. 577671 vom 30/4. 1923, ausg. 9/9. 1924.) KAUSCH.

Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning, Höchst a. M. (Erfinder: Hermann Wagner, Bad Soden i. T. u. Otto Sohst, Höchst a. M., *Darstellung von Azofarbstoffen*. (D. R. P. 407563 Kl. 22a vom 19/1. 1923, ausg. 16/12. 1923. — C. 1923. IV. 330.) **Schw. P. 107620** vom 15/1. 1924, ausg. 1/11. 1924. D. Prior. 18/1. 1923. **F. 575934** vom 17/1. 1924, ausg. 8/8. 1924. D. Prior. 18/1. 1923. — C. 1924. 2307.) FRANZ.

Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Leverkusen, übert. von: **Johann Huismann**, Wiesdorf, *Monoazofarbstoffe*. (A. P. 1483447 vom 15/3. 1923, ausg. 12/2. 1924. — C. 1923. IV. 330.) FRANZ.

Chemische Fabrik Griesheim-Elektron, Frankfurt a. M., Erfinder: Hermann Wagner, Höchst a. M., *Herstellung von Azofarbstoffen*. (Austr. P. 6969 vom 18/5. 1922, ausg. 16/1. 1923. — C. 1923. IV. 210.) FRANZ.

Chemische Fabrik Griesheim-Elektron, Frankfurt a. M. (Erfinder: Hermann Wagner, Höchst a. M., *Herstellung von Azofarbstoffen*. (Aust. P. 8430 vom 15/1. 1922, ausg. 16/1. 1923. — C. 1923. IV. 989.) FRANZ.

Chemische Fabrik Griesheim-Elektron, Frankfurt a. M. (Erfinder: L. Lasch und A. Zitscher), *Herstellung von Monoazofarbstoffen*. (Schwed. P. 55603 vom 6/9. 1922, ausg. 20/11. 1923. D. Prior. 4/11. 1921. — C. 1923. IV. 989. [E. 200739]) FRANZ.

Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., übert. von: **Wilhelm Neumeier und Karl Heusner**, Leverkusen bei Köln a. Rh., *Herstellung von Disazofarbstoffen*. (A. P. 1504134 vom 14/4. 1923, ausg. 5/8. 1924. — C. 1923. I. 881.) FRANZ.

Aktien-Gesellschaft für Anilin-Fabrikation, übert. von **Werner Lange**
Ludwig Neumann, Berlin, *Tetrakisazofarbstoffe*. (A. P. 1504125 vom 23/8.
 2. ausg. 5/8. 1924. — C. 1923. IV. 990.) FRANZ.

Chemische Fabrik Rohrer A.-G., Pratteln, Baselland, Schweiz, *Beizenziehender*
Triarylmethanfarbstoff. Man behandelt 1 Mol. Methyldisalicylsäure u. 1 Mol.
 Alkylsäureamid mit oxydierenden Mitteln, z. B. in H₂SO₄ mit NaNO₃. Der Farb-
 stoff färbt Wolle aus saurem Bade in ponceauroten Tönen, die beim Nachchromieren
 violett übergehen; im Chromdruck auf Baumwolle liefert er rotstichig violette
 Farben von guter Waschechtheit. (Schwz. P. 107621 vom 5/1. 1924, ausg. 1/11.
 1924.) FRANZ.

Guillaume de Montmollin, Joseph Spieler und Gérald Bonhôte, übert. an:
Gesellschaft für Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, *Triarylmethan-*
farbstoffe. (A. P. 1460315 vom 22/11. 1921, ausg. 26/6. 1923. — C. 1923. IV. 292.
 1923. 191854.) FRANZ.

Durand & Huguenin, A. G., übert. von: **Théodore Lombard**, Basel, Schweiz,
Farbenfärbende Chinonfarbstoffe. (A. P. 1503194 vom 7/5. 1923, ausg. 29/7. 1924.
 1923. IV. 456.) FRANZ.

Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Leverkusen, übert. von: **Hein-**
rich Friedrich Raeder und Walter Mieg, Vohwinkel, *Herstellung von sauren*
Chinonfarbstoffen. (A. P. 1508409 vom 28/5. 1923, ausg. 16/9. 1924. —
 1923. IV. 949.) FRANZ.

Perylene Company, Inc., New York, übert. von: **Alois Zinke und Albert**
Klugler, Graz, Österreich, *Schwefelhaltige Perylenfarbstoffe*. (A. P. 1494400 vom
 1923, ausg. 20/5. 1924. — C. 1923. IV. 456. [Pereira].) FRANZ.

Société Chimique de la Grande Paroisse, übert. von: **Louis Haas**, Paris,
 Frankreich, *Herstellung von grünen Schwefelfarbstoffen*. (A. P. 1501769 vom 10/5.
 1923, ausg. 15/7. 1924. — C. 1923. IV. 772.) FRANZ.

Gesellschaft für Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, *Grüne*
Schwefelfarbstoffe und Zwischenprodukte. (E. P. 201540 vom 4/7. 1923, ausg. 19/9.
 1923. Schwz. Prior. 28/7. 1022. — C. 1924. II. 2427.) FRANZ.

Gesellschaft für Chemische Industrie in Basel, Emil Reber und Jaroslav
Rehlich, Basel, Schweiz, *Grüne Schwefelfarbstoffe und Zwischenprodukte*. Indo-
 phenol aus Aralkyl- α -naphthylamin oder Dialkyl- α -naphthylamin werden mit einem
 sauren schwefeligen Säure behandelt u. das erhaltene Prod. mit Alkalipolysulfiden
 in wässriger Lsg. von Cu erhitzt. Das Indolphenol aus Chinonchlorimid u. Benzyl- α -naph-
 thylamin liefert beim Behandeln mit verd. NaHSO₃-Lsg. eine in W. ll. 1-Mono-
 methylamino-4-p'-oxyphenylnaphthylaminosulfosäure; aus dem Indolphenol aus Di-
 methylamino-4-p'-oxyphenylnaphthylamin u. p-Aminophenol entsteht eine 1-Dimethylamino-4-p'-oxy-
 phenylnaphthylaminsulfosäure. Beim Erhitzen mit Alkalipolysulfiden u. Cu erhält
 man Schwefelfarbstoffe, die auf Baumwolle grüne Färbungen liefern, die gegen
 Seifenalkali alkal. Seifenlsg. echt sind. (E. P. 222624 vom 17/8. 1923, ausg. 30/10.
 1923. Zus. zu E. P. 201540; vorst. Ref. Schwz. P. 104709 vom 26/6. 1923, ausg. 1/8.
 1924. Zus. zu Schwz. P. 101403; C. 1924. II. 2427.) FRANZ.

John Langbein, Hamburg, *Herstellung von Wasserfarben*, dad. gek., daß den
 wässrigen Kalk- u. Zementmischungen polymerisierte Öle u. gegebenenfalls
 mit Kieselgur zugesetzt werden. (D. R. P. 401062 Kl. 22 g vom 2/12. 1922, ausg.
 23. 1924.) KAUSCH.

XVI. Nahrungsmittel; Genußmittel; Futtermittel.

Yuzuru Okuda und Seisaku Nakayama, Über die Eigenschaften von „Asaku-
 scor“. Asakusanori oder Hoshinori ist eine beliebte Volksnahrung, gewonnen
 durch Trocknen von *Porphyra tenera* KJELLM. Die angegebenen Analysen zeigen,

daß die besten Qualitäten am meisten N enthalten, hauptsächlich als Eiweiß. (Journ. Coll. Agric. Tokyo 5. 339—40. 1916.)

Hidesaburo Matsui, unter Beihilfe von **Y. Miyama**, *Über die Beziehung zwischen den chemischen Bestandteilen von „Asakusa-nori“ (Porphyra laciniata) und seinen Eigenschaften.* (Vgl. vorst. Ref.) Der höhere N-Gehalt der besseren Proben wird bestätigt. Er hängt ab von den Wachstumsbedingungen der Alge u. der Art des Bodens, auf dem sie wächst. Die höhere Qualität wird gewonnen aus Örtläusen, wo das W. an Algennährstoffen reich ist, u. enthält demgemäß auch mehr Kohlenhydrat u. Fett u. weniger Rohfaser. (Journ. Coll. Agric. Tokyo 5. 391—40. 1916.)

Yuzuru Okuda und Hidesaburo Matsui, *Über konservierte Krabben.* Dargestellt aus Japan ausgeführte Material (canned crab) ist das Fleisch von *Paralithodes camtschatica*. Es werden Unterss. des frischen u. des konservierten Fleisches wiedergegeben. Die Mengen Nichteiweiß-N u. S sind, wie bei anderen Crustaceen im allgemeinen höher als bei Fischen. Bei weiblichen Tieren ist dies in noch höherem Grade der Fall als bei männlichen. Schon bei Kochen mit W. wird ein flüchtige S-Verb. abgegeben. Merkliche Autolyse des frischen Fleisches läßt sich ratsam erscheinen, das Kochen unmittelbar nach dem Fang vorzunehmen. Alkal. Rk. begünstigt die Veränderungen, auch diejenigen beim Kochen. Fast alle Krabbenkonserven zeigen solche Rk., die mit der Zeit zunimmt u. mit zunehmender Stärke immer weitergehende Lsg. von Fe aus der Gefäßwandung verursacht. Das häufige Schwarzwerden der Konserve beruht auf B. von FeS, das geschwärzte Fleisch enthält mehr l. organ. Substanz, Nichteiweiß-N, S u. NH₃ als anderes. Es werden Maßnahmen für Vermeidung der Schwärzung vorgeschlagen. (Journ. Coll. Agric. Tokyo 5. 325—37. 1916.)

Hidesaburo Matsui, *Untersuchungen über die chemische Zusammensetzung von „Tarabagani“ (Paralithodes Camtschatica).* (Vgl. vorst. Ref.) Beim Weibchen enthält das Fleisch mehr W. u. in der Trockensubstanz weniger organ. Substanz als beim Männchen, dagegen mehr Asche, Fe, S u. Nichteiweiß-N. Auch das weibliche Blut hat mehr W., S u. Nichteiweiß-N. Das Blut, das sich an der Luft dunkelblau färbt, enthält neben Schwermetallen (Fe, Cu) *Oxydase*, *Peroxydase*, *Tyrosinase* u. *Katalase*. Ca. $\frac{1}{4}$ seiner Asche ist NaCl. — Die Schale dieser Krabbe besteht im wesentlichen aus *Chitin*, *CaCO₃* u. *Ca₃(PO₄)₂*. (Journ. Coll. Agric. Tokyo 5. 395—400. 1916.)

K. Kobert, *Über frische Bratfische.* Beschreibung des neuerdings in den Verkauf kommenden Nahrungsmittels, weniger richtig auch *Backfische* (engl. *fried-fish*) genannt; durch das Braten der Fische in h. Öl tritt starke Wasserabnahme, gleichzeitig Erhöhung der N-Substanz ein. (Chem.-Ztg. 49. 61. 66—68. Dessau.)

Henri Stassano, *Über die Wirkungsart der Wärme auf die Milchsäurefermentation bei der Milchpasteurisierung.* (Vgl. STASSANO u. ROLLET, C. r. d. l'Acad. des sciences 179. 297; C. 1924. II. 2096.) Die Milchsäurefermente überleben die Pasteurisierung, doch schwächt diese ihre Lebensfähigkeit u. ihre chem. Wirksamkeit. Die entstandene Modifikation vererbt sich auf die folgenden Generationen, klingt dabei aber allmählich wieder ab. (C. r. d. l'Acad. des sciences 179. 14 bis 1440. 1924.)

Nicolas L. Cosmovici, *Der Gesamtstickstoff der Molken aus roher und gekochter Milch.* (Vgl. C. r. soc. de biologie 91. 885; C. 1925. I. 445.) Auch die Molke aus gekochter Milch gibt noch Eiweißrkk., aber im Gegensatz zu derjenigen aus roher nur schwach. Der Gesamt-N ist in jener geringer um eine Differenz, die ca. 5 g Eiweiß in 1000 g entspricht u. das l. Albumin (Lactoglobulin u. Lactalbumin) der Milch darstellt. Für die Best. müssen die Molken unmittelbar nach der Gerinnung abzentrifugiert werden. (C. r. soc. de biologie 92. 20—21.)

Nicolas L. Cosmovici, Ändert sich p_H der Milch, wenn sie auf verschiedene Temperaturen erhitzt wurde? (Vgl. vorst. Ref.) 30 Min. langes Erhitzen verschiedener Milchproben auf 56, 68, 75 u. 100° ergab mit Erhöhung der Temp. fortwährende Verminderung des p_H -Wertes. (C. r. soc. de biologie 92. 73—74. Paris, 1925.) SPIEGEL.

Saccharin-Fabrik, Akt.-Ges. vorm. Fahlberg, List & Co., Magdeburg, Konser-
vierung von Speisefetten, dad. gek., daß man diese Fette in der Kälte mit Salzen
at. Chloramine behandelt. — Besonders geeignet ist z. B. das *Toluolsulfoclor-*
natrium, von dem bereits 0,05% zur Erreichung einer guten Haltbarkeit aus-
reichen. (D. R. P. 408647 Kl. 53h vom 13/12. 1923, ausg. 20/1. 1925.) OELKER.
Société Anonyme la Stérilisation nouvelle, Antwerpen, Vorrichtung zum
Sterilisieren von Nahrungs-, Genußmitteln und ähnlichen Stoffen in Büchsen, Gläsern
u. s. w. (D. R. P. 408093 Kl. 53c vom 7/6. 1921, ausg. 9/1. 1925. — C. 1924.
13.) KAUSCH.

Lévon Arakel Agopian, Paris, Gewinnung von Vitaminen. Zu dem Ref. nach
168903; C. 1922. II. 157 ist folgendes nachzutragen: Das Eindampfen des
Pflanzensaftes u. die Extraktion des mit Schwermetallsalzen erhaltenen Nd. durch
Glycerin kann auch in einer N_2 -Atmosphäre erfolgen. Das antiskorbut.
Eigenschaften besitzende Vitamin C ist ein komplexes N-haltiges Glucosid, mono-
mer, Krystalle aus wss. A., F. 44—48°, in dest. W. bei 18° zu 35% l., sl. in A.
25% u. in 25% ig. Glycerinlg., bei 95° nahezu unl. in A., sowie in 95% ig.
Glycerin. Die wss. Vitaminlg. zers. sich nach 6 Stdn. bei 18° unter Gelbfärbung.
Die festen Krystalle erleiden durch Hydrolyse u. Oxydation Zers. bei Temp.
46°, durch sehr verd. Alkalilsgg., wie überschüssiger $\frac{1}{100}$ -n. Na_2CO_3 -Lsg.,
oder durch konz. Säuren, unter B. von: 1. einer rechtsdrehenden Monose, gibt
bei Erhitzen mit $C_6H_5NH-NH_2$ auf 100° ein Osazon; 2. einer braungefärbten,
hygroskop. in A. wesentlich leichter als das unzers. Vitamin l. organ. Säure,
ein Salz amorphes Pulver, Na-Salz braunschwarze, sehr hygroskop. Krystalle;
das N-haltigen, linksdrehenden, bitterschmeckenden farblosen Prod., das in A.
schwer l. ist als das Vitamin selbst u. Phenolrk. gibt (nämlich Red. von NH_4 -
Sulfatlg. in der Kälte u. B. eines rosa Nd. mit MILLONS Reagens). (Schwz. P.
10774 vom 6/9. 1921, ausg. 1/3. 1924. F. Prior. 7/9. 1920.) SCHOTTLÄNDER.

Lévon Arakel Agopian, Paris, Gewinnung von Vitaminen. Das Verf. des
Hauptpatents wird dahin abgeändert, daß man den Preßsaft aus frischen Gemüsen,
Kartoffeln usw. beim Eindampfen im Vakuum oder in einer N_2 -Atmosphäre anstatt
mit neutralen Metallsalzen, wie des Cu, Ag, Pb oder Hg, mit geringen Mengen
 $HClO_4$, Citronen- oder Weinsäure versetzt. — Diese Säuren zerstören die in den
Pflanzen enthaltenen, einen schädigenden Einfluß auf die Vitamine ausübenden
Enzyme, insbesondere Oxydasen. Citronen- u. Weinsäure lassen sich auch vor
dem Auspressen den Pflanzen in fester Form beimengen. — Z. B. werden die
Pflanzen in einer Filterpresse ausgepreßt u. der sofort in einen Vakuumverdampfer
übergeführte Preßsaft mit ca. 1% CH_3CO_2H versetzt, teilweise eingedampft, unter
Vollständigen Ausschluß filtriert, in einem zweiten Verdampfer unter Vakuum völlig ein-
gedampft u. der pulverförmige, amorphe Rückstand mit A. extrahiert. Will man
das Glycerin extrahieren, so muß man sich außer eines Soxhletapp. noch einer be-
sonderen, in der Patentschrift beschriebenen Vorr. bedienen, die eine Extraktion
des Pulvers bei der niedrigen Temp. von 30—35° u. die Abscheidung des Vitamins C
in einer, krystallin. Form ermöglicht. Zur Gewinnung des wachstumsfördernden,
in fetten l. Vitamins A verwendet man sowohl den Preßsaft, als auch die festen
Rückstände. Der Saft wird wie oben nach Zusatz der organ. Säuren eingedampft
u. der feste Rückstand im Soxhlet mit Bzl., PAe., Ä., Essigester, Aceton oder Chlf.

extrahiert. Enthält der Abdampfückstand mehr als 10% W., so muß eine Vakuumextraktion mit A. oder CH_3OH bei 98° (? Der Ref.) erfolgen. Nach beendeter Extraktion u. Abdestillieren des Lösungsm. hinterbleibt das *Vitamin A* als grünlichgelbes, orangefarbiges oder rotes Öl, das durch Tierkohle entfärbt wird. Bei Verwendung des *Preßrückstandes* muß dieser möglichst schnell im Vakuum über H_2S bei Temp. zwischen 20 u. 30° getrocknet werden. Er wird dann vermahlen wie der Eindampfückstand des Preßsaftes, im Soxhlet extrahiert u. weiter verarbeitet. — Die Trocknung des Preßrückstandes kann auch in einer aus einem luftdicht schließendem, einen Anschlußhahn an eine Vakuumpumpe enthaltenden Deckel versehenen zylindr. Behälter bestehenden Vorr. erfolgen. Im Inneren des Behälters befindet sich auf geeigneten Trägern ein elektr. Heizwiderstand, auf dem eine Platte zur Aufnahme des zu trocknenden Stoffes ruht. Am Boden des Behälters befindet sich H_2SO_4 . Mit seinem unteren Teil taucht der Behälter außen in ein Wasserbad, durch welches k. W. zur Kühlung zu- u. abfließt. — Die erhaltenen *Vitamine* sind zuweilen stark hygroskop. u. erfordern besondere Vorsichtsmaßregeln beim Verpacken. Man bedient sich hierfür eines rechteckigen Kastens, der oben eine mit luftdicht schließendem Deckel versehene Einführöffnung enthält. Am Boden des Kastens befindet sich ein mit H_2SO_4 gefüllter Trog aus Pb zur Adsorption der Luftfeuchtigkeit. Beim Einbringen der Vitamine müssen die Hände des Arbeiters mit Kautschukhandschuhen bekleidet sein. (E. P. 193831 vom 6. 1923, ausg. 25/4. 1923. F. Prior. 23/2. 1922. Zus. zu E. P. 168903; C. 1922. II. 13 F. PP. 26034 vom 23/2. 1922, ausg. 18/7. 1923 u. 27271 vom 20/1. 1923, aus 31/5. 1924. Zuss. zu F. P. 532398; C. 1922 II. 756. Schwz. P. 105864 vom 31. 1923, ausg. 16/7. 1924. F. Prior. 23/2. 1922. Zus. zu Schwz. P. 103774; vorst. R. N. P. 38647 vom 5/2. 1923, ausg. 24/12. 1923. F. Prior. 23/2. 1922. Zus. zu N. 37040; C. 1924. II. 3400.)

SCHOTTLÄNDER.

L. A. von Horst, Coburg, *Hopfenpräparate und Kaffeersatzmittel*. Gemahlener Hopfen wird zwecks Extraktion des Hopfenöles mit Ä. behandelt, dann werden die Harze mit A. u. schließlich die Gerbsäure mit W. extrahiert. Diese drei Extrakte können dann je nach Wunsch miteinander vermischt werden. Der Gerbsäureextrakt kann zur Bereitung eines Kaffeersatzmittels benutzt werden, indem z. B. Mais oder Gerste damit getränkt u. dann geröstet wird. (E. P. 224594 vom 13. 1923, ausg. 11/12. 1924.)

OELKER.

Merrell-Soule Company, Syracuse, V. St. A., *Herstellung eines löslichen Buttermilchpulvers*. (D. R. P. 408556 Kl. 53e vom 7/1. 1917, ausg. 21/1. 1925. C. 1923. II. 198 [A. P. 1391642].)

OELKER.

XIX. Brennstoffe; Teerdestillation; Beleuchtung; Heizung

O. Schäfer, *Die Anwendung des Schwimmverfahrens zur Aufbereitung von Kohlen*. Vf. gibt einleitend eine Zusammenfassung der bisherigen Flotationsverfahren, der Anwendung u. Grenzen. Der Einbau der Schwimmaufbereitung in die naßmech. Wäsche, die Verwendung der gewonnenen Konzentrate, werden besonders hinsichtlich der Kohleaufbereitung eingehend erörtert. Vf. gelangt zu dem Ergebnis, daß nur mit Hilfe der Schwimmaufbereitung das Höchstausräumen in einer Feinkohlenwäsche erreicht wird, u. daß die Schwimmaufbereitung in der Lage ist, wenigstens einen Teil des Minderausbringens zu decken, der ohne sie bei Herabsetzen von ascheärmer Kohle entstehen wird. Das Aufstellen von Waschdiagrammen ist zur Ermittlung des größtmöglichen Ausbringens erforderlich. Mittelprodd. müssen bei der Schwimmaufbereitung nach Möglichkeit vermieden werden. (Stahl u. Eisen 45. 1—7. 44—51. Berlin.)

K. WOLFF.

Robert E. Wilson und Robert E. Wilkin, *Gebrauch der Köhlerschen Sicherheitslampe zur Prüfung von Behältern auf brennbare Gase oder Dämpfe*. D.

lersche Sicherheitslampe kann mit Vorteil zur Prüfung von leeren Behältern brennbare Gase oder Dämpfe benutzt werden, da sie nach Verss. der Vff. bei einer Flammenhöhe von 20—25 mm noch 0,5% Bzn. in einem Luftgemische anzeigt. (Ind. and Engin. Chem. **16**. 1154—56. 1924. Whiting [Ind.]) GRIMME.

Johannes Steinert, *Die wirtschaftlichen Aussichten der Torfverwendung*. Überblick über die Verwertungsmöglichkeiten für den Torf. (Ztschr. f. angew. Ch. **38**. 1—67. Hamburg.) JUNG.

Sidney D. Kirkpatrick, *Amerikanischer Fortschritt in der Verarbeitung von Schieferen in Retorten*. In einer Tabelle wird der Stand der hauptsächlichsten Verfahren zur Dest. von Ölschiefern unter Angabe des Erfinders oder Besitzers, der Retorten u. des Ortes der Veröffentlichung zusammengestellt, u. es wird an Hand von Abbildungen näher berichtet über 2 Verff., von denen das eine bereits einen fabrikmäßigen Dauerbetrieb übergegangen ist u. Catlinretorten verwendet, während sich das andere noch im Versuchszustande befindet u. Brownretorten benutzt. Die Catlinretorte ist eine stehende Retorte mit Innenheizung, die Brownretorte liegt wagerecht u. wird von außen geheizt. (Chem. Metallurg. Engineering **1770**—71. 1924.) RÜHLE.

A. E. Wood, A. Lowy und W. F. Faragher, *Einwirkung von Petroleumaminierungsmitteln auf reine, in Naphtha gelöste organische Schwefelverbindungen*. Versucht wurde die Wrkg. von H_2SO_4 , Natriumplumbit, CuO , $NaOCl$ u. wasserfreiem $AlCl_3$ auf Mercaptane, organ. Sulfide u. Thiophen gel. in Naphtha. Von diesen erwies sich H_2SO_4 als am wirkungsvollsten, da es nur freien S nicht angreift, Natriumplumbit reagiert nur mit Mercaptanen u. H_2S , CuO nur mit Mercaptanen, $NaOCl$ führt Mercaptane in l. Disulfide über, zers. H_2S in $H_2O + S$, $AlCl_3$ reagiert mit Mercaptanen unter B. von k. beständigen, w. sich zers. Additionsprodd., in Thiophen unter Zers. des letzteren. (Ind. and Engin. Chem. **16**. 1116—20. 1924. Pittsburgh [Pa.]) GRIMME.

Gerald L. Wendt und S. H. Diggs, *Der Chemismus des Aussüßens in der Petroleumindustrie*. Das „Aussüßverf.“ war bisher, trotz langer Benutzung, rein empirisch, die dabei vorkommenden Rkk. haben die Vff. nunmehr eingehend studiert u. festgestellt, daß bei der Na-Plumbitmethode nur H_2S u. Alkylmercaptane entfernt werden, während andere Verbb., z. B. freier S, Sulfide u. Disulfide keine säuernden Eigenschaften besitzen. (Ind. and Engin. Chem. **16**. 1113—15. 1924. Whiting [Ill.]) GRIMME.

W. A. Peters, jr., *Fraktionierte Destillation zur Trennung der Petroleumbestandteile*. Gemische bekannter Zus. werden mit geeigneten Fraktionierkolonnen dest. u. die Kolonnen so geeicht, so daß sie bei der Verwendung zur Dest. unbekannter Gemische gut vergleichbare Werte ergeben. (Ind. and Engin. Chem. **16**. 1126—30. 1924. Wilmington [Del.]) GRIMME.

H. H. Knoch, P. A. Crosby und R. R. Matthews, *Bestimmung der Verdünnung von Kurbelöl*. Kurbelöle sollen selbst bei erhöhter Temp. wenig Destillat abgeben. Z. Best. ihres Verhaltens in dieser Beziehung empfehlen Vff. 2 Methoden: Man reizt entweder im konstanten Vakuum bei der Temp. des ersten Kp. bis nichts mehr entweicht, oder dest. bei steigender Temp. unter öfterem Wechseln der Vorlebe. Beide Methoden geben gut übereinstimmende Werte. (Ind. and Engin. Chem. **16**. 1153. 1924. St. Louis [Mo.]) GRIMME.

W. F. Seyer und S. R. McDougall, *Ein Beitrag zur Chemie der Schmierung*. Z. Messung der Reibungskoeffizienten (R.-K.) wurde die von HARDY u. DOUBLEDAY (M. Proc. Royal Soc. London Serie A. **100**. 550. **101**. 487; C. **1922**. IV. 514. **1923**. 1376) beschriebene Apparatur verwandt. Untersucht wurde die Reibung von Stahl auf Stahl (in einzelnen Fällen auch Bi an Bi). Der Vergleich von gesätt. u. ungesätt.

KW-stoffen führt zu dem Ergebnis, daß anscheinend mit dem Grad der Sättigung die Schmierfähigkeit abnimmt (die ungesätt. KW-stoffe wurden durch Extrakt mit fl. SO₂ entfernt). Im allgemeinen nahm der R.-K. bei handelsüblichen Schmierölen nach der SO₂-Extraktion zu, während die in SO₂ gel. ungesätt. Verbb. mit hoher Jodzahl einen geringeren R.-K. hatten. Jedoch bedeutet die hohe Jodzahl eines Öls an u. für sich noch keine gute Schmierfähigkeit; ungesätt. Verbb. mit ringförmiger Struktur sind trotz hoher Jodzahlen schlechte Schmiermittel. — Den aus Schmierölen isolierten *Naphthenen* nimmt der R.-K. mit steigendem Mol.-Gew. ab. $C_{13}H_{26}$ R.-K. 0,367; $C_{15}H_{28}$ 0,328; $C_{16}H_{30}$ 0,323; $C_{17}H_{32}$ 0,339; $C_{18}H_{34}$ 0,311; $C_{19}H_{36}$ 0,300; $C_{20}H_{38}$ 0,295; $C_{21}H_{38}$ 0,284; $C_{23}H_{42}$ 0,270; $C_{25}H_{46}$ 0,254. Eine Abnahme macht nur das *Naphthen* $C_{17}H_{32}$. — Durch den Zusatz von *Fettsäuren*, *Cetylalkohol* oder ungesätt. Verbb. wird der R.-K. von Mineralölen herabgesetzt; die Schmierfähigkeit steigt mit dem Gehalt der zugesetzten Verbb. bis zu deren vollen Wert der Schmierfähigkeit. Verwandt wurde das Mineralöl Petrolatum ($C_{20}H_{42}$) von der National Drug Co., R.-K., 0,3036, Jodzahl 0,0. Die R.-K. wurden bestimmt von Gemischen des Petrolatums mit *Öl*-, *Stearin*- u. *Palmitinsäure*, *Cetylalkohol*, *Ceten*, *Äthylpalmitat*, *Paraffin*; letztes hat annähernd den gleichen R.-K. wie das Petrolatum; bei den übrigen erfolgte Abnahme des R.-K. mit sinkendem Petrolatumsgehalt. Erhöhung des R.-K. erfolgte bei Mischungen mit *Valeron*, *Naphthalin*, *Terpentin* u. *Terpineol*; diese haben auch in reinem Zustande einen höheren R.-K. als Petrolatum. (Trans. Proc. Roy. Soc. Canada [3.] 18. Sekt. III. 35—48. 1924.) ZANDER.

W. F. Seyer und J. L. Hugget, *Die gegenseitigen Löslichkeiten von Cetyl (Hexadecen) und flüssigem Schwefeldioxyd*. Eine Reihe von Schmierölen wurde bei — 10° mit fl. SO₂ extrahiert, wobei die Jodzahlen von 30—40 auf 14—18 sanken u. nach mehrmaliger Wiederholung konstant blieben. Die Diolefine scheinen demnach bei dieser Temp. in fl. SO₂ l., die Monoolefine unl. zu sein. Als Vertreter der letzteren Klasse wurde *Hexadecen*, $C_{16}H_{32}$, untersucht. Die physikal. Konstanten waren: F. 3,5°, D.₄²⁰ 0,7868, n_D^{20} 1,4420. Bei — 10° fand keine Mischung mit fl. SO₂ statt. 20,77% SO₂ enthielt das Gemisch bei 9,5°, 30,84% bei 20,5°, 46,58% bei 34,5°, 55,27% bei 42,5°, 64,87% bei 42,7°, 82,60% bei 42,6°, 93,36% bei 32,1°, 96,03% bei 24,0°. (Trans. Proc. Roy. Soc. Canada [3.] 18. Sekt. III. 213—16. 1924.) ZANDER.

P. Razous, *Die zur Haltbarmachung von Holz verwendbaren chemischen Stoffe*. Im vorliegenden Teile werden $CaSO_4$, $ZnCl_2$, $HgCl_2$, NaF, ZnF_2 u. die verschiedenen Ferrocyanüre besprochen. (Ind. chimique 11. 535—37. 1924.) RÜHLE.

F. Moll, *Prüfungsverfahren für mit Salzlösung imprägnierte Hölzer*. Vgl. auch eine Zusammenstellung bewährter Rkk. auf Imprägnierungssalze u. erörtert ihre prakt. Anwendung. (Ztschr. f. angew. Ch. 38. 73—74. Berlin.) JUNG.

Société de Recherches et de Perfectionnements Industriels, Paris, *Reinigung von Brennstoffen in einem Wasser-Ölgemisch durch Agglomeration*. Die mit W. Ölen gemischten Brennstoffe werden einer der Butterkürnung ähnlichen Behandlung unterworfen u. zwar unter Zusatz von kolloidalen oder krystalloiden Körpern, welche geeignet sind, die Oberflächenspannung des Bades zu reduzieren. Hierin ballen sich die Brennstoffe zu einer butterähnlichen M. zusammen, während die unverbrennlichen Stoffe in der Fl. suspendiert bleiben u. leicht von jener M. getrennt werden können. (E. P. 192369 vom 8/12. 1922, ausg. 28/3. 1923. F. Prior. 28. 1922.) OELKER.

Wilhelm Reginald Ormandy, Belsize Grove, London, und **Archie Vyvyan Board**, Liverpool, *Herstellung von Briketten*. Man vermischt fein verteilte Kohle oder Braunkohle mit kleinen Mengen Cassavastärke (Tapiokastärke), Pech, Bitumen u. Harz o. dgl. mit oder ohne Zusatz von Alkalisulfat, -chlorid, oder -carbonat, b.

tet u. erwärmt die M., formt Brikette daraus u. trocknet sie. (E. P. 205865 vom 21/7. 1922, ausg. 22/11. 1923.) OELKER.

Niels Young, Frankfurt a. M., *Gleichzeitige Gewinnung von Urteer, Halbkoks aus einem hochwertigen Gases und Drehrohrofen zur Ausführung des Verfahrens.* Die Kohle wird kontinuierlich in einem Drehrohrofen entgast, welcher aus einer gemauerten Trommel besteht, die der Erzeugung oder Zuführung eines Stromes (se dient, u. einem gleichaderigen Innenrohr, in dem die Verkohlung der Kohle sich geht unter Durchführung der aus der äußeren Trommel entweichenden Gase. (D. R. P. 408111 Kl. 10a vom 2/11. 1918, ausg. 12/1. 1925.) OELKER.

Thermal Industrial and Chemical (T. I. C.) Resarch Company Ltd., London, *Behandlung von Flüssigkeiten, insbesondere von Teer o. dgl.* (D. R. P. 402417 vom 12/6. 1921, ausg. 18/9. 1924. — C. 1924. I. 1573.) OELKER.

Rütgerswerke-Aktien-Gesellschaft, Berlin, *Gewinnung von Phenolen aus Teerölen aller Art.* Kurzes Ref. nach E. P. 213249; C. 1924. II. 1541. auszutragen ist folgendes: Die die Phenole enthaltende Schicht wird mit k. oder w. behandelt, u. die aus den Waschwässern erhaltenen Salze werden erneut zur Behandlung neuer Teermengen usw. verwendet. — Ebenso lassen sich durch Waschen der neutralen Öle mit W. die Salze der organ. Basen wiedergewinnen u. neuem benutzen. Geeignete Salze des Pyridins u. seiner Homologen sowie prim., sek. u. tert. aromat. Amine sind z. B. die Sulfate, Chloride, Nitrate, Acetate, Lactate. Beispiele sind angegeben für die Abscheidung der Phenole aus: 40% Öle enthaltendem Braunkohlenteeröl mit Pyridinsulfatlsg., — aus: Braunkohlenteeröl mit 35% sauren Ölen durch Monomethylanilinsulfatlsg., — aus: Steinkohlenteerkeosotöl mit 20% sauren Ölen durch Pyridinsulfatlsg., — aus: Schieferenteerstillat mit 10% Phenolen durch in W. gel. neutrales Pyridinsulfat, — sowie aus Holzteeröl durch gel. neutrales Pyridinsulfat. Beim Ausschütteln der Öle mit diesen Salzen geht die Hauptmenge der Phenole mit jenen in die untere Schicht. (D. R. P. 406150 Kl. 12q vom 25/3. 1923, ausg. 14/11. 1924. F. P. 578404 vom 10/1. 1924, ausg. 25/9. 1924. D. Prior. 24/3. 1923.) SCHOTTLÄNDER.

Wilhelm Ueckerseifer, Essen, Ruhr, *Benzolgewinnungsanlagen* für Kokereien u. Gasanstalten, 1. gek. durch in beliebiger Form ausgeführte auswechselbare Einheits-Wärmeaustauschelemente für den Wärmeaustausch zwischen den einzelnen in der Anlage durchfließenden Medien. — 2. Einheits-Gegenstrom-Wärmeaustauschelement, gek. durch einen ausziehbaren Röhrenbündeleinbau mit Doppelmantel u. entsprechend angeordneten Führungswänden für die Medien. — Es wird ein weitestmöglicher Austausch der in den Destillationsdämpfen u. dem h., abgetriebenen Öl enthaltenen Wärme an das k., angereicherte Öl, u. mithin geringster Dampf- u. Kühlwasserverbrauch, bei einfachster Bauart u. geringen Anlagekosten erreicht. (D. R. P. 405600 Kl. 26d vom 27/3. 1924, ausg. 6/11. 1924.) OELKER.

Paul Lechler, Stuttgart, *Innenschutz von Gasbehältern* u. dgl. gegen Rost u. Korrosion, dad. gek., daß man in geeigneter Weise die Gasbehälterinnenwände in geringer Höhe über dem Sperrwasserspiegel mit einem unter Druck stehenden Überzug von Schutzöl ringsum mit solchen Mengen benetzt, die zum tatsächlichen Überzug der Behälterinnenflächen notwendig sind. — Das so angebrachte Öl reißt sich in einem konzentr. Ölüberzug, der fest an den Behälterwandungen anhaftet, auf dem Wasserspiegel aus, derart, daß beim Niedergehen der Glocken die Innenwandungen der Gasbehälter selbsttätig mit Schutzöl bestrichen werden. (D. R. P. 408020 Kl. 4c vom 21/7. 1924, ausg. 30/12. 1924.) OELKER.

Koppers Company, Pittsburgh, Pennsylvan., *Gasreinigung.* Man läßt das gashaltige u. andere Verunreinigungen aufweisende Gas mit einer Absorptionslsg. (z. B. Aalilsg.) in Berührung kommen u. bringt dann die Lsg. auf eine Lage einer

Fe-Verbb. (Fe_2O_3), wodurch das Alkalisulfid der Absorptionslg. in FeS übergeführt wird. (E. P. 209378 vom 3/10. 1922, ausg. 31/1. 1924. A. Prior. 8/12. 1921.)

Fr. Paul Schmidt, Suhl i. Thür., *Acetylenentwickler nach dem Einwurfsystem* dad. gek., daß im Innern des Entwicklers ein Gehäuse angebracht ist, welches der Oberfläche des Entwicklungswassers offen ist u. dessen Abfluß durch Schwimmerventil beeinflußt wird. — Es wird eine zu starke Erwärmung des Entwicklerwassers verhindert. (D. R. P. 408526 Kl. 26b vom 22/1. 1924, ausg. 1925.)

OELKE

C. A. A. M. Roux, Neuilly-sur-Seine, *Verarbeitung von Torf und Braunkohle* Die feuchten Rohstoffe werden zerkleinert, die halbf. M. stufenweise getrocknet durch eine gelochte Platte gepreßt, von den Preßlingen kleine Stückchen geschnitten u. diese in einer gedrehten Trommel gekörnt, zweckmäßig, um Wiedervereinigung der Körnchen zu verhüten, unter Einblasen von Holzstaub Torf- oder Kalkstaub o. dgl. Aus dieser M. werden entweder durch Mischen oder Verpressen mit Holzmehl, gepulverter Kohle o. dgl. Brennstoffe erhalten oder wird trocken destilliert u. die gasförmigen Erzeugnisse der Dest. auf $(\text{NH}_4)_2\text{S}$ die Öle auf Leicht- u. Schweröl, Paraffin u. Pech verarbeitet. (E. P. 223929 vom 25/10. 1924, Auszug veröff. 24/12. 1924. Prior. 26/10. 1923.)

KÜHLING

Soc. Anon. des Petroles, Houilles et Derives, Paris, übert. v. **E. B. G. Bascou**, Paris, *Destillieren oder Spalten von Kohlenwasserstoffen*. Die L. wie Teere, Petroleum usw. werden verdampft bzw. erhitzt, indem man sie in Form eines Schleiers vor in einem Turm angeordneten Erhitzern niederrieseln läßt. (E. P. 224497 vom 4/6. 1924, Ausz. veröff. 7/1. 1925. Prior. 11/11. 1923.)

OELKE

Adolf Greenspan, Minatitlan, Mexico, übert. an: **Whitehall Petroleum Corporation, Limited**, Westminster, *Reinigen von Kohlenwasserstoffen*. (E. P. 203066 vom 22/6. 1922, ausg. 27/9. 1923. — C. 1923. IV. 968.)

FRAN

Hans Finkelstein, Uerdingen, Niederrh., *Imprägnieren von Holz*. (A. P. 1500066 vom 25/3. 1922, ausg. 1/7. 1924. — C. 1923. IV. 969 [Dän. 31854].)

SCHOTTLÄNDER

Paul Tolmer, Paris, *Verfahren zum Konservieren von Holz*. Man unterwirft das Holz einer Hitzebehandlung u. einer chem. Imprägnierung, entweder gleichzeitig oder aufeinander folgend. Z. B. wird das Holz auf 80—120° erhitzt, wobei es völlig asept. wird. Hierauf taucht man es in eine antisept. Fl. oder injiziert diese unter Druck in der Wärme. Das Imprägniermittel besteht aus Holzteer oder Phenolen u. Kresolen u. einem Fixiermittel für den Teer, bestehend aus einer verd. Alkalicarbonatlsg., die unter Zusatz von etwas Sägemehl aufgekocht wurde u. nach dessen Entfernung mit etwas Na-Silicat u. HNO_3 versetzt wird. Erhitzt man das Imprägniermittel auf 80—120° u. behandelt bei dieser Temp. mit ihr das Holz, so ist eine besondere Hitzebehandlung des Holzes entbehrlich. (F. P. 548707 vom 10/3. 1922, ausg. 22/1. 1923. E. P. 194683 vom 23/2. 1923, ausg. 2/5. 1923. F. Pat. 10/3. 1922.)

SCHOTTLÄNDER

Etablissements Poulenc Frères Jean Aboulenc und Jules Aboulenc, Frankreich (Seine), *Lösen von Ricinusöl in Petroleumkohlenwasserstoffen*. Der Mischung des Ricinusöls mit dem Petroleum-KW-stoff wird eine kleine Menge eines aliph. oder aromat. A., z. B. Butylalkohol oder Cyclohexanol hinzugefügt. Die Mischung soll als *Motortreibmittel* Verwendung finden. (F. P. 573646 vom 17/2. 1923, ausg. 27/6. 1924.)

OELKE

Chemisches Zentralblatt.

1925 Band I.

Nr. 11.

18. März.

A. Allgemeine und physikalische Chemie.

E. J. Holmyard, *Ein Roman der Chemie*. I. u. II. **KHALID IBN YAZID IBN AWIYYA** führte im Anfang des 8. Jahrhunderts die Alchemie in die islam. Staaten ein. In Europa kamen die ersten Übersetzungen der arab. Schriften von **ROBERT VON CHESTER** gegen Mitte des 12. Jahrhunderts auf; damit zugleich die Anfänge der Alchemie im christlichen Europa. — II. Lebensbeschreibung von **MORENIUS**, dem Lehrer des **KHALID**. (*Chemistry and Ind.* **44**. 75—77. 105 b. 108. 136—37.) **ZANDER**.

—, *George Downing Liveing*. 1827—1924. Kurzer Lebenslauf des im Alter von 97 Jahren gestorbenen Cambridger Dozenten. (*Chemistry and Ind.* **44**. 116 b. 117.) **ZANDER**.

Albert Scheurer und **Martin Battegay**, *Emilio Noelting, Sein Leben, sein Werk (1851—1922)*. Der Lebenslauf des verstorbenen früheren Direktors der Versuchsschule Mülhausen i. E. u. seine Arbeiten sind geschildert. (*Rev. gén. des Matières colorantes etc.* **28**. 336—40. 1924.) **SÜVERN**.

Andreas Smits und **Pieter Schoenmaker**, *Die Komplexität des festen Zustandes*. Teil I. *Das Verhalten von reinem Schwefeltrioxyd*. Teil I. Die stark trocknende Kraft von SO_3 ließ eine so langsame Einstellung des inneren Gleichgewichts erwarten, daß nach der Dest. die Verb. sich als Gemisch verhalten würde. Dies konnte experimentell gezeigt werden. Durch häufige Vakuumdest. für P_2O_5 intensiv getrocknetes SO_3 wurde in einen App. zur Best. des Dampfdruckes überdest. Der Dampfdruck sank dort mit der Zeit des Stehens in dem App. u. ließ sich durch Verdampfen eines Teiles des SO_3 noch weiter erniedrigen. Ab der Schmelzbereich änderte sich durch diese Operationen. Bei nicht so stark getrocknetem SO_3 wurden die niedrigen Dampfdrucke erheblich leichter erreicht. SO_3 existiert in 3 Formen, der Eisform, der im käuflichen SO_3 oft in großer Menge vorhandenen instabilen niedrigschm. Asbestform u. der stabilen hochschm. Asbestform. Die vorliegende Arbeit bezieht sich nur auf die Eisform. Es wird gezeigt, daß diese aus zwei Pseudokomponenten (Polymeren oder Isomeren im weitesten Sinne der Atomstrukturlehre) α u. β besteht, die eine dissoziierbare Verb. $\alpha\beta$ bilden, also nach dem nebenst. Schema reagieren können. Im inneren Gleichgewicht überwiegt die flüchtigere α -Form etwas. Nach Einstellung des Gleichgewichts, die in nicht zu stark getrocknetem SO_3 ca. 120 Stdn. dauert, reagiert SO_3 als einheitliche Substanz. Genaue Dampfdruckkurven der beiden Zweiphasensysteme fest-gasförmig u. fl.-gasförmig u. des Dreiphasensystems fest-fl.-gasförmig im Original. Zum Schluß wird kurz angedeutet, daß die anderen Modifikationen ein analoges Verh. zeigen. (*Journ. Chem. Soc. London* **125**. 2554 b. 2573. 1924.) **HERTER**.

Andreas Smits und **Arend Joan Rutgers**, *Die Komplexität des festen Zustandes*. Teil II. *Das Verhalten von Phosphorpentoxyd*. Teil I. (Vgl. vorst. Ref.) In durch h. Luft gut getrocknete Glas- oder Quarzgefäße wurde P_2O_5 eindestilliert u. dessen Dampfdruck bei Temp. bis zu 400° gemessen. Bei steigender u. fallender Temp. VII. 1.

Temp. wurden die gleichen Werte erhalten, doch waren sie für verschiedene Proben verschieden, je nach der Vorbehandlung, insbesondere der Sublimationsgeschwindigkeit. Bei 400° geht P_2O_5 in eine andere Modifikation über, wobei der Dampfdruck von ca. 4 at auf 0,02 mm Hg sinkt. Die Flüchtigkeit dieser stabilen Form hängt ebenfalls von ihrer Vorgeschichte ab. Nach der alten Theorie müßte der Dampfdruck beim F. der stabilen Form über dem höchsten der metastabilen Form liegen, in Wirklichkeit liegt er aber bei 563° , dem Beginn der Schmelzperiode bei 0,59 at. Das Ende der langen Schmelzperiode konnte noch nicht bestimmt werden. Das Verh. von P_2O_5 läßt sich durch die Allotropietheorie erklären d. h. man muß annehmen, daß festes P_2O_5 , ähnlich wie SO_2 , ein komplexes Material ist. (Journ. Chem. Soc. London **125**. 2573—79. 1924. Amsterdam, Univ.) **HERTER**

Walter Idris Jones, Hamilton McCombie und Harold Archibald Scarborough, *Die Reaktionsgeschwindigkeit in gemischten Lösungsmitteln*. Teil VII. *Der Einfluß der Base auf die Verseifungsgeschwindigkeit von Estern in Methylalkohol Wassergemischen*. (VI. vgl. Journ. Chem. Soc. London **123**. 2688; C. **1924**. I 2776.) Zur Vervollständigung der im VI. Teil mit KOH erhaltenen Resultate wurde die Verseifungsgeschwindigkeit der *Methylester von n-Buttersäure u. o-Chlorbenzoesäure* in wss. Methylalkohol bei 30° unter dem Einfluß von LiOH, $Ba(OH)_2$ u. $N(CH_3)_4OH$ untersucht. Wieder war die *k*-Kurve in gerade Teilstrecken zerlegbaren Schnittpunkte mit den für KOH ermittelten übereinstimmten, nur bei LiOH fallen die Knicke bei CH_3OH, H_2O u. $CH_3OH, 2H_2O$ aus, dagegen tritt ein solches bei $2CH_3OH, 3H_2O$ (54% Methylalkohol) auf. Es besteht somit eine ziemlich weitgehende Analogie mit dem Verh. von Äthylestern in A.-W.-Gemischen (vgl. CASEMORE, McCOMBIE u. SCARBOROUGH, Journ. Chem. Soc. London **123**. 197; C. **1924**. III. 752). Bildet man das Verhältnis $k_{KOH} : k_B$ [$B = LiOH, Ba(OH)_2$ bzw. $N(CH_3)_4OH$], so gelangt man zu Zahlen, die mit den Journ. Chem. Soc. London **123**. 200 gemachten Annahmen über Mechanismus der Verseifung in Einklang stehen. Nur im Falle der Verseifung des o-Chlorbenzoesäuremethylesters durch $Ba(OH)_2$ ist der Wert für $k_{KOH} : k_{Ba(OH)_2}$ kleiner als für die entsprechende Buttersäureverseifung, während das Gegenteil erwartet wurde. (Journ. Chem. Soc. London **125**. 2590—95. 1924. Cambridge, Univ.) **HERTER**

R. D. Kleeman, *Beziehung zwischen der Oberflächenspannung und der relativen Dichte einer Flüssigkeit*. Die neuerdings von MACLEOD (Trans. Faraday Soc. **1**. 38 [1924]) empir. gefundene Beziehung zwischen der Oberflächenspannung λ einer Fl., ihrer D. ρ_1 u. der D. des gesätt. Dampfes ρ_2 , $\lambda = C(\rho_1 - \rho_2)^4$ ist vom V. schon früher erhalten worden (vgl. Philos. Magazine [6] **21**. 83; C. **1911**. I. 60 u. u. aus theoret. Betrachtungen ist eine Formel für die Konstante C abgeleitet, deren Zahlenwert für einige Fl. angegeben ist. (Science **60**. 589. 1924. Schenectady [N. Y.] Union College.) **JOSEPHY**

Shizuwo Sano und Kamekichi Shiba, *Über die Diffusion elektrisch neutraler Bestandteile in einer Flüssigkeit*. Mathemat. Ableitung einer Beziehung, welche die Diffusion u. die Energieströmung von mehreren, voneinander unabhängigen Bestandteilen einer Fl. unter Zuhilfenahme des II. Hauptsatzes der Thermodynamik behandelt. (Japan. Journ. of Physics **3**. 1—28. 1924. Tokyo, Univ.) **BECKER**

K. Bennewitz, *Über elastische Nachwirkung, elastische Hysteresis und innere Reibung*. Auf Grund mathem. Erweiterung eines früher (Physikal. Ztschr. **21**. 7 [1920]) aufgestellten Satzes wird die Nachwirkung nicht wie bisher durch eine innere Reibung, sondern durch eine innere Sublimation erklärt. Dadurch ergibt sich die Möglichkeit, die Eigenschaften amorpher, kristallisierter u. kristalliner Körper gesondert zu behandeln. Es wird dadurch die Hysteresis, Nachwirkung u. innere Reibung auf einen Rekristallisationsvorgang zurückgeführt. (Physikal. Ztschr. **25**. 417—30. 1924. Berlin, Univ.) **BECKER**

Alb. Colson, Über die Verschiebung des Löslichkeitsmaximums und über die Konstanz konstanter Löslichkeiten. (Vgl. S. 606.) Das Prinzip der Gleichgewichtsverschiebung gel. Körper verliert seine Bedeutung, sobald irgend eine bekannte Lösungswärme nicht direkt mit der Änderung dC/dT der Löslichkeit verknüpft ist. $L = 2iT$ der Ausdruck für das Löslichkeitsmaximum wenig l. Körper, so wird die fortschreitende Änderung von L eine entsprechende Zunahme von T bedingen, vorausgesetzt, daß der gel. Körper bei den reversiblen Vorgängen den Zustand annimmt, den er vor seiner Auflösung besaß. Gleichgültig welches Lösungsm. gewählt wird, W. oder angesäuertes W., so wird der Gehalt der gel. Stoffe sich mit T^0 ändern können, nicht aber die Reversibilität dieser Vorgänge, die nur obiger Gleichung gehorcht. Im Falle von Gips wird L zunehmen in HNO_3 -Lsgg., während H_2O , die H_2SO_4 von Gips teilweise ersetzt, was eine Abkühlung hervorruft, d. h. die Zunahme der Wärme L , die für die isotherm. Auflösung dieses Salzes erforderlich ist, infolgedessen steigt die Temp. T mit L u. bringt beim Überschreiten des Kp. des Maximum in Wegfall. Eine experimentelle Bestätigung bringt Vf., indem er 40 ccm einer 1,5%ig. HNO_3 -Lsg. mit einem Überschuß an Gips (gefällt, gewaschen und getrocknet) im Calorimeter in Berührung bringt. Nach 30 Min. tritt eine Abkühlung von $0,1^\circ$ auf. Dieser Abkühlung entspricht eine Abgabe von 18,5 Cal pro g wasserfreies, isotherm. gel. Sulfat. Es sei $L = 136 \cdot 18,5 = 2516$ Cal, so erfordert das Maximum bei 35° nur 1154 u. erreicht beim Kp. nur 1265 Cal. Das Löslichkeitsmaximum ($2iT$) würde eine Temp. $T = \text{ca. } 600^\circ$ höher als der Kp. d. Lsg. erfordern. Lsgg. von 0,6%ig. HNO_3 verhalten sich analog.

Die Konstanz des Löslichkeitsmaximums verlangt die Stabilisierung dieses Maximums. Ist die Zahl der Moll. in einem gleichbleibenden Volumen bei jeder Temp. T unveränderlich, so ist der Gasdruck proportional T , da in dem Ausdruck $P = RT$ das Volumen V konstant ist. Der osmot. Druck $p = iP$ hat aus analogiegründen dieselbe Eigenschaft, woraus folgt, daß $i = \text{konst.}$ Für Gips ist i zwischen 1 u. 2. Hiernach ist verständlich, weshalb das gel. Mol. in ein u. denselben Vol. V dieselbe Löslichkeitskonstanz zeigt wie in dem Lösungsm., das stabilisiert u. in dem, das es in seine zwei Ionen trennt. Die Verss. bestätigen letzteres, indem 100 g Lösungsm. mit 1 g Säure/Liter konstante Löslichkeiten von 2,2 g gel. Salz ergeben. (C. r. d. l'Acad. des sciences **179**. 1399—1401. 1944.)

K. WOLF.

A₁. Atomstruktur. Radiochemie. Photochemie.

R. W. Wood, Nachgewiesene Bahnübergänge von Elektronen im optisch angeregten Quecksilberatom. Vf. untersucht die Intensitätsverteilung im Spektrum des opt. angeregten Hg-Dampfes, sowie den Einfluß, den Beimengungen von N_2 , He u. CO zu dem Hg-Dampf auf die Intensitätsverteilung besitzen. Als primäre Lichtquelle dient eine wassergekühlte Hg-Lampe, deren Strahlung durch Br_2 -Filter hydrogenisiert wurde. Aus dem gemessenen Intensitätsverhältnis werden Schemata für die Elektronenübergänge der einzelnen Bahnen aufgestellt. Durch Zufügen von N_2 zum Hg-Dampf werden einzelne Linien bis zur 32-fachen Intensität verstärkt, während andere unverändert bleiben. He u. CO zeigen ähnliche Erscheinungen. (Proc. Royal Soc. London, Serie A. **106**. 679—94. 1924.)

BECKER.

J. E. Jones, Über das Atomfeld von Helium und Neon. (Vgl. Proc. Royal Soc. London, Serie A. **106**. 441. 463; C. **1924**. II. 2731.) Unter der Annahme, daß das atomare Feld des He durch eine abstoßende Kraft von der Größe $\lambda_n r^{-n}$ u. einer anziehenden Kraft $\lambda_m r^{-m}$ bedingt ist, wird das Feld aus der experimentell gemessenen Viskosität u. aus seiner Zustandsgleichung zu berechnen versucht. Dabei wird $n = 14$, $\lambda_n = 5,74 \cdot 10^{-113}$, $m = 5$ u. $\lambda_m = 1,930 \cdot 10^{-45}$ berechnet. — Das atomare Feld des Ne wird auf ähnlichem Weg aus seiner Leitfähigkeit,

Viscosität u. aus den Messungen der Atomabstände der NaF u. MgO Krystalle bestimmt. In diesem Fall ergibt sich die Abstoßungskraft $\lambda_n r^{-n}$ zu $\lambda_n = 3,892 \cdot 10^{-10}$, $n = 21$. Die Anziehungskraft konnte nicht berechnet werden. (Proc. Royal. Soc. London, Serie A. **107**. 157—70. Cambridge.)

BECKER.

N. H. Kolkmeier, J. M. Byvoet und A. Karssen, *Die Krystallstruktur der Mercurisulfids. II.* (I. vgl. S. 12.) Vff. untersuchen nach dem Debye-Scherrerverfahren die Krystallstruktur des roten HgS u. finden völlige Übereinstimmung mit den Angaben MAUGUINS (C. r. d. l'Acad. des sciences **176**. 1483; C. **1923**. III. 291.) Die Debye-Scherrerdiagramme des schwarzen u. roten HgS zeigen eine bemerkenswert Übereinstimmung, welche davon herrührt, daß das schwarze kub. u. das rote trigonale HgS dieselbe Atomanordnung u. dieselben Atomabstände in der Oktaeder ebene, bzw. der Basisebene besitzen. *Metacinnabasit* zeigt die Struktur des schwarzen HgS. (Rec. trav. chim. Pays-Bas **43**. 894—96. 1924. Utrecht. Amsterdam.)

BECKER.

H. Ott, *Die Gitterstruktur des Carborunds (SiC)*. Aus Drehkrystallaufnahmen ergibt sich für SiC ein hexagonales (nicht rhomboedr.) Elementarparallelepiped mit den Kantenlängen $a = 3,09$, $c = 15,17$ Å. mit 6SiC-Moll. Die Koordinaten der Atomschwerpunkte sind: 6C (000), $(00 \frac{2}{3})$, $(\frac{1}{3} \frac{2}{3} \frac{1}{6})$, $(\frac{1}{3} \frac{2}{3} \frac{5}{6})$, $(\frac{2}{3} \frac{1}{3} \frac{2}{6})$, $(\frac{2}{3} \frac{1}{3} \frac{4}{6})$, 6Si $(00 p)$, $(0, 0, \frac{2}{3} + p)$, $(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{1}{6} + p)$, $(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{5}{6} + p)$, $(\frac{2}{3}, \frac{1}{3}, \frac{2}{6} + p)$, $(\frac{2}{3}, \frac{1}{3}, \frac{4}{6} + p)$; $p = \frac{1}{8}$. Es ist jedes Atom der einen Art tetraedr. von 4 Atomen der anderen Art umgeben. Der kleinste Abstand Si-C ist 1,09 Å. Die angegebene Struktur zeigt gewisse Ähnlichkeiten sowohl mit der Zinkblende als auch mit der Wurzitstruktur. (Naturwissenschaften **13**. 76. München.)

BECKER.

H. Jung, *Röntgenographische Untersuchungen an den Entwässerungsprodukten des Gipses*. Vff. untersucht nach dem Debye-Scherrerverfahren eine Anzahl von Entwässerungsprodd. des Gipses, um die mit einer Änderung der Krystallstruktur verbundenen Entwässerungsstadien festzustellen. Künstlich hergestellter Gips, welcher durch Fällung einer CaCl_2 -Lsg. mittels H_2SO_4 dargestellt wurde, zeigte ein von Halbhydrat nach VANT HOFF verschiedenes Röntgenbild. Von diesen beiden Strukturen ebenfalls verschieden ist jene des Anhydrits. Bei 200° erhitzter Gips u. ein bei 200° erhitztes Halbhydrat, welches mehrere Stdn. an der Luft stand, zeigten das Röntgenbild des Halbhydrats. Totgebrannter Gips besitzt die Struktur des Anhydrits. Techn. Stuckgips bestand fast ausschließlich aus dem Halbhydrat. Beim Entwässern geht also Gips zuerst in das Halbhydrat über, behält bei allmählicher Temperatursteigerung seine Struktur bei u. erst bei stärkerem Erhitzen vollzieht sich der Übergang zum Anhydrit. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. **149**. 73—79. Jena, Univ.)

BECKER.

J. D. Bernal, *Die Struktur des Graphits*. Vff. untersucht die Struktur des Graphits nach dem Drehkrystallverfahren u. nach der Laue-Methode, ohne indes aus dem Laue-Diagramm mehr als qualitative Schlüsse zu ziehen. Es standen kleine Krystalle von etwa 1 mm Durchmesser zur Verfügung, die aber teilweise verzwillingt waren. Es wird ein Verfahren angegeben, um ohne große Rechnung die Ergebnisse des Diagramms direkt in die stereograph. Projektion zu übertragen, was gegenüber den bisherigen Auswertungsmethoden eine Vereinfachung darstellt. Von der Spaltfläche wurden außerdem mittels eines Ionisationsspektrographen Reflexionen bis zur 5. Ordnung erhalten. Es wird das Hüllsche (Physical Review **10**. 661 [1917]) hexagonale Graphitmodell der Auswertung zugrunde gelegt. Das Elementarparallelepiped, welches der Raumgruppe D_{3h}^{19} angehört, besitzt die Abmessungen $a = 2,4$, $c = 6,82$ Å. Die C-Atome sind in regelmäßigen Sechsecken in Richtung der Spaltebenen angeordnet u. liegen so, daß jede zweite Ebene gegen die erste verschoben erscheint. Im Abstand c liegt dann die dritte Ebene wieder genau über der ersten. Eine Wellung der einzelnen C-Ebenen wird nicht angenommen. Die Struktur

torbildung ergab, daß der Abstand der endständigen C-Atome der Sechsringe für die Ringebene nicht wesentlich von Null verschieden sein kann, so das Vf. bei dem Debye-Scherrerschen Modell (Physikal. Ztschr. **18**. 291; C. **1917**. II. 2) alle C-Atome eines Sechsrings als in einer Ebene liegend betrachtet. Von dem Debye-Scherrerschen Modell unterscheidet sich das Modell des Vfs. dadurch, daß bei DEBYE u. SCHERRER erst die vierte Ringebene wieder über der ersten ist, während es von dem Hullschen Modell dadurch verschieden ist, daß HULL Ringebenen als gewellt annimmt. (Proc. Royal Soc. London. Serie A. **106**. 749 773. 1924.) BECKER.

Enrico Fermi, Über die Theorie des Zusammenstoßes zwischen Atomen und Elektronen. (Atti R. Accad. dei Lincei, Roma [5] **33**. II. 243—45. 1924. — C. **1925**. I. 108.) GOTTFRIED.

Leonard B. Loeb, Die Frage nach der Beweiskräftigkeit der Prüfung NOLANS der Existenz von Gruppen normaler Ionen in Luft von Atmosphärendruck. Vf. erkennt auf Grund der von NOLAN (Physical Review [2] **24**. 16; C. **1924**. II. 1433) durchgeführten Kurven dessen Schlußfolgerung über die Existenz von Ionengruppen verschiedener Geschwindigkeit in Luft nicht an, da die Unregelmäßigkeiten in den Strom-Spannungscharakteristiken, welche NOLAN als Beweis dafür anführt, sekundäre Ursachen haben können. (Physical Review [2] **25**. 101. Berkeley, Univ. of Cal.) BECKER.

Piere Auger, Über die in einem Gas durch X-Strahlen erzeugten sekundären β -Strahlen. Vf. bestätigt durch weitere Verss. über Kr seine früheren Ergebnisse. (C. r. d. l'Acad. des sciences **178**. 929; C. **1924**. I. 2668), die theoret. formuliert wurden. Einzelheiten sind im Original nachzulesen. (C. r. d. l'Acad. des sciences **180**. 65—68.) K. WOLF.

J. H. Smith, Abnormale Brechung von X-Strahlen. (Philos. Magazine [6] **49**. 14—94. London.) K. WOLF.

Elis Hjalmar und **Manne Siegbahn**, Anomale Dispersion im Felde von X-Strahlen. Um genauere Bestst. der Wellenlängen der X-Strahlenspektren zu erhalten, wurden die Gitterkonstanten zweier Krystalle, Calcit u. Gips, miteinander verglichen. Vf. wählten Serien verschiedener Spektrallinien, mit Wellenlängen zwischen 0,7 u. 5,2 Å, zwecks Feststellung des genauesten Wertes dieser grundlegenden Beziehung. Die Messungen dieser Beziehung sind graph. aufgetragen. Der Kurvenverlauf zeigt 2 ausgesprochene Unstetigkeiten. Man erkennt ferner, daß diese zwei plötzlichen Änderungen mit den Wellenlängen der Absorptionskanten von Ca u. S zusammenfallen. Es ergibt sich, daß für alle genauen Messungen der Wellenlängen von X-Strahlen eine verbesserte Braggsche Formel für die Berechnung der Wellenlängen aus den Brechungswinkeln benutzt werden muß. Für diesen Zweck ist die Kenntnis der Dispersionsformel des Krystalles erforderlich. (Nature **111** 85—86. Upsala, Univ.) K. WOLF.

Charles Fabry, Spektroskopie in der Vergangenheit und in der Zukunft. (Journ. Franklin Inst. **199**. 13—25. Paris, Univ.) K. WOLF.

Richard C. Tolman, Notiz über das Problem der quantitativen Formulierung des Bohrschen Korrespondenzprinzips. (Vgl. Physical Review [2] **23**. 693; C. **1924**. II 1768.) Mathemat. (Philos. Magazine [6] **49**. 130—36. Pasadena, Cal.) K. WOLF.

C. G. Darwin, Resonanzstrahlung und das Korrespondenzprinzip. Krit. Bemerkungen im Anschluß an die Verss. von WOOD u. ELLETT (Proc. Royal Soc. London Serie A. **103**. 396; C. **1923**. III. 885) über die Resonanzstrahlung von Hg, welche eine Abänderung der Quantentheorie für notwendig erscheinen lassen. (Nature **115**. 81—82. Edinburgh, Univ.) K. WOLF.

K. W. Meißner, Absorption in angeregtem Neon. Das Prinzip der Versuchsanordnung beruht darauf, daß das Licht einer Emissionsröhre die Absorptionsröhre

durchsetzt u. dann spektral zerlegt wird, so daß die Intensitäten der einzelner Spektrallinien bei angeregter u. unangeregter Absorptionsröhre gemessen werden können. Die erhaltenen Spektren wurden auf photograph. Weg ausphotometrier u. die Expositionszeiten so gewählt, daß die Schwärzung der Platte in den mittleren, geradlinig verlaufenden Teil der S-förmigen Schwärzungskurve fiel. Wurde konstant 1 Milliampère als Erregungsstrom in der Absorptionsröhre verwendet, dann zeigten die Ne-Linien zwischen 5400 u. 7438 Å. eine sehr wechselnde Absorption die von der Intensität der Linien unabhängig war. — Verss. mit Erregungsströme von 0,1 bis 3 Milliampère ergaben mit steigender Stromstärke einen Anstieg der Absorption nach einer Exponentialfunktion. Diese Kurven verliefen für die drei untersuchten Linien 6402, 6334 u. 7032 annähernd parallel. — Verunreinigungen des Ne wirken in dem Sinne, daß nur sehr reines Ne eine starke Absorption zeigt (Ann. der Physik [4] **76**. 124—44. Zürich, Univ.)

BECKER.

T. L. de Bruin und **P. Zeeman**, *Über einen Zusammenhang zwischen den Spektren von Argon und ionisiertem Kalium*. Vff. kommen im Anschluß an ihre frühere Mitteilung (Nature **114**. 352; C. **1924**. II. 2008) u. die Arbeit von DAHME (S. 467) zu der Schlußfolgerung, daß die Differenz von ca. 842 nicht charakteristisch ist u. wahrscheinlich nicht aufrecht zu halten ist. Die Differenz von ca. 1696 ist vorhanden, ein genauerer Wert ist ca. 1712. Vff. finden nunmehr an Stelle der Differenz von ca. 414 den Wert 418,2 für ionisiertes K. (Nature **115**. 116—17. Amsterdam.)

K. WOLF.

J. B. Green und **Max Petersen**, *Doppelte Anregungsspektren von Magnesium und verwandten Elementen*. Vff. vermessen die Wellenlängen der Gruppen $1p_i - m p$ des Mg-Lichtbogens im Vakuum u. in Luft. Aus dem Resultat ziehen sie den Schluß, daß die p' u. auch d' Terme des Mg u. der Erdalkalien doppelt angeregten Zustände neutraler Atome entsprechen, welche von ionisierten Zuständen unabhängig sind (Astrophys. Journ. **60**. 301—12. 1924. Madison, Wisconsin.)

BECKER.

Léon Bloch und **Eugène Bloch**, *Das Funkenspektrum von Eisen im Schumanngebiet*. (Vgl. C. r. d. l'Acad. des sciences **177**. 1025; C. **1924**. II. 9.) Zusammenstellung von 253 Funkenlinien von Fe, die Vff. mit einem Fluoridspektrographie aufgenommen haben. (C. r. d. l'Acad. des sciences **179**. 1396—99. 1924.) K. WOLF.

Masamichi Kimura und **Gisaburo Nakamura**, *Kathodenspektren von Metallen und ihren Salzen*. Die Halogenverbindungen von Li, Na, Cu, Mg, Ca, Zn, Sr, Cd, Ba, Si, Pb, Bi wurden als Kathode einer Entladungsröhre verwendet u. das in Richtung der Kathode ausgesandte Licht untersucht. Es ergab sich, daß die Kathodenspektren der Mg, Sn u. Pb-Salze Funkencharakter aufweisen, während jene der Zn, Cd u. Bi-Salze Bogencharakter besaßen. Ca, Sr u. Ba-Salze zeigten keine von beiden, sondern wiesen nur einige wenige Linien auf. Bei Sn, Cd u. Pb wurde auch die seitliche Emission der reinen Metallkathoden untersucht. Die Linien wurden hauptsächlich aus dem Dunkelraum gegenüber der Kathode emittiert, was das elektr. Feld sehr stark ist. Die Funkenlinien u. die Bogenlinien waren sehr stark, doch treten die ersteren außerhalb des Dunkelraums nicht auf. Bei Sn treten zwei Arten von Funkenlinien im Spektrum auf, welche von Sn^+ u. Sn^{++} her rühren. Das Zahlenmaterial ist angeführt. (Japan. Journ. of Physics **3**. 29—4. 1924. Kyoto, Univ.)

BECKER.

Masamichi Kimura und **Gisaburo Nakamura**, *Kathodenspektren von Metallen*. Vff. untersuchen die Spektren von Geissleröhren gegenüber der Kathode, welche mit Cl_2 - oder J_2 -Dampf gefüllt sind u. Cd-, Al-, Sn-, Pb-Kathoden enthalten. Sie enthalten Funken u. Bogenlinien, deren Intensität an der Kathodenoberfläche am stärksten war u. gegen das Ende des Dunkelraums abnahm. Dieser Intensitätsabfall war bei den Funkenlinien stärker als bei den Bogenlinien. Bei Sn, Al u. Pb wurden längere u. kürzere Linien zwischen den Funkenlinien beobachtet. V

ließen, daß die ersteren von einfach ionisierten Atomen, die letzteren von doppelt ionisierten Atomen herrühren. (Japan. Journ. of Physics **3**. 43—44. 1924. Kyoto Univ.)

BECKER.

Herbert Bell, *Das CuH-Molekül und dessen Bandenspektren*. (Vgl. Philos. Magazine [6] **47**. 549; C. 1924. I. 2566.) Vf. entwickelt eine Formel für Bandenspektren im Sichtbaren u. wendet dieselbe an auf Cu-Banden, die neuerdings von JERICHS u. BENGTSOON im Bereich λ 4700 bis λ 4000 gemessen wurden. Das Halbquantum $\epsilon = \frac{1}{2}$ wird bestätigt u. das Mol. als CuH nachgewiesen. Vf. berechnet die Abstände zwischen dem Cu- u. H-Kerne für die Anfangs- u. Endkonfiguration. (Philos. Magazine [6] **49**. 23—32. Manchester, Univ.) K. WOLF.

G. v. Salis, *Die ersten Funkenspektren von Zink und Cadmium*. Mittels einer Röntgenröhre zu diesem Zweck konstruierten Entladungsröhre, bei welcher der Dampf des zu untersuchenden Metalls selbst der Träger der Entladung ist, werden die Funkenspektren des Zn(II) zwischen 7757 u. 2026 Å. u. des Cd(II) zwischen 8067 u. 2144 Å. aufgenommen u. die Termwerte u. Serien zugeordnet. Das Resultat ist in Tabellen ausführlich wiedergegeben. (Ann. der Physik [4] **76**. 145—62.) BE.

Arthur S. King, *Die elektrischen Ofenspektren von Vanadin und Chrom im Ultraviolett*. Vf. nimmt die Emissionsspektren der bei 2000, 2300 u. 2600° im elektr. Ofen erhitzten Dämpfe von V zwischen 2340—3185 Å. u. Cr von 2362 bis 3175 Å. auf u. vergleicht diese mit dem Bogenspektrum. Es wurden 515 V-Linien u. 1640 Cr-Linien vermessen, welche in Tabellen angeführt sind. Neu gemessen sind bei V 133, bei Cr 94 Linien, welche im Bogenspektrum nicht auftreten. Die Intensität der Bogenlinien sowie der entsprechenden Ofenlinien bei tiefer, mittlerer u. hoher Temp. sind angegeben. (Astrophys. Journ. **60**. 282—300. 1924. Mount Wilson Observatory.)

BECKER.

Y. Rocard, *Über die Diffusion des Lichtes in Flüssigkeiten*. (Vgl. S. 468.) Wenn ein Bündel paralleler Lichtstrahlen in der Richtung Ox sich fortpflanzend durch eine Fl. hindurchgeht u. von einem entfernten Punkt auf Oy aus beobachtet wird, so nennt Vf. ρ = Depolarisation, das Verhältnis der in der Richtung Ox schwingenden Lichtintensität zu der in der Richtung Oz schwingenden. Die Schwierigkeit liegt in der Herst. opt. reiner Fl., frei von Staubeilchen u. Suspensionskolloiden. Unter Anwendung geeigneter Filtrationen, ergab sich für Nitrobenzin $\rho = 0,68-0,67-0,68-0,74$ entsprechend den roten, gelben, grünen bzw. ultravioletten Strahlen, u. für Benzonnitril, das nur im roten Licht durchscheinend ist, $\rho = 0,65$. (C. r. d. l'Acad. des sciences **180**. 52—53.)

K. WOLF.

K. F. Herzfeld und **K. L. Wolf**, *Prüfung der klassischen Dispersionsformel an einatomigen Gasen und Dämpfen*. In der Dispersionsformel $n - 1 = C/(\nu_0^2 - \nu^2)$ bedeutet ν_0 eine charakterist. Frequenz der Absorptionsstelle, nach der klass. Theorie — die Frequenz der Resonanzlinie. Es erweist sich indessen an Hand des vorliegenden Materials, daß die Formel eine bessere Übereinstimmung mit den Messungen aufweist, wenn man für ν_0 eine um einige % größere Frequenz einsetzt, als die der Ionisierungsspannung entsprechende. Die untersuchten Substanzen H, Ne, Ar, Kr u. Xe, besitzen hinter (ultravioletter) der Hauptseriengrenze ein Gebiet der stetigen Absorption; Vf. vermuten, daß die ν_0 mit dem Schwerpunkt dieses Gebietes zusammenfällt. Die (der Größe C proportionale) Anzahl der pro Atom wirksamen Elektronen nimmt mit wachsendem At.-Gew. zu. An Hg, Cd u. Zn sind die Rechnungen mangels des Beobachtungsmaterials nicht genau durchführbar; eine durch Dispersion angezeigte Absorptionsbande von Hg-Dampf bei 710 Å konnte experimentell nicht gefunden werden. (Ann. d. Physik [4] **76**. 7—105. München, Univ.)

BIKEMAN.

L. S. Ornstein und **H. C. Burger**, *Lichtbrechung und Zerstreuung nach der Lichtquantentheorie*. An eine frühere Arbeit anschließend (Ztschr. f. Physik **24**.

41; C. 1924. II. 1156) wird eine mathemat. Ableitung für die Verzögerung des Lichtes in der Materie gegeben. Nach demselben Schema kann auch die Rayleighsche Formel für die Lichtzerstreuung von Atomen abgeleitet werden. (Ztschr. f. Physik 30. 253—57. 1924. Utrecht, Univ.)

BECKER.

Richard Gans, *Strahlungsdiagramme ultramikroskopischer Teilchen*. In Entwicklung der Theorie von MIE (Ann. der Physik [4] 25. 428; C. 1908. I. 1257 zeigt Vf., daß nur metall. ultramikroskop. Teilchen unter allen Umständen mehr Licht in der Richtung des einfallenden Strahles abbeugen, als in der entgegengesetzten Richtung. Die dielektr. Teilchen können nach hinten mehr abbeugen als nach vorne; die dazu erforderlichen Bedingungen konnten aber in Gummigutt u. Mastixemulsion nicht verwirklicht werden. (Ann. der Physik [4] 76. 29—38 La Plata.)

BIKERMANN.

J. W. Hornbeck, *Das photoelektrische Ansprechen von Kalium bei tiefen Temperaturen*. Vf. untersucht das photoelektr. Verh. einer hochevakuierten Zelle mit einer auf 120 V. geladenen Kathode aus reinem massivem K mit spiegelnde Oberfläche u. W.-Anode bei $+20^\circ$ u. -180° in Abhängigkeit von der Wellenlänge ferner für verschiedene Arten monochromat. Lichts in Abhängigkeit von der Temp. beim Erwärmen der Zelle von -180° auf $+20^\circ$. Bei -180° ist die langwellige Grenze der Emission von ca. $650 \mu\mu$ bei 20° nach ca. $600 \mu\mu$ verschoben; selektiv Maxima fehlen in beiden Fällen. Die Photo-Strom-Temperaturkurven für bestimmte Wellenlängen steigen zwischen -80° u. -100° steil an, während sie vorher u. nachher fast parallel zur Temp.-Achse verlaufen. Vf. deutet diese Erscheinung ebenso wie die Verschiebung der langwelligen Grenze mit einer in diesem Temp. Bereich eintretenden Veränderung der Krystallstruktur des K. (Physical Review [2] 24. 631—38. 1924. Cornell-Univ.)

KRÜGER.

A₂. Elektrochemie. Thermochemie.

Richard Kuhn, *Zur Theorie des isoelektrischen Punktes*. Theoret. mathematische Begründung einer früher aufgestellten Gleichung (vgl. KUHN u. JAKOB, S. 459) für die Beziehung zwischen dem isoelektr. Punkt h_i u. dem Stabilitätsmaximum (Viscositätsminimum) h_0 . (Ztschr. f. physik. Ch. 114. 44—48. 1924. München, Bay. Akad. d. Wiss.)

ULMANN.

E. F. Burton und **J. E. Currie**, *Gegenseitige Beeinflussung geladener Teilchen in flüssigen Medien*. Vff. wiederholten die Verss. von DORN, der zuerst zeigte, daß Metallteilchen, pulverisierter Quarz usw., beim Fallen durch eine Wassersäule eine negative Ladung tragen u. eine Potentialdifferenz zwischen der oberen u. unteren Endfläche der Wassersäule hervorrufen. Die benutzten Versuchsanordnungen werden an Hand von Skizzen beschrieben. Außer W. wurden auch andere Flüssigkeiten benutzt. Bleischrot (ca. 1 mm Korngröße) trägt beim Fallen durch W., C_2H_5OH , C_6H_6 , $C_6H_5 \cdot CH_3$, $C_6H_4(CH_3)_2$ eine negative Ladung, durch *Terpentinöl* u. CCl_4 eine positive Ladung, durch Ä. keine Ladung. Es findet Streuung infolge der Ladung statt, so daß zweifelsohne eine gegenseitige Abstoßung zwischen den Teilchen erfolgt. Die Beeinflussung der Streuung durch die Viscosität des Dispersionsmittels wurde für W., *Terpentinöl*, Ä., Ä. u. C_6H_6 untersucht; das diesbezügliche Zahlenmaterial ist tabellar. zusammengestellt. (Philos. Magazine [6] 49. 194—209. Toronto Univ.)

K. WOLF.

A. Stäger, *Experimentaluntersuchungen über Kontaktelektrisierung von staub- und wolkenförmig zerteilten Körpern, speziell von Schnee als gewitterbildendem Faktor*. Beim Auseinanderblasen eines Pulvers werden die Pulverteilchen elektrisiert; die Ladung kann durch Auffangen der Teilchen auf eine feuchte Platte oder mit Hilfe eines Tropfkollektors (im oder ohne Faradayschen Käfig) festgestellt werden. Es entstehen gleichzeitig positive u. negative Teilchen; im Falle des *Eises*, des *S*, des

o *liergipses* u. des *Metaldehyds* erweisen sich die größeren (sich rasch absetzen-
n Teilchen als negativ, die kleineren positiv; beim Aufwirbeln der festen CO_2
ne stets negative Ladung gefunden, wenn man die Reibung am Käfig oder an
r auffangsplatte beseitigte. Auch die Elektrisierung des gegen eine Eiswand ge-
b iderten *Ruß-* oder NH_4Cl -Rauchs wurde gemessen. Die elektr. Raumdichte
tlicher Schneewolken erreicht 10 E.S.E./qm. (Ann. d. Physik [4] **76**. 49—70.
eurg i. Schweiz, Univ.)

BIKERMANN.

Samuel Glasstone, *Untersuchungen über elektrolytische Polarisation*. Teil I.
kathodische Überspannung von Blei. Die kathod. Polarisation von Pb wurde
elektrolyten von $\text{pH} = 1-14$ untersucht. Es wird gezeigt, daß die übliche
el $E = a + b \cdot \log J$ ($E =$ Überspannung, $J =$ Stromdichte in Milliamp./qm,
b Konstanten) nur bei höheren Stromdichten anwendbar ist; bei niedrigen
odichten muß das durch Diffusion von der Kathode entfernte Elektromotor.
riame Material berücksichtigt werden durch Einführung einer dritten Kon-
are c. Nach der Gleichung $E = a + b \log (J - c)$ berechnete Werte stimmten
itlen experimentell gefundenen in n. H_2SO_4 u. n. NaOH an einer Pb-Kathode
origlich überein. Es wird ferner nachgewiesen, daß die graph. Methode zur
es der minimalen Überspannung nicht immer genaue Resultate liefert. Bei ge-
n;r Stromdichte ist, solange noch Blasen an der Kathode frei werden, das nach
rdirekten Methode bestimmte Potential fast gleich der augenblicklichen rück-
ungen EK. Bei höheren Stromdichten wird das Potential durch Ggw. von Alkali-
n. im Elektrolyten stark beeinflusst, anscheinend infolge von B. von Pb-Alkali-
gungen; die minimale Überspannung bleibt jedoch ziemlich unverändert. Sie
t zwischen $\text{pH} = 1$ u. 11 ziemlich konstant u. scheint in stärker alkal. Lsgg. ab-
nmen. Die theoret. Erörterung der Erscheinung führt zu keiner endgültigen
ung der Gründe. Ebenso bedarf die Beobachtung, daß an einer rauhen Ober-
te die minimale Überspannung etwas geringer ist als an einer glatten, noch
erklärung. Jedenfalls ist die vergrößerte Oberfläche nicht allein dafür ver-
antwortlich zu machen.

Experimentelles. Die Pb-Kathode hatte eine wirksame Oberfläche von
5 cm. Vor Gebrauch wurde sie als Kathode in H_2SO_4 benutzt, bis sie nicht
mehr glänzend war. Als Elektrolyt diente H_2SO_4 u. NaOH, zur Erzielung von
bestimmtem pH teilweise mit Citrat oder Borat versetzt. Für $\text{pH} = 7$ u. 9 wurden
 H_2SO_4 bzw. Na_2HPO_4 verwandt. Die minimale Überspannung wurde nach
TEIL u. BREUNING (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. **83**. 329; C. **1914**. I. 732) be-
stimmt, indem erst die Stromdichte so hoch gewählt wurde, daß an der Kathode
teilich Blasen aufstiegen; dann wurde sie so weit verringert, bis in 2 Min.
Blase hoch ging. Die Messung geschah entweder nach der direkten Methode,
od (bei höheren Stromdichten) in der vom Vf. früher (Journ. Chem. Soc. London
2. 250; C. **1924**. I. 2232) angegebenen Weise. Die minimale Überspannung lag
bei $\text{pH} = 1-11$ zwischen 0,60 u. 0,66 V. (Journ. Chem. Soc. London **125**. 2414—23.
9. Exeter, Univ.)

HERTER.

Sidney Raymond Carter und Frank James, *Einige elektrochemische Beobach-
tungen über die reduzierenden Eigenschaften des Schwefeldioxyds*. Das Potential von
SC in saurer Lsg. bei Ggw. von S oder SO_4^{2-} wurde bei Zimmertemp. untersucht,
wofür ohne einwandfreie Ergebnisse. Experimente über die kathod. Red. von SO_2
zeigten die primäre B. von S oder H_2S unwahrscheinlich, vielmehr dürfte das
primäre Prod. der Red. unterschweflige Säure ($\text{H}_2\text{S}_2\text{O}_4$) sein, eine Annahme, die
eine Stütze in den Messungen von JELLINEK (Ztschr. f. Elektrochem. **17**. 157. 245;
C. **911**. I. 1485) findet. — Bei der Red. von SO_2 durch anorgan. Agenzien,
z. B. SnCl_2 oder Al in saurer Lsg., wurden als Endprodd. S, H_2S , $\text{H}_2\text{S}_2\text{O}_4$ u. Tetra-
thiothäure gefunden. Auch hier wird angenommen, daß primär geringe Mengen

von $\text{H}_2\text{S}_2\text{O}_4$ entstehen, die in sekundären Rkk. die B. der anderen Prodd. ermöglichen. — Ein Anhang befaßt sich mit den von SMITH u. MAYER (Journ. Amer. Chem. Soc. **46**. 75; C. **1924**. I. 1644) angegebenen Reduktionspotentialen, wonach unter Umständen auch eine primäre B. von H_2S bei der kathod. Red. von I_2 möglich ist. (Journ. Chem. Soc. London **125**. 2231—40. 1924. Univ. of Birmingham.)

HERTEF

J. Errera, *Die Dispersion der Hertz'schen Wellen in festen Substanzen in der Nähe des Schmelzpunktes*. (Vgl. S. 19.) Vf. untersuchte die Änderung der Dispersion fester Substanzen in der Nähe des F. mit der Frequenz (λ variierte zwischen 500 m u. 1000 km). Untersucht wurden: *Eis, Dimethylsulfat, Nitrobenzol, CH_3COO tert. Butylalkohol, Bzl., Cyclohexan, Äthylbromid, Benzoylchlorid, Metakresol*. Die Dispersionskurven sind von der Temp. abhängig. Bei jeder Temp. nimmt die Dispersion mit der Wellenlänge. Dieser Zuwachs ist in der Nähe des F. stark ausgeprägt u. wird schwächer bei niedriger Temp. Beim Erstarren ist der Verlauf der Dispersion Änderung unstetig. Das Erstarren verringert die DE. bei hohen Frequenzen, bei niedrigen Frequenzen dagegen scheinen die Substanzen die DE. beim Erstarren zu erhöhen. Vf. erklärt dieses Ergebnis durch die Annahme, daß die DE. einerseits herrührt von der Polarisierung durch Lagenänderung bzw. Orientierung der schweren u. geladenen Teilchen, andererseits von der Elektronenbewegung im Innern eines jeden Teilchens, die die Polarisierung bewirkt. Diese Einflüsse sind relativ verschieden entsprechend der Frequenz u. Temp. Der durch die DE. charakterisierte feste Zustand beginnt bei einer entsprechend der Frequenz verschiedenen Temp. (Journ. de Physique et le Radium [6] **5**. 304—11. 1924.)

K. WOLF

O. Feußner, *Eine Bemerkung zu der Arbeit von A. Eucken und O. Neumaier über die Kenntnis des Wiedemann-Franz'schen Gesetzes*. I. (Vgl. EUCKEN u. NEUMAIER, Ztschr. f. physik. Ch. **111**. 431; C. **1924**. II. 2387). Vf. schlägt eine Erklärung vor für die Abhängigkeit der Wärmeleitfähigkeit λ von der Korngröße der verwendeten Metalle. λ ist bei nicht regulären Krystallen in den verschiedenen Richtungen verschieden. Trifft also eine Wärmewelle, die nach EINSTEIN u. DEBYE als eine elektromagnet. Welle zu betrachten ist, auf eine Krystallfläche, hinter der im Sinne des Fortschreitens der Welle eine Änderung der λ eintritt, so findet an der Grenzfläche neben einer Brechung eine Reflexion statt, die dazu führt, daß der Wärme abgebende Krystall eine höhere Temp. haben muß, als der Wärme aufnehmende. (Ztschr. f. physik. Ch. **114**. 320. 1924. Hanau, Phys. Lab. d. Heraeus G. m. b. H.)

BIKERMAN

Oliver Coligny de Champfleury Ellis, *Der Einfluß von Verdünnung auf die Geschwindigkeit der Flamme*. Zu den unter obigem Titel vom Vf. u. Mitarbeitern veröffentlichten Arbeiten (vgl. S. 22) wird bemerkt, daß, wenn die Geschwindigkeit der Flamme einem additiven Bestandteil des Gasgemisches proportional ist, sie das auch jedem anderen sein muß. Der Wärmewert (Verbrennungswärme: Anzahl der reagierenden u. verdünnenden Moll.) wurde als Bezugskonstante gewählt, da alle nötigen Daten bekannt sind u. man für verschiedene Brennstoffe einen gemeinsamen Nenner erhalten kann. Vff. bedauern, andere Beziehungen von PAYMAN (Journ. Chem. Soc. London **117**. 48; C. **1920**. I. 851) übersehen zu haben. (Journ. Chem. Soc. London **125**. 2674. 1924. Sheffield, Safety in Mines Research Board.)

HERTER

P. Laffitte, *Über die Fortpflanzung der Explosionswelle*. Vf. untersuchte nach CAMPBELL den Explosionsvorgang, der sich nach plötzlicher Querschnittszunahme der Röhre fortpflanzt. Es wurden Gemische von $\text{CS}_2 + 3\text{O}_2$ u. $\text{H}_2 + \text{O}$ untersucht. Die Explosion wurde durch den elektr. Funken eingeleitet u. photographisch aufgenommen. Die plötzliche Querschnittszunahme wurde durch 2 durch einen Korkstopfen miteinander verbundene Röhren herbeigeführt. Die Verss. zeigen, daß

Explosionswelle an der Verbindungsstelle der beiden Röhren zunächst aufhört
 fortzupflanzen, um sich dann in der zweiten Röhre nach einer Verbrennungs-
 erde neu zu bilden. Die Dauer dieser Periode hängt ab von dem Ausgangs-
 sch u. dem Verhältnis der beiden Röhrendurchmesser. Schließlich werden die
 erte angegeben, weshalb CAMPBELL bei seinen Verss. die B. der Explosionswelle
 r zweiten Röhre nicht feststellen konnte. (C. r. d. l'Acad. des sciences **179**.
 9—96. 1924.)

K. WOLF.

Nicolai Puschin, *Einfluß des Druckes auf den Gefrierpunkt von p-Nitro-
 toluol, m-Dinitrobenzol und Guajacol*. Die Abhängigkeit des E. vom Druck wurde
 m-Nitrotoluol (I), m-Dinitrobenzol (II) u. Guajacol (III) geprüft, indem bei
 ant gehaltener Temp. (bei I bis 125°, II bis 140°, III bis 60°) der Druck
 smmt wurde, bei dem feste u. fl. Phase im Gleichgewicht waren. Die an-
 yndenden Drucke betrugen bei I bis zu 3100, bei II u. III bis zu 2000 kg/qcm.
 III wurde die Gleichung: $t = 28,4^\circ + 0,0178 p - 0,00000100 p^2$ von DENECKE
 tr. f. anorg. u. allg. Ch. **108**. 1; C. **1919**. III. 1002) ziemlich genau bestätigt
 fiden. (Journ. Chem. Soc. London **125**. 2628—30. 1924. Petrograd, Elektro-
 ce. Inst.)

HERTER.

M. Born und J. Franck, *Bemerkungen über die Dissipation der Reaktions-
 wärme*. Vff. wenden sich gegen die Vorstellung, daß der Energiegehalt eines Mol.
 größer sein kann als die Dissoziationsarbeit, erkennen jedoch die Notwendig-
 keit von Dreierstößen u. Ausstrahlung an. Es werden Beispiele angeführt, bei
 denen der Energiebetrag eines Mol. ein Vielfaches der Dissoziationsenergie ist.
 ähnliche Fälle haben als Gemeinsames, daß die Hauptenergie im angeregten Mol.
 Anregung eines Elektronenquantensprunges verwendet wird. Aber auch, wenn
 die Schwingungs- u. Rotationsenergie in Betracht gezogen wird, kann der
 Energiegehalt die Dissoziationsarbeit in neutrale Bestandteile wesentlich über-
 schreiten. Die Abführung der überschüssigen Energie geht nun in den meisten
 Fällen durch Dreierstöße vor sich, die bei B. von Moll. mit polarem u. nicht polarem
 Charakter aus neutralen Atomen stattfinden. An Stelle der Dreierstöße kann auch
 Ausstrahlung einsetzen, wenn sich elektr. geladene Bestandteile (Ionen, Elektronen)
 zu einem Mol. oder neutralen Atom vereinigen. (Ann. der Physik [4] **76**. 225—30.
 1923.)

BECKER.

Theodor V. Ionescu, *Über die Schallgeschwindigkeit in Flüssigkeiten und ihren
 Zusammenhang mit der Verdampfungswärme*. Die Schallgeschwindigkeit V wurde
 in einem eisernen U-Rohr von 5,6 m Länge u. 33 mm lichter Weite gemessen, die
 Endungen des Rohres wurden mit Glimmermembranen zugeklebt, an denen
 Spiegelchen hingen; die Bewegungen des von den Spiegelchen reflektierten Licht-
 strahls wurden auf einer photograph. Platte registriert. Ergebnisse: W. 1470 m/sec.
 20 A. 1195 m/sec. (23°), Ä. 931 m/sec. (23,5°), Aceton 1120 (24°), Toluol 924 (23,5°),
 Petroleum 1275 (23°), Bzn. 1202 (23°), ein Xylol 1165 (20°). Die Newtonsche Formel
 wurde bestätigt; die Formeln von BOGDAN (Bull. Acad. Roumaine **2**. 30. [1923])
 $V = \text{const.} \sqrt{L}$ (L = die Verdampfungswärme) liefert zu niedrige, die von LEWIS
 Zthr. f. physik. Ch. **78**. 24; C. **1912**. I. 113) $V = \sqrt{L/\alpha T}$ (α = der Aus-
 deungskoeffizient) zu hohe Werte. (Journ. de Physique et le Radium [6] **5**.
 37—83. 1924. Jassy, Fac. des sciences.)

BIKEMAN.

B. Anorganische Chemie.

G. N. Quam, *Eine Untersuchung der Reaktionen in flüssigem Schwefelwasserstoff*.
 Die Darst. u. Verflüssigung des H_2S geschah ähnlich wie bei ANTONY u. MAGRI
 (G. z. chim. ital. **35**. 206 [1905]). Eine sehr große Anzahl organ. u. anorgan., in

fl. H_2S l. u. unl. Substanzen wurden auf ihre Rk. mit fl. H_2S hin untersucht. I. Beobachtungen wurden über Monate ausgedehnt, dann wurden die Versuchsrohre geöffnet u. feste u. fl. Phase analysiert. Im Gegensatz zu den Angaben von ANTONIO u. MAGRI findet Vf., daß trocknes SO_2 sehr heftig mit fl. H_2S reagiert. SeO_2 reagiert langsamer unter B. von freiem Se, S u. W. Fl. H_2S bildet mit W. ein Hyd. $\text{H}_2\text{S} \cdot 5,7 \text{H}_2\text{O}$. Von den Sulfiden u. Sulfhydraten sind nur wenige in fl. H_2S etwas löslich. Von den anorgan. Säuren war die Rk. mit Pyroschwefelsäure heftig, HCl besonders l. Die anorgan. Halogenide zeigten eine deutliche Abstufung in ihrer Reaktionsfähigkeit (Einzelheiten können wegen der zu großen Anzahl der untersuchten Substanzen hier nicht wiedergegeben werden). Mit dem Grad, mit dem die Basizität des positiven Radikals abnimmt, wächst die Löslichkeit u. für jede einzelne Gruppe des period. Systems strebt ein Reaktionstypus um so mehr nach Vervollständigung, je kleiner das At.-Gew. ist. — Die Rk. der Oxychloride von S u. Se mit fl. H_2S vollzieht sich heftig unter B. der entsprechenden Chloride, Oxyde der freien Elemente S u. Se. Die Nitrate von Ag, Bi u. Ammonium reagieren unter B. von Sulfid u. freiem S. Oxydationsmittel bewirkten S-Abscheidung. In den meisten der in H_2S l. Verbb. waren organische. Bei diesen wirkt H_2S als organ. Lösungsm. Rkk. traten ein, wenn die gel. Verb. ein doppelt gebundenes O-Atom oder ein 3-wertiges N im Molekül enthält. Das führt zu der Annahme, daß die Rk. unter B. von Additionsprodd. stattfindet, wie das für den Fall der Thioessigsäure ohne Zweifel ist. Fast alle Rkk. in fl. H_2S verlaufen selbst bei Zimmertemp., sehr langsam. (Journ. Americ. Chem. Soc. **47**. 103—8. Fremont [Nebraska], Fremont land Coll.)

JOSEPHY.

André Graire, Über die Reduktion von Stickoxyden in Gegenwart von Schwefelsäure und schwefliger Säure. Aus den Verss. u. Tabellen, die im Original veröffentlicht sind, schließt Vf., daß die Red. von NO durch SO_2 in Ggw. von H_2S wächst, je verd. die Säure ist. In Ggw. einer mehr als 35%ig. H_2SO_4 ist die Red. gering (bei 94,4% $\text{H}_2\text{SO}_4 = 0$, bei 38,36% Säure = 5,3%); wird die Konz. herabgesetzt (35—25%), so nimmt die Red. stark zu (bei 26,42% H_2SO_4 beträgt die Red. 42,5%); die Red. geht nur bis zum N_2O , Stickstoff wurde, wenn überhaupt, nur in Spuren gefunden. (C. r. d. l'Acad. des sciences **180**. 292—94.)

HABERLAND.

J. Böeseken, Über die komplexen Borverbindungen und die Asymmetrie der Borsäure. Polemik des Vfs. gegen die Auffassung ROSENHEIMS (S. 26) von der Fünfwertigkeit des Boratoms in den innerkomplexen Boraten. Vf. zeigt auf seine früheren Veröffentlichungen hinweisend — wie er sich den Übergang des dreiwertigen B in das höherwertige denkt. Der Koordinationsbegriff sagt hier mehr als der Begriff Valenz. Die Ausführungen des Vfs. stützen sich auf die Anschauungen von LANGMUIR über das Elektronenoktett in der äußeren Schale der Atome u. der von KOSSEL über die polaren u. heteropolaren Bindungen. Es wird auf die Analogie der Atomgruppierung mit den akt. Ammoniumverbb. hingewiesen. Dort gibt der N ein Elektron an das Anion ab, hier nimmt das Boratom ein Elektron vom Kation auf, um den Komplex zu bilden. In beiden Fällen entsteht ein Ion vom Typus des vierwertigen C. Ohne die Elektronenwanderung sind die Gegensätze schwer zu verstehen. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. **58**. 268—70. Deutscher Techn. Hochsch.)

HORST.

M. Centnerszwer und **B. Bružs**, Die stufenweise Dissoziation des Magnesiumcarbonats. Mit der Anordnung von CENTNERSZWER und ANDRUSOW (Ztschr. physik. Ch. **111**. 79; C. **1924**. II. 1568) wurden die Dissoziationstempp. (T_d) des MgCO_3 in CO_2 bei 1 at Druck bestimmt. T_d des bei 320° im CO_2 -Strom getrockneten MgCO_3 liegt bei 373°; dabei entsteht das Monooxymonocarbonat $\text{MgO} \cdot \text{MgCO}_3$, dessen T_d 442° beträgt. Bei 450° bis zur Gewichtskonstanz erhitzt, gibt es eine Substanz, deren Analyse mit $3 \text{MgO} \cdot \text{MgCO}_3$ angenähert übereinstimmt; dieses Trioxymon-

nat dissoziiert bei 469° unter B. von Magnesiumoxyd. Der natürliche rhomb. *arazit* dissoziiert bei 402° u. liefert dabei ein Monoxytricarbonat $\text{MgO} \cdot 3\text{MgCO}_3$; andere, gut getrocknete (380—400°) Probe zersetzte sich nur bei 437° u. gleich in Monoxymonocarbonat. Die letzte Stufe, die MgO-Bildung, wird bei 480° erreicht. — Die Gegenrk. ist unterhalb 230° äußerst langsam. (Ztschr. f. physik. Ch. 42:237—250. 1924. Riga, Univ.)

BIKERMANN.

Rudolf Schenck und Wilhelm Borkenstein. Über die chemischen Gleichgewichte zwischen Bleisulfid und seinen Röstprodukten. II. (I. vgl. SCHENCK und REINDERS, Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 105. 145; C. 1919. III. 8.) Vff. nehmen die Kritik der früheren Arbeit von SCHENCK und ALBERS (l. c.) durch REINDERS (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 109. 52; C. 1920. I. 698) Stellung. Die Gegenrk. erstreckt sich auf die Zus. des Bodenkörpers, welcher beim Abrösten des Bleisulfids entsteht, wenn man bei konstanter Temp. SO_2 abführt, wobei der Gasdruck konstante Werte nicht unterschreiten darf. Weiter wird der vollständige isotherme Abbau von Mischungen von PbS mit einbas. PbSO_4 durch Entnahme von genau bestimmten Mengen SO_2 durchgeführt, wobei die sich darauf einstellenden Gleichgewichtsdrucke beobachtet werden. Es wurde im Wesentlichen nach der von SCHENCK und ALBERS (l. c.) angegebenen Versuchsanordnung gearbeitet. Als Rohmaterial wurden diesmal Al-Röhrchen verwendet, welche in Porzellanrohre gesteckt waren. Durch mehrmaliges Brennen war die Al_2O_3 -Masse dicht u. für Pb-Verbb. durchlässig gemacht worden. Durch Erhitzen von Gemischen von PbS mit PbSO_4 , $\text{PbSO}_4 \cdot \text{PbO}$, $\text{PbSO}_4 \cdot 2\text{PbO}$, $\text{PbSO}_4 \cdot 3\text{PbO}$ u. PbO bei Temp. zwischen 800 u. 850° u. durch Messung des zu dem jeweiligen System gehörigen Dampfdrucks wurden die Gleichgewichtskurven von folgenden Rkk. festgestellt:

1. $7\text{PbSO}_4 + \text{PbS} = 4(\text{PbSO}_4 \cdot \text{PbO}) + 4\text{SO}_2$
2. $10(\text{PbSO}_4 \cdot \text{PbO}) + \text{PbS} = 7(\text{PbSO}_4 \cdot 2\text{PbO}) + 4\text{SO}_2$
3. $13(\text{PbSO}_4 \cdot 2\text{PbO}) + \text{PbS} = 10(\text{PbSO}_4 \cdot 3\text{PbO}) + 4\text{SO}_2$
4. $3(\text{PbSO}_4 \cdot 3\text{PbS}) + \text{PbS} = 13\text{PbO} + 4\text{SO}_2$
5. $2\text{PbO} + \text{PbS} = 3\text{Pb} + \text{SO}_2$.

Es werden die Gründe angeführt, warum REINDERS die Rkk. 2. bis 5. nicht beobachtet hatte, da nach ihm schon die 2. Rk. zwischen $\text{PbSO}_4 \cdot \text{PbO}$ u. PbS zu metall. Pb führt. Nach REINDERS verläuft Gleichung 2



Die Untersuchung des Bodenkörpers ergab kein freies Pb, wenn der Druck so eingestellt wurde, daß die Rk. nach Gleichung 1. bis 4. verlief. Wurde dagegen das System evakuiert, so daß das Druckgebiet unterhalb der durch Gleichung 5) dargestellten Reaktionskurve fiel, dann entstand Pb in großen Mengen. Das gegenwärtige Resultat von REINDERS führen Vff. darauf zurück, daß dieser zu stark evakuierte u. Störungen durch Bleisilikatbildung bei Verwendung von Porzellanrohren nicht berücksichtigte. Die kristallograph. Untersuchung der bas. Sulfate ergab: $\text{PbSO}_4 \cdot \text{PbO}$ monoklin, $\text{PbSO}_4 \cdot 2\text{PbO}$ u. $\text{PbSO}_4 \cdot 3\text{PbO}$ wahrscheinlich rhomb., Lichtbrechung u. Dispersion in allen 3 Fällen sehr stark. Isotherme Abbauverss. an Gemischen von $\text{PbSO}_4 \cdot \text{PbO}$ mit PbS bei 800, 720 u. 650° führten zu denselben Feststellungen wie die Bodenkörperunterss. u. bestätigten die Anschauungen der Vff. über den Reaktionsverlauf. Aus den Dampfdruckkurven wird die Reaktionswärme bei der Rk. $2\text{PbO} + \text{PbS} = 3\text{Pb} + \text{SO}_2$ zu 50300 cal. berechnet, was gut mit anderweitig gemessenen Werten übereinstimmt. Bei den auftretenden 7 Phasen sind 13 univariante Gleichgewichte mit je 3 Bodenphasen denkbar. Bei 9 dieser Kombinationen ist PbS zugegen. In einem räumlichen Modell ist der Verlauf der Gleichgewichtskurven u. die Quintupelpunkte eingezeichnet. Wegen der Lage derselben muß auf die Originalfigur u. die zugehörigen Dia-

gramme verwiesen werden. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. **142**. 143—79. Münster Univ.)

BECKER-ROSE.

George Dean, *Die Atomgewichte von Kohlenstoff und Silber*. 1. Aus Ag_2S u. HCN dargestelltes AgCN wurde im H_2 -Strom zu Ag reduziert. Unter Annahme von $\text{Ag} = 107,88$ u. $\text{N} = 14,008$ ergab sich für C das At.-Gew. $12,0024 \pm 0,0001$ als Mittel aus 21 Bestst. — 2. AgCNO wurde aus AgNO_3 u. Harnstoff gewonnen u. das durch Erhitzen im Luft- oder H_2 -Strom auf ca. 300° entstandene Ag gewogen. Das Mittel aus 16 von 21 Bestst. ergab $\text{C} = 12,0029 \pm 0,0009$. Durch Kombination von 1. u. 2. nach $(\text{AgCNO}) : (\text{AgCN}) = [(\text{AgCN}) + 16] : [\text{AgCN}] = \text{X} : \text{Y}$ wird $(\text{AgCN}) = 133,879$, daraus **$\text{Ag} = 107,871$** u. für $\text{N} = 14,008$, **$\text{C} = 12,000$** . (Journ. Chem. Soc. London **125**. 2656—72. 1924. West Ham Municipal Coll.) HERTER.

Nevil Vincent Sidgwick, *Das Verhalten der einfachen Halogenide gegen Wasser*. Halogenide können mit W . nach 4 Richtungen reagieren: 1. Ionisation, 2. Hydrolyse nach $-\text{XCl} \rightarrow -\text{XOH} + \text{HCl}$, 3. keine Rk., 4. Hydrolyse nach $-\text{XCl} \rightarrow \text{XH} - \text{HOCl}$. Es wird an Beispielen gezeigt, daß das Eintreten dieser Rkk. von der Koordinationszahl des mit Halogen verbundenen Elements (vgl. SIDGWICK u. CALLOW Journ. Chem. Soc. London **125**. 532; C. **1924**. II. 2732) u. von der Vollständigkeit der Elektronenoktets abhängt. Daß OsF_8 hydrolysiert wird, läßt vielleicht auf eine maximale Koordinationszahl von 10 bei den Elementen mit den höchsten Ordnungszahlen schließen. (Journ. Chem. Soc. London **125**. 2672—74. 1924. Oxford Dyson Perrins Lab.)

HERTER.

W. Manchot und **J. König**, *Über Verbindungen von Kohlenoxyd mit Osmiumchlorür*. (Vgl. Ber. Dtsch. Chem. Ges. **57**. 2130; C. **1925**. I. 353.) Leitet man CO in der Wärme über OsCl_3 so tritt bei 220° unter B. eines weißen Sublimats Rk. ein, die in 8 Stdn. bei 270° vollständig wird. U. Mk. erkennt man das Reaktionsprod. als kurze säulenförmige Prismen vermischt mit langen Nadeln. Nach der Reinigung mit CCl_4 ist der Körper auch u. Mk. einheitlich u. schmilzt bei $269\text{—}273^\circ$. Neben diesem Hauptprod. liegen wohl noch mehrere CO -Verbindungen vor, die in allerdings geringer Menge aus den Extraktionslösungen kristallisiert. — Die Analyse des Hauptprod. wurde durch Erhitzen mit 60% ige. NaOH vorgenommen u. das 10-fache Vol. A . zugesetzt. Der Nd. setzt sich nach 5—6 Stdn. Sieden auf dem Wasserbad gut filtrierbar ab u. wurde im H -Strom reduziert zu Metall. In dem alkal. Filtrat wurde Cl als AgCl bestimmt. Die Ergebnisse der Analysen führen zu der Formel $\text{Os}(\text{CO})_3\text{Cl}_2$, wobei Vff. die Frage unbeantwortet lassen, ob nicht ein Gemenge von $\text{Os}(\text{CO})_3\text{Cl}_2$ mit $\text{Os}(\text{CO})_4\text{Cl}_2$ vorliegt, wie aus den Krystallausscheidungen in CCl_4 zu schließen wäre. — Charakterist. für $\text{Os}(\text{CO})_3\text{Cl}_2$ ist die große Beständigkeit ähnlich der CO -Verb. des Ru aber unterschiedlich von der des Ir . Sie ist unzersetzt sublimierbar in O_2 -freier Atmosphäre. An der Luft Verbrennung unter glänzender Feuererscheinung. In W . u. Säuren unl. u. gegen diese indifferent. In NaOH ll., das Cl_2 ist als Ion gebunden. Hingegen ist der Metallkomplex sehr stabil. Für alle Pt-Metalle mit Ausnahme des Rh sind jetzt CO -Verbindungen bekannt; auch für letzteres kommen solche in Betracht. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. **58**. 229—32. München, Techn. Hochschule.)

HORST.

W. Manchot und **H. Gall**, *Über Metall-Kohlenoxyd-Salze*. IX. Über eine Verbindung von Kohlenoxyd mit Iridiumchlorür. (Vgl. vorst. Ref.) Bei 150° bildet sich aus wasserfreiem IrCl_3 u. trockenem CO eine CO -Verb., die in prächtig langen Nadeln kristallisiert, gegen Feuchtigkeit sehr empfindlich ist u. sich bei höherer Temp. zers. Ausbeute gering. In der vorliegenden Verb. ist CO bedeutend lockerer gebunden als in der entsprechenden Ru - u. Os -Verb. Schon mit W . wird das Gas abgespalten. Bei 140° schmilzt das Salz unter Gasentw. An der Luft verbrennt es mit Feuererscheinung u. Metallspiegelbildung. Die Zers. mit W ., die in der Hauptsache nach der Gleichung: $\text{IrCl}_2(\text{CO})_2 + \text{H}_2\text{O} = \text{IrO} + 2\text{HCl} + 2\text{CO}$ ver-

liefert das gesamte CO u. das Cl als HCl. Es entsteht demnach *Iridiumoxydul* ein *Hydrat* desselben. Die Löslichkeit in HCl scheint hierfür zu sprechen. In der Reihe vom Os bis zum Hg fehlen jetzt nur noch von Gold diese CO-Verbb., welche Vf. bereits durch Verss. ihre Existenz festgestellt haben. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58. 232—34. München, Techn. Hochsch.) HORST.

H. Buttgenbach, *Mitteilungen über Phenacit und Euclas*. Ausführliche krystallograph. Beschreibung einiger Proben der beiden Mineralien. (Bull. Acad. roy. Belgique, Classe des sciences [5] 10. 456—64. 1924. Lüttich, Univ.) HABERLAND.

D. Organische Chemie.

P. Walden, *Fünfzig Jahre stereochemischer Lehre und Forschung*. Vortrag, in welchem Vf. nach einer einleitenden Betrachtung der Vorgeschichte u. der beiden Persönlichkeiten VAN'T HOFFS u. LE BELS, die Grundlagen der klass. Stereochemie, die Entw. der klass. Stereochemie des C-Atoms, der N-Verbb. u. der anorgan. Metallkomplexe darlegt. Weiterhin hat Vf. die Richtungen angezeigt, in welchen der Stereochemie aus fruchtbringend auf verwandten Gebieten teils schon gearbeitet worden ist oder noch prakt. Nutzen erwartet werden kann. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58. 237—65.) HORST.

P. Walden, *Vergangenheit und Gegenwart der Stereochemie*. Deckt sich mit dem Inhalt des vorst. Ref. (Chem. Weekblad 22. 34—61. Rostock.) K. WOLF.

P. Bruylants, *Symbolismus in der organischen Chemie*. Vf. erörtert die Vorzüge, die die jetzige Formulierung organ. Verbb. aufzuweisen hat. Zur restlosen Klärung von Valenzfragen (seit der Entdeckung der freien Radikale), sowie von Isomerisationserscheinungen genügen die „klass.“ Anschauungen jedoch nicht mehr, als ihre Ergänzung muß die Wernersche Theorie der wechselnden Valenz herangezogen werden unter Berücksichtigung der verschiedenen Affinitätsbeanspruchung organ. Radikale. (Bull. Acad. roy. Belgique, Classe des sciences [5] 10. 680—97. 1924. Louvain, Univ.) HABERLAND.


P. Bruylants, *Isomerisationserscheinungen bei olefinischen Verbindungen*. Bei dem *Butennitrilen* hat Vf. (vgl. Bull. Soc. Chim. Belgique 33. 331; C. 1924. II. 114) festgestellt, daß das β, γ -ungesätt. Deriv. sich sehr leicht in das α, β -ungesätt. Prod. umlagern läßt. Verbb. mit der Gruppierung $\text{CH}_2:\text{CH}:\text{CH} < \text{CH}_3:\text{CH}:\text{C} < \text{um}$, es entsteht stets die stabilere Verb. Die Entscheidung darüber, welches Deriv. das stabilere ist, braucht nicht auf Grund stereochem. Unterss. gefällt zu werden, sondern man kann die Stabilität voraussagen auf Grund der Wernerschen Theorie der veränderlichen Affinität, sowie auf Grund der von MEERWEIN (LIEBIGS Ann. 419. 121; C. 1920. I. 153, sowie die dort zitierte Literatur) festgestellten Affinitätsbeanspruchung organ. Radikale. An zahlreichen Literaturbeispielen (wobei besonders die Arbeiten von FITTIG berücksichtigt werden) wird die Möglichkeit oder Unmöglichkeit zur Isomerisation dargestellt. (Bull. Acad. roy. Belgique, Classe des sciences [5] 10. 492—503. 1924.) HA.

J. Plotnikow, *Bemerkung zu der Abhandlung von A. Benrath und E. Hertel: Über die Photochlorierung aliphatischer Verbindungen in Tetrachlorkohlenstoff*. (Vgl. BENRATH u. HERTEL, Ztschr. f. wiss. Photographie, Photophysik u. Photochemie 23. 30; C. 1924. II. 822.) Vf. betont den nur qualitativen Charakter der Abhandlung. Daß die vom Vf. gefundenen period. Erscheinungen nicht reproduziert werden konnten, liegt an zu kurzer Dauer der Verss. (Ztschr. f. wiss. Photographie, Photophysik u. Photochemie 23. 79—80. 1924. Zagreb, Techn. Hochschule.) LESZYNSKI.

A. Wohl und K. Freudenberg, *Berichtigung zu der Arbeit: Die Bezeichnung organischer Reihen*. In der früher (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 56. 309 [313]; C. 1923.

I. 889 [890]) gegebenen Übersichtstabelle ist folgendes zu korrigieren. Statt 7'-d-Galaktose muß es heißen: 7'-l(-)-Galaktose, statt 4'-d(-)-Mannose muß stehen 4'-l(-)-Mannose. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58. 451.)

Karl Freudenberg und Arnold Doser, Zur Kenntnis der Acetonzucker. V. *Synthese von Aminohexosen aus Galaktose.* (IV. vgl. Ber. Dtsch. Chem. Ges. 2119; C. 1923. III. 1555.) *Toluolsulfodiacetongalaktose* setzt sich wie mit Hydrat so auch mit dem träger reagierendem NH_3 zu einem Gemisch eines primären eines sekundären Amins, des *Diacetongalaktosamins* (I) u. des *Bis-[diacetongalaktosamins]* (II) um. I liefert bei der Desaminierung *Diacetongalaktose* zurück. Der entsprechende Aminozyucker liefert dabei ein Gemisch, das bei der Oxydation mit HNO_3 neben Oxalsäure nur halb so viel Schleimsäure liefert wie Galaktose. Ferner gibt dieses Gemisch 2 Phenylhydrazone, die jedoch nicht rein erhalten werden konnten. Galaktose ist darin augenscheinlich nicht vorhanden. — Das Galaktosamin läßt sich mit HgO zu einer *Galaktosaminsäure* oxydieren, die nicht identisch mit Chondrosaminsäuren u. ihrem Epimeren.





Die Stellung der Aminogruppe in 3 ist willkürlich gewählt.

Versuche. *Toluolsulfodiacetongalaktose* setzt sich mit fl. NH_3 im Bombenrohr bei Zimmertemp. schon in 24 Stdn. um. Einfacher ist das Verf., durch Erhitzen mit methylalkoh. NH_3 (bei 25° gsätt.) auf 100° (12 Stdn.) Trennung der beiden Amine aus verd. A., wobei II auskrystallisiert. — *Diacetongalaktosamin*, $\text{C}_{12}\text{H}_{21}\text{O}_5\text{N}$, farbloses Öl vom $\text{Kp}_{0,5-1}$ 122–126°, $[\alpha]_{578}^{19} = -63,09^\circ$, $[\alpha]_{633} = -50,42^\circ$, $[\alpha]_{546} = -70,85^\circ$, $[\alpha]_{434} = -127,2^\circ (\pm 4^\circ)$ ($c = 1,1742$). Durchweg ll.; reagiert stark alkalisch. — *Chlorhydrat*, aus Chlf. Zers. bei 229°, ist nicht haltbar. — *Pikrolonat*, aus A. filzige Nadeln vom F. 223° (Zers.). — Gibt in verd. NaOH mit Br-W. einen Nd. des Monobromamins, aus PAe. krystallisierbar. — *Benzoylderiv.*, $\text{C}_{19}\text{H}_{25}\text{O}_6\text{N}$, aus Bzn. F. 132,5°. $[\alpha]_{578}^{18} = -26,74^\circ$ (Aceton). — *Galaktosamin* aus I mit 2-n. H_2SO_4 bei 70° 1,5 Stdn. Drehungsänderung von $-3,8^\circ$ bis $+6,8^\circ$ in 10% ig. Lsg. (1 dem-Rohr). Sirup. — *Galaktosaminsäure*, $\text{C}_6\text{H}_{13}\text{O}_6\text{N}$, aus W. Nadeln. $[\alpha]_{578}^{18} = +9,23^\circ (\pm 1^\circ)$ ($1/5$ -n. NaOH). Gibt ein krystallisiertes *Phenylhydrazid*. — *Benzoylgalaktosamin*, aus Diacetonbenzoylgalaktosamin mit 2-n. H_2SO_4 2 Stdn. bei 70°. — *Phenylhydrazon* aus A. oder aus Pyridin mit Ä. F. 201°. — *Bis-[diacetongalaktosamin]*, $\text{C}_{24}\text{H}_{39}\text{O}_{10}\text{N}$ (II), aus CH_3OH u. W. lange Nadeln vom F. 108°, aus Lg. F. 125–126°. $[\alpha]_{578}^{18} = -84,35^\circ$ (Aceton). — *Benzoylderiv.*, $\text{C}_{31}\text{H}_{43}\text{O}_{11}\text{N}$, aus Lg., dann aus A. F. 129°, $[\alpha]_{578}^{18} = -53,9^\circ$ (Aceton), wl. in L., Bzl., sonst zll. — *Nitrosamin*, $\text{C}_{24}\text{H}_{35}\text{O}_{11}\text{N}_2$, aus A. oder CH_3OH . F. 181–18°, $[\alpha]_{578}^{19} = -7,9^\circ$ (Aceton), $[\alpha]_{633} = -6,8^\circ$, $[\alpha]_{546} = -8,5^\circ$, $[\alpha]_{434} = -33,4^\circ$. Dasselbe Nitrosamin bildet sich aus dem früher beschriebenen as. Di-[diacetongalaktosamin]-hydrazin mit HNO_2 . — *Bisgalaktosamin*, aus der Acetonverb. mit 2-n. H_2SO_4 4 Stdn. bei 70°. Sirup, ll. in W., Glykol, Glycerin, Pyridin, unl. in A., Ä. — *Bisphenylhydrazon*, $\text{C}_{24}\text{H}_{35}\text{O}_8\text{N}_5$, aus W. farblose Nadeln, Zers. bei 192°. Fast unl. in A. u. Ä., wl. in Pyridin. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58. 294–300.)

Karl Freudenberg und Anton Wolf, Zur Kenntnis der Acetonzucker. VI. *Konstitution der Diacetonmannose.* (V. vgl. vorst. Ref.) Die Diacetonmannose zeit

arotation, die durch Alkalien beschleunigt wird. Es muß ihr daher die Konst. I beschrieben werden. Damit erklärt sich die B. von 2 Methylderiv., die leichte Abspaltung des Methyls u. die große Reaktionsfähigkeit der nicht gefaßten Toluol-verb. Daß sie nicht Fehlingsche Lsg. reduziert, kann nur so gedeutet werden, daß der wechselseitige Übergang der α - u. β -Form nicht über die Oxostufe geht, für diese zu rasch durchlaufen wird. — Mit alkoh. NH_3 entsteht das primäre Amin II, neben dem sekundären Amin ($\text{C}_{12}\text{H}_{10}\text{O}_5$) $_2\text{NH}$. Daß der N nicht ringförmig gebunden ist, geht erstens aus der B. dieses 2. Körpers, zweitens aber daraus hervor, daß I auch mit Dimethylamin ganz analog reagiert.



Versuche. Diacetonmannose, aus A. F. 123°. Eine 2,5%ig. Lsg. in verd. A (1:1) drehte im 2 dm-Rohr +1,02°, nach 48 Stdn. +0,46°, nach Zusatz eines Tropfens NaOH +0,23° (Enddrehung). Gibt mit wss. NaOH eine Na-Verb., feine Nadeln, unl. in sehr konz. NaOH. Daraus mit methylalkoh. NH_3 bei 95–98° (4 Stdn.) das primäre Amin II, $\text{C}_{12}\text{H}_{21}\text{O}_5\text{N}$, gelblicher Sirup vom Kp. 128–129°. Man darf nicht größere Mengen (mehr als 2–3 g) dest., da sonst NH_3 -Abspaltung u. B. von sekundärem Amin eintritt. $[\alpha]_{578}^{17} = +9,4^\circ$ (A.). In organ. Lösungsmmm. all weniger in W. Gegen Alkalien beständig, wird dagegen schon von verd. Essigsäure in I zurückverwandelt. — Aus den Destillationsrückständen das sekundäre Amin, $\text{C}_{24}\text{H}_{38}\text{O}_{10}\text{N}$, aus A. prismat. Säulen vom F. 160°, $[\alpha]_{578}^{17} = +26^\circ$ ($\text{C}_2\text{H}_5\text{Cl}_4$), unl. in W. u. PAe. fast unl., sonst mehr oder weniger ll. Ebenfalls sehr empfindlich gegen Säuren. Benzoylderiv. von II, $\text{C}_{17}\text{H}_{25}\text{O}_6\text{N}$, aus A. Nadeln vom F. 178°. — L. aus I mit $\text{NH}(\text{CH}_3)_2$ erhaltene Verb. $\text{C}_{11}\text{H}_{25}\text{O}_5\text{N} = \text{C}_{15}\text{H}_{19}\text{O}_5\text{N}(\text{CH}_3)_2$ sd. bei 10/1 mm. Das Destillat erstarrt. F. 76°. $[\alpha]_{578}^{17} = +42,5^\circ$. Wl. in W., sonst schwer ll. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58. 300–303. Karlsruhe, Techn. Hochschule.)


OHLE.

Adolf Lehne und W. Schepmann, Über die Cellulose der Jute. Zur Unters. kamen hellsepiafarbige Faserbündel, die von holzigen Verdickungen befreit wurden. Das Prod. enthielt bei 19° u. 40% Luftfeuchtigkeit 11,42% W. (bei 105° getrocknet), das getrocknete Prod. hatte einen Aschegehalt von 0,73%. Durch Extraktion mit einem Gemisch von gleichen Teilen Bzl. u. A. wurden der lufttrockenen Substanz 1,03% Fette u. Harze entzogen. Wasserlösliche Substanz in der Jute 3,84%. Cellulosegehalt auf getrocknetes, fett-, harz- u. aschefreies Prod. bezogen 78,81% (nach dem Verf. von SCHWALBE u. SIEBER), Ligningehalt (nach WILLSTÄTTER) 20,8%. Die Best. der Furfurol liefernden Bestandteile wurde nach TOLLENS u. BOEDENER ausgeführt. Sie ergab für Rohjute (bei 100° getrocknet) 11,38% Furfurol, für Rohcellulose (bei 100° getrocknet) 8,35% Furfurol, für Reincellulose (bei 10° getrocknet) 2,41% Furfurol. Durch die intensive Cl-Einw. auf die Rohjute wird also ein Teil der Furfurol liefernden Substanzen zerstört, die Hauptmenge bleibt jedoch bei der Cellulose. Die Abtrennung dieser „Furfuroide“ wurde nach dem Verf. von HEUSER u. BOEDEKER mit 17%ig. k. NaOH ausgeführt. Die Hydrolyse der Jute-cellulose wurde nach WILLSTÄTTER u. ZECHMEISTER vorgenommen u. lieferte fast die gleichen Ausbeuten an Glucose wie Baumwollcellulose. Auch die Hydrolysegeschwindigkeit ist für beide Cellulosearten prakt. gleich. Die Rohjute wird dagegen anfangs viel schneller gespalten als die aus ihr isolierte Cellulose.

lose. Die Zeiten gleicher Glucoseausbeute stehen jedoch in dem konstanten Verhältnis 6:10. Bei beiden Stoffen liegt demnach der Hydrolyse dieselbe Gesetzmäßigkeit zugrunde. Daraus ergibt sich, daß in der Jute keine chem. Verb. der Cellulose mit dem Lignin vorliegen kann u. daß sich das Lignin nicht merkbar an der Zuckerbildung beteiligt. Als Ergänzung zu dieser Unters. wurde festgestellt, daß hochprozentige HCl (D. 1,212) Glucose weder in der Kälte, noch bei 90° merklich angreift, n. HCl dagegen bei 90° recht beträchtlich. — Auch bei der Acetylierung nach BARNETT mit SO_2Cl_2 als Katalysator verhält sich die Jute-cellulose wie die Baumwollcellulose. Man erhält fast die gleichen Ausbeuten an Triacetat u. bei dessen Verseifung die gleichen Acetylzahlen. Jedoch erfolgt die Acetylierung bei der Jute-cellulose schwieriger als bei der Baumwollcellulose. — Auch die Ausbeuten an kristallisierte Glucose nach OST u. WILKENING sind fast dieselben wie bei der Baumwollcellulose. Vff. kommen somit zu dem Schluß, daß die Cellulose der Jute mit der Cellulose der Baumwolle ident. ist. (Ztschr. f. angew. Ch. **38**, 93—98. Karlsruhe, Techn. Hochschule.)

Emil Heuser und Wilhelm Schott, Über den Abbau der Cellulose mit Ameisensäure. (Vgl. HEUSER u. EISENRING, Cellulosechemie **4**, 13; C. **1923**, I, 199.) Aus Viscose regenerierte Cellulose wurde im Rohr mit 5% ig. Ameisensäure auf 160 u. 180° erhitzt. Bei $\frac{1}{2}$ std. Erhitzen auf 160° wurden 17%, bei 1 std. Erhitzen 50% Glucose erhalten; bei 180° genügt $\frac{1}{2}$ std. Erhitzen um 50% Glucose zu erhalten. Schnelles Erhitzen erniedrigt die Ausbeute. Oxymethylfurfurol ließ sich ebenfalls nachweisen. Die Rückstände erwiesen sich als Hydrocellulose, die nach den Reaktionsbedingungen in 8% ig. NaOH mehr oder weniger l. war. (Cellulosechemie **6**, 10—11. Beil. zu Papierfabr. **23**. Darmstadt, Techn. Hochschule.)

H. H. Hodgson, Der Mechanismus der Schwefelung des Anilins mit Beobachtungen über die therapeutische Wichtigkeit der Dithioaniline. Verss. des Vfs. ergaben, daß bei der Einw. von Anilin auf o,o'- u. p,p'-Dithioanilin hauptsächlich o,p'-p,p'-Monothioanilin entstehen. Es muß aber mit vollkommen trockenem Anilin gearbeitet werden, Ggw. von W. verzögert die Rk. Eine Zusammenstellung charakterist. Farbrk. der entstehenden Körper wird in Aussicht gestellt. Liegt ein Gemisch von Dithioanilinen vor, so läßt sich eine quantitative Best. darauf gründen, daß die o,o'-Verb. beim Diazotieren in mineral-saurer Lsg. genau die Hälfte der von der Theorie geforderten Menge unl. Phenyl-diazosulfid liefert, während die p,p'-Verb. sich diazotieren u. mit β -Naphthol zu einem unl. Azofarbstoff kuppeln läßt. Beim Wiederholen des Vers. von A. W. HOFMANN, o,o'-Dithioanilin in Anilins-lsg. mit PbO zu erhitzen, wurde die B. von o,o'-Monothioanilin bestätigt, daneben aber auch o,p'-Monothioanilin beobachtet. Die Rk. von MERZ u. WEITH (Ber. Dtsch. Chem. Ges. **4**, 384) mit PbO verläuft so, daß zunächst sich p,p'-Dithioanilin neben o,o'-Dithioanilin bildet. PbO entzieht beiden Körpern 1 Atom S unter Bildung der entsprechenden Monothioaniline. Auch überschüssiges Anilin entschweifelt, aus dem p,p'-Dithioanilin bildet sich p,p'-Monothioanilin, aus dem o,o'-Dithioanilin entsteht o,p'-Monothioanilin. Die Schwefelung des Anilins beginnt bei 170—180°, konnte noch nicht mit Bestimmtheit festgelegt werden, wann p-Substitution beginnt. Ein Überschuß an Anilin erhöhte die Ausbeute an Monothioanilinen aus den zunächst gebildeten Dithioverb., noch größerer Überschuß an Anilin führte zu vorwiegend kommener Umwandlung in Monothio-basen. Bei S-Überschuß konnte ein in verd.




saure Lsg. des Harzes geht beim Stehen in einen Körper über, der wahrscheinlich

HCl l. Harz erhalten werden welches wahrscheinlich einen Körper der nebensteh. Zus. enthält. Durch Red. mit Zn u. HCl entsteht aus ihm p,p'-Dithioanilin. Die salz-

entsprechende Monothioverb. ist. Das o,o'-Dithioanilin ist von Mc DONAGH als Farbstoff in der Medizin verwendet worden. (Journ. Soc. Dyers Colourists **40**. 330—36. 1944. Huddersfield.) SÜVERN.

John Smeath Thomas und **Richard William Riding**, *Untersuchungen über organischen Polysulfide*. Teil III. *Die Einwirkung der Disulfide der Alkalimetalle auf Natriumtetrasulfid auf einige organische Halogenverbindungen*. (II. vgl. THOMAS u. RIDING, S. 1062.) Mit Alkalidisulfiden bilden die Halogenalkyle in absol. Alkalidisulfid von den in der Literatur angegebenen Eigenschaften. Deren Löslichkeit zu Mercaptanen, aus denen sie auch durch Oxydation entstehen, sowie die Tatsache, daß nie Thioester beobachtet wurden, führen zur Annahme einer Konst. R·S·S·R. Auch die *Alkalidisulfide* müssen dann im Gegensatz zu HOLMBERG (LIEBIGS Ann. **359**. 81 [1908]) u. anderen obige Struktur besitzen. Einige neue Additionsverb. der Dialkyldisulfide wurden gewonnen. — Bei der Einw. von Na_2S_4 auf Halogenalkyl wurden nur Disulfide u. Pentasulfide gefunden. D wahrscheinlich primär entstehenden Tetrasulfide dürften instabil sein:



In der Tat überwiegt im Reaktionsprod. das Pentasulfid. — Versetzt man eine w. Lsg. von NaHS mit so viel S, wie für Na_2S_2 nötig, so reagiert die Fl., die nach THOMAS u. RULE (Journ. Chem. Soc. London **111**. 1063; C. **1918**. II. 177) Na_2S_4 u. Na_2S_4 enthält, mit Allyljodid unter B. von *Diallylpentasulfidtetrajodid*, $\text{C}_{10}\text{H}_8\text{J}_4\text{S}_5$ neben sehr wenig Disulfid.

Experimentelles. Das Prod. aus $\text{C}_2\text{H}_5\text{J}$ u. Na_2S_4 wurde bei 75° im Vakuum fraktioniert, Destillat $(\text{C}_2\text{H}_5)_2\text{S}_2$, Kp. 151°, Rückstand $(\text{C}_2\text{H}_5)_2\text{S}_5$, das oberhalb 70° Sbscheidet; oberhalb 155° dest. $(\text{C}_2\text{H}_5)_2\text{S}_2$ über. Bei der Einw. nitroser Gase (best. nach CARIUS) entstehen S, Essigsäure u. Thioessigsäure. — Aus Propyljod u. Na_2S_4 nach 4tägigem Stehen im Vakuum bei 80° Destillat *Dipropyldisulfid*, Rückstand Dipropylpentasulfid $(\text{C}_3\text{H}_7)_2\text{S}_5$, D.₁₅ 1,183. — Aus Allyljodid u. Na_2S_4 nach Erhitzen auf 65° im Vakuum über P_2O_5 Destillat *Diallyldisulfid*, $(\text{C}_3\text{H}_5)_2\text{S}_2$, Rückstand *Diallylpentasulfid*, $(\text{C}_3\text{H}_5)_2\text{S}_5$, identifiziert durch Überführung in das Tetrajodid. — Aus Benzylchlorid u. Na_2S_4 nach Ausschütteln mit A. u. zweitägigem Stehen über P_2O_5 im Vakuum *Dibenzylpentasulfid*, $\text{C}_{14}\text{H}_{14}\text{S}_5$. Die Einw. des Na_2S_4 auf die Halogenverb. dauerte 4 Tage bis 2 Monate. — $(\text{C}_2\text{H}_5)_2\text{S}_2$ aus $\text{C}_2\text{H}_5\text{J}$ u. Na_2S_2 (2 Monate). Ausbeute nach Dest. 79%. Die Verb. $(\text{C}_2\text{H}_5)_2\text{S}_2$, AgNO_3 von PCE u. TWISS (Journ. Chem. Soc. London **91**. 2121 [1907]) konnte nicht frei von AS gewonnen werden. Verb. mit Allyljodid, $(\text{C}_2\text{H}_5)_2\text{S}_2$, $\text{C}_3\text{H}_5\text{J}$, HgJ_2 , gelbe Kristalle aus Aceton, F. 94,6° unter Zers. — Diallyldisulfid aus $\text{C}_3\text{H}_5\text{J}$ u. Li_2S_2 (5 Tage) oder Na_2S_2 (3 Wochen), Ausbeute 66—75%, Kp.₁₆ 76—82°. Gibt mit AgNO_3 in A. ein Verb., wohl $(\text{C}_3\text{H}_5)_2\text{S}_2 \cdot \text{AgNO}_3$ in gelben Nadeln, die sich leicht unter B. von AS zers. Mit alkoh. HgCl_2 auf Zusatz von W. $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_2\text{Cl}_2\text{S}_2\text{Hg}_2$, das sich langsam zers. unter B. von HgCl_2 . (Journ. Chem. Soc. London **125**. 2460—68. 1924. Kapstadt u. Liverpool, Univv.) HERTER.

Alfred Schaarschmidt und **Max Raeck**, *Kondensationsreaktionen mit Nitrosylchlorid*. Bei gewöhnlicher Temp. bildet sich bei der Einw. von NOCl auf Bzl. in w. Lsg. von AlCl_3 eine Additionsverb. aus AlCl_3 u. NOCl; die Friedel-Craftssche Rk wird also infolge der Addition des Agens an den Katalysator verhindert. Es bilden sich nur geringe Mengen *Nitrobenzol*. Eine wesentliche Rk. tritt erst bei Erwärmung ein; es entwickelt sich HCl; aus den Zersetzungsprodd. läßt sich *p*-minodiphenyl neben harzartigen Kondensationsprodd. isolieren, jedoch kein Nitrobenzol. Mit der Menge des angewandten AlCl_3 steigt die Ausbeute an Kondensationsprodd. u. mit der Temp. die Menge der amorphen Nebenprodd. Der Reaktionsverlauf ist wahrscheinlich der, daß das beim Erwärmen doch in Rk. tretende NOCl mit AlCl_3 u. Bzl. einen ähnlichen Komplex $(2\text{AlCl}_3, 3\text{C}_6\text{H}_6, 3\text{NOCl})$

wie N_2O_4 mit Bzl. in Ggw. von $AlCl_3$ (vgl. S. 362) bildet, dieser als sehr beständig HCl abspaltet u. das entstehende Nitrosobenzol von neuem mit Bzl $AlCl_3$ unter B. der angeführten Reaktionsprodd. reagieren wird. Daneben entsteht noch geringe Mengen von pyridinartig riechenden Basen. — Auch mit *Toluol* die Nitrosierung nicht zu erzielen.

Versuche: Aus 240 g *Bzl.*, 270 g $AlCl_3$ u. 65 g $NOCl$ wurden erhalten: *Bzl.*, 120 g eines braunschwarzen Prod., 60 g einer hellbraunen salzsauren Verb. 2 g Nitrobenzol, 0,2 g saure Verb. u. ca. 0,1 g pyridinähnlich riechende Verb. Die 60 g der salzsauren Verb. ergaben 55 g *p*-Aminodiphenylchlorhydrat, $C_{12}H_{12}N$ das entsprechende Phenol hat F. 161—162°; die *Acetylverb.* der freien Base F. 1 Die 0,2 g saure Verb. ergaben sich als Gemisch von *o*- u. *p*-Aminophenol. (Dtsch. Chem. Ges. 58. 348—52. Berlin, Techn. Hochsch.) ZANDEL

W. Dilthey und W. Radmacher, *Isomeriefälle bei Chalkonen*. Bei der Acylierung von 3-Aminochalkon nach der Vorschrift von KAUFMANN u. BURCKHARDT (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 46. 3812. [1913]) wurde ein 3-Acetylaminochalkon, $C_{17}H_{15}O$ F. 104° (I) (vgl. RUPE u. PORAI-KOSCHITZ, Ztschr. f. Farbenindustrie 5. 3 C. 1906. II. 1761) erhalten; Acetylierung des Aminochalkons mittels Acetanhydrid führte zu einer isomeren Verb. (II), farblose Nadeln, F. 119—120°, ident. mit der von KAUFMANN u. BURCKHARDT (l. c.) beschriebenen Deriv. Vers., II in I durch Erhitzen überzuführen, gaben kein eindeutiges Resultat, es trat geringe Erniedrigung des F. ein. Bei mehrwöchigem Liegen von II im verkorkten Röhrchen hatte sich die Verb. den F. von I, der durch mehrfaches Umschmelzen wieder in den von II überging. — Bei der Darst. von 2-Oxy-4'-methoxychalkon, $C_{16}H_{14}O_2$, wurde in einer Falle außer den von ZWAYER u. v. KOSTANECKI (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 41. 15 [1908]) beschriebenen farblosen Blättchen, F. 147—148° eine isomere Verb. erhalten: gelbe Nadeln, F. 134—135°, die in h. Bzl. viel leichter l. waren als die Blättchen (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58. 361—62.) HABERLAND

N. Zelinsky und E. Bjachina, *Ketonisierung der Naphthensäuren mit H₂O* der Katalyse. (Neftjanoe i slancevoe Chozjajstvo 7. 719—29. 1924. — C. 1925 I. 57.) BIKERMAN

Paul Pfeiffer, *Die Halochromie aromatischer Aminoketone*. (Experimentell gearbeitet von O. Angern, P. Backes, W. Fitz, E. Prahl, H. Rheinboldt u. W. Stoll.) Zur Begründung der Auffassung, daß in den Perchloraten der Ketone Oxoniumsalze im Sinne der Formel $R_2C:O \cdot HClO_4$ vorliegen (vgl. LIEBIGS Ann. 412. 253; C. 1917. I. 189), wurden Aminoketone der Chalkon-, Dibenzalacetone- u. Dibenzalcylohexanonreihe auf ihr Verh. gegen Säuren, besonders $HClO_4$, untersucht. — 1. Maximaltypen der Aminoketonsalze. In ihnen ist die Zahl der addierter $HClO_4$ -Moll. gleich der Summe der vorhandenen $NH_2(R_2)$ - u. CO -Gruppen. Die Zahl der Äthylenlücken u. OCH_3 -Gruppen ist wie früher (l. c.) ohne Einfluß. Man muß daraus folgern, daß die Säuremoll. einzeln an jene Gruppen gebunden sind: $(R_2)H_2N \cdots HClO_4$ u. $>C:O \cdot HClO_4$. Die Diperchlorate der Chalkone I. (M. in m), III. u. IV. sind wenig tieffarbig (bis braunorange), da die bathochrome Wrkg. des $NH_2(R_2)$ durch Salzbildung aufgehoben u. das OCH_3 in p zum CO verknüpft ist, kanntlich ohne Einfluß ist. Um so stärker tritt die Wrkg. des OCH_3 in der isomeren Dibenzalacetone- u. Dibenzalcylohexanonreihe (V. bis XIII.) hervor, wo es vom CO durch eine Äthylenlücke getrennt ist; z. B. ist das Diperchlorat von VI. orangebraun, das von VIII. violett-schwarz. In vielen Fällen entsprechen die Farben dieser Grenzperchlorate denen derselben Perchlorate ohne $NH_2(R_2)$. Es kommt sogar vor, daß die Ammoniumsalzgruppe hypsochrom wirkt; so ist das Triperchlorat von IX. fast farblos, das Perchlorat des Dibenzalacetons selbst gelblich. — 2. Niedrigere Typen der Aminoketonsalze. Das Monoperchlorat des p-

ylaminobenzophenons ist farblos. Die Monoperchlorate der Chalkone I., II. u. I (NH₂ in m) sind gelb, fast wie die Ketone selbst, diejenigen der Dibenzalton- u. Dibenzalcylohexanonderiv. jedoch farbig, von V., VII. (NH₂ in m) u. orange bis braun, von VI., X. u. XI. grün; ihnen schließt sich das dunkelrote aoacetat von IX. an. Kaum gefärbt sind wiederum die Diperchlorate von IX. XIII. u. die Dichlorhydrate von XII. Betreffs der Konst. dieser Salze ist zu enken, daß nur die Anlagerung der Säure an CO, nicht aber die an NH₂(R₂) ochrom wirken kann. Diese Farbvertiefung wird aber besonders stark bei den onen vom Typus (p)R₂N·C₆H₄·CH:CH·CO·R hervortreten, noch stärker als bei entsprechnenden p-Methoxyketonen. Wie stark die bathochrome Wrkg. des N₂ tatsächlich ist, erhellt daraus, daß die SnCl₄-Verbb. der Ketone II., IV., VI. u. VIII. undurchsichtig schwarz, diejenigen derselben N(CH₃)₂-freien Ketone hstens orangegebl sind. Aus allem Gesagten kann mit genügender Sicherheit golgert werden, daß die farblosen u. schwach gefärbten Salze Ammonium-, die fbligen Oxoniumsalze sind. Es überwiegt demnach bald die Basizität des N₂(R₂), bald die des CO. In den Lsgg. der niedrigeren Salztypen liegen Gleichgichte zwischen beiden Formen vor, wie aus den Farbverschiebungen bei Ändeungen der Temp. hervorgeht. — Besondere Erwähnung verdient das Monoperchlorat v. IV. Es ist tiefblau u. wasserhaltig, verliert das W. über P₂O₅, ist dann gelb geht an der Luft unter Aufnahme von 1½ H₂O wieder in das blaue Hydrat ür. Dieses wird als Oxonium-, das gelbe Salz als Ammoniumsalz angesehen.

Was schließlich die Formulierung der Salze betrifft, so kann Vf. keinen grundslichen Unterschied zwischen der von ihm bisher angewandten Formel XIV. u. c von HANTZSCH (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 55. 953; C. 1922. I. 1293) aufgestellten rmel XV. mit ionogen gebundenem negativen Rest finden. Unter der Vorauszung, daß das Dissoziationsvermögen bei Anlagerung eines Addenden an den H alten bleibt, vermag XIV. unter Spaltung in R₂CO·H⁺ u. X⁻ die Salznatur nfalls zum Ausdruck zu bringen. Die wahren Bindungsverhältnisse vermag ne von beiden Formeln — u. ebensowenig eine chinoide Formel, die noch ckbar wäre — wiederzugeben, wenn man nämlich berücksichtigt, daß die Salzrstele Ionengitterstruktur haben u. also jedes Ion von einer größeren Anzahl egegengesetzt geladener Ionen umgeben ist.

I (m oder p) H₂N·C₆H₄·CH:CH·CO·C₆H₅ II. (p) (CH₃)₂N·C₆H₄·CH:CH·CO·C₆H₅

III. (m oder p) H₂N·C₆H₄·CH:CH·CO·C₆H₄·OCH₃ (p)

IV. (p) (CH₃)₂N·C₆H₄·CH:CH·CO·C₆H₄·OCH₃ (p)

V. (m oder p) H₂N·C₆H₄·CH:CH·CO·CH:CH·C₆H₅

VI. (p) (CH₃)₂N·C₆H₄·CH:CH·CO·CH:CH·C₆H₅

VII. (m oder p) H₂N·C₆H₄·CH:CH·CO·CH:CH·C₆H₄·OCH₃ (p)

VIII. (p) (CH₃)₂N·C₆H₄·CH:CH·CO·CH:CH·C₆H₄·OCH₃ (p)

IX. (p) (CH₃)₂N·C₆H₄·CH:CH·CO·CH:CH·C₆H₄·N(CH₃)₂ (p)

X. (p) (CH₃)₂N·C₆H₄·CH:CH·CO—C:CH·C₆H₅

XI. (p) (CH₃)₂N·C₆H₄·CH:CH·CO—C:CH·C₆H₄·OCH₃ (p)

XII. (m oder p) H₂N·C₆H₄·CH:CH·CO—C:CH·C₆H₄·NH₂ (m oder p)

XIII. (p) (CH₃)₂N·C₆H₄·CH:CH·CO—C:CH·C₆H₄·N(CH₃)₂ (p)

XIV. R₂C=O·HX XV. [R₂C—OH]X

Versuche. Nitroketone. Darst. aus den Komponenten in A. oder CH₃OH t 10%ig. alkoh. NaOH durch längeres Stehen bei Zimmer- oder Eisschranktemp. —

p-Nitrobenzal-*p*-methoxyacetophenon, $C_{16}H_{13}O_4N$ (vgl. KAUFFMANN, Ber. Dtsch. Chem. Ges. 54. 801; C. 1921. I. 944). Lsg. in geschm. Trichloressigsäure gelb.
p-Nitro-*p'*-methoxydibenzalacetone, $C_{18}H_{15}O_4N$. Aus *p*-Nitrobenzaldehyd u. Anisalacetone. Gelbe Blättchen aus Eg., F. 185—186°, wl. in Ä. Lsg. in H_2SO_4 blutrot, in chl. essigsäure orangerot. — *o*-Nitrocinnamylidenacetophenon, $C_{17}H_{13}O_3N$.
o-Nitrozimtaldehyd u. Acetophenon. Mkr. hellgelbe Nadeln aus Acetanhydrid, F. 142°, wl. in Ä. H_2SO_4 -Lsg. gelborange. — *o*-Nitrocinnamyliden-*p*-methoxyphenon, $C_{18}H_{15}O_4N$. Mit *p*-Acetylanisol. Gelbe Nadeln aus Acetanhydrid, F. bis 128°, wl. in Ä., CS_2 . H_2SO_4 -Lsg. orangerot. — *p*-Nitrocinnamyliden-*p*-methoxyacetophenon, $C_{18}H_{15}O_4N$. Goldgelbe Nadeln aus Eg., F. 163°, mäßig l. in Ä., H_2SO_4 -Lsg. bordeauxrot. — *o*-Nitrocinnamylidenbenzalacetone, $C_{19}H_{15}O_3N$.
o-Nitrozimtaldehyd u. Benzalacetone. Gelbe Prismen aus Acetanhydrid, F. 118—119°, wl. in CH_3OH , Ä. H_2SO_4 -Lsg. orangerot. — *o*-Nitrocinnamyliden-*p*-methoxybenzalacetone, $C_{20}H_{17}O_4N$. Mit Anisalacetone. Tiefgelb, krystallin. aus Acetanhydrid, F. 124—127°, wl. in Ä., CS_2 . H_2SO_4 -Lsg. tiefrotviolett. — *m*-Nitrocinnamylidenbenzalacetone, $C_{19}H_{15}O_3N$. Hellgelbe Nadeln aus Eg., F. 145—146°. H_2SO_4 -Lsg. blutrot. — *p*-Nitrocinnamyliden-*p*-methoxybenzalacetone, $C_{20}H_{17}O_4N$. Ockergelbe Nadeln aus Eg., F. 197—198°, wl. in Ä., CS_2 . H_2SO_4 -Lsg. tiefrotviolett. — *m*-nitrobenzalcylohexanon, $C_{20}H_{16}O_5N_2$. Aus Cyclohexanon u. *m*-Nitrobenzaldehyd. Hellgelbe Blättchen aus Eg., F. 194°, ll. in Ä., Bzl., Eg. — *Di-p*-nitrobenzalcylohexanon, $C_{20}H_{16}O_5N_2$. Dunkelgelbe Blättchen aus Bzl., F. 207°, wl. in Ä.

Aminoketone u. Derivv. Die Maximaltypen der Perchlorate werden durch Lösen der Aminoketone in überschüssiger w. wss. 70%ig. $HClO_4$ u. Krystallisieren lassen gewonnen, für die niedrigeren Typen wechselt die Methodik. Die Perchlorate besitzen die allgemeinen Formeln: $RR'CO$, $HClO_4$ bzw. $2HClO_4$ bzw. $3HClO_4$. — *p*-Dimethylaminobenzophenon, $C_{15}H_{15}ON$. Monoperchlorat. Mit 70%ig. $HClO_4$ in oder ohne Eg. Farblose glimmerartige Blättchen. — *m*-Aminobenzophenon, $C_{15}H_{13}ON$ (I). Aus der NO_2 -Verb. mit $SnCl_2$ in mit HCl gesätt. Eg. F. 159—160°. — Monoperchlorat. Mit 70%ig. $HClO_4$ in Eg. Gelbliche Nadeln, luftbeständig. — Diperchlorat. Orangegelbe Rhomboeder, die sehr leicht HCl abgeben u. nicht unzersetzt analysiert werden konnten. — *p*-Benzoylaminobenzalacetone, $C_{14}H_{11}O_2N$. Aus *p*-Aminobenzaldehyd, dargestellt nach FRIEDLÄNDER u. LITKE (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 45. 2087 [1912]). Aus W., F. 146°. — *p*-Benzoylaminobenzalacetophenon, $C_{22}H_{17}O_2N$. Aus dem vorigen u. Acetophenon in Ä. mit 30%ig. $NaOH$. Gelbliche Blättchen aus Ä., F. 177—178°. — *p*-Aminobenzalacetophenon, $C_{15}H_{13}ON$ (I). Aus dem vorigen mit 10%ig. H_2SO_4 in sd. Eg. Nach Umfällen mit HCl mit NH_3 F. 147—148°. — Monoperchlorat. Mit 50%ig. $HClO_4$ in Eg. Braune Nadeln. — Ein reines Diperchlorat konnte nicht erhalten werden. — Chlorhydride, $C_{15}H_{13}ON$, HCl . Mit h. 10%ig. HCl . Gelbbraune Blättchen mit einem Stich ins Rötliche. Ident. mit dem „fleischfarbenen“ Salz von RUPE u. PORAI-KOSCHOWITZ (Ztschr. f. Farbenindustrie 5. 317 [1906]), deren rote Form nicht erhalten werden konnte. — *p*-Dimethylaminobenzalacetophenon, $C_{17}H_{17}ON$ (II). Monoperchlorat. Mit w. 70%ig. $HClO_4$. Grünstichig gelbe Blättchen, heller als das freie Keton. In farblosen glimmerartigen Blättchen entsteht es in Eg.-Lsg. — Chlorhydride, $C_{17}H_{17}ON$, HCl . Aus gleichen Vol. konz. HCl u. W. hellgelbe, aus starker HCl farblose Nadeln, die im Exsiccator hellgelb werden, aus konz. HCl hellblaue Blättchen (nicht analysiert). — $SnCl_4$ -Verb., $C_{17}H_{17}ON$, $SnCl_4$. Darst. in wasserfreier Bzl. bei Zimmertemp. Schwarzes Pulver, sehr empfindlich gegen Feuchtigkeit. — *m*-Acetaminobenzal-*p*-methoxyacetophenon, $C_{18}H_{17}O_3N$. Aus *m*-Acetaminobenzaldehyd u. *p*-Methoxyacetophenon, F. 84° u. *p*-Acetylanisol in Ä. mit 15%ig. $NaOH$. Krystalle aus Ä., F. 144—145°, fast unl. in Ä. — *m*-Aminobenzal-*p*-methoxyacetophenon, $C_{16}H_{15}O_3N$ (E). Aus dem vorigen mit 10%ig. H_2SO_4 in sd. Eg. Intensiv gelbe Büschel aus Bzl.,


141°, fast unl. in Ä., Lg. — *Monoperchlorat*. Mit 70%ig. HClO_4 in Eg. Hellgelbe Stäbchen, luftbeständig. — *Diperchlorat*. Orangefarbene Nadelchen, die sich an der Luft verfärben. — *p-Aminobenzal-p-methoxyacetophenon*, $\text{C}_{16}\text{H}_{15}\text{O}_2\text{N}$ (III.). Zersetzt sich beim NO_2 -Verb. wie oben. Bräunlichgelbe Blättchen aus Toluol, F. 173—174°, zerfällt l. — *Benzoylverb.*, $\text{C}_{23}\text{H}_{19}\text{O}_3\text{N}$. Blättchen aus A., F. 199—201°. — *Diperchlorat*. Braunorangefarbene Krystalle. — *p-Dimethylaminobenzal-p-methoxyacetophenon*, $(\text{H}_{19}\text{O}_2\text{N})$ (IV.). Aus *p*-Dimethylaminobenzaldehyd u. *p*-Acetylanisol in A. mit 5%ig. NaOH. Citronengelbe Blättchen aus A., F. 127°. — *Monoperchlorat*. Mit 7%ig. HClO_4 u. wenig W. (Eigenschaften vgl. theoret. Teil.) — *Diperchlorat*. (Angegelbe Kryställchen. — *SnCl₄-Verb.*, $\text{C}_{18}\text{H}_{19}\text{O}_2\text{N}$, SnCl_4 . Fast schwarzes Pulver, zersetzt sich an der Luft.

m-Aminodibenzalacetone, $\text{C}_{17}\text{H}_{15}\text{ON}$ (V.). Aus der NO_2 -Verb. wie oben. Ausfließen mit Na-Acetat u. Extrahieren des trockenen Prod. mit Bzl. Gelbe tetraedrische Krystalle, F. 138—139° (nicht 111° nach KAUFFMANN u. BURCKHARDT, Ber. Dtsch. Chem. Ges. 46. 3808; C. 1914. I. 254). — *Monoperchlorat*. Mit 35%ig. HClO_4 in A. Orangegelbe Kryställchen, ziemlich luftbeständig. — *Diperchlorat*. Mkr. ockergelbe Krystalle, die sich an der Luft verfärben. — *p-Dimethylaminodibenzalacetone*, (H_{19}ON) (VI.). Aus *p*-Dimethylaminobenzalacetone u. Benzaldehyd in A. mit 10%ig. NaOH. Ziegelrote Nadeln aus A., braungelbe Krystalle aus Bzl., F. 155°. Lsg. in A. blutrot. — *Monoperchlorat*. Mit 50%ig. HClO_4 in Eg. Dunkelgrüne Nadeln, luftbeständig. — *Diperchlorat*. Orangebraune Nadeln. Geht an der Luft in das *Monoperchlorat* über. — *SnCl₄-Verb.*, $\text{C}_{19}\text{H}_{19}\text{ON}$, SnCl_4 , C_6H_6 . Fast schwarzes Pulver, zersetzt sich an der Luft. — *m-Aminobenzalanisalacetone*, $\text{C}_{18}\text{H}_{17}\text{O}_2\text{N}$ (VII.). *Monoperchlorat*. Mit 10%ig. oder 70%ig. HClO_4 u. wenig W. Rotbraune Stäbchen, luftbeständig. — *Diperchlorat*. Bordeauxrote Krystalle. — *p-Aminobenzalanisalacetone*, $(\text{H}_{17}\text{O}_2\text{N})$ (VII.). Aus der NO_2 -Verb. wie oben. Aus verd. CH_3OH , F. 158—160°, zerfällt l. — *Diperchlorat*. Fast schwarze, blauschillernde Nadeln. — *p-Dimethylaminobenzalanisalacetone*, $\text{C}_{20}\text{H}_{21}\text{O}_2\text{N}$ (VIII.). Aus Anisalacetone u. *p*-Dimethylaminobenzaldehyd in CH_3OH oder aus *p*-Dimethylaminobenzalacetone u. Anisaldehyd in A. mit 10%ig. NaOH. Braunorangefarbene Blättchen oder Nadelchen aus A., F. 140°. — *Diperchlorat*. Mkr. violett-schwarze Krystalle. — *SnCl₄-Verb.*, $\text{C}_{20}\text{H}_{21}\text{O}_2\text{N}$, SnCl_4 . Schwarzes Pulver, sehr empfindlich gegen Feuchtigkeit. — *p,p'-Tetraamindiaminodibenzalacetone*, $\text{C}_{21}\text{H}_{24}\text{ON}_2$ (IX.). Orangebraune Blättchen, F. 191° (J. SACHS u. LEWIN, Ber. Dtsch. Chem. Ges. 35. 3576 [1902]). — *Triperchlorat*. Gelbe Nadelchen, die an der Luft unter Graufärbung HClO_4 verlieren. Explodiert mit rauchender HNO_3 . — *Diperchlorat*. Mit wenig 70%ig. HClO_4 u. Verd. mit wenig W. Fast farblose, bläulich schimmernde Nadelchen. — *Monoperchlorat*, $\text{C}_{21}\text{H}_{24}\text{ON}_2$, 4HClO_4 . Durch Verreiben des Triperchlorats mit W. oder aus IX. in A. mit 70%ig. HClO_4 . Dunkelbraune Blättchen. Wahrscheinlich eine Molekülverb. von Mono- u. *Diperchlorat*. — *Monoacetat*, $\text{C}_{21}\text{H}_{24}\text{ON}_2$, $\text{C}_2\text{H}_4\text{O}_2$. Aus h. Eg.-Lsg. Dunkelrote Blättchen, die sich beim Erhitzen unter Verlust von $\text{C}_2\text{H}_4\text{O}_2$ orange färben. — *p-Dimethylaminobenzalcylohexanon*, $\text{C}_{15}\text{H}_{19}\text{ON}$. Aus Cyclohexanon u. *p*-Dimethylaminobenzaldehyd in A. mit 10%ig. $\text{C}_2\text{H}_5\text{ONa}$ -Lsg. Hellgelbe Blättchen aus verd. A., F. 127—128°, unl. in Lg. — *p-Dimethylaminodibenzalcylohexanon*, (H_{23}ON) (X.). Ebenso aus dem vorigen u. Benzaldehyd. Hellgelbe Kryställchen aus verd. A., glimmerartige Blättchen aus Lg., F. 137—138°, zwl. in Lg. — *Monoperchlorat*. Mit 70%ig. HClO_4 in verd. A. Grüne Nadeln. Zersetzt sich an der Luft. — *Diperchlorat*. Rotbraune Krystalle, ziemlich luftbeständig (nach der Analyse Gemisch von Mono- u. *Diperchlorat*). — *p-Dimethylaminobenzalanisalcylohexanon*, $\text{C}_{23}\text{H}_{25}\text{O}_2\text{N}$ (XI.). Analog X. mit Anisaldehyd. Tiefgelbe Nadelchen aus verd. A., F. 177—178°, kaum l. in Lg. — *Monoperchlorat*. Mit 70%ig. HClO_4 in sol. A. Tiefgrüne Nadelchen. Zersetzt sich an der Luft. — *Diperchlorat*. Dunkel-

blutrote, stahlblauglänzende Krystalle. Zerfließt an der Luft. — *Di-m-acetambenzalcylohexanon*, $C_{24}H_{24}O_3N_2$. Aus Cyclohexanon u. m-Acetaminobenzaldehyd A. mit 10%ig. NaOH. Hellgelbe Nadeln aus Eg., F. 249°, wl. in A., Bzl. N. glatt verseifbar. — *Di-m-aminobenzalcylohexanon*, $C_{20}H_{20}ON_2$ (XII.). Aus der NO_2 -Verb. wie oben, über das Chlorhydrat. Hellgelbe Blättchen aus Bzl., F. — *Chlorhydrat*, $C_{20}H_{20}ON_2 \cdot 2HCl$. Mit HCl-Gas in A. Hellgelbe Nadelchen, beständig. — *Di-p-acetaminobenzalcylohexanon*, $C_{24}H_{24}O_3N$. Analog mit p-aminobenzaldehyd. Dunkelgelbe Nadelchen aus Eg., F. 296–297°, sonst wie m-Verb. — *Di-p-aminobenzalcylohexanon*, $C_{20}H_{20}ON_2$ (XII.). Aus der Di- NO_2 -V. wie oben. Braune Prismen aus A., F. 240–242°. — *Chlorhydrat*, $C_{20}H_{20}ON_2 \cdot 2HCl$. Hellgelbe Blättchen. — *p,p'-Tetramethyldiaminodibenzalcylohexanon*, $C_{24}H_{28}ON_2$ (XIII.). Darst. analog der Dimethylaminoverb. Orangefarbene Nadeln aus Bzl., F. 248–250°. Meist wl. — *Diperchlorat*. Mit 70%ig. $HClO_4$ in Eg. + wenig W. Hellgelbe Blättchen, luftbeständig. — *Triperchlorat*. Hellgelbe Krystalle. (LIEBIGS Ann. 228–65.)

LINDENBAUM

P. Pfeiffer, H. Rheinboldt und J. Wolf†, *Halochrome Verbindungen. Iminen*. Zur Unters. der Frage, wie weit die Halochromieerscheinungen bei Ketonen u. Iminen einander parallel gehen, wurden die Ketone I. u. die Chinalbasen II. [$X = H, OCH_3, N(CH_3)_2$] miteinander verglichen u. enge Beziehungen festgestellt. Auch die Basen II. bilden farbige Salze mit Säuren ($HClO_4, H_2CdCl_4$ bzw. H_3CdCl_5 u. $C_2H_2O_4$). Den $SnCl_4$ -Verbb. der Ketone entsprechen die der Basen, die auf 1 Mol. Base stets $2CdCl_2$ enthalten. Besonders hervorzuheben ist die tiefe Färbung einiger sich von II. [$X = N(CH_3)_2$] ableitender Verbb., die dem grünen Monoperchlorat u. der schwarzen $SnCl_4$ -Verb. des entsprechenden Ketons (vorst. Ref.) durchaus an die Seite treten. $N(CH_3)_2$ wirkt auch hier stark bathochrom. Die halochromen Verbb. beider Reihen müssen gleichartig konstituiert sein, die Gruppierungen $C:O$ u. $C:N$ sind streng vergleichbar u. bilden halochrome Zentren. — Ferner wurden untersucht: das cycl. Imin III. von KÖNIG (Journ. f. prakt. Ch. 84. 217 [1911]) u. die beiden offenen Imine IV. u. V. von ZINCKE (LIEBIGS Ann. 333. 318 [1904]. 341. 365 [1905]), die, wie ersichtlich, in naher konstitutiver Beziehung zu III. stehen. Zu den bereits bekannten farbigen Salzen dieser Imine wurden einige neue sowie $CdCl_2$ -Verbb. dargestellt. An dieser Stelle liegt typ. Halochromie als Wrkg. einfacher Additionsvorgänge vor; bei IV. u. V. insbesondere ist eine andere Erklärung, etwa chinoide Umlagerung, denkbar. Das Additionszentrum ist stets der Imin-N, während der Aminrest autochrom wirkt, u. zwar darf aus IV. u. V. gefolgert werden, daß Auxochrome nur in Benzolkernen ihre Wrkg. entfalten, sondern immer dann, wenn sie in einem Chromophor durch eine nicht unterbrochene Kette von Äthylenlücken getrennt sind.




Benzalchinaldin (II., $X = H$). F. 96°. — *Chlorhydrat*, $C_{17}H_{13}N, HCl$. In h. HCl 1:1. Hellgelbe Krystalle, F. 112–113°. — *Perchlorat*, $C_{17}H_{13}N, HClO_4$. Mit 70%ig. $HClO_4$ u. wenig sd. Eg. Gelbe Nadelchen. — *Oxalat*, $C_{17}H_{13}N, H_2C_2O_4, H_2O$. Aus möglichst konz. h. Lsg. Citronengelbe Nadelchen, F. 176–177° (Zers.). — *$CdCl_2$ -Verb.*, $C_{17}H_{13}N, 2CdCl_2$. In Eg. Kanariengelber Nd. — *Chlorcadmoat*, $2C_{17}H_{13}N, H_2CdCl_4$. In sd. HCl. Schwefelgelbe Nadelchen. — An

chinaldin (II., $X = OCH_3$). — Oxalat, $C_{18}H_{15}ON, C_2H_2O_4$. Mkr. orangegelbe Blättchen mit ca. $1\frac{1}{2}H_2O$. — $CdCl_2$ -Verb., $C_{18}H_{15}ON, 2CdCl_2$. Gelbe Flocken. — Chlorcadmoat, $3C_{18}H_{15}ON, H_3CdCl_5$. Orangegelbe Krystalle. — p-Dimethylamino-chinaldin (II., $X = N(CH_3)_2$). F. 179° . Fluoresciert in Bzl. grünlich-gelb. — Dichlorhydrat, $C_{19}H_{18}N_2, 2HCl$. Mit HCl-Gas in Bzl. Hellgelber Nd. — Monoperchlorat, $C_{19}H_{18}N_2, 2HClO_4$. Hellgelbe Krystalle. — Monoperchlorat, $C_{19}H_{18}N_2, 2C_2H_2O_4$. Violett-schwarzes Pulver, F. $108-110^\circ$. — $CdCl_2$ -Verb., $C_{19}H_{18}N_2, 2CdCl_2$. Gelartiger Nd., trocken fast schwarze, kantharidengrün glänzende Blättchen. — Chlorcadmoate. 1. $C_{19}H_{18}N_2, H_2CdCl_4$. Silbergraue Blättchen bis 2. $2C_{19}H_{18}N_2, H_2CdCl_4$. Dunkle, grün glänzende Blättchen. — α -Methyl- β -methylindolidenmethan (III.). Gelbes Pulver, F. $231-235^\circ$. — $CdCl_2$ -Verb., $C_{19}H_{18}N_2, 2CdCl_2$. Hellrostbraunes Pulver. — Chlorzinkat, $5C_{19}H_{18}N_2, 2HCl, 2ZnCl_2$. Mit $ZnCl_2$ in Eg. Blauglänzende Krystalle, zerrieben rotbraun. — Anilinoanilbase IV. Monoperchlorat, $C_{17}H_{16}N_2, HClO_4$. Mit verd. $HClO_4$ u. CH_3OH . Tiefrote, stahlblauglänzende Nadeln aus CH_3OH (+ etwas $HClO_4$). — Chloracetat, $C_{17}H_{16}N_2, CCl_3 \cdot CO_2H, CH_3OH$. Rote, blauglänzende Nadeln aus CH_3OH (+ etwas $CCl_3 \cdot CO_2H$). — Chlorzinkat, $5C_{17}H_{16}N_2, 5HCl, 2ZnCl_2$. Kantharidengrün glänzende Kryställchen, zerrieben rostbraun. — $CdCl_2$ -Verb., $C_{17}H_{16}N_2, 2CdCl_2$. Rostbraunes Pulver. — Äthylaminodinitroanilbase V. Monoperchlorat, $C_{17}H_{16}N_4, HClO_4$. Gelbrot, wird an der Luft dunkler. (LIEBIGS Ann. **441**. 265 u. 276. Bonn, Univ.)

LINDENBAUM.

F. Lorrimer, Einige Derivate des Acenaphthens. Die Rk. von RUBIDGE-QUINON zur Darst. von Acenaphthylphenylphthalid u. Acenaphthyltolylphthalid verwendet werden. Dabei reagierte das Zwischenprod. aus Bzl. leichter mit Acenaphthen als das Zwischenprod. aus diesem mit Bzl. Es wurden ferner folgende Derivv. dargestellt: 4-Acenaphthylphthalid u. o-Carboxyphenyl-4-acenaphthylmethan durch Red. des 4-Acenaphthoylbenzoesäure (1,2); 4-Acenaphthylphenylmethan durch Dest. des Salzes der vorvorigen Verb.; Anhydrid des 4,5-Dicarboxy- α -naphthylphenylphthalids durch Oxydation von 4-Acenaphthylphenylphthalid; o-Carboxyphenyl-4-acenaphthylphenylmethan durch Red. desselben Phthalids; 4-Acenaphthylidiphenylmethan durch Dest. des Ba-Salzes von o-Carboxyphenyl-4-acenaphthylphenylmethan; o-Carboxyphenyltolyl-4-acenaphthylmethan durch Red. von Tolyacenaphthylphthalid. Nähere Angaben fehlen. (Proc. Trans. Roy. Soc. Canada [3] **18**. Sekt. III. 119. 1924.) SP.

Ch. Courtot und P. Petitcolas, Synthesen von 9-Fluorenylaminen. (Vgl. S. 647.) Das Cl-Atom in 9-Chlorfluoren (I) reagiert mit primären Aminen nach Schema A. Die gleichen Verbb. (II) können auch nach Schema B. dargestellt werden. Einwirkung NH_3 auf I gibt neben Difluorenylamin (vgl. CURTIUS u. KOF, Journ. f. prakt. Chem. **86**. 129 [1912]) Dibiphenylenäthen; primäres Amin bildet sich nur in Spuren.




Dargestellt wurden folgende Verbb.: 9-Fluorenylphenylamin aus I + Anilin; bei $50-60^\circ$ hergestellte Lsg. bleibt einige Stdn. bei gewöhnlicher Temp. stehen; aus h. A. Nadeln, F. 121° . — 9-Fluorenyl-p-tolylamin, Nadeln, F. 124° . — 9-Fluorenylnitrophenylamin, Darst. bei $140-145^\circ$; aus A. gelbe Nadeln, F. 225° . — 9-Fluorenyl-

α -naphthylamin, aus A. rötliche Nadeln, F. 172°. — 2-Aminofluorenyl-9-phenylan das nach Schema B durch Kondensation von 2-Nitrofluoren + Anilin erhaltene Nitroketimid geht durch Red. in genannte Verb. über; schwach gelbliche Nadeln, F. 151—152°. Rk. zwischen 2-Amino-9-chlorfluoren (entsprechend Schema A) und Anilin bisher nicht die Verb. gegeben. (C. r. d. l'Acad. des sciences 180. 297—99.)


Alfred Eckert, Über Oxydation im Lichte. In Eisessigsig. von 2-Methylanthrachinon erfolgt durch Bestrahlung Autoxydation; es bilden sich Anthrachinon-2-carbonsäure u. α,β -2,2'-Dianthrachinonyläthan. In ähnlicher Weise, wenn auch viel schwächer, reagieren auch andere Derivv. des 1- u. 2-Methylanthrachinon. Letzteres bleibt in Toluol als Lösungsm. vollständig unverändert, während sich in diesem Falle das Toluol als autoxydabel erweist, indem es in Benzoesäure übergeht. In demselben Sinne verläuft die Rk. mit dem unsubstituierten Anthrachinon. Neben Benzoesäure bilden sich noch andere Oxydationsprodd. des Toluols. Eine große Anzahl anderer Verbb. erwiesen sich ebenfalls in Ggw. von Anthrachinon als autoxydabel; Xylole ergeben Methylbenzoesäuren. Besonders rasch reagiert auch Hydrochinon unter B. von schwarzem Chinhydron. Von anorgan. Substanz wurde eine alkal. Pb-Lsg. zu PbO₂, alkal. Cr-Lsg. zu Chromsäure, 3-wertiges As zu 5-wertigem, 3-wertiges Sb zu 5-wertigem, HCl zu Cl oxydiert.

Versuche. 5 g Anthrachinon in 100 g Toluol wurden mehrere Monate lang der Einw. des Sonnenlichtes ausgesetzt; täglich wurde 1—2-mal zum Sieden erhitzt. Aus dem Reaktionsprod. wurden isoliert: Benzaldehyd, Dibenzyl, Benzoesäure (33 g), die fast vollständige Menge des angewandten Anthrachinons, Hydrobenzoin (F. 138°) (10 g) u. i-Hydrobenzoin (F. 121°), außerdem noch eine geringe Menge gelber Nadeln (F. 88—93°), die mit Benzil ident. sein können. Die Wrgk. des Anthrachinons besteht wahrscheinlich darin, daß es zunächst zu Anthrahydrochinon (dessen Anwesenheit im Reaktionsgemisch nachgewiesen werden kann) übergeht, dann durch Luftsauerstoff wieder oxydiert wird. — Belichtet man Toluol in Ggw. von Acetanhydrid u. Anthrachinon, so kann man Benzylacetat isolieren; daneben bilden sich auch hier reichliche Mengen Benzoesäure. — Die neben Benzoesäure gebildeten Oxydationsprodd. des Toluols ließen sich ebenfalls in Eisessigsig. in Ggw. von Anthrachinon bis zur Benzoesäure oxydieren; es wurden so oxydiert Dibenzyl, Hydrobenzoin, Benzil u. Benzoin. Vergleichsverss. mit Phenanthrenchinon (vgl. BENRATH u. MEYER, Ber. Dtsch. Chem. Ges. 45. 2707; C. 1912. II. 145) ergaben, daß dieses viel langsamer wirkt als Anthrachinon. Eine Reihe anderer Chinone u. ähnlich konstituierter Stoffe ergaben ebenfalls geringere Ausbeuten als Anthrachinon; untersucht wurden noch Benzochinon, Naphthochinon, Xanthochinon u. Benzophenon. — Die Nitrotoluole bilden mit Anthrachinon nur wenige saure Substanzen, o-Nitrotoluol ergab eine bei 140° schmelzende Säure von süßem Geschmack (o-Nitrobenzoesäure hat F. 147°). — m- u. p-Xylol ergaben bei der Oxydation m- u. p-Toluylsäure. — Naphthalin wurde nicht oxydiert, Hydrochinon in wenigen Stdn. zu Chinhydron. — Pb(NO₃)₂ in alkal. Lsg. wurde durch anthrachinon- α -sulfonsaures K zu PbO₂ oxydiert, Cr₂(SO₄)₃ in alkal. Lsg. zu Chromsäure. SbCl₃ u. As₂O₃ wurden in HCl-Lsg. durch anthrachinon- α -sulfonsaures K zu fünfwertigen Sb bzw. As oxydiert. — Aus anthrachinon- β -sulfonsaurem Na entstand schon nach kurzem Belichten in HCl-Lsg. 2-Chloranthrachinon (F. 209°); durch das nachweisbar zuerst gebildete Cl ist demnach die Sulfonsäuregruppe abgespalten worden. Ähnlich verhält sich die Anthrachinon- α -sulfonsäure, unter Entw. von Cl bildet sich eine chlorhaltige Verb. (F. 160°). — 2-Methylanthrachinon wurde mehrere Monate in Eisessigsig. belichtet; neben Anthrachinon-2-carbonsäure (F. 284°) wurde Dianthrachinonyläthan C₃₀H₁₈O₄ erhalten, schwach gelbliche Blättchen, F. 342°, die durch Oxydation in Anthrachinon-2-carbonsäure übergeführt werden. — 5,8-Dichlor-2-methylanthrachinon u. 5,6,7,8-Tetrachlor-2-methylanthrachinon sind viel beständig



223°) u. *Dichloranthrachinonyläthan* von vorstehender Formulierung, weiße Blättchen aus Nitrobenzol, F. 290—300° (Zers.). (Ber. Dtsch. Chem. Ges. **58**. 313 320. Tetschen-Liebwerd., Prager Deutsch. Techn. Hochsch.) ZANDER.

R. C. Goodwin und **J. R. Bailey**, *Die Reduktion von Phenylhydrazonen*. Durch katalyt. Hydrierung lassen sich *Acetonphenylhydrazon* in *Phenylhydrazopropyl* (I) u. *Ketohexamethylenphenylhydrazon* in das entsprechende *Phenylhydrazocyclohexyl* überführen. Das von WALKER (Journ. Chem. Soc. London **69**. 1282 [96]) beschriebene angebliche Methylenphenylhydrazon war analog nicht reduzierbar. I läßt sich leicht oxydieren zu *Phenylazo-i-propyl* (II). Der Wasserstoff der *i*-Propylgruppe benachbarten NH-Gruppe in I ist sehr reaktionsfähig, er reagiert mit Cyansäure, Säurechloriden, Senfölen u. *i*-Cyanaten. Mit ersterer bildet I *2-i-Propyl-1-phenylsemicarbazid* (III); das III isomere Prod. IV wird erhalten durch Hydrieren von *Aceton-2-phenylsemicarbazon*. Mit Benzoylchlorid bildet I das Benzoylderiv. V, dessen Konst. dadurch sichergestellt ist, daß durch Einw. von HCNO *1-Propyl-2-phenyl-1-benzoylsemicarbazid* (VI) gebildet wird, eine Verb., die auch durch Benzoylieren von IV erhalten wird. Die beiden Semicarbazide III u. IV gehen durch Oxydation über in II, nebenbei entstehen noch nicht identifizierte Verbb. Durch Erhitzen von III entsteht als einziges Prod. *1-i-Propyl-2-phenylurazol* (II), Erhitzen von III in Ggw. von Harnstoff vermehrt die Ausbeute. VII bildet sich auch unter denselben Bedingungen aus IV. Aus *1-i-Propylsemicarbazid* wurde *1-Propylurazol* erhalten; wahrscheinlich lassen sich alle Semicarbazide, die ein amino-H-Atom enthalten, leicht in die entsprechenden Urazole überführen.



Versuche. *Phenylhydrazo-i-propyl*, $\text{C}_9\text{H}_{14}\text{N}_2$ (I); die Hydrierung von *Acetonphenylhydrazon* wird in alkoh.-salzsaurer Lsg. bei $3\frac{1}{2}$ at Überdruck (Pt-Katalysator) durchgeführt; Kp.₂₅ 162°, D. 0,9720, $n^{20}_D = 1,5463$; die farblose Fl. wird beim Stehen & Luft rasch gelb; ll. in organ. Mitteln, unl. in W.; wird durch Fehlingsche Lsg., ammoniakal. Ag-Lsg. u. Oxydationsmittel leicht oxydiert; Red. mit sd. Eg. u. Zn führt zu Anilin u. *i*-Propylamin; Chlorhydrat, $\text{C}_9\text{H}_{15}\text{N}_2\text{Cl}$, aus A. Prismen, F. 202°, ln A., wl. in W.; Oxalat, $\text{C}_{11}\text{H}_{16}\text{O}_4\text{N}_2$, aus Ä. Blättchen, F. 189°, l. in A. u. Aceton, v. in W. — *Phenylazo-i-propyl*, $\text{C}_9\text{H}_{12}\text{N}_2$ (II), aus dem Chlorhydrat von I in HCl durch Zugabe von 10%ig. NaNO_2 -Lsg. bis freie HNO_2 nachweisbar; II wird der braunen Lsg. durch Ä. entzogen; rötlich-gelbe Fl. von äth. Geruch, ll. in organ. Mitteln, unl. in W.; Kp.₂₈ 110°, D. 0,9443, $n^{20}_D = 1,5249$; läßt sich in alkoh.-wss. Lsg. mittels Na- oder Al-Amalgam leicht zu I reduzieren. — *1,5-Di-i-propyl-2,4-di-phenyl-1,2,4,5-tetrazin* oder s. *1,4-Di-i-propyl-2,5-diphenyl-1,2,4,5-tetrazin*, $\text{C}_{20}\text{H}_{28}\text{N}_4$, als I in W. suspendiert durch Schütteln mit 40%ig. Formaldehyd; das sich abscheidende Öl krystallisiert bei längerem Stehen mit A. in Nadeln; aus Aceton 1163°, unl. in W., wl. in A. — *Benzoylphenylhydrazo-i-propyl*, $\text{C}_{16}\text{H}_{18}\text{ON}_2$ (V), aus Tafeln, F. 113,5°, ll. in organ. Mitteln außer Ä. u. PAe. — *Dibenzoylphenylhydrazo-i-propyl*, $\text{C}_{22}\text{H}_{22}\text{O}_2\text{N}_2$, aus A. Stäbchen, F. 140°, ll. in Aceton u. A., l. in Ä. u.

Essigester, wl. in W. — *2-i-Propyl-1,4-diphenylsemicarbazid*, $C_{16}H_{19}ON_3 = C_6H_5NH(C_3H_7)CONH \cdot C_6H_5$, aus **I** + C_6H_5NCO in A.; aus A. Prismen, F. 146° , ll. in A. Aceton, unl. in W. — *2-i-Propyl-1,4-diphenylthiosemicarbazid*, $C_{16}H_{19}N_3S$, aus C_6H_5N analog voriger; aus A. Prismen mit kuppelförmigen Endflächen, F. 153° , unl. in — *2-i-Propyl-1-phenylsemicarbazid*, $C_{10}H_{15}ON_3$ (**III**), aus **I** in Eg. + $KNCO$ bei Ausfällen durch W.; aus W. in aus langen Nadeln bestehenden Scheiben krystallisierend, F. 119° ; ll. in üblichen Mitteln außer PAe.; l. in konz. HCl , hieraus l. Verdünnen wieder ausfällbar. — *1-Nitroso-2-i-propyl-1-phenylsemicarbazid*, $C_{10}H_{14}O_2$ aus voriger in verd. HCl + 10%ig. $NaNO_2$ -Lsg.; aus Aceton F. 156° , l. in org Mitteln außer PAe. — *1-i-Propyl-2-phenylsemicarbazid*, $C_{10}H_{15}ON_3$ (**IV**), aus A. o W. halbmondförmige rhomb. Tafeln, F. 209° , ist leichter l. als **III** u. löst sich wss. $FeCl_3$ u. verd. Mineralsäuren; Oxydation bei gewöhnlicher Temp. mit w $KMnO_4$ -Lsg. führt zu **II**; Oxydation in sd. Aceton + $KMnO_4$ führt zu weiß Krystallen. — *2-i-Propyl-1-phenyl-1-benzoylsemicarbazid*, $C_{17}H_{19}O_2N_3$, aus **III** durch Benzoylieren in sd. Bzl.; aus A. Prismen, F. 162° , ll. in A., Bzl., Essigester, wl. W. — *1-i-Propyl-2-phenyl-1-benzoylsemicarbazid*, $C_{17}H_{19}O_2N_3$ (**VI**), aus A. Stäbchen, F. 181° , weniger l. in allen Mitteln als vorige. — *1-i-Propyl-2-phenylurazol*, $C_{11}H_{13}O_2$ (**VII**), aus beiden vorigen durch Erhitzen mit Harnstoff auf $200-240^\circ$, Lösen in Schmelze in NH_4OH , Ausfällen mit HCl ; aus h. W. Stäbchen, F. 165° , l. in org Mitteln außer PAe. — *1-i-Propylurazol*, $C_5H_9O_2N_3$, aus W. Tafeln, F. 190° , ll. in u. A., wl. in Essigester, swl. in anderen Mitteln. — *Phenylhydrazocyclohexan*, $C_{12}H_{18}N_2$ (**I**, statt $CH(CH_3)_2 : C_6H_{11}$), ölig, $Kp_{100} 226^\circ$, Löslichkeit wie **I**, wird gleichfalls leicht zur entsprechenden Azoverb. oxydiert. (Journ. Americ. Chem. Soc. **47**, 167—74. Austin [Texas], Univ.)

HABERLAND

C. M. Jephcott, Die Reaktion von Chinolinsäureanhydrid auf aromatische Kohlenwasserstoffe und Aluminiumchlorid. Die B. von β -Benzoylpicolinsäure Chinolinsäureanhydrid, Bzl. u. $AlCl_3$ (vgl. JUST, Monatshefte f. Chemie **18**, 44; C. **97**. II. 763) wird bestätigt. Sie erfolgt auch in Ggw. von Essigsäureanhydrid, ohne daß B. des Lactons des α -Carboxy- β -pyridyldiphenylcarbinols oder die Rk. nach RUBIDGE u. QUA (Journ. Americ. Chem. Soc. **36**, 732; C. **1914**. I. 1949) eintritt. Es wurde noch eine zweite β -Toluylpicolinsäure dargestellt u. eine Unters. der durch Red. dieser u. der Benzoylverb. entstehenden Prodd. vorgenommen. (Proc. Trans. Roy. Soc. Canada [3] **18**, Sekt. III. 120. 1924.)

SPIEGEL

Emil Abderhalden, Über die Konstitution von Proteinkörpern. Gegenüber HERZOG (Ztschr. f. physiol. Ch. **141**, 158; C. **1925**. I. 670) u. BERGMANN (Naturwissenschaften **12**, 1155; C. **1925**. I. 851) legt Vf. ausführlich seinen Anteil an der Begründung der neuen Auffassung über die Konst. von Eiweißstoffen dar. (Ztschr. f. physiol. Ch. **142**, 306—13. Halle a. S., Univ.)

SPIEGEL

E. Biochemie.

R. Feulgen und K. Voit, Über einen weitverbreiteten festen Aldehyd. Seine Entstehung aus einer Vorstufe, sein mikrochemischer und mikroskopisch-chemischer Nachweis und die Wege zu seiner präparativen Darstellung. (Vgl. Ztschr. f. physiol. Ch. **137**, 272; C. **1924**. II. 1207.) Im Protoplasma tier. Gewebe kommt weit verbreitet eine Substanz von Lipoidcharakter vor, Plasmalogen, unl. in W., l. in organ. Lösungsm., aus den Geweben mit A. extrahierbar. Durch Einw. von Säuren oder $HgCl_2$ geht das Plasmalogen, wahrscheinlich durch Abspaltung einer noch bekannten Komponente, in Plasmal über, ebenfalls in W. unl., l. in organ. Lösungsm., ein bei gewöhnlicher Temp. fester, mit Wasserdampf flüchtig Aldehyd; es färbt sich mit fuchsinschwefliger Säure sofort violett („Plasmalmark“; Plasmalfärbung bei mkr. Präparaten), ebenso das Plasmalogen, aber erst nach

gerer Zeit, weil durch fuchsinschweflige Säure das Plasmalogen in Plasmal verwandelt wird. Dadurch daß auch HgCl_2 die Aldehydgruppen des Plasmalogens manifest zu machen imstande ist, unterscheidet sich die Plasmalfärbung von der Methylfärbung (l. c.) u. ebenso durch die Alkohollöslichkeit. Das Plasmalogen bzw. Plasmal wird von den elast. Fasern hartnäckig festgehalten u. ist diesen nach A. nicht oder nur unvollkommen zu entziehen. Entsprechend seiner Aldehydnatur sind das Phenylhydrazon, Thiosemicarbazon, die NaHSO_3 -Verb. usw. darstellbar. Die präparative Darst. des Plasmals erfolgt aus der nach Abdampfen des alkoh. Extraktes von tier. Geweben entstehenden Emulsion durch Spaltung des Plasmalogens mit HgCl_2 . (PFLÜGERS Arch. d. Physiol. 206. 389—410. 1924. Göttingen, Univ.) WOLFF.

E₃. Pflanzenphysiologie. Bakteriologie.

P. Mazé, Über die sich aus der Untersuchung des Gaswechsels zwischen Atmosphäre und ganzer Pflanze ergebende Vielheit der photosynthetischen Produkte. Auf Grund rechner. Auswertung der von anderen Autoren bzgl. des Gaswechsels gegebenen Daten wird festgestellt, daß der Quotient O_2/CO_2 stets größer als 1 ist; zurückzuführen ist dies darauf, daß bei der Photosynthese außer den Kohlenhydraten auch sauerstoffärmere Verbb. entstehen. Nimmt man z. B. für die B. von Zucker die Gleichung: $12\text{CO}_2 + 12\text{H}_2\text{O} = 2\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + 12\text{O}_2$, so kann ein Teil des Zuckers (z. B. die Hälfte) folgende Umwandlung erfahren:
 $\frac{1}{2}\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{C}_2\text{H}_4\text{O} + 2\text{CO}_2 + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{CH}_3\text{CHOHCHO} + 2\text{O}_2$,
 daraus ergibt sich $\text{O}_2/\text{CO}_2 = \frac{13}{12} = 1,08$. (C. r. d. l'Acad. des sciences 180. 3—9.) HABERLAND.

August Rippel, Zur Klarstellung einiger Fragen des Wirkungs- und Wachstumsgesetzes der Pflanzen. Erwiderung auf die von BAULE (Landw. Jahrb. 59. 2; C. 1924. I. 1390) gemachten Einwände gegen die von PFEIFFER u. dem Vf. vorgelegten Argumente, gegen die allgemeine Gültigkeit der mathemat. Formulierung des Wirkungsgesetzes u. des Gesetzes der Wachstumsfaktoren. (Ztschr. f. Pflanzenphysiol. u. Düngung Abt. A 3. 396—401. 1924. Göttingen.) BERJU.

Wilhelm Rother, Über den Zuckergehalt von Nährmitteln. Nährlsgg. aus Pflanzen, wie sie in Frauenkliniken in der Regel hergestellt werden, haben von Anfang an alkal. Rk. gegen Lackmus, saure gegen Phenolphthalein, so daß hier künstliche Regelung der Rk. unnötig ist. Sie haben ferner geringen Zuckergehalt, während dieser bei Nährlsgg. aus Pferdefleisch in größeren Mengen, besonders nach Abbau des Glykogens vorhanden ist. (Zentralblatt f. Bakter. u. Parasitenk. Abt. 94. 77—80. Erlangen, Univ.) SPIEGEL.

G. W. Scarth, Die Giftwirkung destillierten Wassers und die Gegenwirkung von Kationen. Verss. an Spirogyra zeigten viel stärkere Giftwrkg. von dest. W. in Pt.- oder Quarzgefäßen als in Glas. Die Ursache der tox. Wrkg. findet Vf. in der durch CO_2 bedingten $[\text{H}^+]$. Nach Austreibung von CO_2 durch Kochen oder Erhitzen eines CO_2 -freien Luftstromes ist sie fast verschwunden, ebenso nach Neutralisation durch eine Spur Alkali. Kationen wirken, so weit nicht eigene Giftwrkg. in Betracht kommt, der tox. Wrkg. des dest. W. gegenüber antagonistisch in Verhältnis ihrer Valenz. (Proc. Trans. Roy. Soc. Canada [3] 18. Sekt. V. 97 bis 101. 1924. Montreal, MC GILL Univ.) SPIEGEL.

Jacques J. Bronfenbrenner und **Charles Korb**, Untersuchungen über den lytischen Bakteriophagen. I. Ist das lytische Prinzip flüchtig? Wie andere Vorprüfer der Angaben von OLSEN u. YASAKI (Klin. Wehschr. 2. 1879; vgl. auch En. Wehschr. 3. 278; C. 1924. I. 1811) fanden auch Vf. keinen Übergang der lyt. Substanz in das Destillat, wenn das Übergehen zerstäubter Tröpfchen durch

eine geeignete Vorr. verhindert wurde. (Journ. Exp. Med. **41**. 73—79. ROCK FELLER Inst. f. med. res.) SPIEGEL.

J. G. Fitzgerald und Dorothy G. Doyle, *Eine weitere Untersuchung der Fra- der Ausnutzung („Gärung“) von Saccharose durch B. diphtheriae*. An toxinbildend Diphtheriestämmen, die sorgfältig von verunreinigenden Keimen befreit war konnte niemals die Fähigkeit zur Zers. von Saccharose festgestellt werden. (Proc. Trans. Roy. Soc. Canada [3] **18**. Sekt. V. 125—28. 1924. Univ. of Toronto.) SPIEGEL.

N. S. Golding, *Untersuchung der Schimmelpilze in blauegedertem Käse*. F. Verss. zur Herst. von Wensleydale-Käse stellten sich Unterschiede zwischen dem darin dominierenden Schimmelpilz u. dem *Penicillium roqueforti* heraus. Der Wensleydalepilz bildet auf Kartoffelagar nicht die großen weißen Höfe von verschlungenem Mycel, in Molkenpeptonlackmusagar eine geringe Menge Säure, verdaut Casein in Milch viel langsamer, wächst schlechter auf einem synthet. Medium mit Saccharose, Galaktose, Lävulose oder Dextrose, dagegen besser auf solche mit Casein oder Pepton. (Proc. Trans. Roy. Soc. Canada [3] **18**. Sekt. V. 67—70. 1924. (Vancouver, Univ. of British Columbia.) SPIEGEL.

C. D. Kelly, *Die Bakteriologie des „Kingstonkäses“*. Die Flora dieses Käses ist ganz ähnlich, wenn nicht ident. mit derjenigen des Cheddarkäses, obwohl der erste schon in 10 Tagen, der zweite erst in 3—6 Monaten zur Reife gelangt. (Proc. Trans. Roy. Soc. Canada [3] **18**. Sekt. V. 51—59.) SPIEGEL.

E. M. Taylor, *Die Giftigkeit von Säuren gegenüber Hefe*. (Vgl. Trans. Proc. Roy. Soc. Canada [3] **17**. Sekt. III. 158; C. 1924. I. 2376.) Die früheren Verss. wurden mit weiteren Säuren fortgesetzt, die allgemeinen Schlüsse bleiben nach den Ergebnissen der neuen Verss. unverändert. Verss. mit synthet. Medien aus Zucker u. Salzen mit Zusätzen von Bios I u. Bios II zeigten, daß die Mindestmengen der verschiedenen Salze zur Sicherung der n. Vermehrungsgeschwindigkeit ganz von dem benutzten Biospräparat abhängen. Selbst im verdünntesten Medium blieb die Reihenfolge der Säuren in der Giftwrgk. auffallend verschieden von derjenigen in wss. Lsg. Bzgl. des Mechanismus der Giftwrgk. ergab sich folgendes: Das Gift wichtet der in 5 Stdn. bei 25° für je 1 g HCl getöteten Hefe blieb ziemlich das gleiche, ob die Säure 0,1-n. oder 2- oder 4mal so stark war u. ob gerade so viel Hefe genommen wurde, als von der Säure getötet werden kann, oder bis zu 7fachen dieser Menge. Nach Zugabe gewaschener Hefezellen zur Säurelsg. fiel die [H⁺] in wenig Min. auf einen geringen Bruchteil des Anfangswertes; da nur wenig Cl aus der Lsg. verschwand, muß die Erscheinung der Wrgk. eines Exsudats an den Zellen zugeschrieben werden, das sich auch durch Verdampfen der Lsg. nachweisen ließ. Die ersten Anteile dieses Exsudats enthalten kein Bios, nach längerem Einw. ließen sich aber in der Lsg. beträchtliche Mengen Bios II, zuweilen auch Bios I erkennen. „Die Zellen bluten zu Tode.“ (Proc. Trans. Roy. Soc. Canada [3] **18**. Sekt. III. 115. 1924. Univ. of Toronto.) SPIEGEL.

H. des B. Sims, *Die Darstellung und Reinigung von Bios I*. Als Ausgangsmaterial dient Teestaub (vgl. EASTCOTT, Trans. Proc. Roy. Soc. Canada [3] **17**. Sekt. III. 157; C. 1924. I. 2377). Der nach dem Verf. von LUCAS (Trans. Proc. Roy. Soc. Canada [3] **17**. Sekt. III. 157) erhaltene Nd. von Bios I wird mit Hilfe von CO₂ gel., das Pb als Sulfid gefällt, das Filtrat nach Reinigung mit Tierkohle konz., dann mit 4 Voll. CH₃·OH versetzt. Es scheidet sich zunächst ein körniges inakt. Nd. aus, nach mehrtägigem Stehen folgen gleichfalls inakt. Krystalle, erst bei noch längerem Stehen porzellanartige Körnchen, aus nadelförmigen Krystallen bestehend, die sich im Verein mit Bios II für das Hefewachstum gut wirksam zeigten. Die Mutterlauge läßt auf Zusatz von viel CH₃·OH, dann von absol. Ä. zunächst einen Nd. von unreinem Bios I fallen, dann aus dem Filtrat wieder d.

Körnchen ausscheiden. (Proc. Trans. Roy. Soc. Canada [3] 18. Sekt. III. 116.

SPIEGEL.

E. V. Eastcott, *Die Bildung von Bios in Infusen*. (Vgl. Trans. Proc. Roy. Canada [3] 17. Sekt. III. 157; C. 1924. I. 2377.) Bei Vergleich des Hefestadiums in Infusen aus geriebener Gerste u. Infusen aus derselben Menge Stenköerner nach 3 tägiger Keimung zeigte sich die Ernte abhängig von der Zeit, der Korn u. W. in Berührung geblieben waren. Dabei vermehrte sich Bios I in Infusen weit stärker als Bios II. Auch im filtrierten Infus fand die Vermehrung von I noch statt (Verdoppelung in 24 Stdn.), während II prakt. unverändert blieb; diese Steigerung wird durch Kochen des filtrierten Infuses verhindert u. ist schon vermindert, wenn man das Infus bei höherer Temp. stehen läßt. Verwendet man Mais statt Gerste, so vermehrt sich Bios II, ebenso bei Verwendung von Malzkämmen. Für die Stoffe, aus denen Bios I u. II so entstehen, werden die Bezeichnungen *Biogen I* u. *Biogen II* vorgeschlagen. (Proc. Trans. Roy. Soc. Canada [3] 18. Sekt. III. 117—18. 1924.)

SPIEGEL.

F. F. Nord, *Was geht während der Gärung vor?* Vf. gibt eine gedrängte Übersicht über die Gärungsprozesse, die zum Teil von industrieller Bedeutung sind. Er bespricht die Rolle der Brenztraubensäure u. des Acetaldehyds, die Gärungsarten. Herst. von Glycerin in Deutschland während des Weltkriegs u. geht zum Schluß ein auf die Vergärung mit *B. coli* u. *B. butyricus* Fitz. (Chem. Metallurg. Engineering 28. 351—53. 1923. Berlin.)

BEHRLE.

E₅. Tierphysiologie.

H. Zondek und H. Ucko, *Die Zweiphasenwirkung der Hormone*. Verss., durch Kombination von Hormonen u. Elektrolyten die beiden Phasen der Hormonwirkung aufeinander zeitlich u. graduell zu verschieben u. die 2. Phase so zu verstärken, wie sie statt der 1. als der domierende inkretor. Effekt zu Tage tritt. Als Testobjekt wählten Vff. das *Insulin* in seiner Wirkung auf den Blutzuckerspiegel des Menschen. Es ergab sich, daß unter gewissen Voraussetzungen die Insulinwirkung nicht allein von der charakterist. Blutzuckersenkung, sondern nachher auch von einer konstant auftretenden Blutzuckersteigerung gefolgt ist. In ähnlicher Weise tritt die 2. Phase gegenüber der 1. in den Hintergrund, sie kann stärker hervortreten durch die Bindung des Insulins an Ca u. Mg in einem bestimmten Verhältnis. Es gelang, durch gleichzeitige Verabfolgung bestimmter Mengen von 1. Mg die Wirkung des Insulins so zu modifizieren, daß Blutzuckersteigerung als dominierender Effekt hervortrat. Nur bei Zuführung kleiner u. kleinster Hormonmengen gibt sich die Wirkung der Inkrete im Sinne der Zweiphasenrichtung deutlich an. (Klin. Wehsschr. 4. 6—7. Berlin, Charité.)

FRANK.

Russell L. Haden und Thomas G. Orr, *Experimenteller hoher Darmverschluß bei Affen*. Der Nicht-Eiweiß-N im Blut steigt nach der Operation ebenso an wie beim Mensch u. Hund. Bei 2 Affen fiel der Cl-Gehalt stark, bei den anderen etwas ab. Harnsäure u. Keratinin weisen keine typ. Veränderungen auf. Erbrechen tritt nicht ein. (Journ. Exp. Med. 41. 107—11.)

WOLFF.

Russell L. Haden und Thomas G. Orr, *Die Verteilung der Chloride im Hundeserum nach experimentellem Darmverschluß*. (Vgl. Journ. Exp. Med. 38. 477; C. 1924. 1922.) Der nach dieser Operation eintretende Abfall der Chloridmenge im Blut erfolgt in fast gleicher Weise Plasma u. Zellen. Unbekannte Bindungen des Cl spielen dabei nicht. (Journ. Exp. Med. 41. 113—17. Kansas, Kansas School of Medicine.)

WOLFF.

Russell L. Haden und Thomas G. Orr, *Der Natriumgehalt des Hundeserums nach experimentellem Darmverschluß*. Der durchschnittliche Na-Gehalt des Plasmas im Hund beträgt 336 mg in 100 ccm; nach Darmverschluß tritt eine verhältnis-

mäßig geringe Veränderung des Na-Gehaltes ein trotz deutlicher Änderungen Chlorid- u. Bicarbonatgehalt. Das Gesamt-Na steigt etwas an, der Anstieg Bicarbonat gleicht nicht völlig den Abfall an Chlorid aus. Nach der Operat befindet sich ein größerer Anteil des Na in unbekannter Bindung als vorher. (Jou Exp. Med. **41**. 119—27.)

WOLFF

M. Richter-Quittner, Über den Zuckergehalt der Blutkörperchen. (Ztschr. d. ges. exp. Medizin **44**. 384—86. — C. **1924**. II. 1941.)

WOLFF

Ludwig Brings, Über die Stickstoffverteilung in der Oxyproteinsäurefraktion des Harns. Zum Studium der Festigkeit der N-Bindungen in der Oxyproteinsäurefraktion des Menschenharns wurden nach FÜRTH (Biochem. Ztschr. **69**. 448; C. **19** II. 245) unter vorausgegangener Beseitigung des Harnstoffs durch Vergärung Soja-Urease gewonnenen Präparate benutzt, bei denen somit die Oxyproteinsäuren nicht durch beigemengte Harnstoffreste verunreinigt waren. Die Oxyproteinsäuren stehen den Eiweißkörpern u. nicht dem Harnstoff nahe. Sicherlich trägt ein großer Teil des in den Oxyproteinsäuren enthaltenen N polypeptidartigen Charakter u. festgebundener Amino-N. Ein anderer Teil des N ist allerdings anders gebunden, er kann durch BaOH oder Säure als NH_3 abgespalten werden. (Biochem. Ztschr. **154**. 35—42. 1924. Wien, Univ.)

WOLFF

Lee Monroe Miles und Chih-Tung Feng, Calcium- und Phosphorstoffwechsel bei Osteomalazie. Osteomalazie ist ein Mangelkrankheit gleicher Art wie Rachitis. Es mangelt grundsätzlich das fettl. Vitamin, oft auch zugleich Ca. (Journ. Exp. Med. **41**. 137—57. Peking, Peking Union Med. Coll.)

WOLFF

Curt Oehme, Über die Beziehung zwischen Kalium und Magnesium im Stoffwechsel. Die diuret. Wrkg. des KCl wird, bei bestimmtem Mischungsverhältnis der Kost, verhindert durch Beigabe von MgCl_2 . Der Parallelismus des K- u. Mg-Austausches im Darm tritt bei Zulage von NaCl oder NaHCO_3 zur Kost scharf hervor. Sowohl die K- wie die Mg-Ausscheidung wird vermehrt, eine Bewegung, an der beispielsweise das Ca nicht beteiligt ist. Der Zusammenhang des K mit dem Ca gründet sich wahrscheinlich darauf, daß beide Ionen im allgemeinen in großer Konz. in den Zellen als in den Körpersäften vorhanden sind. (Klin. Wchschr. **21**—22. Bonn, Univ.)

FRANK

Vincent Brian Wigglesworth, Studien über Ketose. I. Die Beziehung zwischen Alkalose und Ketose. N. 24std. Rattenurin enthält kein bis 0,30 mg Gesamtacetone u. 0,8—2,5 mg β -Oxybuttersäure. Bei kohlenhydratloser Kost oder nur Fettfütterung tritt deutliche Ketose auf, die anfangs wächst, am 3. Tage ihr Maximum erreicht u. bis zum 5. Tage wieder zur Norm abgefallen ist. Die Ketose ist bei jungen Tieren deutlicher. Auf der Höhe der Ketose ist das Verhältnis β -Oxybuttersäure/Gesamtacetone = 2:4. Zufuhr von NaHCO_3 vermehrt die Milchsäure u. β -Oxybuttersäure, ändert aber nicht die Ausscheidung des Gesamtacetons. Säure keht diese Wrkg. um. Ca-Lactat, Na-Acetat u. wahrscheinlich die Alkalisalze anderer oxydierbarer organ. Säuren wirken wie Alkali, ebenso alkalibildende Nahrung (Karotten). Injektion großer Glucosemengen während der Alkalose vermindert die Ausscheidung von β -Oxybuttersäure. Nach Injektion großer Mengen NaHCO_3 steigt die Gesamtacetonausscheidung deutlich an infolge Störung des Fettstoffwechsels. $(\text{NH}_4)_2\text{H}_2\text{PO}_4$ u. NH_4Cl unterdrücken bei genügender Konz. die durch Fett hervorgerufene Ketose. (Biochemical Journ. **18**. 1203—16. 1924. Cambridge, Biochem. Lab.)

WOLFF

Vincent Brian Wigglesworth, Studien über Ketose. II. Die Oxydation von Ketonkörpern durch die isolierte Rattenleber. (I. vgl. vorst. Ref.) Der O_2 -Verbrauch der frischen Rattenleber steigt in Ggw. von Acetessigsäure u. β -Oxybuttersäure. Bei gleicher Mol.-Konz. wirkt Acetessigsäure stärker. Die Oxydation der Ketonkörper durch die Leber scheint nicht durch 36std. Fasten des Tieres beeinflusst zu werden.

den, ebenso nicht durch Glucose oder deren Abbauprodukt, Pankreasextrakte oder Insulin. Die Ketose beruht nicht auf verminderter direkter Oxydation von Fettsäuren. (Biochemical Journ. 18. 1217—21. 1924.) WOLFF.

A. V. Hill, C. N. H. Long und H. Lupton, Muskelübung, Milchsäure und die Sauerstoffversorgung und -ausnutzung. Teil IV—VI. (I—III. vgl. Proc. Royal Soc. London Serie B. 96. 438; C. 1924. II. 1820.) IV. Methoden zum Studium des Gaswechsels beim Menschen während schneller Änderungen infolge Muskelbewegung oder während Einatmung verschiedener Gasgemische. Die Douglassche Sackmethode wurde für die verschiedenen Zwecke modifiziert, theoret. diskutiert u. prakt. erprobt. — V. Der Erholungsvorgang beim Menschen nach körperlicher Anstrengung. Nach der O₂-Aufnahme während der Anstrengung, ist die Erholung nach mäßiger kurzer Anstrengung in wenig Min. beendet, nach starker oder langdauernder folgt der ebenso verlaufenden Anfangsphase eine langsamere, die bis zu 80 Min. nach Abbruch der Übung dauern kann. Die erste Phase ist als Stadium der oxydierenden Beseitigung der Milchsäure in den Muskeln anzusehen, die zweite als Stadium der Beseitigung derjenigen Milchsäuremengen, die bereits aus den Muskeln hindusdiffundiert waren. In der ersten Phase tritt die Ausscheidung von CO₂ u. hoher R. Q., in der zweiten Retention von CO₂ mit niedriger R. Q. Diese Abweichungen verschwinden zugleich mit der Erholungsnahme von O₂. Die Ruheaufnahme von O₂ bleibt nach starker Anstrengung noch nach 80 Min. noch ca. 7% höher als vor dem Vers., die dadurch angezeigte Erhöhung des Grundstoffwechsels ist aber nicht mehr ein Teil des Erholungsprozesses, sondern Wirkung der allgemeinen Kreislauf- u. Stoffwechselstörung. Nimmt man den normalen Grundstoffwechsel als Grundlinie, so kann aus dem Überschuß der O₂-Aufnahme ca. 35 Min. nach schwerer Übung, noch kürzere Zeit nach mäßiger, das O₂-Defizit mit genügender Genauigkeit bestimmt werden. Die CO₂-Retention nach starker Anstrengung wurde als Maß der beseitigten Milchsäure betrachtet, der bei der Erholung verbrauchte O₂ als Maß der dabei verbrauchten Energie. Der daraus für den Menschen berechnete Wirkungswert der Erholung beim Menschen stimmt im Mittelwert mit dem am isolierten Froschmuskel ermittelten überein. Zu guter Übereinstimmung mit dem wie oben errechneten Wirkungswert lassen sich auch direkte Best. der Milchsäure im Blute in einem beliebigen Intervall vergleichen mit dem in diesem für die Erholung verbrauchten O₂. — Der zeitliche Verlauf des Erholungsvorganges ist bei Einatmung von mit O₂ angereicherter Luft merklich verschieden von dem bei Einatmung von atmosphär. u. selbst von reiner Luft. Nur die frühesten Stadien der Erholung, während deren der Blutlauf noch sehr schnell ist, werden durch höheren O₂-Druck beschleunigt. VI. Das Sauerstoffdefizit am Schlusse der Übung. Dieses Defizit wird gemessen als Gesamt-O₂-Verbrauch während der Periode vollständiger Erholung, abzüglich um den Betrag, der in gleicher Zeit bei andauernder Ruhe verbraucht wird. Annähernde Berechnungen ergeben, daß davon nur ca. 5% den besonderen Anforderungen von Kreislauf u. Atmung zuzuschreiben sind, während der Rest wesentlich zur Umwandlung der Milchsäure in ihr Vorprodukt verbraucht wird. Nach mäßiger, selbst lange fortgesetzter Anstrengung ist das Defizit gering, da Milchsäure sich nicht ansammelt, so lange die O₂-Versorgung genügt. Dagegen können nach starker Anstrengung selbst bei kurzer Dauer beträchtliche Defizite auftreten, die bis zu 0,2—0,4 u. 0,5% Milchsäure in den tätigen Muskeln entsprechen, besonders bei Athleten u. bei Einatmung von O₂-reichen Mischungen, wahrscheinlich, weil die dadurch verringerten Beschwerden größere Anstrengung ermöglichen. — Die willkürlichen Muskeln verhalten sich wie ein Akkumulator von hoher Kapazität mit geringem inneren Widerstande. (Proc. Royal Soc. London Serie B 97. 84—138. 1924. Manchester, Dep. of Physiol. London, Univ. Coll.) SPIEGEL.

A. V. Hill, C. N. H. Long und H. Lupton, Muskelübung, Milchsäure und Sauerstoffversorgung und -ausnutzung. Teil VII—VIII. (Vgl. vorst. Ref. u. H. S. 1098.) VII. *Muskelübung und Sauerstoffaufnahme.* Bei Gehen u. Rennen wächst die O₂-Aufnahme zunächst stetig mit wachsender Schnelligkeit der Bewegung erreicht aber dann ein Maximum, über das hinaus keine körperliche Anstrengung sie treiben kann. Dieses Maximum ist nicht durch mangelnden Bedarf bedingt sondern durch die Beschränkungen des Kreislauf-Atmungssystems. Bei Benutzung von Gasmischungen mit hohem O₂-Druck kann die O₂-Aufnahme beträchtlich erhöht werden, häufig so erheblich, daß das Mehr nicht nur der vollständigen Sättigung des Blutes während seines Weges durch die Lungen zugeschrieben werden kann. Es wird angenommen, daß ein „herrschernder“ Mechanismus im Herzen selbst sonstwo besteht, der den Ausstoß des Herzens mit dem Sättigungsgrade des ihm austretenden Blutes in Einklang zu bringen sucht. Es kann auf Grund der hohen O₂-Aufnahme der maximale Ausstoß annähernd berechnet werden; er beträgt anscheinend unter gewissen Umständen bei angestrenzter Arbeit bis 170—220 l pro Schlag oder 30—40 l pro Min. Um diese Arbeit zu leisten, muß der Herzmuskel selbst in jeder Min. mit mindestens dem doppelten seines eigenen Volumens Blut versorgt werden.

VIII. (Mit **K. Furusawa**). *Muskelübung und Sauerstoffbedarf.* Bei Gehen u. Laufen auf der Stelle wächst der O₂-Bedarf mit zunehmender Geschwindigkeit u. erreicht enorme Werte, bis zum 10-fachen der maximalen Aufnahme (vgl. oben). Für gleiche Geschwindigkeit ist er beim Gehen beträchtlich größer als beim Rennen. Er bildet unter allen Bedingungen u. bei allen Geschwindigkeiten ein Maß der Energie, die für Ausführung einer gegebenen Reihe von Muskelbewegungen benötigt wird, ist daher ein guter quantitativer Maßstab der Anstrengung. Bei sehr strenger Arbeit erreichte die nach dem O₂-Bedarf berechnete B. von Milchsäure bei einem Menschen von 51 kg 2,7 g pro Sekunde, so daß eine Konzentration von 0,3% im tätigen Muskel in 20 Sek. u. das Maximum innerhalb 1 Min. erreicht werden würde. — Der R. Q. des gesamten überschüssigen Stoffwechsels, der durch kontinuierliche Muskelarbeit verursacht wird, scheint = 1 zu sein, während er bekanntlich bei längerer Arbeit erheblich niedriger ist. Vff. schließen vorläufig daraus, daß nach kurzer, den allgemeinen Stoffwechsel noch nicht affizierender Arbeit der Erholungsprozeß nur die Oxydation von Milchsäure oder Kohlenhydrat umfaßt, nach längerer aber auch andere chem. Prozesse u. Organe im Spiele sind. (Proc. Royal Soc. London Serie B. **97**. 155—76. 1924.)

SPIEGEL

M. Nikolajew, Die Wirkung des p_H des Mediums auf die Funktion der isolierten Nebenniere. Zunahme der Alkalinität der durch die isolierte Nebenniere geleiteten Ringer-Lockeschen Fl. durch Bicarbonatzusatz bis p_H = 8,19 ruft eine Steigerung der Abscheidung der adrenalinähnlichen Substanz hervor, u. diese steigt mit der Alkalinität der Lsg. Zusatz von Milchsäure zur Durchströmung hemmt die Sekretion, bis p_H = 5,6 erreicht ist; dann wirkt sie wie n. Ringer-Lockesche Lsg. Bei saureren Lsgg. (p_H < 5,6) steigert sich die Sekretion wieder u. erreicht ihr Maximum bei p_H = 3,14. (Ztschr. f. d. ges. exp. Medizin **418**—24. Leningrad, Mil.-med. Akad.)

WOLFF

W. Tönnis und H. E. Never, Der Pylorusreflex auf Fett im Duodenum. Neutralisiertes Öl bewirkt keinen Schluß des Magenpförtners. Die Ursache des Pylorusreflexes auf Fett liegt in dem Gehalt an freien Fettsäuren. Er ist identisch mit dem Reflex auf Säure. Novocain hebt die Wirkung des nicht neutralisierten Öls auf den Pylorus auf. Die geringste Konz., bei der ein Pyloruschluß auf Fett eintritt, war 0,2% Acidität, was ca. $\frac{1}{100}$ -n. entsprechen dürfte. (Pflügers Arch. d. Physiol. **207**. 24—26. Hamburg, Univ.)

WOLFF

W. L. Mendenhall, E. M. Taylor und A. N. Richards, *Die Wirkung kleinster Mengen von Bariumchlorid auf die Niere*. Wie Adrenalin u. Pituitrin (vgl. RICHARDS PLANT, Amer. Journ. Physiol. 59. 191; C. 1923. I. 474) kann auch BaCl₂ in kleinen Mengen gelegentlich am Kaninchen Steigen von arteriellem Druck, renvol. u. Harnfluß bei Abnahme der Blutströmung in der Niere bewirken, wahrscheinlich durch eine Verengerung der ausführenden Glomerulusarteriole erklärt ist. (Amer. Journ. Physiol. 71. 174—77. 1924. Univ. of Pennsylvania.) SPIEGEL.

A. N. Richards und Carl F. Schmidt, *Eine Beschreibung der Glomerulation in der Froschniere und Beobachtungen über die Wirkung von Adrenalin verschiedener anderer Substanzen auf dieselbe*. Es gelang den Glomeruluskreis- beim Frosch mkr. direkt sichtbar zu machen. Es zeigte sich nun, daß die Blut durchflossenen Glomeruli, die vielleicht nur ein Teil der Gesamtzahl sind, Einfluß verschiedener vasodilator. u. vasokonstriktor. Mittel durch An- u. Ab- wellung u. durch Änderung der Zahl capillarer Kanäle innerhalb des einzelnen merulus unterliegen. Zeitweiliges Pausieren (intermittence) der Glomerulusdurch- mung ist häufig zu beobachten u. kann durch reflektor. Konstriktion der Nieren- ße, elektr. Reizung der sympath. Fasern, die zur Niere führen, u. durch lange intravenöse Injektion von Adrenalin herbeigeführt werden. Es wird an- ommen, daß die Erscheinung auf dem Gegensatz zwischen gefäßverengernden kgg. nervöser oder chem. Natur u. dem erweiternden Einfluß des O₂-Mangels ht, der sich geltend macht, sobald die Zirkulation in den kleinen Arteriolen hört. *Adrenalin* in Mengen, die auf die Nierengefäße nur eben erkennbare kg. auszuüben vermögen, in den Kreislauf eingeführt, vergrößert häufig das merulusbüschel u. läßt es dichter mit Blutkörperchen gefüllt erscheinen, was Verengerung des ausführenden Gefäßes beruhen dürfte (vgl. vorst. Ref.). Bei as kleinerer Gabe verringert es die Zahl der tätigen Glomeruli u. die Zahl itbarer offener Capillarbahnen in den einzelnen infolge Wrkg. auf die Arterien. Abhandlung bringt noch viele Einzelheiten rein physiol. Natur. (Amer. Journ. 71. 178—208. 1924. Univ. of Pennsylvania.) SPIEGEL.

J. T. Wearn und A. N. Richards, *Beobachtungen über die Zusammensetzung Glomerulusharn mit besonderer Beziehung auf das Problem der Wiederabsorption den Nierenkanälen*. (Vgl. vorst. Ref.) Durch eine besondere Technik gelang n Frosche die gleichzeitige Sammlung von Glomerulusharn (I) u. Blasen- (II). er ist bei raschem Blutfluß durch die Glomeruluscapillaren eiweißfrei, kann aber eiweiß enthalten, wenn das Blut nur langsam durchfließt u. die Capillaren erweitert i. Bei hungernden Winterfröschen war kein Zucker im Blute vorhanden. urde dann durch subcutane Injektion von Glucose eine Blutzuckerkonz. von 0,05% hergestellt, so war I zuckerhaltig, II nicht. In dest. W. gehaltene ngerfrösche zeigten II frei von Chloriden, die in I noch vorhanden waren. gl. des Gehaltes an Harnstoff u. der Rk. sind die Verss. noch nicht abge- lossen. Farbstoffe, wie Indigocarmin, Phenolsulfonphthalein u. Methylenblau, den durch die Glomeruli ausgeschieden. (Amer. Journ. Physiol. 71. 209—27. 1924. Univ. of Pennsylvania.) SPIEGEL.

E. Trocello und A. Cruto, *Über die durch hohe Temperaturen auf die Halt- keit des Insulins ausgeübte Wirkung*. Verss. an dem „Insulin Ergon“ des Istituto zionale Medico Farmacologico di Roma zeigten keine Veränderung der rksamkeit des Trockenpräparates in 24 Stdn. bei 100° oder in 33 Tagen bei 4°, während es in Lsg. unter gleichen Umständen ca. 1/2 seiner hypoglykäm- enden Wrkg. verliert u. keine Krämpfe mehr erzeugt. Diese Wirkungsabnahme gte sich von der Dauer der Einw. der betreffenden Temp. abhängig. (Rassegna n. Terap. e Scienze aff. 23. 229—33. 1924. Roma.) SPIEGEL.

Anna Kudrjawzewa, *Über den Einfluß des Insulins auf den Stickstoffwechsel*. Durch Insulin wird die Ausscheidung von N u. Kreatinin im Harn beträchtlich herabgesetzt. Der Kreatiningehalt der Muskeln bleibt unverändert. Insulin keine Wrkg. auf die diastat. Kraft des Blutes n. Kaninchen. Die Einführung von Insulin setzt den Zuckergehalt des Blutes n. Kaninchen herab. Wiederholte Einführung von Insulin während einer bedeutenden Hypoglykämie bringt eine rasch vorübergehende Zunahme des Blutzuckers mit sich. (Ztschr. f. d. ges. exp. Med. **44**. 313—18. Charkow, Med. Inst.) WOLFF

J. J. B. Macleod, E. C. Noble und M. K. O'Brien, *Der Einfluß des Insulins auf den Glykogengehalt der Leber während der Hyperglykämie*. Bei mit Insulin behandelten Tieren war nach Einw. von Adrenalin der Glykogengehalt der Leber größer als bei nicht behandelten. Um Zufälligkeiten, wie sie durch schwankenden Glykogengehalt der einzelnen Tiere entstehen können, zu vermeiden wurde in weiteren Verss. zunächst ein Stück Leber des Versuchstieres extirpiert u. der Glykogengehalt hierin u. in dem Leberrest nach dem Vers. verglichen. Ein hyperglykämisierendes Agens wurde zunächst Urethan benutzt, das auch als Anästhetikum für die Operation diente. Die bisherigen Verss. zeigen, daß Insulin gaben, welche die Entw. einer Hyperglykämie durch jenes Mittel verhindern, den Glykogengehalt der Leber unverändert erhalten. (Proc. Trans. Roy. Soc. Canada [3.] **18**. Sekt. V. 129—34. 1924. Univ. of Toronto.) SPIEGEL

Hans Lullies, *Über die Beeinflussung der Permeabilität von Pflanzenzellen durch Narkotica*. Als Objekt dienten die Blattzellen der Mittelrippe von Tradescantia discolor (Rhoeo), als Narcotica wurden *i*-Butylurethan, Phenylharnstoff, Hepylalkohol, *i*-Amylalkohol, *i*-Butylalkohol u. Propylalkohol benutzt, als Testsubstanzen Glycerin, Glykol, Harnstoff u. KNO₃. Durch Narkotica wird nicht nur die Aufnahme von Alkalisalzen in die Blattzellen, sondern ebenfalls, wenn auch schwächer, das Eindringen von Glycerin u. in noch geringerem Grade das Eindringen von Glykol gehemmt. Auf das Eintreten von Harnstoff ließ sich keine hemmende Wrkg. der angewandten Narkotica nachweisen. Durch Ca war eine Verringerung der Durchlässigkeit weder für Glycerin u. Glykol noch für Harnstoff zu erzielen. Daraus wird geschlossen, daß die untersuchten Stoffe Glycerin, Glykol u. Harnstoff in anderer Weise in die Zelle gelangen als die Alkalisalze, für deren Aufnahme man eine physikal. Zustandsänderung der Zellgrenzflächen, die durch Ca antagonisiert wird, voraussetzt. Für das Eindringen von Glycerin, Glykol u. Harnstoff ist eine bereits bestehende Permeabilität verantwortlich zu machen, die die Durchlässigkeit für die ausgesprochen lipoidl. Substanzen, zu denen sie auch den Übergang bilden, entspricht. Narkotica vermögen nicht nur die Permeabilität für Salze, sondern auch die Durchlässigkeit der Zelle für einige langsam eindringende, relativ wenig oberflächenakt. Stoffe herabzusetzen, deren Eindringen analog dem der lipoidl. Substanzen erfolgt. (PFLÜGERS Arch. d. Physiol. **207**. 8—23. Kiel, Königsberg, Physiol. Institute.) WOLFF

A. Noll, *Die Pupillenweite der Taube im Leben und nach dem Tode und ihre Veränderung durch Curare, Atropin und Coniin*. Nach Atropinisierung eines Auges wird dessen Pupille genau so weit wie unmittelbar nach dem Tode, noch weit nach Einträufeln von Curare u. spontan einige Std. nach dem Tode (ca. 5 min. Durchmesser). Am lebenden Taubenaugen erlischt nach Applikation von Curare oder Atropin der Lichtreflex, bevor die maximale Mydriasis eingetreten ist. (PFLÜGERS Arch. d. Physiol. **207**. 92—103. Jena, Physiol. Inst.) WOLFF

Paul Held, *Allional-Roche, ein schmerzstillendes Beruhigungs- und Schlafmittel*. Allional-Roche (Herst. HOFFMANN-LA ROCHE u. Co., Basel) ist eine Kombination des Phenyl dimethylaminodimethylpyrazolons mit der Isopropylpropenylbarbitursäure.

bewährte sich als Schlafmittel ohne unangenehme Nebenwirkg. (Dtsch. med. Wchschr. 50, 1801. 1924. Berg-Dievenow.) FRANK.

Karl Hajós, *Über einen Fall von anaphylaxieähnlichen Nebenerscheinungen nach Oprotin-Einspritzungen.* Zur Vermeidung von Anaphylaxiegefahr sollte bei Behandlung mit Novoprotininjektionen schon am 6.—9. Tage mit vorausgehenden sensibilisierenden Injektionen begonnen werden. (Klin. Wchschr. 4. 120. Budapest, v.) FRANK.

Johannes v. Mócsy, *Die Behandlung einiger Hautkrankheiten der Hunde mit Staphylo-Yatren.* Staphylo-Yatren bewährte sich bei der Behandlung von Hautkrankheiten der Hunde, besonders der Akne u. dem nässendem Ekzem. (Dtsch. ärztl. Wchschr. 33. 20—21. Budapest, Tierärztl. Hochschule.) FRANK.

Georg-Dietrich Koehler, *Zur Reargonbehandlung.* Vf. berichtet über wenig stige Erfahrungen bei der Behandlung weiblicher u. chron. männlicher Gonorrhoe mit Reargon, von dessen Verwendung er bis auf weiteres Abstand nimmt. (Dtsch. med. Wchschr. 50. 1802—3. 1924. Zittau, Stadtkrankenh.) FRANK.

Samuel Leites, *Die Bedeutung einiger Elektrolyte für den Mechanismus der gerengerenden Wirkung des Adrenalins.* (Ztschr. f. d. ges. exp. Medizin 44. 319 327. — C. 1924. II. 2494.) WOLFF.

Bruno Mendel und Werner Engel, *Über die Milchsäurebildner beim Magenkarzinom.* Vf. trennten den Mageninhalt von Carcinomkranken in ein bakterienfreies Filtrat u. in seine festen Bestandteile einschließlich der Mikroorganismen. Nach Traubenzuckerzusatz wurde das Material in bestimmten Zeitabständen untersucht. In dem traubenzuckerhaltigen bakterienfreien Filtrat nahm der Milchsäuregehalt in wenigen Std. um das mehrfache zu, in dem bakterienfreien Teil trat keine wesentliche Säurevermehrung auf. Der Traubenzuckergehalt nahm nur im bakterienfreien Anteil beträchtlich ab. Die Mikroorganismen, einschließlich der „typischen Bacillen“ sind nicht die Milchsäurebildner im Inhalt des carcinomatösen Magens. Die B. von Milchsäure dürfte auf die Wrkg. eines von den Carcinomen gebildeten Fermentes zurückzuführen sein. (Klin. Wchschr. 4. 119—20. Berlin, Univ.) FRANK.

F. Pharmazie. Desinfektion.

P. van der Wielen, *Die „Extempore“-Bereitung von Ampullen mit sterilen Flüssigkeiten.* Angabe einer prakt. Arbeitsvorschrift. (Pharm. Weekblad 62. 79—86. Amsterdam, Univ.) GROSZFELD.

A. S. Wilson-Jones, *Die industrielle Herstellung des Insulins.* Beschreibung in Verb. mit der Firma Allen and Hanbury Ltd. auf dem Grundstück der British Drug Houses eingerichteten Fabrikation mit Abb. der techn. Apparatur. (Chem. Age 12. 102—4.) SPIEGEL.

Dispersoid Syndicate Limited, England, *Kolloidale Elektrolyte in Suspension haltende Lösungen oder Emulsionen.* (F. P. 572454 vom 30/10. 1923, ausg. 6/6. 1924. D. Prior. 31/10. 1922. — C. 1924. II. 1011 [D. R. P. 392813].) KAUSCH.

The Governors of the University of Toronto, übert. von: **Frederick Banting und Charles Herbert Best**, Toronto, Ontario, und **James Bertram Macleod**, Edmonton, Alberta, Canada, *Herstellung von Insulin.* Pankreasdrüsen werden in einem Lösungsm., wie A., behandelt, um die schädliche Wrkg. der Enzyme das Hormon zu verhindern, alsdann aus den Lsgg. soweit als möglich die Proteine u. Salze durch Fällung entfernt u. gegebenenfalls noch etwa anwesende Hormon verunreinigende Begleitstoffe aus der filtrierten Lsg. durch Wiederfällung der Fällung beseitigt. — Z. B. wird frische Ochsenpankreasdrüse zerkleinert

u. mit dem gleichen Vol. ca. 95%ig. A. vermischt, die Mischung ausgepreßt, filtriert das alkoh. Filtrat mit weiteren Mengen A. versetzt u. mehrere Stdn. unter zähem Umrühren stehen gelassen. Hierbei wird der größere Teil der in I. befindlichen Eiweißstoffe gefällt; der Nd. wird abfiltriert u. das Filtrat, nach Zugabe einer 4%ig. wss. NaHCO_3 -Lsg. als Pufferstoff (auf je 5 L Filtrat $\frac{1}{2}$ ccm der Salzlsg.), zwecks Aufrechterhaltung einer pH zwischen 4—7, bei ca. 30% Vakuum dest., um eine konz. wss., von A. freie Lsg. zu erhalten. Durch 2malige Extraktion der konz. Lsg. mit Ä. werden die Lipoidstoffe entfernt, der Ä. mechanisch abgetrennt u. die Lsg. erneut im Vakuum konz. Durch Zugabe von A. wird eine 80%ig. alkoh. Lsg. hergestellt, gründlich geschüttelt, wobei der größere Teil der Salze ausgesalzen u. noch weitere Mengen von Proteinen ausgefällt werden. Man zentrifugiert alsdann das Gemisch, worauf sich 4 verschiedene Schichten in dem Reagenzrohr bilden. Die oberste völlig klare Schicht enthält die alkoh. Lsg. des wirksamen *Hormons* (*Insulins*), die darunter befindliche zweite Schicht enthält Flocken von Protein, die nächstfolgende eine wss. gesätt. Salzlsg. u. die unterste besteht aus Salzkristallen. Die oberste Schicht wird abgezogen u. mit einigem Voll. 95%ig. A. versetzt, um noch etwa anwesende Verunreinigungen aus dem Hormon auszufällen. Man saugt ab, dest. aus dem Filtrat den A. ab u. löst das zurückbleibende Hormon in dest. W. Die entstandene wss. Lsg. wird schließlich durch Dest. im Vakuum bei 15° auf die gewünschte Konz. eingedampft, das Konzentrat durch ein Berkelandfilter filtriert, zwecks Sterilisierung, u. mit einem Konservierungsmittel, wie einer höchstens 7%ig. Trikesollsg., versetzt. — In ähnlicher Weise erfolgt die Gewinnung des *Hormons* aus der *Pankreasdrüse* von *Knorpelfischen* oder aus den *Langerhansschen Inseln* von *Knochenfischen*. Z. B. wird die frisch entnommene, zerkleinerte Drüse mit dem gleichen Vol. 96%ig. A. versetzt, das Gemisch einige Stdn. bei niedriger Temp. stehengelassen, die Fl. abdekantiert, der feste Rückstand zu einem feinen Brei vermahlen, dieser allmählich mit der wss. Lsg. versetzt u. mit ihr innig durchmischt, das Gemisch ausgepreßt, der Preßsaft filtriert, der Preßrückstand erneut mit 50%ig. A. extrahiert, ausgepreßt, filtriert u. die beiden alkoh. Filtrate vereinigt. Nach Abdest. des A. wird die wss. Lsg. durch Extraktion mit Ä. von den Lipiden befreit, die klare lipoidfreie wss. Lsg. von der äth. Schicht getrennt u. in einem geräumigen Becherglas unter ständiger Bewegung auf dem sd. Wasserbade 3 Min. auf 70—75° erwärmt. Hierbei scheidet sich das Protein als flockiger Nd. ab, u. der in die wss. Lsg. etwa übergegangene Rest Ä. wird gleichzeitig entfernt. Die erkaltete wss. Lsg. wird erst durch Papier u. dann, nach Sterilisation, durch ein Berkelandfilter filtriert. Die Prodd. finden bekanntlich therapeut. Verwendung bei Zuckerkrankheit. (*A. P.* 1469994 vom 12/1. 1923, aus *9/10. 1923. Can. P.* 234336 vom 15/1. 1923, ausg. 18/9. 1923. *E. P.* 203778 vom 13/6. 1922, ausg. 11/10. 1923.)

SCHOTTLÄNDER

The Governors of the University of Toronto, übert. von: **Peter Joseph Maloney und Donald M. Findlay**, Toronto, Ontario, Canada, *Herstellung von Insulin aus Pankreasdrüsen von Säugetieren oder aus entsprechenden Drüsen von Knorpel- und Knochenfischen*. Man extrahiert die Drüsen mit geeigneten Lösungsmitteln, fällt aus dem Auszug das wirksame Hormon mit $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$, löst den Nd. in W. auf, fällt das Hormon mit *Benzoessäure* als *Adsorptionsverb.* aus. Folgende Beispiele sind angegeben: Frische *Pankreasdrüsen* von Säugetieren werden zerkleinert u. mit dem gleichen Vol. sd. W. vermischt, das das wirksame Hormon extrahiert. Der wss. Auszug wird ca. 5 Minuten bei 85—100° gehalten, dann allmählich auf 10° abgekühlt u. stehengelassen. Hierbei werden die Proteine auskoaguliert u. abgeseiht, wie Trypsin, Erepsin u. Oxydasen, zerstört. Die beim Stehen des wss. Auszuges abgeschiedene Lipode werden entfernt u. die Mischung filtriert. Je 1 ccm des Filtrats wird mit 100 ccm einer 25%ig. Na-Benzoesäurelsg. u. 25 ccm konz. HCl

ent versetzt, wobei sich ein Nd. von *Benzoessäure* in fein verteilter Form ab-
 scheidet u. das *Hormon* als *Adsorptionsverb.* mit niederreißt. Der abfiltrierte oder
 ausgeschleuderte Nd. wird mit einer wss. Benzoessäurelsg. nachgewaschen. Nach
 Trocknen erhält man ein von schädlichen Begleitstoffen freies pulverförmiges
 Pulver, das unter sterilen Bedingungen u. niedrigen Temp. die Hormonwrkg.
 fast gänzlich beibehält. Der ausgewaschene Nd. wird nun mit 80% ig. A.
 versetzt, wobei die Adsorptionsverb. gel. wird. Man läßt zur Absetzung indifferenten
 Bestandteile die Lsg. stehen, filtriert, entfernt aus dem Filtrat den größten Teil
 A. durch Kochen u. schüttelt es mit W. u. Ä. aus. Beim Stehen scheiden
 sich zwei Schichten ab, von denen die untere wss. das Hormon in konz. u.
 wässriger Form u. die obere äth. die Benzoessäure enthält. Nach Abtrennung der
 äth. Schicht wird sie mit Ä. nachgewaschen, der Ä. abgedampft u. die wss.
 Lsg. durch Filtrieren durch ein Berkelandfilter sterilisiert. Zur Extraktion der
 verkleinerten Pankreasdrüse kann man auch A., CH_3OH , Holzgeist u. Aceton ver-
 wenden. — Man vermischt gemahlene Pankreasdrüse mit einer 10% ig. CuSO_4 -Lsg.
 etwas konz. HCl zur Verhinderung der Extraktion von Proteinen u. anderen
 löslichen Bestandteilen aus der Drüse u. gibt 80° w. W. zu dem Gemisch. Nach
 Extraktion der wss. Lsg. wird das gleiche Vol. einer gesätt. $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ -Lsg. zu-
 gesetzt, der feste Nd. abfiltriert, in dest. W. gel. u. die Lsg. getrennt mit Na-
 zoat u. HCl versetzt, wobei sich die *Benzoessäureadsorptionsverb.* des *Hormons*
 in fester Form abscheidet. Diese wird wie oben gereinigt u. weiterarbeitet. (A. P.
 10024 vom 12/1. 1923, ausg. 9/10. 1923. Can. P. 234337 vom 15/1. 1923, ausg.
 10. 1923.)

SCHOTTLÄNDER.

Chlorit Chemische Fabrik Akt.-Ges., Berlin-Lichterfelde, *Herstellung von*
Naphthensaurem Lithium, dad. gek., daß man Naphthensäuren einerseits u. Li oder
 Kbb. des Li andererseits nach den für Salzbildung in Betracht kommenden
 Methoden aufeinander einwirken läßt. — Man versetzt z. B. eine h. Li_2CO_3 -Lsg.
 teilweise mit der berechneten Menge Naphthensäure, kocht bis zur Beendigung
 des CO_2 -Entw. u. dampft die Lsg. ein, bezw. dampft eine durch Neutralisieren von
 LiOH mit Naphthensäure erhaltene Lsg. ein, bezw. versetzt wasserfreie Naph-
 thensäure bei niedriger Temp. anteilsweise mit metall. Li. Das salbenförmige
Naphthensaure Li wird sehr leicht von der Haut resorbiert u. findet therapeut. Ver-
 wendung bei Gicht u. ähnlichen Krankheiten. In mineral., tier. u. pflanzlichen
 Ölen u. Fetten, wie Olivenöl, Ricinusöl, Lanolin, Vaseline, Paraffin, sowie in öl-
 igem NH_4 u. Harzseifen ist es l. oder mit diesen Stoffen in jedem Verhältnis
 mischbar. Man verwendet es entweder als Salbe oder Öl zu percutanen Einrei-
 ben oder in Olivenöl gel. zu subcutanen Injektionen. Ferner kann es auch in
 w. oder alkoh. Lsg. oder mit Zusätzen, wie Salicylsäure oder schmerzstillenden
 Mitteln zur Anwendung gelangen. (D. R. P. 404697 Kl. 12o vom 10/5. 1921, ausg.
 10. 1924.)

SCHOTTLÄNDER.

John W. Turrentine, Washington, Columbia, V. St. A., *Herstellung von sämt-*
lichen Inhaltsstoffe von Meeresalgen in unveränderter beständiger Form enthaltenden
Trockenpräparaten. Man trocknet die Meeresalgen möglichst schnell, bei solchen
 Topp., daß die therapeut. wertvollen u. für Ernährungszwecke verwendbaren Be-
 standteile in leicht assimilierbarer, unveränderter Form erhalten bleiben u. die ge-
 wöhnlichen Trockenpräparate in Ggw. von W. gelatinieren. — Als Ausgangsstoff
 hat vorzugsweise *Riesentang* „*Macrocystis pyrifera*“. Während der Trocknung
 muß die Temp. unterhalb des Kp. des Pflanzensaftes gehalten werden. Anderer-
 seits darf die Trocknung nur soweit erfolgen, daß die Algen noch 1—5% Feuchtig-
 keit enthalten, um eine Karamelisierung der Kohlenhydrate, sowie den Verlust der
 Gelatinierfähigkeit zu verhindern. Richtig getrockneter Tang ist lange Zeit unver-
 ändert haltbar u. schwillt beim Eintauchen in W. zu seinem ursprünglichem Vol.

auf. Nach der Trocknung werden die Algen in geeigneter Weise pulverisiert. Das Pulver kann mit Glucose, Gummi arabicum oder Na-Alginat vermischt werden u. eignet sich in dieser Form als Ersatz für *Tafelsalz* oder kann mit *Senf*, *Selleriasamen*, *Pfeffer* oder ähnlichen *Gewürzen* verwendet werden, sowie als Zusatz zu *Gebäck*. Ferner eignet es sich als Bindemittel für *Arzneimitteltabletten*. Es findet auch infolge seines Gehaltes an organ. gebundenem J, vorzugsweise bei der Behandlung von *Kropf* therapeut. Verwendung. (A. P. 1513298 vom 11/1. 1924 ausg. 28/10. 1924.)

SCHOTTLÄNDER

G. Analyse. Laboratorium.

Friedrich Holtz und **W. H. F. Kuhlmann**, *Die Ultrawage*. Vff. haben ein Mikrowage konstruiert (Abbildungen im Original), die der Preglschen Forderung einer Genauigkeit beim Wägen von einem Mikrogramm ($= 0,001$ mg) entsprechen soll. Die Empfindlichkeit der Wage ist um eine Dezimale vergrößert, um $1/100$ -Milligramme sicher festlegen zu können. Vor dem großen Reiterlineal für den 5-mg-Reiter ist ein kürzeres zweites Lineal angebracht, auf dem mit einem 0,5-mg-Reiter (Al) die $1/100$ mg festgelegt werden können. Am unteren Teil des Zeigermechanismus befindet sich eine weiße Scheibe mit einer in $1/20$ mm geteilten Skala, deren Schwankungen mit einem Mikroskop fixiert werden. Die Festlegung der $1/10$ -Mikrogramme erfolgt genauer als die der ganzen Mikrogramme auf der alten Mikrowage. Bei einer Belastung von 20 g beträgt die Genauigkeit 5×10^{-8} . Der Vorzug der Ultrawage besteht unter anderem in der Möglichkeit, mit sehr viel geringeren Substanzmengen wie bisher noch stimmende Analysen machen zu können, was besonders für biolog. Zwecke recht erwünscht sein dürfte. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58. 266—68. Würzburg, Univ.)

HORST.

B. Whiddington und **F. A. Long**, *Notiz über die Anwendung des Ultramikrometers bei der Mikrowage*. Die zwecks Anwendung des Ultramikrometers bei einem Mikrowage System PETTERSSON durchgeführten Verss. deuten darauf hin, daß bei der langsamen Schwingungsmethode hätte angewandt werden können, Änderungen von 10^{-9} g u. weniger in einem Gewicht von ca. 0,2 g der Messung zugänglich gewesen wären. Vff. schließen aus den prakt. Schwierigkeiten, daß die Vorr. im Gebrauch nicht genügend einfach ist um allgemein nützlich zu sein. Abgesehen hiervon ist die Wage nicht empfindlich genug für die Zwecke, wofür sie ursprünglich vorgesehen war. (Philos. Magazine [6] 49. 113—21. Leeds, Univ.) K. WOL.

Arthur George Milligan, *Eine zuverlässige Schüttelmaschine*. Bei dem hauptsächlich von C. MENKENS konstruierten App. ist der Flaschenträger wagerecht auf 4 senkrechten, federnden Latten aus Eschenholz von ca. 1 m Länge tischartig angebracht. Das durch einen Motor von $1/16$ PS. angetriebene Schüttelwerk greift auf dem Flaschenträger an. Bei annähernder Übereinstimmung von Schütteltempo und freier Schwingungsdauer der Apparatur ist der Kraftverbrauch sehr gering. Abbildung im Original. (Journ. Chem. Soc. London 125. 2674—75. 1924.) HERTEL.

Ernst Joël und **Rudolf Schönheimer**, *Studien zur vitalen Fettfärbung*. 0,1 g mit Sudan III gesätt. Fett, einer Maus per os gegeben, bewirkt in 6 Stdn. leuchtende Rotfärbung des Fettes im ganzen Körper, schwächer, aber auch deutlich wirkt der Farbstoff bei Verfütterung für sich, stärker wieder in Lsg. von Na-Desoxycholat. Der Farbstoff wird in allen Fällen in Galle u. Harn (hier wahrscheinlich an Glucuronsäure gebunden) ausgeschieden. Aus den Befunden ergibt sich, daß der Farbstoff nicht zur Charakterisierung von neu resorbiertem Fett verwendet werden kann. (Zentralbl. f. allg. Pathol. u. pathol. Anat. 34. 625—28. Berlin, Krankenh. Moabit; Ber. ges. Physiol. 28. 347. 1924. Ref. v. MÖLLENDORFF.) SPIEGEL.

Adolf Richter, *Maßanalytische Studien über den Einfluß von Salz- und Alkoholsäuren*.

ward sowie Temperaturveränderung auf das Umschlagsgebiet einiger Indicatoren die Ausschaltung der hierdurch bedingten Abweichungen bei acidimetrischen Titrationen. An den Beispielen dreier Indicatoren: Dimethylaminoazobenzol, Tetrabromphenolsulfonphthalein u. Phenolphthalein wird anschließend an die Unters. über die Einflüsse der Temp., des Salz- u. Alkoholzusatzen auf das charakterist. Umschlagsintervall die Durchführung von „Indikatorkorrekturen“ auf dem Gebiet der Acidimetrie u. Alkalimetrie gezeigt. Bzgl. der theoret. Erörterungen, besonders auf Grund der neueren Arbeiten anderer Forscher sei neben dem Original auf die Zusammenfassungen der systemat. Indicatorenkunde von THIEL (vgl. Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. **136**. 406; C. **1924**. II. 2385) hingewiesen. — Die Best. der Dissoziationskonstante nach der modifizierten Methode von FRIEDENTHAL-SALM führte für Dimethylaminoazobenzol (Dimethylgelb) zu dem Mittelwert $1,22 \times 10^{-11}$. Der von S. M. gefundene u. vom Vf. auf 20° berechnete Wert liegt in guter Übereinstimmung mit $1,24 \times 10^{-11}$. Über den Einfluß von Neutralsalz auf die Dissoziationskonstante u. Vf., daß in Salzgegenwart schon geringere p_H als in reinem W. genügt, um die bestimmte Rotfärbung hervorzubringen. Aus der Farbgleichheit zweier mit Indicator versetzter Lsgg. kann man nicht ohne weiteres auf gleichen Gehalt an Ionen schließen. Ein Vergleich setzt reine wss. Lsgg. oder Salzlsgg. gleicher Konz. voraus. Die Dissoziationskonstante des Dimethylgelbs wird durch Erhöhung der Temp. gesteigert. Die beobachtete p_{OH} -Differenz beträgt etwa 1,0 zwischen 20 u. 75°. Diesen abweichenden Einflüssen wird durch Korrekturen (siehe Tabellen im Original) Rechnung getragen, die mit negativen Vorzeichen anzubringen sind. Mit dem CO_2 -Gehalt der Lsgg. ändert sich die Indikator Korrektur fast geradlinig; der Einfl. von Neutralsalzen ist der Einfluß der CO_2 stärker als in reinem W. Als Indikatorkorrekturen sind die Mengen 0,1-n. HCl bzw. H_2SO_4 in ccm angegeben, die zu 100 ccm mit 0,5 ccm Indicatorlsg. versetzter CO_2 -Lsg. zur Erzielung des Standardtones hinzugegeben werden müssen. Solange Säure zugegeben werden muß, tragen die Korrekturen negatives Vorzeichen. Muß mit Lauge zurücktitriert werden, so muß an der Säure eine entsprechende positive Korrektur angebracht werden.

Die Best. der Dissoziationskonstante von Tetrabromphenolsulfonphthalein (Bromtholblau) lieferte den Wert $8,5 \times 10^{-5}$, entsprechend $p_H = 4,07$. Der Neutralisatoreinfluß ist sehr groß, besonders bei kleinen Konz. Vf. widerspricht der Ansicht KOLTHOFFS, daß von der Salzkonz. 0,5-n. ab der Salzfehler des Indicators konstant sei. Die Abhängigkeit des Umschlagintervalls von der Temp. ist sehr groß. Für Temp. zwischen 20 u. 75° sind die entsprechenden Korrekturen ermittelt. Verf. zur Bereitung prakt. brauchbarer Standardlsgg. werden mitgeteilt. Der Einfluß der CO_2 ist wie bei Dimethylgelb gleich groß. Für Carbonat-Säuretitrationen ist das dort beschriebene Verf. auch hier vorteilhaft. Für die Verss. mit Alkoholzusatz wird eine neue Standardlsg. empfohlen. Der Umschlag in alkoh. L. ist reiner von Blau nach Gelb als in wss. Lsg. Der Dichromatismus fällt weg. Es werden „Alkoholkorrekturen“ bezogen auf 0,1-n. HCl mitgeteilt. Bei einem A.-Gehalt von 50% liegt ein Minimum vor, was durch Übereinanderlagerung der Kurven, welche die Herabsetzung der Dissoziationskonstante mit steigendem A-Gehalt u. die Zurückdrängung der Ionisationskonstante des W. wiedergeben, erklärt ist. Die Einflüsse der Temp. sind in der alkoh. Lsg. analog wie in wss. Lsg. Entsprechende Korrekturen sind ermittelt u. in Tabellen mitgeteilt.

Die Indikatorkorrekturen für Phenolphthalein wurden bei 20 u. 75° bestimmt. Bei erhöhter Temp. wird Phenolphthalein unempfindlicher für OH-Ionen u. macht sich der Neutralsalzeffekt im Sinne größerer Empfindlichkeit des Indicators gegen OH-Ionen geltend. Alkoholzusatz übt einen ungünstigen Einfluß aus. Erhöhungen der Temp. in alkoh. Lsgg. bewirken den umgekehrten Effekt wie in W. Die Alkohol-

korrekturen für Lsgg. bis zu 90% A. sind bei 20 u. 75° bestimmt, auf 0,1-n. Na bezogen u. von der verbrauchten Lauge abzuziehen.

Im Vergleich mit den bisherigen Erfahrungen ist die Übereinstimmung mit vorliegenden Ergebnissen recht allgemein. Der Gang der Indikatorkorrektur verläuft entsprechend dem Massenwirkungsgesetz in dem erwarteten Sinne, daß Sa. Zusatz eine Erhöhung der Dissoziationskonstante des Indicators zur Folge hat. Wenn einem bas. Indicator Säure oder zu einem sauren Indicator Base gegeben werden, so ist dieser Vorgang eine Salzbildung, bzw. Hydrolyse, für welche die bekannten Beziehungen maßgebend sind. Da Bromphenolblau nach seiner Dissoziationskonstante eine fünfmal so starke Säure ist als Essigsäure u. daher in rein wss. L. einen tiefer blauen Farbton trägt als den beiden farbigen Formen im Verhältnis 1 : 1 entsprechen würde, muß, um den Dissoziationszustand der Indicatorsäure entsprechend zurückzudrängen, eine gewisse Menge Säure zugesetzt werden. Da die Erhöhung der Temp. eine dem Neutralsalzeffekt entgegengesetzte Wrkg. ausübt, wächst die Hydrolyse des Indicatorsalzes. So verbraucht eine wärmere Lsg. Base Dimethylgelb mehr Säure, dagegen Phenolphthalein mehr Lauge. Nur bei Bromphenolblau liegen die Verhältnisse etwas anders. Hier wird weniger Säure benötigt. Entsprechend der mit steigender Temp. von links nach rechts fortschreitenden Gleichgewichtsverschiebung: $\text{Ind.}' (\text{blau}) + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H} \cdot \text{Ind.} (\text{gelb}) + \text{OH}^-$ wird bei erhöhter Temp. bereits durch geringere pH als bei gewöhnlicher Temp. die dem grünlichen Standardton entsprechende Färbung erreicht. Die Indikatorkorrekturen, die durch den Einfluß von A. nötig werden, sind von ähnlichen Beziehungen abhängig, wie sie bei der Veränderung der Temp. im Zusammenhange mit den Hydrolysevorgängen wahrgenommen wurden, nur daß die Konstanten von W. u. Indicatorsäure hier durch Ggw. von A. kleiner werden. Die in stark alkalischer Lsg. bei höherer Temp. eintretende Verminderung der Laugenkorrektur, läßt einen Rückgang der Hydrolyse des roten Indicatorsalzes schließen. (Ztschr. f. analyt. Chem. 65. 209—45. 1924. Leipzig, Univ.)

HORST

Elemente und anorganische Verbindungen.

N. K. S., *Die Analyse von Ammoniumpolysulfidlösungen.* Man verd. zunächst 20 ccm der Lsg. auf 1 Liter mit frisch gekochtem W. u. bestimmt NH_3 u. Sulfid-schwefel wie üblich, jenes durch unmittelbare Titration, diesen jodometrisch. Der Polysulfidschwefel ist der Unterschied zwischen dem Gesamt-S u. dem Sulfidschwefel. Je höher das Verhältnis Gesamt-S zu Sulfidschwefel ist, um so weniger beständig ist im allgemeinen die Lsg. Zur Best. des Gesamt-S gibt man 25 ccm der verd. Lsg. (s. o.) zu einem Gemische von 20 ccm 10raum-%ig. H_2O_2 u. 10 ccm N. (D. 0.88) u. läßt einige Minuten stehen, bis die gelbe Färbung verschwunden ist, dann engt man ein u. neutralisiert genau mit n. Säure u. mit Methylrot als Indicator (a ccm); dann gibt man 20 ccm n. NaOH zu, kocht wieder ein u. titriert das überschüssige Alkali mit n. Säure (b ccm). Der Unterschied $b - a$ entspricht dem Gesamt-S; 1 ccm n. NaOH = 0,016 g S. Die danach erhaltenen Ergebnisse stimmen mit der Gewichtsanalyse gut überein, erfordern aber viel weniger Zeit. Diese kann noch viel weiter abgekürzt werden, wenn man für die Best. des $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ die Formoltitration verwendet; die Ergebnisse sind dann nicht so genau wie nach dem ersten Verf.; die Abweichungen halten sich aber zwischen 0,2—0,3%, wenn man eine $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ -Lsg. als Vergleichslsg. nimmt. (Bulletin Nr. 13. 2. 129—30. 1924. London, von MURPHY & SON, Ltd. Bureau of Bio-Technology. London, Leeds, Nottingham. Sep.)

RÜHLE

W. S. Shaw, *Anwendung der Formoltitration auf die Bestimmung des Stickstoffs nach Kjeldahl.* Nach Feststellung der Eignung der Formoltitration unter den vorliegenden Bedingungen u. der Ausarbeitung der besten Arbeitsvorschriften hierf.

Vf. den Arbeitsgang an. Danach werden, wenn genügend Substanz vorhanden ist, 0,5—1 g wie üblich verbrannt (CuSO_4 als Katalysator); die abgekühlte Fl. setzt man mit 50 ccm W. u. vertreibt SO_2 durch Aufkochen. Dann neutralisiert vorsichtig gegen Lackmuspapier mit 40%ig. NaOH , so daß die Lsg. gerade sauer bleibt, kocht auf zur Entfernung der CO_2 aus der Lauge u. verd. auf 100 ccm. Zur Vornahme der Titration muß die Lsg. nun genau nach besonderer Vorschrift neutralisiert werden, je vor u. nach Zugabe des Formaldehyds: als Indikator dient Phenolphthalein. Liegt nur 0,05—0,1 g Substanz vor, so sind die Vorschriften für die Mikroanalyse (vgl. LING u. PRICE, Journ. Soc. Chem. Ind. **41**, 49; C. **1922**. IV. 609) zu verwenden. Auch hier ist die Formoltitration anwendbar. (Analyst **49**. 558—65. 1924. Birmingham.) RÜHLE.

G. van B. Gilmour, *Invertzucker als ein Reagens bei Borsäurebestimmungen*. Vorzüge des Invertzuckers hierfür, die Vf. fand (Analyst **46**. 3; C. **1921**. 360), sind seitdem im Schrifttum mehrfach bestätigt worden (vgl. MELLON u. ERIS, Ind. and Engin. Chem. **16**. 123; C. **1924**. I. 1695). Vf. empfiehlt, die Inversion mit H_2SO_4 u. nicht mit HCl vorzunehmen, weil bei Unters. von Butter u. Margarine auf NaCl u. B_2O_3 in derselben Lsg. untersucht werden muß. (Analyst **57**—58. 1924.) RÜHLE.

Edwin Eegriwe, *Reaktionen zum Nachweis von SO_2 , NO_2 und einigen Säuren*. Die hier mitgeteilten Verff. beruhen auf der B. von flüchtigen Verbb. — Zum Nachweis gasförmiger SO_2 wird das Zinknitroprussidreagens dargestellt, indem man eine Lösung von Natriumnitroprussid mit Zinksalz fällt u. mit W. gründlich auswäscht. Eine dünne Schicht des Reagenses am Glasstab wird zunächst NH_3 -Dämpfen ausgesetzt u. dann der zu prüfenden SO_2 -Atmosphäre, wodurch die Reagentenschicht bis dunkelrot gefärbt wird. Es waren so in 5 ccm Na_2SO_3 -Lsg. noch 0,0037 mg SO_2 nachweisbar. Das Zinknitroprussidreagens ist hundertmal empfindlicher als Natriumnitroprussidreagens. — Zum Nachweis von NO_2 u. Nitriten dient ein Benzidindreagens aus einer Lsg. von 1 g Benzidinchlorid in 100 ccm H_2O u. 0,04 g Naphthol in 100 ccm H_2O . Auch zum Nachweis von NO_2' neben NO_2 eignet sich diese Rk. am Glasstab. — Als Reagens für Silicate u. Fluoride eignet sich eine 20%ig. wss. Lsg. von Ammonmolybdat, die durch Aufnahme von SiF_4 gelbfärbt wird. Die auf Kieselsäure zu prüfende Substanz wird mit der dreifachen Menge CaF_2 vermischt u. im Bleitiegel mit konz. H_2SO_4 versetzt. Ein Tropfen Reagens an gebleichtem Papier färbt sich vollständig gelb. H_2S darf nicht zugegeben werden. Ebenso lassen sich Fluoride nachweisen. (Ztschr. f. anal. Ch. **65**. 182—85. 1924. Riga, Univ.) HORST.

F. Feigl und **G. Krauß**, *Eine komplexchemische Methode zur volumetrischen Bestimmung der Acidität, Basizität und des Al-Gehaltes in Aluminiumlösungen*. (Vgl. Ztschr. Chem.-Ztg. **26**. 75; C. **1923**. IV. 385.) Wenn die Metalle leicht hydrolysierbarer Salze in stabile Komplexverbb. übergeführt werden können, in denen das betreffende Metall in maskierte, nicht hydrolysierbare Form übergeführt ist, wird eine quantitative Best. freier Säure darin möglich gemacht, da ja die ursprünglich vorhandene freie Säure auch noch weiterhin jodometr. titrierbar bleibt. — Als Komplexbildner für Al-Salze sind die Alkalioxalate geeignet, die beim Zusatz zu Al-Salzen Alkalisalze der Al-Oxalsäure, in welchen das Al komplex gebunden ist, bilden: $\text{AlCl}_3 + 3\text{K}_2\text{C}_2\text{O}_4 = \text{K}_3[\text{Al}(\text{C}_2\text{O}_4)_3] + 3\text{KCl}$. Aus einer nur hydrolysenfähigen Lsg. wird dann auf Zugabe von $\text{J}'\text{-SO}_3'$ -Lsg. kein Jod freigemacht. Spuren freier Säure geben aber schon positive Jodstärkerk. Man ist daher rasch in der Lage, die Acidität bzw. Basizität einer Al-Lsg. bei aufgehobener Hydrolyse zu bestimmen. — Die Best. freier HCl neben AlCl_3 erfolgt durch jodometr. Messung der restlichen Säuremenge („Restacidität“) nach Aufhebung der Hydrolyse durch Zersetzen des Komplexes. — Will man Al in sauren Lsgg. bestimmen, so ermittelt man

in gleichen Teilen zunächst die Gesamtacidität u. darauf jodometr. die Restacidität. Aus der Differenz wird der Al-Gehalt ($\text{ccm } \frac{1}{10}\text{-n. HCl} \times \text{Faktor } 0,00093$) rechnet. — Analyse von essigsaurer Tonerde (Basizitätsbest.): Der Al-Gehalt gravimetr. festgestellt, dann die Gesamtsäuremenge. Um den Betrag an O₂ bestimmen, wird mit Oxalat das Metall in Komplex übergeführt, ein abgemessener Überschuß $\frac{1}{10}\text{-n. HCl}$ zugefügt (etwa entsprechend dem Gesamtsäuregehalt) u. wie bei der Best. der Restacidität verfahren. Die Differenz zwischen gefundener u. angewendeter Menge HCl entspricht der bei der Komplexbildung frei gewordener Menge NaOH. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. **58**. 398—400. Wien, Univ.) HORS

Ludwig Moser und Alfred Brukl, *Die Trennung des Eisens und Aluminiums vom Mangan und Magnesium, sowie von Phosphorsäure mit Sulfosalicylsäure*. (Teilweiser Mitarbeit von **Ilona Vén.**) Wie für die Trennung von Fe^{III}, Al u. Mn schon mitgeteilt (vgl. Monatshefte f. Chemie **43**. 679; C. **1923**. IV. 79), ist die Sulfosalicylsäure in noch ausgedehnterem Maße zur Trennung auch anderer Metalle geeignet. Nach dem Verf. der Vff. kann Mn direkt neben Fe bestimmt werden, daß dieses vorher abgeschieden werden muß. Mn bildet im Gegensatz zu Fe keine beständige Komplexlsg. mit der Sulfosalicylsäure u. wird am besten als Ammoniumphosphat abgeschieden. Die Stärke der Komplexbindung ist von der Menge der angewandten Sulfosalicylsäure abhängig. Arbeitsvorschrift: Lsg. von Fe^{III} u. Mn^{II} mit 15—20 g festem NH₄Cl versetzen u. mit für je 0,5 g der O₂ 50 ccm Sulfosalicylsäure. Na₂HPO₄ unter Rühren zufügen, zuletzt tropfenweise NH₃. Zum Sieden erhitzt, fällt Mn(NH₄)PO₄ in feinen Krystallen. Im elektr. Feld in Pyrophosphat überführen. Im Filtrat mit H₂S das Fe fällen, gut waschen u. HCl wieder lösen u. mit NH₃ fällen. — Zur Trennung von Fe, Al u. Mn wird in Ggw. von Sulfosalicylsäure aus ammoniakal. Lsg. mit H₂S das Fe mit Mn abgeschieden u. wie oben getrennt. Al bleibt zurück in komplexer Lsg.

Die Methode ist auch geeignet zur Trennung des Mg von Fe u. Al. Mg fällt aus der komplexen Lsg. bei Siedehitze fällbar u. so direkt bestimmbar. Die Sulfosalicylsäure ammoniakal. Lsg. wird in der Siedehitze in einem Gusse gefällt, wodurch teilweises Mitfällen von Al verhindert wird. Das Verf. ist auch für kleine Mengen brauchbar u. erfordert keinen besonderen Zeitaufwand. — Auch zur Trennung der Phosphorsäure in Ggw. von Fe^{III} u. Al, ohne deren vorherige Abscheidung, kann das Verf. angewandt werden u. soll für Bestst. von P in manchen Al-Lösungen wegen seiner Billigkeit geeignet scheinen. Dagegen kann es die Citronensäuremethode nicht ersetzen. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. **58**. 380—85. Wien, Techn. Hochschule.) HORS

G. Luff, *Die Schwefelwasserstofftrennung von Cadmium und Zink*. Die Sulfide des Cd u. Zn, die gewöhnlich kolloidal ausfallen, können unter besonderen Bedingungen in krystallinen, dichten Formarten auftreten, die leicht filtrierbar u. mit W. auswaschbar sind. — CdS u. ZnS gelbe bis braune, rundliche bis 6-eckige Täfelchen u. Rosetten; makroskop. rotorangefarbige, staubige Trübung. Krystalline ZnS — beim Erhitzen der in der Kälte mit H₂S gesätt. sauren Fl. im Druckfläschchen auf 70—100°. Die Fällung von CdS, namentlich in kleineren Mengen, in der Kälte leichter als in der Wärme. Durch Zusatz freier HCl u. bei Anwesenheit von (NH₄)₂SO₄ (I) wird die Fällung in der Wärme stark begünstigt. NH₄Cl (II) wirkt entgegengesetzt. In H₂SO₄-Lsg. tritt keine Verschiebung des Fällungsbeginns durch I ein, dagegen eine Verzögerung oder Verhinderung durch II — nach Vf. infolge von B. komplexer Ammoniumcadmiumchloride. — ZnS-Fällung in HCl-Lsg. in der Wärme begünstigt, anscheinend durch Ausflockung des kolloidal gel. ZnS. Durch I eine geringe fördernde Wrkg.; bei Zusatz von II — Verzögerung. In H₂SO₄-Lsg. bei Zugabe von I in der Kälte u. in der Wärme eine raschere Abscheidung von ZnS; II wirkt auch hier entgegengesetzt.

Best. von Cd. — Nach Vf. das ausgefällte CdS samt Filter in den Einleitungs-
 en zurückgegeben, in 11 cem konz. HCl von 1,181 (bei 0,2 g Cd) unter Erwärmen
 Nach Vertreiben von H₂S filtriert u. h. ausgewaschen. Abdampfen auf 60
 70 cem, Neutralisieren k. mit konz. NH₃, Zusatz von 20 cem NH₃ von 0,910—0,915.
 ben mit 1 Stopfen u. 1 m langem Rohr verschlossen. Erhitzen auf 70°. Zu-
 fenlassen aus einer Bürette eine Lsg. von 2 g K₄FeCy₆ in 5—10 cem W. oder
 er in einer Lsg. von 7 g NH₄Cl. Zusatz von 20 cem NH₃ 0,915 in 100 cem W.
 erieren $\frac{1}{2}$ —1 Stde. bei 70°. Filtrieren nach Abkühlen durch einen Goochtiiegel,
 $\frac{2\frac{1}{2}}{100}$ ig. k. NH₃ waschen, bei 110° trocknen. — U. Mk. 4-eckige Tafeln,
 chmal wie hexagonale Prismen mit Basis. — Zus. *Ammoniumcadmiumferrocyanid*
 (serfrei), Cd(NH₄)₂FeCy₆. Die Methode liefert gute Resultate. Isomorphe Salze
 en unter den gleichen Bedingungen Ni, Co, Mn, wahrscheinlich auch Ca u. Mg.
 fällt in ähnlicher Weise als *bas. Ammoniumzinkferrocyanid*, (NH₄)₂Zn₂OFeCy₆,
 titativ aus. Hexagonale Täfelchen. — **Best. von Zn im Cd-freien Filtrat.** Als
 moniumzinkphosphat in der Kälte abgeschieden, nach 24 Stdn. filtriert u. als
 pyrophosphat gewogen. Vf. macht nähere Angaben über den Einfluß von
 r-Salzen auf die Zn-Fällung. Eine Fällung als ZnS u. Best. nach ROSE wäre
 einfachsten, wenn der Einfluß von NH₄-Salzen auf die ZnS-Fällung zahlenmäßig
 ant wäre. — Die Trennung von Cd u. Zn als Sulfide. Vf. untersucht die
 chiedenen Trennungsmöglichkeiten in HCl u. H₂SO₄-Lsg. mit u. ohne Zusatz
 NH₄-Salzen. Eine verlässliche Trennung durch H₂S in HCl-Lsg. (mit oder ohne
)₂SO₄) gelingt nur, wenn das Einleiten bei höherer Temp. in eine stärker salz-
 Lsg. beginnt u. nach allmählichem Zusatze der nötigen Menge W. bis zum
 alten fortgesetzt wird. Kleine Cd-Mengen fallen erst nach beendigter Verd. aus.
 gleiche gilt auch im wesentlichen für das Arbeiten in H₂SO₄-Lsg. — Vf. betont
 ieblich, daß die Trennung dann quantitativ durchführbar ist, wenn man auf
 alines CdS hinarbeitet u. außer der Temp. u. Säurekonz. auch einen möglichen
 nonsalzgehalt berücksichtigt. (Ztschr. f. anal. Ch. **65**. 97—109. 1924. Nürnberg,
 ere techn. Staatslehranst.)

TENNENBAUM.

A. T. Etheridge, Die Bestimmung von Cadmium in Messing. 5 g Messing
 den in 80 cem verd. H₂SO₄ (1 Vol. konz. H₂SO₄ + 3 Voll. W.) u. 7 cem HNO₃
 1,42) im 400 cem-Becherglas gel. Nach der Lsg. treibt man die nitrosen
 pfe aus, gibt 150 cem W. zu u. filtriert von etwa unl. PbSO₄ ab. In der Fl.
 a 200 cem) scheidet man zunächst Cu elektrolyt. nach Vf. (Analyst **49**. 371;
1924. II. 1834) ab. Die verbleibende Fl. enthält Cd, Zn neben As, Sb, Sn, Bi,
 Ni, Mn. Man raucht zunächst HNO₃ völlig ab, gibt 200 cem W. zu, neutrali-
 t mit verd. NH₃ (1:1) gegen Lackmuspapier u. säuert die etwa 300 cem be-
 ende Fl. mit je 7 cem verd. H₂SO₄ (1:3) auf 100 cem an u. fällt mit H₂S
 neller Strom $\frac{1}{2}$ Stde.). Man läßt über Nacht oder wenigstens 12 Stdn. stehen,
 iert den Nd., der noch Spuren Cu, Sn, As, Sb, Bi u. Zn enthalten kann u.
 cht mit 1%ig. NH₄NO₃-Lsg. nach. Man löst dann den Nd. in h. verd. Königs-
 ser (1 Vol. HNO₃ [D. 1,42] u. 3 Voll. HCl [D. 1,2] dazu 4 Voll. W.), kocht das
 rat, kühlt ab, macht schwach alkal. mit verd. NH₃ (1:1) u. leitet schnell H₂S
 3 Stde. ein. Der Nd. ist CdS neben wenig Zn u. Bi; man filtriert nach 2 Stdn.
 u. wäscht mit 1%ig. NH₄NO₃-Lsg. nach. Man löst den Nd. in 20 cem verd.
 IO₄, raucht ab, verd. auf 80 cem u. neutralisiert mit NH₃, säuert mit 7 cem verd.
 IO₄ auf 100 cem Fl. an u. fällt mit H₂S. Dann wird nochmals in alkal. Lsg. u.
 n in saurer Lsg. gefällt u. das CdS schließlich als CdSO₄ gewogen. Das Verf.
 zwar langwierig, aber die Reinheit des schließlich erhaltenen CdS ist gewährt
 n Verlaufe des Verf. etwa entstehende Verluste sind zu vernachlässigen. (Analyst
572—76. 1924.)

RÜHLE.

Bestandteile von Pflanzen und Tieren.

I. Boas, *Kann die Guajacprobe heutzutage als zuverlässige Methode für Nachweis von okkulten Blutungen angesehen werden?* Der vielfach herrschende Ansicht von der mangelnden Schärfe der Guajacprobe einerseits u. der übergr. Empfindlichkeit der Benzidinprobe andererseits kann in dieser allgemeinen fassung nicht beigestimmt werden. Wird bei der Guajacprobe der Blutfark aus dem Faeces mit Pyridin oder Chloral-A. fast vollständig herausgeholt, besteht kein wesentlicher Unterschied zwischen der Guajacprobe u. der Benzprobe nach GREGERSEN. (Klin. Wehschr. 4. 109—110. Berlin.) FRAN

Stefan Minovici und **Marie Iliesco**, *Die Bestimmung der Lipotide im serum Nervöser.* Während in n. Serum in naher Übereinstimmung mit den funden anderer Forscher der Gehalt an Gesamtcholesterin zwischen 1,30 u. 1. für 1000 ccm gefunden wurde, fand sich bei verschiedenen Nervenkrankheiten Verminderung unter 1 g. Ungefähr im Verhältnis dazu war auch das Unverbare X (durch Digitonin nicht bestimmbar) vermindert, während die Fettsä. annähernd n. waren (4—5,90 g in 1000 ccm). Diese Beobachtungen stützen die MINOVICI (vgl. Chem. News 129. 171; C. 1924. II. 2339) geäußerte Ansicht die physiol. Rolle des Cholesterins. (Bulet. Soc. de Chimie din România 6. 67-1924. Bukarest, Univ.) SPIEGE

Louis Desvergnés, *Über eine Fehlerquelle bei der Derrienschen Reaktion Nachweis von Aminonitrophenolen im Harn.* Die Rk. beruht auf B. eines blaß bis violettroten Farbstoffes, der in Ä. übergeht, mit β -Naphthol nach vorher Diazotierung. Es zeigte sich, daß sie bei Personen, die Jodsalze oder Jodpe. genommen haben, nicht direkt benutzt werden kann, da dann eine Grünfärb. eintritt (die zum Nachweis von Spuren J im Harn brauchbar scheint). In sol. Fällen muß der angesäuerte Harn vor der Diazotierung mit Chlf. erschöpft werden (Journ. Pharm. et Chim. [8.] 1. 56—59.) SPIEGE

Octave Bailly, *Anwendung der Reaktion von Denigès-Grimbert-Leclère Charakterisierung und Bestimmung von Adrenalin in den Nebennierenpulvern.* diesen Zweck ist die genannte Rk. am geeignetsten. Vf. benutzt sie dazu in gender Weise: 1 g Pulver wird mit 1 ccm n. H_2SO_4 , dann mit 5 ccm dest. W. setzt, nach $\frac{1}{4}$ Stde. Stehen unter häufigem Schütteln mit dest. W. auf 100 aufgefüllt, nach einer weiteren $\frac{1}{4}$ Stde. filtriert. 2 ccm des Filtrats werden einer Lsg. von 1 g Na-Acetat in 8 ccm W. gegeben, worauf nach Vermis. 3 Tropfen 5%ig. $HgCl_2$ -Lsg. zugegeben werden. Die entstehende rote Färb. eignet sich zur colorimetr. Best. (Journ. Pharm. et Chim. [7.] 30. 404—5. 1924.)

Amand Valeur und **Léon Launoy**, *Über den Wert des Index DM. für Prüfung der Arsenobenzole.* Der von DE MYTTENAERE (Journ. Pharm. de Belg. 5. 357. 373; C. 1923. IV. 516) als Kriterium für die Zus. der Arsenobenzole gestellte DM-Wert, der nach Art seiner Ermittlung ein Maß für den Gehal. mineral. oder leicht mineralisierbarem As wäre, ist nach den Unterss. der Vf. o. wesentliche Bedeutung, schon deshalb, weil selbst unter Einhaltung ganz ident. dingungen äußerst schwankende Werte auch bei demselben Präparat gewon. werden. Auch die Ermittlung des Verhältnisses N:As ist an nicht von gro. Werte, u. es liegt jedenfalls keine Veranlassung vor, nur eine obere Grenze di. Wertes festzusetzen. Alle chem. Methoden liefern nur ganz ungenügende Anp. punkte für die Qualität der Arsenobenzolpräparate, nur die physiol. Prüfung befriedigende. (Journ. Pharm. et Chim. [8.] 1. 5—22.) SPIEGE

W. W. Radzimowska und **M. C. Jazimirska**, *Über die Bestimmung Wasserstoffionenkonzentration in einzelnen Bakterienkolonien.* Vf. verwendeten speziell konstruierte Ansatzelektrode, mittels der es gelingt, die $[H^+]$ in einze.

terienkolonien, welche auf verschiedenartigen festen Nährböden, gewöhnlichem Agar, den Nährböden von ENDO, CONRADI-DRYGALSKI u. anderen wachsen, bestimmen. Es erscheint die Möglichkeit gegeben, bei der Variabilitätsforschung eine Kolonien von den festen Nährböden nicht nur auf Grund ihrer morphologischen Unterschiede, sondern auch nach ihrem abweichenden Biochemismus auszuwählen. (An. Wehschr. 4. 72—73. Kiew, Univ.) FRANK.

W. Straub, Wertbestimmung von Schilddrüsenpräparaten. Die Acetonitril-Rk. hinreichend genaue Werte, um Schilddrüsenpräparate rasch zu standardisieren. Einheit von Schilddrüsensubstanz wurde diejenige geringste Menge vorsichtig getrockneter Schilddrüse gewählt, die bei einmaliger innerlicher Beibringung eine 10%ig. Resistenz gegen Acetonitril verursacht. Vf. schlägt für die Normierung Schilddrüsen als Normalwert vor: 0,2 ccm einer 5%ig. Aufschwemmung vorzeitig getrockneter Schilddrüsen sollen bei einmaliger Gabe an Mäusen die Resistenz gegen die tödliche Minimaldosis von Acetonitril um etwa 100% erhöhen. (Sch. med. Wehschr. 51. 4—5. München, Univ.) FRANK.

P. Cheramy, Über eine colorimetrische Bestimmung von Novocainlösungen. Zur Bestimmung des Farbstoffes mit diazotiertem Novocain wird an Stelle des β -Naphthols, das durch Einw. des alkal. Mediums für sich eine in verd. Lsgg. von Novocain störende Verfärbung gibt, das K-Salz der Guajacolsulfosäure (Thiocol) benutzt, das dazu in 10%ig. Na_2CO_3 -Lsg. gel. wird. Die Färbung geht je nach Novocaingehalt der Lsg. von Rot bis Gelb. Orthoform u. p-Aminobenzoesäure geben unter den gewählten Bedingungen keine merkliche Färbung, Cocain u. Stovain sind ohne Einfluß. Adrenalin kann in stärkerer Lsg. im Laufe der Rk. durch Oxydation Rotfärbung hervorrufen, bei der als günstig gewählten Verd. von ca. 1:20000 stören die kleinen im Präparat zugesetzten Mengen nicht. Das den Lsgg. von Novocain u. Adrenalin zur Konservierung zugesetzte NaHSO_3 kann die Färbung nur bis zu 20% schwächen. Man vermeidet dies, indem man vor der Diazotierung 1 Tropfen 1/10-n. J-Lsg. zusetzt. Durch Alkali verändertes Novocain gibt bei der Probe keine sofortige Färbung. Man kann dadurch die Veränderungen messen, die Lsgg. infolge Alkalinität im Glase bei der Sterilisierung erlitten haben. (Journ. Pharm. et Chim. [7] 30. 11. 1924. Paris, Fac. de Pharm.) SPIEGEL.

E. C. M. J. Hollman, Wertbestimmung von Opialum. Zur Trennung der einzelnen Opiumalkaloide von Hydrochloras Alcaloideorum principalium Opii, enthaltend Nalcein-HCl 2, Thebain-HCl 4, Codein-HCl 5, Papaverin-HCl 8, NaCl 21, Narcotin-HCl 60, Morphin-HCl 100 Teile, verwendete Vf. Puffergemische u. fand, daß ein $p = 8,6$ beim Ausschütteln von Morphin am geeignetsten ist; Herst. des Puffers ist: 7 ccm Boraxlsg. + 3 ccm Borsäurelsg. mischen, 15 ccm Ä. zugeben u. dann nach Zusatz von 200 mg Opial 10 Min. kräftig schütteln, Ä. abgießen, nochmals mit 10, dann mit 5 ccm Ä. ausschütteln. Filtrierte Ä.-Lsg. mit 5 ccm W. auswachen, Ä. verdampfen, in 15 ccm 0,1-n. HCl lösen, mit 0,1-n. NaOH + 3 Tropfen Methylrotlsg. zurückfiltrieren, 1 ccm 0,1-n. NaOH = 75,9 mg Morphin. — Die Ä.-Lsg. wird dann mit 2 ccm NaOH (Sol. Hydrati natrici) stärker alkal. gemacht u. mit 10 ccm Ä. ausgeschüttelt, nötigenfalls (Probe mit MAYERS Reagens) nochmals mit 5 ccm W. gewaschen, abdest. u. Trockenrückstand bestimmt. Unters. dann eventuell mikrochem. — Genauere Einzelheiten des Verf. in der Quelle. (Pharm. Weekblad 62. 52—58. Amsterdam, Univ.) GROSZFELD.

H. Angewandte Chemie.

I. Allgemeine chemische Technologie.

Ewald Floß, Welche Treibriemenarten eignen sich für chemische Fabriken? Am besten eignen sich Gummiriemen, Kamelhaarriemen u. teilweise auch Chromleder-

riemen, wozu Vf. einige Erläuterungen gibt. (Gummi-Ztg. **39**. 337—38. 1924. Liehtanne i. S.) RÜHI

Hans Alemann, Winterthur (Schweiz), *Mittel für die Gewinnung mit W. emulgierbarer Öle*. Zur Herst. desselben wird *Ölsäure* bei Ggw. von mit beschränkt mischbaren Alkoholen durch Zusatz von Alkali neutralisiert, wobei den Wasserzusatz so bemißt, daß eine in Öl l. u. nicht gelatinierende Seife entsteht. — Diese ist ein vorzügliches Emulgierungsmittel für Öle u. andere in unl. Stoffe u. kann daher bei der Herst. von Schmiermitteln, Wasch-, Reinigungs- u. Desinfektionsmitteln usw. Verwertung finden. (Schwz. P. **107211** vom 1. 1923, ausg. 16/10. 1924. D. Priorr. 6/12. 1922 u. 12/6. 1923.) OELKE

Arnold Brandt, Charlottenburg, *Vorrichtung zum Regeln des Reaktionsverlaufs zwischen einer Fl. u. dem die Rk. herbeiführenden Stoff, gek. durch einen in Fl. rotierenden, kegelförmigen, heiz- oder kühlbaren Hohlkörper, der am ob. Ende von einer Vorr. zur Zuführung des die Rk. herbeiführenden Stoffes umgeben ist u. zum Durchmischen der Fl. dienende Bügel oder Rippen trägt.* (D. P. **408509** Kl. 12g vom 1/12. 1923, ausg. 20/1. 1925.) KAUSCH

Aktiebolaget Separator, Schweden, *Verfahren zur Verhütung schädlicher Reaktionen zwischen einer zentrifugierten Flüssigkeit und der atmosphärischen Luft*. Man führt in den Behälter, in dem die zentrifugierte Fl. gesammelt wird, ein neutrales Gas, wie z. B. CO_2 , ein. (F. P. **579069** vom 21/3. 1924, ausg. 9/10. 1925. Schwed. Prior. 29/6. 1923.) KAUSCH

Soc. Baudrey et Bergeron, Paris, *Filtrieren von Flüssigkeiten*. Es sind in den Filtern Vorr. angebracht, die die filtrierte Fl. zwingen, zurück durch das Filter zu strömen, ohne die n. Filtrierung aufzuhalten u. ohne eine Mischung der zurückfließenden Fl. mit der filtrierten Fl. zu gestatten. (E. P. **225524** vom 25/10. 1923. Auszug veröff. 21/1. 1925. Prior. 29/11. 1923.) KAUSCH

Air Reduction Company, Inc., New York, übert. von: **Claude C. van Nieuw**, Cranford, New Jersey, *Verflüssigung von Gasen*. Die Gasgemische werden komprimiert u. sodann verflüssigt, wobei die Mischungen in eine Vielzahl von Fraktionen zerlegt werden. Zum Kühlen der Gasgemische dienen k. Fraktionen. (A. P. **1521138** vom 19/3. 1921, ausg. 30/12. 1924.) KAUSCH

Bert Eugene Hill, Chicago, *Entfernung nicht verdichtbarer Gase aus Gasgemischen*. Der zur Durchführung des Verf. geeignete App. besteht aus einem geschlossenen zylindr. Behälter, der fl. NH_3 enthält u. eine von diesem bespülte Reaktionschlang. Letztere steht durch ein Rohr in Verb. mit der Leitung für das fl. Gas des App. u. ist ein Expansionsventil für die Entspannung des fl. NH_3 in die Reaktionsspirale vorgesehen. Durch ein Rohr wird das Gemisch der nicht verdichtbaren Gase mit verdampftem NH_3 in die die Rohrspirale umgebende NH_3 -Fl. zugeführt. Die nicht verdichtbaren Gase sammeln sich oberhalb der NH_3 -Fl. (A. P. **1513138** vom 6/1. 1923, ausg. 28/10. 1924.) KAUSCH

Paul Thiele, Rümlang, Schweiz, *Trennung von Gasgemischen*. (O_2 u. N_2) in einer Trennungskolonnen, wobei das fl. Gasgemisch nach seiner Entspannung u. vor seinem Ausguß in die Kolonne einen in den oberen Teil der Kolonne befindlichen Kugelhörper durchströmt, dessen Höhe mindestens 10% der Rektifikationshöhe beträgt. Hierdurch wird eine größere Zone gleichmäßig tiefster Temp. geschaffen, in der sich der Gleichgewichtszustand zwischen Fl. u. Dampf ganz oder wenigstens annähernd einstellen kann. (Schwz. P. **107462** vom 16/12. 1922, ausg. 16/10. 1924.) KAUSCH

Julius Obermiller, M.-Gladbach, *Verfahren zur Einstellung von Luft oder anderen Gasen auf einen bestimmten Feuchtigkeitsgehalt*, nach D. R. P. 396296, besteht darin, gek., daß man die Luft oder die Gase bei zweckentsprechender Temp. mit

ten, höchstkonz. Lsgg. geeigneter in W. l. Salze oder anderer solcher Stoffe in der Verteilung zusammenbringt u. die Lsgg. anschließend zur Aufrechterhaltung Höchstkonz. durch die jeweils in Frage kommenden festen Salze oder Stoffe durchschickt, um sie im Kreislauf dann von neuem wieder der Luft oder den en zuzuführen. (D. R. P. 408653 Kl. 12e vom 17/9. 1922, ausg. 22/1. 1925. zu D. R. P. 396296; C. 1924. II. 1381.) KAUSCH.

Rappold & Volk A.-G., Augsburg, *Verfahren und Vorrichtung zum Eindampfen Flüssigkeiten* durch Zerstäuben u. Behandlung mit einem gasförmigen Verpfungsmittel, bei welchem das zu behandelnde fl. Gut im Innern eines Verpfungsraumes mit kreisförmiger oder polygoner Grundfläche von einer zentral annähernd zentral angeordneten Zerstäubungsvorr. in wagerechter oder andernd wagerechter Richtung nach allen Seiten zerstäubt wird, dad. gek., daß das förmige Verdampfungsmittel in einer den wagerechten Querschnitt des Verpfungsraumes im wesentlichen ganz ausfüllenden, sich in kreisförmigen Windungen hinaufschraubenden Schicht im Gegenstrom gegen die Schicht des zerstäubten fl. Gutes nach aufwärts geführt u. oberhalb derselben aus dem Verpfungsraum abgeleitet wird. — 2. Vorr., gek. durch einen oder mehrere in den Verpfungsraum derart einmündender schlitzzartiger Zuführungskanäle für das Verdampfungsmittel, daß deren Mittellinien tangential zur Grundflächenkurve verlaufen, wobei die Schlitze vorzugsweise nach aufwärts gerichtet sind. (D. R. P. 4480 Kl. 12a vom 27/6. 1920, ausg. 22/1. 1925.) KAUSCH.

Rappold & Volk A.-G., Augsburg, *Verfahren und Vorrichtung zum Verdampfen flüchtigen Bestandteile in Lösungen, Emulsionen und Suspensionen*. Verf., bei welchem innerhalb eines Verdampfungsraumes von kreisförmiger oder polygoner Grundfläche von einer zentralen oder annähernd zentralen Stelle aus das zu verdampfende fl. Gut wagerecht oder annähernd wagerecht durch eine Schleudervorr. nach allen Seiten zerstäubt wird, 1. dad. gek., daß das zerstäubte Gut zwischen zwei parallel zur Richtung des letzteren geführten Schichten eines geringeren Teiles des verwendeten Verdampfungsmittels oder oberhalb einer einzigen wagerechten Schicht desselben ausgebreitet wird, während der größte Teil des verwendeten Verdampfungsmittels von unten gegen das zerstäubte Gut geführt wird u. es durchdringt. — 2. Vorr., dad. gek., daß im Unterteil des Verdampfungsraumes an zentraler Stelle ein kegelförmiger Einbau angeordnet ist, welcher eine Schleudervorr. trägt u. unterhalb derselben einesteiis mit den Austrittsöffnungen des von unten im Verdampfungsmittel gegen die Schicht des zerstäubten Gutes geführten u. andernteils mit Schichten des unterhalb der Zerstäubungszone wagerecht ausgebreiteten Verdampfungsmittels ausgestattet ist, während für die Zuführung eines Teiles des Verdampfungsmittels u. dessen Ausbreitung in einer über der Zerstäubungszone strömenden Pallelschicht an zentraler oder annähernd zentraler Stelle eine Rohrleitung mit entsprechend gerichteten Austrittsöffnungen angebracht ist. (D. R. P. 404479 Kl. 12a vom 24/6. 1920, ausg. 22/1. 1925.) KAUSCH.

Ignacy Moscicki, Lwow, Polen, *Trockene Destillation von bituminösen oder ölhaltigen Stoffen*. Man benutzt zur Dest. das Gemisch der aus dem Destillationsgut selbst erzeugten Dämpfe, indem man diese im kontinuierlich fließenden Strom von den Destillationskammern über einen Kondensator u. einen Vorwärmer zu den ersteren zurückführt u. dabei stets den Überschuß der Prodd. abführt. (E. P. 202333 vom 16/12. 1922, ausg. 13/9. 1923.) OELKER.

V. L. Oil Processes Limited, London, übert. von: **Owen David Lucas**, London, *Kontaktkörper*. (A. P. 1502260 vom 23/10. 1923, ausg. 22/7. 1924. — C. 1924. II. 1258.) KAUSCH.

V. L. Oil Processes Limited und **Owen David Lucas**, Westminster, *Katalysatoren*. (E. P. 209355 vom 26/4. 1923, ausg. 31/1. 1924. — C. 1924. II. 1258.) KA.

Seydel Chemical Company, New Jersey, übert. von: **Hugh McC**
Spencer, Newark, N. J., *Koaguliermittel* für Fl. besteht aus einer $Al(OH)_3$ in p
sierter Form enthaltenden Fl. (**A. P. 1513566** vom 10/10. 1922, ausg. 28
1924.) KAUSC

A. J. Ravnstad, Fredriksstad, Norwegen, *Entfernen suspendierter Stoffe*
Flüssigkeiten. Die Fl. werden mit einem Alginat u. einem festen oder fl. Kö
oder Gas behandelt. (**E. P. 225635** vom 11/9. 1923, ausg. 31/12. 1924.) KA

III. Elektrotechnik.

F. Petz, *Neue Bipolarzellen für Wasserelektrolyse, ihre Konstruktion und*
Charakteristik. Es wird eine neue gedrängte Bauart elektrolyt. Wasserzers
beschrieben u. abgebildet, bei welchen die bipolare Schaltung der Elektroden d
besondere Konstruktion der Zellengefäße aus Eisenbeton erreicht ist. Die Wirku
weise wird erklärt u. einige Angaben über Stromausnutzung gemacht. Die K
onstruktion eignet sich gut zur Ausnutzung von Überschußkraft schwankender Gr
wegen der geringen benötigten Bedienung auch zur Verwertung von Nachtk
Hersteller: Elektrizitäts-Aktiengesellschaft vorm. SCHUCKERT u. Co., N
berg. (Elektrotechn. Ztschr. **46**. 43—45. Nürnberg.) HERTE

Wilhelm Schlüter, Trossingen, *Herstellung von negativen und positiven E*
troden für elektrische Bleisammler, dad. gek., daß der Bleisuperoxydschlamm
gebrauchten Sammlern in porösen Umhüllungen durch Elektrolyse zu Bleischla
reduziert wird, wodurch eine elektr. gut leitende Bleischwammplatte entsteht,
durch Umladen in eine Bleisuperoxydplatte verwandelt werden kann. — Als H
kann Papier, Pappe, Filz u. dgl. dienen. (**D. R. P. 407629** Kl. 21b vom 9/11. 1921,
ausg. 18/12. 1924.) KÜHLIN

General Electric Company, New York, übert. von: **Gorton B. Fo**
Schenectady, *Glühfäden u. dgl.* (**A. P. 1496457** vom 17/7. 1919, ausg. 3/6. 1922,
C. 1924. I. 2728 [D. R. P. 391760].) KÜHLIN

N. V. Philips' Gloeilampenfabrieken, Eindhoven, Holland, *Duktile Kö*
aus Metallen von hohem Schmelzpunkt. (**D. R. P. 407951** Kl. 40a vom 29/3. 1921,
ausg. 3/1. 1925. E. Prior. 24/3. 1922. — **C. 1924. I. 695**.) KÜHLIN

Josef Skorpik, Wien, *Trockenelement mit auswechselbaren Einzelteilen*
Patent 351960, dad. gek., daß die der Erschöpfung unterliegenden Teile lö
miteinander verbunden sind, oder daß 2 unlösbar verbundene mit dem dritten lö
verbunden sind. — Der Nachteil der Vorr. gemäß dem Hauptpat., daß eine Trenn
der Einzelteile nur unter Zerstörung der Einzelelemente möglich ist, wird vermie
(**D. R. P. 407628** Kl. 21b vom 10/8. 1921, ausg. 19/12. 1924. **Zus. zu D. R. P. 351**
C. 1922. IV. 24.) KÜHLIN

William B. Bary, Berlin-Lichterfelde, *Elektrischer Sammler mit horizo*
nebeneinander in Rinnen eines flachen Gefäßes angeordneten Elektroden, dad. g
daß in die vorzugsweise gewölbten Rinnen die Stromleiter aus Bleistreifen fest
den Rinnenboden aufgepreßt sind u. diese Bleistreifen gemeinsam mit den Rin
wandungen als Träger für das akt. Material dienen. — Die akt. M. kann nicht
fallen, die entwickelten Gase entweichen in senkrechter Richtung, ohne an
Oberfläche der akt. M. entlang zu streifen, Kurzschluß findet nicht statt. (**D. R.**
407630 Kl. 21b vom 27/2. 1924, ausg. 29/12. 1924.) KÜHLIN

V. Anorganische Industrie.

Walter Althammer, *Die graphische und rechnerische Behandlung von Salzlösun*
(Vgl. S. 746.) Einführung in die graph. (Dreiecksdarst.) u. rechner. Behandlung
Salzsgg., unter besonderer Berücksichtigung der Kalichemie, von method. u. did

sichtspunkten aus. Ausgegangen wird von der wss. Lsg. eines hydratfreien Salzes, es folgt die Lsg. eines hydratbildenden Salzes, Lsgg. zweier u. dreier gleichger Salze ohne u. mit Hydraten u. Doppelsalzen, wss. Lsgg. zweier ungleichger Salze u. schließlich das vollständige System der *Meerwassersalze*. (Berichte Kali-Forschungs-Anstalt 1924. 57 Seiten. Staßfurt-Leopoldshall. Sep. v. Vf.) ULM.

—, *Fullers Erde*. Die im Imperial Institute zeitweilig eingegangenen Berichte *Fullers Erde*, ihrer Verwendungsarten u. VV. sind zusammengefaßt worden u. den gegeben. Sie enthalten allgemeines über Zus. u. VV., ferner Angaben über Reinigungsmittel, Erzeugung u. Lagerstätten in England u. den Dominien, sowie in anderen Ländern. (Bull. Imperial Inst. Lond. 22. 460—71. 1924.) RÜHLE.

Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning, Höchst a. M., *Bisulfatöfen*. Salzzuführung zu dem Ofen wird durch einen Trichter u. eine Schraube bewirkt u. das Salz fällt auf eine mit der Rührwerkswelle verbundene Verteilungsteile. Die Säure wird durch ein durch diese hohle Welle hindurch geführtes Rohr in der Pfanne zugeleitet. (E. P. 225545 vom 22/11. 1924, Auszug veröff. 21/1. 1925. Prior. 26/11. 1923.) KAUSCH.

Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning, Höchst a. M., *Ofen*. Der Ofen, den die Herst. von Bisulfat oder ähnliche Verf. bestimmte Ofen besitzt eine Ziegel aus widerstandsfähigem Material (Ziegel, Stein) u. wird durch ein Gemisch aus Generator- u. Wassergas geheizt. Die Wärme der Verbrennungsprodd. wird zur Vorwärmen von Luft u. zur Dampferzeugung verwendet. (E. P. 225548 vom 22/11. 1924, Auszug veröff. 21/1. 1925. Prior. 29/11. 1923.) KAUSCH.

Compagnie Nationale de Matières Colorantes et Manufactures de Produits Chimiques du Nord Réunis, Établissements Kuhlmann, Paris, übert. von **Paul Audianne und Gabriel Bachalard**, Paris, *Schwefelsäureanhydrid auf katalytischem Wege mittels Vanadinsalzen*. Man verwendet als katalyt. M. Körner aus einem inerten u. porösem Material (Größe 2—5 mm), das mit einer Lsg. eines Vd-es (50—55 kg Vd₂O₅ auf den cbm des Massevol.) imprägniert ist. Die Körner werden im App. derart an Größe in den einzelnen Teilen ab, daß die umzuwandelnden Gase zuerst durch große u. am Ende ihrer Wege durch kleine Körner hindurchgehen. (A. P. 1518043 vom 19/11. 1923, ausg. 2/12. 1924.) KAUSCH.

Emil Hene, Staßfurt, *Herstellung von Schwefelsäure*, 1. dad. gek., daß die Nitrose allein oder unter Zusatz NO abgebender Substanzen so tief im Glover-Apparat eingeführt wird, daß eben noch völlige Denitrierung erfolgt. — 2. dad. gek., daß ein Teil der nitrosen Säure mit oder ohne Zusatz von NO abgebenden Substanzen am oberen Teil des Glovers u. ein anderer Teil weiter unten eingeführt wird. — 3. dad. gek., daß die Einführung der Nitrose im Fuße des Turmes erfolgt. (D. R. P. 408864 Kl. 12i vom 11/1. 1924, ausg. 27/1. 1925.) KAUSCH.

Rheinischer Verein Chemischer Fabriken Act.-Ges., Aachen, Erfinder: **Hermann Fritzweiler und Walter Grob**, Stolberg, Rhld., *Reinigung von Salzsäure*, 1. dad. gek., daß man rohes As oder Cl₂, oder beide Verunreinigungen zugleich, enthaltende HCl bezw. HCl-Gase der Einw. von metall. Sb bezw. dessen Legierungen aussetzt. 2. gek. durch die Verwendung von schwarzem Sb. 3. gek. durch die Verwendung von auf Trägern niedergeschlagenem schwarzem Sb. (D. R. P. 408944 Kl. 12i vom 9/11. 1923, ausg. 27/1. 1925.) KAUSCH.

J. Pintsch Akt.-Ges., Berlin, *Stickoxyde*. Vorerhitzte brennbare Gase u. Luft werden etwa unter atmosphär. Druck verbrannt u. die Verbrennungsprodd. plötzlich auf den Flächen eines Dampfkessels abgekühlt. (E. P. 225263 vom 18/8. 1923, ausg. 24/12. 1924.) KAUSCH.

J. W. Cederberg, Berlin-Steglitz, *Ammoniakoxydation*. Die Wände des Konverter-App. werden auf niedrigerer Temp. als der Katalysator durch eine Kühlfl. (W.)

gehalten. (E. P. 225821 vom 7/10. 1924, Auszug veröff. 28/1. 1925. Prior. 1923.) KAUSCH

Richard C. Tolman, Washington, Col., V. St. A., *Herstellung von Phosphor-Phosphorverbindungen*. Man erhitzt ein mit einem kohlenstoffhaltigen Reduktionsmittel vermisches Mineralphosphat in einem Ofen in Ggw. eines aus einer Elementarphosphorverb. bestehenden Katalysators auf eine Temp., welche genügt, um gebildeten P zu verdampfen. Die Dämpfe werden kondensiert oder in einem besonderen Ofen in P_2O_5 übergeführt. (A. P. 1518019 vom 15/1. 1921, ausg. 1924.) OELKE

American Cyanamid Company, New York, übert. von: **Harry William Charlton**, New York, *Phosphorsäure*. Man bildet durch Erhitzen im elektr. Ofen u. Dispergierung eines Gemisches aus Phosphatgestein, SiO_2 u. gepulverte C-haltiger Substanz, Mineralwolle, wobei P_2O_5 u. P entweichen. Letzter wird zu P_2O_5 oxydiert. (A. P. 1513088 vom 7/9. 1923, ausg. 28/10. 1924.) KAUSCH

Chemische Fabrik Griesheim-Elektron, Frankfurt a. M. (Erfinder: **Gustav Pistor** und **Robert Suchy**, Griesheim a. M.), *Herstellung von Phosphorsäure* durch Oxydation der in dem elektr. Ofen aus Phosphorit, Sand u. Kohle entstehenden P-Dämpfe mittels Luft, dad. gek., daß man hierbei nur so viel Luft verwendet, daß der P-Dampf verbrennt, das vorhandene CO aber unverändert bleibt. (D. R. P. 408925 Kl. 12i vom 1/2. 1923, ausg. 28/1. 1925.) KAUSCH

Chemische Fabrik Griesheim-Elektron, Frankfurt a. M. (Erfinder: **Robert Suchy** und **Josef Michel**, Griesheim a. M.), *Reinigung von Roharsenik*, dad. gek., daß man das Rohprod. mit Na_2CO_3 -Lsg. in Lsg. bringt u. aus der erhaltenen Lsg. As_2O_3 mittels CO_2 zur Ausscheidung bringt. — 2. dad. gek., daß die zum Aufschmelzen des Roharseniks dienende Na_2CO_3 nur zu 60—70% der für die B. von Monoklinarsenit theoret. erforderlichen Menge angewandt wird. (D. R. P. 408925 Kl. 12i vom 14/7. 1923, ausg. 23/1. 1925.) KAUSCH

Vanadium Corporation of America, Bridgeville, V. St. A., *Behandlung von Erzen, die Vanadinpentoxyd enthalten, mit Kohlenstoff im elektrischen Ofen*. (D. R. P. 408536 Kl. 40c vom 29/12. 1921, ausg. 19/1. 1925. — C. 1923. IV. 285.) KAUSCH

Electric Metallurgical Company, New York, N. Y., übert. von: **Max J. Udy**, Niagara Falls, New York, *Behandlung von Vanadinerzen*. Man mischt das Erz mit Alkali u. einem S an das abgetrennte Metall (Cu) abgebenden Koks (Na_2S) u. erhitzt das Gemisch zum Schmelzen. (A. P. 1513200 vom 25/10. 1921, ausg. 28/10. 1924.) KAUSCH

Titanium Pigment Company, Inc., übert. von: **Charles Avery Dore**, New York, *Behandlung von titan- und eisenhaltigem Material*. (E. P. 206809 vom 24/5. 1923, ausg. 9/1. 1924. A. Prior. 8/11. 1922. — C. 1924. I. 2813.) KAUSCH

Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning (Erfinder: **Otto Ernst Otto Nicodemus**), Höchst a. M., *Herstellung einer hochaktiven Kohle*, nach D. R. P. 371691, dad. gek., daß man die kohlenstoffhaltigen Substanzen nach Tränkung mit Imprägnierung mit Säuren des P oder solchen Verbb., die während der Verkohlung oder in Ggw. von Feuchtigkeit in Phosphorsäuren zerfallen, im Drehofen mit H₂ oder Verbrennungsgasen bis zur völligen Verkohlung erhitzt, vorteilhaft in Ggw. von überschüssigem O_2 . (D. R. P. 408926 Kl. 12i vom 16/6. 1922, ausg. 28/1. 1925. Zus. zu D. R. P. 371691; C. 1923. II. 1058.) KAUSCH

Yoshiho Inada, Takaw, Formosa, Japan, *Entfärbungskohle*. Japan. Coniferenholz wird erst durch Erhitzen vom flüchtigen Harz befreit, dann der Rückstand mit Kaliumacetat imprägniert, geglüht u. dann ausgewaschen. (A. P. 1521541 vom 8/9. 1920, ausg. 30/12. 1924.) KAUSCH

International Nitrogen Co., Cleveland, Ohio, übert. von: **James Henry R.**

dsboro, Vermont, *Herstellung von Gas und Carbid.* (A. P. 1499750 vom 13/2. 1924, ausg. 1/7. 1924. — C. 1924. I. 2813.) OELKER.

Léon Mourgeon, Frankreich, *Herstellung von Wasserstoff und Wasserstoffbindungen unter Druck.* Man läßt W. bei hoher Temp. u. Druck auf Kohle oder stillationsprodd. der Kohle oder Kohlehydrate gegebenenfalls in Ggw. von Katalysatoren einw. (F. P. 579306 vom 13/6. 1923, ausg. 14/10. 1924.) KAUSCH.

H. L. Kidd, London, *Krystallisation.* Die Krystallisation von Na_2CO_3 -Lsg. wird dadurch gefördert, daß man einen elektr. Strom hindurchgehen läßt. (E. P. 225393 vom 17/12. 1923, ausg. 24/12. 1924.) KAUSCH.

Victor Yngve, Niagara Falls, New York, *Salzgewinnung und -reinigung.* Aus der Lsg. des Rohsalzes (NaCl) werden die Ca- u. Mg-Verbb. durch Zusatz von überschüssigem Alkali gefällt, die gebildeten Hydroxyde abgeschieden u. dann mit Säure neutralisiert. (A. P. 1520920 vom 13/2. 1922, ausg. 30/12. 1924.) KAUSCH.

Camille Leveau, Frankreich, *Eau de Javel.* Man verwendet 1000 kg W., 50 kg Kalk, 59 kg Ätznatron u. 36 kg Cl_2 -Gas sowie zur Färbung der Fl. $\text{Na}_2\text{Cr}_2\text{O}_4$ die erforderlichen Mengen. (F. P. 579191 vom 25/3. 1924, ausg. 11/10. 1924.) KA.

Deutsche Gold- und Silber-Scheideanstalt vorm. Roessler, Frankfurt a. M., *Herstellung von Natriumperborat*, aus Alkalisuperoxyd, H_3BO_3 oder Alkaliboraten überschüssiger CO_2 , 1. dad. gek., daß man mehr CO_2 absorbieren läßt, als zur Herstellung des für die Perboratbildung nicht benötigten Alkalis in Na_2CO_3 erforderlich ist u. das hierdurch in der Lauge gebildete NaHCO_3 , gegebenenfalls in Gemeinschaft mit frisch zugesetztem NaHCO_3 durch entsprechende Zufügung von BO_3 oder Alkaliborat u. von Alkalisuperoxyd in Perborat überführt, zweckmäßig ist, daß mit der Zugabe letztgenannter Stoffe bereits begonnen wird, bevor das CO_2 zur Hilfe von CO_2 gebildete Perborat vollständig ausgeschieden ist. — 2. dad. gek., daß zwecks Haltbarmachung des Perborats u. Erhöhung der Ausbeute für Anwesenheit von Schutzstoffen, z. B. von Erdalkalisilikaten, Mg-Silikaten oder organ. Körpern, wie Phenole oder deren Substitutionsprodd. oder Gemischen vorgenannter Körper Sorge getragen wird. (D. R. P. 408861 Kl. 12i vom 26/8. 1920, ausg. 1/1. 1925.) KAUSCH.

Deutsche Gold- und Silber-Scheideanstalt vorm. Roessler, Frankfurt a. M., *Herstellung von Natriumperborat* aus Alkalisuperoxyd, H_3BO_3 oder Alkaliboraten überschüssiger CO_2 , 1. dad. gek., daß etwa 20% u. mehr CO_2 über die zur Überführung des für die Perboratbildung nicht benötigten Alkalis in Na_2CO_3 erforderliche Menge hinaus absorbieren gelassen wird. — 2. dad. gek., daß zwecks Haltbarmachung des Perborats u. Erhöhung der Ausbeute für Anwesenheit von Schutzstoffen z. B. von Erdalkalisilikaten, Mg-Silikaten oder organ. Körpern, wie Phenolen oder deren Substitutionsprodd., oder von Gemischen vorgenannter Körper Sorge getragen wird. (D. R. P. 408862 Kl. 12i vom 26/8. 1920, ausg. 27/1. 1925.) KA.

Société Chimique des Usines du Rhône, Paris, *Calciumarsenat.* Man erhitzt $(\text{AsO}_3)_2$ in Ggw. von O_2 in einer zur Oxydation wenigstens hinreichenden Menge. (Schwz. P. 106771 vom 11/12. 1923, ausg. 16/9. 1924. F. Prior. 15/5. 1923.) KAUSCH.

Chemische Fabrik Griesheim-Elektron, Frankfurt a. M., *Technisch eisenhaltiges Aluminium-Natrium-Doppelfluorid.* Fe-haltige Al-Salzlsgg. werden unter solchen Bedingungen mit F-Verbb. u. Na-Salzen in Anwesenheit freier Mineral-säure behandelt, daß das Fe nicht gefällt wird. (Schwz. P. 107615 vom 3/9. 1923, ausg. 1/11. 1924. D. Prior. 8/9. u. 17/11. 1922.) KAUSCH.

New Jersey Zinc Company, Manhattan, N. Y., übert. von Frank Gottlob Meyer, Earl C. Gaskill und James Arthur Singmaster, Palmerton, Pennsylvania, *Zinkoxyd.* (Austr. P. 7408 vom 15/6. 1922, ausg. 16/6. 1923. — C. 1924. 12626.) KAUSCH.

Naamlooze Vennootschap Handelsmatschappij Grikro, Amsterdam, Z.
oxyd. Zn-Dämpfe werden in einer Muffel oder in einem elektr. Ofen erzeugt u.
Strahlform durch einen Auslaß zur Verbrennung geführt. Damit sich am Aus-
keine festen Teile abscheiden, wird ein nichtoxydierendes Gas (Generator-
KW-Stoffgas oder N₂) um diesen herumgeführt. Ferner besitzt der Auslaß r-
förmige Gestalt u. ist aus wärmeleitendem, widerstandsfähigem Material (z.
Carborundum) hergestellt. (E. P. 225833 vom 7/11. 1924, Auszug veröff.
1925. Prior. 3/12. 1923.) KAUSCH

Kinzlberger & Co., Prag, Verfahren zur Herstellung eines gut filtrierbo-
Chromhydroxyds. (D. R. P. 408867 Kl. 12m vom 20/5. 1922, ausg. 24/1. 1925.)
Tschechoslow. Prior. 10/5. 1922. — C. 1923. IV. 362.) KAUSCH

VII. Agrikulturchemie; Düngemittel; Boden.

H. F. von Feilitzen und **Chr. Barthel**, Versuche mit Sulgine und Biog-
„Sulgine“, mit ca. 30% CaS, wirkte weder als Bodendesinfektionsmittel noch
Düngemittel bei den angewandten Böden. Auch das andere „katalyt. wirke-
u. desinfizierende Düngemittel“ „Biogine“ erzielte bei Kartoffeln keine Mehrer-
Beide Präparate wurden aus dem Laboratorium G. TRUFFAUT, Versailles, bezog-
(BIED. Zentralblatt f. Agrik.-Ch. 54. 18—19. Meddelande Nr. 254. från Cent-
anstalten for forsoksvasendet på jordbruksomvådet Jord buiksavdelningen Nr.
Bakteriologiska avdelningen Nr. 31. S. 3. Stockholm 1924. Ref. GIESECKE.) BERJ

H. Lagatu und **L. Maume**, Untersuchung über den Einfluß von Kalk-Magne-
und Kalidüngung auf den Weinstock durch die periodische Analyse der Blätter.
ermittelten in monatlichen Abständen die Ca-Mg- u. K-Gehalte in den Blättern
Weinstöcken, welche in der Weise gedüngt worden waren, daß jedesmal eins
den genannten Nährelementen fortgelassen wurde, u. verglichen die Ergeb-
dieser Unterss. mit denen, welche mit n. gedüngten Rebstöcken erhalten wur-
Die Ergebnisse dieser Unterss. werden nach dem in der vorhergehenden Abh-
lung (S. 101) angegebenem rechnerischen Verf. ausgewertet u. durch graph. Dar-
erläutert. Vf. glauben, daß durch die period. Unters. der Blätter der Einfluß
Düngung auf das Pflanzenwachstum viel sicherer festgestellt werden kann,
durch die chem. Bodenunters. (C. r. d. l'Acad. des sciences 179. 932—34. 1924.) BERJ

P. Krische, Kalidüngung und Zellstimulation durch Magnesiasalze. Zusammen-
fassende Abhandlung über das Wesen u. die wirtschaftliche Bedeutung der Z-
stimulation. Auf Grund neuerer Forschungen folgert Vf., daß durch Stimulier-
nur bei gleichzeitiger u. reichlicher Düngung Erfolge erzielt werden können
daß im besonderen die Verwendung von Kalirohsalzen nicht die Kalidüngung
ersetzen vermag. (Kali 18. 361—64. 1925. Berlin-Lichterfelde.) BERJ

Hans Wießmann, Hat Kieselsäure bei unzureichender Phosphorsäureernähr-
einen Einfluß auf den morphologischen und anatomischen Bau des Roggenhalms.
Bei Gefäßverss., bei denen als Differenzdüngung 0,1 g P₂O₅ als K₂HPO₄ u. be-
0,1 g P₂O₅ + 12SiO₂ als Kieselsäurehydrat, bezw. 0,2 g P₂O₅ zu je 6500 g G-
sand verabreicht wurden, wurde in Übereinstimmung mit den früheren Un-
suchungen gefunden, daß SiO₂ die Erträge bei unzureichender P₂O₅-Düngung g-
bedeutend zu steigern vermag. Hierbei wurde der %o-Gehalt der Pflanzenteile
P₂O₅ herabgesetzt, an SiO₂ aber, besonders beim Stroh, ganz bedeutend gesteig-
Auf den anatom. Bau der Gewebelemente des Halmes hatte weder die SiO₂ n-
die erhöhte P₂O₅-Gabe verändernd eingewirkt. (Ztschr. f. Pflanzenernähr. u. Düng-
Abt. A 4. 73—83. Berlin, Landw. Hochschule.) BERJ

F. A. Allison, **I. M. Braham** und **I. E. Mc Murtrey**, Feldversuche mit L-
stickstoffdüngemitteln. Bericht über vergleichende Felddüngungsverss. an ei-
großen Anzahl verschiedenster Pflanzen mit Cyanamid, (NH₄)NO₃, (NH₄)Cl, (NH₄)₂S

$H_2(PO_4)$, Ammoniumsuperphosphat, Harnstoff, phosphorsaurem Harnstoff, $H_4NO_3 + (NH_4)_2SO_4$, $NH_4NO_3 + KCl$, $2NH_4NO_3 + K_2SO_4$. Bei Verss., $CaCN_2$ ch Vermischen mit $Ca(NO_3)_2$ verwendungsfähiger zu machen, bildeten sich infolge Hygroskopizität des letzteren sehr harte Stücke, ferner begünstigte die Feuchtigkeit das Entstehen von Dicyanamid. NH_4Cl erzielte gleichgute Erträge wie $(NH_4)_2SO_4$, h auf den Parzellen, die 40 u. 80 lbs je acre erhielten, zeigte es Giftwrkgg., rscheinlich infolge zu hoher $[Cl^-]$. Alle weiteren Verss. zeigten, daß mit Ausnahme des Cyanamids unter gewissen Bedingungen die übrigen angewandten Düngemittel fast die gleichen Erträge wie $(NH_4)NO_3$ u. $(NH_4)_2SO_4$ ergaben. (U. S. A. Dep. of Agric. Dep. Bull. 1180. 1924; ausführl. Ref. vgl. BIED. Zentralblatt f. Phyto-Ch. 54. 7—10.)

BERJU.

A. Densch und Hunnius, *Versuche mit Kupfersulfat*. Bei der Nachprüfung Wrkg. des $CuSO_4$ auf die Erträge konnte im Gegensatz zu den bisherigen Beobachtungen festgestellt werden, daß bei Gefäßverss. in verschiedenen Böden ch bis zu 30 kg $CuSO_4$ je ha entsprechende Gaben eine Ertragssteigerung nicht auf Moorböden, sondern auch auf Mineralböden bewirkt wird. In erster Linie werden die Kornerträge erhöht, während der Strohertrag häufig vermindert wurde. Die fast gleiche Wrkg. wurde durch das Beizen der Samen mit 0,1—0,25% ig. Lsg. von $CuSO_4$ erzielt. Die Wrkg. des $CuSO_4$ beruht vornehmlich auf einer Steigerung des Chlorophyllgehaltes der behandelten Pflanzen. An der hierdurch bewirkten Zunahme an organ. Substanz sind in erster Linie die Kohlenstoffhydrate beteiligt, auf die Eiweißbildung scheint Cu keinen Einfluß zu haben. Das im Boden zugesetzte Cu wurde von den Pflanzen in nachweisbaren Mengen aufgenommen, bei sich das Cu in der Hauptsache im Stroh abgelagerte, aber auch im Korn nachgewiesen werden konnte. (Ztschr. f. Pflanzenernähr. u. Düngung [Abt. A] 3. 1924. Landsberg a. W.)

BERJU.

Julius Stoklasa, *Die modernen Ziele der biochemischen Forschung des Bodens*. Zusammenfassender Bericht mit besonderer Betonung des Einflusses der Bodenbakterien auf die Mobilisierung von PO_4 - u. K-Ionen. Teilweise neue Untersuchungen über den Einfluß der $[H^+]$ im Saft des Wurzelsystems auf Resorption von Mineralstoffen zeigen, daß dieser Einfluß bei weitem nicht ausreicht, um genügende Ausnutzung solcher Bodenbestandteile zu gewährleisten. Die Bakterientätigkeit muß hinzukommen, u. verschiedene Pflanzen gedeihen am besten unter Mitwirkung besonderer Bakterienarten. Bei den bakteriellen Düngern der Aktiengesellschaft „Bakterium“ wird außer den Bakterien u. leicht aufnehmbare Phosphorsäure dem Boden auch leicht abbaufähige organ. Substanz zugeführt. Diese steigert ungemein die Produktion von CO_2 im Boden, damit die B. von Dicarbonaten, die als Regler für Umsetzungen im Boden zu betrachten sind, vom Wurzelsystem leicht aufgenommen werden u. vorzügliche Nährstoffe beim ganzen Bau- u. Betriebsstoffwechsel der Pflanzen bilden. Schließlich wird auf die vorwiegende Bedeutung des Stickstoffs, den Chlorophyllapp. assimilierten C u. die Möglichkeit, die Dynamik dieser Assimilation durch β - u. γ -Strahlen des Ra bedeutend zu erhöhen, hingewiesen. (Chemie d. Zelle u. Gewebe 12. 22—44. 1924. Prag.)

SPIEGEL.

Br. Tacke und Th. Arnd, *Erwidern auf die Arbeit: „Bestehen Beziehungen zwischen dem durch Salzsäure zersetzlichen tonerdesilicatischen Kolloidanteil der Böden und deren Fruchtbarkeit und Düngebedürftigkeit?“* Von R. Ganssen (Gans). Durch Verss. über die Rk. der Extrakte von mit KCl-Lsgg. ausgeschüttelten Böden werden weitere Tatsachen erbracht, welche gegen die allgemeine Gültigkeit der GANSSSEN (Internat. Mitteil. f. Bodenkunde 14. 55; C. 1924. I. 2736) entwickelten Theorie sprechen. (Internat. Mitteil. f. Bodenkunde 14. 155—57. 1924. Göttingen.)

BERJU.

R. Ganssen, *Molekularverhältnis, Bodenreaktion und Düngebedürftigkeit*. Wort auf die Erwidrerung von TACKE u. ARND (vgl. vorst. Ref.) u. Zusammenfassung der vom Vf. über obiges Thema veröffentlichten Arbeiten. (Internat. Mitteil. f. Bodenkunde **14**. 158—70. 1924.) BERJ.

J. N. Mukherjee, *Reaktion zwischen Säure und Elektrolyten und deren Beziehung zur Theorie der Bodenacidität*. Nach JOSEPH u. HANCOCK (Journ. Chem. Soc. London **123**. 2022; C. **1924**. I. 1646) soll vollkommen reine SiO_2 die pH der Lösungen von Säuren nicht ändern; demgegenüber weist Vf. durch Wiederholung früherer Unterss. (vgl. Philos. Magazine [6] **44**. 321; C. **1923**. III. 710) mit sorgfältig gereinigten Kieselsäurehydraten nach, daß reine Kieselsäurehydrate Säuren adsorbieren u. hierbei vornehmlich Anionen adsorbiert werden. Verss. mit Ndd. BaSO_4 zeigten eine vollkommene Analogie mit den bei der SiO_2 beobachteten (Nature **115**. 157—58. Calcutta, Univ. of College of Scie.) BERJ.

O. Lemmermann und **H. Wiessmann**, *Über den Verlauf der Kohlensäurebildung im Boden*. Zum Studium der B. der CO_2 im Boden wurde täglich im Verlauf von 995 Tagen 4—4½ l von CO_2 u. NH_3 befreite Luft durch 4 mit je 1 kg Boden gefüllte Gefäße geleitet, u. die ausgetretene CO_2 nach bestimmten Zeitintervallen gewichtsmäßig festgestellt. Der Boden enthielt 0,506% C u. war ständig mit etwa 60% seiner Wasserkapazität entsprechenden Wassermenge durchfeuchtet. Von 4 Durchlüftungsgefäßen wurde ein Gefäß nur mit dem Versuchsboden gefüllt, die übrigen Gefäße erhielten je eine Zugabe von soviel getrocknetem Stroh, oder Grünsubstanz junger Lupinen oder getrocknetem Pferdemist, daß der Zusatz je 1,2 g C betrug. Wird die während der ganzen Versuchszeit veratmete CO_2 auf C berechnet, so waren nach 995 Tagen von dem anfänglich vorhandenen C weggegangen, bei Boden ohne Zusatz 20,4%, Boden mit Stroh 30,6%, Boden mit Lupinen 27,1%, Boden mit Pferdemist 23,1%. Davon treffen auf die in Form von organ. Substanz zum Boden hinzugefügten 1,2 g C bei Stroh = 73,4%, Lupinensubstanz = 56,3%, Pferdemist = 34,3%. Aus den gefundenen Zahlenwerten u. Kurvenbildern wurde mit großer Wahrscheinlichkeit abgeleitet, daß unter aeroben, sich gleichbleibenden Verhältnissen die B. der CO_2 im Boden entsprechend der Gleichung $x = a \sqrt{t}$ verläuft. (a anfänglicher C-Gehalt, x die nach der Zeit t gebildete CO_2 , k u. c Konstante.) Diese Form der Gleichung hat große Ähnlichkeit mit der Schützseil'schen Regel (vgl. Ztschr. f. physiol. Ch. **30**. 1; C. **1900**. II. 686). (Ztschr. f. Pflanzenernähr. u. Düngung Abt. A **3**. 387—95. 1924. Berlin, Landw. Hochschule.) BERJ.

J. König und **J. Hasenbäumer**, *Die Ermittlung des Düngungsbedürfnisses des Bodens*. Zusammenfassende Darst. u. Verallgemeinerung der in den vorhergehenden Abhandlungen von den Vff. u. ihren Mitarbeitern (vgl. Landw. Jahrb. **59**. 97; C. **1923**. III. 962) bei den einzelnen Kulturpflanzen erhaltenen Ergebnisse (Ztschr. f. Pflanzenernähr. u. Düngung Abt. B **3**. 497—532. 1924. Münster i. W.) BERJ.

V. Novák, *Ein Beitrag zur Charakteristik der Hannaböden*. Beschreibung charakteristischer Eigenschaften der in den fruchtbarsten Gegenden Mährens u. Tschechoslowakei vorkommenden u. der Klasse der Schwarzerden zugehörigen Niederungsböden u. Angaben über die physikal. u. chem. Zus. dieser Böden (Internat. Mitteil. f. Bodenkunde **14**. 86—106. 1924. Brno-Tschechoslow.) BERJ.

W. Riede, *Produktionsmehrung durch Stimulantien*. Bei Gefäßverss. wurde nach Feststellung der optimalen Dosen in Vorverss. durch die ermittelten Mengen fast stets eine deutliche Steigerung der Wachstumsenergie der Versuchspflanzen festgestellt. Unter den günstigen äußeren klimat. Wachstumsbedingungen wurde bei Feldverss. durch die gleichen Mittel (Ä., A., MgSO_4 , CuSO_4 , KCl u. dgl.) keine ertragssteigernde Wrkg. erzielt, dagegen waren 1922 u. 1923 gegenüber ungequollenen, unbehandelten Samen bei der Soja Mehrerträge von 20—75%.

von 10–15%, bei der Kartoffel von 20–30% erzielt worden. Die besten Erträge erbrachten $MnSO_4$, $MgSO_4$, Seesalz u. Tannin (2,5%ig. Lsg.). Bei der Röntgenbestrahlung durch Röntgenstrahlen tritt neben der stimulierenden Wrkg. geringer Dosen auch eine hemmende Wrkg. auf. Da die Stimulationswrkg. auch bei einer passiven Latenzzeit sich geltend macht, ist der Verkauf stimulierten u. Pflanzengutes möglich. (Ztschr. f. Pflanzenernähr. u. Düngung Abt. B 3. 36. 1924. Bonn, Bot. Inst. der Landw. Hochsch.) BERJU.

Gerhard Ruschmann, *Ewige Flachsfelder und Flachsmüdigkeit*. Als Ursache Bodenmüdigkeit auf Flachsfeldern wird das Vorhandensein von Pilzen u. Bakterien, besonders Fusariumarten angesehen. (Faserforschung 4. 145–65. 1924.) SÜ.

H. Janert, *Ist Kohlensäure ein klimatischer Wachstumsfaktor? Entgegnung* von E. Reinau. (Vgl. Ztschr. f. Pflanzenernähr. u. Düngung Abt. A 3. 182; 1924. II. 876.) (Ztschr. f. Pflanzenernähr. u. Düngung Abt. A 4. 105–9. Landsberg a. W.) BERJU.

S. Marcovitch, *Vielversprechende Wirksamkeit von Pflanzeninsecticiden*. Bei Bekämpfung des mexikan. Bohnenkäfers (*Epilachna corrupta* Muls) wurden mit Na_2SiF_6 , $CaSiF_6$ u. *Kryolith*, z. B. bei Feldverss. durch Verstäubung einer Mischung von 9 Raumteilen Kalk u. 1 Teil Na_2SiF_6 gute Erfolge erzielt. Sehr wirksam erwies sich ferner Verstäubung von Holzkohle, in welcher 0,01% *Dichloräthylsulfid* in wenig Ä. oder 5% fl. $C_6H_5NO_2$ absorbiert waren. (Science 61. 22. Knoxville, Tenn. Agric. Exp. Stat.) BERJU.

S. Marcovitch, *Kieselfluornatrium als Insektenvertilgungsmittel*. Kieselfluornatrium wirkt als Kontakt- u. als Magengift. Es wurde im großen mit Erfolg angewandt gegen den mexikan. Bohnenkäfer u. den Baumwollkapselwurm, den Colorado-Käfer u. andere Schädlinge. Die beste Anwendungsweise ist Verstäuben in Mischung mit der neunfachen Menge $Ca(OH)_2$. (Ind. and Engin. Chem. 16. 1249. 1924. Knoxville [Tenn.]) GRIMME.

H. F. Meyer-Berm, *Mottenbekämpfung durch Eulan*. Vf. erörtert die Anwendung von Eulan u. die damit erzielten Erfolge. (Ztschr. f. ges. Textilind. 28. 31–39.) JUNG.

Roy C. Thomas, *Wirksame Bestäubung zur Bekämpfung des Haferbrandes*. Nach 3jährigen Verss. in Ohio waren Bestäubungen mit Cu- oder Ni-Salzen nicht ausreichend, den Haferbrand wirksam zu bekämpfen, dagegen wurden sehr gute Erträge erzielt, wenn 1 Teil des einen oder anderen Salzes mit 2 Teilen $HgCl_2$ fein vermahlen wurde, u. 1 bushel Getreide mit 3 Unzen dieses Gemisches bestäubt wurde. Neben der keimtötenden Wrkg. wurde durch diese Salzgemische auch die Keimkraft der Samen erhöht, was bei Behandlung mit CH_2O nicht der Fall war. Die beste Wrkg. wurde durch Vermischen von $CuCO_3$ mit $HgCl_2$ erzielt. (Science 64. 47–48. Ohio, Agric. Exp. Stat.) BERJU.

Curt Hornemann, *Über den Einfluß der Phosphatdüngung auf die Bildung von Vitamin „B“ in der Pflanze*. Durch Fütterungsverss. an Ratten wurde festgestellt, daß der Vitamingehalt bei Kartoffeln, Hafer u. Klee, welche nur auf einem mit N u. K gedüngtem Boden wuchsen, der gleiche war, wie bei den Pflanzen, welche außerdem noch mit P_2O_5 gedüngt wurden. (Ztschr. f. Pflanzenernähr. u. Düngung Abt. A 4. 84–104. Hamburg, Pharmakolog. Inst. der Univ.) BERJU.

E. J. Sheehy, *Vergleichung der Werte des Proteins, Fettes und der Kohlenstoffhydrate für die Milchfettproduktion*. Bei Fütterungsverss. an Ziegen, welche bei gleichem Grundfutter abwechselnd 1,25–2,25 lbs Maisstärke, 1,25 lbs Casein oder 0,5–1 lb hydrogeniertes Sojabohnenöl täglich erhielten, waren bei einem Minimumgehalt der konstituierenden Nährbestandteile Zugaben von Stärke oder Protein dazu gleichwertig. Zugaben von Fett hatten für die Milchfettproduktion die

2 $\frac{1}{2}$ -fache Wrkg. der ersteren. (Roy. Dublin Soc. Sci. Proc. n. ser. 17. Nr. 20. 211—18. 1923; Exp. Stat. Rec. 50. 579—80. 1924.)

H. Møllgaard, *Der Reinenergiewert der Rüben und Gerste bei der Verfütterung und die Bedeutung der Beziehung des Nährstoffverhältnisses zum Fütterungsdieser Futtermittel*. Fütterungsverss. an Rindern mit Stroh u. Sojabohnenmel. Zugabe von Rüben oder Gerste zeigten, daß der Reinenergiewert der Rüben dem Proteingehalt der gesamten Futtermischung bedingt wird, da die Rüben Protein enthalten. Die größten Energiewerte wurden bei einem Nährstoffverhältnis 1 : 5 erhalten. (Beret. Forsøgslab. K. Vet. og Landbohjskoles [Danmark] 111. 1. 1923; Exp. Stat. Rec. 50. 572. 1924.)

J. E. Breckenridge, *Bestimmung von Phosphorsäure in Düngemitteln*. volumetr. Best. von P_2O_5 liefert bei Rophosphaten gute Werte, während bei Analyse von Superphosphat u. Mischdüngern die vorhandenen Sulfate stören: I lassen sich wie folgt entfernen: 2 g der Probe werden im 200 ccm-Kolben 30 ccm HNO_3 u. einigen ccm HCl $\frac{1}{2}$ Stde. lang gekocht, verd. mit 50 ccm H_2O fällt h. mit 5%ig. $Ba(NO_3)_2$ -Lsg. (bei Superphosphat 50 ccm, bei Mischdüngern 25 ccm). Nach dem Abkühlen kann man dann ohne weiteres die volumetr. P_2O_5 -Best. ausführen. (Ind. and Engin. Chem. 16. 1180. 1924. Carteret [N. J.] GRIMM)

Th. Sabalitschka und **G. Kubisch**, *Die Oxalate des Harnstoffs und die quantitative Bestimmung als sekundäres Oxalat in Düngemitteln*. Die Nachprüfung des von JOHNSON (Journ. Soc. Chem. Ind. 40. 126; C. 1921. IV. 1210) angegebenen analyt. Verf. zeigte, daß der durch den Überschuß von Oxalsäure in der wässrigen amylalkoh.-äth. Harnstofflsg. bewirkte Nd. zum weitaus größten Teil aus Harnstoffoxalat besteht, so daß obige Methode zur Best. von Harnstoff in Düngemitteln ziemlich brauchbar ist. Bemerkenswert ist die Ausscheidung von reinem n. Oxalat bei Ggw. von Oxalsäure im Überschuß (vgl. SABALITSCHKA Ber. Dtsch. Pharm. Ges. 31. 183; C. 1921. III. 824). (Ztschr. f. Pflanzenernähr. u. Düngung Abt. A 3. 406—7. 1924. Berlin, Pharmazeut. Inst.)

Gabriel Bertrand, *Über die Bestimmung der verschiedenen Formen des Mangans in der Ackererde*. Um zu beurteilen, ob eine Mn-Düngung angebracht ist, ist die Best. des im Boden vorhandenen Mangan, wobei es darauf ankommt, ob es in einer für die Pflanze verwertbaren Form vorliegt. Als solche betrachtet Vf. hauptsächlich die von Carbonat u. Phosphat, die in CO_2 -haltigem oder andere schwachen Säuren enthaltendem W. l. sind, als deren Maß er die in verd. Essigsäure l. Menge bestimmt. Nur schwer dürften die Oxyde von der Pflanze verwertet werden, die die allgemeine Hauptmenge ausmachen; als Maß hierfür dient die nach Calciniertwerden in konz. HCl l. Menge. Die in Form von Humaten vorhandene Menge, wahrscheinlich von geringer Bedeutung, kann im Auszug mit verd. NH_3 -Lsg. bestimmt werden, der eingedampft, calciniert, dann ebenso wie im calcinierten Essigsäureauszug, durch Behandlung mit HCl in Lsg. gebracht u. mit H_2SO_4 abgeraucht wird. Die Gesamtmenge wird im calcinierten Boden nach Schmelzen mit Na_2CO_3 u. K_2CO_3 u. Abscheidung der Kieselsäure in üblicher Weise bestimmt. Schlußbest. in allen Proben erfolgt colorimetr. nach dem früher (Bull. Soc. Chim. de France [4] 9. 361; C. 1911. I. 1884) angegebenen Verf. Dieses wird durch Trübung durch etwa nicht vollständig abgeschiedene Kieselsäure gestört, event. auch durch eine solche infolge sehr reichlich vorhandenen Ca, das dann als $CaSO_4$ zugegen ist. In diesem Falle läßt man nach Oxydation zu $HMnO_4$ den Nd. vollständig absetzen u. dekantiert die überstehende Fl., ohne ihr Vol. zu ändern, und colorimetr. Vergleich. (Bull. Soc. Chim. de France [4] 35. 1522—27. 1924.)

S. Tovborg Jensen, *Über die Bestimmung der Pufferwirkung des Bodens*. U. Zugrundelegung der Unterss. von BJERRUM u. GJALDBAEK (Kong. Vet.-og Landbohjskole Aarskrift 1919. 48; C. 1920. IV. 125) wurde vom Vf. eine Methode

der Pufferwrkg. der Böden ausgearbeitet u. eingehend beschrieben, welche auf beruht, daß nach den früheren Unterss. von CHRISTENSEN u. JENSEN (Internat. Mitteil. f. Bodenkunde **14**. 1; C. **1924**. I. 2736) der Wert der oberen Grenze der Reaktionszahlen der am stärksten kalkhaltigen Böden bei der CO₂-Sättigung der at. Luft bei ca. $p_H = 8,4$ liegt u. demnach die Best. der Titrationszahl irgend eines Bodens nach Zusatz verschiedener Mengen $\frac{1}{10}$ -n. HCl bzw. H₂ die Möglichkeit bietet, zu bestimmen, wie große Mengen von CaCO₃ in dem Boden vorhanden sind, bzw. wieviel von diesem dem Boden zugesetzt werden muß, um den angegebenen p_H -Wert zu erreichen. Um durch diese Kurven die Pufferwrkg. der einzelnen Böden möglichst deutlich zu veranschaulichen, wurde für jede einzelne Kurve mit derjenigen Kurve zusammengestellt, die man durch die Sättigung eines pufferfreien Bodens mit denselben Säuren- bzw. Basenmengen erhalten würde.

Durch Ausmessung des Raumes zwischen den beiden so erhaltenen Grundkurven erhält man eine in Zahlen ausgedrückte Übersicht über die Pufferwrkg. der verschiedenen Böden. Wie weiter gezeigt wird, lassen sich die hierbei erhaltenen Diagramme auch zu einer exakten Best. der Pufferwrkg. in den verschiedenen Intervallen der p_H -Skalen benutzen. (Internat. Mitteil. f. Bodenkunde **12**—**30**. **1924**. Lyngby, Dänemark.) BERJU.

Max Trénel, *Darf die elektrometrische Bestimmung der Acidität von landwirtschaftlichen Kulturböden in chlorkaliumhaltiger Suspension erfolgen?* Die Berechtigung KCl-Zusatzes wurde durch Vergleich mit der durch Titration bestimmten „Gesamtacidität“ nachgewiesen. Auch die Gesamtacidität kann in KCl-haltigen Aufschlammungen durch die elektrometr. Best. schnell ermittelt werden. Die p_H wasserarmer Bodenextrakte ist nur innerhalb gewisser Grenzen eine dem Boden entsprechende Größe. Durch die Pufferwrkg. des KCl werden die Grenzen eingebränkt. In den Fällen, in denen durch KCl-Zusatz die Acidität verstärkt wurde, konnte der Austausch von Al nachgewiesen u. die Unterss. von DAIKUNAGA, KAPPEN u. Mitarbeitern bestätigt werden. (Internat. Mitteil. f. Bodenkunde **13**—**45**. **1924**. Berlin, Preuß. Geolog. Landesamt.) BERJU.

Otto M. Reis, *Einige Beobachtungen und Gedanken bei Gelegenheit von Bodenverschlammungen*. Bei dem Schlämmen von Lehm Böden mit Münchener Leitungswasser (enthaltend CaCO₃ i. l.) wurde eine starke Anreicherung des CaO-Gehaltes in den feinen u. tonigen Bestandteilen der Böden beobachtet. Vergleichende Schlammung von Lehm Böden mit Leitungs- u. dest. W. zeigten, daß die Tonbestandteile die Verfestigung in dem trocknenden Schlammrückstand begünstigen, u. daß der CaO-Gehalt des W. diese unmittelbar durch Ausflockung des Tonigen auch im feinsten Beschleunigt. (Internat. Mitteil. f. Bodenkunde **14**. 172—75. **1924**. München.) BE.

E. R. de Ong, *Toxizität von Nicotin als Insekticid und Parasiticid*. Freies Nicotin wirkt bedeutend tox. als seine Salze, so daß man Bestst. von Nicotinpräparaten am besten mittels der Flüchtigkeitsprobe anstellt. Vf. bringt vergleichende Best. nach Flüchtigkeit u. Wirksamkeit bei Schmetterlingen etc. von allerhand fl. Präparaten. Die Resultate sind tabellar. mitgeteilt. (Ind. and Engin. Chem. **16**. 1275—77. **1924**. Berkeley [Calif.]) GRIMME.

Société d'Études Chimiques pour l'Industrie, übert. von: **Joseph Bresler** und **Charles Goudet**, Genf, *Düngemittel*. (A. P. **1501645** vom 22/6. **1922**, Pat. 15/7. **1924**. — C. **1922**. IV. 880. **1924**. I. 2737 [Schwz. P. 102681].) KÜ.

Asahi Glass Company, Ltd., übert. von: **Masao Igawa**, Tokio, *Düngemittel*. (A. P. **9075** vom 20/9. **1922**, ausg. 10/4. **1923**. — C. **1923**. IV. 873.) KÜHLING.

Wargöns Aktiebolag und **Johan Hjalmar Lidholm**, Schweden, *Düngemittel*. Das Düngestoff wird mit den CaCO₃, Graphit u. andere Stoffe enthaltenden Rückständen

vernahlen, welche bei der Herst. des Harnstoffes aus Kalkstickstoff verbleiben (F. P. 576305 vom 24/1. 1924, ausg. 14/8. 1924.) KÜHL

Maurice Spitzer, Frankreich, *Kalkstickstoff*. Fein gepulvertes, gegebene vorgewärmtes CaC_2 wird einem mit gegebenenfalls vorgewärmtem N_2 gespülten Gebläse, u. das Gemisch einer heizbaren Reaktionskammer zugeleitet, in der es sich zu pulverförmigem Kalkstickstoff umsetzt. Die Mengen von CaC_2 können durch in den Zuleitungen angebrachte Schieber geregelt werden. Das Zeugnis wird mittels N_2 aus der Reaktionskammer entfernt, der sich dabei e. u. in diesem Zustand zur Azotierung weiterer Mengen von CaC_2 verwendet (F. P. 575498 vom 15/3. 1923, ausg. 30/7. 1924.) KÜHL

F. Stötzl, Zehlendorf bei Berlin, *Düngemittel*. Abwasserschlämme werden gegebenenfalls mit H_2SO_4 getränktem Torf, Holzkohle, Kehrlicht, Müll o. dgl., w. zwischen gelochten Platten gelagert sind, gefiltert u. der Rückstand samt Fäulnisstoff mit gemahlenem Kalk- oder Gipsstein u., wenn erforderlich, Kaliumknochenmehl, organ. Abfallstoffen, Rückständen der Zuckerindustrie oder Stickstoffverarbeitung u. dgl. gemischt. Das Filtrat wird in im Zickzack geführten Kanälen mit Alaun versetzt, um Fett zu gewinnen. (E. P. 224226 vom 27/10. 1923, ausg. 24/12. 1924. Prior. 3/11. 1923.) KÜHL

Henry W. Earp-Thomas, New York, *Kulturen nützlicher Bodenbakterien*. Gepulverter Glaukonit, der die Entw. nützlicher Bodenbakterien begünstigt, Lebensfähigkeit schädlicher Kleinlebewesen dagegen beeinträchtigt, wird mit trockenem Torf oder anderem humösen Stoff, einem zuckerhaltigen Nährmittel, Holzasche, Schwefel u. fein gepulvertem Rohphosphat, Thomas- oder Knochenmehl gemischt, wenn erforderlich schwach alkalisiert u. sterilisiert, wenn die Mischung nicht für die Benutzung von sterilisiertem Torf u. Glaukonit hergestellt worden war. Die Mischung wird dann angefeuchtet, mit Reinkulturen nützlicher Bodenbakterien geimpft, Luftzutritt u. zeitweiliger Erneuerung des verdunsteten W. mehrere Tage bei geeigneter Temp. erhalten u. dann dem Boden einverleibt. Geringe Mengen genügen, um günstige Wrkgg. auf die Bodenfruchtbarkeit auszuüben. (A. P. 1515016 vom 25/11. 1921, ausg. 11/11. 1924.) KÜHL

Köln-Rottweil Akt.-Ges., Berlin, *Verfahren zur Behebung oder Verringerung des schädigenden Einflusses tierischer oder pflanzlicher Schädlinge auf pflanzliche Gebilde* durch deren Behandlung mit *Chlordioxyd*. — Das zu behandelnde Gebilde wird entweder mit einer verd. wss. Lsg. von ClO_2 besprengt oder in eine solche Lsg. getaucht. Beim Eintauchen von *Getreidekörnern* in eine gesätt. wss. ClO_2 -Lösung bei 15° wird z. B. ohne Herabsetzung der Keimfähigkeit des Getreides eine sofortige Vernichtung der anhaftenden Sporen von Steinbrand bewirkt. Tier. Schädlinge wie *Raupen* oder *Läuse*, werden zwar nicht immer völlig vernichtet, jedoch wird ihr schädigender Einfluß auf die Pflanzen in hohem Maße gelähmt. (D. R. P. 405919 Kl. 451 vom 7/4. 1922, ausg. 10/11. 1924.) SCHOTTLÄNDER

E. Merck, Chemische Fabrik, Darmstadt, *Saatgutbeize*, bestehend aus *Magnesiumhypochlorit* oder *-bromit*. — Die Mg-Hypohalogenite können auch als Gemisch mit in W. l. sauren Salzen, wie KHSO_4 oder NaHCO_3 , verwendet werden. Dies erfolgt in der üblichen Weise durch Bespritzen oder Eintauchen des Saatgutes in die wss. Suspension der bas. Hypohalogenite u. der sauren Salze. Infolge der langsamen Abspaltung von HClO oder HBrO besitzen die Beizfl. eine besonders nachhaltige u. ausgiebige Wrkgg. (D. R. P. 406014 Kl. 451 vom 15/11. 1922, ausg. 13/11. 1924.) SCHOTTLÄNDER

William S. Baldwin, Houston, Texas, V. St. A., *Insektenvertilgungsmittel*, bestehend aus PAe.-haltigem Petroleum, etwas Chlf. u. wenig Senfö. — Das auf die Pflanzen gespritzte Mittel dient insbesondere zur Vernichtung des *Baumwollenspinners*.

u. seiner Larven u. Eier. (A. P. 1520924 vom 3/1. 1924, ausg. 30/12. SCHOTTLÄNDER.)

Hermanus Gerardus Ringeling und **Neeltje Louwrina Wibaut-Isebreë** ns, Amsterdam, Niederlande, *Verfahren zur Vertilgung von in Stoffen oder nständen lebenden schädlichen Insekten*, dad. gek., daß die die Insekten, ihre oder ihre Larven enthaltenden Stoffe oder Gegenstände in einen Raum ein-acht werden, den man nach dem Einbringen der Stoffe oder Gegenstände zu-ist möglichst luftleer macht u. in den man dann trockenes *Ammoniakgas* ein-ia läßt, welches man eine gewisse Zeit lang bei 15° auf die Stoffe oder Gegen-ple einwirken läßt. — Man bringt z. B. die Stoffe oder Gegenstände in einen en Behälter, evakuiert diesen bis auf einen Druck von 100 mm Hg, führt aus Stahlflasche trockenes NH_3 -Gas ein, bis der Druck auf 420 mm steigt, stellt NH_3 -Zufuhr ab u. läßt dann das NH_3 während 1 Stde. einwirken, wobei der k auf 360 mm fällt. Hierauf wird das NH_3 aus dem App. abgesaugt, Luft lassen u. der Behälter entleert. Das angewandte Gas ist für den Menschen ältismäßig unschädlich. Gewebe, Metalle, Holz, Tabak, Kopra, Federn, bohnen u. Pflanzenfasern werden von ihm nicht angegriffen, zumal die Einw. en u. bei 15° erfolgt. Das Verf. eignet sich insbesondere zur Vernichtung von *Wurmern* (*Lycus Caniculatus*), *Totenuhren* (*anobium pertinax*), *Motten* u. *Milben* (*Phagopus domesticus*). (Schwz. P. 105419 vom 25/8. 1923, ausg. 1/7. 1924. Prior. 10/11. 1922. E. P. 204289 vom 1/6. 1923, ausg. 18/10. 1923. Holl. r. 10/11. 1922. F. P. 570754 vom 24/8. 1923, ausg. 7/5. 1924. Holl. Prior. 1. 1922.) SCHOTTLÄNDER.

Henry G. Meeks und **Frederick Stevenson**, Palmetto, Florida, V. St. A., *Mittel zur Behandlung von durch Meltau befallenen Tomatenpflanzen*, bestehend MgSO_4 , S, NaNO_3 u. Ca(OH)_2 oder Kieselgur oder Fullerde als indifferentem ittel. — Zum Gebrauch wird das pulverförmige Mittel in wss. NH_3 gel. u. eritzt. (A. P. 1520197 vom 9/6. 1923, ausg. 23/12. 1924.) SCHOTTLÄNDER.

Harry W. Houghton, Glen Echo, Maryland, V. St. A., *Räuchermittel zur Ver-ug von Ungeziefer und Bakterien*, bestehend aus HCN u. einem *Cyanhalogenid* eizmittel. — Das Mittel wird erst am Orte seiner Benutzung derart erzeugt, a man in einem offenen Gefäß befindliche verd. HCl mit in W. l. Cyaniden u. raten versetzt u. zwar in solchen Mengen, daß z. B. nach der Gleichung: $\text{HCN} + \text{NaClO}_3 + 7\text{HCl} = 5\text{NaCl} + \text{HCN} + 3\text{CNCl}$, ein ca. 25% HCN u. CNCl enthaltendes Gasgemisch entsteht. Der Arbeiter muß mit einer Gas-e versehen sein. Nach etwa 1-std. Einw. auf die zu begasenden Stellen ist egewünschte Wrkg. erzielt, worauf die Fenster u. Türen, bei Begasung ge-essener Räume, geöffnet werden können. Die tränenreizende Wrkg. des CNCl s erst auf, wenn keine HCN mehr anwesend ist. Das Gasgemisch läßt sich in W. gel. als *Spritzmittel* für Pflanzen u. Bäume verwenden. (A. P. 1521537 21/6. 1924, ausg. 30/12. 1924.) SCHOTTLÄNDER.

III. Metallurgie; Metallographie; Metallverarbeitung.

Harry Hyman, *Alte Schriftsteller über Metallurgie*. V. Mitt. Pettus. (IV. vgl. 0.) Sir JOHN PETTUS hat 2 metallurg. Bücher geschrieben: „*Fodinae Regales, the History, Laws and Places of the Chief Mines and Mineral Works in Eng- u, Wales, and the English Pale in Ireland, 1670*“ und „*Fleta Minor, The Laws rt and Nature in Knowing, Judging, Assaying, Fining, Refining and Inlarging odies of Confin'd Metals, 1683*“. In der „*Fodinae Regales*“ gibt er eine Über- über die Bergwerks- u. metallurg. Operationen Englands im 17. Jahrhundert, trend die „*Fleta Minor*“ eine Übersetzung einer metallurg. Abhandlung LAZARUS

ERCKERS, des Generalinspektors der ungar. Bergwerke, ist. 1613 geboren, s
er 1690 in völliger Armut. (Metal Ind. [London] 26. 10.) WILK

C. H. Mathewson, *Die Entwicklungsrichtung in der physikalischen Metallu*
Eine Skizze über die Entwicklungsgeschichte der Metallurgie ab 1864. Der mod
Entwicklungsverlauf hat das Bestreben, eine Konstitutionstheorie der Einzelph
bezw. Phaselemente aufzustellen, die die Eigenschaften u. Zwischenbeziehun
dieser Phasen quantitativ zum Ausdruck bringt. Vf. erblickt den in nächster Zu
zu erwartenden Fortschritt in der Aufstellung genauer Daten über die Konstitu
einphasiger krystalliner Körper u. in einer genauen Charakterisierung der Mögli
keiten struktureller Variation unter wechselnden technol. Bedingungen. (Jo
Franklin Inst. 199. 37—50. Yale Univ.) K. WOL

Paul Schmieder, *Beitrag zur Röstung von Zinkblende mit Berücksichtigung*
den nachfolgenden Destillationsprozeß. Nach eingehender Besprechung des F
vorganges beschreibt Vf. eine Rösttrommel mit eigenartiger Ausmauerung, d
die die Röstluft unter das Röstgut eingeleitet, unter dem Röstgut hingeführt
durch dasselbe hindurchgedrückt wird. Eine besondere Heizung ist selbst l
Rösten der schwierig abzuröstenden Zinkblende nicht nötig; nur bei Inbetriebna
ist die Trommel auf die Rösttemp. zu bringen. (Metall u. Erz 22. 11—14.) WILK

F. C. Thompson, *Wirkung der Temperatur auf die Eigenschaften der Met*
Vf. bespricht die krit. Temp. der verschiedenen Metalle, bei denen sich die mec
Eigenschaften plötzlich ändern u. behandelt besonders die Änderung der Ei
schaften von reinem Fe-Draht bei 120°, die sich aber aus der Zus. u. Mikrostru
des Materials nicht erklären läßt. (Metal Ind. [London] 25. 609—11. 1924.) WILK

Henry D. Hibbard, *Schmelztemperaturen von einfachem Ingotstählen.* Aufstell
einer Tabelle für die Temp. von schmelzendem Fe bis zu 1,50% C unter
nachlässigung des Einflusses von Mn (1% erniedrigt 3°) u. Si (1% erniedrigt 1
(Trans. Amer. Inst. Mining and Metallurg. Eng. 1924. Nr. 1384. 13 Seiten. Plainf
N. J.) WILK

P. Goerens, *Wege und Ziele zur Veredelung von Gußeisen.* Vf. gibt
Zusammenfassung der Faktoren, die für die Eigenschaften, bezw. die Veredel
von Gußeisen maßgebend sind. Es sind eine Reihe von Schau- u. Gefügebild
beigefügt. (Stahl u. Eisen 45. 137—40. Essen.) LÜDE

A. Wimmer, *Über den Einfluß des Sauerstoffs auf die physikalischen und*
nischen Eigenschaften des Flußeisens. Die Eigenschaften sowie das Gefüge e
Reihe systemat. erschmolzener Flußeisenlegierungen mit 0—0,2% O wurden un
sucht, wobei sich ergab, daß die Streckgrenze, Festigkeit, Dehnung, Kontrakt
Brinellzahl u. die Zähigkeit teilweise sehr stark abnahmen. Dasselbe trifft auf
Warmbildsamkeit u. Kaltbildsamkeit zu. Die Rotbruchgrenze liegt etwa
0,130% O; bei diesem Gehalt zeigt sich auch schon Kaltbruch, deutlicher bei 0,15
Bei der Kornätzung ergab sich mit steigendem O-Gehalt ein zunehmendes K
wachstum. (Stahl u. Eisen 45. 73—79. Dortmund.) WILK

J. M. Quinn, *Die Herstellung von Mangan-Gußstahl.* Vf. bespricht an E
von Analysen u. Schaubildern die Gewinnung von Mn-Gußstahl im elek
Ofen, Schlackenzus. u. physikal. Eigenschaften. (Foundry 52. 964—66. 1
Cleveland [O.]) LÜDE

F. Rapatz und H. Pollack, *Über Schwarzbruch.* Das Auftreten von Schw
bruch bei Stählen ist an das Vorhandensein von Temperkohle gebunden.
untersuchen Stähle mit etwa 1,30—1,40% C u. 0,10—0,30% Si u. 0,10—0,30%
Hieraus scheidet sich Temperkohle ab, wenn sie von 1000° sehr langsam
etwa 150° abgekühlt werden. Je nach Art der Abkühlung erhielten Vf. bis
0,64% Temperkohle. Es gelingt mithin auf diese Weise, das metastabile Sys
Fe—C (Auftreten von Fe₃C) teilweise in das stabile System überzuführen.

Schwarzbruch zu erhalten ist es ferner nötig, den Temperkohle enthaltenden zu strecken, u. zwar bei einer Temp., wo die Temperkohle nicht mehr in feste geht. Bei höheren Gehalten von freiem C wie beim Grauguß kann Schwarzbruch auch ohne vorherige Verformung eintreten. — Hieraus folgt für die Praxis, Schwarzbruch vermieden wird, wenn man die betreffenden Stähle auf hohe Temp. (über 1000°) erhitzt u. ebenfalls bei einer Temp. schmiedet, bei der nach Diagramm die ausgeschiedene Temperkohle wieder in Lsg. geht. — Von den Legierungsbestandteilen begünstigt Si das Auftreten von Schwarzbruch, und ein Cr-Zusatz ihm entgegen wirkt. (Stahl u. Eisen **44**. 1509—14. 1924. Eldorf-Oberkassel.)

LÜDER.

Walter Eilender, *Die Stahlherstellungsverfahren unter dem besonderen Gesichtspunkte der Edeltahlerzeugung*. Der Einfluß von H, N, CO u. CO₂ bei der Stahlherstellung wird kurz besprochen, die Wrkg. des zum Frischen der Schmelze ihr zuzuführenden O u. das Desoxydationsproblem werden eingehend erörtert. Der Einfluß anderer Stahlschädlinge, unter denen P u. S die wichtigsten sind, tritt hinter von O u. oxyd. Schlacken im Edeltahl weit zurück. Für die Herst. von Stahl ergaben sich folgende Richtlinien: 1. Weitestgehende Desoxydation unter höchster Ausschaltung von Desoxydationsmitteln, die feste Desoxydationsprodd. (Schlacken) bilden. 2. Durchbildung von Verff. zur Desoxydation mit C unter vermindertem Druck. 3. Möglichkeit des Ausgarens u. Abstehenlassens. 4. Weitestgehende Reinigung des Stahles, vor allem von P u. S, unter besonderer Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit der Verff. 5. Sichere Temp.-Führung zur Durchführung der Verff. — Das Thomasverf. kommt für Edeltahl nicht in Betracht, weil es nicht das saure oder bas. Bessemern. Besser liegen die Verhältnisse beim Bessemer-Martinverf. Besonderer Vorteil bei Herst. harter Werkzeugstähle im Bessemer-Martinofen bietet die Verwendung reinen Roheisens, z. B. schwed. Holzbohm- oder entsprechend zusammengesetzten Elektorroheisens wegen deren niedrigen P- u. S-Gehaltes. Nach dem Herunterfrischen auf den gewünschten C-Gehalt wird die Stahlschmelze sofort abgegossen. — Die Desoxydationsvorgänge im Elektroofen kommen denen im Tiegel am ehesten gleich. Wo höchstleistungsfähige Leistung u. Gleichmäßigkeit unbeschadet des Preises gefordert werden, kommt auch heute noch Tiegelstahl den Vorzug, sonst kommt ihm Elektrostahl in allen Eigenschaften am nächsten. — Nach der chem. Gleichgewichtslehre muß im Elektroofen die Desoxydation mit C allein ohne andere feste Desoxydationsmittel, bildende Desoxydationsmittel gelingen, wenn der Partialdruck des CO oder der Druck der Ofenatmosphäre erniedrigt wird. YENSEN (Bull. Univers. Illin., 1914. Nr. 72) hat bewiesen, daß unter vermindertem Druck Elektrostahl erfolgreich herstellbar ist. (Stahl u. Eisen **44**. 1637—44. 1924.) NEUFELD.

Paul Goerens, *Die Eigenschaften der Edeltähle*. Der Inhalt der Arbeit entspricht einer gekürzten Wiedergabe. Ihr Wert liegt in den zusammenfassenden Ergebnissen über die bisherigen Erkenntnisse. Sie werden teils in umfangreichen Tabellen, teils in Schaulinienbildern u. in einer mehrseitigen graph. statist. Darstellung über die Zus. u. die Eigenschaften von 56 Edeltählen dargestellt. Besprochen werden die Beziehungen zwischen Eigenschaften u. Verh. der Stähle in der Praxis, der Wert der Festigkeitszahlen zur Beurteilung der Güte des Edeltahls, die wichtigsten Baustähle u. ihre Eigenschaften, Stähle für physikal. Anwendungszwecke, zuletzt Werkzeugstähle. Für diese kann eine zahlenmäßige Darst. ihrer Eigenschaften an Hand mechan. u. physikal. Prüfungen nicht gegeben werden, da für ihre Verwendung maßgebenden Eigenschaften nicht durch die üblichen Methoden der Materialprüfung erfaßt werden. Die Werkzeugstähle werden daher von einem gemeinsamen metallograph. Gesichtspunkte aus betrachtet. (Stahl u. Eisen **44**. 14—59. 1924.)

NEUFELD.

H. Neuhaus, *Neue Beiträge zur Kenntnis des Tiegelzementstahls*. Nach Lancashireverf. hergestelltes Schweißisen wird in Stangen von 75×15 mm Q schnitt, zur Zementation in Meilerholzkohle verpackt, 8–10 Tage auf 1000–1100°C geglüht. Mit dem Anheizen u. Abkühlen der zweiteiligen, 22–25 t fassen Ofeneinheit dauert ein Brand etwa 3 Wochen. Die Rohschiene hat vor Zementation 0,01–0,15% C. Die C-Aufnahme wird auf 0,9–1,5% heraufgetrieben. Die Unters. der Gase aus den Zementierkisten ergibt, daß die Zementation Schweißisenrohschiene von einer gleichzeitigen Red. des O aus ihr begleitet ist. Um das zu belegen, wurden Zementationsverss. mit Eisenoxiden u. künstliche Silicate ausgeführt. Glühungen im Vakuum bei 1120–1160° erwiesen, daß Tiegelzementstahl ein außerordentlich O-arme Stahl ist. Seine Herst. ist wirtschaftlich ungünstig, da der therm. Wirkungsgrad des Zementationsverf. nur 1,8–2,4% trägt. Zementstahl wird sich darum bei voller Würdigung seiner hervorragenden Eigenschaften, z. B. für Schneidwaren oder als Verbundstahl, nur dort erhalten können, wo sich bei geringem Stahlgewicht hohe Verarbeitungskosten lohnen. Das Verh. von S u. P bei der Zementation wurde ermittelt. (Stahl u. Eisen 1664–68. 1924.) NEUFELD

Franz Pacher und **Fritz Schmitz**, *Vergleichende Untersuchungen über das Verhalten von Edelstahl beim Schmieden unter dem Hammer und unter der Presse*. Nach einem ausführlich beschriebenen Versuchsplan wurden mit 6 verschiedenen harten legierten Edelstählen Schmiede-, Kerbschlag- u. Zerreißverss. ausgeführt. Bei diesen zeigte sich bemerkenswerte Übereinstimmung der verschiedenen Schmelzbarkeit unter Hammer u. Presse mit den Zahlenwerten der Warmkerbschlagproben u. der Dehnung u. Einschnürung von Warmzerreißproben. Ferner wird der günstige Einfluß einer n. Vorschmiedung unter dem Hammer auf das weitere Verh. der Edelstähle bei der Warmverformung unter Hammer u. Presse beschrieben. Ursache für das verschiedenartige Verh. der Stähle unter Hammer u. Presse wurde Rekristallisationserscheinungen, Zertrümmerung des Ledeburits, Abkühlung der Stähle durch die Schmiedesättel u. die Wirkung verschiedener Schmiedetemperaturdrucke erkannt. (Stahl u. Eisen 44. 1668–74. 1924.) NEUFELD

Erich Siebel, *Über die Eigenschaften der Edelstähle bei den technischen Formgebungsbedingungen*. An Hand von dynam. Warmbiegeverss. wurde der Einfluß der Formänderungsgeschwindigkeit auf die Formänderungsfestigkeit von Edelstählen untersucht. Dabei ergaben sich bei mittleren in der Technik gebräuchlichen Formänderungsgeschwindigkeiten Steigerungen der Festigkeit von 200–300% gegenüber dem Warmzerreißvers. — Zwei Deutungsverss. sind möglich: 1. Die hohe Festigkeit bei dynam. Verss. kann allein darauf zurückgeführt werden, daß mit höheren Formänderungsgeschwindigkeiten die inneren Reibungswiderstände nach Art der Reibungszäher Fl. in Abhängigkeit von der Verschiebungsgeschwindigkeit steigen. 2. Gegenüber stat. Festigkeit beim Kaltbiegevers. spricht die verhältnismäßig geringe Zunahme der dynam. gegenüber stat. Festigkeit beim Kaltbiegevers. 2. Auch bei den hohen Tempp. ist mit primären Verfestigungserscheinungen zu rechnen, die aber beim stat. Vers. stets durch eintretende Rekristallisation wieder rückgängig gemacht werden. Beim dynam. Vers. scheint die Geschwindigkeit der Rekristallisation häufig unter der der Formänderung zu liegen. In diesem Falle ist mit wesentlicher Verfestigung zu rechnen. — Aus den Vers.-Ergebnissen wurde auf das Verh. der Edelstähle bei den technischen Formgebungsverss. gefolgert. Dabei wurden die hohen techn. Formänderungswiderstände, die Empfindlichkeit gegen das Überschreiten der Grenzformänderungsgeschwindigkeit u. die Gleichgewichtszustände in der Formänderungszone besprochen. (Stahl u. Eisen 44. 1675–78. 1924.) NEUFELD

Otto Emicke und **M. Rodenbach**, *Formungsvorgänge beim Rundwalzen von Stahl mit wechselndem Kohlenstoffgehalt*. Die Erscheinung, daß bei gleicher Kali-

ung, Walztemp. u. Walzgeschwindigkeit, aber bei wechselndem C-Gehalte wechselnden Legierungsbestandteilen ein verschiedenes Enderzeugnis erhalten lie, führte zu Verss., die zunächst den Einfluß von C-Gehalt, Walzgeschwindigkeit u. Temp. erfassen sollten. Es ergab sich, daß mit wachsendem C-Gehalt der Querschnitt des Ovalstiches sich vermindert, trotzdem wird das Enderzeugnis größer und genauer, als bei Material mit niederem C-Gehalt, bei dem der Ovalquerschnitt kleiner ist. (Stahl u. Eisen 44. 1679—80. 1924.) NEUFELD.

Walter Schneider und **Eduard Houdremont**, *Die Rekristallisation von Kohlenstoffstählen und legierten Stählen*. Stähle mit höheren C-Gehalten u. legierte Stähle wurden auf Rekristallisation nach vorangegangener Kaltbearbeitung untersucht, um die Beziehungen zwischen Kaltbearbeitung u. Rekristallisationstemp. — Beginn u. Ende — sowie deren Beeinflussung durch Legierungselemente festzustellen. Geprüft wurden ein Mn-Stahl (0,52% C, 1,08% Mn, 0,22% Si, 0,023% P, 0,07% S), ein Stahl mit hohem Cr-Gehalt (2,12% C, 0,42% Mn, 0,26% Si, 0,01% Cr, 0,020% P, 0,014% S) u. ein W-Cr-Stahl (0,46% C, 0,43% Mn, 0,20% Si, 0,01% W, 0,95% Cr, 0,018% P, 0,009% S). Das Verf., die Rekristallisationsbedingungen zu erfassen durch Ausführung von Warmzerreiðverss. u. Verfolgung der Verformung halb der Höchstlast eintretenden Verfestigung führte zu keinen exakten Ergebnissen wegen der Schwierigkeit, die Formänderungsgeschwindigkeit in weiten Grenzen zu verändern u. die Zerreiðverss. über größere Zeitintervalle bei gleicher Verformungsgeschwindigkeit gleichmäßig auszudehnen. Deshalb wurde später die Rekristallisation durch Unters. der Festigkeitseigenschaften so bestimmt, daß die Zugstangen auf der Ziehbank in mehreren Zügen ohne Zwischenglühung auf der kleineren Durchmesser heruntergezogen u. nach jedem Zuge einzelne Stäbe der Vers.-Stange abgetrennt, bei wachsenden Tempp. 2 Stdn. geglüht u. dann Raumtemp. zerrissen wurden. Hierzu dienten 3 Kohlenstoffstähle (0,68% C, 0,01% Mn; 1,02% C, 0,32% Mn; 1,32% C, 0,40% Mn), 1 Mn-Stahl (0,50% C, 0,01% Mn), 1 Cr-Ni-Stahl (0,13% C, 0,72% Cr, 3,66% Ni), je 1 hoch- u. niedrig legierter Cr-Stahl (1,05% C, 0,80% Cr; 0,45% C, 15,7% Cr) u. 2 W-Stähle (1,25% C, 0,01% W; 0,67% C, 3,99% Cr, 16,2% W). Für die prakt. Anwendung ergibt sich: Die Beseitigung der durch die Verformung veränderten mechan. Eigenschaften durch Erhitzen 700° nicht überschritten zu werden mit Ausnahme der sehr hoch legierten Stahldreh- u. Cr-Stähle. Umkristallisation ist also nicht nötig, daher entgeht der Gefahr einer bei der Glühung durch oxydierende Atmosphäre eintretenden Verkohlung des Glühgutes. (Stahl u. Eisen 44. 1681—87. 1924.) NEUFELD.

Herbert Eicken und **Willy Heidenhain**, *Einfluß von Ziehgeschwindigkeit, Querschnittsabnahme und Kohlenstoffgehalt auf die mechanischen Eigenschaften gewalzter Stahldrähte*. Kraftbedarf beim Ziehen. Kalt gezogen wurden 5 C-Stähle verschiedener Zus. aus Siemens-Martinmaterial mit verschiedenen Geschwindigkeiten von 0,42, 0,57, 1,00 m/sek bei Querschnittsverminderungen von 5 mm Durchmesser auf 2 mm zur prakt. Undurchführbarkeit, der dazu erforderliche Kraftbedarf wurde ermittelt. Es ergab sich, daß die angewendeten Ziehgeschwindigkeiten prakt. keinen Einfluß auf die mechan. Eigenschaften der untersuchten Drähte ausüben. Für eine Drahtsorte mit 0,83% C wurde außerdem die Ziehgeschwindigkeit von 1,40 m/sek verwendet. Auch hier trat keine Veränderung der mechan. Eigenschaften ein. Die Streckgrenze u. Streckgrenze steigen mit dem C-Gehalt u. der Querschnittsverminderung; derart, daß die Streckgrenze sich mit zunehmender Verfestigung der Bruchgeschwindigkeit nähert. Dehnung u. Kontraktion fallen stark nach dem ersten Zuge, um dann im weiteren Verlaufe einen ziemlich konstanten Wert beizubehalten. Biege- u. Zugfestigkeitszahlen steigen mit fallendem Querschnitt, sinken jedoch bei Überschreitung des inneren Arbeitsvermögens des Drahtes rasch ab. Alle Tatsachen sind in zahl-

reichen Zahlentafeln u. Schaulinien wiedergegeben. (Stahl u. Eisen 44. 1687—1924.) NEUFELD

Anton Pomp, *Das Kaltwalzen von Edelftahl*. Kaltgewalztes Bandeseisen für die Verwendung in den weiter verarbeitenden Industrien viele Vorteile. Blechtafeln. Die beim Kaltwalzen von Bandstahl eintretenden Gefügeänderungen werden besprochen u. ihr Einfluß auf die Formänderungsfähigkeit u. Härtebar erörtert. Der im Flugzeugbau für U-förmige Profile neuerdings gebrauchte C-Stahl (0,30% C, 1,5% Cr, 3,5—4% Ni) in Bandform erfährt durch Kaltwalzen Glühen weitgehende Gefügeverbesserung u. Homogenisierung, so daß Festigkeitswerte von 15 kg/mm² bei einer Dehnung von 15% erzielt werden. Dem Vf. gel es, Fe-Si-Band für den Dynamo- u. Transformatorenbau mit mehr als 4% Si „endlosen“ Bändern zu verarbeiten, dadurch, daß, je nach Höhe des Si-Gehal bei 50—250° gewalzt wird. Auch hierbei werden, wie beim Kaltwalzen, die Eigenschaften verbessert. Der nur in geringer Menge vorhandene C geht prakt. v in Graphit über, was für bestimmte magnet. Eigenschaften von Vorteil ist. Gleichzeitig tritt weitgehende Gefügeverfeinerung ein. Der Wattverlust nimmt bei so handelten Bändern sehr günstige Werte an. Eine auf 0,20 mm Stärke ausgewa u. dann längere Zeit bei 800° geglühte Legierung mit 4,6% Si ergab mit e Epsteinischen App. nach dem Wattmeterverf. geprüft eine Verlustziffer V_{10} , d. h. den Wattverlust je kg u. 50 Perioden bei der Induktion $\mathfrak{B} = 10000$, von 0 (Stahl u. Eisen 44. 1694—96. 1924.) NEUFELD

Franz Brüsewitz, *Wärmebehandlung bei Einsatzhärtung*. Vf. warnt d die Begriffe Zementation, Einsatzhärtung u. Oberflächenhärtung, wie das hä geschieht, im gleichen Sinne zu gebrauchen u. erklärt die Begriffe. Durch Ve wurde der Einfluß der verschiedenen Behandlung nach dem Einsetzen eines Ni Stahles (0,12% C, 0,45% Mn, 0,15% Si, 1,50% Cr, 4% Ni) festgestellt u. d Vergleich der Kerbzähigkeit der Härte u. des Kleingefüges ermittelt, ob d satz gut schnell erkalten soll oder langsam abkühlen kann. Das beste Verf. Härtung direkt aus dem Einsatz in Öl, Zwischengühlung bei 600° 1 Stde., Sch härtung bei 765—800° in H₂O oder Öl je nach Größe des Werkstoffes. (Stahl Eisen 44. 1697—98. 1924.) NEUFELD

Hans Redenz, *Verschleißversuche mit Kugellager-Chromstahl*. Cr-Stähle 1—1,2% C u. 1,2—1,9% Cr wurden auf der Amsler-Maschine bei rollender Reib ohne Schmiermittel untersucht, um eine der wirklichen Beanspruchung der Ku lager ähnliche Beanspruchung zu haben. Die Einzelheiten der Vers.-Anordn siehe in der Arbeit. Der Einfluß steigender Belastung wurde bei 50, 100 u. 200 untersucht. Die Ergebnisse sind: 1. Auch bei dem harten Material konnte Verschleiß als Folge von Kaltdeformation u. Loslösen kleiner Teilchen na gewiesen werden. 2. Das Verh. der Gegenscheibe ist bei dem harten Mate regelmäßiger als angenommen wurde, läßt aber bei Gebrauch von Kugelmate noch keinen Schluß auf das prakt. Zusammentreffen von Laufring u. Kugel 3. Belastung u. Drehzahl bestimmen auch bei hartem Material vor allem den V schleiß. Ihre Zunahme steigert den Gesamtverschleiß, verringert aber den spe Verschleiß. Erst bei stärkerer Belastung steigen schließlich Gesamt- u. spezif. V schleiß gleichzeitig sehr stark an. 4. Bei Verschleißverss. harter Stoffe sind be Verschleißarten gleichzeitig zu berücksichtigen. Die Verschleißfestigkeit ke zeichnet beide genügend. 5. Der Verschleiß des Kugellagerstahls mit kugelig Zementit in martensit. Grundmasse ist sehr gering. Analyse u. Verarbeitung unterschiede werden durch die Härtung überdeckt, von welcher der Verschle widerstand weitgehend abhängig ist. 6. Die Verschleißigenschaften von gehärte Cr-Stahlringen aus gewalztem Material u. aus Rohren sind gleich. Eine Verschle festigkeit von 2800—3400 mkg je nach den Belastungsverhältnissen ist bei gut

tem u. damit auch gut zu härtendem Kugellager-Cr-Stahl normal. (Stahl u. Eisen 44. 1703—8. 1924.)

NEUFELD.

Wilhelm Oertel und **F. Pölguter**, *Mechanische Eigenschaften einiger Schnellstähle im Vergleich zu ihrer Schnittleistung*. Versucht wurde, Zusammenhänge zwischen einigen mechan. Eigenschaften u. der Schnitthaltigkeit von Schnellarbeitsstahl zu finden. Mit einer Anzahl von Schnellarbeitsstählen unterschiedlicher chem. Zus. wurden Festigkeit u. Härteprüfungen in der Wärme durchgeführt. Zur Warmhärteprüfung diente ein Fallwerk nach Art des von F. WÜST u. P. BARDENHEIMER vorgeschlagenen Fallhärteprüfers. Gehärteter C-Stahl war bei Zimmertemp. härter als Schnelldrehstahl, dieser wiederum härter als Stellite. Härte bei Zimmertemp. gestattet also keineswegs einen Rückschluß auf die Schneideigenschaften. 200° setzt schon für reinen Werkzeugstahl rascher Härteabfall ein. Schnelldrehstahl verliert seine Härte erst oberhalb 600°, die Härte von Stellite sinkt nur allmählich, ohne daß bis zu 1100° ein ausgesprochener Erweichungspunkt zu sehen ist. Die weiteren Verss. zeigten: Zwischen der Härte in der Wärme u. den Schneideigenschaften eines Schnelldrehstahles bestehen zwar Zusammenhänge, sie lassen jedoch nicht aus, um auf Grund der Warmhärteprüfung allein die Beurteilung der Leistungsfähigkeit eines Schnelldrehstahles zuzulassen. Für die Reißverss. an Schnellstählen wurde eine neue in der Arbeit abgebildete u. benutzte Spannvorr. zum Zerreißen von Probestäben verwendet. Sie gestattete, einen Probestab in einem sorgfältig abgedichteten Widerstandsofen zu erhitzen. Es ergab sich, daß auch der Warmzerreißenvers. mit gehärtetem Schnellstahl keinen Rückschluß auf seine Schnittleistung zuläßt. Die weiteren Verss. sind dahin zusammenzufassen: Zusammenhänge zwischen Leistung bzw. chem. Zus. der Stähle u. ihren Eigenschaften in der Wärme sind erkennbar. Die Unterschiede der Festigkeitswerte der einzelnen Stahlsorten voneinander sind jedoch zu gering, daß sie zu einer voraussichtlichen Beurteilung der Schnittleistung dienen könnten. Man kann Härte- u. Festigkeitsprüfungen den Leistungsverss. vorläufig nicht ersetzen. Vielleicht bringt die Abnutzungsprüfung gehärteter Schnellstähle in der Wärme wertvolle Aufklärung. Auch die Prüfung der Wärmeleitfähigkeit dürfte Zusammenhänge mit der Drehleistung von Schnellarbeitsstahl ergeben. (Stahl u. Eisen 44. 1708—13. 1924.)

NEUFELD.

Rudolf Hohage und **Arthur Grützner**, *Das Vanadin in Baustählen*. Der Einfluß des V auf C-Stahl u. auf Cr-Stahl wurde untersucht u. ein V enthaltender Stahl wurde mit 2 Ni-Cr-Stählen verglichen. Hierbei wurde folgendes festgestellt: 1. V erhöht die Streck- u. Bruchgrenze, setzt Dehnung, Einschnürung u. Kerbzähigkeit herab. 2. Mit steigender Abschrecktemp. steigen bei V enthaltenden Stählen Streck- u. Bruchgrenze, fallen Dehnung, Einschnürung u. Kerbzähigkeit. 3. Mit Cr-Ni-Stählen lassen sich gleich gute mechan. Eigenschaften erzielen wie mit Cr-V-Stählen. 4. In dickeren Abmessungen sind die Cr-Ni-Stähle dem Cr-V-Stahl überlegen. 5. Cr-V-Stähle sind teurer als gleichwertige Cr-Ni-Stähle. (Stahl u. Eisen 44. 1713—17. 1924.)

NEUFELD.

H. Moore, *Bemerkung über die Wirkung stärker werdenden Kaltwalzens auf die Brinellhärte von Kupfer*. (Journ. Inst. Metals 32. 407—14. 1924. — C. 1925. 68.)

WILKE.

D. Hanson und **Grace W. Ford**, *Untersuchung der Wirkungen von Verunreinigungen auf Kupfer*. II. *Die Wirkung von Eisen auf Kupfer*. (I. vgl. Metal Ind. [London] 23. 294; C. 1924. I. 239.) Fe übt einen sehr großen Einfluß auf die Eigenschaften des reinen Cu aus, der Einfluß ist in vieler Hinsicht größer als der von O. Festes Cu löst rund 4% Fe bei 1100°, aber bei tieferen Temp. ist die Löslichkeit bedeutend geringer. Innerhalb der Grenzen der festen Lsg. ist die Löslichkeit des Fe groß, besonders in Hinsicht auf den elektr. Widerstand, der schnell

mit dem Fe-Gehalt ansteigt; der Anstieg geht so schnell vor sich, daß man Fe legierendes Element für Cu, das elektr. Zwecken dienen soll, unbedingt verwerfen muß. Die Wrkg. auf die Zugfestigkeit ist geringer als man annimmt in Anbetracht einer festen Lsg., aber im Verhältnis immer noch wirksamer als O; man erhält trotzdem ein nur relativ weiches Material, auch dann noch, wenn das Cu mit Fe gesättigt ist. 2% Fe erhöhen die Zugfestigkeit von 14,5 t/6,4 qcm auf 20 t/6,4 qcm. Wärmebehandlung hat wenig Einfluß u. eine Verbesserung der Eigenschaften durch Wärmebehandlung wie es beim Fe u. einigen Al-Legierungen möglich ist, kommt nicht erreicht werden. Das Brüchigmachen durch Fe ist gering, denn Cu, das Fe enthält, kann mit Leichtigkeit gewalzt werden. Fe kann zum Desoxydieren von Cu benutzt werden, aber es verursacht Schwierigkeiten beim Guß durch B. v. Häutchen, die die Homogenität der Gußmasse zerstören. Außerdem muß man, da die Desoxydationswrkg. gering ist, größere Mengen Fe zusetzen. (Journ. Inst. Metals **32**. 335—65. 1924. National Physical Laboratory.) WILKE.

Douglas H. Ingall, *Die Beziehung zwischen der Zugfestigkeit, Temperatur u. Kaltbearbeitung in einigen reinen Metallen und einzelnen festen Lösungen.* Eine bedeutend ausführlichere u. mit zahlreichen Kurvenzeichnungen versehene Arbeit, die zum weiteren Unterschied gegen die erste Ausarbeitung (vgl. S. 568) einen interessanten Meinungsaustausch bringt. (Journ. Inst. Metals **32**. 41—71. 1924.) WILKE.

E. H. Dix und **A. J. Lyon**, *Vergleichende Zugfestigkeitseigenschaften von Kupfer-Silicium-Aluminium und anderen Aluminiumlegierungen, wie sie erhalten werden durch besonders gegossene Stücke und Stücke, die aus Kurbelgehäusegußstücken herausgeschnitten sind.* Ausführliche Arbeit einer früheren kurzen Veröffentlichung (Metal Ind. [London] **25**. 273; C. 1924. II. 2557). (Journ. Inst. Metals **32**. 27—40. 1924. Engineer. Div., U. S. Air Service.) WILKE.

Francis W. Rowe, *Einige Untersuchungen über den Einfluß der Gußtemperatur und -masse auf die physikalischen Eigenschaften von Marinegeschützmetall.* Die erste Veröffentlichung (vgl. S. 435) ist durch Abbildungen vervollständigt worden. (Journ. Inst. Metals **32**. 327—33. 1924.) WILKE.

Horace Knerr, *Aluminiumlegierungsgußstücke aus Blechabfällen.* (Metal Ind. [New York] **22**. 481—82. 1924. — C. 1925. I. 766.) WILKE.

William M. Corse, *Neueste Entwicklungen der Nichteisenmetallurgie in den Vereinigten Staaten mit besonderer Berücksichtigung von Nickel und Aluminiumbronzen.* (Journ. Inst. Metals **32**. 455—74. 1924. — C. 1924. II. 2556.) WILKE.

Francis W. Rowe, *Moderne Probleme bei der Herstellung von Bronze- und Messingguß.* werden die Schwierigkeiten vom Standpunkt des Praktikers aus eingehend erläutert unter Einschluß der Manganbronze (55,4% Cu, 37,6% Zn, 0,86% Fe, 2,50% Mn, 3,25% Mn oder 58,5% Cu, 1,3% Sn, 0,78% Pb, 38% Zn, 1,4% Fe u. 0,80% Mn) Al-Bronze u. der korrosionsbeständigen Bronzen. (Metal Ind. [London] **25**. 593—604. 1611—14. 1924.) WILKE.

Francis W. Rowe, *Einige Untersuchungen über die Wirkung der Gußtemperatur und der Wärmebehandlung auf die physikalischen Eigenschaften einer hohen Zinnbronze.* Frühere Arbeit (vgl. S. 436) mit Aussprache. (Journ. Inst. Metals **32**. 73—74. 1924.) WILKE.

J. F. Arnold, *Künstlerische Bronzearbeit.* Die Überwindung der gußtechn. Schwierigkeiten bei der Herst. einer sitzenden Figur größerer Dimension aus Bronze wird beschrieben. (Metal Ind. [New York] **22**. 483—84. 1924. Mount Vernon, N. Y.) WILKE.

Franz Sommer und **Franz Rapatz**, *Wissenschaftliche Prüfung und Erforschung der Edelmessing- u. -zinnlegierungen.* Folgende Prüfverf. stehen zu Gebote: Chem.-analyt. Untersuchungen, Festigkeits- u. Härteprüfungen, Gefügeuntersuchung, Großzahlforschung, Röntgen- u. magnet. Unterss. u. technolog. Proben. Diese Erprobungen geben nur in ihrer

samtheit ein richtiges Urteil über die Güte des Stahles. Die wichtigsten Aufgaben der wissenschaftl. Erforschung der Edelmehle sind: Wissenschaftl. Durchforschung des gesamten Erzeugungsganges, Aufdecken von Fehlern bei der Herst., tiefste Erkenntnis der vorhandenen, Erforschung u. Einführung neuer Stahlsorten. Stahl u. Eisen **44**. 1739—43. 1924.)

NEUFELD.

Georg Klein und Walter Aichholzer, *Die Härtebiegeprobe als Chargenkontrolle der Edelmehlerzeugung mit besonderer Berücksichtigung der unlegierten Werkzeugstähle*. Für Werkzeugstähle ist die Einführung eines Prüfverf. notwendig. Da für viele Werkzeuge bei der Benutzung eine Biegebungsbeanspruchung erfahren werden, die die Härtebiegeprobe angewendet. Ermittelt wurden geeignete Querschnittsgrößen, der Einfluß der Querschnittsgröße auf die Biegefestigkeit, die Mindestglühzeit vor dem Abschrecken, der Einfluß verlängerter Glühdauer u. des Ausgangsgrades. Die bisherigen sich auf 2,5 Jahre u. mehr als 300 Schmelzen erstreckenden Ergebnisse werden ausgewertet. Die Empfindlichkeit der Härtebiegeprobe wird durch geringfügige Analysenänderungen nachgeprüft u. als genügend befunden. Die Brauchbarkeit der Probe wurde durch Verfolgung des Werkstoffes bei der Herstellung einer großen Menge fertiger Werkstücke festgestellt. (Stahl u. Eisen **44**. 4—39. 1924.)

NEUFELD.

J. V. Howard und S. L. Smith, *Neuere Entwicklung der Dehnungsprüfung*. Wird das elast. Verh. einiger Stähle bei wechselnder Zugbeanspruchung untersucht, indem die Hysteresisschleifen registriert werden, welche entstehen, wenn die Längsdehnung als Maß für den Elastizitätsmodul bei zunehmender u. abnehmender Belastung als Funktion der jeweiligen Zugbeanspruchung in ein Koordinatensystem eingetragen wird. Die Fläche u. Form der Hysteresisschleife hängen für das betreffende Material u. dessen Vorbehandlung charakterist. Vf. gibt eine Anzahl solcher Diagramme wieder, welche mittels eines selbstregistrierenden Dehnungs-Belastungsmessers aufgenommen sind. (Proc. Royal Soc. London Serie A **113**, 113—25.)

BECKER.

Joseph Würschmidt, *Magnetische Prüfmethode, insbesondere von Dauermagneten*. Besprochen werden die magnet. Eigenschaften eines ferromagnet. Körpers, der Einfluß der Gestalt der untersuchten Probe auf die Prüfungsergebnisse. Krit. beschrieben werden von den magnet. Prüfmethode die magnetometrische, die von Koepsel's u. die ballist. Methode. — Für die Prüfung von Dauermagneten wurde bei Benutzung des Magnetisierungsapp. von HARTMANN & BRAUN eine der Koepsel's ähnliche Methode ausgearbeitet. Sie gestattet die Aufnahme der Magnetisierungskurven u. damit die Angabe der kennzeichnenden Konstanten von Dauermagneten hinreichend genau. Sie ist sehr einfach zu handhaben u. bietet verschiedene beachtenswerte Vorteile. (Stahl u. Eisen **44**. 1727—34. 1924.)

NEUFELD.

Johannes Behr, *Die deutschen Formsande, ihre Verbreitung und Prüfung*. Die rationales u. stratigraph. Verbreitung der Formsande ist leicht durch die neue Überstratigraphiekarte der Formsandlagerstätten festzustellen. Es werden die Entstehung u. die bisherigen Prüfmethode besprochen u. durch Aufstellung von einer Zahlenreihe von Richtlinien für die Bewertung natürlicher Formsande gegeben. (Gießereiztg. **2**. 37—43. Berlin, Preuß. Geol. Landesanstalt.)

WILKE.

G. Kutscher, *Glühhitzeschutz von Eisenteilen durch das Metallspritzverfahren*. Für Schutz des Eisens gegenüber den zerstörenden Wirkg. hoher Temp., wird durch eine sich während Heißaluminierung bildende Al-Oxydschicht geschaffen. (Gram. Rdsch. **33**. 55—56. Neukölln.)

WECKE.

T. Henry Turner und W. E. Ballard, *Metallspritzen und gespritztes Metall*. Diese Arbeit ist eine Erweiterung der 1. Mitteilung (Metal Ind. [London] **25**. 245; 1924. II. 2557) u. enthält eine ausführliche Zusammenstellung der seit 1910 erschienenen Arbeiten. (Journ. Inst. Metals **32**. 291—312. 1924.)

WILKE.

William George Waring, Webb City, V. St. A., *Aufbereitung von Erzen*. Hochwertige Zinkbleierze oder Konzentrate geringwertigerer Erze dieser Art werden zerkleinert, mit Kohle u. Flußmitteln gemischt u. in einem mit 2 Reihen von Windrohren versehenen Schachtofen auf Weißglut erhitzt. Von den Windrohren münden eine Teil unterhalb, der andere oberhalb der Oberfläche der Beschickung. Luftzufuhr der ersteren wird so geregelt, daß die Beschickung reduzierend schmelzen wird. Hierbei geht Cu, Au u. ein Teil des Ag in die Matte, die Gallium bildet mit dem Flußmittel eine Schlacke, Zn, Pb, Cd, Bi, Ga, In, Th u. die Hauptmenge des Ag verflüchtigen sich u. werden durch Luft oxydiert, welche durch oberhalb der Beschickung angebrachten Rohre zugeführt wird. Der dadurch erzeugte Rauch wird in Säcken aufgefangen u. in bekannter Weise aufgearbeitet. (A. P. 1513775 vom 26/12. 1922, ausg. 4/11. 1924.) KÜHLING

Edwin Thomas Henderson, Bröken Hill, Australien, *Behandeln oxydierter Schwefelerze*. Oxydierte Schwefelerze lassen sich nicht mittels Schaumswimmer in Gangart u. Metallverb. zerlegen. Dazu werden sie aber befähigt, wenn sie gemäß der Erfindung in fein gepulvertem Zustande unter Luftabschluß bis zu etwa 1000°C erhitzt u. dann ebenfalls unter Luftabschluß abgekühlt werden. (A. P. 1513776 vom 26/2. 1923, ausg. 4/11. 1924.) KÜHLING

Hugo Lohmann, Berlin, *Entkohlen von Metallen*. (A. P. 1518083 vom 26/2. 1921, ausg. 2/12. 1924. — C. 1921. II. 899 [E. P. 157780].) KÜHLING

Soc. an. John Cockerill, Seraing, Belgien, *Kanal- oder Tunnelofen zur Reduktion von metallischen Erzen*, in welchem das zu behandelnde, auf einer beweglichen Schiene geförderte Gut seinen Lauf in umgekehrter Richtung zu derjenigen der Verbrennungserzeugnisse nimmt u. die für die Verbrennung nötige Luft durch einen Ventilator in die Kühlkammer angesaugt wird, wobei der Ofen in seiner Längsrichtung aus mehreren voneinander abgesonderten Kammern, eine Vorwärm-, eine Reaktions- u. eine Abkühlkammer geteilt ist, dad. gek., daß der Zug durch einen Schieber vor der ersten Verbrennungskammer u. 2 Schieber in der Abkühlkammer geregelt werden, die die Abkühlkammer in 3 Abteilungen teilen, von denen die eine sich zwischen der letzten Verbrennungskammer u. dem Schieber, u. die andere zwischen dem zweiten Schieber u. der Austrittsöffnung befindet, während der Raum zwischen diesen beiden Schiebern in dauernder Verb. mit der Atm. steht. — Es können diese voneinander unabhängige Maßnahmen ohne schädliche Gegenwrg. gleichzeitig ausgeführt werden. (D. R. P. 407247 Kl. 18a vom 14/10. 1922, ausg. 20/12. 1924. Blg. Prior. 30/3. 1922.) KÜHLING

W. J. Early Sons Foundry Corporation, übert. von: **John N. Early**, Pittsburgh, V. St. A., *Eisenlegierungen*, bestehend aus Fe, welches 0,75—1,5% Si, 0,1 bis 0,25% Schwefel, 0,25—0,75% P, 0,2—0,7% Mn u. 2,25—3,75% C enthält. Diese durch Zusammenschmelzen gewonnenen u. gegossenen Legierungen zeichnen sich durch sehr harte Oberfläche aus. Besonders günstige Eigenschaften besitzt eine Mischung, welche neben Fe 1,21% Si, 0,14% Schwefel, 0,57% P, 0,21% Mn, 1,7% freien u. 1,54 gebundenen C enthält. (A. P. 1515244 vom 10/1. 1924, ausg. 11/12. 1924.) KÜHLING

Alwyn Howard Wild, übert. von: **Ronald Wild und Bessie Delafontaine Wild**, Sheffield, England, *Ferrochromlegierungen*. (Aust. P. 11087 vom 13/2. 1924, ausg. 26/2. 1924 u. Dän. P. 33296 vom 3/2. 1923, ausg. 2/6. 1924. E. Prior. 1/12. 1922. — C. 1923. IV. 877 [E. P. 197733].) KÜHLING

American Manganese Steel Company, übert. von: **Wesley G. Nicholson**, Chicago, *Manganstahl*. (Can. P. 236462 vom 26/2. 1923, ausg. 18/12. 1923. C. 1924. II. 1628.) KÜHLING

Ture Robert Haglund, Stockholm, *Herstellung von Aluminium, Silicium u. Legierungen dieser Stoffe*. (D. R. P. 407927 Kl. 40c vom 30/12. 1922, ausg. 3/1/25.) KÜHLING

5 u. Schwz. P. 107250 vom 13/6. 1923, ausg. 16/10. 1924. — C. 1924. 240.) KÜHLING.

Aktiebolaget Ferrolegeringar, Stockholm, übert. von: Bo Michäel Stureling und Sven Dagobert Danieli, Trollhättan, *Kohlenstoff- und siliciumarme alle oder Legierungen*. (A. P. 1493039 vom 1/2. 1922, ausg. 6/5. 1924. — 1923. IV. 246; 1922. II. 1078 [E. P. 174618].) KÜHLING.

Ambrose Joseph Mandell, Forest Hills, V. St. A., *Legierungen*, bestehend aus 16% Si enthaltendem Ni oder Co. Bis zu 3% des Si können durch Al ersetzt den. Die Legierungen können ferner bis zu 40% Fe, 3—10% Mn u. bis zu C enthalten. Sie sind leicht gießbar u. sehr beständig gegen oxydierende Einse. (A. P. 1514064 vom 23/9. 1922, ausg. 4/11. 1924.) KÜHLING.

Aluminium Company of America, Pittsburgh, *Aluminiumlegierungen*. (Schwz. P. 104605 vom 2/2. 1923, ausg. 16/5. 1924. A. Prior. 18/3. 1922. — 1923. IV. 327 [A. P. 1453928].) KÜHLING.

Robert W. Stimson, Köln a. Rh., *Legierungen des Eisens mit Carbide bildenden allen*. (Schwz. P. 107033 vom 24/4. 1923, ausg. 1/10. 1924. E. Prior. 25/4. 2 u. 15/2. 1923. — C. 1924. I. 2474 [F. P. 565353].) KÜHLING.

Metallbank und Metallurgische Gesellschaft Aktiengesellschaft, Franka. M., *Anlage zum Glühen von Metallen in oxydfreier Atmosphäre*. Sie besteht mit einem oder mehreren Glühöfen in Verb. stehenden Arbeits- u. Kühlräumen, ebenso wie die Öfen mit indifferenten, unter geringem Überdruck stehenden en gefüllt sind u. solche Abmessungen haben, daß sie von mit entsprechenden ungsvorrichtungen versehenen Arbeitern betreten werden können, wobei diese me mit solchen Abdichtungsmitteln gegen Luft ausgestattete Zutrittsinrichtungen besitzen, daß sie jederzeit ohne wesentliche Änderung ihres indifferenten inhaltes von Arbeitern betreten werden können u. andererseits die Abmessungen anordnung der Kühlräume so getroffen sind, daß die Abkühlung u. Lagerung geglühten Gutes unabhängig von dem Glühvorgang beliebig stattfinden können. P. 95169 vom 12/6. 1920, ausg. 10/12. 1923. D. Prior. 14/3. 1919.) KAUSCH.

Metallbank und Metallurgische Gesellschaft Aktiengesellschaft, Franka. M., *Durchführung technologischer Behandlung von Stoffen aller Art, die von schädlich beeinflusst werden*. Außer für das Blankglühen von Metallen kann Anlage des Oe. P. 95169 auch für viele andere Prozesse verwendet werden. P. 95170 vom 12/6. 1920, ausg. 10/12. 1923. Zus. zu Oe. P. 95169; vorst. Ref.) KA. Theodor Zeise, Altona-Ottensen, *Erzeugung einer feuerbeständigen Oberfläche Gußstücken mit Hilfe von Aluminium*, dad. gek., daß das Al in die Form in halt eines durchbrochenen Gerippes eingebracht wird, das soweit innerhalb des nraumes liegt, oder in diesen hineinragt, daß das die feuerbeständig u. machende rflächen-schicht bildende Metall (Fe oder Stahl) während des Gießens das Ge durchdringt u. dessen einzelne Elemente mehr oder weniger allseitig umgibt nter B. einer Legierungsschicht ganz oder teilweise absorbiert. — Das Verf. n z. B. bei der Herst. von Roststäben Verwendung finden. (D. R. P. 407728 191c vom 10/7. 1924, ausg. 23/12. 1924.) KÜHLING.

Thomas Charles Cole, Southbridge, V. St. A., *Überziehen von Aluminium- nständen*. Die Gegenstände werden durch Eintauchen in eine Sodalsg. u. schleiten eines elektr. Stromes durch diese gereinigt, dann in erhitzte gesätt. g. von Cu(CN)₂, AgNO₃, Gold-, Nickel- o. dgl. -salzen getaucht u. der entdene Metallüberzug geglättet. Sollen dunkel, z. B. braun gefärbte Überzüge lten werden, so erfolgt eine Nachbehandlung mit Schwefelleber. (A. P. 1515658 4/12. 1919, ausg. 18/11. 1924.) KÜHLING.

Léon Eugène Waltispurger, Frankreich, *Elektrolytische Metallisierung nicht nder Körper*. Die Körper werden vor der Elektrolyse mit der Mischung eines

Metallpulvers u. der Lsg. eines Lackes überzogen, dadurch leitend gemacht u. d. als Kathode des Elektrolysiertes verwendet. (F. P. 575491 vom 12/3. 1923, ausg. 30/7. 1924.) KÜHLING

Robert Schwarz, Charlottenburg, *Aluminiumspritzguß*. Verspritzen von Al- oder Al-Legierungen, 1. dad. gek., daß die Spritzform galvan. mit Cr überzogen wird. — 2. dad. gek., daß der Schmelzbottich mit Cr überzogen wird. — Das schützt die Gefäße vor dem Angriff durch das Al u. dieses vor Verunreinigung durch die gel. Gefäßbestandteile. (D. R. P. 407719 Kl. 31c vom 27/3. 1923, ausg. 20/12. 1924.) KÜHLING

Arthur D. Little, Inc., Newton, Mass., übert. von: **Earl P. Stevenson**, New York, V. St. A., *Behandlung von Beizflüssigkeiten*. Die h. Beizfl., z. B. verd. H₂SO₄, wird zwecks Abscheidung der darin angesammelten Fe- u. Cu-Salze u. zwecks Wiederbrauchbarmachung in feiner Verteilung mit einem Luftstrom in Berührung gebracht, wodurch die Fl. konz. u. abgekühlt u. eine Ausscheidung der Salze bewirkt wird. (A. P. 1515799 vom 5/9. 1922, ausg. 18/11. 1924.) OELKE

Soc. Grauer et Weil, Frankreich, *Brünieren von Gegenständen aus Eisen, Stahl oder anderen Metallen*. Die Gegenstände werden entfettet, 1/2—1 Stde. in einer sauren oder alkal. Lsg. von Pikrinsäure erhitzt, gewaschen u. getrocknet. (F. P. 575670 vom 29/3. 1923, ausg. 4/8. 1924.) KÜHLING

Charles Tschaepat, Lausanne, *Elektrolytische Herstellung von Metallblech*. Bei der elektrolyt. Nd. auf einer aus einem endlosen Bande bestehenden Kathode stattfindet, dad. gek., daß das mit dem elektrolyt. Nd. bedeckte Band nach dem Verlassen des Bades durch eine auf elektr. Wege oder in anderer Weise beheizte Vorr. hindurchgeführt wird, in der durch Ausglühen des Nd. dieser Wärme erlangt, so daß er nach dem Verlassen dieser Heizvorr. ohne Schwierigkeit von seiner bandförmigen Unterlage abgelöst u. nach Maßgabe seiner Erzeugung unumwunden in Rollen gewickelt werden kann. — Das Band besteht zweckmäßig aus Kupferblech. (D. R. P. 406909 Kl. 48a vom 4/2. 1923, ausg. 15/12. 1924.) KÜHLING

X. Farben; Färberei; Druckerei.

Louis Diserens, *Neue Hydrosulfittönen auf Azofarbstoffen*. Ein Vorschlag von **Marius Richard**, eine Farbe aus bas. Farbstoff u. Hydrosulfit NF konz. in wässr. Färbungen mit Eisfarben oder Immedialfarben, die mit Sb-Tannat präpariert sind, aufzudrucken, mit gesätt. Dampf zu behandeln u. lange zu dämpfen, wird krit. gesprochen. (Rev. gén. de Matières colorantes etc. 28. 353—54. 1924.) SÜVERN

Otto Stadtmüller, *Rein Indanthren*. Im Interesse der Erzeuger u. Verbraucher wird Klarheit darüber verlangt, was als „indanthrenfarbig“ bezeichnet werden darf u. welche Ergänzungsprodd. zur Vervollständigung der Indanthrenkollektion in Frage kommen. (Ztschr. f. ges. Textilind. 28. 8—9. Kaiserslautern.) SÜVERN

N. F. Budgen, *Technologie der Druckfarben*. Beschreibung der Fabrikation von Farben für Buchdruck, Lithographie u. Tiefdruck. (Chem. Trade Journ. 1924. 99—100.) JUNG

J. N. Tervet, *Schutzfarbenanstriche*. Das Verh. eines Schutzanstriches aus pulvertem metall. Pb u. mit PbO gekochtem Leinöl auf Stahl wird besprochen. Verss. über das Verh. von Pb u. Fe in Ggw. von Luft u. W. werden beschrieben. (Journ. Soc. Chem. Ind. 44. T. 28—29.) SÜVERN

J. J. Fox, *Einige Gesichtspunkte über das Prüfen von Farben*. Angaben über das Trennen von Pigmenten u. Bindemitteln, über Streckmittel, über Chromate-Anstrichfarben, die Biege-, Kratz- u. Wetterprobe. (Journ. Soc. Chem. Ind. 44. 30—31.) SÜVERN

Frank E. Rozelle, übert. von: **Herbert W. Lamb**, Lagrange, Indiana, *Färben von Gewebe*. Der Farbstoff wird kalt mit einer Bürste auf das Gewebe aufgebracht, dem Trocknen wird das Gewebe in eine Presse gebracht u. dort zwischen zwei Stücke ein feuchter poröser Stoff gelegt; die Presse wird dann mittels einer Handspindel angezogen, u. das Ganze in einem geschlossenen Behälter mit Dampf unter Druck erwärmt, hierbei durchdringt der Farbstoff das Gewebe. (A. P. 143 vom 7/9. 1922, ausg. 16/12. 1924.)

FRANZ.

Eltasac Coloring Process Corporation, New York, übert. von: **Elias Kirschmann**, Philadelphia, Pennsylvania, *Herstellung gefärbter Gewebe*. Man färbt Garne mit einem Überschuß an Farbstoff, nach dem Verweben mit ungefärbtem oder nach gefärbtem Garn, wird das Gewebe angefeuchtet, die Färbungen können nach Behandeln mit Beizen fixiert werden. (A. P. 1518585 vom 8/10. 1923, ausg. 1. 1924.)

FRANZ.

Ernest Cadgène, Englewood Cliffs und **Jules Jeandros**, Paterson, New Jersey, *Erzeugung von erhabenen Mustern auf Geweben*. Man bedruckt das Gewebe mit einer Druckfarbe, die aus einem Farbstoff u. einer Schutzmasse, die das Gewebe gegen Nachbehandlung mit dem Ätzmittel entweder mechan. oder durch Neutralisieren schützt, besteht. Man bedruckt z. B. ein Gewebe aus pflanzlicher u. tier. Faser, in welchem die pflanzliche Faser zerstört werden soll, mit einer gewöhnlichen Druckfarbe, der man Bluteiweiß, Chromacetat u. Na-Acetate zugesetzt hat, dann bringt man auf das Gewebe mittels Walzen AlCl_3 oder $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ auf, erhitzt in einem geschlossenen Gas u. entfernt die zerstörte pflanzliche Faser durch Bürsten. (A. P. 15370 vom 15/2. 1924, ausg. 28/10. 1924.)

FRANZ.

Sayles Finishing Plants, Inc., übert. von: **Harold I. Huey**, Saylesville, Rhode Island, V. St. A., *Erzeugung von Transparenteffekten auf Baumwollgeweben*. Man behandelt das zweckmäßige mercerisierte Gewebe mit einem Gemisch von H_2SO_4 u. NaCl , 41—50° Bé, das man durch Mischen von 1 bis $3\frac{1}{3}$ Teilen H_2SO_4 u. 1 Teil NaCl erhält, wäscht u. trocknet. (A. P. 1519376 vom 19/5. 1922, ausg. 16/12. 1924.)

FRANZ.

Jute Industries Limited, F. D. St. Sandanan und **G. B. Craddock**, Dundee, Schottland, *Färben von Jute*. (E. P. 203258 vom 22/12. 1922, ausg. 27/9. 1924. — C. 1924. II. 2500.)

FRANZ.

Patrick Welch, übert. von: **Bernard Semenza**, New York, *Streichfertige Gewebe* werden erhalten durch inniges Mischen von 3 Teilen Mennige, 1 Teil Gips u. gleichen Mengen von Leinöl u. Terpentinöl oder von einer Mischung von Leinöl u. Terpentinöl in Bzn. gel. Harz u. einer entsprechend geringeren Menge Terpentinöl. (A. P. 153865 vom 12/12. 1923, ausg. 4/11. 1924.)

KÜHLING.

Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Leverkusen, übert. von **Heinrich Hestegge**, Köln, *Herstellung von Monoazofarbstoffen*. (A. P. 1483415 vom 29/3. 1924, ausg. 12/2. 1924. — C. 1924. II. 2502.)

FRANZ.

Gesellschaft für Chemische Industrie in Basel, übert. von: **Emil Reber**, Basel, Schweiz, *Chromierbare o-Oxyazofarbstoffe*. (A. P. 1485814 vom 5/2. 1923, ausg. 4/3. 1924. — C. 1924. I. 2742.)

FRANZ.

Gesellschaft für Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, übert. von: **Paul Leleu**, **Paul de Montmollin**, **Gérald Bonhôte** und **Josef Spieler**, *Herstellung von unlöslichen Azofarbstoffen*. (A. P. 1453660 vom 6/2. 1923, ausg. 1/5. 1923. — C. 1924. II. 2423.)

FRANZ.

Aktien-Gesellschaft für Anilin-Fabrikation, Berlin-Treptow, übert. von: **Werner Lange**, Berlin-Friedenau, und **Ludwig Neumann**, Berlin, Deutschland, *Herstellung von Azofarbstoffen*. (A. P. 1496780 vom 16/12. 1922, ausg. 10/6. 1924. — C. 1924. I. 2742.)


FRANZ.

Gesellschaft für Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, übert. v. **Hermann Fritzsche** und **Emil Reber**, *Herstellung von Pyrazolonazofarbstoffen*. (A. P. 1504469 vom 8/10. 1923, ausg. 12/8. 1924. — C. 1924. II. 1278. E. 210669.) FRANZ

Hans Pereira und **Compagnie Nationale de Matières Colorantes & Manufactures de Produits Chimiques du Nord Réunies (Établissements Kimmann)**, Seine, Frankreich, *Perylenküpfenfarbstoffe*. (F. P. 578758 vom 15/3. 1924, ausg. 3/10. 1924. Oe. Prior. 7/4. 1923. — C. 1924. II. 2427. [Pereira E. 213889.]) FRANZ

Hans Pereira und **Compagnie Nationale de Matières Colorantes & Manufactures de Produits Chimiques du Nord Réunies (Établissements Kimmann)**, Seine, Frankreich, *Perylenküpfenfarbstoffe*. (F. P. 578759 vom 15/3. 1924, ausg. 3/10. 1924. — C. 1924. II. 2426. [Pereira E. P. 212252.]) FRANZ

Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Leverkusen, *Herstellung basischen Farbstoffen*. Man läßt Orthoameisenester, ameisensaure Salze, oder Acetal des β -Alkyloxyacroleins auf Cyclammoniumsalze, die in α - oder γ -Stellung reaktionsfähige CH_3 -Gruppen enthalten, einwirken, zweckmäßig unter Zusatz von Kondensationsmitteln, wie Essigsäureanhydrid, ZnCl_2 , oder Verdünnungsmitteln wie Nitrobenzol. Beim Erhitzen von Trimethylindoleniniumjodmethylat mit Na-Formiat u. Essigsäureanhydrid auf 70° erhält man nach dem Fällen mit Wasser einen Farbstoff, glänzende stahlgraue Krystalle, der Seide und tannierte Baumwolle rot färbt, hat nebenstehende Formel.



p-Chlor- α,β -trimethylindoleniniumjodmethylat liefert einen blaustichigroten, mit dem Acetal des β -Äthoxyacrolein einen blaustichiggrünen Farbstoff. Chinolinjodmethylat gibt beim Erhitzen mit Orthoameisensäureester u. Essigsäureanhydrid den unter dem Namen Pynacyanoljodid bekannten Farbstoff. Das Jodmethylat des *N*-Methylbenzothiazols liefert einen violetten Farbstoff. (F. P. 578435 vom 11/3. 1924, ausg. 25/9. 1924.) FRANZ

Alfons Hartmann, M.-Gladbach, und die **Erben des Adolf Dagobert Libeski**, *Herstellung eines weißen Deckfarbstoffes*, dad. gek., daß ein Gemisch aus 4 Teilen wasserfreiem $\text{Zn}(\text{OH})_2$, je 2 Teilen Na_2CO_3 u. Al_2O_3 , 2 Teile Wasser und von 35° Bé. u. 3 Teilen Schwefel im Muffelofen etwa 1 Stde. lang auf 450° erhitzt wird. — Das Farbstoff soll sich vor Bleiweiß durch Ungiftigkeit u. größere Deckkraft auszeichnen. (D. R. P. 407890 Kl. 22 f vom 7/5. 1921, ausg. 24/1. 1924.) KÜHLING

Eugène Paradis, Marokko, *Ölfarbe*, bestehend aus Zinkweiß, Terpentinlack, Sikkativ, Gips, Harz, NaCl u. etwas W. Die Farbe ist wasser-, luft- und hitzebeständig. (F. P. 576410 vom 28/1. 1924, ausg. 20/8. 1924.) KÜHLING

Augusta Payan, Seine, Frankreich, *Wasserdichter Anstrich*. Man löst Pigment in CS_2 u. vermischt mit Teer u. Ruß. (F. P. 571117 vom 7/12. 1922, ausg. 12/1. 1924.) FRANZ

Erich Tiede, Berlin, *Phosphoreszenzfähige Massen*, bestehend aus Gemischen von H_3BO_3 u. organ. Verbb., welche bei Temp. ganz oder teilweise entwässert worden sind, bei denen die verwendeten organ. Verbb. noch beständig sind. Besonders geeignete organ. Verbb. sind fluoreszierende Körper, wie Oxynaphthylsäure, Anthracen u. Terephthalsäure, besonders aber auch Farbstoffe, wie Fluorescein, Uranin u. dgl. (D. R. P. 407944 Kl. 22 f vom 11/3. 1921, ausg. 30/1. 1924.) KÜHLING

XI. Harze; Lacke; Firnis.

Hans Wagner, *Fortschritte der Farben- und Lackindustrie. Ein Überblick die Patente und Neuerungen der letzten Jahre. II. Lack- und Firnisindustrie.* *ben über App. zum Lösen u. Filtrieren, über trocknende Öle u. Siccative, Harze, Celluloseester u. Lösungsmm. (Farben-Ztg. 30. 785—88. 841—43.)* SÜ.

L. Bock, *Tonerdeverbindungen in der Lackfabrikation.* Angaben über die Verung. von $Al_2(OH)_6$ u. Al-Seifen in der Mattlackherst., von $Al_2(OH)_6$ zur Herst. Emaillackfarben u. über Herst. von Al-Teerfarblacken. (Farbe u. Lack 27.) SÜVERN.

Fritz Zimmer, *Über Glühlampenlacke.* Die Herst. von Lacken für transparent- u. mattbunte Schichten u. ihr Aufbringen ist beschrieben. (Farben-Ztg. 30. 86. 1924.) SÜVERN.

L. Würth, *Einfache Prüfung von Farben und Lacken.* Die in dem Entwurf Betriebsblattes des Ausschusses für wirtschaftliche Fertigung vorgeschlagenen Proben werden kritisiert. (Farben-Ztg. 30. 789—91.) SÜVERN.

Société d'Études et d'Applications pour le Progrès de l'Industrie Résineuse, Gironde, Frankreich, *Verwertung des bei der Gewinnung von Terpentinöl und Camphonium aus Coniferenharzen entstehenden Abfallproduktes.* Das pechhaltige Produkt wird aus einem geschlossenen Gefäß oder unter teilweiser Verbrennung aus eisernen Meilern destilliert, das Destillationsprod. liefert nach nochmaliger Dest. ein dem Harzöl ähnliches Öl, das jedoch in A. leichter l. als Harzöl; man kann es auch denaturieren von A. oder als Carburierungsmittel verwenden. (F. P. 575229 vom 14/1. 1924, ausg. 25/7. 1924.) FRANZ.

Fritz Pollak und Kurt Ripper, Wien, Österreich, *Unlösliche und unschmelzbare Kondensationsprodukte aus Harnstoff, Thioharnstoff oder deren Derivaten und Formaldehyd.* (A. P. 1507624 vom 5/2. 1923, ausg. 9/9. 1924. — C. 1924. II. 1282 vom 17/8. 1923, P. 104339 u. F. P. 562320.) SCHOTTLÄNDER.

Chemische Fabrik Ambra Akt.-Ges., Zittau i. Sa., übert. von: **Hans Goldschmidt**, Berlin-Grünwald, und **Oscar Neuss**, Charlottenburg, *Herstellung plastischer Massen aus Harnstoff und Formaldehyd.* Die aus Harnstoff u. CH_2O in Ggw. von organ. nicht bas. Salzen oder organ. Stoffen saurer Natur erhältlichen, in der Regel festen Kondensationsprodd., werden, zweckmäßig in gemahlenem Zustande, verpresst. — Man erhält hoch wasserbeständige plast. MM. Beispiele sind angegeben für die Verwendung der aus Harnstoff u. 30%ig. CH_2O -Lsg. in Ggw. von konz. H_2SO_4 , bzw. aus Harnstoff u. 30%ig. CH_2O -Lsg. in Ggw. von Resorcin erhältlichen Kondensationsprodd., die in gemahlenem Zustande bei Temp. von 100° über verpresst werden. (E. P. 202651 vom 17/8. 1923, ausg. 17/10. 1923. Prior. 17/8. 1922.) SEHOTTLÄNDER.

Chemische Fabrik auf Actien (vorm. E. Schering), übert. von: **Erich Jordan** und **Hans Jordan**, Berlin, *Herstellung von harzartigen Kondensationsprodukten.* Man kondensiert Verbb. der aromat. Reihe mit organ. Halogenverbb. in Ggw. von Katalysatoren mit großer Oberfläche, wie Fullererde, Franconit, Tonsil oder organ. Halogen Mg- u. Al-Hydrosilicaten, nach Art der Friedel-Craftsschen Rk. — Stattüber der Verwendung der sonst üblichen Katalysatoren, wie wasserfreien Alchloriden, Metallen oder Metalloxyden, bietet diejenige von Hydrosilicaten den Vorteil, daß diese leicht aus den Reaktionsprodd. entfernt werden können u. die zu mißfarbigen u. luftunbeständigen Harzen führen. Diese dienen als Ersatz für natürliche Harze. Beispiele sind angegeben für die Kondensation von: Naphthalin mit Naphthalintetrachlorid in Ggw. von 0,1% Fullererde bei 60—120° zu einem Harz, in CCl_4 , Aceton, Essigester u. Bzl.-KW-stoffen l., in A. unl. Harz bei 65°

erweichend. — Erhitzt man Xylol mit Acetylentetrachlorid in Ggw. von Fullererde bis zur Beendigung der HCl-Entw., so wird eine viscose, dunkelgrüne, in C₂HCl₃ u. Bzl.-KW stoffen ll. M. erhalten. — Urteerphenole geben beim Erhitzen mit Naphthalintetrachlorid in Ggw. von 0,1% Fullererde auf 120—130° bis zur Beendigung der HCl-Entw. eine in A. ll., bei ca. 80° erweichende dunkelgrüne Masse. Erhitzt man Naphthalin mit der doppelten Gewichtsmenge Acetylchlorid in Ggw. von Franconit auf 120° bis zur Beendigung der HCl-Entw., so entsteht ein dunkelbraunes, hartes, bei Temp. oberhalb 60° erweichendes, nur in Chlf. u. CCl₄ lösliches Harz. (E. P. 202997 vom 23/8. 1923, ausg. 24/10. 1924. D. Prior. 24/10. 1922.)

SCHOTTLÄNDER

Gustav Ruth Akt.-Ges., (Erfinder: Richard Weithöner), Wandsbek, Hamburg, stellt ein Grundierungsmaterial nach D. R. P. 389352, dad. gek., daß man an die Stelle von neutralen, harzsauren oder fettsauren Al₂O₃-Verbb. eine kolloidale Quellung aus bas., harzsauren oder fettsauren Al₂O₃ verwendet. (D. R. P. 408111 vom 6/4. 1924, ausg. 24/1. 1925. Zus. zu D. R. P. 389352; C. 1925. 1718.)

KAUSCHUK

Theo. H. Gary, New York, übert. von: Julius Marcusson, Berlin-Lichtenfeld, Öldichte Bindemittel. (A. P. 1521384 vom 17/2. 1920, ausg. 30/12. 1924. C. 1922. II. 948 [Schwz. P. 91801].)

KÜHLING

XII. Kautschuk; Guttapercha; Balata.

H. W. Frevert, Sicherheit beim Mahlen von Schwefel und Hartgummi. Gemahlener S u. Hartgummi wurden in analysierten Gemischen von O₂, N₂ u. Luft verstaubt u. die minimale O₂-Konz. ermittelt, bei der der Staub noch explosiv war. Sie war von der Menge der festen Substanz fast unabhängig u. lag für S bei 8% u. für Hartgummi bei 13%. (Chem. Metallurg. Engineering 31. 894—96. 1924. Washington, Bureau of Chem.)

HERTEL

W. Gothan, Kautschuk in der Braunkohle. Vgl. KINDSCHER, Ber. Dtsch. Chem. Ges. 57. 1152; C. 1924. II. 1283. (Braunkohle 23. 713—15. 1924. Charlottenburg, Techn. Hochschule.)

HABERLAND

Kurt Gottlob, Die industrielle Bedeutung von Kautschukmilchsäften. Die Konzentrierter Kautschuklatex. Vf. schildert an Hand eines Vortrages von HAUSEN die geschichtl. Entw. der Kautschukindustrie, die techn. Verwertung des natürlichen Latex u. die Schwierigkeiten, die sich dieser entgegenstellen, sowie die Versuche zur Entwässerung des Latex. Es gelingt, Latex in Pastenform überzuführen, die nur noch 5—10% W. enthält u. den Kautschuk in Form feinsten Pulvers, so wie sie im natürlichen Latex vorkamen, aufweist. Die Paste nimmt leicht W. auf u. läßt sich leicht ohne mechan. Bearbeitung durch Walzen u. Kalandrieren gleichmäßig mit Füllstoffen u. S. mischen; die Vulkanisationszeit beträgt nur 1/2 h. Die Erfolge mit Latex von anderen Pflanzen als Hevea Brasiliensis waren gering, in erster Linie infolge der Verschiedenheit der Kautschukteilchen verschiedener Latexarten hinsichtlich Form u. Verhalten, nicht etwa hinsichtlich chem. Unterschiede, die sich im wesentlichen nicht erkennen lassen. (Gummi 39. 326—27. 1924.)

RÜHM

J. Traube, Über die Konzentrierung von Kautschukmilchsäften. Hinweis auf das Verf. des Vfs., wonach beim Vermischen von Latex mit bestimmten Pflanzenextrakten zwei Schichten, eine obere mit 50—60% Kautschuk, entstehen. Der letzterer läßt sich sogar noch eine Sahne mit 70—80% Kautschuk abschöpfen. Darst. wasserfreier Kautschukplatten daraus durch Ausgießen in mit Gelatine ausgekleideten Schalen. Hinweis auf Klärwrkg. von Latex in trüben Fll. (Gummi 39. 434—35. Charlottenburg, Techn. Hochschule.)

GROSZKE

W. H. Howson, *Gutta-Percha; ihre Herstellung und allgemeinen Eigenschaften*. S. 910). Durch die Einw. von Luft u. Licht verändern sich *Gutta-Percha* u. z; es bildet sich in der Gutta ein Harz, das von dem ursprünglich vorhandenen nieden ist. Durch die abwechselnde Einw. von Luft u. Licht, sowie durch Einw. von Lösungsm. wird die Gutta-Percha porös u. wertlos. Einen Schutz gegen diese Zers. bietet völliges Eintauchen in W.; es wird auch Überziehen mit empfohlen; HUTCHINSON empfiehlt zu dem Zwecke Wolleholesterin, das die Elastizität u. Zähigkeit von Gutta-Perchagegenständen verbessert. r werden noch das Vulkanisieren von Gutta-Percha u. Balata u. von Gegen von Gutta-Percha u. Kautschuk u. die Eigenschaften der vulkanisierten MM. nchen. (India Rubber Journ. 68. 1045—46).

RÜHLE.

Herbert A. Endres, *Bestimmung der Faktoren der Verstärkungskraft von Füllm. in Mischkautschuk*. Die Verstärkungskraft hängt von 3 Faktoren ab, Korn-Gestalt u. Einweichungsgrad des Füllmittels gegenüber Kautschuk. Hierbei Korngröße u. feinste Verteilung im Kautschuk von größter Wichtigkeit u. n direkt als Wertmesser dienen. An der Hand zahlreicher mkr. Bilder wird erh. der verschiedensten Füllmittel gezeigt. (Ind. and Engin. Chem. 16. -52. 1924. Akron [Oh.]

GRIMME.

H. Alcock, *Der Gesamtschwefel in Gummi*. Bei dem vorgeschriebenen der Best. des Gesamt-S in Gummiwaren durch Behandeln (0,5 g) mit 15 cem stiger HNO₃, Aufnehmen des Rückstandes mit 3 cem HNO₃ u. Zugabe von a₂CO₃, Trocknen u. Schmelzen u. Füllen des BaSO₄, ist die Möglichkeit Verlustes von H₂SO₄ in den ersten Stufen des Verf. gegeben, weshalb Vf. seit mehreren Jahren KNO₃ zugibt, das die H₂SO₄ bindet. Es empfiehlt sich vor der Fällung der H₂SO₄ sämtliche HNO₃ durch mehrfaches Eindampfen Cl zu entfernen. (Analyst. 49. 579. 1924.)

RÜHLE.

de Vries, *Irreführende Kautschukstatistiken*. Die Frage des zulässigen Wasser- z. In den Exportziffern für Rohkautschuk aus Niederländ.-Indien ist der t an Schmutz + W., der bisweilen mehr als die Hälfte, im Mittel für 1924 30—35% beträgt, nicht berücksichtigt. Mancherorts wird der Rohkautschuk einend absichtlich durch Aufbewahren unter W. usw. beschwert. (India Rubber . 69. 99—100.)

GROSZFELD.

F. Goodrich Company, New York, übert. von: **Harlan L. Trumbull** und **B. Dickson**, Akron, Ohio, *Dispersion von Kautschuk in kolloiden Stoffen*. vermisch ein hydrophiles Kolloid, wie Leim, Casein, Na-Resinat, Gummi um usw. mit W. zu einer Paste oder Lsg., diese Paste wird auf einer Knet- mit Kautschuk, der vorher durch Walzen oder Erweichungsmittel weich ge- wurde, vermisch. Die erhaltene latexähnliche M. kann zum Imprägnieren Überziehen von Geweben, Papier usw. dienen. (A. P. 1513139 vom 7/9. ausg. 28/10. 1924.)

FRANZ.

node Rubber Co. Ltd., London, übert. von: **P. Klein**, Budapest, *Herstellung Kautschukschichten*. Aus Kautschukmilch, die durch Schleudern in sehr schnell den Schleudern unter Vermeidung der Koagulation gereinigt worden ist, wird Kautschuk durch Elektrophorese auf der Anode niedergeschlagen; vor dem adern können der Kautschukmilch organ. Farbstoffe u. andere kolloidale , die im Hydrosolzustand eine negative Ladung haben, zugesetzt werden. Als e kann eine drehbare Trommel oder ein endloses Metallband verwendet n, von denen die ausgeschiedene Kautschukschicht nach dem Verlassen des e abgenommen wird. (E. P. 223188 vom 1/11. 1923, Auszug veröff. 3/12. Prior. vom 11/10. 1923. F. P. 573299 vom 12/11. 1923, ausg. 20/6. 1924. r. Prior. 11/10. 1923.)

FRANZ.

The Dunlop Rubber Company, Limited, England, *Verfahren und Vorrichtung zum Mastizieren von Kautschuk*. Der Kautschuk durchläuft eine Walzenmühle wird nach dem jedesmaligen Mastizieren gekühlt. Beim Verlassen der Knetmühle fällt der Kautschuk in Form eines dünnen Felles auf ein unter der Knetmühle geordnetes Transportband, das den Kautschuk über mehrere Walzen oder Trommeln führt, die gekühlt werden können. Die Zahl der Walzen u. der Weg des Transportbandes können verschieden gewählt werden. (F. P. 575870 vom 15/1. 1924, ausg. 7/8. 1924. E. Prior. 24/2. 1923.) FRANZ

Anode Rubber Co. Ltd., London, übert. von: **P. Klein**, Budapest, *Herstellung von Kautschukgegenständen aus Kautschukmilch*. Der Kautschuk wird aus der Kautschukmilch auf elektrophoret. Wege auf eine durchlässige, nicht leitende Unterlage in einer Form, die die Anode umgibt, niedergeschlagen; die an der Anode entwickelten Gase können entweichen, ohne daß sie den Kautschukniederschlag durchdringen. Die Anode, die aus Metall oder Kohle bestehen kann, ist innerhalb der durchlässigen Unterlage, zu deren Herst. man Gips oder unglacierte Tonwaren benutzen kann, angeordnet. Um Gewebe, Papier, Asbest u. dgl. mit Kautschuk zu überziehen, verwendet man eine große flache Platte aus durchlässigem Material, welche die Anoden eingebettet sind, die Kathode ist parallel zu der Anode angeordnet, das mit Kautschuk zu überziehende Material wird über die Oberfläche der Platte gezogen. (E. P. 223189 vom 1/11. 1923, Auszug veröff. 3/12. 1923. Prior. vom 11/10. 1923. F. P. 574552 vom 23/11. 1923, ausg. 16/7. 1924. U. Prior. 11/10. 1923.) FRANZ

Herona Caoutchouc S. A., Schweiz, *Kautschukgegenstände*. Man taucht Kautschukgegenstände, z. B. Puppen, in die Lsg. eines Vulkanisierungsmittels bringt sie dann sofort in eine Form u. preßt dann nach dem Schließen der Form die Luft in das Innere, hierdurch wird erreicht, daß alle Feinheiten der Form auf den Kautschukgegenstand übertragen werden; die Formen können aus Gips, Ton u. dgl. bestehen. (F. P. 576894 vom 24/11. 1923, ausg. 27/8. 1924. D. Prior. 26/10. 1922.) FRANZ

Michigan Chemical Company, übert. von: **Yasujuro Nikaido**, Bay City, Michigan, *Vulkanisieren von Kautschuk*. Als Vulkanisationsbeschleuniger verwenden sie Metallsalze der Mono- oder Dimethyldithiocarbaminsäure. (A. P. 1513122 vom 12/10. 1924, ausg. 28/10. 1924.) FRANZ

The Goodyear Tire & Rubber Company, übert. von: **Clayton Wingfield**, Akron, Ohio, *Beschleunigung der Vulkanisation von Kautschuk*. Als Vulkanisationsbeschleuniger verwendet man das Prod., das man durch Erhitzen von Methylenanilin oder eines Gemisches von Methylenanilin u. Anilin mit Schwefel erhält. (A. P. 1510074 vom 17/5. 1919, ausg. 30/9. 1924.) FRANZ

The Goodyear Tire & Rubber Company, übert. von: **Lorin B. Seabury**, Akron, Ohio, *Vulkanisationsbeschleuniger*. Als Beschleuniger verwendet man Phenylthioharnstoffe, die mindestens in einem Phenylkern zwei zueinander meta-orientierten Methylgruppen enthalten, z. B. den aus m-Xylidin u. CS₂ erhältlichen Di-m-xylylthioharnstoff. (A. P. 1514571 vom 14/8. 1923, ausg. 4/11. 1924.) FRANZ

The B. F. Goodrich Company, New York, übert. von: **Ernest Blaker**, Akron, Ohio, *Vulkanisieren von Kautschukmassen*. Beim Vulkanisieren von dicken Kautschukgegenständen, z. B. Wagenreifen, erhitzt man von außen, z. B. mit überhitztem Wasser auf Temp., die wesentlich höher liegen als die Vulkanisationstemp., bis auch die inneren Teile die Vulkanisationstemp. erreicht haben, dann wird die Temp. zum Heizmittel unter Vulkanisationstemp. gehalten, so daß nunmehr die Wärme von innen nach außen fließt. (A. P. 1516629 vom 1/3. 1922, ausg. 25/11. 1924.) FRANZ

The Fisk Rubber Company, übert. von: **Melvon A. Marquette**, Chicopee Falls, Massachusetts, V. St. A., *Mittel zum Überziehen von Kautschuk, um das*

ankleben während der Vulkanisation zu verhüten. Das Mittel besteht aus einer Mischung von Kautschukmilch, W., NH_3 u. Glimmer. (A. P. 1519547 vom 12/11. 1924, ausg. 16/12. 1924.) FRANZ.

Elektrizitätswerk Lonza, Basel, Schweiz, *Herstellung von organischen Schwefelverbindungen*, 1. dad. gek., daß man feste Polymerisationsprodd. des Acetylen mit Sulfid oder Sulfiden der Metalloide behandelt. — 2. dad. gek., daß die Behandlung bei einer Temp. von nicht über 300° , gegebenenfalls unter Druck, stattfindet. — Es gibt Cupren beim Erhitzen mit S_2Cl_2 in Ggw. von Bzl. am Rückflußkühler, 0% S enthaltendes, beim Erhitzen unter 10 at Druck auf $180\text{--}200^\circ$ dagegen 6% S u. 4% Cl enthaltendes geschwefeltes Prod. — Beim Erhitzen des in Suspension befindlichen Cuprens mit S unter Druck auf $180\text{--}190^\circ$ erhält man eine S enthaltende Verb. Die Prodd. finden in der Kautschukindustrie Verwendung. (P. 406147 Kl. 12o vom 30/12. 1922, ausg. 13/11. 1924.) SCHOTTLÄNDER.

Die Fisk Rubber Company, Chicopee Falls, Massachusetts, übert. von: **George J. Mead**, Chicago, Illinois, und **Clement A. Rossbach**, Milwaukee, Wisconsin, *Wiedergewinnung von Kautschuk*. Mit vulkanisiertem Kautschuk überzogenes Material wird zerrissen, der Kautschuk von den kautschukhaltigen Fasern getrennt, das Material entvulkanisiert, mit unvulkanisiertem Kautschuk gemischt u. kalandert; die Mischung dient zur Herst. von Schuhsohlen, Absätzen usw. (A. P. 1517221 vom 3/5. 1924, ausg. 25/11. 1924.) FRANZ.

Pierre de Montgolfier, Aube, Frankreich, *Wiederverwertung von Altkautschuk*. Vermischt den zerkleinerten Altkautschuk mit Kautschukmilch, Petroleum, Wasser u. Cellulose aller Art, wie Zellstoff, formt unter Druck u. erhitzt. (F. P. 151724 vom 5/2. 1924, ausg. 26/8. 1924.) FRANZ.

Die B. F. Goodrich Company, New York, übert. von: **Herbert A. Winkel** und **Harold Gray**, Akron, Ohio, V. St. A., *Mittel gegen das Altern von Kautschukmischungen*. Man setzt den Kautschukmischungen Kondensationsprodd. aus Aldehyden u. Aminen zu, insbesondere solche, die nicht vulkanisationsbeschleunigend wirken, als besonders brauchbar erwies sich das Kondensationsprod. aus Aldol u. Methylamin; den Mischungen können auch Beschleuniger zugesetzt werden. (A. P. 1515642 vom 2/4. 1923, ausg. 18/11. 1924.) FRANZ.

Charles W. Schnell, Fresno, Californ., *Mischung für Automobilschlauchhüllen*. Bestehend aus gepulvertem Graphit, gepulvertem Glimmer u. Ruß. (A. P. 1519268 vom 9/9. 1920, ausg. 16/12. 1924.) KAUSCH.

George W. Gish, Atlanta, Georgia, *Mittel zum selbsttätigen Verschließen von Reifen in Luftreifen aus Kautschuk*. Das Mittel besteht aus Kautschuk, Kautschukmilch, Erdpech u. Schwefel. (A. P. 1519729 vom 22/4. 1920, ausg. 16/12. 1924.) FRANZ.

Langatuck Chemical Company, Connecticut, übert. von: **Charles E. Brad** und **Montclair**, New Jersey, und **John Mc Gavack**, Elmhurst, New York, *Herstellung von Kautschukfilmen*. Man verwendet Kautschuk, dessen Doppelbindungen durch HCl abgesättigt sind; man leitet in eine Lsg. von Kautschuk in Chlf. HCl-Gas, bis der Film (enthält 30—35% HCl) beträgt, zum Entfärben leitet man Cl_2 durch die Lsg., nach dem Entfernen des überschüssigen HCl u. Cl_2 durch Einblasen von Luft wird filtriert. Die Lsg. mit $\text{C}_2\text{H}_2\text{Cl}_4$, dem zweckmäßig etwas Terpentinöl als HCl-bindendes Mittel zugesetzt ist, verdünnt; hierauf wird auf polierte Flächen gegossen u. die Schicht aufgebracht. An Stelle des Chlf. kann man Bzl., an Stelle des Terpentinöls andere Terpenkohlenwasserstoffe mit Doppelbindungen, wie Dipenten, Limonen verwenden. Der Film besitzt die Eigenschaften des Nitrocellulosefilms, er ist jedoch weniger entflammbar als dieser. (A. P. 1519659 vom 8/8. 1921, ausg. 16/12. 1924.) FRANZ.

XIII. Ätherische Öle; Riechstoffe.

E. Belani, *Ein Vorschlag zur Gewinnung ätherischer Öle (Vanillin) beim Dämpfen oder Kochen von Holz.* Absorption durch kolloidale SiO_2 wird empfohlen. (Pap. fabr. 23. 29. Verein der Zellstoff- u. Papier-Chemiker u. -Ingenieure Villach.)

W. J. van Eerde, *Indische Grasöle.* Nach einer hist. Übersicht werden Citronellaöl, Lemongrasöl, Palmarosaöl, Gingergrasöl u. Vetiveröl besonders besprochen. (Pharm. Tijdschrift voor Nederlandsch Indie 2. 2—12. Leiden.) GROSZFE

Deutscher Schutzverein der Lack- u. Farbenindustrie in Berlin E. V., **Reichsverband des Lack- und Farbenfachs E. V.**, *Terpentinölbezeichnung.* endgültige Fassung der Begriffsbest. für Terpentinöl wird bekanntgegeben. (Farb. Ztg. 30. 736. Berlin.) SÜVER

Ernst Schifftan, *Die Verwendung synthetischer Riechstoffe.* Die Intensität des Duftes in Verdünnung ist von Wichtigkeit. Auch schwach duftende Stoffe können zur Abrundung, als Fixateure u. zur Erzielung besonderer Effekte wertvoll sein. (Dtsch. Parfümerieztg. 11. 5—7. Charlottenburg.) HELLE

L. Guy Radcliffe und **E. H. Sharples**, *Vanillin, Piperonal und Cumarin.* *Prüfung der Bestimmungsmethoden.* Die in der Literatur verzeichneten gravimetrischen u. volumetrischen Methoden zur Best. werden nachgeprüft u. besprochen. Zur titrimetrischen Best. von Vanillin empfehlen Vff. folgendes Verf.: 2 g Vanillin werden in 100 ccm vorher mit $\frac{1}{5}$ -n. alkoh. KOH gegen Phenolphthalein neutralisiertem A. gel. 10 ccm dieser Lsg. werden zur Titration angewandt; weitere 10 ccm werden als Vergleichslsg. benutzt u. nicht mit Phenolphthalein, sondern nur mit entsprechender Menge $\frac{1}{5}$ -n. alkoh. KOH versetzt. Die ersten 10 ccm werden unter Zusatz von Phenolphthalein mit $\frac{1}{5}$ -n. alkoh. KOH titriert, bis ein Tropfen KOH einen Umschlag gegenüber der Vergleichslsg. anzeigt. Die Titration wird am besten in Nesslerischen Gläsern durchgeführt. Die erhaltenen Resultate sind zu niedrigeren Werten, wenn man sie jedoch mit 1,0204 ($\frac{100}{98}$) multipliziert richtige Werte. Bei gleichzeitiger Ggw. von Piperonal werden (infolge Ggw. von etwas Piperonylsäure) zu hohe Werte erhalten. Ggw. von Cumarin beeinflusst das Endergebnis nicht. (Perfumery Ess. Oil Record 15. 396—402. 437—39. 1924.) HABERLAN

Frederic Cohendy, Frankreich, *Herstellung von Riechstofflösungen u. dgl.* *Alkohol.* Man löst die Riechstoffe etc. in Äthylacetat, gießt die Lsg. in ein mit Glycerin enthaltendes Gefäß u. schüttelt dieses so lange, bis sich in der Flüssigkeit zwei übereinanderliegende Flüssigkeitsschichten gebildet haben. Die untere Schicht besteht aus den aromatisierten Stoffen, die obere aus dem Äthylacetat. Die untere Schichten, welche in jedem Verhältnis in W. l. ist, enthält den größten Teil der aromatisierten Stoffe. (F. P. 574472 vom 14/12. 1923, ausg. 11/7. 1924.) OELKE

René Louis Gabriel Desseignes, Frankreich (Seine), *Herstellung eines fixierten Parfums.* Geschmolzenes Wachs wird bei möglichst niedriger Temp. mit dem Parfüm gemischt u. mit geschmolzenem Paraffin, ebenfalls bei einer möglichst niedrigen Temp. über dem F. liegenden Temp. vermennt, worauf die M., die eventuell gefärbt werden kann, in geeignete Formen gegossen wird. (F. P. 574683 vom 13/3. 1923, ausg. 11/7. 1924.) OELKE

Gustav Geiger, München, *Riechsalzträger.* 1. dad. gek., daß derselbe durch eine plastische M. gebildet wird, die aus Seife u. mit denselben verkneteten Salzen des Ammoniums, z. B. dem carbaminsauren, dem Chlorid, Nitrat, Sulfat besteht. 2. dad. gek., daß derselbe in Stangen, Stückchen, Kügelchen oder Plättchen durchgeführt wird. — Die Seife erteilt der M. einen gewissen Feuchtigkeitsgrad, durch ständige NH_3 -Abgabe in mäßiger Menge erfolgt. (D. R. P. 406637 Kl. vom 29/7. 1923, ausg. 24/11. 1924.) OELKE

Ina Mc Cauley Hall, Calgary, Alberta, Canada, *Kosmetisches Mittel*, bestehend H₂BO₃, Maisstärke u. gepulverter Veilchenwurzel. — Das Prod. dient zur Gebeseitigung der Ausdünstungen des menschlichen Körpers. (Can. P. 236981 5/12. 1922, ausg. 15/1. 1924.) SCHOTTLÄNDER.

XIV. Zucker; Kohlenhydrate; Stärke.

Edmund O. von Lippmann, *Vor hundert Jahren*. IV. (III. Dtsch. Zuckerind. 1915; C. 1924. II. 2091.) Kurze Zusammenfassung der Darlegungen u. Eringen DUBRUNFAUTS an Hand seines Werkes (Art de fabriquer le sucre de raves, Paris 1825), das die gesamte Fabrikation des Rübenzuckers umfaßt. h. Zuckerind. 50. 17—19.) RÜHLE.

H. Kind, *Wärmewirtschaft und Kraftversorgung in der Rübenzuckerindustrie*. ar. Ver. Dtsch. Ing. 69. 44—46. Berlin.) BEHRLE.

W. Viebahn, *Schacht-Kalköfen*. Vf. berichtet über Betriebserfahrungen an htalköfen mit Außen- (Rohbraunkohle) u. Innenbefeuerung (Koks) u. den z dieser durch jene, wo dies wirtschaftlich möglich ist. (Dtsch. Zuckerind. 581—83. 1924. Leipzig.) RÜHLE.

E. E. Hartmann, *Das Petreeverfahren zur Klärung von Zuckersäften*. Beibung des Verf. u. seiner Anwendung in der Zuckerfabrikation an der Hand ktiver Bilder. (Ind. and Engin. Chem. 16. 1178—80. New York [N. Y.]) GRIMME.

J. E. Duschski und J. B. Mintz, *Die Krystallisation der Füllmassen*. Vff. hten über ihre Unterss. betreffend den Gang der Krystallisation der Füllmassen e Erschöpfung des Muttersirups in den Sudmischen unter den in der Fabrik haltenen Arbeitsbedingungen. Im Zusammenhange damit sind die für die allisation günstigsten Bedingungen ausgearbeitet worden. (Westnik Sacch. 1916. Nr. 17 u. 18; Zentralblatt f. Zuckerind. 32. 1428—31. 1924.) RÜHLE.

I. S. Paine, M. S. Badollet und J. C. Keane, *Kolloide bei der Herstellung Rohr- und Rübenzucker*. Rohe Zuckerlsgg. enthalten eine Reihe von Kolloiden, ie in allen Stadien der Fabrikation von störenden Einflüssen sind. Ihre Anheit wurde mit den üblichen Methoden der Kolloidchemie nachgewiesen u. (Mengen in den verschiedensten Säften annähernd bestimmt. Vff. wollen ihre state dazu benutzen, die Zuckerherst. aus der mehr empir. Fabrikation zu einer nschaftlichen zu machen. (Ind. and Engin. Chem. 16. 1252—58. 1924. ington [D. C.]) GRIMME.

Ch. Groud, *Die Gewinnung der Lactose*. Vf. bespricht die Verarbeitung der rmilch auf Lactose. (Ind. chimique 11. 537—38. 1924.) RÜHLE.

J. Willaman, *Die Entwicklung einer Sorghumsirupindustrie*. Vf. bespricht Anlage u. Betriebsweise der Waconia Sorghumsirupwerke in Waconia (Minn.). entlich für den Erfolg der Werke ist die Art der Reinigung u. der Aufbereitung hohres, der Vorgang der Klärung u. Filtration des Saftes u. die Verwertung ebenprodd. geworden. Das ganze *Sorghumrohr* bleibt in Bündel verschnürt elden Feldern liegen, bis die Blätter gewelkt u. getrocknet sind, dann gelangt i die Fabrik, wo zunächst der obere Teil mit dem Samenstande auf mechan. e abgeschnitten wird. Die verbleibenden Stengel u. Blätter werden zerschnitten ch einen hindurchgeführten Luftstrom getrennt. Verlust an Saft findet dabei l statt. Das gereinigte Rohr wird dann gemahlen u. der Saft, dessen Säure fig mit Ca(OH)₂ wenn nötig etwas abgestumpft wird, gekocht. Nach dem hlen auf 60°, gibt man Malzdiastase zu, wodurch ein viel klareres Filtrat eer erhalten wird, als wenn man den viskosen Saft nach dem Aufkochen elbar filtrieren wollte. Beträgt der Rohrzuckergehalt des Saftes 60%, oder l so wird der Diastase Invertase zugesetzt, weil sonst der fertige Sirup aus- VII. 1.

krystallisieren würde. Von den Nebenprodd. dient das erschöpfte Rohr (Baga als Heizmittel; die auf 10% W. getrockneten Blätter werden verfüttert. Die Sa werden auf dem Felde oder künstlich ohne Beeinträchtigung der Keimkraft getrock u. verkauft. Durch sorgfältige Auslese hat man ein sehr wertvolles Rohr gezücht das bei vermehrtem Erntegewicht auf den Acker einen Saft mit etwa 16,2% Gesa zucker besitzt. (Chem. Metallurg. Engineering. 31. 845—47. 1924.) RÜHL

W. Ekhard, *Richtlinien für die Beurteilung von Stärkesirup*. Man hat unterscheiden zwischen dem „44er Bonbonsirup“ oder „Kapillärsirup“ u. „42er Sirup“, der als farbloser „weißer“ u. als „halbweißer“ geblich gefärbt. Sirup in den Verkehr kommt. Vf. erläutert kurz die Merkmale für die G des Kapillärsirups u. die Untersuchungsverf. (Ztschr. f. Spiritusindustrie 48. 1- Forschungsinst. f. Stärkefabrikation u. Kartoffeltrocknung.) RÜHL

W. B. Newkirk, *Herstellung und Verwendung von raffinierter Dextrose*. V schrift zur Herst. im Großen. Die angegebenen Konz.-Verhältnisse müssen ge innegehalten werden, da sonst keine quantitative Krystallisation eintritt oder Ware unansehnlich wird. Dextrose läßt sich mit Vorteil in der Confitürenindust zu medicin. Zubereitungen u. zum Süßen von kondensierter Milch benutzen. (I and Engin. Chem. 16. 1173—75. 1924. Argo [III.]) GRIMM

R. F. Jackson, C. G. Silsbee und M. J. Proffitt, *Eine Methode zur Herstellung von Lävulose*. Als Ausgangsmaterial dienen Artischocken, welche nach üblichen Methoden der Zuckerfabrikation extrahiert, invertiert, geklärt, mit gefüllt u. krystallisiert werden. Angaben zur Herst. im Großen im Original. (I and Engin. Chem. 16. 1250—51. 1924. Washington [D. C.]) GRIMM

G. H. Hardin und F. W. Zerban, *Absorptionswirkung von Filtermaterial Zuckerlösungen*. Vf. haben die Beobachtung gemacht, daß beim Filtrieren Zuckerlsgg. durch trockne Papierfilter Konz.-Änderungen durch Absorption von eintreten. Aus diesem Grunde darf man bei Polarisierungen nicht das erste laufende Filtrat, sondern nur die letzten Anteile nehmen. (Ind. and Engin. Chem. 1175—77. 1924. New York [N. Y.]) GRIMM

Franz Cahn, *Vorschläge zur Vereinfachung der Betriebsuntersuchung der Zuckerfabrik*. Die Betriebsunters. der Füllmasse, des I. u. II. Prod., der Melasse u. Dicksaftes nach dem vom Direktorium des Vereins der Deutschen Zuckerindust ausgearbeiteten Verf. glaubt Vf. dadurch vereinfachen zu können, daß er die Pro mit W. im Verhältnis 1:1 mittels eines mechan. Rührwerkes mischt, die Troc substanz des Gemisches mittels des Zeisschen Zuckerrefraktometers oder Spindel feststellt u. die zur Unters. erforderliche Menge der Lsg. durch pipettieren entnimmt; hierdurch umgeht man das zeitraubende Abwägen der 2 Lsg. u. das Umgießen in den 100 ccm-Kolben. Als Pipette wird eine auf Ein geeichte Pipette von 25 ccm genommen. Aus einer beigegebenen Tabelle entnimmt man neben dem nach der Temp. korrigierten Brixgehalte den Faktor, mit dem im Polarisationsapp. ermittelte Zahl zu vervielfachen ist, um unter den angegebenen Verhältnissen unmittelbar den Zuckergehalt zu finden. (Dtsch. Zuckerind. 19—20. Worms.) RÜHL

Al. Ionescu und Elise Spirescu, *Vergleichende Studie über einige chemische Verfahren zur Bestimmung der Glucose*. Die direkte Ferrieyanidmethode IONESCU u. VARGOLICI, Bulet. Soc. de Chimie din România 2. 38. 102; C. 11 IV. 536. 1921. II. 1010) kann bei Fil. mit 1—10% Glucose mit gleicher Genauigkeit wie die klass. Methoden (FEHLING, BERTRAND, LEHMANN) benutzt werden. ist ihnen bzgl. Technik, Apparatur u. scharfer Erkennung des Endpunktes unlegen. Für Mengen unter 1% u. selbst unter 0,5% haben die Verf. FOLIN-WU u. FONTÈS-THIVOLLE genügende Genauigkeit, sie sind aber schwerwendbar, besonders in der Klinik. Deshalb ist für Fil. mit 0,50—1% die ind

vanidmethode vorzuziehen. (Bulet. Soc. de Chimie din România 6. 101—5. est, Univ.) SPIEGEL.

Nys, *Auslesende Bestimmung der Lävulose durch die Ostsche Kupferatlösung*. Vf. zeigt in eingehenden Unterss., deren Ergebnisse in Tabellen tabulieren zusammengestellt sind, die Möglichkeit, Lävulose unmittelbar in anderer Zucker mit der Ostschen Lsg. nach BOURGE durch 2 $\frac{1}{2}$ std. Ern im Wasserbade von 48,5° bis 49° u. Best. des abgeschiedenen Cu₂O nach LAND mit Ferrisulfat u. KMnO₄, zu bestimmen. Beim genauen Einhalten der Versbedingungen geben Glucose, Galactose, Mannose, Lactose u. Saccharose die geringste Spur gefällten Cu₂O. (Sucrerie Belge 44. 11 Seiten. 1924. i. Sep.) RÜHLE.

J. Willaman und F. R. Davison, *Einige Abänderungen der Pikrinsäurele für Zucker*. Die Methode von BENEDICT u. LEWIS erwies sich auch als methode bei der Best. der Zucker in Maisstengelsäften als schneller u. and ebenso genau wie die Cu-Reduktionsmethode, wenn gewisse genau beebene Modifikationen angebracht werden. Als beste Vergleichslsgg. werden ig. Lsg. von Glucose oder 0,076%ig. Lsg. von Saccharose in gesätt. Pikrinsg. empfohlen, die sich ca. 1 Woche halten. Wenn Glucose in Pikrinsäurelsg. er Red. in Na₂CO₃-Lsg. erhitzt wird, ist der Farbwert höher als ohne diese dlung. Da bei Verd. der Pikramatfärbung die Intensität der Farbe nicht tional der Konz. ist, wurde immer auf genau 10 ccm aufgefüllt. Für die Erung des Zuckergehaltes aus der Färbung wurde eine Tabelle aufgestellt, u. es n die Farbwerte für Glucose, Fructose, Maltose, Mannose, Galaktose, Rhamnose, e, Arabinose u. Xylose in zahlenmäßige Beziehung gebracht. (Journ. Agricult. ch. 28. 479—88. 1924. Minnesota Agric. Exp. Stat.) SPIEGEL.

Nottin, *Bestimmung von Maltose in Gegenwart von Glucose durch Benutzung arfoedschen Lösung*. (Bull. Soc. Chim. de France [4] 35. 1527—30. 1924. Bull. Chimistes de Sucr. et Dist. 43. 143—45. 1924. — C. 1924. II. 1861.) Jos.

he Dorr Company, New York, *Trennen von Zuckerfabrikationssäften von Beimengungen*. Man bewegt die sich aus den Säften (mit Ausnahme von se) absetzenden Beimengungen stetig nach einer Ausbringöffnung des Absetzmin, dekantiert die überstehende Fl. u. behandelt die abgesetzten Beimengungen auf filtern weiter, wobei man die Trennung zweckmäßig in einer Reihe von teinandergeschalteten Absetzbehältern nach dem Gegenstromprinzip durchführt. P. 402931 Kl. 89c vom 21/9. 1920, ausg. 27/9. 1924. A. Prior. 26/4.

OELKER.

Douglas Company, Cedar Rapids, Iowa, übert. von: **Richard W. G. Stutzke**, Cedar Rapids, Del., V. St. A., *Herstellung von Stärkeumwandlungsprodukten*. Eine ung von Stärke u. W. wird durch ein erhitztes, spiralförmig gewundenes Rohr urchgepreßt u. dann in fein zerstäubter Form in einen Trockenraum geblasen. emp. des Spiralrohres wird so bemessen, daß die Stärkefl. sich bis über ihren ritzt u. ein Druck entsteht, welcher eine Verdampfung der Fl. verhindert. an erhält l. Stärke u. ähnliche Prodd. (A. P. 1516512 vom 8/11. 1918, ausg. 1. 1924.) OELKER.

XVI. Nahrungsmittel; Genußmittel; Futtermittel.

L. Plank, *Die Konservierung von Lebensmitteln durch das Gefrierverfahren mit besonderer Berücksichtigung von Fischen ostasiatischer Gewässer*. In China an- sulte Verss. mit dem Verf. von OTTESEN, wobei die Fische in eine auf —25° kälte Lsg. von W. + NaCl + Glycerin getaucht u. dann im Kühlraum bei 0 —5° aufbewahrt werden, ergaben auch nach dreimonatiger Aufbewahrung für

die meisten Fischarten ein günstiges Ergebnis. (Japan.-Dtsche. Ztschr. f. Wissenschaft u. Technik 2. 403—12. 1924. Danzig.)

Hans Müller, *Vitamine und Konserven*. Die bei der Herst. der Konserven eintretende Vitaminverminderung ist wie die Vitaminabnahme bei der kühnmäßigen Zubereitung zu beurteilen, sie ist wegen der kurzen Sterilisationszeit keinesfalls größer. (Konserven-Ind. 12. 52—53. Sep.)

F. v. Artus, *Die Bedeutung der Caseinnährmittel für die Volksernährung*. gesprochen werden: *Lactarin*, *Galactogen*, *Guttmanns Milchnährmehl*, *Sanatoplasmon*, *fl. Suppenwürze (Maggi)*. (Konserven-Ind. 12. 51—52. Sep.)

Rudolf Deckert, *Über die Fabrikation der Suppenwürze*. Suppenwürze ein Abbauprod. pflanzlicher oder tier. Eiweißstoffe durch Einw. starker HCl. Rohmaterial, Apparatur, Herst. u. Analyse sind kurz geschildert. (Seifensieder-Ztg. 93. 113. München.)

Théodore Stathopoulos, *Die Boutargue (chemische, bakteriologische und histologische Prüfung)*. Boutargue ist ein in Griechenland durch Pressen von vorher gesalzenen u. an der Sonne getrockneten Fischeiern, im Golf von Missolonghi *Mugil Cephalus*, hergestelltes Nahrungsmittel. Vf. fand in dem Prod. von Missolonghi (bezw. von Ligarón) W. 28,60 (29,14), Fett 28,05 (26,45), N-Substanzen 33,18 (33,18), N-freie Substanzen 3,05 (6,90), Asche 4,45 (4,33) %, von dieser P_2O_5 1, NaCl + KCl 2,04, CaO 0,65, MgO 0,28 %. Das Globulin, nach dem Verf. FRÉMY isoliert, glich dem Ichthylin, der Farbstoff, mittels eines Gemisches A. u. Lg. extrahiert, unl. in Ä. u. Chlf., leicht zers. durch HNO_3 oder H_2SO_4 , verschieden von Vitellolutein u. Vitellorubein, deshalb als *Ichthyolutein* bezeichnet. Die bakteriolog. Prüfung ergab in den Oberflächenschichten Sterilität, im Innern eine verhältnismäßig unbedeutende Zahl von Sarcinen u. Bakterien. Die histolog. Unters. ergab nichts Besonderes. (Journ. Pharm. et Chim. [7] 30. 405—8. 1924. Athen, Polytechn. Schule.)

J. M. Hamil, *Bemerkungen über die Pasteurisierung der Milch*. Allgemeine Erörterungen über die Wrkg. der Pasteurisierung auf den Bakteriengehalt u. chem. u. physikal. Eigenschaften der Milch u. Beschreibung der verschiedenen käuflichen Pasteurisierungsapp. (Gt. Brit. Min. Health, Rpts. Pub. Health Med. Subjs. 17. 14 S. 1923; Exp. Stat. Rec. 50. 580. 1924.)

E. Parow, *Die Erfahrungen und Vorteile mit Trockenkartoffeln als Futtermittel*. Vf. erörtert die Bedeutung der *Kartoffeltrocknung* für die Ausnutzung der Kartoffelernte, namentlich wenn diese infolge geringer Haltbarkeit der Kartoffeln gefährdet ist. Die Trockenkartoffel ist ein hochverdauliches u. hochverwertbares Futtermittel, was an Hand daran angestellter Unterss. näher erläutert wird. (Ztschr. Spiritusindustrie 47. 272. 1924.)

G. Foth, *Bestimmung des Stärkewertes von sehr stärkearmen Kartoffeln*. sollen in diesem Jahre die Kartoffeln teilweise einen sehr geringen Stärkegehalt besitzen, so daß die der Reimannschen Kartoffelwage beigegebene Tabelle nicht mehr zur Best. des Stärkewertes ausreicht. Vf. hat deshalb die Tabelle nach unten hin rechnerisch erweitert u. teilt die Ergänzung mit. Die Zahlen sind aber vermutlich nicht ganz zuverlässig, da es möglich ist, daß die Grundlagen für die Berechnung der ursprünglichen Tabelle nicht auch für die erweiterte Tabelle gelten. Möglich ist auch, daß der geringe Stärkegehalt nur scheinbar besteht, hervorgerufen durch Verwendung hohler Kartoffeln bei der Best. (Ztschr. f. Spiritusindustrie 47. 352 u. 355. 1924.)

P. C. Varrier Jones, *Der Zellengehalt der Milch*. Über die Bedeutung der Zellenbestandteile der Milch bestehen die größten Meinungsverschiedenheiten. Wenige werden leugnen, daß Milch nicht Eiter enthalte, aber es ist strittig, woraus sie bestehe. Eine gewisse Zahl von Leukocyten in der Milch ist physiologisch.

det, über eine gewisse Zahl hinaus kann ihr V. patholog. sein. Während nach einen die Zellenbestandteile der Milch aus dem Blute stammen, reine Blutzellen u. unter Umständen als Eiterzellen angesprochen werden müssen, betonen die ren, daß sie Gewebezellen sind u. unter keinen Umständen als Eiterzellen an- rochen werden dürfen. Wegen der vielfach einander widersprechenden Er- isse bisheriger Arbeiten beschreibt Vf. ein Verf. zum Nachweise der ver- denen Zellbestandteile in Milch u. zu deren Differentialzählung, das zuverlässige bnisse liefert. Danach wird das Tier wie üblich gemolken u. während dessen mmt man von jedem Viertel 3 Proben, also im ganzen 12, die man unmittel- n sterilisierte Proberöhrchen gibt, die man sofort verschließt. Die erste Probe mmt man am Anfange, die zweite in der Mitte u. die dritte am Ende des ens. 10 cem von jeder Probe werden bei 3000 Umdrehungen in der Minute (nuten zentrifugiert. Die über dem Nd. stehende Fl. wird sorgfältig bis auf 0,5 cem entfernt, der Rückstand mit einer Capillarpipette gemischt, die eine auchtung besitzt, in die man den Rückstand aufsaugt. Die Pipette wird dann hlossen u. zentrifugiert, bis sich der Nd. wieder in dem untern Teile ab- zt hat, woraus er durch ein noch feineres Röhrchen auf einen Objektträger geführt wird. Nach dem Trocknen u. Behandeln nach dem Verf. von JENNER man u. Mk. die verschiedenen Arten Zellen fest u. zählt sie. Im weiteren chtet Vf. die besonderen Merkmale dieser Zellenbestandteile u. die in n. u. aler Milch vorkommenden, die physiolog. u. patholog. Einw. darauf, die unft der Zellen, die Ggw. roter Blutkörperchen in Milch u. die Ursachen dafür. lyst. 49. 585—90. 1924.) RÜHLE.

John A. Hall, Victoria, British Columbia, Canada, *Behandlung von Kakao-* en. Zwecks Entfernung des Fettes aus den Kakaobohnen zerkleinert man diese dem Rösten, befeuchtet sie mit einer schwachen Alkalilsg., erhitzt die M. etwa n. in einem geschlossenen Behälter auf etwa 90°, trocknet sie u. entzieht ihr das Fett mittels eines geeigneten Lösungsm. (A. P. 1515947 vom 16/11. 1921, 18/11. 1924.) OELKER.

Sena C. Williams, Oakland, Calif., übert. von: **Herbert W. Low**, Oakland, . A., *Herstellung von pasteurisierter Butter aus saurer Sahne*. Das Fett wird der sauren Sahne durch Kirnen bei einer Temp. von 45—60° F. abgeschieden, uschen, mit Mager- oder Vollmilch vermischt u. zu einer Emulsion verarbeitet, pasteurisiert, gekühlt u. dann wie gewöhnliche süße Sahne auf Butter ver- itet wird. (A. P. 1513331 vom 15/2. 1922, ausg. 28/10. 1924.) OELKER.

Hazel Mary Leo, Topeka, Kansas, übert. von: **Herbert T. Leo**, St. Joseph, ouri, V. St. A., *Herstellung von reinem, trocknen Pektin in Pulverform*. Pektin- ge Substanzen werden in Lsg. gebracht, zwecks Neutralisierung der Säure mit O₂ o. dgl. behandelt, der Einw. von Pectase unterworfen u. abgepreßt. Die ltene Fl. wird filtriert, gegebenenfalls entfärbt, konz. u. mit A. versetzt, worauf dadurch erhaltene Nd. von reinem Pektin getrocknet wird. — Das Prod. soll Herst. von Fruchtgelees etc. dienen. (A. P. 1513615 vom 26/4. 1921, ausg. 1. 1924.) OELKER.

John W. Garland, Inc., Pittsburgh, Pa., übert. von: **Thomas K. Berntson**, burgh, *Behandlung von Maiskolben*. Man unterwirft die Maiskolben in einer hlossenen Retorte, welche von außen erhitzt wird, der destruktiven Destillation ondensiert die entwickelten Gase. — Man erhält aus einer Tonne Rohmaterial 0 Pfund Teer, 120 Pfund Calciumacetat, 2,5 Gallonen Methylalkohol, 560 Pfund le u. 6500 Kubikfuß brennbares Gas. (A. P. 1516701 vom 21/1. 1921, ausg. 1. 1924.) OELKER.

XVII. Fette; Wachse; Seifen; Waschmittel.

W. N. Stokoe, *Die Zusammensetzung von Cocosnussfett*. Zwei Cocosfette verschiedener Herkunft (1 engl. u. 1 holländ.) gaben bei der Unters. mittels Alcohol u. Dest. der Methylester die folgende Zus. (die Zahlen des holländ. Fettes Klammern, %): Capronsäure 0,2 (0,2), Caprylsäure 7,4 (7,2), Caprinsäure 9,5 (10), Laurinsäure 49,1 (48,7), Myristinsäure 17,6 (17,5), Palmitinsäure 4,3 (5,4), Stearinsäure 1,2 (0,8), Oleinsäure 10,3 (9,0), Verlust 0,5 (0,8). Ein Vers. der Fraktionierung der Fettsäuren des holländ. Fettes scheiterte an den Schwierigkeiten, die die Erstarrung des Destillates bot. Die Zus. der 3 ersten Destillate (bis 137° bei 1 mm Druck) war angenähert (%): Capronsäure 0,2, Caprylsäure 7,3, Caprinsäure 10,1. (Analyst. 49. 577—79. 1924.)

RÜHLE

G. L. Voerman, *Tabaksamenöl*. Vf. untersuchte eine Probe von Tabaksamenöl. Das Öl ist gelb u. klar, besitzt den Geruch von fettem Öl u. einen nur wenig bitteren, nicht charakterist. Geschmack. Es ist l. in den gewöhnlichen Fettlösungsmitteln nicht oder sehr wenig in A. (96%). Säurezahl 0,5, Verseifungszahl 190,0, Polenzahl 0,3, Jodzahl (Wys) 142,3, spezif. Gew. 0,925, n_D (25°) 1,4739, Viscosität 20° u. 50° 8,6 bzw. 3,2, keine Drehung der Polarisationssebene. Mit Br keine Ä. unl. Polybromide. Rkk. von BAUDOUIN u. HALPHEN (Sesam- u. Baumwollöl) negativ. Von den Fettsäuren ist $E = +18^\circ$, Jodzahl (Wys) 147,1, n_D (25°) 1,46, Sättigungszahl (Säurezahl) 195,6. Auf einer Glasplatte dünn ausgestrichen, trocknet das Öl bei Zimmertemp. in ca. 84 Std., also etwas langsamer als Leinöl (72 Std.). Nach dem Erhitzen des Öles entsteht keine Ausscheidung, es war jedoch nach dem Abkühlen etwas weniger fl. Die Alkaloidrkk. mit Phosphorwolframsäure u. Jodkalium waren auf einen sauren Auszug von 10 g des Öles schwach positiv. Das Öl gehört demnach zu den ziemlich gut trocknenden Ölen; es dürfte in der Ölfarbindustrie wahrscheinlich brauchbar sein. (Chem. Weekblad 22. 61—62. s'Gravenhage.)

K. WOLFE

F. Le Roi Thurmond, *Wachs von Weiden*. Es handelt sich um das *Candelilla*-Wachs, einen Ersatz des Carnauba- u. Bienenwachses, das in *Euphorbia corollata* u. *syphilitica* zu 2—5% enthalten ist u. daraus durch Schmelzen mit Dampf in Mengen von 1,5—2,5% gewonnen wird. Die Pflanze wächst im Überschuß im nördlichen Mexiko (in den halbtrockenen Gegenden von Coahuila u. Nuevo Leon) u. im südwestlichen Texas. Vf. bespricht kurz die Darst. des Wachses in Mexiko u. Tequil. ch Ausschmelzen u. die Anwendbarkeit des Wachses. (Chem. Metallurg. 31. 782. 1924. Tucson [Ariz.])

RÜHLE

K. L. Weber, *Toilette-Grundseifen*. Es wird zunächst eine eingehende Beurteilung der Rohmaterialien gegeben. Talg kommt in erster Linie u. ausschlaggebend in Frage. Rizinusöl ergibt, entgegen der allgemeinen Auffassung, nicht geschmeidigere, sondern härtere Seifen. Fettsäuren können an Stelle von Neutralfett unbedenklich verwendet werden. Der Siedeprozess, auf 6 Tage ausgedehnt, ist ausführlich beschrieben. Künstliche, schnelle Trocknung wird verworfen. Der W.-Gehalt nach dem Trocknen soll 12—15% betragen. Beim Pilieren darf keine geringe Erwärmung stattfinden, auch in der Strangpresse ist zu kühlen. Fehler bei der Verarbeitung sind eingehend erläutert; Parfümierung und besondere Zusätze machen den Beschluß. (Seifensieder-Ztg. 52. 4—6. 25—26. 44—45. 62—85—86.)

HELLE

Yoshinori Tomoda, *Die Erzeugung des Glycerins durch Gärung*. Ziel der Arbeit war, die für die B. von Glycerin durch Gärung besten Bedingungen zu ermitteln. Als am wirksamsten erwies sich die mittels Plattenkulturen aus *Koji isolierte Sakehefe*. Die Art der zur Vergärung gelangenden Maische ist auf die Glycerinausbeute von geringem Einfluß; techn. dürfte rohe Zuckermelasse das beste R

rial sein. Von chem. Zusätzen begünstigen Sulfite u. Alkalien die Ausbeute. Letzteren ist die Alkalität des Gärungsmediums wichtig; das Optimum wird erreicht bei $pH = 10$. Selbst 7% Na_2CO_3 beeinträchtigen die Gärung nicht, da Carbonat sich in Bicarbonat umsetzt (CO_2 -Entw.) u. somit die Alkalität sich mindert. Die Geschwindigkeit der Gärung scheint mit wachsender Bindung Aldehyds durch Sulfit abzunehmen. Vers.-Temp. 27–31°. (Journ. Faculty of Engineering Tokyo Imp. Univ. 15. 193–205. 1924. Tokio, Univ.) HELLER.

W. Herz und Alexander Wegner, *Die Dichte von wäßrigen Glycerinlösungen*. Dichte der pyknometr. ermittelten DD., bezogen auf W. von 4°, von 10,00–79,95 Lichts-%ig. Lsgg. zwischen 10 u. 90°. Die Ausdehnung nimmt zu mit steigender p. (Ztschr. Dtsch. Öl- u. Fettind. 45. 53. Breslau, Univ.) HELLER.

L. F. Hoyt, *Nicotinseifen*. Bei der Herst. von Nicotinseifen ist vor allem auf Fettsäurekomponente der Seife Rücksicht zu nehmen, ob diese mit den Ca- u. Na-Salzen des später als Lösungsmittel zu verwendenden W. leicht unl. Salze bilden. Aus diesem Grunde ist den Seifen auf Basis Cocosfett unbedingt den basischen fl. Öle, welche viel Ölsäure enthalten, der Vorzug zu geben. (Ind. and Eng. Chem. 16. 1171–72. 1924. Buffalo [N. Y.]) GRIMME.

W. A. Poucher, *Einige nicht zu vernachlässigende Toiletteartikel*. Angaben über Darst. u. Gebrauch von fl. Gesichtspudern, Schminken, rotem Puder u. Nagellack. (Amer. Perfumer 19. 599–600. London.) HELLER.

W. Hannemann, *Der Hautkrem*. Darstellungsvorschriften für Glycerin-, Coldcream- u. Fettfreie Krems. (Dtsch. Parfümerieztg. 11. 4–5. Radebeul.) HELLER.

C. Stiepel, *Beitrag zur Analyse der Fette*. Das bei der „Methode Stiepel“ in der Fettanalyse Unlösliche besteht, wie an zwei ausgerechneten Analysen gezeigt wird, aus einem Gemisch aus den von FAHRION sogenannten Oxyfettsäuren. Die Bestimmung dieser Feststellung wird erörtert. (Seifensieder-Ztg. 52. 61.) HELLER.

M. Naphtali, *Zur Frage der „Verseifbarkeit“*. Erörterung der bisher gegebenen Definitionen, auf Grund deren Vf. empfiehlt, unter „Verseifbarkeit“ die Fähigkeit des in Ä. l. Gesamtfett abzüglich des Unverseifbaren zu verstehen. Die Verseifbarkeit u. Neutralfett sollen nur auf Verlangen bestimmt werden. (Seifensieder-Ztg. 52. 61–62. 84–85. Charlottenburg.) HELLER.

John William Bell, Sleaford, Lincoln, Engl., *Reinigen von Fetten und Ölen*. (Patent) Nr. 10161 vom 4/12. 1922, ausg. 20/11. 1922. E. Prior. 3/12. 1921. — C. 1923. 928. [F. BEDFORD.] OELKER.

Standard Fullers Earth Co., Inc., San Antonio, übers. von: **Peter P. Hindelang**, San Antonio, Texas, *Abscheidung von Öl aus zum Bleichen desselben benutzter Fullerde*. Man drückt nacheinander Luft, Dampf, W. u. nochmals Dampf durch die Filterpresse kommenden Kuchen der Fullerde. (A. P. 1515597 vom 17/10. 1924, ausg. 18/11. 1924.) OELKER.

Hermann Bollmann, Deutschland, *Entfernung von unangenehm riechenden Stoffen aus Fetten und Ölen*. Die Öle oder verflüssigten Fette werden in einer Vorrichtung zwischen Böden in verschiedene Abteilungen geteilte Kolonne nach dem Gegenstromprinzip mit Dampf behandelt, wobei das Öl bzw. fl. Fett in den einzelnen Abteilungen in feiner Verteilung über darin angeordnete Füllkörper rieselt, in dünner Schicht auf den Zwischenböden sammelt, hier durch eine Dampfmenge von Feuchtigkeit befreit wird u. dann durch einen Überlauf in die nächste Abteilung tritt, während der Dampf im entgegengesetzten Sinne durch in den Zwischenböden angeordnete, mit frei schwebenden Hauben überdeckte Rohrstützen in die einzelnen Abteilungen eintritt u. dort mit dem fein verteilten Öl in Berührung kommt. (F. P. 574102 vom 4/12. 1923, ausg. 5/7. 1924. D. Priorr. 25/1. 1924/10. 1923.) OELKER.

Peder Farup, Vettakollen b. Christiania, Norwegen, *Alkoholhaltiges Transpräparat*. Zu dem Ref. nach N. P. 37876 (C. 1925. I. 316) ist nachzutragen, daß das Mischen des Trans mit dem 96%ig. A. zweckmäßig unter starkem Schütteln erfolgt, wobei sich zwei Schichten bilden, die voneinander getrennt werden müssen. Die obere enthält eine ca. 10%ig. alkoh. Lsg. des Trans, während in der unteren sich wss. A. befindet. Vorteilhaft verwendet man jedoch möglichst absol. A., w. dem bei 15° ca. 10% u. bei erhöhter Temp. noch mehr glatt in dem Öl gel. wird. (E. P. 199043 vom 11/6. 1923, ausg. 9/8. 1923. N. Prior. 12/6. 1922.) SCHOTT

J. D. Riedel, Akt.-Ges., Berlin-Britz, *Herstellung von Margarine*, 1. gek. durch Verwendung der alkoholunlöslichen Bestandteile der Abfallprodd. von der Sojabefabrikation. — 2. dad. gek., daß man die erwähnten Stoffe der Margarine in Form einer wss. Emulsion zusetzt. — Die derart hergestellte Margarine schäumt u. bräunlich beim Braten wie natürliche Butter. (D. R. P. 408911 Kl. 53h vom 7/6. 1922, ausg. 27/1. 1925.) OELKER.

Paley Engineering Company, New-York, *Vorrichtung zur Verarbeitung flüssiger Seife zu versandfertigen Stücken*. (D. R. P. 405723 Kl. 23f vom 25/10. 1921, ausg. 7/11. 1924. A. Prior. 1/4. 1920.) OELKER.

Price's Patent Candle Company Ltd., London, *Herstellung von als Spandarmittel für Fette u. Öle verwendbaren Sulfosäuren*. (D. R. P. 408417 Kl. 12o vom 22/10. 1922, ausg. 16/1. 1925. E. Prior. 20/12. 1921. — C. 1924. I. 1883.) OELKER.

Badische Anilin- & Soda-Fabrik, Ludwigshafen a. Rh. (Erfinder: **Mart Luther**, Ludwigshafen), *Gewinnung von Fettsäuren* bei der Oxydation von Kohlenstoffstoffen, insbesondere von Paraffin, dad. gek., daß man die dabei erhältlichen öligen Destillate in Stufen neutralisiert unter Abtrennung der entstehenden Salze von Fettsäuren, die sich durch Ansäuern zerlegen lassen. (D. R. P. 405636 Kl. 12a vom 11/1. 1923, ausg. 4/11. 1924.) OELKER.

Tetralin G. m. b. H., Berlin-Britz, *Herstellung fett- oder seifenartiger Produkte*, dad. gek., daß man das beim Natronsulfatverf. anfallende fl. Harz zwecks Aushebung seines Säurecharakters in Ester oder Salze überführt u. die so erhaltenen Prodd. — gegebenenfalls in Ggw. eines Katalysators — der Einw. vom H₂ unterwirft. (D. R. P. 408512 Kl. 12o vom 14/9. 1922, ausg. 19/1. 1925.) OELKER.

XVIII. Faser- und Spinnstoffe; Papier; Cellulose; Kunststoffe.

O. Flieg, *Die Harnstoffröste*. Verss. ergaben, daß bei einer Rösttemp. von 27—30° bereits bei einer Konz. von 0,25% Harnstoff die Beschleunigung des Röstvorgangs u. die Beseitigung der üblen Gerüche in gleichem Maße erzielt werden kann wie früher mit weit größeren Harnstoffmengen. Die Harnstoffröste ergibt ein deutlich besseres Prod. namentlich dann, wenn ohne Auslaugung gearbeitet wird. Die Faser erweist sich als griffiger u. scheint besser unterteilt. Je sauer die unbehandelte Röste zu Ende geht, um so größer ist der Ausschlag zugunsten einer parallel gehaltenen Harnstoffröste. Die fast neutralen Harnstoffröstabwässer haben durch ihren N-Gehalt eine ausgezeichnete Düngewirkg. (Faserforschung 131—41. 1924. Limburgerhof.) SÜVERN.

Fr. Tobler, *Bemerkungen und Versuche zur Harnstoffröste*. Die vorteilhafte Färbung unter Harnstoffzusatz gerösteten Flachses ist unverkennbar, der Griff entspricht dem guter Qualitäten durchaus. Bei sonst schwer röstenden Flachssorten ermöglicht der Zusatz von Harnstoff eine viel schnellere u. gute Röste. Das Erzeugnis der Harnstoffrösten ist von der Praxis als hochwertig beurteilt worden u. gehört zu den besten, die augenblicklich in Deutschland ausgearbeitet werden. (Faserforschung 4. 141—45. 1924. Sorau u. Dresden.) SÜVERN.

Em. G. Litz, *Das Reinigen und Waschen der Siebe*. Ein prakt. erprobtes Verf. Reinigen mit Säure wird mitgeteilt. (Wchbl. f. Papierfabr. 56. 72—74.) St.
W. Herzberg, *Aufhellung alter vergilbter Drucke*. Kleisterreste u. Vergilbungs-
 per lassen sich aus alten Drucken auch ohne Chemikalien nur durch k. u. h.
 u. Belichten entfernen. (Wchbl. f. Papierfabr. 56. 35—36; Papierfab. 23. 25
 26. Berlin-Dahlem.) SÜVERN.

Ernst Altmann, *Asbestine und ihre Verwendung in der Papier- und chemischen
 ustrie*. (Vgl. S. 1033.) Asbestine, ein federleichtes Doppelsilicat von MgO u.
), ist ein wertvoller Füllstoff, dient zur Leimstreckung, zur Herst. von Löschi-
 er aus Stroh, für Chromo- u. Kunstdruckpapiere, Jacquard- u. Vulkanfibe-
 ren, zu Papiermaché, Papyroplast u. alle mit Öl imprägnierten Papiere. Beim
 en von Zellstoff kann Asbestine zur Bindung des Harzes zugesetzt werden, zu
 k schäumendem Halbstoff aus Hadern gesetzt, bringt sie den Schaum zum Sinken.
 pierfabr. 22. Verein der Zellstoff- u. Papierchemiker u. -Ingenieure 617—18. 1924
 ssen-A.) SÜVERN.

P. M. Hoffmann-Jacobsen, *Kreide als Füllstoff*. Es konnte bei Zusatz von
 ide u. Alaun eine Faserschwächung von 14% beobachtet werden, die wahr-
 einlich auf Hydratisierung auf den Trockenzylindern beruht. (Wchbl. f. Papier-
 r. 56. 47.) SÜVERN.

Vorbrüggen, *Kreide als Füllstoff*. Kreide bietet gegenüber Kaolin bei ge-
 uten u. schwach geleimten Papieren keinen Vorteil u. ist hierfür zu teuer. Nur
 einigen Spezialsorten, die leicht saugend verlangt werden, u. bei gewöhnlichen
 ch- u. Zigarettenpapieren ist Kreide ein gutes Hilfsmittel. (Wchbl. f. Papier-
 t. 56. 46.) SÜVERN.

H. Postl, *Kreide als Füllstoff*. Zigarettenpapier erhält nur durch feinst ver-
 edenes, reines CaCO₃ seine besonderen Eigenschaften. Schwierigkeiten können
 richtiger Leimung nicht auftreten. Feine Kreide gibt dem Papier tadellose
 hlossene Oberfläche u. schöne, gefällige Glätte. (Wchbl. f. Papierfabr. 56.
 t-47. Biedermannsdorf b. Wien.) SÜVERN.

Korn, *Leimungsgradprüfung auf elektrischem Wege*. Der von STEPHENS (Paper
 44, 1142) angegebene Prüfer, bei welchem die Zeit bestimmt wird, die ein Elek-
 ryt braucht, das Papier zu durchdringen, reicht allein zur abschließenden Be-
 teilung der Leimfestigkeit von Papier nicht aus. Er gibt aber für die Prüfung
 n Durchlässigkeit von Elektrolyten verschiedener Art, auch von Tinte, unabhängig
 jeder individuellen Beurteilung Zahlenwerte. Der Gedanke, die Leimfestigkeit
 tr. zu bestimmen, ist nicht neu. (Wchbl. f. Papierfabr. 56. 63—64. Berlin-
 Dilem.) SÜVERN.

Adolphe Rousseau, Seine, Frankreich, *Verfahren zum Weichmachen, De-
 mieren und Reinigen von pflanzlichen Fasern*. Pflanzliche Fasern, wie Leinen,
 hf, Ramie, Ginster, Nessel werden 2 Stdn. in einem Bade aus W., Glycerin u.
 orkalk liegen gelassen; der Chlorkalk wird zweckmäßig in einen Beutel gefüllt
 n das Bad eingehängt; nach dem Spülen mit W. wird die Faser in einem ge-
 lossenen Gefäß mit einer wss. Lsg. von NaOH, Chlorkalk u. HCl auf 120° er-
 t; nach dem Abkühlen wird mit W., dem geringe Mengen eines Oxydationsmittels,
), Hypochlorit, zugesetzt sein können, gespült, getrocknet u. durch geheizte
 lzenpaare geschickt. Die erhaltene Faser kann nach dem Kämmen versponnen
 den. (F. P. 573684 vom 24/2. 1923, ausg. 27/6. 1924.) FRANZ.

Lorentz Segelcke Daae, Norwegen, *Herstellung von imprägnierten Fäden*. Die
 zeln Fäden werden um einen Kern aus dem Imprägnierungsmittel, z. B. un-
 kanisierten Kautschuk, gesponnen, in der Mitte des Kautschuks befindet sich
 Metalldraht oder ein Textilfaden; beim Erwärmen dringt das Imprägnierungs-

mittel von dem Innern des Kernes durch die darum gesponnenen Fäden nach außen (F. P. 572420 vom 29/10. 1923, ausg. 5/6. 1924.) FRANZ.

Camille Belloc, Landes, Frankreich, *Wasserdichtmachen von Geweben*. Gewebe oder Gegenstände aus Geweben, wie Schuhe, werden mit einer Lsg. von Wollfett in Chlf. u. Petroleum getränkt, nach dem Trocknen bringt man das Gewebe in ein w. Gemisch von Petroleumdestillationsrückständen, Fettsäureestern, Bzn., Terpentinöl u. Petroleum u. läßt trocknen. (F. P. 577672 vom 30/4. 1923, ausg. 1924.) FRANZ.

Mario Geronazzo, Italien, *Vereinigung paralleler Textilfäden mittels eines Bindemittels*. Man imprägniert die von einer Trommel kommenden Fäden mit dem Klebstoff u. trocknet sie, indem man sie über eine auf geeigneter Temp. gehaltenen Walze gehen läßt. (F. P. 578780 vom 17/3. 1924, ausg. 10/10. 1923.) KAUSCH.

K. Rommler, Spremberg, Deutschland, *Sammetähnliche Stoffe*. Man bringt feine pulverisierte Faser auf Gewebe unter Verwendung eines Bindemittels, das man durch teilweise Verseifung von Leinöl mit Sodalsg. erhält. (E. P. 225217 vom 19/11. 1924, Auszug veröff. 21/1. 1925. Prior. 19/11. 1923.) FRANZ.

Jacques Delpech, Frankreich, *Behandeln von Kunstseide*. Zwischen die Dichtung nitrierung u. Bleichung der Kunstseide (Nitroseide) fügt man ein Seifenbad ein, auf das man ein Säurebad folgen läßt. (F. P. 576614 vom 30/3. 1923, ausg. 23/10. 1924.) KAUSCH.

William J. Lawrence, Kalamazoo, Michigan, V. St. A., *Präparat zum Überziehen von Papier*, welches durch Vermischen von CaCO_3 , Al(OH)_3 u. Casein erhalten wird. (A. P. 1517996 vom 18/12. 1922, ausg. 2/12. 1924.) OELKER.

Robert Flexer, Seine, Frankreich, *Wärmeisolierrmittel*. Gewellte Pappe wird auf beiden Seiten mit Papier beklebt, die Papierfläche wird mit h. Pech, Asphalt Harz usw. überzogen u. hierauf wieder eine auf beiden Seiten mit Papier beklebte gewellte Pappe aufgebracht u. s. f. (F. P. 577294 vom 18/2. 1924, ausg. 3/12. 1924.) FRANZ.

Rabbow Willink & Co., Den Haag, Holland, *Herstellung von Dachpappen*. 1. dad. gek., daß eine Rohpappe verwendet wird, die durch Vereinigen von zwei oder mehreren Lagen saugfähiger Pappen verschiedenartiger Faserstoffe erzeugt ist. — 2. dad. gek., daß die einzelnen Papplagen von ihrer Vereinigung mit Ölen, Fetten, Wachsen, Harzen, bituminösen Stoffen o. dgl. getränkt werden. — Die Festigkeitseigenschaften der Pappen werden wesentlich verbessert. (D. R. P. 408111 vom 28/11. 1923, ausg. 12/1. 1925.) OELKER.

Karl Frank, Weil i. Schönbuch, Wttb., *Holz feste Pappe* nach Pat. 400411 dad. gek., daß die Emulsion aus Leim oder leimartigen Stoffen u. gebranntem Gips in dem in nassem Zustand befindlichen Pappe oder dem Pappenstoff zugefügt wird. Das Prod. zeigt gegenüber dem, welches nach dem Hauptpat. erhalten wird, eine größere Härte u. Festigkeit bei hoher Elastizität. (D. R. P. 408216 Kl. 55f vom 28/3. 1924, ausg. 14/1. 1925. Zus. zu D. R. P. 400451; C. 1924. II. 1869.) OELKER.

Société Anonyme des Etablissements A. Olier, Clermont-Ferrand, Frankreich, *Herstellung von Zellstoff aus holzhaltigem Rohstoff*. (D. R. P. 404507 Kl. 5 vom 20/11. 1921, ausg. 5/11. 1924. Zus. zu D. R. P. 404506; C. 1925. I. 593.) OELKER.

Antoine Regnouf de Vains, Frankreich, *Wiedergewinnung von Ätznatron aus zum Behandeln von Cellulosestoffen verwendeten Laugen*. Man erhitzt diese Laugen in einem gewöhnlichen (Dampf-)Kessel, bis sie die ursprüngliche Konz. wieder erreicht haben u. benutzt den dabei erzeugten Dampf als Kraftquelle. (F. P. 567911 vom 30/8. 1922, ausg. 12/3. 1924.) KAUSCH.

Antoine Regnouf de Vains, Frankreich, *Gewinnung von Ätznatron aus Celluloseablaugen*. Die Laugen werden zuerst vom Lignin befreit u. dann

perzeugung verwendet. (F. P. 27773 vom 31/1. 1923, ausg. 18/8. 1924. Zus. P. 567926; vorst. Ref.) KAUSCH.

C. G. Schwalbe, Eberswalde, *Behandlung von Sulfitablauge*. Die wertvollen Anteile der Sulfitablauge werden dadurch gewonnen, daß man sie mit Salzen. $MgCl_2$, $CaCl_2$ oder $NaCl$ vermischt u. eventuell unter Druck auf 150—200° zt. Insbesondere werden CH_3COOH , $H\cdot COH$ u. SO_2 auf diese Weise erhalten. — bei dem Prozeß abfallende C kann durch Zusatz von Sägemehl u. dgl. zu der rünglichen Mischung leicht filtrierbar gemacht u. nach dem Filtrieren getrennt u. als Heizmittel verwendet werden. (E. P. 224509 vom 1/10. 1924, z. veröff. 7/1. 1925. Prior. 6/11. 1923). OELKER.

Henri Thomas Deizon und Michel Briat, Rhône, Frankreich, *Wiedergewinnung Celluloid aus Gewebe enthaltenden Celluloidgegenständen*. Die Gegenstände werden auf einer Zerreißvorr. zerrissen, u. dann etwa 2 Stdn. mit H_2SO_4 , D. 1,5, 100° behandelt; die gelierte Cellulose wird hierauf von dem Celluloid getrennt, Behandlung des Celluloids mit H_2SO_4 kann nötigenfalls wiederholt werden. (P. 571312 vom 15/12. 1922, ausg. 15/5. 1924.) FRANZ.

Deutsche Gasglühlicht-Auer-Gesellschaft m. b. H., Berlin, *Herstellung von Kunstseide* nach dem Viscoseverf., 1. dad. gek., daß man den zur Verwendung menden Viscoselsgg. zwecks Befreiung von Metalloxyden, z. B. Erdalkalioxyden, irgendeinem Stadium ihrer Herst. solche Stoffe zusetzt, welche mit den beenden Oxyden in stark alkal. Lsgg. schwer l. Verbb. bilden. — 2. dad. gek., man bereits der für die Herst. der Viscoselsgg. benötigten Alkalilauge die erforderliche Menge an Reinigungsmitteln zusetzt. — 3. dad. gek., daß man als bader für die so vorgereinigten Viscoselsgg. stark saure Fällbäder benutzt, keine zusätzliche Menge an Salz enthalten. (D. R. P. 408822 Kl. 29b vom 1. 1922, ausg. 24/1. 1925.) KAUSCH.

W. J. Stevenson, London, *Kunstseide*. Es werden zur Herst. der Kunstseide Viscoselsgg. verwendet, die durch Zentrifugieren von ihren festen Bestandteilen befreit u. auf 0—3° abgekühlt durch Holzkohle gegebenenfalls im Gemisch mit Wasser filtriert sind. (E. P. 225135 vom 24/5. 1924, ausg. 18/12. 1924.) KAUSCH.

Jaques Delpech, Frankreich, *Fäden und Gewebe aus Kunstseide*. Die einzelnen Fäden werden ohne vorherige Denitrierung u. Entschwefelung weiter verarbeitet. (F. P. 579211 vom 4/6. 1923, ausg. 13/10. 1924.) KAUSCH.

Aktion-Gesellschaft für Anilin-Fabrikation, Berlin-Treptow, *Entfernen von Farbstoffrückständen jeglicher Art aus gespulter Kunstseide*. Nach einer Vorwäsche, bei der das W. mit Hilfe mechan. Mittel an die einzelnen Spulen herangeführt wird, wird das Waschen in einem mit W. gefüllten Gefäß vollendet. (Schwz. P. 583 vom 12/2. 1924, ausg. 1/11. 1924. D. Prior. 12/3. 1923.) KAUSCH.

Otto Faust, Deutschland, *Kunstfaser aus nicht gereifter Viscose*. Man führt Viscose in ein Fällbad durch nichtmetall. Düsen ein. (F. P. 579176 vom 25/3. 1924, ausg. 11/10. 1924.) KAUSCH.

Victor Alexandre Guillet, Seine, Frankreich, *Gewebe für Stickerei*. Man stellt das Gewebe aus Nitrocellulose her, nach dem Besticken wird das Gewebe in A. u. A. gel.; oder man behandelt Baumwolle mit einem Gemisch von HNO_3 u. H_2SO_4 , wäscht, trocknet u. löst nach dem Besticken in A. u. Ä. (F. P. 572359 vom 20/10. 1923, ausg. 4/6. 1924.) FRANZ.

Henry Dreyfus, London, *Kunstfäden*. Man erhält Kunstfäden aus Lsgg. von Celluloseacetat oder anderen Celluloseestern organ. Säuren oder Celluloseäthern nach der Verdampf- oder Trockenspinnmethode unter Verwendung von Lsgg. derer u. dgl. in niedrig sd. Lösungsm. (wie Acetaldehyd, Formaldehyd) gegebenenfalls gemischt mit W. oder Aceton oder dgl. (E. P. 209125 vom 6/7. 1922, ausg. 1. 1924.) KAUSCH.

Courtaulds Limited, London, und **Walter Hamis Glover**, Bedford, *Fäden, Streifen oder Filme aus Celluloseäthern*. Eine Lsg. eines Celluloseäthers (Celluloseäthyläther) wird durch geeignet geformte Düsen in ein tier. oder vegetabil. eingepreßt. (E. P. 224405 vom 5/1. 1924, ausg. 4/12. 1924.) KAUSCH

Courtaulds Limited, London, **Louis Clément** und **Cléry Rivière**, Paris, *Fäden, Streifen oder Filme aus Celluloseestern*. Eine Lsg. eines Celluloseest. (Celluloseacetat, Nitrocellulose, Nitroacetylcellulose) wird durch geeignet geformte Düsen in ein tier. oder vegetabil. Öl (Ricinus-, Leinöl) oder Gemische dieser eingepreßt. (E. P. 224404 vom 5/1. 1924, ausg. 4/12. 1924.) KAUSCH

Theodore François Tesse, Paris, Frankreich, *Celluloseesterlacke*. Man löst Celluloseacetat in einem flüchtigen Lösungsm. u. einem Weichmachungsmittel, dessen Kp. über 200°; als flüchtige Lösungsmittel verwendet man z. B. Acet. Methylacetat, als Weichmachungsmittel Carvacrol, Carvol, Eugenol, Isoeugenol, Triacetin, Benzylalkohol, Acetessigester; der M. kann man ZnO, Al-Bronce usw. zusetzen, sie eignet sich besonders zum Überziehen von Flugzeugbespannungen. (A. P. 1521056 vom 30/1. 1918, ausg. 30/12. 1924.) FRANZ

Charles Michel François Martin, Seine, Frankreich, *Plastische Massen aus Celluloseestern*. Als Plastisierungsmittel für Celluloseacetat verwendet man ein Gemisch von Phenolen mit aromatisierten Sulfamiden, p-Toluolsulfamid. (F. P. 57373 vom 27/2. 1923, ausg. 28/6. 1924.) FRANZ

Société: La Cellophane, Seine, Frankreich, *Verfahren zur ununterbrochenen Herstellung von Filmen, Kunstfäden, Röhren usw. aus Celluloseexanthogenat*. Das Celluloseexanthogenatlg. gelangt durch Öffnungen der gewünschten Form in ein Fällbad, das aus einer Lsg. von $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$, $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ u. Säure, NaHSO_3 oder Na_2SO_4 besteht, das gebildete Häutchen wird über Leitwalzen durch die Bäder geführt, von dem Koagulationsbade gelangt der Film der Reihe nach in ein Säurebad, in ein kaltes u. dann in heißes Waschbad, in ein Entschwefelungsbad, in ein k. u. dann in h. Waschbad, hierauf in drei Bleichbäder, in zwei Waschbäder schließlich in ein Glycerinbad; hierauf wird getrocknet. (F. P. 573533 vom 16/11. 1923, ausg. 25/6. 1924.) FRANZ

Adolf Dulitz, Hirschberg, Deutschland, *Herstellung von Flaschenkapseln*. Man vermischt Acetylcellulose mit einem in W. l. Weichmachungsmittel, Acetin, übergießt die Form mit einem dünnen Häutchen dieser M., u. behandelt auf der Form mit W., hierbei wird das Weichmachungsmittel gegen W. ausgetauscht u. es bleibt ein gequollenes Acetylcellulosehäutchen zurück, das widerstandsfähig ist u. feuerfest aufbewahrt werden kann; beim Trocknen auf der zu verschließenden Flasche schrumpft das Häutchen u. bewirkt einen völligen Abschluß der Flasche; die Acetylcellulose kann mit Metallpulvern usw. vermischt werden. (A. P. 152000 vom 5/5. 1924, ausg. 23/12. 1924.) FRANZ

Linoleum Manufacturing Company Limited, England, *Herstellung von gemustertem Linoleum*. Man ordnet zwischen dünnen Schichten von Linoleum dünne Schichten von anders gefärbtem Linoleum von verschiedener Größe an verschiedenen Stellen an u. preßt, dann wird der Block senkrecht zur Oberfläche der Schichten zerschnitten, die erhaltenen Stücke werden dann senkrecht auf der Oberfläche der Schichten zu der gewünschten Dicke gepreßt, das erhaltene Linoleum erhält hierdurch eine dem Holz gleichende Verzierung. (F. P. 57313 vom 16/11. 1923, ausg. 19/6. 1924, E. Prior. 14/2. 1923.) FRANZ

Chemisches Zentralblatt.

925. Band I.

Nr. 12.

25. März.

A. Allgemeine und physikalische Chemie.

Morris W. Travers, *Die Entdeckung von Argon*. Eine Richtigtstellung polem. r. (Nature 115. 121—22. London.) K. WOLF.

Mil. Z. Yovitchitch, *Das Defizitproblem bei den durch Einwirkung des elektr. Stromes erhaltenen kondensierten Körpern*. Es werden zunächst frühere Ergebnisse von YOVITCHITCH u. LOZANITSCH (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 30. 135 [1897]) von LOZANITSCH (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 44. 312 [1911]) über das gleiche Thema gestellt, aus denen hervorgeht, daß die durch Einw. des elektr. Stromes auf Stoffe erhaltenen Kondensationsprodd. einen geringeren Gehalt an C + H (beers an C) besitzen, als man auf Grund der Zus. der Ausgangsverb. erwarten. Die Ursache dieser Erscheinung hat sich bisher noch nicht aufklären lassen. Ir. ist bisher nur festgestellt worden, daß das Defizit von der Dauer der elektr. Ladungen abhängig ist. Aus Verss. die mit Acetylen angestellt worden sind, u. n bei der analyt. Unters. jede Oxydation des Kondensationsprod. durch Luftstoff verhindert wurde, ist zu schließen, daß die Zus. des Kondensationsprod. vom App. abhängig ist. Das an der äußeren Wandung des App. entstandene war ein festes Pulver, C + H-Defizit = 4,95%, das an der inneren Wandung dete Prod. war anfangs fl., wurde dann fest u. hatte ein C + H-Defizit von 10. (Bull. Acad. roy. Belgique, Classe des sciences [5] 10. 465—77. 1924.) HAB.

Leslie J. Harris, *Säure-Base Titrationen und Gleichgewichte schwacher Basen Säuren*. Vorläufige Mitteilung über theoret. Unterss. des Vfs., die sich hauptsächlich auf die einsäurige u. einbas. Gruppe in Glycin u. die einsäurige u. zweibas. pe in Arginin beziehen. (Nature 115. 119—20. Cambridge.) K. WOLF.

W. Fraenkel und W. Goetz, *Kinetische Studien an festen Metallen. Zerfall Verbindung Al_2Zn_3* . Vf. mißt den unterhalb von 256° stattfindenden Zerfall von Al_2Zn_3 in seinem zeitlichen Verlauf mittels eines Dilatometers u. mittels eines Calorimeters. Die Verb. war durch Zusammenschmelzen der reinen Metalle hergestellt u. wurde nach einem hinreichenden Tempern bei 400° in Eiswasser abgekühlt. Obwohl eine teilweise Korrosion des Metallstückes durch Oxydation at, konnte infolge der schlechten Wärmeableitung keine organ. Fll. als Abkühlungsmittel benutzt werden. Der Zerfall der Verb. geht unter beträchtlicher Umveränderung u. Wärmeabgabe vor sich. Als Dilatometerfl. wurde Anilin, als Calometerfl. Bzl. verwendet. Beide Methoden ergaben übereinstimmend, daß der Zerfall des Al_2Zn_3 nach einer monomolekularen Rk. verläuft. Es werden also in Vereinheit stets der gleiche Bruchteil der vorhandenen Moll. zersetzt, so daß einzelnen Moll. der Verb. unabhängig voneinander zerfallen. (Ztschr. f. Metallkunde 17. 12—17. Frankfurt a. M., Univ.) BECKER-ROSE.

Max Bodenstein und H. Lütkemeyer, *Die photochemische Bildung von Bromwasserstoff und die Bildungsgeschwindigkeit der Brommolekel aus den Atomen*. Kurzes nach Ztschr. f. Elektrochem. vgl. C. 1924. II. 2630. Die Vereinigung von H u. H_2 vollzieht sich in folgenden Stadien:

1. $Br_2 = 2 Br$; 2. $Br + H_2 = HBr + H$; 3. $H + Br_2 = HBr + Br$;
4. $H + HBr = H_2 + Br$; 6. $Br + Br = Br_2$.

Die Anzahl von Br u. H stationär ist (die Atome reagieren viel schneller, als VII. 1.

die Moll.), so lautet die Reaktionsgleichung:
$$\frac{d[\text{HBr}]}{dt} = \frac{2k_2 \cdot [\text{H}_2] \cdot [\text{Br}]}{1 + \frac{k_4[\text{HBr}]}{k_3[\text{Br}_2]}} \quad (k_2, k_3,$$

sind die Geschwindigkeitskonstanten des 2., 3., 4. Vorganges). Das Verhältnis $k_4/k_3 = 0,1$ (vgl. BODENSTEIN u. LIND, Ztschr. f. physik. Ch. 57. 168; C. 190 I. 8), $\log k_2 = -3859/T + 13,862$ (berechnet nach BODENSTEIN u. LIND), so da man aus der Geschwindigkeit der HBr-Bildung die $[\text{Br}]$ berechnen kann. Wie das Brom-Wasserstoff-Gemisch belichtet u. setzt man an, daß jedes absorbierte Lichtquantum ein Brommolekül zerspaltet, so findet man die Menge der Br-Atome die bei Abwesenheit der Rk. 6 (der Vorgang 2 ändert wegen 3 u. 4 die Br-Menge nicht) sich ergeben hätte. Die Differenz zwischen dieser Zahl u. der $[\text{Br}]$ liefert die vom Vorgang 6 verbrauchte Br-Menge u. somit die Geschwindigkeit der Wiedervereinigung der Br-Atome. Vergleicht man dieselbe mit der nach der kinet. Theorie berechneten (Querschnitt des Br-Atoms geschätzt nach der Analogie mit Edelgasen) Anzahl der Zusammenstöße, so stellt sich heraus, daß von 1000 Zusammenstößen nur $1,25 (\pm 100\%)$ wirksam sind. Das Ergebnis stimmt mit der Vorherseher HERZFELDS (Ztschr. f. Physik 8. 132. [1922]) überein, der erfolgreiche Bruch muß aber vom Gesamtdruck der Gase abhängen u. tut es doch nicht (im Bereich von 200—700 mm Hg). Man muß also vorläufig die Vorstellung fallen lassen, daß das Additionsprod. zweier Atome seine Energie durch Stoß abgeben muß, um ein stabiles Mol. zu werden.

Versuche. Die HBr-Bildung wurde durch Messungen der Lichtabsorption des Gasgemisches verfolgt: Br_2 ist der einzige merklich absorbierende Bestandteil. Das Beersche Absorptionsgesetz wurde in einer besonderen Versuchsreihe verifiziert der Extinktionskoeffizient $z = \frac{2,303}{d \cdot c} \cdot \log J_0/J$ (d die Länge des Absorptionsrohres

in cm, c der Druck des Bromdampfes in mm Hg) beträgt bei 218° $5,56 \cdot 10^{-3}$ für $504 \mu\mu$, $2,93 \cdot 10^{-3}$ für $538 \mu\mu$. Die Lichtquelle war eine 100kerzige Lampe, die emittierte Energie wurde mittels eines Bolometers gemessen. Die Geschwindigkeit der HBr-Bildung wurde bei $218, 194, 183, 174$ u. 160° beobachtet; die summierte Reaktionskonstante war (willkürliche Einheiten) bzw. 200, 105, 65, 36 u. (Ztschr. f. physik. Ch. 114. 208—36. 1924. Berlin, Univ.)

BIKERMANN

F. Sauerwald und E. Jaenichen, Über die Adhäsionskräfte zwischen metallischen Oberflächen. (Über synthetische Metallkörper IV.) (III. vgl. Ztschr. f. Elektrochemie 30. 175; C. 1924. II. 237.) Vff. untersuchen Festigkeit u. D. synthet. Metallkörper, welche durch „Fritten“ — im Gegensatz zu „Sintern“, wo auch die fl. Phase eine Rolle spielt — entstehen, in Abhängigkeit von Temp., Preßdruck u. Glühdauer. Angewandt werden Pulver von Cu, Ni u. Fe u. Gemenge von Fe-Cu u. Fe-Ni. Die Daten, welche graph. wiedergegeben werden, lassen erkennen, daß die Adhäsionskräfte an sich bis zum F. an Wrkg. zunehmen. Das schließliche Sinken der u. Festigkeit in Abhängigkeit von der Glüh-temp. kann durch eine Überlagerung von Krystallisationsvorgängen gedeutet werden. Der Verdichtungsgrad hängt außerdem vom Preßdruck auch vom makroskop. Körnungsgrad des Materials ab. Aus der Tatsache, daß Zweistoffsysteme keine neuen Erscheinungen zeigen, schließen Vff. daß die Diffusion bei der Verfestigung keine primäre Rolle spielen kann. Für die erzielte Gesamtverfestigung ist die Zahl der miteinander in Verb. getretenen Oberflächen maßgebend, was für die Krystallisation jedoch nicht wesentlich ist. — graphit. Oberflächen u. an Carbiden sind die Adhäsionskräfte entweder schwächer oder sie gelangen der Natur dieser Materialien nach nicht zur Wrkg. — Bei synthet. Ni-Körpern ermitteln Vff. eine Festigkeit von 42 kg/mm^2 . (Ztschr. f. Elektrochemie 31. 18—24.)

ULMANN

F. Sauerwald und G. Elsner, *Über das Brikettieren und Fritten von Metallen und die Adhäsionskräfte zwischen oxydischen Oberflächen.* (Vgl. vorst. Ref.) stellen fest, daß die Festigkeit u. D. synthet. Körper aus Metalloxyden: Fe_3O_4 , $\frac{1}{3}$ u. CuO u. solchen Metallen, deren Krystalliten mit einer oxyd. Haut bedeckt: Al , mit der Temp. einer Glühbehandlung steigen, soweit nicht das Auftreten von Rissen die Festigkeit herabsetzt. Die Absolutwerte der erreichten Festigkeit sind bedeutend geringer, als bei rein metall. Körpern, woraus Vff. schließen, die Kräfte zwischen den Oberflächen solcher Kristallite von Natur aus geringe Anzeichen für Kristallisation werden in den untersuchten Bereichen nicht zu finden. (Ztschr. f. Elektrochem. 31. 15—18. Breslau, Techn. Hochschule.) **ULMANN.**

H. Remy und A. Kuhlmann, *Löslichkeitsbestimmungen an schwer löslichen Salzen. II. Wasserlöslichkeit der Oxyde von Beryllium, Aluminium, Zink, Cadmium, Kupfer und Silber.* (I. vgl. S. 330.) Wie es der Stellung des Be im period. System entspricht, ist die Wasserlöslichkeit des BeO nur etwa ein Fünfzigstel von der von MgO . Zur Best. der Löslichkeit des BeO konnte die konduktotitrimetr. Methode nicht mehr angewandt werden; man war auf Ergebnisse der Leitfähigkeitsmessung angewiesen. Die Wasserlöslichkeit der Oxyde von Al , Zn , Cd , Pb , Cu u. Ag wurde nach beiden Methoden ermittelt u. führte zu gut übereinstimmenden Werten. Die Wasserlöslichkeit in mg/l beträgt konduktotitrimetr. (k.) u. auf Grund der Leitfähigkeit (L.) gemessen von BeO : 0,20 (L.); Al_2O_3 : 0,94 (k.), 1,04 (L.); ZnO : 2,92 (L.); CdO : 4,80 (k.), 5,00 (L.); PbO : 12,39 (k.), 12,34 (L.); CuO : 5,46 (k.), 5,46 (L.); Ag_2O : 25,29 (k.), 24,80 (L.). Für die Berechnung der spezif. Leitfähigkeit nach Vff. die prakt. Ausführung von Leitfähigkeitskorrekturen mit, die infolge der Änderung der Leitfähigkeit durch die Rk. der Hydroxyde mit der im W. vorhandenen CO_2 nötig werden. Diese Werte müssen zu den durch Verss. gefundenen Äquivalentleitfähigkeitswerten addiert werden, um die „wahren“ Äquivalentleitfähigkeiten der Hydroxyde zu erhalten, die beobachtet würden, wenn die Hydroxyde in reinem W. aufgelöst wären. (Ztschr. f. anal. Ch. 65. 161—81. 1924. Hamburg, Staatl. Staatslab.) **HORST.**

André Charriou, *Über die Verwendung von Tonerde, die verschiedene andere Gase absorbiert hat, als Katalysator.* Es wurde bei 250° getrocknetes, ferner bei 500° erglühtes u. durch Oxydation von Al erhaltenes Al_2O_3 , das wechselnde Mengen von P_2O_5 , CuO , CaO , WO_3 u. W_2O_5 absorbiert enthielt, bzgl. der vollständigen Zersetzung von Äther nach: $C_2H_5O \cdot C_2H_5 = H_2O + 2C_2H_4$ bei 250° untersucht; es ergab sich, daß der reine Katalysator am besten wirkte; schon geringe Verunreinigungen minderten die katalyt. Wrkg. erheblich herab (Kurven im Original); von allen abgetrennten Verbb. hatte nur mit W_2O_5 verunreinigtes Al_2O_3 eine bessere Wrkg. als das reine Al_2O_3 , da W_2O_5 die Zers. von Ä. schon an u. für sich katalysiert. (C. r. d. Acad. des sciences 180. 213—15.) **HABERLAND.**

A₁. Atomstruktur. Radiochemie. Photochemie.

H. Bateman, *Das Feld eines Elektrons in Ruhe und in gleichförmiger Bewegung.* Mathematisch. (Philos. Magazine [6] 49. 1—18.) **K. WOLF.**

W. P. Widdowson und A. S. Russell, *Die Periode von Mesothorium 2.* Vff. beschreiben zunächst die Gewinnung des untersuchten Mesothoriumpräparates. Es zeigt sich, daß kein Zwischenprod. mit einer kleineren Periode als die von Mesothorium 2 existiert. Die Halbwertszeit von Mesothorium 2 wurde genau gemessen. Sie beträgt 5,95 Stdn. Dieser Wert ist wahrscheinlich bis auf weniger als 1% genau u. 4% kleiner als der ursprünglich von HAHN gefundene Wert von 6,2 Stdn. Die neue Zerfallskonstante beträgt 0,116 pro Stde. (Philos. Magazine [6] 49. 3—40. Oxford.) **K. WOLF.**

L. Bastings. *Der Abfall von Radium E.* Vf. geht davon aus, daß das β -Strahlungsspektrum des RaE ein verwaschenes Band primärer β -Strahlen zwischen 75–90% Lichtgeschwindigkeit, jedoch keine einzelnen Linien zeigt. Da eine γ -Strahlung durch die sekundäre β -Strahlen erzeugt werden könnten, bisher nicht festgestellt werden konnte, hält es Vf. für möglich, daß bereits im Kern eine Verschiedenheit der Geschwindigkeiten vorhanden ist, besonders unter der Annahme, daß die Wahrscheinlichkeit des Zerfalls nicht für alle Atome genau gleich wäre, sondern daß die schnellere β -Strahlen aussendenden Atome auch schneller zerfallen. Vf. prüft diese Möglichkeit dadurch, daß er während längerer Zeit das Verhältnis zweier RaE-Quellen bestimmt, von denen die eine unbedeckt, die andere mit einer Al-Folie von 1,1 mm, die bereits die langsamen β -Strahlen fortnimmt, versehen war. Es zeigte sich jedoch kein Einfluß. — Vf. bestimmt ferner an 7 verschiedenen prakt. RaD freien Präparaten die Halbwertszeit des RaE auf $4,985 \pm 0,004$ Tag (bisheriger Wert 4,85 Tage). (Philos. Magazine [6] **48**. 1075–80. 1924. Cavendish Lab. Cambridge.) PHILIPP.

Walther Gerlach, *Atomstrahlen. Zur Nomenklatur.* Vf. wendet sich gegen die von SCHMIDT (S. 196) benutzte Bezeichnung „Atomstrahlen“ für Teilchen, die keine Atome, vielmehr Ionen sind. Unter Atomstrahlen werden geradlinig im Vakuum sich bewegende Atome oder Moleküle verstanden (vgl. Erg. d. exakt. Naturw. **3**. 1924.). (Ann. d. Physik [4] **76**. 106–8.) BIKERMAN.

W. Wien, *Über das Leuchten der Kanalstrahlen bei hohen Drucken und der Frage der Verweilzeit.* Vf. sucht durch Beobachtungen der Lichtemission eines Kanalstrahles in der Nähe eines Spaltes, aus dem der Strahl in das Vakuum austritt, zu entscheiden, ob neben einer klass. Abklingung der Lichtschwingung noch eine Verweilzeit angenommen werden muß. Zu diesem Zweck wird die Intensität der H_{α} -, H_{β} - u. H_{γ} -Linie von Wasserstoffkanalstrahlen bei verschiedenen Drucken (bis 7,5 mm Hg) gemessen. Als Resultat ergab sich, daß mit zunehmendem Druck die Intensität nach einer Exponentialfunktion rasch einem Grenzwert zustrebt, aber von diesem Grenzwert nicht mehr heruntergeht, wie es theoret. zu erwarten ist, wenn man eine endliche Abklingungs- u. Verweilzeit annimmt. In diesem Falle müßte die Druck-Intensitätskurve zu einem Maximum ansteigen u. dann wieder abfallen. Aber auch bei den höchsten gemessenen Drucken tritt dieser theoret. geforderte Intensitätsabfall nicht auf. Infolgedessen liegt kein Grund vor, das Nebeneinanderbestehen einer Verweilzeit u. Abklingungszeit anzunehmen. Beides sind nur verschiedene Darstellungen desselben Vorgangs. (Ann. der Physik [4.] **76**. 109–23. München, Univ.) BECKER.

Robert Döpel, *Elektromagnetische Analyse von Kanalstrahlen.* Es wurde die Geschwindigkeitsverteilung der Kanalstrahlen des Wasserstoffs in ihrer Abhängigkeit von den Entladungs- u. Gasdruckbedingungen untersucht. Die kinet. Energie der Teilchen (u. daraus unter Zuhilfenahme der Ergebnisse der elektr. u. der magnet. Ablenkung auch die Geschwindigkeit u. die Anzahl der Teilchen) wurde durch die Strahlen auffangendes Thermoelement bestimmt. Es wurden Teilchen H_3 , H_2 , H , H' , H_2' , sowie He u. He' nachgewiesen; eine Unterteilung der Molekülpara- von H_2 (sowie von O_2 , N_2 u. He) deutet auf die Existenz von H_4 , O_4 , N_4 u. He_4 im Dunkelraum hin. Die zahlreichsten Teilchen der Wasserstoffstrahlen gehören der H_2' u. H' an; die H' -Ionen sind entweder langsam (die Mehrzahl) oder schnell. Die langsamen H' werden mit wachsender Spannung u. wachsendem Gasdruck abgeschwächt; die schnellen H' werden bei höherer Spannung homogenisiert. Die aus dem Dopplereffekt ermittelte Geschwindigkeitsverteilung deckt sich mit der mittels Thermoelements gefundenen nicht, auch wenn man berücksichtigt, daß es sich bei den Dopplerkurven um neutrale Teilchen handelt. (Ann. d. Physik **76**. 1–28. München, Univ.) BIKERMAN.

- J. A. Gray**, *Streuung und Absorption von γ -Strahlen*. (Nature **115**. 86. Kingston K. WOLF.)
- B. Venkatesachar**, *Der Einfluß der Länge der strahlenden Säule auf die Breite Spektrallinien*. Vff. entwickelt eine größtenteils mathemat. Theorie der Linienverbreiterung, die durch eigene Verss. Bestätigung findet. Im Anschluß hieran das Verh. dieser Linienverbreiterung bei einer Reihe physikal. Unterss., in n auf Sichtbarkeit von Interferenzerscheinungen beruhende Experimentalmethoden angewandt wurden, diskutiert. (Philos. Magazine [6] **49**. 33—59.) K. WOLF.
- E. Fues**, *Bemerkungen zum spektroskopischen Verschiebungssatz*. I. Mathemat. Berechnung von Gesetzmäßigkeiten. (Ann. der Physik [4.] **76**. 299—315.) BECKER.
- Karl Schaum**, *Photometrische und spektralphotometrische Studien*. IV. **Martite Funck**, *Über den Einfluß der Temperatur auf die Absorptionsspektren der α - und Phosphorsalzperlen*. (III. vgl. SCHAUM u. STOESZ, Ztschr. f. wiss. Photographie, Photophysik u. Photochemie **23**. 52; C. 1924. II. 2311.) Vff. untersuchen die Absorptionsspektren der Perlen bei Zimmertemp. u. bei ca. 800° im Rig-Martensschen Spektralphotometer. — In den meisten Fällen konnte die bei Temperaturerhöhung erwartete Verschiebung einzelner Banden nach Rot festgestellt werden. (Ztschr. f. wiss. Photographie, Photophysik u. Photochemie **23**. 73—78. Gießen, Univ.) LESZYNSKI.
- M. Hanot**, *Über die Breite der Linien der Balmerreihe bei oszillierenden Entladungen*. Vff. zeigt, daß für gegebenen Anfangsdruck u. Temp., die durch einen nach gedämpften oszillierenden Funken hindurchgehende maximale Stromintensität für die Breite der untersuchten Linien bestimmend ist. (C. r. d. l'Acad. sciences **180**. 54—56.) K. WOLF.
- N. K. Sur und R. N. Ghosh**, *Absorptionsspektrum von K-Dampf bei hohen Temperaturen*. Vff. wiederholen die Verss. von NARAYAN u. GUNNAYYA (Philos. Magazine [6] **45**. 831; C. 1924. I. 397) über K-Dampf, indem derselbe zwecks therm. Anregung der Atome in einem Stahlrohr erhitzt wird. Die Wellenlänge wurde mit Hilfe eines Vergleichsspektrums von Fe gemessen. Die erreichte Temp. war ca. 1300°. Die erhaltenen Absorptionslinien sind tabellar. geordnet. Schließlich werden die gemessenen Wellenlängen der Köpfe kanellierter Banden orange-grünen Gebiet mitgeteilt. (Philos. Magazine [6] **49**. 60—64. Allahabad, Ind.) K. WOLF.
- P. Takamine und M. Fukuda**, *Über die Quecksilberlinie 2270 Å [1S—2p₁]*. (Nature **114**. 382; C. 1924. II. 2009.) In einer Hg-Lampe von besonderer Konstruktion, bei welcher der Lichtbogen durch 3 zylindr. Hilfeelektroden auseinander gezerzt wird, tritt die 2270 Linie mit besonderer Intensität auf. — Bei Potentialentladungen erscheint die 2270 u. 2345 Linie je um 0.1 Å gegen Rot, gegen die 2565 Linie um 0,1 Å in entgegengesetzter Richtung verschoben, wenn diese Linien mit dem gewöhnlichen Bogenspektrum vergleicht. (Physical Review [II] **25**. 23—29. Tokyo.) BECKER.
- Bayen**, *Funkenpektren von Wolfram und von Quecksilber im äußersten Ultraviolett*. Zwei Tabellen bringen das Zahlenmaterial, das mit Ausnahme von 5 Hg-Linien, nur neue Linien enthält. (C. r. d. l'Acad. des sciences **180**. 57—59.) K. WOLF.
- Hantaro Nagaoka und Yoshikatsu Sugiura**, *Die Verteilung eines elektrischen Feldes im Metallbogen und der im Bogen von Silber, Kupfer, Magnesium, Chrom, Nickel, Kobalt, Eisen und zehn anderen Metallen beobachtete Starkeffekt*. (Vgl. Japan. Journal of Physics **2**. 1; C. 1924. II. 1889.) Durch Verwendung von Kapazitäten von 1 μ F können ruhig brennende Lichtbogen von 7 cm Länge erhalten werden, bei das zu untersuchende Metall als Anode u. Kohle als Kathode verwendet wird. Bei dieser Anordnung bestimmen Vff. den Potentialabfall längs des Bogens. Es wird der Starkeffekt bei Ag, Au, Mg, Zn, Cd, Al, Cr, Ni, Co u. Fe bestimmt,

wobei elektr. Felder von $6-20 \cdot 10^4$ V pro cm erhalten wurden. Die Resultate sind in Tabellen angeführt. Es erscheinen sämtliche Linien, welche derselben Serie angehören, gleichmäßig vom elektr. Feld beeinflusst, doch ist die Veränderung bei verschiedenen Serien verschieden. Mit zunehmender Termnummer wird auch der Starkeffekt stärker. Bei Fe wurden sechs verschiedene Arten von Veränderungen der Linien im elektr. Feld wahrgenommen. Am meisten werden die Funktlinien beeinflusst, während die Bogenlinien im allgemeinen unveränderlich bleiben. — Es wurden eine Anzahl neuer Linien beobachtet, welche durch starke elektrische Felder an der Anode hervorgerufen sind. (Japan. Journ. of Physics 3. 45—1924. Inst. of Physic. and Chem. Research.) BECKER.

K. Schaum und L. Hock, *Über den Einfluß von Lösungsgenossen auf spektrale Absorption*. Die Molarextinktion einer wss. Na-Pikrat-Lsg. ändert sich bei Zusatz von NaOH-Ionen. Die Phenolform ist farblos, sodaß eine Änderung des Gleichgewichts zwischen Aci- u. Phenolform nicht die Ursache sein kann. Eine Änderung der elektrolyt. Dissoziation wohl auch nicht als Ursache in Frage kommt, schließen Vff. entweder auf Deformation oder auf Komplexbildung. Andere Nitrophenole zeigen ähnliche Erscheinungen. (Ztschr. f. wiss. Photographie, Photochem. u. Photochemie 23. 120. 1924. Gießen.) LESZYNSKI.

Henri de Laszlo, *Absorption ultravioletter Strahlen durch methylierte Naphthalinderivate*. (Vgl. HENRI u. LASZLO, Proc. Royal Soc. London, Serie A. 105. 6. C. 1924. II. 803.) Das Absorptionsspektrum der Mono- u. Dimethylnaphthalinderivate gleicht dem des freien Naphthalins: es sind drei Gebiete festgestellt worden: A) zwischen λ 3250 u. 2950 Å., B) λ 2950 u. 2500 Å. u. C) eine starke Bande im Ultraviolett bei 2200 Å. Absorptionskurven für Naphthalin, β -Methyl- u. 2,6-Dimethylnaphthalin in Hexanlsg. vgl. Original. In der Region A) besteht das Absorptionsspektrum aus 5—7 engen Banden, die beim 2,6-Dimethylderiv. zahlreicher sind. Im Dampfzustande findet man (außer für β -Methylderiv.) in A) eng zusammenhängende Banden; beim β -Deriv. beobachtet man zwischen λ 3160,5 u. 3154,2 eine feinere Struktur der Banden. In der B)-Region verursacht die Einführung von 1 oder 2-CH₃ in den Naphthalinkern eine Verschmelzung der Naphthalinbanden. In Hexanlsg. besitzt das α -CH₃-Deriv. 4, das β -Deriv. 3 Absorptionsmaxima; im Dampfzustande zeigt das α -Deriv. 4, das β -Deriv. 7 zusammenhängende Bande. Einführung von CH₃-Gruppen in das Naphthalinmol. verursacht eine Verschiebung des Spektrums nach rot, u. zwar beim β -Deriv. mehr als beim α -Deriv. Diese Verschiebung wird bei den Dimethylderiv. noch deutlicher. Das Spektrum des 2,6-Dimethylnaphthalins unterscheidet sich von dem des 2,7-Dimethylderiv. durch größere Intensität u. zahlreichere Banden, die nach rot verschoben sind. (C. r. d. l'Acad. des sciences 180. 203—6.) HABERLAND.

C. W. Porter und H. C. Ramsperger, *Die Einwirkung von ultravioletter Licht auf Kohlendioxyd und Wasser*. Vff. untersuchten die Einw. von ultravioletter Licht auf ein Gemisch von CO₂ u. W. zwecks Prüfung der Baeyerschen Theorie nach welcher die erste Stufe der Photosynthese der Zucker u. Stärke in Pflanzen die B. von Formaldehyd aus CO₂ u. W. sein soll. Kommen die Gase während der Einw. des ultravioletten Lichts in Berührung mit organ. Substanzen, wie Kautschuk, Siegellack, Khotinski-Zement oder Fett, so wurden tatsächlich kleine Mengen Chloroform gebildet, aber in einem App., der ganz u. gar aus Quarz bestand, u. in dem jede Berührung mit organ. Substanzen vermieden wurde, wurden in 3 verschiedenen Verss. unter der Einw. von Licht einer 220 V. Hg-Bogenlampe weder CH₂O noch reduzierende Zucker gefunden. (Journ. Americ. Chem. Soc. 47. 79—1925. Berkeley [Cal.], Univ.) JOSEPH.

D. H. Bangham und J. Stafford, *Die Oxydationsgeschwindigkeit der Metalle und die Struktur der farbigen Oxydhäutchen*. Vff. schließen aus den neuen

eiten von TAMMANN im Zusammenhang mit einer Arbeit von HINSELWOOD (Proc. Royal Soc. London Serie A 102. 318; C. 1823. I. 495), daß für die farbigen Interferenzhäutchen nur Interferenzvorgänge verantwortlich zu machen sind. Wäre die Interferenz nicht die Ursache dieser Erscheinung, so wäre es eine merkwürdige Coincidenz, daß die berechneten Dicken überhaupt in das Gebiet derjenigen fallen, die Newtonschen Farben verursachen. (Nature 115. 83—84. Manchester-V.)

K. WOLF.

Frederick S. Hammett, *Refraktometrische Untersuchung der Neutralisation*. benutzte n. Lsgg. von Salz-, Schwefel-, Phosphor-, Essig-, Oxal- u. Citronensäure, die mit n. Lsgg. von NaOH bzw. KOH gemischt wurden. Alle Messungen wurden mit einem Refraktometer von PULFRICH-ZEISS bei 20° u. mit Na-Licht durchgeführt u. graph. dargestellt. In Zusammenfassung ergibt sich: Der Brechungsindex von Gemischen starker u. schwacher ein-, zwei- u. dreibas. Säuren u. starker einbas. Basen ist eine lineare Funktion des Neutralisationsvorganges, wenn die Säure durch Säure neutralisiert wird. Die Verallgemeinerung, daß der Brechungsindex eine additive Funktion der molekularen Konz. gel. Substanzen ist, wird erst auf Gemische von chem. reagierenden Verbb. obiger Natur; die erhaltenen Resultate zeigen, daß die Konz. der Endprodd. sich gemäß einer arithmet. Reihe verhält. Das gilt auch für die Neutralisation starker u. schwacher einbas. Säuren mit starker einsäurige Base. Der Brechungsindex von Gemischen von zwei- u. dreibas. Säuren u. einsäurigen Basen ist dagegen keine lineare Funktion des Neutralisationsvorganges, wenn Säure durch Base neutralisiert wird. Obige Verallgemeinerung läßt sich in diesem Falle nicht auf derartige Gemische anwenden; Konzentrationsänderung gehorcht keiner arithmet. Reihe. Der Brechungsindex eines Säure-Salz-Gemisches letztgenannter Art ist nicht für die Messung der Salzkonz. geeignet. (Journ. Franklin Inst. 199. 91—98. Philadelphia, Wistar Inst.) K. WOLF.

R. Tomaschek, *Über den Einfluß des Grundmaterials auf die Phosphoreszenzintensität*. (Vgl. Ann. der Physik [4] 75. 109; C. 1924. II. 2121.) Vf. stellt die von ihm entwickelten Vorstellungen über den Aufbau der Phosphorzentren u. den Neutralisationsvorgang zusammen. Für die Lage der Emissionswellenlängen desselben Phosphorzentrums in verschiedenen Grundmaterialien wird ein Ausdruck angegeben, der außer den DEE. der Grundmaterialien die Bindungsenergien der Verbb. Gattungsatom-Erdalkaliumatom u. Gattungsatom-Schwermetallatom enthält, woraus die Tatsache Rechnung trägt, daß bei den seltenen Erden Pb u. Mn die Vergrößerung der Emissionswellenlängen bei Übergang von CaS zu SrS in entgegen gesetztem Sinne erfolgt, als die Lenardsche Formel $\lambda_0 = \lambda / \sqrt{DE}$ erfordert. Die Auffassung der Phosphorzentren als deformierte Stellen im Krystallgitter lehnt Vf. auf die Versuche der Druckzerstörbarkeit u. der großen Energieisolation der Phosphore ab. (Physikal. Ztschr. 25. 643—46. 1924. Heidelberg.)

KRÜGER.

Enos E. Witmer, *Die Theorie des Abklingens der α -Strahlenlumineszenz*. Die Lenardsche Theorie über das Abklingen der Lumineszenz durch α -Strahlen erregter Körper wird durch die Annahme erweitert, daß das bei dem Zerfall der radioaktiven Zentren im Körper entstehende Strahlungsfeld eine Neubildung aktiver Zentren bewirkt. Die unter vereinfachenden Voraussetzungen für den Wert J zur Zeit t u. den Grenzwert J_∞ der Lumineszenzintensität abgeleitete Gleichung $(J - J_\infty)/(J + J_1) = C \cdot e^{-\lambda t}$ gibt die Ergebnisse von RODMAN an $RaBr_2$ bestätigend wieder. In Gemischen lumineszierender Substanzen scheinen die Komponenten unabhängig voneinander abzuklingen. (Physical Review [2] 24. 639—43. 1924. Univ. of Pennsylvania.)

KEÜGER.

A₃. Kolloidchemie. Capillarchemie.

J. Duclaux, *Kolloide*. (Vgl. S. 940.) Vf. erörtert, daß sich die alte Unter-

scheidung nach GRAHAM in kolloidale u. krystallisierende Stoffe nicht mehr so recht erhalten lasse, weil nach neuerer Erkenntnis derselbe Stoff, je nach seiner Herst. u. den sonstigen Umständen, im kolloidalen oder im krystallisierten Zustand vorkommen kann. (Annales de la Brasserie et de la Distillerie; Brewers Journ. 658—59. 1924.)

Jacques Loeb, *Hydrophobe Kolloide und hydrophile Kolloide*. (Vgl. LOEB Journ. Gen. Physiol 6. 307; C. 1924. I. 2332.) Das Donnan'sche Membrantgleichgewicht erklärt die spezif. kolloiden Eigenschaften sowohl der hydrophilen wie der hydrophoben Kolloide. Es hängt in allen Fällen von der Ladung der Kolloidteilchen ab, sei es, daß diese Ladung vorwiegend durch Ionisation wie im Falle der Hydrophilen oder bloß durch eine elektr. Doppelschicht wie bei den Hydrophoben erklärt werde. (Journ. de Chim. physique 21. 169—87. 1924. ROCKEFELLER-INSTITUT, Med. Res., New York.)

G. W. Scott Blair, *Rhythmische Fällung in verdünnten Gelatinegelelen*. untersuchte den Einfluß des Gel-Alters auf die B. Liesegang'scher Ringe. seinen Verss. diffundiert AgNO_3 nach $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ in verd. Gelatine. Als Standards wurden benutzt: 10%ig. AgNO_3 , 0,019%ig. $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ u. 0,5%ig. bzw. 1%ig. Gelatine. Es zeigt sich, daß die in einem Reagenzzylinder auftretende Zahl der Ringe eine bestimmte ist, u. die Entfernung des zuletzt gebildeten Ringes von der Oberfläche eine durchaus scharfe ist. Diese Entfernung sei mit a_∞ bezeichnet. Es ergibt sich, daß a_∞ regelmäßig zunimmt mit dem Alter des Gels vom Neugeborenen bis etwa 10 Tage. Bei Gelen älter als die vorgenannten hört überhaupt keine Ringbildung auf; dagegen tritt die Fähigkeit zur Ringbildung bei sehr viel älteren Gelen wieder auf. Eine ähnliche fortschreitende Zunahme von a_∞ wurde bei anderen Salzpaaren nicht beobachtet. Mit AgNO_3 u. K_2CrO_4 trat der zweite Typus dieser Erscheinung (Unfähigkeit zur Ringbildung nach einem gewissen Alter) auf. Im Falle des $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ zeigt sich, daß diese Altersgrenze zunimmt mit der Gelatinekonz. Vf. untersuchte ferner den Einfluß von Licht verschiedener Wellenlängen. Es wurde ein fundamentaler Unterschied zwischen dem von ultrarotem u. dem sichtbarem Licht festgestellt. — Eine neue Abänderung der Ostwald'schen Theorie herrührend von C. N. HINSHELWOOD wird diskutiert. Es existiert keine absolute scharfe metastabile Grenze sondern nur ein Konzentrationsbereich, in dem eine Fällung sehr wahrscheinlich wird. Die Micellen des Gels können als Krystallisationszentren für die B. des Nd. wirken, genau so wie kolloide Teilchen geeigneter Größe die Krystallisation unterkühlter Fl. hervorrufen. (Philos. Magazine [6] 49. 90—100. Oxford.)

F. E. Brown, *Dichte und Hydratation in Gelatinesolen*. Kritik der gleichnamigen Arbeit von THE SVEDBERG u. STEIN (Journ. Americ. Chem. Soc. 46. 2613; C. 1924. I. 2333) u. der aus ihr gezogenen Folgerungen, da die Berechnung des Wechsels in der D. auf irrtümlichen Voraussetzungen fußt. (Journ. Americ. Chem. Soc. 46. 1207—9. 1924. Iowa State College, Ames, Iowa.)

Karl Schaum und Philipp Friederich, *Über den angeblichen Einfluß des Lichtes auf die Elektrophorese*. Die elektrophoret. Wanderungsgeschwindigkeit bei rotem Licht hergestellten Solen wird einmal bei langwelligem Licht, einmal bei langwelligem + ultravioletem Licht gemessen. Abgesehen von Halogensilsolen wird nur beim Zinkhydrosol ein Einfluß der Bestrahlung festgestellt. Zinkalkoholsol zeigt keine Beeinflussung. Auf die Halogensilbersole wollen Vf. in einer weiteren Arbeit zurückkommen. Bei Zinkhydrosol scheint chem. Einw. vorzuliegen. Bei den Verss. anderer Autoren, die auch in den anderen Fällen Einfluß der Bestrahlung finden, schließen Vf. auf Änderung der Teilchengröße u. des Doppelschichtpotentials unter Mitwirkung photochem. Vorgänge. (Ztschr. f. wiss. Photographie, Photophysik u. Photochemie 23. 98—101. 1924. Gießen, Univ.)

B. Anorganische Chemie.

P. Bruylants, F. Lafortune und L. Verbruggen, *Neue Bestimmungen des Atomgewichts von Selen*. Die Bestst. von BRUYLANTS u. DONDEYNE (Bull. Acad. roy. Belgique, Classe des sciences [5] 8. 387; C. 1922. III. 1282) wurden wiederholt zur Ausschaltung der bei genauem Studium der früheren Messungen entdeckten Fehlerquellen. Besonderer Wert wurde gelegt auf genaue barometr. Messungen, st. des SeH_2 nach verschiedenen Methoden — aus Al-Selenid wie früher u. aus 1. H_2 bei 700° ; die Methode von WUYTS u. STEWART (Bull. Soc. Chim. Belgique 9. [1909]) ergab stets ein unreines Prod., dessen Reinigung nicht gelang — u. Verwendung von Se verschiedener Herkunft.

Das Litergewicht des SeH_2 beträgt für 1 Atmosphäre 3,66431 (53 Bestst.)
 " " " " " " $\frac{2}{3}$ " 3,64820 (22 ")
 " " " " " " $\frac{1}{3}$ " 3,63549 (35 ")
 n. Litergewicht ergibt sich dann zu 3,66240, daraus das Mol.-Gew. von SeH_2 31,243 woraus für Se das At.-Gew. 79,227 folgt. (Bull. Soc. Chim. Belgique 33. —612. 1924. Löwen, Univ.)
 HERTER.

Ernst Weitz und Herbert Müller, *Über die Einwirkung von Ammoniak auf ferri Eisen(2)-salz-Lösungen*. Die Erscheinung, daß Ferrosalze in Ggw. von Ammoniumsalzen durch NH_3 nicht gefällt werden, wurde bisher durch die Herabsetzung der OH-Ionenkonz. des NH_3 durch die Ammoniumsalze erklärt, so daß verminderte OH-Ionenkonz. dann nicht mehr zur Überschreitung des Löslichkeitsprod. von $\text{Fe}(\text{OH})_2$ ausreicht. Diese Erklärung ist nicht zutreffend, da der Grund der Nichtfällung der Ferrosalze vielmehr in der B. komplexer Ammine zu liegen ist. Ammoniakal. Fe-Lsgg. (Chlorid u. Nitrat) geben mit NO braune Reaktionsprod., die der Zus. $[\text{Fe}(\text{NH}_3)_5\text{NO}]\text{X}_2$ entsprechen; die Vermutung, daß auch in diesen NO-freien ammoniakal. Lsgg. das Fe in Form von Amminen vorhanden ist, wird durch die Unterss. bestätigt. — Beim Einleiten von NH_3 in genügend konz. Ferrosalzlsgg. in Ggw. von Ammoniumsalzen sind drei Phasen zu beobachten. a) Grünlichweißer Nd. von $\text{Fe}(\text{OH})_2$ schon bei den ersten NH_3 -Blasen. Da die OH-Ionenkonz. in diesem Augenblick noch sehr klein ist, kann die Löslichkeit von $\text{Fe}(\text{OH})_2$ nur sehr gering sein, jedenfalls von ganz anderer Größenordnung als die von $\text{Mg}(\text{OH})_2$. b) Mit steigendem NH_3 -Gehalt der Lsg. nimmt der Nd. wieder ab u. geht schließlich ganz in Lsg.; d. h. mit steigender OH-Ionenkonz. geht das $\text{Fe}(\text{OH})_2$ wieder in Lsg., was nur durch B. komplexer Ammine erklärt werden kann. Nach weiterem Einleiten von NH_3 krystallisieren die Komplexverb. aus.

Aus Ferrochlorid, -jodid, -nitrat u. -perchlorat wurden so die entsprechenden Amminferrosalze erhalten; das Sulfat gab entweder ein Aquopentammin oder die Doppelverb. dieser Verb. mit 1 Mol. $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$. Das Acetat gab kein krystallisiertes Ammin, offenbar wegen zu großer Löslichkeit. Durch Erhitzen im inerten Gasstrom geben die Verb. NH_3 ab u. gehen in die wasserfreien Ferrohalogenuide über. Besonders geeignet als Ausgangsmaterial ist Fe-Acetat, welches man gleichzeitig mit K-Salzen u. NH_3 umsetzen kann. Die Ammine sind in Lsg. u. in krystallisiertem Zustande grünlich gefärbt wie die gewöhnlichen Hexaamminferrosalze. — Die Amminferrosalze von stark oxydierenden Säuren sind nicht beständig, das Nitrat u. Perchlorat ist zwar bei Zimmertemp. noch faßbar, wird aber beim Erwärmen zers. Vom Ferronitrit scheint ein Ammin in Lsg. beständig zu sein, bei 80° erfolgte Zers. — Die richtige Formulierung für das analyt.-chem. Fe-Ammin ist also etwa die: ammoniumsalzhaltige Ferrolsgg. werden durch NH_3 nicht gefällt, weil sowohl die Konz. der Fe-Ionen (infolge von Amminbildung) wie die der OH-Ionen (wegen der Zurückdrängung der Ionisation des NH_4OH) soweit abgesenkt ist, daß das Löslichkeitsprod. des $\text{Fe}(\text{OH})_2$ nicht mehr erreicht wird.

Im Anschluß hieran werden die Bedingungen für die Fällbarkeit des $\text{Fe}(\text{OH})_3$ örttert. — *Manganosalze* zeigen dasselbe Verh. gegenüber NH_3 wie die Ferrosalze. *Mg-Salze* bilden ebenfalls in stark ammoniumsalzhaltigen Lsgg. krystallisierte Ammine, während in NH_3 -ärmeren die Komplexbildung mehr zurücktritt.

Versuche: *Hexamminferrochlorid* $[\text{Fe}(\text{NH}_3)_6]\text{Cl}_2$, aus 5 g krystallisiertes $\text{FeCl}_2 + 4\text{H}_2\text{O}$ u. 5 g Salmiak in 20 ccm W., grünliche Oktaeder; luftfrei eingeschlossen, sind sie haltbar. — *Hexamminferro-nitrat* $[\text{Fe}(\text{NH}_3)_6](\text{NO}_3)_2$, aus $\text{Fe}(\text{NO}_3)_2$ u. 5 g $\text{NH}_4\cdot\text{NO}_3$ in 20 ccm W., grünliche Oktaeder mit schwach gelbem Stich (kolloidales $\text{Fe}[\text{OH}]_3$); beim Erhitzen der Lsg. erfolgt bei 90° Zers. unter Abscheidung von schwarzem Ferroferrioxyd. — *Aquopentamminferrosulfat* $[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})(\text{NH}_3)_5]\text{SO}_4$, aus 5 g Mohrschem Salz in 20 ccm W., grünliche rhomboederartige Krystalle. — *Doppelverb. mit* $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$: $[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})(\text{NH}_3)_5]\text{SO}_4 + (\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$, aus 5 g Fe-Vitriol in 10 ccm W. + 40 ccm $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ -Lsg. in konz. NH_3 , blaßgrüne schiefwinkl. Krystalle. — Durch Einleiten von NH_3 in Ferroacetatlsg. wurden Lsgg. von (*Hex*-)Aminferroacetat erhalten, die man direkt zu doppelten Umlösungen verwenden kann. Mit Salzen stark oxydierender Säuren erfolgte Zersetzung mit Na-Nitrit entstand eine gelbe Lsg., aus der sich schließlich Krystalle von Ferrocyanalium abschieden. — *Hexamminferroperchlorat* $[\text{Fe}(\text{NH}_3)_6](\text{ClO}_4)_2$, aus $\text{Fe}(\text{NO}_3)_2$ u. NH_4 -Perchlorat; Abscheidung erfolgt schon vor der vollständigen Lsg. des Salzes aus verschiedenen $\text{Fe}(\text{OH})_3$; Oktaeder mit gelblichem Stich. — *Hexamminferro-bromid* $[\text{Fe}(\text{NH}_3)_6]\text{Br}_2$, aus FeBr_2 u. NH_4Br , blaßgrüne Oktaeder, läßt sich auch als Aminacetatlsg. mit NH_4Br darstellen. — *Hexamminferrojodid* $[\text{Fe}(\text{NH}_3)_6]\text{J}_2$, blaßgrüne Oktaeder. — Zum Schluß folgen Messungen über die Einw. von NH_3 auf Ferrosalzlsgg. von verschiedenem W.- u. NH_4 -Salz-Gehalt, sowie Ferrosalzlsgg., die nur wenig oder gar kein NH_4 -Salz enthalten. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58: 363—75. Halle, Univ.)

ZANDER

P. Siebe, *Die Einwirkung von Eisen auf Kupfer in der Wärme*. Vf. sucht den Einfluß von Fe auf Cu beim gemeinsamen Tempern zu ermitteln, indem er normale, Raffinierte- oder Elektrolytkupfer mit verschiedenem O_2 -Gehalt mit Schmiedeeisen unter Luftabschluß bei 600 — 750° zusammenführt u. dann die mechan. Eigenschaften des so behandelten Cu in Vergleich mit dem in Abwesenheit von Fe geglähten bestimmt. Als Prüfwerte dienten Tiefungszahlen nach ERICHSEN bei Blechen u. Biegungszahlen bei Drähten. Es zeigte sich allgemein eine Verminderung der mechan. Eigenschaften beim Zusammenglühen, was Vf. durch die desoxydierende Wrkg. der im Schmiedeeisen enthaltenen Gase (H_2 , CO) erklärt, welche den notwendigen Cu_2O -Gehalt stark vermindern. Diese Desoxydation konnte an metallograph. Schliffen festgestellt werden. Um die häufig beobachtete Brandblasenbildung aufzuklären, wurde in Cu_2O -haltigen geschmolzenen Raffinadekupfer, Elektrolytkupfer, Schmiedeeisen oder Gußeisen eingebracht u. die Schmelze dann abgekühlt. Die mkr. Unters. des erstarrten Regulus ergab um sämtliche Fe-Stückchen eine desoxydierte Cu-Zone. Dabei war eine Veränderung im C-Gehalt des Fe nicht eingetreten. Wurde Cu_2O -freies Elektrolytkupfer verwendet, dann schloß sich die Fe-Zone dicht an die Cu-Zone an. Dagegen bildeten sich bei Cu_2O -haltigem Material Undichtheiten. Diese Poren sind auf den bei der Red. des Cu_2O entstehenden H_2O -Dampf zurückzuführen. (Ztschr. f. Metallkunde 17. 19—21. Osnabrück, Kupfer- und Drahtwerk A.-G.)

BECKER-ROSE

Rudolf Schenck und Albert Imker, *Über die Dampfspannung des Germaniumwasserstoffs*. Anlaßlich der Veröffentlichung von PANETH, HAKEN u. RABINOWITSCH (vgl. S. 32) über die Eigenschaften von Zinnwasserstoff, wird dort der Dampfdruck des Germaniumwasserstoffs mit -165° , was Vf. bestätigen können, u. der Kp. mit $-88,5^\circ$ angegeben. Für letzteren erhielten Vf. vor etwa 2 Jahren (vgl. Rec. trav. chim. Pays-Bas 41. 569; C. 1923. I. 25) einen wesentlich tieferen Wert bei -125° .

erliche Verss. zur Messung der Dampfspannung ergaben nun Werte zwischen 0° u. -91° (nahe dem Panethschen Wert). Die früher beobachtete Differenz auf eine Zers. des damals zu lange aufbewahrten GeH_4 durch Hg u. auf teilweise von H_2 zurückgeführt. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58. 271—72. Münster [Westf.], HORST.

Richard Schmidt, Über den Reaktionsmechanismus bei der Reduktion des *antetrachlorids* mit Wasserstoff und das Verhalten der Reduktionsprodukte im *uum*. (Vgl. MEYER, BAUER u. SCHMIDT, Ber. Dtsch. Chem. Ges. 56. 1908; 1923. III. 1308.) Die Zers. von TiCl_3 wurde im Kohlerohr vorgenommen. Bei 600° , die 600° nicht wesentlich übersteigen durften, ließ sich auf diese Art fast stoff-freies TiCl_2 gewinnen. Bei 600° u. 0,02 mm Druck findet eine langsame flüchtigung des TiCl_2 statt, die durch Steigerung der Temp. beschleunigt wird. verflüchtigte TiCl_2 wurde nicht als solches wiedergewonnen, sondern als TiCl_3 in kleinen Mengen TiCl_4 . — Die Bedingungen für den vollständigen Zerfall TiCl_3 in TiCl_2 u. TiCl_4 wurden durch besondere Verss. ermittelt. Mit steigen- Temp. wird der Zerfall des Trichlorids stark beschleunigt, aber auch der stanzverlust durch Sublimation vergrößert. Bei 600° ging die Verflüchtigung TiCl_2 nur langsam vor sich. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58. 400—4. Berlin, ZANDER.

C. Mineralogische und geologische Chemie.

W. M. Weigel, Sitz und Charakter von Körnern nichtmetallischer Mineral- schlüsse. Beschreibung von Methoden zur Art u. Lage der Einschlüsse u. Be- rechnung einzelner natürlicher u. künstlicher Beispiele. (Bureau of Mines. Tech- nical Paper 296. 44 Seiten. 1924.) ENSZLIN.

J. Barthoux, Beschreibung eines neuen Minerals: *Dussertit*. Das neue Mineral kommt vom Djebel Debar (Constantine); es ist rhomboedr. oder hexagonal, in diesen Schichten ist es gelblich-grün dichroit., die Zus. entspricht der Verb. $2[\text{FeAl}]_3(\text{CaMg})_3[\text{OH}]_3$; beim Erhitzen auf 1000° werden 9,8% H_2O abgegeben; 3,75, Härte 3,5; l. in verd. HCl; in konz. HCl teilweise l. unter Hinterlassung Calciumarseniat. (C. r. d. l'Acad. des sciences 180. 299—301.) HABERLAND.

Eberhard Rimann, Beiträge zur Mineralogie von Brasilien. I. Ein neues Mineral, *Kalkowskyn*. Vorl. Mitt. Das Mineral kommt in einem muskovitreichen Gangmatitgang neben Zirkon u. Monazit der Serra do Itacohmy, Minas Geraes, vor und wird nach dem Mineralogen ERNST KALKOWSKY *Kalkowskyn* benannt. Es sind regelmäßig begrenzte, scheibenförmige, schwarze bis hellbraune Krystalle, deren Tem nicht zu bestimmen gelang, von lebhaft metallischem, wachs- u. harzartigem Glanz. Lichtbrechung ist größer als 1,769. Härte 3—4. D. $4,01 \pm 0,03$. In konz. HCl findet Zers. unter Herauslösen des Fe statt. H_2SO_4 greift nur wenig an. Die Zus. entspricht $(\text{FeCe})_2\text{O}_3 \cdot 4(\text{Ti, Si})\text{O}_2$ mit etwas $(\text{Nb, Ta})_2\text{O}_5$. Über den Gang eine Analyse vgl. Original. (Zentralblatt f. Min. u. Geol. Abt. A. 1925. 18—24.) ENSZLIN.

B. Gossner, Die chemische Zusammensetzung der Glimmerminerale. (Vgl. 1927.) Die Glimmergruppe, innerhalb deren weitgehende Verschiedenheiten, besonders in opt. Beziehung vorhanden sind, löst sich in 3 Untergruppen auf: Muskovit-Paragonit; Biotit-Phlogopit, Lepidolith-Zinnwaldit. *Muskovit*, $[\text{SiO}_2 \cdot \text{SiO}_3\text{K}_2 \cdot \text{AlO}_3] \cdot 4\text{SiO}_2 \cdot 4\text{AlO}_2\text{H}$, kann als Additionsverb. von 1 Orthoklas mit $4\text{AlO}_2\text{H}$ angesehen werden, was auch dem Ersatz von Feldspat durch Muskovit in tonerde- reichen, besonders metamorphen Gesteinen entspricht. *Paragonit*, $[\text{SiO}_2 \cdot \text{SiO}_3\text{Na}_2 \cdot \text{AlO}_3] \cdot 4\text{SiO}_2 \cdot 4\text{AlO}_2\text{H}$, stellt die Additionsverb. von 1 Albit mit $4\text{AlO}_2\text{H}$ dar.

Biotit, $[\text{SiO}_3\text{K}_2 \cdot \text{SiO}_3\text{Mg}] \cdot 3\text{SiO}_3\text{Mg} \cdot 3\text{AlO}_2\text{H}$. (Zentralblatt f. Min. u. Geol. 1925. 1—10. Tübingen.) ENSZLIN

Georg Schuler, *Untersuchung über die natürlichen Phosphate*. Zu der Mitteilung von GRAMMONT (S. 264) über das V. von Cr in natürlichen Phosphaten, merkt Vf., daß er in Algierphosphat bereits früher (Ztschr. f. angew. Ch. 11. [1898]) Cr nachgewiesen hat. (Bull. Soc. Chim. de France [4] 35. 1666. 1924.) H. ENSZLIN

Juan Hereza y Ortuño, *Übersicht über eine Theorie der Erzbildung*. (Engin. Mining. Journ.-Press 119. 160—62, Huelva, Spanien.) ENSZLIN

M. Perogordo y Lasso, *Eine Radiumlagerstätte bei Chihuahua*. Das Ra findet sich in einer Pechblende neben gediegen Gold in der Kontaktzone eines Porphy mit Kalken u. Mergel bei Chihuahua (Mexiko). (Engin. Mining. Journ.-Press 119. 168. Mexiko City.) ENSZLIN

C. G. Memminger, *Chinesische Phosphatablagerungen*. Bericht über das V. bedeutender Ablagerungen von *Apatiten* am Chao Ho (river) bei Tung Hai Hsi (Kiangsu). Das Mineral ist von bröcklicher Beschaffenheit u. kann leicht vermahlen werden. D. 3,130. Zus.: H_2O 0,12%, organ. u. flüchtige Subst. 0,08%, Ca_3P_2 90,02%, CaSO_4 0,29%, CaSiO_3 2,28%, CaF_2 4,92%, SiO_2 0,62%, Fe_2O_3 Spuren, Al_2O_3 0,67%. (Amer. Fertilizer 61. 27. 1924. Asheville, N. C.) BERJU.

R. C. Wallace und J. E. Maynard, *Die Tone des Beckens des Agassizsees*. I. Ihr kolloidaler Gehalt. Vf. geben die Analysenwerte einiger Tone aus den Ablagerungen am Rande des Agassizsees. Der kolloidale Gehalt steigt im allgemeinen mit größerer Tiefe der Tonschichten. (Proc. Trans. Roy. Soc. Canada [3.] 1. 1924. 9—30. 1924.) ZANDER.

Robert Schwarz, *Über das Problem der Kaolinbildung*. (Tonind.-Ztg. 48. 12. 1924. Freiburg i. B. — C. 1925. I. 354.) WECKE.

E. S. Larsen und E. V. Shannon, *Bustamit von Franklin Furnace, New Jersey*. Bustamit ist fasrig, seidenglänzend, schwach rosenrot. Das Verhältnis $\text{CaSiO}_3 : \text{MnSiO}_3$ ist wie 4:3. Er gehört dem triklinen System an, ist opt. negativ. α 1,662; β 1,674; γ 1,676 je $\pm 0,003$. (Amer. Min. 7. 95—100. 1923; N. Jahrb. f. Mineral 1924. II. 334—35. Ref. W. EITEL.) ENSZLIN.

F. Rinkel, *Über eine Gesetzmäßigkeit in dem Verhältnis des Eisensilicates zum Magnesiumsilicat in dem Olivin der Eruptivgesteine*. Es wurden Olivine verschiedener Herkunft analysiert, opt. untersucht u. das Verhältnis $\text{Fe}_2\text{SiO}_4 : \text{Mg}_2\text{SiO}_4$ bestimmt. (Zentralblatt f. Min. u. Geol. Abt. A. 1925. 11—17. 33—34. Osnabrück.) ENSZLIN.

C. A. Merritt, *Die Funktion von Gelen bei der Bildung von Quarz- und Carbonatadern*. (Vgl. Proc. Trans. Roy. Soc. Canada [3.] 17. 1924. 61; C. 1924. I. 2741.) Ähnlich den SiO_2 -Ablagerungen sind offenbar auch die Carbonatadern (Calciumcarbonat von Cobalt) durch Krystallisation aus kolloidalen Lsgg. entstanden. Das SiO_2 -Gel kann bei hohen Temp. u. unter Druck bestehen. (Proc. Trans. Roy. Soc. Canada [3.] 18. 1924. 85—90. 1924.) ZANDER.

Ralph L. Rutherford, *Korrosion durch Salzwasser*. Die Korrosion von Gesteinen durch Salzwasser geht nicht gleichmäßig vonstatten. Fe-Mg-Arten u. Feldspat scheinen schneller angegriffen zu werden, besonders von NaCl-Lsgg. von starker Konz. Andere Na-Salze wirken nicht in dem Maße, so daß dem Cl der nach eine besondere Wrkg. zukäme. Mechan. u. klimat. Einflüsse spielen der gegenüber nur eine untergeordnete Rolle. (Proc. Trans. Roy. Soc. Canada [3.] 18. 1924. 31—37. 1924.) ZANDER.

W. Gothan, *Studien über die Bildung der Schmelzkohle und des Pyropissits*. V. gibt eine krit. Übersicht über die Literatur der Genesis von Schmelzkohle u. Pyropissit. Im Gegensatz zu POTONIÉ, TILLE u. a., die die Pyropissitlager als sekundär allochthon betrachten, vertritt er die Ansicht RAEFLERS, daß die VV. autochthon

u. stützt diese Auffassung durch chem. u. mkr. Unterss. (Braunkohle 23. 33. 1924. Berlin.) BIELENBERG.

Hans Tropsch, *Über die Bedeutung der in der Kohle gefundenen Cellulosereste*. Vorhandensein von Celluloseresten in Braunkohlen spricht gegen die rein alkal.-chem. Theorie der Kohlenbildung u. ist unter Annahme einer Mumifizierung der Fischer-Schraderschen Theorie ohne weiteres zu vereinbaren. (Brennstoffe 5. 288—89. 1924. Mühlheim-Ruhr, Kohlenforschungsinst.) TROPSCH.

L. Rüger, *Terminologische Bemerkungen zu einigen natürlichen Kohlenwasserstoffen*. Vf. versucht die in Literatur u. Praxis vorhandene Verwirrung der Begriffe „bituminös-“ u. „ölig“ zu klären u. schlägt dazu vor, entweder alle KW-stoffigen Gesteine bituminös zu nennen oder den Begriff bituminös nur auf Ge-bitumen anzuwenden u. mit „Öl-“ alle sekundären Bildungen, bei denen es nur um späteres Eindringen der KW-stoffe handelt, zu bezeichnen. Die dritte Möglichkeit ergibt sich aus der engl. Auffassung, bei der die Gesteinsbitumina mit „bitumene“ u. alle andern Gesteine mit „öldurchtränkt“ bezeichnet werden. (Zentralblatt f. Min. u. Geol. Abt. B. 1925. 1—5. Heidelberg.) ENSZLIN.

Henrik Mohorčič und Krištof Cazafura, *Über die Zusammensetzung der Braunkohle von Slatina Radenci*. Die analysierte Quelle enthält im ganzen 379 g gel. Bestandteile im Liter. Sie gehört zu den alkal. Säuerlingen mit einem Gehalt von 5,85 g NaHCO_3 . Außerdem ist ein hoher Li-Gehalt (0,060 g Li_2O) neben einem beträchtlichen Sulfatgehalt vorhanden. Außer Cl^- wurde auch Br^- u. J^- gefunden. (Nachrichten d. Serb. Kgl. Akad. 1924. Nr. 113. Wien. Sep.) ENSZLIN.

D. Organische Chemie.

L. Aucken, *Eine neue Theorie der Valenz. I. Eine Prüfung der Ansichten über die atomare Bindung*. Ein Atom, das nach der Theorie von LOWRY sowohl durch eine kovalente, als auch durch eine elektrovalente Bindung mit einem andern Atom verknüpft ist, müßte fester gebunden sein, als wenn nur eine kovalente Bindung vorhanden wäre. In diesem Falle müßten die C-Atome im Äthan leichter zu trennen sein als im Äthylen, was jedoch den Tatsachen nicht entspricht; vielmehr ist eine doppelte Bindung leichter zu trennen als eine einfache. Wenn die Theorie über den Ursprung der Acidität spricht das Verhältnis von HI zu HCl ; erstere ist trotz der viel größeren Kernladung des Br-Atoms (im Vergleich zum Cl-Atom) doch nur wenig „stärker“ als HCl . Die Ausdehnung der Valenz der verteilten Elektronen wird durch eine größere Anzahl von Elektronen im Kern vergrößert (Abstoßung der Elektronen). Der Stärke der Säuren ist ihre Stabilität proportional sein; jedoch ist HClO_4 mit der größeren positiven Ladung im Zentralatom weniger stabil als H_2SO_4 mit der kleineren Ladung. Gegen intramolekulare Ionisation als Ursache der Reaktionsfähigkeit werden Beispiele aus der Fettsäurereihe u. Säureamide angeführt. Stearylamid (nach dem Umkristallisieren aus Lg. u. Ä. ergab sich der F. $0,5-1^\circ$ höher als beim Kahlbaumverfahren) gibt mit Phenylhydrazin kein Phenylhydrazon, wie nach LOWRY (Aktivität der CO-Gruppe in einem nichtionisierenden Lösungsm.) zu erwarten wäre, sondern unter Austritt des nichtpolar gebundenen NH_2 das Phenylhydrazid. In der Folge erfolgte trotz Erhitzung keine Rk. In den Säuren u. Amiden ist demnach die CO-Gruppe in Lg.-Lsg., wenn überhaupt, nur kurze Zeit vorhanden. (Chemistry Ind. 44. 72—73.) ZANDER.

G. Bruhns, „Glykose“ oder „Glucose“. Es empfiehlt sich, die Bezeichnung „Glucose“ streng auf den Traubenzucker u. seine Abkömmlinge zu beschränken u. die Abkömmlinge der Zucker im allgemeinen als Glykoside zu bezeichnen. Für

den Zuckertechniker ist es am zweckmäßigsten, die alten Namen „Dextrose“ „Lävulose“, die kein Mißverständnis zulassen, beizubehalten. (Zentralblatt Zuckerind. **32**. 1431. 1924.)

RÜHLE.

Victor Syniewski, *Über die Oxydation des Amylodextrins*. Um Hydrolyse der Stärke zu vermeiden, wurde wie folgt verfahren: Ein ca. 5%ig. Kartoffelstärkekleister wurde im Autoklaven 12 Stdn. auf 125—138° erhitzt, die Lsg. des Amylodextrins filtriert, mit BaCO_3 versetzt u. bei Zimmertemp. so lange (einige Tage u. Wochen) mit Br behandelt, bis J keine Färbung mehr hervorrief. Nach Entfernen von Br u. BaCO_3 wurde mit H_2SO_4 angesäuert u. das Filtrat in A. gegossen. Das Prod. wurde durch mehrfaches Umfällen, dann fraktioniertes Füllen aus W. + gereinigt, wobei sich ergab, daß alle Fraktionen unter sich u. mit dem Rohprodukt ident. waren. Die neue Substanz ist ein weißes, leichtes, beim Reiben elektrisch werdendes Pulver, sl. in W., von stark saurer Rk. $[\alpha]_D^{20} = 191,12^\circ$. Reduzierend. FEHLINGSche Lsg. (in 1%ig. Lsg. = 23,24% Maltose) u. alkal. Ag-Lsg. gibt mit α -Naphthol die Molischsche Rk. (carmoisinrot), mit NH_2OH , HCl u. überschüssiger KOH Rosafärbung, mit FeCl_3 Rottfärbung. Die gelbe Lsg. in NaOH wird beim Neutralisieren farblos. Analysenwerte: 42,71% C, 5,32% H. Gibt mit Phenylhydrazin eine amorphe zinnoberrote Verb., F. 153° (rasch erhitzt), sl. in W., wl. in A., Anilin, unl. in Bzl., Chlf. (mit 49,35% C, 5,91% H, 5,02% N). Trotz des Red.-Vermögens der Substanz handelt es sich nicht um eine Aldehyd- oder Keto-, sondern um eine reine Säure. Quantitative Oxydationsverss. mit NaOH, welches Reagens einen Aldehyd zweifellos weiter oxydieren würde, ergaben, daß bei einem Verbrauch von 48 Atomen Br auf 1 Mol. Amylodextrin, $\text{C}_{216}\text{H}_{372}\text{O}_{186}$, die Rk. beendet ist. Weiter folgt aus der Zus. der Ba-Salze (bas. u. neutral) u. eines bas. Pb-Salzes, daß die neue Säure, welche Vf. *Amylodextrinsäure* nennt, 12-basisch ist u. die Formel $\text{C}_{216}\text{H}_{348}\text{O}_{198} = \text{C}_{204}\text{H}_{336}\text{O}_{174}(\text{CO}_2\text{H})_{12}$ besitzt. Obige Phenylhydrazinverb. ist wahrscheinlich ein Hydrazid, $\text{C}_{288}\text{H}_{420}\text{O}_{186}\text{N}_{24}$.

Die vom Vf. früher (LIEBIGS Ann. **324**. 255 [1902]) aufgestellte Formel des Amylodextrins kann auch geschrieben werden: $[(\text{C}_{18})\{>(\text{C}_6)_3\}_4]$. Das Symbol in der eckigen Klammer ist ein Amylogenrest, (C_{12}) sind die mittels ihres freien CO an den Dextrinring (C_{18}) gebundenen Maltosereste, deren entständige Gruppe CH_2OH frei ist u. zu CO_2H oxydiert wird. Für die Amylodextrinsäure ergibt sich so

O

Formel: $[(\text{C}_{18})\{>(\text{C}_6)_3\}_4] - \text{O} - \text{CH}(\text{CH}_2\text{OH})_2 \cdot \text{CH} \cdot \text{CHOH} \cdot \text{CO}_2\text{H}\}_4$. Aus dem Glucosering der Maltose ist der Glucuronsäurerest geworden, was Vf. auch experimentell durch die Orcinprobe, die Naphthoresorcinrk. u. die quantitative Best. des durch Dehydratation mit HCl gebildeten Furfurols bewiesen hat. — Die Darst. der Amylodextrinsäure ist ein weiterer Beweis für die vom Vf. angenommene Konst. der Stärke, außerdem von physiolog. Interesse, da nun als Lieferant der Glucuronsäure im Tierkörper auch die Stärke sehr nahestehende Glykogen in Betracht kommt. — Auch die B. von Furfurol bei der Dest. von Oxycellulose mit HCl ist nunmehr auf die aus den Glucoseresten der Cellulose entstandenen Glucuronsäurereste zurückzuführen, was hier wie bei der Amylodextrinsäure unter CO_2 -Verlust zunächst in Xylosereste übergehen dürften. So wird die Gewinnung von Furfurol aus „verholzter“ (wohl oxydierter) Cellulose u. von Xylose aus Holz verständlich. (LIEBIGS Ann. **441**. 285 bis 285.)


LINDENBAUM

Victor Syniewski, *Über nichtreduzierendes Grenz-dextrin I*. Die vom Vf. für die Stärke aufgestellte Formel (vgl. LIEBIGS Ann. **324**. 266 [1902]) ließ bei abschließlicher α -carbonylhydrolyt. Spaltung, d. h. Abspaltung aller Maltosereste, die Erhaltung sämtlicher β -Bindungen in dem zurückbleibenden Dextrin, die B. eines nichtreduzierenden Grenz-dextrins I voraussehen. Ein geeignetes Agens fand Vf.

at. Enzym ungemälzter Gerste. Läßt man einen mit k. W. hergestellten Gersteng, dem etwas CH_2O zugesetzt wird, auf eine Amylodextrinlsg. (vorst. Ref.) Zimmertemp. einwirken, so nimmt das Red.-Vermögen der Lsg. schnell zu; bei 6 g „Stärketrockensubstanz“ in 25 cem Mischung war in 48 Stdn. mit ca. 65% Red. (auf Amylodextrin) der Endpunkt im wesentlichen erreicht (bei größerer Menge viel früher). Man erreicht also nicht dieselbe „Maltosemenge“ wie bei der ähnlichen Verzuckerung, u. im Gegensatz zu dieser bleibt die Jodrk. fast rein gelblich. Zur Isolierung des neuen Prod. wird die Lsg. in wenig sd. W. einlaufen lassen u. kurz gekocht, um die Diastase zu vernichten, darauf in A. gegossen. Abscheiden sich Flocken aus (die Maltose kann aus der Mutterlauge gewonnen werden). Die weitere Reinigung erfolgt durch fraktionierte Fällung aus W. + A. Es resultiert eine Substanz, deren Analysen zwar zu der Formel $\text{C}_{72}\text{H}_{126}\text{O}_{63}$ passen, deren Mol.-Gew. sich jedoch aus der Gefrierpunktniedrigung der wss. Lsg. zu 6002 berechnet. $[\alpha]_D^{15} = 193,73^\circ$, klar l. in k. W. Eine konz. Lg. in sd. W. erstarrt beim Erkalten zu einem Kleister (Reversion). Färbung mit J rein blau. Kraft: $R = 1,04\%$ R_{Maltose} (zweifelloos zurückzuführen auf durch die h. Fehle'sche Lsg. entstandene freie CO-Gruppen). — *Acetylverb.* Mit sd. Acetanhydrid u. O_3 . Aus Eg. + W., dann Chlf. + Bzn., amorphes Pulver. Enthält 50,2% O (Mittelwert).

Da das neue Dextrin intakte β -Bindungen enthält, so müßte es noch zur Hydrolyse befähigt sein. Dies trifft in der Tat zu. Läßt man auf seine wss. Lsg. (+ wenig CH_2O) einen 5 Min. auf 76° erhitzten Malzauszug einwirken, so ist nach einer gewissen Zeit das Jodfärbungsvermögen verschwunden. Die Isolierung von *hydrodextrins* in diesem Stadium — bei weiterer Einw. wird das Dextrin völlig hydrolysiert — erfolgt wieder durch fraktionierte Fällung mit A. Eine besonders reine Substanz zeigte $[\alpha]_D^{20} = 187,97^\circ$ u. $R = 13,31\%$ R_{Maltose} . Sie ist im wesentlichen ident. mit dem früher (LIEBIGS Ann. 324. 233 [1902]) beschriebenen *reduzierten Grenzdextrin I*.

Für die Ableitung der Formel des nichtreduzierenden Grenzdextrins I ist zuerst hervorzuheben, daß die für das Amylodextrin ermittelte Formel (vorst. Ref.) $\text{C}_{72}\text{H}_{126}\text{O}_{63}$ Maltose erwarten läßt. Erwägt man, daß die der Berechnung zugrunde gelegte Weinsche Tabelle etwas zu niedrige Ergebnisse liefert, so kommt der wirkliche Befund dem theoret. recht nahe. Die aus der Abspaltung der 12 Maltosereste ergehende Substanz kann höchstens 72 C oder 12 Glucosereste enthalten. Da man ferner annehmen darf, daß eine s. gebaute Molekel dieser Art (l. c.) eine durch berechnbare Zahl von OH-Gruppen enthält, so läßt der gefundene Acetylgehalt der Substanz auf 48 OH schließen. Vf. gelangt somit schließlich zu der Formel $\text{C}_{216}\text{H}_{372}\text{O}_{186}$ für das primär gebildete Dextrin, entstanden nach der Gleichung:



Die analysierte Substanz ist bereits ein Reversionsprod., entsprechend dem Vorgang: $3\text{C}_{72}\text{H}_{132}\text{O}_{66} - 9\text{H}_2\text{O} = \text{C}_{216}\text{H}_{378}\text{O}_{189}$. Mit letzterer Formel stimmen die Ergebnisse der Analyse u. Mol.-Gew.-Best. (ber. 5994) gut überein. (LIEBIGS Ann. 324. 235—97. Lemberg, Techn. Hochschule.)


LINDENBAUM.

Fr. Dehnert und W. König, Über die Einwirkung starker anorganischer und organischer Basen auf Baumwollcellulose. I. Die nach den Angaben von VIEWEG (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 41. 3269 [1908] vgl. auch Ztschr. f. angew. Ch. 37. 1008; 1905. I. S. 642) durchgeführte Einw. von 0,5—12-n. NaOH auf mit Na_2CO_3 abgebleichte, mit A. u. Ä. extrahierte Baumwolle bestätigte die B. einer Verb. $(\text{C}_6\text{H}_5\text{O}_5)_2\text{NaOH}$ u. $(\text{C}_6\text{H}_{10}\text{O}_5)_2 \cdot 2\text{NaOH}$. Mit KOH derselben Konz. wurde die Bildung einer *Kalicellulose*, $(\text{C}_6\text{H}_{10}\text{O}_5)_2\text{KOH}$ nachgewiesen, mit LiOH entstand *Verb.* $(\text{C}_6\text{H}_5\text{O}_5)_2\text{LiOH}$. Bei der Darst. der Verbb. ist erforderlich, die Cellulose in losen Flocken, die Fasern nach der Stapellänge gerichtet, zu verwenden, damit die Ober-

fläche eine möglichst gleichmäßige wird. In einigen Fällen erhielten Vf. I. Ergebnisse, die darauf hindeuten, daß mehr NaOH u. KOH aufgenommen wird, als den vorher genannten Formeln entspricht (Tabellen im Original); besonders was das bei konz. Lauge der Fall, u. es ist möglich, daß zwischen der Alkaliaufnahme u. der Viscosität der Lauge Beziehungen bestehen; irgendeine Gesetzmäßigkeit läßt sich jedoch bisher nicht feststellen lassen. (Cellulosechemie 5. 107—12. Beil. Papierfabr. 22. 1924. Dresden, Techn. Hochsch.)

HABERLAND.

Peter Klason, *Beitrag zur Konstitution des Fichtenholzlignins*. IV. (III. Ber. Dtsch. Chem. Ges. 56. 300; C. 1923. I. 900.) DORÉE u. HALL (Journ. Sci. Chem. Ind. 43. T. 257; C. 1924. II. 1786) haben eine kolloidale *Ligninsulfonsäure* beschrieben, u. daraus ein β -Naphthylaminsalz erhalten, das Vf. neuerdings ebenfalls darstellen konnte; dieses Salz (I) enthält 4,4% S, während ein früher vom Vf. dargestelltes Salz (II) 5,6% S enthält. Wird die Ablauge, die I liefert, mit Su gekocht, so erhält man aus der neuen Lauge nach Zusatz von β -Naphthylamin. Bei fraktioniertem Fällen der Lauge, die I lieferte, mit β -Naphthylaminchlorhydrat wird in der letzten Fällung ein β -Naphthylaminsalz mit 5,33% S erhalten; es muß demnach I ein Gemisch zweier Verbb. sein, von denen die mit höherem S-Gehalt der Zus. $C_{20}H_{20}O_6 + H_2SO_3 + C_{10}H_7NH_2 - H_2O$ entspricht; dieser Zus. nach muß die Ligninsulfonsäure einbas. sein; die früher ausgeführten Unterss. des Vfs. (v. Ber. Dtsch. Chem. Ges. 55. 448; C. 1922. I. 1077) ergeben jedoch, daß die Säure zweibas. sein muß, u. daß die Formel für α -Lignin, $C_{20}H_{20}O_6$, verdoppelt werden muß zu $2C_{20}H_{20}O_6$; da das β -Naphthylaminsalz der α -Lignoximsulfonsäure der Zus. $2C_{20}H_{20}O_6 + 2H_2SO_3 + NH_2OH - H_2O + 2C_{10}H_7NH_2$ entspricht (analog der Zus. hat das entsprechende Semicarbazon), ergibt sich hieraus, daß nur eine Hälfte des Mol. u. zwar die die Acroleingruppe enthaltende in Rk. tritt, die andere Hälfte enthält wahrscheinlich die $CH:CH \cdot CH_2OH$ -Gruppe, u. α -Lignin ist eine Kombination von 3 Mol. Coniferylaldehyd + 1 Mol. Coniferylalkohol. Die zweibas. Sulfonsäure hätte demgemäß die Zus. $(2C_{20}H_{20}O_6) + 2H_2SO_3$, die einbas. Säure die Zus. $(2C_{20}H_{20}O_6) + H_2SO_3$. Ein dieser letzteren Sulfonsäure entsprechendes β -Naphthylaminsalz (3,8% S gefunden, theoret. Wert 3,5%) wurde aus einer bei 100° bereiteten Sulfitlauge erhalten. Die von DORÉE u. HALL (l. c.) beschriebene Sulfonsäure, sowie die dem Salz I entsprechende Säure kann angesehen werden als Gemisch von 2 Mol. der einbas. + 1 Mol. der zweibas. Sulfonsäure, entsprechend der Zus. $3C_{20}H_{20}O_6 + 2H_2SO_3$. Da die Sulfonsäure von DORÉE u. HALL bei Red. mit $Zn + HCl$ 7% H_2S lieferte, u. diese Rk. für an Aldehyde u. Ketone gebundene H_2SO_3 charakterist. ist, ist sie ein weiterer Beweis für das Vorliegen von $CH:CH$ oder CO-Cruppen. Der Umstand, daß das β -Naphthylaminsalz der α -Ligninsulfonsäure, dem Vf. früher Konst. A) gegeben hat, bei Behandlung mit überschüssigem Alkali nicht alles β -Naphthylamin abgibt, deutet darauf hin, daß der Zerfall nach unten stehendem Schema in B), C) u. D) erfolgt; wird nach Entfernung von D) neut mit β -Naphthylaminchlorhydrat versetzt, so entsteht nicht A) sondern aus dem das Deriv. E). Die Isolierung von C) ist Vf. gelungen, indem die nach Behandlung



von A) mit Alkali erhaltene Lsg. mit einer HCl passender Konz. versetzt wurde die Ansicht von HITTIKA, daß das α -Naphthylaminsalz der Ligninsulfonsäure sich gegen Alkali ähnlich verhält wie das β -Salz, kann Vf. nicht bestätigen. Das chem. Verh. deutet daraufhin, daß das α -Salz kein inneres Salz (entsprechend A) enthält. — Die von verschiedenen Autoren vertretene Ansicht, daß Lignin eine Kombination

s Kohlenhydrats u. eines hydroaromat. Körpers ist, weil Salzsäurelignin beim Erhitzen mit w. verd. Säure ein Kohlenhydrat abspaltet, teilt Vf. nicht. Ein Analogon zu diesem Verh. bietet Coniferin, das, wie Vf. früher gezeigt hat (vgl. Mitt.), beim Erwärmen mit verd. Säure einen ligninartigen polymeren Coniferylalcohol mit 10% Zuckergehalt liefert. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58. 375—80.) HAB. **N. D. Costeanu**, *Untersuchung über die Wirkung von Jod auf Benzol*. Bei Erhitzen von J mit Benzol im geschlossenen Rohr auf 600° wurde eine schwarze Substanz erhalten, unschmelzbar, unl. in Ä., Aceton, Bzl., Toluol, Anilin, Nitrobenzol, Essigsäure, durch Mineralsäuren nicht angreifbar. Nach der Elementaranalyse wird für sie die Formel $C_{96}H_{23}J$ errechnet. (Bulet. Soc. de Chimie din România 6. 91—94. Cernautzi, Univ.) SPIEGEL.

Emil Fromm und **Heinrich Jörg**, *Abkömmlinge des Monothioäthylenglykols*. Monothioäthylenglykol wurde aus dem nach BENNETT (Journ. Chem. Soc. London 1918; C. 1921. III. 306) hergestellten β, β' -Dioxydiäthylendisulfid in A. mit Zn-Staub H_2SO_4 bei ca. 40° erhalten, auch durch Na u. A., Kp_{18} 61°. — *Dibenzoyloxymercaptan*, $C_{16}H_{14}O_3S$, Nadeln (aus A.), F. 39°. — Bei dem Vers., aus dem Mercaptan mit Carbonylverb. in üblicher Weise, mit HCl als Kondensationsmittel, haben DELÉPINE u. ESCHENBRENNER (Bull. Soc. Chim. de France [4] 33. C. 1923. III. 824) mit Aceton aus dem zunächst gebildeten Dioxymercaptol auch das Dichlormercaptol erhalten. Vf. verwendeten deshalb zur Kondensation wässertes Na_2SO_4 u. erhielten so aus Benzaldehyd dessen Dioxymäthylmercaptan, $CH_3CH(S \cdot CH_2 \cdot CH_2 \cdot OH)_2$. Mit Benzylchlorid bildet das Thioglykol β -Oxyäthylbenzylsulfid, $C_6H_5 \cdot CH_2 \cdot S \cdot CH_2 \cdot CH_2 \cdot OH$, das auch aus Benzylmercaptid u. Äthylenoxydhydrin oder aus Benzylmercaptan u. Äthylenoxyd gewonnen werden kann. Zum Schutz der OH-Gruppe durch Benzoylierung konnte durch Oxydation daraus β -Benzoyloxäthyl- α -benzylsulfon erhalten werden, das bei Verseifung mit Natriumhydroxyd den Äthyläther des β -Oxyäthyl- α -benzylsulfons, mit wss. Alkali dieses Äthers selbst lieferte. — β, β' -Dioxydiäthylendisulfid (vgl. BENNETT, l. c.) gibt ein leicht krystallisierendes Dibenzolat; in dem bei Kochen mit konz. HCl daraus erhaltene β, β' -Dichlordiäthylendisulfid lassen sich die Cl-Atome sowohl durch Mercaptan als durch S ersetzen. So liefert es mit Benzylmercaptan das β, β' -Bisbenzylmercaptodiäthylendisulfid, $[S \cdot CH_2 \cdot CH_2 \cdot S \cdot CH_2 \cdot C_6H_5]_2$, mit Na_2S das cycl. Diäthylen-trisulfid-1,2,5 (Formel nebenstehend), das auch aus Dichlordiäthylsulfid u. Na_2S_2 entsteht; dieses läßt sich zum Triäthiodiglykol, $HS \cdot CH_2 \cdot CH_2 \cdot S \cdot CH_2 \cdot CH_2 \cdot SH$, reduzieren, das mit Benzylchlorid in β, β' -Bisbenzylmercaptodiäthylsulfid, auch aus β, β' -Dichlordiäthylsulfid u. Benzylmercaptid entstehend, übergeht. Oxydation führt dann zu β, β' -Dibenzoyloxäthylsulfon, $SO_2(CH_2 \cdot CH_2 \cdot SO_2 \cdot CH_2 \cdot C_6H_5)_2$, ident. mit dem von FROMM u. UGAR (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 56. 2286; C. 1924. I. 197) aus β, β' -Bisbenzylmercaptodiäthylsulfon erhaltenen. Wie die Regel von STUFFER (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 26. 1125) erwarten läßt, wird dieses Trisulfon durch Alkalien an 2 Stellen gespalten nach der Gleichung:

$$C_6H_5 \cdot CH_2 \cdot SO_2 \cdot CH_2 \cdot CH_2 \cdot SO_2 \cdot CH_2 \cdot CH_2 \cdot SO_2 \cdot CH_2 \cdot C_6H_5 + 2NaOH =$$

$$C_6H_5 \cdot CH_2 \cdot SO_2Na + HO \cdot CH_2 \cdot CH_2 \cdot SO_2Na + HO \cdot CH_2 \cdot CH_2 \cdot SO_2 \cdot CH_2 \cdot C_6H_5.$$

 D zum Nachweis der Spaltprodd. in der alkal. Lsg. weiter mit $C_6H_5 \cdot CH_2Cl$ erhitzt wurde, wobei die β -Oxyäthylsulfinsäure in β -Oxyäthyl- α -benzylsulfon übergeht, wurde nur dieses, u. zwar in Gestalt seiner Benzoylverb., neben dem dabei aus β -Benzylsulfinsäure entstehenden Dibenzylsulfon isoliert. — Dest. des Dithioglykols mit wasserentziehenden Mitteln liefert unter teilweiser Verkohlungs Diäthylendisulfid, $S \cdot CH_2 \cdot CH_2 \cdot S$.

Benzaldehyd- β -dioxymäthylmercaptan, $C_{11}H_{16}O_3S_2$, Krystalle (aus A.), F. 58°. — VII. 1. 98

β -Oxyäthyl- α -benzylsulfid, $C_9H_{12}OS$, Öl, Kp.₁₈ 169°. — β -Benzoyloxyäthyl- α -benzylsulfon, $C_{16}H_{16}O_4S$, Nadelchen (aus A.), F. 114°. — β -Äthoxyäthyl- α -benzylsulfon, $C_{11}H_{16}O_3S$, Pyramiden (aus A.), F. 53°. — β -Oxyäthyl- α -benzylsulfon, $C_9H_{12}O_3S$, Nadeln (aus W.), F. 97°. — β, β' -Dibenzoyloxyäthyl-disulfid, $C_{18}H_{18}O_4S_2$, Öl, des nicht unzers. — β, β' -Bisbenzylmercaptodiäthyl-disulfid, $C_{18}H_{22}S_4$, Krystalle (aus Chlf.), F. 70°. — Diäthylentrisulfid-1,2,5, $C_4H_8S_3$, Krystalle (aus Nitrobenzol), F. 7 bis 75°. — Bisbenzylmercaptoäthylsulfid, $C_{18}H_{22}S_3$, Krystalle (aus Ä. + A. oder PAe.), F. 53°. — β, β' -Dibenzylsulfonyldiäthylsulfon, $C_{18}H_{22}O_6S_3$, Blättchen, F. 300 unl. in den üblichen Lösungsm. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. **58**. 304—9. Wiesbaden, Univ.) SPIEGEL.

Eug. Bamberger, Die Einwirkung von Halogenwasserstoffsäuren (auch Schwefelsäure) auf Arylhydroxylamine. Enthält die experimentellen Belege zu den früheren (LIEBIGS Ann. **424**. 297; C. **1922**. I. 20) mitgeteilten allgemeinen Ergebnisse. Untersucht wurden: Phenylhydroxylamin, o- u. p-Tolylhydroxylamin, 1,3,4- u. 1,4, Xylhydroxylamin, p-Chlor- u. p-Bromphenylhydroxylamin. Betreffs der Ausführung der Verss. muß auf das Original verwiesen werden. Hier seien nur einige neue Verb. sowie Berichtigungen wiedergegeben. — N-Acetylchlorotoluidin, $C_6H_3(CH_3)(NHCOCH_3)^2(Cl)^3$, Aus W., F. 165—165,5°. — N-Acetylchlorotoluidin, $C_6H_3(CH_3)(NHCOCH_3)^2(Cl)^4$, Aus W. oder Lg., F. 139—139,5° (nicht 130—131° nach GOLDSCHMIDT u. HÖNIG, Ber. Dtsch. Chem. Ges. **19**. 2441 [1886]). Wurde zur Sicherheit vom $C_6H_3(CH_3)^1(NO_2)^2(NH_2)^4$ aus synthetisiert, außerdem über die Säure $C_6H_3(CO_2H)^1(NHCOCH_3)^2(Cl)^4$ (Nadeln aus A., F. 216—216,5°) zum m-Chloranilin abgebaut. — Chlorxylidin, $C_6H_2(CH_3)_2(NH_2)^4(Cl)^5$, Nadeln, F. 40—41°, mit Dampf flüchtig. — 4,4'-Dibrom-1-azoxybenzol, $C_{12}H_8ON_2Br_2$, Hellgelbe Nadeln aus Lg., F. 168,5 bis 169,5° (nicht 175 oder 172°, wie in der Literatur angegeben). — Bromaminophenol, $C_6H_3(NH_2)^1(OH)^2(Br)^4(?)$, Nadeln aus SO_2 -haltigem W., F. 143,5—144°, l. in SO_2 mit brauner Farbe. Mit $FeCl_3$ Violettfärbung, kein Chinongeruch. — Acetylverbenzylamin, $C_{11}H_{13}NO$, F. 191—192°. (LIEBIGS Ann. **441**. 297—318. Zürich, Polytechnikum.) LINDENBAUM.

George Philip Gibson, Nitroderivate von o-Kresol. Da die Angaben für die F. von 5-Nitro-o-kresol (I) in der Literatur zwischen 79 u. 95° schwanken, unternahm Vf. eine nähere Unters. dieser Reihe u. stellte bei dieser Gelegenheit auch weitere Derivv. des o-Kresols dar. I bildet ein Monohydrat (F. 30—40°), das zur Trennung von anderen Nitrokresolen geeignet war, besonders von 3,5-Dinitro-o-kresol. Wasserfrei existiert es in einer unbeständigen gelben Form, die in Ggw. v. Wasser in Lösungsm. in eine stabilere weiße Form übergeht. Nur bei I sind die Ausbeuten bei der Darst. auf den gewöhnlichen Wegen einigermaßen zufriedenstellend, hingegen nicht bei 3-Nitro- (II) u. 3,5-Dinitro-o-kresol (III). Es wurden Umsetzungen mit Benzoylchlorid, Toluol-p-sulfonylchlorid, Dimethylsulfat, Toluol-p-sulfonsäuremethyl- u. äthylester durchgeführt, deren Ergebnis jeweils von der Natur der reagierenden Komponenten abhängig war.

Versuchsteil: Zur Darst. von I u. II wird eine Mischung von o-Kresol u. Eg. zu einem —15° kalten Gemisch von HNO_3 (1,42) u. Eg. innerhalb 2 Stdn. zugegeben. Nach 2 Stdn. (Kältemischung) Krystalle trennen u. Wasserdampfdest.: (35%) geht mit einem kleinen Anteil III über, während I zurückbleibt u. erstarrt. Das Destillat wird fraktioniert getrennt: Reines 3-Nitro-o-kresol (II) hat den Kp. 102—103° u. den F. 70°. Der Rückstand der Wasserdampfdest. wird von wenig III befreit. Wasserfreies 5-Nitro-o-kresol (I) kristallisiert in gelben Nadeln aus Bzl., deren Befreiung vom Lösungsm. große Schwierigkeiten bereitet. Die beiden rasch ineinander gehenden Formen schm. bei 96°, doch ist der F. der unveränderten Nadeln zuweilen bei 75°. Das Monohydrat aus Aceton schm. bei 30—40°. — I wird mit entsprechenden Mengen HNO_3 u. Eg. durch 24-std. Stehen gewonnen wie üblich getrennt. Die reine Verb. ist ein dunkelbraunes Öl. Von allen 3 Verh.

Walter Hückel und Erich Goth, Über die Umlagerung stereoisomerer Säuren
 ihrer Ester. ASCHAN (LIEBIGS Ann. **387**, 16 [1912]) hat festgestellt, daß nur
 hydroaromat. Säuren einer cis-trans Umwandlung fähig sind, die mindestens
 ein Carboxyl an einem sek. Ring-C-Atom enthalten. Die vorliegende Unters.
 zeigt, daß nicht nur die freien Säuren, sondern auch deren Ester dieselbe Um-
 lagerung erleiden können; das K-Salz des *cis-Hexahydrophthalsäureesters* gibt bei
 Zers. durch Säuren den Ester der *trans-Säure*; cis-Ester mit überschüssigem
 K_2CO_3 verseift, liefert *trans-Säure*; derselbe Ester lagert sich beim Erwärmen
 zu wenig $\text{C}_6\text{H}_5\text{ONa}$ quantitativ in den *trans-Ester* um. — Mit der Forderung von
 ASCHAN bzgl. der Konst. der umlagerungsfähigen Säuren steht eine Angabe von

EISENLOHR u. POLENSKE (Ber. Dtsch. Chem. Ges. **57**. 1639; C. **1924**. II. 2399) Widerspruch, wonach *cis-Cyclohexan-1-essig-2-propionsäure* sich beim Erhitzen konz. HCl im Rohr in die entsprechende *trans*-Säure umlagern sollte. Vf. hat daraufhin die *trans*-Säure dargestellt, die denselben F. hatte, wie die *cis*-Säure v. EISENLOHR u. POLENSKE (F. 116°), während eine von HÜCKEL (Nachr. K. G. Wiss. Göttingen **1923**. 43; C. **1923**. III. 766) dargestellte *cis*-Säure F. 109° h. Die nach dem Eisenlohrschen Verf. dargestellte Säure muß demnach schon *trans*-Säure gewesen sein. Durch Erhitzen der Säure F. 116° mit konz. HCl konnte Vf. die von EISENLOHR u. POLENSKE erwähnte Säure mit F. 145° nicht erhalten; die Säure wurde bei dieser Behandlung nicht verändert.

Versuche. *Monokaliumsalz des cis-Hexahydrophthalsäurediäthylesters*, Danach der von SCHEIBLER u. VOSS (Ber. Dtsch. Chem. Ges. **53**. 388; C. **1920**. 853) für Essigester gegebenen Vorschrift; gelbes Pulver; hieraus durch Zers. mit H_2SO_4 erhaltener Ester liefert bei Verseifung *trans-Hexahydrophthalsäure*, F. 216° bis 216°, Anhydrid F. 140°; dieselbe Säure wurde aus 2 g *cis*-Ester + 2 g Na in 28 ccm A. bei $3\frac{1}{2}$ -std. Kochen auf dem Wasserbad erhalten. — *trans-Hexahydrophthalsäurediäthylester*, durch $\frac{1}{2}$ -std. Erwärmen (Wasserbad) von 15 g *cis*-Ester in 0,15 g Na in 2 ccm A.; $D_{20}^{13.1} 1,0471$, $n_D^{18.8} = 1,45219$. — *Enolform des trans-β-Dekalon-β'-carbonesters*, $C_{13}H_{20}O_3$, aus einem 70% β-Dekalon enthaltenden *trans*-Dekalon wurde (vgl. HÜCKEL, S. 956) β-Dekalonoxalester dargestellt, der durch Abspaltung von CO (bei 180°) die genannte Verb. gab; Kp.₃₀ 183°, aus PAe. rechteckige Tafeln, F. 46—47°, mit $FeCl_3$ intensive Blaufärbung gebend, daher v.

$C_6H_{10} \begin{cases} CH_2 \cdot C \cdot COOC_2H_5 \\ CH_2 \cdot \overset{\parallel}{C} \cdot OH \end{cases}$ mutlich nebenst. Konst. — *trans-Cyclohexan-1-essig-2-propionsäure*, $C_{11}H_{18}O_4$, aus voriger in Cyclohexanol durch Na-Cyclohexanolat; aus W. F. 115—116°; *Dianhydrid*, $C_{22}H_{28}O_2N_2$, aus CH_3OH F. 210°. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. **58**. 447—50. Götting Univ.)

HABERLAND

K. Ziegler, *Anomale Verätherung in der Triphenylallylreihe*. (V. Mitt. über mehrfach arylsubstituierte Vinylcarbinole und ihre Derivate.) (IV. vgl. ZIEGLER u. GRABBE u. ULRICH, S. 378.) Vf. hat früher mit OCHS (Ber. Dtsch. Chem. Ges. **2262**; C. **1922**. III. 1130) vermutet, daß der Nachweis der Existenzfähigkeit von Diphenylstyrylmethyl durch die Neigung mancher Propylenderivv. zur Verlagerung der Doppelbindung erschwert werden könnte. Eine entsprechende anomale Substitution in der Triphenylallylreihe wurde bei Verätherung des rohen *Diphenylstyrylcarbinols* (I.) mit $CH_3 \cdot OH$ u. HCl festgestellt; der erhaltene *Methyläther* vom F. 97—98 zeigte sich ident. mit der von K. H. MEYER u. SCHUSTER (Ber. Dtsch. Chem. Ges. **55**. 815; C. **1922**. I. 1142) als dieses Carbinol selbst angesprochenen Substanz, fer



aber mit dem *Methyläther* aus 1,3,3-Triphenylallylalkohol-(1) (II., vgl. IV. Mitt.) aus einem dieser Alkohole muß also die Verätherung unter Verschiebung der Doppelbindung verlaufen sein. Das aus dem Methyläther durch HCl entstehende Chlorid entspricht sicher der Formel II. Reines Diphenylstyrylcarbinol haben demnach MEYER u. SCHUSTER ebensowenig in Händen gehabt wie Vf. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. **58**. 359—61. Marburg, Univ.) SPIEGEL

J. Cryer, *Die Reaktion der Anhydride aromatischer einbasischer Säuren mit Benzol und Aluminiumchlorid*. Wie nach RUBIDGE u. QUA (Journ. Americ. Chem. Soc. **36**. 732; C. **1914**. I. 1949) aus Benzoesäureanhydrid mit Bzl. u. $AlCl_3$ Benzophenon, so könnten aus den Brombenzoesäureanhydriden *Benzophenon*, *Brombenzophenon* oder auch beide entstehen. Die Verss. mit den Anhydriden der *o*-Brombenzoesäuren gaben stets beide Prodd. — Bei Herst. des *Benzophenons*

zoesäure in dieser Rk. wird die Ausbeute durch Zusatz von Essigsäureanhydrid beeinträchtigt, Triphenylcarbinol entsteht dabei nicht. (Proc. Trans. Roy. Canada [3] 18. Sekt. III. 119—20. 1924.) SPIEGEL.


Alvin S. Wheeler und **Haywood M. Taylor**, *p-Cymol-Studien*. V. Die Bromierung von 2-Amino-*p*-cymol und einige neue Azofarbstoffe. 2 Mitt. (IV. vgl. WHEELER u. GILES, Journ. Americ. Chem. Soc. 44. 2605; C. 1923. I. 1366. — 1. Mitt. vgl. WHEELER u. SMITHEY, Journ. Americ. Chem. Soc. 43. 2611; C. 1922. 1356 vgl. auch S. 380). Das durch Bromieren von 2-Acetyl-amino-*p*-cymol u. Abstreifen des Acetylrestes erhaltene Prod. ist, wie sich jetzt herausgestellt hat, als 2-Amino-5-brom-*p*-cymol (I) aufzufassen (vgl. dagegen 1. Mitt. l. c.). Der Konstitutionsbeweis ergibt sich aus folgenden Tatsachen: Oxydation der Bromaminoverb. (bezw. seines Acetylderiv.) mit neutralem KMnO_4 führte zu der von FILETI u. CROSSA (Gazz. chim. Ital. [1] 21. 33 [1891]) beschriebenen 2-Amino-5-brom-4-*i*-propylbenzoesäure; durch Diazotieren erhielten Vff. aus letzterer 2,5-Dibrom-4-*i*-propylbenzoesäure. Ferner ergab das erhaltene Aminobromcymol in 2,5-Dibromcymol u. dieses wieder in 2,5-Dibromterephthalsäure übergeführt werden. Die von WHEELER u. SMITHEY (l. c.) beschriebene Bromaminotoluylsäure (F. 151°) hat sich, nachdem diese Verb. wieder aus A. umkrystallisiert wurde, u. den richtigen F. 166—167° gab, als ident. mit 2-Amino-5-brom-4-*i*-propylbenzoesäure erwiesen. — Durch Diazotieren von I u. Kuppeln mit Phenolen u. Naphtholsulfonsäuren konnte ein Anzahl neuer Azofarbstoffe dargestellt werden.

Versuche. 2-Acetyl-amino-5-brom-*p*-cymol, $\text{C}_{12}\text{H}_{16}\text{ONBr}$, Darst. wie in der 1. Mitt. angegeben (dort als 3-Bromderiv. bezeichnet); aus A. Nadeln, F. 122,5°. — Chlorhydrat des 2-Amino-5-brom-*p*-cymols, $\text{C}_{10}\text{H}_{14}\text{NBr}$, HCl, aus A. hexagonale Tafeln, F. 105° (Zers.); Bromhydrat, $\text{C}_{10}\text{H}_{14}\text{NBr}$, HBr, aus A. achteckige Tafeln, F. 200° (Zers.). — 2-Amino-5-brom-*p*-cymol, $\text{C}_{10}\text{H}_{14}\text{NBr}$ (I) farbloses, bald gelb u. schließlich verharrendes Öl, Kp.₂₀ 167—170°. — 2-Acetyl-amino-5-brom-*p*-cuminsäure, $\text{C}_{12}\text{H}_{14}\text{O}_3\text{NBr}$, u. dem Acetylderiv. von I durch Oxydation mit KMnO_4 in Ggw. von MgSO_4 bei 100° aus A. Nadeln, F. 217° (korr.). — Chlorhydrat der 2-Amino-5-brom-*p*-cuminsäure, $\text{C}_{12}\text{H}_{13}\text{O}_3\text{NClBr}$, aus voriger durch Kochen mit konz. HCl; aus A.-HCl-Gemisch bei 100° F. 191—192° (korr.) unter Zers. — 2-Amino-5-brom-*p*-cuminsäure, $\text{C}_{10}\text{H}_{12}\text{O}_2\text{NBr}$, nach 2maligem Umkrystallisieren aus A. F. 166—167°. — 2,5-Dibromcuminsäure, $\text{C}_{10}\text{H}_{10}\text{O}_2\text{Br}_2$, aus A. F. 149°. — 2,5-Dibrom-*p*-cymol, mit Wasserdampf flüchtiges Öl, Kp. 272°. Hieraus durch Oxydation mit HNO_3 (D. 1,12; 8 Stdn. bei 180°) 2,5-Dibromterephthalsäure, $\text{C}_8\text{H}_4\text{O}_4\text{Br}_2$, F. 314—315°; Diäthylester, F. 124,5°.


Folgende Azofarbstoffe wurden durch Diazotieren von I u. Kuppeln in alkal. Lösung dargestellt: 1. 2,4-(5-Bromcarvacryldisazo)-phenol, $\text{C}_{28}\text{H}_{28}\text{ON}_4\text{Br}_2$, durch Kuppeln von Phenol; aus h. Essigsäure braune Krystalle, F. 212° (korr.), färbt Wolle u. Seide gelb; mit k. konz. H_2SO_4 rosenviolett, in der Hitze rotbraun; mit verd. Säure dunkelgelb. — 2. 4-(5-Bromcarvacrylazo)-resorcin, $\text{C}_{16}\text{H}_{17}\text{O}_2\text{N}_2\text{Br}_2$, aus h. Lg. claretbraune Krystalle, F. 202° (korr.); Wolle wird primulingelb, Seide goldgelb gefärbt; mit k. konz. H_2SO_4 rotviolett, in der Hitze dunkelrot; mit verd. H_2SO_4 keine Färbung. — 3. 2,6-(5-Bromcarvacryldisazo)-thymol, $\text{C}_{30}\text{H}_{30}\text{ON}_4\text{Br}_2$, aus h. Lg. vanillabraune Krystalle, F. 249° (korr.), färbt Wolle kadmiumgelb, Seide braungelb; mit k. konz. H_2SO_4 cherryrot, in der Hitze rotbraun; mit verd. Säure bernsteingelb. — 4. 2,4-(5-Bromcarvacryldisazo)-1-naphthol, $\text{C}_{30}\text{H}_{30}\text{ON}_4\text{Br}_2$, aus h. Lg. bronzefarbene Krystalle, F. 228° (korr.); färbt Wolle rosa, Seide goldrot; mit k. konz. H_2SO_4 dunkelblau, in der Hitze dunkelstrohgelb; mit verd. H_2SO_4 farblos. — 5. 1-(5-Bromcarvacrylazo)-2-naphthol, $\text{C}_{20}\text{H}_{19}\text{ON}_2\text{Br}$, aus h. Aceton rosarote Krystalle, F. 168 bis 170° (korr.); Wolle wird fleischfarben, Seide blaßrot gefärbt; mit konz. H_2SO_4 cherryrot, in der Hitze dunkelbraun, mit verd. H_2SO_4 orange. — 6. 4-(5-Bromcarvacrylazo)-1-naphthol-2-sulfonsäure, $\text{C}_{20}\text{H}_{19}\text{O}_4\text{N}_2\text{BrS}$, aus h. A. granatroter Krystalle,

te wss. Schicht aus einer angesäuerten KJ-Lsg. Jod frei, H_2O_2 ließ sich mittels Anisulfat jedoch nicht nachweisen. — Benzoessäurephenylester, in Ä.-Bzl.-Gemisch, reagiert auch langsam mit 2 Atomen Na; es entsteht eine tief rotbraune Lsg. ein Nd.; auf Zusatz von W. tritt sofort Entfärbung ein, als Reaktionsprodd. werden dieselben wie mit 1Na erhalten, ein Zeichen dafür, daß das Dinatriumstitutionsprod., falls es überhaupt gebildet wird, ebenso leicht $\text{C}_6\text{H}_5\text{ONa}$ abgibt. — W. von 4Na auf $1\text{C}_6\text{H}_5\text{COOC}_6\text{H}_5 + 2\text{C}_6\text{H}_5\text{Br}$ in Ä. führte zu einer grünlichen äth. Schicht u. einem tiefblauen Nd. (vgl. ACREE, Journ. Americ. Chem. Soc. 29. 601 [1903]); bei der Zers. durch W. fand sofortige Entfärbung statt, als Zersetzungsprodd. wurden isoliert *Phenol* u. *Triphenylcarbinol*. Die Rkk., die stattfinden, lassen sich wahrscheinlich durch obenstehendes Schema (IX—XIV) wiederlegen. Der tiefblaue Nd., der anfangs gebildet wird, ist wohl ein Gemisch von **XII**. — *Benzoessäuremethylester* reagiert ähnlich wie der Äthylester (vgl. ACREE, loc. cit.), die Rk. geht hier jedoch in Ä. nicht zu Ende. — *Benzoessäurebenzylester* in Ä. + 1Na bildet nach 12-std. Schütteln eine braune Lsg. u. einen Nd.; bei Zers. durch W. wurden isoliert *Benzoessäure*, *Benzylalkohol*, *Benzoessäurebenzylester* u. eine kleine Menge einer hochsd. Fl. — α -*Naphthoesäurephenylester* in Ä.-Bzl. + 1Na len im Laufe von 5 Tagen eine tiefrote Lsg., aus der durch Zers. mit W. isoliert wurden: α -*Naphthoesäure*, *Phenol*, Ester u. eine zähe M., die Fehlingsche Lsg. reduzierte u. mit alkoh. KOH tiefrot wurde, es scheint hiernach ein dem Benzoin analog substituiertes Naphthalinderiv. vorzuliegen. — *Hexahydrobenzoessäureäthylester* in Ä. Na reagieren schnell, es entstehen keine farbigen Verb., sondern ein weißer Niederschlag; auf Zusatz von W. wurden erhalten *Äthylalkohol* u. Ester. — *Hexahydrobenzoessäurephenylester*, dargestellt aus dem Säurechlorid u. $\text{C}_6\text{H}_5\text{ONa}$ in Ä., Kp.₁₅ 160°; reagiert mit Na in Ä. ebenfalls unter B. eines weißen Nd.; Zers. mit W. liefert *Phenol* u. ein farbloses süßschmeckendes Öl ohne bestimmten Kp. (Journ. Americ. Chem. Soc. 47. 229—39. Ann Arbor [Mich.], Univ.) HABERLAND.

R. A. Jacobson und Roger Adams, *Trioxymethylanthrachinone*. V. *Synthese Morindons*. (IV. vgl. S. 1075.) Die Synthese des *Morindons* u. zugleich der Nachweis, daß die Verb. *1,2,5-Trioxo-6-methylanthrachinon* (**V**) ist, gelang auf folgendem Wege: *Opiansäure* u. *p-Brom-o-kresol* wurden zu dem Phthalid **I** kondensiert, das mit $\text{Zn} + \text{NaOH}$ zu *5,6-Dimethoxy-2-(2'-oxy-3'-methylbenzyl)-benzoensäure* (**II**) reduziert wurde (vgl. I. c.). Durch Einw. von 85%ig. H_2SO_4 (mit konz. SO_4 trat kein Ringschluß ein) entstand hieraus das Anthron **III**, das sich leicht in *Morindondimethyläther* (**IV**) u. weiter in *Morindon* (**V**) überführen ließ. Die synthet. Verb., sowie ihre Derivv. sind mit dem natürlichen Prod. u. seinen Derivv.




ident. Da frühere Autoren Morindon eventuell auch als 1,2,8-Trioxy-7-methylanthrachinon (VIII) ansahen, wurden durch Kondensation von Hemipinsäure mit o-Kresol die Verbb. VI u. VII dargestellt u. aus letzterer VIII erhalten, die mit Morindon nicht ident. war.




Versuche. 1,2-Dimethoxy-5-oxy-6-methyl-9,10-dihydro-9-ketoanthracen (III) aus II (vgl. 4. Mitt., 1. c) durch Stehen mit 85%ig. H_2SO_4 ; nach Aufgießen auf Eis gelber Nd. — 1,2-Dimethoxy-5-oxy-6-methylanthrachinon, $\text{C}_{17}\text{H}_{14}\text{O}_5$ (IV), aus Toluol gelbe Nadeln, F. 138, bis 139° (korr.). — 1,2-Dimethoxy-5-acetoxy-6-methylanthrachinon, $\text{C}_{19}\text{H}_{16}\text{O}_6$, aus Eg. gelbe Nadeln, F. $185-185,5^\circ$ (korr.). — 1,2,5-Trioxy-6-methylanthrachinon (Morindon) $\text{C}_{15}\text{H}_{10}\text{O}_5$ (V), durch Kochen einer Eg.-Lsg. von IV mit HBr (D. 1,48); aus Toluol orangerote Nadeln, F. $281-282^\circ$ (korr.); Tribenzoat, F. $233-234^\circ$ (korr.), Triacetat, F. $255-256,5^\circ$ (korr.). — Mit J. H. Gardner: Kondensation von Hemipinanhidrid + o-Kresol in Ggw. von AlCl_3 (bei ca. 70°), Zers. des Reaktionsprod. mit HCl u. Behandlung des nach Dest. mit Wasserdampf erhaltenen Rückstandes mit sd. 10%ig. NaOH, dann Sättigen der alkal. Lsg. mit CO_2 gibt als Nd. 3,4-Dimethoxy-2,2-di(4'-oxy-3'-methylphenyl)-phthalid, $\text{C}_{24}\text{H}_{22}\text{O}_6$ (VI), aus Essigsäure gelbliche Nadeln, F. $238-239,5^\circ$ (korr.), Lsg. in Alkali intensiv blaurot, bei pH 8,7 umschlagend. Aus dem Filtrat durch Ansäuern: 3,4-Dimethoxy-2-(2'-oxy-3'-methylbenzoyl)-benzoesäure, $\text{C}_{17}\text{H}_{16}\text{O}_2$ (VII), aus CH_3OH weißes Pulver, F. $253-254^\circ$ (korr.). — 1,2,8-Trioxy-7-methylanthrachinon, $\text{C}_{15}\text{H}_{10}\text{O}_5$ (VIII), aus VII durch Erhitzen mit einem Gemisch von konz. H_2SO_4 + Borsäure auf 140° ; aus Essigsäure bräunlichgelbe Nadeln, F. $287-288^\circ$ (korr.); Lsg. in NaOH rot, schwach bläulich; in konz. H_2SO_4 bläulichrot; in A. gelb; in alkoh. NaOH rot; in alkoh. HCl grünlich-gelb. — 3,4-Dimethoxy-2-(4'-methoxy-3'-methylbenzoyl)-benzoesäure, $\text{C}_{18}\text{H}_{18}\text{O}_6$, aus Hemipinanhidrid + o-Kresolmethyläther in Ggw. von AlCl_3 bei 70° ; aus CH_3OH weißes Pulver, F. 223 , bis 224° (korr.). — 5,6-Dimethoxy-2-(4'-methoxy-3'-methylphenyl)-phthalid, $\text{C}_{18}\text{H}_{18}\text{O}_5$, aus Opiansäure + o-Kresolmethyläther mittels 73%ig. H_2SO_4 ; aus Aceton F. 119 , bis $119,5^\circ$ (korr.). — 5,6-Dimethoxy-2-(4'-methoxy-3'-methylbenzoyl)-benzoesäure, $\text{C}_{18}\text{H}_{18}\text{O}_6$, aus voriger in CH_3OH + NaOH nach Eindampfen erhaltener Rückstand wird mit 3%ig. KMnO_4 -Lsg. oxydiert; aus CH_3OH , danach aus Eg. F. $206-206,5^\circ$ (korr.) (Journ. Americ. Chem. Soc. 47. 283-90. Urbana [Ill.], Univ.) HABERLAND.

P. Wolff, Über halogenalkylierte aromatische Amine und einen neuartigen Pyrrolidin-Ringschluß. N-Äthyl-N-γ-brompropylanilin (I) geht bei der Dest. im Vakuum über in N-Phenyl-α-methylpyrrolidin (II):



N-Äthyl-N-γ-chlorpropylanilin (entsprechend I) aus 4 Mol. N-Äthylanilin (am besten techn., mit etwas Diäthylanilin verunreinigt) + 6 Mol. Trimethylenbromid durch 12-stdg. Erwärmen auf dem Wasserbad, durch Ausäthern von Trimethylenbromid befreites Bromid (I) wird durch mehrstd. Erwärmen mit konz. HCl in das Chlorid übergeführt; nach Alkalisieren u. Ausäthern wird im Vakuum fraktioniert. Bei 13 mm geht bis 110° Äthylanilin über; bis 155° Äthylchlorpropylanilin, bei nochmaligem Fraktionieren Kp_{13} $146-150^\circ$, gelbes, schwach riechendes Öl; Salze kristallisieren schlecht. Als drittes Reaktionsprod. wird bis Kp_{13} 230° isoliert: s. Diäthylpyrrolidin. — N-Phenyl-α-methylpyrrolidin, $\text{C}_{11}\text{H}_{15}\text{N}$ (II), wird erhalten, wenn das I entsprechende Cl-Deriv. zwecks Überführung in I mit HBr (10 Stdn.) erwärmt, das Reaktionsprod. alkal. gemacht, ausgeäthert u. dest. wird. Kp_{13} $126-128^\circ$; Jodmethylat, $\text{C}_{12}\text{H}_{18}\text{NJ}$, F. 159° (Zers.). (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58. 404-6. Berlin, Landwirtschaftl. Hochschule.) HABERLAND.

O. Magidson, Schließung des Fluorenringes in der Di- α -naphthylmethanreihe. Tschitschibabin u. Magidson, Journ. Russ. Phys.-Chem. Ges. **46**. 1389; 915. I. 1123.) Da bei kurzer Einw. von krystallisierter H_3PO_4 auf Di- α -naphthyl-*inol* [stets etwas von dessen Anhydrid nachgewiesen werden konnte, war annehmen, daß die wasserentziehende Wrkg. in erster Phase den entsprechenden *er* bildet, bei weiterer Wasserentziehung Tetra- α -naphthyläthylen (I), das sich in Di- α -naphthofluoren (II) umlagert.





Die Reaktionsgeschwindigkeiten der einzelnen Phasen des Vorganges sind ziemlich gleich groß, es entstehen ca. 65% reines II, 25% eines schwer rennenden Gemisches von I u. II u. 10% des fast reinen Äthylens. Letzteres ist in Eg. mit Zn bei Ggw. von HCl II, mit Phosphorsäure im Einschlußrohr Di- α -naphthylmethan u. Bis-di- α -naphthofluorenyl (Tetra- α -naphthylenäthan) (III):

$$(<C_{10}H_6>)_2CH_2 + (C_{10}H_7)_2C : C(C_{10}H_7)_2 = (<C_{10}H_6>)_2CH \cdot CH(C_{10}H_6>)_2 \text{ (III)} + (C_{10}H_7)_2CH_2.$$

Letzteres ist sehr beständig. III wurde auch durch Einw. von Cu-Pulver auf Di- α -naphthobromfluoren dargestellt, ferner durch Einw. von J auf Di- α -naphthoven-MgBr, das leicht aus Alkyl-MgBr u. Di- α -naphthofluoren (l. c.) erhältlich ist:




B. des Fluorenringes zeigt sich auch bei der Einw. von PCl_5 auf Di- α -naphthyl-*in*; statt des erwarteten Ketonchlorids entsteht unter Entw. von HCl in guter Ausbeute Di- α -naphthofluorenchlorid (IV):




IV ist durch die Beweglichkeit seiner Cl-Atome gekennzeichnet, die sich leicht in W. umsetzen. Durch sd. Amylalkohol (+ etwas H_2SO_4) erhält man Di- α -naphthofluoren: $(<C_{10}H_6>)_2 \cdot CCl_2 \longrightarrow (<C_{10}H_6>)_2 \cdot CO$.


Bei der Einw. von H_3PO_4 auf Benzhydrol u. Xanthydrol bilden sich aus 1 Mol. Hydrol 1 Mol. Keton (Xanthon) u. 1 Mol. Methan (Xanthen):



Beim Benzhydrol bilden sich außerdem kleine Mengen von Tetraphenyläthylen (V), dessen B. der von I entspricht. Letzteres zeigt nicht die Äthylenrk., was im Gegensatz zu V weder Cl noch Br aufnimmt. Ein weiterer Unterschied zeigt sich bei der Einw. von PCl_5 . V gibt mit diesem Benzophenonchlorid, das mit I in Benzophenon übergeht; I gibt mit PCl_5 Di- α -naphthochlorfluoren (Di- α -naphtylchlormethan), das auch aus Di- α -naphthofluorenol u. HCl dargestellt werden kann. Die Fluorenbildung verläuft hier nach dem Schema:




Die Dissoziation von I liegt für so schwere KW-stoffreste durchaus im Bereich der Möglichkeit. Die B. des Fluorenringes trat auch bei der Best. des Mol.-Gew. von I in Campher ein, wobei unter Red. des Camphers III entstand:




Durch Einw. von Cu auf die benzol. Lsg. von IV wurde der intensiv grüne Stoff Bis-di- α -naphthofluorenylen (Tetra- α -naphthylenäthylen) (VI) erhalten, das noch in Verdünnung 1 : 10000 starke Grünfärbung zeigt. Durch Red. von VI erhält III. VI addiert kein Br, gibt aber bei der Bromierung ein Dibromderiv. von ebenso intensiv grüner Farbe. — Bei der Einw. von Di- α -naphthofluorenyl-*in* auf Xanthon (um das entsprechende Äthylenderiv. zu erhalten) wurde III erhalten neben unverändertem Xanthon. Die B. von III ist offenbar durch die

Einw. des Luftsauerstoffs auf den als Zwischenprod. gebildeten tertiären Alkohol verursacht:




Versuche. Zur Unters. der Ausbeutebedingungen an **II** aus Di- α -naphthylcarbinol durch Einw. von krystallisierter H_3PO_4 wurden Mischungsverhältnisse der Komponenten, Temp. u. Dauer des Erhitzens variiert. Der Äther des Di- α -naphthylcarbinols (F. 246°) trat nur bei niedriger Temp. auf (20%) (Ausbeute in % Theorie); **II** (25–50%), F. 230°; Gemisch von **I** u. **II** (3–25%), durch vielfache Krystallisation aus Bzl. zu trennen; **I** (8–10% oder 0%), F. 322°. Längeres Erhitzen u. höhere Temp. veranlassen vollständige Umsetzung zu **II**; desgleichen kann die Rk. so geleitet werden, daß **I** als Hauptprod. entsteht. — Isomerisation von **I** zu **II** erfolgt: a) durch Zinkstaub in Eg. (+ wenig HCl); b) unter dem Einfluß der H_3PO_4 beim Erhitzen auf 240°; das Reaktionsprod. besteht hier jedoch hauptsächlich aus **III** (F. 336–340°) u. Di- α -naphthylmethan (F. 106–107°). Bis-di- α -naphthofluorenyl, $C_{42}H_{26}$ (**III**), a) aus Di- α -naphthobromfluoren (dieses aus Di- α -naphthofluorenol mit HBr) u. Kupferbronze, F. 338–343°; b) aus Di- α -naphthofluorenyl-MgBr u. J. — Di- α -naphthofluorenonchlorid (Di- α -naphthylendichloromethan) (**IV**), $C_{21}H_{12}Cl_2$, aus Di- α -naphthylketon u. PCl_5 durch Erhitzen auf 1 bis 155°, gelbe Nadeln aus Bzl., F. 256–258°, ll. in h. Bzl., Chlf., unl. in Ä. u. A., wird durch sd. i-Amylalkohol (+ einigen Tropfen konz. H_2SO_4) in das Ket. Di- α -naphthofluorenon, übergeführt, dunkelrote Nadeln aus Xylol, F. 266–268°, swl. in Bzl. u. Xylol. — Benzhydrol u. krystallisierte H_3PO_4 gaben nach 5 Stdn. im Einschmelzrohr (200°) Tetraphenyläthylen (**V**), aus A., F. 217–220°, Diphenylmethan (F. 21–22°), Benzophenon u. einen harzigen Rückstand. — Aus Xanthylendichloromethan nach derselben Behandlung Xanthen (F. 98–100°) u. Xanthon (F. 1 bis 173°), l. in konz. H_2SO_4 mit gelber Farbe. Das erwartete Dixanthylen wurde nicht erhalten. — Aus **V** entstand mit PCl_5 im Ölbad (150°) Benzophenonchlorid neben unverändertem Ausgangsmaterial. — Aus **I** entstand mit PCl_5 im Ölbad (Kp. des Oxychlorids) Di- α -naphthochlorfluoren, $C_{21}H_{13}Cl$, das zum Identitätsnachweis auch aus Di- α -naphthofluorenol u. HCl im Einschlußrohr dargestellt wurde, F. 224–225°, gelbe Nadeln aus Bzl.; mit Cu-Pulver in Xylol entsteht **III**. — Bei der Vers. der Mol.-Gew.-Best. in Campher trat bei 165° Lsg. ein, bei weiterer Erhitzung schieden sich Krystalle aus, die durch Mischprobe als **III** identifiziert wurden. — Aus **IV** entstand durch Kochen mit Kupferbronze Bis-di- α -naphthofluorenylen, $C_{42}H_{24}$ (**VI**), dunkelgrünes Pulver aus Bzl., F. 308–310°, sl. in B. Chlf., fast unl. in Ä. u. A., löst sich in konz. H_2SO_4 mit kirschroter Farbe; bei Kochen der Lsg. bei Luftzutritt erfolgt Oxydation zum Di- α -naphthofluorenon:








Dibromid, $C_{42}H_{22}Br_2$, aus **VI** u. Br in CS_2 -Lsg., grünes Pulver, Verfärbung 325°, Zers. bei 380°, ll. in Bzl. u. Chlf. — Red. von **VI** mit Zn in Eg. führt zu **III**. — Bei der Einw. von Di- α -naphthofluorenyl-MgBr auf Xanthon wurde **III** (F. 348–350°) neben unverändertem Xanthon (F. 165–173°) erhalten. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58. 433–42. Moskau, Chem.-pharmazeut. Forsch.-Inst.) ZANDER

A. Tschitschibabin und G. Menschikow, Über die Alkylierung des α -Pyridin-nitramids. I. Eine neue, der Kishner-Wolffschen analoge Reaktion. Für das α -Pyridin-nitramid (vgl. Tschitschibabin u. Rasorenow, Journ. Russ. Phys.-Chem. Ges. 1291; C. 1916. II. 15) ist die Existenz von 3 tautomeren Formen (I.–III.) zu erwarten. Direkte B. eines Äthers mit $CH_3 \cdot OH$ gelang nicht. Verss. zur Umsetzung von Alkalimetallsalzen des Pyridylnitramids, die aller Wahrscheinlichkeit nach die II. entsprechende Struktur haben, in wss. Lsgg. mit Alkylsulfaten oder Alkylschwefelsäuresalzen führten mit guten Ausbeuten zu Alkylderiv., wie z. B. I.

aber nicht der Form II., sondern III. entsprechen. Dies wird bewiesen durch Identität mit der in Gemeinschaft mit **R. Konowalowa** durch direkte Ierung von *N*-Methyl- α -pyridonimid hergestellten Verb., ferner aber durch den Einw. von Ätzalkalien erfolgenden quantitativen Zerfall in je 1 Mol. *N*-Methylpyridon u. N_2O . Diese Rk. kann allgemeinere Geltung im Sinne des Schemas:



en. Ihre Analogie mit dem Zerfall des Nitramids unter Einfluß von Alkalien ist für die Formel $H_2N \cdot NO_2$ des Nitramids.



N-Methyl- α -pyridonnitroimid, $C_8H_7O_2N_3$ (IV.), Blättchen oder Nadeln (aus h. h. W. oder viel h. Bzl.), F. 161° , sehr beständig gegen Na_2CO_3 -Lsg. — *lith*- α -pyridonnitroimid, $C_7H_5O_2N_3$, schwach gelbliche Nadeln oder Blättchen, 39° , gegen $NaOH$ u. Na_2CO_3 gleiches Verh. wie beim vorigen. (Ber. Dtsch.-m. Ges. **58**. 406—8.) SPIEGEL.

A. F. Roffo, Einwirkung von Röntgenstrahlen auf Cholesterin. 0,02%ig. Lsgg. Cholesterin in Chlf. oder Bzl. werden durch weiche, nicht filtrierte Röntgenstrahlen weitgehend zers. Die Zers. erstreckt sich nur auf das Cholesterin, dessen Kern intakt bleibt. Nach Verdampfen des Lösungsm. hinterbleibt eine dunkelgelbe, aromatische ölige M. Harte, filtrierte Röntgenstrahlen, O_3 u. naszierendes O_2 sind ohne Wrkg. auf die Lsgg. Krystallisiertes Cholesterin wird durch Röntgenstrahlen nicht verändert. (C. r. d. l'Acad. des sciences **180**. 228—29.) HA.

E. Biochemie.

E₂. Pflanzenchemie.

Oscar Czerny, Über die Natur des aus den Fichten der Bukowina ausgezogenen *Phans*. (Vgl. Bulet. Soc. de Chimie din România **6**. 39; C. **1924**. II. 674.) Das *Phan* enthielt 88,5% Säuren u. 4,6% Unverseifbares. Die Säuren bestehen in der Hauptmenge aus γ -Pinsäure, ferner γ - u. β -Abietinsäure u. Sylwinsäure. (Bulet. Soc. de Chimie din România **6**. 94—96. Cernautzi, Univ.) SPIEGEL.

P. Delauney, Über die Glucoside mehrerer einheimischer Orchideenarten. (Vgl. Journ. Pharm. et Chim. [7] **28**. 53; C. **1923**. III. 1029.) Das V. des Glucosids *Loroglossosid* (früher als *Loroglossin* bezeichnet) wurde jetzt auch in folgenden Pflanzen durch Nachweis seines Spaltprod. *Loroglossigenol* (früher: *Loroglossigenin*) festgestellt: *Goodyera repens* R. Br., *Limodorum abortivum* Sw., *Spiranthes autumnalis* Rich., u. *Orchis ustulata*. (C. r. d. l'Acad. des sciences **180**. 224—25.) HA.

Marc Bridel, Über das Vorhandensein von *Monotropitin* in den frischen Wurzeln einiger *Spiräen*arten: *Spiraea ulmaria* L., *S. Filipendula* L., *S. gigantea*, var. *rosea*. (Journ. Pharm. et Chim. [7] **30**. 400—3. 1924. — C. **1924**. II. 2666.) SPIEGEL.

E. Cattelain, Die Alkaloide der Calababohne. *Eserin* und *Geneserin*: chemische Eigenschaften und Konstitution. Zusammenfassende Übersicht über die bezüglichen Forschungsergebnisse, besonders von MAX u. MICHEL POLONOVSKI. (Journ. Pharm. et Chim. [8] **1**. 59—75.) SPIEGEL.

Matao Yukawa, Der Verbleib von Tyrosin in „Shoyu-Moromi“. Vf. untersucht

die Frage, ob Tyrosin durch Enzyme von *Aspergillus Oryzae* im „Koji“-Stadium oder im jungen Reifestadium des „Moromi“ aus dem Eiweiß von Bohnen u. Weizen — dem Rohmaterial von „Shoyu“ — entsteht u. dann weitere Zers. bei der weiteren Reifung erleidet oder ob der größte Teil des Sameneiweißes direkt der Einw. von Mikroorganismen während des Reifeprozesses unterliegt. — Aus „Shoyu“ u. „Tamar Shoyu“ isoliert Vf. *Tyrosol* (als Dibenzoat, F. 111° identifiziert) u. *Tyrosamin* (verschiedentlich identif., u. a. als Chloroplatinat, Zers. 205° u. Benzoat, F. 170°) untersucht die Gärungsprodd. von Pilzen, die — aus „Shoyu-Moromi“ isoliert auf Nährslgg. mit 0,1% ig. Tyrosingehalt gezüchtet werden: *Zygosaccharomyces sojae major* u. *japonicus* erzeugten Tyrosol, jedoch kein Tyrosamin u. keine *p*-Hydroxyphenyl-milchsäure, während in *Monilia*- u. *Mycoderma* Kulturen — die nur in „Koji“ isoliert werden — auch *p*-Hydroxyl-phenyl-milchsäure (F. 169°) neben Tyrosol, jedoch kein Tyrosamin nachgewiesen wurde. Danach vermutet Vf., daß Tyrosamin in „Shoyu“ oder „Tamar“ aus Tyrosin bzw. seinen Zersetzungsprodd. oder direkt aus den Eiweißstoffen in „Moromi“ durch *Aspergillus Oryzae* entsteht. — Die anregende Wrkg. von „Shoyu“ u. „Tamar“, die in Japan als Küchengewürz viel gebraucht werden, beruht auf dem Gehalt an Tyrosamin, das nach BICKEL u. PAWLOW (Biochem. Ztschr. 47. 345) eine Kontraktion der Blutgefäße bewirkt (Journ. Coll. Agric. Tokyo 5. 291—99. 1924.)

TRÉNEL.

G. P. Walton, *Chemisches und Strukturstudium über Süßhülsen-, Johannisbroten- und Gleditschiebohnen*. Da die ganzen Früchte des Süßhülsenbaumes (*Prosopis juliflora*) fast unverändert den Verdauungstraktus der Tiere passieren, müssen sie zerkleinert werden. Das wegen der klebrigen Beschaffenheit der Schoten schwierige Verf. der Vermahlung der Schoten wird beschrieben, sowie die chem. Zus. der ganzen Früchte u. der einzelnen Teile derselben in einer Tabelle mitgeteilt. Die Schoten enthalten ungefähr 20% Rohrzucker. Unterss. des Wasserextraktes verschiedener Süßhülsenbohnenprodd. ergaben einen Gehalt von ungefähr 57% Rohrzucker u. deuten somit auf die Möglichkeit hin, diese in großen Mengen fast ungenutzt vorkommenden Früchte als Ausgangsmaterial zur Fabrikation von Rohrzucker zu verwenden. (U. S. A. Dep. of Agric. 1194. 1923; Exp. Stat. Rec. 501—2. 1924.)

BERJU.

E₄. Tierchemie.

Walter Jones und M. E. Perkins, *Das Vorkommen von Pflanzennucleotiden in tierischen Geweben*. Aus dem β -Nucleoprotein des Pankreas wurden nicht nur Guaninnucleotid, sondern auch Cytosinnucleotid u. Adeninnucleotid mit allen Eigenschaften der aus Hefennucleinsäure dargestellten Substanzen erhalten. Da Substanzen, die mit dem Pankreasnucleoprotein ident. oder nahe verwandt sind, aus verschiedenen Drüsen hergestellt sind, läßt sich ein strenger Gegensatz zwischen pflanzl. u. tier. Nucleotiden nicht aufrechterhalten. (Journ. Biol. Chem. 62. 291—300. 1924. Baltimore, Johns Hopkins Univ.)

SPIEGEL.

Gustav Embden und Margarete Zimmermann, *Über die Chemie des Lactacidogens*. IV. Mitt. (III. vgl. EMBDEN u. LAQUER, Ztschr. f. physiol. Ch. 113. C. 1921. III. 1169.) Die Beimengen von H_3PO_4 , welche die Isolierung der Hexosediphosphorsäure erschwert, läßt sich beseitigen, indem man den aus frischen, eingekühlten Kaninchenmuskeln gewonnenen Preßsaft mit dem gleichen Vol. n/3-NaOH, 0,4% Glykogen u. 2% $NaHCO_3$ 4 Stdn. bei ca. 10° stehen läßt, wodurch die freie H_3PO_4 in Lactacidogen verwandelt wird. Darauf wurde mit einer dem Preßsaft entsprechenden Menge 5% ig. $HgCl_2$ u. 4% ig. HCl enteiweißt. Je 100 ccm des von Hg befreiten Filtrates werden zur Ausfällung der Kohlenhydrate mit 10 ccm 10% ige $CuSO_4$ -Lsg. u. mit so viel Kalkmilch versetzt, bis im Filtrat auf weiteren Zusatz kein blauer Nd. mehr entsteht. Der Nd. wird mit Kalkwasser gewaschen u. m

ig. H_2SO_4 zerlegt. Man trennt vom CaSO_4 u. fällt das Filtrat nochmals mit milch. Der Nd. wird mit H_2SO_4 zerlegt u. das Filtrat mit H_2S von Cu befreit. verd. auf ca. 1,5 Liter u. entfernt die H_2SO_4 durch Zugabe von h. Barytlsg. sauer reagierende Filtrat wird mit 10%ig. Bleizuckerlsg. ausgefällt, der Nd. H_2S zerlegt. Das Filtrat enthält außer dem Lactacidogen nur geringe Mengen r pentosehaltigen Nucleinsäure u. Spuren von anorgan. H_3PO_4 . Man versetzt nge mit einer methylalkoh. Lsg. von Brucin, bis die Rk. gegen Lackmus nur n schwach sauer ist, worauf das neutrale Brucinsalz einer Hexosediphosphorsäure $\text{I}_{118}\text{O}_{28}\text{N}_6\text{P}_4$ auskristallisiert, das ident. ist mit einem von **Gertrud Kahn** aus ungshexosediphosphorsäure dargestellten Brucinsalz. Aus $\text{CH}_3\text{OH} + \text{W.}$ doppel-ehende prismat. Krystalle. Kein F. Ausbeute 1,5 g aus dem Muskelpreßsaft s Kaninchens. 0,1 g in 8 ccm CH_3OH drehen im 1 dem-Rohr — 0,29°. Lös-keit in W. von 13° 0,135 Vol.-%. Es ist möglich, daß im Muskelpreßsaft neben Hexosediphosphorsäure noch eine Monophosphorsäure vorkommt. (Ztschr. f. siol. Ch. **141**. 225—32. 1924. Frankfurt, Univ.) GUGGENHEIM.

Emil Abderhalden, *Notiz über Insulin*. (Vgl. ABDERHALDEN u. WERTHEIMER, ÜGERS Arch. d. Physiol. **203**. 439; C. **1924**. II. 500.) Insulinpräparate ver-edener Herkunft geben eine negative Ninhydrink., wenn sie mit dem Reagens t über 2 Min. gekocht werden. Bei längerem Kochen wird die Rk. immer elicher positiv. Kocht man die Insulinpräparate vorher 1 Min. mit n/10-HCl, st der Ausfall der Ninhydrink. stets positiv. Es erscheint möglich, daß durch a Kochen mit HCl ein im Insulin vorhandener cycl. Komplex zu einer die ydrink. gebenden Verb. aufgespalten wird. Nach dem Kochen mit n/10-NaOH i die Rk. gewöhnlich negativ aus. Auf das Vorhandensein von Carbonylgruppen n Insulinpräparaten deutet der positive Ausfall der Pikrinsäurerk. (Ztschr. f. siol. Ch. **141**. 309—10. 1924. Halle a. S., Univ.) GUGGENHEIM.

H. Heinlein, *Zur Kenntnis melanotischer Pigmente*. Durch Kochen mit ehender HCl können natürliche Melanine nicht von fest anhaftenden Eiweiß-eremungen oder Eiweißderivv. befreit werden, da sich dabei *Melanoidinsäuren*, dem Tryptophankomplex im Eiweißmol. entstammen, den Melaninen beimengen. i behandelt daher melaninhaltige Gewebe besser mit Alkali in der Wärme, fällt i HCl ein Gemenge von Melanin u. Albuminat, löst in NaOH u. fällt mit dem peltten Vol. konz. HCl das Melanin, während das Albuminat im Säureüberschuß e bleibt. Wenn bei Wiederholung Phosphorwolframsäure im Filtrat keine ung mehr gibt, erscheint die restlose Beseitigung von Eiweißbeimengungen ge-erleistet. Die aus melanot. Pferdelymphdrüsen u. aus Melanosarkometastasen schlicher Lebern gewonnenen Melanine zeigten in ihrer analyt. Zus. (C 55,9 bis 6%, H 5,2—5,7%, N 8,5—9,4%, O 27,3—28,1%) ziemliche Übereinstimmung. Vergleich mit der Zus. des Tyrosins wie mit der von künstlich durch Einw. c Pilztyrosinase auf Tyrosin entstandenem Melanin spricht nicht gegen die An-eme, daß das Tyrosin im wesentlichen die Muttersubstanz der Melanine sei u. a der Übergang von Tyrosin in Melanin im wesentlichen durch Abspaltung von lder 2 C-Atomen sowie durch oxydative Beseitigung eines oder mehrerer H-eme eingeleitet werde. Bei Einw. von Kalumpersulfat oder anderer kräftiger dationsmittel auf Tyrosin ist der Vorgang der Melaninbildung wegen N-Ab-ptung nicht nachzuahmen. Fertige Melanine können mit ammoniakal. AgNO_3 -s. nicht reduziert werden. Bei auf chem. Wege gereinigten Melaninen gelingt it wie bei in den Geweben präformiertem Melanin eine Entfärbung durch ClO_2 aphanol“). (Biochem. Ztschr. **154**. 24—34. 1924. Wien, Physiol. Inst.) WOLFF.

D. Ackermann, F. Holtz und H. Reinwein, *Über das Vorkommen von Methyl-ämin, Dimethylhistamin, Guanidin, Betain und Eledonin bei Geodia gigas*. Nach-ke von HOLTZ (Ztschr. f. Biologie **81**. 65; C. **1924**. II. 686) im Riesenkiesel-

schwamm bereits das V. des bis dahin bei Wirbellosen nicht gefundenen Agmatin festgestellt war, wurden in diesem Organismus nunmehr auch die in der Überschrift genannten Substanzen, ferner eine noch nicht näher untersuchte Base $C_7H_{14}O_2$ gefunden. *Methyladenin*, $C_6H_7N_5$. *Pikrat*, $C_6H_7N_5 \cdot C_6H_5(NO_2)_3OH$, gibt bei 125° kein Krystallwasser ab, Zers. 250°. *Sulfat*, $(C_6H_7N_5)_2 \cdot H_2SO_4 \cdot 4H_2O$, Nadeldrusen, bei 125° wasserfrei, dann Zers. bei 168—170° (Aufschäumen). — Base $C_7H_{14}O_2N_6$, ein Au-Salz vom Zers.-Punkt ca. 207° aus dem Filtrat vom Methyladenin-pikrat gewonnen. — *Dimethylhistamin*, $C_7H_{13}N_3$; aus dem Filtrat der Pikrinsäurefällung Argininfraktion nach Zusatz von W. u. längerem Stehen abgeschiedenes öliger Pikrat wurde über Sulfat, Chlorhydrat (Krystalle, wl. in A.) verwandelt in Au-Salz $C_7H_{13}N_3 \cdot 2HAuCl_4$, F. 198°. Die Salze geben intensive Paulysche Diazork. — *Guanidin* fand sich in den Mutterlaugen vom Umkrystallisieren des Agmatin-pikrats. — *Betain* fand sich in der Lysinfraktion. Das alkoh. Filtrat vom Chlorid des Betains enthält das *Eledonin*, $C_{14}H_{30}O_8N_2$, das als $HgCl_2$ -Doppelsalz gefällt, dann übergeföhrt wurde in das Au-Salz, $C_{14}H_{30}O_8N_2 \cdot 2HAuCl_4$, hellgelbes krystallin. Pulver, wl. in W. (vgl. ACKERMANN, HOLTZ u. KUTSCHER, Ztschr. f. Biologie 80. 155; C. 1922. I. 1816). (Ztschr. f. Biologie 82. 278—84. 1924. Würzburg, Univ.) SPIEGEL.

E₅. Tierphysiologie.

Minko Dobreff, *Experimentelle Untersuchungen über die Wirkung von Pflanzensekretinen auf die Blutzusammensetzung*. Versuche an Tauben u. Hunden. Gleich nach Brennesselsekretininjektion tritt eine vorübergehende, ca. 2 Stdn. anhaltende Erythrocytose ein, die auch von einer Steigerung der Hämoglobinkonz. begleitet ist. Parallel damit geht eine Steigerung der Trockensubstanz, ebenfalls vorübergehend. Die Erythrocytose ist sekundär durch Dehydration des strömenden Blutes bedingt. Bei chron. Einw. von Pflanzensekretinen zeigt sich dagegen eine Reduktion der roten Blutkörperchen u. eine damit verbundene Hämoglobinabnahme sowie parallel damit eine entsprechende Herabsetzung des Trockenrückstandes des Blutes, sekundär durch Hydrämie bedingt. (Ztschr. f. d. ges. exp. Medizin 44. 393—403. Berlin Charité.) WOLFF.

John William Corran und William Cudmore McCullagh Lewis, *Die Wasserstoffionenkonzentration des Gesamtblutes gesunder Männer und Krebskranken gemessen mit der Chinhydronelektrode*. Durchschnittlicher n. Wert ist $p_H = 7.3$, ebenso bei Krebskranken. Injektion eines Pb-Suspensoids senkt den p_H nur wenig. (Biochemical Journ. 18. 1358—63. 1924. Liverpool, Univ.) WOLFF.

Robert Meyer-Bisch, *Untersuchungen über den Wasserhaushalt*. V. Mitteilung. Über den Einfluß peroral gegebener Lävulose und Dextrose auf den Wassergehalt des Blutes. (IV. vgl. Ztschr. f. d. ges. exp. Medizin 25. 307; C. 1922. I. 42) Perorale Zufuhr von 100 g Lävulose bewirkt beim n. Menschen eine Bluteindickung, die sich in Zunahme von Hämoglobin u. Serumeiweiß äußert u. in der Regel nach 15—30 Min. ihr Maximum erreicht hat. Perorale Zufuhr der gleichen Menge Dextrose läßt entweder die Blutzus. unverändert oder bewirkt eine mäßige Blutverd. Leberkranke verhalten sich wie Gesunde. Bei Zuckerkranken tritt die Wrkg. der Lävulose weniger gesetzmäßig auf u. bleibt nicht selten ganz aus. Bei Kaninchen u. Hund besteht der am Menschen beobachtete Wirkungsunterschied zwischen Lävulose u. Dextrose nicht; hier entsteht in beiden Fällen eine Bluteindickung. Der NaCl-Gehalt des Blutes bleibt unbeeinflusst. Die beim Kaninchen auftretende Hyperchlorämie ist eine Aderlaßhyperchlorämie. Das Eindringen großer Zuckermengen in den abgebandenen Dünndarm verursacht Wasserverarmung des Körpers durch Austritt von W. in den Darm. (Ztschr. f. d. ges. exp. Medizin 44. 355—68. Göttingen, Med. Klin.) WOLFF.

E. Kylin und G. Myhrman, *Blutkalkstudien*. VI. Mitt. Der Blutkalkgehalt

uständen von sog. vegetativer Neurose. (V. Vgl. S. 244.) Die Werte schwanken und nicht charakterist. (Ztschr. f. d. ges. exp. Medizin **44**. 378—83. Eksjö reden), Mil.-Krankenh.) WOLFF.

Bruno Mendel, Werner Engel und Ingeborg Goldscheider, *Über den Milchgehalt des Blutes unter physiologischen und pathologischen Bedingungen.* (Vgl. 17.) Mittels einer an anderer Stelle zu beschreibenden colorimetr. Methode nach Prinzip von HOPKINS u. HARROP wurde zunächst der Milchsäuregehalt des Blutes (Muskelruhe u. Muskularbeit untersucht. Nach längerer völliger Ruhe stellt er auf einen bestimmten, weiterhin konstanten Wert ein („Ruhewert“), wonach Blute ein „Milchsäurespiegel“ existiert. Bei kräftiger Arbeit steigt der Gehalt um das Mehrfache des Ruhewertes. War die Arbeit von kurzer Dauer, so fällt die steiler Kurve nach wenigen Min. völliger Ruhe wieder auf den Ruhewert, wenn allmählich in flacher Kurve nach langer Arbeit. (Klin. Wchsch. **4**. 262 33. Berlin, Univ.) SPIEGEL.

W. H. J. Ivens und J. M. van Vollenhoven, *Über die intraglobuläre Hämoglobinämie.* Sulfhämoglobinämie wurde u. a. nach Einnahme von Phenyl beobachtet. Dieses wirkt in vitro nicht in diesem Sinne, von seinen Spaltprodukten besitzt aber *p-Aminophenol* auf Hämoglobinlg. in Ggw. von sehr wenig ausgesprochene Fähigkeit zur B. von Sulfhämoglobin. In vivo scheint unter Entnahme von S aus dem Darminhalt besonders bei gestörter Leberfunktion einzutreten. (Nederl. Tijdschr. Geneeskunde **69**. I. 447—52. Amsterdam, MELMINA-Gasthuis.) SPIEGEL.

Felix Klopstock, *Über das Wesen des sogenannten Komplements.* Die Komplemente sind fermentartige Körper, die zu ihrer Aktivierung nicht nur einer bestimmten [H⁺], sondern eines kolloidalen Systems bedürfen mit einer bestimmten Ionenkonzentration, elektr. Ladung der Teilchen, Oberflächenspannung, Viscosität etc. Wie beispielsweise Pepsin durch HCl werden die Bakteriolyse u. Hämolyse durch das kolloidale System des Serums (Komplementserokinase) aktiviert. Es handelt sich offenbar um eine Art von einem kolloidalen Komplex ausgehender Katalyse. (Dtsch. med. Wchsch. **50**. 1790—92. 1924. Berlin-Dahlem, Kaiser-Wilhelm-Inst. f. experim. Therapie.) FRANK.

Ernst Wiechmann, *Über die Permeabilität des Plexus und der Meningen für Glukose.* Beim n. nüchternen Individuum ist der Zuckergehalt des Liquors wesentlich niedriger als der des Plasmas. Der Liquor enthält zwischen 54 und 60 % des Plasmazuckers (Mittelwert 59 %). 20 u. 40 Min. nach oraler Darreichung von 100 g Glucose findet sich keine Erhöhung des Liquorzuckers, eine deutliche Erhöhung erst nach 60 Min. Wahrscheinlich haben Phlorhidzininjektionen bei Senkung des Plasmas ein Abströmen des Zuckers aus dem Liquor, vermutlich zum Plasma, zur Folge. Für den Zuckeraustausch zwischen Plasma u. Liquor beim N. kommen in Betracht die akt. Zellvorgänge in Betracht. Vielleicht ergänzt sich dieser physiol. Vorgang mit einem physikal. Vorgang. Wird natives oder mit Zucker-Ringerlsg. versetztes Blut 12 Std. bei 37° in den Brutschrank gesetzt, so ändert sich der Zuckergehalt nicht. Beim Diabetes ist der Liquorzuckerwert erhöht. Das relative Verhältnis zwischen Plasma- u. Liquorzucker ist angenähert dasselbe wie beim Normalen. Im Verlauf der Insulinbehandlung wird das Verhältnis Plasmazucker: Liquorzucker nicht wesentlich beeinflusst. Bei Krankheiten ist der Liquorzuckerwert verändert. Diagnost. ist die Liquorzuckerbest. nicht sehr brauchbar. (Ztschr. f. d. ges. exp. Medizin **44**. 328—54. Köln, Univ.) WOLFF.

Laoul Lecoq, *Milchmehle und Rachitis.* Vf. tritt der Ansicht entgegen, daß die Verwendung von V. präparierten Milchmehle zu Rachitis führen. Trotz ihrer Mängel bzgl. der Nährstoffe können sie langsames, aber dauerndes Wachstum ermöglichen u. bei

Säuglingen mit Verdauungsstörungen usw. schnell gute Ergebnisse liefern. mit Milch gekochten Milchemhle sind ein ausgezeichnetes Nahrungsmittel. (J. Pharm. et Chim. [8] 1. 49—52.) SPIEGEL

A. T. Cameron und **J. Carmichael**, *Nachwirkungen von Schilddrüsenfütterung bei jungen Ratten*. (Vgl. Proc. Trans. Roy. Soc. Canada [3] 16. Sekt. V. 57; C. 1. III. 1242.) Eine zweite Periode von Schilddrüsenfütterung beeinflusst das Wachstum stärker als die erste. Nach der ersten nehmen die Tiere teilweise zu sehr stark zu, so daß sie darin die Kontrolltiere übertreffen können; diese Erscheinung ist aber vorübergehend. Im ganzen läßt sich sagen, daß Verfütterung von Schilddrüse selbst in relativ kurzer Zeit an junge n. Tiere längere Wachstumsstörung u. Organhypertrophie herbeiführen kann. (Proc. Trans. Roy. Soc. Canada [3] 18. Sekt. V. 105—14. 1924. Winnipeg, Univ. of Manitoba.) SPIEGEL

P. Morawitz und **G. Kühn**, *Der Blutumsatz des Normalen unter verschiedenen Bedingungen (Eisen, Arsen, Fleisch)*. Stoffwechselverss. an Menschen u. Hu. Es ergab sich, daß Fleisch im Gegensatz zu Fe u. As den Blutumsatz des Normalen in recht erheblichem Maße beschleunigt. Reichliche Fleischnahrung bei n. Menschen u. Tieren einen Zustand beschleunigter „Blutmauserung“ weder durch Fe noch durch As hervorgerufen werden kann. Vf. bezeichnet Fleisch als wahres Reizmittel für die blutbildenden Organe. (Klin. Wchschr. 4. Würzburg, Univ.) FRAUENFELD

S. M. Neuschlosz, *Über die Bedeutung der K-Ionen für den Tonus des gestreiften Skelettmuskels*. III. Mitt. *Die Beziehungen der Erregungscontractur zum Gehalt der Muskeln an gebundenem Kalium*. (II. Vgl. NEUSCHLOSZ u. TREPP, PFLÜGERS Arch. d. Physiol. 204. 374; C. 1924. II. 1226.) Ähnlich wie bei z. bedingten ton. Kontrakturen (Tetanusstarre) läßt sich auch bei der durch (oder Acetylcholin verursachten Erregungskontraktur des quergestreiften Muskels eine Vermehrung des gebundenen K in der kontraktile Substanz feststellen. durch gewinnt die Anschauung an Wahrscheinlichkeit, daß ton. Erregungskontraktur des Zentralnervensystems ihren Weg zum Skelettmuskel über die rezeptive Substanz nehmen. Bei der Reversion der Erregungskontraktur durch Auswaschen der Substanz mit reiner Ringerlsg. u. mittels rhythm. Reizung des Muskels wird die K-Bindung rückgängig gemacht. Wird das Auftreten der Erregungskontraktur durch Vorbehandlung des Muskels mit Atropin verhindert, so bleibt auch die Vermehrung des gebundenen K infolge der Cholinwrkg. aus. Nach Vorbehandlung des Muskels mit Novocain oder einer Ringerlsg. mit 10fach erhöhtem Gehalt an CaCl₂ bleibt die Muskelverkürzung infolge der Cholinwrkg. ebenfalls aus. Die Vermehrung des gebundenen K tritt aber in diesen Fällen ebenso ein wie bei der Erregungskontraktur nicht vorbehandelter Muskeln. Demnach ist die Vermehrung des gebundenen K, wenn auch unentbehrlich, immerhin nicht die alleinige Bedingung für ton. Muskelverkürzungen, die auch von dem jeweiligen Zustand der Muskelkolloide abhängen. Lactacidogenspaltung tritt bei der Erregungskontraktur nicht auf; dadurch unterscheidet sie sich prinzipiell von der physiol. Säurekontraktur. Die erhöhte K-Bindung seitens der kontraktile Substanz dürfte Zustandsänderung der betreffenden Kolloide herbeiführen, welche sich als Kontraktur äußert. (PFLÜGERS Arch. d. Physiol. 207. 27—36. Rosario de Saratí [Argentinien], Med. Fak.) WOHLFARTH

S. M. Neuschlosz, *Über die Bedeutung der K-Ionen für den Tonus des quergestreiften Skelettmuskels*. IV. Mitt. *Die chemischen Vorgänge bei der Kalikontraktur des isolierten Kaltblütermuskels*. (III. vgl. vorst. Ref.) Im Laufe der Kontraktur durch isoton. Lsg. an Krötenmuskeln nimmt der K-Gehalt des Muskels zu. Zunahme des freien K u. des gebundenen K erfolgt annähernd parallel. Durch Ca-Zusatz

-Kontraktur verhindert werden. Hierbei wird auch die Zunahme im K-Gehalt Muskels (des freien wie des gebundenen K) bis zu einem gewissen Grade vermindert. Doch ist die Vermehrung des gebundenen K auch in Ggw. von Ca in manchen Fällen groß genug, um eine Kontraktur hervorzurufen. Da eine Verkürzung auch unter diesen Umständen nicht eintritt, muß eine Wrkg. des Ca auf die kontraktilen Elemente angenommen werden. Lactacidogenspaltung tritt im Laufe der Kontraktur nicht auf. (PFLÜGERS Arch. d. Physiol. 207. 37—42.) WOLFF.

1. **M. Neuschlosz**, *Über den Mechanismus der Rhodankontraktur des quergestreiften Skelettmuskels*. Die durch 2%ig. NaCNS-Lsg. herbeigeführte Dauerkontraktur quergestreifter Muskeln (geprüft am Gastrocnemius von Bufo marinus L.) wird weder mit Lactacidogenspaltung noch mit vermehrter K-Bindung einher. Die Dauerkontraktur ist in ihrem 1. Stadium vollkommen reversibel, später jedoch nicht mehr. Die genannte Dauerverkürzung wird durch *Atropin* nicht beeinflußt, durch *Novocain* u. CaCl_2 jedoch merklich herabgesetzt, wenn nicht aufgehoben. Auch scheint NaCNS unmittelbar auf die kontraktile Substanz des Muskels zu wirken u. führt wahrscheinlich eine Quellung jener Elemente herbei, die an Dauerkontrakturen des Muskels beteiligt sind (Sarkoplasma?). (PFLÜGERS Arch. d. Physiol. 207. 43—51. Rosario de Santa Fé [Argentinien], Med. Fak.) WOLFF.

2. **M. Neuschlosz**, *Über eine einfache Methode, Erregungskontrakturen zu erzeugen*. Durch Abtrennung des oberen Drittels eines Krötengastrocnemius läßt sich ein Präparat gewinnen, das keine receptive Substanz besitzt, jedoch auf elektrische Reize gut anspricht. An diesem Präparate läßt sich eine typische Kontraktur mittels *KCl* oder *NaCNS* hervorrufen, nicht aber durch *Acetylcholin*. Auch scheinen die erstgenannten Gifte unmittelbar an der kontraktilen Substanz anzugreifen, das Acetylcholin an der receptiven Substanz. (PFLÜGERS Arch. d. Physiol. 207. 52—57.) WOLFF.

3. **M. Neuschlosz**, *Über den Angriffspunkt des Novocains im quergestreiften Muskel*. 0,5%ig. Novocain-HCl in Ringerlsg. hemmt außer Erregungskontrakturen auch solche Dauerkontrakturen, bei denen das Kontrakturgift unmittelbar in der kontraktilen Substanz des Muskels angreift. Demgegenüber scheint auch Novocain unmittelbar an dem kontraktilen Elemente anzugreifen, zwar zumindest vorwiegend an jenem Substrate, welches den Dauerkontrakturen zugrundeliegt. (PFLÜGERS Arch. d. Physiol. 207. 58—64.) WOLFF.

4. **A. Lissievisci-Drăganescu**, *Experimentelle Untersuchungen über die Fixierung von Bismut in den Organen und über seine Gegenwart in den Körperflüssigkeiten*. Bei der Verabreichung löslicher und unlöslicher Salze. Für die Aufschließung der Salze usw. wurde das Verf. von POUCHET am geeignetsten gefunden. Für die Analyse eignet sich gut das Reagens von AUBRY (Journ. Pharm. et Chim. [7] 25. 15; 1922. IV. 112), das so modifiziert werden kann, das man eine zum Vergleich dienendere kolloidale Lsg. erhält. Bi, in Form von intramuskulären Injektionen in kleinen Dosen von Na-K-Bismutotartrat längere Zeit Hunden u. Kaninchen verabreicht, fixiert sich in kleinen Mengen in einigen Organen nach der Reihenfolge (von oben nach unten) Dickdarm, Nieren, Milz, Speicheldrüsen, Gehirn, Leber. Nach schneller Verabreichung eines l. Salzes (ammoniakal. Citrat) in tox. Gabe ist die Reihenfolge der Organe dieselbe wie nach unl. Salzen, nur enthielt die Leber in einem Falle ebensoviel Bi wie die Nieren. Die Menge Bi in den einzelnen Organen steht im Verhältnis zu der in ihnen vorhandenen Blutmenge. In Harn u. Schweiß findet sich nach therapeut. Gaben Bi, niemals aber in der Rückenmarksfl. des Tieres, bei Tieren nach starker Vergiftung auch in dieser wie in Harn, Milch, Urin, nicht in der Galle. (Bulet. Soc. de Chimie din România 6. 86—91. Bukarest Univ.) SPIEGEL.

J. Markowitz, *Das Verhalten der Blutdiastasen bei diabetischen, mit Insulin behandelten Tieren.* Die Best. der Blutdiastasen erfolgte nach einer Modifikation Verf. von MYERS u. KILLIAN. Es zeigte sich, daß totale Entfernung des Pankreas bei einem Hunde von einer starken Abnahme der Blutdiastasen gefolgt war, daß auch bei länger diabet. Hunden der Diastasegehalt des Blutes geringer war als bei n. Tieren. Injektion von *Insulin* führte dann fast stets zu Erhöhung. Bei diabet. Hyperglykämie kann danach nicht auf erhöhte Glykogenolyse infolge gesteigerter Diastasewrkg. des Serums zurückgeführt werden. (Proc. Trans. Roy. Soc. Canada [3] 18. Sekt. V. 141—46. 1924. Univ. of Toronto.) SPIEGEL

S. U. Page, *Die Wirkung des Insulins auf den Phlorrhizindabetes bei Hund.* Soweit die Unregelmäßigkeiten, die sich bei den Verss. zeigten u. auf eine Senkung des Blutzuckers schon durch die Wrkg. des Phlorrhizins zurückgeführt werden können, Schlüsse zulassen, werden im allgemeinen die Ergebnisse von NASH (Journ. Biol. Chem. 58. 453; C. 1924. I. 1959) u. RINGER (Journ. Biol. Chem. 58. 453; C. 1924. I. 1959) bestätigt. (Proc. Trans. Roy. Soc. Canada [3] 18. Sekt. V. 140. 1924. Univ. of Toronto.) SPIEGEL

Emil Starkenstein, *Die Toxizität des Veramons, gemessen an seiner Wirkung auf die Atemgröße.* Verss. an Kaninchen. Im Veramon ist die lähmende Wirkung des Veronals auf das Atemzentrum bedeutend vermindert; in geringen Dosen aufgehoben; es ist also durch das *Pyramidon* eine Entgiftung des Veronals am Atemzentrum erfolgt. Die narkot. Wrkg. der einen Komponente (Veronal) wird durch die erregende der anderen (Pyramidon) antagonisiert, beeinflusst, umgekehrt die erregende des Krampfgiftes durch die lähmende des Narkotikums. Klin. Erfahrungen zeigen, daß neben diesem wechselseitigen, in der Toxizität zum Ausdruck kommenden Antagonismus auch ein Synergismus hinsichtlich der analget. Wrkg. beider Komponenten vorhanden ist. (Klin. Wchschr. 4. 114—17. Prag, Univ.) FRANKE

Erwin Loewy-Hattendorf, *Die Diallylbarbitursäure: Dial oder Curral?* Obwohl das *Dial* (CIBA) dieselbe Konst.-Formel besitzen soll wie das *Curral*, ist es doch letzteren in der Wrkg. überlegen; es zeigt vor allem keine unangenehmen Nebenwirkungen. (Dtsch. med. Wchschr. 50. 1801. 1924.) FRANKE

Otto, *Erfahrungen mit dem neuen Schlafmittel Noctal.* Bericht über günstige Wrkg. des Schlafmittels *Noctal*. Hervorgehoben wird das Fehlen jeglicher Nebenwirkungen. (Dtsch. med. Wchschr. 51. 26—27. Berlin-Wilmersdorf, Städt. Krankenh.)

Sonntag, *Erfahrungen mit Albertan in der kleinen Chirurgie.* *Albertan* bewährt sich als austrocknendes, desodorierendes u. anästhesierendes Mittel bei Wunden verschiedenster Art. (Dtsch. med. Wchschr. 51. 26. Leipzig, Univ.) FRANKE

I. Snapper und A. Grünbaum, *Über die Ausscheidung von Akineton, einer spasmolytisch wirkenden Benzylverbindung.* (Vgl. SNAPPER, GRÜNBAUM u. STURM, S. 702.) Im Gegensatz zu den Benzylestern zeigte sich Akineton, die Phthalatverb. des Benzylamins, $C_6H_5 \cdot CH_2 \cdot NH \cdot CO \cdot C_6H_4 \cdot COOH$, die außerdem den Vorzug hat, ein in W. l. Na-Salz zu bilden, im Organismus schwer spaltbar (keine vermehrte Ausscheidung von Hippursäure). (Nederl. Tijdschr. Geneeskunde 69. I. 441 bis 447. Amsterdam, Gem. Univ.) SPIEGEL

O. Schürch, *Reizversuche mit physiologischen Substanzen auf der Haut Normalen und Ekzematikern.* Vf. brachte zur Entscheidung der Frage, ob es überhaupt, in größerem oder geringerem Maße, eine Hautidiosynkrasie für körpereigene physiol. Stoffe gibt, eine Reihe von Substanzen in 1%ig. Lsg. 24 Stdn. lang auf der Haut n. u. ekzematöser Personen in innigen Kontakt. Es wurden auf folgende Weise geprüft: *Na-Urat, Milchsäure, Traubenzucker, Glykokoll, β -Oxybuttersäure, Aceton, Adrenalin, Phenol, Brenzkatechin, gallensaure Alkalien, hippursaures Kresol*, außerdem Urin von n. u. ekzematösen Individuen. Die Haut-Rkk. wurden in 5 Wrkg.-Grade eingeteilt, von schwacher Rötung bis zu hochgradigen

lungen mit Blasen u. Nüssen. Die Verss. ergaben ein fast völlig negativesultat. Im Gegensatz dazu reagierten mit körperfremden Substanzen (*Terpentin*, H_2 , *Chinin*, Primelextrakt u. anderen) behandelte Personen über 50% positiv. die Annahme eines endogenen Stoffwechselelekzems sprechen die Ergebnisse der Verss. nicht. (Klin. Wehschr. 4. 11—13. Zürich, Univ.) FRANK.

R. Umezawa, *Über die Wirkung der Ceriumsalze auf das Brechzentrum.* Get wurden $Ce(NO_3)_4 + H_2O$, $Ce_2(SO_4)_3 + 8H_2O$, $Ce_2Cl_6 + 14H_2O$, $Ce_2(NO_3)_6 + 7H_2O$, $Ce_2Br_6 + 14H_2O$, $Ce_2(COO \cdot COO)_2 + 9H_2O$. Cerosulfat u. Cerohlorid den nur zuweilen, Cerooxalat nur in den seltensten Fällen von der Magen-eimhaut resorbiert; dann freilich wird die Erregbarkeit des Brechzentrums (ge't mittels Apomorphin an Hunden) abgeschwächt. Die Wrkg. des Ce per os ist sehr gering. Intravenöse Applikation von Cersalz hemmt mit Sicherheit die regung des Brechzentrums. Ceri-Ammoniumnitrat ist sehr stark reizbar, aber in ner Dosis ist die gute Wrkg. deutlich u. auch länger anhaltend als bei den eren Cersalzen. Subcutane Injektion ist zu vermeiden. — Auf das isolierte chherz wirkt dreiwertiges Cer stärker schädigend als vierwertiges. Erythro-n werden durch Cersalzlsg. agglutiniert. (Ztschr. f. d. ges. exp. Medizin 44. 1—17. Berlin, Pharmakol. Inst.) WOLFF.

Paul Heymann, *Über intravenöse Verwendung von Bromnatrium, nebst Be- tungen über intravenöse Anwendung einiger anderer Substanzen.* Intravenöse In- on von 10%ig. NaBr-Lsg. hat sich zur Bekämpfung innerer Blutungen be- irt. — Es wird ferner auf die Vorteile O_2 -gesätt. Lsgg. zu intravenösen ktionen bei Intoxikations- u. Kreislaufschwächezuständen hingewiesen. Ge- et zu solchen Injektionen sind auch *Atophanyl* u. *Hexeton*, in Fällen, wo ge- ende Reservekraft des Herzens noch vorhanden ist, auch *Scillaren*. Gewarnt il vor Verwendung von *KJ*, unverd. *Alival*, hochkonz. Lsgg. von *Na-Salicylat*. algemeinen sollte die intravenöse Injektion nur dann stattfinden, wenn die on gegenüber anderen Einverleibungswegen zu erwartende stärkere oder schnellere g. im richtigen Verhältnis zu den etwaigen Nebenerscheinungen steht. (Therapie egenwart 66. 63—67. Wiesbaden, Städt. Krankenh.) SPIEGEL.

Alfonso Satta, *Die Cholesterinverbindungen des Quecksilbers und des Jods bei e Behandlung der nervösen und langsamen Syphilis.* Mit *Coleosan*, das in 1 cem Hg, 5 cg organ. gebundenes J u. 4 cg Cholesterinoleat enthält, wurden bei den enannten Krankheitsformen mindestens ebenso gute Erfolge erreicht wie mit den tchen Hg-Präparaten. Das Präparat wird ausgezeichnet vertragen ohne die Un- glichkeiten der Hg-Salze. (Rassegna Clin. Terap. e Scienze aff. 23. 234—42. Et. Sassari, R. Univ.) SPIEGEL.

O. Foerster, *Über die therapeutische Verwendbarkeit des Tetrophans.* Mit *Tetro- in* (vgl. Ber. Dtsch. Chem. Ges. 55. 3675; C. 1923. I. 431) konnte Vf. günstige olge bei *Tabes* u. multipler Sklerose erzielen. (Klin. Wehschr. 4. 55—60. 3slau.) FRANK.

E. Kylin und M. Lidberg, *Zur Frage der Adrenalinreaktion.* V. *Über die avenöse Adrenalinreaktion, besonders bei Diabetikern.* (Vgl. KYLIN, Zentralblatt m. Med. 45. 745; C. 1924. II. 373.) 1 cem Adrenalinlsg. 1:100000 wurde avenös injiziert. Von 18 Diabetesfällen ohne Blutdrucksteigerung zeigten danach eine abnorm kräftige Steigerung; diese Rk. war öfter positiv als die Vermehrung e Blutzuckers. Vf. sieht hierin einen weiteren Beleg für den Antagonismus von kreas u. Nebennieren. Bei Diabetes mit gleichzeitiger essentieller Hypertonie ot, wie KYLIN früher angegeben hat, der Adrenalininjektion zunächst Blutdruck- erung u. nach subkutaner Injektion Abflachung der Blutzuckerreaktionskurve. 3le Arten Diabetes zeigen also einen prinzipiellen Gegensatz, nur die erste

ohne Hypertonie) dürfte pankreatogen sein. (Dtsch. Arch. f. klin. Med. 145. 373—1924. Stockholm, Seraphimerlazarett.) SPIEGEL

Josef Neu, *Über Papavydrin, eine Papaverin-Eumydrin-Kombination*. An Stelle von Atropin verwendet Vf. das 50mal weniger giftige Eumydrin in Kombination mit Papaverin. Das Präparat kommt unter dem Namen Papavydrin (Heidelb. R. u. O. WEIL, Frankfurt a. M.) in Form von Drageeten, Suppositorien u. Injektionsform in den Handel. Es bewährte sich bei spast. Zuständen des Magen-Darm-Kanals. (Klin. Wchschr. 4. 45—46. Stuttgart.) FRANK

Charles W. Edmunds und Erwin E. Nelson, *Zur Polycythämie durch subcutane Adrenalininjektion*. Subcutane Adrenalininjektion 1 mg/kg verursacht bei Hunden eine Polycythämie, Anstieg der Retikulozyten u. junger Formen polymorphkerniger Leukozyten. Diese Polycythämie ist zweifellos teilweise ein Konzentrationsphänomen, aber aus dem Auftreten junger Formen geht hervor, daß zugleich eine Störung in den blutbildenden Organen vorliegt infolge der Einw. des Adrenalins auf diese Organe. (Journ. Exp. Med. 44. 1—12. Ann Arbor, Univ. Michigan, Med. School.) WOLFF

E. Vogt, *Erfahrungen mit der intravenösen Injektion von Cylotropin zur Bekämpfung der Harnverhaltung*. Vf. empfiehlt das Cylotropin (vgl. Münch. med. Wchschr. 70. 1485; C. 1924. I. 429) zur Bekämpfung postoperativer u. postpartaler Harnverhaltung. (Klin. Wchschr. 4. 18—20. Tübingen, Univ.) FRANK

Adolf Beyersdorf, *Therapeutische Versuche mit phosphorsaurem Paraneprhrin*. Merck bei der Osteomalacie des Rindes. Mit phosphorsaurem Paraneprhrin (Merck) gelingt es, rund 70% der Fälle von Osteomalacie beim Rinde in kurzer Zeit zu Heilung überzuführen. Schädliche Nebenwrgg. wurden nicht beobachtet. (Dtsch. tierärztl. Wchschr. 33. 22—25. Hannover, Tierärztl. Hochschule.) FRANK

René van Saceghem, *Das Bayer 205 (Naganol) und die Behandlung tierischer Trypanosomiasen*. I. (Vgl. S. 406.) Mit 5 g pro 100 kg Körpergewicht konnte ein Rind, das mit *Trypanosoma congolense* unmittelbar darauf infiziert wurde, nicht gegen die Infektion geschützt werden. Bei erkrankten Tieren ergaben sich Gaben von > 20 g nur eine vorübergehende Sterilisation des peripheren Kreislaufs. Das Naganol scheint bei dieser Krankheit der Kombination von Brechweinstein u. Atoxyl nicht überlegen. Noch weniger wirksam ist es bei Infektionen durch *Tr. vivax*. Gaben von 15 g für 100 kg sind für Rinder tödlich. Naganol führt aber schnell zu Gewöhnung. (C. r. soc. de biologie 91. 1452—54. 1924. Kisen Lab. vétérin. du Congo et Ruanda Urundi.) SPIEGEL

H. Pfeiffer und F. Standenath, *Zur Kenntnis der Traubenzuckerwirkung bei Eiweißzerfallsvergiftungen*. Vff. untersuchten den Einfluß intravenös eingespritzten Traubenzuckerlsgg. bei Kaninchen, die durch beiderseitige Nierenausschaltung in den Zustand der Urämie versetzt worden waren. In einer Reihe von Fällen konnte eine erhebliche Verlängerung des Lebens beobachtet werden. Ein so günstiger Erfolg wurde auch an Mäusen nach einer intraperitonealen Trypsinvergiftung erzielt; schwerst erkrankte Tiere konnten durch die Behandlung vor dem sicheren Tode gerettet werden. Ähnliche Wrgg. wurden auch an phosphordynam. geschädigten Mäusen festgestellt. Die Wrgg. des Traubenzuckers ist einer Entgiftung zu suchen, die er auf diese Form der Störung des Eiweißstoffwechsels ausübt. Bei Tieren mit Fettlebern blieb die Behandlung wirkungslos. (Klin. Wchschr. 4. 119. Graz, Univ.) FRANK

Fritz Wankell, *Zur Analyse der Vitalfärbung, mit Beobachtungen über das Verhalten von Tumoren*. Carcinom u. Sarkom von Mäusen, denen Säurefuchsin, Lichtgrün u. ähnliche sich leicht entfärbende Triphenylmethanfarbstoffe injiziert wurden, färben sich bei Benetzung mit Essigsäure unter Regeneration des Farbstoffes.

stärker als alle Organe. Die reichliche B. der farblosen Prodd. im Körper mit der schwach alkal. Rk. der Säfte zusammen u. nicht mit „elektropen“ Einheiten nach KARCAG (Biochem. Ztschr. **138**. 344; C. **1923**. III. 1280). Membranen, die die Einlagerung von Eiweiß oder Eiweiß + Lecithin in Kollodiumhüllen hergestellt, lassen die farblosen Derivv. der Farbstoffe leichter passieren als diese selbst. Man nimmt die farblosen Derivv. leichter auf als die Farbstoffe selbst. (Müllers Arch. d. Physiol. **207**. 104—9. Kiel, Physiol. Inst.) WOLFF.

O. Schumm, *Bemerkung zu meiner Abhandlung „Die Farbstoffumwandlung in rotem Fleische“*. (Vgl. S. 854.) Bei einzelnen Farbstofffraktionen aus zersetzten, spektroanalyt. festgestellte Merkmale lassen auch die Möglichkeit der Entstehung von *Mesoporphyrin* in Betracht ziehen, besonders auch mit Rücksicht auf die noch nicht veröffentlichten Feststellungen von **A. Papendieck** u. **K. Bonath** über die verschiedenen Porphyrine aus Blutfarbstoff. Mesoporphyrin verhält sich zu Essigsäurehaltigem Ä. u. in 25%ig. HCl dem Koproporphyrin so ähnlich, daß eine sichere Unterscheidung bei den bisher in Fleisch- u. Organfäulnisversuchen unreinen Farbstofflsgg. auf diesem Wege kaum möglich erscheint. Auch die mit $\text{CH}_3\cdot\text{OH}$ u. HCl erhaltenen Veresterungsprodd. beider Porphyrine verhalten sich bzgl. der Spektralprobe in Chlf. u. der Chlf.-HCl-Probe täuschend ähnlich, ebenso ihre Fe-Komplexverbb. bei der Spektralprobe mit Pyridin u. Methylhydrat. — Auch für das „ätherlösliche“ *Porphyrin des n. Harns* (vgl. Ztschr. f. physiol. Ch. **136**. 247; C. **1924**. II. 2488) kann die Möglichkeit eines Mesoporphyringehaltes nicht ganz u. nicht allgemein ausgeschlossen werden. (Ztschr. f. physiol. Ch. **142**. 314.) SPIEGEL.

G. Analyse. Laboratorium.

Frank, *Störungen bei der Bestimmung des spezifischen Gewichts von Gasen mit dem Bunsen-Schilling-Apparat*. Es wurde festgestellt, daß die D.-Best. an Tagen mit sehr feuchter Luft schlecht übereinstimmen; Schuld hieran trägt Wasserdampf die ungleiche Verteilung. (Gas- u. Wasserfach **68**. 25. Augsburg.) WECKE.

Samuel Sugden, *Die Bestimmung der Oberflächenspannung aus der Erhöhung der Kapillarröhren*. Vf. zeigt, daß das Problem, die Oberflächenspannung aus der Kapillaren Erhöhung (vgl. **RICHARDS**, **SPEYERS** u. **CARVER**, Journ. Americ. Chem. Soc. **46**. 1196; C. **1924**. II. 1667) rechner. zu bestimmen, zu ihm bereits in aller seiner Form früher gelöst worden ist (vgl. Journ. Chem. Soc. London **119**. 1483; Journ. Chem. Soc. London **1922**. II. 109). Eine Erweiterung findet die Lsg. durch die Anwendung der kinemat. Arbeit von **BASHFORTH** u. **ADAMS** („An Attempt to Test the Theories of Capillary Action“, Cambridge, Univ. Press [1883]), welche von Vf. diskutiert wird. (Journ. Americ. Chem. Soc. **47**. 60—64. London, Univ.) JOSEPHY.

B. Jonaust und **P. Wagnet**, *Über die Anwendung der photoelektrischen Zelle bei teilweise industrielle photometrische Messungen*. Die an 15 Kohlefaden- u. 8 Metallhalogenlampen durchgeführten Verss. zeigen, daß in Händen geübter Experimentatoren eine photoelektr. Zelle das Auge bei diesen photometr. Messungen ersetzen kann. (Bull. d. l'Acad. des sciences **180**. 59—61.) K. WOLF.

Paul M. Dean und **Evelyn Newcomer**, *Die Bestimmung von Chloriden mit der calorimetrischen Titration und einige Versuche über die Titration von Gemischen von Cyanid und Halogeniden*. Es wird gezeigt, daß auch Chloride nach der calorimetrischen Titrationmethode (vgl. **DEAN** u. **WATTS**, Journ. Americ. Chem. Soc. **46**. 855; Journ. Chem. Soc. London **1924**. II. 511) bestimmt werden können, wenn nicht auch andere Ionen, die durch AgNO_3 gefällt werden, in der Lsg. vorhanden sind. Sind verschiedene Halogenide u. Cyanid nebeneinander in der Lsg., so liefert der Knickpunkt der Kurve den Gesamtverbrauch an AgNO_3 . Die Fällung der einzelnen unl. Salze

wird durch die Kurve nicht angezeigt. Bei organ. Analysen, wo in Lsg. von NH_3 Cyanide gebildet werden, z. B. bei CHCl_3 , CCl_4 usw. kann diese Methode nicht angewandt werden. Die Analyse von *Dichloranilin*, bei der kein Cyanid gebildet wird, liefert nach dieser Methode richtige Werte. (Journ. Americ. Chem. Soc. 47. 64—67. Boulder [Col.], Univ.) JOSEPHY.

C. J. Oosterholt, *Eine Sicherung für den registrierenden Calorimeter nach Pr. Junkers*. Um ein Zurückschlagen oder Erlöschen der Flamme bei Abnahme Gasdruckes oder Unterbrechung der Wasserzuführung zu verhindern, wurde eine Sicherung in Form eines Schwimmers bestehend aus einer Glasglocke mit hoch umgeschlagenen Rande eingebaut, die bei Störungen untersinkt u. die Gaszuführung unterbricht. Näheres durch Zeichnungen u. Abbildung in der Quelle. (Het G. 45. 42—47.) GROSZFELD.

Elemente und anorganische Verbindungen.

Josef Weichherz, *Bestimmung von Jod in Jodiden*. (Vgl. WEICHHERZ KLINGER, Chem.-Ztg. 48. 269; C. 1924. II. 87.) Vf. wurde von RUPP u. HO auf das von ihnen (vgl. RUPP, Apoth.-Ztg. 37. 452; C. 1923. II. 119) bereits beschriebene Verf. aufmerksam gemacht. Die Vorschrift des Vf. bedeutet einen Fortschritt, da sie ein schnelles Arbeiten u. die Best. der kleinsten Mengen J gestattet. Das Rupp-Hornsche Verf. ist in Ggw. großer Mengen Br u. Cl unbrauchbar. (Chem.-Ztg. 49. 83.) JUNG.

E. Rupp, *Bestimmung von Jod in Jodiden*. Antwort an WEICHHERZ (vgl. Ref.). Die Unstimmigkeit der Befunde erklärt sich durch den raschen Zusatz Permanganatlsg., der zu schwankenden, meist zu hohen Jodidwerten führt. (Chem.-Ztg. 49. 83.) JUNG.

Marion B. Richards und William Godden, *Das Verfahren von Pemberton Neumann zur Bestimmung des Phosphors*. Das Verf. (vgl. NEUMANN, Ztschr. physiol. Ch. 37. 129) zeigte, wenn die Arbeitsbedingungen wesentlich verändert wurden, gewisse Unsicherheiten, wie bereits verschiedentlich im Schrifttume festgestellt worden war. Vff. haben deshalb das Verf. genau durchgearbeitet, worüber berichtet wird u. schreiben für biolog. Material (Faeces) folgenden Gang vor: Die Best. des Gesamt-P in frischen Faeces: 1,5—2 g werden im Kolben von 500 ccm mit 10 ccm konz. H_2SO_4 u. 10 ccm konz. HNO_3 über kleiner Flamme erhitzt, keine braunen Dämpfe mehr entweichen u. der Kolben voll weißer Dämpfe. Nach dem Abkühlen gibt man noch 5 ccm HNO_3 zu u. digeriert bis der fl. Inhalt klar u. farblos ist. Nach dem Abkühlen verd. man auf 200 ccm, macht gelackmus gerade alkal. mit konz. NH_3 u. säuert mit HNO_3 gerade an. Dann gibt man 30 ccm 50%ig. NH_4NO_3 -Lsg. zu u. nach Erhitzung auf 70—75° 30 ccm NH_4 -Molybdatlsg., zu der man 1,5 ccm konz. HNO_3 zugefügt hat, u. schüttelt. Den Nd. läßt man absitzen bis die Fl. sich abgekühlt hat (gewöhnlich 1 St.). Man kann aber auch über Nacht stehen lassen. Man saugt dann vom Nd. wäscht 2mal mit 10%ig. HNO_3 , 3—4mal mit 2%ig. NH_4NO_3 u. 2mal mit k. Man spült dann den Nd. vom Filter in den Fällungskolben zurück, löst in 1% NaOH -Lsg. (etwa 1 ccm), verd. auf 250 ccm etwa u. kocht 20 Minuten. Wenn Fl. noch warm ist, titriert man mit $\frac{1}{2}$ -n. H_2SO_4 mit Phenolphthalein als Indikator zurück, u. gibt einen Überschuß von 1—2 ccm Säure. Man kocht wieder 15 Min. u. titriert nach dem Abkühlen die Säure mit $\frac{1}{2}$ -n. NaOH genau zurück; als Endpunkt wird die erste ausgesprochene Rotfärbung, die ziemlich bald wieder bleicht, angenommen. Der Unterschied zwischen den gesamten ccm Alkali u. Säure gibt das der vorhandenen P_2O_5 äquivalente Vol. Alkali (1 ccm $\frac{1}{2}$ -n. NaOH 0,001365 g P_2O_5). (Analyst. 49. 565—72. 1924.) RÜHL.

E. Rupp, G. Siebler und W. Brachmann, Gehaltsbestimmung von Spießglanz Goldschwefel. Zur Sb-Best. im Spießglanz kocht man 0,2 g feinstgepulverte im Erlenmeyer (100 ccm) mit 10 ccm NaOH (15%) 10 Min. gelinde, verd. mit W., filtriert in Titrierbecher u. wäscht 2mal mit je 10 ccm W. Filtrat man auf 20 ccm ein, säuert heiß mit 25 ccm HCl (25%) an u. erhitzt bis zur der Ausfällung. Darauf verd. man auf 100 ccm, wärmt nochmals auf 80–90° fügt 1 Tropfen Methylorange zu u. titriert die klare h. Lsg. mit $\frac{1}{10}$ -n. KBrO₃ Entfärbung. 1 ccm $\frac{1}{10}$ -n. KBrO₃ (GYÖRY) = 0,00850 g Sb₂S₃; 1 ccm $\frac{1}{100}$ -n. O₃ (A.-B.) = 0,00510 g Sb₂S₃. Es werden auch Verff. zur jodometrischen Best. geben. — Zur Best. von Goldschwefelpräparaten löst man 0,2 g im Titrierbecher 5 ccm HCl (25%) durch Erhitzen auf dem Drahtnetz u. kocht so lange, bis entwichen ist. Zur Lsg. fügt man eine erbsengroße Menge Weinsäure (ca.) u. verd. mit 50 ccm W.; darauf macht man die erkaltete Fl. dicarbonatalkal. 5 g NaHCO₃ u. titriert mit $\frac{1}{10}$ -n. Jodlsg., Stärkelsg. als Indicator, bis die Fl. rund blau gefärbt ist. 1 ccm $\frac{1}{10}$ -n. J = 0,01011 g Sb₂S₃. — Dreiwertiges Sb sich auch mit Chloramin titrieren, von dem man aus 15 g im l eine $\frac{1}{10}$ -n. Lsg. titet u. diese gegen $\frac{1}{10}$ -n. As₂O₃ oder Na₂S₂O₃ einstellt. — Die Titration von hweinstein u. Goldschwefel mit Chloramin wird beschrieben. (Pharm. Zentral- 66. 33–36.) DIETZE.

A. Stadeler, Kritische Untersuchung der Bestimmung der Kieselsäure in Erzen, Zucken, Zuschlägen und feuerfesten Baustoffen. Die Kieselsäurebest. soll nur in in- oder Porzellanschalen ausgeführt werden. Nach dem Eindampfen der ungsfl. muß der Rückstand zum Unlöslichmachen der Kieselsäure 1 Stde. auf erhitzt werden. Bei höheren u. mittleren SiO₂-Gehalten ist nochmaliges Ein- pfen von Filtrat u. Waschw. unbedingt notwendig. Zur Best. von SiO₂ in arfestem Material ist ein Aufschließen mit Alkalicarbonat von vornherein an- macht. Begleitende Bestandteile außer Fluor haben keinen Einfluß auf die Best. chl u. Eisen 44. 1477–81. 1924. Hattingen, Ruhr.) WILKE.

D. M. Fairlie und G. B. Brook, Die Natriumbestimmung in Aluminium. (Journ. Metals 32. 283–90. 1924. — C. 1924. II. 2600.) WILKE.

C. Holthaus, Die gleichzeitige Bestimmung des Schwefels und Kohlenstoffs in ed, Roheisen und Ferrolegierungen durch Verbrennung im Sauerstoffstrom. Um ehzeitig S u. C in Fe-Proben zu bestimmen, wird in einem der üblichen Öfen Einwaage von 2 g Stahl oder von 1 g Roheisen bzw. Ferrolegierung bei 1050° O₂-Strom verbrannt. Die Gase gelangen zur Absorption des SO₂ zunächst in eigens konstruierte Absorptionsbürette, die mit 50 ccm 2%iger H₂O₂-Lsg. eckicht ist, um das SO₂ zu H₂SO₄ zu oxydieren. Dann treten die Gase zwecks orption der CO₂ in eine gleiche Bürette, die mit 50 ccm 0,5-n. NaOH gefüllt — Die in der ersten Bürette entstandene H₂SO₄ wird mit 10 ccm $\frac{1}{30}$ -n. NaOH etzt u. mit $\frac{1}{30}$ -n. H₂SO₄ titriert. — Zur Titration des in der zweiten Bürette ildeten Na₂CO₃ neben dem vorhandenen NaOH benutzt man 0,5-n. HCl u. mphthalein, das sich entfärbt, wenn NaOH neutralisiert u. Na₂CO₃ in NaHCO₃ rgeführt ist. Verwendet man Büretten, die das genaue Ablesen von $\frac{1}{300}$ ccm tatten, gibt diese Best. in kürzerer Zeit gleich genaue Werte wie die gewichts- ylt. Methoden. (Stahl u. Eisen 44. 1514–19. 1924. Dortmund.) LÜDER.

Et. Olivier, Standardisation (Vereinheitlichung) der industriellen Zinkbestimmung en Mineralien. Die Entw. der titimetr. Best. von Zn in der Industrie nach IAFFNER, ihre Modifikation durch TOBLER u. NOAILLON wird beschrieben. egenwärtige Ausführung: 1,25 g Mineral, 60 ccm NH₃, Vol. 500 ccm, kein Fe in d Vergleichslsg., Indicator Pb-Papier. (Bull. Soc. Chim. Belgique 33. 543–49. 1924. Vieille Montagne.) HERTER.


Fred. C. Bond, *Bestimmung des Bleis in Stangensilber*. 1 g Substanz wird einem Erlenmeyer in 15 cem konz. HNO_3 gelöst, 10 cem W. u. 5 cem konz. HNO_3 zugegeben u. bis zum Entweichen von SO_3 erhitzt. Nach dem Abkühlen werden 75 cem W. 3 cem konz. H_2SO_4 u. 10 cem A. zugegeben, kalt filtriert u. mit verd. H_2SO_4 (1:50) ausgewaschen. Das Filter samt Nd. wird 2 mal mit Ammoniumacetat (150 g Ammonacetat + 15 cem konz. NH_4OH auf 1 l) in der Hitze behandelt, wobei das Pb in Lsg. geht. Zum Filtrat werden 7 cem konz. H_2SO_4 zugefügt, zum Entweichen von SO_3 erhitzt, auf 100 cem verd. u. 5 cem konz. H_2SO_4 gegeben. Nach dem Erkalten wird mit 10 cem A. versetzt, filtriert u. als Sol gewogen. — Nach dem Lösen mit Ammoniumacetat kann das Blei auch Chromat gefällt u. gewogen werden. (Engin. Mining. Journ.-Press **119**. 170.) ENSZL

Kurt Röhre, *Über die Destillation des Arsen(3)-, Antimon(3)- und Zinnchlorids*. Zur Beschleunigung der Dest., speziell des AsCl_3 , muß sein Partialdruck erhöht werden durch Temp., Konz. des in Lsg. vorhandenen undissoziierten Arsens oder aber durch aussalzende Zusätze, durch deren Hydratation der Lsg. W. entzogen wird. Stark wasserbindende Stoffe verdienen bei sonst gleicher Löslichkeit in HCl vor anderen den Vorzug. Größere Mengen von Zusätzen können außerdem auch den Kp. der Lsg. stark erhöhen, was die Dest. günstig beeinflusst. Es wurde zunächst der Einfluß bestimmter Zusätze auf den Dampfdruck des Arsens bei Zimmertemp. durch Ausschüttelungsverss. mit CCl_4 untersucht. Sowohl durch Erhöhen der HCl-Konz. in der Lsg., insbesondere bei einer Gehaltssteigerung desselben vom 7- auf das 8-fache, als auch durch Zusätze von H_2SO_4 , H_3PO_4 , CaCl_2 oder AlCl_3 eine bedeutende Erhöhung des Partialdampfdruckes von AsCl_3 in der Lsg. As geht auch bei höheren HCl-Konz., als AsCl_3 u. nicht als ein Komplex wie etwa H_3AsCl_6 über. Zusatz von H_2SO_4 zu HCl steigerte jedenfalls durch die stärkere Wasserbindungsvermögen die Wrkg. erheblich, als ein Mehr an HCl von gleicher Stärke. — Destillationsverss. bei Siedetemp. der Lsg. ergaben eine Beschleunigung u. bestimmtere Regelung des As-Überganges durch genannte Zusätze. Einzelheiten werden erörtert. Bei HCl-Zusatz ist eine starke Vorkonz. der Lsg. (bis zum Entweichen von HCl-Gas) dazu notwendig. Die Destillationswerte von den angewandten absoluten As-Mengen u. von der Geschwindigkeit der Dest. unabhängig. Mit wachsender Menge des Zusatzes eine stark zunehmende wasserbindende Kraft u. somit HCl u. As herausdrängende Wrkg. von H_2SO_4 , CaCl_2 . As-Übergang durch erhöhte Temp. begünstigt. Die Wrkg. verschiedener Zusätze wurde untersucht. AlCl_3 wirkt ähnlich wie CaCl_2 , H_3PO_4 etwas schlechter als H_2SO_4 . Zusätze wie ZnCl_2 , CdCl_2 , CuCl_2 (keine ausgeprägte wasserbindende Kraft) oder KBr , BaCl_2 (swl. in HCl) zeigen keine Wrkg. — Dest. von Sb u. Sn bei Siedetemp. in analoger Weise nicht möglich infolge von geringer Flüchtigkeit dieser Chloride u. des bei höherer Temp. auftretenden HCl-Mangels in der Lsg. Günstige Einwrkg. des Zutropfenlassens von HBr auf Sb u. besonders Sn-Übergang wurde bestätigt. — Dest. bei Wasserbadtemp. wird bei As durch Anwendung von aussalzenden Zusätzen, speziell von H_2SO_4 u. CaCl_2 begünstigt; SbCl_3 u. SnCl_4 sind bei dieser Temp. auch bei Gegenwart von Zusätzen, praktisch nicht flüchtig. Trennung des As in Form von AsCl_3 von Metallen, deren Chloride nicht flüchtig sind geschieht auf Grund der aussalzenden Wrkg., speziell von H_2SO_4 u. CaCl_2 -Zusatz. Die Arbeitsweise wird beschrieben. Am einfachsten wird die Dest. bei Verwendung von CaCl_2 . In ähnlicher Weise wird die Trennung des As vom Sb bei Wasserbadtemp. beschrieben. Auch die Trennung As-Hg ist auf gleicher Weise durchführbar. — Reduktionsverss. von 5- zu 3-wertigem As u. Sb ergaben, daß aus einer Lsg. von Na_3AsO_4 in konz. HBr bei deren Kp. ein Gemenge von AsBr_3 u. freiem Br übergeht. In der Vorlage findet sich dann infolge Reoxydation des AsBr_3 durch das Br wieder das 5-wertige As vor, von

im Kolben ausgegangen worden war. Bei durch H_2SO_4 -Zusatz erhöhter Temp. u. Zutropfenlassen von HBr zeigt das 5-wertige Sb dasselbe Verhalten; die Wirkung von 3- u. 5-wertigem As u. Sb von anderen Metallsalzen durch Dest. geht also bei Anwendung von HBr ohne eine besondere Reduktion. Von organ. b. wurde bei Pyrogallol in HCl -Lsg. eine starke reduzierende Wrk. gegen 5-wertigem As u. Sb gefunden; Hydrazinsulfat wirkte schwächer; Hydrochinon u. Resorzin waren ungeeignet. Das Auftreten von bei gleichzeitigem HBr -Zug gesteigerter Reduktionskraft von Hydrazinsulfat (vgl. JANNASCH u. SEIDEL Dtsch. Chem. Ges. 43. 1218. [1910]) wurde bestätigt. Die titrimetr. Best. von As mit Bromatlsg. geschah nach ZSCHOKKE; als Reduktionsmittel diente Zn . Die noch h. Lsg. sofort titriert. Bei 2-maliger Red. Resultate befriedigend, daß sich das Übertitrieren u. Zurücktitrieren nach KJ -Zusatz mit $\text{H}_2\text{S}_2\text{O}_8$ -Lsg. notwendig erwies. (Ztschr. f. anal. Ch. 65. 109—28. 1924. Leipzig, Univ.) TENN.

Organische Substanzen.

A. Gutmann, Natriumarsenit, das Reagens auf locker gebundenes Halogen. (Vgl. 1.) Der Nachweis von locker gebundenem Halogen ist mit Na_3AsO_3 , das zu Arsenat, AsO_4 oxydiert wird, leicht durchführbar. Vf. erklärt den leichten Zerfall solcher Verbind. aus der Existenz von dreiwertigem —Hg< , das befähigt ist, H_2O in seine Bestandteile H_2 u. O zu zerlegen, wodurch die B. von Arsenat durch erh. O_2 ermöglicht ist. Als Zwischenphase wird die Entstehung von unterphosphorigsaurem Alkali angenommen. — Wird Jodoform in eine Lsg. von As_2O_3 in 10%ig. NaOH eingetragen, so tritt spontan Rk. ein; nach 1std. Erhitzen ist J. beendigt. Na-Arsenat krystallisiert aus u. wurde mit Magnesiamischung u. verd. saurer KJ -Lsg. nachgewiesen. Außerdem bildet sich Methylenjodid (aus 40 g J. u. etwa 26 g $\text{C}_2\text{H}_5\text{J}_2$). Die Rk. verläuft quantitativ nach der Gleichung:



Violettrotes Dijodphenoljod, $\text{C}_6\text{H}_3\text{J}_2\cdot\text{O}\cdot\text{J<}$, wird durch Na_3AsO_3 -Lsg. erst bei Erhitzen farblos. Nach dem Kochen krystallisiert Na_3AsO_4 . Aus dem Eindampfückstand erhält man mit A. Dijodphenol (F. 69°) erhalten. Hingegen wirkt das isomere, weiße Trijodphenol, $\text{C}_6\text{H}_3\text{J}_3\text{OH}$, auch beim Kochen nicht auf das Arsenit ein, woraus Vf. schließt, daß alles J in letzterer Verb. in einwertiger stabiler Form vorliegt. Acetylbromanilin, $\text{CH}_3\text{CO}\cdot\text{N}\cdot(\text{C}_6\text{H}_5)\cdot\text{Br<}$ wird von warmer Na_3AsO_3 -Lsg. unter B. von Arsenat entfärbt, hingegen nicht das isomere Essigsäure-p-bromanilid, $\text{CH}_3\text{CO}\cdot\text{NH}\cdot\text{C}_6\text{H}_4\cdot\text{Br}$. — Phenyljodidchlorid, $\text{C}_6\text{H}_5\text{J<Cl}_2$ wird beim Erwärmen mit Na_3AsO_3 in Benzol verwandelt, es scheidet sich Na_3AsO_4 aus. — Gelbes Jodosobenzol, $\text{C}_6\text{H}_5\text{O<}$, wird sofort entfärbt unter B. von Jodbenzol. — Weißes Jodobenzol, $\text{C}_6\text{H}_5\text{O}_2$, reagiert mit kalter Arsenitlsg. sehr lebhaft. — Die wss. Lsg. von Essigsäurebromamid, $\text{CH}_3\cdot\text{CO}\cdot\text{NH}\cdot\text{Br<}$ u. die gelbe äth. Lsg. von Dibromurethan, $\text{C}_2\text{H}_5\cdot\text{N}\cdot\text{Br}\cdot\text{Br}$, oxydieren bereits in kalter Arsenitlsg. unter Entweichen von H_2 . Auch die Lsgg. von Chlorstickstoff u. Jodstickstoff werden bereits in der wss. Lsg. entfärbt. Es entweicht NH_3 u. Arsenat krystallisiert aus. — p-Toluolsulfonamidnatrium, $\text{C}_7\text{H}_7\text{SO}_2\cdot\text{N}\cdot\text{Na}\cdot\text{Cl<}$ (Chloramin „Heyden“) oxydiert Arsenit schon bei Zimmertemp. — Dichlorylbenzolsulfamid-p-carbonsaures Na (Pantosept) liefert bei Kochen. — Es reagieren dagegen nicht: Acetylchlorid, Benzylchlorid, Benzoylchlorid. Benzolsulfochlorid u. Toluolsulfochlorid reagieren jedoch unter B. von Arsenat u. benzolsulfinsaurem bzw. toluolsulfinsaurem Na. Im Schwefelchlorür ist Cl nur in der einwertigen Form enthalten, der S dagegen größtenteils in der dreiwertigen Form, das Schwefelbromür soll einen Teil des Broms in abgespaltenen, dreiwertigen Form, den Rest als Bromid in einwertiger Form enthalten. — Jodazid, $\text{N}_3\text{J<}$ reagiert sofort mit Na_3AsO_3 ; es wird Arsenat u. Na-Azid gebildet. Ebenso

verhält sich *Chlorazid*, $\text{N}_3 \cdot \text{Cl} <$. *Jodcyan*, $\text{C} \equiv \text{N} - \text{J}$ reagiert quantitativ nach Gleichung: $\text{CNJ} + \text{AsO}_3\text{Na}_3 + \text{Na}_2\text{O} = \text{CNNa} + \text{AsO}_4\text{Na}_3 + \text{NaJ}$. 1 Mol. (entspricht in der oxydierenden Wrkg. 2 Atomen J oder 1 Atom O. — *Diazobenzchlorid*, $\text{C}_6\text{H}_5 \cdot \text{N} \equiv \text{N} - \text{Cl}$, erzeugt in eiskalter Na_3AsO_3 -Lsg. eine intensiv himbeerfärbung, die nach 10 Min. nach gelbrot u. gelb umschlägt (B. von Bzl.). Auf Zu von A. scheidet sich Na_3AsO_4 aus. Da eine n.-Diazotatlsg. in gleicher Weise. Arsenit einwirkt, ist hier die B. von unterchlorigsaurem Na nicht anzunehmen. Die Oxydation wird durch Spaltung in einen stabilen u. einen labilen Rest gleichzeitiger Hydrolyse erklärt. *i-Diazobenzolkalium*, $\text{C}_6\text{H}_5 \cdot \text{N} : \text{N} \cdot \text{ONa}$, reagiert Na_3AsO_3 nicht. (Ztschr. f. anal. Ch. 246—54. Weißenburg [Bayern].) HORS

Bestandteile von Pflanzen und Tieren.

E. Canals, *Volumetrische Bestimmung des Calciums in mineralischen Stoffen, welche Phosphorsäure, Magnesium, Eisen und Aluminium enthalten.* Das von MELLET u. JUNKER (Schweiz. Apoth.-Ztg. 62. 629. 647; C. 1925. I. 727) behandelte Th. ist schon früher von BLASDALE, MURMANN, QUARTAROLI u. ASTRUC bearbeitet worden. Die Angabe von MELLET u. JUNKER, daß sich die Phosphate vollständig lösen, stimmt für die des Ca u. Mg, aber nicht für die des Fe u. Al; da diese leicht in l. Oxalate umformen lassen (durch NH_4 -Oxalat), ist die obige Angabe weniger schlimm für die Best. Vf. stellt sie nur fest, um Verwechslungen zwischen dem Nd. von gelatinöser SiO_2 u. den Phosphaten des Fe u. Al zu vermeiden, die in Eg. unl. sind. (Schweiz. Apoth.-Ztg. 63. 29—30. Montpellier, Fac. de Pharm.) DIETZ

Baggesgaard-Rasmussen und Schou, *Über die Titration von Alkaloiden.* bestimmten die Titrationskurve für verschiedene Alkaloide derart, daß die eines Alkaloids in einem kleinen Überschuß von Säure mit $\frac{1}{10}$ -n. NaOH aus einer Mikrobürette titriert u. die $[\text{H}^+]$ nach jedem Zusatz von Lauge elektrometr. ermittelt wurde. Dabei fanden die Billmannsche Kinhydronelektrode u. die n. Elektrode von VEIBEL Verwendung. Die Relation zwischen $[\text{H}^+]$ u. zugesetzter Lauge graph. dargestellt. Aus der in dieser Weise gewonnenen Kurve kann man den pH-Wert ersehen, bis zu welchem pH-Wert oder mit welchem Indicator man titrieren darf. Das Resultat kann mittels einer gewöhnlichen colorimetr. Titration verificiert werden. — Strychnin, Brucin, Morphin, Kodein u. Atropin lassen sich mit Methylrot titrieren, Cinchonin mit Methylrot bis pH ca. 5,8, Chinin mit p-Nitrophenol, man bis pH 6,2—6,4 titriert; man erhält dann bas. Salze. Narkotin titriert bis pH ca. 4,5 mit Methylorange. Hydrastin läßt sich schwer genau titrimetrisch mitteln; mit Methylrot als Indicator u. Titration bis pH 4,8 kann man einigermaßen gute Resultate erzielen. (Farm. Tidende 1924. Nr. 47—50; Schweiz. Apoth.-Ztg. 30—31.) DIETZ

E. Kohn-Abrest, *Die Gase im frischen, in Fäulnis übergegangenen und gefrorenen Blute.* Mittels des kürzlich (S. 417) beschriebenen App., der noch Einzelheiten modifiziert wurde, angestellte Unterss. zeigen, daß die Analyse der Gase das beste Mittel ist, um die Frische von Blut u. tier. Material zu prüfen. Durch Gefrieren wird die Fäulnis aufgehalten u. verschwinden mindestens im ersten Wrkgg. (B. von H_2S) ganz. (C. r. d. l'Acad. des sciences 179. 1171—1172. 1924.) SPIEGEL

Cl. Giese und H. Krüger, *Die Prüfung und Auswertung des Malleins.* von SCHNÜBER (Berl. tierärztl. Wehschr. 1910. 262) sowie von SCHREIBER u. STICKDORN (Berl. tierärztl. Wehschr. 1915. Nr. 47) angegebenen Verff. zur Auswertung des Malleins sind nicht zuverlässig. Es ist wahrscheinlich möglich, auch dem amtlichen Tuberkulinprüfungsverf., das Mallein an rotzinfizierten M

sinnen auszuwerten. Für die Praxis ist die Methode jedoch zu teuer. (Arbb. Reichsgesundheitsamt 55. 45—61. 1924.) BORINSKI.

Ekkert, *Über eine Farbenreaktion des Pilocarpins*. Mengt man zu 1 ccm 1%ig. wss. Lsg. des Pilocarpinhydrochlorids erst 1 ccm frisch bereitete Nitrocid-Na-Lsg., dann 1 ccm n. NaOH, säuert darauf die gelbe Fl. nach einigen mit verd. HCl an, so färbt sich die Fl. sofort weinrot bis rubinrot. Fügt man zur Hälfte dieser roten Fl. einige Tropfen $\frac{1}{10}$ -n. Na₂S₂O₃-Lsg., so wird die in kurzem lebhaft grün, während die andere Hälfte der roten Fl., mit einigen Tropfen H₂O₂ (3%) versetzt, sich sofort schön karminrot färbt. Verwendet man 1 Tropfen der Pilocarpinlsg. = ca. 0,002 g Pilocarpinhydrochlorid, so färbt die gelbe Fl. bei dem Ansäuern mit HCl sofort weinrot; selbst bei Verwendung nur 0,0002 g wird die Fl. noch deutlich rot. (Pharm. Zentralhalle 66. 36. pest, Univ.) DIETZE.

H. Angewandte Chemie.

II. Gewerbehygiene; Rettungswesen.

Charles E. Munroe, *Bekannte historische Nitratbrände*. Vf. schildert einige Fälle, aus denen zu lernen ist, daß Nitrate zwar an u. für sich gefahrlos sind, brennbare Stoffe von ihnen ferngehalten werden müssen. (Chem. Metallurg. Engineering 31. 962—966. 1924. Washington.) JUNG.

—, *Nitrat-Brand in Jersey-City*. Der Brand in einer Salpeterfabrik lehrt, daß bei der Handhabung von Nitraten die Berührung mit Holz- u. anderen brennbaren Stoffen wegen Feuersgefahr zu vermeiden ist. (Chem. Metallurg. Engineering 31. 966—967. 1924. Washington.) JUNG.

George S. Rice, *Die Anwendung des Steinstaubes oder Felsstaubes zur Verhütung von Kohlenstaubexplosionen in Großbritannien und Frankreich*. Bericht über Versuche u. Unterss. in Deutschland, Amerika, England u. Frankreich. (Bureau of Mines. Bulletin 225. 54 Seiten. 1924. Sep.) JUNG.

K. Erslev, Nijmegen, Holland, *Staublöschmittel*. Man emulgiert bituminöse Stoffe mit W. u. Eiweißstoffen (Milch, Blut, Blutserum u. dgl.) (E. P. 225587 vom 6/6. 1923; ausg. 31/12. 1924.) KAUSCH.

Friedrich Emil Krauss, Schwarzenberg, S., und **Wilhelm Graaff**, Berlin, *Überzug für Feuerlöscher*, dad. gek., daß der Feuerlöscher bezw. dessen Zubehör mit einem aus einer quellenden Schicht bestehenden Überzug versehen ist, bei dem auf diesen Überzug noch eine, z. B. aus einem elast. bleibenden Lack bestehende Deckschicht aufgebracht sein kann. — Undichtigkeiten machen sich durch Leckstellen des bezw. der Überzüge bemerkbar. (D. R. P. 407709 Kl. 75c vom 14/12. 1922, ausg. 22/12. 1924.) KÜHLING.

Otto Fr. Beckh, Berlin, *Patrone, welche die zum Nachfüllen von Naßhandfeuerlöschern notwendigen Chemikalien enthält*, dad. gek., daß die Säuretube rings um den zur Füllung des Feuerlöschers notwendigen, in Verb. mit Säure CO₂ entwickelnden Salz umgeben ist. — Säureschäden werden vermieden. (D. R. P. 404326 vom 16/11. 1923, ausg. 16/10. 1924.) KÜHLING.

IV. Wasser; Abwasser.

C. W. Foulk, *Schäumen von Kesselwasser*. Vf. hat die Einw. verschiedener Salze u. Verbb. sowie suspensierter Teilchen auf das Eintreten oder Ausbleiben des Schäumens eingehend studiert. Gesetzmäßigkeiten lassen sich aus den erhaltenen Resultaten bisher nicht ableiten. Als bestes Mittel zur Verhütung des

Schäumens erwies sich *Ricinusöl*. (Journ. Ind. and Engin. Chem. 16. 1121-1924. Columbus [Oh.]) GRIMM

Joh. Neide, *Neue Gesichtspunkte über Speisewasserreinigung*. (Zentralbl. Hütten u. Walzw. 29. 24-25, — C. 1925. I. 878.) JUN

A. Frederking, *Neue Gesichtspunkte über Speisewasserreinigung*. Vf. weicht gegen eine kürzlich erschienene Behauptung von NEIDE (vorst. Ref.), daß der Kesselreinigung nicht der Gips, sondern der kohlen saure Kalk zu bekä sei. (Die Wärme 48. 10-11. Magdeburg.) SPLITTGERBER

Janata, *Abwässer der Papierfabrikation*. Angaben über das Verhältnis zwis Fabrikationswasser- u. Fasermengen u. seine Veränderlichkeit, über Wege zur minderung von Stoffverlusten, Waschvorgang u. Abwasser, Entwässerung u. S verluste bei Lang- u. Rundsieb, Sammeln der Abwässer u. ihre Behandl Stoffwiedergewinnung, Trichterfilter u. ihre Arbeitsweise sowie Kontrolle Abwässer. (Papierfabr. 22. Verein der Zellstoff- u. Papier-Chemiker u. -Ingeni 594-96. 601-4. 1924.) SÜVER

Fleck und Heilmann, *Die Versuchsberechnung mit Abwässern in Dres* Vf. berichten über günstige Ergebnisse mit der Berechnung mit Abwässern. sundheitsingenieur 48. 6-8. Dresden.) JUN

J. v. Darányi, *Die Anwesenheit von hydrophilen Kolloiden im Trinkwa* Vf. hält den Nachweis von hydrophilen Kolloiden im Trinkwasser bei der örtlic Besichtigung einer Wasseranlage für eine einfach durchführbare Methode, we über die Verunreinigung eines Wassers noch vor der chem. u. bakteriolog. Un brauchbaren Aufschluß gibt. Einzelheiten der Methode vgl. Original. (Dtsch. Wehschr. 51. 23-24. Budapest, Staatl. Bakteriolog. Institut.) FRAN

Ludwig Fleischer, *Die Verwendbarkeit der elektrischen Leitfähigkeit für Trinkwasseruntersuchung, besonders für die Härtebestimmung*. Bei Kenntnis Cl-Gehaltes u. der Carbonathärte kann man bei Trinkw., das keine freien Sä oder Alkalien, keine Alkalidicarbonate u. nicht > 100 mg Cl oder 30 mg N enthält, aus der elektr. Leitfähigkeit die Härte bestimmen nach der Fo Härte = $\frac{L - 3\text{Cl} - 20 + K(F_s - F_k)}{F_s}$, worin $L = x_{18} \times 10^6$ (x = Leitfähigkeit

Cl = Cl-Gehalt (mg in 1 l), K = Carbonathärte in deutschen Härtegrä F_s = Faktor für die Leitfähigkeit von 1° Sulfathärte, F_k = desgleichen für Carbonathärte. — Bei Cl- oder NO₃-reichen Wässern, deren Härte gewichtsant bestimmt wurde, läßt sich mit Hilfe der Leitfähigkeit feststellen, ob diese I in größerer Menge als Erdalkalisalze vorliegen. — Schließlich läßt sich bei meisten Trinkwässern unter bestimmten Voraussetzungen durch Multiplikation x mit dem Faktor 0,6 mit recht befriedigender Genauigkeit das Gewicht des wa freien, Salzzückstandes (mg in 1 l) ermitteln. (Ztschr. f. Hyg. u. Infekt.-Krankh. 157.-75. Göttingen, Univ.) SPIEGE

G. Poirot, *Über den Nachweis von Kupfer im destillierten Wasser*. Die frisch bereiteter Lsg. von Guajakharz mit Cu-Salzen (vgl. IMBERT u. PILGR Bull. Sciences Pharmacol. 31. 83; C. 1924. I. 2724) tritt auch in Ggw. von I ein. Vf. benutzt durch Ausziehen von 100 g Rohharz mit 200 ccm h. 95%ig. u. Verdampfen der h. filtrierten Lsg. gereinigtes, bei 100° getrocknetes Guajak Die Lsg. desselben läßt sich konservieren durch Zusatz von Pyridin, das zugl die Farbe der Rk. vertieft. Benutzt wird eine Lsg. von 10 g des gereinigten Ha in farblosem Pyridin zu 100 ccm (in gelben Flaschen mit eingeschliffenem Stop zu verwahren). Davon werden 0,2 ccm erst mit 3 Tropfen H₂O₂-Lsg. (100 Vol.-% mit redest. W. 1:10 verd.), dann mit 10 ccm 95%ig. A., schließlich mit 10 der zu prüfenden Lsg. versetzt u. geschüttelt. Die Empfindlichkeit geht bis 1

100 Millionen Teilen W. Es konnte so in einer ganzen Anzahl von Proben dest. W. aus Handel u. Laboratorium Cu nachgewiesen werden. (Journ. n. et Chim. [7] **30**. 393—99. 1924. Paris, Fac. de pharm.) SPIEGEL.

Ernst Otto Scheidt, Werder; Havel, *Mehrstufiges Kreisfilter mit nachfolgender Druckfiltration*, dad. gek., daß der Durchfluß des zu filtrierenden W. durch die Stufenfilter mit stets abnehmender Geschwindigkeit erfolgt. — Die Verengungen können sich infolge dieser Konstruktion parallel der Zurückhaltung der Schwebeteile u. der abnehmenden Geschwindigkeit absetzen. (D. R. P. **21** Kl. 85b vom 15/11. 1923, ausg. 5/1. 1925.) OELKER.

William Swan Elliott, Pittsburgh, V. St. A., *Entfernen von Luft und Gasen aus Flüssigkeiten, insbesondere Wasser*. (D. R. P. **405853** Kl. 13b vom 7/3. 1920, 12/11. 1924. A. Prior. 31/3. 1915. — C. **1921**. II. 630.) OELKER.

Karl Schnetzer, Obersiedlitz b. Aussig a. E. (Tschechoslowakei), *Verhütung Kesselsteinansatzes in Dampfkesseln, Verdampfern, Vorwärmern u. dgl.* — Es werden an möglichst weit auseinanderliegenden Stellen des zu schützenden Wasserrohrs die Pole einer Gleichstromquelle angelegt, deren Spannung um ein Beträgliches unterhalb der Zersetzungsspannung der Fl. liegt, u. zwar jedenfalls geringer als die Hälfte der Zersetzungsspannung beträgt. — Als Stromquelle können Elektroelemente verwendet werden, deren Erregung durch h. Teile des Kessels erfolgt. (Schwz. P. **107069** vom 10/11. 1923, ausg. 1/10. 1924. Tschechoslow. Pat. 7/12. 1922.) OELKER.

Elektro-Osmose Akt.-Ges. (Graf Schwerin Ges.), W. Ruppel und W. Dietrich, Berlin, *Wasserreinigung*. (E. P. **211562** vom 20/11. 1922, ausg. 20/3. 1924. — 1924. I. 228.) OELKER.

L. Girard, Paris, *Behandlung von Abwasser*. Das Abwasser wird in einem Behälter, dessen Scheidewände in mehrere Abteilungen geteilten Behälter in bekannter Weise durch einen Faulprozeß unterworfen. Die sich dabei entwickelnden Gase werden aus dem Behälter durch einen Teil der Faulkammern direkt oder indirekt in das umgebende Erdreich oder in einen mit Steinen u. einer darüber liegenden Erdschicht gefüllten Graben geleitet, während die behandelte Fl. durch ein Koks- oder Torfbett filtriert wird. (E. P. **307** vom 15/2. 1923, ausg. 18/4. 1923. Prior. 15/2. 1922.) OELKER.

L. E. Rogers, London, *Behandlung von Abwasser*. Das Abwasser wird unter einem Druck zunächst durch mehrere Absetzbehälter u. dann durch mehrere mit Aktivkohle beschickte Filter geleitet, wobei die Weiterleitung des W. von einer Reinigungsstufe zur anderen durch intermittierenden Zufluß der Fl. in die erste erfolgt. (E. P. **203498** vom 14/8. 1922, ausg. 4/10. 1923.) OELKER.

VI. Glas; Keramik; Zement; Baustoffe.

D. J. van Wyk, Jr., *Angriff feuerfester Materialien durch Verbrennungsprodukte*. Beschränkt sich kürzestens auf Chamotte als das gebräuchlichste feuerfeste Material, u. Steinkohle, in einer modernen Kesselfeuerungsanlage verfeuert. 1. Zusammensetzung der Chamotte u. ihr Verh. beim Erhitzen. Die chemische Analyse sagt nichts aus über Bau, Verh. u. Eigenschaften. Die rationelle Analyse zeigt, daß zu Quarz, Feldspat, Tonsubstanz; diese drei Stoffe sind sozusagen nebenher vorhanden. In der Tonsubstanz können Al, Si u. H teilweise ersetzt werden durch Fe, Ti, Na oder K oder Ca. Bei 800° reagieren Al_2O_3 u. SiO_2 miteinander; diese Rk. ist bei 1050° besonders stark u. führt zur B. von Mullit ($Al_2O_3 \cdot 2SiO_2$). Die herrschende Ansicht, daß Sillimanit ($Al_2O_3 \cdot SiO_2$) sich bildet, ist nach BOWEN u. GREIG (Journ. Amer. Ceram. Soc. **7**. 238; C. **1924**. II. 297) nicht zutreffend. Mullit ist sehr beständig u. schmilzt bei ca. 1810°. Eine zweite Meinung ist die B. von Silikaten mit Na, K, Ca u. Fe. Diese Silikate lösen

sich zwischen 900° u. 1200° in den SiO₂-Krystallen auf. Der bis auf 1300° erhf. feuerfeste Ton enthält demnach SiO₂ (als Tridymit), Mullit, andere Metallsilik. gel. in SiO₂; letztere Lsgg. umhüllen als glasige Masse die beiden ersten St. 2. Die schwachen Punkte der Chamotte. Diesbezüglich werden erwä. die Porosität, die in SiO₂ gel. Metallsilikate, freier Quarz. Eine gewisse Porosität ist erforderlich hinsichtlich der prakt. auftretenden Temperaturschwankungen. Niedrig schmelzende Metallsilikate verursachen frühzeitiges Erweichen der M. Freie SiO₂ wird bei den in Kesselfeuerungen herrschenden Tempp. durch Schl. angegriffen. Verss. im Laboratorium für Tonindustrie (Berlin) zeigten, daß St. mit dem höchsten Al₂O₃-Gehalt, also mit der wenigsten freien SiO₂, dem An der Schlacke am besten standhielten. 3. Die offensiven Elemente in Verbrennungsprodd. u. ihre Wrkg. auf feuerfestes Material. Als Verbrennungsprodd. werden genannt: Die Rauchgase, hauptsächlich CO₂, O₂ u. die keinen nennenswerten Einfluß auf feuerfeste Materialien ausüben; die Asche (Schlacken). Die Schlacken enthalten einen großen Prozentsatz Fe- u. Ca-Silikate, die sehr leicht schmelzbar sind. Geraten glühende Ascheteilchen mit dem gleichen Aschegehalt in glühenden Mauerwerk in Berührung, so werden die Fe- u. Ca-Silikate der Asche die SiO₂-Moll. der feuerfesten Masse angreifen u. damit wieder leicht schmelzbare Lsgg. bilden. Letztere tropfen aus dem Mullitskelett heraus. Diese W. schreitet immer weiter u. kann bis zur vollständigen Zerstörung des feuerfesten Mauerwerks führen. Asche bzw. Schlacke ist daher das gefährliche Element u. den Verbrennungsprodd. Vf. warnt gegen die Verwendung minderwertiger Brennstoffe. Besonders Braunkohlen, deren Schlacke einen hohen Fe- u. Ca-Gehalt wirken verheerend. In diesem Zusammenhange wird die große Bedeutung der Ascheanalyse hervorgehoben. 4. Mittel zwecks Beschränkung der nachteiligen Einflüsse. Das Verhältnis von Al₂O₃ zu SiO₂ soll möglichst dem Mullit (70% Al₂O₃, 29% SiO₂) entsprechen, soweit dies mit den Forderungen der Praxis in Einklang zu bringen ist. Der Gehalt an Flußmitteln (Fe-, Na-, K-Ca-Silikate) soll möglichst niedrig gehalten werden. Die Porosität soll unter Berücksichtigung der Temperaturschwankungen so klein wie möglich sein. — Zusammenfassung ergibt sich, daß für eine moderne Kesselfeuerungsanlage feuerfester Stein am geeignetsten ist, der nicht schwindet, möglichst hohen Al₂O₃-Gehalt u. möglichst geringe Porosität besitzt. (Chem. Weekblad. 22. 16—18.) K.

R. Rieke, *Die Umwandlung von Flint in amorphen Quarz*. Es wird auf die Arbeit von GRÜN (Stahl u. Eisen 44. 883; C. 1924. II. 2291) erwidert, daß längst bekannt ist, daß Flint sich beim Erhitzen schneller umwandelt als die gewöhnlichen Quarzvorkommen u. daß die Annahme des Auftretens von Cristobalit durch die Feststellungen GRÜNS, daß Flint oberhalb 1300° amorph würde, nicht widerlegt wird. Es folgt dann eine 2. Erwiderung. (Stahl u. Eisen 44. 1775—76. 1924. Charlottenburg.) WILK.

R. Grün, *Die Umwandlung von Flint in amorphen Quarz*. Auf die Bemerkung von RIEKE (vorst. Ref.) wird festgestellt, daß die für die Umwandlungen notwendigen günstigen Tempp. u. Erhitzungszeiten untersucht wurden, um für die Praxis billiges Ausgangsmaterial für hochfeuerfeste Steine zu gewinnen. (Stahl u. Eisen 44. 1776—77. 1924. Düsseldorf.) WILK.

Merz & McLellan, Newcastle-upon-Tyne und London, *Betrieb eines Zementbrennofens*. (D. R. P. 408494 Kl. 80c vom 21/2. 1922, ausg. 21/1. 1925. E. P. 17/3. 1921. — C. 1922. IV. 828.) KÜHLIN

Eberhard Zschimmer und Paul Askenasy, Karlsruhe, *Herstellung von Glases*, bestehend aus Al₂O₃, SiO₂, B₂O₃ u. BaO, dad. gek., daß der Glassatz solcher Weise zusammengestellt wird, daß das fertige Glas in 1 Gewichtsteil

mindestens $\frac{1}{3}$ Al_2O_3 , mindestens $\frac{1}{3}$ SiO_2 , höchstens $\frac{1}{6}$ B_2O_3 u. als Rest — Die Gläser sind zur Herst. *elektr. Isolatoren* geeignet. Vor Porzellan-
oren sind sie durch Billigkeit ausgezeichnet. (D. R. P. 407792 Kl. 32b vom
1922, ausg. 22/12. 1924.) KÜHLING.

Axel E. Bertelson, New York, *Glassschwamm*. Faserförmiges Glas o. dgl.,
Glaswolle, wird mit einem Stoff, welcher nicht unterhalb des F. des Glases
u. auch bei dieser Temp. nicht chem. auf Glas wirkt, z. B. NaCl oder CuS ,
nicht u. die Mischung bis zum beginnenden Schmelzen des Glases erhitzt. Hierbei
t das Glas zu einer schwammförm. M., aus der das Füllmittel durch ein ge-
tes Mittel, z. B. W. oder Säure, herausgel. wird. (A. P. 1515653 vom 7/11.
ausg. 18/11. 1924.) KÜHLING.

Bausch & Lomb Optical Company, übert. von: **Robert J. Montgomery**,
ester, V. St. A., *Optische Gläser*. Mehr als 30% BaO enthaltende Gläser konnten
r nur ausnahmsweise frei von Luftbläschen erhalten werden. Dieser Übel-
r wird gemäß der Erfindung durch Zusatz von 0,3—3% Sb_2O_3 zum Glassatz
ieden. Größere Mengen von Sb_2O_3 dürfen nicht verwendet werden, weil sie
Glase gelbe Färbung erteilen, welche die Lichtdurchlässigkeit beeinträchtigt.
1513923 vom 2/4. 1923, ausg. 4/11. 1924.) KÜHLING.

J. V. Glasfabriek „Leerdam“ v/h. Jeekel Mijnsen & Co., Leerdam, Holland,
hartes Material. (Schwz. P. 106960 vom 19/7. 1923, ausg. 16/9. 1924. Holl.
4/8. 1922. — C. 1924. I. 93 [E. P. 201880].) KÜHLING.

Thomas Rigby, London, *Trocknung von Zementrohschlamm* vor seiner Ein-
ung in einen Drehrohr- oder sonstigen Ofen, während er zu einer Schicht aus-
eitet ist, dad. gek., daß er stetig als sehr dünne gleichförmige Schicht auf die
fläche (z. B. die Außenfläche einer innen beheizten rotierenden Trommel) eines
ofbeheizten Trockners aufgebracht u. in trockenem Zustand entfernt wird, u.
unter Benutzung eines Trockners bekannter Art, bei welcher die Verdampfung
nem geschlossenen Gehäuse erfolgt, aus dem der aus der M. entwickelte
pf, wesentlich frei von nicht kondensierbaren Gasen, abgesaugt u. in einem
ensensor oder in einem anderen Trockner, der in Vielfachwrkg. mit dem ersten
unden ist, oder zu einer Vorr. geleitet wird, in welcher der Dampf komprimiert
u. um ihn erneut als Heizdampf zu verwenden. (D. R. P. 407170 Kl. 80b vom
1922, ausg. 15/12. 1924. Teilref. nach F. P. 565924 vgl. C. 1924. I. 2734.) KÜ.

Heinrich Müller, Gelsenkirchen, *Herstellung von Hochofenzement, Eisen-
rindzement u. dgl. unter Verwendung von Naturklinker*, dad. gek., daß die trockene
rofenschlacke anstatt mit Portlandzementklinker mit hochprozentigem gesinter-
n Kalkstein möglichst heiß vermahlen wird. — Der CaO braucht nicht gelöscht
werden. (D. R. P. 407654 Kl. 80b vom 30/6. 1921, ausg. 22/12. 1924.) KÜ.

Harbison-Walker Refractories Company, übert. von: **Robert H. Youngman**,
tburg, V. St. A., *Neutraler Zement*. Fein gepulvertes Chromerz wird mit eben-
l fein gepulvertem Natriumsilicat, gegebenenfalls unter Zusatz von Dextrin,
ait, Diaspor oder Ton gemischt. Zum Gebrauch wird die Mischung mit etwa
8% W. vermengt. Sie bindet innerhalb weniger Stunden ab u. liefert ein feuer-
es Bindemittel. (A. P. 1514812 vom 26/8. 1921, ausg. 11/11. 1924.) KÜHLING.

Hubert Löscher, Halanzý, Belg., *Herstellung von Mörtelbindemitteln aus Hoch-
schlacke*, 1. dad. gek., daß die abgestochene fl. Schlacke auf dem Wege in einen
melzofen mit Zuschlägen vermischt u. die Mischung in dem Schmelzofen bis
u Dünflüssigkeit durchgeschmolzen u. in dünnfl. Zustände mit einer geringen
ge W. zusammengebracht wird, die gerade zur Erzielung trockener Körnung
eicht. — 2. dad. gek., daß die Vermischung von fl. Schlacke u. Zuschlagstoffen
u. zwangsläufig verbundene Schieber geregelt wird. — Es werden unter spar-

samstem Wärmearaufwand Erzeugnisse von bisher unerreichter Gleichmäßigkeit zielt. (D. R. P. 407410 Kl. 80b vom 6/4. 1922, ausg. 12/12. 1924.) KÜHLIN
Buffalo Refractory Corporation, Buffalo, übert. von: **John L. Ohn**
 Niagara Falls, *Feuerfeste Massen*. (A. P. 1479107 vom 1/11. 1917, ausg. 1924. — 1924. II. 531.) KÜHLIN

Kate M. Widmer und **Harriet P. Bain**, übert. von: **Ardon M. Mitch**
 New York, *Geformte Massen*. Kohlenasche wird mit der gleichen Menge W. dämpft, sorgfältig mit fein gepulvertem NaOH vermischt u. unter Druck gefe. Es können Bausteine, Pflastersteine, Rohrmüllungen u. dgl. hergestellt werden, die sich durch hohe Wärmeisolerfähigkeit auszeichnen. (A. P. 1513922 vom 1923, ausg. 4/11. 1924.) KÜHLIN

VII. Agrikulturchemie; Düngemittel; Boden.

A. v. Nostitz, *Zur Bedeutung der basisch austauschbaren Bodennährstoffe für die Pflanzen und über Einwirkung des Kalkes auf die absorbierenden Bodenkörper*. Vegetationsverss. in Hohenbecker Glassand, bei denen K, Na, Mg u. NH_4 ganz oder teilweise in Form künstlicher Al-Silicate, welche durch Beträufeln u. nachheriges Auswaschen von Permutit mit den Chloriden obiger Elemente hergestellt worden waren, oder als l. Salze gegeben wurden, sowie die chem. Unters. der Permutite vor u. nach Beendigung der Vegetationsverss. ergaben, daß bei reichlicher Düngung mit diesen Permutiten die Versuchspflanzen ihren Bedarf an Nährstoffen direkt aus der absorptiven Bindung decken konnten, doch zeigte Düngungsverss. mit geringeren Permutitgaben, daß nur ein geringer Teil der adsorbierten Nährstoffe den Wurzeln zugänglich ist. Durch CaCO_3 wird der Anteil wesentlich erhöht u. der Zers. der Permutite wesentlich entgegen gewirkt. Folgt aus seinen Ergebnissen, daß unter natürlichen Verhältnissen ohne die Möglichkeit eines Basenaustausches die bas. gebundenen Nährstoffe den Wurzeln wesentlich nur durch den Angriff der Absorptionsträger u. damit auf Kosten der Absorptionskraft des Bodens zugänglich sind, u. die im Boden vorhandenen sorptiv gebundenen Nährstoffe den Kulturpflanzen ohne Basenaustausch zu einer genügenden Ernährung kaum ausreichen werden. Bei Ggw. von CaCO_3 wird der Zers. der zeolithähnlichen wasserhaltigen Al-Silicate sehr stark verhindert. (Landw. Vers.-Stat. 103. 159—77. München, Forschungsanst. f. Bodenkunde.) BERJ

F. Honcamp, **E. Kochs**, **E. Müller** und **W. Schramm**, *Über die Beeinflussung der Rohfaserverdaulichkeit durch die Zusammensetzung der Futterration*. Bei Futterverss. an Hammeln wurde nach Beigabe eiweißreicher Futterstoffe eine gesteigerte Vergärung der Rohfaser in den Rauhfuttern nicht beobachtet, u. war die getrennte u. zeitlich möglichst auseinander liegende Verfütterung von Kohlehydraten einseitig u. eiweißreichen u. Rauhfutterstoffen andererseits ohne erheblichen Einfluß auf die Verdaulichkeit sowohl des Gesamtfutters als auch der einzelnen Nährstoffgruppen. Dasselbe ist auch der Fall, wenn man zu den kohlehydratreichen Futterstoffen im Sinne der getrennten Verfütterung noch bereits vergorenes Material, eingesäuertes Rübenblatt oder Sauerschnitzel beifüttert. (Landw. Vers.-Stat. 1179—208. Rostock.) BERJ

VIII. Metallurgie; Metallographie; Metallverarbeitung

D. H. Andrews und **John Johnston**, *Die Anwendung der idealen Löslichkeitskurve auf die Interpretation des Gleichgewichtsdiagramms in Metallsystemen*. Frühere Veröffentlichung (Metal Ind. [London] 25. 276; C. 1924. II. 2552) war Auszug dieser Arbeit. (Journ. Inst. Metals 32. 385—405. 1924. Yale Univ.) WIL

J. Czochralski, *Metallkunde und physikalische Forschung*. Vf. gibt einen zusammenfassenden geschichtlichen Überblick über die Zusammenhänge zwischen

ik u. Metallkunde, über die Erforschung der Fließvorgänge in Metallen, noden zur Darst. der zu seinen Verss. verwendeten Metalleinkristalle u. über Ergebnisse der Röntgenstrahlenanalyse u. Methoden der dislozierten Reflexion der Unters. von Fließerscheinungen u. Gitterstörungen in den Metallkristallen. hr. f. Metallkunde 17. 1—11. Frankfurt a. M.) BECKER.

Platzel, *Die Nutzbarmachung der Schwimmaufbereitung für Fahlerze der Gewerkschaft Gottesgabe, Aurora und Seifenroth, Roth (Kreis Biedenkopf) nach dem Verfahren Gröndal-Dr. Franz*. Das Fahlerz tritt auf als sogenanntes Antimon-Fahlerz (Sphalerit, $3\text{Cu}_3\text{SbS}_3$; $\text{CuFe}_2\text{SbS}_4$), das silberhaltig ist u. weist eine stahlgraue, ins Eisenschwarze übergehende Farbe auf. Die Schwimmaufbereitung ist eine sonst übliche. Besonderheiten der Anlage sind der sog. Reichschäumer, der jedem verhältnismäßig langsam flotierenden Fahlerz die reicheren Partien ausnimmt, während die tiefer stehenden parallel geschalteten Nachschäumer den Abzug des App. umschäumen, dann das Rotationsgebläse, der Präzisionsöler, die Kugelmühle u. Rohrmühle, der Schüttelkipper u. a. m. Vf. schlägt zur Verbilligung der Produktionskosten, ein Abstoßen von Bergen auf naßmechan. Weise zur Zuführung in die Kugelmühle vor. (Metall u. Erz 22. 1—11. Roth.) WILKE.

P. Holtzhausen, *Vergleich einer Wärmebilanz eines gewöhnlichen Kupolofens mit der eines Schürmann-Ofens*. (Gießereiztg. 21. 497—504, 520—25. 1924.) NEUFELD.

—, *Der neue AEG-Härteofen*. Beim neuen Salzbad-Härteofen fallen die bisher notwendige sekundäre Umschaltung u. damit die Schalttafel u. schweren Kupfergehäusen fort, so daß hauptsächlich nur noch ein für Drehstrom eingerichteter Transformator u. ein Ofen benötigt werden. Damit wird einfachste Aufstellung, billigeres Anheizen u. 25—40% Verbilligung erreicht. (AEG-Mitteilungen. 1924. 55—67. Berlin.) WILKE.

A. Stadeler, *Beiträge zur Eisenhüttenchemie*. (Januar bis Dezember 1923). Allgemeine Übersicht über die Neuerungen im Jahre 1923 im allgemeinen, Apparate- und Vorrichtungen u. über die Unterss. von Roheisen, Stahl, Erzen, Schlacken, Zulegungen, feuerfesten Stoffen, Metallen u. Metallegierungen, Brennstoffen, Gasen, Ölen u. a. m. (Stahl u. Eisen 44. 1411—15. 1457—60. 1924.) WILKE.

M. Bamberger, O. Einerl und J. Nußbaum, *Untersuchungen über technisches Ferrosilicium*. Vff. unterss. Fe-Si-Gemenge von 35—73 Gewichts-% Si = 52 bis 73 Atom-% Si. Sie gingen nicht von reinen Bestandteilen sondern von 2 Proben techn. Ferrosilicium aus, die 1. 26,15% Fe, 73,1% Si, 0,31% Al, 0,15% Mn, 0,17% Cu, 0,1% Ca, 0,011% P u. 2. 50,73% Fe, 48,3% Si, 0,38% Al, 0,28% Mn, 0,15% Ca, 0,01% P enthielten u. nötigenfalls mit reinem Fe zusammengeschmolzen wurden. Die Legierungen zwischen 35 u. 45% Si einerseits von 56—73% Si andererseits waren beständig, während solche von 46—55% Si hygroskop. sind u. an der Luft mit B. giftiger Gase (PH_3 usw.) in kleine Stücke zerfallen. Durch Abschrecken gelang es, auch diese Legierungen kompakt zu erhalten u. anzuschleifen. Sie wurden durch Eintauchen in ein Gemenge gleicher Teile konz. HF u. HNO_3 geätzt. Zugleich ausgeführte therm. Unters. bestätigte mit den Schmelzbildern zusammen die Existenz der Verb. FeSi_2 (mit 50,4 Gew.-% Si), F. 1270°. Bei 45,7 Gew.-% Si existiert ein Eutektikum zwischen FeSi u. FeSi_2 , F. 1200°; ein weiteres Eutektikum bei 5,4 Gew.-% Si zwischen FeSi_2 u. Si, F. 1215°. Die Verb. FeSi_2 kristallisiert lamellar u. hat jene auffallende geringe mechan. Festigkeit. Allerdings sind zur Herstellung gewisse Verunreinigungen notwendig, um sie zur Ausscheidung zu bringen. (Stahl u. Eisen 45. 141—44. Düsseldorf.) LÜDER.

Emil Schütz, *Das Graphiteutektikum im Gußeisen*. Zwecks Darst. des Graphiteutektikums des Systems Fe-C wurden techn. Fe-Proben mit 1,9, 2,5, 3,0 u. 3,5% Si verschieden schnell abgekühlt, u. zwar in Stäbe von 20 mm, 15 mm, 10 mm ϕ in


Sand u. in Kokillen gegossen, ferner in W. von 35° u. in Eiswasser. Das Graphit-Eutektikum trat auf bei Proben mit 3,0% Si, u. zwar bei dem in Sand gegossen Stabe von 10 mm ϕ u. den in Kokillen gegossenen Stäben von 30 u. 20 mm. Die Proben mit 3,5% Si wiesen sämtlich Graphit-Eutektikum auf, mit Ausnahme des in Sand gegossenen Stabes von 30 mm ϕ u. der in Eiswasser abgeschreckte Probe. Der in die Kokille von 30 mm ϕ gegossene Stab bestand aus reinem Graphit-Eutektikum. Die B. desselben ist also an eine bestimmte Abkühlungsgeschwindigkeit gebunden. Dieser Stab hatte eine Zugfestigkeit von 36 kg/qmm u. nach einstündigem Erhitzen auf 850° eine Biegefestigkeit von 85 kg/qmm. (Stahl Eisen 45. 144—47. Leipzig.)

LÜDDE

Friedrich Körber, *Einfluß der Temperatur auf die Festigkeitseigenschaften Stahlguß*. Bessemer-, Siemens-Martin- u. Elektrostahlguß wurden im gegossenen u. geglühten Zustande zwischen 20 u. 400° auf Zugfestigkeit, Dehnung, Einschnürung u. Kerbzähigkeit (bis 500°) untersucht, wobei Zugfestigkeit u. Kerbzähigkeit zwischen 100 u. 300° Höchstwerte aufwiesen, während Dehnung u. Einschnürung ihre tiefsten Werte hatten. Ähnlichkeit mit künstlich spröde gemachtem Flußeisen! (Stahl Eisen 44. 1765—71. 1924. Düsseldorf.)

WILKE

George, *Erfahrungen über die Entfernung des Antimons aus dem Werkblei trockenem Wege*. Vf. beschreibt die techn. Entfernung des Sb aus Werkblei mittels Bleioxyden. Die Umsetzungen verlaufen nach folgenden Gleichungen:



Dem Werkblei, das etwa 0,6% Sb enthält, können noch Pb-Abfälle mit höherem Sb-Gehalt zugesetzt werden, so daß der Sb-Gehalt des Ofeneinsatzes etwa 1% beträgt. Das Werkblei wird bei 350° geschmolzen, dann auf 700—800° erhitzt, Oberwind angestellt u. zunächst die leichter schmelzbaren metallreichen u. oxydärmeren Bleiabfälle vom Raffinierungs- u. Entsilberungsbetrieb zugegeben u. dann erst die oxydreichen Pohloxyde. Es muß gut gerührt werden. 1½ Stde. nach dem Eintragen der ersten Partie kann der fl. schwarze Abstrich abgezogen werden. Er hat 12—14% Sb u. 0,005% Ag. Dann werden arme Bleioxyde zugesetzt, bis eine Schicht über dem Pb 1—2 cm dick ist. Nach abermals 2½ Stdn. kann wieder der dickfl. schwarze Abstrich abgezogen werden mit 12—15% Sb u. 0,005% Ag. Hier werden nochmals Pohloxyde zugesetzt, nach derselben Zeit der Abstrich gemacht, darauf die letzten Pohloxyde zugeführt u. nach wieder 2½ Stdn. ein Abstrich gemacht, der 10—11% Sb enthält u. 0,005% Ag. Arbeitet der Ofen noch auf dem Abstrich, so wird mit Luftsauerstoff 1—2 Stdn. lang zur Glättebildung raffiniert. Bei Auftreten von Bleiglätte enthält der Ofeneinsatz noch 0,02—0,04% Sb, deshalb muß unter Umrühren u. Weiterfeuern oder mit Druckluft gepohlt. Sobald die Ansätze an den Krätzen rein gelb sind, kann der Einsatz in den Entsilberungskessel gelassen werden. Ausführl. Zahlenmaterial über Zus. der Zusätze ist in Tabelle angegeben. Obwohl das Sb des Einsatzes sich fast vollständig aus ihm entfernt läßt, ist dazu ein Überschuß von 30—40% PbO notwendig. Ohne Verlängerung des Prozesses war der Gehalt des Abstriches an Sb nicht zu erhöhen oder Verringerung der Abstrichmenge zu erreichen. Der Raffinationsprozeß ließ sich nicht durch Eintränken von Oxyden beschleunigen. Die Abstriche waren Ag-haltig u. müssen besonders entsilbert werden. Das Verf. ist wirtschaftlich in sofern vorteilhaft, als es oxyd. Zwischenerzeugnisse dem Betrieb nutzbar macht. (Metall Erz 22. 27—34. Lautenthal [Harz].)

BECKER-ROS

T. F. Jennings, *Im Cupolofen erschmolzene Kupfergußstücke*. (Metall [London] 26. 7—8. — C. 1925. I. 766.)

WILKE

John Arnott, *Sauerstoff im elektrolytischen Kupfer*. Vf. bestritt die Ansicht, nicht nur bestes Ingot-Cu, sondern auch elektrolyt. Cu-Blöcke sehr beträchtlichen Mengen O enthalten u. daß es bei der Herst. von Legierungen aus diesen unbedingt nötig sei, dieselben Vorsichtsmaßregeln zu beobachten wie bei minderwertigen Material. (Metal Ind. [London] **26**. 6. G. & J. WEIR, WILKE.)

Thomas K. Rose und J. H. Watson, *Untersuchungen über die Bearbeitbarkeit von Nickel zu Münzen*. Gußnickelbarren mit 1—3% Mn können kalt gewalzt werden. Die Barren müssen 2mal auf 800° während der Red. von 2,5 cm auf 1,25 cm u. ein 3. Mal auf 675° nach dem Walzen zwecks weiterer Verarbeitung angesetzt werden. Mg-Zusatz ist unnötig, stört aber bei Beträgen von 0,1—0,2%. Mehr als 0,2% C ist zu vermeiden, da Brüchigkeit eintritt; auch der Fe-Gehalt soll niedrig sein. Hieraus ergeben sich bestimmte Vorsichtsmaßregeln bei der Herst. der Gußbarren. Die beste Gußtemp. liegt zwischen 1540 u. 1550°. Die Barren mit 2% Mn sind gut ausgeprägt, magnet. u. bestehen aus einer festen Lsg., die sie der Korrosion genau so widerstehen wie diejenigen, die 99—99,5% Ni enthalten. Auch sonst sind diese beiden Münzenarten nicht zu unterscheiden. (Journ. Inst. Metals **32**. 271—82. 1924. Royal Mint, London.) WILKE.

J. F. Budgen, *Niedrigschmelzende Legierungen*. Zusammenstellung der Eigenschaften, Herst. u. Anwendungen der Pb-, Bi-, Sn- u. Cd-Legierungen u. Amalgams, die niedrig schmelzen. (Metal Ind. [London] **26**. 1—3. 33—35.) WILKE.

Vilhelm Oertel und Edmund Pakulla, *Beitrag zur Frage der Kobalt-, Nickel-, Wolfram- (Molybdän-) Legierungen*. Die Verss. nahmen ihren Ausgangspunkt von der Art der von HAYNES „Stellit“ benannten aus 3% C, 0,3% Mn, 5% Si, 30% Cr; 15% W, 50% Co, 1% V bestehenden Legierung. Gezeigt wird folgendes: 1. mit steigendem Fe-Gehalt wird sowohl die Rotwärmhärte als auch die Schnittleistung schlechter. 2. Die krit. Schnittleistung liegt bei Bearbeitung von Grauguß tiefer als bei Bearbeitung von Cr-Ni-Stahl. 3. Für eine geringe Schnittleistung der verwendeten Ausgangslegierung ist ein krit. C-Gehalt notwendig. 4. Die therm. Effekte u. das mkr. Gefüge werden wesentlich durch C bestimmt. 5. Die Hartlegierung hat im Vergleich zu Flußeisen eine sehr gute u. u. Korrosions-Beständigkeit. — Die hervorragenden Schnittleistungen der Legierungen, dem Stellit ähnlich, Schneidmetall-Legierung sprechen, für erfolgreiche Verwendung zum Bearbeiten von weichem u. mittelhartem Werkstoff bei hoher Schnittgeschwindigkeit. Solche Legierungen sollten nicht als Ersatz, sondern als wertvolle Ergänzung der Schnellarbeitsstähle angesehen werden. (Stahl u. Eisen **44**. 1717—20. 1924.) NEUFELD.

F. Fuß und H. Bohner, *Lautal*. Lautal ist eine Al-Si-Cu-Legierung (Zusammensetzung angegeben), bei welcher man durch geeignete Wärmebehandlung günstige mechan. Eigenschaften erzielen kann. Je nach der Temp., von welcher es abgekühlt wird, schwankt die Festigkeit u. die Härte, welche beide bei 550° Abkühlungstemp. ein Minimum erreichen. Durch mehrmaliges Anlassen oberhalb 500° können Festigkeit u. Härte gesteigert werden, desgleichen durch Nachwalzen, Ziehen, Pressen u. Schmieden. Es läßt sich leicht verarbeiten u. ist chem. widerstandsfähiger als Al. Von Luft wird es nicht angegriffen. D. = 2,74, Elektr. Leitfähigkeit ist 40% jener des Cu u. 70% jener des Al. (Ztschr. f. Metallkunde **17**. 1924.) BECKER-ROSE.

Tomojiro Tanabe, *Untersuchungen über das Aluminium-Zinksystem*. Die S. 435 erwähnte Veröffentlichung ist nur eine knappe Wiedergabe der hier ausführlicher behandelten Verss. (Journ. Inst. Metals **32**. 415—53. 1924. Sumitomo Copper Works, Osaka.) WILKE.)

R. Genders, *Die Ausstoßung von Messingstäben durch den umgekehrten Pro* (Journ. Inst. Metals **32**. 313—325. 1924. — C. 1924. II. 2556.) WILK

A. Logan, *Eine Bemerkung über Propellermessing*. Das Manganmessing k je nach den Eigenschaften folgende Zus. haben: 50—60% Cu, 0,6—1,0% Sn, 0,3% Pb, rund 0,9% Fe, bis 2,0% Mn, bis 1,0% Al, der Rest Zn. Es werden Wrkgg. der Zusätze, die Mikrostruktur, Best. der α -Kristalle, Gußtemp., Korro u. Kornwachstum sowie interkristalline Durchdringung kurz besprochen. (Jo Inst. Metals **32**, 477—80. 1924. Newcastle-on-Tyne.) WILK

R. W. Müller, *Die Zinkverluste beim Messingschmelzen und ihre Zur gewinnung*. (Zentralbl. d. Hütten u. Walzw. **29**. 15—16. — C. 1925. I. 765.) N

Franz Heckenthal, *Autogene Schweißung mit flüssigen Brennstoffen*. Brenner (Herstellerin: Fernholz-App. A.-G., Berlin W 9) zur autogenen Schweiß wird der fl. Brennstoff durch ein Röhrchen aus Speziallegierung, das um die Leitung gewickelt ist, zugeführt u. dort wie in einer Lötlampe vergast. (Zentr d. Hütten u. Walzw. **29**. 26—27. Berlin.) JUN

F. C. Heath, *Elektrische Ofenerfahrungen in der Bronze-Gießerei*. Vf. beschreib eine Bronze-Gießerei mit 5 elektr. Öfen mit indirekter Lichtbogenheizung. Charge von 104 kg benötigt zum Schmelzen 17 Min., so daß pro Tag 21 Chargen vergossen werden können. Die erzeugten Bronzen enthalten 10% Zn u. 2% 10% Zn u. 10% Sn usw. (Trans. Amer. Electr. Soc. **46**. 4 Seiten. Sep.; Foundry **52**. 980. 1924.) LÜDE

Harry Allen, *Elektrisches Emaillieren*. Es wird die Entwicklung der Emaillierung in elektr. beheizten Öfen seit 1914 behandelt unter besonderer Berücksichtigung der Verbesserung der Arbeitsweise, der Wirtschaftlichkeit u. der erzeugten Qualität. (Trans. Amer. Electr. Soc. **46**. 8 Seiten. 1924. Detroit [Mich.] Sep.) LÜDE

Louis Vielhaber, *Das Verhalten der Metalloxyde in Grundemails auf Blech*. Vorlaufender Bericht über des Vf. Verss. zum Haften verschiedener Emails auf Blech. (Keram. Rdsch. **33**. 53—55.) WECK

L. Vielhaber, *Zur Fluorfrage in der Emailindustrie*. Eine wissenschaftliche deutige Erklärung der Trübung gibt es noch nicht. (Keram. Rdsch. **32**. 766—767. 1924.) WECK

Th. Schauer, *Die chemische Widerstandsfähigkeit von Emaillefritten*. Der Angriff der Lsg. steigert sich mit deren Dissoziationsgrad. Schlechte Kühlung mindert die Widerstandsfähigkeit. Entmischung der Emaille hat größere Löslichkeit zur Folge. Die Auslaugung geht um so schneller vor sich, je leichter entstandene Salz in der betreffenden Lsg. l. ist. Die Widerstandsfähigkeit wächst, wenn durch Einsmelzen einer Verb. in die Emaille eine in den Lösungsschwerl. Verb. entstanden ist. Die Auflösung der Emaille nimmt durch ö Behandlung ab, nähert sich aber niemals dem Nullwert. (Sprechsaal **58**. 5—8.)

H. B. Maxwell, *Ein Schwarznickelelektrolyt*. (Metal Ind. [London] **25**. 1924. — C. 1925. I. 766.) WILK

Guy D. Bengough und R. May, *Der siebente Bericht vom Korrosionsuntersuchungs-Ausschuß des Institute of Metals*. Der Bericht beschäftigt sich hauptsächlich mit der B. u. dem Verh. der „scales“ genannten Überzüge auf Cu u. Messing in Ggw. von Seewasser. Um die sich dabei abspielenden Rkk. zu erforschen, wurden zuerst am Cu u. Zn u. dann erst am Messing der Rk.-Verlauf festgestellt. Bei Cu bildet sich in Cl-haltigen Lsgg. CuCl als Zwischenprod., um sowohl im Seewasser als auch in dest. W. entsprechend $12\text{CuCl} + 3\text{O} \rightarrow 3\text{Cu}_2\text{O} + 6\text{CuCl}_2$ umzubilden. Wenn genügend O vorhanden ist, findet folgender Verlauf $3\text{Cu}_2\text{O} + 2\text{CuCl}_2 + 8\text{H}_2\text{O} + 3\text{O} \rightarrow 2\text{Cu}_4(\text{OH})_6\text{Cl}_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$, ist dagegen ungenügend O da, so bildet sich eine Mischung von Cuprochlorid, Kupferoxychlorid

Cu_2Cl_2 . CuCl_2 sammelt sich aber bei Anwesenheit von Cu zu keinem großen
 ge in der Lsg. an, sondern wirkt etwa wie folgt auf Cu ein:
 $2\text{Cu} + 2\text{CuCl}_2 \rightarrow 4\text{CuCl}$; $4\text{CuCl} + \text{O} \rightarrow \text{Cu}_2\text{O} + 2\text{CuCl}_2$
 u. $4\text{Cu} + \text{Cu}_2\text{O} + 2\text{CuCl}_2 + 8\text{H}_2\text{O} + 5\text{O} \rightarrow 2\text{Cu}_4(\text{OH})_6\text{Cl}_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$.
 schließliche Endprod. von CuCl wurde im Seewasser schneller erreicht als
 W. Bei der Zn-Korrosion mit Seewasser bildeten Carbonat, Hydroxyd u.
 Chlorid die hauptsächlichsten Prodd. Das Hydroxyd übt eine beträchtliche
 endende Wrkg. auf Zn aus, sogar in schnell fließendem W. Durch CO_2 wird
 Wrkg. abgeschwächt, da sich teilweise bas. Carbonat bildet. Die vollständige
 zwischen CuCl_2 u. Messing kann etwa folgendermaßen dargestellt werden:
 $\text{CuCl}_2 + (2\text{Cu} \cdot \text{Zn Messing}) \rightarrow \text{ZnCl}_2 + 3\text{Cu}$; II. $3\text{CuCl}_2 + 3\text{Cu} \rightarrow 6\text{CuCl}$
 i Anwesenheit von überschüssigem O III. $6\text{CuCl} + 3\text{O} + 4\text{H}_2\text{O} \rightarrow$
 $2\text{Cu}_3(\text{OH})_2\text{Cl}_2 \cdot \text{H}_2\text{O} + 2\text{CuCl}_2$. Die Rk. wird oft im Stadium I durch die Ggw. eines
 euges von CuCl u. Zinkverbb. unterbrochen; das Messing ist dann „entzinkt“.
 Die Umstände so, daß die Zinkprodd. ihre schützende Wrkg. gegen die Oxy-
 nicht ausüben können, so wird das Cu so schnell wie es sich bildet oxydiert
 (die „vollständige Korrosion“ ist das Ergebnis. Neben dem sehr wichtigen
 r des Gehaltes an überschüssigem O übt noch das im Messing enthaltene As
 e bedeutenden Einfluß auf die Korrosion aus. Bei 0,01–0,02% As geht die
 orsion stets weiter. Andere Metalle sind nicht so wirksam wie As. Die Korrosion
 est mit der Fließgeschwindigkeit des W., dabei aber ist die Art der Anwesenheit
) von Bedeutung. Ist er nur in W. gelöst, so wird die Korrosion kaum
 r, anders aber wenn freie Luftblasen vorhanden sind; was auf Entfernung der
 nnschicht durch die Blasen zurückzuführen ist.
 on den Fragen über die Korrosion an Kondensationsrohren konnten nur einige
 üßig beleuchtet werden, wie die chem. Zus. des zirkulierenden W. u. der damit
 geführten Stoffe, Temp. des W., Wasserbewegung, Abscheidung fester Ndd.,
 Zus. der Rohre usw. Es ist hier nicht möglich, kurz alle die gemachten
 ichtungen aufzuführen. Als prakt. Ergebnis kann der Vorschlag aufgefaßt
 rn, die Röhren mit bestimmten schützenden Überzügen zu versehen. Die Herst.
 er Überzüge wurde im Laboratorium in Angriff genommen. Sie widerstehen
 3mal besser den Einflüssen als Röhren ohne Überzug. Zum Schluß werden
 e andere Methoden zum Schutze der Kondensationsrohre betrachtet. (Journ.
 Metals 32. 81–269. 1924.)

WILKE.

William E. Greenawalt, Denver, V. St. A., *Metallurgisches Verfahren zur*
uereitung von Sulfiden oder Oxyden oder beide enthaltenden Kupfer-Eisen-
z. Nur Sulfide der genannten Metalle enthaltende Erze werden zweckmäßig
 einen an Cu reichen u. armen Anteil geschieden u. beide geröstet. Sulfid u.
 r enthaltende Erze werden durch Schaumswimmverf. getrennt u. das Sulfid
 rtet. Die oxyd. u. die an Cu ärmeren abgerösteten Sulfide werden mit einer
 n Fl. ausgelaugt, wobei Cu u. Fe in Lsg. gehen. Diese Lsg. wird unter
 ableiten eines starken Luftstroms mit dem an Cu reichen abgerösteten Sulfid
 behandelt, bis die Hauptmenge, aber nicht alles Fe gefällt ist, dann mit SO_2 be-
 handelt u. elektrolysiert. Die elektrolysierte Lsg. dient zum Auslaugen weiterer
 egen von Erz. (A. P. 1514153 vom 7/4. 1923, ausg. 4/11. 1924.) KÜHLING.
Schmelz- und Raffinierwerke, New York, Mischen pulverisierter Brennstoffe
it Luft und Einführung derselben in die Schmelzzone von Hochöfen mit Hilfe der
uwrkg. des Gebläsewindes, 1. dad. gek., daß der Brennstoff in einem geschlossenen
ra in einer verhältnismäßig dünnen Schicht mit Luft unter geringer Druckwrkg.
erb. gebracht u. das entstandene wolkenartige Gemisch der Brennstoffteilchen
uft durch Saugkraft eines Gebläsewindes von verhältnismäßig hohem Druck

angezogen u. in das Ofeninnere getrieben wird. — 2. Vorr. zur Ausführung
Verf. nach Anspruch 1, dad. gek., daß der pulverförmige Brennstoff in den ober
Teil eines geschlossenen Raumes eingeführt wird, in dem ein Vertei
angebracht ist, der den Brennstoff langsam in dünner ringförmiger Schicht z
Boden gleiten läßt, während Luft unter geringem Druck dem herabfallenden Bre
stoff entgegengeführt wird, um ihn zu zerstäuben. — Es wird jedes Brennsto
teilchen mit einer Lufthülle umgeben u. der Verbrennungsvorgang dadurch
schleunigt. (D. R. P. 407246 Kl. 18a vom 26/1. 1922, ausg. 19/12. 1924.) KÜHLING

Bertel O. Henning, Chicago, *Desoxydieren und Reinigen von Metallen u
Legierungen*. Das zu reinigende Metall o. dgl. wird in einer Schale geschmol
u. dann durch eine sehr enge am Boden der Schale mündende Rohrschlange B
säurelsg. eingepreßt, welche sofort verdampft, die Schmelze durchrührt u. die B
mengenungen an die Oberfläche führt. (A. P. 1513989 vom 31/5. 1918, ausg. 4/
1924.) KÜHLING

Alwyn Howard Wild, übert. von: **Ronald Wild und Bessie Delafra**
Wild, Sheffield, England, *Rostfreies Eisen und Stahl*. (Aust. P. 11088 vom 15
1923, ausg. 26/2. 1924. E. Prior. 1/3. 1922. — C. 1923. IV. 877. [E.
198633].) KÜHLING

Th. Goldschmidt Akt.-Ges., Essen, Ruhr, *Hochbleihaltige Lagermetalllegierung*
(D. R. PP. 408229 vom 2/10. 1920. — C. 1922. II. 322 u. 408 254 Kl. 4
[Zus. Pat.] vom 26/11. 1920, ausg. 14/1. 1925. — C. 1922. II. 636.) KÜHLING

Union Carbide & Carbon Research Laboratories, Inc., übert. von: **Frederi**
Mark Becket und Alexander L. Feild, New York, *Metallgewinnung aus Lösung*
(A. P. 1492 282 u. 1492 283 vom 3/8. 1922, ausg. 29/4. 1924. — C. 1924.
2629.) KÜHLING

Jules Sejournet, Frankreich, *Legierungen*. Bei dem Verf. des Hauptpat
werden Mischungen verwendet, welche außer Mg u. Al auch noch Zn. z. B.
1 Teil Mg u. Al u. 3 Teile Zn enthalten. (F. P. 27792 vom 27/2. 1923, ausg. 18
1924. Zus. zu F. P. 559 903; C. 1924. I. 528.) KÜHLING

Summit Marl Co., Inc., übert. von: **Erwin F. Moldenhauer und Le R**
M. Bickett, Watertown, V. St. A., *Masse zur Herstellung von Formen*. Etwa 375 T
Wachs oder Paraffin werden zum Sieden erhitzt u. 577 Teile CaCO₃, welches
ringe Mengen MgCO₃, SiO₂, Fe₂O₃, Al₂O₃ u. K₂O enthält (Mergel) eingerührt. (A.
1516113 vom 27/1. 1923, ausg. 18/11. 1924.) KÜHLING

Udylite Process Company, übert. von: **William A. Wissler und Ch**
H. Humphries, Kokomo, V. St. A., *Rostschützender Überzug*. (A. P. 1504298 v
9/4. 1921, ausg. 12/8. 1924. — C. 1923. IV. 801.) KÜHLING

Randall Williams Company, übert. von: **Glen Lenardo Williams**, Detr
V. St. A., *Rostbeseitigungs- und -schutzmittel*. Es wird eine Lsg. aus einem oder mehr
der Phosphate des Ni, Co, Zn oder Mn, Königswasser u. einem alkal. reagierend
organ. Stoffe, vorzugsweise Zucker enthaltenden Abwasser hergestellt. Die zu e
rostenden Gegenstände werden in die sd. Lsg. getaucht. Nach Entfernung der Ro
schicht läßt man die Lsg. verdampfen, sie hinterläßt dann einen Überzug auf d
Metall, der dieses vor erneuter Rostbildung schützt. (A. P. 1514494 vom 29
1922, ausg. 4/11. 1924.) KÜHLING

IX. Organische Präparate.

Charles Moureu und Charles Dufraisse, Seine, Frankreich, *Verhüten o
Oxydation*. Als antioxygen wirkende Stoffe verwendet man J, Br u. ihre Deriv
Schwefel, Phosphide, Arsenide usw. Bei *Acrolein*, *Benzaldehyd* usw. verwen
man als antioxygene Stoffe NH₄J, in W. l. Jodhydrate von organ. Basen, wie Mo

Dimethylammoniumjodhydrat. (F. P. 573677 vom 23/2. 1923, ausg. 27/6. FRANZ.)

Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning (Erfinder: **Karl Thiess** und **Josef Müller**), Höchst a. M., *Darstellung von Dipolyoxyalkyläthern der Dithio-ene, gek. durch Einw. der Alkylenmercaptane auf Chlorhydrine mehrwertiger hrole oder der Mercaptane mehrwertiger Alkohole auf Alkylendihalogenuide.* — Man zt z. B. Äthylenchlorid mit KSH zum Sieden, gibt dann nach u. nach 2 Mol. ylenchlorhydrin hinzu u. erhitzt noch ca. $\frac{1}{2}$ Stde. auf 100°, — bzw. erhitzt odiglykol, durch Einw. von 2 Mol. Äthylenchlorhydrin auf 1 Mol. Na₂S₂ er- n, mit alkoh. K₂S-Lsg. auf 100°, säuert an, verjagt den H₂S aus der Lsg., alisiert mit NaOH, läßt 1 Mol. Äthylenchlorid zufließen u. erwärmt noch kurze Es wird so daß Äthylendithiodiglykol, OH·CH₂·CH₂·S·CH₂·CH₂·S·CH₂·CH₂·OH, s, in A. ll., in W. zll. u. in Ä. unl. Öl erhalten. — Erhitzt man das durch r. von 2 Mol. einer alkoh. NaHS-Lsg. auf 2 Mol. α-Monochlorhydrin erhältliche glycerin SH·CH₂·CH(OH)·CH₂·OH, kurze Zeit mit Methylenchlorid, so geht es Methylendithiodiglycerin, CH₂(S·CH₂·CH(OH)·CH₂OH)₂, dickfl., sirupartiges, in u. A. ll., in Ä. unl., im Vakuum nicht unzers. destillierbares Öl, über. Die ld. finden als Lösungsm. für Farbstoffe sowie als Weichmachungsmittel Ver- dng. (D. R. P. 405384 Kl. 12o vom 11/4. 1922, ausg. 31/10. 1924.) SCHOTTL.

Rudolf Lesser, Berlin, und **Georg Gad**, Schlachtensee b. Berlin, *Darstellung Methylarsinsäure*, dad. gek., daß man eine alkal. wss. Lsg. von H₃AsO₃ mit Methylsulfat behandelt. — Man läßt z. B. in eine wss. Lsg. von Na₃AsO₃ unter iren u. anfänglicher Kühlung Dimethylsulfat eintropfen u. setzt das Rühren tzt bei 15°, bis zum Verschwinden des Dimethylsulfats fort. Beim Abkühlen idet sich ein Teil der Methylarsinsäure als zweibas. Na-Salz ab, der durch pressen u. Waschen mit wenig W. rein gewonnen wird. Den Rest erhält man ch Erhitzen der Mutterlauge mit CaCl₂-Lsg. als wl. Ca-Salz, das durch Einw. Na₂CO₃-Lsg. ebenfalls in das Na-Salz übergeführt wird. (D. R. P. 404589 Kl. 12o vom 15/3. 1923, ausg. 20/10. 1924.) SCHOTTLÄNDER.

Holzverkohlungsindustrie Aktien-Gesellschaft, Konstanz i. B. (Erfinder: **E. Krause** und **K. Roka**), *Formaldehyd.* (Schwed. P. 55248 vom 12/9. 1922, ug. 2/10. 1923. Oe. Prior. 17/9. 1921. — C. 1924. I. 2542.) SCHOTTLÄNDER.

Albert Fritz Meyerhofer, Zürich, Schweiz, *Herstellung von anorganischen n organischen Säuren.* Kurzes Ref. nach E. P. 213599; C. 1924. II. 1259. Nhzutragen ist folgendes: Von komplexen F-haltigen Säuren eignen sich zur Zs. fester Salze anorgan. u. organ. Säuren die H₂SiF₆ u. HBF₄. Diese enlgt in vielen Fällen bereits in der Kälte, man kann aber auch bei erhöhten Topp., unter Druck oder im Vakuum arbeiten. Zweckmäßig verwendet man sche Salze von Säuren, die mit HF oder den komplexen Säuren unl. oder w Salze liefern, wie des Na, K, Ba, aber auch von Erd- oder Schwermetallen. Z. Herst. wasserfreier Säuren verwendet man die HF oder deren Komplexverb. rGasform. Z. B. vermischt man NaCl mit 32%ig. H₂SiF₆ u. rührt längere Zeit. E entsteht nach der Gleichung: 2NaCl + H₂SiF₆ = Na₂SiF₆ + 2HCl ein fester N. von 98%ig. kieselfluorwasserstoffsäurem Na u. 19%ig. Salzsäure. Analog erhält na aus Na-Formiat u. H₂SiF₆ 23,7%ig. Ameisensäure u. Na₂SiF₆. Natriumnitrat u Borfluorwasserstoffsäure geben Salpetersäure u. Natriumborfluorid nach der Gleichung: NaNO₃ + HBF₄ = HNO₃ + NaBF₄. Es gelingt sogar durch Zers. vi NaHSO₄ mit HF Schwefelsäure herzustellen. Das Verf. führt zu besonders raen Prodd. (F. P. 579039 vom 18/3. 1924, ausg. 8/10. 1924. D. Prior. 28/3. u 18/10. 1923.) SCHOTTLÄNDER.

The Shawinigan Water & Power Co., Montreal, Canada, *Essigsäureanhydrid*

und Acetaldehyd aus Äthylidenacetat. (D. R. P. 408416 Kl. 12o vom 21/3. 19 ausg. 19/1. 1925. — C. 1924. I. 2203.) SCHOTTLÄNDER

Consortium für elektrochemische Industrie G. m. b. H. (Erfinder: Rud Meingast und Martin Mugdan), München, Anhydride niedermolekularer Fettsäure Zu dem Ref. nach Schwz. P. 101168, F. P. 563452 u. E. P. 194719; C. 1924. 1590 ist nachzutragen, daß außer $\text{CH}_3\text{CO}_2\text{H}$ auch Propionsäure u. Buttersäure gleichen Anhydridspaltung unterworfen werden können. (D. R. P. 408715 Kl. 1 vom 11/3. 1922, ausg. 22/1. 1925.) SCHOTTLÄNDER

Roessler u. Hasslacher Chemical Company, New York, übert. von: Otto L knecht, Frankfurt a. M., Blausäure. (A. P. 1497690 vom 27/8. 1921, ausg. 17 1924. — C. 1922. IV. 943.) KAUSCH

The Roessler & Hasslacher Chemical Company, New York, V. St. übert. von: August Albert, München, Organische Arsenverbindungen. (A. 1472778 vom 26/2. 1923, ausg. 6/11. 1923. — C. 1924. II. 1272 [F. P. 5624 MARGULIES].) SCHOTTLÄNDER

August Albert, München, Aromatische Carbonylverbindungen mit dreiwertig Arsen. (A. P. 1425931 vom 25/3. 1922, ausg. 15/8. 1922. — C. 1924. II. 12 [Oe. P. 96688, MARGULIES].) SCHOTTLÄNDER

August Albert, München, Deutschland, Derivate organischer Arsenverbindungen (A. P. 1425929 vom 25/3. 1922, ausg. 15/8. 1922. — C. 1924. II. 1273 [Oe. 96689, MARGULIES].) SCHOTTLÄNDER

August Albert, München, Deutschland, Arsenoxyde und Arsenoverbindung der aromatischen Reihe. (A. P. 1425930 vom 25/3. 1922, ausg. 15/8. 1922. C. 1924. II. 1274 [Oe. P. 96690, MARGULIES].) SCHOTTLÄNDER

Kober Chemical Company, Inc., Hastings on Hudson, New York, übert. von Paul George Dohr, Yonkers. New York, V. St. A., Trocknen des 3,3'-Diamin-4,4'-dioxarsenobenzoldichlorhydrats sowie anderer Salze und Derivate dieser Arsenverbindung unter Luftausschluß und sterilen Bedingungen. Das durch Fällung ein wss. alkal. Lsg. der Base mit HCl erhaltliche Dichlorhydrat des Diaminodioxarsenobenzols, bezw. andere Salze oder Deriv., wie die N-Monoformaldehydsulfosäure, werden unter Luftausschluß filtriert, die feuchten Ndd. in einen verschlossenen Behälter gebracht u. unter Vakuum solange auf 35—50° erwärmt, bis Prodd. frei von HCl bezw. W. sind. — Man leitet z. B. die die ausgefällten Prodd. enthaltende Fl. durch ein mit Hahn versehenes Zuflußrohr, das auch als Zuleitungrohr für indifferente sterile Gase während des Trocknens dienen kann, in eine umgekehrte, weithalsige, durch einen doppelt durchbohrten Kautschukstopfen geschlossen Glasflasche. In dieser befindet sich ein nicht zerbrechlicher, zylind. Filterkörper aus porösem, säurefestem Material, der ebenfalls mit durchbohrten Kautschukstopfen verschlossen ist. Durch die eine Bohrung des Stopfens der Glasflasche führt in das Innere ein Glasrohr durch die Bohrung des Stopfens des Filterkörpers, in den es mit dem äußersten Ende hineinragt. Das aus der Glasflasche herausführende Ende des Glasrohres wird mit einer Vakuumabsaugvorrichtung verbunden. Durch Anlassen der Luftpumpe wird die Fl. durch den porösen Filterkörper u. das Glasrohr allmählich abgesogen, während sich der Nd. auf der Außenseite des Filterkörpers ansammelt. Nach möglichst vollständiger Entfernung der Fl. aus dem Glasbehälter kann der aus dem Dichlorhydrat bestehende Nd. mit HCl, mit oder ohne Zusatz alkohol. HCl u. Ä., nachgewaschen werden. Die Verbindung zwischen Glasrohr u. Filterkörper wird hierauf durch Herausziehen des Rohrs aufgehoben, wobei der Filterkörper mit dem Nd. sich lose auf den Stopfen der Glasflasche lagert. Die umgekehrt stehende Glasflasche wird dann durch das Glasrohr mit einer Vakuumtrockenröhre luftdicht verbunden, die als Absorptionsmittel für W. u. HCl geschmolzenes NaOH u. wasserfreies CaCl_2 enthält. Das Vakuum

nebst einer oder mehreren Glasflaschen mit dem Nd. auf dem Filterkörper dann in eine durch Dampf beheizte Heizkammer eingeführt, deren Temp. beobachtet wird. Man evakuiert nun das Trockenrohr, wobei Luft u. Feuchte aus dem Glasbehälter abgesaugt werden. Um die Trocknung zu beschleunigen, kann durch das Zuleitungsrohr in die Glasflasche gleichzeitig ein steriles inertes Gas eingeleitet werden. Das Prod. ist vollständig trocken u. frei von Wasser. (A. P. 1512909 vom 11/7. 1921, ausg. 28/10. 1924.) SCHOTTLÄNDER.

Marcel Pomaret, Paris, und **May & Baker Limited**, London, *Herstellung von Wasser leicht löslichen Derivaten des 3,3'-Diamino-4,4'-dioxarsenobenzols*. — Läßt Piperazin auf neutral l. Derivv. des Diaminodioxarsenobenzols, wie das Salz der *N-Monoformaldehydsulfoxylsäure*, einwirken u. behandelt das Reaktionsprodukt mit reduzierenden Zuckern, wie Glucose oder Lävulose, oder läßt gleich Piperazin u. reduzierenden Zucker auf die wss. Lsg. des Na-Salz der Formalddehydsulfoxylsäure einwirken. — Die Rk. erfolgt unter Verdrängung des Restes $\text{SO}_2 \cdot \text{SO} \cdot \text{OH}$ durch den Zuckerrest. Das Verf. bietet den Vorteil, daß die vollständige Abscheidung des freien Diaminodioxarsenobenzols entfällt. Z. B. wird das Salz der *N-Monoformaldehydsulfoxylsäure* in einer 75%ig. wss. Glucoselsg. gel. u. Piperazin zu der Lsg. gegeben. Man verd. mit W. u. läßt einige Tage bei 15° stehen. Die luftbeständige, wenig tox. Lsg. findet in Form von subcutanen oder intramuskulären Injektionen therapeut. Verwendung. (E. P. 203077 vom 10/6. 1922, ausg. 7/9. 1922.) SCHOTTLÄNDER.

Établissements Poulenc Frères und **Marcel René Louis Pomaret**, Paris, *Herstellung eines Derivates des 4,4'-Dioxy-3,3'-diaminoarsenobenzols*. Man behandelt die freie Base mit Glucose u. läßt auf das bei 15° feste, in W. l., stark wasserlösliche u., infolge der in ihm enthaltenen freien Phenolhydroxylgruppen, ein wirkendes Kondensationsprod. Piperazin einwirken. — Die neutral reagierende Piperazinverb. des Glucoseanilids des Diaminodioxarsenobenzols ist in W. ll., läßt sich sterilisieren u. findet therapeut. Verwendung. (Schwz. P. 106037 vom 10/6. 1922, ausg. 16/8. 1924.) SCHOTTLÄNDER.

Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning, Höchst a. M. (Erfinder: **Ernst Streitwolf**, Frankfurt a. M.), *In Lösung haltbare Arsenobenzolderivate*. (D. R. P. 667 Kl. 12q vom 30/9. 1922, ausg. 22/1. 1925. Zus. zu D. R. P. 375717; C. 1923. IV. 537 [vgl. auch D. R. P. 375718; C. 1923. IV. 537]. Schwz. PP. 107345, 107346 vom 30/9. 1923, ausg. 16/10. 1924. D. Prior. 29/9. 1922. Zuss. zu Schwz. P. 91245; C. 1922. II. 745. — C. 1925. I. 296.) SCHOTTLÄNDER.

Karl Kindler, Hamburg, *Darstellung von Thioamiden aus Aldehyden u. Ketonen*. — Zeigt, daß man auf die Umsetzungsprodd. der Aldehyde oder Ketone mit NH_3 , prim. oder sek. Aminen S einwirken läßt. — Geht man von den Ketonen aus, so erhält man gleichzeitig die Wanderung eines der an der CO-Gruppe haftenden Alkylreste an das endständige C-Atom des zweiten Alkyls. Beispiele sind angegeben für die Darstellung von: Thiobenzamid, aus Bzl.-PAe. Krystalle, 115–116°, aus Benzaldehyd, aus Gas u. S bei 170–180° unter Druck. — *p*-Methoxy-*N*-methylthiobenzamid, gelbe Krystalle, F. 108–109°, aus Anisaldehyd, Monomethylamin u. S. — *N*-Dimethylthiobenzamid, Krystalle, F. 81°, aus Phenylacetaldehyd, S u. Dimethylamin. — *p*-Methylphenylthioacetamid, Krystalle, F. 63°, aus Acetophenon, Monomethylamin u. S. — *p*-Methoxy-*N*-dimethylphenylthioacetamid, Krystalle, F. 75–76°, aus *p*-Methylacetophenon, S u. Dimethylamin, sowie des *N*-Dimethylthioamids der δ -Phenylglyoxalsäure, orangegelbes Öl, Kp. 203–205°, aus Phenylbutylketon, S u. Dimethylamin. (D. R. P. 405675 Kl. 12o vom 13/3. 1923, ausg. 4/11. 1924.) SCHOTTLÄNDER.

Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Leverkusen b. Köln a. Rh., (Erfinder: **Alfred Engelhardt**, Wiesdorf-Eigenheim), *Darstellung von Abkömmlingen*

des Glykols, darin bestehend, daß Äthylendihalogenide mit Alkalisalzen org. Säuren, Phenolaten oder Alkoholaten bei Ggw. mehrwertiger Alkohole oder ihrer Fettsäureester kondensiert werden, wobei die Einw. von entwässertem Na-Acetat Äthylendichlorid bei Ggw. von Glykoldiacetat ausgenommen ist. — Das Verf. lie. in guter Ausbeute Glykoläther aus Alkaliphenolaten oder -alkoholaten u. Äthylendihalogeniden u. ist ferner besonders wertvoll für die Herst. von Nitrophenoläther da infolge der Abwesenheit von W. die schädliche Einw. des Alkalis auf die Gruppen u. Äthylendihalogenide verhindert wird. Ebenso ist die Ausbeute an *B. steinsäuredinitril* wesentlich erhöht, da kein Vinylhalogenid entsteht. Beispiele: angegeben für die Herst. von: Glykoldiacetat, Kp. 186—188°, aus Äthylenchlorid u. K-Acetat bei Ggw. von Glykolmonoacetat, — von: Glykolmonosalicylsäureester Äthylenbromid u. Na-Salicylat in Ggw. von Glykol, — von: Äthylenglykol *p*-nitrophenyläther, $\text{NO}_2 \cdot \text{C}_6\text{H}_4 \cdot \text{O} \cdot \text{CH}_2 \cdot \text{CH}_2 \cdot \text{O} \cdot \text{C}_6\text{H}_4 \cdot \text{NO}_2$, aus *p*-Nitrophenolnatrium u. Äthylenbromid in Ggw. von Glykol, — sowie von Glykolmonoacetat aus Äthylchlorid u. K-Acetat in Ggw. von Glycerin. (D. R. P. 404999 Kl. 12o vom 3. 1919, ausg. 25/10. 1924.) SCHOTTLÄNDER

Parke, Davis & Company, Detroit, Michigan, übert. von: Lucas P. Kyriakos, New York, V. St. A., Herstellung von kernmercurierten Aryloxyfettsäuren und deren Salzen. Im Mol. zwei CO_2H -Gruppen enthaltende Aryloxyfettsäuren werden nach den üblichen Methoden mercuriert. — Z. B. werden reines Hg-Acetat u. Salicylaldessigsäure, $\text{C}_6\text{H}_4(\text{O} \cdot \text{CH}_2 \cdot \text{CO}_2\text{H}) \cdot (\text{CO}_2\text{H})^2$, innig gemengt u. fein gepulvert in ein Ölbad solange auf 140—160° erhitzt, bis eine Probe mit verd. Alkali kein Hg mehr abscheidet. Das unreine Reaktionsprod., das Anhydrid der Oxymercurisalicylaldessigsäure, wird alsdann in verd. NaOH gel. u. CO_2 in die Lsg. eingeblasen, wobei dimercuriertes Prod. u. andere Verunreinigungen als gallerartiger Nd. fallen. Zu der filtrierten Lsg. des Dinatriumsalzes der Oxymercurisalicyloxyessigsäure wird $\text{CH}_3\text{CO}_2\text{H}$ gesetzt, das abgeschiedene Anhydrid abfiltriert, mit wässr. Säurefrei gewaschen, in W. suspendiert u. allmählich mit wss. NaOH bis zur alkal. Rk. auf Phenolphthalein versetzt. In die filtrierte wss. Lsg. des Dinatriumsalzes wird dann reiner A. gegossen, wobei das Salz als körniger weißer Nd. fällt, der filtriert, mit A. ausgewaschen u. bei Temp. unter 60° im Vakuum getrocknet wird. Das 43,5—43,9% Hg enthaltende, in W. ll., nahezu neutral reagierende Prod. findet in dest. W. gel. zu Injektionen Verwendung. — Analog erhält man aus Hydrochinondiessigsäure, $\text{C}_6\text{H}_4(\text{O} \cdot \text{CH}_2 \cdot \text{CO}_2\text{H})_2^{1,4}$, das Dinatriumsalz der Oxymercurihydrochinondiessigsäure, $\text{C}_6\text{H}_3(\text{O} \cdot \text{CH}_2 \cdot \text{CO}_2\text{H})_2^{1,4} \cdot (\text{HgOH})^x$, u. das Dinatriumsalz der Oxymercurioresorbindiessigsäure aus der Resorbindiessigsäure Hg-Acetat. Die neutral reagierenden Dialkalisalze bildenden mercurierten Säuren übertreffen die bisher bekannten, in der Therapie verwendeten Hg-Verbb. in ihrer Wirksamkeit u. sind nur $\frac{1}{7}$ so giftig wie die gleiche Menge HgCl_2 . Beim Kochen mit konz. Säuren spalten die mercurierten Dicarbonsäuren Hg-Salze ab, z. B. HCl HgCl_2 . (A. P. 1513115 vom 11/7. 1921, ausg. 28/10. 1924.) SCHOTTLÄNDER

Aladar Skita, Kiel, Herstellung von Aminen durch Reduktion von ungesättigten organischen Verbindungen mit aliphatisch gebundener Nitrogruppe, dad. gek., man diese Nitroverbb. der katalyt. Red. unterwirft. — Das Verf. liefert die entsprechenden Amine in einem einzigen Arbeitsgang u. besseren Ausbeuten als bisher übliche Red. mit naszierendem H_2 . Als Nebenprodd. entstehen dicycl. Amine. Aus ω -Nitrostyrol erhält man z. B. bei der Einw. von H_2 in Ggw. von kolloidaler Pt-Lsg. unter 2 at Druck Phenyläthylamin, aus A. Krystalle, F. 217°, nebst Di-(phenyläthyl)-amin. — *p*-Methoxy- ω -nitrostyrol gibt bei der katalyt. Red. in Ggw. von PdCl_2 -Lsg. u. anschließend von kolloidaler Pt-Lsg. *p*-Methoxyphenyläthylamin, Kp.₁₈ 135—138°, — u. α -Methylenedioxy-3,4-phenyl- β -nitroäthylen (Methylenedioxy-nitrostyrol) in Ggw. von kolloidaler Pt-Lsg. Homopiperonylamin neben (anscheinend

methylenedioxyphenyläthyl)-amin, Acetat Krystalle, F. 181—182°. (D. R. P. 49 Kl. 12 q vom 26/11. 1922, ausg. 14/11. 1924.) SCHOTTLÄNDER.

Tetralin G. m. b. H., Berlin, *Darstellung von Aminoderivaten der Benzol- und Phthalinreihe*, dad. gek., daß man Nitro-, Azoxy-, Azo- oder Hydrazoverbb. in Zustände bei Ggw. von Oxyden oder Salzen des Ni oder des Co, die gegebenenfalls untereinander gemischt, mit oder ohne Zusatz der Oxyde oder Salze des Cu oder des Mn, zur Anwendung kommen können, mit H₂ unter Druck bei erhöhter Temp. behandelt. — Mit der Verwendung der Metalloxyde oder Salze entfallen die Schwierigkeiten der gesonderten Herst. des Katalysatoren durch Red. unter Luftabschluß. Umsetzungen der katalyt. wirksamen Metallsalze oder Metalloxyde mit sauren Gruppen in den zur Red. gelangenden Verbb. (Phenolen, Sulfonaten) treten bei dem Verf. nicht ein. Beispiele sind angegeben für die katalyt. Red. von: *Nitrobenzol* mit H₂ in Ggw. von Ni-Carbonat bei 180° unter 15 at Druck zu *Anilin*, — von: *Azobenzol* mit H₂ in Ggw. von Ni-Carbonat bei 200° unter 20 at Druck zu *Anilin* (an Stelle des Ni-Carbonats können Ni-Formiat, Ni-Nitrat, Oxyde des Ni; wie das Suboxyd, sowie Salze u. Oxyde des Co verwendet werden), — von: *Benzol-azo-β-naphthol* in Dekahydronaphthalinlsg. mit H₂ in Ggw. von Ni-Carbonat bei 200° zu *Anilin* u. *1-Amino-2-oxynaphthalin*, — von: *Orange II* (*Phthalol-azo-benzol-p-sulfosaurem Na*) in i-Propylalkohol gel. mit H₂ in Ggw. von Ni-Carbonat bei 180° unter 20 at Druck zu *Sulfanilsäure* u. *1-Amino-2-oxynaphthalin*, — sowie von: *p-Diäthoxyazobenzol* in Dekahydronaphthalin gel. mit H₂ in Ggw. eines Gemisches aus gleichen Teilen Ni-Carbonat, Mn₂O₃ u. bas. Cu-Carbonat bei 80° unter 10 at Druck zu *p-Phenetidin*. (D. R. P. 406064 Kl. 12 q vom 4/3. 1924, ausg. 13/11. 1924.) SCHOTTLÄNDER.

Julius von Braun, Frankfurt a. M., und **Tetralin G. m. b. H.**, Berlin, *Darstellung von Phthalonsäure und Phthalsäure aus Tetrahydronaphthalin*, dad. gek., daß man Tetrahydronaphthalin oder seine arom. Substitutionsprodd. in Ggw. von W. oder KMnO₄, vorzugsweise in der Wärme, behandelt u. die gebildeten Phthalonsäuren entweder als solche isoliert oder in saurer Lsg. weiter zu Phthalsäure oxydiert. Vgl. auch v. BRAUN, BRAUNSDORF, ENGELBERTZ, E. HAHN, G. HAHN, L. BACH, KREDEL u. LARBIG, Ber. Dtsch. Chem. Ges. 56. 2332; C. 1924. I. 657.) (D. R. P. 405459 Kl. 12 o vom 4/10. 1921, ausg. 1/11. 1924.) SCHOTTLÄNDER.

Chemische Fabrik Kalk G. m. b. H. und **Hermann Oehme**, Köln-Kalk, *Herstellung von Äthylenoxyd* aus Chlorhydrin u. Basen, 1. dad. gek., daß man die Dämpfe von Chlorhydrinlsgg. über feste Basen oder Basengemische oder durch deren Suspensionen in W. oder CaCl₂-Lsgg. bei solchen Temp. leitet, bei denen sich weder Chlorhydrindämpfe noch die mitgeführten Wasserdämpfe kondensieren können. 2. dad. gek., daß man im Falle der Anwendung von Ca(OH)₂ oder Natronkalk zuerst die entstehende CaCl₂-Lauge oder Salz-CaCl₂-Lauge den Chlorhydrindämpfen zugeführt u. dabei nötigenfalls noch weitere Mengen gleichartiger Lauge hinzugefügt. — 3. dad. gek., daß man in den Reaktionsraum von vornherein nur einen Teil der notwendigen Basenmengen einfüllt u. weitere Mengen nur in dem Maße nachträgt, als man die äthylenoxydfreie Metallchloridlsg. aus dem Reaktionsraum abzieht. — Das Verf. ermöglicht, unmittelbar aus einer dünnen Chlorhydrinlsg. Äthylenoxyd in guter Ausbeute zu erhalten. Z. B. werden die Dämpfe einer sd. 10%ig. Äthylenchlorhydrinlsg. durch ein auf mindestens 100° erhitztes Rohr geleitet, in dem sich festes Ca(OH)₂ oder eine feuchte Paste desselben befindet. Die verdampfte Chlorhydrinlsg. werden durch fraktionierte Kühlung 35—38 g Äthylenoxyd gewonnen. (D. R. P. 403643 Kl. 12 o vom 23/4. 1921, ausg. 30/9. 1924.) SCHOTTLÄNDER.

Chemische Fabrik Griesheim-Elektron, Frankfurt a. M., *Herstellung von N-Acetylderivaten aromatischer Aminoverbindungen*. Man erhitzt, zweckmäßig

bei Ggw. von Lösungs- oder Verdünnungsmitteln, gleiche Moll. *Acetessigester*, dessen *Homologen* oder *Analogen* mit prim. *aromat. Monaminen* der allgemeinen Formel: $\text{NH}_2 \cdot \text{R} \cdot \text{X} \cdot \text{R}^1$, worin $\text{R} = \text{Arylrest}$, R^1 entweder der gleiche oder ein verschiedener *Arylrest* oder ein heterocycl. oder acycl. eine mit Diazoverbb. kuppelungsfähige CH_2 -Gruppe enthaltender Rest, X eine Azo- oder Azoxygruppe oder der Rest eines fünfgliedrigen heterocycl. Kerns ist, — bzw. 2 Mol. eines *Acylessigesters* mit einem Mol. eines *aromat. Diamins* der allgemeinen Formel: $\text{NH}_2 \cdot \text{Y} \cdot \text{NH}_2$, worin Y einen Aryl- oder substituierten Arylrest, einen Diarylrest oder substituierten Diarylrest, bzw. den Rest einer Diarylverb. der allgemeinen Formel

$\text{Z} < \begin{smallmatrix} \text{A} \\ \text{A}_1 \end{smallmatrix}$, in der A u. $\text{A}_1 =$ zwei gleichen oder verschiedenen, unsubstituierten oder substituierten Arylresten, verbunden durch Atome oder Atomgruppen $\text{Z} = -\text{O}-, -\text{S}-, -\text{CH}_2-, -\text{CO}-, -\text{NH}-, -\text{NH} \cdot \text{CO}-, -\text{N}:\text{N}-, \text{N} \begin{smallmatrix} \text{O} \\ \diagup \diagdown \end{smallmatrix} \text{N}, \text{CO} \begin{smallmatrix} \text{NH} \\ \diagup \diagdown \end{smallmatrix} \text{NH}$


oder $-\text{O} \cdot \text{CH}_2 \cdot \text{CH}_2 \cdot \text{O}-$ ist, bedeutet. (Die Herst. von Bisacetoacetylbenzidin durch Erhitzen von Benzidin mit Acetessigester bei Abwesenheit von Lösungs- oder Verdünnungsmitteln auf $110-120^\circ$ [vgl. HEIDRICH, Monatshefte f. Chemie **19**. 69 C. **99**. I. 618] ist hierbei ausgenommen.) — Die *N-Acylacetyldiamino-* bzw. *N-Benzoylacetyldiamino-*verb. haben substantiven Charakter, d. h. sie können in alkal. Lsg. auf der Baumwollfaser fixiert u. mit Diazoverbb. zu waschechten Färbungen entwickelt werden. Als Lösungs- oder Verdünnungsmittel beim Erhitzen der Komponenten können KW-stoffe der Bzl.-Reihe, Chlorbenzol, Nitrobenzol, Naphthalin oder ein großer Überschuß der Acylessigester selbst verwendet werden. Man hält das Gemisch der Komponenten im Sieden, bis die Abspaltung des Alkohols aus dem angewandten Acylessigester beendet ist. Beispiele für die Herst. folgender N-Acylderivv. sind angegeben: *Acetoacetyldehydrotoluidin* aus A. Krystalle, F. $170-172^\circ$ (unkorr.) unter geringer Zers., l. in A. u. Nitrobenzol, unl. in Ä. u. CCl_4 . — *Benzol-azo-1-acetoacetyldiaminonaphthalin* aus A. orangefarbige Nadeln, F. $154-156^\circ$ (unkorr.) unter geringer Zers., l. in A., unl. in Ä. — *p-Acetoacetyldiaminoazobenzol* aus verd. A. orangefarbige Krystalle, F. $130-131^\circ$ (unkorr.), l. in Essigester, Ä., unl. in CCl_4 . — *4'-Acetoacetyldiaminobenzol-azo-1-phenyl-3-methyl-5-pyrazolon* aus verd. Acetonitril leuchtende orangefarbige Nadeln, F. 208° unter Zers., l. in A. u. Acetonitril, unl. in Ä. — s. *1,4-Bisacetoacetyldiaminobenzol* aus viel W. Krystalle, F. $104-106^\circ$ unter Zers., l. in W. u. A. — *Bisacetoacetyl-o-tolidin* aus A. Nadeln, F. $204-206^\circ$ unter Zers., l. in A., Eg. u. Nitrobenzol, weniger l. in Aceton u. Essigester, unl. in Bzl., Ä. u. CCl_4 . — *Bisacetoacetylbenzidin* durch Erhitzen von in Solventnaphthalin oder Toluol gel. Benzidin mit Acetessigester erhalten, aus Eg. Krystalle, F. $234-235^\circ$ (unkorr.) unter Zers. — *Bisacetoacetyl-o-dianisidin* aus A. schwach gelbliche Nadeln, F. $164-165^\circ$ unter Zers., l. in A., Eg. u. Nitrobenzol, weniger l. in Bzl., unl. in Ä. u. CCl_4 . — *Bisbenzoylacetyl-o-tolidin* aus *o-Tolidin* in Solventnaphthalin u. Benzoylessigester erhalten, aus verd. $\text{CH}_3\text{CO}_2\text{H}$ Nadeln, F. 233° unter Zers., l. in A. u. Toluol, etwas löslicher in Eg. u. Pyridin. — s. *4,4'-Bisacetoacetyldiaminobenzophenon* aus viel W. Nadeln, F. $175-176^\circ$ unter geringer Zers. — s. *4,4'-Bisacetoacetyldiaminoazobenzol* aus verd. $\text{CH}_3\text{CO}_2\text{H}$ gelborangefarbige Krystalle, F. $222-224^\circ$ bis 234° unter Zers. — *2-Acetoacetyldiaminoazotoluol* aus verd. A. orangefarbige Nadeln, F. 147° , l. in A. u. Eg., unl. in Ä. — *3-Acetoacetyldiaminoazotoluol* orangefarbige Schuppen aus verd. A., F. $133-134^\circ$, l. in A. u. Eg., unl. in Ä. — *4'-Chlor-4-acetoacetyldiaminoazobenzol* aus verd. A. verfilzte orangefarbige Nadelchen, F. 188° , l. in A. u. Eg., unl. in Ä. — *3'-Nitro-4-acetoacetyldiaminoazobenzol* aus Acetessigester verfilzte orangefarbige Nadelchen, F. 138° unter geringer Zers., l. in A., Eg. u. Acetessigester, unl. in Ä. — *4'-Nitro-4-acetoacetyldiaminoazobenzol* aus Acetessigester orangefarbige Schuppen, F. $190-191^\circ$ unter geringer Zers., l. in A. u. Eg., unl. in Ä.

etoacetylaminooxybenzol, aus p-Aminoazoxybenzol B. (vgl. PASSERINI, Gazz. ital. 51. I. 229; C. 1921. III. 780) erhalten, aus verd. A. schwachgelbe Nadeln, F. 138° unter Zers., l. in A. u. Eg., unl. in Ä. — 4'-Acetoacetylaminobenzol-azo-2-naphthalin aus verd. A. orangegelbe kugelige Krystallaggregate, F. 53—154°, l. in A. u. Eg., weniger l. in Ä. — 4'-Acetoacetyldiaminobenzol-azoresol aus Acetonitril zu Büscheln vereinigte orangegelbe Nadeln, F. 165°, l. in Eg. u. Acetonitril, unl. in Ä. — 1,4-Bisacetoacetyldiaminonaphthalin aus Acetonitril Nadeln, F. 197° unter Zers., l. in Acetonitril, wl. in A., Eg. u. Xylol. — Bisacetoacetyldiaminonaphthalin aus Eg. silbergraue Krystallschuppen, F. 249 bis 251° unter Zers., l. in A., wl. in Ä. — 2,6-Bisacetoacetyldiaminonaphthalin aus A. Büscheln vereinigte Nadeln, F. 203—204° unter Zers., l. in A. u. Eg. — Bisacetoacetyl-o,o'-dichlorbenzidin aus verd. A. sich bei 145—147° zers. Krystallflocken, F. 145—147° unter Zers., l. in A. u. Bzl. — Bisacetoacetyl-m,m'-dichlorbenzidin aus verd. A. sich bei 212° zers., zu Büscheln vereinigte Nadeln, l. in Eg., unl. in A. u. Bzl. — Bisbenzoylacetylbenzidin aus verd. A. gelbliches Krystallpulver, l. in Eg. u. Pyridin, unl. in Ä. — 4,4'-Bisacetoacetyldiamino-3,3'-dichlordiphenylmethan aus Eg. Krystalle, F. 138—139° unter Zers., l. in A. u. Eg., unl. in Ä. — 4,4'-Bisacetoacetyldiamino-3,3'-dimethyldiphenylmethan aus A. verfilzte Nadeln, F. 143—144°, l. in A. u. Nitrobenzol, unl. in CCl₄. — Bisacetoacetyldiaminoazoxybenzol aus verd. CH₃·CO₂H bräunlich gelbes Krystallpulver, F. 219—220° unter Zers., l. in A. u. Eg., unl. in Ä. — 4,4'-Bisacetoacetyldiamino-3,3'-azotolol aus A. hellgelbes Pulver, F. 215° unter Zers., l. in A. u. Eg., unl. in Ä. — 4,4'-Bisacetoacetyldiaminodiphenylharnstoff aus CH₃CO₂H aus verd. A. zehrende Blättchen, F. oberhalb 320°, l. in Eg. u. Pyridin, swl. in Aceton, A. u. Xylol. Die Prodd. sind sämtlich in verd. NaOH l. (**F. P. 567284** vom 11/6. 1923, **E. PP. 211772** u. **1314** vom 4/6. 1923, **D. Prior. 28/8., 16/9. 1922 u. 3/5. 1923.** **Schwz. P. 104566** vom 16/6. 1923, **ausg. 1924.** **D. Prior. 28/8. 1922 u. Schwz. PP. 104908 [Zus.-Pat.]** vom 16/6. 1923, **ausg. 16/5. 1924.** **D. Prior. 16/9. 1922, 104909 [Zus.-Pat.]** vom 16/6. 1923, **ausg. 1924.** **104910, 104911 [Zus.-Pat.]** vom 16/6. 1923, **ausg. 16/5. 1924.** **D. Prior. 1923.)**

SCHOTTLÄNDER.

Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Leverkusen b. Köln a. Rh. Erfinder: Hans Hahl, Elberfeld), Darstellung von Aminoalkylderivaten schwefeliger Verbindungen, dad. gek., daß man auf solche S-haltige Verb., die den S-Form der SH-Gruppe mercaptanartig gebunden enthalten, bas. Alkylmonohalogenide oder Alkylendihalogenide in Ggw. alkal. wirkender Mittel einwirken läßt, wobei man in letzterem Falle die halogenhaltigen Zwischenprodd. mit prim. oder sekund. aliphat. Aminen zu den entsprechenden Aminoalkyläthern umsetzt. — Man löst Mercaptobenzol in NaOC₂H₅-Lsg., gibt Diäthylaminochloräthanol, (C₂H₅)₂N·C₂H₅·CH₂Cl, hinzu u. erwärmt. Das entstandene Diäthylaminoäthylphenylsulfid, C₆H₅·CH₂·CH₂·N(C₂H₅)₂, gelbes Öl, Kp.₁₂ 144—148°, bildet Chlorhydrat, aus Aceton Krystalle, F. 105—106°. — Aus m-Tolylmercaptannatrium u. Diäthylaminochloräthanol in alkoh. Lsg. entsteht Diäthylaminoäthyl-m-tolylsulfid, gelbes, mit Säuren gut kristallisierende Salze bildendes Öl, Kp.₁₀ 161—162°; Chlorhydrat Blättchen, F. 108°, das man auch durch Umsetzung von Diäthylamin mit dem durch Einw. von Äthylenbromid auf m-Tolylmercaptannatrium gewonnenen Bromäthyl-m-tolylsulfid, Kp.₇ 148 bis 151°, erhalten kann. — Das durch Einw. von Äthylenbromid auf Phenylmercaptannatrium in alkoh. Lsg. erhältliche Bromäthylphenylsulfid, Kp.₁₃ 132—136°, geht beim Erhitzen mit Methylamin in alkoh. Lsg. auf 90—100° in das Monomethylaminoäthylphenylsulfid, farbloses, bas. riechendes Öl, Kp.₁₅ 136—138°; Chlorhydrat aus Aceton Nadeln, F. 105°, über. — Aus der Na-Verb. des α-Oxymercaptanaphthalins u. Diäthylaminochloräthanol in alkoh. Lsg. erhält man beim Erwärmen das

Diäthylaminoäthyl-α-oxynaphthylsulfid, gelbes Öl, Kp.₁₂ 180—195°; *Chlorhydrat* aus A. Krystalle, F. 95—96°. — Erwärmt man eine Lsg. von *Thioharnstoff* in alkoh. NaOC₂H₅-Lsg. mit *Diäthylaminochloräthanol*, so erhält man eine *S*-haltige Verb. des Zus. NH : C(NH₂)·S·CH₂·CH₂·N(C₂H₅)₂, wasserhelle Fl., Kp.₁₀ 140—143°; *Chlorhydrat* 249—250°. Der Thioharnstoff reagiert hierbei in der ps-Form. — Aus der Na-Verb. des *Phenylthiobiazolonsulphydrats* (vgl. Ber. Dtsch. Chem. Ges. 27. 251



[1894]) u. *Diäthylaminochloräthanol* in alkoh. Lsg. entsteht das *Diäthylaminäthylphenylthiobiazolonsulfid* nebenst. Zus. dickes Öl; *Chlorhydrat* Krystalle, F. 20

bis 208°. Die in W. mit neutraler Rk. l. Salze der *S*-haltigen Verbb. weisen star gefäßzusammenziehende u. infolgedesse blutstillende oder wehenregende Eigenschaften auf u. finden therapeut. Verwendung. (D. R. P. 406151 Kl. 12q vom 7/11 1922, ausg. 14/11. 1924.)

SCHOTTLÄNDER.

Chemische Fabrik auf Actien (vorm. E. Schering), Berlin (Erfinder: **Max Dohrn**, Charlottenburg, und **Helene Soenderop**, Berlin), *Darstellung von Hydrazopyridin*, dad. gek., daß man 2-Pyridylhydrazin auf in 2-Stellung halogenierte Pyridin, mit oder ohne Lösungsm., einwirken läßt. — Man erhitzt z. B. 2-Pyridylhydrazin mit 2-Chlorpyridin auf 160—180°. Das 2,2'-Hydrazopyridin, aus W. Krystalle, F. 165°, in h. W. u. A. l., in Ä. u. PAe. wl., findet zu therapeut. Zwecken Verwendung. (D. R. P. 406205 Kl. 12p vom 18/11. 1922, ausg. 15/11. 1924.)

Chemische Fabrik auf Actien (vorm. E. Schering), Berlin (Erfinder: **Max Dohrn**, Charlottenburg, und **Hans Horsters**, Nowawes b. Berlin), *Darstellung von Acylderivaten des 2-Aminopyridins und seiner Abkömmlinge*, dad. gek., daß man die betreffenden Aminopyridine mit acylierenden Mitteln behandelt u. das entsprechende Reaktionsprod. der Vakuumdest. unterwirft. — Die N-Acylderivate werden hierbei unzersetzt als einheitliche Fraktion erhalten. Sie finden als Ausgangsstoffe für pharmazeut. Prodd. sowie für techn. Zwecke Verwendung. Beispiele sind angegeben für die Darst. von: 2-Acetylaminopyridin, Kp.₁₅ 155—156°, F. 71°, aus der Base u. Essigsäureanhydrid — von 2-Diacetylamino-3-äthyl-6-methylpyridin, erstarrt zum Öl, Kp.₁₀ 160—162°, dann Nadeln, F. 108°, ll. in A., Aceton u. Bzl., unl. in W., aus 2-Amino-3-äthyl-6-methylpyridin u. Essigsäureanhydrid —, von 2-Acetylamino-5-chlorpyridin, aus wss. A. Nadeln, F. 171°, Kp.₁₅ 170—180°, ll. in A., Bzl. u. Chlf., unl. in Ä. u. W., — u. von 2-Dibenzoylaminopyridin, aus Ä. Krystalle, F. 94—95°, aus 2-Aminopyridin u. Benzoesäureanhydrid. (D. R. P. 406206 Kl. 12p vom 28/12 1922, ausg. 15/11. 1924.)

SCHOTTLÄNDER.

Chemische Fabrik auf Actien (vorm. E. Schering), Berlin (Erfinder: **Max Dohrn**, Charlottenburg, und **Hans Horsters**, Nowawes b. Berlin), *Darstellung eines Kondensationsproduktes aus 2-Aminopyridin*, dad. gek., daß man auf 2-Aminopyridin oder dessen Salze bei erhöhter Temp. Phosgen einwirken läßt. — Man erhitzt z. B. wasserfreies 2-Aminopyridinchlorhydrat oder die freie Base mit COCl₂ auf 300—320°, bezw. leitet in die Lsg. des Chlorhydrats in Cumol bei 180—200° COCl₂ bis zur völligen Absorption ein. Die Cl- u. O-freie Verb. unbekannter Zus., aus wss. A. oder CH₃OH Nadelchen, F. 85°, Kp.₇₆₀ 307—308°, Kp.₁₃ zwischen 176 u. 178°, ll. in den bekannten organ. Lösungsm., wl. in W., findet als Ausgangsstoff für die Herst. pharmazeut. Präparate Verwendung. (D. R. P. 406207 Kl. 12p vom 29/12. 1922, ausg. 15/11. 1924.)


SCHOTTLÄNDER.

Chemische Fabrik auf Actien (vorm. E. Schering), Berlin (Erfinder: **Max Dohrn**, Charlottenburg, und **Hans Horsters**, Nowawes b. Berlin), *Darstellung von Pyrrolidinderivaten*, dad. gek., daß man acylierte Brenztraubensäureester bezw. Oxal-essigester mit 2-Aminopyridin oder dessen Abkömmlingen bei höheren Temp. kondensiert. — Aus Benzaldehyd u. 2-Aminopyridin erhält man eine Benzylidenverb., di-


der Kondensation mit Acetylbrenztraubensäureäthylester in benzol. Lsg. in das Pyridyl-2-phenyl-3-acetyl-4,5-diketopyrrolidin, Nadeln, F. 245°, l. in Na₂CO₃-Lsg., in W. u. organ. Lösungsm., außer A. u. Chlf., übergeht. — Das aus derselben Benzoylbrenztraubensäureester erhältliche Pyrrolidinderiv., hellgelbe Krystalle, schm. bei 220°. — Kondensationsprod. aus 2-Aminopyridin, Benzaldehyd u. Oxalessigester aus A. gelbliche Nadeln, F. 192°. — Kondensationsprod. aus 2-Aminopyridin, Piperonal u. Acetylbrenztraubensäureester aus A. Krystalle, F. 146—148°, l. in Na₂CO₃, unl. in verd. Säuren. — Erhitzt man 2-Aminochinolin mit Benzaldehyd kurze Zeit auf 100° u. nach Zugabe von Bzl. u. Acetylbrenztraubensäureester 4 Stdn. zum Sieden, so erhält man ein Pyrrolidinderiv. (1-Chinolyl-2-phenyl-3-acetyl-4,5-diketopyrrolidin), das, aus wss. A. umkrystallisiert, Nadeln vom Schmp. 152° bildet. Die Prodd. finden therapeut. Verwendung. (D. R. P. 406209 Kl. 12p vom 20/7. 1922, ausg. 15/11. 1924.) SCHOTTLÄNDER.

Chemische Fabrik auf Actien (vorm. E. Schering), Berlin (Erfinder: Max Dohrn, Charlottenburg, und Hans Horsters, Nowawes b. Berlin), Darstellung von 2-Pyridyl-3-methyl-5-pyrazolon, dad. gek., daß man das 2-Pyridylhydrazin mit Acetessigester in der Kälte oder bei höherer Temp. kondensiert. — Beispiele für die quantitativ verlaufende Kondensation bei 20 bzw. 100° sind angegeben. Das 2-Pyridyl-3-methyl-5-pyrazolon, aus Ä. Prismen, F. 112°, zeigt antipyret. u. antitumorlogist. Eigenschaften u. findet als Zwischenprod. für die Herst. pharmazeut. Präparate Verwendung. (D. R. P. 406212 Kl. 12p vom 28/12. 1922, ausg. 15/11. 1924.) SCHOTTLÄNDER.

Chemische Fabrik auf Actien (vorm. E. Schering), Berlin (Erfinder: Max Dohrn, Charlottenburg, und Hans Horsters, Nowawes b. Berlin), Darstellung eines Kondensationsproduktes aus 2-Pyridylhydrazin und Acetessigester, dad. gek., daß man entweder die beiden Komponenten im Verhältnis von 1:2 Mol. aufeinander einwirken läßt oder 1-Pyridyl-3-methyl-5-pyrazolon (vgl. vorst. Ref.) mit einem weiteren Mol. Acetessigester kondensiert. — Z. B. werden 2-Pyridylhydrazin u. Acetessigester in äth. Lösungsm. 6 Stdn. auf 100° erhitzt, die Temp. dann allmählich gesteigert u. zuletzt noch 4 Stdn. auf 170—180° erhitzt, bzw. erhitzt man 1-Pyridyl-3-methyl-5-pyrazolon mit Acetessigester 4 Stdn. auf 130—140° u. weitere 6 Stdn. auf 180 bis 200°. Zur Reinigung wird das feste Reaktionsprod. mit Bzl. verrieben u. umkrystallisiert. Das Kondensationsprod. von der Bruttoformel: C₁₅H₁₁O₂N₃ u. wahrscheinlich nebensteh. Zus., aus verd. HCl fast farblose Nadeln oder Blättchen, F. 232°, unl. in W., wl. in Bzl., l. in h. A., mit FeCl₃ keine charakterist. Farbrk. gebend, findet als Zwischenprod. für die Herst. pharmazeut. Präparate Verwendung. (D. R. P. 406213 Kl. 12p vom 29/12. 1922, ausg. 15/11. 1924.) SCHOTTLÄNDER.



Chemische Fabrik auf Actien (vorm. E. Schering), Berlin (Erfinder: Max Dohrn, Charlottenburg, und Hans Horsters, Nowawes b. Berlin), Darstellung von 1,2'-Pyridyl-3-methyl-6-pyridazinon, dad. gek., daß man Lävulinsäure u. 2-Pyridylhydrazin bei höherer Temp. aufeinander einwirken läßt. — Man gibt z. B. in auf 50° erwärmtes 2-Pyridylhydrazin in kleineren Anteilen Lävulinsäure u. erhitzt das bald erstarrende Gemisch einige Stdn. auf 140°, wobei W. entweicht. Das noch w. Prod. wird dann im Vakuum dest., wobei die Hauptmenge als hellgelbes Öl, Kp.₂₃ zwischen 242 u. 247°, übergeht u. in der Kälte erstarrt. Das 1,2'-Pyridyl-3-methyl-6-pyridazinon nebensteh. Zus., fein krystallin. M., F. 105°; Chlorhydrat F. 242°, Hydrazon aus Pyridylhydrazin F. 183°.



findet als Ausgangsstoff für pharmakolog. wirksame Stoffe Verwendung. (D. R. P. 406214 Kl. 12p vom 28/12. 1922, ausg. 15/11. 1924.) SCHOTTLÄNDER.

Chemische Fabrik auf Actien (vorm. E. Schering), Berlin (Erfinder: **Ma Dohrn**, Charlottenburg, und **Hans Horsters**, Nowawes b. Berlin), *Darstellung von Kondensationsprodukten aus 2-Aminopyridin, Benzaldehyd und Acetylbrenztraubensäureestern*, 1. dad. gek., daß man Benzaldipyrindylamin mit acylierten Brenztraubensäureestern oder Oxalessigester ohne äußere Wärmezufuhr kondensiert u. gegeben falls die hierbei entstandenen Verb. erhöhten Temp. aussetzt. — 2. darin bestehend, daß man 2-Aminopyridin, Benzaldehyd u. einen Acetylbrenztraubensäureester oder Oxalessigester im Verhältnis von 2:1:1 Mol., mit oder ohne Lösungsm., unter Erwärmen auf einander einwirken läßt. — Beispiele sind angegeben für die Herstellung des Kondensationsprod. aus Benzaldipyrindylamin u. Acetylbrenztraubensäureäthylester von der Zus. $C_{22}H_{21}O_4N_4$, Krystalle, F. 167—169°, unl. in W. u. organ. Lösungsmitteln, außer A. u. Chlf., geht durch längeres Stehenlassen bei erhöhter Temp. oder durch Erhitzen in 1-Pyridyl-2-phenyl-3-acetyl-4,5-diketopyrrolidin über; — des Kondensationsprod. aus Benzoylbrenztraubensäureester (1 Mol.), 2-Aminopyridin (2 Mol.) u. Benzaldehyd (1 Mol.), schwach gelbliche Nadeln. F. 145—146°, l. in A., h. Bzl. u. Na_2CO_3 -Lsg. — sowie des Kondensationsprod. aus Benzaldipyrindylamin u. Oxalessigsäureester, aus Bzl. Nadeln, F. 162°, l. in Na_2CO_3 . Die Prodd. finden therapeut. Verwendung. (D. R. P. 406216 Kl. 12p vom 19/7. 1922, ausg. 15/11. 1924.) SCHOTTLÄNDER.

A. E. Tschitschibabin, Moskau, *Darstellung von Oxyderivaten des Pyridins, Chinolins, ihrer Homologen und anderer pyridinkernhaltiger Basen*, dad. gek., daß man diese Basen mit Ätzalkalien erhitzt u. die so entstandenen Metallverbb. der Mono- oder Polyoxyderiv. dieser Basen in der üblichen Weise in die freien Oxyderiv. überführt. — (Hierzu vgl. auch Ber. Dtsch. Chem. Ges. 56. 1879; C. 1922. III. 1225.) Bei dem Verf., das unter Entw. von H_2 verläuft, entstehen meistens die α -Oxyderiv. des Pyridins, Chinolins usw. Längeres Erhitzen mit überschüssigen Alkalien führt zu Dioxyverbb., die zur Darst. von Azofarbstoffen u. für andere Zwecke verwendet werden können. Durch Zusatz von BaO zu den Ätzalkalien wird die Rk. gefördert. Aus 4-Methylchinolin (*Lepidin*) entsteht z. B. beim Erhitzen mit KOH unter Rückfluß bis zur Beendigung der H_2 -Entw., Lösen in W. u. Zersetzen mit HCl das 2-Oxy-4-methylchinolin (α -*Lepidon*), aus h. W. Krystalle, F. 223°. — Leitet man dampfförmiges 2-Methylpyridin (α -*Picolin*) durch auf über 320° erhitzte KOH, so geht es in 6-Oxy-2-methylpyridin, aus Bzl. Prismen, F. 159°, über. — Erhitzt man Chinolin mit mindestens 2½ Mol. KOH erst unter Rückfluß bis zur B. der K-Verb. des Carbostryls, u. erhöht dann die Temp. des Reaktionsgemisches auf 300—320°, so beginnt erneut die Entw. von H_2 . Nach Abspaltung von 2 Mol. H_2 läßt man erkalten u. löst in W. HCl oder H_2SO_4 fällen aus der wss. Lsg. ein dunkles Pulver, enthaltend ein Gemisch von Dioxychinolinen, hauptsächlich 2,4-Dioxychinolin (γ -Oxycarbostryl). — Durch Erhitzen von β -Naphthochinolin mit gepulvertem KOH auf 280—300° entsteht das β -Naphthocarbostryl, aus h. W. Schuppen, F. über 280° liegend. (D. R. P. 406208 Kl. 12p vom 16/8. 1922, ausg. 15/11. 1924.) SCHOTTLÄNDER.

Leopold Cassella & Co. G. m. b. H., Frankfurt a. M. (Erfinder: **Ludwig Benda**, Mainkur b. Frankfurt a. M., und **Otto Sievers**, Fechenheim a. M.), *Darstellung von Acridiniumverbindungen*, darin bestehend, daß man Oxy- oder Alkoxyacridine bei Abwesenheit säurebindender Stoffe mit alkylierenden Mitteln behandelt. — Die Oxy- u. Alkoxyacridiniumverbb. finden infolge ihrer starken baktericiden Wirkung u. geringen Giftigkeit als Antiseptika Verwendung; sie zeigen im Gegensatz zu den entsprechenden Aminoacridiniumverbb. vorteilhafterweise kaum Farbstoffcharakter u. besitzen gegenüber den Alkoxyacridinen nach D. R. P. 392066 (vgl. C. 1922. II. 891) den Vorzug, leichter l. u. diffusionsfähig zu sein. Man erhitzt z. B.

3-Dioxyacridin bei Ggw. von Nitrobenzol mit p-Toluolsulfosäuremethylester auf 0—180° u. wandelt die krystallin. *Toluolsulfosäureverb.* durch Kochen mit wss. Cl in das **3,6-Dioxy-10-methylacridiniumchlorid**, aus W. gelbe Nadeln, sl. in NaOH, n. — Aus **3,6-Dimethoxyacridin** entsteht analog das **3,6-Dimethoxy-10-methylacridiniumchlorid**, goldgelbe Schuppen, unl. in Ae., Bzl., Naphtha, swl. in Aceton, in Eg., A., ll. in CH₃OH, aus dieser Lsg. durch Ae. fällbar. — Das aus p-Toluolsulfosäureäthylester u. dem *Dimethoxyacridin* sowie Umsetzung der *Toluolsulfosäureverb.* mit verd. HCl erhaltliche **3,6-Dimethoxy-10-äthylacridiniumchlorid**, aus W. dunkelgelbe, goldglänzende Schuppen, F. 198° unter Zers., stark bitter schmeckend, in Eg. u. A. l., in Ae., Bzn., Chlf. u. Bzl. unl. — Erhitzt man in Nitrobenzol l. *Dimethoxyacridin* mit *Benzylchlorid* auf 150°, so geht es in **3,6-Dimethoxybenzylacridiniumchlorid**, aus W. dunkelgelbe, bitterschmeckende Nadeln, F. 236° unter Zers., l. in A., Glycerin, CH₃CO₂H, unl. in Ae., Bzl. u. Chlf., über. — Das durch Einw. von *Äthylenchlorhydrin* bei 125° erhaltliche **3,6-Dimethoxy-10-oxäthylacridiniumchlorid** bildet aus W. umkrystallisiert hellgelbe, bei 240—242° unter Zers. schmelz., in A., Äthylenchlorhydrin u. CH₃CO₂H ll., in Bzl., Lg. u. Chlf. unl. Nadeln. **R. F. 403868** Kl. 12p vom 15/2. 1923, ausg. 24/1. 1925. **E. P. 218542** vom 10/10. 1923, ausg. 31/7. 1924.)

SCHOTTLÄNDER.

Etablissements Poulenc Frères und Auguste Behal, Paris, *Herstellung von Oxyalkylsubstitutionsprodukten des Theobromins und deren Oxydationsprodukten*, dad. gek., daß man auf Theobromin in alkal. Lsg. Halogenhydrine einwirken läßt. — 2. dad. gek., daß man die *1-Oxyalkylsubstitutionsprodd.* des Theobromins mit oxydierenden Mitteln behandelt. — Beispiele sind angegeben für die Herstellung *1-Oxäthyltheobromins* aus in wss. NaOH gel. Theobromin u. Glykolchlorhydrin, aus sd. W. Krystalle, F. 194°, ll. in W., besonders in h., sl. in A. u. Chlf. — des *Dioxypropyltheobromins* aus *Glycerinmonochlorhydrin* u. in wss. NaOH gel. Theobromin, aus sd. A. Krystalle, F. 155—156°, sl. in W., wl. in A., von der Zus. $\text{H}_2\text{O}_2\text{N}_4\cdot\text{CH}_2\text{CH}(\text{OH})\cdot\text{CH}_2\cdot\text{OH}$, — sowie für die Oxydation des *1-Oxäthyltheobromins* in wss. Lsg. mit KMnO₄ bei Ggw. von CH₃CO₂H zu *Theobromin-1-essigsäure* C₇H₇O₂N₄·CH₂·CO₂H, aus sd. W. Krystalle, F. 259—260°. (**F. P. 569463** vom 20/10. 1922, ausg. 12/4. 1924 u. **F. P. 27349** [Zus.-Pat.] vom 20/11. 1922, ausg. 16. 1924.)

SCHOTTLÄNDER.

XV. Gärungsgewerbe.

H. van Laetem, *Die Geschichte des Alkohols*. Kurzer Überblick über die geichtliche Entw. der Darst. vergorener Getränke u. der Dest. von A. daraus. *Annales de la Brasserie et de la Distillerie* **23**. 107; *Brewers Journ.* **60**. 659—60. 24.)

RÜHLE.

Y. Nishiwaki, *Über die Ursache des Schwarzwerdens der Dachziegel auf den Bauereigebäuden*. Die Ursache der auffallenden Erscheinung, daß in Japan die Dachziegel von Gebäuden, in denen Saké, Essig u. Soja hergestellt werden, eine schwärzere Färbung zeigen als diejenigen anderer naheliegender Gebäude, wird in dem *Dematium pullulans* DE BARY gefunden. Dieses erhält einen günstigen Nährboden wohl dadurch, daß bei Verarbeitung des Getreides sehr feine Getreidekörner herumfliegen, die sich auf den Dächern absetzen u. Feuchtigkeit usw. absorbieren. In Kojiextrakt mit 8% A., Sojakojiextrakt mit 15% NaCl u. Speisesig mit 4% Essigsäure entwickelt sich der Pilz nicht, er hat nach den bisherigen Erfahrungen auch während der Gärungsdauer keinen schädlichen Einfluß auf die Gärung geübt. (*Zentralblatt f. Bakter. u. Parasitenk.* Abt. II. **63**. 173—75. Osaka, techn. Hochsch.)

SPIEGEL.

E. Lühder, *Über Hefenaussaat und Größe der Hefengefäße*. Es werden die Beziehungen zwischen Hefenaussaat u. Größe der Hefengefäße erörtert u. an

mehreren Beispielen die Größenverhältnisse für die Hefengefäße unter den jeweils vorhandenen Bedingungen berechnet, die unter den heutigen Umständen als zweckentsprechend bezeichnet werden müssen. (Brennereiztg. 41. 206. 210; Ztschr. f. Spiritusindustrie 47. 331. 1924.) RÜHLE.

Wagner, *Hopfendarren mit offener Koks- bzw. Holzkohlenfeuerung*. Es wird empfohlen, sich der Einführung offener Koksdarren im Hopfenbau zu widersetzen u. Darren mit geschlossener Feuerung, die besseren Hopfen liefern, beizubehalten (Wochenbl. d. landw. Ver. in Bayern; Allg. Brauer- u. Hopfenztg. 64. 1257. 1924. Weihenstephan.) RÜHLE.

Dietrich Wiegmann, *Die Hallertauer Hopfen der Ernte 1924 und die Weihenstephaner Versuchssude*. Die zu den Versuchssuden verwendeten Hopfen enthielten (‰):

	Wassergehalt	Bitterstoffe	
		lufttrocken	wasserfrei
Starkscheckiger Hopfen	10,8	12,8	14,35
Grüner Hopfen	16,0	11,7	13,93
Halbscheckiger Hopfen	14,1	12,0	13,97

Die Hopfen sind reich an Bitterstoffen, nur der starkscheckige Hopfen hat n. Wassergehalt. Die Sude wurden mit Weihenstephaner Leitungswasser (etwa 22 Carbonathärte) u. mit enthärtetem W. ausgeführt. Durch die Verwendung enthärteten W. war der Bitterstoffverlust gegenüber dem unveränderten Leitungswasser um 13—14‰ größer geworden; die Bitterstoffe der scheckigen u. grünen Hopfen verhielten sich bei den Suden ganz gleich. Scheckiger Hopfen kann anstandslos auch zur Bereitung der leichtesten Biere verwendet werden. Ferner haben die Sude wieder gezeigt, daß die bei der Analyse gefundene Bitterstoffmenge keinen Aufschluß über die Höhe der Hopfengabe sowie die Stärke des bitteren Geschmacks eines Bieres gibt. (Allg. Brauer- u. Hopfenztg. 64. 1213—14. 1924. Weihenstephan. Staatl. brautechn. Vers.-Stat.) RÜHLE.

Bokorny, *Einiges über Gerste und Hefe*. *Gerste*. Behandlung der Samen mit Kali (KOH). Es wird über Beizverss. an Gerste, Erbsen u. Bohnen mit Lsgg. von KOH Kaffein, Mn-Sulfat, NaOH, NH₃, CaO berichtet. — *Hefe u. Inulin*, ferner *Pentosen Ernährungsversuche an Hefe*. Inulin konnte nicht zur Ernährung von Hefe dienen. Wie es sich mit den Pentosen hierbei verhält, geht aus dem vorliegenden Schrifttum nicht eindeutig hervor; Vf. beabsichtigt deshalb eine erneute Prüfung dieser Frage. — *Hefe u. Aminotetrazotsäure*. Die Hefe kann diese Säure nicht als Nahrung benutzen. Glykokoll, Tyrosin u. Leucin können zur Ernährung dienen. Algen bilden daraus Stärke. Ebenso verhalten sich Asparaginsäure, Hydantoin, Urethan, Kreatin, Betain u. Neurinsalze. Nitrilanilin ist eine gute N-Quelle für Hefe u. Schimmelpilze. Aus Cyanverbb. (z. B. Ferrocyankalium) können Pilze der C nicht assimilieren. (Allg. Brauer- u. Hopfenztg. 64. 1214—16. 1924.) RÜHLE.

H. Stanley Taylor, *Der Khaprakäfer; sein Einfluß auf den Wassergehalt lagernden Malzes*. Auf ind. Gerste u. daraus hergestelltem Malze ist diese Schmarotzer wiederholt nachgewiesen worden. Es ist ein ganz kleines Tier, das durch die feinsten Öffnungen schlüpfen kann. Vf. nahm bisher an, daß der *Khaprakäfer* sich auf Malz oder Korn mit weniger als 2‰ Gehalt an W. nicht entwickeln könne. Neuere Beobachtungen haben aber wahrscheinlich gemacht, daß der Käfer die Fähigkeit hat, W. zu erzeugen u. sich somit selbst geeignete Entwicklungsbedingungen zu schaffen (vgl. nachf. Ref.). (Bulletin Nr. 13. 2. 113—17. 1924. Lab. von MURPHY AND SON, Ltd., Bureau of Bio-Technology. London, Leeds u. Nottingham. Sep.) RÜHLE.

F. A. Mason, *Der Khaprakäfer in englischem Malz*. (Vgl. vorst. Ref.) V.

achtet über die Lebensgewohnheiten des *Khaprakäfers* (*Tragoderma Khapra* oder *granarium* Everts). Auffällig ist die Widerstandsfähigkeit des Käfers gegen die Temp.; er scheint 56° nicht nur zu ertragen, sondern sich dabei auch zu entwickeln u. sie auf Grund seiner Lebensvorgänge in von ihm befallenen Malze zu erzeugen, das bei starkem Befallensein immer Temp. von 44—49° zeigt. Der Gehalt an W. von Malz kann durch die Tätigkeit dieses Käfers von ursprünglich 10% auf 10% gebracht werden. Als wirksame Maßnahme gegen diesen Schmarmer kennt Vf. das Räuchern; von den dazu von VOELKER (Arbb. d. Biolog. Anst. f. Land- u. Forstwirtschaft 1924. Nr. 13) erwähnten Stoffen hat *Erpikrin* die besten Erfolge gezeigt. (Bulletin Nr. 13. 2. 118—23. 1924. Lab. MURPHY AND SON, Ltd., Bureau of Bio-Technology. London, Leeds, Nottingham. Sep.) RÜHLE.

H. E. Foote, *Die Gewinnung von Fuselöl auf den Philippinen*. Die im Rohalkohol vor der Rektifikation enthaltene Menge *Fuselöl* beträgt etwa 0,4%; sie entspricht etwa dem gesamten bei der Gärung gebildeten Fuselöle, es geht also bei der Dest. der vergorenen Melasse nichts davon verloren. Von dieser Menge können 1000 l. Rohalkohol 0,2—0,23% gewonnen werden. Es ist dies aber nur ein kleiner Teil der größeren Brennereien der Philippinen möglich, die etwa 65% der ganzen Erzeugung von A. bewältigen. Die Verff. zur Gewinnung des Fuselöls sind einfach zu handhaben. Das Fuselöl aus Melassen enthält in der Hauptsache *isoamyl-alkohol* ($(\text{CH}_3)_2\text{CH}\cdot\text{CH}_2\cdot\text{CH}_2\text{OH}$, Kp. 131,5°) u. inaktiven oder *isoamyl-alkohol* ($(\text{CH}_3)_2\text{CH}\cdot\text{CH}_2\cdot\text{CH}_2\text{OH}$, Kp. 129°), dagegen das aus der Nipapalme außerdem beträchtliche Mengen von Zwischenprodd., besonders *Propyl-* u. *Butylalkohole*. Das Fuselöl aus Melassen destilliert fast völlig zwischen 127 u. 132°, das aus der Nipapalme zwischen 115 u. 135°. Weitere Angaben betreffen den Destillationsverlauf u. die dabei über die Gewinnung des Fuselöls gemachten Erfahrungen. (Philippine Journ. of Science 25. 405—12. 1924. Manila.) RÜHLE.

W. Windisch und P. Kolbach, *Einfluß des Maischverfahrens und des p_H auf die Zusammensetzung der Würze und auf die Acidität der Biere*. In Gemeinschaft mit M. Derz, J. de Groen und E. Klein. (Vgl. Wehschr. f. Brauerei 39. 273; 1923. II. 927.) Es wurden Maischverss. nach einem Eiweißbrastdekoktionsverf. bei 50° (I), einem Eiweißbrastinfusionsverf. bei 50° (II) u. einem Hochkurzmaisverf. bei 62° (III) angestellt. Die näheren Bedingungen der Verss. müssen im Original angesehen werden. Die Extraktausbeuten waren bei I > II > III (78,87, 78,63, 74,7% der Malztrockensubstanz). In allen Fällen erhöht Zusatz von Säure die Ausbeute, während Zusatz von Lauge etwas erniedrigt. Der Laugenzusatz entspricht einem schwachen Carbonatwasser. — Die Größe der Titrationsacidität der Würzen gegen Neutralrot nimmt ebenfalls in der Reihenfolge I > II > III ab. Die Temp. von III liegt weit oberhalb vom Optimum der Säurebildung. — Es wird durch Analysen u. Formeln gezeigt, daß sowohl zugesetzte HCl als auch zur Maische zugesetzte NaOH zum Teil durch Umsetzung mit Treberbestandteilen aus der Maische verschwindet. Die Ausführungen müssen im Original nachgelesen werden. — Kocht man die Würzen, so wird die Acidität erhöht bzw. es verschwinden alkal. Stoffe. — Die Titrationsalkalität gegen γ -Dinitrophenol wird ebenfalls durch Erhitzen beeinflusst, u. zwar weist die auf freier Flamme gekochte Würze eine geringere Alkalität auf als die im Wasserbad gekochte Würze. — Die nach III hergestellten Würzen, welche die niedrigste Titrationsacidität haben, haben die höchste $[H^+]$, d. h. das niedrigste p_H . — Als Maß der Pufferung dient der Tangens des Winkels, den die kolorimetr. oder elektrometr. Titrationsgerade mit der Ordinate bildet. I. II liefern gute, III schlechter gepufferte Würzen. — N-Gehalt der Würzen nimmt ab II > I > III. — Verf. III liefert die zuckerreichsten Würzen. — Mit

steigendem Zusatz von Säure fällt der Endvergärungsgrad etwas. — Die Messung des pH der vergorenen Würzen zeigt, daß das Bier aus den sauersten Würzen alkalischer ist als das aus Würzen ohne Zusatz. Verf. III liefert die sauersten, Verf. I die alkalischsten Biere. (Wechschr. f. Brauerei 41. 237—40. 243—46. 1924. Berl. Vers.- u. Lehranst. f. Brauerei.) HESSE.

Alfred Delroisse, *Fabrikation von Karamel aus Glucosen. Untersuchungen über die Ursachen der Biertrübungen.* Die Biertrübungen beim Zusatz von karamellisierter Saccharose oder Glucose werden wahrscheinlich durch Fe- u. Al-Salze hervorgerufen, die beim Reinigen der Zucker nicht entfernt wurden. Die Karamellisierung muß unter 205° erfolgen, da sonst Substanzen entstehen, welche ebenfalls eine Biertrübung bewirken können. (Petit Journ. du Brasseur 32. 636—37. 1924. Ztschr. f. Spiritusindustrie 48. 16—17.) HESSE.

Paul Hassack, *Sind die Oxydationsleistungen von Schnelllessigbildnern im Dauerbetrieb, sowie die augenblicklich in der Praxis erzielten Säureausbeuten beschränkt auf die bisherigen Produktionsleistungen?* Vf. erörtert die Frage nach den Ausbeuten, die von Schnelllessigbildnern im prakt. Betriebe erreicht werden an Hand einer mehrmonatlichen Betriebsbeispiele. Das Rothenbachsche Verf. bezeichnet Vf. als Grund eigner Unterss. u. genauer Kenntnis des Verf. als einen wesentlichen Fortschritt auf dem Gebiete der Schnelllessigfabrikation. (Dtsch. Essigind. 28. 373—374. 1924.) RÜHL.

W., *Alte Spanfüllungen und ihre Nachteile.* Sie bilden eine dauernde Gefahr für den ganzen Betrieb der Schnelllessigbildner, sie sind Herde der Überoxydation u. eine der Hauptursachen schlechter Maischeverteilung mit deren Nachteilen. Deshalb sind alte Späne umgehend zu entfernen; wann dies zu geschehen hat, hängt von den jeweiligen Umständen ab. (Dtsch. Essigind. 28. 357—58. 1924.) RÜHL.

E. A. Vuilleumier, *Nachweisprobe für die Anwesenheit von Diäthylphthalat in denaturiertem Alkohol.* 50 ccm werden durch Erwärmen frei gemacht von A. Bzl., Rückstand mit W. aufnehmen u. im Reagensglas mit NaCl-Lsg. (20:100) versetzen. Diäthylphthalat scheidet sich aus. Soviel NaCl-Lsg. zusetzen, daß das Phthalat frei schwimmt, also die gleiche D. hat als die Lsg. D. bestimmen. Diäthylphthalat hat D. 1,123. (Journ. Ind. and Engin. Chem. 16. 1120. 1924. Carlisle [Pa.].) GRIMME.

Nathan-Institut A.-G., Zürich, übert. von: **Eduard Moufang**, Kirm a. d. N. *Behandlung von in der Gärungsindustrie verwendeten Substanzen.* (A. P. 15176 vom 31/5. 1919, ausg. 2/12. 1924. — C. 1921. II. 38.) OELKER.

Gustave T. Reich, Sausalito, Californ., *Reinigung von Gärungsgasen.* Man wäscht diese Gase mit verd. A. u. W., dann unterwirft man sie der Einw. eines sechswertigen Cr-Verb. u. H₂SO₄, entfernt die H₂SO₄ daraus u. bringt sie endlich mit einer M. in Berührung (Holzkohle u. ein geruchloses Öl), die die organ. Oxydationsprodd. herausnimmt. (A. P. 1519932 vom 3/6. 1922, ausg. 16/12. 1924.) KAUFMANN.

Société E. Barbet et Fils et Cie., Frankreich (Seine), *Kontinuierliche Herstellung von absolutem Alkohol.* Die Dest. des mit Kalk vermischten A. findet in einem Verdampfer statt, der so konstruiert ist, daß das Durchrühren der Mischung anstatt durch ein in der Kolonne angeordnetes Rührwerk durch den Kochprozess selbst erfolgt. (F. P. 27777 vom 21/2. 1923, ausg. 18/8. 1924. Zus. zu F. P. 55366 vom 1/12. 1923. C. 1923. IV. 1012.) OELKER.

XIX. Brennstoffe; Teerdestillation; Beleuchtung; Heizung

Percy E. Spielmann, *Nomenklatur des technischen Benzols und seiner Fraktionen.* Vf. gibt Definitionen, um die bisher in der engl. Sprache herrschenden Verwirrungen zwischen „Benzol“ u. „Benzene“ zu vermeiden. Die Bezeichnung

enzol“ sollte nur für techn. Rohbenzol [angewandt werden; für den reinen Stoff C_6H_6 ist sie wegen der Endsilbe „ol“ (Alkohol) abzulehnen. „Benzene“ lemnach nur für das reine C_6H_6 anzuwenden. (Chemistry and Ind. 44. 56.) ZA.

Tübben, *Neuere Hilfsgeräte im Grubenrettungswesen*. Besprechung neuer Atmungsgeräte, einer neuen, elektr. Grubenlampe u. des Lobelins. Letzteres ist das Chlorhydrat eines Alkaloids der Lobelia inflata u. bewirkt bei subkutaner Injektion eine Erregung des Atemzentrums. Die Wirksamkeit wächst mit steigendem CO_2 -Gehalt des Blutes. (Braunkohle 23. 691—95. 1924. Berlin.) BIELENBERG.

G. Franke, *Elektrische Brasenentstaubung*. Vf. bespricht zunächst das Prinzip elektr. Gasreinigung nach COTTRELL-MÖLLER u. die Anwendung des Verf. für die Brasenentstaubung. Einige bereits errichtete Anlagen werden geschildert u. die damit gemachten Erfahrungen besprochen. (Braunkohle 23. 745—52. 1924. Berlin.) BIELENBERG.

Eintracht-Braunkohlenwerke u. Brikettfabriken A.-G., Welzow, N.-L. u. Siemens-Schuckert-Werke G. m. b. H., Siemensstadt bei Berlin, *Elektroretorten in Braunkohlenbrikettfabriken*. Beschreibung einiger Elektrofilteranlagen zur Reinigung u. Innenentstaubung von Brikettfabriken hinsichtlich Konstruktion, Betriebssicherheit, Wirkungsgrad u. Wirtschaftlichkeit. (Braunkohle 23. 753—58. 1924. Berlin.) BIELENBERG.

S. W. Parr und H. F. Hadley, *Die Untersuchung von Kohle mit Phenol als Lösungsmittel*. Verss. der Vff. haben ergeben, daß Phenol ein brauchbares Extraktionsmittel für Kohle darstellt. Die Extraktausbeuten sind höher als mit anderen Lösungsmitteln. Eine chem. Einw. des Phenols findet nicht statt. Dies ergibt sich daraus, daß Extrakt + Rückstand = Einwage. Die Extraktion wird mit Phenol von 110° vorgenommen; die Temp. wird dad. eingehalten, daß das siedende Phenol unmittelbar nach dem Extraktionsgut an einem Gefäß mit siedendem Toluol kondensiert wird u. auf die Kohle herabfließt. Um Oxydation zu vermeiden, wird im CO_2 -Strom gearbeitet. Der Rückstand wird durch Soxhletextraktionen mit A. u. Ä. von dem überschüssigen Phenol befreit, in CO_2 -Atmosphäre bei 200° getrocknet u. gewogen. Der Extrakt wird bei vermindertem Druck allmählich auf 200° erwärmt; mittels dieses Stroms wird bei dieser Temp. schließlich noch vorhandener Phenoldampf entfernt. Zerss. sollen bei 200° noch nicht eintreten. Extraktausbeuten bei zahlreichen Verss. im Original. (Fuel 4. 31—38. Illinois Univ.) BIELENBERG.

Rudolf Lessing und Maurice Alfred Lister Banks, *Katalytische Beeinflussung der Verkokungsvorgänge*. (Journ. Chem. Soc. London 125. 2344—55. 1924. — C. 1925. 10.) BIELENBERG.

R. A. Mott, *Koksöfen mit Nebenprodukten-Gewinnung*. I. Übersicht über die Entwicklung der Kokerei vom Meiler, Bienenkorbofen bis zum modernen Koksofen mit Nebenproduktengewinnung. Statist. Material über die Entw. in Deutschland, England u. den Vereinigten Staaten. (Fuel. 4. 15—23. Sheffield University.) BIELENBERG.

—, *Verkokung einer Süd-Wales-Kohle in Vertikalretorten*. Die Verss. sind im Rahmen der Arbeiten des Fuel Research Board ausgeführt. Während der Verkokung wurde vom unteren Ende der Retorten Dampf eingeblasen zum Schutz der inneren Retortenteile gegen zu starke Erhitzung. Der Dampfzusatz bewirkte eine geringe Erhöhung der Teerausbeute u. des NH_3 . Der Heizwert des Gases wurde dadurch etwas verringert, die Gasmenge vergrößert. Der anfallende Koks war qualitativ besser. (Gas Journ. 168. 903—4. 1924.) BIELENBERG.

D. J. W. Kreulen, *Beitrag zur Kenntnis der Kohle von Wemyss Leven*. Bei seinen früheren Unterss. (vgl. S. 594) hatte Vf. gefunden, daß die prozentuale Zusammensetzung der zerkleinerten Kohlenproben hinsichtlich der Korngrößen Verschiedenheiten zeigt,

die von der Härte des Materials abhängig sind. Die Frage des verschiedenen chem. Verh. der einzelnen Korngrößen war noch ungeklärt. Verschiedenheiten d. letzteren Art treten beim Anthrazit nicht auf, wohl aber bei Kohlen, die ja bekanntlich aus verschiedenen Komponenten (Clarain, Vitrain, Durain, Fusain), bestehen. D. vom Vf. untersuchte Kohle ließ sich relativ bequem in diese Bestandteile zerlegen. Es wurden nun sowohl die ursprüngliche Kohle als auch die einzelnen Komponenten zerkleinert u. durch Siebung einzelne Korngrößenfraktionen gewonnen, deren chem. Verh. untersucht wurde. Während die einzelnen Siebfraktionen der ursprünglichen Kohle die schon früher beobachteten Verschiedenheiten in physikal. u. chem. Hinsicht zeigten, war dies bei den Fraktionen der Komponenten nicht oder nur untergeordnetem Maße der Fall, mit Ausnahme eines holzkohleartigen, sehr weichen Bestandteils, der vermutlich aus zwei verschiedenen Substanzen besteht. Aus d. Resultaten ist zu schließen, daß das unterschiedliche Verh. verschiedener Siebfraktionen einer gepulverten Kohlenprobe auf den Umstand zurückzuführen ist, daß die Kohle aus mehreren Komponenten verschiedener Zus. u. Härte besteht. (Brennstoffchemie 6. 6—8. Rotterdam, Chem. Labor. d. Steenkohlen-Handelsvereinigung.)

BIELEBERG.

R. A. Dengg, *Über das Backvermögen von festen Brennstoffen*. Vf. untersuchte Kohlen der Staatsgrube „Emma“, die ein starkes Backvermögen aufweisen. Die Kohle wurde mit Magerkohle in verschiedenen Verhältnissen gemischt. D. Verss. zeigen, daß die Form des erhaltenen Koks von der Temp., dem %-Geh. an Magerkohle, dem Aschegehalt der backenden Kohle u. der Tiegelform abhängt. Die Ausführungen von KREULEN (Chem. Weekblad. 21. 396; C. 1924. II. 18) hinsichtlich der Tiegeldimensionen werden hierdurch bestätigt. Die Form des kleinen Kokskuchens kann prakt. als Maß für das Backvermögen angesehen werden, vorausgesetzt, daß eine niedrigere Temp. innegehalten wird als bei der Backung flüchtiger Bestandteile der Kohle. (Chem. Weekblad. 22. 13—15. Amsterdam.) K.

J. W. Meuser Bourgognion, *Kokserzeugung und Koksbeschaffenheit*. Ausführlich erörtert werden: Wahl der Kohlensorte, Anforderungen an die zu verarbeitende Kohle, Beurteilung der Koksbeschaffenheit. Angabe von Untersuchungsverfahren. (Het Gas 45. 38—42.)

GROSZFELD.

D. J. W. Kreulen, *Über die Korngröße von Kohleproben*. Vf. hat Kohlen gleicher Weise gepulvert u. der Siebanalyse unterworfen. Die meisten Proben gaben etwa den gleichen Prozentsatz der verschiedenen Siebfraktionen mit Ausnahme von sehr hartem Anthracit u. weicher Braunkohle. Die Feinheit ist eine Funktion der Härte. Bei reinen Kohlen besitzt die feinste Siebfraktion im allgemeinen den höchsten Aschengehalt, bei unreinen Kohlen ist es umgekehrt. Feuchte Kohlen geben feinere Proben. Der aus verschiedenen Siebfraktionen einer reinen Kohle hergestellte Koks ist in der Regel bei den feinsten Fraktionen am stärksten gebläht. (Brennstoffchemie 5. 281—85. 1924. Rotterdam, Steenkohlen-Handelsvereinigung.)

TROPSCH.

H. G. Shatwell und J. Ivon Graham, *Die Hydrierung und Verflüssigung von Kohle*. I. Vff. haben einige engl. Kohlen u. die einzelnen Komponenten (Vitrain, Clarain, Durain, Fusain) auf ihre Umwandlung in Öle nach dem Verf. von BERGIUS unters. Sie haben gefunden, daß die Hydrierung tatsächlich bei hohen Druck u. Temp. (400—436°) fl. Prodd. liefern kann. Die Prodd. selbst wurden noch nicht näher untersucht. Die Behauptung BERGIUS, daß Kohlen mit einem C-Geh. von mehr als 85% nicht verflüssigbar seien, trifft für die von Vff. untersuchten Kohlen nicht zu. Die Zugabe von organ. Lösungsmitt. erhöht entsprechend die Angaben von BERGIUS die Ausbeute an fl. Prodd. Vff. verwendeten hierbei mit gutem Erfolg Phenol. Die aus Clarain u. Durain derselben Kohle erhaltenen

odd. ähnelten sich hinsichtlich der Menge u. Zus. Vf. erblicken darin eine Bestätigung der Ansicht von TIDESWELL u. WHEELER (Journ. Chem. Soc. London 5. 690; C. 1920. IV. 197) wonach Clarain- u. Durain derselben Kohle einander ähnliche chem. Konst. zeigen. Fusain lieferte ein scheinbar unverändertes Prod. uel 4. 25—30. Birmingham, Univ.) BIELENBERG.

R. Wüster, *Neuzeitliche Betriebsüberwachung in Kohlenwäschen*. Die Überwachung der Kohlenwäschen darf sich nicht auf tägliche Feststellung der S-, W-Aschengehalte beschränken. Es ist vielmehr notwendig, zu prüfen, ob die Wäsche maximalen Betriebsgang hat. Diese Kontrolle wird ermöglicht durch Aufstellung von Waschkurven, die entweder nach der Methode von HENRY u. REINHARDT oder nach dem Schwimm- u. Sinkverf. erhältlich sind. An Hand von Betriebsbeispielen erläutert Vf. die Anwendung u. Deutung derartiger Waschkurven für Beurteilung u. Überwachung von Kohlenwäschen. (Glückauf 61. 61—68. Essen.) BIE.

—, *Kohlenstaub-Mikrophotographien*. Mikrophotographien von Mager-, Fett- u. Braunkohlenstaub. (Arch. f. Wärmewirtsch. 6. 15.) BIELENBERG.

Fritz Hinden, *Beobachtungen über Zersetzungserscheinungen an Steinkohlen*. Es werden einige im Gaswerk Zürich beobachtete Autoxydationserscheinungen von stapelter Kohle (Verwitterung, Selbstentzündung) beschrieben. Die in Frage kommenden Kohlen hat Vf. auf ihre Br-Aufnahme u. ihr Verhalten gegen KMnO_4 untersucht. Er unterscheidet gute Lagerkohlen, k. Verwitterungskohlen (bei ihnen geht die Autoxydation ohne Wärmeentw. vor sich) u. Selbstentzündungskohlen. Letztere sind gegenüber den Lagerkohlen durch geringe Br-Zahl u. KMnO_4 -Zahl deutlich zu unterscheiden. Die k. Verwitterungskohlen zeigen erst nach Einsetzen der Verwitterung Unterschiede gegenüber den Lagerkohlen. — Eine Methode zur Best. der KMnO_4 -Zahl wird beschrieben. (Monats-Bulletin Schweiz. Ver. Gas- u. Wärmewirtsch. 4. 417—23. 1924. Zürich, Lab. d. Gaswerks.) BIELENBERG.

Fritz G. Hoffmann, *Über den Einfluß der Drehofenkonstruktion auf die Zusammensetzung der Urteere und Gasbenzine*. Die im bisherigen Betrieb der Drehöfen übliche Abführung der flüchtigen Schwelstoffe im Gleichstrom mit der durchlaufenden Kohle läßt sich aus wärmewirtschaftlichen Gründen rechtfertigen. (Brennstoffchemie 5. 287—88. 1924. Lugau i. Sa.) TROPSCH.

A. Korevaar, *Der Einfluß von Wasserdampf in Generatoren*. Wegen der Geschwindigkeit des Gasstromes im Generator kommt es nie zur Einstellung eines Reaktionsgleichgewichtes. Alle bisherigen Schlüsse, die dieses bei den stattfindenden Rkk. vorausgesetzt haben, sind daher unbrauchbar. Der Generator kann nur einen Teil des zugeführten Wasserdampfes zerlegen; die Menge, die diesen Höchstwert überschreitet, erscheint unverändert im Gas. Im Dowsongasgenerator verbleibt im unteren Teile aller C zu CO_2 , wodurch der Generator stets in Gang bleibt, im oberen Teile dagegen sinkt die Temp. durch Zerlegung des Wasserdampfes schnell u. damit auch die Reaktionsgeschwindigkeit, so daß bald nicht mehr alles CO_2 gespalten wird; bei zuviel Wasserdampf wird dann auch dieser Folge Abnahme der Temp. nicht mehr völlig zers. u. erscheint als H_2O im Gas. Im unteren Teile ist Wasserdampfgehalt der Luft ohne Einfluß auf die Temp. (Ned. chem. Weekblad 22. 66—73. s'Gravenhage.) GROSZFELD.

M. W. Travers, *Eine kritische Studie der veröffentlichten Untersuchungsergebnisse an Wassergasanlagen*. (Vgl. S. 802.) (Journ. Soc. Chem. Ind. 43. T. 355—61. 1924.) BIE.

M. W. Travers, *Kritische Studie über Versuche am Wassergaserzeuger*. Vf. rechtfertigt gegenüber Einwänden von PARKER die von ihm gewählten therm. Daten. (Gas Journ. 168. 784. 1924.) BIELENBERG.

Erdmann, *Wasserstoff und Stickstoff in Schwelgasen*. Vf. nimmt Stellung zu der Kontroverse zwischen RUHEMANN u. ZELLER (Braunkohle 23. 932; C. 1924. II. 2103)

einerseits u. PFAFF u. TRUTNOVSKY (vgl. Braunkohle 23. 129; C. 1924. II. 569), andererseits. Er hat bei Verschwelung unter vermindertem Druck H_2 bei einer Temp. von 325° festgestellt; allerdings in wesentlich geringerer Menge als PFAFF u. TRUTNOVSKY. Viel höheren H_2 -Gehalt zeigte Braunkohlenschwelgas aus der Drehtrommel. — Vf. hat ferner im Gegensatz zu RUHEMANN u. ZELLER (Ztschr. f. angew. Ch. 35. 723; C. 1923. II. 492) festgestellt, daß beim Schwelen von Braunkohle schon von 180 — 325° freier N_2 auftritt. (Braunkohle 23. 685—89. 1924. Univ. Halle, Lab. f. angew. Ch.)

BIELEBERG.

W. Golub, *Überwachung der technischen Herstellung von Erdölgas*. Verss. über die therm. Zers. von Erdöl in der Versuchsfabrik der Universität zu Saratow ergaben: Die Temp. der Retorte muß 800 — 900° betragen; die Regulierung der Temp. muß nicht durch die Zuflußgeschwindigkeit des Erdöls, sondern durch die Änderung der Heizung bewerkstelligt werden; die Geschwindigkeit des Zuflusses des Erdöls ist empir. festzusetzen; der Gang des Prozesses ist statt an jetzt üblichen qualitativen Merkmalen an der Gasuhr zu verfolgen. — Werden die Retorten mit Stahlspänen beschickt, so nimmt die Gasausbute zu; gleichfalls ändert sich die Zus. des Gases, indem CH_4 den H_2 teilweise verdrängt. (Neftjanoc i slancevoe Chozjastvo 7. 725—29. 1924. Saratow, Univ.)

BIKERMANN.

M. Sauer, *Konsistente Maschinenfette*. Diese sind Lsgg. von Seifen in Mineralölen. Ansatz u. Arbeitsgang sind beschrieben. (Ztschr. Dtsch. Öl- u. Fettind. 45. 44—45.)

HELLER.

Franz Fischer und **Hans Tropsch**, *Über die Herstellung von Synthol durch Aufbau aus Kohlenoxyd und Wasserstoff*. (II. Mitteilung.) (Vgl. Brennstoffchemie 4. 276; C. 1924. I. 1297.) Das für die Verss. benötigte Wassergas wurde in einem kleinen Generator erzeugt, mit Gasreinigungsmasse von H_2S befreit u. die organ. S-Verbb. entweder durch akt. Kohle entfernt oder durch Erhitzen des feuchten Gases auf dunkle Rotglut in durch Gasreinigungsmasse entfernbare S-Verbb. umgewandelt. Das Wassergas enthielt durchschnittlich 1 — 2% CO_2 u. 4% N u. wurde auf 150 Atm. komprimiert. Der Kontakapp. bestand aus einem senkrecht stehenden, elektr. geheizten, innen mit Cu ausgekleideten Stahlrohr. Dem oben eintretenden Gas konnte gegebenenfalls vorher durch Passieren eines mit W. gefüllten, von außen geheizten Gefäßes Dampf beigemengt werden. Die fl. Reaktionsprodd. schieden sich in einem mit einem Entspannungsventil versehenen Stahlgefäß ab.

A. Versuche mit CO + Wasserdampf. Mit Fe-freien, jedoch zur Formiatbildung geeigneten Kontaksubstanzen (Kalikalk, $ZnO + KOH$ bzw. Li_2CO_3 auf Bimsstein, $Ca(OH)_2$, KOH auf Cu-Spänen) wurde bei 80 Atm. u. 420° in einigen Fällen nur eine Umsetzung zu $CO_2 + H_2$, jedoch keine B. fl. Reaktionsprodd. erzielt. Fe-Feilspäne mit KOH imprägniert, gaben bei 410° mit CO von 100 Atm. Druck, durch W. von 250° geleitet, ein wss. acetonalhaltiges u. ein öliges Reaktionsprod., letzteres mit einem oberen Heizwert von 8750 Cal. Gegen Ende des Vers. bildete sich bei Mangel an Wasserdampf nur Öl. Das Reaktionsgas enthielt dann $56,9\%$ CO_2 , 2% KW-stoffe, $0,2\%$ O , $21,4\%$ CO , 9% H , $5,9\%$ CH_4 u. $4,6\%$ N . Ein großer Teil des CO_2 war hier durch Zerfall von CO entstanden, auf dem Kontakt waren $37,3$ g C abgeschieden. Mit KOH imprägniertes MnO , durch Red. von Fe-haltigem Braunstein erhalten, gab geringe Mengen Öl. — **B. Versuche mit Wassergas**. Fe-freie Kontakte (Bimsstein mit $K_2CO_3 + Zn(NO_3)_2$ nach D. R. P. 293787, C. 1916. II. 530) ließen das Gas fast unverändert, es entstand keine Spur von Öl. Dagegen gab Ca-Acetat + Ferriacetat auf Bimsstein mit 85 Atm. Wassergas bei 400 — 420° eine saure, alkoholhaltige Fl., jedoch kein Öl. Fein verteiltes Fe (Brauneisenstein mit Rb_2CO_3 , ferner Fe_2O_3 mit Rb_2CO_3 auf Bimsstein u. reduziert) ist als Kontakt sofort wirksam, begünstigt jedoch wegen

echter Wärmeleitung die CO-Spaltung u. wird wegen des ausgeschiedenen C h unwirksam. Alkalisirtes, kompaktes Fe in Form von Feil- oder Dreh- en katalysiert erst nach einiger Zeit, bleibt jedoch wochenlang wirksam. — die volle Wirksamkeit der Fe-Kontakte zu erzielen, ist eine bestimmte Menge li notwendig. Meist wurden 300 ccm n. Rb_2CO_3 -Lsg. für 300 g Fe-Späne verdet. Stärkere Imprägnierungen erwiesen sich nicht wirksamer, da zu Beginn Rk. eine gewisse Menge Alkali weggewaschen wird, so daß schließlich Kon- e mit gleichen Alkalimengen resultieren. Bei schwächeren Imprägnierungen em n. Rb_2CO_3 auf 300 g Fe) nimmt die Menge der fl. Reaktionsprodd. stark das Verhältnis der in W. l. zu den öligen steigt von 0,14 auf 1,8 an. Ähn- : Ausbeuten ergab ein Vers. mit geringen Kontaktmengen (20 g Fe- ie + 20 ccm n. Rb_2CO_3); das Verhältnis der in W. l. zu den öligen Reaktions- d. war 23:1, woraus hervorgeht, daß primär in W. l. Alkohole u. Ketone ge- et werden, die erst bei weiterer Berührung mit dem Kontakt Öl bilden. — Mit ehrender Stärke der zum Imprägnieren der Fe-Späne gebrauchten Base t die Syntholausbeute. Kontakte aus Fe-Spänen u. den Basen in Form von roxyd oder Carbonat, unter möglichst gleichen Bedingungen verwendet, gaben ecbm angewandtes Wassergas ccm fl. organ. Reaktionsprodd.: Li 0,8, Na 10, , Rb 48, Ca 4,2, Sr 1,8, Ba 18. Bei Li, Ca u. Sr bildete sich kein Öl, sondern in W. l. Reaktionsprodd. Bei den stärksten Basen (Rb, Cs) war keine, bei übrigen geringe u. bei Li starke C-Abscheidung auf dem Kontakt vorhanden. Reaktionsgase enthielten bei starker Syntholbildung bis 23% CO_2 , ca. 10% ca. 4% ungesättigte KW-stoffe, die sich beim Durchleiten durch konz. H_2SO_4 gesättigten KW-stoffen C_nH_{2n} polymerisierten. — Fe-Späne + K_2HPO_4 gaben recht gute Ausbeuten an fl. Reaktionsprodd., durch Umwandlung des stark bas. H_2PO_4 in $\text{K}_4\text{P}_2\text{O}_7$ wurde jedoch der Kontakt unwirksam. Fe + H_3PO_4 gab nur s A.; jedoch kein Öl. Stark bas. Salze (K_2SiO_3 u. KCN) verhielten sich wie onate, die Syntholausbeute war nur etwas geringer.

Einfluß der Temperatur: Die günstigste Reaktionstemp. war 460°, außen essen, entsprechend 410° im Reaktionsraum. Bei niedrigeren Temp. wird die eute geringer, das Verhältnis der in W. l. zu den öligen Reaktionsprodd. ver- bt sich zu Gunsten der ersteren. Einfluß des Druckes: Zwischen 70 bis 100 Atm. wurden keine erheblichen Unterschiede in den Ausbeuten beobachtet. Bei eigeren Drucken hört zuerst die Ölbildung, dann die der in W. l. Akohole auf. Einfluß der Gasgeschwindigkeit: Das Maximum der Ölbildung wurde bei rger Gasgeschwindigkeit erreicht. Bei höherer Geschwindigkeit tritt das Öl güber den in W. l. Prodd. zurück. Einfluß der Gaszusammensetzung: CO_2 -Gemische im Verhältnis 2:1, 1:1, 1:2 gaben an n. alkal. Fe-Kontakt bei 410° 4 bzw. 32 ccm Öl pro cbm angewandtes Gas. Das Verhältnis der wss. zu den n Reaktionsprodd. war 1:1, 1:1,7 bzw. 1:7,7; pro cbm angewandtes CO ent- ulen jedoch fast gleiche Mengen Synthol. Bei CO-reichem Gas schied sich viel f dem Kontakt aus, bei H-reichem Gas blieb die C-Abscheidung aus. Synthol e) O-reichem Gas enthielt mehr höher sd. Anteile (70% bis 200%) als solches aus eichem Gas (86,5%). Die Kpp. von Synthol aus gewöhnlichem Wassergas n in der Mitte. Synthol aus CO-reichem Gas enthielt mehr in konz. H_2SO_4 l: eb. (KW-stoffe?), sowie in Bisulfit l. Bestandteile (Aldehyde u. Ketone). — Der H_2CO_3 imprägnierte Fe-Kontakt war nach 14tägigem ununterbrochenen Betrieb e voll wirksam. Je cbm Wassergas wurden günstigstenfalls 60 ccm wss. u. m ölige Reaktionsprodd. erhalten bei 450°, einem Druck von 130—118 Atm. u. a Ausströmungsgeschwindigkeit des Reaktionsgases von 40 l/Stde. Der Kontakt telt nach 14tägigem Gebrauch an der Gaseintrittsstelle 0,94%, an der Austritts- el 0,10% S u. war mit Ausnahme der untersten Schicht zu einem feinen Pulver

zerfallen, C-Abscheidung war nicht vorhanden. — Von anderen H-Überträgern a Fe erwiesen sich Sb u. J (als CuJ) für die Syntholbildung unwirksam. Mit KO imprägnierte grobe Ni-Späne erwiesen sich gegenüber Fe-Spänen gleicher Oberfläche weniger wirksam; bei 410° bildete sich nur eine geringe Menge wss. Reaktion prodd. jedoch kein Öl, bei 450° 7 ccm wss. u. 9 ccm ölige Reaktionsprodd. je cb Wassergas. Der Kontakt war stark zerfallen, C-Abscheidung nicht vorhanden. D. aus Ni-Kontakt erhaltene Synthol wies bedeutend mehr niedrig sd. Anteile u. g. ringeren C-Gehalt auf als solches vom Fe-Kontakt gleicher Beschaffenheit. V. fein verteilten Metallen, im Gemisch mit K-Acetat auf Bimsstein niede geschlagen, gab bei 420° nur Fe Synthol, Co u. Ni nur wss. Reaktionsprodd. 50%; Ni-Sn-Legierung, mit Alkali imprägniert, war unwirksam. Alkalisieretes Mo g Synthol.

In einem Zirkulierapp. (Abb. im Original), der 740 g Kontakt faßte, u. in de das Gas nach Abscheidung der fl. Reaktionsprodd. immer wieder (5mal in der Std. über den Kontakt gepumpt werden konnte, wurden aus 268 l unter 102 Atm. stehendem Gas mit 22,8% CO₂, 1,0% u. KW-stoffe, 0,4% O, 9,3% CO, 55,1% l 4,8% CH₄, 6,6% N in 4 Std. bei 410° 20 ccm Öl, 9,3 ccm in W. l. Alkohole 111 l Reaktionsgas mit 32,1% CO₂, 6,1% u. KW-stoffe, 0,5% O, 19,4% CO, 10,3% 19,8% CH₄ + Homologe, 11,8% N erhalten. Von dem Heizwert des Ausgangsgases wurden 27% in den fl. Reaktionsprodd. wiedergefunden, 10% war von d. exothermen Rk. herrührender Verlust. Bei einem anderen Vers. wurden 23% d. angewandten C in den fl. Reaktionsprodd. wiedergefunden. — Syntholbildung aus CO₂ + H₂. CO₂ + H₂ (1:2) gaben bei 80 Atm. u. 420° 48 ccm alkohol-ketonhaltiges W. pro cbm Wassergas, jedoch kein Öl. Im Zirkulierapp., der 115 Atm. Gas (24,0% CO₂, 0,1% O, 73,6% H, 2,3% N) gefüllt war, wurden na 6std. Umpumpen bei 410° 105,5 ccm wss. u. 7,5 ccm ölige Reaktionsprodd. erhalten. Zuerst bildeten sich nur wss. Prodd. u. erst nach 4std. Pumpen trat gleichzei mit CH₄ Ölbildung ein, die bis zu einem Enddruck von 7 Atm. anhielt. Geg. Schluß des Vers. waren im Gas bis 15,2% u. KW-stoffe vorhanden, die anscheine aus zuerst gebildeten Alkoholen entstanden sind. Ebenso enthielt das Öl im Geg. satz zu den Verss. mit Wassergas 40% in konz. H₂SO₄ unl. KW-stoffe. Kurz v. Eintritt der Ölbildung enthielt das Gas 19,3% CO, während der CO₂-Gehalt a 8,7% zurückgegangen war. — Aus CH₄ + CO₂ (3:1) sowie CH₄ + CO (2:1) e standen im Zirkulierapp. weder wss. noch ölige Reaktionsprodd. (Brennstoffchemie 5. 201—8. 217—27. 1924. Mülheim-Ruhr, Kaiser-WILHEM-Inst. f. Kohlforschung.)

R. J. Sarjant, *Industrielle Feuerung*. I. Besprechung der wissenschaftlich u. prakt. Grundlagen von Kohle-, Öl-, Gas- u. Kohlenstaubfeuerung. (Fuel 5—14. Sheffield.)

G. Lambris, *Die Bestimmung des Stickstoffs der Brennstoffe*. An Stelle Kjehldahlschen Methode zur N-Best., die für Kohle u. Koks zu niedrige We liefert, schlägt Vf. eine von ihm ausgearbeitete Modifikation der Dumassch Methode vor. Die Substanz wird im Schiffchen ohne Zumischung von Oxydation mitteln verbrannt. Der benötigte O₂ wird mittels geteilter Leitung vor u. hin dem Schiffchen zugeführt. Hinter dem Schiffchen befindet sich zunächst e Schicht CuO, dann eine solche von Cu-Pulver u. schließlich nochmals CuO. I Rohr wird zunächst mit CO₂ durchgespült u. luftfrei gemacht. Hierauf wird O₂-Strom verbrannt u. schließlich wieder mit CO₂ gespült. O₂ u. CO₂ werden gleichen Gefäß entwickelt u. zwar durch Zufließenlassen von H₂O₂- bzw. Na₂C Lsg. zu einer wss. Lsg. von H₂SO₄ + K₂Cr₂O₇. (Brennstoffchemie 6. 1—6. Aach Techn. Hochschule.)

J. W. Kreulen, *Die Methode der drei Punkte mit beschleunigter Abkühlung*.

GROSZFELD.

BIELNBERG.

JUNG.

TROPSCHE.

OELKER.

OECKER.

OECKER.

Powdered Fuel Plant Company, Ltd., Westminster, übert. von: **La Combustion Rationnelle (Soc. Anonyme)**, Paris, *Pulverisierapparat für Kohle u. dgl.*, in welchem die demselben in regelbarer Weise zugeführte Kohle nach dem Pulverisieren durch einen Luftstrom abgeführt wird. Die Stärke u. Menge des Luftstroms kann so bemessen werden, daß je nach Wunsch ein Pulver von größerer

oder geringerer Feinheit erhalten wird. (E. P. 190990 vom 6/3. 1922, ausg. 14/2. 1923. F. Prior. 31/12. 1921.) OELKER.

Soc. Anon. l'Air Chaud, St. Etienne, Loire, Frankr., *Gaserzeugung*. Die den Gaserzeuger zugeführte Gebläseluft wird auf eine Temp. von etwa 800° erhitzt, so daß die Rückstände im geschmolzenen Zustande entfernt werden können u. die C vollständig in CO umgewandelt wird. (E. P. 194648 vom 4/4. 1922, ausg. 2/5. 1923. Prior. 8/3. 1922.) OELKER.

Fr. Paul Schmidt, Suhl i. Thür., *Strahlapparat für Acetylenentwickler*. Bei diesem App., durch welchen dem Acetylenentwickler gleichzeitig Frisch- u. Klärwasser zugeführt werden, sind vor u. hinter dem Strahlapp. Hähne angebracht, die durch einen gemeinsamen Antrieb gesteuert werden, um den Austritt von W. aus dem Entwickler in den Behälter für die Klärung des Schlammwassers zu verhindern. (D. R. P. 408527 Kl. 26b vom 22/1. 1924, ausg. 21/1. 1925.) OELKER.

S. E. Company, San Francisco, Calif., *Schwelen oder Verkohlen von Schieferkohle, Braunkohle u. dgl.* (D. R. P. 406409 Kl. 10a vom 27/11. 1923, ausg. 22/11. 1924. C. 1925 I. 599.) OELKER.

David T. Day, Washington, Col., V. St. A., *Gewinnung von Mineralwachs aus Ölschiefen*. Man behandelt den Ölschiefer mit einem h. Lösungsm., das, wie z. B. A. die Eigenschaft hat, im h. Zustande die wachsartigen Substanzen des Schiefers zu lösen, sie in der Kälte aber vollständig wieder auszuscheiden. (A. P. 1513746 vom 15/1. 1921, ausg. 4/11. 1924.) OELKER.

David T. Day, Washington, Col., V. St. A., *Brennstoff*, welcher dadurch erhalten wird, daß man aus Ölschiefer o. dgl. die paraffin- u. harzartigen Substanzen mit einem Lösungsm., z. B. h. A. auszieht u. dann aus dem Extrakt den A. soweit abdest., bis sich eine feste Emulsion von Paraffin, Harz u. A. gebildet hat. (A. P. 1513746 vom 15/1. 1921, ausg. 4/11. 1924.) OELKER.

Standard Oil Company, Chicago, Ill., übert. von: **Charles S. Palmer**, Pittsburgh, Pa., V. St. A., *Behandlung von Petroleumölen*. Um aus schweren Petroleumölen durch Kracken leichtere Öle vom Gasolincharakter zu erzeugen, leitet man die Schweröle zunächst durch eine Erhitzungszone u. zwar unter einem solchen Flüssigkeitsdruck, daß eine Dampfentwicklung ausgeschlossen ist, u. dann durch eine Kühlzone, in welcher der Druck aufgehoben wird u. infolgedessen die Dampfentwicklung erfolgen kann. (A. P. 1514098 vom 5/7. 1917, ausg. 4/11. 1924.) OELKER.

Ellis-Foster Company, New Jersey, übert. von: **Carleton Ellis**, Montclair, New Jersey, V. St. A., *Behandlung von Petroleumölen*. Zwecks Herst. von Motortreibmitteln unterwirft man Petroleumöle, welche schwerer sind als Gasolin, bei verhältnismäßig hohem Druck u. hoher Temp. einer Spaltung, vermischt das entstandene Gemenge von aliphat. u. aromat. KW-stoffen mit einer zur vollständigen Oxydation nicht ausreichenden Menge Luft u. leitet die Mischung über einen erhitzten Katalysator. (A. P. 1516720 vom 17/12. 1921, ausg. 25/11. 1924.) OELKER.

Ellis-Foster Company, Montclair, übert. von: **Harry M. Weber**, Bloomfield, N. J., V. St. A., *Herstellung aromatischer Substanzen aus Petroleumölen*. Die Öle werden einem Krackprozeß bei 1000—1200° F. unterworfen, wodurch eine Mischung von aliphat. u. aromat. KW-stoffen erhalten wird, die man alsdann in Ggw. eines erhitzten Katalysators mit Oxydationsmitteln behandelt. Hierbei gehen die aromat. KW-stoffe in aromat. Säuren, Aldehyde, Anhydride etc. über, während die aliphat. unverändert bleiben. (A. P. 1516756 vom 12/5. 1922, ausg. 25/11. 1924.) OELKER.

Ellis-Foster Company, New Jersey, übert. von: **Harry M. Weber**, Caldwell, New Jersey, *Flüssiger Brennstoff*, welcher als Motortreibmittel dienen soll

aus durch Kracken erhaltenen oxydierten Petroleum- KW-stoffen u. Alkohol (ethylalkohol oder denaturierter A.) zusammengesetzt ist. (A. P. 1516757 vom 3/4. 1923, ausg. 25/11. 1924.) OELKER.

Carleton Ellis, Montclair, New Jersey, *Behandlung von Petroleumölen*. Petroleumöle von einem unter 300° liegenden Kp. werden entschwefelt u. auf Krackmp. erhitzt, worauf die erhaltenen Prodd. mit Luft gemischt auf eine unter Rot- hitze liegende Temp. erhitzt werden. Man erhält höhere Fettsäuren, wie *ropionsäure* u. dgl., deren Ester als *Riechstoffe* in der Parfümerie Verwendung finden können. (A. P. 1517968 vom 3/1. 1922, ausg. 2/12. 1924.) OELKER.

U. S. Gasoline Manufacturing Corporation, New York City, New York, *finder: William John Knox*, New York, V. St. A., *Spalten von Kohlenwasserstoffen*. (A. P. 9289 vom 4/10. 1922, ausg. 6/7. 1923. — C. 1924. II. 2106.) FRANZ.

Roy Cross, Kansas City, Missouri, V. St. A., *Material zum Raffinieren von Petroleumkohlenwasserstoffen*, welches aus einer anorgan. Substanz von hoher Adsorptionsfähigkeit, z. B. Bentonit u. einem Metallsalz besteht, welches eine große Affinität für S-Verbb. besitzt, wie z. B. Cu-Salze. (A. P. 1515733 vom 31/12. 1923, ausg. 18/11. 1924.) OELKER.

J. W. Chadwick, Kansas City, Missouri, *Gewinnung von Gasolin*. KW-stoffdämpfe, natürliche Gase etc. werden mit einem Lösungsm. für Gasolin, z. B. Rohöl, gewaschen; das Gasolin wird abdest. u. das zurückbleibende Lösungsm. im Waschen neuer K-W-stoffdämpfe benutzt. (E. P. 224688 vom 18/10. 1923, ausg. 11/12. 1924.) OELKER.

Andrew J. Rowland, Cincinnati, Ohio, V. St. A., *Behandlung von Asphalt*. man erhitzt den Rohasphalt auf etwa 300° F., bläst bei dieser Temp. drei- bis vierundzwanzig Stdn. Luft durch die Schmelze, kocht sie mit verd. HCl, wäscht sie mit sd. W. aus u. erhitzt nochmals auf 300° F. — Das Prod. soll zur Herst. von Asbest-, säure- u. alkalibeständigen Überzügen dienen. Es kann mit Bzl. oder Anthracen u. dgl. bis zu einer beliebigen Konsistenz verd. werden. (A. P. 1513133 vom 30/9. 1920, ausg. 28/10. 1924.) OELKER.

Lester Kirschbraun, Chicago, Ill., *Herstellung von Emulsionen aus Asphalt*. Man vermischt den geschmolzenen Asphalt o. dgl. mit einer Fettsäure, verd. diese mit wss. Alkalilsg. zu der Mischung, verarbeitet die M. zu einer Emulsion u. verrührt diese mit einem Brei von kolloidalem Ton. — Die Emulsionen sollen zur Herst. von Bindemitteln, wasserdichten Stoffen etc. dienen. (A. P. 1517075 vom 9. 1918, ausg. 25/11. 1924.) OELKER.

Ray, S. Gehr, Cleveland, übert. von: **Fred K. Bezzenberger**, East Cleveland, Ohio, *Bohröl*, welches aus einem animal. Öl (15%), einem Mineralöl (75—60%) u. einem geschwefelten vegetabil. Öl, wie Mais-, Lein-, Rüb-, Holzöl u. dgl. (25—10%) zusammengesetzt ist. — Das Öl soll frei von unangenehmen Gerüchen, klar u. sehr haltbar sein u. sich durch eine hohe Kühlwirkung auszeichnen. (A. P. 1516879 vom 26/6. 1922, ausg. 25/11. 1924.) OELKER.

Merco Nordstrom Valve Company, San Francisco, übert. von: **Sven Johansson**, San Francisco, Calif., *Schmiermittel*, welches aus einer Mischung von 10% harter Seife, 52% Schmierseife, 4% Graphit u. 12% Glycerin besteht. (A. P. 1514095 vom 28/8. 1922, ausg. 4/11. 1924.) OELKER.

Merco Nordstrom Valve Company, San Francisco, übert. von: **Sven Johansson**, San Francisco, *Schmiermittel*, welches aus Mineralöl u. einer Kalkseife zusammengesetzt ist, die aus Ricinusöl, Wachs u. Ca(OH)₂ erhalten wird. (A. P. 1514096 vom 28/8. 1922, ausg. 4/11. 1924.) OELKER.

Zacharias Olsson, New York, *Schmiermittel*, welches aus Mineralöl, Bentonit (kolloidaler Ton) u. W. zusammengesetzt ist. Der Bentonit soll als Ersatz für die

bisher benutzten organ. Kolloide (Seifen) dienen. (A. P. 1517577 vom 29/4. 1922 ausg. 2/12. 1924.) OELKER.

Arista Manufacturing Company, übert. von: **William W. Christmas**, Ridgfield Park, New Jersey, *Kunstholz*. Man vermischt 4—5 Teile zerkleinertes Holz mit 3 Teilen W. u. 1 Teil *Caseinleim*, den man aus Caseinpulver durch Zusatz von 10% Ca(OH)_2 u. der erforderlichen Menge W. herstellen kann; die M. kann gefornet oder zu dünnen Platten usw. gewalzt werden; nach dem Erhärten lassen sich die Gegenstände wie Holz bearbeiten. (A. P. 1521174 vom 21/2. 1923, ausg. 30/1. 1924.) FRANZ.

U. S. Industrial Alcohol Co., West-Virginia, übert. von: **A. A. Backhaus**, Baltimore, Maryland, *Motortreibmittel*, welches aus etwa 50% *Naphtha* u. 50% reinem *Methylalkohol* besteht. (A. P. 1516907 vom 25/6. 1918, ausg. 25/1. 1924.) OELKER.

XX. Schieß- und Sprengstoffe; Zündwaren.

M. Nierenstein, *Die Entdeckung der Pikrinsäure*. K-Pikrat war schon vor 1647 bekannt, da es in einem in diesem Jahre erschienen Buch von SALA „Opera medico-chymica“ schon als „Tincturia nitri Glauberi“ erwähnt ist. Die Pikrinsäure selber wurde 1771 von WOUFFE entdeckt. (Chemistry and Ind. 44. 117.) ZANDEL.

A. Marshall, *Geschichte der Pikrinsäure*. Vf. gibt eine ausführliche Übersicht über die Entwicklungsgeschichte der Pikrinsäure u. ihre Anwendung als *Sprengstoff*. (Chemistry and Ind. 44. 4—5.) WAGNER.

G. St. J. Perrott, *Eigenschaften von Explosionen von flüssigem Sauerstoff*. (Vgl. Engin. Mining Journ. Press 117. 610; C. 1924. II. 785.) Vf. bestimmt die charakteristischen Eigenschaften der explodierenden fl. Luft, insbesondere die Detonationszeit, Stärke der Explosion u. den Einfluß des Füllmaterials der Patronen in Abhängigkeit vom O_2 -Gehalt. Es werden die Eigenschaften von Spezialpatronen, (L. O. X.) welche mit verschiedenen Rußsorten gefüllt sind, mittels ballist. Pendelmessungen u. Messungen der Detonationszeit bestimmt. Die Resultate sind in 14 Schaubildern u. 11 Tabellen wiedergegeben. (Trans. Amer. Inst. Mining and Metallurg. Eng. 1924. No. 1388. 27 Seiten. Pittsburgh.) BECKER.

H. Kast und **A. Haid**, *Über die sprengtechnischen Eigenschaften der wichtigsten Initialsprengstoffe*. Reines, feuchtes *Bleiazid* wirkt auf Al nicht merklich, feuchtes *Knallquecksilber* nur allmählich ein. Bei letzterem bildet sich eine schwach explosive Kruste unter Abscheidung von Hg. HgCl_2 , HCl u. Hg-Oxalat wirken stärker ein. *Knallquecksilber* bildet mit Cu grüne Krusten (Cu-fulminat), die in der Flamme weniger explosiv sind. Die Tatsache, daß feuchtes CO_2 *Bleiazid* zers., wurde bestätigt. Eine nennenswerte Einw. auf Al findet dabei nicht statt. *Knallquecksilber* u. Hg-Salze verhalten sich in CO_2 wie oben beschrieben. — Von *Cyanurtriazid*, *Bleiazid*, *Knallquecksilber* u. *Bleitrinitroresorcinat* besaß das erste die größte Hygrokopizität, die prakt. nicht von Bedeutung ist. — Die Schlagempfindlichkeit wurde auf einem Amboß unter dem Fallhammer (App. im Original abgebildet) geprüft. Tabelle u. Diagramm im Original. *Cyanurtriazid* ist merklich empfindlicher als *Knallquecksilber* u. *Bleiazid*; *Knallquecksilber-Kaliumchlorat* ist etwas unempfindlicher als reines *Knallquecksilber*; *Knallquecksilber* u. *Bleiazid* unterscheiden sich nur bei niederen Fallhöhen. Bei der Prüfung auf Reibung im Porzellanmörser verschiebt sich das Verhältnis etwas. Die Empfindlichkeit des *Cyanurtriazids* scheint nicht so groß zu sein, daß sie prakt. Schwierigkeiten bereitet. — Bei *Bleiazid* tritt bei längerer Lagerung keine Verflüchtigung ein; *Cyanurtriazid* zeigt nach wenigen Tagen einen deutlichen Gewichtsverlust. Bei der Prüfung im Mikroskalimationsapp. durch KEMPF (vgl. Ztschr. f. anal. Ch. 62. 284; C. 1923. II. 94).

te sich bei 29—30° nach 96std. Erhitzung ein Anflug am Deckglas; bei 38° imiert in 24 Stdn. ein großer Anteil. Das sublimierte Salz (Mikrophotographien im Original) krystallisiert vermutlich hexagonal. Bei der Trocknung ist ere Temp. einzuhalten u. am besten Vakuum anzuwenden. Die Gefahr durch htigkeit beim Lagern kann durch Auflegen eines Celluloidplättchens in der ngkapsel verkleinert werden. Eine zufällige Überhitzung wird nicht wie beim allquecksilber schädlich wirken, zumal die Schmelzbarkeit einen Sicherheitsfaktor stellt. Knallquecksilber ist bereits bei Temp. über 50° nicht mehr lager- indig, während Bleiazid u. Bleitritiroresorcinat sich erst bei höherern Temp.etzen. Die Verpuffungsprobe wurde durch kontinuierliche Temp.-Steigerung u. desselben Musters u. durch Erhitzung bei stufenweise erhöhten Temp. ver- dener Muster geprüft im Glasrohr u. im Eisenrohr. Das Diagramm zeigt, daß allquecksilber eine rasche Erhitzung auf 160°, Cyanurtriazid auf 190°, Blei- itroresorcinat auf 260°, Bleiazid auf 335° nicht mehr ohne Detonation verträgt; längerem Erhitzen detoniert Knallquecksilber bei 145°. Bleiazid zersetzt sich e Dauerhitzung bei 150° an der Oberfläche. Bleitritiroresorcinat explodiert bei 0 nach 25std. Erhitzen. — Vff. berechnen die Explosions- u. Bildungs-Wärme nach e analyt. festgestellten Zers.-Gleichung. Die Detonationsgeschwindigkeit wurde i Siemensschen Chronographen bestimmt. Sprengungen in Bleicylindern ent- enchen annähernd den berechneten Werten der spezif. Energie. Die aus der onationsgeschwindigkeit, der spezif. Energie u. der kubischen D. berechneten ranzzahlen beweisen, daß Knallquecksilber, Bleiazid u. Cyanurtriazid zu den intesten Sprengstoffen gehören u. ihre Wrkg. als Initialsprengstoffe auf ihrer en Arbeitsleistung beruht. (Ztschr. f. angew. Ch. 38. 43—52. Berlin.) JUNG.

J. B. Taylor, *Eine neue Stabilitätsprobe für Nitrocellulose*. 4,5 g der bei 40° fln. lang getrockneten Probe werden in ein 30 cm langes, 1,4 cm weites Reagens- le fest eingestopft u. dann darin ein langes Thermometer, dessen von 135—140° endende Skala oberhalb des Verschlußstopfens liegt, eingedrückt. Die Hg-Kugel olganz in der Probe stecken. Man stellt in ein auf 135° geheiztes Xylol-Toluol- pfbad u. erwärmt vorsichtig bis zur Zers. Die über 135° liegende Temp. heißt etzungsindex. (Ind. and Engin. Chem. 16. 1185—86. 1924. Kenvil [N. Y.]) GRI.

C. A. Baldus, Charlottenburg, *Patrone zur Herstellung von Sprengladungen aus flüssiger Gase*, dad. gek., daß die Patrone mit einer die Verdampfung der ase vermindernenden Umhüllung aus MgCO₃ umkleidet ist. — Man erreicht auf ie Weise eine bisher nicht bekannte Lebensdauer der Patronen. (D. R. P. 2875 Kl. 78e vom 23/4. 1914, ausg. 14/1. 1925.) OELKER.

De Wendelsche Berg- und Hüttenwerke, Hayingen, Lothr., *Aus brennbarem Millpulver und einem Absorptionskörper für flüssige Luft bestehende Sprengpatrone* an Pat. 300630, dad. gek., daß an Stelle eines, mehrere brennbare Metallpulver esonderer Patrone oder Beutelchen eingehüllt mit oder ohne Beimischung von n. Stoff oder amorphem C zur Anwendung kommen, wobei an Stelle des organ. nbaren Stoffes verkohlte organ. Stoffe von großem Absorptionsvermögen für . Luft angewendet werden können. — Bei Erniedrigung der Herstellungskosten e Sprengmittels wird eine Erhöhung der Sprengwrkg. erzielt. (D. R. P. 402492 Kl. 78e vom 20/7. 1915, ausg. 16/9. 1924. Zus. zu D R P. 300630; C. 1921. II. 177.) OELKER.

Hans Rathsburg, Fürth, Bay., *Herstellung von Zündsätzen*. Zu dem Ref. an E. P. 201000 (C. 1924. I. 386) ist nachzutragen, daß es sich um die Ver- edung von Tetrazenen handelt. (D. R. P. 400814 Kl. 78e vom 19/10. 1921, au. 19/8. 1924. Zus. zu D. R. P. 362433; C. 1923. II. 371. F. P. 573107 vom 31. 1923, ausg. 18/6. 1924.) OELKER.

XXI. Leder; Gerbstoffe.

Madge Kaye und Dorothy Jordan Lloyd, *Eine histologische und physiochemische Untersuchung über die Quellung eines Fasergewebes*. (Vgl. auch S. 40.) Die Hautfibrillen u. -fasern sind doppelbrechend. Säure u. Alkaliquellung bewirken Verschwinden der Doppelbrechung. Bei der einzelnen Fibrille erscheint die Doppelbrechung bei der Entquellung vollkommen unverändert wieder, bei der Faser nicht, da bei ihr das Bild nicht nur durch die infolge einer inneren Struktur der Faser verursachte Doppelbrechung verursacht ist, sondern auch durch die gegenseitige Lagerung der Fibrillen, die aber durch die Quellung irreversibel verändert wird. (Quollene Fasern frischer Häute zeigen dort, wo sie durch die Querschnitte zusammen gepreßt werden, Doppelbrechung. Durch Trocknen werden diese unerschlingenden Elemente u. mit ihnen diese Doppelbrechung zerstört. Gelatinefasern (LLOYD, Biochemical Journ. 14. 584. 1920; C. 1921. I. 30) quellen nach allen Seiten während Fibrille u. Hautfaser sich bei der Quellung in der Längsrichtung kontrahieren. Diese Kontraktion ist durch eine innere Struktur veranlaßt, die das Trocknen überlebt; hingegen zeigt die frische Fibrille eine Lokalisation der Drehung des polarisierten Lichtes, die auch durch eine innere Struktur veranlaßt ist, aber bei Trocknen irreversibel verschwindet. Es ist zu unterscheiden zwischen „geschwollener“ (swelled) Haut, die dick, schlaff, von geringer Elastizität, undurchsichtig, leicht auspreßbar ist u. zwischen „praller“ (plumped) Haut, die transparent, das W. festhaltend, zurückspringend, elastisch ist. STIASNY (Gerber 200; C. 1907. I. 140) hat gezeigt, daß die Hydrate von Na, K, Ca, Ba Prallwerden mit NH_3 bloß Schwellung verursachen. Die Schwellung ist eine *Pseudoquellung*, veranlaßt durch den Eintritt von W. zwischen die getrennten Fibrillen. Das Prallwerden ist durch *Quellung*, eine kolloide W.-Aufnahme in die Fibrillensubstanz veranlaßt. Außer Ammoniak bewirken Trypsinlsg. u. starke NaCl-Lsg. Pseudoquellung. Gesättigte $\text{Ca}(\text{OH})_2$ -Lsg. bewirkt Aufbündelung u. Trennung der Fasern in einzelne Fibrillen u. dann echte Quellung. Auch die Pseudoquellung ist nicht ganz reversibel, u. die Vorbehandlung der Häute bestimmt ihr späteres Verhalten. So veranlaßt Vorbehandlung mit NH_3 u. Trypsin u. NaCl infolge Trennung der Fasern in Fibrillen, daß nachträgliche Säure- u. Alkalibehandlung stärkere W.-Aufnahme bewirken, als wenn nicht vorbehandelt wurde. Die bloße NH_3 -Wrkg. kann dabei stärker sein (unterhalb pH_5) als die Trypsinwrkg. Pseudoquellung verdickt die Fasern ohne Verkürzung, echte Quellung gleichzeitige Verkürzung (Proc. Royal Soc. London, Serie B 96. 293—316. 1924. London.) GERNGROSS.

Hugo Blänsdorf, Berlin, *Verwendung synthetischer Gerbstoffe in der Tintenfabrikation*, dad. gek., daß Kondensationsprodd., die aus ein- oder mehrwertigen Phenolen u. Estern unter Verwendung von Formaldehyd hergestellt sind u. auf Fe-Salze mit tiefblauer Färbung reagieren, gebraucht werden. — Z. B. gibt die aus *o*-Kresolsulfosäure beim Erhitzen mit POCl_3 u. Weiterkondensation mit CH_3I u. Na_2SO_3 erhaltliche sirupartige Prod. amorphe, in W. ll. Salze von den gleichwertvollen Eigenschaften wie Tannin bzw. Gallussäure. Mit Fe-Salzen erhält man tiefblaue Färbungen, mit Gelatine flockige Fällung, mit BaCl_2 einen weißen, mit HNO_3 unl. Nd., mit Anilin einen weißen Nd. Gegenüber Methylorange hat die wss. Lsg. des Prod. saure Rk. Die mit Hilfe von FeCl_3 ohne Zusatz von H oder H_2SO_4 hergestellten Tinten weisen gegenüber der üblichen Eisengallustinten den Vorteil auf, daß die Federn nicht rosten u. keine Krustenbildung eintreten. (D. R. P. 406042 Kl. 22g vom 28/10. 1923, ausg. 13/11. 1924.) SCHOTTLÄNDER.

Chemisches Zentralblatt.

1925 Band I.

Nr. 13.

1. April.

A. Allgemeine und physikalische Chemie.

Johannes Fromme, Dr. Georg Fromme †. Am 1. Februar starb der durch seine Unterss. von Drogen bekannte Mitarbeiter von CAESAR & LORETZ im Alter von 65 Jahren. (Pharm. Ztg. 70. 164.) DIETZE.

A. Sommerfeld, *Zur Theorie des periodischen Systems*. Vf. gibt eine Theorie des period. Systems, welche die von STONER (S. 10) aufgestellte Hypothese berücksichtigt, daß dieselben Quantengewichte auch die Elektronenzahlen der betreffenden Energieniveaus, bei voller Besetzung derselben, angeben. In Abweichung von der Stonerschen Ansicht kommt Vf. zu folgenden Regeln: Die aus der Systematik der Linienspektren ermittelten Quantenzahlen k und j , welche jeweils den Aufbau der sukzessiven Atomschalen bestimmen, spiegeln sich folgendermaßen in den Grundbahnen der sichtbaren Spektren wieder: 1. Die Atome, deren äußere Schalen im Stonerschen Sinn abgeschlossen sind, sind durch den Wert $j = 0$ u. durch diamagnet. Verh. ausgezeichnet. Beispiel: Edelgase, s -Term u. Diamagnetismus in der zweiten, vermuteter p_0 -Term in der vierten Vertikalreihe des period. Systems. 2. Die Atome, welche auf abgeschlossene Schalen unmittelbar folgen, besitzen in ihren Grundbahnen dieselben Quantenzahlen k u. j wie die hier beginnenden Atomschalen. Beispiel: s -Term der Alkalien u. Edelmetalle, p_0 -Term der Erden u. des ionisierten C-Atoms, d_2 -Term der Elemente Sc^{++} , Y^{++} , La^{++} . 3. „Verkehrte“ Terme lassen sich voraussehen, wenn die Grundbahn ein p_2 -Term sein würde, z. B. N , P . 4. Bei der Ausfüllung tieferer Schalen handelt es sich nicht um einen Abbau schon begonnener, sondern um einen Einbau neuer Schalen. Beispiel: Der Anfang der Fe-Gruppe bei Sc. Im weiteren Ausbau der Fe-Gruppe treten Unregelmäßigkeiten auf. Der Paramagnetismus der Ionen der seltenen Erden entspricht dem Einbau zweier N -Schalen (N_{43} u. N_{44}). Vorliegende Betrachtungen begegnen sich Schwierigkeiten bei der Deutung der relativist. Dubletts im Röntgen- u. sichtbaren Gebiet, jedoch ist eine Klärung der modellmäßigen Bedeutung der Quantenzahlen k und j auf diesem Weg zu hoffen. (Physikal. Ztschr. 26. 70—74.) FRBU.

W. Lodotschnikow, *Einfache Darstellungsmethoden der polynären Systems*. Vf. bespricht die bekannten Verff. zur graph. Darst. der Vielkörpersysteme u. schlägt auch eigene vor: 1. Drei unabhängige Bestandteile (Fig. 1) $AB = 1$, $AE = G$ = dem Molenbruch des dritten („äußeren“ im Diagramm) Bestandteils, EP = dem der ersten, PF = dem der zweiten Komponente. Das System wird durch den Punkt P dargestellt. Ist die Zus. irgend eines Systems nicht direkt durch die Molenbrüche der unabhängigen Bestandteile gegeben, sondern durch die Punkte P_1 , P_2 , P_3 der drei am Endsystem beteiligten Ausgangssysteme, so findet man den resultierenden Punkt P_0 als den Schwerpunkt von P_1 , P_2 u. P_3 . 2. Vier unabhängige Bestandteile. Das Quadrat $ABCD$ wird senkrecht aufgestellt, die vierte Komponente auf dem aus P errichteten Lot aufgetragen. Da aber drei dimensionale Diagramme nicht vervielfältigt werden können, empfiehlt Vf. ein anderes Verf. (Fig. 2) $AE = HJ$ = dem Molenbruch der vierten Komponente, EF = der ersten, EG = der zweiten, GH = der dritten. Das System wird durch den Vektor FG dargestellt. Als vierte Komponente wird man zweckmäßig die wählen, deren Konz. am meisten schwanken, als die zweite die in geringsten Konz. vorliegende.

Werden drei Vektoren JJ_1 , KK_1 u. LL_1 gegeben, so kann man bestimmen, ob System MM_1 aus den drei Ausgangssystemen zusammengestellt werden kann: ist der Fall, wenn die Punkte m u. m_1 auf einer den gegebenen Vektoren parallelen Geraden liegen. — Das quaternäre System von der Art $a + b + c = d +$ wird wie auf Fig. 1 dargestellt; der Vektor ist stets vom Ende des Abschnittes




Fig. 1.




Fig. 2.

zum Ende des Abschnittes d gerichtet. — Wie sich das Diagramm einer Reihe d Systeme gestaltet u. wie es verwertet wird, kann hier nicht auseinandergesetzt werden. (Annales de l'institut d'analyse physico-chimique 2. 255—351. 192 [Russ.] Sep.)

BIKERMANN.

P. Debye und **J. Mc Aulay**, *Das elektrische Feld der Ionen und die Neutralsalzwirkung*. Vff. geben auf Grund energet. Betrachtungen eine Erklärung d „Neutralsalzwirkung“, welche von Elektrolyten auf Nichtelektrolyte ausgeübt wird u. die sowohl in bezug auf die Lage von Gleichgewichten (Löslichkeit des Nichtelektrolyten, Aussalzeffekt, osmot. Druck) als auch auf kinet. Vorgänge (Neutralsalzwirkg. auf die Inversionsgeschwindigkeit des Rohrzuckers) in Erscheinung tritt. Die Abweichungen, welche gemäß zahlreichen Beobachtungen die Werte der osmot. Drucke, Löslichkeiten usw. gegenüber den nach der „klass. Theorie“ zu erwartenden Werten aufweisen, sobald es sich um Lsgg. handelt, welche gleichzeitig Elektrolyte u. Nichtelektrolyte enthalten, sind gemäß einer von den Vff. entwickelten Betrachtung dadurch verursacht, daß in die Gleichgewichtsbedingungen neben den Volumenänderungsarbeiten $p dv$ noch elektr. Arbeitsleistungen eingehen; diese sind deshalb aufzuwenden, weil das elektr. Feld der Ionen durch den Zusatz von Nichtelektrolyten u. die dadurch herbeigeführte Änderung der DE. in seinem Energieinhalt wesentlich beeinflußt wird. Die bei Auflösung der meisten Nichtelektrolyte in W. eintretende Verminderung der DE. bewirkt eine Vermehrung der elektr. Energie des Ionenfeldes; die hierfür beanspruchte Arbeit muß sich aber als eine Erhöhung des osmot. Druckes äußern. Der Aussalzeffekt kommt dadurch zustande, daß in dem die Ionen umgebenden elektr. Felde das Mischungsverhältnis der Lsg. in Zusammenhang mit deren DE. derart beeinflußt wird, daß die die DE. erniedrigenden Stoffe (Nichtelektrolyte) aus diesen Feldern verdrängt werden — oder mit anderen Worten — in der Nähe der Ionen häufen sich die Moleküle größerer Polarisationsfähigkeit (H_2O) auf Kosten derjenigen mit geringerer Polarisationsfähigkeit (Nichtelektrolyte) an. Diese, mehr qualitativen Überlegungen werden durch quantitative Berechnungen gestützt. In denselben werden die für die Gleichgewichtslagen maßgebenden Ausdrücke für die freien Energien der Lsgg. entwickelt u. hierbei die Zusatzarbeiten elektr. Natur gemäß den früheren Arbeiten (Physikal. Ztschr. 25. 97; C. 1924. II. 161) in Rechnung gesetzt. Es zeigt sich, daß die durch

zatz des Nichtelektrolyten verursachte Verminderung der DE. eine erhöhte Aktivität des Nichtelektrolyten zur Folge hat. Letzteres gibt einen Hinweis für Deutung eines Geschwindigkeitseffektes, nämlich der Erhöhung der Diffusionsgeschwindigkeit von Zucker durch Elektrolytzusatz. Die klassische Theorie führt hier auf Widersprüche; nimmt man jedoch an, daß die Diffusionsgeschwindigkeit nicht der Konz., sondern der Aktivität des Zuckers proportional ist, so gelangt man im Anschluß an obige Darlegungen zu einer Deutung des Effektes. Vff. führen hierauf die mathemat. Gleichungen zu ihren Betrachtungen im einzelnen aus; nach Einsetzen der experimentell bestimmten Werte für die DE. gelangen sie zu Werten für die Ionenradien, welche in der Größenordnung mit direkt bestimmten Werten zusammenpassen ($\sim 1 \cdot 10^{-8}$ cm = mittlerer Radius der K- u. Cl-Ionen). (Physikal. Ztschr. 26. 22—29. Zürich.) FRANKENB.

Marcel Brillouin, *Zustandsgleichungen für die plastische Phase eines im natürlichen Zustand isotropen festen Körpers*. Vff. wendet sich gegen die Hypothese, daß eine plast. Substanz sich wie eine isotrope Flüssigkeit verhält u. stellt demgegenüber eine Theorie auf, daß die plast. Phase dadurch gekennzeichnet ist, daß ein einziges Element der Deformation beliebig anzuwachsen imstande ist, während die übrigen weiterhin durch die Elastizitätsbedingungen bestimmt bleiben. Es werden mathemat. Ansätze allgemeiner Art in dieser Richtung entwickelt. (C. r. d. l'Acad. des sciences 179. 1563—66. 1924.) FRANKENBURGER.

Gregory Paul Baxter und **Howard Warner Starkweather**, *Die Dichte des Sauerstoffs*. Vff. bestimmen mittels einer besonders exakten Methode der Wägung u. Druckmessung die D. des O_2 in verschiedenen Proben, die sie mittels Elektrolyse, Erhitzens von $KMnO_4$, Erhitzens von $KClO_3$ u. Verflüssigung sowie Destillation reiner Form gewinnen. Als Mittelwert der Best. ergibt sich die D. zu 1,901, d. h. als etwas niedriger wie der übliche Wert 1,42905. (Proc. National Acad. Sc. Washington 10. 479—83. 1924. Harvard Univ.) FRANKENBURGER.

N. Kurnakow, **D. Krotkow** und **M. Oxman**, *Über den Zusammenhang zwischen den Schmelz- u. Zähigkeitsdiagrammen binärer Systeme*. (Bull. Acad. St. Pétersbourg [6] 1915. 45—71. — C. 1924. II. 271.) BIKERMAN.

P. Semjatschenski, *Kontakterscheinungen bei der Krystallisation*. II. (I. vgl. Bull. Acad. Sc. Pétersbourg. [6] 1914. 541; C. 1914. II. 2.) Gesätt. KCl-, KBr- u. KJ-Lsgg. wurden zur Krystallisation gebracht u. die Eigenschaften der Krystalle in Abhängigkeit von der Natur der in der Lsg. befindlichen festen Fremdstoffe untersucht. — *KCl*. Bei Ggw. von Glimmer, Topas, Baryt entstehen trübe, würfelförmige Krystalle, andere Mineralien beeinflussen den Habitus nicht. Die Krystallisation am Glimmer liefert auch zahlreiche Zwillinge, deren ein Individuum meist besser ausgebildet ist als das zweite. — *KBr* behält seine Würfelform bei Ggw. aller Mineralien. Auf einer Muscovitplatte entstehen in Mehrzahl Zwillinge, die auch ohne Topas auftreten. — *KJ*. Es bilden sich Zwillinge auf Topas, Baryt, Bergkristall u. Orthoklas, nicht aber auf Muskovit. — Erwärmt man die Lsg. mit verschiedenen Krystallen, bis sie aufgelöst sind, u. läßt man wieder krystallisieren, so erhält man meistens weniger Zwillinge als bei der ersten Krystallisation. Ein höherer Übersättigungsgrad begünstigt die B. von Zwillingen. — Eine Erklärung der Änderung der Krystallisationsgeschwindigkeit, die Orientierung der ausfallenden Krystalle, die Änderung des Habitus u. die B. von Zwillingen kann bei dem jetzigen Stand der Wissenschaft nicht gegeben werden. (Bull. Acad. Sc. Pétersbourg [6] 1914. 1009—22.) BIKERMAN.

A. Gyemant, *Die Hydratation der Ionen*. Es wird die Änderung der elektrostatischen Energie eines Ions (Radius = r) beim Übergang aus dem Vakuum in eine Dipolfeldigkeit berechnet unter der Annahme, daß die Feldstärke u. die Polarisation

durch die Langevinschen (Ann. de Physique [8] 5. 70. [1905]) Gleichungen geregelt werden. Da sie nicht allgemein lösbar sind, so berechnet Vf. durch Substitution die jeweiligen r entsprechenden Polarisationswerte P u. stellt sie graph. dar. Die Hydratationsenergie H ist $\int_{r+r_0}^{\infty} P dr$ proportional, worin r_0 den Radius des Wasse-

mol. bedeutet; aus den Kurven kann man also gleichfalls die H ablesen. Für einwertige Ionen, deren Radius zwischen 10^{-8} u. $3,5 \cdot 10^{-8}$ liegt, gilt angenähert die Gleichung $H = 2,92 \cdot 10^{12} - 6,36 \cdot 10^{19} r_0 + 5,45 \cdot 10^{26} r_0^2$ erg, wenn r des W. gleich $1,5 \cdot 10^{-8}$ gesetzt wird. — Eine besondere Betrachtung zeigt, daß das Gleichsetzen des W. u. einer idealen Dipolf., wie es oben geschah, zulässig ist. Rechnet man nämlich das Potential des fehlenden Halbraumes auf ein im statist. Gleichgewicht befindliches Dipolensystem aus, so findet man für die Oberflächenspannung einen Wert von richtiger Größenordnung, falls für das Dipolmoment der übliche Wert eingesetzt wird. (Ztschr. f. Physik 30. 240—52. 1924. Berlin.) BIKERMAN.

M. C. Crew, Hildur Edith Steinert und B. S. Hopkins, *Die Löslichkeit von Yttriumsalzen*. Die Löslichkeiten von YCl_3 , YBr_3 , $Y(NO_3)_3$ u. $Y_2(SO_4)_3$ in W. wurden bestimmt. Die untersuchten Salze besaßen fast die Reinheit für At.-Gew. Best., außer Spuren von Holmium u. Erbium waren sie völlig frei von Verunreinigungen. Das Oxalat wurde durch Glühen im Pt-Tiegel in Oxyd verwandelt u. dieses in den betreffenden Säuren gel. u. zur Krystallisation eingedampft. Zur Darst. von YBr_3 nimmt man wegen der größeren Löslichkeit statt Y_2O_3 besser $Y(OH)_3$. Die Reagentien wurden alle zuvor sorgfältig gereinigt. Zu den pulverisierten Salzen wurde eine zur Auflsg. unzureichende Menge W. gegeben u. bis zur Erreichung des Sättigungspunktes (5 Stdn.) im Thermostaten aufgehoben. Mittels eines zylindr. Scheidetrichters wurden der überstehenden Fl. Proben zur Analyse entnommen. Um das Aufziehen fester Teilchen zu verhindern, hatte der Trichter vor seiner unteren Öffnung ein kleines seidenes Sehtuch. Dieses wurde, wenn der Stiel des Trichters gefüllt war, entfernt u. die Lsg. in einen gewogenen Pt-Tiegel gegeben, in dem Nitrat u. Sulfat durch Glühen zum Oxyd bestimmt wurden. Die Lsgg. der Halogenide wurden verd., Y als Oxalat gefällt u. dieses zum Oxyd geglüht. Die Löslichkeitsdaten der Salze für verschiedene Temp. sind im Original tabellar. angegeben. (Journ. Physical Chem. 29. 34—38. Urbana [Ill.], Univ.) JOHNSON.

E. Moles und M. Marquina, *Löslichkeit der Halogensalze des zweiwertigen Quecksilbers in Glycerinwassergemischen*. Die Vf. haben 1914 die Löslichkeiten von *Sublimat* in Gemischen von *OH*-haltigen Stoffen mit W. angegeben; die alten Angaben, soweit sie *Glycerin* betreffen, werden umgerechnet u. korrigiert. $HgCl_2$ löst sich bei 25° zu 0,267 Mol. im Liter Lsg., wie auch andere Forscher gefunden haben. Die Löslichkeit steigt bei Glycerinzusatz an (in 25%ig. Lsg. 10,62 g in 100 Lösungsm., bei 50,2%ig. Glycerin 17,48 g in 100 g Lösungsm., in reinem Glycerin 79,23 g in 100 g Lösungsm.). Ältere Unterss. über die Löslichkeit von *Mercurbromid* werden angegeben. In reinem W. lösen sich bei 25° 0,0170 Mol. im Liter. Zusatz von *Glycerin* erniedrigt die Lösungsgeschwindigkeit, so daß 50 Stdn. gerührt werden muß.

% Glycerin	in 100 g Lösungsm.	D. $25^\circ/4^\circ$
0	0,6135 g $HgBr_2$	1,0023
25,0	0,9840 g $HgBr_2$	1,0651
75,2	3,456 g $HgBr_2$	1,2204
99,5	15,687 g $HgBr_2$	1,4000

Die Löslichkeit folgt nicht der Mischungsregel, sondern steigt angenähert proportional dem Logarithmus des Glyceringehalts. (Annales soc. espagnola Fis. Quim. 22. 551—54. 1924. Madrid, Labor. de Invest. Fis.) W. A. ROTH.

Albert F. O. Germann und Glenn H. McIntyre, *Die Eigenschaften von Gasen-Lösungen: Dampfdruckkurven von Aluminiumchloridlösung bei 0 und 25°*. (gl. Journ. Physical Chem. 28. 965; C. 1924. II. 2224.) Vff. bestimmen die Dampfdrucke von AlCl_3 in COCl_2 -Lsg. bei 0 u. 25° gravimetr. u. volumetr. Die Werte sind für Konzz. zwischen 0 u. 55% AlCl_3 in der Lsg. im Original angegeben. (Journ. Physical Chem. 29. 102—5. Stanford [Cal.], Univ.) JOSEPHY.

P. Walden, *Benzol als Lösungsmittel für Elektrolyte*. Der van't Hoff'sche Faktor i (in Klammern) wurde kryo- (k vor der i -Zahl) oder ebullioskop. (e vor der Zahl) für folgende in Bzl. gel. Substanzen bestimmt: Monochloressigsäure (k 0,5 bis 3), Dichloressigsäure (k 0,54—0,65), Trichloressigsäure (k 0,65—0,70), Tribromessigsäure (k 0,62—0,73), Essigsäure (k 0,47—0,59), Benzoesäure (k 0,54), Myristinsäure (k 0,9—0,8), SnJ_4 (e 1), $\text{CHBr}_2 \cdot \text{CHBr}_2$ (e 1), Tristearin (e 0,8—1), ricinolsaures Cu (e 0,2—0,3), Tri- i -amylammoniumpikrat (e 0,5), Tri- i -amylammoniumrhodanid (e 0,25 bis 3), Di- i -butylammoniumdichloracetat (e 0,5), p -Toluidinmonochloracetat (e 1—1,8, 1,6), p -Toluidinsalicylat (e 1,3—1,7, k 1,2—1,9), Dimethylpyronpikrat (e 1,3—1,7, 1,6—2), Pikrat des β -Naphthols (e 1,8). Tetra- i -amylammoniumjodid zeigte Unregelmäßigkeiten: bald eine Erhöhung, bald eine Erniedrigung des F des Bzl. Es sollte sich heraus, daß das Salz eine Additionsverb. $\text{N}(\text{C}_5\text{H}_{11})_4\text{J} + \text{C}_6\text{H}_6$ gibt, die bei Erwärmung ins benzolfreie Salz vom F . 127° übergeht, beim zweiten Schmelzen aber bei 143—144,5° schm. — Schlußfolgerungen aus den Messungen: 1. Die Einwirkung einer Carboxylgruppe fördert die Polymerisation, die mit wachsender Verd. Temp. abnimmt. 2. Tri- i -amylamin u. Pikrinsäure sind in Bzl. monomolekular, während das von ihnen gebildete Salz assoziiert ist: also bedingt die chem. Verb. eine weitere Assoziation. 3. Da die Salze mit $i > 1$ in Bzl. nicht leitend sind, so muß ihre Dissoziation nicht elektrolyt., sondern „benzolyt.“ Natur sein. 4. Der „Benzolysegrad“ nimmt mit steigenden Affinitätskonstanten der Salzkomponenten ab, mit steigender Temp. zu. (Bull. Acad. Sc. Pétersbourg [6] 1914. 1161—86.) BKM.

P. Walden, *Naphthalin als Lösungsmittel und Solvolysator binärer Salze*. (Vgl. vorst. Ref.) Der kryoskop. ermittelte van't Hoff'sche Faktor i in Naphthalin (bei verd. ca. 10—100 Liter/Mol.) beträgt: Anilin, Guajacol, SnJ_4 u. BiBr_3 : ca. 1; Tetra- i -amylammoniumjodid: 0,16—0,56, Triphenyl- i -amylphosphoniumjodid: 0,2—0,6, Äthylpropylphenylbenzylammoniumjodid: 2,1, Methyltribenzylammoniumjodid: 1,7—2,0; Pikrate des Tetrapropylammoniums: 0,4—0,9, des Piperidins: 1, des Tri- i -amylamins: 1, des s . Kollidins: 0,9—1, des Pyridins 1—1,5, des Dimethylanilins: 1,6—1,8, des Methylanilins: 1,9—2,1, des p -Toluidins: 2, des Anilins: 2,0—2,1, des Dimethylpyrons: 1,9—2,1; Anilinsalicylat: 1,6—2, Anilinphenolat: 1,9—2. Die wichtigste Folgerung aus den Messungen ist namentlich an der Reihe der Pikrate sichtbar: je größer die Affinität der Komponenten (im Falle der Pikrate — der Base) ist, um so mehr neigt die Verb. zur Polymerisation, während die aus schwächeren Bestandteilen zusammengesetzten Salze einer Solvolyse anheimfallen. Die Solvolyse wird durch Verd. u. die Temperaturerhöhung begünstigt. (Bull. Acad. Sc. Pétersbourg [7] 1915. 1—26.) BIKERMAN.

P. Walden, *Über den Molekularzustand binärer Salze in Tetrachlorkohlenstoff, Schwefelkohlenstoff und Cyclohexan*. (Vgl. vorst. Ref.) Die ebullioskop. Konstante des CCl_4 ist 52,8, welche Größe theoret. begründet u. an Äthylbenzoat u. p -Toluidinogg. bestätigt wird. Die mit Hilfe dieser Konstante berechneten i (meistens für $i = 5$ bis 20 Liter/Mol.) betragen: i -Valeriansäure 0,5, Monobromessigsäure 0,5, Pikrat des Tri- i -amylamins 0,3—0,5, p -Toluidinmonochloracetat 0,8—1,1, Pikrat des Dimethylpyrons 1,4—1,7, p -Toluidinsalicylat 1—1,4, Anilinsalicylat 1—1,3. Das Tetra- i -amylammoniumjodid erzeugt keine regelrechte Kp.-Erhöhung. Die Polymerisation steigt also mit der Affinitätskonstante, die Solvolyse fällt. In CS_2 wurden Tri- i -amylammoniumrhodanid ($i = 0,7—0,08$), Pikrat des Tri- i -amylamins ($i =$

0,9—0,4), *p*-Toluidinmonochloracetat ($i = 1,9$) u. Anilinsalicylat ($i = 1,7-2,0$) untersucht. In C_6H_{12} : Di-*i*-butylamindichloracetat ($i = 0,62-0,75$), *p*-Toluidinmonochloracetat ($i = 1,26$) u. *p*-Toluidinsalicylat ($i = 1-1,5$); das Tetra-*i*-amylammoniumjodid bewirkt keine Siedepunktserhöhung. Die Abhängigkeit der i von der Stärke der Säure u. der Base des gel. Salzes ist dieselbe bei allen drei Lösungsm. (Bull. Acad. Sc. Pétersbourg [6] 1915. 233—56.)


BIKERMANN.

Arthur B. Lamb und W. E. Vail, Die Wirkung von Wasser und von Kohlendioxyd auf die katalytische Oxydation von Kohlenmonoxyd und Wasserstoff durch Sauerstoff. Vff. messen die verzögernde Wrkg. von Wasserdampf auf die katalyt. Oxydation von CO u. H_2 durch den O_2 der Luft in Ggw. von Hopcalit (Gemisch von MnO_2 u. CuO) als Katalysator. Die Messungen, die nach demselben Verf. ausgeführt sind wie die früheren (vgl. LAMB, SCALIONE u. EDGAR, Journ. Americ. Chem. Soc. 44. 738; C. 1922. III. 489) erstrecken sich über ein Temperaturintervall von 25—100° für CO u. 55—140° für H_2 u. ein Druckintervall des Wasserdampfes von 0—50 mm Hg. Das Standardgasgemisch enthält 0,25% CO bezw. H_2 . CO wurde durch Tropfen von Ameisensäure in konz. H_2SO_4 bei 100° dargestellt. Vgl. Abb. des App. im Original. Der Wassergehalt des Hopcalit im Gleichgewicht mit feuchter Luft wurde ebenfalls für dasselbe Temp.- u. Druckintervall bestimmt. Für einen gegebenen Gleichgewichtswassergehalt des Katalysators u. somit auch vermutlich für einen gegebenen Wassergehalt der Katalysatoroberfläche ist die Aktivität fast unabhängig von der Temp. Die etwas größere Aktivität bei höheren Temp. ist nur so groß, wie sie aus der Zunahme der Aktivität von trockenem Hopcalit mit wachsender Temp. erwartet wird. Der Katalysator ist gegen CO wirksamer als gegen H_2 . Sehr trockner Hopcalit hat bei einem Gemisch von H_2 u. Luft bei Zimmertemp. anfangs eine sehr beträchtliche katalyt. Aktivität, infolge des durch die Rk. gebildeten W. sinkt die Aktivität aber in wenigen Minuten auf das gewöhnliche Maß. Eine ähnliche Erscheinung trat auch bei einem Gemisch von CO u. Luft auf. Große Mengen Wasserdampf, CO_2 oder N_2 beeinflussen die Aktivität des Hopcalits gegenüber Gemischen aus H_2 u. Luft ganz gleichmäßig, u. zwar gemäß der Adsorbierbarkeit der Gase. (Journ. Americ. Chem. Soc. 47. 123—42. Cambridge [Mass.], HARVARD Univ.)


JOSEPHY.

Erich Müller und Friedrich Müller, Die katalytische Zersetzung des Formaldehyds. III. (II. vgl. E. MÜLLER, Ztschr. f. physik. Ch. 107. 347; C. 1924. I. 1737.) Außer Os bewirken auch die übrigen Pt-Metalle, ähnlich wie bei Ameisensäure (vgl. S. 482) den Zerfall von Formaldehyd. Bei Ir u. Pt war die katalyt. Wrkg. nicht mit Sicherheit nachzuweisen, sehr stark war sie bei den Verbb. von Ru u. Pd. Je nach dem Katalysator ist die Art des Zerfalls verschieden, z. B. entsteht mit Os sehr wenig CO, dagegen viel mit Rh, Ru u. Pd. Die auftretenden Prodd. sind CO, CO_2 , CH_4 , CH_3OH , HCO_2H u. H_2 . Die Summenformeln der einzelnen sich abspielenden Rkk. sind:

1. $H_2CO + H_2O = HCO_2H + H_2$; 2. $2H_2CO + H_2O = HCO_2H + CH_3OH$;
3. $H_2CO + H_2O = CO_2 + 2H_2$; 4. $H_2CO = CO + H_2$; 5. $2H_2CO = CO_2 + CH_4$;
6. $3H_2CO + H_2O = CH_4 + 2HCO_2H$; 7. $3H_2CO + H_2O = CO_2 + 2CH_3OH$
(1. u. 2. in alkal. Lsg., 3.—7. in neutraler bezw. schwach saurer Lsg.). Es wird die B. von Zwischenprodd. (Staukörpern) angenommen, die einzelnen Rkk. mit ihren Zwischenstadien werden in der Elektronenschreibweise (vgl. S. 482) wiedergegeben. Der Staukörper der Rk. 5. ist sehr unwahrscheinlich, damit die ganze Rk. Die früher für Rk. 1. (E. MÜLLER, Ztschr. f. Elektrochem. 27. 558; C. 1922. I. 1013) angenommene Gleichung:




würde zu erklären sein nach:






Die gepunktete Linie bedeutet die Angriffsstelle des Katalysators. (Ztschr. f. Elektrochem. **31**. 41—45.) HERTER.

Erich Müller und **Friedrich Müller**, *Die katalytische Zersetzung der Brenztraubensäure*. (Vgl. vorst. Ref.) Die Spaltung von Traubenzucker in A. u. CO_2 unter dem Einfluß von Pt-Metallen gelang nicht, wohl aber ließ sich Brenztraubensäure in wss. Lsg. bei 100° durch Os, Pd u. Ru in Acetaldehyd u. CO_2 zerlegen. (Andere Gase als CO_2 wurden nicht beobachtet. Die Rk.:



er lief nie quantitativ, in 7 Stdn. zerfielen bei einem Vers. ca. 20% der Säure. Unterhalb 100° nahm die Geschwindigkeit der Zers. schnell ab. Ohne Katalysator wurde bei 100° keine B. von CO_2 beobachtet, nach Zusatz von pulverisierten Tonsteinen wurden einige cem CO_2 aufgefangen. (Ztschr. f. Elektrochem. **31**. 45 t. 46.) HERTER.

Erich Müller, *Zur Frage nach dem Verlauf organischer Reaktionen*. (Vgl. vorst. Ref.) In Anlehnung an seine Verss. über die katalyt. Spaltung von Ameisensäure (vgl. S. 482 u. die beiden vorst. Refs.) entwickelt Vf. eine allgemeine Theorie des Verlaufs organ. Rkk. Es wird begründet, daß eine Rk. so verlaufen muß, daß der Zeitraum, der die Zeit des Überspringens (Umlaufzeit?) eines Elektrons betrifft, ein Atom bzgl. seiner äußersten Elektronenschale unbefriedigt ist. Vf. hält daher seine frühere Annahme, daß dem Zerfall von HCO_2H Dissoziation vorausgeht, fallen; es ist nämlich unwahrscheinlich, daß die aus 2 Moll. abdissoziierten Atome sich innerhalb einer Umlaufzeit treffen u. vereinigen können. Er kommt auf das l. c. gegebene Schema A) $\rightleftharpoons$ B) $\longrightarrow$ C) zurück. Wenn hier angenommen



wird, daß A) u. B) im Gleichgewicht stehen, so müssen A) $\longrightarrow$ B) u. B) $\longrightarrow$ A) sein verlaufen. Warum bedarf aber B) $\longrightarrow$ C) dann besonderer Anlässe (Katalysator)? Der Grund liegt in der verschiedenen Elektronenbindung. Vergleicht man A) $\longrightarrow$ B) u. B) $\longrightarrow$ C), so versteht man, daß in A), wo die H-Atome bei α u. δ durch 2 Elektronen gebunden sind, die Aberration eines Elektrons nach β (oder γ leichter möglich ist als in B) die Aberration nur eines Elektrons. Betrachtet man B) $\longrightarrow$ A) u. B) $\longrightarrow$ C), die leicht bzw. schwer verlaufen sollen, so ist ersichtlich, daß bei B) $\longrightarrow$ A) die Aberration eines der 3 Elektronen bei γ nach α

oder δ leichter vor sich gehen wird als bei B) $\rightarrow$ C), die des einzigen Elektron bei α oder δ nach β . Ganz analoge Betrachtungen führen für den Zerfall von Brenztraubensäure zu dem Schema D) $\rightleftharpoons$ E) $\rightarrow$ F) u. einem gleichen bei der CO₂-Abspaltung aus Malonsäure. Die hier vorgetragene Auffassung bietet für das Valenzproblem etwas prinzipiell Neues. Nach der alten Auffassung greifen nach einem vielgebrauchten Bild die Häkchen bei 2 einwertigen Atomen ineinander, halten diese dadurch zusammen; für eine Bindung müssen also beide Häkchen beansprucht werden. Hier dagegen greift das Häkchen eines Atoms um den Rumpf des anderen Atoms, u. es kann die Bindung deshalb schon durch ein Häkchen bewirkt werden, allerdings nur unter bestimmten Bedingungen. Es wird nämlich verlangt, daß um den Rumpf eines Atoms je nach seiner Natur eine ganz bestimmte Anzahl Häkchen greifen müssen, z. B. bei C 8, bei H 2 usw. Bzgl. der Rk. zwischen 2 Moll. stimmt Vf. vollkommen mit WIELAND (Rec. trav. chim. Pays-Bas 41. 576; C. 1923. III. 1310) überein, der sagt: „Alle Umsetzungen organ. Stoffe, die sich zwischen zwei Komponenten abspielen, verlaufen zweifellos auf dem Weg der gegenseitigen Addition“. Während WIELAND z. B. Veresterung so valenzzeichen darstellen kann, muß er aber bei formal gesätt. Verbb., wie der Rk. zwischen CH₄ u. Cl₂, ein Kraftfeld in der Umgebung der Moll. annehmen, während in der Auffassung des Vfs. auch diese Rk. sich einfach nach dem Schema G $\rightarrow$ H $\rightarrow$ ausdrücken läßt. (Ztschr. f. Elektrochem. 31. 46—50.)

HERTER.

A₁. Atomstruktur. Radiochemie. Photochemie.

W. Gerlach und W. Schütz, *Bemerkungen über die Lebensdauer angeregter Atome*. Vf. berechnen auf Grund verschiedener experimenteller Daten die Lebensdauern angeregter Atome; in die Gleichungen gehen vor allem die aus der kinet. Gastheorie berechenbaren „Stoßzeiten“ einerseits, die aus opt. u. magnetoopt. Effekten ermittelten Zeitwerte für Bewegungen des Leuchtelektrons andererseits ein. Die Betrachtungen führen zu der Folgerung, daß die „kinet.“ u. die „opt.“ Stoßzeit sich durch einen „opt. Stoßfaktor“ voneinander unterscheiden. Die errechneten Werte für die Lebensdauern angeregter Na-Atome liegen zwischen den Grenzen 10⁻⁷ bis 10⁻⁹ Sekk., diejenigen für Hg-Atome unterhalb 8·10⁻⁵ Sekk. als mittlerem oberem Grenzwert. (Physikal. Ztschr. 26. 33—35. Frankfurt a. M.)

FRANKENBURGER.

Hawksworth Collins, *Die Struktur des Thalliums*. Auf Grund der relativen Voll. u. der Bildungswärmen seiner Verbb. wird dem Tl die atomare Zus. Cu₂S zugeschrieben. (Chem. News 130. 85—88.)

HERTER.

H. B. Wahlin, *Die Beweglichkeiten der positiven Ionen im Helium*. Vf. diskutiert die Frage, ob die gegenüber den nach der kinet. Theorie errechneten Werten als sehr klein befundenen Beweglichkeiten von Gasionen mittels einer B. von „Haufenionen“, d. h. einer Anlagerung nicht ionisierter Atome bzw. Moll. an das einzelne Ion zu deuten sind. Um dies zu klären, untersucht er die Beweglichkeiten von Ionen im He. Es zeigt sich, daß frisch entstandene Ionen höhere Beweglichkeiten aufweisen, als „gealterte“ Ionen (Alterungszeit beträgt Bruchteile von Sekk.); dies ist gut mit der Haufenionentheorie vereinbar. Es zeigt sich, daß die frisch entstandenen Ionen Beweglichkeiten von 13,3 cm/sec pro 1 Volt/cm aufweisen, die gealterten von 7,17 cm/sec pro 1 Volt/cm. Unstetigkeiten in den Kurven lassen darauf schließen, daß neben den „gealterten“, scheinbar aus 3 He-Atomen sich zusammensetzenden „Haufenionen“ noch relativ wenige, aus 2 He-Atomen gebildete vorhanden sind. (Proc. National Acad. Sc. Washington 10. 475—78. 1924. Wisconsin Univ.)

FRANKENBURGER.

Walter Dällenbach, Eduard Gerecke und Eugen Stoll, *Vorgänge an negativ geladenen Sonden und an Teilchen, die in Gasentladungen suspendiert sind*. Vf.

geben einen Auszug aus Unterss., die im Laboratorium der A. G. BROWN, BOVERI & Co. über die Vorgänge im Quecksilberdampfgleichrichter unternommen wurden. Vor allem werden die Potentiale bestimmt, die sich an negativ geladenen, in die positive Säule des Lichtbogens eingebrachten Sonden ausbilden. Hg-Ionen, die mit Geschwindigkeiten bis zu 3000 Volt auf eine Eisenfläche aufprallen, lösen aus dieser noch keinen meßbaren Elektronenstrom aus (unterhalb ca. 1% des auffallenden Ionenstroms). Der Umschlag der Glimmentladung in den Lichtbogen kann bereits bei so kleiner Energieentwicklung an der Kathode der Glimmentladung vor sich gehen, daß Erhitzung u. Elektronenemission infolge Richardseffekt dabei nicht die Ursache sein können. Als die Ursache solcher „Zündungen“ sind Verunreinigungen der Kathodenoberfläche, besonders z. B. Alkali-Halogenverbb. wirksam. Es wird die Auffassung entwickelt, daß eine Verunreinigung um so eher „zündet“, je leichter sie unter dem Bombardement positiver Ionen einerseits Gase, andererseits Elektronen abgibt. Bei der Gasabgabe u. auch bei der Elektronenabgabe spielen möglicherweise chem. Rkk. eine Rolle, die durch die Stöße der positiven Ionen in Gang gebracht u. unterhalten werden. (Physikal. Ztschr. 26. 1924. 22.)

FRANKENBURGER.

Madame Pierre Curie, *Über die Konstanz der Umwandlungsgeschwindigkeit der Radiumemanation bei verschiedenen Konzentrationen*. Vf. untersucht mittels einer sehr empfindlichen Kompensationsmethode die Abnahme der γ -Strahlung zweier möglichst gleicher RaEm-Mengen (ca. 200–270 Millicurie), von denen bei den verschiedenen Verss. die eine in höchst konz. Form in einer kleinen Kugel von etwa 0,21–0,26 mm³ Inhalt (Druck ca. $\frac{1}{2}$ at), die andere in verd. Zustande in dem Röhrchen von 0,5 mm Durchmesser u. 20–30 mm Länge sich befand, um zu prüfen, ob durch die Einw. der radioakt. Strahlung auf die RaEm-Atome eine Beeinflussung der Halbwertszeit sich erreichen ließe. Die theoret. u. experimentellen Versuchsbedingungen werden eingehend geschildert. Es konnte mit einer Genauigkeit von 1:10000 gemessen werden, es ergaben sich aber nur Unterschiede kleiner als 1:2000, die nicht einer bestimmten Ursache zugeschrieben werden konnten. (Ann. de Physique [10] 2. 405–33. 1924. Paris.)

PHILIPP.

Jean Thibaud, *Die durchdringende γ -Strahlung des Mesothoriums 2*. Vf. weist durch Vergleiche mit dem „natürlichen β -Strahlenspektrum“ des Mesothorium 2 nach, daß die von ihm in früheren Verss. nachgewiesenen γ -Strahlungen von 908200–962700 Volt Energie, die von dem im Gleichgewicht mit seinen aktiven Prodd. stehenden Mesothorium herrühren (vgl. C. r. d. l'Acad. des sciences 178. 1706. 179. 1052; 1924. II. 2633. 1925. I. 933), dem Mesothorium 2 zuzuschreiben sind. Zu seinen bisherigen Feststellungen fügt Vf. den Nachweis zweier weiterer, vom Mesothorium emittierter γ -Strahlungen relativ geringerer Energie (333 u. 459 Kilovolt) hinzu; diese sind mittels einer schwachen, offenbar aus den K- u. L-Niveaus ausgelösten photoelektr. β -Strahlung von Pb ermittelt. Auch diese γ -Strahlen scheinen vom Mesothorium 2 auszugehen. Auch beim Mesothorium 2 scheint — ebenso wie beim RaB u. C das natürliche β -Strahlenspektrum ein sekundärer Effekt seiner γ -Strahlungen zu sein. (C. r. d. l'Acad. des sciences 179. 1322–24. 1924.)

FRANKENB.

Albert Nodon, *Untersuchungen über Röntgenstrahlen großer Wellenlängen*. Unter Heranziehung einiger Literaturstellen beansprucht Vf. die Priorität der Entdeckung langwelliger ($\lambda = 750 \text{ \AA} - \lambda = 12 \text{ \AA}$) Röntgenstrahlen. Nach seinen früheren Befunden sollen dieselben unter dem gleichzeitigen Einfluß ultravioletter Strahlung u. eines elektrostat. Feldes, auch bei normalem Luftdruck von Metallplatten emittiert werden. (C. r. d. l'Acad. des sciences 179. 1600–1.)

FRBU.

P. P. Ewald, *Die Intensitäten der Röntgenreflexe und der Strukturfaktor*. Vf. unterzieht die bisherige Theorie der Röntgeninterferenz in Krystallgittern einer krit. Betrachtung. Auf Grund eines Vergleichs mit den opt. Eigenschaften der

Krystalle weist er die Mängel der bisherigen Ansichten auf u. kommt auf Grund mathemat. Entwicklungen zu folgenden Schlüssen: 1. Der Hauptteil der Intensität des reflektierten Röntgenstrahls entsteht durch Totalreflexion. 2. Hieraus folgt, daß die bisherige Vorstellung über die Wirkungsweise des Strukturfaktors nicht zutrifft. 3. Die allgemeine Theorie der Röntgenoptik zeigt, daß der Winkelbereich für den Strahleneinfall, unter dem Totalreflexion eintritt, bei symmetr. Reflexion monochromat. Strahlung proportional zu $S \cotg \vartheta$ ist (ϑ = Einfallswinkel, S die Strukturamplitude). 4. Auch die Intensität ist deshalb proportional zu $S \cotg \vartheta$ (nicht zu S^2 , wie bisher angenommen wurde). 5. Hiermit stehen im Einklang Messungen von W. L. BRAGG am Aragonit, von W. H. BRAGG am Diamant, sowie von R. v. NARDROFF am Pyrit. (Physikal. Ztschr. 26. 29—32. Stuttgart, Technische Hochschule.)

FRANKENBURGER.

J. H. Shaxby, *Über die Erzielung von Laue-Diagrammen mittels monochromatischer X-Strahlen und über die Struktur der Perlmutter*. Vf. beschreibt eine Anordnung, mittels deren es gelingt, monochromat. Röntgenstrahlung zur Erzielung von Laue-Diagrammen anzuwenden. Als monochromat. Strahlung wird die K-Strahlung des Antikathodenmaterials bzw. bei zu starker Absorption derselben in dem zu untersuchenden Krystall eine noch härtere Strahlung benützt. Vf. verwendet eine Quarzröhre von 5 cm Durchmesser mit Ag-Antikathode u. 40000 V Belastung. Austritt der Strahlung erfolgt durch ein mit Fenster versehenes Ansatzrohr, Ausblendung durch ein Pb-Diaphragma; die Aufnahme auf einer mit Verstärkerschirm versehenen Platte. Dauer der Aufnahmen betrug bei einem Strom von etwa 20 Milliampere u. 1 cm dickem Krystall etwa 4 Stdn. Vf. untersucht mit dieser Anordnung die Struktur der *Perlmutter*. Bei einer senkrecht zur Schichtebene der *Perlmutter* erfolgenden Inzidenz der Strahlung erhält Vf. Aufnahmen, welche darauf schließen lassen, daß der mineral. Teil der *Perlmutter* aus Aragonitkrystallen besteht, deren quasi-hexagonale Achse senkrecht zur Schichtungsebene steht. (C. r. d. l'Acad. des sciences 179. 1602—3. 1924.)

FRANKENBURGER.

F. Croze, *Über die Struktur des Linienspektrums des Stickstoffs*. Vf. behandelt die Zuordnung der Serien im Linienspektrum des Stickstoffs zu dem N-Atom einerseits, dem einfach ionisierten N^+ u. dem doppelt ionisierten N^{++} -Ion andererseits. Während für die Spektren des N u. des N^{++} bereits bekannt ist, daß sie aus Kombinationen geradzahlicher Multipletts (Dubletts u. Quadrupletts) bestehen, weist Vf. mittels Messungen des Zeemaneffektes nach, daß das Spektrum des N^+ gemäß dem Gesetz des Multiplettwechsels durch ungeradzahliche Multipletts, vor allem Triplets, charakterisiert ist. (C. r. d. l'Acad. des sciences 179. 1603—05. 1924.)

FRANKENBURGER.

Rita Brunetti, *Über die Feinstruktur der Heliumbande 5876 Å*. (Atti R. Accad. dei Lincei, Roma [5] 33. II. 413—15. 1924. Arcetri, Physikal. Lab.)

ZANDER.

Félix Joachim de Wisniewski, *Die Dubletts der Alkalimetalle (Auszug)*. Vf. gibt eine Formel an, welche die Breite der aufeinanderfolgenden Dubletts der Hauptserien des Na, K, Rb, Cs u. Mg aus der Ordnungszahl des Dubletts (Bezeichnung gemäß RITZ) $= n$ u. einer für jedes Element charakt. Konstanten α errechnen läßt. Die Frequenzdifferenz $\Delta\nu$ innerhalb des Dubletts ist $\Delta\nu = \alpha(1 - 0,5/n)/n^3$; die gleiche Formel stellt in befriedigender Weise die Frequenzdifferenz $\Delta\nu_{13}$ für die Totalbreite des Triplets des Al^+ dar. Für Na, K, Rb u. Cs läßt sich weiterhin α als Funktion der Ordnungszahl des betr. Elementes darstellen. (C. r. d. l'Acad. des sciences 179. 1316—17. 1924.)

FRANKENBURGER.

M. A. Catalán, *Über die Struktur des Scandiumspektrums*. II. Mitt. (Vgl. Annales soc. espanola Fis. Quim. 20. 606. 21. 464; C. 1924. I. 857. 1320.) Vf. modifiziert seine früheren Ansichten teilweise nach den Ausführungen von GIESELER u. GROTRIAN (Ztschr. f. Physik 25. 342; C. 1924. II. 2121), er gibt neue Zu-

anmenstellungen für die Terme des ionisierten Sc, für das neutrale Sc-Atom werden zwei neue Multipletts angegeben. Das von LAPORTE (Ztschr. f. Physik **23**, 195; C. **1924**. II. 156) am Eisenspektrum bewährte, modifizierte Selektionsprinzip gilt auch für das Sc-Spektrum. Einige Linien, darunter starke, konnten noch nicht klassifiziert werden. (Annales soc. espanola Fis. Quim. **20**. 497—505. 1924. Madrid, Lab. de Invest. Fis.)

W. A. ROTH.

Guillaume C. Lardy, *Ultraviolette Absorptionsspektren einiger Ketene und ihrer Isomeren*. II. (I. vgl. S. 819.) Vf. bringt weitere ergänzende Messungen in ausführlichen Tabellen u. Kurven. Die wesentlichen Daten sind schon nach Teil I (c.) referiert; ebenso sind die theoret. Auslegungen u. Vergleiche mit den verwandten Körperklassen dort bereits eingehend wiedergegeben. (Journ. de Chim. Physique **21**. 353—85. 1924. Zürich, Univ. u. Polytechn.)

HORST.

Th. Dreisch, *Der Einfluß der C-H-Gruppe auf die Stärke der Absorption einiger organischer Verbindungen unter 3 μ* . (Vgl. S. 1164.) Die Maxima von Oberbanden von ELLIS (Physical Review [2] **23**. 48; C. **1924**. I. 1635) der C-H-Bindung zugeordneten Bande bei 6,9 μ werden bei Chloroform, Acetylen u. Benzol verglichen. Das Verhältnis der Absorptionskoeffizienten Bzl. zu Chlf. findet Vf. gleich 6:2. (Ztschr. f. wiss. Photographie, Photophysik u. Photochemie **23**. 102—10. 1924. Bonn.)

LESZYNSKI.


Ch. Courtot und A. Dondelinger, *Optische Untersuchung von Indanbasen*. Wiehgenannte, von Vff. früher (vgl. C. r. d. l'Acad. des sciences **178**. 493; C. **1924**. II. 1785) synthetisierte Verbb. wurden bzgl. ihrer Mol.-Refr. u. der Absorptionsspektren untersucht. (Ergebnisse tabellar. u. graph. im Original): 1. *Indanylamin*, n_D^{20} 96—97°, D_{15}^{15} 1,0380, $n_D^{15} = 1,5619$. — 2. *N-Methylandanylamin*, Kp_{15} 106 bis 170°, D_{15}^{15} 0,9981, $n_D^{15} = 1,5411$. — 3. *N-Dimethylandanylamin*, Kp_{10} 99—100°, D_{15}^{15} 0,9803, $n_D^{15} = 1,5357$. — 4. *N-Äthylindanylamin*, Kp_{10} 106—107°, D_{15}^{15} 0,9846, $n_D^{15} = 1,5342$. — 5. *N-Diäthylindanylamin*, Kp_{10} 131—132°, D_{15}^{15} 0,9542, $n_D^{15} = 1,6218$. — 6. *N-Phenylindanylamin*, Kp_{15} 202—203°, D_{15}^{15} 1,0910, $n_D^{15} = 1,6215$. — 7. *N-o-Tolyindanylamin*, Kp_{15} 201°, fest. — 8. *N-m-Tolyindanylamin*, Kp_{16} 210 bis 212°, D_{15}^{15} 1,0742, $n_D^{15} = 1,6122$. — 9. *N-p-Tolyindanylamin*, Kp_{15} 203°, fest. — 10. *N-Xylylindanylamin*, Kp_{17} 218°, D_{15}^{15} 1,0600, $n_D^{15} = 1,6037$. — 11. *N-Methylphenylindanylamin*, Kp_{11} 191—192°, D_{15}^{15} 1,0790, $n_D^{15} = 1,6165$. — 12. *N-Äthylphenylindanylamin*, Kp_{12} 193—194°, D_{15}^{15} 1,0647, $n_D^{15} = 1,6065$. — 13. *N-Methylbenzylindanylamin*, Kp_{17} 197—198°, D_{15}^{15} 1,0438, $n_D^{15} = 1,5775$. — Zu Vergleichszwecken: 14. *N-Methyl-N-benzylanilin*, Kp_{13} 171°, D_{15}^{15} 1,0475, $n_D^{15} = 1,6071$ u. 15. *N-Äthyl-N-benzylanilin*, Kp_{12} 173°, D_{15}^{15} 1,0330, $n_D^{15} = 1,5975$. Aus der Tabelle der Originals ergibt sich bzgl. der Mol.-Refr. folgendes: refraktometr. wirkt die Indanylgruppe wie ein aliph. oder alicycl. Substituent; die experimentell gefundene Mol.-Refr. der Verbb. 1, 2, 3, 4, 5 u. 13 stimmt mit den mittels der Eisenlohrschen oder Brühlschen Inkremente berechneten Werten gut überein. — Bei 11 u. 12 zeigt die Mol.-Refr. bei Benutzung der Eisenlohrschen Inkremente erhebliche Exaltation gegenüber der experimentell festgestellten Mol.-Refr. Mit den Brühlschen Werten wird gute Übereinstimmung erzielt. Es ergibt sich, daß bei tert. Anilinen, die ein aliph. u. ein Indanylradikal enthalten, letzteres sich refraktometrisch wie ein aliph. oder alicycl. Radikal verhält. — Die Verbb. 6—10 zeigten bei Benutzung des Brühlschen Wertes für sek. Arylamin-N gegenüber den experimentell gefundenen Werten erhebliche Exaltation; diese Exaltation zeigte sich stets, unabhängig von der Stellung der CH₃-Gruppen im Benzolkern. Die von LEY u. LEIFFER (Ber. Dtsch. Chem. Ges. **54**. 363; C. **1921**. I. 785) gemachte Beobachtung, daß Einführung eines zum N o-ständigen Radikals (CH₃ oder Cl) in Dimethylanilin eine Depression der Mol.-Refr. bewirkt, konnten Vff. an den von ihnen untersuchten sek. Aminen nicht feststellen; auch fanden sie keine so erheblichen Kpp.-Unter-

schiede bei den Verbb. 7—9 wie LEY u. PFEIFFER sie für o- u. p-Methyldimethylanilin festgestellt haben. 7 weicht jedoch chem. von den anderen sek. Aminen insofern ab, als bei Einw. von CH_3MgJ eine Entw. von CH_4 erst bei 120—121 (bei den anderen sek. Aminen schon bei gewöhnlicher Temp.) stattfindet.

Bzgl. der Absorptionsspektren ergibt sich folgendes: (Lsgg. in Bzl.); 1. konnte nicht untersucht werden, da es leicht CO_2 aus der Luft absorbiert. Außer den vorher genannten Verbb. wurden weiterhin noch untersucht: 16. *Diindanylamin*, 17. *Methyldiindanylamin*, 18. β -*Naphthyldiindanylamin*, 19. *Diphenyldiindanylamin* u. 20. o-, m- u. p-*Nitrophenyldiindanylamin*. Aus den im Original veröffentlichten Kurven sind als allgemeine Ergebnisse folgende hervorzuheben. Die chromogene Wrkg. des Indanylradikals ist geringer als die von C_6H_5 u. stärker als $\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_3$. Die chromogene Wrkg. des Indanylradikals tritt deutlicher hervor, wenn es bei N gebunden ist, statt im Benzolkern direkt zu sitzen; die o-, m- u. p- CH_3 -Deriv. von 6. lassen sich (besser noch die entsprechenden NO_2 -Deriv.) bzgl. ihrer Absorptionsspektren gut unterscheiden. p-Substitution bedingt gegenüber den o- u. m-Deriv. eine hyperchrome Wrkg. (Bull. Soc. Chim. de France [4] 37. 11 bis 130.)

HABERLAND.

Cz. Korschun und C. Roll, *Absorptionsspektren des Pyrrols und seiner Derivate*. III. Mitt. *Der Einfluß von NH_2 - und $(\text{NH}\cdot\text{CO}\cdot\text{NH}_2)$ -Gruppen auf die Absorptionsspektren der Pyrrollderivate*. (II. vgl. Bull. Soc. Chim. de France [4] 37. 55; C. 1923. III. 1019.) Die Absorptionskurven der *Äthylester der 1-Amino- u. 1-Ureido-2,5-dimethylpyrrol-4-carbonsäure* wurden ermittelt u. mit den früher erhaltenen Kurven des in 1 nicht substituierten u. des 1- CH_3 -Deriv. verglichen. Es ergab sich, daß die Kurven des 1-Amino- u. 1- CH_3 -Deriv. fast ident. sind, daß das NH_2 -Deriv. zeigt eine schwache Zunahme der Intensität der Absorptionsbanden. Tritt eine $\text{NH}\cdot\text{CONH}_2$ -Gruppe in 1-Stellung, so wird die Kurve nach Ultraviolett verschoben, was darauf zurückzuführen ist, daß NHCONH_2 weniger auxochrome wirkt als CH_3 u. NH_2 ; die Intensität der zweiten Absorptionsbande ($1/\lambda$ 3700) ist geringer als die der entsprechenden vorher genannten Verbb. — Vergleicht man die Kurven von a) *2,3,5-Trimethylpyrrol-4-carbonsäureäthylester*, des entsprechenden b) *1-Amino-*, c) *1-Methyl-* u. d) *1-Ureidoderiv.*, so ergibt sich, daß die Kurven von b) u. a) sehr ähnlich sind; die von c) ist nach Ultraviolett verschoben, die Intensität der zweiten Bande von a) ($1/\lambda$ 3700) ist geringer als die von c). Die Kurve von d) ist nach Ultraviolett verschoben, die Intensität der zweiten Bande (3700—3900) ist stärker als bei a—c. Entsprechende Verhältnisse findet man bei *2,5-Dimethylpyrrol-3,4-dicarbonsäureester* u. den in 1. analog substituierten Deriv. (Kurven im Original). — Nach den bisherigen Ergebnissen der Messungen war anzunehmen, daß eine Zunahme des Sättigungszustandes der NH_2 -Gruppe eine Verschiebung der Kurve nach Ultraviolett sowie Schwächung der Intensität der Banden verursachen müßte. Diese Annahme konnte experimentell bestätigt werden, indem die Äthylester von 1-Amino-2,5-dimethylpyrrol-4-carbonsäure u. der entsprechenden 3,4-Dicarbonsäure in alkoh. HCl untersucht wurden. Der Einfluß des Sättigungszustandes ergibt sich auch bei Unters. von 1-Ureido-2,5-dimethylpyrrol-4-carbonsäureester in alkoh. HCl u. NaOH. Diese Verb. bildet mit HCl ein mehr oder weniger beständiges Prod., der Sättigungszustand des an den N des Pyrrolkerns gebundene Stickstoffs wird infolgedessen nur wenig vermehrt, die Kurven in neutraler u. saurer Lsg. unterscheiden sich nicht erheblich. Anders dagegen ist die Kurve in alkalischer Lsg.; hier bildet sich das Gleichgewicht:



u. wenn das Harnstoffderiv. sich im Enolzustande befindet, wird die Affinität von N des Pyrrolkerns geschwächt, der Sättigungszustand des Harnstoffderiv. nimmt

Emile Rousseau, *Bindung der ultravioletten Energie durch Mangan.* (Vgl. 1164.) Vf. benutzt eine wss. 10% ig. $MnCl_2$ -Lsg., die wiederholt von kolloidem N. (MnO_2) abfiltriert wird u. in verschlossenen Quarzröhrchen der Wrkg. des ultravioletten Lichtbogens unterworfen wird. Nach jeder $\frac{1}{2}$ Stde. wird ein Röhrchen entfernt u. dessen Inhalt titriert. Die Verss. zeigen, daß eine 10% ig. $MnCl_2$ -Lsg. ein photokatalyt. Resonanzvermögen besitzt, das verschiedene Monate außerhalb der Lichtquelle (ultraviolette oder sichtbare Strahlen) erhalten bleibt. Obiger photokatalyt. Effekt scheint mit den ultravioletten Strahlen zuzunehmen, nimmt jedoch bei fortgesetzter ultravioletter Wrkg. ab. (C. r. soc. de biologie 91. 1190—92. 24. Paris.) K. WOLF.

Richard Gans, *Molekulare Lichtzerstreuung in Flüssigkeiten.* Es werden neue, auf einer etwas verfeinerten Methode ausgeführte Messungen mitgeteilt, die den früheren (Ztschr. f. Physik 17. 353; C. 1923. III. 1592) dargetanen Zusammenhang zwischen der Kerrkonstante u. dem Depolarisationsgrad des Tyndalllichtes reiner Flüssigkeiten bestätigen. Die untersuchten Fl. stellen sich in folgende Reihe nach wachsendem Depolarisationsgrad (weißes Licht): CCl_4 , CH_3OH , A. , $n\text{-C}_3\text{H}_7\text{OH}$, Ä. , $i\text{-C}_3\text{H}_7\text{OH}$, W. , Ameisensäure, Aceton, Chlf. , Eg. , Bzl. , Toluol, $m\text{-Xylol}$, $p\text{-Xylol}$, $\text{C}_2\text{H}_5\text{Cl}$, $\text{C}_6\text{H}_5\text{Br}$, CS_2 , $\text{C}_6\text{H}_5\text{NO}_2$. Die Übereinstimmung mit der Schwankungstheorie im Falle nicht dipolarer Fl. befriedigend; eine ähnliche Berechnung auf Grund der „molekularen“ Theorie, die jedem Mol. die gleiche Zerstreuungsfähigkeit zuschreibt, lieferte grob abweichende Zahlen. (Ztschr. f. Physik 30. 231—39. 1924. Plata. Inst. de Fisica.)

BIKERMÁN.

Walter König, *Einige Beobachtungen über künstliche Doppelbrechung durch Temperaturungleichheit*. Vf. beschreibt experimentelle Unterss. über das Zustandekommen künstlicher Doppelbrechung durch lokales Erhitzen vorher opt. isotroper Körper (Glas) u. weist auf den Zusammenhang dieser Erscheinungen mit der durch mechan. Druck erzeugten Doppelbrechung hin. (Physikal. Ztschr. 26. 45–47. Essen.)
FRANKENBURGER.

Gaetano Viale, *Über die Hemmung photodynamischer Erscheinungen.* (Vgl. Arch. di scienze biol. 4. 323; C. 1924. I. 1740.) Die photodynam. Wrkg. des Eosins auf die Hämolyse u. auf die Oxydation von KJ wird durch Tyrosin (I), Tryptophan (II), Pepton (III) u. Resorcin (IV) gehemmt, seine beschleunigende Wrkg. auf die Edersche Rk. aber durch I u. II nicht, so daß sich deren Hemmung nur gegen die Oxydationsbeschleunigung durch Eosin zu richten scheint. Erythrosin hebt die photodynam.-hämolyt. Wrkg. von Erythrosin, Benzoflavin u. Chlorophyll vollständig auf, I u. II wirken so nur gegen Benzoflavin, III auf dieses u. Erythrosin; die photodynam. Wrkg. des letzten auf KJ wird wie diejenige des Eosins durch I—IV gehemmt, diejenige von Chinin, Äsculin u. U-Salz hingegen nicht beeinflußt. Der Einfluß von Eosin auf KJ wird durch Saccharose u. Glucose nicht gehindert, durch Casein bei alkal. Rk. gehemmt, bei saurer Rk. beschleunigt. Benzoflavin u. Chlorophyll sind auf die Spaltung von KJ ohne Einfluß. Im allgemeinen läßt sich sagen, daß Hemmung der photodynam. Wrkg. durch eine Substanz da zu erwarten ist, wo ihr Zusatz die Fluorescenz aufhebt oder schwächt. Arch. di fisiol. 22. 61—75. 1924. Torino, Univ.; Ber. ges. Physiol. 29. 170. Ref. (NCUSSEN.) SPIEGEL.

Ed. Bayle, R. Fabre und H. George, *Beitrag zur Untersuchung der Fluorescenz und ihrer Anwendungen*. Kurzes Ref. nach C. r. d. l'Acad. des sciences vgl. 1924. II. 1158. Nachzutragen ist: unter der Einw. von Hg-Licht (λ 3650) tritt

bei *Daphnetin* u. *Daphnin* keine Fluorescenz auf. *Cumarin* fluoresciert unter gleichen Bedingungen violett, *Umbelliferon* blauviolett, *Äsculetin* violett; die Fluorescenz ist jedoch gering u. ihre Intensität nicht meßbar. *Äsculin* zeigt von allen genannten Verbb. die stärkste Fluorescenz (violett), die Intensität betr. (wenn die von Na-Salicylat = 20 gesetzt wird) 9. — *Cotarninchlorhydrat* fluoresciert bei Bestrahlung mit der Hg-Lampe gelb, *Hydrastinchlorhydrat* blau, die freien Basen fluorescieren fast gar nicht; *Hydrastinchlorhydrat* u. -salicylat fluorescieren schwach grünlich wie die freie Base. (Bull. Soc. Chim. de France [4] 37. 89—1 Paris, Lab. de l'Identité judiciaire.) HABERLAND.

Allen Garrison, *Das Verhalten von AgJ in der photovoltaischen Zelle*. I. Eine neue Art einer photovoltaischen AgJ-Zelle. (I. vgl. Journ. Physical Chem. 2 333; C. 1924. II. 1442.) Die Elektroden der neuen Zelle bestehen aus Gold-Platin- oder Palladiumblech, das mit einem dünnen, durchsichtigen Häutchen aus geschmolzenem AgJ überzogen ist. Metall. Ag wird also vermieden. Das Photopotential stellt sich sehr langsam ein u. ist immer positiv. Für alle Wellenlängen steigt das Potential bei Beginn der Belichtung proportional der Lichtintensität an, während sich die Maxima bei hohen Intensitäten einem Grenzwert nähern. Eine neu hergestellte Elektrode ist für blaues Licht empfindlicher als für grünes u. rotes. Durch Blaubelichtung steigt die Rotempfindlichkeit, wobei das Häutchen eine grünliche Färbung annimmt. Diese Färbung geht im Dunkeln zurück, verschwindet aber erst beim Umschmelzen völlig. Der photoelektr. Effekt für weißes Licht ist stärker als die Summe der Effekte für die einzelnen Lichtkomponenten. Vf. nimmt einen Energieaustausch zwischen Molekülen in verschiedenen Polarisationszuständen an. (Journ. Physical Chem. 29. 58—67. Houston [Texas] Rice Inst.) LESZYNSKI.

A₂. Elektrochemie. Thermochemie.

Jean Granier, *Absorption elektromagnetischer Wellen durch das Eis*. Vf. untersucht mittels elektr. Methoden den Winkel der entstehenden Phasendifferenz u. die Selbstinduktion, welche reines Eis gegenüber elektr. Wellen verschiedener Frequenz aufweist: es zeigt sich, daß das Verh. eines Eiskondensators schemat. durch zwei parallel geschaltete Kondensatoren von je 2,05 u. etwa 78 Einheiten Selbstinduktion, dargestellt werden kann; hinter den 2. Kondensator wäre ein Widerstand zu schalten, dessen Wert umgekehrt proportional der Temp. variiert. Vf. gibt eine Deutung dieses Befundes, welche hauptsächlich die Eigenschwingungen u. die gegenseitige Reibung der H- u. OH-Ionen des Eises zur Erklärung heranzieht. (C. r. d. l'Acad. des sciences 179. 1313—16. 1924.) FRANKENBURGER.

Albert F. O. Germann, *Kohlenmonoxyd, ein Produkt der Elektrolyse*. Bei der Elektrolyse von Phosgen oder einer Lsg. von $AlCl_3$ in $COCl_2$ wurden CO u. Cl_2 erhalten. Die spezif. Leitfähigkeit von red. techn. $COCl_2$ wurde von **Russe Timpany** zu $0,007 \times 10^{-6}$ bei 25° bestimmt. $COCl_2$ ist demnach ein schwach dissoziierendes Lösungsm. (Science 61. 70—71.) HERTER.

Albert F. O. Germann, *Was ist eine Säure?* (Vgl. vorst. Ref.) Nachdem FRANKLIN für Basen neben OH^- auch NH_2^- als charakterist. Ion zugelassen hat, erhebt sich die Frage, ob nicht auch Säuren existieren können, die keine H^+ -Ionen abspalten. Vf. bejaht diese auf Grund des Verh. von $AlCl_3$ in $COCl_2$, deren Verb. $COAl_2Cl_3$ „Carbonyldichloraluminat“ er auf Grund der früher (GERMANN u. GAGOS Journ. Physical Chem. 28. 965; C. 1924. II. 2224) angegebenen Rkk. als eine Säure mit dem charakterist. zweiwertigen Ion CO^{2-} auffaßt. Als Säure ist danach die Substanz zu definieren, die sich bildet, wenn ein ionisierendes Lösungsm. sich chem. mit einer geeigneten Substanz verbindet u. die imstande ist. Salze mit Metallen

mit von dem Lösungsm. abgeleiteten Basen zu bilden. Beispiel $\text{SO}_3 \cdot \text{HOH}$ mit PH_3 , 2AlCl_3 , COCl_2 mit CaCl_2 . (Science 61. 71. California, Stanford Univ.) HERT.

Sven Bodforss und Aksel Arstal, *Die Perboratbildung bei der Elektrolyse mit asymmetrischem Wechselstrom*. Eine wss.-alkal. Lsg. von H_3BO_3 wurde der Elektrolyse unterworfen, wobei dem Gleichstrom (J_g) ein Wechselstrom (J_w) überlagert wurde, dessen Stärke bei der größten Amplitude J_g übertraf. J_g wurde mit (Coulometer, die Gesamtstromstärke (J_A) mit Weicheisen- oder Hitzdrahtampèrèmeter gemessen. Es war dann $J_w = \sqrt{J_A^2 - J_g^2}$. Als Anode diente ein Zn-Stab; auch Sn gab positive Resultate, wenn auch in geringem Maße, die anderen untersuchten Metalle ergaben keine B. von Perborat bzw. H_2O_2 . Die Resultate, die zu großen Teil mit denen von BÜRGIN (Diss. Berlin 1911) übereinstimmen, sind folgende (Elektrolyt stets $5\text{NaOH} + 1\text{B(OH)}_3$ im l): Die günstigste Stromdichte war $D_A = 0,06 \text{ Amp./qcm}$ bei $J_w : J_g = 2,8$. Die Ausbeute an Peroxydsauerstoff ist am größten ca. 15 Min. nach Beginn der Elektrolyse, danach fällt sie ab, u. zwar um so stärker, je kleiner $J_w : J_g$ ist. Die Temp. des Elektrolyten ist niedrig, da besten unter 0° zu halten, bei 30° entsteht kein Perborat mehr. Dessen B. beginnt erst bei einer solchen Stärke des Wechselstroms, daß der Gesamtstrom kein a. Gleichstrom mehr, sondern ein a. Wechselstrom ist. Die Ausbeute, gemessen auf Gleichstrom, steigt dann mit der Amplitude des Wechselstroms. Die Zn. des Elektrolyten wurde variiert von $\text{NaOH} : \text{B(OH)}_3 = 1-7$. Die günstigsten Ergebnisse wurden bei $\text{NaOH} : \text{B(OH)}_3 = 5$ erhalten. Hier liegt auch die maximale Leitfähigkeit der Fl. Der Verbrauch an Zn wurde gravimetr. verfolgt. Die Resultate zeigen deutlich, daß zwischen B. von Peroxyd u. Auflösung von Zn kein direkter Zusammenhang besteht. Zur Theorie der Rk. machen Vf. vorläufig die Annahme, daß die B. von Perborat mit a. Wechselstrom ein kathod. Prozeß ist: Wenn die Elektrode Anode ist, beladet sie sich mit O, bei dem kathod. Prozeß wird dieser zu H_2O_2 red. Die Verss. von F. FISCHER u. PRIESS (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 46. 6; C. 1913. I. 1324) über kathod. Red. von O_2 zu H_2O_2 an Hg stützen die Hypothese. Die Theorie von BÜRGIN (l. c.), wonach der Wechselstrom als Depolarisator dient, wird abgelehnt. (Ztschr. f. Elektrochem. 31. 1—5. Drontheim, Techn. Hochsch.) HERTER.

E. Liebreich und W. Wiederholt, *Die Stromspannungskurven von Nickel und Amminum*. Die früher (Ztschr. f. Elektrochem. 30. 263; C. 1924. II. 1317) an C Fe u. Hg ausgeführten Unters. über die Stromspannungskurven wurden auf Al u. Al ausgedehnt. Als Elektrolyte dienten $0,1\%$ ig. H_2SO_4 , 1% ig. H_2O_2 , $0,1\%$ ig. H_3O_3 , $1/10$ -n. HCl u. $1/10$ -n. NaOH, bei Ni auch NiSO_4 verschiedener Konz. Auch d. anod. Teil der Kurven wurde untersucht. Wie in den früheren Fällen kommt es bei kathod. Polarisierung von Ni u. Al zur B. von Hydroxyden, bevor H_2 entwickelt wird. Allerdings bestehen gewisse Unterschiede, von denen wohl der wichtigste ist, daß infolge der geringen Löslichkeit der Hydroxyde diese nicht vollständig red. werden, es kommt der H_2 an einer Deckschicht, die sich an der Metalloberfläche ausbildet, zur Abscheidung. Auch Auflösung des Metalls unter Einwirkung von Salzen wurde beobachtet. Die Unlöslichkeit von Al bei anod. Polarisierung wird beweiskräftig auf die B. einer Oxydhaut zurückgeführt, deren Sichtbarmachung photograph. Wiedergabe gelang. Das gesamte Versuchsmaterial läßt es unzweifelhaft erscheinen, daß die Passivitätserscheinungen lediglich Folgen der chem. Bindungen in der Umgebung der Elektrode sind, ihre Ursache ist nicht dem Metall selbst zuzuschreiben. Die Augenfälligkeit der Passivität bei mehrwertigen Metallen wird nur dadurch gehoben, daß bei dem Wechsel der chem. Bedingungen (relative Menge von O u. H) die Wertigkeitsstufen auch gleichzeitig wechseln. (Ztschr. f. Elektrochem. 31. 6—15. Berlin, Chem.-Techn. Reichsanstalt.) HERTER.

Elisabeth Becker und Hermine Hilberg, Über die Passivität der Metalle

Es wurde untersucht, ob die Kontaktdistanzen (vgl. ROHMANN, Physikal. Ztschr. 24, 417 [1920]) u. die lichtelektr. Empfindlichkeit ein Kriterium für den akt. oder passiven Zustand von Metallen darstellen. Die Verss. erstreckten sich auf Fe, Cr u. Ni. W war nicht verwendbar, da es sich im Kontakt mit Säuren mit einer Oxydschicht überzieht, also stets mechan. passiv ist. Mo ließ sich entgegen den Angaben von MUTHMANN u. FRAUNBERGER, Sitzungsber. Bayr. Akad. d. Wiss. 34, 201 [1904] auf keine Weise passivieren. Elektrolyt. aus Chromsäure auf Fe niedergeschlagenes Cr wurde durch kathod. Polarisierung für mehrere Stdn. akt. Auf Cr dagegen wurde es sehr schnell wieder passiv. Im allgemeinen war die Kontaktdistanz des passiven Metalls größer als die des akt.; dieser Befund spricht gegen die Dispersoidtheorie (vgl. GRAETZ, Handb. der Elektrizität, Bd. II., S. 541). Häufig gingen auch Lichtelektrizität u. Passivität bei den teils akt., teils passiven Metallen parallel. Sichere Kennzeichen für den einen oder anderen Zustand des Metalls sind aber beide nicht. Das einzige sichere Charakteristikum ist die verschiedene Reaktionsgeschwindigkeit bezw. die Feststellung, ob das Metall sich nach dem Faradayschen Gesetz auflöst oder nicht. (Ztschr. f. Elektrochem. 31, 31—41 Münster, Physikal. Inst.)

HERTER.

Herbert S. Harned und Maurice H. Fleysher, Die Aktivitätskoeffizienten von Chlorwasserstoffsäure in äthylalkoholischen Lösungen. Die EKK. der Kette $H_2 | HCl(m) | AgCl | Ag$ wurden bei 25° gemessen. Als Lösungsm. dienten entweder A. oder Gemische von A. u. W. Die Säurekonz. war bei variabler Zus. des Lösungsmittelgemisches 0,01 u. 0,1 n. Der A. wurde gereinigt durch Dest. aus konz. H_2SO_4 , wobei nur die mittlere Fraktion genommen wurde, die nochmals über alk. AgO dest. wurde. Das Destillat wurde über frisch gebranntem Kalk aufgehoben u. vor dem Gebrauch abdestilliert u. immer vor Luft u. Feuchtigkeit geschützt. Alkoh. Lsgg. von HCl wurden durch Einleiten von völlig trockenem HCl-Gas in den gereinigten A. unter Eiskühlung dargestellt. Die Lsg. ist jedoch nicht beständig, sondern es bildet sich langsam Äthylchlorid u. W. In 25 Tagen fiel die Säurekonz. von 4,3% HCl auf 3,2%. W. verzögert die B. von Äthylchlorid. — Mit wachsendem A.-Gehalt nimmt die EK. der Kette bei konstanter Säurekonz. ab. Andererseits ist die Säurekonz. von 0,001 bis 3,62-n. bzw. 2,5-n. variiert u. die EK. der Kette in reinem A. bzw. einem Gemisch von 50% A. — 50% W. gemessen. Die EK. ist als Funktion des log der Konz. graph. dargestellt. — Aus der Differenz der EKK. zwischen 2 Konz. M_1 u. M_2 wird das Verhältnis der Aktivitätskoeffizienten γ_1 u. γ_2 nach der Gleichung

$$\Delta E = 0,1183 \log (\gamma_2 M_2 / \gamma_1 M_1)$$

berechnet, doch läßt sich so nicht der Wert bei unendlicher Verdünnung extrapolieren. Der Aktivitätskoeffizient von HCl in dem A.-W.-Gemisch wurde mit Hilfe der Gleichung $\log \gamma_1 / \log \gamma_2 = D_2 / D_1$ nach DEBYE u. HUECKEL (Physikal. Ztschr. 24, 185; C. 1923. III. 334) gefunden. Der Aktivitätskoeffizient von HCl ist in A. ungefähr 100mal größer als in W. (Journ. Americ. Chem. Soc. 47, 82—92.)

JOSEPHY.

Herbert S. Harned und Maurice H. Fleysher, Die Überföhrungszahlen von Chlorwasserstoffsäure in äthylalkoholischer Lösung. (Vgl. vorst. Ref.) Vff. berechneten die EKK. der Kette $Ag | AgCl | HCl(m_2) | H_2 | HCl(m_1) | AgCl | Ag$ u. messen die EKK. der Ketten $Ag | AgCl | HCl(m_2) | HCl(m_1) | AgCl | Ag$ u. berechnen daraus thermodynamisch die Überföhrungszahlen der Ionen der Säure nach der Methode von MAC INNES u. BEATTIE (Journ. Americ. Chem. Soc. 42, 1117; C. 1920. III. 661). Die Werte sind für die verschiedenen Säurekonz. zwischen 0,001- bis 3,5-n. in reinem A. u. 50 Mol% A. in W. angegeben. (Journ. Americ. Chem. Soc. 47, 92—95. Philadelphia [Penns.], Univ.)

JOSEPHY.

S. Kalandyk, *Das elektrische Leitvermögen von Salzdämpfen in der Chlorwasserstoffflamme*. Die Zerstäubung des Salzes (RbCl, KCl, NaCl oder KJ) wurde trockenem Wege bewirkt, dadurch, daß das völlig trockene Salz mit Seesand d. u. auf die gewünschte Konz. gebracht, vom Wasserstoffstrom mitgerissen wurde, der zur Flamme führte. Der elektr. Strom einer abstufbaren Akkumulatorenerreiter wurde über ein Drehspulgalvanometer mittels zweier Platinelektroden der Flamme zugeführt. Die eine Elektrode war an einem Messingstück befestigt, durch dessen Kühlwrgk. Thermionenemission vermieden wurde. Es wurden bei 2, bzw. 10 V. Spannung die Galvanometerausschläge bei steigender Salzkonz. von 0,004- bis 0,02-n. beobachtet u. zwar sowohl in der *Wasserstoff-Sauerstoff-*, als auch in der *Wasserstoff-Chlorflamme*. Die Stromintensitäten durchlaufen bei konstantem angelegten Potential u. konstanter Temp. Maxima u. verlaufen in beiden Flammen ähnlich. Die Beobachtungen machen es wahrscheinlich, daß bei geringen Konz., wenigstens bei KCl u. NaCl, die Stromstärke proportional dem Salzgehalt wächst. Die Leitung ist unipolar u. entspricht in der H-O-Flamme einer größeren Beweglichkeit der negativen, in der H-Cl-Flamme einer größeren Beweglichkeit der positiven Ionen, während jedoch in der letzteren Flamme das Verhältnis der Stromintensitäten beim Umpolen nahezu konstant ist, nimmt es in der H-O-Flamme mit steigender Salzkonz. rasch ab. Die Erscheinung weist auf starke Ionisation an der Kathode hin, wird deutlicher mit wachsender angelegter Spannung u. dürfte Thermion. Ursprungs auf der heißeren Elektrode sein. — Die H-Cl-Flamme leitet besser bei heißer Anode, was zur Unters. der Emission glühenden Platins in Cl-Atmosphäre veranlaßte. Es wurde vorwiegend negative Ionenemission gefunden, die nahezu konstant blieb während einer Zeit, in der Pt in Luft eine überwiegende rasch abnehmende positive Ionenemission aufweist. (Journ. de Physique et le Radium [6] **5**. 345—52. 1924.)

KYROPOULOS.

Stefan Meyer, *Magnetisierungszahlen seltener Erden*. Vf. teilt neuere Bestst. der Magnetisierungszahlen der seltenen Erden mit. Die hieraus sich ergebende Kurve für die magnet. Eigenschaften der seltenen Erden in Abhängigkeit von der Ordnungszahl zeigt einen Anstieg vom diamagnet. La (III) zum paramagnet. Pr (III) darauf Abfall zum Sm (III) u. erneuten Anstieg bis zu einem, bedeutend höher als dem des Pr gelegenen Maximum für Dy u. Ho. Hierauf fällt die Kurve erst zum diamagnet. Cp ab. Die vom Vf. gemessenen Werte decken sich gut mit den von CABRERA ermittelten. Auf Grund seines Befundes diskutiert Vf. die mutmaßliche Elektronenzuordnung für die Elemente Nr. 60—70. (Physikal. Ztschr. **26**. 51—54.)

FRANKENBURGER.

Helmut Hausen, *Bemerkung über den Zusammenhang zwischen der spezifischen Wärme c_v , der inneren Energie U und der Zustandsgleichung der Körper auf Grund des zweiten Hauptsatzes der Thermodynamik. Entgegnung auf die gleichnamige Arbeit von Witold Jazyna*. Kritik der Arbeit JAZYNAS (Ztschr. f. Physik **25**. 133; **1924**. II. 1059), die durch die Ergänzung desselben (Ztschr. f. Physik **27**. 254 [1924]) teilweise überholt ist. (Ztschr. f. Physik **30**. 277—79. 1924. Pullach bei München.)

BIKERMANN.

H. Hausen, *Zur physikalischen Begründung des sogenannten „reziproken Theorems“*. Entgegnung auf die gleichnamige Arbeit von Witold Jazyna. Vf. weist auf Fehler in der Beweisführung JAZYNAS (Ztschr. f. Physik **27**. 254 [1924]) hin u. zeigt, daß auch Folgerungen aus dem „reziproken Theorem“ wenig wahrscheinlich sind. (Ztschr. f. Physik **30**. 280—84. 1924. Pullach b. München.)

BIKERMANN.

Witold Jazyna, *Zum Beweis und zur Begründung des reziproken Theorems*. Bemerk. gegen HAUSENS erste Entgegnung (vgl. vorvorst. Ref.). (Ztschr. f. Physik **30**. 372—75. 1924. St. Petersburg.)

BIKERMANN.

Witold Jazyna, *Über die physikalische Bedeutung des reziproken Theorems*. Vf. zerlegt die Änderung der inneren Energie bei einem isotherm. Vorgang in einen von Kohäsionskräften u. einen von Dissoziation herrührenden Teil. Der zweite gleich Null, so muß nach dem „reziproken Theorem“ (vgl. v. Ref.) auch der erste gleich Null sein. (Ztschr. f. Physik **30**. 376—79. 1924. St. 1. ttersburg.)

BIKERMAN

J. A. V. Butler, *Die Beziehung zwischen den Abweichungen vom Raoult'schen Gesetz und den Partiallösungswärmen*. (Vgl. S. 346.) Vf. zeigt, daß in den Fällen, in denen Werte für die Partiallösungswärmen in binären Flüssigkeitsgemischen vorliegen, wie sie z. B. die Unterss. über konz. Tl-Amalgame von RICHARDS DANIELS (Journ. Americ. Chem. Soc. **41**. 1732; C. **1920**. I. 814) u. die Berechnung von LEWIS u. RANDALL (Journ. Americ. Chem. Soc. **43**. 233; C. **1921**. III. 450) gaben, zwischen den Abweichungen vom Raoult'schen Gesetz u. den Partiallösungswärmen Proportionalität besteht. Die Bedeutung dieser Beziehung in der Theorie der binären Gemische wird vom Standpunkt der statist. Theorie erörtert. Gilt die Beziehung allgemein, so folgt daraus, daß die Lösungswärme einer Komponente in einem Flüssigkeitsgemisch direkt der stattfindenden Volumenänderung proportional ist. Ferner zeigt Vf., wie man unter gewissen Voraussetzungen zu der Gleichung von CADY (Journ. Physical Chem. **2**. 551 [1898]. **3**. 107 [1899]) gelangt. (Journ. Americ. Chem. Soc. **47**. 117—22. Swansea [Wales], Univ.)

JOSEPHY

Maurice Prud'homme, *Über die molekularen Verdampfungswärmen*. A Grund der Troutonschen Beziehungen zwischen molekularer Verdampfungswärme u. absol. Temp. wird am Beispiel des Äthylalkohols als einzigem Fall, für den re übereinstimmende Beobachtungen vorliegen, abgeleitet, daß beim absol. Nullpunkt die molekulare Verdampfungswärme eine einfache Funktion der absol. krit. Temp. ist. Bei anderen Verbb. sind die Werte für die Konstante $K = L/T_1$, worin L die molekulare Verdampfungswärme u. T_1 die absol. Siedetemp. beim Druck von 1 Atm. ist, stärker variierend, wie aus den mitgeteilten Messungen von T , $T_c - T$, L u. von Δ , $\text{CH}_3 \cdot \text{COOH}$, Ameisensäuremethylester, Buttersäuremethylester, Hexan, SNO_2 hervorgeht. (Journ. de Chim. physique **21**. 461—64. 1924.)

HORST

L. Holborn und J. Otto, *Über die Isothermen von Helium, Stickstoff u. Argon unterhalb 0°*. Vf. empfehlen folgende Interpolationsformeln: Helium: $p v = A + B p + C p^2$; bei -50 , -100 , -150 u. -183° sind A 0,81642, 0,633 0,45062, 0,32992; $B \cdot 10^3$ 0,700, 0,699, 0,670, 0,613; $C \cdot 10^6$ 0,163, 0,285, 0,449, 1, Argon: $p v = A + B p + C p^2 + D p^4$; bei -50 u. -100° sind A 0,81804 0,63478, $B \cdot 10^3$ $-2,22100$ u. $-3,78075$; $C \cdot 10^6$ 1,3720 u. $-17,6813$, $D \cdot 10^9$ 0,3008 $-0,3906$. Stickstoff: $p v = A + B p + C p^2 + D p^4 + E p^6$; bei -50 , -100 -130° sind A 0,81747, 0,63434, 0,52446; $B \cdot 10^3$ $-1,54934$, $-3,04600$, $-4,685$; $C \cdot 10^6$ 5,7092, $-3,0667$, $-24,4699$; $D \cdot 10^9$ 0,2438, 1,8603, $-20,2026$; $E \cdot 10^{12}$ 0, 8,4248. — Zum Schluß wird eine Korrektions-tabelle für die mit He, Ar oder gefüllten Gasthermometer gegeben. (Ztschr. f. Physik **30**. 320—28. 1924. Ch lottenburg, Phys.-techn. Reichsanstalt.)

BIKERMAN

A. Schidlof, *Die Strahlungsquanten und die Gastheorie*. II. (Vgl. Arch. phys. et nat. Genève [5] **6**. Suppl. 61; C. **1924**. II. 2389.) Es wird eine statist. Ableitung des Planckschen Strahlungsgesetzes u. der chem. Konstante idealer Gase gegeben. Der Ausdruck für die chem. Konstante ist nur gültig, solange die Größe $\left(\frac{h^2}{2\pi k m T} \right)^{3/2} \frac{N}{V}$, worin m die M. des (monoatomigen) Mol. deutet, neben 1 zu vernachlässigen ist. Die Einführung der Zahlenwerte für Konstanten π , h , k u. N/V ergibt für die untere Temperaturgrenze des Gültigkeitsbereiches der Formel für die chem. Konstante sehr geringe Werte, im Falle des

z. B. ($m = 4:6,07 \cdot 10^{23}$) liegt die Grenze bei $0,07^\circ$ abs. (Arch. Sc. phys. et nat. (nève) [5] 6. 381—92. 1924.)

BIKERMANN.

J. Duclaux, *Theorie der Gase und Zustandsgleichung*. Auf Grund der Annahme, daß die Moleküle im Gaszustand keine Coulombschen Kräfte aufeinander ausüben, die Gase also bei konstanter Temp. z. B. Gemische von einfachen u. Doppelmolekülen darstellen, die in bezug aufeinander indifferent sind, u. daß die Lösungsverhältnisse den chem. Gleichgewichtsgesetzen folgen, wird eine Zustandsgleichung aufgestellt, die für niedrige Drucke u. überkrit. Temp. in die van der Waals'sche Gleichung übergeht u. im übrigen die Reaktionskonstante enthält. Durch Einführung der Temp.-Abhängigkeit dieser Konstanten nach der van t'Hoff'schen Gleichung geht die Gleichung des Vf. in die von LEDUC experimentell aufgestellte Zustandsgleichung über. Die Gleichung stimmt gut bei CO_2 . Die Einführung des Gesetzes der korrespondierenden Zustände führt zu den Folgerungen, daß: 1. in korrespondierenden Zuständen gleiche Bruchteile der Gase assoziiert sind; 2. die Entropieänderungen durch Dissoziation der assoziierten Moleküle unabhängig von deren Natur sind. (Journ. de Physique et le Radium [6] 5. 331—37. 1924.)

KYROPOULOS.

Vladimir Njegovan, *Über den absoluten Wert der Entropie realer Gase*. Mitt. (I. vgl. Ztschr. f. Elektrochem. 30. 291; C. 1924. II. 2113.) Vf. setzt eine mathemat. Behandlung der Entropie realer Gase fort u. kommt zu dem Schluß, daß bei hohen Drucken, wo nach den neuesten Messungen die C_p -Kurven ganz eigenartige Formen annehmen, die Entropiekonstante nicht mehr konstant bleibt. Sollte sich die Annahme von der variablen Entropiekonstante bestätigen, so wäre statt „absol. Wert der Entropie“ ein anderer Name einzuführen, wofür Vf. „Wärmeextensität“ vorschlägt. (Ztschr. f. Elektrochem. 31. 5—6. Zagreb [Jugoslawien], Techn. Hochsch.)

HERTER.

J. E. Mills, *Eine neue Energiebeziehung für Flüssigkeiten und Dämpfe*. Bei Einführung der theoret. Bedeutung der Gleichung $\lambda = CRT \ln V/v$ von DITERICI in der Physik [4] 35. 220; [1911], worin λ die Verdampfungswärme, C eine Konstante, V das Vol. in ccm eines g Dampf, v dasselbe eines g Fl. ist, fand Vf. nach Integration vom absol. Nullpunkt bis zur krit. Temp. von $dv CRT/v$, woraus folgende Gleichung folgt, die Beziehungen $\mu' \sqrt[3]{d_0} = \mu' \sqrt[3]{d} + \frac{1}{2} E_T + CRT \ln v/v_0$ für Fl. u. $\mu' \sqrt[3]{d_0} = \mu' \sqrt[3]{D} + \frac{1}{2} E_T + CRT \ln V/v_0$ für Dampf. v_0 ist das Vol. in cm eines g Fl. am absol. Nullpunkt, D = Dichte des Dampfes, d = Dichte der Fl., d_0 = Dichte am absol. Nullpunkt, $\mu' = \lambda / (\sqrt[3]{d} - \sqrt[3]{D})$. E_T ist die Bewegungsenergie eines Moleküls in unendlicher Entfernung, dann wird die mittlere kinet. Energie der Teilchen der Dichte d $2\mu' \sqrt[3]{d} + E_T$. Die gefundene Beziehung wird an 12 Fl. geprüft. Die Konstante C hängt mit der Neigung der Mittellinie von CAILLETET u. MATHIAS zusammen. Aus den Werten für C ist ersichtlich, daß das Molekularvol. am absol. Nullpunkt eine additive Eigenschaft der Atome ist, u. wird daher angenommen, daß auch die Molekularenergie am absol. Nullpunkt die Summe der Energie der Atome ist. (Journ. Physical Chem. 29. 68—73. 1924.)

JOSEPHY.

B. Anorganische Chemie.

Ellen Gleditsch, *Über das Atomgewicht des Chlors*. Zur Feststellung, ob in den in der Natur vorkommenden Chloridmineralien eine teilweise Trennung der

Isotopen des Cl durchgeführt ist, untersucht Vf. vulkan. *Salmiak*salze vom Vesuv u. Grubenwasser aus Kupfergruben in der Nähe des Oberen Sees. Auf die Reinigung der Salze wurde besondere Sorgfalt verwandt. Außer diesen natürl. Mineralien wurden Cl-Bestst. mit chem. reinem BaCl_2 nebenher ausgeführt. In allen Fällen waren die experimentell gefundenen Werte für das At.-Gew. des Cl übereinstimmend dieselben. Sie liegen im Mittel (innerhalb der zulässigen Fehlergrenzen) um den gewöhnlichen At.-Gew. des Cl, trotz des verschiedenen Ursprungs des untersuchten Materials. (Journ. de Chim. physique **21**. 456—60. 1924. Christiania, Univ. Paris, Radium-Inst.)

HORST.

H. v. Wartenberg und **D. Weigel**, *Die Dissoziation von Chlor*. Vff. bestimmen nach der Methode von V. MEYER, vermittelt einer näher beschriebenen Apparatur, durch Vergleich des Vol. von Cl_2 u. CO_2 bei 1478°C die Dissoziation des Cl_2 . Die gefundenen Werte stehen in Übereinstimmung, innerhalb der Fehlergrenzen der verschiedenen Methoden, mit den Resultaten von HENGLEIN (vgl. Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. **123**. 137; C. **1923**. III. 426) u. WOHL (vgl. Ztschr. Elektrochem. **30**. 36; C. **1924**. I. 1163). (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. **142**. 337—4 Danzig, Techn. Hochsch.)

ULMANN.


Charles De Witt Hurd und **H. J. Brownstein**, *Die Darstellung von freiem Hydroxylamin*. Die Isolierung von freiem NH_2OH erfolgte durch Krystallisation aus Butylalkohol, in dem es weniger l. ist als in A. Auf diese Weise wurde 50% des in der Lsg. vorhandenen NH_2OH krystallisiert erhalten. Der Butylalkohol des Handels wurde nur durch Dest. gereinigt, u. die zwischen $115,5$ — $117,5^\circ \text{C}$ frakt. Fraktion wurde zu den Verss. benutzt. Die Temp. während der Krystallisation braucht nur auf -10° erniedrigt zu werden. Ein Gemisch von 0,1 g Phenolphthalein, 34,8 g trockenem $\text{NH}_2\text{OH} \cdot \text{HCl}$ u. 30 ccm Butylalkohol wurden langsam erwärmt u. 10 Min. lang gerührt. Durch einen Tropftrichter wurde Na-Butylat so schnell zugesetzt, wie das Phenolphthalein gestattete. Bevor die warme Lsg. des Na-Butylats in den Tropftrichter gegeben wurde, wurden, um das Festwerden des Butylats zu verhindern, 2 ccm Butylalkohol hineingegossen. Der Vers. dauert ca. $1\frac{1}{2}$ Stdn. NaCl wurde abfiltriert, u. aus dem Filtrat begann bei 0°C NH_2OH auszukrystallisieren. Der in der Lsg. gebliebene Teil des NH_2OH kann entweder durch HCl wieder als $\text{NH}_2\text{OH} \cdot \text{HCl}$ zurückgewonnen werden, oder durch Äthylbenzoat u. Na-Äthylat in das Na-Salz der Benzhydroxamsäure umgewandelt werden (vgl. S. 1292), woraus durch HCl die Benzhydroxamsäure freigemacht wurde, die als Cu-Salz gefällt wurde. Oder der in Lsg. gebliebene Teil des Hydroxylamins wird als Phenylacethydroxamsäure wiedergewonnen. Diese Umwandlung ist ähnlich wie bei der Benzhydroxamsäure. (Journ. Americ. Chem. Soc. **47**. 67—69. Evanston [Ill.], Univ.)

JOSEPHY.

Karl Friedrich Schmidt, *Über die Bildung von Hydrazin, Hydroxylamin und Anilin aus Stickstoffwasserstoffsäure*. Wasserfreie Stickstoffwasserstoffsäure wird (nach CURTIUS) durch konz. H_2SO_4 unter Gasentw. zers. Vf. setzt N_3Na mit konz. H_2SO_4 um, bei ca. 30°C tritt die Rk. ein; sie besteht hauptsächlich in einer Oxydation durch die H_2SO_4 unter B. von N_2 , H_2O u. SO_2 ; daneben bildet sich *Hydroxylamin*, u. zwar $\frac{1}{7}$ der nach $\text{N}_3\text{H} + \text{H}_2\text{O} = \text{N}_2 + \text{NH}_2\text{OH}$ möglichen Menge. Vf. nimmt an, daß die N_3H durch Einw. der H_2SO_4 in $\text{N}_2 + >\text{NH}$ zerfällt, u. das $>\text{NH}$ größtenteils durch die H_2SO_4 zu N_2 oxydiert wird, zum kleinen Teil dagegen mit dem bei der Red. der H_2SO_4 entstehenden W. zu NH_2OH zusammentritt. — Verd. H_2SO_4 oder gasförmige HCl wirken anders auf N_3H , nämlich langsam nach: $3\text{N}_3\text{H} + \text{HCl} = \text{NH}_4\text{Cl} + 4\text{N}_2$, also unter B. von Ammoniumsalz. Wird ohne fremde Säure die N_3H in Lsgg., z. B. in *Bzl.*, erhitzt, so tritt ein ähnlicher Zerfall ein, wobei die Rolle der HCl von N_3H übernommen wird: $4\text{N}_3\text{H} = \text{NH}_4\text{N}_3 + 4\text{N}_2$. Diese Rk.

aber noch träger; eine 4%ige Lsg. von N_3H in Bzl. hatte nach 10 Stdn. bei 10° noch kein NH_3 gebildet, erst nach 48 Stdn. bei 230° waren $\frac{2}{3}$ umgesetzt. — Wird dagegen eine Lsg. von N_3H in Bzl. mit konz. H_2SO_4 unterschichtet u. stehen gelassen, so erfolgt schon bei 15° dauernde Gasentw., die nach 5–6 Tagen beendet ist; bei 60–70° unter Turbinieren ist sie schon nach 5 Stdn. beendet. In beiden Fällen ist die Menge N_2 ca. 85% vom N-Gehalt des Ausgangsmaterials, der Verlauf der Rk. aber ganz verschieden. Bei dem Vers. bei 15° hat sich in der H_2SO_4 -Schicht *Hydrazinsulfat* abgeschieden; außerdem bildet sich *Anilin* u. etwas *Hydroxylamin*. Beim Vers. bei 60–70° wird nur wenig Hydrazin gebildet, dagegen viel mehr Anilin; in der Bzl.-Lsg. ist, außer SO_2 , kein sonstiges Prod. nachzuweisen. von NH_3 in beiden Fällen höchstens spurenweise.

Vf. bereitet die N_3H -Lsg. durch Versetzen einer kaltgesätt. Lsg. von N_3Na in Bzl. mit 50%ig. H_2SO_4 u. Ausschütteln mit reinem Bzl.; 90% der N_3H gehen ins Bzl., ca. 4%ige Lsg., alkalimetr. Best. der N_3H in dieser. Der entw. N_2 nimmt bei den Verss. nur wenig N_3H mit, die in vorgelegter NaOH bestimmt wird, ebenso das gebildete SO_2 . N_2 wird gemessen. Aus der H_2SO_4 -Schicht wird durch Verdünnen mit Eis u. viel A. Hydrazinsulfat quantitativ gewonnen u. gewogen, Kontrollwägung mit Benzalazin. Aus dem Filtrat wird, nach Entfernung der H_2SO_4 , durch alkal. Ausfäherung das Anilin isoliert, die ausgeätherte Fl. mit HCl eingedampft gibt an *Hydroxylaminchlorhydrat* ab, das gewogen u. durch N-Best. als rein erwiesen wird. Bei jedem Vers. wird aller als N_3H eingesetzter N in Summa wiedergefunden. Die B. von Anilin erklärt Vf. wie folgt:



aus der B. von Sulfonamiden aus Sulfonaziden u. KW-Stoffen entspricht, wo ebenfalls intermediär ein Radikal, $R \cdot SO_2 \cdot N<$, auftritt. Daß die B. von Anilin in der Wärme begünstigt ist, liegt an der in der Wärme geringeren Neigung der $>NH$ zum Zersplittern zu Diimid (siehe unten) u. an der leichteren Angreifbarkeit des Bzls. Das Zersplittern von $>NH$ wird besonders deutlich, wenn man es durch leicht addierende Stoffe abfängt: Vf. versetzt die Lsg. von N_3H in Bzl. mit *Benzophenon* oder *m-Nitrobenzaldehyd* u. dann in der Kälte mit wenig konz. H_2SO_4 , wobei sofort stürm. Rk. Mit *Benzophenon* bildet sich quantitativ *Benzanilid* infolge Beckmannscher Umlagerung des primär aus *Benzophenon* u. $>NH$ entstandenen *Benzophenonoxims*; mit *m-Nitrobenzaldehyd* bildet sich zu $\frac{5}{6}$ *m-Nitrobenzonitril* unter Abspaltung von W. aus dem Gemisch, zu $\frac{1}{6}$ *m-Nitroanilin* unter Abspaltung von CO; Gesamtbildung nicht ganz quantitativ. — Man könnte annehmen, daß auch die B. des Hydrazins bei 15° unter Mitwirkung des Bzls. erfolgt, da sie nur in Bzl. eintritt, also nach: $2N_3H \rightarrow 2N_2 + 2NH<$; $2HN< + 2H$ (aus dem Bzl.) = N_2H_4 . Entsprechendes ist bei den Sulfonaziden beobachtet worden, wobei die KW-Stoffe unter H-Verlust zu „Antipernern“ verknüpft werden. Aber bei den Verss. des Vf. wurden keine solchen Antikörper gefunden, u. die Menge Hydrazin bleibt hinter der nach obiger Theorie erwartenden zurück u. ist, mit Berücksichtigung der Nebenprodd. (*Hydroxylamin*, *Anilin*), nie größer als nach folgender Gleichung zu erwarten: $4N_3H = N_2H_4 + 5N_2$. Letztere Rk. nimmt Vf. daher an u. legt sie wie folgt aus: $4N_3H = 4N_2 + 4HN<$; $4HN< = 2HN:NH$; $2HN:NH = N_2 + N_2H_4$. Die primäre Rk. mit H_2SO_4 ist also in jedem Falle die B. von N_2 u. $>NH$; unter geeigneten Bedingungen greift auch $>NH$ das Lösungsm. (Bzl. in der Wärme, Ketone usw. in der Kälte) an, wennfalls polymerisiert es sich zu Diimid, das sofort (vgl. THIELE) zu $N_2 + N_2H_4$ disproportioniert wird. Die B. von *Hydroxylamin* bei 15° dagegen dürfte innerhalb der H_2SO_4 -Schicht erfolgen, wie bei dem Vers. mit H_2SO_4 ohne Bzl.; auch hier so Mitwirken von $>NH$ als Zwischenprod. (*Acta Acad. Aboensis Mathematica* 2. 38 Seiten. 1924. Sep.)

ARNDT.

Carl Faurholt, *Studien über die wässerigen Lösungen von Kohlendioxyd und*

Kohlensäure. (Journ. de Chim. physique **21**. 400—455. **22**. 1—44. 1924. — (1924. II. 1336.)


HORST.

P. H. Hermans, *Über die Konstitution der Borsäure und einiger ihrer Derivate* (Vgl. Koninkl. Akad. van Wetensch. Amsterdam, Wisk. en Natk. Afd. **31**. 626 C. **1923**. III. 1340.) Alle Borsäuren enthalten koordinativ vierwertiges Bor u. sin-

ziemlich starke Säuren. Die Orthoborsäure $\begin{bmatrix} \text{HO} > \text{B} : \text{O} \\ \text{HO} \end{bmatrix} \text{H}$ kann sich in das echt

Trihydroxyborium $\begin{bmatrix} \text{OH} \\ \text{OH} \end{bmatrix} > \text{B} - \text{OH}$ umlagern, von dem sich die Ester $(\text{RO})_3\text{B}$ ab-

leiten. Dieser tautomeren Modifikation wird auch die verhältnismäßig schwach saure Rk. der Orthoborsäure zuzuschreiben sein. Auch die aus Borsäure u. Dimethyl-2,4-pentandiol-2,4 erhaltene Dimethyl-2,4-pentandiol-2,4-borsäure (**I**) hat nur schwach sauren Charakter. Analoge Verbb. wurden vom Vf. dargestellt, die ebenfalls nur schwach sauer sind: Dimethyl-2,4-hexandiol-2,4-borsäure (**II**), Pentandiol-2,4-borsäure (**III**), Pinakonborsäure (**IV**). Vf. nimmt an, daß alle 1,2- u. 1,3-Glykole mit Borsäure Verbb. des Typus **I** bilden können, aber häufig schwierig faßbar sind. Von der cis-Cyclohexandiol-1,2-borsäure (**V**) wurden das Mono- u. Dikaliumsalz, ebenso von der Cyclopentandiolborsäure, der cis-1,2-Indandiolborsäure, der cis-1,2- u. 2,3-Tetrahydronaphthalindiolborsäure (**VI**) u. der Phenylglykollborsäure (**VII**) entsprechende K-Salze dargestellt. Da die trans-Isomeren keine derartigen Verbb. bilden, ist dies ein Hilfsmittel zu ihrer Trennung.



Als Vertreter stärker saurer Verbb. kommen die längst bekannten Brenzcatechinborsäuren vom Typus **VIII** in Betracht (vgl. ROSENHEIM u. VERMEHEN S. 26). Wie bei der Dibrenzcatechinborsäure wird der Säuregrad im selben Sinne stark erhöht bei der B. der Bor-di-citronensäure (K-Salz) (**IX**) u. Zn-Salz (**X**) u. der Bordicyclopentan-1-oxy-1'-carbonsäure (**XI**). Die vier am Bor sitzenden Valenzen sind im Raum verteilt, wie die Spaltbarkeit in opt. Antipoden, welche MEULENHOF gelungen ist, erkennen läßt. Der Übergang von den Derivv. der Orthoborsäure durch Rk. mit einem zweiten Mol. der Dioxyverb. führt zu den unbeständigeren aber stärker sauren Tetrahydroxyborsäuren vom Typus der Dibrenzcatechinborsäure nur dann, wenn die OH-Gruppen im Raum günstig zueinander orientiert sind, wobei vermutlich zunächst ein Mol. H_2O addiert wird. Die Verbb. vom Typus **VIII** sind wahrscheinlich die Träger der typ. Aciditätserhöhung. Der K-Salzen der Monodiolborsäuren kommt wohl die Struktur **XII** zu. Die Fähigkeit der Borsäure, komplexe Anionen mit der Gruppierung $\begin{array}{c} \text{O} \\ \diagup \quad \diagdown \\ \text{O} \end{array} > \text{B} < \begin{array}{c} \text{O} \\ \diagup \quad \diagdown \\ \text{O} \end{array}$ zu bilden, ist die

Veranlassung zur B. der verhältnismäßig starken Säuren. In den *Polyborsäuren* nimmt Vf. dreiwertige Boratome neben koordinativ vierwertigen Boratomen an, von denen letzteren soviel als der Ladung des komplexen Anions entspricht. Vf. berichtet die große Zahl der in der Literatur veröffentlichten Polyborate u. die Deutungen der Konst. derselben. Für viele Fälle ist die Hypothese des Vfs. recht haltbar. Im Original sind zahlreiche Strukturmöglichkeiten wiedergegeben. Als Bausteine aller Polyboratanionen kommen nach der Auffassung des Vfs. das Anion der *Metaborsäure* u. das Anion des *Borax* in Betracht. Im Original werden die Verhbb., Eigenschaften u. Analysen der beobachteten Verbb. ausführlich beschrieben. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. **142**. 83—110.) HORST.

P. H. Hermans, *Berichtigung zu meiner Arbeit: „Über die Konstitution der Borsäure und einiger ihrer Derivate“*. (Vgl. vorst. Ref.) Vf. weist noch besonders darauf hin, wie er sich bei der *Orthoborsäure* den Übergang von der Säureform zur Pseudoform denkt u. worin der schwächer saure Charakter der Monodiolborate beruht. Ziemlich starke Säuren werden dann erhalten, wenn durch entsprechende Substitution der Übergang des koordinativ vierwertigen Bors in das dreiwertige Bor unmöglich wird, z. B. bei den *Didiolborsäuren* (nebenst.). Gleiches gilt für verschiedene *Polyborsäuren*. Bei Verbb. vom Typus der *Dibrenzcatechinsäure* dürfte nach den Auffassungen des Vfs. u. auf Grund der Spaltbarkeit in Antipoden ein Unterschied zwischen Haupt- u. Nebenvalenzen nicht angängig sein. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. **142**. 399—400.) HORST.

P. H. Hermans, *Die Löslichkeitskurven der Systeme Mannit-Borsäure-Wasser und cis-Tetrahydronaphthalin-1,2-diol-Borsäure-Wasser bei 25°*. (Vgl. vorst. Ref.). Zur Unterstützung der Hypothese, daß die *Didiolborsäuren* die Erhöhung des Säuregrades der Borsäuren verursachen, hat Vf. obiges System näher untersucht. Die Messungen geben keinen Beweis für die Existenz stabiler Verbb. als Bodenkörper ergeben. Die *Monomannitborsäure*, $C_6H_{13}O_7B \cdot H_2O$ ist demnach im Gleichgewicht mit wss. lsgg. nicht existenzfähig. Im Schnittpunkt der beiden Löslichkeitskurven ist das molekulare Verhältnis *Mannit-Borsäure* = 1,08. — Im System *cis-Tetrahydronaphthalin-1,2-diol-Borsäure-H₂O* wurde bei 25° auch keine Verb. beobachtet. Im Gegensatz zu dem vorigen System ist hier die Löslichkeitserhöhung der Komponenten recht gering (molekulares Verhältnis Diol-Borsäure = 0,148). (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. **142**. 111—14. Delft, Techn. Hochsch.) HORST.

Hans von Wartenberg, *Notiz über den Angriff von Silicaten durch einige Gase*. Quarz u. Porzellan geben in Berührung mit reduzierenden Gasen bei ca. 1200° Si-Dampf ab, welcher sich in eventuell anwesenden Metallen anreichern kann. Ein größerer Bestandteil des Porzellans ist auch das FeO , welches beim Glattbrand in der reduzierenden Flamme entsteht. Auch kann durch das Fe bei höheren Temp. O_2 u. Cl_2 gebunden werden. Da derartige Gasrkk. auch in die Tiefe dringen, lassen sie sich nicht durch Ausglühen, z. B. beim Arbeiten mit Cl_2 im Cl_2 -Strom, beseitigen. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. **142**. 335—36. Danzig, Techn. Hochsch.) ULMANN.

H. Funk, *Über die Entstehungsbedingungen der Aluminiumboride*. Vf. untersucht systemat. die B. von Boriden durch Zusammenschmelzen von verschiedenen Mengen Al u. B oder B-Verbb. bei Temp. von 700—1700°. B. von AlB_2 tritt ein, wenn auf wenig B reichlich Al einwirkt u. die Temp. mindestens ca. 1000° beträgt, der wenn bei Ggw. von viel B die Einw. sehr kurz ist. Bei höherer Temp., ca. 500°, u. wenn genügend B vorhanden ist, entsteht — auch bei kurzer Schmelzdauer 10—15 Min. — ein borreicherer Prod. AlB_{12} . Es finden sich aber auch Präparate mit mehr Al u. weniger B. AlB_2 wird auffallenderweise von geschmolzenem Al überhaupt nicht mehr aufgenommen, die Krystalle werden schwarz u. unansehnlich.

Diese, sie vermutlich schützende Schicht, bildet sich auch schon bei alleiniger Einw. der Atmosphäre des Kohlerohrofens bei nicht allzu hohen Temp. Gleichfalls werden die Krystalle der borreicheren Verb., aber bei höherer Temp. durch die Ofengase verändert, es tritt ein weißer Beschlag auf (vermutlich B_2O_3), aber sie lösen sich leicht im Al auf, wenn man die Temp. rasch auf 1500° bringt. Bei Abkühlen krystallisieren die sechsseitigen Blättchen des Al_2B_4 aus. Bei ca. 70° bleibt die borreichere Verb. in geschmolzenem Al unverändert. Aus diesem Verhalten der beiden Boride läßt sich die Schichtenbildung beim Schmelzen der KÜHN-Reguli in Al erklären. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. **142**. 269—79. München Techn. Hochsch.)

ULMANN.

G. Carobbi, Über die Doppelchromate der seltenen Erden mit Alkalimetallen

I. Doppelchromate von Lanthan und Kalium. Vf. untersucht das System $La_2(CrO_4)_3 \cdot K_2CrO_4 \cdot H_2O$ bei 25° . Es wurden folgende Körper erhalten: $La_2(CrO_4)_3 : K_2CrO_4 : H_2O =$ a) 1:1:2, bei 25° in Ggw. von 7,5%ig. K_2CrO_4 -Lsg. beständig, gelb, schwer filtrierbar, b) 1:3:2, beständig ungefähr wie a), l. in 100 Teilen W., c) 1:4:2, Stabilität eng begrenzt, hellgelb, d) $1:4\frac{1}{2}:2$, beständig in 11,1—17,8%ig. K_2CrO_4 -Lsg., l. in viel W., e) 1:5:2, sehr weiter Existenzbereich, beständig in 17,8—39,4%ig. K_2CrO_4 -Lsg., gelb, l. in viel W.; daneben bildeten sich in einigen Fällen Gemische verschiedener Komponenten. (Atti R. Accad. dei Lincei, Roma [5] **33** II. 416—20. 1924. Neapel, Univ.)

ZANDER.

F. Zambonini und V. Caglioti, Die Doppelsulfate der seltenen Erdmetalle und Alkalimetalle. II. Sulfate von Neodym und Kalium. (I. vgl. S. 1056.) Beschreibung

der früher erhaltenen Verbb. folgender Zuss.: $Nd_2(SO_4)_3 : K_2SO_4 : H_2O =$ a) 1:5:2 bei 25° beständig in Lsgg. mit 0—0,4% $Nd_2(SO_4)_3$ u. 10,5—11,18% K_2SO_4 , hellrote Pulver, l. bei 15° in 150 Teilen W., verliert bei 200° die Hälfte seines Krystallwassers, D. ca. 2,74, b) 1:4:2, bei 25° beständig in Lsgg. mit 0,04—0,07% $Nd_2(SO_4)_3$ u. 5—10,5% K_2SO_4 , rotes Pulver, etwas weniger l. in W. als a), verliert bei 170° 1 Mol. W., D. 2,86, c) 1:4:1, beständig in Lsgg. mit 0,08% $Nd_2(SO_4)_3$ u. 3,8—5% K_2SO_4 , kleinerer Existenzbereich als das entsprechende Dihydrat, verliert sein W. bei 200° , d) 1:3:2, sehr kleiner Existenzbereich [in Lsgg. mit 0,2% $Nd_2(SO_4)_3$ u. 3—3,2% K_2SO_4], e) 2:3:8, beständig in Lsgg. mit 0,2—1,6% $Nd_2(SO_4)_3$ u. 2,8—0,5% K_2SO_4 , f) 1:1:2, beständig in Lsgg. mit 1,7—2,8% $Nd_2(SO_4)_3$ u. 0,47 bis 0% K_2SO_4 [bei Abwesenheit der erforderlichen $Nd_2(SO_4)_3$ -Mengen Zers. zur Verb. 2:3:8], Krystallpulver, D. 3,305, verliert bei 200° die Hälfte seines W. — Alle Verbb., mit Ausnahme von f), können ohne Zers. bis zu ihrem F. erhitzt werden. — Die erhaltenen Werte werden mit denen aus der Reihe $La_2(SO_4)_3 \cdot K_2SO_4 \cdot H_2O$ verglichen. (Atti R. Accad. dei Lincei, Roma [5] **33** II. 385—89. 1924.) ZANDER.

G. Carobbi, Über die Doppelnitrate der Metalle der Cergruppe mit Kupfer und Cadmium. Zu einer gesätt. Lsg. von $2La(NO_3)_3 \cdot 3Mg(NO_3)_2 \cdot 24H_2O$ wurden La- u. Cu-Nitrat im stöchiometr. Verhältnis 2:3 hinzugefügt. Nach mäßigem Erwärmen u. schnellem Abkühlen wurden Krystalle von $2La(NO_3)_3 \cdot 3Cu(NO_3)_2 \cdot 24H_2O$ erhalten, D.¹⁰ 2,227. — $2Ce(NO_3)_3 \cdot 3Cu(NO_3)_2 \cdot 24H_2O$ wurde aus Lsgg. der beiden Komponenten erhalten, D.¹⁰ 2,237. (Atti R. Accad. dei Lincei, Roma [5] **33** II. 246—50. 1924. Neapel, Univ.)

ZANDER.

Robert B. Corey, A. W. Laubengayer und L. M. Dennis, Germanium. VIII. Die physikalischen Eigenschaften von Monogerman. (VII. vgl. DENNIS, COREY u. MOORE, Journ. Americ. Chem. Soc. **46**. 657; C. **1924**. I. 2677.) Die Herst. des Monogermans, GeH_4 , u. die experimentellen Messungen wurden, wie in der vorigen Mitteilung beschrieben, ausgeführt. Die D. des gasförmigen GeH_4 betrug 3,420 g/l. Zur Best. des F. nahmen Vff. als Kältebad Pentan der Atlantic Refining Co., welches in einem im Original abgebildeten App. fraktioniert dest. werden mußte. F. von GeH_4 ergab sich zu -165° . Die D. des fl. GeH_4 betrug bei -142° 1,523 g/ccm. Beim

Spitzen des GeH_4 in einer Quarzröhre unter 35 mm Druck wurde bei 280° ein Spiegel gebildet, bei 285° schritt die Zers. schnell fort. Bei Zimmertemp. über war auch nach einem Jahr keine merkliche Zers. eingetreten. Der Dampfdruck wurde zwischen -145° u. -90° gemessen, die Dampfdrucktemperaturkurve ist gezeichnet, sie weicht beträchtlich von der von SCHENCK (Rec. trav. chim. Pays-Bas **41**. 569; C. 1923. I. 25) gefundenen ab. Stellt man $\log p$ als Funktion von T graph. dar, so liefern wie bei n. Fl. die Werte der Vf. eine Gerade, die von SCHENCK nicht. Aus der Dampfdruckkurve ergab sich der Kp. zu -90° , während von SCHENCK zu -126° gefunden war. (Journ. Americ. Chem. Soc. **47**. 112—17. Iaca [N. Y.], CORNELL Univ.) JOSEPHY.

Kurt Lindner und Herbert Helwig, Das sogenannte Molybdändibromid und einige seiner Derivate. (Vgl. LINDNER, HALLER u. HELWIG, Ztschr. f. anorg. u. phys. Ch. **130**. 209; C. 1924. I. 28.) Die Darst. von Mo_3Br_6 gelingt durch Bromierung von Mo-Pulver im mit Br beladenen N_2 -Strom bei $600-700^\circ$. Mo_3Br_6 ist in W., wss. Säuren u. Ä., wl. in sd. A., zl. in alkoh. Halogenwasserstoffsäuren. Nach Einw. von 3%ig. KOH-Lsg. entstehen gelbe Lsgg., aus denen durch verd. Flußsäure ein amorphes Hydroxyd $[\text{Mo}_3\text{Br}_4 \cdot 2\text{HO}](\text{OH})_2 \cdot aq$ abgeschieden wird. Aus d. alkal. Lsgg. krystallisiert in Ggw. von NH_4Cl die Verb. $[\text{Mo}_3\text{Br}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}](\text{OH})_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$.

Durch Einw. von NH_3 -Gas auf die alkoh. Lsg. von Mo_3Br_6 in Ggw. des doppelten Vol. Ä. entsteht das Ammin $\text{Mo}_3\text{Br}_6(\text{NH}_3)_3 \cdot 2\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$. Pyridin scheidet a. der sd. alkoh. Mo_3Br_6 -Lsg. ein zweites Ammin ab. $[\text{Mo}_3\text{Br}_6 \cdot \text{C}_5\text{H}_5\text{N}]$ dunkelgelbe Knollen. $(\text{C}_5\text{H}_5\text{N})_3\text{H}_5\text{Mo}_3\text{Br}_{17} \cdot 2\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$, aus der Lsg. von Mo_3Br_6 in alkoh. HBr-Lsg. u. einer Lsg. von $\text{C}_5\text{H}_5\text{N} \cdot \text{HBr}$ in alkoh. HBr-Lsg. — $\text{C}_5\text{H}_5\text{N} \cdot \text{HMo}_3\text{Br}_7$, durch therm. Zerfall der vorigen Verb. bei 140° . — Beim Lösen des amorphen Hydroxyds $[\text{Mo}_3\text{Br}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}](\text{OH})_2 \cdot aq$ in KOH-Lsg. u. Umsetzen dieser Lsg. mit wss. HCl-Lsg. (D. 1,124) entsteht das Chlorid $[\text{Mo}_3\text{Br}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}]\text{Cl}_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$, aus dessen Lsg. in alkoh. HCl-Lsg. beim Umsetzen mit $\text{C}_5\text{H}_5\text{N} \cdot \text{HCl}$ in alkoh. HCl-Lsg. ein Gemenge von 3 Verbb. ausfällt. — $\text{C}_5\text{H}_5\text{N} \cdot \text{HMo}_3\text{Br}_4\text{Cl}_3 \cdot \text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$, rechteckige gelbe Blättchen, durch Umkrystallisieren des Gemenges aus A. — $(\text{C}_5\text{H}_5\text{N})_3\text{H}_3\text{Mo}_3\text{Br}_8\text{Cl}_7 \cdot 3\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ nadelähnliche Krystalle, durch Umkrystallisieren des Gemenges aus alkoh. HCl-Lsg. — $(\text{C}_5\text{H}_5\text{N})_3\text{H}_3\text{Mo}_3\text{Br}_4\text{Cl}_6 \cdot \text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$, Oktaeder, durch Umkrystallisieren des Gemenges aus Lsgg. von $\text{C}_2\text{H}_5\text{N} \cdot \text{HCl}$ in alkoh. HCl-Lsg. — $\text{C}_5\text{H}_5\text{N} \cdot \text{HMo}_3\text{Br}_4\text{Cl}_3$, aus d. beiden vorigen Verbb. durch therm. Abbau bei 140° . (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. **142**. 180—88. Berlin-N u. Oranienburg.) K. LINDNER.

A. Schleicher und W. Schmitz, Über ein hochmolekulares Zwischenprodukt der Zersetzung von $[\text{Pt}(\text{en}_2)]_2$ durch Säuren. (Vgl. SCHLEICHER, HENKEL u. SPIES, Journ. prakt. Ch. **105**. 31; C. 1923. I. 508.) Durch Zusatz von verd. Säuren zu Lsgg. von $[\text{Pt}(\text{en}_2)]_2$ wird zunächst die B. eines swl. Hydrationsproduktes desselben von d. Zus. $[\text{Pt}_2\text{en}_4\text{J} \cdot 12\text{H}_2\text{O}]\text{J} \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ veranlaßt. Gleichzeitig ausgeschiedenes J führt ein erst zur Zers. zu PtJ_2 u. zur B. von Äthylendiaminsulfat. Starke Säuren bewirken dieses sofort. Zur Darst. des entsprechenden Propyldiaminsalzes, $[\text{Pt}(\text{en}_2)]_2$ läßt man das Amin auf PtJ_2 einwirken, es zeigt bei der Zers. durch Säuren ein ähnliches Zwischenprod. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. **142**. 367—72. Jachen, Techn. Hochsch.) ULMANN.

C. Mineralogische und geologische Chemie.

Royer, Über die Orientierung von Ammoniumjodidkrystallen auf dem Muskovit. V. studiert die Einzelheiten der orientierten Ausscheidung von $(\text{NH}_4)\text{J}$ -Krystallen auf den Spaltflächen des Muskovits. RbJ , KJ u. $(\text{NH}_4)\text{J}$ krystallisieren auf frisch gespalteten Glimmerflächen stets in kub. Form u. zwar in einer bestimmten Orien-

tierung zu den Symmetrieelementen des Glimmers. Vf. bereitet eine h. gesätt. L. von $(\text{NH}_4)\text{J}$ u. bringt einen Tropfen auf die Glimmerfläche: die Krystallisation erfolgt infolge der Abkühlung sofort ein. Eine dreizählige Achse der entstehenden Krystalle steht stets senkrecht auf der Spaltfläche des Muskvoits, die drei Spaltflächen parallelen Flächendiagonalen der Würfelflächen sind so orientiert, daß die Richtung der drei Risse annehmen, welche als Schlagfigur auf der Glimmerfläche entstehen. Es entstehen somit kleine dreiseitige Pyramiden, deren Seitenfläche stets parallel der Spur der Symmetrieebene des Glimmers verläuft. Orientiert man die Grundlinie dieser Pyramidenfläche horizontal, so lassen sich zwei Sorten von Pyramiden unterscheiden: solche, deren dritte Ecke der Grundfläche nach oben u. solche, deren dritte Ecke der Grundfläche nach unten steht. Auf völlig frischen Spaltflächen tritt jeweils nur eine Art dieser Pyramiden auf; bei treppenartiger Abblätterung des Glimmers zeigt es sich, daß die beiden Arten der Ausscheidungsorientierung auf den verschiedenen Spaltflächen im Wechsel auftreten. Hieraus folgt, daß der Muskovit nur ein Symmetriezentrum besitzt u. daß die monokline Symmetrie nur durch eine gegenseitige Drehung der Spaltflächen um 180° vorgespiegelt wird. Die Korrosionsfiguren lassen lediglich nicht auf monokline Symmetrie schließen, während das noch feinere Unterscheidungsmerkmal der orientierten Ausscheidung die trikline Symmetrie der Einzelflächen offenbart. (C. r. d. l'Acad. des sciences **179**. 1610—12. 1924.) FRANKENBURGER.

Ja. Ssamoilow und **N. Tschewjakow**, *Über den Allophan aus dem Dorfe Baranowka (Bez. Skopin, Gouv. Rjäsan) und über die Adsorptionsminerale.* D. Zs. des Allophans, der in der Carbonformation vorkommt, ist (Mittel aus 3 Bestst.) SiO_2 21,06; Al_2O_3 34,83; CaO 1,94; CO_2 1,59; lose gebund. CO_2 1,61; organ. Substanzen 0,87; H_2O 38,55. — Das W. wird unter 200° vollständig abgegeben; eine Unstetigkeit bei 100° tritt nicht auf. Die lose gebundene CO_2 entweicht unter 105° . Ihre Menge ist der Menge der fest gebundenen prakt. gleich u. ergibt mit dem vorhandenen CaO die Formel $\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$. Das Vorhandensein des Ca -Bicarbonat in Mineralien ist bisher nicht festgestellt worden, manchmal wurde aber ein höherer CO_2 -Gehalt, als dem CaCO_3 entspräche, beobachtet, so von GLADSTON u. GLADSTON (Philos. Magazine **23**. 461 [1862]), die ein neues Mineral, Hovit, entdeckt zu haben glaubten. Vff. belegen das $\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$ mit diesem Namen. Sie finden Hovit auch in Allophanen anderen Ursprungs (New-Mexico, Stirien). Auch einige Bauxite — aber kein Kaolin — enthalten zu viel CO_2 . — Die Verwitterung von alumosilikat. Grundmasse des Allophans mit dem Hovit ist eine Adsorptionsverwitterung. Sie entsteht bei Niederschlagen der zusammengesetzten Hydrogelen von Al_2O_3 u. SiO_2 . Die Tatsache, daß der Hovit nur in Tonarten mit größerem Al_2O_3 -Gehalt gefunden wird, läßt vermuten, daß es eine u. dieselbe Ursache ist, die die Anreicherung des Al_2O_3 im Nd. u. das Mitreißen des $\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$ bewirkt. (Bull. Acad. St. Pétersbourg [6] **1915**. 197—204.) BIKERMAN.

L. Strekalowa, *Über Barytkrystalle aus der Umgebung von Theodosia.* D. Zs. aus Calcitkonkretionen isolierten, ca. 5 mm großen Krystalle wurden goniometrisch untersucht: $a : b : c = 0,8145 : 1 : 1,3120$. (Bull. Acad. St. Pétersbourg [6] **1915**. 227—32. Petersburg, Frauenhochschule.) BIKERMAN.

W. Wernadski, *Bemerkungen über die Verteilung der chemischen Elemente in der Erdkruste.* VI. (V. vgl. Bull. Acad. Sc. Pétersbourg [6] **1911**. 1007; C. **1912**. II. 1959.) Es wird die Verteilung des Rb unter die Hydro- u. Lithosphäre auf Grund der vorliegenden Analysen besprochen. Während die Lithosphäre u. das Wasser der Flüsse nur Spuren von Rb enthalten, beträgt das Verhältnis des Rb zu K im Meerwasser 4,2:100. Die Anreicherung des Rb im W. der Ozeane kann nicht darauf zurückgeführt werden, daß es dem W. in geringeren Mengen entzogen wird; der Gehalt des Meerschlamms an Rb ist nicht verschwindend klein. Außerdem

nte die in Ozeanen befindliche M. des Rb nur während einer Zeitspanne gebildet
e, die auch im geolog. Maßstabe zu groß ist: so gering ist die Zufuhr des Rb
Flüssen. Eine der Ursachen ist wohl die größere Löslichkeit der Rb-Salze im
gleich mit den K-Salzen, die die Abscheidung von Rb-Verbb. aus den Meeren
Austrocknung verhinderte. — Wie gering auch das Verhältnis Rb:K in
steinen ist, es ist dennoch größer, als im W. der Flüsse. Alle Orthoklase, Biotite,
eite enthalten Rb, noch mehr die jüngsten vulkan. Gesteine. (Bull. Acad. Sc.
Petersbourg [6] 1914. 951—66.) BIKERMAN.

W. Wernadski, *Materialien zur Spektroskopie der Erdkruste*. I. Allgemeine
achtungen über die Aufgaben u. Ansichten der spektroskop. Unters. der Erd-
ste. (Bull. Acad. Sc. Pétersbourg [6] 1914. 989—1008.) BIKERMAN.

W. Wernadski und **B. Lindener**, *Materialien zur Spektroskopie der Erdkruste*.
(I. vgl. vorst. Ref.) Es wurden die Spektren (in Flammen) von 77 Glimmer-
phen photograph. aufgenommen u. auf Vorkommen der Li, Na, K, Rb, Cs, Tl,
Ga, Ca, Ba, Sr, Mn, Fe, Zn, Cu u. Cr untersucht. Rb wurde in fast allen
phen gefunden, namentlich in *Lepidoliten* u. *Zinnwalditen*. Diese beiden Mineralien
halten auch fast ausnahmslos Cs u. Tl. Die übrigen Glimmer weisen nur
schwache oder keine Cs- u. Tl-Linien auf. Ga scheint nur in wenigen Glimmer-
phen vorzuliegen. — Die ausführliche Tabelle des Originals kann nicht wieder-
geben werden. (Bull. Acad. Sc. Pétersbourg [6] 1915. 27—32.) BIKERMAN.

Rudolf Vogel, *Über die Struktur der Eisen-Nickelmeteoriten*. Vf. weist nach,
ß zwischen der Struktur des synthet. u. meteor. *Nickeleisens* kein wesentlicher
Unterschied besteht. Fe-Ni-Meteorite sind hauptsächlich aus zwei Strukturelementen,
da *Kamazit* (4,85—7,16% Ni) u. dem *Taenit* (13,02—35,5% Ni), in wechselnden
Angelegen u. in verschiedener Anordnung zusammengesetzt. Die Unterss. des Vf. er-
strecken sich auf den Verlauf der δ - γ -Umwandlung des Fe in den Fe-Ni-Misch-
kristallen, zwecks Vervollständigung des Systems Fe-Ni. Das durch Aufnehmen
Abkühlungs- u. Erhitzungskurven zwischen 1300 u. 1600° erhaltene Diagramm
verschiedener Legierungen zeigt, daß bei der Krystallisation von Fe-Ni-Schmelzen
folge der δ - γ -Umwandlung zwei dem Kamazit u. dem Taenit entsprechende Misch-
kristalle mit ca. 6 u. 30% Ni entstehen müssen. (Die Veränderlichkeit der Ni-
Gehalte ist auf die B. übersättigter Mischkristalle zurückzuführen.) Die durch die
 δ -Umwandlung hervorgerufene Mischungslücke schließt sich wieder bei sinkender
Temp., ihr Umfang ist mit der Geschwindigkeit der Krystallisation veränderlich.
Bei schneller Abkühlung bleibt die Heterogenität des Gefüges bestehen. Die durch
Unterkuhlungserscheinungen hervorgerufenen Unregelmäßigkeiten in der Krystalli-
sation werden auch durch kleine Beimengungen von Co u. P bewirkt. Hier, wie
auch bei Berührung der Schmelze mit einer leichtflüssigen Schlacke, gelang es Vf.
Geguli zu erhalten, welche aus einem einzigen Dendriten bestanden.

Unterss. der durch Ätzung mit 3% HNO₃ erhaltenen Strukturbilder führt Vf.
zur Unterscheidung von „Krystallisationsfiguren“, welche dendrit. Wachstumsgebilde
mit 2 oder 3 Wachstumsrichtungen sind, u. von „Umwandlungsfiguren“, welche im
Bereich der δ - γ -Mischkristalle auftreten u. aus nadeligen oder stäbchenförmigen
Krystallen bestehen. — Die Körnung des Kamazit weist Vf. an synthet. Nickeleisen
auf Rekristallisationseffekt nach, der seine Ursache vermutlich in einer Über-
beanspruchung des Materials oder in der verschiedenen Wärmeausdehnung der beiden
Strukturelemente hat. Verss. zeigen, daß eine längere Zeit auf 1000° erhitzte Ni-arme
Legierung, nach vorhergehendem stärkeren Hervortreten der Umwandlungsfiguren,
unter Ausbildung von gleichartigen Krystallpolyedern homogen wird u. die Um-
wandlungsfiguren völlig verschwinden. Bedeutend schwerer gelingt die Homo-
genisierung bei steigendem Ni-Gehalt. Sie hängt auch sehr von der feineren oder
grobere Ausbildung des Taenit ab u. geht in letzterem Falle viel langsamer vor


sich. Taenitärmere u. taenitreichere Stellen verhalten sich wie Ni-ärmere (12% Ni) u. Ni-reichere (28% Ni) synthet. Legierungen. — Die Änderung des elektr. Widerstandes, sowie die magnet. Umwandlung u. Längenänderungen von Ni-Fe-Legierungen mit der Temp. bringt Vf. in Zusammenhang mit der heterogenen oder homogenen Struktur des betreffenden Materials.

Die verschiedenen Untersuchungsergebnisse dienen Vf. als Grund zur Erklärung der B. von meteor. Struktur. Zwischen den unterschiedenen drei typ. Gefügestrukturen existieren mannigfaltige Übergänge, welche von den verschiedenen Einflüssen abhängen. Das Krystallisationsgefüge: unterhalb 1400 bzw. 1455° stabil, gek. durch Umhüllungen des Kamazit durch den Taenit; das δ - γ -Umwandlungsgefüge: wird zwischen 1400 u. 1455° instabil, gek. durch orientierte Ni-reiche Lamellen oder Nadeln im Kamazit u. Fe-reichere Lamellen im Taenit; das homogene körnige Gefüge: unterhalb 1400° stabil, der Ni-Gehalt der ursprünglich verschieden zusammengesetzten Strukturelemente hat sich ausgeglichen, die Figuren sind verschwunden. — Die Widmannstätten'schen Figuren sind wohl durchweg als „Krystallisationsfiguren“ anzusprechen. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. **142**. 193—222 Göttingen, Univ.)


ULMANN.

D. Organische Chemie.

Dussol, *Elektrolytische Darstellung von Hexabromäthan*. (Vgl. S. 1287.) 10 KBr + 300 ccm mit Acetylen gesätt. W. werden bei 22° 7 Stdn. lang mit 0,5 Amper. elektrolysiert, indem durch das Gefäß ein C_2H_2 -Strom (30 Blasen pro Min.) durchgeht. Größe der Pt-Anode 4×3 cm, der Kathode $2 \times 2,5$ cm; letztere ist vor einem porösen Gefäß mit durchlöcherter Boden umgeben. Als Reaktionsprodukte wurden isoliert: s. *Tetrabromäthan*, $CHBr_2 \cdot CHBr_2$, fl., ab 190° infolge Zers. (Bromabspaltung) dunkel werdend, u. *Hexabromäthan* C_2Br_6 , aus Ä. weiße, campherartig riechende Krystalle, bei 160—170° sublimierend, bei 210—215° vollständige Zersetzung unter Br-Entw. — Das Tetrabromderiv. bildet sich durch Addition von Br an C_2H_2 , während die B. des Hexabromids nach folgenden Gleichungen stattfindet:



Eine B. des Hexabromids aus dem Tetrabromid nach:




findet, wie besondere Verss. ergeben haben, nicht statt. — Wird ein Elektrolyt verwandt, der außer KBr noch freies Br enthält, so wird fast nur $C_2H_2Br_4$ gebildet. Bei Ggw. von überschüssigem KOH sinkt die Ausbeute an Hexabromid, da frei gewordenes Br sich mit KOH umsetzt. Zugabe von Na_2CO_3 u. Durchleiten von CO_2 vermindert die Ausbeute. $K_2Cr_2O_7$ ist ohne Einfluß. (Bull. Soc. Chim. de France [4] **37**. 161—67. Toulouse, Fac. des Sc.)

HABERLAND

W. Tschelinzew, *Über die höheren Valenzen der Oniumverbindungen*. (Vgl. Bull. Soc. Chim. de France [4] **35**. 741; C. **1924**. II. 1468.) Als Ergänzung der l. c. beschriebenen Verss. mit Sauerstoffverb. wurden jetzt *Thionium-* u. *Ammoniumverb.* untersucht, indem die Additionswärme von C_2H_5OMgJ u. Mercaptanen Thioäthern, primären, sek. u. tert. Aminen ermittelt wurden (in Bzl.-Lsg.). Die therm. Wrkg. bei B. der Thioniumverb. ist gering. Beim Zugeben von 1, 2 u. 3 Mol. C_3H_7SH bzw. $i-C_5H_{11}SH$ zu C_2H_5OMgJ werden entwickelt: 2,60 Cal. u. 0,59 Cal. u. 0 Cal. mit 1—3 Mol. des erstgenannten Mercaptans, 2,22 Cal., 0,43 u. 0 Cal. bei $C_5H_{11}SH$. Noch geringer ist die Wärmeentw. bei den aus $(C_3H_7)_2S$ u. $(i-C_5H_{11})_2S$ u. C_2H_5OMgJ gebildeten Komplexen; hier war eine Wärmeentw. überhaupt nicht feststellbar. Die Mercaptane werden aus den Komplexen durch $AlCl_3$ vollständig verdrängt. — Von Aminen wurden folgende untersucht: $i-C_4H_9NH_2$, $i-C_5H_{11}NH_2$, $(i-C_4H_9)_2NH$, $(i-C_5H_{11})_2NH$, $(C_3H_7)_3N$ u. $(i-C_5H_{11})_3N$; die Additionswärmen

(mit Ausnahme der letzten beiden) bei Zugabe von 1, 2 u. 3 Mol. beträchtlich, war bei den primären Aminen größer als bei den anderen; sie ist größer als bei den Oxoniumverbindungen. Bei den aus den primären u. sek. Aminen gebildeten Komplexen wird nur das 3. Mol. des Komplexes durch A. verdrängt, es entstehen sich wahrscheinlich gemischte Komplexe wie: $C_2H_5OMgJ \cdot 2C_4H_9NH_2 \cdot C_2H_5OH$ u. $C_2H_5OMgJ \cdot 2(C_4H_9)_2NH \cdot C_2H_5OH$. Die Tatsache, daß die therm. Wrkg. bei der Komplexbildung sich ausdrücken läßt durch die Reihenfolge Ammonium > Oxonium > Thionium, ist wahrscheinlich auf den mehr oder weniger ausgesprochenen Charakter der entsprechenden Wasserstoffverb. (NH_3 , H_2O u. H_2S) zurückzuführen. (Bull. Soc. Chim. de France [4] 37. 176–81.) HABERLAND.

W. Tschelinzew, Über die Spannung höherer Valenzen und ihre Bedeutung für die Assimilation, die Katalyse und andere chemische Prozesse. (Vgl. vorst. Ref.) Bei der Ermittlung der Additionswärme organ. Verb. mit $ROMgJ$ hat sich ergeben, daß vor allen Dingen sauerstoffhaltige Verb., infolge Betätigung höherer Valenzen des Sauerstoffs, Komplexe zu bilden vermögen. Aus den experimentellen Verss. ergibt sich für die Fähigkeit zur Komplexbildung bei sauerstoffhaltigen organ. Verb. folgende Reihenfolge: Aldehyde > Ketone > Ester > Säuren > Alkohole > Äther. Die Fähigkeit zur B. von Komplexverb. veranlaßt Vf. folgende Ansicht über die B. von Assimilationsprodd. zu äußern: 2 Mol. H_2CO_3 (I) kondensieren sich zu der Peroxydverb. III, die unter Abgabe von O in IV übergeht, woraus durch Abspaltung von H_2O Oxalsäure (V) entsteht. Diese bildet mit einem weiteren Mol. H_2CO_3 die Komplexverb. VI, die in Mesoxalsäure (VII) übergeht. Nach Abspaltung von CO_2 geht VII in Glyoxylsäure, durch erneute Kondensation mit H_2CO_3 in Tartronsäure über. Aus letzterer bildet sich durch CO_2 -Abspaltung Meserinsäure usw. bis zu Hexonsäuren u. Hexosen. — Die Veresterung kann man auf Grund der Tatsache, daß in organ. Säuren vor allen Dingen der Carbonylsauerstoff der $COOH$ -Gruppe höhere Valenzen betätigt, durch die Formeln VIII–X darstellen. Die katalyt. Wrkg. von HCl bei der Veresterung erklärt Vf. damit, daß organ. Säure + HCl den Komplex XI bzw. XII bilden, woraus leicht die reaktionsfähige Gruppierung XIII entsteht. Bei Benutzung von H_2SO_4 als Katalysator bildet der aus dem Alkohol u. H_2SO_4 entstehende Ester mit der organ. Säure den Komplex XIV, woraus über XV der Ester XVI entsteht.



Bei den Alkoholen ROH u. den Äthern ROR' zeigt sich eine nicht so starke Wrkg. der höheren Sauerstoffvalenzen, wie z. B. bei den Ketonen. Vf. führt dies auf den Einfluß der direkt mit O verbundenen Radikale zurück. Von Alkoholen

u. Phenolen zeigen primäre Alkohole (der Fettreihe) die stärkste Betätigung höhere Sauerstoffvalenz, dann folgen die sek. u. tert. Alkohole; für die Phenole ergibt sich die Reihe $p\text{-Hal}\cdot\text{C}_6\text{H}_4 > \text{C}_6\text{H}_5 > o\text{- u. m-Hal}\cdot\text{C}_6\text{H}_4 > \beta\text{-C}_{10}\text{H}_7 > \alpha\text{-C}_{10}\text{H}_7$. Mit dieser Reihenfolge hängt wahrscheinlich auch die verschiedenen große Esterifizierungsgeschwindigkeit der Alkohole zusammen. (Bull. Soc. Chim. de France [4] 37. 18 bis 187. Saratow, Univ.)

HABERLAND.



H. Staudinger und **M. Lüthy**, *Hochpolymere Verbindungen. III. Über die Konstitution der Polyoxymethylene.* (I. u. II. vgl. STAUDINGER, Ber. Dtsch. Chem. Ges. 53. 1073; C. 1920. III. 230 u. STAUDINGER u. RHEINER, Helv. chim. Acta 7. 23; C. 1924. I. 1780.) Von Polymerisationsprodd. des CH_2O sind bekannt: das Trioxymethylen von PRATESI (Gazz. chim. ital. 14. 139 [1884]), der durch Eindampfen wss. CH_2O -Lsgg. erhältliche, ll. u. noch wasserhaltige Paraformaldehyd (besser als Polyoxymethylenhydrate bezeichnet), schließlich mehrere wasserarme oder wasserfreie, wl. oder unl. *Polyoxymethylene* (I), z. B. die 4 mit α , β , γ u. δ bezeichneten Formen von AUERBACH u. BARSCHALL (Arbb. Kais. Gesundh.-Amt 27. 183 [1907]). Wenn die von STAUDINGER (l. c.) geäußerte Vermutung, daß in I viele CH_2O -Mol. zu einer langen Kette, $\dots \text{CH}_2\cdot\text{O}\cdot[\text{CH}_2\cdot\text{O}]_x\cdot\text{CH}_2\cdot\text{O} \dots$, verbunden seien, zutrifft, so mußten sich mit geeigneten Reagenzien Spaltstücke mit einer größeren Anzahl von CH_2O -Mol. gewinnen lassen. Dies ist auch der Fall.

Einw. von Acetanhydrid auf I. Zunächst wurden die Angaben von DESCUDÉ (Ann. Chim. et Phys. [7] 29. 502 [1903]) bestätigt, daß aus mol. Menge I u. Acetanhydrid außer unverändertem letzteren *Methylendiaceetat* (Kp. 164—165°) u. *Diooxymethylendiaceetat* (Kp. 200—202°) entstehen, wenn man 24 Stdn. auf 125—130° erhitzt. H_2SO_4 oder ZnCl_2 beschleunigen die Rk. — Darauf wurden die Mengen Acetanhydrid systemat. verringert bis zu 1 Mol. auf 100 Mol. CH_2O . Zu den Vers. wurden getrockneter käuflicher Paraformaldehyd, der besonders reaktionsfähig ist, oder die verschiedenen Formen von I benutzt, von denen γ u. δ träger als α u. β reagieren. Man muß im Rohr erhitzen, u. zwar um so länger u. höher, je mehr I man verwendet, schließlich bis auf dessen F. (170°). Mit steigender Menge CH_2O wächst auch die Menge der gebildeten festen, wl. bis unl., also hochmol. *Polyoxymethylendiaceetate*, $\text{CH}_3\cdot\text{CO}\cdot\text{O}\cdot\text{CH}_2\cdot\text{O}\cdot[\text{CH}_2\cdot\text{O}]_x\cdot\text{CH}_2\cdot\text{O}\cdot\text{CO}\cdot\text{CH}_3$ (II), bis bei 1 : 10 ca. $\frac{2}{3}$ des Rk.-Prod. unl. sind. Gleichzeitig nähert sich der F. der Prodd. immer mehr dem von I. Alle diese Prodd. enthalten jedoch chem. gebundene Essigsäure u. geben beim Erhitzen im Vakuum — zum Unterschied von I — *Tetraoxymethylene* (nachst. Ref.). — Besonders instruktiv verlief der Vers. in den Mengenverhältnissen 1 : 5 (160°, 30 Stdn.). Die Aufarbeitung, die sich der genauen Wiedergabe an diese Stelle entzieht, erfolgte auf Grund der verschiedenen Löslichkeit in Ä., dann Essigester. Ganz unl. blieben 7,4% (mit mehr als 17 Mol. CH_2O); aus der Essigesterlsg. wurden 9,5% (mit 13—17 Mol. CH_2O), aus der Ä.-Lsg. durch Abkühlen 8,9% (mit 9—12 Mol. CH_2O) u. aus der Mutterlauge 74,5% (mit 1—8 Mol. CH_2O) gewonnen. Aus dem letzten Anteil können die Prodd. mit 1—5 Mol. CH_2O im Hochvakuum herausdest. werden. Rein erhalten wurden folgende Prodd.: *Trioxymethylendiaceetat*, $\text{C}_7\text{H}_{12}\text{O}_6$, Kp.₂ 113—115°. — *Tetraoxymethylendiaceetat*, $\text{C}_8\text{H}_{14}\text{O}_7$, Kp.₂ 132—134°. — *Pentaoxymethylendiaceetat*, $\text{C}_9\text{H}_{16}\text{O}_8$, Kp._{0,4} 160—165°. Wird in Kältemischung fest. — Die Prodd. mit 1—6 Mol. CH_2O sind mit Ä. mischbar. — *Heptaoxymethylendiaceetat*, $\text{C}_{11}\text{H}_{20}\text{O}_{10}$, Kp._{0,3} 180—190°, F. ca. 15°. — *Octaoxymethylendiaceetat*, $\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}$, F. 27,5—28,5°. — *Nona oxymethylendiaceetat*, $\text{C}_{13}\text{H}_{24}\text{O}_{12}$, F. 50—51° bzw. 46—48°. — *Undekaoxymethylendiaceetat*, $\text{C}_{15}\text{H}_{28}\text{O}_{14}$, F. 64—65°. — *Dodekaoxymethylendiaceetat*, $\text{C}_{16}\text{H}_{30}\text{O}_{15}$, F. 66—67°. — Die Prodd. mit 7—12 Mol. CH_2O sind in Ä. sl. bis wl. sonst ll. außer in PAe. — *Heptadekaoxymethylendiaceetat*, $\text{C}_{21}\text{H}_{40}\text{O}_{20}$, F. 103—107° bzw. 105—107°, l. in h. Essigester, Chlf., unl. in Ä., PAe. — *Polyoxymethylendiaceetate* (II) bis $\text{C}_{24}\text{H}_{46}\text{O}_{23}$, F. 120° bzw. 125—128°, unl. — Es könnte eingewende


den, daß alle diese Acetate durch Einlagern von CH_2O in prim. gebildetes Hylandiacetat oder Dioxymethylendiacetat entstanden seien, denn man erhält aus en durch Erhitzen mit 3—4 Mol. **I** ein gleichartiges Rk.-Prod. wie aus Acetanhydrid u. 5 Mol. **I**. Da die Umsetzung aber langsamer erfolgt, so ist es wahrscheinlicher, daß die niederen Acetate prim. in CH_2O u. Acetanhydrid zerfallen. — Existenz von **II** zeigt die Beständigkeit langer CH_2O -Ketten, die demnach auch selbst anzunehmen sind. **I** muß, wenn man es als Endglied der Diacetatreihe zieht u. seinen hohen F. berücksichtigt, sehr hochmol. sein.

Einw. von Säurechloriden auf **I**. Die Erfahrungen früherer Bearbeiter bestätigen, daß CH_3COCl nur langsam, CH_3COBr aber lebhaft (auch ohne ZnCl_2) auf **I** einwirkt u. bei Verwendung mol. Mengen hauptsächlich *Brommethylendibenzoat* (**III**) entsteht. Steigert man aber die Menge von **I**, z. B. im Verhältnis 1 : 4 erhitzt 3 Stdn. auf 150° , so erhält man CH_2O -reichere Prodd., u. zwar viel fl., Ä. l. neben wenig festen, unl.; in ersteren wurden Deriv. mit ca. 5 Mol. CH_2O abgewiesen, letztere sind wieder sehr CH_2O -reich. Auch hier können aus **III** u. CH_2O -reichere Prodd. gewonnen werden. — Mol. Mengen **I** u. $\text{C}_6\text{H}_5\text{COCl}$ reagieren in Ggw. von ZnCl_2 lebhaft miteinander, u. es bilden sich, wie schon DESCUDÉ (1890) gefunden hatte, Prodd. mit 1 Mol. CH_2O , nämlich *Chlormethyläther*, *Chlormethylbenzoat*, $\text{Cl}\cdot\text{CH}_2\cdot\text{O}\cdot\text{CO}\cdot\text{C}_6\text{H}_5$ (**IV**), Kp._{13} $112\text{--}114^\circ$, u. *Methylendibenzoat*, $\text{C}_6\text{H}_5\cdot\text{O}\cdot\text{CH}_2\cdot\text{O}\cdot\text{CO}\cdot\text{C}_6\text{H}_5$ (**V**), aus A., F. 99° . Aufarbeitung des Rk.-Prod. — auch den folgenden Verss. — durch Dest. im Hochvakuum. — Auch ohne ZnCl_2 erfolgt Umsetzung, allerdings viel langsamer, da erst nach 2-tägigem Erhitzen (Wasserbad) Lsg. eintritt. Es entstehen außer Chlormethyläther nur Prodd. mit 2 Mol. CH_2O : 1. *Dioxymethylenchlorbenzoat*, $\text{Cl}\cdot\text{CH}_2\cdot\text{O}\cdot\text{CH}_2\cdot\text{O}\cdot\text{CO}\cdot\text{C}_6\text{H}_5$ (**VI**). Krystalle aus PAe., F. 32° , ll. Zerfällt mit ZnCl_2 (Wasserbad) in CH_2O , **IV** u. **V**. Bildet sich leicht aus mol. Mengen **IV** u. **I** (140° , 6 Stdn.), muß also aus der Spaltung der CH_2O -Kette von **I** hervorgegangen sein. 2. *Dioxymethylendibenzoat*, $\text{C}_6\text{H}_5\cdot\text{CO}\cdot\text{O}\cdot\text{CH}_2\cdot\text{O}\cdot\text{CH}_2\cdot\text{O}\cdot\text{CO}\cdot\text{C}_6\text{H}_5$ (**VII**). Nadeln aus PAe., F. 46° , ll. Zerfällt mit ZnCl_2 quantitativ in CH_2O u. **V**. — Aus der Zers. von **VI** u. **VII** durch ZnCl_2 erklärt sich der Verlauf des obigen Descudéschen Vers. — Erhitzt man 1 Mol. $\text{C}_6\text{H}_5\text{COCl}$ mit 2 Mol. **I** auf $140\text{--}150^\circ$, so hat sich in ca. 1 Stde. alles gel. Man erhält außer Chlormethyläther wieder **VI** u. **VII**, hauptsächlich letzteres. CH_2O -reichere Prodd. können nicht isoliert werden, da sie offenbar zerfallen, wie die reichliche CH_2O -Entspaltung am Schluß der Dest. zeigt. Ebenso ist der Verlauf mit 3 Mol. **I**. In Ggw. von ZnCl_2 entstehen bei allen Verss. wieder die Prodd. mit 1 Mol. CH_2O . Erhitzt man 1 Mol. $\text{C}_6\text{H}_5\text{COCl}$ mit 2 Mol. **I** bei Zimmertemp., so ist auch nach 7 Tagen noch der größere Teil ungel. Als einziges Rk.-Prod. hat sich außer wenig Chlormethyläther **VII** gebildet. — Bemerkenswert ist noch, daß durch Einleiten von CH_2O -Gas in CH_3COCl oder $\text{C}_6\text{H}_5\text{COCl}$ sofort Polymerisation zu **I** erfolgt, ohne daß sich Rk.-Prodd. bilden. — Das ständige Auftreten der Prodd. mit 2 Mol. CH_2O könnte als Stütze für die Auffassung von HANTZSCH u. OECHSLIN (Ber. Dtsch. Chem. Ges. **40**. 4341 [1907]) dienen, daß **I** ein dimerer CH_2O zugrunde liegt. Sie ist aber unhaltbar, da mit den Acetylhalogeniden u. Acetanhydrid ganz andere Prodd. entstehen u. o-Chlorbenzoylchlorid nur *Methylendichlorbenzoat* liefert.

Einw. organ. Säuren auf **I**. Die Angaben von GRASSI u. MASELLI (Gazz. chim. ital. **28**. 477 [1898]) über die Einw. von Eg. auf **I** sind nicht ganz zutreffend. Erhitzt man 1 Mol. **I** mit 2 Mol. Eg., so tritt bald Lsg. ein, u. bei der Dest. geht die Hauptmenge bei $101\text{--}110^\circ$ über. Das Destillat zers. sich beim Abkühlen unter Ausscheidung einer weißen M., eines Gemisches von *Polyoxymethylenhydratacetaten* (**III**), deren B. aus prim. *Oxymethylenacetat* vielleicht in folgender Weise zu erklären ist:



Das Prod. läßt sich durch Essigester weiter zerlegen. Der l. Anteil schm. 107—110°, hat die Zus. $21\text{CH}_2\text{O}$, $\text{C}_2\text{H}_4\text{O}_2$, $\frac{1}{2}\text{H}_2\text{O}$ u. kann mit h. Chlf. in eine Teil von fast derselben Zus. u. einen unl. Teil mit mehr CH_2O u. weniger $\text{C}_2\text{H}_4\text{O}_2$ gespalten werden. Der unl. Anteil zers. sich bei 140—145° unter Verlust CH_2O , hat die Zus. $65\text{CH}_2\text{O}$, $\text{C}_2\text{H}_4\text{O}_2$, H_2O u. liefert beim Erhitzen im Vakuum zum Unterschied von den Diacetaten II — kein Tetraoxymethylen. — Mit H.C. wurde ein Rk.-Prod. vom Kp. 89—110° erhalten, das nur wenig feste Verbb. scheidet. Die Prodd. mit Propion- u. Buttersäure sd. höher u. spalten dabei CH ab. — Die Abscheidung von VIII aus Oxy-methylenacetat erinnert an die B. Paraformaldehyd (Polyoxymethylenhydrate) beim Eindampfen der wss. Lsg. Die Vorgang wäre also wie folgt zu formulieren:





Über α -, β -, γ - u. δ -Polyoxymethylen. (Mitbearbeitet von Johner.) V diesen 4 von AUERBACH u. BARSCHALL (l. c.) dargestellten Modifikationen von I — verglichen an den Rkk. mit Acetanhydrid bezw. Eg. — die α -Form die reaktionsfähigste, etwa wie Paraformaldehyd, die δ -Form die reaktionsträgstste. Auch Gaszustand zeigen sich Unterschiede; die α -Form dissoziiert völlig, die γ -Form gibt Mol.-Geww. zwischen 34 u. 40, die δ -Form 61,2; bei letzterer bleibt stets (selbst bei 250°) ein geringer nicht flüchtiger Rückstand, der den zu hohen Wert vor allem verschuldet. — Die α - u. β -Form sind fast reine CH_2O -Polymerisate mit ca. 99% CH_2O . Der für die Darst. der γ -Form notwendige CH_3OH wirkt nicht katalytisch (AUERBACH u. BARSCHALL), sondern beteiligt sich an der Rk., die γ -Form stellt sich sehr hochmol. *Polyoxymethylenmethylläther*, $\text{HO}\cdot\text{CH}_2\cdot\text{O}\cdot[\text{CH}_2\cdot\text{O}]_x\cdot\text{CH}_2\cdot\text{OCH}_3$ oder $\text{CH}_3\cdot\text{O}\cdot\text{CH}_2\cdot\text{O}\cdot[\text{CH}_2\cdot\text{O}]_x\cdot\text{CH}_2\cdot\text{OCH}_3$, dar; der CH_3OH -Gehalt wurde einwandfrei nachgewiesen, in geringerer Menge auch in der δ -Form. — Bei der Darst. der δ -Form nach AUERBACH u. BARSCHALL erhielten Vf. aus der h. Na_2SO_3 -Lsg. bei Erkalten einen flockigen Nd., in dem ein Gemisch von *Polyoxymethylenmethylläthern* vorliegt. Mit PAe. oder Lg. wurden daraus Verbb. mit den FF. 51—52°, 72°, 78—80°, 87—88° gewonnen, die wahrscheinlich 5—15 Mol. CH_2O enthalten. Untersucht wurde bisher nur der *Dodekaoxymethylenmethylläther*, $\text{CH}_3\cdot\text{O}\cdot[\text{CH}_2\cdot\text{O}]_{12}\cdot\text{CH}_3$, aus Lg. oder W., F. 78—80°. In k. A. unverändert l. Nach dem Kochen mit A. oder verd. HCl ist abgespaltenes CH_2O nachweisbar. Diese polymeren Prodd. können nur durch Abbau der CH_2O -Kette entstanden sein, denn beim Kochen einer CH_2O -Lsg. mit Na_2SO_3 bildet sich wohl CH_3OH , aber kein höhermol. Prod. (Helv. chim. Acta 8. 41—64.)

LINDENBAUM.

H. Staudinger und M. Lüthy, *Hochpolymere Verbindungen*. IV. Über Tri- und Tetraoxymethylen. (III. vgl. vorst. Ref.) Das Trioxymethylen wird durch Erhitzen von Paraformaldehyd oder α -, β - oder γ -(CH_2O)_x u. Einleiten des gebildeten CH_2O -Gases in W. gewonnen. Aus δ -(CH_2O)_x kann es nicht erhalten werden, u. auch die Darst. aus den β - u. γ -Formen mißlingt häufig infolge unbekannter Einflüsse. Sicher ist jedoch, daß W. zu seiner B. notwendig ist. Kühlt man die aus feuchtem (CH_2O)_x gebildeten CH_2O -Dämpfe auf —80° ab, so entsteht nur so lange (CH_2O)₃, als noch Feuchtigkeit zugegen ist, andernfalls kondensiert sich nur (CH_2O)_x. Beim Einleiten des trockenen Gases in Eiswasser tritt sofort wieder (CH_2O)₃ auf, auch wenn man das Gas zuvor ein auf 200—250° erhitztes Rohr passieren läßt, so daß die Möglichkeit einer Vorbildung von (CH_2O)₃ völlig ausgeschlossen ist. — Vf. haben noch ein weiteres molekulardisperses Polymeres des CH_2O aufgefunden, das Tetraoxymethylen (CH_2O)₄. Es sublimiert über, wenn man die hochmol. Polyoxymethylen-diacetate (vorst. Ref.) im Vakuum auf ca. 150° erhitzt, bildet sich aber weder aus den niedermol. Diacetaten noch aus Polyoxymethylenacetaten oder (CH_2O)_x. Die hochmol.

acetate müssen demnach einen der B. von $(\text{CH}_2\text{O})_4$ entsprechenden Bau besitzen. $(\text{CH}_2\text{O})_4$ sublimiert im Vakuum in langen Nadeln, schm. (aus CS_2) bei 112° , II., auch in W., u. beständig bei 200° (DD.-Best. in p-Toluidindampf). Da $(\text{H}_2\text{O})_3$ u. $(\text{CH}_2\text{O})_4$ keine Aldehydrkk. zeigen, so müssen ihnen die Formeln I. u. II.




teilt werden. In der Tat ist II. (Achtring) unbeständiger als I. (Sechsring), indem ein wss. Lsg. schon bei 60° merklich in CH_2O zerfällt, I. jedoch erst bei längerem Erhitzen auf 100° . Es ist wahrscheinlich, daß Paraldehyd u. Metaldehyd sich in analoger Weise unterscheiden. (Helv. chim. Acta 8. 65—67.) LINDENBAUM.

H. Staudinger, *Hochpolymere Verbindungen. V. Über die Konstitution der Polyoxymethylene und anderer hochpolymerer Verbindungen.* (IV. vgl. vorst. Ref.) Als Grundkörper der Verbb. der $(\text{CH}_2\text{O})_x$ -Reihe kann das Polyoxymethylenhydrat oder besser Polyoxymethylenendiol, $\text{HO} \cdot \text{CH}_2 \cdot \text{O} \cdot [\text{CH}_2 \cdot \text{O}]_x \cdot \text{CH}_2 \cdot \text{OH}$, angesehen werden. Man hält für $(\text{CH}_2\text{O})_x$ die Kettenformel bei, $-\text{CH}_2 \cdot \text{O} \cdot [\text{CH}_2 \cdot \text{O}]_x \cdot \text{CH}_2 \cdot \text{O}-$, so würden sich an den Enden freie Valenzen ergeben, aber man darf annehmen, daß diese bei der Größe des Mol. völlig in den Hintergrund treten. — Mit den Verhältnissen in der $(\text{CH}_2\text{O})_x$ -Reihe vergleichbar sind z. B. die bei S, As u. P, die in Molekelarten auftreten. Krystallisierter S, gelbes As u. gelber P, die sich wie $(\text{H}_2\text{O})_3$ u. $(\text{CH}_2\text{O})_4$ molekulardispers lösen, sind niedermol. Polymerisate des S_2 , As_2 u. P_2 , amorpher S, graues As u. roter P hochmol. Formen, die nicht unzers. u. flüchtig sind. Die verschiedenen Erscheinungsformen des $(\text{CH}_2\text{O})_x$ entsprechen wahrscheinlich wie beim roten P u. grauen As den verschiedenen Bildungsformen (OHLSCHÜTTER). — Für die Moll. der hohen Polymerisate hat Vf. die Bezeichnung Makromolekel eingeführt. Bei solchen Moll. ist Krystallisation um so eher zu erwarten, je einfacher die einzelnen Bausteine sind, wie dies beim $(\text{CH}_2\text{O})_x$ der Fall ist. — Die Ergebnisse der Unterss. in der $(\text{CH}_2\text{O})_x$ -Reihe erlauben Rückschlüsse auf die Konst. anderer hochpolymerer organ. Substanzen. (Helv. chim. Acta 8. 67—70. Zürich, Techn. Hochsch.) LINDENBAUM.

André Dubosc, *Synthetischer Acetaldehyd, Aceton und Pinakon.* Kurzer Überblick über die vom Acetylen ausgehende Herst. dieser Stoffe, die aus 2,5 kg CaC_2 etwa 1 kg Pinakon zu gewinnen gestattet. (La Parfumerie moderne 18. 6—7.) HE.

Erich Schmidt und Alfons Ascherl, *Synthese von α -Oxyketonen.* I. Die $\text{C}(\text{Cl})(\text{NO}_2)$ -Gruppe wird durch katalyt. Red. in die $>\text{CO}$ -Gruppe nach dem Schema $>\text{C}(\text{Cl})(\text{NO}_2) + 6\text{H} = >\text{CO} + \text{NH}_4\text{Cl} + \text{H}_2\text{O}$ übergeführt, so daß diese zu einer Synthese von α -Oxyketonen (I—III) dienen kann. Auf Grund der Mol.-Refr. sind die Formeln I—III anzunehmen.



Verss.: Die Oxyketone werden aus der Chlornitroverb. in W. mit 5%ig. wässrigem BaSO_4 u. H_2 dargestellt. — 3-Chlor-3-nitropentandiol-(2,4), F. 113 bis 4° . — Pentanol-(2)-on(3), $\text{C}_5\text{H}_{10}\text{O}_2$ (I) (bearbeitet von Hermann Lutze), Kp.₁₁ 45° bis 48° ; $n_D^{20} = 1,4218$; $D_4^{20} 0,9692$; M_D (Oxo-Form: $\text{C}_5\text{H}_{10}\text{O} \cdot \text{O} \cdot$) Ber. 26,82, ef. 26,75. Osazon, F. 167° . — Butanol-(1)-on-(2) (II), Kp.₁₁ $43\text{—}45^\circ$; $n_D^{20} = 1,4189$; $d_4^{20} 1,0272$; M_D (cyclo-Form: $\text{C}_4\text{H}_8\text{O} \cdot \text{O} \cdot$) Ber. 21,64, Gef. 21,65. Osazon, sintert bei $115\text{—}116^\circ$. — Pentanol-(1)-on-(2) (III), Kp.₁₁ $54\text{—}56^\circ$; $n_D^{20} = 1,4234$; $D_4^{20} 0,9860$; M_D (cyclo-Form: $\text{C}_5\text{H}_{10}\text{O} \cdot \text{O} \cdot$) Ber. 26,26, Gef. 26,38. Osazon, $\text{C}_{17}\text{H}_{20}\text{N}_4$, aus A., F. $110\text{—}111^\circ$. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58. 356—58. München, Bayer. Akad. d. Wiss.) BUSCH.

Neil K. Adam und Joseph W. W. Dyer, *Synthese der Arachinsäure und einiger Verbindungen mit langen Ketten.* Die Angaben über die FF. des Methyl- u. Äthyl-

esters der Arachinsäure sowie des Eikosylalkohols sind in der Literatur teilweise höher festgelegt, als es Verbb. von dieser Kettenlänge auf Grund der beobachteten Regelmäßigkeiten zukommt. Vff. haben durch Malonestersynthese die *Arachinsäure* aus Stearinsäure dargestellt u. fanden für den F. des *Äthylesters* 41,5–42,5°, des *Methylesters* 46–47°, des *Eikosylalkohols* 65–65,5°, als Mittelwerte zwischen den Verbb. der Reihen mit 18 u. 22 C-Atomen, während die älteren Angaben oft höher waren als der Reihe mit 22 C-Atomen entspricht. *Arachinsäure* selbst schm. übereinstimmend bei 75°. Die Synthese vom Äthylester der Stearinsäure ausgehend war mit 41% Ausbeute die beste Methode, um zu Verbb. mit 20 C-Atomen zu gelangen. Es werden ferner beschrieben: eine für lange Ketten geeignete Reduktionsmethode u. die Darst. von Aminen, Estern u. Amiden der Reihen C_{18} u. C_{20} .

Versuchsteil. Durch Red. mit Na u. A. werden erhalten aus *Stearinsäure-äthylester* (6 Stdn.) *n-Octadecylalkohol*, $C_{18}H_{38}O$, mit 68,5% Ausbeute, aus *Arachinsäureäthylester* in 70%ig. Ausbeute *Eikosylalkohol*, $C_{20}H_{42}O$, F. 65–65,5° aus A. — *Essigsäureeikosylester*, aus Aceton F. 39,5–40,5°. — Aus den Alkoholen wurden die entsprechenden Jodide mit HJ in quantitativer Ausbeute erhalten, die mit Na u. Äthylmalonester kondensiert wurden. Die Ausbeuten an den entsprechenden Malonaten waren bis 70%. *Diocadecylmalonsäureäthylester* wurde erhalten aus dem Monooctadecylmalonester durch 6-std. Erhitzen mit Na u. Octadecyljodid (in absol. A.). Nach 48 Stdn. mit alkoh. KOH verseift (10 Stdn.); über das Ca-Salz wird die *Diocadecylmalonsäure*, $(C_{18}H_{37})_2C(CO_2H)_2$, rein, aus Eg. F. 93,5–94° rein erhalten. — *Diocadecylessigsäure*, $(C_{18}H_{37})_2CH \cdot CO_2H$, durch Erhitzen der vorigen Verb. auf 160°, F. 81–82° aus Eg. — *Arachinsäure* wurde aus Monooctadecylmalonsäure durch Erhitzen erhalten u. zeigt den Kp_1 203–205°, krystallisiert in Blättchen vom F. 75 bis 75,5° aus PAe. — *Arachinsäureamid*, F. 109°, u. -nitril, F. 49,5°. Aus letzterem mit absol. A. u. Na *Eikosylaminhydrochlorid*, $C_{20}H_{43}N \cdot HCl$. — *Eikosylcarbamid*, $C_{20}H_{41} \cdot NH \cdot CONH_2$, F. 111,5° (korr.) aus A. — *Essigsäureoctadecylamid*, $C_{18}H_{37} \cdot NH \cdot CO \cdot CH_3$, aus dem Amid, das bei 79,5–80° schm. — *Essigsäurehexadecylamid*, $C_{16}H_{33} \cdot NH \cdot CO \cdot CH_3$, auf analoge Weise gewonnen, zeigt die in der Literatur bekannten Konstanten. (Journ. Chem. Soc. London 127. 70–73. Sheffield, Univ.) HORST.

E. F. Armstrong und T. P. Hilditch, Über die Konstitution natürlicher ungesättigter Fettsäuren. I. Eine neue Methode, die Lage der Äthylenbindung in Säuren der Ölsäurereihe zu bestimmen. Vff. suchen nach Methoden, mittels deren in ungesätt. Säuren mit beliebig vielen Doppelbindungen die Lage dieser einwandfrei bestimmt werden kann. Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich nur mit der Ölsäure aus Olivenöl. Von den bekannten Methoden, aus denen die Lage der Doppelbindung in dieser Säure geschlossen wurde, genügt keine den Bedingungen, die an eine befriedigende Methode gestellt werden müssen, nämlich 1. so milde zu sein, daß Verschiebung der Doppelbindung ausgeschlossen ist, 2. die Rk.-Prodd. annähernd in den berechneten Mengen zu liefern. Vff. fanden ein recht gutes Verf. in der Oxydation von Ölsäuremethyl- oder -äthylester mit $KMnO_4$ in Aceton oder Eg.

Die Ölsäure wird mit Pb-Acetat (ca. 35% der theoret. notwendigen Menge) in absol. A. von festen Fettsäuren befreit, weiter über das Li Salz (aus 80%ig. A.) gereinigt, mit A. oder CH_3OH u. H_2SO_4 (3%) verestert u. die Ester unter 3–5 mm fraktioniert. — 1. Beispiel: 50 g Methylester in 500 ccm sd. Aceton wurden in 1½ Stdn. mit 200 g $KMnO_4$ versetzt, 16 Stdn. gekocht, Aceton abdest., 1 l W. zugefügt, MnO_2 mit $NaHSO_3$ u. verd. H_2SO_4 gel. Dann wurde ausgeäthert u. die äth. Lsg. mit 20%ig. Sodalsg. ausgezogen. Erstere hinterließ 10,9 g neutrale Prodd. (Mol.-Gew. 279,6, Jodzahl 49,9). Letztere wurde (zur Verseifung des Azelainsäuremonomethylesters) mit 50 g NaOH gekocht, angesäuert u. ausgeäthert. Erhalten: 41 g rohe Säuren. Diese wurden durch 4-maliges Auskochen mit PAe. zerlegt in 18,7 g unl. u. 18 g l. Säuren. Erstere sind fast reine *Azelainsäure*, letztere ent-

alten hauptsächlich *Nonansäure* (identifiziert durch das Ba-Salz) neben niederen iuren (Essigsäure) u. Azelainsäure. Gesamtausbeute (bei Abzug der neutralen rodd.): ca. 83% Azelainsäure, 50% Nonansäure. — 2. Beispiel: 45 g Äthylester, 25 ccm Eg., 75 g KMnO_4 (Dampfbad, im ganzen $2\frac{1}{2}$ Stdn.). Zunächst weiter wie oben, dann den ganzen Ä-Extrakt mit Dampf dest. Das Destillat lieferte 11,2 g reine Nonansäure. Nicht flüchtiger Rückstand ausgeäthert u. mit Alkali zerlegt in 5,5 g rote Azelainsäure u. 7,8 g neutrale Prodd. (Mol.-Gew. 207,4, Jodzahl 4,1; die er besonders niedrige Jodzahl läßt darauf schließen, daß sich primär O an die Doppelbindung addiert). Ausbeute: ca. 95% Azelainsäure, 59% Nonansäure. Diesem Verf. haftet jedoch der Nachteil an, daß sich die letzten Mengen Eg. schwer von den Rk.-Prodd. entfernen lassen. — 3. Beispiel zunächst wie beim 2. Beispiel. Trennung nicht durch Dampfdest., sondern durch Dest. unter 3—5 mm aus einem Bad von höchstens 170°. Das Destillat enthält außer etwas Eg. hauptsächlich Nonansäure, der Rückstand Azelainsäuremonoäthylester u. neutrale Prodd. Letztere gleichen denen des 2. Beispiels. Ausbeute: ca. 89% Azelainsäure, 80% Nonansäure. Dies Trennungsverf. lieferte bei anderen Säureestern der Ölsäurereihe einiger gute Resultate. — Dem im 1. Beispiel beschriebenen Verf. geben Vff. den Vorzug. Bei Gemischen natürlicher Ölsäuren dürften sich betreffs der Erkennung der verschiedenen Oxydationsprodd. Schwierigkeiten ergeben. Palmitin-, Stearinsäureester werden von obigen Oxydiergemischen nicht angegriffen. (Journ. oc. Chem. Ind. 44. T. 43—47.)

LINDENBAUM.

Emile André und M. Th. François, Über das Additionsvermögen des Jods gegenüber Äthylenverbindungen. (Vgl. ANDRÉ, Bull. Soc. Chim. de France [4] 33. 341; C. 1924. I. 434.) Vff. haben gefunden, daß die Ggw. von Cu die Addition von J an Äthylenbindungen katalysiert. Das Reagens wird folgendermaßen bereit: 21 g fein gepulvertes J werden unter gelindem Erwärmen in 1 l Eg. gelöst. 10 ccm hiervon werden mit Cu-Acetat (4—5 g pro l) versetzt u. das Gemisch unter zeitweiligem Rühren 1—2 Tage stehen gelassen; dann wird dekantiert u. in 20 ccm der dekantierten Lsg. durch Eindampfen u. Glühen der Gehalt an CuO bestimmt. Von der nicht mit Cu-Acetat versetzten anderen Hälfte der Eg.-J-Lsg. wird dann so viel hinzugegeben, daß die Lsg. $\frac{1}{1000}$ CuO enthält. Mit dieser Lsg., sowie mit der Eg.-J-Lsg. u. einer nach HANUS dargestellten Lsg. wurde die Jodzahl verschiedener ungesätt. Pflanzen- u. Tierfette ermittelt. Ergebnisse tabellar. im Original. Hervorzuheben ist, daß die Best. der Jodzahl nach HANUS u. mit der Cu-haltigen Lsg. bei Olivenöl, Mandelöl u. Erucasäure fast dieselben Werte lieferte, während sie nur mittels der Eg.-J-Lsg. erhaltenen Zahlen erheblich niedriger waren. Bei Leinöl, die (nach HANUS) eine niedrige Jodzahl haben, war mit dem neuen Reagens schon nach 15-std. Stehen dieselbe Jodmenge addiert wie nach 24 Stdn. Die Beschleunigung der Jodaddition in Ggw. von Cu ist im Original für Olivenöl, Walrat, Leinöl graph. im Vergleich mit Cu-freiem Reagens dargestellt. Bei Walrat ist ersichtlich, daß sowohl in Ggw., als auch in Abwesenheit von Cu nach einiger Zeit ein Aufhören der Jodaddition eintritt, die erst später wieder weitergeht; in Ggw. von Cu ist das Maximum der Jodabsorption nach 6 Stdn., in Abwesenheit von Cu erst nach 12 Stdn. (60%) erreicht. Bei Leinöl wird in Ggw. von Cu das Maximum der Jodaddition (80%) nach 48 Stdn. erreicht, in Abwesenheit von Cu beobachtet man, daß nach 48 u. 72 Stdn. die Jodabsorption geringer ist als nach 24 Stdn.; das Maximum der Jodaddition beträgt in diesem letzten Falle nur 50%. — Die Beschleunigung der Jodaufnahme durch Cu scheint nur einzutreten bei Erbb., die in einer langen KW-stoffkette nur eine Äthylenbindung enthalten. (Bull. Soc. Chim. de France [4] 37. 167—76. Hôpital Beaujon.) HABERLAND.

Walter Qvist, Beitrag zur Kenntnis der Oxalsäuredarstellung aus Sägespänen. Bei Erhitzen von Sägespänen mit NaOH müssen auf 100 g Späne 235—280 g NaOH,

d. h. 6—7 Grammäquivalente, angewandt werden, da bei niederem NaOH-Geh. Verkohlung nicht zu vermeiden. Erhitzen in zwei Operationen scheint vorteilhaft für die Oxalsäureausbeute. Die beste Temp. ist 230—240°, läßt sich aber durch Zusatz verschiedener Oxydationsmittel auf 190—200° herabsetzen. Zusatz indifferenten Stoffe wie Salz u. namentlich Sand erhöht die Oxalsäureausbeute bei gleicher Rk.-Temp.

Beim Erhitzen mit 200—250 g, d. h. 3,5—4,5 Grammäquivalenten KOH auf 100 g trockne Späne auf 190—200° erhält man 80—100% vom Spänegewicht kristallisierte Oxalsäure; mit weniger KOH Verkohlung, mit mehr KOH sinkt die Ausbeute, falls nicht die Temp. erhöht wird. — Mit 4,0—4,24 Grammäquivalenten eines Gemisches von NaOH u. KOH auf 100 g Späne bei 190—200° erhält man ein Maximum von Oxalsäure, wenn die Grammäquivalente KOH u. NaOH sich etwa wie 7:3 verhalten. — Beim Erhitzen mit KOH + NaOH oder KOH allein betrug die an Oxalsäure gebundene Menge Alkali im Rk.-Prod. bestenfalls ca. 40% des Gesamtalkalis; mit NaOH allein (bei Zusatz von Sand) bestenfalls 20%. Bei Erhitzen mit einem Gemisch von KOH u. Ba(OH)₂ oder MgO von konstantem Alkaligehalt von 4,24 Grammäquivalenten auf 100 g Späne sinkt die Oxalsäureausbeute mit sinkendem Gehalt der Mischung an KOH. — Bei 3—4std. Erhitzen von Sägespänen aus Birken-, Fichten-, Eichen-, Tannen- u. Espenholz mit Mischungen von KOH u. NaOH, von konstantem Alkaligehalt von 4,24 Grammäquivalenten, auf ca. 200° konnte in Bezug auf Oxalsäureausbeute kein Unterschied zwischen den verschiedenen Holzarten festgestellt werden. Auch aus Hydrocellulose wurde die gleiche Ausbeute erhalten. (Acta Acad. Aboensis Mathematica et Physica 3. 20 Seiten. 1924. Sep.)

ARNDT.


William Henry Perkin jun. und Herbert Sheppard Pink, α,γ -Dialdehydpropan- β,β -dicarbonsäure und α,γ -Dialdehydpropan- β -carbonsäure. (Vgl. PERKIN u. SPANKLING, Journ. Chem. Soc. London 75. 11 [1899].) Aus der Na-Verb. des Acetalmalonsäurediäthylesters wird mit Bromacetal Diacetalmalonsäureester u. durch Hydrolyse desselben *Diacetalmalonsäure*, (C₂H₅O)₂ · CH · CH₂ · C(CO₂H)₂ · CH₂ · CH(OC₂H₅)₂, erhalten. In der Kälte mit n. HCl behandelt, entsteht hieraus zunächst der Ester der α,γ -Dialdehydpropan- β,β -dicarbonsäure u. durch konz. HCl weiterhin die freie Säure. Durch Red. wird diese in *Bis-(γ -butyrolacton)- α,α -spiran (I)* oder durch Oxydation mit K₂Cr₂O₇ in *Propan- $\alpha,\beta,\beta,\gamma$ -tetracarbonsäure*, CO₂H · CH₂ · C(CO₂H)₂ · CH₂ · CO₂H, F. 151°, übergeführt. Letztere spaltet am F. CO₂ ab u. bildet *Tricarballysäure*. Erhitzt man die α,γ -Dialdehydpropan- β,β -dicarbonsäure mit V. bei 180°, so entsteht unter Abspaltung von CO₂ die α,γ -Dialdehydpropan- β -carbonsäure, C₆H₈O₄ = CHO · CH₂ · CH(CO₂H) · CH₂ · CHO, Sirup. — *Di-p-nitrophenylhydra-*

I
$$\begin{array}{c} \text{CH}_2 \cdot \text{CH}_2 \\ \diagup \quad \diagdown \\ \text{O} - \text{CO} > \text{C} < \begin{array}{c} \text{CH}_2 \cdot \text{CH}_2 \\ \diagdown \quad \diagup \\ \text{CO} - \text{O} \end{array} \end{array}$$
 azon, C₁₈H₁₈O₆N₆, F. 198°. — Die Umsetzung zwischen der Na-Verb. des Acetalmalonsäurediäthylesters und Bromacetal wird im Autoklaven bei einer Ölbadtemp. von 200° während 6 Stunden vorgenommen; *Diacetalmalonsäurediäthylester*, C₁₉H₂₆O₈, wird als farblose Fl. vom Kp.₁₈ 192—196°, D.₂₀ 1,031, erhalten. — Die Hydrolyse mit Ba(OH)₂ in methylalkoh. Lsg. auf dem Wasserbad während 4 Stunden führt zu *Diacetalmalonsäure*, C₁₅H₂₈O₈, einem viscosen Sirup, der nicht erstarrt. — α,γ -Dialdehydpropan- β,β -dicarbonsäure, C₇H₈O₆, nach wochenlangem wiederholten Erhitzen im Vakuum farblose Prismen, F. 122° (Zers.). — *Di-p-nitrophenylhydrazon*, C₁₉H₁₈O₈N₆, gelbe Blättchen aus A. vom F. 156° (Zers.). — Der Äthylester sd. b. 18 mm zwischen 174 u. 178° u. dessen *Di-p-nitrophenylhydrazon*, C₂₃H₂₆O₈N₆, kristallisiert aus A. mit dem F. 170°. — Die Red. der Dialdehydsäure mit Na-Amalgam durch Rühren (8 Tage) in Eiskühlung ergibt **I** in Blättchen aus W. vom F. 110 bis 110°. (Journ. Chem. Soc. London 127. 191—94. Oxford, DYSON PERRINS Lab.)

HORST.

George Newbery, Die Einwirkung von Alkalilaugen auf α -Äthyl- α -brombutyr-


carbamid. Bei der Einw. von 2-n. NaOH auf α -Äthyl- α -brombutyrylcarbamid wurden Hauptprodd. isoliert: ein Gemisch der Isomeren von α -Äthylcrotonsäure (Öl vom Kp.₇₆₀ 200—210°), eine Verb. vom F. 198° u. eine gesätt. Säure vom Kp.₇₆₀ 283—286°. Hingegen wurde Diäthylhydantoin nicht beobachtet. Die bei 198° schmelzende Substanz wurde auf Grund ihres Verh. bei der Hydrolyse als α -Äthylcrotonylcarbamid, $C_7H_{12}O_2N_2$ (I), erkannt. Die Verseifung liefert α -Äthylcrotonamid (II) vom F. 118° u. ein Gemisch von zwei α -Äthylcrotonsäuren. Durch Rk. von Harnstoff mit α -Äthylcrotonylchlorid wird ein Isomeres von I mit dem F. 158° erhalten. Dieses nebst einer isomeren Form von II (F. 104°) wurden in geringer Menge auch bei obiger Rk. des α -Äthyl- α -brombutyrylcarbamids mit Alkali erhalten. Bei der Rk. mit Na-Amalgam ergeben die beiden isomeren Amide II α -Äthylbutyramid (F. 112°), die beiden isomeren Carbamide I α -Äthylbutyrylcarbamid (F. 207°). Mit F. in CS_2 werden die beiden isomeren α, β -Dibrom- α -äthylbutyramide vom F. 128° u. F. 79° erhalten u. aus den entsprechenden Carbamiden die isomeren α, β -Dibrom- α -äthylbutyrylcarbamide, $CH(CH_3)Br \cdot CBr(C_2H_5) \cdot CO \cdot NH \cdot CO \cdot NH_2$, vom F. 143° u. 12°. — Die fette Säure vom Kp. 283—286° erstarrt im Eisschrank u. zeigt dann bei F. 24°; es konnten zwar keine einheitlichen Analysenergebnisse erhalten werden, doch führte die Verseifung der vermutlich zweibas. Säure zu Diäthylglykolsäureamid, $OH \cdot C(C_2H_5)_2 \cdot CO \cdot NH_2$, vom F. 88°, u. Diäthylglykolsäure vom F. 79—80°. Man kann daher in der Verb. vom Kp. 283—286° Bis-(diäthylglykoly-carbamid), $[OH \cdot C(C_2H_5)_2 \cdot CO \cdot NH]_2 \cdot CO$, annehmen. Aus dem Ag-Salz mit Äthyljodid Bis- α -äthoxy- α -äthylbutyrylcarbamid, $[O(C_2H_5) \cdot C(C_2H_5)_2 \cdot CO \cdot NH]_2 \cdot CO$, F. 240°, u. durch dessen Hydrolyse α -Äthoxy- α -äthylbutyrylamid vom F. 36°. — Unter gleichen Bedingungen werden die ungesätt. Amide nicht merklich hydrolysiert, während die Verseifung der Carbamide in zwei Richtungen verläuft:



Bis-(diäthylglykoly-carbamid) wird durch milde Alkalien zu dem stabilen Diäthylglykolsäureamid (F. 88°) u. weiterhin zu Diäthylglykolsäure (F. 81°) verseift. (Ann. Chem. Soc. London 127. 295—307. Wandsworth.)

HORST.



H. Staudinger und W. Kreis, Versuche mit einem heiß-kalten Quarzrohr. Vff. haben versucht, durch rasches Abkühlen von hohen auf tiefe Temp. einige Stoffe zu gewinnen, die nur bei höherer Temp. bekannt sind, während sie sich bei Abkühlung polymerisieren. Die Verss. wurden in einem elektr. geheizten Quarzrohr durchgeführt, das in einer durch fl. Luft gekühlten Vorlage endete, so daß die Gase auf einer Strecke von wenigen cm von +1000° auf -190° abgekühlt werden konnten. — Wird geschm. grünes Nitrosobenzol rasch auf -80° abgekühlt, so erhält man eine grüne feste M., die das Monomere darstellt u. sich bei -20° bis -30° zum farblosen Dimeren polymerisiert. — Nicht gelungen ist die Darst. von rotem braunen NO₂, von rotem metalloiden Tellur u. von blauem S₂, das eine blaue, bei -30° sd. Fl. sein müßte. Die Polymerisationsgeschwindigkeit dieser Stoffe ist zu groß. — Weiter wurden Verss. zur Darst. des unbekannten Schwefel-oxyds, SO, unternommen, das zwischen -100 u. -120° sd. sollte. Aus SOCl₂ wurden im Quarzrohr jedoch nur Cl₂, S₂, Cl₂Br, S u. SO₂ erhalten; etwa gebildetes SO war in SO₂ u. S zerfallen. Auch andersartige Methoden führten nicht zum Ziel, z. B. aus Diphenyldiazomethan oder Diphenylketen u. SOCl₂:



(Z. phys. chim. Acta 8. 71—74. Zürich, Techn. Hochsch.)

LINDENBAUM.


Julius v. Braun und Otto Engel, *Metaringschlüsse in der Benzolreihe*. III. M (II. vgl. v. BRAUN, KARFF u. v. GARN, Ber. Dtsch. Chem. Ges. 53. 98; C. 1920. 286.) Vff. führen an einem zweiten Beispiel den Nachweis, daß man durch eine Reihe einfach u. glatt verlaufender Rkk. von offenen Benzolderivv. zu Stoffen gelang kann, die kaum eine andere Deutung als die von m-ständig an den Benzolkern gegliederten Ringen zulassen. — ω, ω' -Dibromesitylen, aus Mesitylen durch Bromierung in 2 Stufen, gibt mit KCN (etwas mehr als 2 Mol.) in alkoh.-wss. L. das Dinitril der 5-Methylphenylen-1,3-diessigsäure, $C_{11}H_{10}N_2$; Kp.₁₄ 224—225°, F. 173°. Gibt mit konz. HCl im Rohr 5-Methylphenylen-1,3-diessigsäure, $C_{11}H_{12}O_4$, zll. in W., F. 173°. Gibt im Rohr bei 160—170° mit konz. HNO_3 Trimesinsäure, $C_9H_6O_6$.



F. oberhalb 300° (Zers.). — Äthylester, $C_{15}H_{18}O_6$, F. 133°. — Monoamin, $C_{11}H_{15}N$ (I) aus dem Dinitril der Methylphenylendiessigsäure mit Na u. A. neben wenig I. amin; Kp.₁₃ 110—111°, wl. in W., riecht bas., zieht CO_2 an; gibt eine Nitrosoverbindung ein Benzolsulfoderiv. u. ein Jodmethylat, $C_{13}H_{20}NJ$; aus A., F. 253°. — $C_{26}H_{40}N_2Cl_6$ zers. sich oberhalb 233°. — I. gibt mit HNO_3 Trimesinsäure. — Das quartäre Jodmethylat gibt mit Ag_2O die Ammoniumbase II. u. diese beim Erhitzen im Vakuum unter Abspaltung von $(CH_3)_2NH$ den *KW-stoff* $C_{11}H_{12}$ (III.); Kp.₁₄ 71—72°, riecht an Terpene erinnernd; entfärbt Permanganat; D_{20}^{20} 0,9012; $n_D^{20} = 1,5371$; Mol. Refr. 49,96 (ber. für $C_{11}H_{12}$ mit 4 doppelten Bindungen 46,70). Gibt mit HNO_3 Trimesinsäure. Gibt das Dibromid $C_{11}H_{12}Br_2$, Nadeln, aus A.-PAe., F. 90°. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58. 281—85. Frankfurt a. M., Univ.)

BUSCH.

N. Zuschine, Über die Darstellung von NO_2Cl und NO_2Br und ihre Einwirkung auf Grignardverbindungen. Darst. von Nitrylbromid, NO_2Br , durch Überleiten von Br_2 mit NO_2 gesätt. Br -Dämpfen über auf 200—250° erhitzte calcinierte Knochen; der ersten Vorlage kondensiert sich überschüssiges Br , in der zweiten (gekühlte) NO_2Br . — Darst. von Nitrylchlorid, NO_2Cl , nach der Gleichung:



indem man zu 75 cem w. HNO_3 (Kolben mit Kühler) 70 cem $POCl_3$ zutropfen läßt. Kp. 4—6°. Einw. von NO_2Cl auf Phenyl-MgBr ergab Diphenyl u. Brom- oder Chlorbenzol. Ein Nitroderiv. bildete sich weder mit C_6H_5MgBr , noch mit C_2H_5MgBr . (Bull. Soc. Chim. de France [4] 37. 187. Kiew, Univ.)


HABERLAND.

Erich Krause und Aristid v. Grosse, *Fluoride metallorganischer Verbindungen*. III. Alkyl- und Arylthalliumfluoride. (II. vgl. KRAUSE u. POHLAND, Ber. Dtsch. Chem. Ges. 55. 1282; C. 1922. III. 138.) Die Fluoride sind im Gegensatz zu den übrigen Halogenverbb. sl. in W. u. CH_3OH , die Phenylverb. etwas schwerer, sw. sind sie in Ä. u. Bzl. — Die Darst. erfolgte aus den Chloriden oder Bromiden in wss. Lsg. oder Suspension mit AgF , weniger als berechnet. — Dimethylthalliumfluorid, C_2H_5FTl , aus W. + $12H_2O$, aus CH_3OH wasserfreie Prismen; schon bei gewöhnlicher Temp. spurenweis flüchtig, riecht etwas süßlich, vermutlich giftig; sublimiert oberhalb 200° fast unz. unter B. von Nadeln; zers. sich bei langsamem Erhitzen oberhalb 230°, verpufft bei raschem Erhitzen bei ca. 260°; in 100 g CH_3OH 55 g bei 18°. — Diäthylthalliumfluorid, $C_4H_{10}FTl$, aus W. + $12H_2O$, wasserfreie Prismen, doppelbrechend, aus CH_3OH , verliert bei langsamem Erhitzen von 170° an d. organ. Bestandteile, verpufft bei schnellem Erhitzen bei 200—235°; in 100 g CH_3OH 1. 95 g bei 23°. — Diphenylthalliumfluorid, $C_{12}H_{10}FTl$, Nadeln, aus W. oder Pyridin frei von Lösungsm., schm. bei vorsichtigem Erhitzen bei 305—310° (Zers.), verpufft bei jähem Erhitzen; 1,5 g l. in 100 g W. von 16°. — Eine wss. Lsg. des Diphenylthalli-Ions gibt mit verd. 0,1—1%ig. Lsgg. von NO_3' , NO_2' , ClO_3' , CO_3'' , $(COO)_2$

(CO_4'' , Cl' , Br' u. J' weiße Fällungen der entsprechenden Salze, dagegen keine Ndd. bei Lsgg. von SO_4'' , HPO_4'' , ClO_4' u. $\text{CH}_3\text{COO}'$. — Aus nicht sehr verd. Lsgg. von *Salpetersäure* oder Nitraten fällt sofort ein mikrokristalliner Nd., aus verd. Lsgg. von 1:1000 bis 1:10000 nach 1 Sek. bis 2 Min. ein Regen von im Sonnenlicht in allen Farben schillernden Täfelchen. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58. 272—75. Berlin, Techn. Hochsch.)

BUSCH.


I. M. Kolthoff, *Über den Zustand von Methylorange in seinem Umschlagsintervall*. Aus Messungen anderer Autoren u. aus seinen eigenen berechnet Vf. den Durchschnittswert der Säuredissoziationskonstanten der freien *Dimethylaminoazobenzolsulfonsäure* (als schwache Säure betrachtet) zu $k_s = 4,0 \cdot 10^{-4}$ (bei 25°). — Nach der neueren Anschauung besteht die wss. Lsg. der Methylorangesäure jedoch hauptsächlich aus dem Zwitterion $\text{HN}(\text{CH}_3)_2\text{RSO}_3'$; dieses hat chinoide Struktur u. ist rot gefärbt. Durch Zusatz von OH-Ionen bildet sich die ungespaltene gelbe Base $\text{N}(\text{CH}_3)_2\text{RSO}_3'$. Methylorange verhält sich demnach als Indicator (genau wie eine Muttersubstanz, das Dimethylaminoazobenzol) wie eine schwache Base. Seine Dissoziationskonstante ist von derselben Größenordnung wie beim Dimethylaminoazobenzol. Beim Farbumschlag findet folgende Rk. statt:




Der isoelekt. Punkt der Methylorangesäure ergibt sich aus den Löslichkeitsbest. in W., Essigsäure, HCl u. gesätt. Salicylsäurelsg. bei 18° in der Nähe von $[\text{H}^+] = 0,005$. — Die Sulfosäuregruppe verhält sich wie eine sehr starke Säure. (Rec. trav. chim. Pays-Bas 44. 68—74. Utrecht, Univ.)

ZANDER.

I. M. Kolthoff, *Über den Zustand von Methylrot in seinem Umwandlungsintervall*. (Vgl. vorst. Ref.) Aus kataphoretr. Verss. ergibt sich der isoelekt. Punkt der *Dimethylaminoazobenzol-o-carbonsäure* (*o-Methylrot*) bei 15° zwischen pH 3,7 u. 4,1 (so etwa 3,9), entsprechend einer $[\text{H}^+]$ von $1,2 \cdot 10^{-4}$. Damit übereinstimmend ergab sich die geringste Löslichkeit bei pH 4,0 zu $1:75\,000 = 13 \text{ mg/l} = 5 \cdot 10^{-5} \text{ mol}$. Nach der Verteilungsmethode wurde die Basendissoziationskonstante des Methylrots bei 15° zu $2,5 \cdot 10^{-12}$ bestimmt. Die Säuredissoziationskonstante ergab sich nach colorimetr. Messungen bei 15° zu $9 \cdot 10^{-6}$. Nach diesen Annahmen, nämlich, daß *o-Methylrot* beim isoelekt. Punkt in der neutralen Form vorliegt, würde es sich im Intervall pH 4—6 wie ein saurer Indicator verhalten, es würde Salzbildung der Carboxylgruppe stattfinden. Aus der Empfindlichkeit des Indicators gegenüber Ionen ergibt sich jedoch, daß er sich zwischen pH 4 u. 6 wie eine Base verhält. Der isoelekt. Punkt liegt Methylrot nach BJERRUM als Zwitterion $\text{'HN}(\text{CH}_3)_2\text{RCOO}'$ vor, das rot gefärbt ist. Mit Säuren bildet es das Kation:



mit Basen das Anion:



Bei seinem Umschlag zwischen pH 4 u. 6 wirkt also die Aminogruppe salzgebend, der Indicator ist also als Base zu betrachten. Die Dissoziationskonstante der bas. Gruppe ist $K_B = 7 \cdot 10^{-10}$, während $K_S = 2,5 \cdot 10^{-3}$ ist. — Vom *p-Methylrot* ist K_B etwa $10^{-10,5}$ u. $K_S = 10^{-3,3}$. Zur Erklärung des Verh. dieser Substanz als Indicator ist die Anschauung von BJERRUM auch hier wieder am meisten beiderlegend. (Rec. trav. chim. Pays-Bas 44. 75—81. Utrecht, Univ.)

ZANDER.

Fr. Fichter und Jacques Meyer, *Die elektrochemische Oxydation der Benzolmologen*. I. *m-Xylol*. (Vgl. FICHTER, Trans. Amer. Electr. Soc. 45. 107; C. 1924. 2832.) Zu allen Verss. diente ein elektrolyt. voroxydierter Bleitopf als Anode u. ein Innstab als Kathode, entweder mit einer Tonzelle fest zu einem Rührwerk verbunden oder ohne solche. — 1. 43 g *m-Xylol*, emulgiert in 450 ccm n. H_2SO_4 , mit 0,066 Amp./qcm u. 3 Farad/Mol., bei 94°, mit Diaphragma (beschickt mit 5-n. SO_4). Es entweicht CO_2 . Zurückgewonnen: 23 g *m-Xylol*. Erhalten: Aus der

folgenden Vers. bestätigt: 1 g reinstes *a. m.*-Xylenol, 400 ccm n. H_2SO_4 mit 0,006 Amp./qcm u. 90 Amp./Min., bei 90° , mit Diaphragma. Nach Zus. von 10 g FeCl_3 wurde mit Dampf dest. Erhalten: 0,28 g = 25,1% *p*-Xylochinon. — Die Gesamtergebnisse können — von harzigen Prodd. abgesehen — durch umstehendes Schema wiedergegeben werden. (Helv. chim. Acta 8. 74–83. Basel, Anst. f. anorg. Chemie.)

LINDENBAUM.

Edward Russell Trotman, Darstellung quaternärer Kohlenwasserstoffe. Quaternäre Verbb. des Typus $(\text{C}_6\text{H}_5 \cdot \text{CH}_2)_2\text{CR}_2$ sind nur in geringer Zahl bekannt. Zweck der Unters. war die Darst. solcher Verbb. Doch erwies sich, daß die *Frignardsche Rk.* mit tert. Halogenverbb. oft einen recht unerwarteten Verlauf nimmt. β -Methyl- α -phenyl- β -brombutan reagiert mit $\text{C}_2\text{H}_5\text{MgBr}$ unter Entw. von Äthan u. Äthylen. Die Reaktionsprodd. waren $\text{C}_6\text{H}_5 \cdot \text{CH} : \text{C}(\text{CH}_3) \cdot \text{C}_2\text{H}_5$ u. $\text{C}_6\text{H}_5 \cdot \text{CH}_2 \cdot \text{CH}(\text{CH}_3) \cdot \text{C}_2\text{H}_5$. Der Nachweis einer quaternären Verb. gelang nicht. α -Phenyl- β -benzyl- α -brompropan reagiert mit $\text{MgC}_2\text{H}_5\text{Br}$ unter B. von α, δ -Diphenyl- β, γ -dibenzyl- β, γ -dimethylbutan in sehr geringer Menge, während die Hauptprodd. der Rk. ein Gemisch von α, γ -Diphenyl- β -methylpropan u. α, γ -Diphenyl- β -methyl- Δ^a -propen (?) sind. Der quaternäre KW-stoff α -Phenyl- β, β -dibenzylpropan bildet sich, allerdings in sehr geringer Menge, aus α -Phenyl- β -benzyl- β -brompropan neben Olefinen. Aus Tribenzylmethylbromid u. $\text{C}_2\text{H}_5\text{MgBr}$ wird in geringer Ausbeute Hexabenzyläthan erhalten neben den olefin. Hauptprodd. Aus $\text{C}_6\text{H}_5 \cdot \text{CH}_2 \cdot \text{MgCl}$ u. β -Methyl- α -phenyl- β -brompropan entsteht in besserer Ausbeute der quaternäre KW-stoff (50%) α -Phenyl- β -benzyl- β -methylpropan vermischt mit α -Phenyl- β -methyl- Δ^a -propen. Verss., durch Red. von Diketonen des Typs $\text{C}_6\text{H}_5 \cdot \text{CO} \cdot \text{CR}(\text{CH}_2 \cdot \text{C}_6\text{H}_5) \cdot \text{CO} \cdot \text{CH}_3$ zu quaternären KW-stoffen zu gelangen, führten nicht zu dem gewünschten Ergebnis. Es entstand *o*-Benzylacetophenon, indem eine Acetylgruppe eliminiert wird.

Versuchsteil: β -Methyl- α -phenyl- β -brombutan (I), $\text{C}_6\text{H}_5 \cdot \text{CH}_2 \cdot \text{C} \cdot \text{CH}_3 \cdot \text{C}_2\text{H}_5 \cdot \text{Br}$, stark riechendes Öl mit Wrkg. auf die Augen, erhalten durch Sättigen von Benzylmethyläthylcarbinol mit HBr. Zers. sich beim Destillieren. — Einw. von $\text{C}_2\text{H}_5\text{MgBr}$ auf I führte zu einem zwischen 195° u. 205° sd. Öl, wahrscheinlich ein Gemisch von β -Methyl- α -phenyl- Δ^a -buten u. β -Methyl- α -phenylbutan. Die erwartete Verb. mit quaternärem C dürfte sich kaum gebildet haben. — Methyl- β -benzylcarbinol, $(\text{C}_6\text{H}_5 \cdot \text{CH}_2)_2\text{C} \cdot \text{CH}_3 \cdot \text{OH}$, aus $\text{C}_6\text{H}_5 \cdot \text{CH}_2\text{MgBr}$ u. Äthylacetat, farblose, süß schmeckende Fl., Kp.₁₄ $195\text{--}200^\circ$ (Zers.). — α -Phenyl- β -benzyl- β -brompropan, $(\text{C}_6\text{H}_5 \cdot \text{CH}_2)_2 \cdot \text{C} \cdot \text{CH}_3 \cdot \text{Br}$, Prismen aus PAe. u. A., F. $78,5^\circ$, spaltet leicht HBr ab beim Destillieren unter 0,2 mm. — Durch Einw. von $\text{C}_2\text{H}_5\text{MgBr}$ auf α -Phenyl- β -benzyl- β -brompropan wurde erhalten β, γ -Dimethyl- α, δ -diphenyl- β, γ -dibenzylbutan, $(\text{C}_6\text{H}_5 \cdot \text{CH}_2)_2 \cdot \text{C} \cdot \text{CH}_3 \cdot \text{C} \cdot \text{CH}_3 (\text{CH}_2 \cdot \text{C}_6\text{H}_5)_2$, Blättchen aus PAe., F. 171° . Aus der alkoh. Mutterlauge wurde nach Abtrennung von α, γ -Diphenyl- β -methyl- Δ^a -propen (II) das bei $290\text{--}294^\circ$ sd. β -Methyl- α, γ -diphenylpropan, $\text{C}_{16}\text{H}_{18}$, erhalten. Der quaternäre KW-stoff, β -Methyl- α -phenyl- β -benzylbutan, war nicht unter den Reaktionsprodd. — Das Olefin II, $\text{C}_{16}\text{H}_{16}$, farbloses Öl vom Kp. $294\text{--}296^\circ$, konnte nicht rein gewonnen werden. — Die Einw. von $\text{C}_6\text{H}_5 \cdot \text{CH}_2 \cdot \text{MgCl}$ auf α -Phenyl- β -benzyl- β -propan führte zu α -Phenyl- β, β -dibenzylpropan, Prismen vom F. 113° . — Durch die Rk. von $\text{C}_2\text{H}_5\text{MgBr}$ mit Tribenzylmethylbromid wurde gewonnen α, γ -Diphenyl- β -benzyl- Δ^a -propen (F. $42\text{--}43^\circ$) u. aus der alkoh. Mutterlauge der KW-stoff $\text{C}_{44}\text{H}_{42}$, Hexabenzyläthan, vom F. $82\text{--}83^\circ$. — Aus Tribenzylmethylbromid u. $\text{C}_6\text{H}_5 \cdot \text{CH}_2\text{MgBr}$ entstand Tetrabenzylmethan, $\text{C}_{20}\text{H}_{28}$, kub. Krystalle vom F. 164° ; das Hauptprod. war α, γ -Diphenyl- β -benzyl- Δ^a -propen. — β -Methyl- α -phenyl- β -brompropan, $\text{C}_6\text{H}_5 \cdot \text{CH}_2 \cdot \text{C}(\text{CH}_3)_2 \cdot \text{Br}$, aus Dimethylbenzylcarbinol durch Sättigen mit HBr. — β -Methyl- α -phenyl- β -benzylpropan, $\text{C}_{17}\text{H}_{20}$, aus der vorigen Verb. u. $\text{C}_6\text{H}_5 \cdot \text{CH}_2 \cdot \text{MgCl}$, Prismen aus A. vom F. $68\text{--}69^\circ$ (Kp. $293\text{ bis }294^\circ$) neben β -Methyl- α -phenyl- Δ^a -propen (Kp. 181°). — Wenn Benzoylaceton


mit Benzylchlorid im Überschuß gekocht wird, entsteht *Benzylbenzoylacetone*, $C_{17}H_{16}O_2$, Nadeln, F. 60—61°. (Journ. Chem. Soc. London **127**, 88—95. Nottingham, Univ.) HORST.

Gilbert T. Morgan, Harry Dugald Keith Drew und Charles Raymond Porter, *Beobachtungen über die Claisen-Kondensation*. Diketone $R \cdot CO \cdot CH_2 \cdot CO \cdot R'$ geben blaue oder grüne Cu-Salze u. mit $FeCl_3$ rote Färbungen; Diketone $R \cdot CO \cdot CH(R'') \cdot CO \cdot R'$ geben neutrale graue Cu-Salze u. färben sich mit $FeCl_3$ purpurn oder violett. — *Diäthylketon* gibt mit 3 Mol. *Essigester* u. Na bei 0° *3-Methylpropionylacetone*; Kp.₇₃₆ 180°; Cu-Salz: graue Nadeln, F. 176—178° (Zers.). — Die 3-alkylierten β -Diketone haben, frisch aus ihren Cu-Verbb. in Freiheit gesetzt, intensiven Anisgeruch, der bald schärfer u. etwas fruchtig wird (infolge Ketisierung des zunächst vorhandenen Enols). — Wird die Claisenkondensation durch Erwärmen zu Ende geführt, so entsteht *Propionylacetone* (vgl. CLAISEN, LIEBIGS Ann. **277**, 170; C. **93**, II. 1052); Kp.₇₅₀ 155—157°; Cu-Salz, blaue Nadeln, aus CH_3OH , F. 196 bis 198°. — Die normale Claisenkondensation geht also bereits in der Kälte vor sich; an diese schließt sich aber beim Erwärmen sogleich eine Alkoholyse an. — *Diäthylketon* u. *Propionsäureäthylester* geben mit Na bei 0° *4-Methyldipropionylmethan*, Kp.₇₃₆ 187°; Cu-Salz: graue Nadeln, aus Lg., F. 171—173° (Zers.). Gibt mit sd. A. oder CH_3OH lichtblaue Nadeln der Alkyloxyverbb. $C_2H_5 \cdot CO \cdot C(CH_3) : C(O \cdot Cu \cdot OR) \cdot C_2H_5$. — Die Kondensation unter Erwärmen ergibt Äthylpropionat, Propionsäure u. Autokondensationsprodd. des Diäthylketons. — *Äthyl-n-propylketon*, aus Äthylzinkjodid u. n-Butyrylchlorid bei 0° in Bzl. gibt mit Äthylacetat u. Na beim Erwärmen *Propionylacetone*, Kp. 158°, n-Butyrylacetone, Kp. 175° u. ein Gemisch von Äthylestern der Essig-, Propion- u. n-Buttersäure. — *Di-n-propylketon* u. Essigsäureäthylester geben mit Na beim Erwärmen n-Butyrylacetone u. *Äthyl-n-butyrate*. Bei der Kondensation in der Kälte entsteht *3-Äthyl-n-butyrylacetone*. — *Äthylphenylketone* gibt mit Essigsäureäthylester u. Na in der Kälte Äthylbenzoat, Propionylacetone u. *3-Methylbenzoylacetone*, Kp.₁₂ 145—147°; Cu-Salz: bei 225—228° Zers. — Bei der Kondensation unter Erwärmen entsteht Äthylbenzoat, Benzoesäure, Propionylacetone u. *Propionylbenzoylmethan*, Kp.₇ 137—139°; entsteht auch aus Methyläthylketone u. Äthylbenzoat mit Na; $C_{22}H_{22}O_4Cu$: bläulich grün, aus CH_3OH , F. 153—154°. — *Phenylbenzylketone* u. Äthylacetat erleiden weder in der Kälte noch in der Wärme eine Kondensation. — *Äthylbenzylketone*, aus Phenylacetylchlorid mit Äthylzinkjodid in Toluol u. Essigester, Kp. 223—225°, *Semicarbazone* 154—155°, gibt mit Äthylacetat u. Na beim Erwärmen *3-Phenylpropionylacetone*, ω -Phenylacetylacetone, Cu-Salz: blaßblaue Nadelchen, F. 223—224°, Selenderiv., F. 164—165°, ω, ω' -*Diphenylacetylacetone* (?), Cu-Salz: F. 238° (Zers.) u. ω, ω' -*Diphenylacetylmethan*. Die Kondensation in der Kälte ergab nur *3-Phenylpropionylacetone*, $C_{12}H_{14}O_2$, Kp.₁₅ 136 bis 137°; F. 24—26°; Cu-Salz $C_{24}H_{26}O_4Cu$: Tafeln, aus A., F. 162—163°. Gibt mit 20%ig. KOH *Methylbenzylketone*. — *Semicarbazone*, F. 187—188° u. *Äthylbenzylketone*, *Semicarbazone*, F. 154—155°. — ω -Phenylacetylpropionylmethan, $C_{12}H_{14}O_2$, aus Methyläthylketone, Phenylelessigsäureäthylester u. Na, Kp.₁₃ 153—154°; Cu-Salz: Nadeln, aus A., F. 185°. — *Methylbenzylketone*, aus Phenylacetylchlorid u. Methylzinkjodid in Toluol u. Essigester, u. Essigsäureäthylester geben mit Na in der Kälte 13 bezw. 8% *3-Phenylacetylacetone*, $C_{11}H_{12}O_2$, F. 58—60°, Kp.₁₅ 127—128°, Cu-Salz, dunkelgrüne Nadeln, sintert bei 210°, bei 222—224° Zers. u. ω -Phenylacetylacetone. Beim Erwärmen geht die Kondensation weiter unter B. von 10% *3-Phenylacetylacetone* u. 30% ω -Phenylacetylacetone. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. **58**, 333—41. Univ. Birmingham, Edgbaston.)

BUSCH.

H. Gelissen und P. H. Hermans, *Über neue Synthesen mittels organischer Peroxyde*. I. Mitt. *Die Einwirkung des Dibenzoylperoxyds und einiger seiner Derivate auf siedendes Benzol*. Die Rk. des Dibenzoylperoxyds mit aromat. KW-stoffen verläuft in der Weise, daß sich das Peroxydmol. unter Abgabe von 1 Mol. CO_2 in

Teile spaltet, während sich der KW-stoff R·H in 2 verschiedenen Rkk., einer Haupt- u. einer Nebenrk., an die beiden Bruchstücke addiert. Mit Bzl. erfolgen die Rkk. I.—III.; die fettgedruckten Formeln entsprechen den tatsächlich isolierten Substanzen:




$\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{5}$ des Peroxyds reagiert in einer anderen, in dem Schema nicht enthaltenen Weise unter B. von harzigen MM. — Die B. von CH_4 beim Erhitzen von Benzoylacetylperoxyd in Xylollsg. (vgl. FREER u. NOVY, Amer. Chem. Journ. 27. 61; C. 1902. I. 930) läßt sich nunmehr nach der Rk.:

$\text{C}_6\text{H}_5 \cdot \text{CO} \cdot \text{O} \cdot \text{O} \cdot \text{CO} \cdot \text{CH}_3 + \text{C}_6\text{H}_4(\text{CH}_3)_2 \longrightarrow \text{CO}_2 + \text{CH}_4 + \text{C}_6\text{H}_5 \cdot \text{CO} \cdot \text{O} \cdot \text{C}_6\text{H}_3(\text{CH}_3)_2$ erklären (vgl. auch CLOVER u. HOUGHTON, Amer. Chem. Journ. 32. 60; C. 1904. I. 764). — Beim Erhitzen des *Dibenzoylperoxyds* für sich, besonders in Ggw. von Katalysatoren, entsteht CO_2 u. *Diphenyl*, das auf diese Weise leicht hergestellt werden kann. Aus disubstituierten Peroxyden sind so leicht disubstituierte Diphenyle erhältlich.

Versuche. 60 g *Dibenzoylperoxyd* u. 200 g *Benzol* geben beim Erhitzen 22,6 g *Benzoesäure*, 10,0 g *Diphenyl*, 1,0 g *Phenylbenzoat*, 1,3 g *Quaterphenyl* u. 17,5 g harzigen M., aus der etwas *Terphenyl* isoliert werden konnte. — *Quaterphenyl*, $\text{C}_{24}\text{H}_{18}$, aus sd. Bzl., F. 320°. — *Terphenyl*, $\text{C}_{18}\text{H}_{14}$, aus A., F. 205°. — *p'-Dichlordibenzoylperoxyd*, aus *p*-Chlorbenzoylchlorid u. Aceton mit H_2O_2 u. NaOH unterhalb 6°; aus Chlf. + CH_3OH , F. 137—138° (Zers.); empfindlich gegen Stoß u. Reibung. — Gibt mit Bzl. bei Siedetemp. *p*-Chlorbenzoesäure u. 4-Chlordiphenyl, $\text{C}_{12}\text{H}_9\text{Cl}$; aus verd. A., F. 77,2—77,4°. — *m,m'*-Dinitrobenzoylperoxyd, aus *Dibenzoylperoxyd* mit HNO_3 (D. 1,52) u. konz. H_2SO_4 ; aus Chlf. + CH_3OH , F. 130° (Zers.). — Gibt mit Bzl. bei Siedetemp. *m*-Nitrobenzoesäure u. 3-Nitrodiphenyl, $\text{C}_{12}\text{H}_9\text{O}_2\text{N}$. — Bei der Einw. von *Dibenzoylperoxyd* auf geschm. *Diphenyl* entsteht entsprechend Rk. II. u. III. u. a. *Terphenyl* u. *Quaterphenyl*. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58. 285 bis 294. Deventer, Lab. d. N. V. NOURY & VAN DER LANDE, Delft, Techn. Hochsch.)

BUSCH.

Alex. McKenzie und George Ogilvie Wills, *Übergang von Aminosäuren in opt. Aminoalkohole*. (Vgl. Mc KENZIE u. DENNLER, S. 72.) Durch Einw. von $\text{C}_6\text{H}_5 \cdot \text{MgBr}$ auf *rac. Alanin* wurde α,α -Diphenyl- β -amino-*n*-propylalkohol, $\text{C}_{15}\text{H}_{17}\text{ON}$ (I), 3 Blättchen vom F. 101,5—102,5° (aus A.) erhalten. Mit HNO_2 wird dieser Alkohol durch *Semipinakolindesaminierung* in *Methyldeoxybenzoin* (II) vom F. 50—51° umgesetzt:



Diese Beobachtungen sind eine Bestätigung derer von Mc KENZIE u. ROGER (vgl. Journ. Chem. Soc. London 125. 844; C. 1924. II. 37). Die Unters. werden auf die opt.-akt. Aminoalkohole, die vom *d*-Alanin aus dargestellt werden können, ausgedehnt. Die hochakt. Alkohole $([\alpha]_D = \pm 243^\circ)$ drehen die Ebene des Lichtes

im entgegengesetzten Sinne wie die Phenylaminoessigsäuren als Ausgangssubstanzen dargestellt wurden der *d*- u. *l*-Phenylaminoessigsäureäthylester (Hydrochloride), die durch Einw. von $C_6H_5 \cdot MgBr$ in *d*- β -Amino- α, α, β -triphenyläthylalkohol, $C_{20}H_{19}ON$ Nadeln vom F. 129,5—130°, u. in *l*- β -Amino- α, α, β -triphenyläthylalkohol vom F. 129, bis 130° umgewandelt wurden. Durch HNO_2 wird opt.-inakt. Phenyldeoxybenzoin vom F. 134—135° gebildet. — *l*, β -Amino- α, α, β -triphenyläthanol-*d*-camphersulfonat, $C_{16}H_{16}O_4S$, Nadeln vom F. 200—201° (Zers.); die entsprechende enantiomorphe Verb. vom F. 200—201°. — *l*, β -Amino- α, α, β -triphenyläthanol-*l*-camphersulfonat, Nadeln vom F. 213,5—215,5° (Zers.); ebenso die entsprechende enantiomorphe Verb. — Durch Einw. von $C_6H_5 \cdot MgBr$ auf α -Aminohydratropasäure entsteht β -Methyl- α, α, β -triphenyl- β -aminoäthylalkohol, $C_{21}H_{21}ON$, Blättchen vom F. 113—114°. — Aus *d*-Phenylalanin u. $C_6H_5 \cdot MgBr$ erhält man *d*, α -Diphenyl- β -benzyl- β -aminoäthylalkohol, Nadeln vom F. 143—144°. — Vff. haben die Verss. von FISCHER u. WEICHOLD (vgl. Ber. Dtsch. Chem. Ges. **41**. 1286; C. **1908**. I. 2038) u. von MARVEL u. NOYES (vgl. Journ. Americ. Chem. Soc. **42**. 2259; C. **1921**. I. 324) über den bei der Einw. von HNO_2 auf *d*- u. *l*-Phenylaminoessigsäureester beobachteten Wechsel des Vorzeichens der opt. Drehung der erhaltenen Mandelsäuren erneut nachgeprüft u. die Formulierung von FISCHER u. WEICHOLD: $d\text{-CH} \cdot C_6H_5(NH_2) \cdot CO_2C_2H_5 \rightarrow l\text{-CH} \cdot C_6H_5(OH) \cdot CO_2 \cdot C_2H_5$ bestätigen können. (Journ. Chem. Soc. London **127**. 283—95 Dundee, Univ. Coll. St. Andrews Univ.)


HORST.

Erich Krause und Otto Schlöttig, Darstellung einer krystallisierbaren organischen Bleiverbindung mit vier verschiedenen Liganden. (Vgl. KRAUSE u. SCHMITZ Ber. Dtsch. Chem. Ges. **52**. 2150; C. **1920**. I. 332). Eine vergleichende Untersuchung der Haftfestigkeit verschiedener aromatischer Gruppen unter sich, gegenüber der Cyclohexylgruppe u. gegenüber aliphatischen Gruppen ergab: bei Ggw. von nur aromatischen Radikalen wird umgekehrt wie in der aliphatischen Reihe die schwerste Gruppe zuerst abgespalten; aliphatische haften fester als aromatische, am festesten haftet die Cyclohexylgruppe. Die erkannten Gesetzmäßigkeiten ermöglichten die Darst. von Phenylcyclohexylmethylbleibromid.

Verss.: Es wird auf die Giftigkeit der Organobleiverb. hingewiesen. Eine Verwendung von mit Bleialkylen versetztem Bzn., wie es die Standard Oil Co. herstellt, ist bedenklich (vgl. BEHRLE S. 878). — Tetraphenylblei, aus $PbCl_2$ u. C_6H_5MgBr bei Siedetemp., nur bei Überschuß der Mg-Verb., sonst entsteht hauptsächlich Bleitriphenyl. Bei geringem Überschuß an $PbCl_2$ entsteht Triphenylbleichlorid. Das mit KOH gewonnene Triphenylbleihydroxyd gibt mit 15%ig. HB Triphenylbleibromid. Letzteres entsteht auch durch gemäßigte Bromierung von Tetraphenyl- oder Triphenylblei mit Hilfe des Br-Additionsprod. von Pyridin. Diese Methode diente auch zur Bromierung gemischter Bleiaryle, bei —15° u. Anwendung von reinem Pyridin. — Triphenylbleichlorid entsteht auch aus Bleitetraphenyl mit NH_4Cl bei 170—180°. — Triphenylmethylblei, $C_{19}H_{19}Pb$, aus $(C_6H_5)_3Pb \cdot Bz$ u. überschüssigem $CH_3 \cdot MgBr$ oder $CH_3 \cdot MgCl$; aus Bzn. rhomboedr. Krystalle F. 60° (unkorr.), bei 220° Trübung, bei 260° Zers.; wl. in k. 94%ig. A. Alkohol. AgNO₃-Lsg. fällt aus der alkoh. Lsg. Silberphenyl-Silbernitrat. — Triphenyl-*p*-phenoxyphenylblei, $C_{30}H_{24}OPb$, aus $(C_6H_5)_3Pb \cdot Br$ u. der Mg-Verb. des *p*-Bromdiphenyläthers F. 127° (unkorr.); bräunt sich bei 220°; Zers. bei 260°; zwl. in h. A. — Diphenyl-*di-p*-xylylblei, $C_{28}H_{28}Pb$, aus Diphenylbleidibromid u. *p*-Xylol-MgBr; Stäbchen aus absol. A. F. 94° (unkorr.), bei ca. 250° Zers. — Triphenyl-*p*-tolyl-, Triphenyl-*p*-xylyl-, Triphenyl- α -naphthyl- u. Triphenyl-*p*-phenoxyphenylblei geben bei der Bromierung Triphenylbleibromid. — Diphenyl-*di-p*-xylylblei gibt bei der Bromierung Diphenyl-*p*-xylylbleibromid, $C_{30}H_{19}PbBr$; aus 80%ig. A., F. 90° (unkorr.), von 200° an Zers. Gibt mit überschüssigem C_6H_5MgBr Triphenyl-*p*-xylylblei. — Triphenylcyclohexylblei gibt bei der Bromierung Diphenylcyclohexylbleibromid, $C_{18}H_{21}PbBr$; Nadeln, aus Bzn

135° (unkorr.), bei 160° Zers. Gibt mit C_6H_5MgBr Triphenylcyclohexylblei; 119—120° (unkorr.), bei 215° Zers. — *Triphenylmethylblei* gibt beim Bromieren *triphenylmethylbleibromid*, $C_{13}H_{13}PbBr$; Nadeln aus Bzn. + absol. A., F. 118° (unkorr.), bei 124° Zers. Gibt mit C_6H_5MgBr Triphenylmethylblei zurück. — *Triphenyläthylblei* gibt beim Bromieren *diphenyläthylbleibromid*, $C_{14}H_{15}PbBr$; Nadeln, 119° (unkorr.), bei 130—135° Zers.; l. in h., swl. in w. Bzn. Gibt mit C_6H_5MgBr triphenyläthylblei zurück, Prismen aus A., F. 45°, trübt sich von 215° ab, bei 240° zers. — *Diphenylcyclohexylbleibromid* gibt mit überschüssigem CH_3MgBr *diphenylcyclohexylmethylblei*, $C_{19}H_{24}Pb$; farbloses Öl, aus A.; mischbar mit organ. Lösungsmitt. — *Diphenylcyclohexylblei* gibt bei der Bromierung *phenylcyclohexylmethylbleibromid*, $C_{18}H_{19}PbBr$; sehr empfindlich gegen Licht u. Temp.; doppelbrechende farbenzerstreuende Prismen, aus Bzn., F. 93—94° (unkorr., Zers.). (Ber. Dtsch. chem. Ges. 58. 427—32. Berlin, Techn. Hochsch.) BUSCH.

J. Böeseken und J. S. Petrus Blumberger, *Beobachtungen über die Oxydationsgeschwindigkeit einiger aromatischer Äthylenderivate durch das Reagens von Prileshajew*. In Beziehungen zwischen der Oxydationsgeschwindigkeit von aromat. Äthylen-deriv. mittels *Benzopersäure* u. der Lage der doppelten Bindungen festzustellen, werden die Oxydationsgeschwindigkeiten bei einer Reihe von ungesätt. Verb. gemessen. Die erhaltenen Werte schwanken zum Teil stark, was von der wechselnden Reaktionsfähigkeit der Benzopersäure abhängt; trotz sorgfältigster Herst. der Perure sind oft Spuren von Verunreinigungen vorhanden, welche die Aktivität stark beeinflussen. Eine frisch hergestellte Lsg. ist weniger wirksam als eine 24 Stdn. bei 15° aufbewahrte, diese wieder ist wirksamer als eine bei 0° aufbewahrte Lsg. Die Reaktionsgeschwindigkeit wurde in Chlf. u. Tetrachlorkohlenstoff gemessen. Das Schema ist:



$K \times 10^4$ ergab sich für *Stilben*: 14—20 (0—1°) (a), 40—45 (15—16°) (b), 180 (0°) (c); *i-Stilben*: a) 20, b) 90; *Styrol*: a) 20, 36, b) 220, 250, 78, c) 350; *Allylbenzol*: a) Durchschnitt von 7 Messungen 11, b) 63, 170, c) 60, 80, 100, 150; *Propenylbenzol*: a) 34, 60, 111, 147, b) 230, 350, 539, c) 1100—1900; *Phenylbutylen-Δ^{1,2}*: a) 200, b) 800; *Phenylbutylen-Δ^{2,3}*: a) 20—30, b) 100; *Phenylbutylen-Δ^{3,4}*: a) 20—30, b) 80—90. — Trotz der großen Schwankungen der Zahlenwerte ergeben sich daraus folgende Regeln: Die Oxydationsgeschwindigkeit steigt mit Annäherung der ungesätt. Bindung an den Kern; Substitution eines ω-H-Atoms durch Alkyl erhöht, durch Aryl vermindert die Oxydationsgeschwindigkeit. (Rec. trav. chim. Pays-Bas 4. 90—95. Delft, Techn. Hochsch.) ZANDER.

Hans Lecher, Fritz Holschneider, Karl Köberle, Walter Speer und Paul Höcklin, *Phenylschwefelchlorid*. II. (I. vgl. Ber. Dtsch. Chem. Ges. 57. 755; 1924. II. 182.) Vff. haben die Darst. des Phenylschwefelchlorids u. einiger analoger Verb. u. Umsetzungen des Phenyl- u. p-Tolylschwefelchlorids untersucht. — *Phenylschwefelchlorid*, aus Diphenyldisulfid in CCl_4 mit Cl; Kp.₃ 58—60° (korr.). — *p-Tolylschwefelchlorid*, C_7H_7ClS , aus Thio-p-kresol u. Cl; das Chlorierungsgefäß ist vor Licht zu schützen. Rote, wie SCl_2 riechende Fl., Kp._{2,5} 77,5—78,5° (korr.). — *Thio-β-naphthol* gibt in CCl_4 mit Cl hauptsächlich unreines *Chlor-1-naphthylschwefelchlorid*, $(C_{10}H_7ClS)_2$, orangegelbe Krystalle, aus Hexan, F. unscharf 60—65°, schmilzt bei ca. 10° tiefer. — Aus Diäthylamid der Benzolsulfensäure u. HBr oder aus Thiophenol u. Br entsteht *Phenylschwefelbromid*, das aber wegen seiner Zersetzlichkeit nicht isoliert wurde. Auch das Phenylschwefelchlorid zers. sich beim Aufbewahren. — Bei der alkal. Hydrolyse des Phenylschwefelchlorids entsteht *Diphenylsulfid* u. *Benzolsulfinsäure*. — *Methylester der Benzolsulfensäure*, C_7H_5OS , aus Phenylschwefelchlorid u. Na-Methylat; farblose Fl., Kp.₄ 88—89° (korr.);

Geruch erinnert an Thiophenol. — Phenylschwefelchlorid gibt mit Phenol in Ä bei Wasserbadtemp. Diphenyldisulfid u. *p*-Oxydiphenylsulfid. *Methyläther*, $C_{13}H_{12}OS$; Kp.₁₁ 178—180°. — Benzolsulfinsaures Ag gibt mit Phenylschwefelchlorid *Diphenyldisulfoxyd*, F. 43,5—45°. — Phenylschwefelchlorid gibt mit C_6H_5MgBr *Diphenylsulfid*, Kp.₁₂ 148,5—149,5° (unkorr.). — *p*-Tolylschwefelchlorid gibt ebenso *Phenylp-tolylsulfid*, Kp.₁₁ 163—163,5° (unkorr.). — Phenylschwefelchlorid gibt in CCl_4 unter Feuchtigkeitsausschluß mit Äthylen ω -Chloräthylphenylsulfid, C_8H_9ClS ; Kp.₁₃ 122°. — *p*-Tolylschwefelchlorid gibt ebenso ω -Chloräthyl-*p*-tolylsulfid, $C_9H_{11}ClS$, Kp.₁₃ 139,5—140,5°. — *o*-Nitrophenylschwefelchlorid gibt in Äthylenbromid bei 100° mit Äthylen ω -Chloräthyl-*o*-nitrophenylsulfid, $C_8H_8O_2NCIS$; gelbe Krystalle, aus Ä F. 50—52°. — Die ω -Chloräthylsulfide haben ähnliche Giftwrg. wie der Gaskampfstoff Bis- ω -chloräthylsulfid; man vermeide, sie auf die Hand zu bringen, eventuell wasche man sofort mit Chlorkalkbrei. — *Dimethylamid der Benzolsulfensäure*, $C_8H_{11}NS$, aus Phenylschwefelchlorid in absol. Ä. mit Dimethylamin; Kp.₃ 63,5—64° (korr.). — *Anilid der Benzolsulfensäure*, $C_{12}H_{11}NS$, aus Phenylschwefelchlorid in Ä mit Anilin; farblose Krystalle, F. 53—55°; sll. — *Anilid der p-Toluolsulfensäure*, $C_{13}H_{13}NS$, aus Anilin u. *p*-Tolylschwefelchlorid in Ä.; Nadeln, aus Gasolin, F. 81° bis 81°; meist ll. Gibt mit HNO_2 in Eg. (blauviolette Lsg.) *p,p'*-Dityldisulfoxyd, F., aus A., 75,5—77° u. Diazoniumsalz. — *Imid der Benzolsulfensäure*, $C_{12}H_{11}NS$, aus Phenylschwefelchlorid mit NH_3 in Ä.; zuerst intensive Violettfärbung, dann gelb; farb- u. geruchlose Krystalle, durch Ausfrieren aus Ä. oder Toluol; sintert vor 120° ab; F. 126,5—128° (korr.) unter NH_3 -Entw. zu einer violetten Fl. — Die Rk. mit *p*-Tolylschwefelchlorid u. NH_3 verläuft ganz analog; zuerst Violettfärbung, dann orange; ein noch leicht rot gefärbtes Prod. schm. bei 103° unter Zers. — Ein Vers. ω -Chloräthylphenylsulfid durch intramolekulare Friedel-Craftssche Rk. in 2,3-Dihydrothionaphthen zu verwandeln, führte nur zu harzigen MM., desgleichen Verss. mit Phenyl- u. *p*-Tolylschwefelchlorid. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. **58**. 409—16.) BUSCH.

Hans Lecher, *Beiträge zum Valenzproblem des Schwefels*. VIII. (VII. vgl. LECHER u. SIMON, Ber. Dtsch. Chem. Ges. **55**. 2423; C. **1922**. III. 1125.) Vf. hat die gleiche Ansicht über den Reaktionsverlauf der Disulfidspaltungen wie STEINKOPF u. MÜLLER (Ber. Dtsch. Chem. Ges. **56**. 1926; C. **1923**. III. 1310) schon früher (vgl. Ber. Dtsch. Chem. Ges. **53**. 577; C. **1920**. III. 45) geäußert.

Über *Diphenyltrisulfid* und *Diphenyltetrasulfid*. (Gemeinsam mit **Fritz Holschneider**). Wenn man in Radikalen, wie Triphenylmethyl, einen am radikalbildenden Element befindlichen Arylrest durch die Radikalgruppe ersetzt, also in Triphenylmethyl eine Phenylgruppe durch Triphenylmethyl, wobei das nur monomere bekannte Pentaphenyläthyl entsteht, so wird die Neigung zur Radikalbildung sehr stark erhöht. Vf. nennt dies Prinzip das Goldschmidt-Schlenksche Prinzip (vgl. SCHLENK u. MARK, Ber. Dtsch. Chem. Ges. **55**. 2285; C. **1922**. III. 1340; GOLDSCHMIDT u. LIEBIGS Ann. **437**. 208; C. **1924**. II. 950). Dies Prinzip wird auch in der Schwefelreihe erprobt: bei Ersatz der Phenylgruppe im Phenylschwefelrest C_6H_5S- durch die Phenylschwefelgruppe kommt man zur Gruppierung $C_6H_5 \cdot S \cdot S-$, deren Dimere das Diphenyltetrasulfid darstellt. Verss., bei dieser Verb. Dissoziationserscheinungen zu beobachten, führten zu dem Ergebnis, daß Konstellationen, die bei anderen Elementen zur Radikalbildung führten, beim S diesen Effekt nicht hatten; vermutlich wegen des negativen Charakters der Atomgruppen mit einwertigem S. Atomgruppen $Ar \cdot S-$ oder $Ar \cdot S \cdot S-$ besitzen eine deutliche Elektronenaffinität, da sie leicht in Anionen übergehen, da die entsprechenden H-Verbb. $Ar \cdot S \cdot H$ Säuren sind; daher treten diese Radikale nicht monomer auf. — *Diphenyltrisulfid*, $C_{12}H_{10}S_3$, aus Thiophenol u. SCl_2 in Ä.; farblose Krystalle, F. gegen -5° (unscharf); F. des reinen Stoffes wohl 2—3° höher; riecht schwach; mischbar mit organ. Lösungsmm. bei 186—190° u. 1 mm Druck dest. hauptsächlich *Diphenyldisulfid* als Zers.-Prod.

Das Trisulfid entsteht auch, aber unreiner, aus *Bisdiäthylamid der Sulfoxylare*, das durch HCl in SCl_2 u. Diäthylaminhydrochlorid zerlegt wird, u. Thiophenol oder aus *Phenylschwefelrhodanid* oder *Phenylschwefelchlorid* u. H_2S . Mit Hg gibt das Trisulfid HgS u. *Diphenyldisulfid*. — *Diphenyltetrasulfid*, $\text{C}_6\text{H}_5\text{S}_4$, aus Thiophenol u. Schwefelchlorür in Ä.; schwach gelbe Krystalle, F. 34–35°; sll. Die Lsgg. zeigen starke Thermochromie; eine bei Zimmertemp. schwach blugrüne Xylollsg. ist bei 140° intensiv gelb gefärbt. Sehr zersetzlich; bei der Dest. im Hochvakuum (170–190°) B. von Diphenyldisulfid. Gibt mit Hg schon bei Zimmertemp. HgS + Disulfid, daneben freien S. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58. 7–22.) BUSCH.

Hans Lecher, Karl Köberle und Paul Stöcklin, *Beiträge zum Valenzproblem des Schwefels*. IX. Über eine neue Klasse organischer Radikale (VIII. vgl. vorst. f.) Vff. untersuchen den Einfluß der Gruppe $\text{C}_6\text{H}_5\cdot\text{S}$ — auf die Tendenz des N. zur Radikalbildung. — Werden im Hydrazin die 4 H-Atome durch $\text{C}_6\text{H}_5\text{S}$ -Reste ersetzt: $\text{H}_2\text{N}-\text{NH}_2 \rightarrow (\text{C}_6\text{H}_5\cdot\text{S})_2\text{N} + \text{N}(\text{S}\cdot\text{C}_6\text{H}_5)_2$, so entsteht ein Hydrazinderiv., das sich bei der Dehydrierung des *Imids der Benzolsulfensäure*, $(\text{C}_6\text{H}_5\cdot\text{S})_2\text{NH}$ (vgl. letztes Ref.) bilden muß. — Das Imid gibt beim Schütteln einer 1%ig. Lsg. in sol. Ä. oder Bzl. mit PbO_2 u. trockenem K_2CO_3 eine intensiv violette Lsg., deren Farbe bei axialer Durchsicht eines langen Rohres durch Verdünnen viel tiefer getrübt wird. Es liegt also ein Dissoziationsgleichgewicht vor, dessen kleinerer Partner violett gefärbt ist. Aus der violetten äth. Lsg. erhält man nach Absaugen bei tiefer Temp. farblose Krystalle, die sich in organ. Lösungsmm. wieder violett lösen u. das in Lsg. weitgehend in *Radikale* $(\text{C}_6\text{H}_5\cdot\text{S})_2\text{N} \dots$ mit zweiwertigem N. spaltene Hydrazin enthalten. Beim Schütteln mit PbO_2 , zu lange oder mit zu viel, wird das Radikal verändert, Ag_2O zerstört es momentan. — Das *Imid der Nitrobenzolsulfensäure* zeigt ein analoges Verh.; es ist l. in Nitrobenzol bei 25° (0%, in Chlf. 0,2%. — Lsgg. des *Anilids der p-Toluolsulfensäure*, in Ä. oder Bzl. werden beim Schütteln mit PbO_2 rot. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58. 423–24. Leipzig i. B. Univ.) BUSCH.


A. Roux und Jh. Martinet, *Perylen*. Angaben über verschiedene Herstellungsmethoden des Perylens, über Oxy-, Nitro- u. Aminoderivv., über Perylendinitril, Perylendicarbonsäure, Dibenzoylperylen u. Farbstoffe aus Perylentetracarbonsäureimid. (Rev. gén. des Matières colorantes etc. 1924. 306–8. 340–42.) SÜVERN.

Kurt Brass und Grete Nickel, *Phenanthrenchinon-3-azid und seine saure Zersetzung*. (Vgl. S. 1207.) *Phenanthrenchinon-3-azid* zeigt bei der Zers. mit H_2SO_4 ein Verh., das durchaus verschieden ist von dem des 2- u. 4-Azids u. dadurch bedingt ist, daß die 3-Stellung einer Ketogruppe in *p* gegenübersteht.

Versuche. *3-Nitrophenanthrenchinon*, aus Acetylsalpetersäure u. 9,10-Diaminophenanthren nach SCHMIDT u. SÖLL (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 41. 3679; C. 1908. 1868); aus Eg., F. 260°; aus Nitrobenzol, F. 275°. — *3-Aminophenanthrenchinon*, $\text{C}_{14}\text{H}_9\text{O}_2\text{N}$, aus der NO_2 -Verb. mit Hydrosulfit in NaOH ; aus A. (l. mit dunkelroter Farbe, F. 256°; braune Nadeln, aus Eg. In Bzl. u. Xylol gelb l., in konz. H_2SO_4 braun. — *Monozim*, braunrote Blättchen, aus A., F. 247°. — Färbt ungebeizte Schafwolle rot. — *Phenanthrenchinon-3-diazoniumperbromid*, aus der Aminoverb. durch Diazotieren mit Nitrosylschwefelsäure u. Behandeln mit Br in Br -Lsg. — *Phenanthrenchinon-3-azid*, $\text{C}_{14}\text{H}_7\text{O}_2\text{N}_3$, aus dem Perbromid mit 10%ig. NH_3 -Lsg.; swl. in A. mit rotbrauner Farbe; braune Nadeln, F. 186°. Verpufft im h. Reagenzrohr unter Entw. von rotem Dampf, der sich als braunvioletter Anhang absetzt; dieser ist l. in konz. H_2SO_4 violettbraun. — *Phenanthrophenazin-3-azid*, $\text{C}_{14}\text{H}_{11}\text{N}_5$, gelbe Nadeln, aus Pyridin, F. 183°; l. in konz. H_2SO_4 rotviolett, in A. mit gelber Farbe. — Phenanthrenchinon-3-azid gibt bei der Zers. mit H_2SO_4 2 : 1 ein schwarzes Prod., darin große Mengen von *3-Aminophenanthrenchinon*. —

Acetylverb. des 3-Oxyphenanthrenchinons, $C_{16}H_{10}O_4$, Nadeln, aus Essigsäureanhydrid, F. 200°. — Verd. H_2SO_4 1 : 3 läßt das 3-Azid zum größten Teil, 17%ig. H_2S auch bei längerem Kochen ganz unzersetzt; bei stundenlanger Einw. von k., konz. H_2SO_4 werden 70% 3-Amin zurückerhalten. — Die gasförmigen Prodd. der Zersetzung des 3-Azids mit konz. H_2SO_4 enthielten kein Stickoxydul. Bei der volumetrischen Bestimmung der Azide ist die Methode von MEHNER (Journ. f. prakt. Ch. [2] 63. 304; C. 190. I. 1374) der von DUMAS vorzuziehen. (LIEBIGS Ann. 441. 217—27. Stuttgart-Rheinland, Dtsch. Forsch.-Inst. f. Textilind.)

Dan. Radulescu und Victor Georgescu, Über eine allgemeine Methode zur Synthese von Polyspiranen. (Vorläufige Mitt.) (Vgl. RADULESCU, Bulet. Societ. Stiint. din Cluj 1. 628; C. 1924. I. 2250.) Die Dinatriumverb. der aus Aldehyden u. cycl. β -Diketonen erhaltenen Kondensationsprodd. geben beim Umsetzen mit CH_2 in äth. Lsg. Dispirane. — Dinatriumsalz des Methylenbisdimethyldihydroresorcins, $C_{17}H_{22}O_4Na_2$, aus der nach VORLÄNDER (LIEBIGS Ann. 294. 316) dargestellten freien Verb. in A. durch Zugabe von C_2H_5ONa ; prismat. Krystalle. Hieraus durch







Schütteln mit äth. Jodlsg.: cyclo-Propanbisdimethyldihydroresorcindispiran (nebenst.), aus monokline Nadeln, F. 211—212°.


— Dinatriumsalz des Methylenbisphenyldihydroresorcins, $C_{25}H_{22}O_4Na_2$ (vgl. VORLÄNDER, LIEBIGS Ann. 309. 380). Hieraus cyclo-Propanbisphenyldihydroresorcindispiran, $C_{25}H_{22}O_4$, aus A. weiße Nadeln, F. 218—219°. (Bull. Soc. Chim. de France [4] 37. 187—89.)

HABERLAND

George Alfred Edwards, William Henry Perkin jun. und Francis Wilb. Stoyale, Neue Synthesen der Meconine. Vff. beschreiben eine neue u. direkte Methode zur Synthese von Meconin (I) u. m-Meconin (III), ferner eine indirekte Methode von ps-Meconin (II). Veratrumsäure kondensiert sich nicht mit s. Dichlordimethyläther



oder k. Formaldehyd, wohl aber beim Kochen mit überschüssigem Formaldehyd und konz. HCl. Es bildet sich das entsprechende Meconin nach der Gleichung:







Die Ausbeuten betragen bis zu 30%. Der Formaldehyd hat in o-Stellung zum Carboxyl angegriffen, wie durch die Identität mit dem aus Opiansäure (IV) erhaltenen Prod. erwiesen wurde. Durch Oxydation mit MnO_2 wird I in IV übergeführt u. dadurch eine neue Synthese für Opiansäure geschaffen. Durch Oxydation von IV wird die Hemipiansäure, F. 177°, erhalten. Vom Anhydrid der Hemipiansäure, Nadeln, F. 179°, ausgehend ist durch Red. mit Zn-Staub u. Eg. die indirekte Synthese von II möglich. Von II durch Oxydation zur ps-Opiansäure zu gelangen scheint das m-Meconin (III) wird aus m-Veratrumsäure u. Formaldehyd gewonnen. Lactonring von III wird durch Eg. leicht wieder geöffnet u. führt so zu 4,5-dimethoxy-2-carboxybenzylalkohol, Nadeln, F. 146—149°, der durch konz. Alkali wieder in III zurückgeht. m-Opiansäure (V) wurde zwar in geringer Menge durch

oxydation von *m*-Meconin mit MnO_2 erhalten u. über das Phenylhydrazon, Nadeln, 155—157°, gereinigt, doch ist dies keine Methode zur Darst. größerer Mengen. **III** wird mit alkal. KMnO_4 in guter Ausbeute die *m*-Hemipinsäure, gelb, F. 203° (ers.) erhalten. Der Methylenäther von 4,5-Dioxyphthalid konnte nicht durch Kondensation von Piperonylsäure mit Formaldehyd erhalten werden. — *o*-Veratrumure, F. 120—122°, wird aus *o*-Veratrumaldehyd durch Oxydation mit KMnO_4 gewonnen, das langsam zu der sd. alkal. Lsg. der Säure gegeben wird. — Meconin, $\text{C}_{10}\text{H}_{10}\text{O}_4$ (I), Prismen aus W. [vom F. 102°. — Opiansäure, $\text{C}_{10}\text{H}_{10}\text{O}_5$ (V), aus I durch st. Kochen mit KMnO_4 in H_2SO_4 -saurer Lsg.; Prismen aus h. W. vom F. 146°. — Veratrumsäure, F. 179°, in halbgelatinösem Zustand aus dem Aldehyd durch oxydation mit KMnO_4 . — *m*-Meconin, $\text{C}_{10}\text{H}_{10}\text{O}_4$ (III). (Journ. Chem. Soc. London 7. 195—99. Oxford, DYSON PERRINS Lab.)

HORST.



L. Claisen und E. Tietze, Über den Mechanismus der Umlagerung der Phenoläther. (Vgl. Ztschr. f. angew. Ch. 36. 478; C. 1924. I. 178.) Sicher in einigen, wahrscheinlich aber in sämtlichen Fällen ist der Mechanismus der Allylätherumlagerung so, daß bei den Phenolallyläthern $\text{C}_6\text{H}_5 \cdot \text{O} \cdot \text{CH}_2 \cdot \text{CH} : \text{CH}_2$ das Allyl nicht mit demjenigen C-Atom α , mit dem es sich von dem O ablöst, in den Benzolkern eintritt (Schema I), sondern daß dies unter gleichzeitiger Verschiebung der Doppelbindung von β , γ nach α , β mit dem End-C-Atom γ geschieht entsprechend Schema II. — Von der direkten Alkylierung durch Umsatz von $\text{Br} \cdot \text{CH}_2 \cdot \text{CH} : \text{CH} \cdot \text{R}$ mit Na-Phenolaten in Bzl. ist festgestellt, daß sie das Alkyl mit demselben C-Atom, mit dem es an das Halogen gebunden war, in den Benzolkern eintreten läßt, so daß ein Vergleich von auf den zwei verschiedenen Wegen hergestellten Alkyläthern die Frage entscheidet. — In dem Maße, wie (vgl. Schema II.) durch die erhöhende Temp. der Zusammenhang zwischen dem Allyl u. dem O gelockert und schließlich ganz aufgehoben wird, tritt durch gleichzeitig erfolgenden Bindungsschmel im Kern eine neue Valenz am o-C-Atom hervor (vgl. III.), von der das Allyl im selben Augenblick, wo es sich von dem O völlig ablöst, an dem räumlich nächst liegenden γ -C-Atom erfaßt wird; nach erfolgtem Eintritt des Allyls in den Kern schnellte dann das System aus der ketoniden wieder in die phenolide Form zurück; keinesfalls verbindet sich das Allyl schon vor der Ablösung vom O mit dem o-C-Atom.



Versuche. Cinnamylbromid, aus Zimtalkohol in 48%ig. HBr; F. 28,2°; 28,1°; Kp.₁₅ 130—131°; nicht haltbar. — Gibt mit methylalkoh. Na-Phenolat Phenolcinnamyläther, Nadeln, aus h. Bzn., F. 66—66,5°; Kp.₁₃ 189—191°. — *p*-Kresoläther, F. 78—79°. — Der Äther gibt bei der Hydrierung den Phenoldihydrocinnamyläther. — Phenolcinnamyläther gibt in sd. N-Diäthylanilin *o*- α -Phenylallylphenol, $\text{C}_{14}\text{H}_{14}\text{O}$; Kp.₁₂ 183—185°; erstarrt nicht bei -20°; geruchloses Öl, FeCl_3 nicht färbend. — Phenylcarbaminat, $\text{C}_{22}\text{H}_{19}\text{O}_2\text{N}$, Nadelchen, aus Bzl.-Bzn., F. 91—91,5°. — Das Phenol gibt in Eg. mit HBr 2-Methyl-3-phenylcumarin, $\text{C}_{15}\text{H}_{14}\text{O}$ (IV.); farbloses Öl, angenehmer Blumengeruch; Kp.₁₃ 167—168°; Kp.₇₆₀ 306°. — Das wahre Cinnamylphenol hat F. 56°, Kp.₁₁ 208—209°. — *p*-Kresolcinnamyläther gibt bei der Umlagerung *o*- α -Phenylallylkresol, Kp._{12,5} 191°. — Phenylcarbaminat, $\text{C}_{22}\text{H}_{21}\text{O}_2\text{N}$,

Nadeln, aus Bzl.-Bzn., F. 113,5—114,5°. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58. 275—8. Godesberg a. Rh.) BUSCH.

Jules Meyer, Über eine Reaktion zwischen Diazodesoxybenzoin (Phenylbenzoyldiazomethan) und Schwefelkohlenstoff. 26. Mitt. über aliphatische Diazoverbindungen (25. Mitt. vgl. STAUDINGER, Helv. chim. Acta 5. 87; C. 1922. III. 1002.) Da STAUDINGER u. SIEGWART (Helv. chim. Acta 3. 837; C. 1921. III. 217) nicht gelungen war, aus Diphenyldiazomethan u. CS₂ ein S-haltiges Prod. zu gewinnen, hat Vf. Phenylbenzoyldiazomethan (Diazodesoxybenzoin) mit CS₂ zur Rk. gebracht. Dabei entsteht mit ca. 90% Ausbeute eine Verb. von der Konst. II., denn sie zerfällt mit sd. alkoh. KOH in H₂S, Benzoesäure, Phenylelessigsäure u. Thiobenzilsäure. Das prim. Rk.-Prod. ist offenbar das β-Lacton I., das unter halbseitiger Benzilsäureumlagerung in das beständigere γ-Lacton II. übergeht. — Eine I. analoge Verb. aus Diphenyldiazomethan kann eine solche Umlagerung nicht erfahren u. muß daher in CS₂ u. Tetraphenyläthylen zerfallen.



γ-Thiolacton der α,γ,γ-Triphenyl-α-benzoyl-β-ketobutandithiocarbonsäure C₂₉H₂₀O₂S₂ (II.). 30 g Phenylbenzoyldiazomethan u. 160 ccm CS₂ werden 2 Tag gekocht. Krystalle aus CS₂, F. 153—154°, unl. in W., wl. in A., Ä., ll. in B. Chlf., Eg., CS₂. Beständig gegen w. konz. HCl u. sd. Anilin. Reagiert nicht mit CuSO₄ in Eg. (Helv. chim. Acta 8. 38—41. Zürich, Techn. Hochsch., u. Lyon.)




A. Verley und **J. Beduwé**, Allgemeine Methode zur Darstellung substituierter Indolderivate. (Vgl. VERLEY, Bull. Soc. Chim. de France [4] 35. 1039; C. 1924. 2032.) Nach der l. c. angegebenen Methode wurden durch Schmelzen von Acyltoluidinderivv. mit Natriumamid weitere α-Indolderivv. dargestellt. Aus Propion-o-toluidin, aus PAe. F. 89,5°, wurde durch 1/4-std. Erhitzen mit der 2 1/2-fach Menge NaNH₂ auf 250—260° erhalten: α-Äthylindol aus PAe. silberglänzende Nadeln, F. 43°, Kp.₅ 142—143°; Geruch ähnlich wie Methylindol, aber fruchtartig. — Butyryl-o-toluidin, Nadeln, F. 75°; hieraus α-Propylindol, aus PAe. durchsichtige Tafeln, F. 34°, Kp.₅ 147—148°. — Valeryl-o-toluidin, F. 79°; hieraus α-i-Butylindol aus PAe. Prismen, F. 42,5°, Kp.₅ 149—150°. Geruch blütenartig. (Bull. Soc. Chim. de France [4] 37. 189—91. Ile Saint-Denis, Établ. VERLEY.) HABERLAND.

Richard Willstätter, **Franz Seitz** und **Julius v. Braun**, Hydrierung von Indols zum Perhydroindol und zum Hexahydro-o-äthylanilin. (Vgl. v. BRAUN, BAYER u. BLESSING, Ber. Dtsch. Chem. Ges. 57. 392; WILLSTÄTTER u. v. BRAUN, Ber. Dtsch. Chem. Ges. 51. 767; C. 1924. I. 2260. 1918. II. 364.) Eine Nachprüfung der vorst. zitierten Arbeiten zeigte, daß nur die Hydrierung mit Pt zum Perhydroindol führt, u. daß andererseits mit Ni bei 225° Ringöffnung zum o-Äthylanilin zum Hexahydro-o-äthylanilin erfolgt, aber keine B. von Hydroindol. — Perhydroindol, Kp.₁₂ 64—65°; Kp.₇₆₀ 185,5°; D.₂₀ 0,9472; n_D²⁰ = 1,4892; Mol.-Refr. g 38,15; ber. 38,34; Chlorplatinat, F. 172—173°; Pikrat, F. 137—138°; Benzolsulfonver. F. 70—71°. — Hexahydro-o-äthylanilin, C₈H₁₇N, Kp.₁₂ 53°; Kp.₇₆₀ 170—171°. D.₂₀ 0,8744; n_D²⁰ = 1,4682; Mol.-Ref. gef. 40,43; ber. 40,36; Chlorplatinat, F. 2 bis 239°; Pikrat, F. 189—190°. — Quatern. Jodid C₁₁H₂₄NJ. — Benzolsulfonver. F. 121—122°, unl. in Alkali. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58. 385—87. München, Bayer. Akad. d. Wiss. u. Frankfurt a. M., Univ.) BUSCH.

Julius v. Braun und **Otto Bayer**, Zur Kenntnis der katalytischen Hydrierung von Indolbasen. (Vgl. vorst. Ref.) Vf. haben die früher (l. c.) erhaltenen Resultate nachgeprüft. Der Pyrrolidinring ist in den bicycl. Perhydroindolbasen umfester gebaut u. um so weniger leicht durch Einlagerung von H zu sprengen,



er mit Alkylresten beladen ist u. je näher diese zum N stehen. — Bzgl. der ge der *Hydrierung des Carbazolkomplexes* (vgl. v. BRAUN u. RITTER, Ber. Dtsch. m. Ges. **55**. 3792; C. **1923**. I. 598) sind Vff. der Ansicht, daß die Verbb. von ESKIN u. PLANT (Journ. Chem. Soc. London **125**. 1903; C. **1924**. II. 1347) keine erlderivv. sein können u. der Formel I. entsprechen.

Versuche. α -Methylketol gibt bei der Hydrierung bei 200° *o*-Propylanilin, Methyl-4,5-tetramethylenpyrrol u. α -Methyloktahydroindol, $C_9H_{17}N$; Kp.₁₆ 76°; 751 188°, D.¹⁸₄ 0,9150. — Quatern. Jodmethylat, F. 197°; Benzolsulfoverb., aus A., 20—121°. — Bei einer Hydrierungstemp. von 240—250° oder einer Nachhydrierung Oktahydromethylindols entsteht *o*-Propylhexahydroanilin, $C_9H_{19}N$; D.¹⁹₄ 0,8752; 14 60°; Benzolsulfoverb., unl. in Alkali, F. 131—132°; quart. Jodmethylat H₂₆NJ, F. 208—210°. — Skatol gibt bei der Hydrierung bei 205° Oktahydroskatol, I₁₇N, Kp.₁₅ 75°; D.¹⁷₄ 0,9080; Pikrat, F. 150°; Jodmethylat C₁₁H₂₂NJ, F. 197°, 250° die Base C₉H₁₉N (II.); Kp.₁₅ 68°; D.¹⁷₄ 0,8790; Benzolsulfonylderiv., F. 132°; rat, F. 194—195°. — 1,2-Dimethylindol gibt bei 200° neben dem Tetramethylen-rolkörper ganz reines Dimethylperhydroindol (III.) u. bei 240° daneben nur zu



o-Propyl-N-methylhexahydroanilin. — 3-Äthylindol, Kp.₁₄ 150°, F. 43°; Pikrat, trote Nadeln, F. 121°; B. nach ARBUSSOW aus Butyraldehydphenylhydrazon mit I bei 200°. Die von PICTET u. DUPARC (Ber. Dtsch. Chem. Ges. **20**. 3415) erene Verb. dürfte kaum 3-Äthylindol gewesen sein. Es gibt bei der Hydrierung 235° *o*-i-Butylhexahydroanilin, $C_{10}H_{21}N$, Kp.₁₈ 92°; D.¹⁷₄ 0,8900; riecht nach ierling; Chlorhydrat, ll. in W., F. 212—214°; Pt-Salz, aus W., F. 217° (Zers.); rt. Jodid C₁₅H₂₃NJ, F. 236—237°. Gibt mit HNO₂ *o*-i-Butylcyclohexanol, Kp. as über 220°. — 1-n-Butylindol, C₁₂H₁₅N, aus Indol mit K u. n-Butylbromid; 145°; erstarrt nicht bis -60°, besitzt nicht unangenehmen Geruch, färbt den htenspan rot, D.¹⁸₄ 1,002. Gibt bei der Hydrierung bei 235° im wesentlichen i-Butylperhydroindol, C₁₂H₂₃N; Kp.₁₆ 102—103°; riecht schierlingartig; D.¹⁶₄ 0,8873; rat, aus A., F. 135°. — Daneben entsteht *o*-Äthylhexahydroanilin, Benzolsulfoverb., A., F. 122°. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. **58**. 387—93. Frankfurt a. M., Univ.) Bu.



Nevil Vincent Sidgwick und Sidney Glenn Preston Plant, Einige koordinierte Verbindungen der Alkalimetalle. Verbb. mit kovalentem Alkalimetall werden alten, wenn auf *ps*-Indoxylspirocyclopentan (I) konz. Alkalien (1 : 4) einwirken.



diesen Verbb. ersetzt ein Metallatom ein H-Atom in 2 Moll. Beim Erhitzen d ein Mol. abgespalten, wobei das einfache Salz C₁₂H₁₂ONNa zurückbleibt. Die ordination, die der Indoxylring zwischen N u. O hervorruft, kann durch das late Ringschema von 6 Atomen mit zwei konjugierten Doppelbindungen wie II eutet werden. Die Wrkg. der starken Alkalien besteht darin, die Ionisation ser koordinierten Verb. zu verhindern. Mit der kovalenten Eigenschaft des tallatoms in dem Doppelmol. hängt wohl auch die große Löslichkeit in Toluol ammen. Es wurden dargestellt das *Na-Deriv.*, C₁₂H₁₂ONNa, C₁₂H₁₃ON, farblose smen vom F. 204°, das *K-Deriv.*, farblose Blättchen vom F. 80—90°, das *Li-Deriv.* F. 170°; doch konnte diese Verb. mit Li nicht gereinigt werden, da sie wenig bil ist. (Journ. Chem. Soc. London **127**. 209—11. Oxford, DYSON PERRINS orat.)

HORST.


Jan Kalff und Robert Robinson, *Eine Synthese von Myricetin und ein Galanginmonomethylester, der in der Galangawurzel vorkommt*. Vff. haben an der Methode von ALLAN u. ROBINSON (vgl. S. 84) 5,7-Dioxy-3-methoxyflavon (I) halten können, welches mit dem Galanginmonomethylester aus *Alpinia officinarum* ident. ist. Durch die Synthese wurde die Stellung der Methylgruppe in 3 bestätigt. Galangin selbst wird durch Entmethylierung dargestellt. — *Myricetin* (II), 3,5,7,3',4'-Hexaoxyflavon, wird gewonnen durch Erhitzen von ω -Methoxyphloracetophenon Gallussäuretrimethylätheranhydrid u. dem Na-Salz der Trimethyläthergallussäure nachfolgender Hydrolyse. Wird das erhaltene 5,7-Dioxy-3,3',4',5'-tetramethoxyflavon entmethyliert, so entsteht Myricetin in verhältnismäßig guter Ausbeute.



Versuchsteil: ω -Methoxyphloracetophenon, Na-Benzooat u. Benzoesäureanhydrid werden 8 Stdn. im Ölbad bei 180° erhitzt. Über die Diacetylverb., $C_{20}H_{16}O_7$, reinigend die aus A. umkrystallisiert bei 175—176° schm. (gelbe Nadeln). Durch Hydrolyse entsteht Galangin-3-monomethylester, $C_{16}H_{12}O_5$, aus A. gelbe Blättchen vom F. 230°. Eigenschaften u. Mischschmelzpunkt erweisen die Identität mit dem natürlichen Produkt. Mit HJ u. Eg.-Anhydrid tritt Entmethylierung ein. B. von Galangin (F. 214—215°) ein. — *Myricetin-3,3',4',5'-tetramethyläther*, $C_{19}H_{18}O_8$, gelbe Blättchen vom F. 270° bis 277,5° aus A. — *Diacetat*, $C_{23}H_{22}O_{10}$, gelbe Nadeln aus A. vom F. 159°. — Nach Entmethylierung erfolgt durch 2-std. Erhitzen mit HJ u. Essigsäureanhydrid. *Myricetin*, $C_{15}H_{10}O_8$, gelbe Nadeln aus wss. A., schm. etwa bei 360°. — *Hexaoxyflavon*, $C_{27}H_{22}O_{14}$, aus A. farblose Nadeln, F. 214—215°. (Journ. Chem. Soc. London 1925, 181—84. Manchester, Univ.)

HORST

E. Wedekind, M. Miller und Cl. Weinand, *Über die Einwirkung von Triäthylamin auf die Chloride der Adipinsäure und β -Methyladipinsäure*. Nach vorhergegangenen Verss., die Chloride der einfachsten Dicarbonsäuren mit tertiären Basen zu kondensieren, prüften Vff. die Chloride der Adipinsäure u. der β -Methyladipinsäure auf ihr Verh. gegen Triäthylamin u. Pyridin. — Adipinsäurechlorid reagiert mit Triäthylamin heftig unter B. eines Kondensationsprod. $C_8H_6O_2$, dem nach dem Bestst. der Vff. das doppelte Mol.-Gew. zukommt. Wahrscheinlich entsteht zunächst ein Diketen (I), das sich dimerisiert zu II oder III:




Gegen Formel II sprechen die Farblosigkeit der Verb. u. das Ausbleiben für 1,2-Diketone charakterist. Rkk. Vff. entscheiden sich daher vorläufig für Formel III, die einem *cyclo-Dekan-bis-cyclo-butandion* entspricht. Die Verb. ließe allerdings nicht das zu erwartende Tetraphenylhydrazon, sondern nur ein Diphenylhydrazon, vielleicht infolge ster. Hinderung der beiden inneren CO-Gruppen. Oxidation mit Perhydrol oder Na_2O_2 führte zu zwei den Formeln $C_{10}H_{14}O_4$ u. $C_8H_6O_2$ entsprechenden Säuren von unbekannter Konst. Red. des Kondensationsprod. führte zu Adipinsäure.

Pyridin ergab kein Kondensationsprod., sondern Adipinsäure. Ähnlich liefern

Methyladipinsäurechlorid u. Triäthylamin das Anhydrid der β -Methyladipinsäure. Auch hier vorübergehend ein Diketen gebildet wurde, ließ sich durch Behandeln Reaktionsgemisches mit absol. A. nachweisen, mit dem der zu erwartende Methyladipinsäureäthylester entstand. — Adipinsäurechlorid setzt sich bei Ggw. Zn Spänen mit Ä. zu Adipinsäurediäthylester um. — *cyclo*-Dekan-bis-*cyclo*-butan-2-ol (?), $C_{12}H_{12}O_4$ (III.), unter Luftabschluß (ein besonderer App. wird beschrieben) Adipylchlorid u. Triäthylamin, F. 141—142°, unl. in W., Lg., Ä. u. Alkalien, in Bzl., Eg., A. u. starker HCl. — *Diphenylhydrazon*, $C_{24}H_{24}O_2N_4$, F. 182—184°. — *Leibsa. Säure* $C_{10}H_{14}O_4$, F. 170—171°, unl. in Bzl., Ä., Lg., Chlf. u. CCl_4 , ll. in h. A. u. Aceton. — *Pb-Salz*, $Pb(C_{10}H_{12}O_4)$ (Druckfehler im Original). — *Säure* $C_{10}O_8$, F. 81—82°, l. in Ä., A. u. Bzl. — *Adipinsäurediäthylester*, $C_{10}H_{18}O_4$, F. 240—245°. — β -Methyladipinsäureanhydrid, $C_7H_{10}O_3$, Kp.₃₀ 225—227°. (Journ. prakt. Ch. 109. 161—74. Hann.-Münden, Forstl. Hochsch.) GOTTSCHALDT.


Wallace Frank Short, Die Kondensation von Phenyläthylamin mit *s*-Dichloräthyläther. Eine Mischung von β -Phenyläthylaminhydrochlorid u. *s*-Dichloräthyläther wird mit wasserfreiem $ZnCl_2$ in äth. Lsg. zunächst bei Zimmertemp. u. in 4 Stdn. auf dem Wasserbad gerührt. Aus dem öligen Rückstand des Ä.-Ausgusses der Vakuumdest. wurde nach Red. mit Sn u. HCl β -Phenyläthylchlorid isoliert. Hauptmenge des Reaktionsprod. (59%) bestand aus Tetrahydro-*i*-chinolin, $C_9H_{11}N$, Kp.₇₆₃ 234°, das über das bei 196° schmelzende Pikrat gereinigt wurde. Aus dem Rückstand der Dest. des Tetrahydro-*i*-chinolins wurden nach Lösen in HCl, Schmelzen mit Tierkohle u. Reinigen aus h. W. farblose Krystalle erhalten, aus denen mit NaOH die Base Bis-(β -phenyläthylamino)-methan, $C_{17}H_{22}N_2$, Nadeln vom F. 153° dargestellt wurde (10% des angewandten β -Phenyläthylamins). Die Diacetylverb. Bis-(β -phenyläthylamino)-methans bildet Nadeln vom F. 191°. (Journ. Chem. Soc. London 127. 269—71. Auckland [New Zealand], Univ.) HORST.

C. Räth, Über intramolekulare Kondensationsreaktionen von Aminoacetalen und Aminoaldehyden. III. Über das 2-Amino-3-methylpyridin und das 1,2-Dihydro-1-methylpyridin. (II. vgl. RÄTH u. PRANGE, Ber. Dtsch. Chem. Ges. 57. 550; C. 1924. 12516.) Das von SEIDE (S. 86) beschriebene 2-Amino-3-methylpyridin ist schon früher (vgl. G. PRANGE, Dissert. Berlin 1923) dargestellt worden. — 3-Methylpyridin gibt mit Natriumamid in Toluol bei 120—130° 2-Amino-3-methylpyridin, $C_6H_8N_2$; Kp.₁₁ 113—116°; aus Bzl. + PAe., F. 103 bis 104°. — $C_6H_8N_2$, HCl:F. 177—178°. — Pikrat: wl., gelbe Nadeln, aus Aceton, F. 229°; ist explosiv. — 2 Mol. geben mit 1 Mol. Bromacetal im Rohr bei 250° 1,2-Dihydronaphthylidin, $C_8H_8N_2$ (nebenst.); hellgelbe Fl., Kp.₁₂ 112—117°. — $C_8H_8N_2$, HCl: ll. in A. (Ber. Dtsch. Chem. Ges. 58. 346—48. Berlin, Landwirtsch. Hochsch.) BUSCH.



F. Kehrmann und **Jack Arnold Schedler**, Über Fluorindine und Fluorindinumsalze. VIII. Mitt. über Fluorindine. (VII. vgl. KEHRMANN u. LEUZINGER, Ilv. chim. Acta 6. 239; C. 1923. I. 1327.) Die Fluorindine werden aus den Komponenten mit sd. Benzoesäure (einige Min.) dargestellt. — 2,3-Dioxynaphthylmazin, $C_{16}H_{10}O_2N_2$. Aus Dioxychinon u. 1,2-Naphthylendiaminchlorhydrat in W. (Wasserbad, $\frac{1}{2}$ Stde.), dann 10%ig. HCl zugeben. Reinigung über das hellgelbe Chlorhydrat. Orangefarbene Krystalle aus Nitrobenzol, meist wl. Lsg. in Alkali gelb, in konz. H_2SO_4 carminrot. Diacetylverb., hellgelbe Nadelchen aus Bzl., F. 217—218°. — Naphthophenofluorindin, $C_{22}H_{14}N_4$ (I. oder II., R = H). Aus dem vorigen u. Phenylendiaminchlorhydrat. Füllen der h. alkoh. Lsg. mit NH_3 . Mkr. grünlich glänzende Kryställchen aus Nitrobenzol, swl. mit starker roter Fluorescenz. In konz. H_2SO_4 -Lsg. trübe blau, mit W. rein blau. — Monophenylderiv., $C_{28}H_{18}N_4$ (I. u. II., R = C_6H_5). Mit o-Aminodiphenylaminchlorhydrat. Aus Nitrobenzol krystallisiert

das eine Isomere in mkr. roten Nadelchen mit denselben Eigenschaften wie d. Muttersubstanz aus. Die Nitrobenzolzuckerlauge gibt mit konz. HCl das violette Chlorhydrat des anderen Isomeren, das, mit NH_3 abgeschieden, aus A. + B. krystallisiert. Die dunkelroten Lsgg. fluorescieren nicht. H_2SO_4 -Lsg. blau. *Dinaphthofluorindin* (III. oder IV.). Mit 1,2-Naphthylendiaminchlorhydrat. Die n. Na-Acetat abgeschiedene Base ist äußerst oxydabel. Das Chlorhydrat fällt aus d. alkoh. Lsg. der Schmelze mit konz. HCl aus u. bildet mkr. bläulich metallglänzende





Kryställchen aus 90%ig. Essigsäure. — *N-Phenylphenanthrophenofluorindin*, $\text{C}_{32}\text{H}_{20}$ (V., $\text{R} = \text{H}$). Aus 2-Amino-3-anilino-7-oxyaposafranon (vgl. KEHRMANN u. STOFFEL, Ber. Dtsch. Chem. Ges. **33**, 395 [1900]) u. o-Phenylendiaminchlorhydrat. Kupferglänzende Nadelchen aus Nitrobenzol, swl. mit violettblauer Farbe ohne Fluorescenz. Lsg. des Chlorhydrats (l. c.) in Eg. u. H_2SO_4 -Lsg. blaugrün. — *N-Phenylderiv.*, $\text{C}_{38}\text{H}_{24}$ (V., $\text{R} = \text{C}_6\text{H}_5$). Mit o-Aminodiphenylaminchlorhydrat über das Chlorhydrat (blaue, kupferglänzende Kryställchen). Dunkelviolette, kupferglänzende Kryställchen aus Bzl., swl. in A. Fluoresciert nicht. H_2SO_4 -Lsg. schmutziggelblich. — *N-Diphenylmethylphenanthrophenofluorindiniumchlorid*, $\text{C}_{39}\text{H}_{27}\text{N}_4\text{Cl}$. Aus dem vorigen in Nitrobenzol mit $(\text{CH}_3)_2\text{SO}_4$, Füllen mit Ä., Zers. in sd. 90%ig. A. mit Na-Acetat Verd. mit W., Ausäthern u. Füllen mit HCl. Dunkelgrüne, kupferglänzende Kryställchen aus A., wl. in W., A., zl. in Eg. (blaugrün). Färbt tannierte Baumwolle aus essigsaurer Lsg. blaugrün, seifenecht u. ziemlich lichtecht. H_2SO_4 -Lsg. trüblich grün, mit W. klar u. blau. — 2-Amino-3-anilino-7-oxyaposafranon, $\text{C}_{24}\text{H}_{18}\text{O}_2\text{N}_4$. Aus Diphenyltetraminobenzoldichlorhydrat u. Dioxychinon in sd. A. über das Chlorhydrat ($\text{C}_{24}\text{H}_{18}\text{O}_2\text{N}_4\text{Cl}$, grünmetallglänzende Nadeln) durch Zers. mit Na-Acetat in A. Braune, grünschimmernde Krystalle aus A., unl. in W., sonst l. (rot). H_2SO_4 -Lsg. schmutzig braun, mit W. blau, dann violett. — 2-Amino-3-anilino-5-phenylfluorindin, $\text{C}_{30}\text{H}_{22}\text{N}_6$ (VI.). Aus dem vorigen Chlorhydrat u. o-Phenylendiaminchlorhydrat in A. Braunviolette, schwach metallglänzende Kryställchen aus Bzl. + A. H_2SO_4 -Lsg. blaugrün, mit W. blau, dann violett. Nitrat, aus der alkoh. Lsg. der Schmelze mit 30%ig. HNO_3 , fast schwarze, schwach messingglänzende Nadelchen, unl. in V. (Helv. chim. Acta **8**, 3—8.)

LINDENBAUM.

F. Kehrman und Jack Arnold Schedler, Über Derivate des Triphenylazoxazins und des Triphenyldioxazins. *N-Phenyltriphenylazoxazin*, $\text{C}_{24}\text{H}_{15}\text{ON}_3$ (I.). A.


Oxyaposafranon u. o-Aminophenolchlorhydrat mittels Benzoesäure. Trennung von triphenldioxazin (aus o-Aminophenol) durch Ausäthern der verd. HCl-Lsg. Grünlich metallschimmernde Nadelchen, Zers. gegen 314° , unl. in W., wl. in A., zl. in A. mit violetter Farbe u. feuerroter Fluorescenz. H_2SO_4 -Lsg. grünlichblau, in W. violettblau. Aus verd. HCl krystallisiert das Chlorhydrat in dunklen, essigglänzenden Nadelchen. Seine Lsg. gibt mit HClO_4 das Perchlorat, $\text{C}_{25}\text{H}_{18}\text{O}_5\text{N}_3\text{Cl}$, metallglänzende Nadeln, mit HNO_3 das ähnliche Nitrat. — Methylammoniumsalze (II): Aus I. mit $(\text{CH}_3)_2\text{SO}_4$ in Nitrobenzol (vorst. Ref.) u. Fällung



der betreffenden Säure. Perchlorat, $\text{C}_{25}\text{H}_{18}\text{O}_5\text{N}_3\text{Cl}$, metall. grüne Nadeln aus $\frac{1}{10}$ ig. A. Nitrat, goldglänzende Blätter, l. in sd. W. (violettblau). Chloroplatinat, $\text{C}_{25}\text{H}_{18}\text{ON}_3\text{Cl}_2\text{PtCl}_6$, mkr. dunkelviolet, kupferglänzende Kryställchen, unl. Diese Salze sind mit den von DIEPOLDER (Ber. Dtsch. Chem. Ges. **32**. 3514 [1899]) beschriebenen, aber anders formulierten Salzen ident. — 2-Oxy-6-chloraposafranon, $\text{C}_{25}\text{H}_{11}\text{O}_2\text{N}_2\text{Cl}$. Aus Dioxychinon u. 5-Chlor-2-aminodiphenylamin. Braunrote Nadeln aus A. Fluoresciert sehr schwach. — Chlor-N-phenyltriphenazinoxazin, $\text{C}_{25}\text{H}_{14}\text{ON}_3\text{Cl}$ (nach I.). Aus dem vorigen wie I. Mkr. braunrote, grünlich-schimmernde Kryställchen aus Bzl., l. in A., Bzl. (rot mit roter Fluorescenz). Salze violettblau. H_2SO_4 -Lsg. wie bei I. — Methylammoniumsalze (nach II.): Nitrat. Chloroplatinat, $(\text{C}_{25}\text{H}_{17}\text{ON}_3\text{Cl}_2)\text{PtCl}_6$. Wie bei I. — Aus Triphenldioxazin u. $(\text{CH}_3)_2\text{SO}_4$ konnten bisher nur Spuren der Methylammoniumverb. (als Perchlorat) gewonnen werden, ident. mit dem auf anderem Wege erhaltenen Prod. (nachst. Ref.). (Helv. chim. Acta **8**. 9—12.)



LINDENBAUM.

F. Kehrman und Georges Wild, Über die Kondensation von Methylphenazinoxazin-o-chinon mit o-Aminophenol und alkylierten o-Diaminen. Aus Methylphenazinoxazin-o-chinon u. o-Aminophenol hatte DIEPOLDER (Zitat vgl. vorst. Ref.) nur triphenldioxazin erhalten. Läßt man jedoch das Chinon mit 2 Mol. o-Aminophenolchlorhydrat in Eg. (+ einige Tropfen HCl) 24 Stdn. bei Zimmertemp. stehen, wird mit W., beseitigt das Triphenldioxazin durch Filtrieren u. Ausäthern, so lassen sich aus der Lsg. Salze gewinnen, die mit denen des methylierten Triphenldioxazins (vorst. Ref.) ident. sind. Das CH_3 befindet sich also am N, u. da ferner die chinoid Formulierung einem höheren Gleichgewichtsgrad entspricht, so wird man in Salzen nicht Formel I., sondern II. erteilen. — Nitrat. Mit $\text{HNO}_3 + \text{NaNO}_3$ aus obiger Lsg. u. Umfällen aus W. + HNO_3 . Mkr. metall. grüne Kryställchen, unl. in W., A. (blauviolett). H_2SO_4 -Lsg. blau. Färbt tannierte Baumwolle u. Filtrierpapier dunkelviolet. — Chloroplatinat, $(\text{C}_{19}\text{H}_{13}\text{O}_2\text{N}_2)_2\text{PtCl}_6$. Aus dem Nitrat.








Krystallin. Pulver, unl. — Über die Identität der nach DIEPOLDER aus obigem Chinon u. o-Aminodiphenylamin erhaltenen Verb. mit dem methylierten N-Phenyltriphenazinoxazin vgl. vorst. Ref. — Die Kondensation des Chinons mit Phenyl-o-naphthylendiamin gelingt nur mit sd. Benzoesäure. Die mit NH_3 isolierte Base wird in A. mit HCl gel., Bzl. u. W. zugesetzt u. geschüttelt.

das Bzl. geht der Teil, der das CH_3 verloren hat. Aus der blauen wss.-alkoh. Lsg. fällt NaNO_3 das Nitrat der neuen Base (nach III.), aus verd. A. + HNO_3 metall. grüne Nadeln, wl. in W., l. in A. H_2SO_4 -Lsg. grünlichblau. Färbt tannierte



Baumwolle u. Filtrierpapier waschecht dunkelblau. Mit sd. verd. NaOH wird das CH_3 abgespalten. — *Chloroplatinat*, $(\text{C}_{29}\text{H}_{20}\text{ON}_3)_2\text{PtCl}_6$. Dunkelblaues Pulver, in unl. — *Perchlorat*, $\text{C}_{29}\text{H}_{20}\text{O}_5\text{N}_3\text{Cl}$. Unl. (Hely. chim. Acta 8. 13—15.) LINDENBAUM.

F. Kehrman und **C. Bener**, *Synthesen der dem Fluo-flavin entsprechende Sauerstoffisologen*. Diese Verbb. werden erhalten, wenn bei der Hinsbergschen Synthese des *Fluo-flavins* (I.) das o-Phenylendiamin ganz oder teilweise durch o-Aminophenol bezw. Brenzcatechin ersetzt wird. Die Farbe erhöht sich in dem Maße, als der Ersatz von NH durch O fortschreitet. Sämtliche Verbb. sind halochrom.



Diphenazinnoxazin, $\text{C}_{14}\text{H}_9\text{ON}$ (II., $\text{R} = \text{H}$). 1. Aus 2,3-Dioxychinoxalin u. 2 Mol. o-Aminophenolchlorhydrat in sd. Benzoesäure (10—15 Min.), Verd. mit A. 2. Aus 1 Mol. 2,3-Dichlorchinoxalin u.



2 Mol. o-Aminophenol bei 160° (weniger vorteilhaft). Kanariengelbe Nadeln aus A. + Bzl., F. 311—312,5°, unl. in W., wl. in A., Bzl., zl. in der Mischung beider mit hellblaugrüner Fluorescenz. H_2SO_4 -Lsg. orangegelb (zweisäuriges Salz), mit W. erst grünlichgelb (einsäurig), dann farblos. Lsg. in konz. HCl grüngelb (einsäurig). Wird von sd. Lauge zers., von $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ u. H_2SO_4 in Eg. zu einem braunroten Prooxydiert. — *Chlorderiv.*, $\text{C}_{14}\text{H}_8\text{ON}_3\text{Cl}$. Aus 6-Chlor-2,3-dioxychinoxalin (nachstef. Ref.). Schwefelgelbe Krystalle aus Bzl. + A., F. 298—299°. Lsg. in H_2SO_4 orangegelb (zweisäurig), in HCl citronengelb (einsäurig). Das Cl ließ sich nicht gegen Aminreste austauschen. — *N-Phenylloxychinoxalin*, $\text{C}_{14}\text{H}_{10}\text{O}_2\text{N}_2$ (V.). (Dargestellt von **P. Leuzinger**.) Aus o-Aminodiphenylaminchlorhydrat u. wasserfreier Oxalsäure (160—180°, 1 Stde.). Nadeln aus W., Zers. bei 302—303°, fast unl. in k. W. — *N-Phenyldiphenazinnoxazin*, $\text{C}_{20}\text{H}_{13}\text{ON}_3$ (II., $\text{R} = \text{C}_6\text{H}_5$). Aus dem vorigen wie die Muttersubstanz. Gelbe Blättchen aus Bzl. + A., F. 207,5—208,5°, sonst wie die Muttersubstanz. — *Diphendioxazin*, $\text{C}_{14}\text{H}_8\text{O}_2\text{N}_2$ (III.). Aus Oxalsäure u. 2 Mol. Aminophenolchlorhydrat mit Benzoesäure (höchstens 200°, 10 Min.). Farblose Blättchen aus A., dann Bzl., F. 259—260°, unl. in W., wl. in A., Bzl. Wird von sd. Lauge zers. Lsg. in konz. H_2SO_4 grünlichgelb (einsäurig), in rauchender H_2SO_4 erst orangefarben (zweisäurig), dann gelb (Sulfierung). — *Diphenazinnoxin*, $\text{C}_{14}\text{H}_8\text{O}_2\text{N}_2$ (IV.). Aus 2,3-Dichlorchinoxalin u. 2 Mol. Brenzcatechin bei 190—200°. Farblose Nadeln aus A., F. 264—265°, unl. in W., wl. in Ä., Bzl. Wird von sd. Lauge zers. Lsg. in konz. H_2SO_4 orangegelb (zweisäurig), mit W. grünlichgelb (einsäurig). (Hely. chim. Acta 8. 16—20.) LINDENBAUM.

F. Kehrman und **C. Bener**, *Über Phenyl- und Halogenderivate des Fluo-flavins*. Vff. beabsichtigten, einerseits über halogenierte Fluo-flavine Aminreste in das *Fluo-flavin* (I. im vorst. Ref.) einzuführen, andererseits an N-phenylierte Fluo-flavine $(\text{CH}_3)_2\text{SO}_4$ anzulagern, Rkk., die in der Fluorindinreihe leicht ausführbar sind, in der Fluo-flavinreihe aber bisher nicht verwirklicht werden konnten. — 6-Chlor-2,3-

oxychinoxalin, $C_8H_5O_2N_2Cl$. Aus 4-Chlor-1,2-phenylendiaminchlorhydrat u. 2 Mol. wasserfreier Oxalsäure bei 220° . Nadeln aus A., F. über 350° , wl. H_2SO_4 -Lsg. (üblich). — *2,3,6-Trichlorchinoxalin*, $C_8H_3N_2Cl_3$. Aus dem vorigen mit PCl_5 bei 20° . Krystalle aus A., F. $143-144^\circ$, unl. in W., wl. in Bzl., ll. in A. H_2SO_4 -Lsg. (üblich). — *3-Chlorfluorflavin*, $C_{14}H_9N_4Cl$. Aus Chlordioxychinoxalin u. 2 Mol. o-Phenylendiaminchlorhydrat in sd. Benzoesäure (20 Min.). Goldgelbe Nadeln aus Eg., unl. in A. + Bzl., F. über 350° , der Muttersubstanz sehr ähnlich. — *3,6-Dichlorfluorflavin*, $C_{14}H_7N_4Cl_2$. Ebenso mit 4-Chlor-1,2-phenylendiaminchlorhydrat. Goldgelbe Nadeln aus Eg., F. über 350° , swl. H_2SO_4 -Lsg. orangegelb, mit W. gelb. Diese die vorige Verb. reagieren nicht mit Anilin. — *N-Phenylfluorflavin*, $C_{20}H_{14}N_4$. Aus Phenylloxychinoxalon (V. im vorst. Ref.) u. 2 Mol. o-Phenylendiaminchlorhydrat in sd. Benzoesäure ($1\frac{1}{2}$ Std.) neben Fluorindin u. farblosen Prodd. Goldgelbe Krystalle aus Bzl. + A., unl. in W., sonst wl. Die Lsgg. wie die H_2SO_4 -Lsg. gelb u. fluorescieren grün. Addiert nicht $(CH_3)_2SO_4$. (Helv. chim. Acta 8. —22.)

LINDENBAUM.

F. Kehrmann und Jean Tschui, Über Carbazone. IV. Mitt. über farbige Derivate des Tetraphenylmethans. (III. vgl. KEHRMANN, RAMM u. SCHMAJEWSKI, Helv. chim. Acta 4. 538; C. 1921. III. 650.) Entsprechend der Umwandlung der Safranine, Oxazine u. Thiazine in Safranone bezw. Safranole, Oxazone u. Thiazone, lassen sich auch die Carbazime (I.) in Carbazone (II.), Amino- u. Oxy-carbazone überführen. Selbst konnte übrigens bisher nicht erhalten werden. — *7-Aminocarbazon-2**) wurde bisher nur in zur Analyse unzureichenden Mengen als Zwischenprod. zur





folgenden Verb. erhalten. Eine Lsg. von 7-Aminocarbazim-2-chlorhydrat*) (II. Mitt.) in 80% ig. A. wird mit 10% ig. NaOH bis zum Umschlag in rot versetzt u. bis zur Blaufärbung gekocht. Fällt mit W. nichts aus, so

erd ausgeäthert u. die äth. Lsg. mit sehr verd. NaOH, Essigsäure, W. gewaschen. Essigglänzende Nadelchen aus A. + W., F. $248-249^\circ$. Die Lösungsfarbe ist von der Natur des Lösungsm. abhängig: in Ä. kirschrot mit ziegelroter Fluorescenz, in Chlf. u. Bzl. orangegelb u. -rot mit gelber Fluorescenz, in k. A. blau, in sd. A. violett. — *7-Oxy-carbazon-2**), $C_{25}H_{17}O_2N$. Man verfährt wie für die vorige Verb., reicht aber bis zur bleibend grünblauen Färbung, läßt den A. verdunsten u. fällt das Filtrat mit Essigsäure. Dunkelbraune, grünlich metallglänzende Tafeln aus Ä., dann A., F. $232-233^\circ$, unl. in W., sonst l. (gelb bis orangegelb). Lsgg. in Ä. /kali u. konz. H_2SO_4 methylenblau. Die Alkalisalze haben also — analog den Deriv. in der Safranin-, Oxazin- u. Thiazinreihe — dieselbe Farbe wie die entsprechenden Salze des Aminocarbazims. — *Acetylverb.*, $C_{27}H_{19}O_3N$. Bräunlichgelbe Nadeln aus Bzl. + PAe., dann Bzl., die an der Luft unter Verlust von Krystallwasser hell orangegelb werden. F. $208-209^\circ$. Die Lsgg. sind gelb. H_2SO_4 -Lsg. grünblau. — *5,7-Diaminocarbazon-2**), $C_{25}H_{19}ON_3$. Aus dem entsprechenden Carbazimchlorhydrat mit NaOH in sd. verd. A. (1:1) (3 Std.), Füllen mit W. Schwarze, grünlich schimmernde Blättchen aus A., F. $277-278^\circ$. Lsgg. in A. rotviolett, Ä. bläulichrot, Bzl. orangegelb. H_2SO_4 -Lsg. trübe blau, mit W. bräunlichviolett. — *Acetylverb.*, $C_{27}H_{21}O_2N_3$. Mit k. Acetanhydrid. Braune, grünglänzende Blättchen aus Bzl. + A., F. $236-237^\circ$. — Setzt man das Kochen im vorigen Vers. bis zur bleibenden Violett färbung fort, so erhält man ein *Amino-oxy-carbazon**), das eine orangegelbe Acetylverb. liefert. (Helv. chim. Acta 8. 23—27.)

LINDENBAUM.

*) Bei diesen Verbb. ist —C(9,9)-diphenyl- zu ergänzen. Die Redaktion.

F. Kehrman und **Jean Tschui**, *Über Methyl-diphenylcarbazin und einige Nitroderivate desselben*. V. Mitt. *über farbige Derivate des Tetraphenylmethans*. (IV. v. vorst. Ref.) Vf. haben Diphenylcarbazin zu I. methyliert u. beabsichtigen, Farbstoffe vom Typus II. zu gewinnen. Die unten beschriebenen NO_2 -Deriv. von I. lassen sich zwar mit SnCl_2 u. HCl reduzieren u. die Red.-Prodd. mit FeCl_3 farbigen Prodd. oxydieren, die aber unbeständig sind u. noch nicht krystallisiert erhalten werden konnten. Die NO_2 -Deriv. sind im allgemeinen heller gefärbt als die des Diphenylcarbazins selbst u. reagieren nicht mit alkoh. Lauge. Die NO_2 -Gruppen treten auch hier in o- u. p zum Ring-N. Die Konst. wurde bestimmt durch Red. mit Sn u. HCl , Entmethylierung mit sd. HBr u. Oxydation mit FeCl_3 wobei das betreffende Carbazin (II. Mitt.) erhalten wurde.



möglichst wenig sd. Eg. gel., abgekühlt u. mit ca. 1,5 Mol. HNO_3 in Eg. verseift (12 Stdn.) Citronengelbe Kryställchen aus Eg. (die 1. Fraktion ist Dinitroderiv., dann A. + Bzl., zl. in A., Bzl., Eg. Wurde zum Diphenylcarbazin-2 abgebaut. 2,7-Dinitroderiv., $\text{C}_{26}\text{H}_{19}\text{O}_4\text{N}_3$. Ebenso mit ca. 2,7 Mol. HNO_3 . Citronengelbe Prismen aus Eg., F. 279° , zwl. in A., Bzl., Eg., leichter in Chlf . Wurde zum 7-Aminodiphenylcarbazin-2 abgebaut. — 2,4,7-Trinitroderiv., $\text{C}_{26}\text{H}_{18}\text{O}_6\text{N}_4$. Aus d. vorigen ebenso mit überschüssiger HNO_3 . Citronengelbe Nadeln aus Eg., F. 30° (Zers.), swl. in A., Bzl. Wurde zum 4,7-Diaminodiphenylcarbazin-2 abgebaut. 2,4,5,7-Tetranitroderiv., $\text{C}_{26}\text{H}_{17}\text{O}_8\text{N}_5$. Man verfährt wie für das vorige u. setzt nach Abscheidung desselben HNO_3 bis zur Lsg. der Krystalle u. nach 6 Stdn. noch etwas HNO_3 zu, gießt dann in W. Gelbe Kryställchen aus Eg., die sich zers., ohne zu schm., swl. Wurde zum 4,5,7-Triaminodiphenylcarbazin-2 abgebaut. (H. chim. Acta 8. 27—31.)

LINDENBAUM.

F. Kehrman, *Konstitution und Farbe*. XI. *Über gesetzmäßige Veränderung der Farbe, welche organische Substanzen saurer Natur bei der Salzbildung mit Basen erleiden*. (X. vgl. S. 500.) In ähnlicher Weise wie für die Salzbildung organ. Basen mit Säuren (VIII. Mitt.) sucht Vf. die Farbänderungen, welche bei der Salzbildung saurer organ. Substanzen mit starken Basen auftreten, gesetzmäßig darzustellen. Obwohl die Atomgruppierungen sauren Charakters zahlreich u. verschiedenartig sind, liegt ausreichendes Beobachtungsmaterial nur für die Gruppierung $\equiv\text{C}\cdot\text{CO}_2\text{H}$, $\equiv\text{C}\cdot\text{OH}$ u. $\text{—C—N}\cdot\text{OH}$ vor. — I. Die Salzbildung von Carbonsäuren hat im allgemeinen merkliche Farberhöhung zur Folge. Vf. verweist auf das Verhalten von LEY, Farbe u. Konst. bei organ. Verbb. — II. Die Salzbildung des Phenol-C (vgl. Chem.-Ztg. 14. Nr. 31 ff. [1890]) wirkt ausgesprochen farbvertiefend; Phenol u. Naphtholsalze zeigen positive Verschiebung im Ultraviolett; die Salze der Nitrophenole, Azophenole, Oxyketone, Oxychinone sind tiefer farbig wie die Verbb. selbst. Folgende interessante Beziehungen werden angeführt u. durch Beispiele belegt: 1. Die Alkalisalze farbiger Phenole u. die entsprechend konstituierten freien Amine einerseits, dieselben Phenole u. die Säuresalze der entsprechenden Amine andererseits sind vielfach gleich gefärbt. Ausnahme: Oxyazobenzol (orange gelb). Aminoazobenzolchlorhydrat (blau-schwarz rot); bei letzterem ist die Säure entweder am Azo-N fixiert oder an einer NH -Gruppe, die sich infolge chinoider Umlagerung gebildet hat. 2. Die Alkalisalze der chinoiden Verbb. Benzaurin, Safranin, Ox

azon, Thionol u. Oxycarbazon mit den Gruppen CO u. OH sind gefärbt wie die Iuresalze der entsprechenden Verbb. mit den Gruppen C=NH u. NH₂, nämlich es Doebnerschen Violett, Phenosafranins, Aminooxazims, Thionins u. Aminocarbins, u. zwar rotviolett, rot, violettrot, violett, grünblau. Die freien Verbb. sind mtlich orangefarben. Die Farbvertiefung bei der Salzbildung ist demnach am ringsten in der Safranin-, am stärksten in der Carbazinreihe. Diese Tatsachen id durchaus verständlich, denn CO wirkt stärker farbvertiefend als C=NH, Salzbildung am C=NH wirkt farbvertiefend, u. ONa(K) ist von etwa der gleichen opt. rkg. wie NH₂ (vgl. oben unter 1.). Das in der Carbazinreihe noch unbekannte urbazon wird zweifellos gelb sein, nämlich etwas tiefer gefärbt als das hellgelbe urbazim. — III. Betreffs der Salzbildung der Oxime verweist Vf. auf die von ANTZSCH studierten Erscheinungen der „Pantochromie“ der Violurate u. ähnlicher erbb. (Helv. chim. Acta 8. 31—35. Lausanne, Univ.) LINDENBAUM.

Hsien Wu und **Daisy Yen**, *Neue Beobachtungen über die Wirkungen vernter Säuren und Alkalien auf Proteine*. Die Färbung mit dem Phenolreagens n FOLIN u. DENIS (vgl. WU, Journ. Biol. Chem. 51. 33; C. 1922. IV. 14) ist nsiver bei in NaOH gel. Proteinen als bei ohne NaOH gel., was in Beziehung r Denaturierung steht. Alle untersuchten Globuline u. Albumine zeigten in 0,05-n. ure oder Alkali Veränderung der Löslichkeit, Gelatine, Proteosen u. Peptone nicht. ie Geschwindigkeit dieser Denaturierung ist für die einzelnen Proteine charakterist. rschieden. In saurer Lsg. nimmt dabei die [H⁺], in alkal. Lsg. die [OH⁻] ab, ährscheinlich infolge Zunahme des Säure- bzw. Basenbindungsvermögens. Die eschwindigkeit der Denaturierung nimmt meist (Ausnahme Pferdeserumalbumin) it steigender [H⁺] zu, die Geschwindigkeitskonstante nimmt bei Voraussetzung ner monomolekularen Rk. mit der Zeit ab. In gleicher Weise wie die Löslichkeit idert sich der Farbwert mit dem Phenolreagens, aber anders bei dem mit NaOH s bei dem mit HCl denaturierten Eiweiß, auch die Prodd. beider Prozesse sind rschieden. Wahrscheinlich liegt der Änderung sowohl der Löslichkeit als des urwertes derselbe Vorgang (Hydrolyse labiler Bindungen) zugrunde. Die beachtete Abspaltung von H₂S u. NH₃ ist für den Denaturierungsvorgang nicht esentlich. (Proc. of the soc. f. exp. biol. and med. 21. 573—77. 1924. Peking, ion med. coll.; Ber. ges. Physiol. 29. 180. Ref. FELIX.) SPIEGEL.

E. Biochemie.

A. J. Kiewiet de Jonge, *Das Atommodell von Rutherford-Bohr bei der Frage n der Art und dem Zusammenhang geistiger und körperlicher Prozesse*. Vf. sucht ychophys. Probleme auf Grund der neuesten physikal. Theorien zu deuten. 'schiatr. en neurol. bladen 1924. 60—66. 76—77; Ber. ges. Physiol. 29. 285. ef. RÜMKE.) SPIEGEL.

S. C. Brooks, *Die elektrische Leitfähigkeit reinen Protoplasmas*. Das Plasmodium n *Brefeldia maxima* (Fr.) Rost., das fast reines Protoplasma darstellt, hatte eine eitfähigkeit, die unter n. Bedingungen etwa derjenigen einer 0,00145-n. NaCl-Lsg. eichkommt, ca. 2,8-mal so stark wie die Fl., in der es sich entwickelte. Bei ehandlung des Plasmodiums mit 1%ig. Meerwasser stieg die Leitfähigkeit erheblich, ch über die dieses W. hinaus. (Journ. Gen. Physiol. 7. 327—30. Washington). C.] U. S. Public Health serv.) SPIEGEL.

Stuart Mudd, *Elektroendosmose durch seröse Säugetiermembranen*. I. *Der Wasserstoffionenumkehrungspunkt mit polyvalente Anionen enthaltenden Puffern*. Wenn ein elektr. Strom durch eine solche in verd. Pufferlsg. befindliche Membran ht, strömt durch diese Fl. zur Kathode, wenn p_H des Puffers auf der alkal. eite eines gewissen krit. Punktes liegt, zur Anode, wenn der Wert auf der sauren eite dieses Umkehrungspunktes liegt. Die Mittelwerte für diesen Punkt wurden

in allen untersuchten Fällen zwischen $p_H = 4,3$ u. $5,3$ gefunden. Für die Mesenterien lebender Tiere lagen sie niedriger als post mortem, was durch die Beimischung von Puffersalzen aus dem Blute zu den äußeren Puffern im ersten Falle erklärt wird. — Bei Puffern mit nur einwertigen Anionen liegen die Umkehrungspunkte etwas höher. (Journ. Gen. Physiol. 7. 389—413. 2 Tafeln. ROCKFELLER-Inst. f. med. res.) SPIEGEL.

E. Newton Harvey, *Untersuchungen über Bioluminescenz. XVII. Fluoreszenz und Verhinderung von Luminescenz bei Ctenophoren durch ultraviolettes Licht.* (Vgl. Naturwissenschaften 12. 165; C. 1924. I. 1746.) Es werden zunächst Beobachtungen angeführt, die Luminescenz unter mechan. Reizung als durch einen Nervenmechanismus vermittelt erscheinen lassen. Bei kleinen Haufen von Leuchtzellen von Mnemiopsis wurde diese Wrkg. nicht mehr beobachtet, obwohl sie bei Behandlung mit Saponinlg. zum Leuchten kamen, wohl aber bei größeren, mit 2 „paddle-plates“ verbundenen. Die kleinsten Stückchen von Leuchtgewebe, sogar solche, die durch Filtrierpapier hindurchgehen, können im Tageslicht ihr Leuchtvermögen verlieren, es dann im Dunkeln wieder teilweise zurückgewinnen. Die Luminescenz sowohl des ganzen Tieres als auch einzelner Zellen wird durch nahe ultraviolettes Licht aufgehoben, was nicht auf Erschöpfung des photogenen Materials durch eine Reizwrkg. beruht. Bei Tieren, die nach mehrmaliger mechan. Reizung in ultraviolettes Licht gebracht werden, zeigt sich eine Luminescenz längs der Meridiane in denselben Stellungen, wie die bei Reizung auftretende. Diese „ton. Luminescenz“ tritt nicht bei an Licht gewöhnten Ctenophoren auf; sie wird als Fluorescenz des Oxydationsprod. aus dem photogenen Material gedeutet. An dem Leuchtorgan von Photuris u. dem Leuchtschleim von Chaetopterus läßt sich aufgesprochene Fluorescenz im Ultraviolett beobachten, nicht aber an den Leuchtsubstanzen von Cypridina. Es scheint eine enge Beziehung zwischen fluoreszierenden u. chemilumineszenten Substanzen bei Tieren zu bestehen, ähnlich wie bei ungesättigten Si-Verbb. u. bei Grignardverbb. (Journ. Gen. Physiol. 7. 331—39. Princeton Univ. Cleveland, The Nela Res. Labb. Woods Hole, Marine Biological Lab.) SPIEGEL.

C. Heymans und A. R. Moore, *Mitteilung über die Erregung und Verhinderung der Luminescenz bei Beroë.* (Vgl. Journ. Gen. Physiol. 6. 273; C. 1924. I. 1954.) Die Ctenophore *Beroë ovata* verhält sich bzgl. des Leuchtens ähnlich wie Pelagia noctiluca. *Ca* u. *K* sind für die Leitung des Impulses notwendig. In van't Hoff'scher Lsg. ohne *Mg* zeigt das Tier Übererregbarkeit für den Leuchtprozeß, da hier der antagonist. Einfluß gegen die oben genannten Ionen fehlt. Leuchtmaterial, auf Filtrierpapier gebracht, zeigt keine Luminescenz in Seewasser oder mit dieser isoton. Lsgg. von $NaCl$, $MgCl_2$ u. *Saccharose*, wohl aber in solchen von $CaCl_2$, $SrCl_2$, $BaCl_2$, KCl u. K_2SO_4 . Beim dunkelgewöhnten Tiere wird die Luminescenz durch eine gewisse Menge Licht gehemmt, deren Betrag durchschnittlich bei 57,285 Meterkerzen pro Min. liegt. (Journ. Gen. Physiol. 7. 345—48. Gent, Univ. New Brunswick, RUTGER Univ.) SPIEGEL.

E₁. Enzymchemie.

James B. Sumner, Vi A. Graham und Charles V. Noback, *Die Reinigung von Jackbohnenurease.* Im 30%ig. alkoh. Auszug des Jackbohnenmehles finden sich neben Urease u. Amylase Canavalin, die Concanavaline A u. B, ein Albumin, ein Albumose, eine Pentose, Hexose u. ein Chromogen. Durch Abkühlen auf $-40^\circ C$ wird die Urease ausgefällt, nur noch vergesellschaftet mit den Globulinen, die zum Teil auch noch durch Krystallisation entfernt werden können. So kann man eine unl. Urease herstellen, die durch starke Trypsinlgg. unter Zunahme der Wrkg. gel. wird. Die Urease ist wahrscheinlich ein Eiweißkörper. (Proc. of the soc.

p. biol. and med. **21**. 551—52. 1924. Ithaca, CORNELL Univ. med. coll.; Ber. ges. physiol. **29**. 295. Ref. JACOBY.) SPIEGEL.

Ken Harada, *Über die Spaltung der Stärke durch Amylase*. II. (I. vgl. Journ. Biochemistry **3**. 149; C. 1924. I. 2104.) Die Spaltung von Amylose durch Malz-*amylase* verläuft nach der Gleichung der monomolekularen Rk. — Die Spaltung von *Amylopektins* verläuft so, daß Vf. auf 3 verschiedene Bestandteile des Amylopektins schließt, welche zu 35%, 25% u. 40% vorhanden sind. Diese Bestandteile werden verschieden schnell von Amylase abgebaut u. zwar einer schneller als Amylose, ein anderer aber sehr langsam. — *Amydulin* u. *Stärkekleister* verhalten sich auch beim diastat. Abbau als Gemische von Amylose u. Amylopektin. — Erhitzen der Amylaselsg. auf 60° bezw. 70° schädigt das Enzym stark. — Die Amylase wirkt auf Amylose am besten auf 38°. — Die Spaltung von Amydulin (MERCK) wird durch geringe Mengen $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ u. Na_2HPO_4 stark gehemmt; CaCl_2 , Na_2SO_4 , Na-Citrat fördern in geringen Konz., hemmen aber in höheren Konz.; NaCl u. KCl hemmen in 2,0-mol. Lsg. (Es ist nicht angegeben, ob hierbei in Ggw. von anderen gearbeitet wurde.) (Journ. Biochemistry **4**. 123—37. 1924. Tokyo, Kaiserl. Univ.) HESSE.

A. Smirnow, *Zur Frage der Rolle der Aschenbestandteile in den Pflanzen*. Mitt. Das Einwirken von Neutralsalzen auf die Peroxydase. (I. vgl. Biochem. Ztschr. **149**. 63; C. 1924. II. 1210.) Die Wrkg. der Peroxydase wurde gemessen in der Menge KMnO_4 , die zur Oxydation des Purpurogallins (aus Pyrogallol + H_2O_2 unter Einfluß des Fermentes gebildet) in saurer Lsg. verbraucht wurde; zur Best. wurde das Purpurogallin zunächst isoliert u. dann in H_2SO_4 gel. — Die Peroxydase des Weizensamens wirkt am besten bei $\text{pH} = 8,8$; im Gebiet, das saurer als $\text{pH} = 3,5$ ist, ist die Peroxydase wirkungslos. — Bei Unters. der Einw. von Chloriden auf Peroxydase wurde gefunden, daß die Salzwrgk. bei fast gleichbleibendem pH durch die Natur der Kationen bestimmt ist. — Erdalkalisalze fördern die Wrkg. der Peroxydase; die Größe der Wrkg. wächst mit steigendem At.-Gew. — MgCl_2 wirkt in größeren Konz. fördernd, in kleinen dagegen hemmend. — Ca , Sr , Ba -Chlorid wirken fördernd, die Wrkg. steigt mit steigendem At.-Gew. — Li ist auch noch in großen Verd. ($1/40000$ -n. u. $1/200000$ -n.), die den Salzkonz. in der lebenden Zelle ähnlich sind, stark sichtbar. Die Wrkg. der angegebenen Salze beruht auf einem Einfluß auf die Peroxydase selbst zu beruhen. Aus Verss. mit $\text{e}^- + \text{H}_2\text{O}_2$ geht hervor, daß die Salze weder auf das Substrat, noch auf das H_2O_2 wirken. — ZnCl_2 hemmt die Peroxydasewrgk. sehr stark. Das System $\text{e}^- + \text{H}_2\text{O}_2$ wird von ZnCl_2 nicht beeinflusst. — HgCl_2 bewirkt in Konz., in denen ZnCl_2 schon die Wrkg. der Peroxydase auf 30% herabsetzt, eine kaum merkliche Hemmung der Peroxydase; in großer Verd. hat HgCl_2 eine geringe fördernde Wrkg. — LiCl wirkt bei höheren Konz. ($1/20$ -n.) aktivierend, verliert aber diese Eigenschaft in verd. Lsgg. ($1/100$ -n.) — NH_4Cl hat eine kaum merkliche Wrkg. — NaCl , KCl , RbCl hemmen die Peroxydase; die hemmende Wrkg. ist dem At.-Gew. der Kationen umgekehrt proportional. Der Einfluß der Alkalichloride ist viel geringer, als der entgegengesetzte der Erdalkalichloride. — Die aktivierende Wrkg. der Erdalkalichloride ist eine additive Eigenschaft. — MnCl_2 hemmt die Peroxydase; die Größe der Hemmung nimmt mit abnehmender Menge MnCl_2 zu. — e^- -Tartrat fördert die Wrkg. der Peroxydase; die Aktivierung ist aber geringer als die durch Erdalkalisalze bewirkte. Eisensalze können nicht als für Peroxydasen spezifische Aktivatoren angesehen werden. — Anionen wirken nur in ziemlich hohen Konz. ($1/80$ -n. u. $1/30$ -n.) auf die Peroxydase. Chloride wirken schwach hemmend (Maximum bei $1/800$ -n. Lsg. etwa 10%); Phosphate wirken etwas stärker aktivierend als Nitrate, beide wirken stärker als Sulfate. Alle Verss. wurden bei gleichen pH vorgenommen. — Vf. schließt, daß die als Aschenbestandteile der Peroxydase

geltenden Elemente eine Aktivierung des Enzyms bewirken. (Biochem. Ztschr. 15 1—34. Moskau, Landwirtschaft. Akad.) HESSE.

Ross Aiken Gortner, *Beobachtungen über den Mechanismus der Tyrosin-Tyrosinasereaktion*. Die von RAPER u. WORMALL (Biochemical Journ. 17. 45; C. 1923. III. 1623) für die Wrkg. der Kartoffeltyrosinase gegebene Deutung gilt nicht für die vom Vf. in *Tenebrio molitor* gefundene. Diese ist unl. u. kann in jedem Stadium der Rk. entfernt werden. Nach Stehen von Tyrosin mit diesem Ferment bis zu Dunkelrosafärbung geht nur unfiltrierte, also fermenthaltige Lsg. im Dunkeln bei Zutritt von O₂ über Violett in Dunkel über u. setzt Melanin an, welches durch Filtration entfernt werden kann. Die Filtration durch eine G₂ oder G₃ filterte nicht. Für die erste Rotfärbung ist die OH-Gruppe maßgebend (sie tritt auch mit *Tyrosol* auf), für die B. von Melanin die NH₂-Gruppe (mit *Tyrosol* nicht). (Proc. of the soc. f. exp. biol. and med. 21. 543—45. 1924. Minneapolis, Univ. of Minnesota; Ber. ges. Physiol. 29. 292. Ref. SCHMITZ.) SPIEGEL.

John H. Northrop, *Die Kinetik der Zersetzung von Peroxyd durch Katalase*. Ergebnisse von MORGULIS (Journ. Biol. Chem. 47. 341 [1921]) zeigten teilweise Verhältnisse ähnlich denen, die Vf. (Journ. Gen. Physiol. 6. 439; C. 1924. II. 69) bei Unterss. über die Kinetik der Trypsinwrkg. gefunden hat. Die Verss. von MORGULIS werden ausführlich wiedergegeben u. neu berechnet. Es ergibt sich, daß die bei Zers. von H₂O₂ durch Leberkatalase bei 20° in Ggw. eines relativ hohen Peroxydüberschusses erhaltenen sich durch folgenden Mechanismus quantitativ erklären lassen: 1. Die Geschwindigkeit der B. von O₂ ist unabhängig von der Konz. an H₂O₂, falls diese größer als 0,10 M. ist. — 2. Die Geschwindigkeit der Zers. von H₂O₂ ist jederzeit der jeweiligen Konz. an Katalase proportional. — 3. Während der Rk. erleidet die Katalase spontan monomolekulare Zers., unabhängig von ihrer Konz. u. umgekehrt proportional der ursprünglichen Konz. an H₂O₂ bis zu 0,4 M. aufwärts, bei sehr hohen Konz. schneller. — 4. Die danach sich ergebende Gleichung $K = \frac{1}{t} \log \frac{A}{A-x}$, in der x der in der Zeit t ent-

bundene O₂, A die Gesamtmenge des entbundenen O₂ u. K die Inaktivierungskonstante des Enzyms ist, paßt sich den Versuchsergebnissen genau an. (Journ. Gen. Physiol. 7. 373—87. ROCKEFELLER-Inst. f. med. res.) SPIEGEL.

H. Vollmer, W. Schmidt und J. Serebrijski, *Über die Hemmung der Serumlipase und Organlipase durch Jod*. Die stalagmometr. gemessene Tributyrinhydrolyse durch Lipase wird durch Zusatz von alkoh. Jodtinktur gehemmt. Bei kleinen Konz. an J ist die Hemmung verhältnismäßig am größten. Faßt man die Jodwrkg. als eine Adsorptionswrkg. auf, so ist also bei kleinen Konz. die Lipaseadsorption an Jod verhältnismäßig größer als bei hohen Jodkonz. Dieser Vorgang entspricht dem Adsorptionsgesetz. — Die gleiche Wrkg. haben J-KJ-Lsgg.; es wird gezeigt, daß KJ oder A. ohne nennenswerten Einfluß sind. — Ein Unterschied in der Hemmungswirkung war zwischen Blut-, Niere-, Leber-, Milz-, Lunge- u. Pankreaslipase nicht zu beobachten. Man muß bei dem Vergleich der verschiedenen Organe aber die verschiedenen Konz. des Fermentes in den Organen berücksichtigen. (Biochem. Ztschr. 154. 476—82. 1924. Berlin, Kaiserin AUGUSTA VIKTORIA-Haus.) HESSE.

Shuzo Kimura, *Beiträge zur Kenntnis der Serumprotease*. III. *Über die Abbauprodukte durch Serumprotease*. Vf. folgert aus seinen Versuchsergebnissen, daß in enteweißten Verdauungsgemischen bei Anwendung von Serumprotease auf Casein oder Kuhmilch der Gesamt-N (besonders Monoaminosäure- u. Albumosen-N) viel größer ist als mit anderen Fermenten u. auch der P-Gehalt der eiweißfreien Verdauungsprodd. bedeutend vermehrt ist. (Tôhoku Journ. of exp. med. 4. 671—73. Sendai, Tôhoku Univ.; Ber. ges. Physiol. 27. 444. 1924. Ref. KOMM.) SPIEGEL.

Werner Gottstein, *Fermentwirkung im Säuglingsmagen*. Übersichtsreferat (Klin. Wchschr. 4. 269—72. Berlin, Univ.) SPIEGEL.

E₃. Pflanzenphysiologie. Bakteriologie.

G. Klein, *Zwischenprodukte im Stoffwechsel der höheren Pflanze*. Vf. u. seinen Mitarbeitern **Kisser**, **Pirschle** u. **Werner** ist es gelungen, bei den 3 Fundamentalprozessen der grünen Pflanze, der CO₂-Assimilation, der Atmung u. der N₂-Assimilation, zum ersten Mal die Zwischenprodd. in eindeutiger Weise zu fassen. Bei der CO₂-Assimilation wurde mit Hilfe der Neubergschen Methode, die Zwischenprodd. im Organismus anzureichern, *Formaldehyd* durch das Narkoticum *Dimedon* gefangen u. es gelang, bei voller Intensität der Assimilation relativ geringe Mengen des Formaldimedonprod. zu fassen, u. zwar betragen die gefundenen Mengen $\frac{1}{50}$ bis $\frac{1}{100}$ der theoret. berechneten. Aus 10 g Elodea als Assimilationsmaterial wurden 0,1—3 g Formaldimedon erhalten, das mit mkr. Schmelzpunktp. charakterisiert werden konnte. Gleichzeitig wurde gezeigt, daß die intakte Pflanze im Dunkeln u. bei Belichtung im CO₂-freien Raum kein CH₂O abspaltet. — Versuchsmaterial für die Unters. der Atmung der Pflanzen kamen nur Knospen, Wurzeln u. Keimlingsgewebe in Betracht. Diese Organe liefern intakt wie im sterilen Autolysat *Acetaldehyd* als Zwischenprod. bei der Atmung u. zwar in ebenso großer Menge wie von NEUBERG am tier. Gewebe gefunden wurde. Schon bei Abbau von Stärke durch Insulin wurde Acetaldehyd gefunden. Ferner konnte festgestellt werden, daß sowohl tier. wie pflanzliches Insulin verschiedener Herkunft die Atmung u. damit die B. von Acetaldehyd um das Zwei- bis Dreifache steigert. Pflanzenkeimlinge, aus denen ein Insulinpräparat hergestellt werden kann, liefern auch ohne Insulinzugabe doppeltsoviel Acetaldehyd wie andere Keimlinge. — Die N₂-Assimilation wurde in der Wurzel der Pflanze untersucht unter Ausschluß von Bakterien u. Pilzen. Auch hier wurde eine Anreicherung versucht, entweder indem die Pflanzen anfangs im Nitrathunger gehalten wurden, wobei dann die Umsetzungsgeschwindigkeit der nachher zugeführten Nitrate stark gesteigert wurde, oder die Pflanze wurde mit N-Verbb. gesätt., so daß die Umsetzung verlangsamt u. die Zwischenprodd. angereichert wurden. In allen Fällen wurde NO₂ u. NH₃ nur in der Kulturlf. nicht in der Wurzel nachgewiesen. Bei Kultur ohne Zucker tritt im Licht hauptsächlich NO₂ auf, im Dunkeln weniger, NH₃ tritt im Dunkeln nur sehr wenig auf. Bei Zuckerdarreichung wird viel NH₃ u. nur anfangs auch noch wenig NO₂ gefunden. Bei gleichzeitiger Abfangung eines Teils des bei der Atmung entstehenden Acetaldehyds wird das unverbrauchte NH₃ auf das Doppelte angereichert. (Naturwissenschaften 13. 21—24.)

JOSEPHY.

Wilhelm Sigmund, *Über die Einwirkung von Stoffwechselendprodukten auf die Pflanzen*. IV. Mitteilung. *Einwirkung N-freier pflanzlicher Stoffwechselendprodukte auf die Keimung von Samen: Harze, Farbstoffe*. (III. vgl. Biochem. Ztschr. 146. 193; C. 1924. II. 349.) Die Versuchsanordnung war die der früheren Mitteilungen. — *Harze*: *Benzoe* ist in größerer Menge schädlich, in geringerer weniger nachteilig. *Adabalsam*, *Terpentine* u. *Copaivabalsam* wirken bei Zusatz zum Keimbett stark schädlich, als Dämpfe sind sie minder nachteilig. — *Guajakharz* ist verhältnismäßig wenig schädlich. — Größere Mengen von *Gummigutt* schädigen die Keimung, geringere Mengen benachteiligen nur die B. der Wurzeln. — *Mastic* ist nur in größeren Mengen schädlich. — *Myrrhe* schädigt auch in kleinen Mengen noch. — *Arbabalsam* verhindert im Keimbett jede Keimung; seine Dämpfe sind von geringem Einfluß. — *Storax* schädigt auch in geringen Mengen stark. — *Tolubalsam* wirkt tödlich auf fast alle Keimlinge. — *Weihrauch* ist nur in größerer Menge nachteilig. — *Farbstoffe*. *Alkannawurzelspäne* schädigen nur in großer Menge, *Alkanaextrakt* wirkt schon in kleiner Menge stark toxisch. — *Blauholz* ist in jeder Form schädlicher als *Alkana*. — *Curcuma* u. *Gelbbeeren* schädigen in geringer Konz. die Keimung u. die B. von Wurzeln. — *Gelbholz* schädigt sehr stark. — *Indigotin* ist nahezu ohne Nachteil. — *Krappwurzel* schädigt nur in großen Mengen.

— Unreines käufliches *Lackmus* schädigt stark, während gereinigte Präparate derselben Konz. eine geringe Giftwrkg. haben. — *Orseille*, *Quercitron* haben n geringe Wrkg. — *Rotholz*, *Saffor*, *rotes Sandelholz* schädigen stark. — *Waid Wau* schädigen wenig. — Bei fast allen Farbstoffen wurde besonders die Ent der Wurzeln benachteiligt. (Biochem. Ztschr. 154. 399—422. 1924. Prag, Deutsche techn. Hochsch.)

HESSE.

Hermann Ullrich, *Die Rolle der Chloroplasten bei der Eiweißbildung in grünen Pflanzen*. Aus Beobachtungen bei eingehend geschilderten Verss. wird ein erheblichen Anteil der Chloroplasten an der B. von Eiweiß in den grünen Pflanzen geschlossen. (Ztschr. f. Botanik 16. 513—62. 1924; Ber. ges. Physiol. 2. 229—30. Ref. DÖRRIES.)

SPIEGEL.

A. Richter, *Das farbige Licht und die Assimilation*. II. (I. vgl. Bull. Acad. St. Pétersbourg [6] 1912. 727; C. 1912. II. 619.) Nach der l. c. beschriebenen Methode wurde die CO₂-Assimilation verschieden gefärbter Algen im Lichte verschiedener Farbe untersucht; die Verss. wurden in Roscoff (Bretagne) ausgeführt. Wie seinerzeit die Beobachtungen in Neapel, ergaben diese Verss., daß die Lichtstärke u. nicht Farbton der maßgebende Faktor ist; der Unterschied zwischen den schatten- bzw. lichtliebenden Algen ist wichtiger, als der zwischen roten, braunen u. grünen Arten. Die Assimilation von *Chondrus crispus* ist bei grünen u. roten Exemplaren dieselbe. Nur bei wenigen roten Algen deutet die Farbempfindlichkeit der Assimilation auf eine chem. Rolle des Phykoerythrins. (Bull. Acad. Sc. Pétersbourg. [6] 1914. 935—50.)

BIKERMAN.

A. Richter, *Der Mechanismus der Photosynthese*. I. Grüne Blätter von *Plectoglyne* (*Aspidistra*) u. von *Bambusa verticillata* wurden der Einw. des Bogenlichts ausgesetzt: 1. ununterbrochen, im Abstände x (20—60 cm); 2. indem zwischen der Bogenlampe u. dem Blatt eine gelochte Scheibe rotierte, die die Belichtungsdauer auf $1/n$ -tel reduzierte; Abstand = x ; 3. ununterbrochen, im Abstände $x \cdot \sqrt{n}$. In der 2. u. der 3. Versuchsreihe vom Blatt empfangene Energie war also konstant. Die Menge der verbrauchten CO₂ war in der 3. Reihe kaum größer, als in der 2.; in diesen beiden Fällen überstieg sie ganz beträchtlich (bis um 300%) das $1/n$ -te Teil der in der 1. Reihe verbrauchten CO₂-Menge. Eine starke ununterbrochene Belichtung setzt somit die Ausbeute herab; als Ursache dieser Hemmung nennt Vf. die Überhitzung, die Anhäufung der Assimilationsprodukte u. die Verarmung an CO₂. Die Nachwirkung spielt keine Rolle. (Bull. Acad. St. Pétersbourg [6] 1914. 857—74.)

BIKERMAN.

A. Richter und **E. Kollegorskaja**, *Der Mechanismus der Photosynthese*. I. (I. vgl. vorst. Ref.) Ein CO₂-Strom wird durch einen Glasbehälter mit einem grünen Blatt u. darauf durch ein Glasröhrchen mit Leuchtbakterien durchgeleitet. Man wartet das Erlöschen der (aeroben) Bakterien ab, schaltet eine das Blatt beleuchtende Lampe ein u. notiert die Zeit des Aufleuchtens der Bakterien, das selbst als Reagens auf O₂ dient. Indem man zwischen die Lampe u. das Blatt Papierschirme einsetzt, kann man die Lichtstärke verändern. Es wurden Blätter der schattenliebenden *Aspidistra elatior* u. der lichtliebenden *Bambusa verticillata* verglichen. Es ergab sich: 1. Die Zeit des Aufleuchtens ist im wesentlichen durch die Geschwindigkeit des Gasstromes bedingt, so daß man annehmen muß, daß die Zeit der Entstehung des ersten O₂ am Blatt von der Lichtstärke unabhängig ist. 2. Bei zu geringen Lichtstärken leuchten die Bakterien überhaupt nicht auf. 3. Der Schwellenwert der Lichtintensität ist für *Aspidistra* u. *Bambusa* annähernd gleich (ca. 20 Meterkerzen). 4. Dieser Schwellenwert ist beträchtlich geringer für Blätter, die mit besonderen Einrichtungen zum Lichtauffangen versehen sind, wie *Viola odorata*, *Begonia imperialis*, *Fittonia Verschafeltii*, *Anthurium Waroqueanum*.

Passica Robertiana, *Fittonia gigantea*. (Bull. Acad. St. Péterbourg [6] 1915. 457
s. 467.) BIKERMAN.

L. Pissiset, J. Verge und V. Carneiro, Vergleich der Wirkung von destilliertem Wasser und physiologischem Serum auf die Lebensfähigkeit einiger Mikroben. Entgegen der bisher geltenden Meinung fand Vf. bei einigen Mikroben längere Lebensfähigkeit in dest. W. als in 0,8%ig. NaCl-Lsg. unter sonst gleichen Bedingungen. (Ann. Inst. Pasteur 39. 80—85. Alfort, Ecole vétérin.) SPIEGEL.

R. Sazerac und R. Vaur, Über die Rolle der Phagocytose bei der Wirkung von Wismut auf Trypanosomen und Spirochäten. Intraperitoneal injiziertes gefälltes Wismut wird von den Phagocyten aufgenommen u. transportiert. Die Wrkg. gegen Malariaaninfektion u. Spontanspirochätose des Kaninchens ist bei dieser Behandlung wenigstens so gut wie bei Injektion in die Gewebe. (Ann. Inst. Pasteur 39. 86 bis 100.) SPIEGEL.


Alexander von Lingelsheim, Über Zoogloen des *Bacterium xylinum* A. J. Brown. Beschreibung einiger vom Vf. untersuchten Zoogloen des *Bact. xylinum*, sowie Hinweis auf einige in der Literatur beschriebener Zoogloen. Die sogenannten „Leichenröhren“ erweisen sich als Zoogloen. — Vf. bespricht dann Verss. zur Verwendung von typ. Hautdecken des *Bact. xylinum* als Kunstleder u. für gasdichte Ballonstoffe. (Monatssch. Essigind. 29. 12—13. 19—20. Breslau.) HESSE.

R. C. Robertson, Accessorische Nährstoffe (Vitamine) beim Bakterienwachstum. III. Beziehung der von Colibacillen gebildeten Stoffe zum Hefewachstum. (VII. vgl. ROBERTSON u. DAVIS, Journ. of infect. dis. 32. 153; C. 1924. II. 2174.) In vitaminenreichem synthet. Nährboden aus Asparagin (3,4 g), CaCl₂ (0,1 g), Dextrose (20 g), K₂SO₄ (0,2 g), K₂HPO₄ (1 g), NaCl (5 g) in 1000 ccm dest. W. wuchs *B. coli* kontinuierlich, Hefe nicht, diese aber auch nach Zusatz von wss. Auszug aus Hefetritolysat oder Karotten. Ebenso gut ergänzend wie diese Auszüge wirkte das Filtrat jenes Nährbodens, in dem Colibakterien noch in 68. Generation gewachsen waren. *B. coli* vermag also Ergänzungsstoffe zu bilden. (Journ. of infect. dis. 34. 15—99. 1924. Chicago, Univ. of Illinois coll. of med.; Ber. ges. Physiol. 29. 297.) SPIEGEL.



Th. Bokorny, Einiges über Hefenfett. (Vgl. S. 977.) Vf. beschreibt einige Verss., in dem es ihm nicht gelang, beim Züchten von Hefe einen erheblichen Prozentsatz an Fett in den Hefezellen zu erzielen. (Allg. Brauer- u. Hopfenztg. 65. 40—41.) HESSE.

A. J. Kluyver und H. J. L. Donker, Die Einheit im Chemismus des fermentativen Zuckerdissimilationsprozesses der Mikroben. Im Anschlusse an die Neubergschen Ansichten u. Befunde stellen Vff. folgendes Schema für die B. der verschiedenen Prodd. bei der Zers. von Zucker durch Mikroben auf einheitlicher Grundlage auf:



Einleitende Zersetzung:






Umlagerungen des hypothetischen Zwischenproduktes:




Dehydrogenierungsreaktionen:




Kondensationsreaktionen:



Protoplasmaregenerationsreaktionen:



Beispiele von Protoplasmaregenerationsreaktionen:



Die Übereinstimmungen u. Verschiedenheiten einzelner Mikrobenarten bzgl. d. in obigem Schema enthaltenen Rkk. werden tabellar. zusammengestellt u. besprochen. Dabei spricht sich auch die Verwandtschaft der Arten untereinander aus. Unter diesen werden so 7 Gruppen gebildet. (Koninkl. Akad. van Wetenschappen Amsterdam, Wisk. en Natk. Afd. **33**. 895—914. Delft.) SPIEGEL.

A. J. Kluyver und **H. J. L. Donker**, *Die Bildung von Acetylmethylcarbinol und 2,3-Butylenglykol durch die fermentative Zerlegung von Zuckern durch Alkoholhefen und echte Milchsäurebakterien*. Durch NEUBERG u. REINFURTH (Biochem. Ztschr. **143**. 553; C. **1924**. I. 1396) ist festgestellt, daß Acetaldehyd, der zu einem mit Bier- oder Preßhefe gärenden Zuckerls. gefügt wird, in Acetylmethylcarbinol übergeht. Wenn dieser Vorgang gewöhnlich bei der alkoh. Gärung nicht eintritt, muß dies durch schnelle anderweitige Umsetzung des hier intermediär gebildeten Acetaldehyds bedingt sein, u. aus dem von Vff. (vgl. vorst. Ref.) aufgestellte Schema geht hervor, daß es die Protoplasma-H-Verb. ist, die sich seiner bemächtigt. Dann sollte ein Eingriff in den Stoffwechsel, der das wenigstens teilweise Eintreten einer anderen Protoplasmaregenerationsrk. zur Folge hat, in erster Linie eine Zerstörung der Protoplasma-H-Verb. bedeuten, die die Bildung des Acetaldehyds, demgemäß auch die B. von Acetylmethylcarbinol u. seine Reduktionsprod. 2,3-Butylenglykol erwarten lassen. Dies erwies sich in der Tat als zutreffend bei Vergärung von 10%ig. Glucoselsg., mit 1/10 % Methylenblau versetzt, mittels 10% Preßhefe unter Luftabschluß bei 30°. Es ist danach wahrscheinlich, daß das Ausbleiben der B. jener beiden Prodd. bei n. Vergärung von Glucose durch echte Milchsäurebacillen ebenfalls nur der mangelnden Gelegenheit zur B. des Carbinols zuzuschreiben ist. Es gelang bei 2 Arten, *Lactobacillus fermentum* BEIJERINCK u. *Betabacterium breve* ORLA-JENSEN, diese B. in der gleichen Weise wie bei Hefe zu erzwingen. Da nach dem Schema der Vff. Lävulose für Bakterien dieser Gruppe nicht nur ein vorzüglicher Dissimilationsstoff, sondern überdies als H-Acceptor geeignet ist, ließ sich mit ihr die B. der fraglichen Stoffe ohne weiteren Zusatz erwarten. In der Tat wurde in Hefewasser mit 10% Lävulose nach Impfung mit einem der genannten Stämme nach einigen Tagen das Butylenglykol nachgewiesen. Dieses konnte dann auch neben noch unverbrauchtem Acetaldehyd bei Vergärung von Lävulose durch Preßhefe (schon nach 3 Stdn.) nachgewiesen werden, während bei Glucosegärung unter gleichen Umständen weder das Glykol noch Acetylmethylcarbinol zu entdecken war. Die Acceptorfunktion der Lävulose im Gegensatz zu Glucose kam noch besser in Verss. mit nach

BEDEW aus der Hefe hergestelltem Macerationssaft zur Geltung. (Koninkl. Akad. Wetensch. Amsterdam, Wisk. en Natk. Afd. **33**. 915—19. Delft.) SPIEGEL.

P. Boysen Jensen, *Studien über die Kinetik der Zymasegärung*. Untersucht den Einfluß von Zymase, Co-Enzym, Phosphat, Zucker, Hexosephosphat u. CH_3CHO auf die Gärung bei konstanter Temp. u. konstantem p_{H} . — Die Zeit von Beginn des Vers. bis zur Erreichung des Maximums der CO_2 -Entw. (also einschließlich Induktionszeit) nennt der Vf. „Aktivierungszeit“. Die Kurve $\text{mg CO}_2/\text{Zeit}$ hat die Aktivierungszeit die Form der Kurven autokatalyt. Rkk. Diese Form der Kurven ist nach MEYERHOF (Ztschr. f. physiol. Ch. **102**. 185; C. **1918**. II. 838) durch den anfänglichen Mangel an Hexosephosphat bedingt. Dies kann Vf. bestätigen: die Aktivierungszeit wird (wie die Induktionszeit) durch Zugabe von Hexosephosphat wesentlich verkürzt. Hexosephosphat ist auch für die Bindung von Phosphates an den Zucker notwendig: in Lsgg., in denen alles Hexosephosphat durch längeres Stehen des Macerationssaftes vergoren ist, findet erst dann wieder die Gärung statt, wenn gleichzeitig mit dem Zucker auch Hexosephosphat zugesetzt wird. — Die auch bei Ggw. von Hexosephosphat noch ziemlich lange Aktivierungszeit läßt sich durch Zugabe von CH_3CHO oder Methylenblau als Wasserstoffacceptoren noch weiter verkürzen. Die Aktivierungszeit wird dabei von 3 Stdn. auf 140 Min. (durch Hexosephosphat allein) bzw. auf 60 Min. (durch Hexosephosphat + CH_3CHO) verkürzt. Hexosephosphat u. CH_3CHO können sich gegenseitig nicht ersetzen, man kann also auch nicht durch Vermehrung des Hexosephosphates die stärkere Verkürzung der Aktivierungszeit erreichen. Bei der aus dem Macerationssaft auszufällenden Zymase, die also weder Hexosephosphat noch H_2 -Acceptoren enthält, läßt man stets eine sehr lange Aktivierungszeit, die durch Zugabe der genannten Stoffe verkürzt wird. — Es wurde unter Konstanthaltung aller übrigen Faktoren miteinander die Wrkg. der einzelnen am Anfang genannten Gärungsfaktoren untersucht. Die gewählten Mengen waren so groß, daß die Aktivierungszeit möglichst kurz war. Es wurde gefunden, daß die Gärgeschwindigkeit wahrscheinlich immer mit der Zymasekonz. proportional ist. Für alle übrigen Gärungskomponenten gilt wahrscheinlich folgendes Gesetz: Bei kleinen Konz. steigt die Gärgeschwindigkeit ungefähr proportional der Konz.; die Gärgeschwindigkeit ist bei höheren Konz. der betreffenden Gärungskomponenten unabhängig von der Konz. Die Kurve Konz. (Abszisse) / Gärgeschwindigkeit (als Ordinate) steigt anfänglich gerade, biegt dann um u. verläuft am Schluß ungefähr parallel zur Abszisse. — Die Gärgeschwindigkeit ist also durch die Zymasekonz. u. die Konz. einer der anderen Gärungskomponenten bestimmt, u. zwar durch diejenige, die in der verhältnismäßig geringsten Menge vorhanden ist (der „begrenzende Faktor“); in gewissen Fällen können auch mehrere der Gärungskomponenten als begrenzende Faktoren wirken können. (Biochem. Ztschr. **154**. 235—62. 1924. Kopenhagen, Univ.) HESSE.

C. Neuberg und **A. Gottschalk**, *Erfahrungen über die Vergärung des Dioxyacetons*. (Vgl. S. 1217.) Während FISCHER u. TAUBE (Ber. Dtsch. Chem. Ges. **57**. 1922; C. **1924**. II. 2242) bei einer Hefe eine weitgehende Vergärung von Dioxyacetone fanden, haben Vff. bei einer großen Anzahl von Hefen nie eine Vergärung von Dioxyacetone beobachtet, die den gleichzeitig mit Zucker angestellten Gärungen nur annähernd entsprach. — Die Gärung von Hexosen wird durch die Triose nicht beeinflusst. — *Mucor stolonifer*, der selbst auf Fructose- oder Brenztraubensäure selbstg. gut gedeiht, wächst unter den gleichen Bedingungen auf Dioxyacetone nur spurenhafte. Auch dies ist ein Beweis für die biolog. Ungleichwertigkeit von Dioxyacetone u. Hexosen. (Biochem. Ztschr. **154**. 487—91. 1924. Berlin-Dahlem, Kaiser-Wilhelm-Inst. f. exper. Ther. u. Biochemie.) HESSE.

E₅. Tierphysiologie.

Robert Mc Carrison, *Pathogenese von Mangelkrankungen. XIII. Einfluß v. Hitze, Kälte, Serum und Sonnenlicht auf die Wirkung von Epinephrin- und Adrenalinhydrochlorid.* (XII. vgl. Indian Journ. of med. res. **10**. 861; C. **1925**. I. 112.) Die Beeinflussung der Adrenalinempfindlichkeit durch Änderung der Temp. ist wahrscheinlich nur der Ausdruck einer Abhängigkeit von der Intensität oxydativer Stoffwechselvorgänge. Hemmung durch Serum beruht auf Zerstörung des Adrenalins durch die alkal. Rk. 2-std. Einw. der Tropensonne auf adrenalinhaltiges Serum vermindert dessen Wrkg. nicht merklich. Auch im Körper ist die sympathetisierend sensibilisierende Wrkg. des Epinephrins in Abhängigkeit von den oxydativen Prozessen u. der Gewebsrk. anzunehmen, denen die Nebennieren vermutlich den Grad der Adrenalinabgabe anpassen. (Indian Journ. of med. res. **10**. 900—907. 1925. Coonoor, PASTEUR Inst. of Southern India; Ber. ges. Physiol. **29**. 240. R. OEHME.) SPIEGEL

H. Fischer, *Untersuchungen über Reststickstoffgehalt des Blutes und seine Beziehung zur Urämie.* Bei n. u. an nicht uräm. Nephritiden leidenden Personen wurden Werte bis 100 mg in 100 ccm Gesamtblut, bis 120 mg in 100 ccm Serum bis 100 mg in 100 ccm Plasma gefunden. Höhere Werte bezeichnen fast stets klinisch sichere Urämiefälle. Doch fanden sich Werte innerhalb der n. Grenzen auch bei tödlich verlaufenden, klin. sicheren Urämiefällen, die Best. des Rest-N leistet also für die Diagnose der Urämie keine eindeutige Hilfe. Seine Verteilung auf Blkörperchen, Serum u. Plasma ist bei n. wie bei pathol. Fällen durchaus unregelmäßig. (Dtsch. Arch. f. klin. Med. **146**. 233—45. Stuttgart, Katharinenhospital.) SPIEGEL

Irene Koechig, *Der Calciumgehalt des Blutes unter pathologischen Bedingungen.* Leichtere Verringerungen des n. Gehaltes (9,5—11 mg/%) wurden gefunden bei Nephritis, Colitis, Pellagra, Gelbsucht, Osteomalacie u. Tetanie. Der Minderbefund bei Gelbsucht erklärt sich durch Fällung von Gallenfarbstoff-Ca bei der Eiwasserfällung. Bei Carcinomen beobachtete Verringerungen beziehen sich offenbar auf solche Fälle mit Ikterus. (Journ. of laborat. and clin. med. **9**. 679—85. 1925. St. Louis, WASHINGTON Univ. med. school; Ber. ges. Physiol. **29**. 257. R. VAN REY.) SPIEGEL

Friedr. Valentin, *Über den Milchsäuregehalt des Blutes.* Eingehende Untersuchungen an Menschen u. Kaninchen in physiolog. u. patholog. Fällen. Im n. Menschenblut weist der Milchsäurewert keine großen Schwankungen auf. Der Mittelwert beträgt 11,06 mg/%. Im Kaninchenblut waren große Schwankungen zu beobachten, sowohl bei verschiedenen als auch bei denselben Tieren. Der Gehalt an Milchsäure schwankte zwischen 75—128 mg/%. Die ausschließliche Kohlenhydratfütterung der Tiere u. die damit verbundenen Gärungsprozesse im Darm üben einen Einfluß auf die Milchsäurekonz. aus. Bei akt. kontrahierter Armmuskulatur an 2 Menschen wurde eine Erhöhung von 40 bzw. 36% der Milchsäure im Blute gegenüber dem Befunden bei schlaffer Armmuskulatur gefunden. Im spast. kontrahierten Arm fand sich bei 3 Personen eine durchschnittlich 63%ig. Erhöhung gegenüber dem gesunden Arm. Epileptiker zeigten keine Erhöhung des Milchsäuregehaltes im Blute, wohl aber war solcher fast stets bei mit Dyspnoe einhergehenden pathologischen Zuständen nachweisbar. In Fällen von Arteriosklerose konnte Vf. keine Erhöhung der Milchsäurewerte im Blute beobachten, fast stets aber bei Carcinomen. Versuche am n. Menschen unter Wrkg. von Insulin ließen keinen definitiven Schluß auf den Milchsäuregehalt zu, beim Diabetiker blieb letzterer trotz der ausgesprochenen Wrkg. des Insulins auf den Blutzucker unverändert. (Münch. med. Wchschr. **72**. 86—90. München, Schwabing.) FRANK.

A. V. Hill, *Ein Vortrag über die Funktion des Hämoglobins im Körper.* Zusammenstellung der herrschenden Ansichten über Hämoglobin u. seine physiol. B.

atung. (Lancet 206. 994—98. 1924; Ber. ges. Physiol. 29. 255—56. Ref. HOEN.) SPIEGEL.

G. L. King und F. H. Scott, *Die Verteilung des dem Blute zugesetzten Wassers in den blutigen Körperchen und Serum*. Defibriniertem Ochsenblut in Mengen, die noch kein sichtbares Lackfarbigwerden bedingen, zugesetztes dest. W. wird fast vollständig von den Erythrocyten aufgenommen, stets in höherem Grade, als nach den sonstigen Verhältnissen zu erwarten. (Proc. of the soc. f. exp. biol. and med. 21. 35—46. 1924. Minneapolis, Univ. of Minnesota; Ber. ges. Physiol. 29. 256. Ref. EHLER.) SPIEGEL.

Sebastiano Zisa, *Die Immunität gegen pflanzliche Giftstoffe, studiert am Beispiel des Pyrodins*. Durch chron. Verabfolgung des Pyrodins (*Acetylphenylhydrazins*, also eines pflanzlichen Giftstoffes) in kleinen, allmählich steigenden Dosen gelingt es, Mäusen u. Hunde an dieses Blutgift zu gewöhnen. Es handelt sich dabei um eine Resistenz der Blutzellen, nicht um B. von Antikörpern. Das Serum der behandelten Tiere schützt n. Blutkörperchen weder in vitro noch in vivo vor der Wrkg. des Pyrodins, verstärkt sogar seine Wrkg. auf n. Tiere. (Arch. di patol. clin. med. 3. 290—304. 1924. Bologna, Univ.; Ber. ges. Physiol. 29. 314—15. Ref. SELIGMANN.) SPIEGEL.

Walter Goldstein, *Schwere Nierenschädigung und Urämie nach Anwendung von Chloramin-Heyden*. Bericht über schwere Nierenschädigung u. Urämie bei Anwendung einer bisher als unschädlich geltenden 0,05%ig. *Chloramin*lsg. auf einer handgroßen Resorptionsfläche. Vf. nimmt eine temporäre Halogenüberempfindlichkeit unbekannter Ursache an. (Dtsch. med. Wchschr. 51. 153. Berlin-Lichtenberg, Städt. Krankenh.) FRANK.

Hattie L. Heft, Max Kahn und William J. Gies, *Untersuchungen über das physiologische Verhalten von Glycerintrimargarat [Intarvin]*. I. Versuche über die Wirkung des Intarvins bei mehreren Generationen von weißen Ratten als Zusatz zu einem natürlichen Futter. In bisher 4 Generationen war unter besagten Umständen kein Unterschied zwischen Intarvin u. natürlichem Fett festzustellen. (Proc. of the soc. f. exp. biol. and med. 21. 479—80. 1924. New York, Columbia Univ.; Ber. ges. Physiol. 29. 242. Ref. LESSER.) SPIEGEL.

E. M. Benedict, W. S. Ladd, M. L. Strauss und Randolph West, *Der Nährwert des Intarvins*. (Vgl. vorst. Ref.). Bei Diabetikern u. Normalen zeigte sich, daß Intarvin Eiweiß spart, die Ketonkörperausscheidung herabsetzt u. den Respirator. Quotienten erniedrigt. Es wird zu 92—98% resorbiert. (Proc. of the soc. f. exp. biol. and med. 21. 485—87. 1924. New York, Columbia Univ.; Ber. ges. Physiol. 29. 242. Ref. LESSER.) SPIEGEL.

S. Lauter und M. Jenke, *Über die biologische Wertigkeit von Fleisch, Kartoffeln und Weizenmehl*. Der Begriff der „biolog. Wertigkeit“ ist relativ. Der Wert eines Nahrungsmittels ist nicht nur von seinem Gehalt an hochwertigen Aminosäuren abhängig, sondern auch von der momentanen Eiweißavidität des Körpers. Deshalb ist die Prüfung der biolog. Wertigkeit nur dann gut vergleichbare Ergebnisse, wenn bei den Versuchspersonen ungefähr der gleiche Eiweißzustand des Körpers hergestellt wird. Vff. wählten als Ausgangspunkt ihrer Unterss. das sogenannte Minimum wegen der Konstanz der N-Ausscheidung. So ergab sich, daß die in verschiedenen Formen zur Erreichung des niedersten Gleichgewichts nötige Menge bei Fleisch 115 bzw. 120%, bei Kartoffel 120 bzw. 135%, bei Weizenmehl 160 bzw. 175% der minimalen N-Ausscheidung betrug. (Dtsch. Arch. f. klin. Med. 146. 173—86. München, Univ.) SPIEGEL.

Kanzaburo Hizume, *Über Fermentuntersuchungen bei Ernährungsstörungen im Kindesalter*. (Jahrb. f. Kinderheilk. 106. 227—44. 1924. Berlin, RUDOLF VIRCHOW-Krankenh.; Ber. ges. Physiol. 29. 295. Ref. BLOCH.) SPIEGEL.

Harry E. Dubin und **Casimir Funk**, *Untersuchungen über die Chemie Dorschlebertrans*. II. *Ein Lebertrankonzentrat mit antirachitischen und antiophthalmischen Eigenschaften*. (I. vgl. Proc. of the soc. f. exp. biol. and med. **21**. 1. C. 1924. II. 1108.) Durch ein besonderes Verf., dessen Natur nicht angegeben, läßt sich aus Lebertran eine Fraktion gewinnen, die den gesamten Vitamingehalt sowohl antirachit. als auch antixerophthalm., enthält. Das Prod. ist frei von P, N, enthält S u. gibt die H₂SO₄-Rk. des Lebertrans. (Proc. of the soc. f. exp. biol. and med. **21**. 458—60. 1924. New York, Lab. von H. A. METZ; Columbia Univ. Ber. ges. Physiol. **29**. 239—40. Ref. WIELAND.) SPIEGEL.

Alfred F. Hess und **Mildred Weinstock**, *Weitere Versuche über die antirachitische Wirkung des Eidotters*. (Vgl. HESS, Proc. of the soc. f. exp. biol. and med. **20**. 369; C. 1924. I. 1559.) Zum Schutze von Ratten bei P-armen Kost vor Auftreten von Rachitis genügen 0,05 ccm Eidotter täglich, bei Ca-armen Kost die Wrkg. weniger günstig. Subcutan wirken erst 0,15 ccm. Das Unverseifbare des Dotters wirkt entsprechend dem Ausgangsmaterial, doch ist die Wirksamkeit möglicherweise nicht auf diese Fraktion beschränkt. Durch 20 Min. langes Kochen des Eies leidet die antirachit. Wrkg. des Dotters nicht merklich, wohl aber durch Trocknen u. Aufbewahrung in trockenem Zustande. (Proc. of the soc. f. exp. biol. and med. **21**. 441—42. 1924. New York, Columbia Univ.; Ber. ges. Physiol. **29**. 240. Ref. WIELAND.) SPIEGEL.

Franz Zernik, *Die angebliche Zerstörung der Vitamine in Lebertranemulsionen*. Nach dem gegenwärtigen Stande der Wissenschaft sind im Lebertran zwei Lipovitamine enthalten, nämlich Vitamin A u. Vitamin E. Das antixerophthalm. Vitamin A wirkt im wesentlichen fördernd auf das Wachstum u. ist gegen Hitze u. Alkali beständig, aber gegen Oxydation empfindlich. Das antirachit. Vitamin E wirkt heilend u. schützend bei Rachitis u. ist sehr widerstandsfähig gegen äußere Einflüsse. Weder aus der Literatur noch aus der Praxis ergeben sich irgendwelche Anhaltspunkte oder Beweise dafür, daß die Wirksamkeit dieser Vitamine in Lebertranemulsionen zerstört werde. (Pharm. Ztg. **70**. 156.) DIETZEL.

Harry J. Deuel jr. und **Robert Weiss**, *Der Grundumsatz bei Mangel an Vitamin B*. Vitamin B hat keinen Einfluß auf die Wärmeproduktion. Die Abnahme bei B-freier Fütterung entspricht nur der Körpergewichtsabnahme infolge verminderter Nahrungsaufnahme. Umsatzsteigerung auf der Höhe der Polyneuritis durch den gesteigerten Tonus der Muskulatur zu erklären. Mit dem Hungertode zustande hat der hohe N-Umsatz in diesem Stadium nichts zu tun. Es scheint aber Zusammenhänge zwischen dem Grade des Vitaminhungers u. dem Grundumsatz zu bestehen. (Proc. of the soc. f. exp. biol. and med. **21**. 456—58. New York, CORNELL-Univ. med. coll.; Ber. ges. Physiol. **29**. 238. Ref. WIELAND.) SPIEGEL.

Siegfried Gräff, *Zur Avitaminose der Taube*. Auf Grund der Best. der H-Zahl im Gewebe u. der Nadirk. kommt Vf. zu folgenden Schlüssen: Bei ausschließlicher Fütterung mit geschältem Reis gefütterten Tauben löst eine Säuerung bestimmter Hirnteile einerseits eine Verminderung ihres Oxydationsvermögens, andererseits nervöse Reizerscheinungen aus, welche sich als Speiseretention oder Opisthonus zu erkennen geben. Bleibt bei Reistauben die Säuerung des Gehirns aus, dann treten auch keine Reizerscheinungen auf, der Tod erfolgt aus anderer unbekannter Ursache, möglicherweise als allgemeiner Hungertod. Vf. betrachtet obige Thesen noch nicht als definitiv erwiesen, sie sollen vielmehr als ein Arbeitsplan für weitere Forschungen aufgefaßt werden. Ein Vergleich des Wesens der Reiskrankheit der Tauben mit Vergiftungen durch KCN ergab, daß bei Reistauben die H-Zahl aller Organe u. die Geschwindigkeit der Indophenolblaubildung gesetzmäßig gleichläufig mit der H-Zahl während KCN-vergiftete Tauben keine Bindung an den Parallelismus zeigten. D.

beiden Fällen herabgesetzte Oxydationsvermögen bestimmter Teile des Gehirns ruht auf durchaus verschiedenen Zustandsänderungen der Zellen. (Münch. med. Wchschr. 72. 122—25. Heidelberg.) FRANK.

Pankraz Heilmann, *Stoffwechseluntersuchungen nach totaler Magenresektion*. In 4 Totalresezierten leben 2 beschwerdefrei. Die Stoffwechselunters. ergab bei beiden n. Eiweißverdauung, dagegen schlechte Ausnützung des Fettes. Die Röntgenbeobachtung ergab eine Hyperperistaltik im ganzen Darmtraktus. Infolge mangelhafter Aufschließung der Speisen besteht erhöhte Indikanurie. Die Harnacidität sinkt nicht nach der Hauptmahlzeit, dagegen die Alkaleszenz des Blutes. Die NaCl-Ausscheidung in Harn u. Kot ist vermindert, nicht jedoch unmittelbar nach der Operation. (Münch. med. Wchschr. 72. 178—82. Bamberg, Allgem. Krankenh.) FK.

K. Felix und Kj. v. Oettingen, *Beitrag zum Kohlenhydratstoffwechsel der normalen menschlichen Placenta*. Wird der Durchblutungsfl. für überlebende menschliche Placenta Traubenzucker zugesetzt, so verschwinden davon 18—33%, bei gleichzeitigem Insulinzusatz nimmt der Zuckergehalt nicht ab. (Monatsschr. f. Geburtsh. u. Gynäkol. 67. 41—46. 1924. Heidelberg, Univ.; Ber. ges. Physiol. 29. 4. Ref. FELIX.) SPIEGEL.

W. Berg und V. Falk, *Mikroskopische Untersuchungen über den Zusammenhang von Eiweißabbau und Fettgehalt in den quergestreiften Muskelfasern des Frosches im Winter*. Fett wurde nur in solchen Muskelfasern gefunden, in denen die Ninhydrinrk. positiv war, während diese auch in Abwesenheit von färbbarem Fett auftrat. Der Eiweißabbau erscheint danach als der primäre Vorgang, der das vorher larvierte Fett mkr. darstellbar macht. Dieses verschwand aus den Muskelfasern Ende April, während sich Eiweißabbau bis zum Schluß der Beobachtungsgang (Mitte Mai) feststellen ließ. (Jahrb. f. Morphol. u. mkr. Anat. 2. Abt. 1. 297 S. 309. 1924. Königsberg, Univ.; Ber. ges. Physiol. 29. 247—48. Ref. ARNDT.) SP.

H. Beumer, *Gibt es einen intermediären Cholesterinabbau?* Wird der Totalcholesteringehalt von Tieren vor u. nach längerem Hungern miteinander verglichen, läßt sich entscheiden, ob ein Verbrauch von Cholesterin in dieser Zeit eintreten ist, vorausgesetzt, daß die zu vergleichenden Tiere in ihrem Cholesterin gehalt einigermaßen übereinstimmen. Dies trifft bei jungen Hunden gleichen Wurfs gleichen Gewichts, die 7—10 Tage gesäugt waren, tatsächlich zu. 3 Hunde wurden 15—20 Tage lang nur mit Ringerlsg. getränkt, während bei 3 anderen sofort das Gesamtcholesterin bestimmt wurde. Obwohl die Hungerhunde zum Teil s zu $\frac{1}{3}$ ihres Körpergewichts u. ihr ganzes Fett verloren hatten, stimmte ihr Gesamtcholesteringehalt (einschließlich Kost) fast genau mit dem der Kontrollhunde überein. Es findet demnach im Hunger bei umfangreichster Einschmelzung anderer Körpergewebe ein Abbau von Cholesterin nicht statt. Auch unter n. Verhältnissen muß ein oxydativer Abbau des Cholesterins als sehr fraglich angesehen werden, da eine Zerstörung in größerem Umfange kann nicht die Rede sein. (Dtsch. med. Wchschr. 51. 230. Königsberg, Univ.) FRANK.

E. Fourneau, *Gegenwärtiger Stand der Chemotherapie*. Vortrag mit ausführlichen Literaturangaben. (Bull. Soc. Chim. de France [4] 37. 1—30. Inst. PASTEUR.) HA.

H. H. Dale, *Fortschritte und Aussichten der Chemotherapie*. (Lancet 207. 57—61. 1924; Ber. ges. Physiol. 29. 319—20. Ref. SCHNITZER. — C. 1924. II. 349.) SPIEGEL.

J. Meßner, *Ein Irrtum in der pharmakologischen Wismutliteratur*. In unseren Landbüchern werden dem Bi Vergiftungserscheinungen zur Last gelegt, die durch die Irrungen des Kernerschen Falles entstanden sind. Dieser Arzt hatte eine Vergiftung durch angebliches Bi-Subnitrat beschrieben, das in Wirklichkeit aus Hydrarg. raecipit. alb. bestand, was aber erst 6 Jahre später bekannt wurde. (Pharm. Zentralbl. 66. 97—99. Darmstadt.) DIETZE.

E. Meneghetti, *Pharmakologische Wirkung des kolloidalen Antimonsulfids*. Minimale tox. Dosis des Präparates ist für Kaninchen intravenös 0,006—0,007 pro kg, sicher letale 0,01 g. Die tox. Wrkg. kennzeichnet sich durch Depressionzustand, Parese der Hinterbeine, schlechten Puls, oberflächliche u. seltene Atmzüge, Albuminurie u. beruht auf Ausfallen des sehr zur B. von Ndd. neigenden Präparates. Die in den großen Kreislauf gelangten Teilchen werden in der Leber zurückgehalten u. verschwinden, wenn die Tiere am Leben bleiben, allmählich durch Lsg. oder chem. Veränderung. Dann erst wird pharmakolog. Wrkg. bemerkbar, von gleicher Art wie nach gewöhnlichen, nichtkolloidalen Lsgg. (Arch. internat. de pharmacodyn. et de thérapie **29**. 31—62. 1924. Padova, Univ.; Ber. ges. Physiol. **29**. 307. Ref. WACHOLDER.) SPIEGEL.

H. Zeehuisen, *Über Sensibilisierung des Kaliums durch Nicotin*. Im Anschluß an Feststellungen von ZWAARDEMAKER über Sensibilisierung der Radioaktivität durch Adrenalin u. Cholin wurde der Einfluß von *Pyridin*, *Chinin*, *Strychnin*, *Atropin*, *Koffein*, *Strophanthin*, *Saponin*, *Curare*, *Coniin* u. *Nicotin* untersucht, wobei nur das letzte immer deutlich sensibilisierend für K, nicht für U wirkte. Die Minimal- u. Maximaldosen des K wurden erheblich verringert u. die Akkomodationsbreite des Herzens gegenüber K reduziert. Mit Curare, dem Antagonisten des Nicotins, wurde wiederum eine Verschiebung des Gleichgewichtes zwischen K u. U nach Seite des letzteren beobachtet, aber nicht bei völligem Herzstillstand. Coniin wirkte in dieser Richtung stärker, beide sensibilisierten K nicht. Bei Saponin war eine Wrkg. festzustellen, die aber mit der tox. einherging u. das Herz nach kurzem Aufwachen zum Stillstand brachte. (Archives néerland. sc. exact. et nat. **9**. 289—90. 1924. Ber. ges. Physiol. **29**. 311—12. Ref. ZEEHUISEN.) SPIEGEL.

Rose A. Kriz, *Selektive Wirkung von Strychnin und Nicotin auf einzelne Zellen*. Ciliaten reagieren bei Einw. von Lsgg. der beiden Alkaloide mit einer Art Agglutination u. für jedes mit sehr charakterist. komplizierten Bewegungsänderungen bedingt durch Lähmungen, welche die Wimpern an der einen oder der anderen Stelle ergreifen. (Americ. naturalist **58**. 283—87. 1924. Milwaukee [Wisconsin] MARQUETTE Univ. med. school; Ber. ges. Physiol. **29**. 312. Ref. HEYMANN.) SPIEGEL.

Erwin E. Nelson und George F. Keiper jr., *Der Angriffspunkt verschiedener peripher wirkender Gifte*. III. *Die Wirkung von Pilocarpin auf die glatte Gefäßmuskulatur*. An Hunden mit erhaltenem Nerv vergrößern kleine Dosen (0,02 mg) Pilocarpin das Pfortenvol. unter Senkung des Blutdrucks, während große jenes erniedrigen, den Blutdruck aber ebenfalls herabsetzen. Nach Durchschneidung des Nervus ischiadicus wirken schon kleine Dosen erniedrigend auf beide. An Fröschen (Läwen-Trendelenburgsches Präparat) bedingt 0,1% Pilocarpin in der Durchspülungsfl. Gefäßerweiterung. (Arch. internat. de pharmacodyn. et de thérapie **29**. 11—18. 1924. Ann Arbor, Univ. of Michigan med. school; Ber. ges. Physiol. **29**. 312. Ref. ELLINGER.) SPIEGEL.

E. Tolstoi, R. O. Loebel, S. Z. Levine und H. B. Richardson, *Die Milchsäurebildung im Diabetes nach Insulingabe*. (Vgl. TOLSTOI, Journ. Biol. Chem. **69**; C. **1924**. II. 998.) Steigerung des respirator. Quotienten (RQ) u. Abnahme des Blutzuckers unter Insulinwrkg. kommen ohne jede Änderung der Milchsäure im Blute vor, diese vermehrt sich aber, wenn Hypoglykämie eintritt, aber auch während Adrenalinhyperglykämie (partielle Anoxybiose?). Die Änderung des RQ nach Insulin ist nicht durch B. von Milchsäure, sondern durch Verbrennung von Zucker zu erklären. Insulin u. Adrenalin setzen anorgan. P_2O_5 im Blute herab. (Proc. Soc. f. exp. biol. and med. **21**. 449—52. 1924. New York, Bellevue Hosp.; Ber. ges. Physiol. **29**. 241. Ref. LESSER.) SPIEGEL.

John R. Murlin, C. Clyde Sutter, R. S. Allen und H. A. Piper, *Günstige Wirkung von per os zugeführtem Insulin*. Das Insulin wurde in Kapseln od.

bletten mit gegen Magenverdauung widerstandsfähiger Hülle zusammen mit $-0,2\%$ HCl gegeben. (Proc. of the soc. f. exp. biol. and med. **21**. 338—40. Chester; Ber. ges. Physiol. **29**. 242. Ref. LESSER.) SPIEGEL.

C. Heymans und M. Matton, *Beitrag zur Kenntnis der Wirkung des Insulins auf den Stoffwechsel*. Insulin führt beim n. Kaninchen keine Änderung der CO_2 -ausscheidung (I) u. der Lungenventilation (II) herbei, so lange keine hypoglykäm. Symptome bestehen. Injektion von hyperten. Glucoselsg. intravenös steigert I um 20% ohne Änderung durch gleichzeitige Insulininjektion. Danach betrachten wir das Verschwinden des Blutzuckers unter Insulin nicht als Folge gesteigerter Zuckerverbrennung. Narkose mit Urethan senkt I, II u. die Temp. (III), gleichzeitige Insulingabe führt auch hier bei hyperglykäm. gemachten Tieren zu keiner Änderung. Beim Hungerkaninchen senkt Insulin I, II u. III. Red. von Dinitrophenol durch ausgeschnittene Gewebe wird durch Insulin beschleunigt. Im hypoglykäm. Stadium steigert es I u. II, langsamer auch III. Hefegärung wird nicht beschleunigt. (Arch. internat. de pharmacodyn. et de thérapie **29**. 311—42. 1924. Gen. u. Univ.; Ber. ges. Physiol. **29**. 241. Ref. LESSER.) SPIEGEL.

F. N. Allan, D. J. Bowie, J. J. R. Macleod und W. L. Robinson, *Das Verhalten pankreasloser Hunde, die mit Insulin am Leben erhalten wurden*. (Vgl. VALENTI, Amer. Journ. Physiol. **67**. 275; C. **1924**. I. 2528.) Pankreoprive, dauernd mit Insulin behandelte Hunde zeigten Krankheitserscheinungen, die nach kürzerer oder längerer Zeit zum Tode führten, besonders bei kurzer Entziehung des Insulins nach längerer Darreichung. Auf Fett- u. Stärkezufuhr reagierten sie sofort mit schweren Darmstörungen. Bei ausschließlicher Ernährung mit fettarmem Fleisch u. Zucker sind sie zunächst von n. Tieren nicht zu unterscheiden, dann aber treten Erscheinungen von Leberintoxikation auf, Ikterus, Verweigerung der Nahrungsaufnahme, Erbrechen, Schwäche, blutig gefärbter Kot. Das Originalpräparat gibt noch die Sektionsbefunde u. Angaben über Fett- u. Glykogengehalt. (Brit. Journ. of exp. pathol. **5**. 75—83. 1924. Toronto, Univ.; Ber. ges. Physiol. **29**. 241—41. Ref. LESSER.) SPIEGEL.

Heinz Rahmlow und Georg Raatz, *Erfahrungen mit Noktal, einem neuen Barbitursäure-Hypnotikum*. Bericht über günstige Erfahrungen mit Noktal als Schlafmittel. (Dtsch. med. Wchschr. **51**. 153—54. Berlin, Krankenh. Gitschinerstraße.) FRANK.

Emil J. Pellini und Arthur D. Greenfield, *Über den Mißbrauch von Narcotics*. II. *Über das Vorkommen von toxischen Substanzen im Serum bei Morphingewöhnung*. (I. vgl. Arch. of internat. med. **26**. 279; C. **1921**. I. 341.) Die Angaben von VALENTI (Arch. f. exp. Pathol. u. Pharmak. **75**. 437; C. **1914**. I. 1518) über das V. derartiger Substanzen im Serum morphingewöhnter Hunde konnten nicht bestätigt werden. (Arch. of intern. med. **33**. 547—65. 1924. New York, Univ.; Bellevue Hosp.; Ber. ges. Physiol. **29**. 313. Ref. ELLINGER.) SPIEGEL.

Hans Schmoller, *Ein neues hochwertiges Kalkpräparat*. Bei akuten Formen der Tetanie wurden mit einem Ca-Präparat, *Cealmalt* (Herst. PFEFFERMANN & Co., Berlin), das eine 6% Calc. chlorat. sicc. entsprechende u. an Malzsuppenextrakt gebundene Menge Ca enthält, gute Resultate erzielt. Der Geschmack unterscheidet sich nicht wesentlich von dem des Malzsuppenextrakts. (Dtsch. med. Wchschr. **50**. 133. 1924. Berlin.) FRANK.

B. Stuber und A. Nathansohn, *Diurese- und Diureticastudien*. III. (Vgl. Arch. f. exp. Pathol. u. Pharmakol. **96**. 296; C. **1923**. III. 1190.) Unterss. bei instantanen Kostaätzen verschiedener Art zeigten, daß ein gehörig wirkendes Diureticum (Theocin) neben der Steigerung der Ausfuhr von W. u. NaCl auch Steigerung der Basenausscheidung hervorruft, sowohl bei Säure- als bei Basenüberschuß in der Kost. Die Ansprechbarkeit auf ein Diureticum ist aber indi-

viduell verschieden. 1 Tag nach der Verabreichung des Diureticums, besonders nach starker diuret. Wrkg., wurde neben der Minderausscheidung von W. u. N. auch eine solche von Basen bei meist ungeminderter, bisweilen mäßig erhöhter Säuremenge festgestellt. Es kann so saurer Harn bei Kost mit Basenüberschuss auftreten. In einem Falle von Schrumpfniere, wo Theocin noch diuret. wirksam erschien, die Überführung des Harns in alkal. Rk. erschwert. (Dtsch. Arch. f. klin. Med. 146. 145—62. Freiburg, i. Br., Univ.) SPIEGEL

Albert Stahl, *Die Wirkung der gebräuchlichsten Brechmittel*. Aufstellung für die Veterinärmedizin wichtigsten Brechmittel, ihre pharmakolog. Wrkgg. Nebenwrkgg. (Dtsch. tierärztl. Wehschr. 33. 53—54. Hannover, Tierärztl. Hochschule.) FRANK

Otto Mergelsberg, *Über Reargon*. Klin. Bericht. Das Reargon entspricht nicht den Erwartungen, die von vielen Seiten an dieses Antigonorrhöikum geknüpft wurden. Die Abortivkur gelingt selten, Reizerscheinungen u. Komplikationen werden häufig beobachtet. (Dtsch. med. Wehschr. 51. 69—70. Aachen.) FRANK

Hans Kreitmair, *Über Digenea und das daraus hergestellte Wurmmittel Helminal*. Helminal „Merck“ (vgl. Pharm. Zentralhalle 63. 287; C. 1922. IV. 9) besitzt gute wurmabtreibende Wrkg. Schädliche Nebenerscheinungen wurden nicht beobachtet. (Münch. med. Wehschr. 72. 56—57. Erlangen, Univ.) FRANK

J. F. Caius und K. S. Mhaskar, *Die Beziehung zwischen chemischer Struktur der Anthelmintica und ihrem therapeutischen Wert bei Gelegenheit der Hakenwurmsstudie in der Madraspräsidentschaft*. XVII. Antiseptica. Von den untersuchten Mitteln — KMnO_4 , Kaolin, Naphthalin, Phenocoll, Methylenblau, Duotal, Kreosot, Oleum copaivae, Oleum cassiae u. Izal — zeigten für Abtreibung von Haken-, Rund- u. Peitschenwürmern nur die beiden letzten eine sehr geringe Wirksamkeit, die anderen gar keine. (Indian Journ. of med. res. 11. 92—102. 1923; Ber. ges. Physiol. 29. 315. Ref. DOLD.) SPIEGEL

J. F. Caius und K. S. Mhaskar, *Die Beziehung zwischen chemischer Struktur der Anthelmintica und ihrem therapeutischen Wert bei Gelegenheit der Hakenwurmsstudie in der Madraspräsidentschaft*. XVIII. Abführmittel. (Vgl. vorst. Ref.) Alster-Succus acalyphae u. Crotonöl waren wirkungslos, ganz geringe Wrkg. hatten Ricinusöl, Kalomel u. Phenolphthalein. (Indian Journ. of med. res. 11. 103—9. 1923; Ber. ges. Physiol. 29. 315. Ref. DOLD.) SPIEGEL

J. F. Caius und K. S. Mhaskar, *Die Beziehung zwischen chemischer Struktur der Anthelmintica und ihrem therapeutischen Wert bei Gelegenheit der Hakenwurmsstudie in der Madraspräsidentschaft*. XIX. Mit Thymol verwandte Gifte. (Vgl. vorst. Ref.) Thymotal (Thymolcarbonat) u. Carvacrol wirken schwächer als Thymol, das zweite wirkt dabei mehr reizend u. tox. Campher ist prakt. unbrauchbar. Es folgt, daß Thymol u. Carvacrol wegen des Benzolcharakters, der Phenolnatur und der Stellung des OH zum CH_3 wurmwidrig, zugleich aber giftig auf den Wurm wirken, Veresterung des OH u. Hydrierung des Benzolkernes beide Wrkgg. verringern, bei vollständiger Beseitigung des Benzolcharakters die wurmwidrige Wrkg. schwindet, während Giftwrkg. bleibt. (Indian Journ. of med. res. 11. 337—46. 1923; Ber. ges. Physiol. 29. 315—16. Ref. SCHÜBEL.) SPIEGEL

J. F. Caius und K. S. Mhaskar, *Die Beziehung zwischen chemischer Struktur der Anthelmintica und ihrem therapeutischen Wert bei Gelegenheit der Hakenwurmsstudie in der Madraspräsidentschaft*. XX. Kohlenstofftetrachlorid. (Vgl. vorst. Ref.) Gegen Ankylostomum wie gegen Necator amer. ist CCl_4 in Gaben von 5 ccm ein gutes Anthelminticum, dabei für den Menschen in dieser Dosis im allgemeinen nicht tox. Auf Rundwürmer wirkt es wenig, auf Peitschenwürmer nicht. Die Giftigkeit des CCl_4 wird durch Ggw. von CS_2 erhöht. Da nach 5 ccm beim Menschen ähnlich wie beim Hunde nach 5 ccm CCl_4 fettige Degeneration von Leber u. Nieren

treten kann, werden Gaben von nur 3 cem empfohlen. (Indian Journ. of med. res. **11**. 347—51. 1923; Ber. ges. Physiol. **29**. 316. Ref. SCHÜBEL.) SPIEGEL.

J. F. Caius und K. S. Mhaskar, *Die Beziehung zwischen chemischer Struktur Anthelmintica und ihrem therapeutischen Wert bei Gelegenheit der Hakenwurmadie in der Madraspräsidentschaft. XXI. Verschiedene Wurmmittel.* (Vgl. vorst. Hft.). *Ankylostomum* ist gegen *Santonin* weniger widerstandsfähig als *Necator*. *Desmotosantonin* ist für den Wirt ungiftiger, *Desmotroposantonin*, in dem statt CO eine phenol. OH-Gruppe sich findet, ist zwar für den Menschen viel weniger giftig, aber ohne nennenswerte Wrkg. auf den Hakenwurm. *Oleum Rutae*, Äthylonylketon enthaltend, wirkt auf Hakenwürmer tödlich, nicht auf Spulwürmer. *Embeliasäure* (aus getrockneten Früchten von *Embelia ribes*), Samen von *Butea*, Abkocht von *Margosablättern*, Dekokt von *Granatrinde*, *Pelletierintannat*, *Quassiainfus*, *Arnoniasamen* u. *Cocos nucifera* waren gegen Hakenwürmer unwirksam. (Indian Journ. of med. res. **11**. 353—70. 1923; Ber. ges. Physiol. **29**. 316. Ref. SCHÜBEL.) SP.

J. F. Caius und K. S. Mhaskar, *Die Beziehung zwischen chemischer Struktur Anthelmintica und ihrem therapeutischen Wert bei Gelegenheit der Hakenwurmadie in der Madraspräsidentschaft. XXII. Auszug und Schlußfolgerungen.* (Vgl. vorst. Ref.). Die Unters. von 70 chem. Verb., von denen 20 bei maximalen u. submaximalen Dosen sich wirksam gegen Würmer zeigten, hat keinen Zusammenhang zwischen dieser Wrkg. u. der chem. Konst. erkennen lassen. (Indian Journ. of med. res. **11**. 371—75. 1923; Ber. ges. Physiol. **29**. 316—17. Ref. SCHÜBEL.) SP.

J. Schumacher, *Die Ergebnisse der Syphilisforschung.* Die Wrkg. der Asäpräparate, insbesondere des Salvarsans u. seiner Derivv. auf Spirochäten wird geschildert. Auch Sb-Präparate u. V-Salze können eine gewisse Wrkg. haben. Weitere wirksame Körper sind in der Chininreihe u. unter den Farbstoffen zu suchen. Die histochem. Erforschung der Unterschiede im chem. Aufbau der Körperzelle einerseits u. der zu bekämpfenden Parasitenzelle andererseits muß möglichst abgeschlossen sein, bevor das Tierexperiment beginnt. (Apoth.-Ztg. **40**. 150—51.) DIETZE.

R. Douris und G. Beytout, *Vergleichende Toxikologie antisypilitischer Quecksilbermedikamente.* In Verss. an Hunden, Kaninchen, Fröschen u. Fischen wurden $\text{Hg}(\text{CN})_2$ u. seine Verb. mit Hexamethylentetramin, das *Veryl* (vgl. Bull. Sciences Pharmacol. **30**. 76; C. 1923. II. 1010), verglichen. In der Giftwrkg. ergeben sich nur geringe u. nicht konstante Differenzen zugunsten des Veryl, doch zeigt dieses in therapeut. Gaben nicht die Unzuträglichkeiten des $\text{Hg}(\text{CN})_2$ bei gleicher antisypilit. Wirksamkeit. (Bull. Sciences Pharmacol. **32**. 7—20. Nancy, Fac. de Pharm.) SPIEGEL.

E. F. Mueller und C. N. Myers, *Die Wirkung von Arsenverbindungen und Verbindungen aus der Salvarsangruppe auf das vegetative Nervensystem.* Veränderung der Leukocytenzahl nach intravenösen Salvarsaninjektionen (Leukopenie in den peripheren Gefäßen) steht mit dem autonomen Nervensystem in Beziehung. Silberarsen hat keinen Einfluß auf Leukocytenzahl u. Blutgefäße. Tödliche Dosen des gewöhnlich benutzten Salvarsans erzeugen keine Veränderungen in der Rk. des autonomen Nervensystems, das Mono-Na-Salz oder saure Lsgg. dagegen erhebliche, gefährliche oder tödliche Störungen dieses Systems sind nicht dem Salvarsan selbst, sondern Veränderungen seiner Lsgg. zuzuschreiben. (Proc. of the soc. f. exp. biol. and med. **21**. 474—77. 1924. New York, Columbia Univ.; Ber. ges. Physiol. **29**. 37. Ref. SCHÜBEL.) SPIEGEL.

Karl Petrén und Mart. Odin, *Zur Wirkung des Neosalvarsans bei akuter Leukämie (Sepsis?).* Klin. Bericht über Erfolge der Behandlung von akuten Leukämie mit Neosalvarsan in 2 Fällen. Beim 1. Fall trat Gesundung ein, beim 2. Fall Veränderung der akuten in chron. Leukämie mit langer Remission. (Therapie d. Gegenst. **66**. 6—12. Lund, Med. Klinik.) FRANK.

Felix Klemperer, *Zur Chemotherapie der Tuberkulose. Die Behandlung der Tuberkulose mit Prof. Holger Møllgaards Goldpräparat Sanocrysin.* Klin. Bericht über Erfahrungen bei Behandlung der Tuberkulose mit Sanocrysin von MØLLGAARD. Das weiße, in W. l. krystallin. Pulver hat die Zus. $\text{Au}(\text{S}_2\text{O}_3)_2\text{Na}_3$. Die an Tiere u. zum Teil auch an Menschen durchgeführten Verss. lassen noch keinen einwandfreien Schluß auf die Wirksamkeit des Präparates zu. (Therapie d. Gegenwart 66 23—27. Berlin.) FRANK.

Kurt Brünecke, *Über Seifen- und Terpestrolseifenbehandlung der Tuberkulose der unspezifischen Bronchopneumonie und der Bronchitis.* Bei obigen Krankheiten erzielt Vf. gute Resultate durch Einreibungen mit Schmierseife, besonders aber mit Terpestrolseife. (Dtsch. med. Wchschr. 51. 68—69. Sülzhayn, Kinderheilstätte.) FRANK.

Bratke, *Behandlung von Keuchhusten und Durchfall mit Parakodin.* Bericht über gute Erfolge bei der Behandlung von Keuchhusten u. Durchfall bei Kindern mit Parakodin (KNOLL). (Dtsch. med. Wchschr. 51. 70. Breslau.) FRANK.

Jean La Barre, *Das Eingreifen der peristaltikanregenden Substanzen in die Wirkung der Opiumalkaloide auf den Darm.* Nach Verss. an isolierten Darmerschlingen des Kaninchens mit Chlorhydraten der verschiedenen Alkaloide sowie mit Pantopon, Opon u. Narcophin ergeben sich 2 Wirkungsgruppen: 1. Hypertonisierend (bei folgenden optimalen Mengen auf 100 cem Thyrodelsg.): *Morphin* (10 mg), *Codein* (5 mg), *Thebain* (2 mg), *Narcein* (2 mg), sämtlich hypotonisierend bei 60 mg. — 2. Hypotonisierend, von der angegebenen Menge an, mit wachsender Menge bis zu völliger Darmlähmung steigend: *Narcotin* (0.15 mg), *Kryptopin* (1 mg), *Xanthalin* (2 mg). — *Pantopon*, *Opon* u. *Narcophin* wirken hypotonisierend, das zweite 20 mal stärker als das erste. — Das *Cholin* des Darmes greift in diese Wrkgg. der Alkaloide ein, anscheinend mit ihnen Komplexe oder Verbb. bildend. Seine Diffusion, ebenso wie die der anderen peristaltikanregenden Substanzen des Darmes wird durch die hypotonisierenden Alkaloide gehemmt. — Opon u. Narcotin erscheinen als die geeignetsten Mittel, den Darm zum Stillstand zu bringen. (Arch. internat. de pharmacodyn. et de thérapie 29. 179—303. 1924. Bruxelles, Univ.; Belg. ges. Physiol. 29. 313—14. Ref. STRAUSS.) SPIEGEL.

Hans Truttwin, *Die chemische Seite des Andriolprinzips.* Die klin. Wrkgg. der verschiedenen Andriolpräparate (vgl. LASCH, Wien. med. Wchschr. 74. 1311 C. 1924. II. 715) werden angeführt. Mit Andriol-Bi-Lsg. in k. oder w. Badebehandlung tier. Wolle wies eine prachtvoll orange Färbung auf, die als Beizungsunterlage für Alizarinfarbstoffe benutzt werden kann. Es besteht anscheinend ein Parallelismus zwischen Auffärbbarkeit eines Stoffes auf tier. Faser u. seiner therapeut. Wrkg., wenigstens soweit es die Tiefenwrkg. von außen betrifft. Diejenigen sauren Farbkörper werden die tiefgehendsten Wrkgg. zeigen, die auf die Wollfaser am raschesten u. kräftigsten ziehen. (Münch. med. Wchschr. 72. 18 bis 183. Prag.) FRANK.

L. Lewin, *Untersuchungen an Haffischern mit „Haffkrankheit“.* In Harnen u. Kot von Kranken, in Haaren u. Organen einer erkrankt gewesenen u. verendeten Katze, im Blute der Erkrankten, vor allem aber im Haffwasser wurde As in nicht unerheblichen Mengen in gel., nicht flüchtigen u. flüchtigen Verbb. nachgewiesen. Wahrscheinlich können aus dem in das Haffwasser gelangten As (aus 2 am Pregolegelegenen Fabriken, bei denen es als unerwünschtes Nebenprod. entsteht, in die Abwässer gelangt u. durch einen Kanal in eine Bucht des Haffs geleitet wird) durch Lebewesen des W., bezw. des Schlicks, flüchtige organ., in besonderer Weise schädigende Verbb. entstehen. Durch diese Annahme der Haffkrankheit als eine As-Schädigung ist jedoch die eigenartige regionäre Verbreitung des Leidens u. die oft paradox erscheinende Verteilung der Kranken nicht aufgeklärt. Die starke

schmerzender Erkranken sind die gleichen Schmerzen, die sich nach chron. Vergiftung manchmal ausbilden, hier durch die viel höhere Energie der flüch-
ten organ. As-Verbb. akut erzeugt. (Dtsch. med. Wchschr. 51. 133—34.
rlin.) FRANK.

P. G. Dal Collo, *Nierenschädigung bei akuter Thalliumvergiftung*. Bei Kaninchen
r nach dem Tode infolge intravenöser Injektionen von Tl-Acetat besonders der
fangsteil der Tubuli contorti geschädigt, bei Meerschweinchen u. Ratten zeigten
h mehr diffuse, die ganzen Tubuli u. auch das Gefäßsystem erfassende Ver-
änderungen. (Sperimentale 78. 519—26. 1924. Napoli, Univ.; Ber. ges. Physiol.
307. Ref. RENNER.) SPIEGEL.

W. E. Gye und W. J. Purdy, *Die giftigen Eigenschaften der kolloidalen
Kieselsäure*. III. (I. u. II. vgl. Brit. Journ. of exp. pathol. 3. 75. 86; C. 1922. III.
2.) Die bei verschiedenen Tierarten festgestellten giftigen Eigenschaften der
kolloidalen Kieselsäure werden auf Veränderungen der Endothelien in den Ca-
laren zurückgeführt. Die Veränderung des Lebergewebes führt zu Cirrhose. Da
Kieselsäure in vielen Nahrungsmitteln vorkommt, wird die Frage aufgeworfen, ob
auch bei patholog. Zuständen des Menschen eine Rolle spielt. (Brit. Journ. of
exp. pathol. 5. 238—50. 1924. London, National Inst. f. med. res.; Ber. ges. Physiol.
306. Ref. JOACHIMOGLU.) SPIEGEL.

Raffaele Menzani, *Toxische Phänomene nach geringen Antipyrindosen*. Eine
au zeigte sehr starke Intoleranzerscheinungen schon nach 0,05 g Antipyrin per
nach 0,03 g lästige Urticaria. (Bull. d. scienze med. 2. 123—25. 1924. Bologna,
iv.; Ber. ges. Physiol. 29. 315. Ref. RENNER.) SPIEGEL.

Ernst Kratzeisen, *Zwei Fälle von Pilzvergiftung*. Bericht über 2 Vergiftungs-
le mit tödlichem Ausgang nach Genuß von Pilzen bei einer 20jährigen u. einer
jährigen Frau. In dem einen Falle waren vermeintliche Champignons, im anderen
orcheln roh gegessen worden. Klin. waren vor allem schwere Schädigungen der
ber, der Niere u. des Herzens festzustellen. (Wien. klin. Wchschr. 38. 96—97.
linz, Stadtkrankenh.) FRANK.

F. Pharmazie. Desinfektion.

Joachimoglu, *Über die Auswertung einiger wichtiger Arzneimittel*. Die pharma-
log. Auswertung der Digitalisblätter, des Hypophysenextraktes (das eine antagonist.
rkg. zum Insulin besitzt) u. des Adrenalins nach verschiedenen Verff. wird be-
prochen. (Apoth.-Ztg. 40. 139—40.) DIETZE.

H. Mentzel, *Neue Arzneimittel, Spezialitäten und Vorschriften*. Boehdeco
B. BOEHDEN, Berlin SW), 6,4% Hg-Präcipitat u. 93,6% Paraffinsalbe. — Carvin
RÜNING & Co., Berlin N), vermutlich ein künstliches Mineralw. — Ronolin-
letten (P. WOLLBRAND, Berlin-Adlershof), 23,8% Mg(OH)₂, 65,83% Mg-Carbonat,
2% CaCO₃, 0,03% Fe-Carbonat, 0,38% Alkali-Carbonat, 9,44% Mg-Silicat, bei
pfschmerzen u. Magen-Darmbeschwerden. — Silikoklein (KOLIN), Tabletten mit
taminen u. pflanzlicher SiO₂. — Testitotal (LABOSCHIN), Rejuven masculin., aus
Tierhoden bereitet. — Thyreoid-Dispert (KRAUSE-Medico, München), Tabletten aus
Milchmittel in Tropfenform. — Urethroklein (KOLIN), Hexamethylentetramin in
Tabletten. — Uriceoklein, Tabletten aus Succus Citri neutr. cum Acylpyrino u.
taminen, gegen Rheuma. — Vagintus (M. ELB, Dresden-A.), kolloides Al-Präparat,
r Fluorbehandlung. — Hormokutan (HAGEDA), bisher Hormokutin. — Malfin
(heinsche Serum-Ges. Deutsch. Tierärzte, Köln-München), organ. u. anorgan.
uren, HCOOH, SiO₂, Cymophenole, Oxychinolinsalze u. Jod. — Stibosan (V. HEYDEN)
bisher „471“, bei trop. Infektionskrankheiten. — Xerosinpräparate (WEIGERT),

Ichthyol, Acid. boric., ZnO, Talk u. Gelanthum. — *Pellidol-Xerosin* enthält 1% Pellidol; *Zinnober-Schwefel-Xerosin* 1% S u. Zinnober.

Chloraminlösungen, aus Tabletten zu bereiten. — *Chloraminsalben*, 4—10% Chloramin-HEYDEN u. Vaseline oder Unguent. Paraffini. — *Diabram* (CHR. BRAUNE, Zerbster Kräutermittel unbekannter Zus., gegen Diabetes. — *Insulin Organon Neerlandicum* (N. V. ORGANON, 'Oss-Holland), in 1 cem 20 neue Einheiten, 40% stärker als frühere Präparate. — *Nerostenol*, P, HCOOH, endokrine u. paragangline Säfte, bei Neurasthenie. — *Nervakon* (Apoth. KUNTZ, Pfeddersheim-Rheinhausen), Sanguinalbuminsaccharatlsg. — *Lecithin*, Mentholcinnamylvalerylester, Fe, Mn, bei Blutarmut usw. — *Nottol* (Pharm. Lab. „Tisania“, München), zur Unterbrechung der Schwangerschaft. — *Novirudin* (Dr. V. STEIN, Aussig), eine der Gruppe der Melaninsäuren angehörige Substanz, zur Behinderung der Blutgerinnung. — *Orral*, Kombination von Orangenblütensaft u. Valeriana. — *Tisaniastift* („Tisania“, München), zur Verhütung der Empfängnis. — *Vesculan mite und forte* (R. & O. WEIL), Fucus vesiculosus u. mild. Drastica, gegen Fettsucht.

Carnatin (SCHIMMEL & Co.), synthet. Riechstoff mit Nelkengeruch. — *Eufilavin* neutrales Acriflavin in Pulverform u. in Tabletten zu 0,056 g. — *Falicain* (FAHLBERG LIST & Co., Magdeburg), p-Amidobenzoyldiäthylaminoäthanol. — *Forxol*, 0,5 g Mn, 1 g Ca-, 0,25 g Fe-Nucleophosphat, 0,03 g Monomethylarsenigsäure gebunden an Mn, Ca, Fe, 2,6 g Hexosohexaphosphorsäure, 0,015 g nucleinsaures Dimethylxanthin, 25 g Monoanhydrobihexose, 10 g Propantriol, Vitamine usw. — *Glauramin*, Lsg. von Auramin in A. u. Glycerin, gegen Gonorrhöe. — *Guajacolhonigpräparat*, 7% Ka-sulfogajacol. u. 5% Extr. Primulae. — *Libanotol* (SCHIMMEL & Co.), synthet. Riechstoff mit Geruch nach brennendem Weibrauch. — *Notyol*, Salbe aus Litiol, Sulfoschistol, Hamamelisextrakt, ZnO, Borax u. Salbengrundlage. — *Supragol*, gleichartig mit Krysolgan. — *Tubersanol*, Erethynsäure, organ. SiO₂, Ca in Kolloidallsg. Gerb- u. Bitterstoffe. (Pharm. Zentralhalle 66. 55—56. 72. 85—87. 103—4.) DIETZE.

—, *Neue Arzneimittel*. *Tuberkulin-Antigen-Scheitlin-Tasch*, ein Tuberkulotoxin u. Antitoxin. (Pharm. Ztg. 70. 57—58.) DIETZE.

—, *Neue Arzneimittel*. *Oxantin* (Hoechst), Dioxyaceton, weißes Pulver, l. in gleichen Teilen W. von 20° beim Verreiben, schneller beim Erwärmen, bei Zuckerkrankheit, insbesondere Coma, intravenös 15—30 g in 10—20%ig. Lsg. (Apoth.-Ztg. 40. 154—55.) DIETZE.

—, *Spezialitäten und Geheimmittel*. *Aphrodite* (PAUL HARTMANN A.-G., Heidenheim), Hg-Präcipitat, Bi-Subnitrat, Vaseline u. Lanolin. — *Bronchitine* (PAUL HARTMANN A.-G.), Kautschukpflaster mit äth. Ölen, gegen Keuchhusten. — *Colisil* (Co-Li G. m. b. H., Dresden-A.), SiO₂-Lsg. mit A., gegen Lungenleiden. — *Demo* (H. FROMME, Bonn), Camphor, Ol. Eucalypt., Terebinth., Sinap., Hyoseyam., Methyl. salic., CHCl₃, Chloralhydr., Lanolin u. Vaseline, gegen Rheuma. — *Dermotaft* (PAUL HARTMANN A.-G.), wasserdichter Verbandstoff. — *Erosan* (TEICHGRÄBER A.-G., Berlin S 59), fettfreier Hautcreme. — *Eu-Med* (TELL & Co., Berlin O 34), Tabletten aus Coffein, Phenacetin, Sedatin u. Pyra. — *Glycerinomucigen* (Apoth. WEISZ & Co., Wien), Glycerin, 7% ZnO, 5% Stärke, 5% Talkum u. Schleim. — *Guanolkopfschmerz-tabletten*, *Paeckels* (Apoth. PAECKEL, Erfurt), Aminophenazon, Chinin, Guarana u. Kola. — *Heliochrom-Spezial-Frostbeulen-Tinktur* (TEICHGRÄBER A.-G., Berlin S 59), bewährte Mittel gegen Frostbeulen. — *Hypnopyrin* (VON SEYDLITZ, Berlin-Steglitz), Antipyreticum. — *Nephro-Myrmekan* (KRULL & Co., Güstrow), HCOOH-Lsg. — *Siccolan* (Co-Li, Dresden-A.), haltbare SiO₂-Lsg., bei Arteriosklerose. (Apoth.-Ztg. 40. 144—45.) DIETZE.

W. Nagel, *Über die bakterizide Wirkung von Stabulol*. *Stabulol* (Herst. Dtsch. Gold- u. Silberscheideanst., Frankfurt a. M.), eine konz. Lsg. von Aldehyden, hydroxytoluolartigen Körpern u. anderen Bestandteilen des Steinkohlenteers, komm

Rohware u. als Stabulol-Extrakt in den Handel. Die Verss. ergaben, daß obigeparate bei allen Bakterienstämmen mit Ausnahme der Staphylokokken demol durchschnittlich um das 2—4fache überlegen sind. Auf diese wirken beidech gut ein. Die Stabulolrohware ist zur *Desinfektion von Ställen* geeignet.sch. tierärztl. Wchschr. 33. 51—52. Frankfurt a. M., Univ.) FRANK.

Ferdinand Krechel, *Über Verchon, ein neues Desinfektionsmittel*. Verchon, Ce-Chinolinderiv. (Herst. Niederlausitzer Chem. Werke) bewährte sich alsloses, ungiftiges u. die Hände nicht angreifendes Ersatzmittel für Jodtinktur.sch. med. Wchschr. 51. 235. Berlin, Marienkrankenhaus.) FRANK.

Merck & Co., New York, übert. von: **William H. Engels**, Rahway, New Jersey, St. A., *Alkalisalze von Benzylestersäuren*. Benzylestersäuren von mehrbas. anorgan. organ. Säuren werden bei Abwesenheit von W. mit Alkalihydroxyden odercarbonaten behandelt. — Man löst die betreffenden Säureester in Aceton oderoholen, neutralisiert mit Alkalihydroxyd oder -carbonat u. scheidet die Alkalie der betreffenden Benzylestersäuren aus den Lsgg. entweder durch Krystallisationder Kälte oder durch Fällung mit Ä., Bzl. oder Gasolin ab. Beispiele sindegeben für die Herst. der Na-Salze der *Dibenzylphosphorsäure*, des *Bernsteinremonobenzylesters* u. der *Benzylphthalestersäure*. Die in W. ll. Salze haben spasmod. Wrkg. u. finden in Form von Injektionen therapeut. Verwendung. Anstelle des NaOH oder Na_2CO_3 lassen sich die Hydroxyde oder Carbonate des NH_4 oder Li verwenden. (A. PP. 1485377, 1485378 u. 1485379 vom 25/4. 1922, ausg. 4/3. 1924.) SCHOTTLÄNDER.

Merck & Co., New York, übert. von: **William H. Engels**, Rahway, New Jersey, St. A., *Herstellung von Alkali- und Erdalkalisalzen der Salicylosalicylsäure*. Man handelt in einem indifferenten organ. Lösungsm., wie Aceton, Äthylacetat, Bzl. oder Chlf., gel. *Salicylosalicylsäure* bei mäßig erhöhten Tempp. mit Alkali- oder Erdalkalcarbonaten. — Beispiele sind angegeben für die Herst. des Na-Salzes der Säure zur Verwendung von wasserfreiem Na_2CO_3 u. Aceton bezw. Bzl. als Lösungsm. Verwendung von Aceton muß das Salz durch Ä. oder Bzl. aus der Lsg. gefällt werden, nach teilweiser Entfernung des Acetons durch Dest. im Vakuum. Das *Salicylosalicylsäure Natrium*, weißes, in W. mit neutraler Rk. ll. Pulver findet, ebenso wie die anderen Salze, als *Analgeticum* therapeut. Verwendung. (A. P. 1483217 vom 22/9. 1922, ausg. 12/2. 1924.) SCHOTTLÄNDER.

J. D. Riedel Akt.-Ges., Berlin-Britz, *Darstellung leicht löslicher organischer Ammoniumverbindungen*, dad. gek., daß man die Bi-Salze der Oxymercurisalicylsäure oder ihrer Derivv. in Ggw. von Eiweißstoffen oder deren Abbauprodukten erzeugt oder in frisch dargestellten Verbb. durch Zusatz von Lsgg. dieser Schutzkolloide in W. überführt, worauf man beim Eindunsten oder Ausfällen mit Hilfe organ. Lösungsmmm. die festen Verbb. abscheidet. — Z. B. wird eine wss. Lsg. von *oxymercurisalicylsäurem Na* mit einer durch Aufspaltung von Gelatine mit HCl gegebenen neutralisierten Gelatose lsg. versetzt u. allmählich eine konz. wss. glycerinhaltige Lsg. von $\text{Bi}(\text{NO}_3)_3$ zugegeben. Aus der Lsg. erhält man, gegebenenfalls nach Dialysieren, durch vorsichtiges Eindunsten das *komplexe Bi-Salz* der *Oxymercurisalicylsäure*, schwach gefärbte Lamellen, in W. ll. — Durch Einw. von frisch dargestelltem $\text{Bi}(\text{OH})_3$ auf eine mit wss. Gelatose versetzte Lsg. von *cyanmercurisalicylsäurem Kalium* entsteht eine im auffallenden Licht milchigtrübe, in W. Durchsicht klare Lsg., aus der mit Aceton die *komplexe Bi-Verb.* in fester Form gefällt wird. Die trotz der bekannten Neigung von Bi-Salzen, mit W. basische Salze abzuschcheiden, haltbaren Lsgg. finden therapeut. Verwendung. (D. R. P. 6867 Kl. 12 q vom 1/12. 1922, ausg. 29/11. 1924.) SCHOTTLÄNDER.

J. D. Riedel Akt.-Ges., Berlin-Brandenburg, *Darstellung eines leicht löslichen, organischen Wismutsalzes*, dad. gek., daß man *Lecithin* nach den üblichen Methoden in ein *bas. Bi-Salz* überführt. — Z. B. wird eine alkoh. *Lecithin*lsg. mit 10%ig. wss. NH_3 einer konz. wss. glycerinhaltigen Lsg. von $\text{Bi}(\text{NO}_3)_3$ versetzt. Der ausgeschiedene Nd. von *Lecithinwismut* wird mit Aceton gewaschen u. im Vakuum getrocknet. Das hellbraune Pulver ist in W., Chlf., KW-stoffen ll., in Fetten u. fetten Ölen unl., in A., Ä. u. Aceton unl. Das mit dem Vorzug der festen Form den der Lipophilie löslichkeit vereinigende Bi-Salz entfaltet in wss. Lsg. infolge seiner großen Oberflächenaktivität eine besonders starke therapeut. Wrkg. (**D. R. P. 407544** Kl. 12 vom 4/8. 1923, ausg. 17/12. 1924.) SCHOTTLÄNDER.

Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Leverkusen b. Köln a. R., übert. von: **Hans Hahl** und **Walter Kropp**, Elberfeld, *Herstellung einer organischen Wismutverbindung*. Guajacolcarbonsäure wird mit Wismutoxyd behandelt. — Z. B. wird das durch Einw. von verd. NaOH auf eine Lsg. von $\text{Bi}(\text{NO}_3)_3$ in 30% $\text{CH}_3\text{CO}_2\text{H}$ erhaltliche Bi_2O_3 in h. W. aufgerührt u. in eine sd. wss. Lsg. von Guajacolcarbonsäure eingetragen. Das gut verrührte Gemisch wird während 3 Stdn. unter Rückfluß gekocht, dann h. filtriert u. der Nd. mit h. W. neutral gewaschen, getrocknet u. gepulvert. Das erhaltene Prod., das *bas. Wismutsalz der Guajacolcarbonsäure* von der Zus. $\text{C}_6\text{H}_3(\text{OH}) \cdot (\text{OCH}_3) \cdot (\text{CO}_2 \cdot \text{BiO})$, weißlichgelbes, in W. u. organ. Lösungsmitteln unl. Pulver, besitzt antiluet. Wrkg. u. findet in Form von Ölemulsionen zu subcutanen Injektionen Verwendung. Die anästhesierenden Eigenschaften der Guajacolcarbonsäure wirken schmerzlindernd bei der Injektion. Das Salz enthält ca. 53–56% Bi. (**A. P. 1522054** vom 15/4. 1924, ausg. 6/12. 1925.) SCHOTTLÄNDER.

Merck & Co., New York, übert. von: **William H. Engels**, Rahway, New Jersey, V. St. A., *Herstellung einer organischen Wismutverbindung*. Man führt 8-Oxychinolin nach den üblichen Methoden in das *bas. Wismutsalz* über. — Beispiele sind angegeben für die Herst. des Salzes durch Einw. von $\text{Bi}(\text{OH})_3$ auf das 8-Oxychinolin in wss. Suspension bei erhöhter Temp., — bezw. durch Umsetzung der wss. Lsg. des Na-Salzes des Oxychinolins mit $\text{Bi}(\text{NO}_3)_3$ oder Bi-Subnitrat bei 60°, — bezw. einer wss. Lsg. des neutralen 8-Oxychinolinsulfats mit Bi-Subnitrat unter Zusatz von wss. NaOH bei 60°. Das *bas. 8-Oxychinolinwismut* der Zus. $\text{C}_9\text{H}_6\text{N}_2\text{O} \cdot \text{Bi}(\text{OH})_2$ leuchtend gelbes Pulver, unl. in W. u. alkal. Lsgg., auf Zugabe von Säuren, selbst verd. $\text{CH}_3\text{CO}_2\text{H}$, sich zers., findet als *Wundantiseptikum* therapeut. Verwendung. (**A. P. 1485380** vom 22/9. 1922, ausg. 4/3. 1924.) SCHOTTLÄNDER.

Leo Adler, Frankfurt a. M., *Herstellung eines den Stoffzerfall im Organismus und gleichzeitig die Temperatur herabsetzenden Mittels*, dad. gek., daß man die Bauchspeicheldrüsen von Wirbeltieren, im besonderen winterschlafenden, mit W. oder physiolog. NaCl-Lsg. bei möglichst niedriger Temp. extrahiert, den Auszug filtriert, das Filtrat mit A. behandelt, den eiweißhaltigen Nd. entfernt u. die Lsg. im Vakuum einengt. — Das eiweißfreie, aber N-haltige Prod. zeigt keine Biuretreaktion, reagiert gegen Lackmus neutral; in sterilen Ampullen eingeschmolzen ist die Lsg. haltbar. Eine Injektion von 1,0 ccm gibt bei coliefiebernden Kaninchen eine Senkung der Temp. von 40,8 auf 39,1°, bei typhuskranken Patienten eine solche von 2 ccm wiederholt eine Herabsetzung um 1,5–2,0°. Diese antipyret. Wrkg. beruht besonders auf der Hemmung des Eiweißzerfalls. Ein Beispiel für die Herst. des Auszuges aus von *Igel*n während des Winterschlafes entnommenen Bauchspeicheldrüsen ist angegeben. (Hierzu vgl. auch Arch. f. exp. Pathol. u. Pharmak. 91. 1. C. 1922. I. 150.) (**D. R. P. 406531** Kl. 12p vom 8/3. 1921, ausg. 21/11. 1924.) SCHOTTLÄNDER.

George Washington Carver, Tuskegee, Alabama, V. St. A., *Kosmetisches Mittel*. Erdnüsse werden fein vermahlen u. mit h. oder k. W. gut verrührt, hierauf auf dem Wasserbade bis zur Ausscheidung von Öltröpfchen auf der Oberfläche eingedampft.

Kaolin oder Fullererde zu einer dicken Salbe verrieben u. mit etwas Salicylure, Benzoin u. einem Duftstoff vermischt. Durch Zusatz von Farbstoffen läßt sich die Pomade oder Salbe beliebig färben. (A. P. 1522176 vom 17/9. 1923, ausg. 1925.)

SCHOTTLÄNDER.

Maurice M. Bluhm und **Hermann Theaman**, New York, V. St. A., *Zahnreinigungsmittel*, bestehend aus gepulverter pflanzlicher Faser u. einer schwachen Weinsäure. — Man verwendet zweckmäßig weiches Holz, z. B. Weidenholz, das in einem staubfeinen Pulver vermahlen u. mit W. u. einer Fruchtsäure zu einer Paste angerührt wird, der Fruchtessenzen, Glycerin, u. Gummiarabicum als Bindemittel, zugesetzt werden können. Das Prod. greift den Zahnschmelz nicht an, wirkt jedoch hinreichend reinigend auf die Zähne. (A. P. 1522410 vom 5/3. 1924, ausg. 6/1. 1925.)

SCHOTTLÄNDER.

G. Analyse. Laboratorium.

J. A. Christiansen, *Eine Bürette zur Mikrogasanalyse*. Vf. beschreibt einen einfachen Apparat zur Mikrogasanalyse. Die Bürette ist im Original abgebildet. Das Gas wird durch eine Toeplerpumpe abgeleitet, über Quecksilber gesammelt und bei Atmosphärendruck analysiert. (Journ. Americ. Chem. Soc. 46, 109—12. Kopenhagen [Dänemark], Univ.)

JOSEPHY.

G. Chesneau, *Bericht über die Apparate „Pluton“ von M. Alabarbe*.

Vf. beschreibt einen Ölbrenner für Laboratoriumszwecke, bei dem der Brennstoff dem Brenner mittels Druckluft zugeführt wird. Die Konstruktion des Brenners ist aus Fig. 3 ersichtlich. (Bull. soc. encour. industrie nationale 123. 597 bis 600. 1924.)

JUNG.

Hannemann, *Eine praktische Druckfiltervorrichtung für den Laboratoriumsgebrauch*. Das Druckfilter der Firma PFLUGBEIL & Co., Berlin N 4, Chausseestr. 120, besteht aus zwei Schalen, die luftdicht verschraubt werden; die obere trägt neben einem Manometer ein Fahrradschlauchventil, durch das mit einer Luftpumpe Luft gepreßt wird. An den konischen Austritt der unteren Schale können Filtriernutschen angeschlossen werden. Der App. eignet sich vor allem zum Filtrieren von Lsgg. in flüchtigen Lösungsmitteln. (Chem.-Ztg. 49. 140—41.) JUNG.

Bernhard Neumann und **Ernst Zöllner**, *Die Ursache des Reißens der Rohre von Vakuumverdampfapparaten*. Neue u. gebrauchte Flußeisenrohre aus Vakuumverdampfapparaten wurden auf ihre chem. Zus., ihre Festigkeitseigenschaften u. u. Mk. geprüft. Ihr Gefüge untersucht, um den Grund für das häufige Reißen solcher Rohre zu klären oder in der Nähe der Einwalzstelle aufzuklären. Dies ist beim Eindampfen von NaOH oder Aluminatlauge nicht auf chem. Angriff oder übermäßige mechan. Beanspruchung zurückzuführen, sondern darauf, daß an den Einwalzstellen durch das Aufwalzen eine Deformation (Kaltreckung) des Materials stattfindet, die noch durch mehr oder weniger unsachgemäßes Walzen verstärkt werden kann. Diese ist die Ursache, daß nach kürzerer oder längerer Zeit durch die in den App. herrschenden Verdampfungsstemp. die Sprödigkeit des Materials sich an diesen Stellen soweit steigert, daß Blaubruch eintritt. Das Reißen ist also auf Blaubruch zurückzuführen. Eine Verringerung dieser Gefahr kann nur dadurch erreicht




Fig. 3.

ihren zeitlichen Schwankungen gesondert zu registrieren. Das hauptsächlichste Hilfsmittel hierzu ist Umpanzierung der Ionisierungskammer mit einer 12 cm dicken Schicht u. Verwendung äußerst empfindlicher Elektrometer. (Physikal. Ztschr. 40—43. Königsberg.)

FRANKENBURGER.

E. Grynfeldt und P. Cristol, *Einfaches Verfahren zum Erzielen der Berliner-reaktion in der Cytochemie auf durch alkalische Bichromate fixierten Organen*. Paraffinschnitte werden erst mit $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$ behandelt, dann der Rk. nach PERL verworfen, schließlich nacheinander mit konz. Lsg. von $\text{K}_4\text{Fe}(\text{CN})_6$ (10—30 Min.) 4%ig. HCl (4—5 Min.) behandelt. (Bull. Soc. Chim. Biol. 5. 797—800. 1923; r. ges. Physiol. 29. 195—96. Ref. PÉTERFI.)

SPIEGEL.

Rudolf Lang, *Über neue jodometrische Methoden, die auf der Bildung und Färbung von Jodcyanid beruhen*. II. u. III. Mitt. (I. vgl. Ztschr. f. anorg. u. allg. Chem. 122. 332; C. 1922. IV. 819.) Durch die Oxydation der zu messenden Stoffe mit positiv einwertigem J, wobei eine äquivalente Menge J frei wird, erhalten die Jodattitrationen ihre allgemeinste Form. Diese Jodattitrationen lassen sich auch mit bromoxydimetr. Methoden anwenden, wodurch rasche Oxydation oder eine in verschiedenen Fällen nötige Bromierung erreicht wird. Hierbei wird zunächst in salzsaurer bromidhaltiger Lsg. bei Abwesenheit von HCN das Br in Freiheit gesetzt u. ein Überschuß zurücktitriert. Zum Schluß mit HCN umgesetzt u. mit Jodat- titriert. Aus Verss. über das Verh. von JBr gegen HCN schließt Vf., das JBr im Gegensatz zu JCl in wss. Lsg. zum Teil dissoziiert ist. Eine allzuhohe Bromidkonz. bei Ggw. von HCN wirkt ungünstig auf die Titrationsergebnisse, der Jodatverbrauch ist zu groß u. es wird zur B. von BrCN Anlaß gegeben. JCN dagegen ist von keinerlei Wrkg. auf Bromide. Ungenau wird die Jodstärkerk. bei hoher HCl - u. zu geringer HCN -Konz. Nicht beseitigen lassen sich Störungen durch Ag - u. Hg -Salze, wo die Jodstärkerk. zu früh aufhört oder ganz ausbleibt. Von den Lsgg. mit positiv einwertigem J, deren Darst. Vf. angibt, ist JCl un- begrenzt haltbar; JCN wird jedesmal neu hergestellt; JOH ist nur anzuwenden, wenn die Oxydation bei Zimmertemp. u. rasch vor sich geht, da, wie Verss. zeigen, fast bei nachfolgender Titration mit Jodat viel zu hohe Werte erhalten werden. Die Abnahme des Oxydationswertes führt Vf. zur Annahme eines Verlustes von J, hervorgerufen durch den Zerfall des Hypojodides in O_2 u. Jodid.

Bei der Best. von Jodidjodat in Gegw. von Schwermetallen fand Vf., daß sich *Ferri-jodid* gut bestimmen läßt, wenn mit sirupöser H_3PO_4 angesäuert wird. *Cupro-jodid* läßt sich glatt mit KJO_3 titrieren, angeschlossen wird hieran eine Titration mit $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ in oxalsaurer Lsg. *Bleijodid* wird in etwas Lauge gel., mit überschüssiger JCl oxydiert u. nach Zusatz von KCN mit KJO_3 titriert. Oder das PbJ_2 wird in salpetersaurer, CN -haltiger Lsg. mit Nitrit oxydiert u. nach Zusatz von J mit $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ titriert. Oder es wird in salpetersaurer Lsg. nach CN -Zusatz zunächst bis zum Hellerwerden der Blaufärbung u. nach erfolgtem Zusatz von NaCl mit KJO_3 titriert. *Quecksilberjodid* läßt sich direkt mit KJO_3 titrieren, sind Bromide anwesend, so wird nach KCN -Zugabe langsam mit Nitrit oxydiert, mit Harnstoff versetzt u. nach Zugabe von KJ mit $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ titriert. Ist Hg in größerer Menge in der Lsg. vorhanden, so wird es zweckmäßig vorher entfernt. *Silberjodid* gab meist zu hohe Jodidwerte, so daß das Ag zweckmäßig durch Red. mit Metallen vorher entfernt wird.

As (III)-Salze lassen sich gut jodometr. bestimmen, nur ist das Resultat bei sehr geringen As-Mengen stark abhängig von der Konz. u. von der HCl -Menge. Dieses kann umgangen werden durch Oxydation mit überschüssigem Jodat, welches dann zurücktitriert wird. Auch ist eine direkte Titration nach vorangegangener Oxydation mit JCl oder JCN stets möglich. Ferri- u. Ferro-Salze sind ohne Ein- laß. Resttitration mit As (III)-Salz wird am günstigsten in salzsaurer Lsg. aus-

geführt. *Sb (III)-Salze* verhalten sich bei der Jodattitration wie As. — *Cu-Salze* lassen sich nach einem Restverf. oder direkt bestimmen, durch Red. ammoniakalisch. *Cu (II)-Salzls.* mit KCN u. Titration des Cu (I) in mineral-saurer Lsg. mit Jodat. Ggw. von Pb, Fe, Co u. Mn stören nicht, nur ist es nötig, die Metallsalze in Lsg. zu halten, am besten mit $\text{Na}_4\text{P}_2\text{O}_7$. — *Fe (II)-Salze* lassen sich direkt mit Jodat titrieren, wenn zuvor mit JCl oder JOH oxydiert wird; oder nach dem bromoxydimetr. Verf. bestimmen. *Fe (III)-Salze* können durch ein Red.-Verf. bestimmt werden. — Befinden sich *As (III)* u. *Fe (II)-Sulfat* *nebeneinander* in Lsg. so wird erst das As durch Titration mit Jodat, nach vorheriger Zugabe von KCN bestimmt, danach mit JCl versetzt, stehen gelassen u. durch erneute Titration mit Jodat das Fe gefunden. Liegen *As (III)-* u. *Fe (III)-Sulfat* *nebeneinander* vor, so wird das Fe zunächst in schwach saurer Lsg. mit H_2SO_3 reduziert, oder in stärker schwefelsaurer Lsg. mit geringen Mengen von CuJ. Liegen *As (V)-* u. *Fe (III)-Salze* *nebeneinander* vor, so wird in schwefelsaurer Lsg. erst das As mit Zn oder Cu reduziert u. nach Abstumpfen der Säure auch das Fe. Auch *As*, *Cu* u. *Fe* *nebeneinander* lassen sich nacheinander bestimmen. Nach Red. mit H_2SO_3 wird mit H_2SO_4 angesäuert u. das As mit Jodat titriert. Es folgt die Titration des Fe mit Permanganat. Nun wird eingedampft, $\text{Na}_4\text{P}_2\text{O}_7$ u. NH_3 zugegeben u. das Cu mit Jodat gefunden.

N_2H_4 läßt sich ganz wie As bestimmen, da bei der Einw. von JCN auf N_2H_4 die gleichen Oxydationsprodd. entstehen. Bei der Best. größerer N_2H_4 -Mengen ist eine Titration mit $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ zweckdienlich. N_2H_4 u. NH_2OH *nebeneinander* lassen sich in schwefelsaurer Lsg. bestimmen, indem erst das N_2H_4 mit Jodatlsg. titriert wird u. nach Red. des gebildeten JCN mit Na_2SO_3 u. Ausfällung des Jodid mit AgNO_3 -Lsg., das NH_2OH nach Zugabe von $\text{FeNH}_4(\text{SO}_4)_2$ mit KMnO_4 titriert wird. — *HCN* läßt sich bestimmen nach vorheriger Jodierung, oder einfacher nach Bromierung, mit Br-Wasser in saurer Lsg., vermitteltst des bromoxydimetr. Verf. Wichtig ist bei der Best. von HCN neben oxydierenden Stoffen, daß Br auf JCN nicht einwirkt. — *HCNS* läßt sich nach mehreren Methoden bestimmen, da die Rk. zwischen HJO_3 u. *HCNS* verschieden geleitet werden kann. Die Oxydation in salz- oder schwefelsaurer Lsg. mit überschüssigem Jodat u. Zurücktitrieren mit $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ beruht auf der Rk.: $\text{CNS}' + \text{JO}_3' + \text{H}_2\text{O} = \text{SO}_4'' + \text{HCN} + \text{J}' + \text{H}$. Sie muß schnell vorgenommen werden, um Einw. des Luftsauerstoffes zu vermeiden. Bei direkter Titration mit Jodat kann man sich davon unabhängig machen, wenn man das Rhodanid zunächst mit JCl oder JCN oxydiert. Ist *CNS'* u. *J'* *nebeneinander* zu bestimmen, so wird erst die Summe beider Verbb. mit Jodat in Ggw. von HCN titriert u. gleich eine Titration des gebildeten JCN mit $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ abgeschlossen. — Soll *HCN* u. *HCNS* *nebeneinander* bestimmt werden, so muß eine Methode der Bromierung unter Mitwirkung von Jodat angewandt werden; es läßt sich hier ein Differenzverf. benutzen, aber es ist auch eine Nacheinander-titration möglich. — $\text{H}_4\text{Fe}(\text{CN})_6$ läßt sich durch direkte Titration mit Jodat nach vorheriger Oxydation mit JOH, die schnell vor sich geht, bestimmen. Auch ein Restverf. läßt sich anwenden. Es fällt auf, daß HJO_3 $\text{K}_4\text{Fe}(\text{CN})_6$ verhältnismäßig schnell oxydiert, Fe^{++} -Salz dagegen sehr langsam, umgekehrt wird Fe^{++} von JCl rasch angegriffen, während $\text{K}_4\text{Fe}(\text{CN})_6$ mit diesem kaum reagiert. — Befinden sich *HCN*, *HCNS* u. $\text{H}_4\text{Fe}(\text{CN})_6$ *nebeneinander*, so wird letzteres erst durch ZnSO_4 ausgefällt u. in einer besonderen Probe nach vorheriger Oxydation bestimmt zu werden. — H_2O_2 läßt sich direkt mit Jodat titrieren nach vorheriger Oxydation durch JOH (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. 142. 229—56. 280—98. Brünn. Deutsche Technische Hochschule.)

ULMANN.

Ernst J. Kraus, *Ein Entwurf von logarithmischen Tabellen für maßanalytische Bestimmungen*. Vf. empfiehlt die Aufstellung von speziellen Logarithmentabellen

r maßanalyt. Bestst., erläutert seinen Vorschlag an der Best. von Zn u. kündigt
e Herausgabe solcher Tabellen an. (Chem.-Ztg. **49**. 145.) JUNG.

B. G. van Name und **F. Fenwick**, *Das Verhalten von Elektroden aus Platin
und Platinlegierungen in der elektrometrischen Analyse. I. Ungleiche Elektroden.*
(vgl. WILLARD u. FENWICK, Journ. Americ. Chem. Soc. **44**. 2504; C. **1923**. IV. 313.)
Wenn 2 Elektroden, eine aus reinem Pt, die andere aus einer Legierung von Pt
u. Rh, in eine Lsg. von FeSO_4 tauchen, tritt eine Potentialdifferenz auf. Wenn
ein kleiner Teil des FeSO_4 oxydiert ist, haben beide Elektroden prakt. das gleiche
Potential bis die Oxydation fast vollständig ist. Dann wird die Potentialdifferenz
umso größer, je näher der wahre Endpunkt rückt. Die beiden wahrscheinlichsten
Ursachen für das Auftreten der Potentialdifferenzen zwischen zwei inerten Elektroden
sind a) daß die Elektroden nicht völlig unangreifbar sind, oder wahrscheinlicher
eine unvollkommene Reversibilität der Elektrodenrk. selbst. Der ideale Ausdruck
für das Elektrodenpotential einer inerten Elektrode ist $E = \text{const.} \times \log [x/(1-x)]$,
wobei x der Bruchteil des Elektrolyten der höheren Oxydationsstufe, $1-x$ der
der niederen Oxydationsstufe ist. Die größte Empfindlichkeit liegt demnach beim
Anfangs- u. Endpunkt der Oxydation, wo $x = 0$ bzw. 1 ist. Wenn die Er-
klärung b) richtig ist, müssen die Potentiale beider Elektroden sich mit der Zeit
demselben Wert nähern. Um das zu prüfen, wurden folgende elektrometr. Titra-
tionen ausgeführt: Fe^{2+} mit KMnO_4 , mit $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$; $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ mit Jod. Nur in Lsgg.
mit reversibler Elektrodenrk. erreichte die Potentialdifferenz mit der Zeit den Wert
Null, in allen Fällen wurde er jedoch angestrebt. Die Potentiale der Elektroden
wurden gegen eine AgCl -Elektrode als Nullelektrode gemessen. Die Pt-Rh-Elek-
trode hatte bei Oxydations- u. Reduktionsrkk. ein höheres Potential als die Elektrode
aus reinem Pt. Das Potential der Pt-Elektrode sank, bevor das der Pt-Rh-Elektrode
in Maximum erreicht hatte. Bei Titrationen von $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$ mit TiCl_3 verschwand die
Potentialdifferenz schon früh bis zum Endpunkt, wo die Pt-Rh-Elektrode ein höheres
Potential annahm. Bei Titration von $\text{Ce}(\text{SO}_4)_2$ mit $\text{Ti}_2(\text{SO}_4)_3$ hatte die Pt-Rh-Elek-
trode bis fast zum Endpunkt ein etwas höheres Potential. Nur bei Titration von
 I_2 mit KMnO_4 hatte bis fast zum Endpunkt die Pt-Elektrode das positivere
Potential. Bei verschiedenen Pt-Legierungen hängt die Beziehung zwischen Zeit
Potentialdifferenz zwar stark von der Natur des Metalls in der Legierung ab,
aber die Erscheinung ist nicht spezif. genug, um daraus auf die Natur oder die
Ursache der Verunreinigung schließen zu können. Wird eine frisch geglühte Pt-
elektrode in eine Lsg. von AgNO_3 getaucht, so verhält sie sich elektromotor. wie
eine, wahrscheinlich weil sie von einer unsichtbaren Ag-Schicht bedeckt ist. (Journ.
Americ. Chem. Soc. **47**. 9—19.) JOSEPHY.

B. G. van Name und **F. Fenwick**, *Das Verhalten von Elektroden aus Platin
und Platinlegierungen in der elektrometrischen Analyse. II. Polarisierete Elektroden.*
(vgl. vorst. Ref.) Die Unterss. oxydimetr. Titrationen mit polarisierten Elektroden
aus reinem Pt zeigten, daß die Schärfe des elektrometr. Endpunktes hauptsächlich
von dem Grad der Reversibilität der Elektrodenrk. vor u. nach dem Endpunkt
abhängt. Konz. u. die Art des Rührens sind von geringerem Einfluß. Der End-
punkt ist umso schärfer, je vollständiger reversibel die Elektrodenrk. auf der einen
Seite des Endpunkts u. je vollständiger irreversibel sie auf der andern Seite des
Endpunkts ist, aber er ist prakt. scharf genug für die Analyse auch in den Fällen,
in denen die Forderung nicht ganz erfüllt ist. Die Verschiebung des Endpunktes
durch die Polarisation ist so gering, daß sie für die Maßanalyse keine Bedeutung
hat, vielmehr verbessert die Polarisation hinsichtlich einer Pt-Hilfselektrode den
Endpunkt am Endpunkt der Titration. (Journ. Americ. Chem. Soc. **47**. 19—29. New
Haven [Connecticut], YALE Univ.) JOSEPHY.

Jean Barbandy, *Die Wasserstoffionenkonzentration. I. Teil: Die Methoden.*

Vf. behandelt die wissenschaftlichen Grundlagen der $[H']$ u. beschreibt ausführlich die elektrometr. u. colorimetr. Methoden zu ihrer Best. unter Verwendung der neuesten Veröffentlichungen. (Rev. gén. des Sciences pures et appl. **36**. 5—17.) T

Elemente und anorganische Verbindungen.

André Lévêque, *Die quantitative Mikroanalyse*. Übersicht über die bekannten gewordenen Methoden. (Bull. Sciences Pharmacol. **32**. 29—45.) SPIEGEL

A. Coquillat, *Quantitative Untersuchung auf Nitrit mit dem Tromsdorffschen Reagens*. Nach der Vorschrift von TROMSDORFF soll man das Gemisch von ZnO u. Stärke etwa 4 Stdn. kochen u. dann reines trockenes ZnJ_2 zugeben. Vf. zeigt, daß 1std. Kochen genügt, daß äquivalente Mengen von KJ oder CdJ_2 , die bequem erhältlich sind, die gleichen Dienste wie ZnJ_2 tun, daß beim Nachweis von wenig Nitrit ein Überschuß von KJ das Eintreten der Blaufärbung beschleunigt, daß ein Überschuß von Stärke die Färbung verschlechtert u. 1 g im Liter genügt. Ist die nachzuweisende Menge geringer als 0,1 mg N_2O_3 im Liter, so genügen 10 g KJ im Liter nicht mehr. Der Sauerstoffgehalt des Wassers ist auf die Intensität der Färbung von Einfluß. Unter genau gleichen Bedingungen ist bei Verwendung von lufthaltigem W. u. kleinen Mengen von N_2O_3 die Intensität der Färbung der N_2O_3 -Menge proportional, bei Luftfreiheit nicht. Das $ZnCl_2$ des Rezeptes kann vorteilhaft durch NaCl ersetzt werden, die Lsgg. sind dann etwas haltbarer. In die Empfindlichkeit mit der Menge der zugesetzten Lsg. steigt, wegen der höheren KJ-Menge, sollte man nie weniger als 5 ccm Reagens benutzen. Auch mit der zugesetzten Menge H_2SO_4 steigt die Empfindlichkeit; da es aber schwer ist, ganz nitritfreie H_2SO_4 zu bekommen, ersetzt man sie besser durch Eg. (5 ccm einer 10%ig. Lsg.) Jede Rk. kann als positiv gelten, die innerhalb 30 Min. eintritt. Die Lsg. von THRESH mit 1 g Stärke, 5 g KOH, 10 g KJ zu 1 Liter ist der von TROMSDORFF vorzuziehen, sie ist wegen des größeren Gehaltes an J' empfindlicher u. haltbarer, ähnlich die von DENIGES vorgeschlagene Lsg. mit CdJ_2 . Vf. schlägt folgende Zus. vor: 10 g KJ, 1 g l. Stärke, 20 g NaCl zu 1 Liter. Damit kann man noch 0,02 mg N_2O_3 im Liter nachweisen; die Lsg. hält sich 6 Monate unverändert. (Annales soc. espnola Fis. Quim. **22**. 523—44. 1924. Madrid, Facultad de Farmacia.) W. A. ROTH.

Chemisches technisches Laboratorium Ingenieur-Chemiker Welwar
Antimonbestimmungen. Die jodometr. Best. von Sb (vgl. ECKE, Chem.-Ztg. **48**. 537 C. 1924. II. 1612) ist nach den Literaturangaben stets mit Fehlern behaftet. Einfach u. genau ist das $KMnO_4$ -Verf. (Chem.-Ztg. **49**. 152. Wien IX.) JUNG.
A. Ecke, *Antimonbestimmungen*. Entgegnung zu vorst. Ref. (Chem.-Ztg. **49**. 152.) JUNG

H. Funk und H. Winter, *Über die quantitative Bestimmung der Borsäure bei Gegenwart von Aluminium- (Eisen-Chrom-) Salzen*. Größere Mengen von Al -, Cr^{+++} - oder Fe^{+++} -Salzen, welche die Best. der H_3BO_3 stören, lassen sich durch Fällung in alkal. Lsg. nicht gut entfernen, da diese Fällungen stets — mit Ausnahme von FeS — H_3BO_3 festhalten. Durch Verss. mit verschiedenen Al-Salzen u. Borax fand Vf., daß sich Al u. B_2O_3 gut trennen lassen, wenn man das Al in schwach essigsaurer Lsg. als Phosphat fällt. Aus dem Nd. läßt sich die H_3BO_3 gut auswaschen. Das Filtrat wird alkal. gemacht, eingeeengt, nach dem Erkalten sauer gemacht u. aus einer Retorte destilliert, das B_2O_3 gravimetr. bestimmt. Soll das Al gleichzeitig mitbestimmt werden, so wird die nur schwach saure Lsg. mit einem Überschuß von Jodid-Jodatmischung versetzt. Nach kurzem Erwärmen das $Al(OH)_3$ abfiltriert u. ausgewaschen, aus dem Filtrat das J durch H_2SO_4 entfernt, alkal. gemacht u. wie oben das B_2O_3 bestimmt. Cr läßt sich von H_3BO_3 gleichfalls nach der Jodid-Jodatmethode trennen, oder das in Chromat übergeführte Cr wird in essigsaurer

sg. mit BaCl_2 gefällt. Zur Trennung von Fe läßt sich die beim Al angewandte phosphatmethode verwenden, oder es wird mit NH_4SH gefällt, welches nachher durch Kochen mit Perhydrol zerstört wird. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. **142**. 57—68. München, Techn. Hochsch.)

ULMANN.

Gerhart Jander, Erwin Wendehorst und Berthold Weber, Über die Bestimmbarkeit geringer Mengen von Magnesium als Magnesiumammoniumphosphat bei Anwesenheit von viel Aluminium. Durch zahlreiche Verss. weisen Vff. nach, daß auch kleine Mengen von Mg neben viel Al gut bestimmen lassen. Zwecks Al -Best. wurde das zu untersuchende Rohaluminium bei 200° in einem Strom von trockenem Cl erhitzt u. schließlich in Al_2O_3 übergeführt. Die mit übergegangene MgCl_2 -Menge war praktisch ohne Bedeutung, ließ sich aber gut bestimmen. Das Al_2O_3 wird mit $\text{K}_2\text{S}_2\text{O}_7$ aufgeschlossen u. nach Zugabe von 3—5 Gewichtsteilen Weinsäure in der Siedehitze mit Na_2HPO_4 versetzt u. ammoniakal. gemacht. Immer, wenn auch oft nach mehrtägigem Stehen, fiel das NH_4MgPO_4 aus. Die Fällung wird durch gleichzeitige Anwesenheit von Al u. Weinsäure nur verzögert, nicht verhindert. (Ztschr. f. anorg. u. allg. Ch. **142**. 329—34. Göttingen, Univ.)

L. P. Hammett und C. T. Sottery, Ein neues Reagens auf Aluminium. Der Farbstoff Aurintricarbonsäure bildet mit Al -Salzen einen glänzenden roten Lack, der als Nachweis für Al dienen kann. Dieselbe Eigenschaft besitzen auch andere Metalle, z. B. Cr , doch mit dem Unterschied, daß der Al -Lack, wenn er einmal in einem Essigsäureacetatpuffergemisch gebildet ist, noch ziemlich lange beständig bleibt, wenn die Lsg. mit NH_4OH alkal. gemacht wird, während der Cr -Lack auf Zusatz von NH_4OH entfärbt wird. Die Empfindlichkeit des Nachweises geht bis zu 10^{-6} Mol. Al . Einen roten Nd . mit dem Reagens geben auch die Erdalkalien, auch werden diese Ndd. durch CO_3 -Ionen entfärbt. (Journ. Americ. Chem. Soc. **47**. 42—43. New York [N. Y.], Columbia Univ.)

JOSEPHY.

C. Kollo und N. Georgian, Neue Methode zur Trennung des Aluminiums vom Calcium mittels Hexamethylentetramin. Bei der Fällung von Al aus Al u. Ca enthaltenden Lsgg. mittels NH_3 werden meist für Al zu hohe Werte erhalten, da NH_3 aus der Luft CO_2 absorbiert u. durch das so gebildete NH_4 -Carbonat Ca als Carbonat (beim Erhitzen) mitgefällt wird. Diese Fehler werden bei Verwendung von Hexamethylentetramin vermieden, welches in W. ll. ist u. bei der Hydrolyse in NH_3 u. HCHO zerfällt; letzteres hat unter den in Frage kommenden Bedingungen weder auf Al , noch auf Ca einen Einfluß. — Zu der Al u. Ca enthaltenden neutralen oder schwach sauren Lsg. wird eine genügende Menge Hexamethylentetramin zugesetzt u. zum Sieden erhitzt (ca. 1 Min.), wobei sich NH_3 entwickelt u. reines carbonatfreies $\text{Al}(\text{OH})_3$ gefällt wird, das heiß filtriert wird. Aus dem Filtrat wird Ca wie üblich als Oxalat gefällt. Zu langes Kochen ist zu vermeiden. Die erhaltenen Resultate sind von theoret. Genauigkeit. (Bulet. Soc. de Chimie din România **6**. 111—12. 1924. Bukarest, Univ.)

ZANDER.

I. Ciocină, Abänderung der Methode zur Bestimmung des Kohlenstoffs im Gußeisen und Stahl durch Verbrennung im Sauerstoffstrom. Die bisher üblichen Verff. zur Best. des C im Gußeisen u. Stahl geben meist zu hohe Werte, da neben C auch der S des Eisens oxydiert wird, wobei sich SO_2 u. durch katalyt. Wrkg. des Porzellanrohres SO_3 bilden. Nach dem vom Vf. beschriebenen Verf. werden diese Störungen vermieden, wenn die entwickelten Gase zunächst durch einige J-förmige Röhren geleitet werden, in denen durch J in KJ -Lsg. das SO_2 vom CO_2 getrennt wird. — Eine große Rolle spielt ebenfalls die Absperrfl. in der Gasbürette. Bei Verwendung von frischem W . sind die erhaltenen Werte infolge Absorption zu gering, bei schon gebrauchtem W . u. Hg infolge des SO_2 -Gehaltes zu hoch; nach Abtrennung des SO_2 durch J erhält man mit CO_2 - u. O -gesätt. W . als Sperrfl. den theoret. Wert. (Bulet. Soc. de Chimie din România **6**. 97—99. 1924.)

ZAND.

I. Ciochină, *Die Schnellbestimmung des Schwefels im Gußeisen und Stahl.* 5 fein gepulvertes Gußeisen oder Stahl werden 10 Min. mit 3 g fester Soda über einem Bunsenbrenner geschmolzen u. nach einigem Abkühlen mit höchstens 150 b. 180 ccm W. (einschließlich Auswaschen) ausgezogen. Nach dem Hinzufügen von etwas frisch bereiteter Stärkelslg. wird folgendermaßen titriert: Man fügt schnell 10 ccm reiner konz. HCl zu u. titriert mit J in KJ-Lsg. Ein Gußeisen mit genau 0,124% S ergibt nach dieser Methode einen Gehalt von 0,118—0,120%, einen für die Praxis genügenden Wert. Die ganze Analyse kann von einem geübten Analytiker in 20 Min. ausgeführt werden. (Bulet. Soc. de Chimie din România 6. 100—1924.)

ZANDER.

Barbu N. Angelescu, *Neue Methode zur volumetrischen Bestimmung des Mangans.* Die vom Vf. beschriebene Methode zur volumetr. Best. des Mn beruht auf der Rk. zwischen dem Kation Mn^{++} u. dem Anion CrO_4^{--} . K_2CrO_4 -Lsg. erzeugt in Lsgg. von Mn-Salzen einen Nd., der sich beim Erhitzen sofort absetzt. Sein Zus. entspricht der Formel $MnCrO_4 \cdot 2H_2O$ oder $MnO \cdot CrO_3 \cdot 2H_2O$; seine Löslichkeit beträgt bei 15° in W. 1:3672, in 50%ig. A. 1:13513, in 75% A. 1:230000 in Ggw. von K_2CrO_4 -Lsg. ist die Löslichkeit noch geringer: in 30% A. 1:212000 in 40% A. 1:383000. — Analyse: Die Lsg. des Mn-Salzes (20 ccm mit ca. 0,15 bis 0,20 g Salz) wird mit 20 ccm $\frac{1}{10}$ -n. K_2CrO_4 u. 30 ccm absol. A. versetzt u. 15 Min. auf dem Wasserbade erhitzt. Nach dem Abkühlen wird die Lsg. im Meßkolben mit W. aufgefüllt u. in je 25 ccm Lsg. der Überschuß von K_2CrO_4 mittels $Na_2S_2O_3$ titriert. Die erhaltenen Resultate differieren um 0,02 bis höchstens 0,07% vom theoret. Wert. (Bulet. Soc. de Chimie din România 6. 109—10. 1924. Bukarest Univ.)

ZANDER.

S. J. Jindal, *Eine empfindliche Methode zum Nachweis von Kobalt, das allein oder in Gegenwart von Nickel- oder anderen Salzen in neutraler Lösung vorliegt.* Versetzt man eine verd. Co-Salzlsg. mit Na-Silicatlsg., so entsteht ein im Überschuß des Reagens mit blauer Farbe l. blauer Nd. Die Färbung verschwindet auf Zusatz von Mineralsäure u. erscheint wieder beim Neutralisieren mit NH_3 . Die blaue Lsg. wird auf Zusatz von Br oder Cl-Wasser grünlichgelb, in der Kälte nach längerem Stehen, in der Hitze schnell schwarz. H_2O_2 ruft dieselbe grünlichgelbe Färbung hervor, nicht aber die Schwärzung. Ni gibt mit Na-Silicat einen weißgrünen, im Überschuß des Reagens unl. Nd., der durch Oxydationsmittel nicht verändert wird. Ggw. von NH_4 , Ba u. Ca stört ebenfalls den Nachweis von Co nicht. Man kann so 0,000039 g Co in 5 ccm Lsg. nachweisen. Die Rk. verläuft wahrscheinlich so, daß zunächst Co-Silicat ausfällt, das sich im Überschuß von Wasserglas zu blauem $Na_4Co(SiO_3)_3$ löst. Dies wird durch Br zu unbeständigem grünlichgelbem $Na_3Co(SiO_3)_3$ oxydiert, das unter Abscheidung von $Co(OH)_2$ zerfällt (Chem. News 130. 34—35. Allahabad, Univ.)

HERTER.

Bestandteile von Pflanzen und Tieren.

Maurin, *Nachweis der Oxymethylantrachinone in einigen Purgativpflanzen.* Um freie Anthracenderivv. oder glucosid. Verbb. von solchen nachzuweisen, wurden die Pflanzenpulver einmal direkt mit sd. Chlf. ausgezogen, das andermal erst nach dem Verf. von DAELS (Bull. de l'Acad. de méd. de Belgique 27. 350 [1913]) hydrolysiert. Die Prüfung erfolgte dann mittels der Rkk. von BORNTAEGER u. von LESTAGE. Untersucht wurden mit durchweg negativem Erfolge: Stiele u. Blätter von *Colutea arborescens*, *Berberis vulgaris*, *Ceratonia Siliqua*, *Buxus sempervirens*, *Sambucus nigra* u. *Evonymus europaeus*, gegen Pflanzen von *Mercurialis annua*, *Globularia Alkymum*, *Scrofularia aquatica*, *Cichorium Intybus*, *Gratiola officinalis* u. *Linum catharticum*, Wurzeln von *Aclepias Vincetoxicum* u. *Mirabilis Jalapa*, Blätter u. Blüten von *Amygdalus Persica* u. *Genista purgans*, Stengel, Blätter u. Wurzeln

Sambucus Ebulus, Pulpa von *Tamarindus indica*. Die Abführwrkg. dieser Pflanzen oder Pflanzenteile beruht also nicht auf Ggw. von Anthracenderivv. (Bull. Sciences Pharmacol. **32**. 27—28. Toulouse.) SPIEGEL.

Raymond-Hamet, Über die Bestimmung des Yohimbins in den Rinden und den enischen „Yohimbe“-Präparaten. Das V. falscher Yohimbeherinden, die zum l statt des Yohimbins weit giftigere Alkaloide enthalten, macht es notwendig, den Rinden u. den daraus hergestellten galen. Präparaten nicht nur den Gesamtalkaloidgehalt, sondern das Yohimbin als solches zu bestimmen. Vf. gibt dazu off. an, deren wesentlicher Bestandteil die Isolierung des Chlorhydrats aus Lsg. absol. A. ist. Die Alkaloide werden vorher aus den Rinden bzw. Pulvern oder pckenrückständen der fl. Präparate durch ein Gemisch von Chlf. u. Ä. in Berührung mit verd. NaOH ausgezogen, aus der Extraktionsfl. mit verd. H_2SO_4 ausgeschüttelt, der sauren Lsg. nach Zusatz von Na_2CO_3 -Lsg. bis zu alkal. Rk. (gegen Phenolphthalein) durch Ä. entzogen, der dann bei möglichst niedriger Temp. unter Schutz gegen Licht abdest. wird. Das nach der Vorschrift resultierende Chlorhydrat s nahezu rein, enthält nur eine geringe Menge Mesoyohimbin. (Bull. Sciences Pharmacol. **32**. 21—27.) SPIEGEL.

A. Grigaut, Über die Bestimmung des Bluteleithins. (Journ. Pharm. et Chim. **1**. 97—104. — C. 1925. I. 556.) SPIEGEL.

Walter Lampe, Kompensationskolorimeter zur Konzentrationsbestimmung geer Stoffe in andersfarbigen Medien, insbesondere zur Gesamtblutmengenbestimmung. Beschreibung u. Abb. eines Kolorimeters, mit dem auf leichte Weise u. ohne Herst. er besonderen Eichkurve die Konz. eines gefärbten Stoffes, der in einem anders-ebigen oder getrübten Lösungsm. gel. ist, bestimmt werden kann. Vor den veriebblichen Keil des Kolorimeters nach AUTENRIETH-KÖNIGSBERGER, der das rbplasma bekannter Konz. enthält, wurde ein feststehender Trog, in dem sich sasma ohne Farbzusatz befindet, gesetzt. Andererseits wurde vor dem Trog, der dem Farbplasmagemisch unbekannter Konz. gefüllt ist u. sich in gleicher Höhe e der erstgenannte Trog befindet, ein weiterer Keil angebracht. Dieser Keil ehält, wie der Vorsatztrog der anderen Seite, Plasma ohne Farbzusatz. Er ist as dem Standardkeil gekuppelt u. nur gleichzeitig u. gleichsinnig mit diesem be-eglich. Werden die Keile in eine beliebige Stellung gebracht, so ist unter allen ehältnissen die Schichtdicke des gelben, oft auch ein wenig getrübten Plasmas dderseits stets die gleiche, es ändert sich in diesem System nur die künstlich hiegebrachte u. in ihrer Konz. bekannte Farbkomponente des Standartkeils gegen-er der in ihrer Konz. zu bestimmenden Farbkomponente im Vergleichstrog. (Erst. Verkaufsvereinigung Göttinger Werkstätten, Göttingen.) (Dtsch. d. Wehschr. **51**. 181—82. Göttingen, Univ.) FRANK.

Fritz Joseph, Nachweis okkultur Blutungen mittels der Pyramidonreaktion. Von d. zu untersuchenden Substanz wird ein linsengroßes Stück in 4 ccm W. zer-eben u. mit 8 Tropfen einer 50%ig. CH_3COOH -Lsg. angesäuert. Hierzu kommt e gleiche Menge gesätt. alkoh. Pyramidonlsg. (Pyramidon 2,5, A. 50 g). Als ydationsmittel werden 6—8 Tropfen H_2O_2 hinzugefügt. Bei positivem Ausfall e steht Lilafärbung. Die Pyramidonrk. ist brauchbar, besitzt mittlere Empfindlich-kt u. gibt bei der im allgemeinen etwas stärkeren Blutung des Carcinoms gegen-er dem Ulcus ventriculi stets positive Ausschläge für Carcinom u. abwechselnd itative u. negative Ausschläge für Ulcus. Bei negativem Ausfall kann sicher die wesenheit patholog. Blutungen angenommen werden. (Dtsch. med. Wehschr. **51**. 1)—51. Hamburg, Allgem. Krankenh. St. Georg.) FRANK.

Oskar Müller, Über einheitliche Hämoglobinbestimmung mit dem Glasstabhämo-ter nach Sahl-Leitz. Bei vergleichenden Hämoglobinbest. mit dem Glasstab-äometer nach SAHLI-LEITZ ergaben sich Differenzen bis 14%. Jeder App. ist

vor der Verwertung der Resultate einzustellen. Man bestimmt bei einer größeren Zahl, etwa 25, gesunder kräftiger Männer im Alter von 20—35 Jahren das Hämoglobin. Der Durchschnittswert der gefundenen Skalentheile wird dann = 100% gesetzt. Würden dieser Prozentzahl beispielsweise 90 Skalentheile des graduirten Hämometerröhrchens entsprechen, so erhält man die Prozentzahl für jeden Skalentheil durch Multiplikation mit $\frac{10}{9}$. Es empfiehlt sich, für jedes Hämometer eine entsprechende Tabelle mit den Skalenwerten aufzustellen, aus der dann jederzeit rasch die Prozentwerte abzulesen sind. (Zentralblatt f. inn. Med. **46**. 50—51. Zitiert nach Stadtkrankenh.)

FRANK.

Linzenmeier, *Über die Mikrosedimetrie*. Beschreibung u. Abb. eines App. zur Best. der Blutkörperchensenkungsgeschwindigkeit in geringen Blutmengen. Werden Capillaren verwendet, die ähnlich wie bei der Blutkörperchenzählpipette im oberen Teil eine Erweiterung erfahren haben. (Herst. FRANZ HUGERSHOFF, Leipzig.) Einzelheiten vgl. Original. Um eine beschleunigte Ablesung zu ermöglichen, empfiehlt sich Schrägstellung der Röhrchen. (Münch. med. Wchschr. **7**. 5—6. Leipzig, Univ.)

FRANK.

A. A. Horvath, *Über eine Modifikation der Apparatur zur Harnstoffbestimmung nach der Urease-methode*. Der Kork, der das zur Dest. dienende Reagensglas verschließt, erhält eine zweite Bohrung; durch diese geht bis kurz unter den Stopfen ein außen durch Gummischlauch u. Klemme verschließbares Glasrohr, so daß Druckverschiebungen während der Dest. durch kurzes Öffnen ausgeglichen werden können. (Journ. of laborat. and clin. med. **9**. 722—23. 1924. Peking, Union med. coll.; Biolog. ges. Physiol. **29**. 178. Ref. PINCUSSEN.)

SPIEGEL.

R. Seyderhelm, *Die Prüfung der Vitalität isolierter Zellen mittels kolloidalen Farbstoffe*. Beitrag zur Urinsedimentuntersuchung. Zur Prüfung der Vitalität isolierter Zellen erwies sich am geeignetsten ein Gemisch der beiden hochmolekularen Farbstoffe Kongorot u. Trypanblau. Nur die Zelle, deren Membran während des Absterbens ihre Undurchgängigkeit eingebüßt hat, nimmt den kolloidalen Farbstoff in Protoplasma u. Kern auf. Zellen, die völlig abgestorben sind, färben sich momentan, geschädigte Zellen lassen den Farbstoff in mehr oder minder verlangsamt Tempo durch ihre geschädigte Membran durchgehen. Die membran-schädigende Wrkg. von Zellgiften jeder Art läßt sich auf diese Weise u. M. quantitativ verfolgen. Der definitive Zelltod markiert sich mit dem Zeitpunkt, zu dem auch der Zellkern den kolloidalen Farbstoff aufgenommen hat. Bei Verwendung obiger Farbstoffe ist es möglich, den Verlauf von Blasen- u. Nierenkrankheiten im Mik. in allen Stadien genau zu beobachten. (Dtsch. med. Wchschr. **51**. 180—181. Göttingen, Univ.)

FRANK.

Nikolaus Frank und Friedrich Doleschall, *Über die Diastasebestimmung im Stuhle*. Die Diastasebest. nach WOHLGEMUTH wird durch Fette u. fettähnliche Substanzen der ikter. Fäces gestört. Diese Störung konnten Vff. dadurch beheben, daß aus dem Stuhle mit physiol. NaCl-Lsg. eine dünne Emulsion hergestellt wird, die mit gleicher Menge Ä. ausgeschüttelt wird. Die vorher nicht nachweisbare Diastase ist nach Entfernen der äth. Lsg. leicht nachweisbar. — Bei Unters. von Stühlen, die nicht mit Ä. behandelten Fäces traten stets Schwierigkeiten infolge B. von N. auf, welche im Original näher erörtert werden. Vff. halten die Ndd. für Verleumdung der Stärke mit sauren Alkalisalzen der Fettsäuren; letztere sind durch Hydrolyse der Seifen in stark verd. Lsgg. entstanden. — An einer Reihe von Beispielen wird gezeigt, daß Stühle, welche bei der üblichen Unters. keine oder nur geringe diastatische Wrkg. hatten, nach Behandlung mit Ä. die Stärke verdauten. Man kann also, wie z. B. bei mit Gelbsucht einhergehenden Lebererkrankungen nach der gewöhnlichen Methode Diastase im Stuhl nicht nachweisbar ist, nicht ohne weiteres auf Hypo-

ktion des Pankreas schließen. Erst die Unters. der mit Ä. extrahierten Fäces
t hierfür Anhaltspunkte. (Biochem. Ztschr. **155**. 125—32. Budapest, Univ.) HESSE.

Erich Roucka, Blansko, Tschechoslowakei, *Einrichtung zur Messung von physikalischen oder chemischen Größen*, die sich zur Wrkg. bringen lassen in Form einer Hebelvorr. wirkenden mechan. Kraft, die durch eine mechan. Gegenkraft vermöge einer als Maß der ursprünglichen Größe dienenden Änderung der Hebelübersetzung sich ausgleichen läßt, dad. gek., daß zur selbsttätigen Änderung der Hebelübersetzung der Drehpunkt der Hebelvorr. in Auswrkg. u. nach Maßgabe der zu messenden Kraftgröße verschiebbar angeordnet ist, so daß sowohl die ursprüngliche Kraft als auch die mechan. Gegenkraft auf den Überwachungshebel Angriffspunkten einwirken, deren Lage an diesem Hebel sich nicht ändert. — Die Einrichtung kann z. B. zur Messung von Unterschieden der Strömungsgeschwindigkeit von Fll. dienen. (D. R. P. **407903** Kl. 42k vom 16/12. 1921, ausg. 1. 1925. Tschslov. Prior. 1/9. 1921.) KÜHLING.

Erich Roucka, Blansko, Tschechoslowakei, *Einrichtung zur Messung und Übertragung von beliebigen physikalischen und chemischen Größen* mit Hilfe einer solchen Werten entsprechend selbsttätig regelbaren u. ihre Wrkg. mechan. ausgleichenden elektr. Größe, gek. durch die Einschaltung einer period. wirkenden Kraft, welche entsprechend der jeweiligen Stellung eines bei einer Störung des Gleichgewichts wirksam werdenden Hilfsorgans die Steuerung des die elektr. Kraftgröße regelnden Servomotors derart beeinflusst, daß diese Steuerung bei einer Störung des Ausgleichs zwecks deren Beseitigung das Anlaufen des Servomotors veranlaßt. — Gemessen können z. B. werden Druck, Strömungsgeschwindigkeit, Temp., Drehmoment, Leuchtkraft, Gehalt an Gasen oder Fll., Leitfähigkeit, D. u. v. (D. R. P. **407904** Kl. 42k vom 1/1. 1922, ausg. 7/1. 1925. Tschslov. Prior. 1. 1925. 8. 1921.) KÜHLING.

H. Angewandte Chemie.

V. Anorganische Industrie.

K. — n., Carl Przibylla †. 7. Mai 1852 — 27. Januar 1925. Nachruf auf den Mitbegründer der Kali-Forschungsanstalt. (Chem.-Ztg. **49**. 149.) JUNG.

P. Parrish, *Intensive Herstellung von Schwefelsäure. Patentiertes Verfahren von A. Gaillard*. Beschreibung des Verf. von GAILLARD zur Fabrikation von H₂SO₄, bas. auf der Verwendung eines Turbozerstäubers für die HNO₃ beruht. (Chem. Age **1**. 128—29.) JUNG.

J. M. Hill und **G. F. Loughlin**, *Magnesium und seine Verbindungen*. Die Ertr. der im Kriege in Angriff genommenen Ausbeutung der in den Vereinigten Staaten von Nordamerika vorhandenen Lager an Dolomit u. Magnesit wird geschildert u. die techn. Verwendungszwecke für Mg u. seine Verb. kurz angegeben. (Chem. News **130**. 53—54. Washington, Department des Inneren.) HERTER.

Émile Paul Dumanois, Frankreich, *Entwässern von Luft*. Man läßt die Luft in Behälter eintreten, die W. absorbierende Fll. (A.) enthalten. (F. P. **580493** vom 10/7. 1923, ausg. 7/11. 1924.) KAUSCH.

Victor Joseph Petit, Frankreich, *Schwefeldioxyd*. Geschmolzener Schwefel wird in Regenform verbrannt. (F. P. **580551** vom 22/4. 1924, ausg. 10/11. 1924.) KAUSCH.

Nitrogen Corporation, Providence, Rhode Island, übert. von: **John Collins**

Clancy Company, Ashbury, New Jersey, *Stickstoff-Wasserstoffgemische*. (Can. 238358 vom 2/3. 1923, ausg. 4/3. 1924. — C. 1922. IV. 231. [F. P. 534618.]) KAUSCH.

Norsk Hydro-Elektrisk Kvaelfstofaktieselskab, Norwegen, *Ammoniumsulfidsynthese*. Das bei der Synthese aus den Elementen entstandene NH_3 wird das Gasmisch mittels Stoffe entzogen, welche, wie CaCl_2 , ZnCl_2 , $\text{Zn}(\text{NO}_3)_2$, NH_4NO_3 es in Form von Ammoniakaten oder solchen Komplexen binden, die es beim Erhitzen wieder abspalten. Die Absorption erfolgt zweckmäßig ohne Entspannung des Gasmisch; die dabei entwickelte Wärme wird zur Zersetzung von gebildeter Ammoniakate usw. nutzbar gemacht. (F. P. 576507 vom 31/1. 1923, ausg. 22/8. 1924.) KÜHLING.

Erhard Britzke, Moskau, *Kondensation von Phosphorsäurenebeln und -dämpfen* im Gemisch mit großen Mengen indifferenten Gase u. Dämpfe, dad. gek., daß man diese in innige Berührung mit akt. Kohle bringt. (D. R. P. 408865 Kl. 12i vom 12/2. 1924, ausg. 24/1. 1925.) KAUSCH.

Compagnie Générale des Produits Chimiques de Louvres, Frankreich, *Titansäure und -verbindungen*. Titanhalogenverbb. werden in Dampfform mit Metalloxyden oder -sulfaten oder solchen Metalloidverbb. behandelt. (F. P. 580458 vom 4/7. 1923, ausg. 7/11. 1924.) KAUSCH.

Compagnie Générale des Produits Chimiques de Louvres, Frankreich, *Titansäure*. Titanhalogenverbb. werden in Dampfform mit Sulfiden u. das gebildete TiS_2 mit Wasserdampf behandelt. (F. P. 580459 vom 4/7. 1923, ausg. 7/11. 1924.) KAUSCH.

Edmond Jean Eugène Dumond, Frankreich, *Graphitanreicherung*. Das grobrochene Mineral wird zuerst in einem Rohr feucht behandelt u. dann feucht durch ein Sieb getrieben. (F. P. 580570 vom 23/4. 1924, ausg. 10/11. 1924.) KAUSCH.

Verein für chemische und metallurgische Produktion, Aßig a. Elbe, Tschechoslowakische Republik, *Herstellung von Preßlingen aus Alkalipyrosulfit*. dad. gek., daß trockenes Alkalipyrosulfit mit Alkalicarbonatlsg. verrieben, die Mischung in beliebiger Form gepreßt u. hierauf getrocknet wird. (D. R. P. 408863 Kl. 12i vom 17/2. 1924, ausg. 24/1. 1925. Tschechoslow. Prior. 24/2. 1923.) KAUSCH.

Clive Morris Alexander, Wahachie, Texas, *Zersetzung kalihaltiger Stoffe* durch Einblasen eines Gemisches von pulverisiertem Mineral, Brennstoff u. Luft in eine Verbrennungs- u. Reaktionskammer. (A. P. 1522091 vom 9/9. 1920, ausg. 6/1. 1925.) KAUSCH.

Carlo Rossi, Italien, *Natriumsulfat*. Man läßt Na_2CO_3 auf CaSO_4 einwirken, trennt das wasserfreie Na_2SO_4 durch Krystallisation oder Abkühlung der erhaltenen Lsg. auf eine unter 0° liegende Temp. (F. P. 580825 vom 28/4. 1924, ausg. 17/11. 1924.) KAUSCH.


Carlo Rossi, Italien, *Natriumsulfat*. Die von der Kunstseidefabrikation oder dgl. herrührenden, Na_2SO_4 enthaltenden Lsgg. werden einer Temp. unter 0° ausgesetzt, so daß wasserfreies Na_2SO_4 auskrystallisiert. (F. P. 580826 vom 28/4. 1924, ausg. 17/11. 1924.) KAUSCH.

Rhenania Verein Chemischer Fabriken A. G., Deutschland, *Barium- oder Strontiumhydroxyd*. Man behandelt BaS oder SrS mit NH_3 in Ggw. von W. (F. P. 579454 vom 5/3. 1924, ausg. 17/10. 1924.) KAUSCH.

Giovanni Battistoni, Italien, *Bariumoxyd aus Bariumcarbonat im elektrischen Ofen*. Man verwendet zur Behandlung der Briketts aus Kohle u. BaCO_3 den Voltbogen u. verwendet die Ofenwärme mittels Radiatoren in einem ein Band ofenähnlichen Ende aufweisenden Trockenapp. (F. P. 579857 vom 5/4. 1924, ausg. 25/11. 1924.) KAUSCH.

Nichols Copper Company, New York, übert. von: **Eugene Fitzpatrick**

York, *Basisches Kupfercarbonat*. Man mischt fein zerteiltes trocknes CuSO_4 trocknes Na_2CO_3 u. gibt das Gemisch unter lebhaftem Umrühren zu W.:



P. 1521611 vom 19/2. 1923, ausg. 6/1. 1925.)

KAUSCH.

New Jersey Zinc Company, New York, übert. von: Frank G. Breyer, Earl Gaskill und James A. Singmaster, Palmerton, Pennsylvan. *Zinkoxyd*, bestehend aus einem 0,25 Mikron an Größe nicht überschreitenden Prod. (A. P. 2098 vom 23/5. 1923, ausg. 6/1. 1925.)

KAUSCH.

VII. Agrikulturchemie; Düngemittel; Boden.

G. Sani und V. Grilli, *Praktische Mitteilungen über die Erhaltung und Umwandlung des Stickstoffs im Stalldung*. Stalldung mit 0,45% N, davon 0,0045% NH_3 , 0,0025% HNO_3 , enthielt nach der Behandlung mit 120 g S per Doppelzentner 0,9% NH_3 u. 0,0141% HNO_3 . Die Verluste an Gesamtstickstoff (10,40%) waren geringer als ohne S-Behandlung (32,4%); noch geringer waren sie bei Behandlung mit S u. Perphosphat (4,41%). Entgegen den üblichen Ansichten stellen Vf. Grund ihrer Analysen fest, daß nur ein sehr geringer Teil des N im Dünger NH_3 oder Nitrat gebunden ist. Aminosäuren sind gar nicht vorhanden. (Atti Accad. dei Lincei, Roma [5] 33. II. 250—53. 1924. Perugia, Ist. sup. agrar.) ZANDER.

H. Kappen und K. Bollenbeck, *Über die Bedeutung der Aziditätsformen der Böden für das Löslichwerden schwerlöslicher Phosphate*. Humussäure, die aus Zucker nach BERTHELOT u. ANDRÉ dargestellt wurde, zersetzt Tricalciumphosphat (Industrieware) u. auch Rohphosphate unter Entbindung von Phosphorsäure. Geringer ist die Löslichkeit des Phosphats bei Einw. einer Humussäure, die vorher 2-n. K_2SO_4 -Lsg. behandelt wurde, am geringsten, wenn diese vom Vf. sogenannte „hydrolyt.-saure“ Humussäure durch Behandeln mit AlCl_3 -Lsgg. in die „austauschsaure“ Form übergeführt ist, was leicht dadurch erklärt werden kann, daß das in der „austauschsauren“ Form befindliche Al die zunächst in Lsg. gegangene Phosphorsäure wieder ausfällt. Kaliumsulfatlsg. steigert die aufschließende Wkg. der Humussäuren, proportional der Konz. des K_2SO_4 . Dieselbe Wkg. haben andere Düngesalze in folgender Reihenfolge: MgCl_2 , K_2SO_4 , $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$, NaNO_3 , KNO_3 , KCl . — SiO_2 aus Wasserglas gefällt, zeigte die Erscheinung erst, nachdem sie mit 1-n. K_2SO_4 -Lsg. behandelt worden war. Mit CO_2 behandelter Permutit u. „austauschsaure Böden“ erniedrigten die Löslichkeit des Phosphats, wie oben auf Al u. Fe zurückgeführt wird. (Ztschr. f. Pflanzenernähr. u. Düngung Abt. A. 4. 1—29.)

TRÉNEL.

Gustave Rivière und Georges Pichard, *Die partielle Sterilisierung des Ackerbodens*. Deutliche Steigerung des Ernteertrages bei Getreidearten u. Kartoffeln wurde durch Beifügung von 6—12 g Ca- oder Mg-Sulfit pro qm zum Ackerboden erreicht, was auf Veränderung der Mikroorganismenflora u. -fauna zugunsten nützlicher Bodenbakterien zurückgeführt wird. (Ann. de la science agronom. franç. et étrangère 41. 251—53. 1924; Ber. ges. Physiol. 29. 233. Ref. ARNBECK.) SPIEGEL.

O. Arrhenius, *Der Kalkbedarf des Bodens vom pflanzenphysiologischen Standpunkt*. II. *Die Bodenreaktion und das Wachstum der höheren Pflanzen*. Unter Benutzung eines reichen bibliograph. Materials zeigt Vf. die Abhängigkeit der Kulturpflanzen von der Bodenrk. Daß diese Abhängigkeit sich auch in den Erträgen ausdrückt, wird an den Zuckerrübenerten mehrerer Güter von 1916—1923 statist. nachgewiesen. Eine Versuchsreihe auf künstlich angesäuertem bzw. alkalisiertem Boden (unter Verwendung von H_2SO_4 bzw. NaOH) mit verschiedenen Haferarten, Gerste, Weizen, Erbsen, Luzerne, Rotklee, Futter- u. Zuckerrüben, Kartoffeln, zeigt, daß Hafer u. andere Pflanzen zwei optimale Reaktionsbedingungen haben, z. B. für Hafer die eine zwischen pH 5—6, die andere bei pH 8—9, je nach der Art. Das

Optimum für Gerste u. Weizen liegt bei p_H 7,2—7,4, das der Erbse bei p_H 6— u. bei 8,8 das von Luzerne bei p_H 7,9 von Zuckerrüben bei 7,5, von Kartoffeln bei 5,2—6,3, von Rotklee bei 6,1 u. 8,4. (Ztschr. f. Pflanzenernähr. u. Düngung Abt. 4. 30—47.)

TRÉNEL.

D. R. Hoagland, *Die Aufnahme von Ionen durch Pflanzen.* (Vgl. HOAGLAND u. DAVIS, Journ. Ges. Physiol. 6. 47; C. 1924. I. 924. HOAGLAND u. MARTIN, California Sta. Tech. Paper 8; C. 1924. II. 1808.) Von wenige Wochen alte Gerstenpflanzen wurden die verschiedenen Ionenarten ungleich u. unter gegenseitiger Beeinflussung aufgenommen. Sulfation, langsam absorbiert, setzt auch die Absorptionsgröße der zugehörigen Kationen herab. Eine verhältnismäßig hohe Na vermindert die Absorption anderer Kationen, besonders von K u. Ca . In der Grade, wie die Konz. der aufnehmbaren Ionen einer Lsg. abnimmt, verringert sich auch die von der Pflanze aufgenommene Menge. Nur selten werden die Ionen im selben Verhältnis aufgenommen wie das W. der Lsg., K , NO_3 u. PO_4 unter bestimmten Bedingungen in größeren Mengen, Ca , Mg u. SO_4 aber weniger schnell. Daher werden die Kulturfl. durch die wachsenden Pflanzen bzgl. einer Reihe von Ionen immer mehr verd., bzgl. anderer mehr konz. Betont wird die Bedeutung von klimat. Faktoren für die Ionenaufnahme, u. es wird darauf hingewiesen, daß mit den Vorgängen der Ionenabsorption Energieaustausch stattfindet. Permeabilitätserscheinungen allein können diese Phänomene in den lebenden Pflanzen nicht erklären. (Soil science 16. 225—46. 1923. Berkeley, Univ. of California; Ber. ges. Physiol. 29. 232. Ref. DÖRRIES.)

SPIEGEL.

D. R. Hoagland und **J. C. Martin**, *Vergleich zwischen Kulturen in Sand, Lösungen und Böden als Medium für das Pflanzenwachstum.* (Vgl. vorst. Ref.) Versuche mit Züchtung von Gerste unter gleichen klimat. Bedingungen in Lsgg., Sand u. Boden führen zu der Folgerung, daß der Vorgang der Absorption von mineralischen Elementen aus dem Boden von dem der Absorption aus Nährlsgg. keineswegs verschieden ist. In an Phosphaten armen, darin aber konstant gehaltenen Nährlsgg. war das Wachstum gut. (Soil science 16. 367—88. 1923. Berkeley, Univ. of California; Ber. ges. Physiol. 29. 233. Ref. DÖRRIES.)

SPIEGEL.

H. Behn, *Beiträge zur Kenntnis der Wirkung von Reizstoffen auf das Pflanzenwachstum.* Eine Anzahl von der biol. Reichsanstalt untersuchter Mittel zeigte keine oder nur geringe Wrkg. auf das Pflanzenwachstum. Bodenbeschaffenheit u. Düngung bewirkten gewisse Unterschiede. Von Bedeutung ist auch die Art der Pflanzen. So wirkte 3,6-Diaminoacridinnitrat auf Mais, nicht aber auf Rüben, Senf oder Hafer. (Angew. Botanik 6. 201—24. 1924; Ber. ges. Physiol. 29. 233. Ref. DÖRRIES.)

SPIEGEL.

K. K. Gedroiz, *Die Salzsäuremethode zur Bestimmung der im Boden in adsorbiertem Zustande vorhandenen Kationen.* 5—25 g Boden werden mit 25—50 cc 1/20-n. HCl in einer Porzellanschale behandelt, dann auf gehärtetem Filter filtriert u. mit derselben Säure gewaschen, bis das Filtrat kein Ca mehr enthält. In dem Filtrat werden in an sich bekannter Weise die einzelnen Kationen bestimmt. Mit HCl von der angegebenen Stärke tauschen die zeolith.-humosen Bestandteile ihre Kationen aus. (Soil science 16. 473—74. 1923; Ber. ges. Physiol. 29. 232. Ref. DÖRRIES.)

SPIEGEL.

P. L. Hibbard, *Vergleich zwischen der durch die Verdrängungsmethode erhaltenen Bodenlösung und dem Wasserauszug alkalischer Böden.* Der wss. Auszug gibt kein richtiges Bild der im Boden vorhandenen Verhältnisse. Carbonat, Dicarbonat u. Phosphat werden darin viel zu hoch gefunden, Chlorid, Nitrat, Na annähernd richtig, Sulfat u. K zu hoch, Ca u. Mg bald zu hoch, bald zu niedrig. Die Konz. in der Bodenlsg. wird weit größer sein, als gewöhnlich auf Grund der Befunde an

wss. Auszügen angenommen wird. (Soil science **16**. 465—71. 1923. Berkeley, v. of California; Ber. ges. Physiol. **29**. 235. Ref. DÖRRIES.) SPIEGEL.

H. Niklas und A. Hock, *Ein Universalindikator zur colorimetrischen p_H -Bestimmung bei der Bodenuntersuchung*. Um den orientierenden Vers., in welchem Indicatorgebiet eine Bodenslg. liegt, zu ersparen, haben Vff. einen „Universalindicator“ aus Clark- u. Lubsschen Indicatoren zusammengestellt. Sie verwenden eine Mischung von folgenden Lsgg.: 4 Tl. Bromphenolblau (0,04%ig.), 1 Tl. Bromphenolpurpur (0,04%ig.), 6 Tl. Methylrot (0,02%ig., alkoh.), 4 Tl. Bromthymolblau (0,04%ig.). Als Standardlsgg. benutzen sie für das Gebiet p_H 3,5—5,0 das „Citrat-schwarz“, von 5—7,6 das Phosphatgemisch nach SÖRENSEN u. erhalten so eine Farbskala von rot über rosa, bräunlich, grau, grün nach blau. Die maximale Farbgrenze ist $\pm 0,2$ der p_H -Einheit, wie aus vergleichenden Messungen hervorgeht. Vff. machen auf die Bedeutung dieses „Universalindicators“ als Kontrollmittel für die elektrometr. Titration aufmerksam. (Ztschr. f. Pflanzenernähr. u. Düngung Abt. A. **3**. 402—5. 1924.) TRÉNEL.

Th. Arnd, *Die Humussäuren in ihrem Einflusse auf das Mikrobenleben im Moorboden und die Methoden der Aziditätsbestimmung*. Ammonisation u. Denitrifikation haben ihren Höhepunkt im neutralisierten Boden; die Neutralisation der sauren Böden — Moorstorf, Heidehumus u. Niedermoorboden — erfolgte durch $CaCO_3$, berechnet nach der Methode von TACKE-LÜCHTING. Eine stärkere Ammonisation hatte keine nennenswerte Verstärkung der Mikrobentätigkeit zur Folge. Die Azidität der „Moostorfsäuren“ erwies sich am stärksten, die des Niedermoorbodens am kleinsten. Die Nitrifikation dagegen beginnt erst bei neutraler Rk.; mit zunehmenden Kalkgaben über diesen Punkt hinaus tritt eine verstärkte nitrifizierende Tätigkeit der Bodenbakterien ein. Ein Vergleich mit der Methode nach GULLY ergab, daß der Essigsäure, die der Moorboden aus $Ca(OOC \cdot CH_3)_2$ frei macht, u. auch nach DAIKUHARA ergab zu hohe Werte, die nicht mit den Höhepunkten der Ammonisierenden u. denitrifizierenden Tätigkeit der Bakterien, bzw. mit dem Betrag der nitrifizierenden Tätigkeit zusammenfallen. (Ztschr. f. Pflanzenernähr. u. Düngung Abt. A. **4**. 53—72.) TRÉNEL.

Stockholms Superfosfat Fabriks Aktiebolag, Schweden, *Herstellung von Ammoniumsalzen aus Kalkstickstoff*. Kalkstickstoff wird in Ggw. der zur Aufspaltung seiner l. Teile bestimmten Menge W. bzw. Cyanamid- oder Harnstofflsg. verflüchtigt. Die erhaltene Lsg. wird mit der zur Neutralisation des CaO u. zur Auflösung des im Cyanamidsalz vorhandenen Ca erforderlichen Menge einer beliebigen Säure, z. B. H_2SO_4 , SO_2 oder CO_2 , behandelt. Die Säure kann auch schon beim Erhitzen des Kalkstickstoffs mit dem Lösungsm. zugegeben sein. Bei Verwendung von CO_2 wird zweckmäßig in geschlossenen Gefäßen unter Druck gearbeitet. Man kann den Kalkstickstoff auch zunächst mit so viel Säure u. W. behandeln, als erforderlich ist, um den Gesamtgehalt der M. in das Calciumsalz der Säure zu verwandeln u. dann das Erzeugnis auslaugen, oder ihn mit einer so geringen Menge W. von höchstens 125° oder h. Salz- oder Säurelsg. behandeln, daß vorhandenes Ca u. CaO in $Ca(OH)_2$ oder Ca -Salz verwandelt werden u. der Rest des W. verflüchtigt u. die M. dann mit W. bei Ggw. von CO_2 auslaugen. Eine zur Durchfuhrung des Verf. bei gewöhnlichem Druck geeignete Vorr. besteht aus einer Anzahl in den Boden durch enge Röhren verbundener Zylinder, in deren Böden Zuleitungsröhren für CO_2 münden. Die Mischung von Kalkstickstoff u. W. o. dgl. wird dem ersten Zylinder zugeführt u. in die anderen durch die zugeleitete CO_2 geblasen. (Z. P. **577550** vom 21/2. 1924, ausg. 6/9. 1924, **577596**, **577597** u. **577598** vom 21/2. 1924; ausg. 8/9. 1924.) KÜHLING.

Charles Harnist, Paris, *Desinfizierendes Düngemittel*. Organ. Stoffe beliebige Art, vorzugsweise Abfallstoffe, wie *Sulfitablauge*, werden mit geeigneten, zweckmäßig Alkali- oder Erdalkalisalzen von Sauerstoffsäuren des Schwefels, wie Sulfiten, Bisulfiten, Thionaten, Polythionaten o. dgl., gegebenenfalls auch Sulfaten gemischt da letztere im Boden reduziert werden. An Stelle der fertigen Salze können auch ihre Bestandteile verwendet, z. B. in genügend eingeeingte Sulfitzellstoffablauge SO_2 u. NH_3 eingeleitet werden. Die hierbei entstehende Fällung kann als Gerb- oder ebenfalls als Düngemittel verwendet werden. (**Schwz. P. 106785** vom 27/2. 1922, ausg. 16/10. 1924. F. Priorr. 1/3. u. 25/9. 1922.) KÜHLING.

Chemische Fabrik auf Actien (vorm. E. Schering), Berlin (Erfinder: **Herman Emde**, Basel, und **Karl Görnitz**, Berlin-Steglitz), *Saatgutbeize*, 1. dad. gek., daß man die Hg-Verbb. nach D. R. P. 125095 verwendet. — 2. dad. gek., daß man die Hg-Verbb. nach 1. zusammen mit anderen Stoffen, insbesondere Mg-Salzen verwendet. — Die alkal. Eiweiß nicht koagulierenden Hg-Verbb. nach D. R. P. 125095, insbesondere die *Hg-Äthylendiaminkomplexverb.*, besitzen eine bedeutend Tiefenwrkg., sind in geringerer Konz. oder in kürzerer Zeit wirksam als andere Hg-haltige Saatgutbeizen, töten die dem Saatgut anhaftenden Brandsporen ab und erhöhen die Triebkraft u. Keimfähigkeit des Gutes, besonders in Verb. mit Mg-Salzen. Beispiele für die in üblicher Weise erfolgende Verwendung einer wss. 0,02—0,05%ig. Lsg. von HgSO_4 -Äthylendiamin, bzw. einer 0,1—0,25%ig. wss. Lsg. von 80 Teilen MgSO_4 u. 20 Teilen HgSO_4 -Äthylendiamin sind angegeben. (**D. R. P. 406801** Kl. 45l vom 7/2. 1923, ausg. 27/11. 1924.) SCHOTTLÄNDER.

Maschinenbau-Anstalt Humboldt, Köln-Kalk, *Mittel mit fungicider und insekticider Wirkung*, dad. gek., daß man *Furfurol*, seine *Homologen* oder *Derivate* in *hydriertem* oder teilweise hydriertem Zustande oder in Ggw. eines cycl., sauerstoffhaltigen Hydrierungsprod. anwendet. — Die Hydrierung des Furfurols erfolgt in bekannter Weise unter Anwendung von H_2 oder H_2 -haltigen Gasen in Ggw. von Pd-Mohr, fein verteiltem Ni oder Pt als Katalysatoren, indem man z. B. Furfurolämpfe mit H_2 über erhitzte mit Katalysatoren beladene Träger leitet. Die Anlagerung von H_2 kann auch elektrochem. erfolgen. Die keimtötende Wrkg. des Furfurols kann ferner durch Zusatz von hydrierten Phenolen, hydrierten cycl. Ketonen, Furfuralkohol oder hydriertem Furfuralkohol, der gleichzeitig als Schutzmittel gegen die zu leichte Verharzung des Furfurols wirkt, erhöht werden. Neben diesen Stoffen kann man gleichzeitig andere Verbb., wie Phenol, Kresol, deren Chlorierungsprodd., Phenolate, Seifen oder Naphthalin, dem Furfurol zusetzen, ohne dessen fungicide oder insekticide Wrkg. zu beeinträchtigen. (**D. R. P. 406831** Kl. 48l vom 15/9. 1922, ausg. 28/11. 1924.) SCHOTTLÄNDER.

VIII. Metallurgie; Metallographie; Metallverarbeitung.

Craig M. Bouton, **Wallace C. Riddell** und **Lionel H. Duschak**, *Silber bei der chlorierenden Röstung*. Die für die chlorierende Röstung von Pb-, Au- u. Cu-Erzen geltenden Bedingungen haben sich für Ag-Erze als ungeeignet erwiesen. Deshalb wurde das Verh. von Ag-Mineralien u. Ag-Verbb. während des Erhitzens untersucht. Die meisten wurden durch langes Erhitzen in metall. Ag umgewandelt. Wenn dieses dann zu Kügelchen schmolz, so war es schwer, es unter Ofenbedingungen zu chlorieren. Dampfdruckbest. von AgCl bei verschiedenen Temp. stützten nicht die Hypothese, daß die Schwierigkeit bei der Chloridverflüchtigung von Ag auf der geringen Flüchtigkeit des Chlorides beruhe. Die Hydrolyse von AgCl bei hohen Tempp. wurde untersucht, um festzustellen, ob die Anwesenheit von Wasserdampf in den Ofengasen die Hydrolyse des AgCl unter gleichzeitiger B. von metall. Ag verursachte oder die B. von AgCl verhinderte. Endlich wurde geprüft, ob Ag-Silicate sich aus verschiedenen Ag-Mineralien u. in den Erzen ent-

tenem SiO₂ während des Röstens bildeten. — Die Unterss. früherer Forscher werden zur Erörterung der eigenen Verss. u. Ergebnisse der Vff. herangezogen. Die umfangreiche Arbeit hat folgende Hauptabschnitte: Hydrolyse von AgCl bei verschiedenen Temp. — Verh. von Ag-Verbb. (Ag₂O, Ag₂S, Ag₂SO₄, AgCl) in der Hitze — Dampfdruck von AgCl — Silbersilicat — Partialdampfdrucke von H₂O u. HCl über AgCl-Lsgg. — Verflüchtigung von Ag beim Probieren. — Ihre Ergebnisse sind: Der Dampfdruck von AgCl ist hoch genug, um Ag, das in AgCl umgewandelt ist, abdestillieren zu können. — Die Ggw. von H₂O-Dampf in den Ofengasen neigt bei hohem Mangel an HCl oder Cl zur B. von Ag aus AgCl. — Für die B. von Silbersilicat besteht nur geringe Wahrscheinlichkeit, doch kann Ag anscheinend in kleinen Mengen, wahrscheinlich in kolloider Form, in SiO₂ eintreten. Hierauf beruht wohl die „vollständig festgehaltene“ Ag in gerösteten Erzen. — Die Arbeit hat 82 Quellen. (Bureau of Mines. Techn. Paper 317. 56 Seiten. 1924. Sep.) NEUFELD.

R. W. Müller, *Verwertung von verzinktem Eisenschrott*. Verzinkter Schrott kann im Martinofen verarbeitet werden, wenn die ZnO-Dämpfe durch eine Vergerung der Luftbrücke durch einen ausgemauerten Kessel u. eine Filteranlage abgefangen werden. Wenn alles Zn abgebrannt ist, wird der Ofen an den Kamin angeschlossen. (Chem.-Ztg. 49. 140. Witten a. Ruhr.) JUNG.

C. W. Davis, *Verfahren zur Wiedergewinnung von Platin, Iridium, Palladium, Gold und Silber aus Goldschmiedeabfällen*. (Bureau of Mines. Techn. Paper 342. 10 Seiten. 1924. Sep. — C. 1925. I. 435.) NEUFELD.

H. S., *Elektrolytische Entzinnung*. Beschreibung einer elektrolyt. Entzinnungsanlage. (Chem.-Ztg. 49. 117—19.) JUNG.

Friedr. Krupp Grusonwerk, A.-G., Magdeburg-Buckau, *Entwässern von aus Schaumschwimmverfahren stammenden Schlämmen*. Der Schaumschlamm wird durch eine grobkörnige Filterschicht aufgegeben u. dieser eine schüttelnde Bewegung erteilt, um das Eindringen der groben Körner in die Schaumblasen zu erreichen, wodurch der Schaum zerstört u. infolgedessen eine weitgehende Entwässerung des Schlammes erreicht wird. (Schwz. P. 107350 vom 4/3. 1924, ausg. 16/10. 1924. Prior. 28/3. 1923.) OELKER.

Thornhill-Anderson Company, Muskogee, übert. von: **Edwin B. Thornhill** u. **Hector G. S. Anderson**, Hurley, V. St. A., *Aufbereitung von Kupfererzen*. Kupfererze, welche Oxyd u. Sulfid nebeneinander enthalten, werden gemahlen, mit verd. H₂SO₄ behandelt, welche die oxyd. Bestandteile löst, die Sulfide aber ungelöst, dann mit Eisenschwamm behandelt, um das gel. Cu zu fällen, mit gegebenenfalls überschüssigem Kalkstein neutralisiert u. die M. unter Zusatz eines geeigneten Schaumerzeugungsmittels dem Schwimmverf. unterworfen. Hatte man zum Mahlen eiserne Gefäße, besonders mit Stahlkugeln ausgerüstete Mühlen benutzt, so ist der Zusatz von Eisenschwamm nicht erforderlich. (A. PP. 1518828 u. 1518829 vom 31. 1. 1922, ausg. 9/12. 1924.) KÜHLING.

Soc. an. Française des Forges et Aciéries de la Sarre, Frankreich, *Legierungen*, welche neben Fe 0,5—20% Cr, 0,03—0,5% C, 0,03—2% Mn u. Si u. 0,05—0,5% Ni enthalten. Die Legierungen sind rostfrei u. nehmen beim Glätten einen schönen Glanz an. Um sie leicht bearbeitbar zu machen, erhitzt man sie langsam auf 650—700°, dann rasch auf etwa 900°, schmiedet oder walzt sie bei einer nicht unter 800° sinkenden Temp. u. läßt hierauf langsam auf 670—720° u. dann rasch auf gewöhnliche Temp. abkühlen. Man kann auch die etwa 925° h. Stücke in Öl erhitzen u. auf 250—720° wiedererhitzen. (F.P. 577373 vom 14/4. 1923, ausg. 14. 1924.) KÜHLING.

Robert Wickersham Stimson, New York, *Herstellung von Eisenchromlegierungen*. (Chaltiges Chromeisenerz wird mit Si oder einer Si enthaltenden Legierung, be-

VII. 1.

sonders Ferrosilicium in solchem Verhältnis zusammengeschmolzen, daß die M. etw. 5% Si enthält. Ein Teil des Si kann durch andere reduzierende Stoffe, wie Kohle ersetzt werden; Kohle soll aber nicht verwendet werden, da die Gewinnung kohlestoffreier oder -armer Legierungen angestrebt wird. — Es wird dann unter Zusatz von CaO oder anderen Flußmitteln bis zur Beendigung der Red. erhitzt u. schließlich die Schmelze mit einem oxydierenden Gase, vorzugsweise Luft, gegebenenfalls unter Mitverwendung von Dampf geblasen. (Schwz. P. 107 030 vom 17/2. 1923, ausg. 16/10. 1924.) KÜHLING.

Robert W. Stimson, Köln a. Rh., *Reinigen von Legierungen des Eisens mit z. Carbidbildung neigenden Metallen*. (Teilreferat nach E. P. 202 345 vgl. C. 1924. I. 376.) Nachzutragen ist, daß die Ätzalkalien zweckmäßig in Verb. mit CaO als Alkalikalk u. in Ggw. leicht reduzierbarer Metalloxyde, besonders solcher der Eisen-Gruppe verwendet werden. Die Zusätze können fest, z. B. in Form von Briquets oder geschmolzen, am Boden der Schmelze oder an der Oberfläche zugeführt werden. Auch können sie in Pulverform durch Ströme von Luft, CO₂, Dampf o. dgl. eingeblasen werden. (Schwz. P. 107 031 vom 15/3. 1923, ausg. 1/10. 1924. E. Prior. 17/3. u. 1/12. 1922.) KÜHLING.

Robert W. Stimson, Köln a. Rh., *Reinigen von Legierungen des Eisens mit z. Carbid bildenden Metallen*. (Teilref. nach E. P. 203 728 vgl. C. 1924. I. 376.) Nachzutragen ist, daß als reduzierbare Oxyde vorzugsweise CrO₃, K₂Cr₂O₇, Na₂Cr₂O₇, Na₂WO₄, Fe₂O₃, BaO₂ o. dgl. verwendbar sind. Z. B. wird die Legierung durch eine Schmelze hindurchgetrieben, welche in der Richtung von oben nach unten enthält: Chromit, reines Fe₂O₃ neben reinem Cr₂O₃ u. schließlich chromfreies Fe₂O₃. Dieser Reinigung folgt zweckmäßig eine solche mittels überhitzten Dampfes unter Mitverwendung von Alkalicarbonat. (Schwz. P. 107 032 vom 16/3. 1923, ausg. 1/10. 1924. E. Prior. 17/3., 1/4. u. 30/6. 1922.) KÜHLING.

Electro Metallurgical Company, übert. von: **Frederick M. Becket**, New York, *Gegenstände aus Chromstahl* von großer Härte u. Widerstandsfähigkeit gegen oxydierende u. andere zerstörende Einflüsse auch bei hohen Temp. werden erhalten durch anhaltendes Erhitzen von mehr als 20% Cr enthaltenden Chrom- bezw. Chrommanganstählen innerhalb von Carbonisierungsmassen. (A. P. 1517 392 vom 7/9. 1922, ausg. 2/12. 1924.) KÜHLING.

Société anonyme Lumière, Schweiz, *Bearbeitung von Wolfram, Molybdän oder Legierungen dieser Metalle*. Die Metalle bzw. Legierungen werden in Pulverform in einer Wasserstoffatm. zunächst mittels elektr. Ströme von hoher Spannung u. geringer Stärke bei etwa 1600°, dann mittels niedrig gespannter Ströme von hoher Stärke bis annähernd zum Schmelzen erhitzt. Sie werden durch diese Behandlung in einen Zustand übergeführt, in dem sie auch in der Kälte dehnbar (duktile) sind. (F. P. 577 196 vom 15/2. 1924, ausg. 1/9. 1924. D. Prior. 15/2. 1923.) KÜHLING.

Joseph M. Schwarz, New York, *Aluminiumnickellegierungen*, bestehend aus 85—97% Al u. Cu u. Ni im Verhältnis von 2 : 1, z. B. aus 90—97% Al, 7,5—2% Cu u. 2,5—1% Ni bzw. 85—96% Al, 10—2,5% Cu u. 5—1,5% Ni. Zur Herst. der Legierung wird erst Cu u. Ni zusammengeschmolzen u. die entstandene Legierung in geschmolzenes Al eingetragen, beides zweckmäßig in Ggw. desoxydierender Mittel. Die Legierungen zeichnen sich durch geringe D., Beständigkeit gegen Säuren u. andere zerstörende Einflüsse, Festigkeit u. dgl. aus. (A. P. 1518 760 vom 10/12. 1922, ausg. 9/12. 1924.) KÜHLING.

Carborundum Company, übert. von: **Frank J. Tone**, Niagara Falls, *Metallgußformen*. Mischungen von Siliciumcarbid u. einem feuerfesten Bindemittel, vorzugsweise von 90 Teilen Carbid in Körnern verschiedener Größe u. 10 Teilen Ton werden unter Zusatz von W. gemischt, geformt, getrocknet u. bei Temp. gebrannt, bei denen die M. verglast. Zweckmäßig werden Teilstücke hergestellt, die nach

ndetem Guß auseinandergenommen u. wieder benutzt werden. Die M. besitzt e ziemlich hohe Wärmeleitfähigkeit, so daß metall. Gußstücke rasch abkühlen. **P. 1513435** vom 26/5. 1923, ausg. 28/10. 1924.) KÜHLING.

Quintin Marino, Belgien, *Metallüberzüge auf Metallen*. Die zu überziehenden allgegenstände werden als Kathoden eines elektr. Gleichstroms geschaltet, als o n dienen aus den Metallen bzw. Legierungen, mit denen die Gegenstände rzenogen werden sollen, gefertigte Platten o. dgl., als Elektrolyte, Lsgg. von Salzen er Metalle, Sn, Pb, Zn, Al oder Cd, in Ätzalkalilauge, welcher ein Alkalitartrat, osphat oder -pyrophosphat u. zweckmäßig noch ein Alkalichlorid zugefügt ist. ktrolysiert wird mit 0,3—3 V. u. 100—300 Amp. je qm. (**F. P. 577132** vom 13/2. 4, ausg. 1/9. 1924.) KÜHLING.

X. Farben; Färberei; Druckerei.

—, *Edgar Louis Andés* †. Der schriftstellerischen Tätigkeit des Verstorbenen dem Gebiete der Lacke u. Farben wird gedacht. (Farben-Ztg. **30**. 960.) SÜ.

—, *Bleichen von Wolle und Halbseide*. Angaben über das Bleichen mit SO₂ Peroxyden. (Rev. gén. des Matières colorantes etc. **1924**. 297—99.) SÜVERN.

L. Eymmer, *Der Begriff der Schnelligkeit in der Färberei*. Die Schnelligkeit Färbens, der Absorption u. des Wiederheruntergehens des Farbstoffs von der er u. die Beziehungen dieser Vorgänge bei verschiedenen Arten des Färbens rden besprochen. (Rev. gén. des Matières colorantes etc. **1925**. 8—9.) SÜVERN.

Siegfried Marian, *Über das Färben von Haarhutfilzen*. Nach theoret. Ausrungen über das Anfärben wird das Färben im Labratz u. im Stumpen (Stück) sauren u. Chromentwicklungsfarbstoffen beschrieben. (Melliands Textilber. **6**. —32. 104—106. Wien.) SÜVERN.

János Hollub, *Pelzfärberei*. Das Färben mit Pflanzenfarbstoffen, Ursolen, kofarben, Furreinen u. Furrolen, Küpen- u. Beizenfarbstoffen, sowie das Vor-Nachbehandeln ist beschrieben. (Chem. Rundschau Mitteleuropa u. Balkan **1925**. —23.) SÜVERN.

Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning, *Leonil S in der Färberei und rrichterei der Rauchwaren*. Einzelheiten über die Anwendung des Stoffes. (Melliands Textilber. **6**. 112.) SÜVERN.

J. Kny, *Das Karbonisieren der Wollstückware*. Angaben über Einrichtung der rbonisierkammern, das Karbonisieren vor u. nach dem Färben u. über *Leonil S* Zusatz zum Säurebad. (Melliands Textilber. **6**. 97—98.) SÜVERN.

Haller, *Theoretische Probleme der Druckerei*. Die Verdickung hat nicht allein Zweck, die Capillarität des Gewebes aufzuheben, sie dient auch dazu, die Anndung viel höherer Konz. zuzulassen als Färbebäder im allgemeinen. Die Verdkung verzögert ferner das Aufziehen substantiver Farbstoffe auch in Ggw. der ylen Menge von Elektrolyten in dem Sinne, daß sie nur ganz allmählich, aber tig, bestimmte Mengen Farbstoff zur Färbung der Faser freigibt. Das einbadige rben mit Alizarin ist beim Druck durch die besondere Wrkg. der Verdickung, ee glückliche Regelung der Geschwindigkeit der Lackbildung, erreicht. Für das ntilluminieren von Indigofärbungen mit Küpenfarbstoffen nach einem vom Vf. egearbeiteten Verf. wird eine Erklärung gegeben. (Melliands Textilber. **6**. 101 t 103. Großenhain.) SÜVERN.

A. Schneevoigt, *Über die Verwendung von Resorcin im Zeugdruck*. Man kann rbstoffe ohne Dämpfen in einfacher Weise dadurch fixieren, daß man bas. Farb-ff, Tannin, Resorcin oder ein anderes Phenol, W. u. Verdickungsmittel aufdruckt, tcknet u. ohne zu dämpfen durch ein k. bis lauwarmes Sb-Bad geht. Das Verf. it sich für Spritz- u. Bürstendruck verwenden. Resorcin wirkt nicht nur bei ta Farbstoffen günstig, die zum direkten Aufdruck dienen. Auch das durch

Formaldehyd aus Resorcin erhaltene Harz ist als Fixierungsmittel vielseitiger Verwendung fähig. (Melliands Textilber. 6. 106—7.) SÜVERN.

G. Tagliani und E. Krähenbühl, *Neue Fixationsmethode für das Indigosol* DE. Aus dem Indigosol kann die Indigorückbildung außer durch Oxydationsmittel auch durch Einw. von leicht dissoziierbaren organ. Salzen auf die Indigonatriumnitrimischung während des Trocknens oder durch nachträgliches Dämpfen erfolgen. Das Verf. eignet sich auch für naphtholierte Ware beim Aufdruck von Indigo neben Eisfarben, ebenso für den Druck von Indigosol neben Cr-Beizfarbstoffen für die längeres Dämpfen notwendig ist, es ergibt auch gute Resultate bei der alkal. Kräuselartikel u. bei der Imitation des üblichen Blaudrucks. Die direkte Entw. der Indigosolnitritdruckfarbe kann auch durch eine stark essigsäure (ameisenakroleinsäure) Atmosphäre in einem Schnelldämpfer erfolgen. (Melliands Textilber. 6. 107.) SÜVERN.

Rudolf Ditmar, *Eine neue Bleifarbe*. Unter dem Namen *Subox* wird auf elektr. Wege kolloidal zerstäubtes Pb, das mit Leinöl verrieben ist, als Schutzfarbe in den Handel gebracht. Die Farbe haftet sehr fest, ist ausgiebiger als Mennige und verhindert, daß etwa vorhandener Rost weitergeht. (Chem. Metallurg. Engineering 31. 775. 1924. Graz.) SÜVERN.

Hans Wolff, *Neue Rostschutzfarbe?* Besprechung der *Subox*farbe. Verss. mit ihr im Vergleich zu Anstrichen mit Eisenrot u. grauer Rostschutzfarbe oder mit Bleimennige u. Bleigrau ergaben, daß der Suboxanstrich in seiner Schutzwirkung keinesfalls den Anstrichen mit den Regenproben überlegen ist. Von einem vollständigen Abbinden des Rostes kann keine Rede sein. (Farbe u. Lack 1925. 65—66 Berlin.) SÜVERN.

S. Ganelin, *Über Sulfo-Bleiweiß*. Entgegnung auf die Ausführungen SACHER (Ztschr. f. angew. Ch. 37. 732; C. 1924. II. 2419). Sulfo-Bleiweiß ist unempfindlich gegen SO₂ u. wetterbeständiger. Nach den Unterss. des Materialprüfungsamtes ist Sulfobleiweiß hinsichtlich Farbe, Deckkraft, Glanz u. Stärke des Anstrichs dem Carbonat-Bleiweiß überlegen. Der Grad der Bleiseifenbildung ist nicht geringer. Sulfobleiweiß bedarf weniger Öles zum Anreiben. Sulfobleiweiß ist im Magen- u. Darmsaft weniger l. als Carbonatbleiweiß. (Chem.-Ztg. 49. 151.) JUNG.

Adrian de Vries, *Altes und neues aus der Buntfarbenindustrie*. Angaben über Pb-Chromate u. Zn-gelb. (Farbe u. Lack 1925. 52—53.) SÜVERN.

A. Cobenzl, *Altes und Neues vom Berlinerblau*. (Vgl. L. BOCK, S. 1249.) Vorschlag zur Mitverwendung von (NH₄)₂CO₃ bei der Blauherst. u. Hinweis darauf, daß mit A. angerührter Pariserblauteig nicht absetzt u. glatt durch jedes Filter geht. (Farben-Ztg. 30. 902. Nußloch b. Heidelberg.) SÜVERN.

v. d. Mühlen, *Die Grenzen der ölfreien Grundiertechnik*. Die ölfreien Grundierstoffe können bei Anstrichen auf Weichhölzern außen, falls besonders hohe Ansprüche auf Haltbarkeit gestellt werden, nicht konkurrieren. Für Innenanstriche können die ölfreien Grundiermittel immer mit Vorteil angewendet werden, sie sparen gut aus u. ersparen Zeit, Material u. Lohn. Farbenanstriche, Naturlackierungen u. -lasierungen werden besprochen. (Farben-Ztg. 30. 898—901.) SÜVERN.

—, *Über die Erwärmung farbiger Gegenstände durch Bestrahlung*. Nach Verss. von GARDNER (The Oil and Colour Trades Journal 1924. 2288) werden die Temp. Erhöhungen mitgeteilt, die mit verschiedenen Anstrichen versehene Metallbehälter Holz- u. Fe-Platten, sowie Steine beim Bestrahlen zeigten. (Farbe u. Lack 1925. 42.) SÜVERN.

A. Kertess, *Normen zur Prüfung der Echtheitseigenschaften von Färbungen auf Baumwolle und Wolle*. Die von der Echtheitskommission der Fachgruppe für Farben- u. Textilchemie des Vereins Deutscher Chemiker für Baumwolle u. Wolle

her ausgearbeiteten Bestst. werden besprochen. (Chem.-Ztg. 49. 109—10. inkur.) SÜVERN.

E. Wilhelm, Können Reinheitsbegriffe und Echtheitseigenschaften von Farben allgemein durchführbare Kennzeichnung finden? Als techn. rein wäre jedes Mittel anzusprechen, das nur aus dem Stoff besteht, nach dem es bezeichnet ist, bei der Benennung entweder die chem. Zusammensetzung, das natürliche Vorkommen oder der Handels- oder Rechtsgebrauch zugrunde zu legen ist. Anilinstofflacke sollten mit dem Namen des verwendeten Anilinfarbstoffs gekennzeichnet werden. Vorschläge für die Normung der Lichtechtheit u. des Farbtons werden besprochen. (Farben-Ztg. 30. 840—41. 897—98.) SÜVERN.

Georg Zerr, „Kalkbeständig“, „Beizfrei“, „Spritecht“. Es ist unzweckmäßig, Alkfarben aus bas. Teerfarbstoffen auf Wasserechtheit mit A. zu prüfen. (Farben-Ztg. 30. 959.) SÜVERN.

Maria Scholz, Leichlingen, Rhld, Herstellung von Ätzen oder Buntätzen nach R. P. 390841, dad. gek., daß man das mit Farbstofflsg. getränkte Gewebe nach dem Trocknen mit der Ätzfarbe bedruckt, hierauf in ein heißes Bad von Wachs, einem indifferenten organ. Lösungsm. oder einer Salzlsg. bringt. — Das Fixieren des Farbstoffes u. das Ätzen erfolgt hierbei in einem Bade in kurzer Zeit. (D. R. P. 6860 Kl. 8n vom 13/4. 1923, ausg. 29/11. 1924. Zus. zu D. R. P. 390841, C. 1924. 1871.) FRANZ.

René Clavel, Basel-Augst, Schweiz, Färben von Celluloseacetat. (D. R. P. 68178 Kl. 8m vom 21/5. 1922, ausg. 13/1. 1925. F. Prior. 27/10. 1921. Zus. zu R. P. 355533; C. 1922. IV. 552. — C. 1923. II. 576.) FRANZ.

René Clavel, Basel-Augst, Schweiz, Färben von Celluloseacetat. (D. R. P. 68179 Kl. 8m vom 1/9. 1922, ausg. 13/1. 1925. — C. 1924. I. 709.) FRANZ.

British Dyestuffs Corporation, Limited, Leslie Gordon Lawrie und Harold Blackshaw, Manchester, England. Schwarzfärben von Celluloseacetat. Man läßt Celluloseacetatseide primäre arom. Basen, besonders α -Naphthylamin, Benzidin, Folidin, Diamidin, p,p' -Diaminodiphenylamin absorbieren, diazotiert auf der Faser u. entwickelt mit 2,3-Oxynaphtholsäure oder Resorcin. Die Lsg. der Basen kann man durch Erhitzen der Basen in Säuren u. Versetzen mit Alkalien, oder durch Lösen in A. u. Eingießen in W. oder durch Dispergieren mit Türkischrotöl u. Verd. mit W. erhalten. (E. P. 224359 vom 18/10. 1923, ausg. 4/12. 1924.) FRANZ.

British Cellanese Limited vormals **British Cellulose and Chemical Manufacturing Company Limited**, London. **George Holland Ellis**, **Francis Malcom Stevenson** und **Cyril Mansley Croft**, Spondon b. Derby, Färben und Bedrucken von Celluloseacetat. Man färbt mit Pyrazolonfarbstoffen, insbesondere Pyrazolonazofarbstoffen, die keine SO_3H -Gruppe enthalten, z. B. mit den Farbstoffen aus diazotiertem Anilin, p -Anisidin p -Aminodimethylanilin u. 1-Phenyl-3-methyl-5-pyrazolons. Zum Färben der Celluloseacetatseide löst man die Farbstoffe in Alkalien unter Vermeidung eines Überschusses, oder man löst die Farbstoffe in einem organ. mit W. mischbaren Lösungsm. u. gießt dann in das Färbebad, oder man vermischt die Farbstoffe mit Ricinusölsulfosäure oder anderen sulfonierten Fettsäuren oder deren Salzen u. trägt die Mischung in das Färbebad ein; den Färbebädern können Schutzkolloide zugesetzt werden. Enthalten die verwendeten Farbstoffe eine freie diazotierbare NH_2 -Gruppe, so können sie auf der Faser diazotiert u. entwickelt werden. Die erhaltenen Färbungen sind alkali-, säure-, seifen- u. lichtecht. Das Verf. kann auch auf Celluloseacetat enthaltende Mischgewebe angewendet werden. (E. P. 24681 vom 11/10. 1923, ausg. 11/12. 1924.) FRANZ.

British Celanese Limited, vorm. **British Cellulose and Chemical Manufacturing Company Limited**, London, und **George Holland Ellis**, Spondon b.

Derby, England, *Färben von Celluloseacetat*. Die zum Färben dienenden in V unl. oder wl. Farbstoffe oder Basen, die zur Erzeugung von Farbstoffen auf d Faser dienen, werden durch Behandeln mit carbocycl. Verbb., die salzbildend Gruppen enthalten oder deren Salzen l. gemacht; solche Verbb. sind Naphthensäuren, Naphthensulfosäuren, Phenole, Phenolsulfonsäuren, -carbonsäuren, Naphtho- lin-anthracensulfonsäuren. Zum Drucken setzt man den Mischungen Verdickungsmittel zu. (E. P. 224925 vom 22/5. 1923, ausg. 18/12. 1924.) FRANZ.

Société pour la Fabrication de la Soie „Rhodiaseta“, Seine, Frankreich *Färben von Celluloseacetatseide*. Zum Färben von Gebilden aus Celluloseacetat, w. Kunstseide, Filme usw., mit basischen Farbstoffen setzt man den Färbebädern arom. Sulfo- oder Carbonsäuren, die außerdem Phenolgruppen enthalten können zu, wie Benzoesäure, Oxybenzoesäuren, Benzol-, Toluolsulfosäuren, Sulfosalicylsäuren, Phthalsäure, Resoreylsäure usw. oder ihre in W. ll. Salze; da mehrere d. genannten Verbb. in Quellungen von Celluloseacetat l. sind, so kann man dies Stoffe dem Celluloseacetat auch vor dem Verspinnen zusetzen, die so hergestellte Fäden lassen sich ohne weiteres mit den bas. Farbstoffen färben. (F. P. 57989 vom 7/4. 1924, ausg. 25/10. 1924.) FRANZ.

Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Leverkusen b. Köln a. Rh. (Erfinder: **Wilhelm Neelmeier** und **Richard Fischer**), *Erzeugung wasserechter Färbungen auf der Faser* aus Beizenfarbstoffen u. Chromchlorid, dad. gek., daß man die Faser bei gewöhnlicher Temp. mit der Lsg. des Farbstoffes trinkt u. nach dem Trocknen die so erhältliche Färbung ebenfalls bei gewöhnlicher Temp. mit einer Lsg. von Chromchlorid behandelt. Hierbei fällt das Dämpfen fort; das Verfahren eignet sich zur Herst. von Javabatiks. (D. R. P. 408294 Kl. 8m vom 25/11. 1923, ausg. 16/1. 1925.) FRANZ.

Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning, Höchst a. M., (Erfinder: **Fritz Peterhauser**), *Färben der pflanzlichen Faser in Halbwolle oder ähnlichen Fasergemischen mit Schwefelfarbstoffen*, dad. gek., daß man die Schwefelfarbstoffe unter Zusatz von Alkalicarbonat u. Hydrosulfit mit oder ohne Zusatz von kolloid. wirkenden Stoffen, wie Casein, Sulfoleate, Seife, Leim, Sulfitpech, organ. Salze usw. reduziert u. löst u. bei gewöhnlicher Temp. oder auch bei wärmerer Temp. färbt — Man erhält walk-, wasch-, licht- u. überfärbecchte Färbungen; die Wolle wird nicht geschädigt. (D. R. P. 408404 Kl. 8m vom 29/6. 1921, ausg. 19/1. 1925.) FRANZ.

Robert Haller und **Friedrich Kurzweil**, Großenhain i. Sa., *Buntreservieren von Anilinschwarz und ähnlichen Oxydationsfarbstoffen mit Küpenfarbstoffen*, dad. gek., daß man das mit Anilinschwarzklutzbrühe getränkte u. vorgetrocknete Gewebe mit einer Druckfarbe, die neben den Küpenfarbstoffen u. den zum Reservieren des Schwarz notwendigen Zusätzen noch Reduktionsmittel enthält, bedruckt u. nach dem Entwickeln des Anilinschwarz durch Dämpfen, mit heißer NaOH behandelt, wäscht u. trocknet. — Der Küpenfarbstoff wird hierbei vollkommen auf der Faser fixiert, ohne daß sich weiße Höfe um die Buntätzeffekte herum bilden. (D. R. P. 408414 Kl. 8n vom 11/9. 1923, ausg. 16/1. 1925.) FRANZ.

Action-Gesellschaft für Anilin-Fabrikation, Berlin, übert. von: **Paul Onnertz**, Berlin-Wilmersdorf, und **Alfred Peters**, Berlin, *Färben von Wolle mit Chromierungsfarbstoffen*. (A. P. 1511359 vom 15/5. 1922, ausg. 14/10. 1924. — C. 1923. IV. 22 [E. P. 188632].) FRANZ.

Auguste Escaich und **Jean Paul Worms**, Paris, Frankreich, *Färben und Drucken von Faserstoffen aller Art*. Man färbt aus einer Lsg. von Molybdaten, Wolframaten, die unter Verwendung von Al- oder Mg-Amalgam reduziert wird; eine Lsg. von NH₄-Molybdat in W. u. verd. HCl wird mit Al-Amalgam versetzt, aus der blauen Fl. wird die Faser blau angefärbt. (E. P. 224361 vom 22/10. 1923, ausg. 4/12. 1924.) FRANZ.

Société d'Exploitation des Procédés Escaich, Seine, Frankreich, *Färbefahren*. (F. P. 576060 vom 27/9. 1923, ausg. 11/8. 1924. D. Prior. 25/11. 1922. - vorst. Ref.) FRANZ.

Société d'Exploitation des Procédés Escaich, Seine, Frankreich, *Färbefahren*. Man schlägt auf die Faser Metalloxyde aus Metallsalzlsgg. durch Behandeln mit Reduktionsmitteln, wie Aldehyden, Ketonen, Zuckerarten, Hydrazinen usw. nieder. Man erwärmt z. B. Seide mit verd. *Fehlingscher Lsg.* u. *Glucose*; man erhält ein Rosa; man erwärmt eine Lsg. von Cu-Acetat mit Hydrazinsulfat, die Faser kann vorher mit Cu, Ni usw. gebeizt werden. (F. P. 571195 vom 27/9. 1923, ausg. 13/5. 1924. D. Prior. 25/11. 1922.) FRANZ.

Société d'Exploitation des Procédés Escaich, Seine, *Färbeverfahren*. Man oxydiert Phenole, Resorcin, Hydrochinon, Naphthole, Tannin, Amine, Eosine in der Färbeflotte oder auf der pflanzlichen oder tier. Faser mit Metallsalzen oder mit einem Oxydationsmittel unter Zusatz eines katalyt. wirkenden Metallsalzes. Man färbt die Faser mit Tannin u. behandelt mit NH₄-Molybdat, man erhält eine gelbe Färbung; beim Behandeln von tannierter Baumwolle in einem Bade aus CuSO₄, [HgCl₂], Seignette-Salz bei Siedetemp. erhält man Khakifärbungen. Diaminophenolchlorhydrat liefert mit Natriumpersulfat u. CuSO₄ einen rot färbenden, Resorcin mit Natriumpersulfat, CuSO₄ u. NH₃ einen graugrün färbenden, Hydrochinon mit Natriumpersulfat, CuSO₄ u. NH₃ einen braunen, α -Naphthol mit Hypochloriten, Ferricyanid einen violett färbenden, Anilin mit Kaliumferricyanid u. ZnSO₄ einen violett färbenden Farbstoff. (F. P. 576057 vom 27/9. 1923, ausg. 11/8. 1924. D. Prior. 25/11. 1922.) FRANZ.

Société d'Exploitation des Procédés Escaich, Seine, Frankreich, *Färbefahren*. Man läßt auf Kaliumferri- oder -ferrocyanid in saurer Lsg. in Ggw. von katalytisch wirkenden Metallsalzen oder -oxyden HgSO₄, Reduktionsmittel, Zucker, einwirken; zu einer kochenden Lsg. von HgSO₄ u. Zucker setzt man Kaliumferricyanid, die Fl. färbt blau. (F. P. 576058 vom 27/9. 1923, ausg. 11/8. 1924. D. Prior. 25/11. 1922.) FRANZ.

Société d'Exploitation des Procédés Escaich, Seine, Frankreich, *Färbefahren*. Man färbt mit Fluoresceinfarbstoffen unter Zusatz eines Oxydationsmittels, wie J, Br, in Ggw. von Katalysatoren, wie Pyridin, Chinolin, oder Metallsalze in Ggw. von Persalzen, oder Bromate oder Jodate unter Zusatz von Reduktionsmitteln, wie Sulfite, Hydrazinsalze, Amalgame. Ein Bad aus *Fluorescein*, NaClO₃, *Glucose*, HgSO₄ u. Essigsäure färbt in der Siedehitze die Faser gelb, ein Bad aus *Fluorescein*, Na₂SO₃, KJO₃, H₂SO₄ u. CuSO₄ färbt rot. (F. P. 576059 vom 27/9. 1923, ausg. 11/8. 1924. D. Prior. 25/11. 1922.) FRANZ.

Société d'Exploitation des Procédés Escaich, Seine, Frankreich, *Färbefahren*. Man färbt Fasern aller Art aus einem Bade, das Phenole, Salicylsäure, l. Nitrite, Metalloxyde oder -salze unter Zusatz von Säuren enthält, ein Bad, das *Salicylsäure*, Nickelchlorid, NaNO₂ u. Eg. enthält, färbt die Faser rosa tiefrot, ein Bad aus *Phenol*, *Kaliumferricyanid*, HgCl₂, NaNO₂ u. Eg. färbt grün. (F. P. 576061 vom 27/9. 1923, ausg. 11/8. 1924.) FRANZ.

Société d'Exploitation des Procédés Escaich, Seine, Frankreich, *Färbefahren*. Man färbt die Faser in der Wärme mit einem Bade aus NaNO₂ u. Metallsalzen, oder man läßt die Faser in der Kälte 24 Stdn. liegen. Das Verf. kann auch für tannierte Baumwolle, Leder usw. angewendet werden. (F. P. 576062 vom 27/9. 1923, ausg. 11/8. 1924. D. Prior. 25/11. 1922.) FRANZ.

Chemische Fabrik Griesheim-Elektron, Frankfurt a. M., (Erfinder: **Arthur Zitscher**, Offenbach a. M.), *Zur Farbstoffherstellung geeignete Präparate in trockener oder Pastenform*. (D. R. P. 408505 Kl. 8m vom 12/6. 1923, ausg. 19/1. 1925. — J. 1924. II. 2790.) FRANZ.

Paul Gamichon, Frankreich, *Bleiglätte*. Innerhalb eines Behälters, der durch eine weite Bodenöffnung mit einem größeren Vorratsbehälter in Verb. steht, wird geschmolzenes Pb mit Luft, der gegebenenfalls Dampf beigemischt wird, behandelt die durch eine Anzahl schräg gerichteter Röhren zugeführt wird u. das Metall in kreisläufige Bewegung versetzt. Das hierbei ohne weitere Wärmezufuhr exotherm gebildete PbO wird durch ein senkrechtes von einem Heizmantel umgebenes Rohr abgeleitet, in dem mitgerissene Teilchen von metall. Pb oxydiert werden, so daß völlig bleifreier Farbstoff gewonnen wird. Soll ein weniger reines Erzeugnis gewonnen werden, so leitet man durch ein wagerechtes Rohr ohne Heizmantel. (F. P. 577338 vom 10/4. 1923, ausg. 3/9. 1924.)

KÜHLING.

Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning, Höchst a. M., (Erfinder: **Hermann Wagner**, Bad Soden a. Ts. und **Otto Sohst**, Höchst), *Darstellung von Monoazofarbstoffen*, darin bestehend, daß man *m*-Aminobenzoesäureanilid diazotiert u. mit den *Methylphenylpyrazolonmonosulfonsäuren* u. *Naphtholsulfonsäuren* wie 1,4-, 2,6- u. 1,5-Naphtholsulfonsäure kuppelt. — Man erhält gut l. Farbstoffe, die Wolle in gleichmäßigen, gelben bis roten Tönen färben. (D. R. P. 406787 Kl. 22a vom 25/7. 1922, ausg. 27/11. 1924.)

FRANZ.

Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Leverkusen, übert. von: **Josef Haller**, Wiesdorf, *Unlösliche Azofarbstoffe*. (A. P. 1503044 vom 26/9. 1922, ausg. 24/7. 1924. — C. 1923. IV. 987 [F. P. 555505].)

FRANZ.

Gesellschaft für Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, *Herstellung von nachchromierbaren Azofarbstoffen*. (F. P. 579510 vom 28/3. 1924, ausg. 18/10. 1924. Schwz. Prior. 19/4. 1923; Schwz. P. 105939 [Zus.-Pat.] vom 19/4. 1923, ausg. 16/7. 1924 u. Schwz. P. 106421, Zus.-Pat. vom 19/4. 1923, ausg. 16/8. 1924.) Fr.

Gesellschaft für Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, *Azofarbstoffe für Wolle*. Man behandelt die Chromverb. von Azofarbstoffen, die man durch Einw. von chromabgebenden Verb. auf den durch Kuppeln von 1-Diazo-2-oxynaphthalin-4-sulfosäure mit α -Naphthol darstellbaren Azofarbstoff erhält, mit salpetriger Säure; der Farbstoff färbt Wolle aus saurem Bade in echten schwarzen Tönen. (F. P. 582435 vom 17/9. 1923, ausg. 18/12. 1924. Schwz. P. 102278 vom 3/10. 1922, ausg. 16/11. 1923.)

FRANZ.

Gesellschaft für Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, *Herstellung von nachchromierbaren Azofarbstoffen der Triarylmethanreihe*. Man vereinigt die Diazoverb. von Aminotriphenylmethanverb. der Formel: $R_2N \cdot C_6H_4 \cdot CH[C_6H_3 \cdot NH_2^4 \cdot SO_3H^2]C_6H_4NR_2$, R = Alkyl-, Aralkyl-, Aryl-, mit solchen 1-Aryl-5-pyrazolonderiv., die sich von Aminosalicylsäuren, ihren Homologen oder Derivv. ableiten. Der Farbstoff aus diazotiertem *p*-Amino-o-sulfotetramethyl-*p,p*-diaminotriphenylmethan u. 1-(4'-Oxy-3'-carboxy)-phenyl-3-methyl-5-pyrazolon färbt Wolle aus saurem Bade in gelben Tönen, die beim Nachchromieren in reine grüne walk- u. pottingechte Färbungen übergehen; ähnliche Farbstoffe erhält man mit 1-(4'-Oxy-3'-carboxy-5'-methyl)-phenyl-3-methyl-5-pyrazolon, 1-(4'-Oxy-3'-carboxy-6'-methyl)-phenyl-3-methyl-5-pyrazolon oder 1-(2'-Oxy-3'-carboxy-5'-methyl)-phenyl-3-methyl-5-pyrazolon; die entsprechenden 1-Aryl-5-pyrazolon-3-carbonsäuren liefern tiefere Färbungen. (F. P. 579838 vom 5/4. 1924, ausg. 24/10. 1924, Schwz. Prior. 7/4. 1923 u. Schwz. PP. 105485 vom 7/4. 1923, ausg. 16/6. 1924, 107328, 107329, 107330 [Zus.-Pat.] vom 7/4. 1923, ausg. 16/10. 1924.)

FRANZ.

Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Deutschland, *Herstellung von Triphenylmethanfarbstoffen*. Man kondensiert Triphenylmethanfarbstoffe, die in *p*-Stellung zum Methankohlenstoff durch Cl, NO₂, SO₃H, CH₃O usw. substituiert sind, mit aromat. Basen, die in *o*-Stellung durch Halogen substituiert sind, wie 4-, 5-, 6-Chlor-2-toluidin, 4,6-Dichlor-2-toluidin, 3-Chlor-4-toluidin, 4-Chlor-2-anisidin, 4-Chlor-2-aminobenzol-1-carbonsäureäthylester, 1-Chlor-2-aminonaphthalin. Die Farb-

offe färben Wolle in rötlichblauen bis violetten Tönen, beim Nachchromieren erhält man reine rotviolette Färbungen; nach dem Sulfonieren erhält man ll. Farbstoffe, die sich zum Druck eignen; der Farbstoff aus *p*-Chlorbenzaldehyd u. *o*-Kresotinsäure liefert beim Erhitzen mit 6-Chlor-2-toluidin einen rötlichblau färbenden Farbstoff. (F. P. 583703 vom 11/7. 1924, ausg. 20/1. 1925. D. Priorr. 25/7. 1923 u. 1/3. 1924.) FRANZ.

Gesellschaft für Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, *Anthrachinonfarbstoffe und Zwischenprodukte*. Man kondensiert aminosubstituierte *o*-Benzylbenzoesäuren mit halogenierten 1,3,5-Triazinderiv., z. B. Cyanurchlorid, u. beirkt dann den Ringschluß zum Anthrachinonring; man kondensiert z. B. Cyanurchlorid mit 3 Mol. 3'-Aminobenzoylbenzoesäure in Ggw. von Sodalsg. u. behandelt is Prod. mit 95%ig. H₂SO₄, der erhaltene Küpenfarbstoff färbt Baumwolle gelb; urch Kondensation von Cyanurchlorid mit 3 Mol. des Lactams der 2',5'-Diaminobenzoylbenzoesäure in Nitrobenzol in Ggw. von Natriumacetat u. Behandeln des od. mit rauchender H₂SO₄ erhält man einen rot violetten Küpenfarbstoff. (E. P. 23911 vom 20/10. 1924, Auszug veröff. 24/12. 1924. Prior. 26/10. 1923. Zus. zu P. 205525; C. 1924. I. 2013.) FRANZ.

British Dyestuffs Corporation, Limited, Manchester, **James Baddiley**, lackley b. Manchester, und **William Wyndham Tatum**, Huddersfield, England. *Herstellung von Anthrachinonfarbstoffen*. Man kondensiert Aminoanthrachinone mit er Carbonsäure eines Alkylenoxyds, z. B. Phenylglycidsäure, in Eg. mit oder ohne asatz von Cu. 1,4-Diaminoanthrachinon gibt mit dem K-Salz der Phenylglycid- iure einen Farbstoff, der Wolle in echten, lebhaften, blauen Tönen anfärbt; mit Aminoanthrachinon erhält man einen roten, mit 1-Amino-4-oxyanthrachinon einen rpur färbenden Farbstoff; ähnliche Farbstoffe entstehen auch mit Methylglycid- iure. Die Farbstoffe färben auch Celluloseacetatseide. (E. P. 224363 vom 25/10. 1923, ausg. 4/12. 1924.) FRANZ.

Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning, Höchst a. M., *Benzanthron- urbstoffe*. Man kondensiert Benzanthrone, die in 1'-Stellung substituiert sind, z. B. -Chlorbenzanthron, β -Methylbenzanthron, mit aromat. Säurechloriden, wie Benzoyl- chlorid, mittels AlCl₃ u. ZnCl₂. Die Farbstoffe färben Baumwolle aus der Küpe elb. (E. P. 222125 vom 16/9. 1924, Auszug veröff. 12/11. 1924. Prior. 18/9. 1923. us zu E. P. 205502; C. 1924. I. 710.) FRANZ.

Farbwerke vorm. Meister, Lucius & Brüning, Höchst a. M., *Dibenzanthron- urbstoffe*. Man erhitzt Nitro- oder Dinitrodibenzanthron mit alkal. Kondensations- mitteln; die Farbstoffe färben Baumwolle aus der Küpe graublau bis schwarz. E. P. 220930 vom 22/5. 1924, Auszug veröff. 22/10. 1924. Prior. 21/8. 1923; Zu- satz zu E. P. 215782; C. 1924. II. 2792.) FRANZ.

Badische Anilin- & Soda-Fabrik, Ludwigshafen a. Rh., *Graue bis schwarze Küpenfarbstoffe*. Man erhitzt Nitrierungsprodd. des Dibenzanthrons oder die nach E. P. 572971; C. 1924. II. 2506, gereinigten Nitrodibenzanthrone mit Schwefel oder hwefelabgebenden Stoffen mit oder ohne Zusatz von Katalysatoren, wie CuO, bS₂. Die Farbstoffe färben Baumwolle aus der Küpe je nach der Stärke in grauen is schwarzen Tönen. (F. P. 581966 vom 26/5. 1924, ausg. 9/12. 1924. D. Prior. 6/6. 1923.) FRANZ.

L. B. Holliday & Company, Limited, **Arthur Clayton** und **Joseph Arthur tokes**, Huddersfield, York, England, *Herstellung von Pyrazolonfarbstoffen*. Man rhitzt 2,6,8-Naphthylhydrazindisulfosäure mit Dioxyweinsäure in stark saurer Lsg.; er Farbstoff färbt Wolle in licht- u. säureechten gelben Tönen. (E. P. 225097 om 13/2. 1924, ausg. 18/12. 1924.) FRANZ.

Leopold Cassella & Co. G. m. b. H., Frankfurt a. M., (Erfinder: **Richard ierz**), *Herstellung von Küpenfarbstoffen*. (D. R. P. 398877 Kl. 22e vom 29/6.

1916, ausg. 19/7. 1924. Zus. zu D. R. P. 395 692; C. 1924. II. 2505. — C. 1924. I. 711.) FRANZ.

Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning, Höchst a. M., *Herstellung haltbarer, trockener, leichtlöslicher Küpenfarbstoffpräparate*. (D. R. P. 408 177 Kl. 8n vom 27/3. 1921, ausg. 13/1. 1925; Zus. zu D. R. P. 407 474, C. 1925. I. 1019. — C. 1922. IV. 252.) FRANZ.

Compagnie Nationale de Matières Colorantes et de Produits Chimiques Seine, Frankreich, *Herstellung von schwarzen Küpenfarbstoffen*. Das durch Einwirkung von wasserfreiem AlCl_3 auf β -Dinaphthol erhaltliche Prod. wird mit Schwefel auf 310° erhitzt; nach dem Entfernen des Schwefels durch Auslaugen mit h. Na_2S -Lsg. erhält man einen Küpenfarbstoff, der Baumwolle schwarz färbt. (F. P. 28 080 vom 11/4. 1923, ausg. 14/1. 1925. Zus. zu F. P. 575 512.) FRANZ.

Gesellschaft für Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, *Herstellung leichtlöslicher Küpenpräparate*. Alkalisalze der Leukoderivv. der Chinonwollküpenfarbstoffe (D. R. P. 265 195; C. 1913. II. 1441) werden in Ggw. von Verbbl., die zugleich als Schutzkolloide u. verklebend wirken können, wie Dextrin, Melasse, Eiweißstoffe, Sulfitablauge, im Vakuum bei niedriger Temp. eingedampft; die erhaltenen Prodd. bilden schaumige Stückchen, die sich gut lösen u. farbkräftige Küpen geben. (Schwz. P. 105 718 vom 21/4. 1923, ausg. 1/7. 1924 u. F. P. 580 415 vom 15/4. 1924, ausg. 6/11. 1924. Schwz. Prior. 21/4. 1923.) FRANZ.

Gesellschaft für Chemische Industrie in Basel, Basel, Schweiz, übert. von **Richard Tobler**, *Indigoide Farbstoffe*. Man kondensiert 2,1-Naphthindoxyl mit im Benzolkern substituierten Isatinen. 2,1-Naphthindoxyl gibt mit 7-Chlorisatin eine Baumwolle braun, mit 5,7-Dibromisatin einen olive färbenden Farbstoff. (A. P. 151 8710 vom 21/5. 1924, ausg. 9/12. 1924.) FRANZ.

Hans Pereira, Wien, übert. von: **Alois Zinke** und **Albert Klingler**, Graz, *Österreich, Schwefelfarbstoffe*. (Can. P. 237 955 vom 29/6. 1923, ausg. 19/2. 1924. C. 1923. IV. 456 [PEREIRA].) FRANZ.

Chemische Fabrik Pharma G. m. b. H., Hannover, *Herstellung von Kondensationsprodukten aus Formaldehyd und primären aromatischen Aminen*, dad. gek., daß man auf sehr verd. wss. Lsgg. von Salzen prim. arom. Mono- oder Diamine $1\frac{1}{2}$ bis 2 Mol. Formaldehyd in der Siedehitze einwirken läßt. — Man erhitzt z. B. eine verd. wss. Lsg. von Anilinchlorhydrat (1 Mol.) mit 35% ig. CH_2O -Lsg. ($1\frac{1}{2}$ Mol.) zum Sieden. Durch Eindampfen zur Trockne wird aus der Lsg. das Chlorhydrat des Kondensationsprod. in fester Form abgeschieden. Aus der wss. Lsg. fällt verd. NH_3 die freie Base, amorphes, schwachgelbliches Pulver, in Chlf. unl., in Nitrobenzol nur teilweise l., in Pyridin ll., in Eg. mit tieforangeroter Farbe l., bei 130° sich ohne F. zers.; aus der dunkelgelben h. Lsg. in 25% ig. HCl scheidet sich das Chlorhydrat beim Erkalten oder auf Zusatz von k. W. wieder aus. — Das in analoger Weise aus 1 Mol. p-Phenylendiaminchlorhydrat u. $1\frac{1}{2}$ Mol. CH_2O erhaltliche Kondensationsprod., olivgrünes, amorphes Pulver, in Nitrobenzol mit grünlicher, in Eg. mit rotbrauner Farbe l., ist gegen Wärme sehr empfindlich u. erleidet bereits bei 35° Zers.; Chlorhydrat in W. mit dunkelbrauner Farbe l. Die Verbbl. können zur Herst. von Farbstoffen Verwendung finden u. eignen sich in Form ihrer Salze zum Präparieren von Druckplatten für die Vervielfältigung von Hand- u. Maschinenschriften, sowie Zeichnungen. (D. R. P. 406 218 Kl. 12q vom 8/5. 1923, ausg. 15/11. 1924.) SCHOTTLÄNDER.

XVII. Fette; Wachse; Seifen; Waschmittel.

E. Herrndorf, *Raffination vegetabilischer Öle und Fette*. Nach allgemeinen Darlegungen über die Aufgaben der Raffination wird an Hand von Konstruktionszeichnungen der übliche Arbeitsgang bei täglicher Verarbeitung von ca. 5000 kg

beschrieben. Anhangsweise ist eine „Universalraffination“ beschrieben u. durch Zeichnung erläutert, bei der Entsäuerung, Bleichung u. Desodorisierung im gleichen App. stattfinden. (Ind. u. Technik 6. 33—37. Berlin.) HELLER.

Jacobus, *Praxis der Seifenbleichung*. Mitteilungen aus der Praxis über die Verwendung von Hydrosulfit A. Z. A. der Höchster Farbwerke. Gute Verseifung ist notwendig. In stark alkal. Seifenleim läßt sich auch das Fe entfernen. Ein verteilter C sowie Chlorophyll lassen sich nicht bleichen. Das Bleichen von Fettsäuren gelingt unter gewissen Bedingungen. (Seifensieder-Ztg. 52. 125—26.) HE.

Otto Eckart, *Bleichwirkung der Bleicherden*. Vf. betrachtet diese als reine Oberflächen- u. Adsorptionswirkung, da sich der aufgenommene Farbstoff mit 50%ig. A. aus der Erde extrahieren läßt. Die dunkle Verfärbung der deutschen Erden beim Bleichprozeß beruht nach Vf. auch auf einer Lackbildung der Farbstoffe mit in den Erden vorhandenen Fe- u. Al-Salzen. (Der Ölmarkt 7. 3—4. Leipzig.) HELLER.

W. Normann und **Fr. Piekenbrock**, *Isarit, eine neue Bleicherde*. In vergleichenden Verss. an Rüböl, Sardinextrakt u. an einem Mineralöldestillat erwies sich die von der Firma IVO DEIGLMAYR in München hergestellte Erde als ein gutes Prod., während unter anderm die akt. Kohle von BAYER wirkungslos blieb. (Seifensieder-Ztg. 52. 127—28.) HELLER.

K. H., *Über das Pressen von Seifen*. Voraussetzung für leichtes Pressen ist gute Beschaffenheit der Seife, insbesondere bzgl. des Wassergehaltes. Um leichtes Ablösen der Stücke von der Preßstanz zu ermöglichen, empfiehlt sich Benetzen mit verd. Essigsäure, wodurch zugleich Neutralisation der Oberfläche eintritt. Für den Großbetrieb wird die Autopresse empfohlen, die eingehender beschrieben ist, vorauf sich Bemerkungen über Abkanten u. Prägen schließen. (Ztschr. Dtsch. Öl- u. Fettind. 45. 79—81.) HELLER.

—, *Eine neue Seifenflocken-Herstellungsmaschine*. Beschreibung u. Abbildung einer von der Firma JOH. HAUFF, Berlin-Lichterfelde, hergestellten Hobelmaschine, deren Tagesleistung 600 kg bei $\frac{1}{2}$ PS Kraftbedarf beträgt. Die Maschine liefert sehr voluminöse, nicht transparente Flocken. (Ztschr. Dtsch. Öl- u. Fettind. 45. 68.) HELLER.

Jean Nivière, *Rasierseifen*. Ansatz u. Arbeitsgang zur Herst. fester u. fl. Rasierseifen, die sich an Stelle des teuern natürlichen auch mit künstlichem Lavendelöl parfümieren lassen. (La Parfumerie moderne 18. 14—15.) HELLER.

Johannes Altenburg und **Emil Hoyer**, *Das fermentative Fettspaltungsverfahren*. Polemik gegen M. Ost (S. 1144). Die durch den Krieg unterbrochene Herst. von Ricinusferment ist jetzt durch die Vereinigten Chem. Werke, Charlottenburg, wieder aufgenommen. Das Fermentationsverf. liefert die qualitativ höchstwertigen Fettsäuren, auch das Glycerinwasser läßt sich nach D. R. P. 103077 reinigen. Es wird eine Kalkulation für eine wöchentliche Verarbeitung von 20000 kg Öl gegeben. (Ztschr. Dtsch. Öl- u. Fettind. 45. 84.) HELLER.

Achleitner, *Wasserglas-Komposition*. Diese Bezeichnung umfaßt Waschmittel von etwa 5% Fettsäuregehalt, die insbesondere in Süddeutschland anstelle von Schmierseife verwendet werden. Ansatz u. Arbeitsweise sind beschrieben. (Seifensieder-Ztg. 52. 126—27.) HELLER.

Niederländischer Bund für den Handel mit Fetten, Ölen und Ölsaaten, *Analysenmethoden für den Handel mit Fetten, Ölen und Ölsaaten*. Es werden beschrieben: Probenahme, Best. der Verseifbarkeit (aus W., Schmutz u. Asche, sowie Unverseifbarem berechnet), Best. der freien Fettsäuren, Best. des Titers, Unters. von Palmkernen, Best. der D. von Ölen in Tanks. (Ztschr. Dtsch. Öl- u. Fettind. 45. 65—67.) HELLER.

M. Naphtali, *Über die Jodzähl*, Kurze Kennzeichnung der bekannten älteren Verf. zur Best. der J-Zahl. Obwohl die Methode von WINKLER von dem Ministerium für Landwirtschaft vorgeschrieben ist, darf als festgestellt gelten, daß sie ungenaue Resultate liefert. Vf. überprüfte eingehender die Methode von MARGOSCHES (Ztschr. f. angew. Ch. **37**. 334; C. **1924**. II. 772) unter Anwendung von denaturiertem, 96 vol. %ig. A. Die Ergebnisse bei Sesam- u. bei Olivenöl waren genügend genau, so daß die Methode an Einfachheit u. Billigkeit kaum zu übertreffen ist. (Ztschr. Dtsch. Öl- u. Fettind. **45**. 77—79. Charlottenburg.) HELLER.

L. W. Winkler, *Die Jodbromzahl der Fette*. (Zweite Abhandlung.) (I. vgl. Pharm. Zentralhalle **65**. 385; C. **1924**. II. 1529.) Vf. prüft die von ROSENMUND u. KUHNHENN (Ztschr. f. Unters. Nahrsg.- u. Genußm. **46**. 154; C. **1924**. I. 836) angegebene Methode zur Best. der J-Zahl der Fette mit Pyridinsulfatdibromid in essigsaurer Lsg. Zusammen mit **E. Schulek** stellt er fest, daß die Ggw. von Pyridin u. H₂SO₄ überflüssig ist, da in den Lsgg. kein Bromid, sondern Br enthalten ist. Es werden zu den Bestst. $\frac{1}{10}$ -n. Lsgg. von Br in 99%ig. Essigsäure benutzt. Die Fette werden zur Best. in CCl₄ gel. Der Br-Überschuß wird jodometr. oder direkt mit $\frac{1}{10}$ -n. Arsenitlsg. bestimmt.

Zusammen mit **St. Kühn** führt Vf. Vergleichsverss. zwischen dem Bromessigsäureverf. u. dem früher mitgeteilten KBrO₃-Verf. durch. Die Genauigkeit ist bei beiden Verf. gleich. Das KBrO₃-Verf. setzt eine bestimmte Einwirkungszeit u. Ausschuß von Tageslicht voraus, hat aber den Vorteil, daß die benutzten Lsgg. titerbeständiger u. billiger sind als die Lsg. von Br in Essigsäure. Die Ausführungsform des KBrO₃-Verf. wird zur Erhöhung der Genauigkeit noch etwas modifiziert. (Pharm. Zentralhalle **66**. 17—20. Budapest.) K. LINDNER.

K. W. Rosenmund und **W. Kuhnenn**, *Die Jodbromzahl der Fette. Bemerkung zu der gleichnamigen Abhandlung von L. W. Winkler*. Bei Zusatz von Pyridinsulfat zu einer Br-Eg.-Lsg. erhält man exaktere Bromjodzahlen als mittels einer Br-Eg.-Lsg. allein. Das von WINKLER (vorst. Ref.) mitgeteilte Br-Eg.-Verf. ist von den Vf. bereits vor längerer Zeit angewendet u. geprüft worden; es gab aber zu hohe Werte. (Pharm. Zentralhalle **66**. 81—82. Berlin, Univ., Pharm. Inst.) DIETZE.

J. Leimdörfer, *Die Bewertung der Seife*. Abbildung u. Erläuterung eines einfachen App., in dem der „Verreibungswert“ von Seifen prakt. genau genug ermittelt werden kann. Als Verreibungswert bezeichnet Vf. die von harten Seifen unter gleichen Bedingungen abgeriebenen Gewichtsmengen. (Seifensieder-Ztg. **52**. 104—5.) HELLER.

Karl Friedrich Wilhelm, Deutschland, *Abscheidung von Fettsäuren, Harzen, Schleimstoffen usw. aus Fetten und Ölen*. Man behandelt die Öle u. Fette mit einem mit W. mischbaren, wohl die Fettsäuren, nicht aber die Fette u. Öle lösenden Mittel, wie z. B. A., dem man NH₃ zugesetzt hat. — Es findet eine schnelle Scheidung der Fettsäuren u. sonstigen Verunreinigungen von den neutralen Fetten u. Ölen statt u. zwar ohne erhebliche Verluste an letzteren. (F. P. **577037** vom 11/2. 1924, ausg. 29/8. 1924. D. Prior. 24/12. 1923.) OELKER.

Raymond Vidal, *Reinigungsmittel*. Konz. wss. Lsgg. von Alkaliseifen der Ricinusölsäure, der Oxyölsäure oder der Oxystearinsäure werden mit einfachen Fettsäuren, wie Ölsäure versetzt u. dann mit Petroleum-KW-stoffen vermischt. Man erhält auf diese Weise dicke in W. l., dauernd haltbare Pasten, welche in der Textil- u. Lederindustrie etc. Verwendung finden können. (F. P. **577389** vom 18/4. 1923, ausg. 4/9. 1924.) OELKER.

XVIII. Faser- und Spinnstoffe; Papier; Cellulose; Kunststoffe.

F. Hoyer, *Kocher für die Verarbeitung von Hadern, Holz und Stroh*. Angaben über das Kochen des gelben Strohstoffs in Gruben mit $\text{Ca}(\text{OH})_2$, über ältere Kocher, die Vorteile des Flußeisens gegenüber Schmiedeeisen, Zylinder-, Sturz- u. Holzkoher, Ausmauerung u. Auskleidung der Holzkoher sowie Sicherheitsvorrichtungen an Kochern. (Papierfabr. 23. Verein der Zellstoff- u. Papier-Chemiker u. Ingenieure 4—47.) SÜVERN.

J. K., *Die Feuchtung beim Satinieren*. Die Wichtigkeit des Feuchtens u. verschiedene dabei zu beachtende Punkte werden besprochen. (Zellstoff u. Papier 11.) SÜVERN.

Jarl Enckell, *Harz-Schwierigkeiten bei der Papierherstellung*. (Zellstoff u. Papier 5. 20—22. — C. 1925. I. 1146.) SÜVERN.

Korn, *Leimungsgradprüfung auf elektrischem Wege*. (Zellstoff u. Papier 5. —11. — C. 1925. I. 1469.) SÜVERN.

H. Fay, *Einiges über Stoffdichte und Verluste während der Fabrikation*. Die einzelnen Daten bei Verss. an einer Langsiebpapiermaschine u. einer Langsiebartonmaschine werden mitgeteilt. Die Fangstoffanlage nach OTTO SCHMIDT hat sich bewährt. Durch Verss. ist festzustellen, wieviel an Füllstoffen bei verschiedenen Papierstärken verloren geht, dementsprechend ist von Anfang an genügend Füllstoff zuzusetzen. (Wchbl. f. Papierfabr. 56. 128—30.) SÜVERN.

Sigurd Smith, *Der Einfluß des Wassers auf die Papierfaser während des Fabrikationsprozesses*. Als Ergänzung zu den Ausführungen von JANATA (S. 449) wird auf den erweichenden Einfluß hingewiesen, der bei der Quellung auftritt u. die Fasern geschmeidig u. biegsam werden läßt. (Papierfabr. 23. Verein der Zellstoff- u. Papier-Chemiker u. -Ingenieure 41—42.) SÜVERN.

Erik Hägglund, *Untersuchungen über die Schwarzlauge aus der Natroncellulosefabrikation und ihr Verhalten bei höheren Temperaturen*. (Vgl. Cellulosechemie 5. 31; C. 1924. II. 2620.) Die Regenerierung der Lauge von der Cellulosefabrikation durch „Entkohlung“, d. h. Abscheidung der organ. Substanz als Kohle u. teerartige Prodd. mittels Druckerhitzung auf 350° , war von Vf. früher mit Schwarzlauge, die aus Aufschlüssen nach der Sulfatmethode stammte, durchgeführt worden. Hierbei wird aber aus dem Na_2S , das in Na_2CO_3 übergeht, H_2S frei, der die Regenerierung prakt. undurchführbar macht. Nunmehr benutzt Vf. Schwarzlaugen von Aufschlüssen nach der reinen Alkalimethode. Beim Aufschluß wird 269 g bzw. 224 g NaOH auf 1000 g absolut trocknes Nadelholz verwendet u. die Kochung bis zur B. bleichbarer Masse durchgeführt; letztere sowie die Menge Schwarzlauge u. ihr Gehalt an Essigsäure, Ameisensäure, NaOH , Na_2CO_3 wird bestimmt; der an Essigsäure beträgt durchschnittlich etwa 4% vom Holzgewicht. Um das Verh. von Lsgg. von Acetat u. Formiat bei Druckerhitzung kennen zu lernen, werden solche reinen Lsgg. 2 Stdn. auf 350° erhitzt; das Acetat bleibt prakt. unverändert, das Formiat geht in Na_2CO_3 über unter Abspaltung von H_2 , etwas CO , CH_4 u. a. Bei der Druckerhitzung der Schwarzlauge bleibt aber der Acetatgehalt nicht unverändert, sondern steigt von 4% auf ca. 9%. Daher wird bei jeder Regeneration das Acetat in der erhaltenen Weißlauge angereichert; Vf. untersucht, welchen Einfluß ein höherer Gehalt an Acetat in der regenerierten Lauge auf die Aufschlußkochung ausübt u. findet, daß die zulässige Grenze bei ca. 15 g Acetat in 100 ccm liegt. Demnach muß jedesmal etwa ein Drittel der entkohlten Lauge aus dem Kreisprozeß herausgenommen u. durch acetatfreie Lauge ersetzt werden. — Während in der Schwarzlauge ca. 2 g CH_3OH auf je 1 kg Nadelholz enthalten ist, steigt der Gehalt an CH_3OH in der entkohlten Lauge auf 15 g oder 5% vom Ligningewicht. Auf 1 t

Masse erhält man ca. 37 kg *Methylalkohol*. — Zum Schluß gibt Vf. eine Unters. des Teers, der früher bei der Entkohlung von Sulfatlauge erhalten worden war; Fraktionierung mit W.-Dampf u. im Vakuum, Angabe der Mengen u. Kpp. der Fraktionen ohne nähere Identifizierung. — Verss. zum Teil mit **G. Grandell**. (Acta Acad. Aboensis Mathematica et Physica 2. 17 Seiten. 1924. Sep.) ARNDT.

Fenchel, *Apparat zur Bestimmung der Wasser- und Feuchtigkeitsdehnung und Schrumpfung*. Der App. gestattet, durch Einspannen von 15 mm breiten Streifen von 100 mm Länge die Flächenveränderung des Papiers in W. oder bei einer beliebigen Luftfeuchtigkeit nach 10 Minuten auf $\frac{1}{100}\%$ genau abzulesen. Nicht nur die Dehnung beim Feuchten, auch die Schrumpfung beim Trocknen kann festgestellt werden. (Zellstoff u. Papier 5. 20.) SÜVERN.

J. Schandroch, *Maßanalytische Schnellbestimmung der Kupferzahl für Zellstoffe*. Es wird nicht das reduzierte Cu₂O gemessen, sondern das verbleibende CuO. Das Cuprisalz wird mittels KJ in Cu₂J₂ übergeführt u. das freiwerdende J₂ mit Na₂S₂O₃ gemessen. (Papierfabr. 23. Verein der Zellstoff- und Papier-Chemiker u. -Ingenieure 43. Rechberg, Kärnten.) SÜVERN.

E. Ristenpart und **K. Petzold**, *Der Nachweis kleinster Kupfermengen auf Gespinsten*. (Vgl. Melliands Textilber. 5. 179; C. 1924. I. 2484.) Der Nachweis der kleinen Mengen Cu, die nach dem Kochen mit Fehlingscher Lsg. auf der Baumwolle verbleiben, wird beschrieben. (Melliands Textilber. 6. 108.) SÜVERN.

Lanil Akt.-Ges., Basel, Schweiz, *Behandlung gemischter Textilerzeugnisse* aus animal. u. vegetabil. Spinnfasern mit oxydierend (chlorierend) wirkenden Mitteln, dad. gek., daß diese Mittel in solchen Mengen des Materialgewichts der animal. Faser an Chlorkalk u. 25 l Chlorgas auf je 1 kg animal. Material betragen; die derart oxydierte Faser kann noch mit Seifen u. l. Ölen behandelt werden. (**D. R. P. 406773** Kl. 8k vom 24/10. 1923, ausg. 27/11. 1924.) FRANZ.

H. Cruse, Hyde, Cheshire, England, *Tränken von Faserstoffen mit Aceton mittels Elektrolyse*. Zum Tränken von Faserstoffen, Baumwolle, Wolle, Seide mit Al-Acetat verwendet man Essigsäure als Elektrolyten u. Anoden aus Al; die Kathoden können aus Al oder einem anderen Metall bestehen. (**E. P. 224285** vom 7/8. 1923, ausg. 4/12. 1924.) FRANZ.

Dispersoid Syndicate Limited, England, *Undurchdringlichmachen und Schützen von Faserstoffen*. Man dispergiert Wachse, Kunstharze, Linoxyn, Fettsäuren, Bitumen usw. mittels einer Kolloidmühle in W., als Schutzkolloide oder die Dispersion begünstigende Mittel verwendet man die Salze von Ölsäuren oder Fettsäuren, Gummiarabicum, Leim, Casein; die erhaltene Emulsion wird durch Aufbürsten, Tränken oder Zerstäuben auf das Gewebe aufgebracht. (**F. P. 571268** vom 7/9. 1923, ausg. 14/5. 1924. E. Prior. 7/9. 1922.) FRANZ.

A. E. Meyer, Paris, *Erhöhung der Festigkeit von Garnen*. Gummierter ungezwirnte Garne werden beim Laufen von einer Bobbine zur anderen durch Dämpfen, Besprühen usw. angefeuchtet, um die Klebrigkeit zu erhöhen, als Klebmittel kann man Leim, Gelatine, Stärke, Gummi arabicum, Harz oder ein Lösungsm. für Kautschuk verwenden. (**E. P. 224875** vom 21/10. 1924, Auszug veröff. 14/1. 1925. Prior. 12/11. 1923.) FRANZ.

H. T. Böhme Akt.-Ges., Chemnitz, *Behandeln von Faserstoffen mit Flüssigkeiten*. Man setzt den Färbe-, Wasch-, Bäuch-, Mercerisier- usw. -bädern, Druckpasten usw. hydrierte, heterocycl. Basen, Piperidin oder ihre Verbb., z. B., mit Fettsäuren, Oxyfettsäuren, sulfonierte Fettsäuren, Tranöle zu; hierdurch wird die Benetzbarkeit der Faser erhöht, auch wird die Intensität u. die Gleichförmigkeit der Einw. dieser Fl. erhöht. (**E. P. 224882** vom 6/11. 1924, Auszug veröff. 14/1. 1925. Prior. 13/11. 1923.) FRANZ.

Société pour l'Industrialisation des Produits de la Mer, Frankreich, *Be-
ndlung von Naiadaceen zwecks Erzielung weicher, nichtfaulender und unverbrenn-
rer Fasern*. Man taucht die Naiadaceen in ein Bad, um sie vom Sand u. Ver-
reinigungen zu reinigen, u. behandelt sie alsdann mit NaOCl-Lsg. unter Ein-
sen von Luft. (F. P. 580671 vom 27/7. 1923, ausg. 13/11. 1924.) KAUSCH.

Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co., Leverkusen b. Köln a. Rh.,
finder: **Kurt Meisenburg**, Elberfeld und **Wolfgang Lenhard**, Vohwinkel-
ummerstein), *Herstellung von pulverförmiger Baumwolle*, die insbesondere auch zur
sführung chem. Rkk., wie Verätherung oder Veresterung usw., geeignet ist, dad.
k., daß man Baumwolle oder Watte durch Walzen zerkleinert. Die behandelte
umwolle wird chemisch fast nicht verändert, man erhält ein äußerst feines
lver. (D. R. P. 403783 Kl. 12o vom 12/5. 1920, ausg. 4/10. 1924.) FRANZ.

Cesár de Molinari, Frankreich, *Entbasten von Flachs oder dgl.* Die Textil-
ngel werden einem Zerstampfen oder Hämmern ausgesetzt, um sie in der Längs-
htung zu spalten, worauf man sie nochmals mechan. zerstampft, wodurch man
ei Bänder, aus den inneren holzigen Bestandteilen bestehend u. zwei Bänder
s den äußeren Textilfasern erhält. (F. P. 579963 vom 9/4. 1924, ausg. 27/10.
24.) KAUSCH

Oliver Reginald Herzog, Berlin-Dahlem, *Entfetten von Rohwolle*. Man be-
ndelt die Rohwolle mit fl. Aceton u. entfernt dann die Lsg. (A. P. 1521624
m 16/8. 1924, ausg. 6/1. 1925.) KAUSCH.

Zellstofffabrik Waldhof, übert. von: **Hans Clemm**, Mannheim-Waldhof,
winnen der schwefligen Säure und der Wärme aus Abgasen der Cellulosekocher.
(P. 1515656 vom 27/11. 1922, ausg. 18/11. 1924. — C. 1922. IV. 771. [D. R. P.
0471].) KAUSCH.

Ferdinand Dobler, Frankreich (Seine), *Leimen von Papier mittels Harzseifen*.
ich der bekannten Ausfällung des Harzes in dem Papierbrei durch ein Al-Salz
einem sauren Mittel setzt man dem Papierbrei zwecks Neutralisation der Säure
CO₂ zu. — Die Papiermaschinen werden geschont u. die Farbe des Papiers wird
rbessert. (F. P. 577349 vom 10/4. 1923, ausg. 3/9. 1924.) OELKER.

Nathan Sulzberger, New York, *Asbestpapier*, welches insbesondere zur Herst.
n Zigarettenhüllen dienen soll u. aus Asbest u. einem aus Celluloseacetat u.
atriumsilicat bestehenden Bindemittel hergestellt wird. (A. P. 1518944 vom 13/9.
20, ausg. 9/12. 1924.) OELKER.

Badische Anilin & Soda-Fabrik, Ludwigshafen a. Rh. (Erfinder: **Wilhelm
appel**, Heidelberg und **Kurt H. Meyer**, Mannheim), *Herstellung von Cellulose-
ungen*, dad. gek., daß man Cellulose mit Chloral in Ggw. tert. organ. Basen be-
andelt. — Die erhaltene viscose Lsg. hinterläßt beim Verdunsten des Lösungsm.
e Cellulose als Chloralverb. in Form einer klaren durchsichtigen Haut, sie kann
i Lacküberzügen, Filmen usw. verwendet werden. (D. R. P. 408821 Kl. 22b,
m 30/12. 1922, ausg. 24/1. 1925.) FRANZ.

Brown Company, Berlin, New Hampshire, übert. von: **George A. Richter**,
erlin, New Hampshire, *Herstellung von Zellstoff*. Man kocht cellulosehaltiges
aterial mit einer SO₂ u. Na₂SO₄ enthaltenden Lsg., konz. die hierbei erhaltene
ulfitablauge, verschmilzt den Rückstand mit dem Rückstand, welcher durch Kon-
entrieren einer vom Sulfatprozeß stammenden Abfallauge erhalten wird, löst die
chmelze in W., säuert die Lsg. mit SO₂ an u. benutzt die so erhaltene Lauge
am Kochen einer neuen Menge des cellulosehaltigen Materials. (A. P. 1519509
om 6/9. 1923, ausg. 16/12. 1924.) OELKER.

Dispersoid Syndicate Limited, England, *Herstellung von verspinnbaren Lö-
ungen aus Cellulose und Kupferoxydammoniak*. Man löst in W. unl. Cu-Verb.,
CuCO₃, Cu(OH)₂, Cu-Pulver in NH₃, zweckmäßig in einer Kolloidmühle oder einer

anderen schnellaufenden Dispersionsvorr. u. gibt dann Cellulose zu, zur Beschleunigung der Dispersion kann man 0,1—1% Anilin, Toluidin, Harnstoff oder eine andere organ. NH_2 -Verb. zusetzen; nach dem Filtrieren kann man die Lsg. unmittelbar zu Kunstfäden verspinnen. Die Lsg. der unl. Cu-Verbb. in NH_3 löst größere Mengen Cellulose, als die aus den in W. l. Cu-Salzen gewonnene Kupferoxydammoniaklsg., auch ist die erhaltene *Kunstseide* hochwertiger. (F. P. 578671 vom 15/3. 1924, ausg. 2/10. 1924. D. Prior. 16/3. 1923.) FRANZ.

Richard Müller, Eilenburg, *Herstellung von Zellstoffestern* nach D. R. P. 387685. dad. gek., daß Zwecks Gewinnung bei der Rk. sich lösender Zellstoffverbb. Zellstoff in Flockenform, wie er aus feuchtem Rohzellstoff unter Mitwirkung von Schlag u. Transport in Transportexhaustoren gewonnen wird, auf übliche Weise, z. B. auf Acetylcellulose oder Viscose, verarbeitet wird. — Die Überführung dieses Zellstoffes in Acetylcellulose oder Viscose verläuft erheblich schneller als nach den bisherigen üblichen Verf., auch erhält man Erzeugnisse, die vollkommen frei von Fäserchen sind. (D. R. P. 400190 Kl. 12o vom 9/11. 1919, ausg. 2/8. 1924. Zus. zu D. R. P. 387685; C. 1924. II. 134.) FRANZ.

Otto Venter, Chemnitz, *Herstellung von Viscose*, insbesondere für Kunstfäden. dad. gek., daß mit Alkalilauge getränkter zerkleinerter Zellstoff wiederholt durch eine oder durch mehrere hintereinandergeschaltete, mit Transportschnecken, Schneidmessern u. gelochten Messerscheiben versehene Schneide- u. Mischmaschinen geführt wird. — Man erhält unter Kraftersparnis eine Alkalicellulose, die sich besonders für die Behandlung mit CS_2 eignet. (D. R. P. 408594 Kl. 12o vom 28/4. 1920, ausg. 22/1. 1925.) FRANZ.

J. P. Bemberg Akt.-Ges., Rittergausen, Barmen, *Kunstseide*. Zur Herst. von Kunstseide nach dem Streckspinnverf. dient ein App., in dem die Fäden zuerst im Gegenstrom u. dann nach hinreichender Härtung im Gleichstrom zur Fällfl. laufen. Das Fällgefäß besteht aus einer zylindr. Kammer mit Spindüse oben, während unten die Fällfl. eintreten kann. Unten ist am kon. Boden die Hauptabzugsöffnung für die Fäden u. oben am Zylinder ist noch ein zweiter Flüssigkeitsabzug. (E. P. 224864 vom 20/8. 1924, Auszug veröff. 14/1. 1925. Prior. 17/11. 1923. Zus. zu E. P. 224503; C. 1925. I 1148.) KAUSCH.

Dispersoid Syndicate Limited, England, *Herstellung von Viscose*. Man vermischt Cellulose u. eine Lsg. von NaOH in einer Kolloidmühle oder einer anderen Dispersionsvorr. u. fügt allmählich so viel W. zu, bis eine homogene Lsg. entstanden ist, dann gibt man 1 Mol. oder einen geringen Überschuß CS_2 u. einen KW-Stoff, Petroleum oder einen nicht verseifbaren Chlorkohlenwasserstoff zu, zu der gebildeten kolloidalen Dispersion von KW-Stoff u. Viscose gibt man 1—3% NH_3 u. nötigenfalls neue Mengen KW-Stoff u. erwärmt auf 70—75°, zur Beschleunigung der Koagulation kann man kleine Mengen Salze zusetzen, nach dem Absaugen wird die Viscose mit W., dann mit schwachen organ. Säuren u. wieder mit W. gewaschen; die erhaltene Viscose wird in Alkalien oder NH_3 zu einer konz. Lsg. gelöst, sie kann dann ohne Reifen unmittelbar versponnen werden. (F. P. 579048 vom 20/3. 1924, ausg. 8/10. 1924. D. Prior. 22/3. 1923.) FRANZ.

Erste Böhmisches Kunstseidefabrik A. G., Tschechoslowakei, *Kunstfäden, Bänder, Filme usw. aus Viscose*. Der Natur des Zellstoffs u. der Reife der Viscose entsprechend fügt man dem Fällbad aus H_2SO_4 u. Na_2SO_4 von der D. von wenigstens 1,35 einen Prozentgehalt an $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ bei. (F. P. 580252 vom 17/4. 1924, ausg. 4/11. 1924. Tschechoslowak. Prior. 18/5. 1923.) KAUSCH.

Charles Moriondi, Italien, *Kunstseidefäden*. Man läßt Viscoselsgg. in ein Fällbad eintreten, wobei sich der Viscosestrahl u. das Fällbad in gleicher Richtung bewegen. (F. P. 580383 vom 25/3. 1924, ausg. 5/11. 1924. A. Prior. 27/3. 1923.) KAUSCH.

Jacques Delpach, Frankreich, *Denitrirung und mechanische Endbehandlung von Kunstseiden*. Die Kunstseide wird in Form möglichst langer Strähne denitriert, behaspelt u. gereinigt, indem man sie durch einen engen Spalt gehen läßt. (E. P. 580635 vom 21/7. 1923, ausg. 12/11. 1924.) KAUSCH.

Leon Lilienfeld, Wien, *Herstellung von Abkömmlingen der Cellulosealkyläther*. (D. R. P. 406081 Kl. 12o vom 8/6. 1922, ausg. 14/11. 1924. Oe. Prior. 13/6. 1921. — C. 1922. IV. 851.) FRANZ.

Ernst Teupel, Eilenburg, *Darstellung von Celluloseäthern aus Alkalicellulose und Halogenalkyl*, dad. gek., daß das bei der Ätherbildung aus Halogenalkyl u. Alkalihydroxyd entstehende Salz von vornherein dem Alkylcellulosegemisch oder der zu verwendenden Alkalilauge oder Alkalicellulose oder beiden zugesetzt wird. — Man erzielt bei verkürzter Reaktionszeit eine so vollständige Äthylierung der Cellulose, daß eine Reinigung durch Umlösen oder Filtrieren unnötig ist. (D. R. P. 408342 Kl. 12o vom 26/4. 1922, ausg. 16/1. 1925.) FRANZ.

Cellon-Werke, Dr. Arthur Eichengrün, Charlottenburg, *Herstellung von kühlen Filmen aus Cellulosederivaten*. Man bringt eine Paste oder eine Lsg. eines Celluloseesters oder -äthers auf eine Unterlage aus einem Cellulosederiv., das in dem zur Herst. der aufzubringenden Cellulose lsg. verwendeten Lösungsm. nicht löslich ist; nach dem Trocknen kann man den Film leicht von der Unterlage ablösen; der als Unterlage dienenden Celluloseestermasse kann man Stoffe, die das Haften des trocknen Films an der Unterlage vermindern, wie Mineralöle, Fette, Glycerin zusetzen; die Unterlage kann glatt oder gemustert sein, der zur Herstellung des Filmes dienenden Celluloseesterlsg. kann man Gelatinierungsmittel, Farbstoffe, Pigmente, Bronze pulver oder Füllstoffe zusetzen. (E. P. 202306 vom 8/8. 1923, ausg. 10/10. 1923. D. Prior. 10/8. 1922.) FRANZ.

Cellon-Werke, Dr. Arthur Eichengrün, Charlottenburg, *Herstellung von kühlen Filmen aus Cellulosederivaten*. Die Paste oder konz. Lsgg. von Celluloseestern oder -äthern wird auf eine Unterlage aufgebracht, die in dem benutzten Lösungsm. etwas löslich ist, der gebildete Film wird von der Unterlage abgezogen, bevor er vollständig getrocknet ist; als Unterlage kann man Celluloseacetat, Celluloseäther, Kautschuk, mit Kautschuk überzogene Gewebe, Gelatine usw. verwenden. (E. P. 224848 vom 8/8. 1923, ausg. 18/12. 1924. Zus. zu E. P. 202306; vorst. Ref.) FRANZ.

Emile Bronnert, Mühlhausen i. E., *Herstellung von Cellulosexanthogenat*. Man vermischt trockene fein zerteilte Alkalicellulose mit CS₂ bei einer Temp., bei der eine Rk. noch nicht eintritt, so lange bis eine vollkommen gleichmäßige Durchdringung der Alkalicellulose stattgefunden hat; hierauf läßt man durch Anwärmen des Gemisches die Rk. eintreten, wobei man durch Regulierung der Temp. auf verschiedene Stufen jeweils verschiedene aber durchweg homogene, ll. Xanthogenate erhält. (Oe. P. 95772 vom 9/5. 1923, ausg. 25/1. 1924.) FRANZ.

Elektrizitätswerk Lonza, Gampel und Basel, übert. von: **Jakob Sulser**, Basel, Schweiz, *Linoleum*. (A. P. 1511784 vom 31/10. 1922, ausg. 14/10. 1924. — C. 1923. II. 871.) FRANZ.

Internationale Galalith-Gesellschaft Hoff & Co., Harburg a. E., *Herstellung durchsichtiger, hornartiger Caseinmassen*, dad. gek., daß das trockene Handelscasein in einem rotierenden Extraktionsgefäß mit A., dem zweckmäßig Bzl. oder Bzn. zugesetzt ist, gegebenenfalls unter Erneuerung des Extraktionsmittels, bewegt wird, worauf das Casein nach Ablassen des Extraktionsmittels unter lebhafter Bewegung im Vakuum zwecks Trocknung erwärmt u. in der üblichen Weise auf Kunstmassen weiterverarbeitet wird. — Man erhält ein vollkommen entfettetes Casein, die Extraktionsmittel werden hierbei wiedergewonnen. (D. R. P. 408407 Kl. 39b vom 4/12. 1914, ausg. 20/1. 1925.) FRANZ.

Jean Paiseau, Seine, Frankreich, *Plastische Massen*. In durchsichtige oder durchscheinende MM. aus Celluloid, Celluloseacetat, Viscose, Gelatine, Kunstharz, Kopal, werden Gewebe, Stickereien, gemustertes Papier, Blumen, Blätter, Insektenflügel usw. eingeschlossen. Man kann auch verschieden gefärbte Schichten übereinanderlegen u. dann auf die Oberflächen einen ungleichmäßigen Druck ausüben, man erhält dann wellenförmige oder marmorähnliche Verzierungen; man kann auch die Oberfläche örtlich mit einem Lösungsm. für die plastische M. oder für die benutzten Farbstoffe behandeln; zur Herst. der gefärbten Schichten kann man Pigmentfarbstoffe oder l. Farbstoffe oder Fischschuppentinktur verwenden. (F. P. 579068 vom 21/3. 1924, ausg. 9/10. 1924, D. Prior. 2/2. 1924.) FRANZ.

XIX. Brennstoffe; Teerdestillation; Beleuchtung; Heizung.

H. H. Winn, *Acetylenegebläseflamme*. Vf. erörtert den chem. Vorgang in der Acetylenegebläseflamme u. ihre richtige Anwendung beim Schweißen. (Acetylene Journal 26. 344. 362. Sep.) JUNG.

G. W. Jones, L. B. Berger und W. F. Holbrook, *Unglücksfälle durch Kohlenoxyd beim Gebrauche von Öfen mit Naturgasheizung*. Im Auftrage des Bureau of Mines untersuchten die Vff. 6 Arten der üblichen Stubenöfen für Naturgasfeuerung in Räumen ohne Zufuhr von Frischluft bis zum Verlöschen der Flammen durch O-Mangel. Die Ofenkonstruktionen werden abgebildet u. beschrieben, ebenso die Prüfverf. u. Einrichtungen. Die Ergebnisse werden besprochen u. Anweisungen gegeben, um die Menge des unter gewissen Bedingungen entstehenden CO zu verringern. Die Vff. betonen, daß die Unters. auch für „Kunstgas“- (Leuchtgas-) Öfen beachtenswert ist. — Aus den 17 Punkte umfassenden Schlußfolgerungen seien hervorgehoben: Brennt man in einem geschlossenen Raume von 1000 Kubikfuß einen Naturgasofen, bis die Flammen verlöschen, so wächst der CO-Gehalt von Null bis zur hochgefährlichen Konz. von 1,72%. — Die Öfen müssen so gebaut sein, daß eine ausreichende Menge Sekundärluft in die Flamme strömen kann, um vollständige Verbrennung zu erzielen. Naturgas darf nur in Einrichtungen, die der Sekundärluft Zutritt gestatten, verbrannt werden. — Ein Naturgasofen soll nie ohne Abzugsrohr in einem Schlafräum u. ohne daß mindestens 1 Fenster geöffnet ist, benutzt werden. — 9 Zahlentafeln enthalten die Vers.-Ergebnisse, 1 Schauliniensbild zeigt den %-Gehalt an CO, der sich bei ein- u. mehrmaligem Luftwechsel in 1 Stde. in einem Raum von 1000 Kubikfuß bildet. (Bureau of Mines. Techn. Paper 337. 31 Seiten. 1923. Sep.) NEUFELD.

G. Gane, *Graphische Darstellung der Analysen der Erdöle Rumäniens*. Daraus folgende Beobachtungen. Aus den Analysen verschiedener rumän. Petroleumarten werden Beziehungen zwischen der D. des *Petroleums* u. den Kpp. der verschiedenen durch Dest. erhaltenen Fraktionen aufgestellt. Es wurden bestimmt: a) Leichtbenzin, D.¹⁵ 0,720—0,725, b) Schwerbenzin, D.¹⁵ 0,760—0,770, c) Leuchtpetroleum, D.¹⁵ 0,815—0,823, Flammpunkt mindestens 23°, d) Gasöl (bis 300°) u. e) Masut (Rückstand über 300°). Die D.D. der rumän. Erdöle schwanken im allgemeinen zwischen 0,820 u. 0,875. Der %-Gehalt an Fraktionen bis 300° ist der D. des *Petroleums* umgekehrt proportional. Die Öle von den angegebenen D.D. sind reich an a), b) u. c). (Bulet. Soc. de Chimie din România 6. 80—85. 1924. Bukarest, Geol. Inst.) ZANDEB.

Herm. Friedr. Hammer, *Vom Färben des Holzes*. Angaben über das Färben am toten Stamm, das Färben lebenden, zerschnittenen oder verarbeiteten Holzes, über Holzbeizen aus Pflanzen- u. Teerfarbstoffen sowie Metallsalzen. Ferner wird die Erzeugung von Azofarbstoffen im Holz u. die Verwendung von Wachs-, Spiritus- u. Ölbeizen beschrieben. (Farbe u. Lack 1925. 28—29. 45. 55—56.) SÜ.

Robert Nowotny, *Beitrag zur Haltbarkeit der mit Fluoriden imprägnierten Holzmaste.* (Vgl. S. 803. 1036.) Vf. berichtet über die diesjährige Prüfung der in einem Versuchsfelde 1909 eingebauten imprägnierten Hölzer (vgl. Ztschr. f. angew. Ch. 26. 694; C. 1914. I. 85 u. Österr. Chem.-Ztg. [2] 20. 173; C. 1917. II. 840). Ztschr. f. angew. Ch. 38. 125—27. Wien.) JUNG.

Basilus Malenković, *Beizen bei der Fluor-Dinitro-Holzimprägnierung.* Die Auslaugung eines Antiseptikums folgt einem Exponentialgesetz. Beim Malenit (BECKER) fixiert Holz aus verd. Lsgg. Sb nahezu quantitativ. Dinitrophenolnatrium gibt mit SbF₃ eine Adsorptionsverb. Die Permeabilität der Holzfaser wird durch sie entstehenden wl. Verb. vermindert. Beim Triolith wird die Cellulose durch das als Kesselschutzmittel verwendete Na₂Cr₂O₇ brüchig. Die Leistungen des Basilits sind bei Grubenholz nicht überrtreffbar; bei Buchenschwellen dürfte Malenit mehr bestehen. (Österr. Chem.-Ztg. 28. 17—19. Neulengbach.) JUNG.

G. Gane, Ph. Schwartz und M. Zilişteanu, *Die Bestimmung der ungesättigten Kohlenwasserstoffe im Petroleum.* Besprechung der üblichen Verff. zur Best. der ungesätt. KW-stoffe in natürlichen u. gecrackten Erdölen. Die Best. der Jodzahl gibt die für die Technik wichtige Möglichkeit, die Qualität der Petroleumprodd. zu erkennen. (Bulet. Soc. de Chimie din România 6. 71—79. 1924. Bukarest, Geolog. Inst.) ZANDER.

Frederick Lamplough und George Henry Fathers, England, *Herstellung von Briquets.* Man vermischt den pulverigen Brennstoff, z. B. Kohlenstaub, in der Hitze, aber ohne Anwendung von Dampf, mit einem geeigneten Bindemittel, wie Pech, Asphalt, Teer usw. u. führt die h. M. direkt in die Briquetiermaschine in. (F. P. 575733 vom 11/1. 1924, ausg. 5/8. 1924. E. Prior. 26/1. 1923.) OELKEB.

Minerals Separation Ltd., England, *Entwässern und Agglomerieren von Kohle.* Bei der bekannten Behandlung der Kohle in wss. Suspension mit einem als Bindemittel wirkenden viskosen KW-stoff, wird dieser der Suspension in Form einer Emulsion zugesetzt, welche einerseits genügend fl. ist, um sich leicht in der M. zu erteilen, sich andererseits aber leicht in ihre Bestandteile trennt, damit der KW-stoff seine zusammenballende Wrkg. auf die Kohle ausüben kann. — Als Emulgierungsmittel können Seifen, Harzseifen, Alkalicarbonat etc. verwendet werden. (F. P. 575222 vom 3/1. 1924, ausg. 25/7. 1924. E. Prior. 7/3. 1923.) OELKEB.

Robert Mezger, Stuttgart, *Vorrichtung zur Reinigung der Destillationsdämpfe von sauren Ölen (Phenolen) mittels Alkalilauge im Dampfstrom*, 1. dad. gek., daß ein System von Kolonnenböden nach dem an sich bekannten Prinzip der Rektifikationskolonnen in den Dampfstrom saurer Steinkohlenteerfraktionen derart eingeschaltet wird, daß dieser Dampf die Kolonnenböden durchstreicht, während in der entgegengesetzten Richtung NaOH oder KOH in geeigneter Konz. eingeführt wird, die auf ihrem Wege unter Aufnahme von sauren Ölen (Phenolen der Steinkohlenteerdest.) aus den Destillationsdämpfen u. organ. Kondensaten sich in die entsprechenden Na- bzw. K-Verbb. der Phenole verwandelt. — 2. dad. gek., daß die Mischung von organ. Kondensaten u. den Na- bzw. K-Verbb. der Phenole in einem unten eingefügten Sammelbehälter durch eine Dampfbräuse unter völliger Ausnutzung des Reaktionsmittels in Mischung bleibt. — 3. dad. gek., daß die gebildete Mischung aus Reaktionsprodd. u. organ. Kondensaten durch ein Siphon, dessen einer Schenkel mit dem Dampfraum der Vorr. u. dessen anderer Schenkel mit der Atmosphäre in Verb. steht, zur gründlichen u. fortlaufenden Scheidung in eine Scheideflasche üblicher Konstruktion abgeführt wird. — Die Vorr. ermöglicht eine kontinuierliche wirtschaftliche Arbeitsweise. (D. R. P. 407001 Kl. 12q vom 17/2. 1924, ausg. 9/12. 1924.) SCHOTTLÄNDER.

Édouard Urbain, Frankreich, *Poröse Masse zum Füllen von Metallbehältern mit komprimierten Gasen insbesondere Acetylen* bestehend aus gekörnter aktiver Kohle. (F. P. 580527 vom 19/4. 1924, ausg. 8/11. 1924.) KAUSCH.

Milon J. Trumble, Los Angeles, Calif., *Gewinnung von Kohlenwasserstoffen aus Ölsanden*. Man behandelt die Ölsande mit einem geeigneten Lösungsm. für die KW-stoffe u. zwar nach dem bekannten Anreicherungsprinzip, indem man 4 Behälter, die bereits mehr oder weniger mit KW-stoffen angereichertes bezw. reines Lösungsm. enthalten nach einander mit dem Ölsandbehälter verbindet u. dann zuerst das am meisten angereicherte Lösungsm. durch den mit frischem Sand gefüllten Behälter zirkulieren läßt u. danach das weniger angereicherte bezw. frische Lösungsm., so daß dieses mit dem nur noch wenig KW-stoffe enthaltenden Sand in Berührung kommt. Das Lösungsm. wird durch fraktionierte Dest. von den KW-stoffen geschieden u. zur Wiederbenutzung in den Behälter für das frische Lösungsm. übergeführt. (A. P. 1514113 vom 5/6. 1922, ausg. 4/11. 1924.) OELKER.

Artis C. Campbell, Tulsa, Oklahoma, V. St. A., *Reinigen von Rohrleitungen für Rohpetroleum*. Zwecks Entfernung der sich in den Rohren aus dem Rohpetroleum absetzenden Verunreinigungen leitet man durch erstere eine Fl., welche aus Na₂CO₃, NaHCO₃, Naphtha u. W. zusammengesetzt ist. (A. P. 1513371 vom 29/6. 1922, ausg. 28/10. 1924.) OELKER.

Gustav Linnmann, Deutschland, *Hochwertige Kohlenwasserstoffe aus fettigen oder öligen Rückständen*. (F. P. 565632 vom 30/4. 1923, ausg. 31/1. 1924. — C. 1923. II. 279 [WÖHLER].) FRANZ.

Standard Oil Company, V. St. A., *Spalten von Kohlenwasserstoffen*. Das durch die Wärmeaustauschvorr. vorgewärmte Rohöl wird durch ein erhitztes Rohr geleitet, in welchem es auf etwa 395—480° erhitzt wird, die Durchlaufgeschwindigkeit des Öles wird so geregelt, daß eine Absetzung des abgeschiedenen Kokes in dem Heizrohr nicht erfolgen kann, das erhitzte Öl wird dann in einen größeren Behälter geleitet, in dem das Öl auf eine Temp. von mindestens 380° gehalten wird, die Temp. der Gefäßwandungen soll nicht über 480° betragen, nach einiger Zeit, während der sich aus der gebildete Koks abgesetzt hat, wird das Öl durch die Wärmeaustauschvorr. u. ein dahinter befindliches Gefäß abgeleitet, u. fraktioniert dest.; während des Spaltens herrscht in der Vorr. ein so hoher Druck, daß die KW-stoffe fl. bleiben; um das Verf. ununterbrochen ausführen zu können, ist noch ein zweiter Behälter angebracht, der benutzt wird, wenn aus dem andern der abgeschiedene Koks entfernt wird. Das Verf. eignet sich zum Spalten der amerikan. Rohöle, die bei dem üblichen Spaltverf. sehr große Koksmengen abscheiden. (F. P. 545905 vom 13/1. 1922, ausg. 24/10. 1922. Holl. Prior. 15/1. 1921.) FRANZ.

Buel Welsh Richards, Beach, North Dakota, V. St. A., *Holzkonservierungsmittel*, welches durch Vermischen von Paraffin, Kohlenteer, Weinessig u. NaHCO₃ erhalten wird. Beim Gebrauch wird die Mischung geschmolzen u. der zu konservierende Gegenstand durch Eintauchen in die Schmelze oder in anderer geeigneter Weise damit überzogen. (A. P. 1520442 vom 30/8. 1923, ausg. 23/12. 1924.) OELKER.

Max Michael Pemmerl, Niederplanitz i. Sa., *Färb- und Imprägnierverfahren für Bürstenhölzer*, dad. gek., daß die auf 130° erhitzten Hölzer in Lack getaucht, um nach Lufttrockenheit zwecks Einbrennen des Lackes nochmals einer hohen Temp. ausgesetzt zu werden. — Beim Erhitzen auf 130° verflüssigen sich die im Holz enthaltenen Harze u. verbinden sich beim Eintauchen in geeigneten Lack mit diesem. Nach dem Einbrennen des Lackes bei 180° entsteht ein glasharter Überzug auf dem Holz, der ein Quellen u. Faulen, sowie Lockern der Borstenbündel verhindert u. längere Gebrauchsfähigkeit von Spül- u. Waschbürsten sichert. (D. R. P. 406797 Kl. 38h vom 15/4. 1924, ausg. 28/11. 1924.) SCHOTTLÄNDER.

XXI. Leder; Gerbstoffe.

Kläre Stinnes, Mülheim, Ruhr, *Verfahren zum Gerben von tierischen Häuten*. den Reff. nach F. P. 542027 [C. SCHMIDT]; C. 1924. I. 2659 u. F. P. 547359 [C. SCHMIDT]; C. 1924. I. 2660 ist folgendes nachzutragen: Außer den hochkonzentrierten Prodd. aus Zellstoffabläugen können auch *Chlorsubstitutionsprodd.* tierlicher *vegetabil. Gerbstoffe*, die mit Oxydationsmitteln nachbehandelt wurden, zum Gerben tier. Häute Verwendung finden. — Z. B. wird in h. W. gel. *Quebracho* mit gasförmigem Cl₂ behandelt, wobei die Temp. auf ca. 60° steigt. Nach Bedingung der Cl₂-Aufnahme wird der in 20%ig. HCl suspendierte Nd. mit KClO₃ oxydiert, abfiltriert, mit HCl gewaschen u. getrocknet. Das Prod. enthält ca. 1% Cl. Zur Gerbung wird es mit 1%ig. wss. NaOH verrührt u. mit CH₃CO₂H zur schwach sauren Rk. versetzt. Die Gerbung einer in die Lsg. eingehängten vorbereiteten Blöße (Rindspalt) ist nach ca. 4—5 Tagen beendet. (D. R. P. 406043 Kl. 28a vom 27/8. 1921, ausg. 13/11. 1924.) SCHOTTLÄNDER.

Urbain Jules Thuau und Marcel Massin, Paris, Frankreich, *Verfahren zum Enthaaren roher oder gegerbter Felle*. Rohe oder gegerbte, auf alle Fälle entpökelte, Felle werden sehr tiefen Temp. ausgesetzt. — Z. B. wird fl. Luft gegen Haar- oder Fleischseite der Felle geschleudert, oder man taucht die Felle in die fl. Luft oder setzt sie in Gefrierräumen der erforderlichen tiefen Temp. aus. Bei der tiefen Temp. von nahezu —180° öffnen sich die Hautporen u. die Haarwurzeln werden leicht gelockert, daß sie sich auf mechan. Wege nachträglich leicht entfernen lassen. Eine Schwellung der ungegerbten Haut wird so vermieden u. gleichzeitig die Wolle geschont. Es lassen sich in jeder beliebigen Art gegerbte Felle enthaaren. Sehr dicke Felle werden nach dem Entfleischen u. vor dem Enthaaren gleichmäßig in einer schwachen Säurelsg. geschwellt. (F. P. 552899 vom 9/11. 1921, ausg. 8/5. 1923. E. P. 200763 vom 2/12. 1922, ausg. 9/8. 1923. Aust. P. 1740 vom 18/1. 1923, ausg. 15/5. 1923.) SCHOTTLÄNDER.

Badische Anilin- & Soda-Fabrik (Erfinder: Otto Schmidt und Heinrich Ulrich), Ludwigshafen a. Rh., *Gerbende Stoffe*. (D. R. P. 407727 Kl. 28a vom 17/7. 1920, ausg. 20/12. 1924. — C. 1924. II. 1652.) SCHOTTLÄNDER.

Georges Wilhelm Neu, Deutschland (Saargebiet), *Imprägnieren und Wasserdichtmachen von Leder*. Das Leder wird unter einem Druck von ca. 30 at in einen unl. oder im Verlauf des Verf. in diesem unl. werdenden Stoff eingetaucht. — Z. B. wird eine Lsg. von *Acetylcellulose* u. *Campher* in Amylalkohol u. A. in einem Autoklaven auf ca. 100° erhitzt, in den das Leder eingebracht u. unter einem Druck von ca. 30 at, jedoch nicht weniger als 15 at, 1/2—1 Stde. belassen wird. Die alkoh. Lsg. durchdringt hierbei das Leder gleichmäßig von beiden Seiten. Man läßt hierauf abtropfen u. gibt dem Leder bei ca. 55° durch Pressen oder Walzen die gewünschte Form. Schließlich wird mit einem feuersichermachenden, in W. unl. Firnis überzogen. — An Stelle von *Acetylcellulose* kann man auch Lsgg. von *phenol-Formaldehydkondensationsprodd.* in Alkalien, A. oder Bzl., mit oder ohne Zusatz von Farbstoffen, verwenden. Beim Trocknen des mit den Lsgg. imprägnierten Leders gehen die l. Kondensationsprodd. in unl. Resite über u. machen das Leder wasserdicht. Nach dem gleichen Verf. lassen sich auch *Gewebe wasserdicht machen*. (D. R. P. 580565 vom 23/4. 1924, ausg. 10/11. 1924.) SCHOTTLÄNDER.

Albert Louis Benoit, Holland, *Massen aus Lederabfällen*. Zerkleinerte Lederabfälle, insbesondere von Chromleder, werden unter Druck geformt; die Lederabfälle können vor dem Pressen mit Asbest, Infusorienerde, Kautschuklsg. usw. vermischt werden. Die MM. können als Wärmeschutzmassen, elektr. Isoliermittel usw. dienen. (F. P. 573741 vom 23/11. 1923, ausg. 28/6. 1924.) FRANZ.

Dispersoid Syndicate Limited, England, *Herstellung von Kunstleder*. Zerkleinerte Lederabfälle oder nicht gegerbte tier. Abfallprod. werden mittels einer Kolloidmühle in W. fein verteilt, bei Anwendung nicht gegerbter tier. Abfallprod. kann man während der Behandlung in der Kolloidmühle Gerbstoffe zusetzen; dann gibt man eine Dispersion von Kautschuk, Guttapercha usw. oder eine Lsg. von Kautschuk, der gegebenenfalls Schwefel zugesetzt sein kann, als Bindemittel zu; die erhaltene Paste kann über geheizte Walzen geleitet werden; sie kann auf Unterlagen, Gewebe, Papier usw. aufgetragen werden. Um ein poröses Kunstleder zu erhalten, wird das erhaltene Kunstleder gepreßt u. dann unter Druckverminderung erhitzt. Oder man setzt der Dispersion eine Emulsion von Öl in W. zu; das hieraus hergestellte Kunstleder ist porös, falls die Porosität zu groß sein sollte, kann man sie durch Walzen oder Pressen verringern. Zur Erhöhung der Geschmeidigkeit des Kunstleders kann man es durch Behandeln mit organischen Lösungsmitteln von den Fetten usw. befreien u. dann mit Glycerin u. Seife behandeln. (F. P. 576556 vom 1/2. 1924, ausg. 22/8. 1924. D. Priorr. 2/2. u. 12/2. 1923.) FRANZ.

Paul Reynier Ardèche, Frankreich, *Kunstleder*. Man kocht Lederabfälle in W., dem man 2% NH_3 zusetzen kann, bis eine sirupartige M. entstanden ist; dann vermischt man zerkleinerte Faser mit zerkleinertem Leder, das man durch Tränken von Leder mit W., Zerreißen, u. Trocknen erhalten kann, dieses trockne Gemisch vermischt man dann mit 10–12% der sirupartigen M. u. 5% Leinöl, die erhaltene homogene Paste wird dann in Formen unter Druck bei 50–60° getrocknet; die Platten werden dann in eine Emulsion von Paraffin in W. u. Glycerin getaucht u. getrocknet. (F. P. 577637 vom 25/4. 1923, ausg. 8/9. 1924.) FRANZ.

Badische Anilin- & Soda-Fabrik (Erfinder: **Otto Schmidt**), Ludwigshafen a. Rh., *Verfahren zum Gerben tierischer Häute*. (D. R. P. 406110 Kl. 28 vom 21/5. 1920, ausg. 14/11. 1924. Zus. zu D. R. P. 388680; C. 1924. I. 2661. C. 1924. I. 2660 [F. P. 540495, E. P. 189190].) SCHOTTLÄNDER.

Farbenfabriken vorm. Friedrich Bayer & Co., Leverkusen b. Köln a. Rh. (Erfinder: **Alfred Thauss**, Köln-Deutz), *Darstellung von wasserlöslichen, nicht färbenden Derivaten geschwefelter Phenole*, darin bestehend, daß man entweder direkt nach dem Verf. des D. R. P. 400242; C. 1925. I. 1261) oder die durch Einw. von S_2Cl_2 auf Phenole erhältlichen Thioderiv. von Phenolen, zweckmäßig unter gleichzeitiger Anwendung von Oxydationsmitteln, mit Alkalisulfiten behandelt. — Es entstehen bei dem Verf. in W. l. Verbb., vermutlich *Thiosulfosäuren*, die bei 15° durch starke Säuren nicht ausgefällt werden. Man verwendet zweckmäßig neutrale Sulfite u. als Oxydationsmittel O_2 der Luft oder Peroxyde. Die Prodd. eignen sich als *Beizmittel* in der *Färberei*, finden jedoch auch in der *Gerberei* Verwendung. Man löst z. B. die durch Erhitzen von wss. *Phenolnatrium* mit S erhältliche Rohschmelze in W. versetzt mit Na_2SO_3 u. läßt unter Einleiten von Luft bei 70–80° einige Tage bis zum Eintritt der Löslichkeit in W. stehen. Beim Neutralisieren mit HCl u. Zugabe von NaCl scheidet sich die *Thiosulfosäure* als weiße, voluminöse beim Erwärmen zusammenbackende M. ab, die in w. W. l. ist; Zusatz von Mineralsäure bewirkt beim Aufkochen unter Entw. von SO_2 , Abscheidung des erst nach Zusatz von Alkali in W. l. *Thioderiv.* — Dieselbe *Thiosulfosäure* entsteht auch bei Verwendung von 30%ige H_2O_2 -Lsg. als Oxydationsmittel. — Die in analoger Weise erhältlichen *Sulfosäuren* der *Thioderiv.* aus o- u. m-Kresol sind in h. W. u. A. ll., in Ä. u. Bzl. unl. u. werden aus den h. wss. Lsgg. durch wenig Mineralsäure u. NaCl gefällt. — Weitere Beispiele betreffen die Herst. der *Thiosulfosäuren* von p-Chlorphenol, o-Chlorphenol u. Rohkresol. — Die durch Einw. von S_2Cl_2 auf Phenol bzw. Rohkresol in Ggw. von CCl_4 , oder ohne Zusatz bei 100 bzw. 80° gewonnenen S-haltigen, schwach gelblichen oder rötlich bräunlichem Harze lassen sich durch Einw. von Na_2SO_3 unter Einleiten von Luft bei 100° ebenfalls in *Thiosulfosäuren* überführen. — *Zwischenprod.* aus Phenol

S_2Cl_2 in verd. NaOH ll. mit bräunlich gelber Farbe, aus der Lsg. durch Säure farbloser, voluminöser, beim Erwärmen sich harzig zusammenballender Nd. lbar, in A. u. Aceton mit gelblicher Farbe l., in Eg. u. Bzl. zwl.; wird durch SO_4 bei mäßigem Erwärmen nicht verändert. — *Zwischenprod.* aus *Rohkresol* u. Cl_2 in A., Ä. u. Aceton sl. mit schwacher Orangefarbe, zl. in h. Eg., wl. in Bzl., st mit H_2SO_4 66° Bé bei 100° allmählich eine schwärzliche Lsg. (D. R. P. 406675 vom 10/2. 1923, ausg. 26/11. 1924.) SCHOTTLÄNDER.

Willy Moeller, Hamburg, *Herstellung von Kondensationsprodukten*. Zu dem f. nach E. P. 146180; C. 1922. IV. 976 ist folgendes nachzutragen: Die *Säureharze* geben nicht nur beim Erhitzen mit Naphthalin, sondern auch mit *Anthracenöl*, *den*, *Tetrahydronaphthalin*, dem *KW-stoffgemisch*, das durch Kondensation von *Methylheptonen* mit $ZnCl_2$ entsteht, sowie mit *Di-i-propenyl* in W. kolloidal l., hochmolekulare, *gerbend wirkende Kondensationsprodd.* — Beispiele sind ferner angegeben für die Kondensation: von *Säureharz* (mit 50% H_2SO_4), *Naphthalin* u. 30%ig. CH_2O bei mäßig erhöhter Temp. — sowie von in *Aceton* gel. *Säureharz* mit *Anthracenöl* in Ggw. von HCl -Gas, $SOCl_2$ oder $POCl_3$, wobei das *Aceton* sich auch am Aufbau der Verb. beteiligt, u. weitere Kondensation des Prod. mit 30%ig. CH_2O bei 120—130° im Vakuum. (D. R. P. 406780 Kl. 12o vom 1/3. 1914, ausg. 11. 1924. Zus. zu D. R. P. 387890; C. 1924. I. 2634.) SCHOTTLÄNDER.

Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning (Erfinder: **Georg Kränzlein** und **Arthur Voß**), Höchst a. M., *Darstellung von Sulfobenzyläthern von aus Phenolen* u. ableitenden harzartigen Kondensationsprodukten, 1. dad. gek., daß man diese Kondensationsprodd. mit *Aralkylhalogenidsulfosäuren* in alkal. Lsg. umsetzt. — 2. darin bestehend, daß man *Aralkylhalogenidsulfosäuren* in alkal. Lsg. mit *Phenolen* umsetzt u. die so entstandenen Sulfobenzyläther der Phenole nachträglich mit *Aldehyden* behandelt. — Als Ausgangsstoffe eignen sich die durch Einw. von Aldehyden, von Schwefelungsmitteln oder von Metallchloriden, wie $ZnCl_2$ oder $AlCl_3$, auf Phenole oder deren Homologen erhältlichen harzartigen Kondensationsprodd., die in Form ihrer Alkalisalze leicht mit *Aralkylhalogenidsulfosäuren* unter B. in W. sl. *Sulfosäuren* reagieren, die sich gegenüber der tier. Faser wie echte Gerbstoffe verhalten. Von anderen synthet. Gerbstoffen unterscheiden sie sich vorteilhaft dadurch, daß sie ohne jegliche Zusätze zur *Gerbung tier. Häute* verwendet werden können, sich hierbei genau wie vegetabil. Extrakte verhalten u. weiche, volle *Leder* geben, die die mit *Mimosa* erzeugten Leder erinnern. Diese gegenüber anderen synthet. Gerbstoffen erzielten Vorteile sind offenbar auf die Ggw. der externen Sulfogruppen zurückzuführen. — Analoge Prodd. werden durch nachträgliche Kondensation von *Phenolsulfobenzyläthern* mit Aldehyden erhalten. Beispiele sind angegeben für die erst. von *Sulfobenzyläthern* aus: *p-Benzylchloridsulfosäure* u. dem harzartigen *Kondensationsprod.* aus techn. *Kresol* u. *Paraldehyd*, — aus den durch Einw. von o-u. *Benzylchloridsulfosäure* in alkal. Lsg. auf ein Gemisch von *Phenol*, *Kresol* u. deren Homologen erhältlichen *gemischten Aryloxy-sulfobenzyläthern* u. nachträgliche Kondensation dieser mit CH_2O in schwach saurer Lsg. —, aus der *Methylbenzylthio-sulfosäure* des ar. *Tetrahydro-β-naphthols*, erhalten durch Einw. von *Tolylchloridsulfosäuren* in alkal. Lsg. auf das *Tetrahydro-β-naphthol* (die ihrerseits durch Behandlung von techn. *Xylol* mit $SO_3H \cdot Cl$ u. Einleiten von Cl_2 in das Gemisch der entstandenen *Xylolsulfochloride* u. Verseifung der kernmethylierten *Benzylchloridsulfochloride* gewonnen werden), u. nachträgliche Kondensation mit CH_2O 30%ig. saurer Lsg., — dem harzartigen *Kondensationsprod.* von *α-Naphthol* u. *Paraldehyd* dem Na-Salz der *2-Chlorbenzylchloridsulfosäure*, die durch Chlorieren von *2-Chlor-methylbenzol-4-sulfochlorid* u. Verseifung des *2-Chlorbenzylchloridsulfochlorids* erhalten wird; — aus dem *S-haltigen Harz* aus techn. *Kresol* u. S_2Cl_2 u. *benzalchloridsulfosäurem Na* in alkal. Lsg., — aus dem harzartigen *Kondensationsprod.* von *Re-*

sorcin mit Benzaldehyd u. Benzylchlorid-*p*-sulfosäure, — sowie aus dem durch Einw. von $ZnCl_2$ auf Resorcin erhältlichen harzartigen Kondensationsprod. u. Benzylchlorid-sulfosäure in alkal. Lsg. — Die Benzylchlorid-*p*-sulfosäure wird durch Sulfonieren von Toluol u. Chlorieren der Toluol-*p*-sulfosäure in der Siedehitze erhalten. — Durch Einw. dieser Säure auf die harzartigen Kondensationsprodd. von Phenol mit CH_2O , bezw. mit Acetaldehyd oder Paraldehyd, bezw. mit Aldol u. von Kresol mit Aldol, bezw. mit CH_2O in alkal. Lsg. werden ebenfalls in W. ll. Sulfobenzyläther erhalten. — Durch Behandeln der harzartigen Kondensationsprodd. aus Phenolen in alkal. Lsg. mit im Mol. ein bewegliches Halogenatom enthaltenden Alkyl- u. Aryl-sulfosäuren erhält man Sulfoalkyl- bezw. Sulfoaryläther dieser Kondensationsprodd. mit denselben wertvollen gerbenden Eigenschaften wie der obigen Sulfoaralkyläther. Hierfür sind folgende Beispiele angegeben: Das durch Einw. von S_2Cl_2 auf Phenol erhältliche *S*-haltige harzige Kondensationsprod. wird in wss. NaOH gel. mit dem Na-Salz der 2-Nitro-4-chlorbenzol-1-sulfosäure unter Druck auf 130–140° erhitzt. Der Nitrosulfoaryläther gibt in schwach saurer Lsg. ein gelbes Leder. Die Nitrogruppe in der Äthersulfosäure läßt sich zur Aminogruppe reduzieren. Die Aminophenyläthersulfosäure des *S*-haltigen harzigen Kondensationsprod. aus Phenol hat besonders wertvolle, gerbende Eigenschaften. — Durch Kochen einer wss. alkal. Lsg. des harzartigen Kondensationsprod. aus Phenol u. CH_2O mit 2-Chlor-4-sulfobenzol-1-carbonsäure unter Rückfluß entsteht eine Carboxyphenyläthersulfosäure, die ein volles, weiches u. sehr helles Leder liefert. — Der durch Einw. von Chloräthansulfosäure auf *ar*-Tetrahydro- β -naphthol in alkal. Lsg. erhältliche *ar*-Tetrahydro- β -naphthylsulfoäthyläther gibt bei der Kondensation mit 30%ig. CH_2O in Ggw. von HCl ebenfalls ein hochmolekulares, in W. sl., gerbend wirkendes Kondensationsprod. — Schließlich kann man auch durch Kondensation von aromat. oder aliphat. ein bewegliches Halogenatom enthaltenden Sulfosäuren mit aromat. KW-stoffen, deren Homologen u. Derivv. mit oder ohne Zusatz von Katalysatoren, wie $ZnCl_2$, $AlCl_3$ oder konz. H_2SO_4 , bezw. durch innere Kondensation von Aralkylhalogenidsulfosäuren oder deren Chloriden für sich allein, mit oder ohne Zusatz der erwähnten oder anderer Katalysatoren, zu in W. ll., gerbend wirkenden Prodd. mit externer Sulfogruppe gelangen. Für diese Kondensation, die unter Eintritt des Sulfobenzylrestes in den Kern der betreffenden aromat. Verbb. erfolgt, eignen sich besonders die Aralkylhalogenidsulfosäuren. Durch Einw. von Benzylchloridsulfochlorid auf Naphthalin in Ggw. von Zn bei 100–120° entsteht z. B. ein braunes, zähes, in W. ll. Harz, das ein festes, weiches Leder liefert. — Weitere Beispiele betreffen: die Kondensation von Carbazol mit Benzylchlorid-*o*-sulfosäure in Ggw. von $AlCl_3$ bei 140°, — von Anthracenrückständen der Anthracenreinigung mit Benzylchlorid-*p*-sulfochlorid in Ggw. von $AlCl_3$ bei 100° bis zur Beendigung der HCl-Entw., — von techn. Kresol mit 2-Chlorbenzylchlorid-4-sulfosäure bei 140–150° ohne Katalysator gelblich braunes, in W. ll. Harz, — von Cumaronharz mit Benzylchlorid-*p*-sulfosäure in Ggw. von konz. H_2SO_4 , — sowie die innere Kondensation von Benzylchlorid-*p*-sulfochlorid durch Erhitzen in Ggw. von $ZnCl_2$, — bezw. eines Gemisches aus Benzylchlorid-*o*- u. *p*-sulfochlorid durch Erhitzen in Ggw. von PCl_5 u. nachträgliche Verseifung der eine Sulfochloridgruppe enthaltenden Reaktionsprodd. Die Sulfosäuren geben sämtlich mit $FeCl_3$ oder anderen Fe-Salzen typ. Färbungen. (D. R. P. 408871 Kl. 12q vom 8/2. 1923, ausg. 27/1. 1924. Schwz. P. 107632 vom 1/2. 1924, ausg. 1/11. 1924. D. Prior. 7/2. 1923 u. Schwz. PP. 108000, 108001, 108002, 108003, 108004 [Zus.-Patt.] vom 1/2. 1924, ausg. 1/12. 1924. D. Prior. 7/2. 1923. F. P. 576758 vom 6/2. 1924, ausg. 26/8. 1924. D. Prior. 7/2., 1/5. u. 18/7. 1923.

SCHOTTLÄNDER.

Nr. 13.
1553—1672.

Chemisches Zentralblatt

1925. Bd. I.
1. April.

ollständiges Repertorium für alle Zweige der reinen und angewandten Chemie

Herausgegeben vom
Vorstand der
Deutschen Chemischen Gesellschaft

vertreten durch
Prof. Dr. W. Marckwald

Redaktion:
Dr. M. Pflücke und Dr. E. Behrle
Berlin W. 10, Sigismundstraße 4

Liste der ständigen Mitarbeiter siehe Heft 1

96. Jahrgang [7. Folge. 7. Jahrgang.]
1925.

Schentlich eine Nummer, jährlich zwei Bände. — Jahresbezugspreis Rm. 80.—

Die Bezieher des Zentralblatts
erhalten kostenlos als Beilage die monatlich erscheinende „*Bibliographia chimica*“

Reklamationen von Heften des Zentralblattes, welche den Beziehern nicht rechtzeitig
gegangen sind, bittet man in allen Fällen zunächst innerhalb 14 Tagen nach dem
erscheinungstermin schriftlich bei dem zuständigen Postamt anzubringen. Sollte
s ohne Erfolg sein, so werden Mitglieder der Deutschen Chemischen Gesellschaft und des
eins Deutscher Chemiker gebeten, sich direkt an die Geschäftsstelle der Deutschen Che-
schen Gesellschaft, Berlin W. 10, Sigismundstraße 4, zu wenden, Nichtmitglieder dagegen
den Verlag Chemie, G. m. b. H., Leipzig, Rosestraße 2. — Kostenlos können Hefte,
eiche bei der Expedition verloren gegangen sind, nur nachgeliefert werden, wenn die
klamation innerhalb von 4 Wochen nach dem Erscheinen des betreffenden Heftes erfolgt.

Verlag Chemie, G. m. b. H., Leipzig und Berlin
Postvertrieb ab Leipzig

Inhalt

Allgemeine und physikalische Chemie	1553	IV. Wasser; Abwasser	—
A. Atomstruktur. Radiochemie. Photochemie	1560	V. Anorganische Industrie	1648
B. Elektrochemie. Thermochemie	1566	VI. Glas; Keramik; Zement; Baustoffe	—
C. Kolloidchemie. Capillarchemie	—	VII. Agrilkulturchemie; Düngemittel; Boden	1645
D. Inorganische Chemie	1571	VIII. Metallurgie; Metallogr.; Metallverarb.	1648
E. Mineralogische und geologische Chemie	1577	IX. Organische Präparate	—
F. Organische Chemie	1580	X. Farben; Färberei; Druckerel	1651
G. Biochemie	1611	XI. Barze; Lacke; Firnis	—
H. Enzymchemie	1612	XII. Kautschuk; Guttapercha; Balata	—
I. Pflanzenchemie	—	XIII. Ätherische Öle; Elechtstoffe	—
J. Pflanzenphysiologie. Bakteriologie	1615	XIV. Zucker; Kohlenhydrate; Stärke	—
K. Tierchemie	—	XV. Gärungsgewerbe	—
L. Tierphysiologie	1620	XVI. Nahrungs-, Genuß- und Futtermittel	—
M. Pharmazie. Desinfektion	1629	XVII. Fette; Wachse; Selsen; Waschmittel	1658
N. Analyse. Laboratorium	1633	XVIII. Faser- und Spinnstoffe; Papier; Cellu- lose; Kunststoffe	1661
O. Elemente und anorganische Verbindungen	1638	XIX. Brennst.; Teerdeest.; Beleuchtung; Helz.	1666
P. Organische Substanzen	—	XX. Schieß- und Sprengstoffe; Zündwaren	—
Q. Bestandteile von Pflanzen und Tieren	1640	XXI. Leder; Gerbstoffe	1669
R. Angewandte Chemie	1643	XXII. Leim; Gelatine	—
S. I. Allgemeine chemische Technologie	—	XXIII. Tinte; Wichse; Bohnermassen usw.	—
II. Gewerbehygiene; Rettungswesen	—	XXIV. Photographie	—
III. Elektrotechnik	—		

Zuschriften an die Redaktion erbeten an: Die Redaktion des Chemischen
Zentralblattes, Berlin W.10, Sigismundstr. 4

Namenregister

- Achleitner 1659.
 Adam, N. K. 1585.
 Adler, L. 1632.
 A.-G. für Anilin-Fabrikation 1654.
 Alexander, C. M. 1644.
 Allan, F. N. 1625.
 Allen, R. S. 1624.
 Altenburg, J. 1659.
 Anderson, H. G. S. 1649.
 André, E. 1587.
 Angelescu, B. N. 1640.
 Armstrong, E. F. 1586.
 Arnd, T. 1647.
 Arrhenius, O. 1645.
 Arstal, A. 1567.
 Ascherl, A. 1585.
 Baddiley, J. 1657.
 Badische Anilin- & Soda-Fabrik 1657.
 1663. 1669. 1670.
 Barbaudy, J. 1637.
 Battistoni, G. 1644.
 Baxter, G. P. 1555.
 Bayer, O. 1602.
 Bayle, E. 1565.
 Becker, E. 1568.
 Becket, F. M. 1650.
 Beduwé, J. 1602.
 Behn, H. 1646.
 Bemberg, J. P., A.-G. 1664.
 Benedict, E. M. 1621.
 Bener, C. 1608.
 Benoit, A. L. 1669.
 Berg, W. 1623.
 Berger, L. B. 1666.
 Beumer, H. 1623.
 Beytout, G. 1627.
 Blackshaw, H. 1653.
 Bluhm, M. M. 1633.
 Blumberger, J. S. P. 1597.
 Bodforss, S. 1567.
 Böhme, H. T., A.-G. 1662.
 Böseken, J. 1597.
 Bokorny, T. 1617.
 Bollenbeck, K. 1645.
 Bouton, C. M. 1648.
 Bowie, J. D. 1625.
 Brass, K. 1599.
 Bratke 1628.
 Braun, J. v. 1590. 1602.
 Breyer, F. G. 1645.
 Brillouin, M. 1555.
 British Cellanese Ltd., vormals British Cellulose and Chemical Mfg. Co. Ltd. 1653.
 British Dyestuffs Corp., Ltd. 1653. 1657.
 Britzke, E. 1644.
 Bronnert, E. 1665.
 Brooks, S. C. 1611.
 Brown Co. 1663.
 Brownstein, H. J. 1572.
 Brünecke, K. 1628.
 Brunetti, R. 1562.
 Butler, J. A. V. 1570.
 Caglioti, V. 1576.
 Caius, J. F. 1626. 1627.
 Campbell, A. C. 1668.
 Carborundum Co. 1650.
 Carneiro, V. 1617.
 Carobbi, G. 1576.
 Carver, G. W. 1632.
 Cassella, L., & Co. G. m. b. H. 1657.
 Catalán, M. A. 1562.
 Cellon-Werke, Dr. A. Eichengrün 1665.
 Chemische Fabrik auf Actien (vorm. E. Schering) 1648.
 Chemische Fabrik Griesheim-Elektron 1655.
 Chemische Fabrik Pharma G. m. b. H. 1658.
 Chemiestechnisches Laboratorium Ingenieur-Chemiker Weltwart 1638.
 Chesneau, G. 1633.
 Christiansen, J. A. 1633.
 Ciochină, I. 1639. 1640.
 Claisen, L. 1601.
 Clancy, C. C., Co. 1644.
 Clavel, R. 1653.
 Clayton, A. 1657.
 Clemm, H. 1663.
 Cobenzl, A. 1652.
 Collins, H. 1560.
 Collo, P. G. D. 1629.
 Compagnie Générale des Produits Chimiques de Louvres 1644.
 Compagnie Nationale de Matières Colorantes et de Produits Chimiques 1658.
 Coquillat, A. 1638.
 Corey, B. B. 1576.
 Courtot, C. 1563.
 Crew, M. C. 1556.
 Cristol, P. 1635.
 Croft, C. M. 1653.
 Croze, F. 1562.
 Cruse, H. 1662.
 Curie, M. P. 1561.
 Dällenbach, W. 1560.
 Dale, H. H. 1623.
 Davis, C. W. 1649.
 Debye, P. 1554.
 Delpech, J. 1665.
 Dennis, L. M. 1576.
 Deuel jr., H. J. 1622.
 Dispersoid Syndicate Ltd. 1662. 1663. 1664. 1670.
 Ditmar, R. 1652.
 Dobler, F. 1663.
 Dobson, H. J. E. 1634.
 Doleschall, F. 1642.
 Dondelinger, A. 1563.
 Donker, H. J. L. 1617. 1618.
 Douris, R. 1627.
 Dreisch, T. 1563.
 Drew, H. D. K. 1594.
 Dubin, H. E. 1622.
 Dubose, A. 1585.
 Duclaux, J. 1571.
 Dumanois, E. P. 1643.
 Dumond, E. J. E. 1644.
 Duschak, L. H. 1648.
 Dussol 1580.
 Dyer, J. W. W. 1585.
 Eckart, O. 1659.
 Ecke, A. 1638.
 Edwards, G. A. 1600.
 Electro Metallurgical Co. 1650.
 Elektrizitätswerk Lonza 1665.
 Ellis, G. H. 1653.
 Emde, H. 1648.
 Enckell, J. 1661.
 Engel, O. 1590.
 Engels, W. H. 1631. 1632.
 Erste Böhmische Kunstseidefabrik A.-G. 1664.
 Escaich, A. 1654.
 Ewald, P. P. 1561.
 Eymer, L. 1651.
 Fabre, R. 1565.
 Falk, V. 1623.
 Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co. 1632. 1654. 1656. 1663. 1670.
 Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning 1651. 1654. 1656. 1657. 1658. 1671.
 Fathers, G. H. 1667.
 Faurholt, C. 1573.
 Fay, H. 1661.
 Felix, K. 1623.
 Fenchel 1662.
 Fenwick, F. 1637.
 Fichter, F. 1591.
 Fischer, H. 1620.
 Fischer, R. 1654.
 Fitzpatrick, E. 16.
 Fleysher, M. H. 15.
 Fournneau, E. 1623.
 François, M. T. 15.
 Frank, N. 1642.
 Fromme, J. 1553.
 Funk, C. 1622.
 Funk, H. 1575. 16.
 Gamichon, P. 1656.
 Gane, G. 1666. 16.
 Ganelin, S. 1652.
 Gans, R. 1565.
 Garrison, A. 1566.
 Gaskill, E. C. 164.
 Gedroiz, K. K. 16.
 Gelissen, H. 1594.
 George, H. 1565.
 Georgescu, V. 160.
 Georgian, N. 1639.
 Gerecke, E. 1560.
 Gerlach, W. 1560.
 Germann, A. F. O. 15. 1566.
 Ges. für Chemische Industrie in Basel 16. 1657. 1658.
 Gies, W. J. 1621.
 Gleditsch, E. 1571.
 Göroitz, K. 1648.
 Goldstein, W. 1621.
 Gortner, R. A. 161.
 Gottschalk, A. 161.
 Gottstein, W. 1614.
 Gräff, S. 1622.
 Graham, V. A. 16.
 Grandell, G. 1662.
 Granier, J. 1566.
 Greenfield, A. D. 16.
 Grigaut, A. 1641.
 Grilli, V. 1645.
 Grosse, A. v. 1590.
 Grynfeltt, E. 163.
 Gye, W. E. 1629.
 Gyemant, A. 1555.
 Hägglund, E. 166.
 Hahl, H. 1632.
 Haller 1651.
 Haller, J. 1656.
 Haller, R. 1654.
 Hammer, H. F. 16.
 Hammett, L. P. 16.
 Hannemann 1633.
 Harada, K. 1613.
 Harned, H. S. 156.
 Harnist, C. 1648.
 Harvey, E. N. 161.
 Hausen, H. 1569.
 Heft, H. L. 1621.
 Heilmann, P. 1623.

- wwig, H. 1577.
 rmans, P. H. 1574.
 1575. 1594.
 rrdorf, E. 1658.
 rz, R. 1657.
 rzog, O. R. 1663.
 ss, A. F. 1622.
 ymans, C. 1612.
 1625.
 bbad, P. L. 1646.
 lberg, H. 1568.
 lditch, T. P. 1586.
 ll, A. V. 1620.
 ll, J. M. 1643.
 ume, K. 1621.
 agland, D. R. 1646.
 A. 1647.
 fmann, G. 1634.
 lborn, L. 1570.
 lbrook, W. F. 1666.
 liday, L. B., & Co.,
 Ltd. 1657.
 llub, J. 1651.
 lschneider, F. 1597.
 1598.
 pkins, B. S. 1556.
 rvath, A. A. 1642.
 yer, E. 1659.
 yer, F. 1661.
 ynakowski, C. 1634.
 rd, C. De W. 1572.
 ernationale Galalith-
 ges. Hoff & Co. 1665.
 cobus 1659.
 ader, G. 1639.
 yma, W. 1569.
 1570.
 nke, M. 1621.
 nsen, P. B. 1619.
 idal, S. J. 1640.
 achimoglu 1629.
 nes, G. W. 1666.
 nge, A. J. K. de 1611.
 eph, F. 1641.
 hn, M. 1621.
 landyk, S. 1569.
 lf, J. 1604.
 ppen, H. 1645.
 rmann, F. 1605.
 1606. 1607. 1608.
 1609. 1610.
 pper jr., G. F. 1624.
 rtess, A. 1652.
 mura, S. 1614.
 ng, G. L. 1621.
 sser 1615.
 ein, G. 1615.
 mperer, F. 1628.
 ingler, A. 1658.
 uyver, A. J. 1617.
 1618.
 ry, J. 1651.
 iberle, K. 1597. 1599.
 eichig, I. 1620.
 nig, W. 1565.
 ollegorskaja, E. 1616.
- Kollo, C. 1639.
 Kolthoff, I. M. 1591.
 Korn 1661.
 Korschun, C. 1564.
 Krähenbühl, E. 1652.
 Kränzlein, G. 1671.
 Kratzzeisen, E. 1629.
 Kraus, E. J. 1636.
 Krause, E. 1590. 1596.
 Krechel, F. 1631.
 Kreis, W. 1589.
 Kreitmair, H. 1626.
 Kriz, R. A. 1624.
 Kropp, W. 1632.
 Krotkow, D. 1555.
 Krupp, F., Gruson-
 werk, A.-G. 1649.
 Kühn, S. 1660.
 Kuhnhen, W. 1660.
 Kurnakow, N. 1555.
 Kurzweil, F. 1654.
 La Barre, J. 1628.
 Ladd, W. S. 1621.
 Lamb, A. B. 1558.
 Lampe, W. 1641.
 Lamplough, F. 1667.
 Lang, R. 1635.
 Lanil A.-G. 1662.
 Lardy, G. C. 1563.
 Laubengayer, A. W.
 1576.
 Lauter, S. 1621.
 Lawrie, L. G. 1653.
 Lecher, H. 1597. 1598.
 1599.
 Leimdörfer, J. 1660.
 Lenhard, W. 1663.
 Leuzinger, P. 1608.
 Lévêque, A. 1638.
 Levine, S. Z. 1624.
 Lewin, L. 1628.
 Liebreich, E. 1567.
 Lilienfeld, L. 1665.
 Lindener, B. 1579.
 Lindner, K. 1577.
 Lingelsheim, A. v. 1617.
 Linnmann, G. 1668.
 Linzenmeier 1642.
 Lodotschnikow, W.
 1553.
 Loebel, B. O. 1614.
 Loughlin, G. F. 1643.
 Lüthy, M. 1582. 1584.
 Lutze, H. 1585.
 Mc Anlay, J. 1554.
 Mc Carrison, R. 1620.
 Mc Intyre, G. H. 1557.
 Mc Kenzie, A. 1595.
 Macleod, J. J. R. 1625.
 Malenković, B. 1667.
 Marian, S. 1651.
 Marino, Q. 1651.
 Marquina, M. 1556.
 Martin, J. C. 1646.
 Martinet, J. 1599.
- Maschinenbau-Anstalt
 Humboldt 1618.
 Massin, M. 1669.
 Matton, M. 1625.
 Maurin 1640.
 Meisenburg, K. 1663.
 Meneghetti, E. 1624.
 Mentzel, H. 1629.
 Menzani, R. 1629.
 Merck & Co. 1631. 1632.
 Mergelsberg, O. 1626.
 Meßner, J. 1623.
 Meyer, A. E. 1662.
 Meyer, J. 1591. 1602.
 Meyer, K. H. 1663.
 Meyer, S. 1569.
 Mezger, R. 1667.
 Mhaskar, K. S. 1626.
 1627.
 Miller, M. 1604.
 Mills, J. E. 1571.
 Minerals Separation
 Ltd. 1667.
 Moeller, W. 1671.
 Moles, E. 1556.
 Molinari, C. de 1663.
 Moore, A. R. 1612.
 Morgan, G. T. 1594.
 Moriondi, C. 1664.
 Mudd, S. 1611.
 Mühlen, v. d. 1651.
 Mueller, E. F. 1627.
 Müller, E. 1558. 1559.
 Müller, F. 1558. 1559.
 Müller, O. 1641.
 Müller, R. 1664.
 Müller, R. W. 1649.
 Murlin, J. R. 1624.
 Myers, C. N. 1627.
 Nagel, W. 1630.
 Name, R. G. v. 1637.
 Naphtali, M. 1660.
 Nathansohn, A. 1625.
 Neelmeier, W. 1654.
 Nelson, E. E. 1624.
 Neu, G. W. 1669.
 Neuberg, C. 1619.
 Neumann, B. 1633.
 Newbery, G. 1588.
 New Jersey Zinc Co.
 1645.
 Nichols Copper Co.
 1644.
 Nickel, G. 1599.
 Niederländischer Bund
 für den Handel mit
 Fetten, Ölen und
 Ölsaaten 1659.
 Niklas, H. 1647.
 Nitrogen Corp. 1643.
 Nivière, J. 1659.
 Njegovan, V. 1571.
 Noback, C. V. 1612.
 Nodon, A. 1561.
 Normann, W. 1659.
- Norsk Hydro-Elektrisk
 Kvaestofaktieselskab
 1644.
 Northrop, J. H. 1614.
 Nowotay, R. 1667.
 Odin, M. 1627.
 Oettingen, K. v. 1623.
 Onnertz, P. 1654.
 Otto, J. 1570.
 Oxman, M. 1555.
 Paiseau, J. 1666.
 Panisset, L. 1617.
 Parrish, P. 1643.
 Pellini, E. J. 1625.
 Pemmerl, M. P. 1668.
 Pereira, H. 1658.
 Perkin jr., W. H. 1588.
 1600.
 Peterhauser, F. 1654.
 Peters, A. 1654.
 Petit, V. J. 1643.
 Petró, K. 1627.
 Petzold, K. 1662.
 Pichard, G. 1645.
 Piekenbroek, F. 1659.
 Pink, H. S. 1588.
 Piper, H. A. 1624.
 Pirschle 1615.
 Plant, S. G. P. 1603.
 Porter, C. R. 1594.
 Prud'homme, M. 1570.
 Purdy, W. J. 1629.
 Qvist, W. 1587.
 Raatz, G. 1625.
 Radulescu, D. 1600.
 Râth, C. 1605.
 Rahmlo, H. 1625.
 Raymond-Hamet 1641.
 Reynier, P. 1670.
 Rhenania Verein Che-
 mischer Fabriken
 A.-G. 1644.
 Richards, B. W. 1668.
 Richardson, H. B. 1624.
 Richter, A. 1616.
 Richter, G. A. 1663.
 Riddell, W. C. 1648.
 Riedel, J. D., A.-G.
 1631. 1632.
 Ristenpart, E. 1662.
 Rivière, G. 1645.
 Robertson, R. C. 1617.
 Robinson, R. 1604.
 Robinson, W. L. 1625.
 Roll, C. 1564.
 Rosenmund, K. W.
 1660.
 Rossi, C. 1644.
 Roueka, E. 1643.
 Rousseau, E. 1565.
 Roux, A. 1599.
 Royer 1577.
 Ruppel, W. 1663.
 Sani, G. 1645.
 Sazerac, R. 1617.
 Schandroch, J. 1662.

- Schedler, J. A. 1605.
1606.
Schidlöf, A. 1570.
Schleicher, A. 1577.
Schlöttig, O. 1596.
Schmidt, E. 1585.
Schmidt, K. F. 1572.
Schmidt, O. 1669.
1670.
Schmidt, W. 1614.
Schmitz, W. 1577.
Schmölter, H. 1625.
Schneevoigt, A. 1651.
Scholz, M. 1653.
Schütz, W. 1560.
Schulek, E. 1660
Schumacher, J. 1627.
Schwartz, P. 1667.
Schwarz, J. M. 1650.
Scott, F. H. 1621.
Seitz, F. 1602.
Semjatschenski, P.
1555.
Serebrijski, J. 1614.
Seyderhelm, R. 1642.
Shaw, F. W. 1634.
Shaxby, J. H. 1562.
Short, W. F. 1605.
Sidgwick, N. V. 1603.
Sigmund, W. 1615.
Singmaster, J. A. 1645.
Smirnow, A. 1613.
Smith, S. 1661.
Soc. an. Française des
Forges et Aciéries
de la Sarre 1649.
Soc. anon. Lumière
1650.
Soc. d'Exploitation des
Procédés Escaich
1655.
- Soc. pour la Fabri-
cation de la Soie
„Rhodiaseta“ 1654.
Soc. pour l'Industriali-
sation des Produits
de la Mer 1663.
Sohst, A. 1656.
Sommerfeld, A. 1553.
Sottery, C. T. 1629.
Speer, W. 1597.
Ssamoilow, J. 1578.
Stahl, A. 1626.
Standard Oil Co. 1668.
Starkweather, H. W.
1555.
Staudinger, H. 1582.
1584. 1585. 1589.
Steinert, H. E. 1556.
Stevenson, F. M. 1653.
Stimson, R. W. 1649.
1650.
Stinnes, K. 1669.
StockholmsSuperfosfat
Fabriks Aktiebolag
1647.
Stöcklin, P. 1597. 1599.
Stokes, J. A. 1657.
Stoll, E. 1560.
Stoyle, F. W. 1600.
Strauss, M. L. 1621.
Strekalowa, L. 1578.
Stuber, B. 1625.
Sulser, J. 1665.
Sulzberger, N. 1663.
Summer, J. B. 1612.
Sutter, C. C. 1624.
Tagliani, G. 1652.
Tatum, W. W. 1657.
Teupel, E. 1665.
Thauss, A. 1670.
- Theaman, H. 1633.
Thibaud, J. 1561.
Thornhill, E. B. 1649.
Thornhill-Anderson
Co. 1649.
Thuau, U. J. 1669.
Tietze, E. 1601.
Timpany, R. 1566.
Tobler, R. 1658.
Tolstoi, E. 1624.
Tone, F. J. 1650.
Trotman, E. R. 1593.
Trumble, M. J. 1668.
Truttwin, H. 1628.
Tschelinzew, W. 1580.
1581.
Tschervjakow, N.
1578.
Tschui, J. 1609. 1610.
Ullrich, H. 1616.
Ulrich, H. 1669.
Urbain, É. 1668.
Vail, W. E. 1558.
Valentin, F. 1620.
Vaur, R. 1617.
Venter, O. 1664.
Verein für chemische
und metallurgische
Produktion 1644.
Verge, J. 1617.
Verley, A. 1602.
Viale, G. 1565.
Vidal, R. 1660.
Vogel, R. 1579.
Vollmer, H. 1614.
Voß, A. 1671.
Vries, A. de 1652.
Wagner, H. 1656.
Wahlin, H. B. 1560.
Walden, P. 1557.
- Wartenberg, H. v. 1575.
1575.
Weber, B. 1639.
Wedekind, E. 1609.
Weigel, D. 1572.
Weinand, C. 1604.
Weinstock, M. 162.
Weiss, E. 1622.
Wendehorst, E. 163.
Wernadski, W. 1579.
1579.
Werner 1615.
West, R. 1621.
Wiederholt, W. 156.
Wild, G. 1607.
Wilhelm, E. 1653.
Wilhelm, K. F. 166.
Wills, G. O. 1595.
Willstätter, R. 160.
Winkler, L. W. 166.
Winn, H. H. 1666.
Winter, H. 1638.
Wisniewski, F. J. d.
1562.
Wolf, H. 1652.
Worms, J. P. 1654.
Wu, H. 1611.
Yen, D. 1611.
Zambonini, F. 1576.
Zeehuissen, H. 162.
Zellstofffabrik Waldh.
1663.
Zernik, F. 1622.
Zerr, G. 1653.
Zilisteanu, M. 1667.
Zinke, A. 1658.
Zisa, S. 1621.
Zitscher, A. 1655.
Zöllner, E. 1633.
Zuskine, N. 1590.

Die Deutsche Chemische Gesellschaft sucht eine Anzahl
ungebundener Exemplare des

Jahrgangs 1920 des Chemischen Zentralblatts

zurückzukaufen und bittet um umgehende Angebote.

Geschäftsstelle der Deutschen Chemischen Gesellschaft

Berlin W. 10, Sigismundstr. 4

HOCHAKTUELL!

Soeben erschien und ist durch uns zu beziehen:

B. Rasso

Die Chemische Industrie

(Band I der Reihe: Die Deutsche Wirtschaft und ihre Führer.
Herausgegeben von K. Wiedenfeld. Gotha, Flamberg Verlag)

XIX u. 131 S. 8°. Mit 3 Bildnissen und 6 Ansichten chemischer Großbetriebe
Geheftet Rm. 3.50. Gebunden Rm. 4.—.

AUS DEM INHALT: **I. Chemische Technik:** Ältere Entwicklung und Eintritt in den Wettbewerb; Entwicklung bis 1900 (Anorg. Großindustrie, org. Präparate, Teerfarbstoffe, künstl. Heil- und Desinfektionsmittel, ätherische Öle und Riechstoffe, andere Zweige); 1900–1914 (Anorg. Großindustrie usw.); Kriegszeit; Nachkriegszeit. **II. Wirtschaftlicher Aufbau:** Besonderheiten; Statistisches (Lohnsummen, Außenhandel, Kunstdünger, Durchschnittsernten, Teerprodukte usw.); Gemeinschaftseinrichtungen; Kartelle und Verbände; Führer (Caro, Bosch, Merck, Goldschmidt, Raschig usw.).

Diese Schrift des bekannten Leipziger Universitätsprofessors, früheren Generalsekretärs des Vereins Deutscher Chemiker, wird der Bedeutung unserer großen Wirtschaftsführer in der chemischen Industrie gerecht und nicht nur seitens des Unternehmertums und der Wissenschaft, sondern auch bei den Mitarbeitern, einschließlich der gebildeten Arbeiterschaft großem Interesse begegnen.

Lieferung postfrei gegen Voreinsendung des Betrages

Verlag Chemie G.m.b.H. Leipzig, Bosestraße 2
Postscheckkonto 55018

Selbstrasierer

benutzt die Deutsche „Wiking“-Rasierklinge!

Beste Edelstahl-Qualität



Kein Schleifen der Klingen mehr nötig,
da der Neupreis für die „Wiking“-Rasierklinge
nicht höher wie die Kosten des Nachschleifens



Reklamepreis

pro 100 Stück M. 6.80 einschl. Verpackung
pro 50 Stück M. 4.70 einschl. Verpackung

dazu ein Rasierapparat in hochfeinem Etui gratis


Nachnahme 50 Pfennig mehr

Versand direkt an Verbraucher und Wiederverkäufer

Allein-Vertrieb:

Karl Fr. Becker, Hamburg, Colonnaden 43

A. L. G. Dehne, Maschinen-Fabrik, Halle a. S.



Filterpressen
Pumpen
Wasserreinigung
Armaturen



FILTRIR PAPIER

In unerreichter Vollkommenheit und Vielseitigkeit liefern wir auf Grund 40 jähriger Erfahrung unsere

Filtrirpapier-Sonderheiten

für die Zwecke der Technik und analytischen Chemie.
Beim Einkauf achte man auf unsere in allen Kulturländern eingetragenen Etiketten und Schutzmarken.

Carl Schleicher & Schüll, Düren (Rheinland)

In Vorbereitung:

Führer durch die Literatur der Chemie und ihrer Nachbarggebiete

Von Regierungsrat Dr. Kempf und Dr. Wiederholt

100 bis 120 Seiten 8°. Preis etwa Rm. 3.—

Der Führer umfaßt in verschiedenen Zusammenstellungen und Tabellen die gesamte in- und ausländische Fachliteratur, die Zeitschriften, Referier-Organe, General-Register usw., mit allen nötigen Hinweisen, die großen Handbücher, Kompendien, Lehrbücher, Kalendarien und Tabellenwerke, Angaben über Bibliotheken, in denen die Zeitschriften und Werke vorhanden sind und eingesehen werden können, sowie ihre Benutzungsvorschriften, ferner weitere wertvolle Hinweise über die chemische Nomenklatur, die Quellen über chemische und physikalische Konstanten, Angabe der Zeitschriften, die über Patent-Literatur berichten usw. Zur Beherrschung der Literaturquellen ist also der Führer unentbehrlich.

Der Führer wird voraussichtlich im Sommer fertig vorliegen.
Bestellungen werden schon jetzt entgegen genommen.

Lieferung postfrei gegen Voreinsendung des Betrages.

Verlag Chemie G. m. b. H. Leipzig, Bosestraße 2

UNIVERSITY OF ILLINOIS-URBANA



3 0112 077843453